陳氏小兒病源方論
千金寶要
嚴氏明理論

江蘇古籍出版社

千金寶要



江蘇古籍出版社

宛委別藏

（清）阮元 輯

江蘇古籍出版社出版
江蘇廣陵古籍刻印社整理
江蘇省新華書店發行
上海市印刷七廠印刷
開本：七八七×一〇九二毫米 三十二開
印張：一八九七·七五 插頁：四八〇
一九八八年二月第一版
一九八八年二月第一次印刷
ISBN 7-80519-073-9/Z·13
定價：（全120册） 2650 圓

千金寶要六卷提要

孿經室外集卷二

唐孫思邈原本宋郭思采錄刻石案舊唐書思邈本傳止載千金方三十卷葉夢得避暑錄話稱其作千金方時已百餘歲後三十年又作千金翼方云各三十卷今俗閒傳本千金翼方九十三卷兩書清涸不復可別不知何人書志書錄解題並載兩書郡齋讀所定也郭思刻石在宋宣和間其所依据當是思邈原本刻石在華州公署明正統景泰間又重刻石本又有木刻本至隆慶時燿州真人祠復有石刻槩酉

陽雜俎謂昆明池龍宮有仙方三十首思邈以療龍疾得之乃著千金方三十卷每卷置一仙方信為方書中之最可寶貴者書中稱痘瘡為小兒丹毒即元人奇効良方所謂痘疹也或謂此疾出自近代者殆不可從今本錄副以備唐人方書之厓畧云

此書初得華州石刻舛訛最多繼得華州木刻及蜀中及郭武定木刻其訛猶華之石刻也其門類錯亂者茲皆類明拾遺一段為其便于檢閱也其間有字句之謬可以意而為一為其便于檢閱也其間有字句之謬可以意會者乃私改之字高古不能讀者不敢輒易乃仍舊焉至若有所舉重段止似欲人知所避忌也自五勞七傷有小腹急痛起至婦人新產上厠段止既無治法又無令人避忌之意自五勞段數至第二十二段中有凡是病者皆須服之句後淋閉論末又云悉服之立驗或亦萬病玉壺各有所主也因併及之

委官李海立

生員謝沾書

役翊鄒鳳皐刻

千金寶要目錄
婦人第一
小兒第二
中毒第三
飲食中毒第四
餌藥百藥毒第五
蛇蝎等毒第六
喉痺金瘡第七
瘡疽癰腫第八
霍亂吐瀉第九
虎犬馬傷第十　針折入肉附

舌耳心目等大小便第十一
中風大風水氣第十二
瘧痢癰癤等第十三
頭風吐逆第十四
疫癘濁淋第十五
頭面手足瘭瘡漏第十六
痔第十七
論
千金須知
千金寶要目錄終

千金寶要卷之一

婦人第一

妊娠難產燒車軹脂內酒中服亦治腹中痛并欬嗽

妊娠忽苦心腹痛燒鹽令赤熱三指撮酒服之立產

又方吞槐子二七箇

又方菟絲子或車前子以酒或米汁服方寸匕即生

又方水或酒服家中黑塵及小鼈橫生倒生難生者半夏白斂各二兩末之服方寸匕亦可加代赭鞋麥各二兩佳小

子死腹中

兩末之服方寸匕亦可加代赭鞋麥各二兩佳小

難一服橫生二服倒生三服子死四服

又方榆白皮細切煮三升服之

子死衣不出上搶心者急取蟻垤土三升熬之令熱
囊盛熨心良
又方末竈突中墨三指撮水或酒服之
乳無汁者土瓜根末之一服半錢匕日三
衣不出及橫生逆生者小麥小豆煮濃汁飲立出
產三日不出者燒大刀鐶以酒一盞沃之頓服
又方燒藥杵令赤內酒中飲之救死不分孩者
產乳暴絕者製了半夏一兩末之丸如大豆內鼻孔

中愈

又方神麴末水服方寸匕
又方含釀醋嘆而

子死腹中牛屎塗母腹上立出
胎死腹中服水銀三兩立出
未足月而胎死者以苦酒濃煮大豆一服一升死胎立出
妊娠時疾子不下竈中黃土水或酒或泔清調塗臍方寸乾再上
又方酒服車轄脂
又方煞白一把水三升煮熟食煞令盡亦安胎胎死者即出
妊娠中盡燒敗鼓皮酒服方寸匕
妊娠傷寒煞白十莖生薑二兩切水三升煮去半服

取汗

產後血不盡煩悶搐生藕取汁飲二升良

產後腹脹痛者煮黍粘根為飲一服即愈

五色帶下者煮艷帶汁服一二升良

月水不斷灸內踝下白肉際青脉上隨年壯

又方服地黃酒良或大豆服亦佳

月水不利及無子灸四滿三十壯穴在丹田兩邊相

去各一寸半丹田在臍下二寸

漏下積年困篤者取鵲重巢燒灰末之服方寸匕日

三服三十日愈重巢者連二年鵲產其上者是

產後月水往來多少不定或不通痛小腹急腰身重

白馬尿一升服之良

逆生横生者竈下黄土三指撮酒服立出

小兒第二

凡小兒生下不啼者取兒臍帶向身却将之仍呵之百度亦可以芟白鞭之浴新生兒以猪膽一箇汁入湯中令兒無瘡疥

小兒生輒死者便覷兒口中懸癰前上腭有胞者急以指摘取頭決令潰去血勿令血入咽入咽即殺兒慎之

小兒臍不合燒蜂房灰末傅之

小兒中風口噤雀屎如麻子丸之飲下即愈

兒生三日內朱蜜多則生陰瘡朱蜜三日內通得用
三豆許朱蜜多則生瘡朱蜜後與牛黃亦
後可與米飲研米作厚飲如豆大與兒
日二七日後方哺乳
小兒解顱熬蛇脫皮末之和豬頰車中髓傅頂上日
三四
小兒肚皮卒然青黑以酒和胡粉傅上若不急治須
臾便死
又方灸臍左右上下各半寸並鳩尾骨下一寸凡五
處各三壯
小兒暴脹欲死半夏隨多少微炮之為末酒丸如粟

米大日三

小兒丹毒搗慎火草絞取汁塗之

小兒赤遊腫若徧身入心腹殺人搗伏龍肝為末以

雞子白和傅之乾易之

又方白豆末水和傅之勿令乾

又身赤腫起者熬米粉令黑以唾和傅之

小兒傷寒發黃搗土瓜根汁三合服之

又方搗青麥汁服之

又方搗韭根汁澄清滴兒鼻中如大豆許即出黃水

差

小兒霍亂研尿澤乳上服之

又方牛涎灌口中一合

小兒客忤吞麝香大豆許立愈

又方以母月衣覆兒上大良

又方取牛鼻津服之

又方取牛口沫傅乳頭飲兒汁飲兒下便愈亦治噎啼而青腹強核大吞之或含之其針立出者

小兒誤吞針取磁石如棗核大吞之其針立出

誤吞鐵物等艾蒿一把以水五升煮取一升半服之即下

誤吞髮亂髮燒灰酒服一錢
吞錢艾葉五兩以水五升煮取一升頓服即下
又方末火炭酒服方寸匕水服亦得
又方服密二升即出
吞金銀水銀一兩再服之
又方吞水銀一兩再服之漸漸食之多食益佳
吞鏍及指彄燒鴈毛二七箇末服鵝毛亦得
吞鈇鉞鏍白糖二斤一頓服
吞鈇鉞菲令萎蒸熟勿切食多食自消
縷如韭法皆可用但力意多食自消
吞銅鐵而哽燒銅弩牙令赤內酒中飲之立愈
吞釘針及箭鏃等但多食脂肥肉令飽自裹出

吞針取懸針磁石末飲服方寸匕即下

小兒尿竇丹初起兩股入臍陰頭皆赤者水二升桑

皮切二升煮取汁浴之良

又方燒李根為灰以田中流水和傅之良

小兒朱田丹一日夜即成瘡先從背漸徧身如棗

大赤者濃煮棘根洗之已成瘡者赤小豆末傅之

小兒野火丹徧身皆赤者用油塗之

小兒茉萸丹初起背徧身如繒一宿成瘡者煮赤小豆末以傅之

豆作末以

小兒廢竈火丹初起足趺正赤色者以棗根煮汁沐

浴五六度自愈

小兒風痙隱疹心迷悶巴豆二兩以水七升煮取三升加減用之

升故皂染汁拭之大人石二兩末之酒三升清令消皂染汁拭病上

又方礬石一兩末之酒五斤煮取一升半皂染汁拭病上

小兒隱疹入腹體强舌乾無津子末酒服方寸匕日

三

又方蚕沙二升水二升煮取一升去渣洗之

又方鹽湯洗了以蓼子授傅之

又方車前子作末傅之

諸丹毒渠中藻菜細切熟搗傅丹上厚三分乾易之

又方芸臺菜熟搗厚封之隨手即消如餘熱氣未愈

但三日內封之使醒醒好差止

五色油丹縛母猪枕頭卧之良

又方牛屎塗之乾則易之

赤流腫搗火麻子水和傅之

又方以羊脂煎了磨之赤黑丹起偏身者殺人

小兒瘡初起漂凝似火瘡熟搗桃仁以麪脂和傅之

亦治偏身赤腫

小兒身體頭面生瘡榆白皮隨多少暴令乾末之醋和塗絲以傅瘡上虫自出

小兒丹毒馬齒莧一握搗取汁飲之以滓傅之

又方搗赤小豆五合水和取汁飲之一合良滓塗五

心

又方濃煮大豆汁塗之良差亦無瘢痕

又方臘月猪脂和釜下土傅之乾則易之

小兒五色丹搗翁薑葉傅之

又方薤白一把豉一升以水三升煮取二升分三服

又方柏葉一升麻子末一升以水五升煮取三升分三服

兒每服三合

又方搗石榴汁服之

又方亂髮灰鹿角灰等分三歲兒以水和服三錢匕

日二

小兒赤白痢單服生地黃汁一合

小兒熱病者木瓜葉飲之
小兒冷病萎菜搗汁量大小飲之一作芥菜
又方搗蒜傅兩足下
小兒暴病赤小豆末酒和塗足下日三油和亦得
小兒盡毒病藍青汁一升二合分為四服飲之
小兒渴病搗木瓜汁飲之
小兒頭不生髮楸葉搗汁傅之
小兒瘡瘡家中石灰厚傅之
小兒浸淫瘡以竈下黃土髮灰等分末之以猪脂和傅之

小兒濕癬煎馬尿洗

小兒斑疹入眼浮萍陰乾為末以生羊子肝半箇入
蓋內以杖子刺碎沒水半合絞取肝汁食後調下
不甚進者一服已傷目者十服見效大人亦可用

小兒赤熱腫目川大黃白礬朴硝等分為末冷水調
作掩子貼目上

小兒重舌腫起舌下以朴硝研水敷咽喉外其內用
成塊者含涎出乃平

小兒重舌蜱虫和薄荷研汁帛包蘸舌下腫起重舌
又方地膽蘸舌下筋包蘸舌下腫起重舌
極證用指去爪先于舌下筋上擦至根漸深擦如
此三次又用指蘸水取項後燕窠小坑中筋自下

趕下至小腹病去矣

小兒禿瘡及惡瘡以苦練皮燒灰以猪脂調傅大人惡瘡亦可用

小兒卵腫偏墜防風牡丹皮等分為末每服二錢ヒ溫酒調服鹽湯亦可

小兒卒客忤以竈中黃土蚯蚓糞等分研細水調塗兒頭上及五心良

又方米粉鹽等分炒變色腹上摩之

小兒頭瘡經年不差者取屋塵末和油瓶下滓以皁角湯洗傅之

小兒頭瘡胡粉一兩黃連二兩末之洗瘡去痂拭乾
傳之即差再發再傳之
禿瘡蔓荊子細末先洗傳之
小兒惡瘡熬豉令黃末之傳瘡上不過三度傳愈
小兒手足及身腫者以小便溫煖漬之即愈傳愈
又方巴豆五十枚去心皮以水三升煮取一升以絲
內湯中拭病上隨手消并治隱疹
小兒脫肛灸頂上旋毛中三壯即入
又方灸尾翠骨三壯
小兒痃癖麻子傳之日六七度
又方灸臍中隨年壯

小兒濕瘡濃煮地榆汁洗浴日兩度

小兒尿血燒鵲巢灰井花水服之亦可治尿血淋

小兒解顱猪牙煩車髓傅顖上差

小兒風瘙隱疹牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不差

搗末傅之亦治骨疽癲疾瘭痙絶妙

小兒胎寒嘔啼驚癇腹脹不嗜食大便青黄并大人虚冷或有實不可吐下者馬齒莧一斤燒半日以棗膏和大人服如梧子二丸日三小兒以意減之

小兒五色丹猪槽下爛泥傅之乾則易之以愈為度

又方服黄龍湯二合并傅瘡上

小兒赤丹芸臺葉汁服三合滓傅上

小兒赤丹斑駮唾和胡粉從外向內傅之良

又方煅鐵屎為末以猪脂和傅之

又方屋塵以臘月猪脂和傅之

小兒火丹赤如朱走皮中酢和敲研傅之即愈

又方搗荏子傅之

又方猪屎水和絞取汁服少許

小兒天火丹大如手徧身或痛或癢生麻油塗之

小兒火丹其證小蒜厚封之着足踝者是

小兒殃火丹每着兩脇及腕下者伏龍肝末和油傅

之乾則易之若入腹及陰則以慎火草取汁服之

小兒夜啼不已醫所不治者即已

水服如黍米大二枚其啼即止

小兒即止

又方取狼糞中骨燒作灰末馬骨燒灰傅乳上飲兒即止

小兒吐痢燒特猪屎水解取汁少少服之良

又方搗白花胡葵子末煮汁服之

又方雞屎白服一錢匕

各一壯

又方灸臍下一寸三壯又灸橫紋百壯又灸口兩吻小兒溫瘧鹿角末先發時便服一錢匕

又方灸两乳下一指三壯

小兒洞注下痢蔌藜子二升搗汁溫服以差為度

又方木瓜搗汁飲之

又方炒倉米末飲服之

又方炒石榴燒灰服半錢匕日三

又方酸石榴燒灰服半錢匕日三

又方炒枳實令焦水淋汁服之神驗冷則酒淋服

小兒赤白帶下薤白一把豉一升以水三升煮取一升分為三服

升分為三服

又方柏葉一升麻子末一升以水五升煮取三沸百

日兒每服三合

又方搗石榴汁服之

又方亂髮灰鹿角灰等分三歲兒以水和服三錢匕

二

中毒第三

凡卒死無脈無佗形候牽牛臨鼻上二百息牛舐必差牛不宜舐上即牛宜舐

又方牛馬屎絞取汁飲之無新者水和乾者亦得一法以人溺解之

又方炙熨斗熨兩脇下又治尸厥

又方搗韭汁灌鼻孔中歔者灌兩耳一云灌口中

又方搗韭汁灌鼻孔中即覺

鬼魘不悟末伏龍肝吹鼻中

又方末皁角少大豆許吹鼻中嚏則氣通起死人亦治中惡

又方灸兩足大指叢毛中二七壯亦救卒死人中惡

中惡菝心黃剌鼻孔中血出差一云男左女右

使目上人尿其面上愈

又方使人尿其面上愈

中惡并蠱毒冷水調伏龍肝如雞子大服之必吐

又方溫二升猪肪頓服之

又方車軨脂如雞子大酒服之

又方中惡灸胃管五十壯愈

卒忤中惡也鹽八合以水三升煮取一升半分二服

得吐即愈若小便不通筆頭七枚燒作灰末水調
服即通
又方犢子屎半盞酒三升煮取一升頓服之亦治霍亂一云治
鬼擊又云大牛屎亦可用
又方書墨末之水服一錢匕
又法卒忤死灸手十指爪下各三壯又灸人中三壯
又灸肩井百壯又灸間七壯又灸巨闕百壯
卒中鬼擊及刃兵傷血漏腹中煩滿欲絶雄黃粉酒
服一刀圭一日三服血化為水
鬼擊之狀卒着人如刀刺胸腹紋痛或吐血或口鼻
血出或下血雞屎白如棗大青花麻一把以酒七

升煮取三升熱服須臾發汗不汗熨斗盛火灸兩肋下熱汗出愈

又方艾如雞子大三枚以水五升煮取二升頓服

又方吹酢少許鼻中

救自縊死者以氈褥極須按定其心勿截繩徐徐抱解之心下尚溫者以氈覆口鼻兩人吹其兩耳立活

又方僵卧以物塞兩耳竹筒內口中使兩人痛吹之

塞口傍一日死人即噫噫噫即勿令氣出半日勿吹也

又方搗皁角細辛屑如胡豆大吹之兩鼻中

又方搗藍青汁灌之口中即活男雌文雄

又方雞血塗

又方雞屎白如棗大酒半盞灌口及鼻中半時吹兩耳內一小竹筒子中西人各捉一筒同時吹兩耳兩鼻中即活

又方尿鼻口眼耳中并捉頭髮如筆管大一撮掣之

立活

又方自縊死灸四肢大節陷大指本文名曰地神各七壯

熱暍着熱死者取道上熱塵以壅心上若少冷即易氣通即止

又方仰卧口暍人熱土壅臍上令人承之臍上溫即愈

又方可飲熱湯亦可內

稍咽勿使飽但以熱

又方濃煮蓼取汁三升飲之即愈如不愈再飲

又方地黄少乾薑橘皮甘草煮飲之稍上佳

又方水半盖和麪一大抄服之

又方張死人口令通以湯入腹須臾即蘇

頭令湯漿一盖即愈

又方灌地嚏其心令暖易人為之

又方使人抱狗子或雞著心上熨之

又方屋上南畔瓦熱熨心冷易之

救落水死者以竈中灰布地令厚五寸以竹管中吹下孔中即當吐水水下盡二方寸匕去甑下死人伏于甑上使頭口相對捉死人兩脚上下少垂下抄鹽灰內其口中及兩耳

人心下足得暖卒無甦者于岸側削地如竈燒令暖以死人着上亦可用車轂為之勿令隱其腹令死人低頭水得出并炒灰數斛令暖以粉身溼更易溫者

又方但埋死人暖灰中頭足俱没惟開七孔

又方倒懸死人以好酒灌鼻中又灌下部又酯灌鼻亦得

又方縣裹皁角內下部中須臾水出

又方裹石灰內下部中水出盡則活

即易

又方熬沙盛囊覆死人面上下有沙但出鼻口耳沙冷溼

又方倒懸解去衣去臍中垢極吹兩耳起迤
又方竈中灰二石埋死人從頭至足出七孔即活
又方屈兩脚着生人兩肩上死人背向生人背即負
持走行吐出水便活
又方落水經一宿猶可
活
冬日落水凍四肢直口噤有微氣者以大器中熬灰
使暖盛以囊薄其心上冷即易心暖氣通目得轉
口迤開可溫尿粥稍稍呑之即活若不先溫其心
便持火爭即死
卒中惡風心悶煩毒欲死者急灸足大指下橫文隨

年壯即愈

上件病若筋急不能行者内踝筋急灸内踝上三十壯立愈

十壯外踝筋急灸外踝上四

卒中惡風眼戴睛灸目兩皆後二七壯

卒中惡心痛苦參三兩吠季肋頭七壯

人頓服老小二服

又方桂心八兩吠咀以水四升煮取一升半分作二

服

飲食中毒第四

凡諸食中毒飲黃龍湯及犀角汁無不治也飲馬尿

亦良

又方食百物中毒掘地坑中著水取以飲之

又方含貝子一枚須臾吐食物差

又服生韭汁數升亦得

中毒煩悶苦參三兩㕮咀以酒二升半煮一升頓服之取吐愈

食六畜肉中毒各取六畜乾屎末水服之佳

食自死六畜肉毒服黃藥末方寸匕須臾復出

又方燒小豆一升末服三方寸匕

又方水服竈底黃土方寸匕

食生肉中毒掘地深三尺取下土三升以水五升煮

土五六沸取上清飲一升立愈

食牛肉中毒煩悶欲死方

又方溫湯服狼牙灰水服方寸匕一作猪牙

又方水煮甘草汁飲之

食馬肉血洞下欲死豉二百枚杏仁二十枚吠咀蒸之五升米下飯熟搗之再服令盡

又方蘆根汁飲以浴即解

食猪肉中毒燒猪屎末服方寸匕犬屎亦佳

食百獸肝中毒頓服猪脂一斤佳

食陳肉毒方同上

食馬肝中毒牝鼠屎二七枚兩頭尖者是以水研飲

之不差更作

食野菜馬肝肉諸脯肉毒取頭垢如棗核大吞之可起死人

又方燒狗屎灰水和絞取汁飲之立愈

又方燒猪骨末之水服方寸匕日三

茅屋漏水沾脯上有毒搗韭汁服之良大豆亦得

肉閉在密器中者名蠶肉有毒燒狗屎末水服方寸匕凡生肉熟肉皆不藏蓋不泄氣皆殺人又方

在器中密蓋氣不出亦殺人

脯在黍米中有毒麴一兩水一升鹽兩撮煮服之

食中射罔脯毒末貝子水服如豆佳不差又服

食餅臛中毒方同上

以肉作餅臛食多吐下服犀角末方寸匕甚良

食鵝鴨肉成病胸滿面赤不下食者服秫米汁大良

食中魚毒煮橘皮湯停極冷飲之其效甚大

食中魚毒及中鱷魚毒剉蘆根舂取汁多飲良亦可

取蘆葦莖汁飲之

蟹毒方同上又冬瓜汁服二升亦可食冬瓜良

山中木菌毒人尿汁服一升良

食魚膾不消燒魚鱗水服方寸匕

食諸鮑魚中毒方同上

食牛馬肉中毒飲人乳汁良

酒病豉白各一升以水四升煮取二升頓服之

飲酒中毒煮大豆三沸飲汁

酒醉不醒葛根汁一斗三升飲之取醒止

又方酒漬乾棋汁服之

連日酒煩毒不堪

又治大醉

千金寶要卷之一終

解百藥毒第五

凡解百藥毒甘草薺苨大小豆汁藍汁藍實汁藍根汁並解

雄黃毒防已汁解

礬石毒大豆汁解

金銀毒服水銀數兩即出鴨屎解水和雞屎汁煮菽

鐵粉毒礜石汁並解

防葵毒葵根汁解

桔梗毒白粥汁解

甘遂毒大豆汁解

芫花毒防己防風甘草桂汁並解

大戟毒防己防風甘草桂汁並解

蜀椒毒葛蒲汁解

烏頭毒葵子汁桂汁豉汁及水調服解

斑猫芫青毒猪脂大豆汁或鹽藍汁鹽湯煮猪骨並

解

馬刀毒清水解

杏仁毒土漿人糞汁解

野芋毒土漿人糞汁解

諸菌毒掘地作坑以水沃中攪之令濁澄清飲之名

地漿解一切毒藥不止者甘草蜜四兩㕮咀以水五升煮甘草取二升去滓歇大熱內粉湯中攪令勻調內白蜜四兩更煮令熟如薄粥適寒溫飲一升最佳

解一切毒藥不止者甘草蜜四兩㕮咀以水五升煮甘草取二升去滓歇大熱內粉湯中攪令勻調內白蜜四兩更煮令熟如薄粥適寒溫飲一升最佳

解一切毒藥不止者甘草蜜四兩㕮咀以水五升煮甘草取二升去滓歇大熱內粉湯中攪令勻調內白蜜四兩更煮令熟如薄粥適寒溫飲一升最佳

解一切毒藥不止者甘草蜜四兩㕮咀以水五升煮甘草取二升去滓歇大熱內粉湯中攪令勻調內白蜜四兩更煮令熟如薄粥適寒溫飲一升最佳

解鴆毒及野葛毒已死口禁者取青竹去兩節柱兩肋臍上內冷水注之暖即易之須臾口開開即服藥立活惟須數易水

解鴆毒及野葛毒已死口禁者取青竹去兩節柱兩肋臍上內冷水注之暖即易之須臾口開開即服藥立活惟須數易水

石藥毒白鴨屎人參汁並解

食菖蒲苦悶亂如卒中風者飲甘草汁藍青汁即愈

中鉤吻毒欲死者齏苾八升冷如人體服五合日三夜二凡煮齏苾惟濃佳

升冷如人體服五合日三夜二凡煮齏苾惟濃佳

又方煮桂汁飲之

又方嚼薤汁飲甘草汁藍青汁即愈

諸毒方同上

中蠱蚘根各三兩㕮咀以水四升煮取二升頓服

又方槲樹北陰白皮一大握長五寸水三升煮取一

升空腹服即吐虫出

中蠱下血方同上

諸熱毒或盡毒口鼻血出取人屎光七枚燒作灰色置水中研之頓服即愈亦解百毒時氣熱病之毒諸服藥過劑悶亂者飲藍汁溫覆取汗勿輕此方極神驗

水和胡粉地漿蕹荷汁並解

瘡中水毒炭白灰胡粉等脂調塗瘡孔上水出則痛止

瘡中水腫方同上

卒刺手足中水毒搗韭及藍青置上以火灸熱徹即愈

破傷風腫厚塗杏仁膏然麻燭遥灸之

蛇虺蝮蛇毒蝎蜈蚣蜴蜥蜘蛛蜣蜋蜂蜜蜡蝎蜜蜡蝎蜜蜡蝎

又方用銅青傅瘡上

又方搗大蒜和胡粉傅之

又方雞屎二七枚燒作灰投酒服之

又方以麪圍上令童男尿其中燒鐵令赤投中冷復燒着二三度差

又方口嚼大豆葉塗之

又方猪脂和鹿角灰塗之

又方鹽四兩水一斗煮十沸定以湯浸冷易之

又方搗紫菀取汁飲一升以滓封瘡以少水灌之

又方梳中垢如指大長一寸尿和傅之

又方灸梳汗出處之

又方取合口椒胡荽苗等分搗傅之無不差

又方灸螫處三七壯無艾以火頭稱瘡孔大小熱之

蛇嚙人屎厚塗帛裹即消

睡中蛇入口挽不出以刀破蛇尾內生椒三兩枚裹即出

着須臾即出

又方艾灸蛇尾即出

又方以刀周匝割蛇尾截令皮斷仍將皮倒脫即出

蛇入口並入七孔者割毋猪尾頭瀝血着口即出

又方以患人手中指等截三歲大猪尾以器盛血傍

蛇瀉血口中拔出之

卒為蛇繞不解以熱湯淋之

又方令人尿之

蛇蝎螫服小蒜汁滓傅上

又方熟搗葵取汁服

又方取齒中残飯傅之

又方猪脂封之

又方射罔封之

又方砒砂和水塗上立愈

又方碗着手足冷水浸水微暖則易之着餘處冷水

又方若着手足冷水浸水微暖則易之着餘處冷水

浸故布揄之小暖則易

又方生烏頭末唾和傅之

射工毒不治七日能殺人鬼白葉一把内苦酒中漬

之熟搗絞汁服一升日
又方取生吳茱萸莖葉一
水二升煮取七合頓服
又方取葫切貼瘡灸七壯
又方赤莧菜搗絞取汁一服
又方白雞屎取白頭者三枚湯和塗中毒
已有瘡者取芥子熟搗苦酒和厚塗瘡上半日痛便
止

又方取狼牙葉冬取根搗
四五合

蚰蜒入耳炒胡麻搗之以葛袋盛傾耳枕之即出

又方以牛酪灌之滿耳即出出口口消若入腹中空腹食好酪一二升即化為黃水而出不盡更服于水毒凡山水有毒虫人涉水中人似射工而無物其初得之惡寒微似頭痛目眶疼心中煩懊四肢煩腰背百節皆强兩膝痛或翕翕而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷至肘膝一三日腹中生虫食人下部肛中有瘡不痛不癢令人不覺不急治過六七日下部出濃潰虫上食人五臟熱盛毒煩下利不禁八九日良醫不能治矣不過十日殺人欲知是中水與非者當作五六升湯以小蒜五升

吸咀投湯中消息勿令大熱去滓以浴之是水毒
身體當發赤斑無異者非也治中水毒取梅若桃
葉搗絞取汁三升許或乾以少水絞取汁飲之小
兒不能飲以汁傅乳頭與喫
又方搗蒼耳汁服一升又以滓裹杖沾汁導下部日
二過即差
又方蓼一把搗以酒和絞取汁一升服之不過三服
一作葉葉
又方藍一把搗水解以塗并導下部生者尤用汁凡夏
月行常多賫此藥屑入水上流無
又方搗蛇苺根末水飲之

又方服王不留行即出兼取根末貼之

又方煮山龍麥汁飲之日三差止

又方用牛膝根莖生者併搗以薄之即出瘡雖合猶出

又方白茅根燒末以膏和塗之亦治瘡因風致腫

又方嚼白梅塗之

又方頭垢開口內兒尿煮三兩沸浸病上傅之即出

惡刺苦瓠開口內兒尿煮三兩沸浸病上傅之即出

又方濃煮大豆汁漬取差

又方莨菪根水煮浸之冷復易

喉痺金瘡等第七

喉痺痺桂心末如棗核大絲裹着舌下即破其喉痺剝又方荊瀝稍稍咽之

又方只將顖上近頭心髮直上作力提之出其喉痺剝然一聲遂破最奇

墮落車馬及木打已死者以死人安着以手袖掩其口鼻眼上一食頃活開眼與熱小便二升

凡墮落傷損欲死取淨土五升蒸之令溜分半以故布數重裹之以熨病上勿令大熱恐破皮肉冷則易之取痛止則已凡有損傷以此法治之神効已死不能言者亦活三十年年者亦差

腕折骨損者以大麻根葉搗汁飲一升無生麻煮乾
麻汁服
腕折四肢骨碎及筋傷蹉跌生地黃不限多少熟搗
用薄所損處又云爛搗熬之以裹傷處以物縛令急勿令轉動
裹令遍縛令急勿令轉動一日可十易三日差若
血駈在折處以刀子破去血
四肢骨碎筋傷蹉跌竹編夾
頭破腦出中風口噤大豆一斗熬去腥勿使太熟搗
末熟蒸之氣徧合覷下以酒一斗淋之溫服一升
凡被打損血悶搶心氣絶不能言可闢開口灌其中

令下咽即醒

卒中毒矢搗藍汁一升飲之

布漬絞汁飲之并淋瘡中

又方內鹽臍中灸之

又方煎地黃汁作丸服之百日矢當出

又方煮蘆根汁飲三升

又方多飲葛根汁并治一切金瘡

又方末雄黃傅之當沸汁出愈

又方末貝齒服一錢匕大良

又方搗葛根汁飲之葛白屑熬黃傅瘡止血

金瘡破腹腸突出欲令入取人屎乾之以粉腸即入并薄瘡上若無藍取青

矣

又被傷腸出不斷者作大麥粥取汁洗腸內之當研米粥飲之二十日稍稍作強糜百日後乃可差耳

金瘡煩滿赤小豆一升以苦酒漬之熬令燥復漬滿三日日三

箭鏃及諸刀刃在咽喉胸膈諸隱處不出者牡丹皮一分白斂二分一方作白歛二味治下篩以酒服方寸匕日三出

又方取苦蔄汁塗箭瘡上即出

又方酒服薤方寸匕日三差

卒為弓弩矢所中不出或在肉中有瘀血取婦人月經

布燒作灰屑酒服之

又方白飲半夏等分治下節酒服方寸匕日三浅瘡

金瘡血出不止桑根十斤沸服一升即止

十日出深瘡二十日出

又方柳絮封之

又方搗車前汁傅之血即絶連根用立効

又方飲人尿三升愈

又方以蜘蛛幕貼之

金瘡腹中瘀血大麻子三升大棗白二七枚使數人各搗令熟用九升水煮取一升半頓服之若血出不盡腹中有濃血更合服當吐膿血耳

金瘡内漏還自取瘡中血着杯中水和服
又方七月七日麻勃一錢匕日
五夜二
又方牡丹皮為散水服三指撮立尿出血
金瘡若痛楊木白皮熬令燥末之服方寸匕日三又
末傅毛刺瘡痛不可忍百治不差者熬一杷以水三
升煮數沸漬洗瘡止痛良
傷墜車馬及諸物隱體肉斷者以酢和麪塗之
筋骨傷初破時以熱馬尿傳之無瘢
又方大豆二升水五升煮取二升以醇酒六七升合

和豆汁服之一日盡如湯沃雪用小豆亦佳

落車墜馬及木崩血腹滿短氣大豆五升以水一斗煮取二升去豆一服令盡劇者不過三作

金瘡便以石灰厚傅無石灰只灰亦可裹之止痛又若深未宜速合者內少滑石令瘡不時合也

針灸瘡血出不止燒人屎灰傅之

金瘡出血多其人必渴當忍之噉燥食并肥脂之物以止渴慎勿醎食若多飲粥及漿犯即血動溢出又忌嗔怒大言笑思想陰陽行動作勞多食酸醎飲酒熱羹臛葷菜瘡差後猶須如此出百日半年乃可復常也

又方燒乾梅作炭搗末傳之一宿即差亦治被打傷

又方磁石末傳之止痛斷血

又方桑白汁塗桑白皮裹或石灰封之妙

又方麻葉三升以水三升煮取三升半為一服

又方飲麻子汁數升亦治毒箭所傷

又方蚯蚓屎以水服方寸匕日三

又方杏仁石灰細末猪脂和封亦主犬馬金

又方搗楮穀子傳之

瘡癰腫第八

發背亂髮灰酒服方寸匕亦治瘭疽

又方飲鐵漿二升取利

又方三年醋滓微火煎令稠和牛脂傅上日四五亦治發乳

又方猪脂切作片冷水浸貼上暖則易之五六十片差初貼少許即寒寒定好眠甚妙

又方燒鹿角灰醋和傅之日四五

帛裹展轉傅上良

又方以麻子熬作末摩其上良

又方酒和麵傅之

又方剝去瘡痂溫醋泔清洗之以胡燕窠百日男兒

又方亂髮灰服方寸匕日三亦治發背

又方煮芸薹菜取汁一升服之并食乾熟芸薹數頓少與鹽醬冬月用其子水和服之

又方以猪膽傅之良

又方枸杞根葵根葉煮汁煎如糖服之隨意

又方臘月糖畫夜浸之數日乃愈

疽潰後鹽湯洗拭了燒皁角灰粉之良

又方以牛耳中垢傅之良

又方以生麻油滓縣裹帛瘡上垂出

又方以沸湯灌瘡中三四徧了明日還滿膿如小豆

疽似癰而小有異今日去膿

汁者芸薹熟搗濕布裹盛之埋熱灰中更互熨之
即快得安不過再三
又方皁角煎湯洗拭乾
以蘗皮末傅勿令作痂
一切腫毒痛不可忍者取萆麻子搗傅之即差
惡毒腫一宿可殺人者以一升日三
四服滓傅腫上冬中根亦可用起死神方
魚臍丁瘡尚香草搗取汁飲
燒灰塗貼即差
又方先以針刺瘡上四畔作孔搗白苣取汁滴瘡孔
丁腫忌見麻勃見即死者以針刺四邊及中心塗雄

黄末立愈一云塗黄土

又方鼠新望土和小兒尿傳之

又方鐵衣末和人乳汁傳之立可

又方小豆花為末傳之差

又方人屎尖傳之立差

又方以四神丹一枚當頭上安經宿則根出矣四神

丹方在第十二卷中

凡腫病須百方内外攻之生商陸一斤猪脂一斤煎

可得二升二味如煎令黄去滓以磨腫處亦可服

少許并塗以繆清之燥輒傳之不過三日差

因瘡腫痛者皆中水及中風寒所作其腫入腹則殺

人溫桑灰汁漬之冷復溫之常令熱神秘

治癰疽花為末膠和如粥傅之

瘡發心胸以下者武都雄黃松脂各三兩不差更合

子刮為散飲服方寸匕日三

石癰堅如石不作膿者生商陸根搗傅之乾則易之

取軟為度又治濕漏諸癰節

又方蜀桑根白皮陰乾搗末炷膠以酒和藥傅腫即

拔出根

又方酯和良薑末傅頭上即拔出根

又方蛇脫皮貼之經宿差

又方梁上塵葵根莖灰等分醋和傅之即差

又方櫟子一枚以醋于青石上磨之以塗腫上乾更塗不過十度即愈

又方當上灸之百壯石子當碎出如不出益壯乃佳

癰腫痛煩悶生楸葉十重貼之以帛包令緩急得所

日二易止痛無消腫蝕膿其良勝于衆物如冬月用時鹽潤之亦可薄消楸皮用之

始覺腫令消以莨菪末三指撮水和服之日三神良

已結膿使聚苦蔞根末之苦酒和傅上燥則易赤小豆亦佳

癰腫芥子末湯和傅紙上貼之

又方白薑石末蒜和搗傅上差

膿潰後瘡不合熟嚼大豆傅之
又方炒烏麻令黑熟搗傅之
又方牛糞傅之乾則易
又方燒破蒲席灰臘月猪脂和内孔中
癰久不差馬齒葉搗汁煎刺傷瘡不差者石硫黄粉
癰瘜肉不斷及諸物濕内硫黄中以刺瘡孔瘡
癰瘜肉中如眼睛諸藥不効犯
一兩筋一片搥頭碎少許丁瘡無菁根鐵生
差為度
和搗以大針刺作孔復削無菁根如針大衣等分
生衣塗上刺孔中又塗所搗者封上仍以前鐵

緋帛塗貼之有膿出易之須臾拔根立差忌油膩
生冷酢滑五辛陳臭粘食
又方刺瘡頭及四畔令汁極出搗生栗黃傅上以麪
圍之勿令黃出從旦至午根即拔矣
又方以新針亂刺瘡銅器煮熬醋令沸
瀉麪圍中令容一盞冷則易之三度即拔根出
又方取蛇脫皮如雞子大以水四升煮三四沸去滓
頓服蒼耳苗搗取汁二升飲之滓傅上立差
一方灸掌後橫文後五指男左女右七壯
癰肉中如眼諸藥不効取附子削令如碁子安腫上

唾貼以火灸之令附子熱氣微焦復唾濕復以火灸之
如是三度令附子熱氣徹內即差
一切毒腫疼痛取葷麻子熟搗傅之即差
脚腫向上至腹即殺人者赤小豆一斗以水三斗煮
令爛去滓出豆以汁浸脚至膝每日一度差止若已入
腹不須浸但煮豆食之忌鹽菜米麪等湯飲汁差
瘡久不差而復發骨從孔出名骨疽以猪脂和楸
葉搗封之
又方搗白楊葉傅之
又方無菁子搗傅之帛裹一日一易

又方穿地作坑口小裹大深三尺取乾雞屎二升以艾及荆葉擣碎和雞屎令可然火坑中燒出將疽就坑口熏之以衣擁口勿泄氣半日當有虫出甚効

附骨疽槲皮燒灰飲服方寸匕

又方灸閒使後一寸隨年壯耳根莖苗子但取一色燒為灰酢泔淀和如泥塗上乾則易之不過十度即拔根出神良

又方取鐵漿每飲一升立差

又方麪和臘月猪脂封上立差

又方蒺藜子一升燒灰醯醋和封上經宿便差或針

破頭封上更佳

又方皁角子取仁作末傳之五日內差

又方艾蒿一把担燒作灰于竹筒中淋取汁以一二合和石灰如麪漿以針刺瘡中至痛即點之點三遍其根自拔

赤眼丁熬白鼠糞等分令黑窯和傳之良

又方以新望鼠壤水和塗之熱則易之

又方搗馬牙齒末臘月猪脂和傳之可拔根出亦燒

灰用

火燒瘡慎不得以冷水洗熱得冷更深入骨壞人筋

骨□□初被火燒急更向火灸疰大痛强忍之一

食久即不痛神驗

又方家中一文子火燒手且浸浸至掌急以酸酢升餘浸之出酢尚痛時不瘡不膿不瘢神妙神妙

又方未熬油麻和梔子仁塗之惟厚為佳

又方已成瘡者燒白糖灰粉之即燥立差

因瘡而腫痛劇者數日死或中風寒或中水或中尿刺燒黍穰若牛馬屎若生桑條燒取多煙以熏之汗出愈如無生桑條燒取得多煙之物燒熏汗出愈

又方熱蠟內瘡中新瘡亦善

又方以息公英草根莖白汁塗之惟多塗為佳大神效此草蜀中名耳瘢菜關中名苟乳乳腸癰雄雞屎頂上毛并屎燒作末空心酒服又方截取檐頭尖少許燒作灰水和服當作孔出膿血愈

又方瓜子三升末之以水三升煮取一升五合分三服

又方死人家上土作泥塗之

內癰未作頭者服雞屎即差

又方腸癰屈兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血即差

婦人妬乳取葵莖瓦末之飲服方寸匕日三□□□

法為末不為瓦

又一方取葵莖瓦研米槌二枚灸令熱以絜及故帛揭乳上以槌更互熨之差止

乳癰以水磨盛醋泔清燒石內乳漬之冷更燒石即愈

前少熱內中沸止更燒如

愈

又一方取苽白搗傅之并絞汁一升頓服即愈

又方柳根削取上皮搗令熟熬令溫盛練袋中熨乳

上乾則易之一宿即愈

又方鹿角治下篩以猪脂上清汁服方寸匕不過再

服亦可以醋浆水服

千金寶要卷之二終

霍亂轉筋嘔吐瀉第九

之一方作梨葉

又方燒故木梳灰末之酒服一枚小者永差

又方車轂中脂塗足下立差

又方作極鹹鹽湯于槽中煖漬之

又方以醋煮青布搦之冷復易之

轉筋不止若男子以手挽其陰牽之女子挽其乳近

轉筋在兩臂及胸中者灸手掌白肉際七壯又灸亶中

左右邊

中府巨闕胃管尺澤并治筋拘頭足皆愈

霍亂引飲飲輒乾嘔生薑大佳

二升半分二服高良薑五兩㕮咀以水五升煮取

中熱霍亂暴利心煩脉數欲得冷水者新汲井水頓

服一升立愈先患胃口冷者勿服之

霍亂吐下腹痛以桃葉煎汁服一升立止冬用皮

走哺轉筋灸踵踝白肉際各三七壯又灸小腹下橫

轉筋灸湧泉六七壯在足心下當拇趾大筋上又灸

足大趾下約中一壯

又方轉足踝聚筋上白肉際七壯立愈

轉筋入腹痛欲死四人持手足灸臍上一寸十四壯

自不動勿復持之又灸股裏大筋去陰一寸

霍亂轉筋令病人合面正卧伸兩手著身以繩橫量脊骨兩邊相去各一寸半灸

霍亂已死有煖氣者灸承筋取繩量圍足從趾至跟度令頭至跟踏地處別縪上

西捻取等折一半以灸頭即是穴灸七壯起死人又以鹽內臍中灸

二七壯

水三升煮取一升頓服之良

又方香茅
佳
蠱毒宿食不消霍亂極醎鹽湯三升熱飲
令吐宿食使盡不吐更服吐訖復飲三
服吐乃住此
死而已凡有此病即須先用之
又方蒴豆一升香薷一升以水六升煮取二升分服
單用亦得
胞轉小便不通亂髮急纏如兩拳大燒末
二方寸匕服之訖即炒熟黑豆葉蹲坐其上
又方阿膠三兩水二升煮取七合頓服之

又方豉五合以水三升煮數沸頓服之

又方麻子煮取汁頓服之

又方連枷關燒灰水服之

又方筆頭燒灰水服之

又方灸玉泉七壯穴在關元下一寸大人從心下處取八寸是玉泉穴小兒量酌取之

又法灸第十五椎五十壯

又法灸臍下一寸隨年壯一日四寸

吐逆霍亂吐血灸手心主五十壯

吐血生地黃肥者五升搗以酒一升煮沸三上三下去滓頓服之

又方服桂心末方寸匕日夜可二十服亦治下血
忽吐血熟艾三壯子許水五升煮取二升頓服
又方燒亂髮灰水服方寸匕日三亦治舌上忽出血
如簪孔者亦治小便出血
中盡下血數十行苦瓠一枚以水二升煮取一升
稍稍服之當下盡及吐蝦蟆蝒科斗之狀一月後乃
盡又云用苦瓠之又云用苦酒一升
煮

虎犬馬傷第十　針折入肉附

虎咬瘡煮葛根令濃以洗之十遍飲汁及搗為散以
葛根汁服方寸匕日五六甚者夜二

又方青布急卷為繩止一物燒一頭然內竹筒中注
瘡口熏之以妙
又方煮鐵令濃洗瘡
又方嚼栗子塗之良
剝死馬骨傷人毒攻欲死便取馬腸中屎塗之大良
又方取其屎燒灰服方寸匕
狂犬咬人毒有七日一發百日內殺人者每到七日
搗韭汁飲一二升當終身禁食犬肉蚤蝨若犯則
死不可救瘡未愈之間禁食生魚及諸肥膩冷食
但于飯下蒸魚及于肥器中食便發不宜飲酒過
一年乃佳

猘犬嚙人搗地榆絞汁塗瘡無生者取乾
汁飲之亦可末之服方寸匕日三兼傅
止

又方搗韭絞汁飲一升日三四清塗之日三四
又方以豆醬清塗之日三四瘡愈止
又方刮虎牙或骨服方寸匕日三
猘犬毒燒虎骨傅瘡及熨又燃微熬杏仁搗研取汁服
之良又取燈盞殘油灌瘡口此皆禁生菜猪肉魚
酒

又方用韭根洗故梳二枚以水二升煮取一升頓服
又方桃東南枝白皮一握水二升煮取一升分二服

吐出犬子

又方服艮岩子七枚日一百壯以後當日灸一壯

又方梅子末酒服

猘犬所齧惡血未盡灸上佳

若不出血刺出其血百日灸乃止禁飲酒猪犬肉

凡犬齧人以熱牛屎塗之和聚着折針上即出

針折入肉中刮象牙末水和聚着折針上即出

又方磁石吸鐵者着上即出

舌耳心目等大小便第十一

舌卒腫滿口溢出須臾不治殺人急以指刮破舌兩

邊去血汁即愈

步即出

又方桃葉火熨卷之口塞耳立出

又方車肛脂傅耳孔自出肘後以療聤耳膿血

又方以茹涕灌耳中虫即出肘後亦治耳聾

齒齗間血出不止生竹茹二兩醋煮合之含之其血合即止

又方溫童子小便半斤取三合一即荊葉取汁酒服二合

九孔出血搗荊葉取汁酒服槐枝一握去皮煮汁空腹以意服之

九種心痛取當太歲上新生槐枝一握去皮煮取一升頓服

以水三升煮取一升頓服之

又方桃白皮兩頭吹咀

婦人心痛布裹鹽如彈丸燒作灰酒服

又方燒秤錘投酒中服佳
又方炒大豆投酒中服佳
產後卒心腹痛桂心三兩酒三升煮取二升去滓分
三服日三
又腹中苦痛生牛膝五兩酒五升煮取二升去滓分
二服若乾牛膝根即酒浸一宿方可煮
奔豚氣急作湯以浸兩手足數數易之
又方灸章門百壯一名長平二穴在大橫外直臍肋
端
又方灸氣海百壯穴在臍下一寸半
又方灸關元百壯在臍下三寸

又方灸中極五十壯在臍下四寸

又方灸第二肋端傍一寸五分

又方灸期門百壯直乳下八寸臍下橫文是也

奔豚腹中與腰痛灸中府百壯穴在兩乳上三肋間

耳聾有膿不差有虫先以縣纏去耳中汁以礬石末

粉耳中次以石鹽末粉其上食久乃起不過再永

差

聤耳桃仁熟搗以故絁絹裹內耳中日三易以差為

度

治底耳黃礬燒縣裹內耳中不過三日愈或以葦管

吹耳中

治虫心痛鶴虱末之密和梧子大服四十丸日三蜜湯下加至五十丸慎酒肉

又方鶴虱一兩末之空腹溫酢一盞和服之虫當吐出

又方服漆一合

熱翳漫睛夜卧開目納之即閉目以羊筋漱口熟嚼

睡去膜明日差亦治眯目

眼暗以銅器盛大酢三四升煎七八日覆器口漉地取銅青一合以三月杏仁一升取汁和銅青傅之日不過三四度大良

又方含黃蘗一爪甲許使津置掌中拭目訖以水洗之至百日眼明此法乃可終身行之永除眼疾神良

崔目術令崔目人至黃昏時看崔宿處打令驚起崔飛乃呪曰紫公紫公我還汝盲汝還我明三過作之眼即明曾試有驗

大小便不通葵子末一升青竹葉以水二升煮煮五沸頓服

又方葵子一升榆皮一升水五升煮取二升分三服

又方葵子一升以水三升煮取一升去滓納豬脂一升煮取一升分二服

又方瓠帶煮取汁和蒲黄方寸匕日三服

又方猪脂一升以水二升煮取三沸飲汁立通

又方灸臍下一寸三壯

失欠頰車蹉一人以手指牽其頤以漸推之引矣推常疾出指恐悞齒傷人指也

又方消蠟和水傅之

目眯不出以蚕沙一粒吞之即出

卒食物入鼻有入腦羊脂如指大內鼻中吸上物隨

脂下

鼻中出血不止搗楮葉汁飲三升大良

齒痛蚯蚓糞水和作稠泥圍以火燒之令極赤如粉

以臘月猪脂和傅斷上日三兩度永差

又方馬齒莱一把嚼之即差

齒根動欲落生地黃縣裹着齒上咋之及咀以汁

漬齒根日四五并咽汁十日大佳

大便難好蜜膠三寸匆白一把以水四升煮取一升半頓服之即下

又方葵子汁和乳汁等分服之立出

大便失禁不拘老人小兒灸兩脚大指去甲一寸三壯

小便不通水四升洗甑帶取汁煮葵子取二升半分三服

又方胡燕糞敗各一合和搗丸如梧桐子大服三丸日三

又方髮去垢燒末一升葵子一升以飲服方寸匕日三

又方石槽塞灰土井花水服之日三

又方服車前子末方寸匕日三百日止

卒不得小便車前草一把桑白皮半兩㕮咀以水三升煎取一升頓服之

婦人卒不得小便者杏仁二七枚熬末服之

又方紫菀末井花水服三指撮立通血出四五度服之

大小便不利葵子二升消石二兩以水五升煮取二升分再服

升分再服

小便不利大便數注灸屈骨端五十壯

胃反食則吐搗粟米作麪水和作丸如梧子大七枚

爛煮內酢中細細吞之得下便已麪亦得用之

胃反食即吐出上氣蘆根莖根各二兩細切以水四

升煮取二升頓服之得下良

又方飲白馬尿即止

又方淘小芥子暴乾為末酒服方寸匕日三

又方灸兩乳下各一寸以差為度

上氣上酥一升獨頭蒜五顆先以酥煎蒜黃出之生

薑汁
上氣嘔吐不下腹溫服方寸匕
梧子大七丸日二亦可作散酒浸服治臍下絞痛
腳氣入腹困悶欲死吳茱萸六升木仆兩箇切以水
一斗三升煮取三升分三服如人行十里久再進
一服或吐或汗或利或大熱悶即差此起死人方
卒噎塞滿口着蜜食之即下
又方刮楮杵頭細糠含之即下
又方老牛涎棗核大水中飲之終不復噎
齲齒及虫痛切白馬懸蹄如米許以綿裹着痛處孔
中不過三度

又方家中法以煮酒蠟少許任在虫孔子中以熱火
筋烙之令蠟融于孔立愈
熱病後眼暗失明以羊膲槐子陰乾百日食後吞一
明目令髮不落牛膲中漬槐子陰乾百日食後吞一
枚十日身輕三十日白髮再黑百日通神
明目小黑豆每日空心吞二七粒
又方三月三日採蔓菁花陰乾治下飾空心井花水
服方寸匕久服可夜讀細書
目赤及翳烏賊骨鉛丹大小等分合研細和白蜜如
泥蒸之半食久冷着眼
治三十年聾故鐵三十斤以水七斗浸三宿取汁入

麴釀米七斗如常造酒法候熟取磁石一斤研末
浸酒中三日乃可飲取醉以緜裹磁石內耳中好
覆頭卧酒醒去磁石即耳中
耳聾鳴汁出一二十年不差
汁和黙入麝香少許以生菖蒲根
耳聾已豆十四箇成鍊松脂半兩合治丸如黍米大
緜裹以簪頭着耳中一日一易藥如硬微火灸之
以汁出乃愈妙
又方菖蒲附子等分末之以麻油和以緜裹內耳中
又方芥子搗碎以男兒乳和緜裹內之
又方作一坑可容二升許着炭火其中坑似窖形以

磚覆口上磚上作一孔可容小指磚孔上着地黃一升以木盆覆之以泥泥盆下勿泄盆底上鑽一小孔可容筯其孔上着三重布以耳孔當盆上熏久若悶去布度神効

又方酒三升浸牡荊子二升碎之浸七日去滓任性服盡三十年聾亦差

又方硫黃雄黃各等分末之絲裹內耳中數日聞人語

中風大風水氣第十二

大風半身不遂垂沙兩石熬令蒸作直袋三枚各受七斗熱盛一袋着患處如冷即取餘袋一依前法數

數易百不禁差止須羊肚釀粳米芍白薑椒豉等
爛煮熱喫日食一枚十日止千金不傳
百種風灸腦後項大椎平處兩廂量二寸三分各灸
百壯得差須取病人指寸量
卒病惡風欲死灸第五椎名曰藏輸一百五十壯三
中風口僻眼急諸藥不能差者枳實上青刮取末欲
至心止得如茹五升微火炒去瀝氣以酒一斗漬微
火暖令得藥味隨性飲之大驗治緩風急風並佳
中風口喎炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服
之口噤不開亦治

又方大皁角一兩去皮子下節以三年大酢和左喎
塗右右喎塗左乾更塗之差
卒氣短搕韭汁服一升立差
大風疾煉松脂投水中二十徧蜜丸服二兩飢便服
之日三鼻柱斷離者二百日服之差斷鹽及雜食
房室
又方天門冬酒服百日愈
大風灸百會七百壯
腎寒灸腎輸百壯
中風口喎灸手交脈三壯左灸右右灸左其狂如鼠
屎橫安之兩頭下火

風勞毒種疼痛攣急桃仁一升研如常法以酒三升攪和頓服之厚衣盖令汗不過三劑猥退風草麻子脂一升酒一斗銅鉢盛着酒中一日煮之令熟服之

失音濃煮桂汁服一升覆取汗亦可末桂着舌下漸漸咽汁

又方濃煮大豆汁含亦佳無豆用豉

歷節風松膏一升酒三升浸七日服一合日再數劑愈

冷氣氣短蜀椒五兩絹袋盛以酒一斗浸之二七日服之任意多少

卒上氣鳴急便欲死者搗韭汁服一升良
久氣枸杞葉生薑各二兩叉咀以水三升煮取一升
頓服
心腹冷痛熬鹽一斗熨熬蚕沙燒磚石蒸熨取其裹
溫暖止蒸土亦大佳
虛勞浮腫灸太衝百壯又灸腎輸
虛勞不得眠酸棗榆葉等分末之蜜丸如梧子大每
服十五丸日再
又方乾薑四兩末湯和頓服覆取汗愈
一切虛羸鹿骨一具碎枸杞根切二斤二味各以水
一斗別器各煎汁五升去滓澄清仍合一器共煎

取五升日二服盡好將慎皆用大斗
補虛羸九月十日取生薑枸杞子一斗酒六升煮五
沸出取研之熟濾取汁令其子極淨暴子令乾搗
末合前汁微火煎令可丸酒服二方寸匕日二加
至三方寸匕亦可加至五十丸
腹脹滿繞臍結痛堅不能食灸中守百壯穴在臍上
一寸一名水分
脹滿氣聚寒冷灸胃管百壯三報穴在鳩尾下三寸
脹滿瘕聚滯下冷疼灸氣海百壯穴在臍下一寸忌
脹滿氣如水腫狀小腹堅不可針灸膀胱募百壯穴在

中極傍各一寸臍下四寸
脹滿腎冷痰聚洩利灸天樞百壯穴在臍傍相對橫
去臍三寸兩傍各二寸
諸冷極馬蘭子九升淨治去土空腹服一合日三飲
及酒下之服訖須臾以食壓之取差乃止
骨蒸天靈蓋如栝大灸令黃碎以水五升煮取二升
分三服起死人神方
又方取人屎灰以酒服方寸匕日三
走症燒車缸令熱暫入水以潑布裹熨之
三十年氣症豉心半升生椒一合以水二升煮取半
升適寒溫用竹筒縮取汁令病者側卧以手擘大

孔射灌之少時當出惡物此法垂死患治得差百
千不可具述
欬嗽胸脇支滿多唾上氣
經宿煮取半升分三服
酢飯三四口止之
又方薑汁一升半浸肥皁莢兩挺
服之
又方白糖五分微煅令消內皁莢末方寸合煎薑汁減半內糖更煎
又方服芥子七丸以油酒下之
先食服如小豆二丸
上氣欬嗽乾羌末三兩膠飴一斤二味和令調烝五

升米下以棗大含稍咽之日五夜二
卅年嗽百部根二十一斤搥取汁煎如飴服方寸匕
日三
又方白蜜一斤生羌二斤取汁二味先將銅銚秤知斤兩訖內蜜復秤知數次內羌汁以微火煎令羌汁盡惟有蜜斤兩在丸如棗大含一丸日三禁一切雜食
又方紫菀二兩款冬花二兩末之食後以飲服方寸匕日三七日差
久水腹大如鼓烏豆一斗熬令香勿令大熟去皮為細末餳粥皆得服之初服一合稍加之若初服多

後即進嬉臭服盡即更造取差止不得食肥膩渴則飲羹汁慎酒肉猪雞魚牛羊兎鹿肉此處大飢渴時食之可忍亦勿食也生冷酢滑房室得食漿粥此病難治雖諸大藥丸散湯膏當時雖差過後復發惟此散差後不發終身服之終身忘發矣其所禁食物常須少噉莫隨意醎物諸雜食等

又方葶藶末二寸匕蒼耳子灰二寸匕調和水服之

日二

又方椒目沉水者取熬之搗如膏酒服方寸匕

又方水煮馬兜零服之

水腫利小便葶藶四兩生用桂心一兩末之蜜飲下

梧子大七九日二以知為度

又方牽牛子末之水服方寸匕日一利止

又方郁李仁末麪各一升和作餅子七枚熬熟空腹

熱食四枚不知更加一枚加至七枚

大水頭面徧身腫脹苦瓠白穰實捻如大豆以麪裹煮一沸空腹呑七枚至午當出水口升三四日水自出不止大瘦乃差三日內慎口味也苦瓠須好無厭翳細理研口口口口有毒不堪用崔氏用子作餅食之恐虛者牛乳服之如此隔日作服漸加至三七枚以小便利為度小便若太多即二日一停止

水通身腫煎猪椒枝葉如餳空腹服一匕日三痒以
汁洗之
又方苦瓠膜二分葶藶子五分熬搗為丸如小豆大
服五丸日三
又方單服牛尿大良凡病水無不差服法先從少起
得下為度
又方大棗肉七枚苦瓠膜如棗核大搗丸如行十五里久又服一服三丸水出更服一丸即止
又方煎人尿令可丸如小豆大日三服
又方葶藶桃仁各等分皆熬合搗為丸服之利小便
一曰用杏仁

又方搗生薑亭歷子酢和服小便數為度

又方燒姜石令赤內黑牛尿中令熱服一升日一

又方灸足第二趾上一寸隨年壯又灸兩手大指縫頭七壯

凡卒中風口喎以葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麪窓塞之勿令泄氣一頭內大豆一顆并艾燒之令然灸七壯即差患右灸左患左灸右耳病亦灸之若不能語者灸第三指上百壯若眼反口噤腹中切痛灸陰囊下第一橫理十四壯人卒死者灸法同之

破傷風腫厚塗杏仁膏燒麻燭遙灸之

刺傷中風水刮箭羽下漆塗之

又方服黑牛熱尿一服二升三服即止

又方煮韭熟搦之

又方蠟一兩熱灸熨薄裹其上水出愈

千金寶要卷之三終

卒下痢黄連五兩生薑一斤㕮咀以水五升煮取一
升頓服未止更服
久冷白痢日夜五六十行大小腹痛不可忍好麴末
五升微熬令和溫清酒令熱和麴末一升空腹頓
服日三服若至食時搦蒜一升令至熟下薑椒調
和如常食法惟須稠勿加鹽以水和麴二升作索
餅極爛煮之乾漉熱內蒜薑臼中相和一頓食之
少與餘食至飢時仍準前食麴末酒比至差不過
久冷或痢或不痢但患腰腹苦冷者上等新蜀椒三
升用醋宿漬之以麴三升和椒一升緊拌煮作粥

空腹頓服之加葱豉鹽任性調和不差更作以差為限不過三升椒即全去知耳

冷極有所益久當自愈此不但治冷大治諸虛損

瘧或間日或夜發者燒黑牛尾頭毛作灰酒服方寸匕日三

又方無問新久者小便一升半蜜三匕同煮三沸頓服自至發勿食重者漸退不過三服差

一切瘧無問遠近正仰臥以線量乳間中屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右

五臟諸瘧灸尺澤七壯穴是肘約上動脈

禳瘧法未發前抱一大雄雞時時驚動令雞作大聲立差

卒暴癥腹中有物堅如石痛如斫刺晝夜啼呼不治百日必死牛膝二斤㕮咀暴之令乾以酒一升浸之密塞氣口煎取半升一服半升一服便吐去宿食神効

又卒暴癥取商陸根搗碎蒸之以新布藉腹上以藥鋪布上冷復易之數日勿息

凡所食不消取其餘類燒作末酒服方寸匕便吐去宿食即差如食桃不消者以時無桃就樹間得槁桃燒服亦可

卒食不消欲成癥積者煎艾汁如飴取半升作一服
便利吐去宿食神良
又方白艾五尺圍一束薏苡根一大把二味㕮咀以
食魚肉等成癥結并諸毒氣狗屎五升燒末絞裹之
雜中食痰實不消心腹堅痛以水三升煮白鹽一升
盡隨所食便出矣
以酒一斗浸再宿濾取清分十服日三服三日使
令消分三服自吐亦治暴癥
患癥結病及瓜病似瓜形或在臍左或在臍右或在
臍上下若鱉在左右肋下或當心如合子大先針
其足以椒熨之取一新大盆受一斗者盆底鑽一

百二十孔孔上着椒三合上着一重紙上着冷
灰一升上着灰半升上着剛炭火
食頃盆底熱徹當病上安盆火
盆大熱以漸更加一重若火更熱不可忍加至三
口口及一口冷飲還上火消二分許即停經三日
不差作末露宿丸服之方在第十六卷中
驚癪腹堅硬腫起大如盆眠臥不得取藍
三升絞取汁服一升日二
又方葫蘆根白莖一握研取汁水和服之
食口得病為驚癪在心下堅強雞屎一升炒黃取五

合以酒一升浸半為末以所浸酒服方寸匕日三作一劑

蛟龍病開皇六年三月八日有人食芹得之其人病發似癲癎面色青黃因食寒食餳過多便吐出蛟龍有頭及尾從茲有人患此疾令服寒食餳二斗米擣常欲食米若不得米則胸中清水出雞屎一升白米五合合炒令米焦搗末以水二升頓服取盡須臾吐出病如研米若無米當出疾自此永憎米

大驗

不復食

頭風吐逆第十四

凡食後吐酸水乾薑茱萸各二兩治篩酒服方寸匕
日二胃冷服之立驗
嘔噦蘆根切三升以水一斗煮取四升分四服
乾嘔吐逆涎沫出者半夏乾薑等分㕮咀以漿水一升半煮取七合頓服之日三
乾嘔酒浸馬屎一宿取汁服之
又方灸心主尺澤亦佳
又方灸乳下一寸三十壯
乾嘔不止粥食湯藥皆吐不停灸手間使三十壯若治噦煮豉三升飲汁佳
四厥脉沈絶不至者灸之使通此起死人法

又方空腹飲薑汁一升

又方濃煮蘆根汁飲之

又方灸承漿七壯炷如麥大又灸臍下四指之

惡心苦乾嘔不下食以酒水三升煮取一升頓

服須臾吐下如蝦蟆衣狀小便百日佳

又方服麻子一升熬令香熟搗取酒三升熟研濾取一

升飲盡日二服盡口石差一切病自能食飲不能

升飲即止

酒者任性多少

食飲輒吐頓服生熟湯三

吐逆食不住灸胃管百壯三報

吐逆飲食却出灸脾募百壯三報章門也

咽痛逆氣不能食麻子一升熬令黑以酒一升淋取汁空心一服一升漸至二升多汗好覆勿觸風冷

此方無理產婦及丈夫中風如角弓反張口噤不開

治婦人氣平旦服烏牛屎日一止

腰痛以酒單服鹿茸與角方寸匕日三

腰臀痛導引法正東坐收手抱心一人于前據躡其兩膝一人後持其頭徐牽令偃卧頭到地三起三

腰痛灸法宜針決膝腰句尺一中青赤路脉出血便

又方灸脚跟上横文中白肉際十壯良
又方灸足巨陽七壯巨陽在外踝下
又方灸腰自窌七壯在尻上約左右
腰卒痛灸八窌及外踝上約中
頭風大灸窮骨上一寸七壯
又方灸八窌及外踝上骨約中
九升方
又方服判澥不限多少取差止
又方搗薤根一升酒二升漬服汗出止
又方末蔓荆子二升酒一升絹袋盛浸七宿溫服三

合日三
又方臘月烏雞屎一升炒黃末之絹袋盛以酒三升
浸溫服任意常令醺醺酣
又方七月麻勃三升麻子一石末相和蒸之沸
湯一石煮取一石神麴五斗三徧淋之煮取二十斤漬
之令發以黍米兩石五斗釀之熟封三七日服清
一升百日身中澀皮入風胸隔五臟骨髓伏風百
病悉去不過三四度愈
頭風沐方蔓荊子煮沐不過三四度愈
又方蜀椒二升以水煮取汁沐髮良
白屑以桑灰汁沐頭去白屑神良

白髮還黑烏麻九蒸九暴末之以棗肉丸久服之佳

又方隴西白芷旋覆花秦椒各一升桂心一尺治下

飾以井花水服方寸匕日三三十日白髮還黑禁

房室

千金寶要卷之四終

疫瘴渴淋第十五

令瘟不相染人汲水瓶上繩長七寸盜着病人卧席下良

又方以繩度所住戶中壁屈繩則斷之

又方桃木煞鬼蟲屎末之水服方寸匕

又方木豉等分酒漬服之妙

又方正旦未吞麻子赤小豆各三七枚又以二七枚投井中

井中

又方新布袋盛大豆一升內井中一宿出服七枚

又方松葉末之酒服方寸匕日三

又方常以七月七日合家向門戶上吞赤小豆二七枚

又方常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆二七枚

又方正旦取東行桑根大如指長七寸以丹塗之挂門戶上

又令帶之

又方常以月望日細剉東引竹枝煮湯浴

瘴氣蒜五升以三歲男兒尿二升煮取三升分三服汗不

升煮五六沸去滓服之良

又方青竹茹二升以水四升煮取三升分三服汗不

止者白朮葉作飲方寸日服三

盜汗韭根四十九枚水二升煮一升頓服

又方豉一升以酒二升浸三日若服不差更合服
過三劑
消渴甘草乾薑各二兩以咬咀水三升煮取一升半去滓
分二服又法有大棗十二箇
渴利生括蔞根三十斤切以水一石煮取一斗半去
滓以牛脂五合煎水盡以溫酒食如雞子大日三
服
渴口便利復非淋楡白皮二斤切以水一斗煮取五
升一服三合日三
又方小豆藿一把搗取汁頓服三升
又方薔薇根水煎服之佳

又方三年重鵲巢燒末以飲服之

又方桃膠如彈丸含之咽汁津

又方蠟如雞子大以酢一升煮二沸適寒溫頓服之

熱渴頭痛壯熱及婦人血氣上衝悶不堪者茅根切

三升搗取汁渴即飲之令盡

消渴病百日以上者不得灸刺

消渴乾薑浮萍栝蔞根等分末之以人乳汁和丸如梧子空腹飲服二十丸日三三年病者三日愈治虛

治渴黃連一斤生地黃一斤又云十斤絞地黃取汁浸黃連出燥曝之燥復內之令汁盡乾搗末蜜

丸如梧子每服二十丸日三食前後無
大渴深掘大栝蔞根厚削皮至白處以寸
散以酒服方寸匕
日夜易水經五日取出爛搗研之以絹袋濾之如
出粉法乾之水服方寸匕日三四亦可蜜丸又云水和栝蔞散服方寸
食之不限多少取差止
匕亦可蜜丸如梧子大每服三十丸
又方取七宝井索近桶口結燒作灰井花水服之不
過三服差
又方取豉清汁任性多少飲之
又方濃煮竹根取汁飲之以差止

又方以青梁米煮取汁飲之以差止

消中日夜尿七八升者鹿角炙令焦以酒服五分匕

日三漸加至方寸匕

又方漚麻汁服一升佳

又方葵根如五升盆大兩束又云五六斤以水五斗煮取汁服三升

煮取三斗宿不食平旦每服三升

諸淋細白沙三升熬令極熱以酒三升淋取汁服一

合

淋痛蒲黄滑石等分末之酒服方寸匕日三

氣淋船底胎如鴨子大水三升煮取二升頓服

又方水三升煮豉一升一沸去滓內鹽一合頓服亦

可單煮豉汁服

又方水一斗煮比輪錢三百文取三升溫服之

又方搗葵子末湯服方寸匕

又方空心單茹蜀葵一滿口止

又方熬鹽熱熨小腹冷復易亦治小便血

又方瞻中着鹽灸三壯

石淋車前子二升絹袋盛水九升煮取三升頓服之

石即出先經宿不得食

又方取浮石使滿一手治下篩以水三升酢一升煮取二服石出亦治噉醇酒

煮之

取二升澄清服一升不過三服

又方常煮冬葵根飲之

血淋生大麻根十箇以水五升煮取二升頓服之亦出血

治小便出血

又方大豆葉一把水四升煮二升頓服之

又方葵子一升水三升煮取汁日三服亦治虛勞尿血

血

又方灸丹田隨年壯又灸伏留五十壯又灸大敦三十壯

五淋灸懸泉十四壯穴在足內踝前一寸斜行脉上是

中封之別名

卒淋灸外踝尖七壯

頭面手足瘰癧瘡漏第十六

凡口吻瘡以經年葵根欲爛者燒作灰熱傅之佳

燕吻瘡白楊枯枝鐵上燒取湔及熱傅之佳

唇上瘡經年不差八月藍取汁洗三日差

諸瘡因風致腫燒白芋灰溫湯調之傅上厚三分乾即易不過五度差

又方櫟根皮三十斤剉水三斛煮令熱下鹽三斛煮令熱以浸瘡當出濃血日日為之差止

的的然熱以浸瘡當出濃血日日為之差止

反花瘡并積年諸瘡取牛蒡根一云牛蒡根熟搗和臘月猪脂封上差止

又方馬齒菜搗封差止

惡露瘡搽
內即差
惡瘡燒扁
又方羊屎
惡瘡似火
洗之
身瘡頭瘡菖蒲末傅上日三夜二
惡瘡十年不差似癩蛇脫皮一枚燒末之猪脂調傅
又方苦瓠
癬甚良
醋調亦得
一枚咬咀煮取汁洗瘡口日三又煎以塗
皆先以泔洗日差
並葉傅瘡口以
大艾炷灸藥上令熱氣入
竹灰和楮白汁塗之
麻根燒煙斷膏和封有汁乾傅
白馬屎暴乾
以河水調煮十
沸絞取汁

又方鹽湯洗搗地黃葉占之

又方燒猳猪屎傅之

諸瘡久不差并六畜瘡棗膏三升水三斗煮取一斗半數洗取愈

代指甘草二兩㕮咀水五升煮取一升半漬之若無

用芒硝代之

又方以麪作椀子盛唾着碉砂搜麪作椀子盛唾調白碉砂如棗大以爪指着中一日差

又方以毛雞黃土作泥指上令厚五分內糖灰中煨令熱可忍泥乾易數度差

又方刺指熱飯中二七徧愈

又方以麻沸湯漬之即愈

又方單煮地榆湯漬之半日差

又方先以刮去膿血炙魚鮓皮令溫以纏裹周匝痛止

便愈

又方蜀椒四合水一升煮三沸以漬之

又方取姜黃葧葉煮湯漬之

指痛欲脫猪脂和鹽煮令消熱內其中食久住千金

翼作和乾薑

手足指掣痛醬清和蜜溫塗之

又方灸指端七壯

手足指逆臚此緣廁上搔頭還坐廁上以指倒將二
七下即差
凍指馬屎三升以水煮令沸漬半日愈
人脚冬夏常拆裂雞屎一升以水二升煮數沸停小冷
漬半日差亦用馬糞
又方羊膠乾故帛貼上
九漏成鍊松脂末之填瘡孔令滿日三四度七日差
又方馬齒莧陰乾臘月燭燼等分末之以臘月猪脂
調先以暖泔清洗瘡拭乾傅之日三
又方乾牛屎乾人屎搗先慕縣于瘡上縣上着屎虫
聞屎香出若癢即舉縣去之更取縣着屎如前虫

出盡乃止

又方苦瓠四枚大如盖者各穿一孔如桔大置湯中煮十數沸取一竹筒長一尺內一頭瓠孔中一頭注瘡孔上冷則易之偏止

又方煮鹽花麪匡中厚二寸臭以麪擁病上內鹽花麪以熨得所可忍冷則無益下以桑葉三重藉鹽候冷熱則肉破一日一度候病根勢消則止若已瘡者

搗穅穀末粉之

又方榆北陰白皮三十斤剉以水一石煮取一斗去滓煎如糖又取都廁上雌雄鼠糞各十四枚燒令汁盡末內煎中溫酒一升投煎中合攪之羸人

五合服之當有虫出
漏作瘡孔上末露蜂房臘月猪脂調傳孔上
瘡因風致腫櫟木根皮一斤濃煮入鹽一斤把漬之
灸瘡不差者每日于上別灸六七壯自差
灸瘡中風冷腫痛但向火灸之瘡得熱則瘡快至痛
止日六七灸愈
諸漏霜下乾薑花暴乾末傅之
又方搗土瓜根薄之燥則易不限時節
又方故布裹鹽如彈丸燒令赤末酒服
又方服白馬屎汁一升
又方正月雄狐屎陰乾末之水調服

又方鹽麪和燒灰傅之

又方水研杏仁服之

又方猪脂一升酒五合煎七日三立差

漏下槐子燒末酒服方寸匕

一切冷瘻燒人吐出蛔虫為末先以甘草湯洗瘡後

着灰無不差者慎口味猪脂咬咀生地黄内脂中

鼠漏瘡差復發以不經水猪脂咬咀生地黄内脂中

令足相淹和煎六七沸去滓灰汁洗瘡去惡汁以此

膏傅日一易

鼠漏腫核未成膿以柏葉着腫上熬鹽着柏葉上熨之

令熱氣下即消

螻蛄瘻出樹葉灰先以泔清煮樹葉取汁洗拭乾以灰
內瘡中
蜂瘕瘻漸大者熬鹽熨之三宿四日不差至百日成
瘻其狀大如四五寸石廣三寸中生蜂作孔乃有
數百以石硫黃隨多少然燭燒令汁出着瘡孔中
須臾間見蜂數十惟蜂盡差
又方人屎蛇脫灰臘月猪膏調傅之
又方蜂窠灰臘月猪脂調傅孔中
瘭瘡瘻雄雞屎灰臘月猪脂調封之
蜣蜋瘻蜋所推丸末傅之
又方蜣蜋屎和臘月猪脂傅之

又方乾牛屎末傳瘡則撥却更厚封差止

又方熱牛屎塗之數數易應有蜣螂出

蚯蚓瘻牛屎雞屎末之用社猪下頷膸和傳之

蝎瘻五六孔相通者搗茅根汁着孔中和封之

蛇瘻蛇脫皮灰臘月猪脂和傳至差慎口味

顛當瘻搗土瓜根傳至差慎口味

雀瘻取母猪屎灰和臘月猪脂傳瘡蟲出如雀形

膿瘻桃花末和猪脂封之

石瘻兩頭出令人寒熱搗槐子和井花水封之

灸漏法菅蘆子二合豉一升搗令極熟作餅如大錢

厚二分許取一枚當瘡孔上作大艾炷如小指大

灸餅上三壯一易三餅九壯隔三日復一灸之如是頭瘡不可灸蔴蘆氣入腦殺人

又方七月七日日未出時取麻花五月五日取艾等分合搗作炷用灸瘡上百壯亦灸瘰癧

九漏灸肩井二百壯

又方灸鳩尾骨下宛宛中七十壯

又方遠四白垂治下踝上三壯二年六年冷息肉灸足內

諸惡漏中冷息肉灸足內踝上三壯二年六年冷息肉灸之如

瘰癧白蘞檀替燒末五匕分匕日三十日差

又方故鞋底吐鼠三朝服和酒一升平旦向日服之

又方狼尿末傳之

又方五月五日取一切種雜草煮汁洗一切瘭及觸處但有肉結凝似作瘻及癰節者以獨頭蒜截兩頭留心大指上灸之勿令上破肉但取熱而已七壯作艾炷隨蒜大小貼瘡子灸之五里人迎各三十壯

瘻瘡灸兩脇裏患瘡處宛中日一壯七日止神驗

又方灸五里人迎各三十壯

又方灸背兩邊腕下後文上隨年壯

又方灸耳後髮際直脉上七壯

去面黑黯成鍊松脂為末溫酒服三合日三服盡三

升無不差

又方白附子末酒和傅之即落

脚氣腫已入腹至小腹脹小便澁少取烏特牛尿一升一服日二取消乃止又云羸瘦人二分尿一分

牛乳合煮乳結服

口中瘡久不差入胸中並生瘡三年已上不差者濃煎薔薇根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬用根

夏用其高灰傅之一宿知二宿差有汁吐不得咽也

又方角蒿汁佳又燒蛇脫一具酒

癬瘍刺蓟汁服之又服地黃根蜜和傅之一無根字

又方熱搗煎餅不限多少日一徧薄之良

又方醋煎艾塗之

又搗羊蹄根和乳塗之

瘿昆布二兩洗切如指大小麥麪一升以三年酢漬含咽汁盡愈

又方海藻一斤又云三兩

升麪末暴乾往反酢畫搗為散酒服方寸匕七日三

忌芻力

瘿上氣短氣灸肺輸百壯

瘿上氣胸滿灸雲門五十壯

肉瘤勿治治則殺人又云不得針灸

陰癩取楊柳枝脚指大長三尺二十枚水煮令極熱

以故布及韆掩腫處取熟柳枝更互柱之如此取差

浸淫瘡小亦治淫癖

又方猪牙車骨年久者椎破燒令脂出熟塗之

又方取苦練皮或枝燒作灰傅乾者猪膏塗并治小兒禿瘡諸惡瘡

瘑瘡酢一升溫令沸以生韭一把內酢中封瘡上差

又方炒臘月糟薄之

又方燒故履系末傅之

又方燒松根取脂塗之

燥瘡瘡瘡酢和
瘡疥瘡癢不
熟搗淨洗
乾作末癢
又方灸足大指奇間二七壯灸大指頭亦
白殿平旦以手掉取韭頭露塗之極效

痔第十七

痔以蒲黃水服方寸匕日三良又取桑耳作羹空腹
飽食之三日食佳

痔下血及新產漏下好礬石一兩附子一兩末之白
蜜丸如梧子大酒服二丸日三稍加不過數日便

斷百日服之終身不發一方有乾薑一兩

五痔十年者塗熊膽取差止一切方皆不及此神良

又方七月七日多採槐子熟搗取汁內銅器中重煎成如鼠

屎大內於穀道中日三亦主瘻及百種瘡

又方痔下血及新產漏下常食篇竹葉及煮羹粥大

佳

又方虎頭骨犀角末之如雞子大和不經水豬脂大如

雞子塗瘡上取差

五痔取槐根煮洗之

又方取桃根煮洗之

痔出膿血有虫傍生孔竅槐白皮一担剉内釜中煮
令味极出置大盆中適寒溫坐其中如浴蟲悉
出冷又易之不過二三即差

久冷五痔便血灸脊中百壯

五痔便血失屎灸回氣百壯穴在脊窮骨上
肛出女萎一升以器中燒坐上熏之即時入
脫肛蒲黄二兩以猪脂和傅肛上内之二三愈

腸隨肛出者生栝蔞根取粉以猪脂為膏溫塗隨手
冷痢脫肛枳實一枚石上磨令滑澤鑽安柄密塗灸
令暖納肛即自得縮入
灸暖納入縮入止

又方鐵精粉內上按令入即愈

又方生鐵三斤以水一斗煮取五升出鐵以汁洗日

再

因寒冷脫肛灸臍中隨年壯

又灸橫骨百壯

又方灸龜尾七壯即後窮骨是也

千金寶要卷之五終

小有居士河陽郭思纂

千金論曰上醫醫未病之病中醫醫欲病之病下醫醫已病之病思以謂知病之前者此上智之所能也知病于未病之前者此中智之所及也若夫已病而求醫則常情同然不必論其智不智也孫氏曰聖人設教欲家家自學人人自曉尊親有疾不能療之者非忠孝也斯言可謂切至矣

氣不調百病自生衆病積聚皆起于虛又曰虛生百病藥石有相欺者入人腹中遂相鬪爭力甚刀劍言不知性氣者不可服也凡服食藥餌須量自己性理所宜不可見彼得力我便服之人患瘡瘕未瘳不得

合陰陽
婦人妊娠食羊肝令子多厄食山羊肉令子多病食
驢肉延月食兎犬肉令子無音聲并缺唇食騾肉產
難食雞子及乾鯉魚令子多瘡食裸并鴨子令子倒
出食雀肉并豆醬令子面多黑子食雀肉飲酒
令子心淫情亂不畏廉恥食鷩令子短項食冰漿絶
胎多經大驚者生子患癲向非常地大小便必半產
殺人穢污死喪家人來看視產婦則難產傷兒不依
產圖令子母多妨產乳忌月方覆之產婦人衆看則難產臨產憂悒
戚出此房若在反支月者浣濯水以器
則難產兒已生不得自視穢污便利于懸廁之上或

十二痼疾產後百日內勿行房大忌上廁只室中上盆佳暑月產卧忌取涼百日忌服轉瀉藥月經不去大忌合陰陽生十二疾卧濕冷地大忌合陰陽生十二疾大忌以冷水洗浴合陰陽生十二疾小兒初生不以絲裹指拭口中青泥惡血則入腹生百病初生舉之遲則中寒下痢斷臍帶留至足跌短則中寒下痢斷臍帶隔衣咬斷之不得以刀子截落六寸長則傷肌短則傷臟臍不以時截及按水入臍令兒腹痛臍帶中多有虫不去之疾臍留汁不盡則寒生臍風兒生男以父女以母故衣裹之過厚皮膚害血脉發雜瘡而黃新生兒衣暖大厚令

筋骨緩弱解脫兒臍及換衣
朱蜜食多則脾胃冷腹脹喜
帶瘡未合愈數洗浴令兒患陰瘡氣急變
臍夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去寒乳令
新房以氣不能行母有熱以乳兒令兒羸瘦交脛
乳兒令兒羸瘦母怒以乳兒令喜驚發氣
令變黃不能食母怒以乳兒令喜驚發氣
氣顛狂又令上吐及風中
兒身熱腹滿乳兒當極接散其熱氣勿令
不得用宿乳母欲寐則不得飽及填兒
口鼻也浴兒水不冷熱得所則令兒驚亦致五藏病
兒冬不可久浴久浴則傷寒夏不可久浴久浴則傷

向兒邊者令兒中馬客忤
鳴驚能令兒作客忤兒衣
頭髮白衣不得用青帶青衣不得用白帶皆能為客
忤凡非常人及諸物從外來亦驚小兒致病欲防之
法當將兒避之若不避者當燒牛屎令常有煙氣置
戶前則善暴冷不避之多患肚熱下
痢小兒解着傷風亦作傷寒病尋常晚夜及陰雨夜
小兒衣物不得在露地有鈎星鬼禽喜落毛羽于人
中庭置兒衣中便令兒作瘑病必死七八月尤忌兒
生未能行而母再有娠使兒飲亂乳作魅病小兒飲
食過度不知自止作疾小兒夏月積冷洗浴過度及

乳母亦將冷水洗浴以冷乳飲兒兒壯熱涼即令兒病痢等夏月暴寒小兒不避之病中客忤心腹脹滿刺痛口噤氣急停屍卒死者服張仲景備急丸

人失明之本有十六件事生食五辛接熱飲食熱食熬已房室無節極目遠視數看日月夜視蚊食飲食不寫多年雕鏤星火夜讀細作博奕書月下看書抄寫多年雕鏤不休久處煙火泣淚過多刺頭出血過多又由馳騁田獵冒涉風霜迎風追獸日夜不息之所致也

地因寒暑風濕皆作蒸氣人足履之謂之風毒名為脚氣婦人產後尤宜慎此四時之中不得久立久坐

溼冷之地令人作脚氣病
取涼皆成脚氣患脚氣人
蒜韲菜菘菜蔓菁菰子酒
得犯之一方用鯉魚外魚
宜食生牛乳與生栗子及
薑橘皮
病有三患一患覺之晚二
患驕狠恣傲三患狐疑不
決犯之多枉傷性命故曰
欲臨近亡人法為信者施不為
新食畢取風者令人患漏
亦然亦宜帶絳囊一方寸
欲臨近亡人法為信者施不為疑者設
亦然亦宜將少金牙散塗鼻孔耳門及視疾者
新食畢取風者令七男左女右
者令人患漏

風新沐浴畢取風者令人
人患內風尊貴人骨弱肌膚
時動搖被微風所及得血
頓取涼快意生病亦然暴寒亦然
冬時嚴寒最宜周密若觸冒之者為傷寒
皆能為病其傷寒尤重以
人春多患溫病以冬時多
犯之多病所謂時行之氣
時應涼而反大冷秋時應暖而
反大溫凡熱病大病新差
油膩等物必大下痢醫所
不能治食餅餌粢飴哺

鱠炙棗諸果物脯脩及堅實難消之物胃氣尚虛
弱不能消化必更結熱下之則大痢難禁不下之必
死下之復危皆難治也不可不慎但得食麋粥寧少
食令飢勿飽不得他有所食引日轉久可漸食羊肉
白麋若羹汁雉兔鹿肉不可食猪狗肉當靜卧勿早
起梳頭洗面非但不可體勞雖言語亦不得多亦不
得生心用意煩勞凡上氣力未平復而以房室並令人勞復女勞當舌
吐數寸而死凡差未滿百日氣力未平復而以房室
者畧無不死未滿五日食一切肉麪病更發大困食
生魚鮓下痢必不止食生菜令人顏色終身不平復
病新汗解飲冷水者損心胞令人虛補不復食生棗

及羊肉者必隔上作熱蒸食犬羊等肉者骨中蒸熱
食魚肉與瓜生菜令人身熱食鱠者病發必大困早
起勞多及美飲食過多致發欲死
穀疸者由失飢大食胃氣衝熏所致酒疸者由大勞大熱而交接畢入
水所致黃疸有人以竹筒使人極吹病人鼻中者無
當風入水所致女勞疸者由大勞大熱而交接畢入
不死大慎之
夏傷暑至秋作瘧瘧冬中于風寒氣藏于骨髓中至
暑有所用力腠理開又中邪氣能作瘧肺有熱因有
所作用力腠理開能令作瘧
交接損令人卵縮筋攣

食生物令虫卵生入腹者成虫虻及魚鼈蛇
食過常作吐血
服藥吐利後常須閉口少語一日無風處溫地
息
凡人執作汗出當風因以房室過度醉飲飽
令心氣逼迫短氣脉悸得風寒而濕結之腦汗未止得濕癩病
熱沐髮而濕結之腦汗未止得濕癩病
因大驚及當風從高墜下致喜悲善恐怖如有鬼物
患
有所擊仆若醉飽入房汗出當風則必傷脾
凡患痢服止藥初間痢須轉劇愚人不能便不服其

藥此誤也但服不過再三服之病病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾脯醬粉鹽所食諸食皆須大熟爛為佳亦不得傷飽

凡疳鹽醬酢酥油棗皆忌惟白飯豉苜蓿苦苣蕪菁不在禁限

凡日月蝕時忌食飲腹中生蠶虫及房室生子不具足必患月蝕疳日月蝕不得與兒乳日月生後乃不忌令人口臭齒齗宣露常有血出舌上生瘡

肺膽氣妄泄即令人目青氣喘端酒客勞飲酒當風入氣含千肺面目黃腫即頭眩欬逆上氣倦當風喜怒氣血胸痛引時忽忽欲絶心下弦急不能飲食或吐膿

背支滿欲嘔
七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣憂氣愁氣喜氣
氣積聚堅大如杯若柈在心腹中疾痛不能飲食時
來時去每發欲死如有禍祟
尸疰鬼疰者即五尸之中尸疰也又挾諸鬼邪為害
者也其大畧令人寒熱淋瀝沉沉嘿嘿不的知其所
苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至于死死後
復注易傍人乃至滅門覺如此候宜急療之
人有九虫其虫亦惡人之極患也常以白筵草沐浴
及治諸病皆須先去諸虫并疾飲宿癖醒醒除盡不
佳根葉皆可用既是香草又服補藥

爾必不得藥力脾勞熱有虫在脾中令人好嘔肺勞熱生虫在肺鼻中出血肝勞熱生虫在肝目睛急有虫曰蝡虫如菜中虫在腎人得傷寒及天行熱病腹中有熱及人食少腸胃空虛若齒斷無色舌上盡白甚者唇裏有瘡四肢沉重忽忽喜眠當數看其上唇內有瘡唾血唇內如粟瘡者心內懊憹痛悶上蝕其五藏下唇內生瘡者其人喜眠此虫在下蝕其下部人不能知可服蜚虫殺人熱病蛄毒令人喜寐不知痛處而面赤如醉下利膿血當數視其人下部大小之孔穐穐然赤則是蜚虫也劇能殺人若有所舉重若入房過度汗出如浴水則傷腎

人因身勞汗出衣裏冷濕久而得腎著之病身體重腰以下如帶五千錢腰中冷如冰又其人本來不吃忽然饕吃而好嗔恚反常性此腎之傷也取寒眠地卧冷濕地氣所傷則腰痛墮傷腰則腰痛房室後用則腰痛肝傷善忘脾傷善飲肺傷善嗽遠思強慮傷善飲肺傷善欠善悲哀傷人喜樂過度傷人忿怒不解傷人汲汲所願不遂傷人戚戚所患患傷人

五勞七傷有小腹急痛膀胱虛滿手足逆冷食飲苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目眩耳聾口焦小便自利者虛損少氣腹脹內急拘引小腹至冷不得屈伸不能

飲食寒熱頭痛手足逆冷大小便難或復下痢口乾
夢中泄精或時吐逆恍惚面色枯瘁又復微腫百節
酸疼者

五勞七傷虛羸不足面色黧黑手足疼痛久立腰疼
起則目眩腹中懸急而口絶傷外引四肢亦有一邊
虛勞寒口飲在脇下決決有聲飲已如從一邊下決
決然也有頭並衝皮起引兩乳內痛裏急善夢失精
氣短目眡眡忽忽多忘者

五勞七傷小腹急臍下膨亨兩脇脹滿腰脊相引臇
口乾燥目暗眡眡憒憒不下飲食胸中氣急逆不樂
堊中策痛小便黃赤尿有餘瀝夢與鬼神交通去精

驚恐虛乏之候者

凡男女有因積勞損或大病後不復常苦四體沉滯骨肉酸疼吸吸少氣行動喘憑或小腹拘急腰背強痛心中虛悸咽乾唇燥面體少色或飲食無味陰陽廢弱悲憂慘戚多卧少起者

有大勞虛劣寒熱嘔逆下焦虛熱小便赤痛客熱上熏頭痛目疼骨肉痛口乾者

有虛勞不足四肢煩疼不欲食食則脹汗出者

有虛勞少氣胸心淡冷時時驚惕心中悸動手脚逆冷體常自汗腸鳴風濕血氣四肢煩疼腰背引痛耳鳴有虛勞損羸乏效逆短氣者

面黎黑骨蒸煩熱小便赤黃心悸目眩者
有大虛不足小便數噓吸焦燋引飲膀胱滿急者
有左脇氣衝膈上滿頭上有風如虫行手足頑痺鼻
塞脚轉筋兩目時腫痛者
有虛損短氣咽喉凝唾不出如膠塞咽喉者
有五勞六極其心傷者令人善驚妄怒無常者
有五勞六極其脾傷者令人腹滿喜噫食竟欲卧面
目痿黃者
有五勞六極其肺傷者令人少精腰骨痛四肢厥逆
者
有五勞六極其肝傷者令人少血面黑者

有五勞六絡其腎傷者有積聚少腹腰背滿痺欬唾
小便難者
六絶之為病皆起于大勞脉虛外受風邪内受寒熱
令人手足疼痛膝以下冷者
有五勞六絶腹中雷鳴時泄痢者
有五勞六絶或閉或痢面目腫心下憒憒不欲語憎
憎聞人聲者
有五勞七傷八風十二痺無有冬夏悲憂憔悴者凡
是病皆須服之者
有虛勞百損者
有五勞六極七傷虛損者

男子女人虛損傷絶頭目眩骨節煩痛飲食微少羸瘦百病皆起腎氣不足腰痛陰寒小便數嚢冷濕尿有餘有虛勞腎氣不足腰痛陰寒小便數嚢冷濕尿有餘

瀝精自出陰痿不起忽忽悲喜者

有五勞七傷六極強力行房室所食不消胃氣不平者

而行房室所食不消胃氣不平者

有五勞七傷每事舉重重病後骨髓未滿

有五勞七傷每事不如意者

有陰下濕癢汗出或生瘡蝕莖中痛者

有溺血小腹冷欲唾有血喉鳴喘息者

有膀胱虛冷欲唾有血喉鳴喘息者

有膀胱虛冷坐起欲倒目視眩氣不足骨痿者

有膀胱虛冷坐起欲倒目視眩氣不足骨痿者

有膀胱寒小便數漏精稠厚如白米泔者

有胞屈僻津液不通者

有尿白濁者

有胞轉者

有上焦熱腹滿而不欲飲食或食先吐而後下肘掌痛者

有上焦飲食下胃汗出面背身中皆發熱者

有上焦冷下胃汗出痢腹內不安食好注下者

有上焦閉塞乾嘔嘔而不出熱少冷多好吐白沫青

涎吞酸者

有中焦實熱閉塞上下不通隔絕關格不吐不下腹

滿澎澎喘急者

有中焦熱水穀下痢者

有中焦寒洞泄下痢或因霍亂後瀉黃白無度腹中虛痛者

有下焦熱大小便不通者

有下焦熱或下痢濃血煩悶恍惚者

有下焦熱毒痢魚腦雜痢赤白膿下小腹絞痛不可忍欲痢不出者

有膀胱三焦津液不下大小腸中寒熱赤白泄痢及腰脊痛小便不利及婦人帶下者有下焦虛寒津液不止短氣欲絶者

有下焦虛寒損或見血後便轉此為亡血或不利

有下焦虛寒損或先便轉後見血此為遠血或利或不利好因勞冷而發者

有三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦起或熱損發或因酒發者

有手足厥冷脉絶者

有下焦虛寒損腹中瘀血令人喜恚不欲聞人語胸中噎塞而短氣者

有吐下汗出而小便復利或下利清穀裏外熱脉微欲絶或發熱惡寒者

凡霍亂務在溫和將息若冷則遍體轉筋此病定一日不食為佳雖食為佳所以養脾氣也食息七日勿令全飽仍須三日少喫粥三日已後可依常有霍亂吐下腹滿食不消心腹痛者有霍亂吐利止而身體痛不休者有霍亂轉筋血冷汗出嘔不已斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絶者有霍亂已服理中四順熱嘔逆吐涎沫不解者有婦人霍亂者慎不可下有年老霍亂贏劣冷柔惡心食飲不化心腹脹虛滿拘

急短氣嘔逆四肢厥冷心煩氣悶而須汗者

有毒冷霍亂吐利煩嘔轉筋肉冷汗出手足指腫端息唾死絶語音不出者

有霍亂盡宿食不消積冷心腹煩滿鬼氣者

有霍亂洞下不止者

有霍亂引飲飲輒乾嘔者

有先服石人因霍亂吐下服諸熱藥吐不得止因即變虛心煩手足熱口乾燥欲得水嘔逆迷悶脉急數者

有時行熱病後毒未盡因霍亂吐下仍發熱心胸欲裂者

有霍亂皆因飲食非關鬼神因飽食肫膾復餐乳酪海陸百品無所不嗽眠卧冷席多飲寒漿暴胃中諸食結而不消所致思謂此說止為貴者言若貧下此症亦以瓜李生冷不慎致然

霍亂人忌與米飲胃中得米即吐不止但與厚朴葛根飲若冬瓜葉飲但沾漬咽喉而不可多與若服湯時隨服吐者候吐定乃止診脉絶不通以桂合葛根為飲

為吐下心煩肉熱汗不出不轉筋脉急數者可犀角合葛根為飲

粉汁為佳若不止可與葛根薺苨飲服之

婦人霍亂嘔吐者

霍亂四逆吐少嘔多者

霍亂久將遠行預備者

霍亂永不發丸者

中熱霍亂暴利心煩脉數欲得冷水者

陰陽二氣擁而反戾陽氣欲降陰陽乖隔變成吐利頭痛如破百節如解遍體諸筋皆為回轉論症雖小卒病之中最為可畏雖臨深履危不足以喻之

人生放恣者衆盛壯之時未自慎惜快情縱慾極意房中稍至年長腎氣虛竭百病滋生時服石散真氣既盡石氣孤立惟有虛耗唇口乾焦精液自洩或小

便赤黃大便乾實所食之物皆化作小便此皆由房室不節熱結中焦則為堅

熱結中焦則為堅

下焦熱則為溺血令人淋閉不通

氣淋之為病溺難澀常有餘瀝

石淋之為病埜中痛溺不得出

膏淋之為病尿似膏自出

勞淋之為病勞倦即發痛引氣衝下

熱淋之為病熱即發甚則尿血

下焦結熱小便赤黃不利數起出少埜痛或尿血出溫

病後餘熱及霍亂後當風取熱過度飲酒房勞及行

步胃熱冷飲逐熱熱結下焦作淋及散石熱動關格
小腹堅脹如斗諸有此淋悉治之立驗
錄忌如左

喪孝　產乳　音樂　一切魚

一切肉　諠戲　房室　酢滑　生冷

蒜　粘食　米豆　油膩

右並忌不爾若雖差復發不可治其不禁者並具本方之下再發若不得食及不得用心其不禁者並具本方之

婦人產後飲水不即消三焦決漏小便不利仍相結

漸漸生聚逐流諸經絡故也

忌腹上出水出水者一月死大忌之

第一唇黑傷肝

第二缺盆平傷心

第三臍齊出傷脾

第四背平傷肺

第五足下平滿傷腎熱結為淋者

人氣急積久不差成水病者

有患水腫細腹堅如石小勞苦足脛腫小飲食便氣

急此終身疾不差服丹參亦可愈

酒客有虛熱當風飲冷水腹腫陰復脹滿者

水病有通身洪腫者流腫者百藥治不差而欲死者

有大腫眼合不欲開短氣欲絶者

男子女人新久腫得暴風入腹者
婦人新產上廁風入臟腹中如馬鞭者噓吸短氣欬
嗽者
耆婆萬病丸
牛黃 麝香 犀角 一方云一鉢今各一分
乾薑 桂心 當歸 芎藭 芍藥 甘草 茯苓
黃芩 蜀椒 細辛 桔梗 巴豆 前胡
紫菀 蒲黃 葶藶 防風 各一分 蜈蚣 三節 石蜥蜴
人參一寸 朱砂 雄黃 黃連 大戟 芫花
禹餘糧 芫青 七枚
右三十一味並令精細牛黃麝香犀角朱砂雄黃禹

以小水送之為佳若一歲以下小兒有疾者令乳母服兩小豆亦以吐利為度近病及卒病皆用多積久疾病即少服常取微溏利為度崔氏無苓桑白皮桔梗防風為二十七味萬病丸治症開錄如左

卒病欲死

蠱毒吐血腹痛如刺

卒中惡口噤

五症鬼刺客忤

瘧病未發前一日

猫鬼口口口口

諸有痰飲

患冷痰癖

宿食不消

癥瘕痃積聚

拘急心腹脹滿心痛

上氣喘逆胸滿不得臥

傷寒時行

大痢

疳濕

水病

頭痛惡寒

小便不通

大便不通

耳聾睛耳

鼻衄

癰腫

疔腫

犯疔腫血出

胸背腰脇腫

癩瘡用萬病丸傅之

瘻瘡

痔瘡

冷癆積年不差者

癬瘡

惡刺

蝮蛇螫

蝎螫

蜂螫

婦人諸疾胎衣不下

小兒客忤

小兒驚癇

小兒乳不消心腹脹滿

仙人玉壺丸

雄黃　黎蘆　丹砂　礬石一作礬　巴豆
八角附子略二兩
右六味先搥巴豆三千杵次內礬石又搥三千杵次內附子三千杵次內礬石三千杵次內雄黃三千杵內蜜又搥萬杵若不用丹砂內珍珠四兩無在每內藥輒治五百杵內少蜜恐藥飛揚治藥用王相吉日良時童子齋戒為良天晴明日無雲霧白晝於淨室中勿泄氣着清潔處大人服丸如小豆欲下病者宿勿食平旦服二丸不知者以粥飲發之令下下不止飲冷水以止之病在膈上吐膈下利或但噫氣即已若欲漸除及將服消病者如

麻子大三丸卒中惡欲死不知人以酒若湯和二丸
強開口灌喉中鬼疰病百種不可名漿水服二丸日
再
玉壺丸治症開錄如左
男女與鬼交通歌哭無常
腹中若有虫欲鑽脇出狀急痛一止一作
憂恚氣結在胸心若連噫及欬胸中刺痛
心腹一切痛及心中熱
癖飲疾飲
諸疝
卒上氣氣但出不入并逆氣衝喉胃中暴積聚

癥結堅痞
積寒熱痞
食肉不消腹堅脹
腹中三虫
下痢重者
卒關格不得大小便欲死
瘧已後未發
卒霍亂心腹痛煩滿吐下手足逆冷并寒熱往來
傷寒救濇時氣熱病
淋瀝疲瘦百節酸疼
頭卒風腫

癰疽痤瘡癤癘瘰瘻欲作痛
鼠瘻
中水毒
齒痛
耳聾膿血汁出及卒聾
風目赤或癢視物漠漠淚出爛
中蠱毒吐血腹內如刺
中蛇蝮諸毒
猘犬所咋
狂馬所咋
婦人產後餘疾及月水不通往來不時

婦人胸中苦滯氣氣息不利小腹堅急繞臍紋痛
小兒百病驚癇瘡瘍塞及有熱
小兒大腹及中熱惡毒食物不化結成積聚
小兒寒熱頭痛呼熱及吐
小兒羸瘦丁奚不能食食
欲問人病不化
頭上繫玉壺及繫頭上
獨宿山澤冢墓廟社叢林之中燒一丸百鬼走去
以蠟和一丸如彈丸着絳囊繫臍男左女右山精
千金須知鬼魅皆畏之

中慢驚為陰癇
緩縱為痱
淋為癃
黃為痺
強直為痙
喘嗽為欬逆
隔氣為膏盲
悶瞀為暍
熱死為暍
怔忡為悸
利為滯下
臟毒為痢之蠱毒

腸風為裏血腸滯下血
咳逆為喉嚨逆
服金石藥為服石
度者量也
漬者浸也
和者調也
傅者塗也
暴者驟也
叹咀者秤畢細切也
三兩者今之一兩
三升者今之一升

方寸匕者正方一寸散子以不落為度

錢匕者五銖銅錢上全抄也

錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之令不落為

度

半錢匕者一錢抄取一邊

梧桐子大者以二大豆準之

刀圭者如梧桐子大者四刀圭

一撮者四刀圭

如彈丸如雞子者十梧桐子準之

一升者取平升為正

一把者二兩

草一束者三兩
桂一尺者削去皮半兩
甘草一尺者二兩
蜜一斤者有七合
猪膏一斤者二升二合
半夏一升者洗畢五兩
椒一升者三兩
吳茱萸一升者五兩
兎絲子一升者九兩
蘘荷子一升者四兩
蛇牀子一升者三兩半

地膚子一升者四兩
巴豆以枚計者去皮心二分準豆六枚
附子烏頭以枚計者去皮半兩準二枚
枳實以枚計者去穰二分準二枚
棗三枚準一兩
生薑一兩累半兩

千金寶要卷之六終