原件短缺 P1上半页

成州烏頭

邵州烏頭

晉州烏頭

江寧府烏頭

大雄

側子

附子

附子味辛甘。氣溫大熱。浮也。陽中之陽也。有大毒。係烏頭傍出。故附子僉名。皮黑體圓底平。山芋狀相彷彿。畏人參黃耆甘草。併黑豆烏韭防風。惡蜈蚣。使地膽種蒔川蜀。（蜀人。春每種蒔。）冬月收採者汁全。頂擇正圓。一兩一枚者力大。製宗陶氏槌法。以刀去淨皮臍。先將薑汁鹽水各半甌。入砂鍋緊煮七沸。次用甘草黃連各半兩。加童便緩煮一時。撈貯鑵中埋伏地內。晝夜週畢。圇（音忽）圇（音輪）曝乾。藏須密封角。旋薄剉。仍文火復炒。庶劣性盡除。氣因浮中有沉。功專走而不守。凡和羣藥。可使通行諸經以爲引導佐使之劑也。除四肢厥逆。去五臟沉寒。噤閉牙關。末納鵝管吹入。紅突丁毒。末調釅醋塗消。口瘡久不差。醋麪和末貼腳底。腳氣暴發腫。醋汁攪末敷患間。漏瘡剉片如錢。封口加艾可灸。煖腳膝健步。堅筋骨強陰。佐八味丸中。壯元陽益腎。（非附子不能補下焦陽虛。故入味丸加桂附。乃補腎經之陽。六味丸去桂附。蓋補腎經陰也。丹溪謂加爲少陰向導。恐非是。）君朮附湯內。散寒溼溫脾。陰經直中。眞寒。薑

附湯煎可禦。此須生用。不在製拘。助甘緩參芪成功。健潤滯地黃建效。內傷熱甚。速入勿疑。（此藥治外感證。）非偏身表凉四肢厥者。不可僭用。經云。壯火食氣故也。治內傷證。縱身表熱甚而氣虛脈細者。正宜速入。經云。溫能除大熱是也。俗醫不知誤爲補劑。日相習用。寧不殺人。孕婦忌煎。墮胎甚速。○立春生者。乃謂烏頭。因有腦類烏烏頭顱。竟假名。爲醫家呼喚。氣味製度。俱與附同。本經云。春採爲烏頭。冬採爲附子。又云。附子頂圓正。烏頭頂歪斜。宗此別之。庶弗差謬。忌豉汁。惡藜蘆反半夏括蔞貝母及歙。（烏及白歙。）遠志爲使。諸經亦行。理風痺。卻風痰。散寒邪。除寒痛。破滯氣。積聚去心下痞堅。亦善墮胎。孕婦切忌。

煎膏名射罔。須識。敷箭射禽獸即亡。倘誤中人。甘草急嚼。藍青萍草。亦可解之。○烏喙（音諱）兩岐。（頂上兩岐。）拇合狀如牛角。喙者乃烏之口。因類亦假爲名。一應俱同烏頭。惟使別用莽草。主風濕陰囊瘡瘍。止寒熱歷節掣疼。亦墮妊娠。更消癰腫。○天雄亦係一種。其體略細而長。氣味相同。製度弗異。惡腐婢。使亦遠志。忌豉汁。制須乾薑專補上焦陽虛。善治一

切風氣感寒濕痺。緩急拘攣。卻頭面風。往來疼痛。助武勇。力作不倦。消結積。身輕健行。調血脉益精。墮胎孕通竅。○側子狀如棗核。又從附子傍生。畏惡無差。但宜生用。理腳氣驗。散風瘴良。掃鼠瘻惡瘡。劫冷氣濕痺。如前墮孕。女科當知。○毗穗亦一名。木鼈子者是。令人喪目。藥中忌之。

凡使。先須細認。勿誤用。有烏頭烏喙天雄側子。木鼈子。烏頭少有莖苗。長身烏黑。少有傍尖。烏喙皮上蒼。有大豆許者。孕八九箇。周圍底陷。黑如烏鐵。宜於文武火中炮。令皺拆。即無尖。周匝四面有附孕十一箇。皮蒼色。即是天雄。宜炮皺拆後。去皮尖。底用。不然。陰制用。並得。側子。只是附子。傍有小顆。附子如棗核者是。宜生用。治風瘴神妙。木鼈子。只是諸喙附雄烏側出。入藥中用。若服令人喪目。若的子底平有九角。如鐵色。一箇重一兩。細剉。即是氣全堪用。失修事十兩。於文武火中炮。令皺拆者去之用。乃刮上孕子。并去底尖。微細劈破。于屋下午地上掘一坑。可深一尺。安于中一宿。至明取出。焙乾用。大欲炮者。灰火勿用雜木。只用柳木最妙。若陰使即生去尖皮底了。薄切。用東流水并黑豆浸五日夜。然後漉出。于日中曬令乾用。凡使須陰制去皮尖子。每十兩用生烏頭五兩。東流水六升。

謨按附子烏頭烏喙天雄側子射罔木鼈子七名。實出一種。但治各有不同。今尊會編附其總

論。天雄長而尖者。其氣親上。故曰非天雄不能補上焦陽虛。附子圓而矮者。其氣親下。故曰非附子不能補下焦陽虛。烏頭原生苗腦。形如烏烏之頭。得母之氣。守而不移。居乎中者也。側子散生傍側。體無定在。其氣輕揚。宜其發四肢。充皮毛。爲治風瘫之神妙也。烏喙兩岐相合。形如烏嘴。其氣鋒銳。宜其通經絡。利關節。尋蹊逵徑。而直抵病所也。煎爲射罔。禽獸中之即死。非氣之鋒銳捷利者。能如是乎。又有所謂木鼈子。乃雄喙烏附側中有毗穗者。其形摧殘。其氣消索。譬如疲癃殘疾之人。百無一能。徒爲世累。且又令人喪目。宜其不入藥用也。

天南星

天南星

味苦辛。氣平。可升可降。陰中陽也。有毒。下畢

極多。在處俱有。苗類荷梗直起。高僅尺餘。葉如芡葉杪生。兩枝相抱。花若蛇頭黃色。子結作總鮮紅根比芋猶圓。肌細膩且白。本經載虎掌草即此。後人以天南星改稱。亦與鬼蓋蒟蒻相侔。每逢冬月間悞採。殊不知蓋蒻莖斑花紫。根極大肌麤。南星莖青花黃。根略小肌細。炮者之易裂。得此纔眞。製須多泡生薑湯。七次。或研塡入牯牛膽。臘月黑牯牛膽一箇用南星研末。取汁拌勻塡入內。風乾過年成塊。剉碎復炒捵痂。方書謂之牛膽南星。即此是也。（會卒不能得此。依前薑湯泡。或火炮。並殺毒。堪用。但恂猶烈也）乃上行治肺經本藥。欲下行資黃蘗引之。（生乾薑及黑附子。散跌撲即凝瘀血。墜中風不語痰利胷膈下氣墮胎。破堅積。誅癰消腫。水摩箍蛇蟲咬毒。醋調貼破腦傷風。瘤突額顱。麝加數粒。先用小針十數枚。作一把。瘤上微刺通竅。用新南星醋摩加麝少許。日數二次。任如椀大。半月全消。）



齊州半夏

半夏

半夏 一名守田。味辛微苦。氣平。生寒熟温。沉而降。陰中陽也。有毒。山谷川澤處處有之。苗起一莖。莖端三葉。根名之曰半夏。每于八月採收。反烏頭惡皂莢。畏雄黄。生薑乾薑。秦皮。龜甲。忌羊肉。羊血。海藻。飴糖。使宜射干柴胡。經入足膽脾胃。久藏入藥。同橘皮謂二陳。生嚼戟喉。生用則麻戟人喉嚨。宜沸湯製七次。仍加薑制。纔可投瓶。若研末。攪少枯礬。每泡過半夏四兩。入枯礬一兩共研。拌薑汁。捏作小餅。楮葉包裹。風際陰乾。此又名半夏麴也。片則力峻。麴則力柔。總主諸痰。驗證佐助。火痰黑。老痰膠。加芩連秫樓海粉。寒痰清。濕痰白。入薑附蒼朮陳皮。風痰卒中昏迷。皁角天南星和。痰核延生腫突。竹瀝白芥子攪拗。痰厥頭疼。止痰飲脇痛。散逆氣。除嘔惡。開結氣。發音聲。脾瀉兼嘔心汗。且斂。蓋脾惡濕。半夏專能燥濕。勝水故爾。孕婦忌用。恐墮胎元。如不得已用之。復加薑汁炒過。消渴及諸血證。尤禁莫加。因燥反助火邪。眞陰愈被熬害。津枯血耗。危殆日侵。不得不預防也。生

半夏消癰腫成顆者。摩水敷蠍子螫人。塗上卽愈

婦人產後暈絕。爲丸塞兩鼻中。能頃刻回甦。此扁鵲捷法。

雷公云。凡使勿誤用白傍蕘子。真似半夏。只是咬著微酸。不入藥用。若修事半夏四兩。用搗了白矾子末二兩。頭醋六兩。二味攪令濁。將半夏投中洗三遍用之。半夏上有隱洗。若洗不淨。令人氣逆。肝氣怒滿。

謨按內經云。腎主五液。化爲五濕。自入爲唾。入肝爲淚。入心爲汗。入脾爲痰。入肺爲涕。丹溪又云。有痰曰嗽。無痰曰欬。是知痰者。因嗽而動脾之濕也。半夏惟能入脾以瀉痰之標。不能入腎以瀉痰之本。然欵無形。痰有形。無形則潤。有形則燥。所以爲流濕潤燥之劑也。又小柴胡湯中。加之以治傷寒寒熱。半助柴胡以主惡寒。半助黃芩而能去熱。及往來寒熱。皆用之。有各半之意。故因而名曰半夏云。本經別以守田目之者。蓋緣夏半前後。人多耘耘。蒔在田。斯又指名而生意也。

第二卷貝母款後謨按。宜參看。

隨州京三稜



京三稜

京三稜味苦辛。氣平。陰中之陽。無毒。生荊襄陂澤。近霜降採根。狀若鯽魚。黃白體重者美。麪包火炮。加醋復炒過。靈色。白屬在氣。邊專破血中之氣。故消癥瘕血塊。證兼歐積聚氣滯疼。虛者忌煎。恐損眞氣。○仍有三種。亦附其名。

黑三稜色若烏梅。輕鬆去皮則白。○

草三稜形如雞瓜。屈曲根上生根。○

石三稜色黃。體重。堅硬如石。總消積氣。主治相同。

那州京三稜



端州蓬莪茂

溫州蓬莪茂



蓬蒌茂

蓬蒌茂味苦辛。氣温。無毒。多產廣南諸州。或生江浙田野。子如乾椹。葉似蘘荷。莖錢大。略高。根類薑成塊。茂生根底相對。似卵大小不常。九月採收。依前炮製。色黑屬在血分。氣中之血專毆。破痃癖。止心疼。通月經。消瘀血。治霍亂積聚。理惡疰邪傷。入氣藥仍發諸香。在女科。真爲要劑。凡求速効。摩酒單嘗。

雷公云。凡使干砂盆中。用醋磨令盡。然後于火畔吸冷乾。重篩過用。

骨碎補

骨碎補

骨碎補味苦。氣温。無毒。陰濕山谷。生長最多。根着樹石上有毛。葉附兩小葉相對。每一大葉邊附小葉。槎牙兩兩相對。不結花實。至冬乾黃。入藥採根。刮去毛用。補骨節傷碎。療風血積疼。破血有功。止血亦効。本名曰胡孫

薑唐明皇以其主折傷甚驗。故易名骨碎補。也。

雷公云。凡使採得後。先用銅刀刮去上黃赤毛盡。便細切用。酒拌令潤。架柳甑蒸一日後出。暴乾用。又乾寧記云。去毛細切。後用生蜜拌蒸。從巳至亥。準前暴乾。擣末用。炮猪腎空心喫。治耳鳴。亦能止諸雜痛。

滁州牡丹

牡丹

牡丹味辛苦。氣寒。陰中微陽。無毒。多生漢中巴郡。花開品色異常。富貴來先。賢贊揚。賞玩爲當世貴重。凡資治療。惟採根皮。家園花千層。根氣發奪無力。山谷花單瓣。根性全具有神。赤專利多。白兼補最。入劑之際。不可不知。今市多取枝梗皮代充。或採五加皮雜賣。乖謬殊甚。選擇宜精。經入足腎少陰。及手厥陰胞絡。忌葫蒜。畏兎絲。涼骨蒸不遺。止吐衄必用。除癥堅瘀血。留舍於腸胃中。散冷熱血氣。

攻作於生產後。仍主神志不足。更調經水欠勻。治風癇定搐止驚。瘀癰腫。排膿住痛。

雷公云。凡使採得後日乾。用銅刀劈破去骨下。細用。用清酒拌蒸。從巳至未出日乾用。

謨按牡牡乃天地稱。牡則爲羣花首。花爲陰成實。葉爲陽發生。丹係赤色象離。陰中之火能瀉故丹溪云。地骨皮治有汗骨蒸。牡丹皮治無汗骨蒸。蓋有見於此爾。本經又云。主神志不足。神不足。手少陰也。志不足。足少陰也。張仲景入味

大薊

小薊

大小薊

大小薊

味甘苦。氣溫。一云氣凉。無毒。雖係兩種。氣味不殊。隨處田野俱生。北平今改順天出者力勝。蓋薊門以薊取名則可徵矣。凡資治病。五月採根大薊高

三四尺餘葉多青刺而皺花開如髻赤若紅藍其人因之呼爲千針草也破血捷消腫奇吐劒唾咯立除沃漏崩中即止去蜘蛛蠍子咬毒平煬突痛甚癰疽並搗爛絞濃汁半甌攪靑便或醇酒飲下小薊苗高尺許花亦如前但葉略差有刺不皺僅理血疾不治外科



劉寄奴

劉寄奴草味苦氣溫無毒山側巖崖道傍春緩融和即產凡欲用之入藥隨時可以採收下氣止心腹急疼下血卻產後餘疾消煬腫癰毒滅湯火熱瘡子研泡熱水下咽腸瀉無度者即已原因劉裕小名寄奴用此以治金瘡獲効竟指名曰劉寄奴草也

雷公云凡採得後去莖葉只用實凡使先以布拭上薄殼皮令淨拌酒蒸從巳至申出曝乾

方可用之

紅藍花

紅藍花

紅藍花味辛甘苦。氣溫。陰中之陽。無毒。各鄉俱蒔。五月旋收。因葉似藍。故此爲譽。堪染顏色。可作臙脂。欲留目曝乾。入藥手揉碎。惟入血分。專治女科。下胎死腹中。爲末生聖藥。療口噤血暈。誠已產仙丹多用則破血通經。酒煮方妙。少用則入心養血。久煎却宜。喉痺噎塞不通。搗取生汁。旋嚥。天行痘疹難出。研細〔子末酒吞。苗〕搗敷遊毒殊功。○〔臙脂滴聽耳立効。



玄胡索

玄胡索

玄胡索 即胡索 味辛苦。氣溫。無毒。來自安東。縣名。屬南直隸。生從奚國。因避宋諱。改玄爲延。形類半夏。色黃。用須炒過咀片。專入太陰脾肺。一云又走肝經。調月水氣滯血凝。止產後血衝血暈。跌撲下血。淋露崩中。心腹卒疼。小腹脹痛。並治之而即効也。

鬱金 味苦。氣寒。純陰。屬土。與金有水。無毒。色赤兼黃。生于蜀地者爲最勝。體圓有節。形類蟬肚者乃爲眞。倘或入藥頃刻難求。採山茶花。亦可抵代。但燒灰存性。研細稀調。服之凉心經而下氣。用之消陽毒以生肌。禁小便尿血。除尿管血淋。兼歐血氣作痛。破瘀積惡血。止吐血上升。仍散積血歸經。因性輕揚上行。又治鬱過殊効。名由此得。曾載本經。學者攷求。須當細辨。

宜州薑黃

澧州薑黃

薑黃

【薑黃】味辛氣溫無毒圖經云是經種三年已上老薑也多生江廣江西湖廣亦產蜀川色比鬱金甚黃形較鬱金稍大論主治功力又烈過鬱金破血立通下氣最捷主心腹結氣併疰忤積氣作膨治產血攻及撲損瘀血爲痛更消癰腫仍通月經

時珍曰按鬱金薑黃兩藥實不同種鬱金味苦寒色赤亦類蟬肚圓尖薑黃味辛溫色黃似薑瓜圓大鬱金最少薑黃常多今市家惟取多者欺人謂原本一物指大者爲薑黃小者爲鬱金則世間之物俱各大小不齊何嘗因其異形而便異其名也此但可與不智者道爾若果爲是則鬱金亦易得者又何必以山茶花代爲耶是鬱金之與薑黃原非一物明矣

明州艾葉

艾葉

艾葉　味苦。氣生寒。熟溫。陰中之陽。無毒。各處田野有。以複道者爲佳。初春布地生。與草蒿狀頗類。但葉背白。風動微香。每端午朝。天明多採。或懸户貧襄疫癘。或藏家防治病邪。煎服宜新鮮。氣則上達灸火。宜陳久。氣乃下行。揉碎入四物湯。安胎漏癥瘕。搗汁攪四生飲。止吐衄唾紅。艾附丸。同香附末醋糊丸。開鬱結。調月經。溫煖子宮。使孕早結。薑艾丸。同乾薑末蜜丸。嘔冷氣去惡氣。逐鬼邪氣。兇證久纏。和研細雄黃。熏下部濕疰濕痺及疥癬神效。和蠟。片訶子熏痔。後寒熱。急痛。并帶漏殊功。作灶灸諸經穴不差。鑿竅拔風濕毒尤驗。實取入藥。令人有娠。助水臟壯陽。煖腰膝明目。○又九牛草　產筠州山。屬湖廣。葉圓長。背白有芒。莖獨植高二尺許。氣香似艾。採亦端

陽。治諸般風勞。止遍身疼痛。

謨按艾葉本經及諸註釋。悉云生于田野類蒿。複道者爲佳。未嘗以州土拘也。世俗反指此爲野艾。至賤視之。端午節臨。僅採懸户。辟疫而已。其治病証。遍求蘄州所産。獨莖圓葉背白有芒者。稱爲艾之精英。倘有收藏。不吝價買。彼處仕宦。亦每採兩京送人。重紙包封。以示珍貴。名益傳遠。四方盡聞。今形狀考之。九牛草者即此。人都不識。並以艾呼。經註明云。氣雖艾香。實非艾種。醫用作灶。以灸風濕痺疼。癆熱積聚。嘗獲效者。亦因辛竄可以通利關竅而已。謂之全勝真艾。未必能然。大抵人之常情。貴遠賤近。泥于習俗。膠固不移。縱有本經之文。諸家之註。何嘗着一目視。以爲眞僞之別耶。噫。可勝歎哉。可勝歎哉。

地榆

地榆

地榆味苦甘酸。氣微寒。氣味俱薄。陰中陽也。無毒。山谷俱有生長。八月採根曝乾。惡麥門冬。宜人頭髮雖理血病。惟治下焦止婦人帶下崩中。及月經不斷。邪小兒痘熱瀉痢。致積瘀時行。塞痔瘻來紅。禁腸風下血。散乳痙。愈金瘡。因性沉寒。故諸血熱者可用。倘若虛寒水瀉冷痢。切宜忌之。投劑略差。恐增他病。

第一卷五加皮款後。謨按宜參看。

單州紫草

紫草

紫草味苦。氣寒。無毒。人家園圃。多有栽種。三月採根。可煎染紫。凡資入藥。去根取茸。益氣補中。通竅利水。治目黃成疸。療腹滿作疼。合膏敷瘡癬瘡瘍。單煮托瘢痘瘡癮。

雷公云。凡使。須用蠟水浸之。待水乾取出。去頭并兩。於鍋中鎔。鎔盡。便投蠟水作湯用。每脩事紫艸一斤。用蠟三兩。於鍋中鎔。鎔盡。便投蠟水作湯用。凡使。須用蠟水浸之。待水乾取出。去頭并兩脾髭。細剉用。每脩事紫艸一斤。用蠟三

茜草

茜草 味苦。氣寒。陰中微陽。無毒。多產郊原。一名地血。苗牽長蔓延草上。根紫色。收採春初。煎汁可染絳紅。入藥勿犯銅鐵。療中多蟲毒。吐下血如爛肝。治跌久損傷。凝積血成瘀塊。虛熱崩漏不止。勞傷吐衄。時來。女子經滯不行。婦人產後血暈。凡諸血證。並建奇功。除乳結爲癰。理體黃成疸。

馬鞭草

甘艸水解之。即毒氣散。凡使勿用赤柳艸根。真似茜根。只是味酸澀。不入藥中用。若服令人患內障眼。速服銅刀於槐砧上剉。日乾。勿犯鉄并鉛。

馬鞭草

馬鞭草味甘苦。氣微寒。有小毒。江淮州郡多。村墟陌路有。苗葉類菊。又若狼牙。高二三尺。莖圓。抽四五穗。花紫。春開細碎紫色。秋復再花。穗較鞭鞘不異。故以馬鞭爲名。主下部匿瘡。併金瘡積血作疼。研末敷妙。曾治楊梅瘡用此煎湯。先熏後洗。湯氣纔到。便覺爽快。候濕洗之。痛腫隨減。通女人月水。及血氣成癥結瘕。生搗煎良。醇酒煎服。去小腹卒痛難當。禁久瘧發熱不斷。絞腸沙即効。纏喉痺極靈。殺諸般疳蟲。消五種瘕塊。

夏枯草

夏枯草味苦辛。氣寒。無毒。曠野平原。隨處俱有。葉類旋覆花。似丹參。冬至後發生。夏至時枯瘁。故謂夏枯草也。四月收採。洗淨陰乾。凡用拯病。王瓜爲使。

破癥堅癭瘤結氣。散瘰癧鼠瘻頭瘡。寒熱堪歐。濕

痺兼却

謨按夏枯草。禀純陽之氣。得陰氣即枯。故逢夏至梗枯也。丹溪有言善補養厥陰血脉之功。能治肝虛目疼。冷淚不止。羞明怕日。久甚昏花。用夏枯草五錢。香附子一兩。研細爲散。茶調下咽。服之誠有神功。惜乎本經未之及也。

百部

味甘苦。氣微溫。又云微寒。無毒。一云有小毒。

處生長。用惟取根。療開去心。酒浸一宿。出焙乾。細剉用。蔥一窠。鬚有八十三條者。號曰地仙苗。若修事餌之。可千歲也。

凡使採得後。用竹刀劈破。去心皮花。作數十條。於簷下懸令風吹。待土乾後。却用酒浸一宿。出焙乾。細剉用。蔥一窠。鬚有八十三條者。號曰地仙苗。若修事餌之。可千歲也。

雷公云。凡使採得後。用竹刀劈破。去心皮花。作數十條。於簷下懸令風吹。待土乾後。却用酒

用。又專除蟲。亦可去疳。燒湯洗牛馬身蝨不生。燒煙熏樹木蛀蟲即死。人家用以燒蠅。盡逐蠓蜣諸

滁州百合

成州百合

百合

百合味甘氣平無毒。洲渚山野俱生。花開紅白二種根如葫蒜。小瓣多層。人因美之稱名百合。白花者。養臟益志。定膽安心。逐驚悸狂叫之邪。消浮腫痞滿之氣。止遍身痛。利大小便。辟鬼氣。除時疫。發遠

淄州前胡

殺蠱毒。治外科癰疽。乳腫喉痺殊功。發背搭肩立效。又張仲景治傷寒瘕後。已成百合病證用此治之。固取名同然未識有何義也。蒸食。能補中益氣作痿。可代麵過荒赤花者。僅治外科不理他病。凡

珠待用。務必分苗。

淄州前胡

絳州前胡

成州前胡

建州前胡



江寧府前胡

前胡

味苦。氣微寒。無毒。山谷多產。秋月採根。色白兼黃。氣香甚窴。凡用入藥。須日曝乾。畏藜蘆。惡皂莢。

以半夏爲使。去痰實如神。胸脇中痞滿立除。心腹內結氣即逐。治傷寒寒熱。又推陳致新。消風止頭疼。保嬰利疳氣。

雷公云。凡使。勿用野蒿根。緣真似前胡。只是味粗酸。苦誤用。令人胃反不受食。若是前胡味廿微苦。凡修事先用竹刀刮去蒼黑皮并蘆土了。細剉。甜竹瀝浸令潤。于日中曝乾用之。

旋覆花

旋覆花

旋覆花　味鹹甘。氣溫。無毒。一云冷利。有小毒。叢生深谷中。又名金沸草。顏色深黃如菊。人又呼金錢花。七月採收。曝乾入藥。治頭風明目。逐水濕通便。去心滿噫氣痞堅。消胸結痰唾膠漆。驚悸亦止。寒熱兼除。倘病者稍涉虛羸。防損氣不宜多服。葉理癢止血。根主風濕續筋。

雷公云。凡採得後。去裏花蕊殼皮。及蒂子。取蓋蒸。從巳至午。曬乾用之。

蜀州大黃



大黃

大黃　味苦。氣大寒。味極厚。陰中之陰。降也。無毒。形同

牛舌。產自蜀川。必得重實錦紋。勿用輕鬆朽黑。使黃芩一味。入陽明二經。欲使上行。須資酒製酒浸達巔頂上。酒洗至胃脘中。並載舟楫。枯梗。少停仍緩。凶老卄艸。不墜。有斯佐助。纔去病邪。如欲下行。務分緩速。欲速生使。投滾湯一泡便吞。欲緩熟宜。同諸藥久煎。方服。入劑多寡。看人實虛。蓋性惟沉不浮。故用直走莫守。調中化食。霎時水穀利通。推陳致新。頃刻腸胃蕩滌。奪土鬱。無壅塞滿。定禍亂建太平。因有峻烈威風。特加將軍名號。仍導瘀血。更滾頑痰。破癥瘕堅積。聚止疼。敗癰疽熱毒。消腫。勿服太過下多亡陰。若研末雞清調稠。可敷上火瘡取効。

謨按大黃極寒。硫黃極熱。二黃氣味懸隔。何號將軍相同。蓋硫黃係至陽之精。大黃乃至陰之類。一能破邪歸正。提出陽精。一能推陳致新。蠲定禍亂。並有過乎諸藥之能。宜其同得居七之號也。

兗州連翹

連翹

連翹味苦。氣平。微寒。氣味俱薄。輕清而浮。升也陽也。無毒。莖短微赤。葉狹常青。花細瓣深黃。實作房黃黑。因中片片相比。狀如翹應故名。凡用採收。須擇地土。生川蜀者。實類椿實。殼小堅。似椿實而開者。外完而無跗萼。剖則中解。氣甚芬香。纔乾便脫。莖間不擊自然落下。生江南者。實若菡萏。殼柔軟。外有跗萼抱之。解脈絕無香氣。自少。乾久尚着莖上。任擊亦不脫離。以此爲殊。惟蜀最勝。去梗旋研。入劑方靈。

餘剩密藏。氣味俱失。經入少陰心臟。手足少陽陽明。瀉心經客熱。殊功。降脾胃濕熱神效。敵惡瘡毒。蠱毒。去寸白蟲。蚘蟲。瘡科嘗號聖丹。血證每爲中使。通月水。下五淋。義蓋取其結者散之。故此能散諸經血凝氣聚。必用而不可缺也。實人宜用。虛者

勿投。○連翹係根之名仲景方云去熱本經未載此亦附之

滁州射干

射干 射音夜

味苦。氣平微溫。屬金有木。與水火。陰中陽也。無毒。川澤郊原。隨處生長。葉如翅羽扇。俗呼烏翳根。只因試過有驗。三月三日採根。曝乾。凡藥劑投煎。務米泔浸宿。散結氣旋平癰毒。逐瘀血。克通月經。止喉痺刺疼。嘔。口熱穢臭。去因勞而發之濕熱。潰硬腫殊功。行太陰厥陰之積痰。消突核甚捷。仍治胃滿氣脹。更療欬急涎多。

一說葉類萱草堅強。根多短鬚黃黑。花開四種。紫白紅黃。丹溪取紫爲眞。

雷公云。凡使。先以米泔水浸一宿漉出。然後用以篁竹葉煮。從午間至亥漉出。日中曝乾用之。

冀州 萹蓄

萹蓄

萹蓄 味苦。氣平。無毒。春月布地生。在處沿路有。苗類瞿麥。根若蓬蒿。葉細竹葉相同。莖赤釵股近似。節間花綻。色微黃青。五月採收。陰乾入藥。主浸淫瘙疝疼。治丹石發腫眼疼。去小兒疣蟲。療女子陰

成德軍 苦參

蝕

秦州 苦參

苦參

苦參 味苦。氣寒。沉也。純陰無毒。田野山谷。隨處生之。採根曝乾。嚼之極苦。反藜蘆莫入。惡貝母兔絲。使

宜玄參。惟作丸服。不入湯劑。治腸風下血。及熱痢刮痛。難當療溫病狂言。致心燥結胸垂死。赤癩倉脫者。敢風有功。黃疸遺溺者。逐水立効。掃遍身瘡瘕。止卒暴心疼。除癰腫。殺疥蟲。破癥瘕。瘦。散結氣。養肝氣。明目止淚。益腎精。解渴生津。利九竅。通二便。安五臟。定志宜子。生作菜。十月堪收。亦明目輕身。惟久服有驗。

凡使。不計多少。先須用糯濃泔汁浸一宿。上有腥穢氣。並在水面上浮。並須重重淘過。即蒸。從巳至申。取出曬乾。細細到用之。

越州牽牛子

牽牛子

牽牛子味苦。氣寒。有毒。不拘州土。處處有之。種春時。旋生苗作藤蔓繞牆垣籬壍。待秋月方開花。如豉子花碧色。日出開。日西闔。結實。白皮裹外成毬。葉發枝間。有三尖

角。子藏毬內。亦三廉稜。九月採收曝乾。多有黑白兩種。黑者屬水。力速。白者屬金。効遲。炒研煎湯。並取頭末。除壅滯氣急。及痃癖蠱毒殊功。利大小便難。併脚滿水腫極驗。

雷公云。凡草金零牽牛子是也。凡使。其藥秋末即有實。冬收之。凡用瞥乾。却入水淘。浮者去之。取沉者瞥乾。臨用舂去黑皮用。

謨按東垣云。牽牛非神農經藥。出名醫續註。云味苦寒。能除濕利小便。治下疰脚氣。據所說氣味。主治俱誤。凡藥中用牽牛者。少則動大便。多則瀉下如水。乃導氣之藥。試取嘗之。味則辛辣。久嚼雄壯。漸漸不絕。非辛而何。續註謂味苦寒。果安在哉。牽牛但能瀉氣中濕熱。不能瀉血中濕熱。況濕從下受。下焦主血。是血中之濕。宜用寒苦之味也。張仲景治七種濕証。小便不利。無一藥犯牽牛者。非不知牽牛能瀉濕利小便也。爲濕病之根在下焦。是血分中氣病。不可用辛辣氣藥。反瀉上焦太陰之氣故也。仲景尚不敢輕用。夫何世醫。不分血氣。而一槩用之乎。夫濕

者。水之別稱。有形者也。若肺先受濕。則宜用之。今則不問有濕無濕。但傷食。或欲動大便。或有熱證。或作常服尅化之藥。罔不用之。豈不悞哉。殊不知牽牛。比諸辛藥瀉氣尤甚。張文懿公。嘗謂牽牛不可脫嗜。脫人元氣。吾初疑藥。有何脫嗜。後每見人因酒食。病痞者。多服神芎丸等藥。皆犯牽牛。初服則快。藥過復痞。仍前再服。隨藥而效。由是愈信脫嗜久服。暗傷元氣。而猶不知悔悟也。治當益脾健胃。使元氣生發。自然腐熟水穀。此治無以加矣。經云。辛瀉氣。肺氣病者。集多食辛。況飲食勞倦。所傷在胃。胃氣不行。心火乘之。胃受火邪。名曰熱中。脈經云。脾胃主血。其所生病。當于血中瀉火潤燥。破惡血。瀉胃之濕熱也。胃熱上炎。肺受火邪。當用黃芩之苦寒以瀉火。當歸之辛溫以瀉血結。桃仁之辛甘油膩以破惡血。兼除燥潤大便。然猶不可專用。須于藥內兼而用之。何則上焦元氣。已自虛弱。津液

不足。口燥舌乾若反用牽牛。氣味俱陽大辛之藥。重瀉其已虛之元氣。復耗其津液。利其小便。以致陰火愈甚。故重則死。輕則天。誠可憫也。牽牛感南方熱火之化。所生者也。血熱而瀉氣。差誤甚矣。若病濕勝。氣不得施化。致大小便不通。則宜用之耳。濕去則氣得周流。所謂五臟有邪。更相平也。經云。一臟不平。以所勝平之。火能平金而瀉肺者。即此也。近世錢氏瀉黃散中。獨用防風過于他藥一二倍者。以防風辛溫。能于土中瀉金之子。不使助母也。經云。從前來者爲實。邪謂子能令母實。故以所勝平之也。晦菴語錄中。有秋食薑則天人天年。經止言辛瀉氣而晦菴云然。戒之深也。然則秋分食薑。令人瀉氣故禁之。夏月食薑不禁者。熱氣主旺之時。宜以汗散。薑能發汗以越其熱也。薑向如此。況牽牛乎。可見味辛之物。皆有宜禁之時。亦猶牽牛。不可一槩用之也。

曹州葶藶



葶藶

葶藶味辛苦。氣大寒。沉也。陰中之陰。無毒。一云有小毒。用之當熬。陝西河北俱多。曹州屬山東。出者獨勝。延生田野牧採夏間粒如黍。匾小微黃。製隔紙。文火略炒。惡僵蠶石龍芮。使榆皮得酒良。種因甜苦

丹州葶藶

兩般證量輕重各用甜苦葶藶行水走泄迅速。形壯證重者堪求甜葶藶行水走泄緩遲。形瘦證輕者宜用。苟或鹵莽易致殺人。逐膀胱伏留熱氣殊功。消面目浮腫水氣立效。肺癰喘不得臥非此難痊葶藶大棗瀉肺湯主之。出仲景方。痰飲欬不能休。用之易愈。主癥瘕積聚結氣理風熱癢瘡疥癩久服虛人須記勿犯。

雷公云。凡使勿用赤鬚子。真相似葶藶。只是味微甘苦。葶藶子入預苦。凡使用以糯米相合于燠上。微微焙待米熟去米單搗用。

徐州澤蘭

梧州澤蘭

澤蘭

味苦甘。一云苦辛。氣微溫。無毒。水澤多生。家園少種。苗高二三尺許。紫節方莖。有棱。四葉尖對生有七。但不光潤。入月花開白色。狀與薄荷花同。初採做辛。此爲異耳。採收入藥。防巳使良。理胎產百病。淹纏。女科須覓。消身面四肢浮腫。濕中宜求。破宿血。去癥瘕。殊功。行瘀血。療撲損易効。散頭風目痛。追癰腫瘡膿。長肉生肌。利關通竅。○根色紫黑。地笋爲名。與粟根相侔。凡血證俱治。女人產後。堪作菜疏。○又種益妳草收。彷彿澤蘭葉類。莖色略異。細認纔知。果益妳。續斷乳如神。仍去痔。收脫肛最捷。炙令香燥。漬酒飲之。

雷公云　凡使。須要別識雌雄。其形不同。大澤蘭形葉皆圓。根青黃。能生血調氣。與榮合。小澤蘭通別。採得後。看葉上班根須尖。此藥能破血通久積。凡脩事大小。澤蘭須細剉用絹袋盛。懸

於屋南畦
禹令乾用

廣州葫蘆巴



葫蘆巴

葫蘆巴 味苦氣溫純陽無毒本經云乃番國蘿蔔子也原本產諸胡地今京西亦蒔于嶺南春月生苗夏間結子子作細莢至秋採收得桃仁大茴香治膀胱疝氣効三味麩炒各等分研末半以酒和丸半爲散每用五七十丸鹽酒下散以米飲調下



蘄艾



蘄蒲

荊門軍草

蘄艾

蘄蒲

荊門軍草

元府草

蘄艾

蘄蒲

荊門軍草

典

蘄艾

蘄蒲

荊門軍草

辭

蘄艾

蘄蒲

荊門軍草

歐脹滿腹脇中退青黃面頰上

蘄艾

蘄蒲

荊門軍草

結子子作細莢至秋採收得桃仁大茴香治膀胱疝氣効三味麩炒各等分研末半以酒和丸半爲散每用五七十丸鹽酒下散以米飲調下與九相用空心服日各一二服即効得硫黃黑附子療腎臟虛冷佳

蘄艾

蘄蒲

荊門軍草

草薢

【草薢】味苦甘。氣平。無毒。盛出河陝荆蜀。蔓生葉作三又。秋月採根。狀類山芋。一種莖有刺者根白實。一種莖無刺者。根輕虛。種雖兩般。白者爲勝。又與菝葜小異。凡收切勿混真。苦益菝葜根。作塊赤黃。草薢根細長淺白。博物誌亦曰。菝葜與草薢相亂時人每呼白菝葜者。即草薢也。利刀切片。酒浸烘乾。凡用拯痠。忌食牛肉。畏葵根牡蠣及柴胡大黃。爲使宜薏苡仁。治痺盡風寒濕。腰背冷痛。止筋骨掣痛除補水臟益精。縮小便。明目。逐關節久結老血。掃肌膚延生惡瘡。仍主恚怒傷中。尤療老人五緩。○

【菝葜】別種。亦俗曰金剛根。又呼鼈凡檢根。延發山野地。採根秋月切片曝乾。浸赤汁。煮米粉嘗。辟時疫瘟瘴極驗。搗細末。釀醇酒飲。去風毒腳痺殊佳。止小便。益血氣。腰背疼甚。煎服亦靈。

謨按近道所產。呼爲冷飯團。即草薢也。俗之淫夫淫婦多病楊梅瘡。劑用輕粉。愈而復發。久則肢體拘攣。變爲癩瘺。刴草薢三兩。或加皂角刺

牽牛各一錢。水六碗。煎耗一半。溫三服。不數劑。多差。原因水衰。肝挾相火凌土。土屬濕。主肌肉。濕熱鬱于肌腠。故爲癰腫。經曰濕氣害人皮肉。筋脉是也。蕳辛味甘淡。去脾濕。濕去則榮衛從。病服之不効者。火盛而濕未鬱。蕳解長于去溼。而劣于去熱。病久則火已衰。而氣已耗。氣耗則濕鬱。用之去濕。故拘攣癱漏並愈。此亦理也。初效也。

預知子

預知子

預知子味苦。氣寒。無毒。出淮南。及漢黔諸州。係藤蔓附大木直上。葉三角綠色。背淺面深。實五月作房。生青熟赤。子藏房內。大六七多枚。如皁角子褐斑。似飛蛾蟲光潤。欲求極貴。因得甚難。取二枚。綴衣服

領中。遇毒物。則有聲側側能先知覺故有此名。服須去皮。研細湯下。殺蟲誅蠱。諸毒並愈。根搗水煎

獲効尤速。

海州蕪荑



【蕪荑】【味】苦。氣寒。有小毒。一云氣熱。無毒。沃壤多生。平澤亦有。氣作猪臭。故名蕪荑。【此】草多生江東。其【語】言呼猪爲蕪。呼臭爲荑。

【蕪荑】

五六七月採。【五】月五日。【六】月六日。【七】月七日並宜收採。

枝葉花實俱用。【惟】去麤莖。【蜜】酒層層和灑。九蒸九曝。完全細末。研成蜜丸。豆大。每服十丸。起空腹吞服。酒下。多寡隨宜。療暴中風邪。口眼喎斜者立效。治久滲濕痺。腰腳酸痛者殊功。搗生汁服之。主熱暨煩滿。服多則吐。惟少爲宜。

謨按此草。處處俱生。視之多有異狀。金稜銀線。素根紫莖。對節生枝。方梗圓葉。如式脩製。服誠

益人。百服則耳目聰明。千服則鬚髮烏黑。追風逐濕。猶作泛閒。古方每竭贊揚。深功難盡著述可見至賤之類。却有殊常之能。醫者不可因賤而不收。病家亦勿謂賤而不製服也。

除州鶴蝨

鶴虱

鶴虱　味苦。氣平。有小毒。平原曠野俱有。莖圓一二尺高。葉皺大。彷彿紫蘇花白黃儼若甘菊。八月結子。粒細而尖。任收研散爲丸。大能殺蟲。追毒蚘蝕蟲咬。心腹卒痛者。肥肉汁調下即安。疳霜毒吞。腸胃未裂者。濃薑汁送下立吐。

酸漿實

酸漿

海州石韋



酸漿實味酸。氣平寒。無毒。園囿田坂。處處有生。春開白花。旋結青殼。子藏殼內。大若櫻珠。臨熟盡變深紅。五月堪取啖。食孕婦吞下。立分娩無憂。小兒食之。能除熱有益。根搗汁極苦。治黃疸易消。葉採陰乾。亦利水道。定志益氣。解燥除煩。

石韋

石韋味苦甘。氣平微寒。無毒。叢生山谷石上者。真不聞人聲水聲者。效。葉長似柳。背有黃毛。不拭射入肺中。即成欬嗽難治。務先去淨。炙拌羊脂。炒變焦黃。方入藥劑。得菖蒲妙。使杏仁良。治遺溺。淋通膀胱利水。療癰疽發背。去惡風止煩。益精氣。補五勞。除邪熱。安五臟。○生兎上者。兎韋爲名。治淋亦佳。本經曾載。

黔州海金沙

海金沙 本經不言氣味。只云出產黔州。屬雲南一二尺高。株材巢小。七月收取。拔起全科。晴日襯紙地。問將此曝于紙上。以杖敲擊。自落細沙。且曝且敲。沙盡爲度。用爲充散。專利小腸。得梔子牙硝。蓬砂可共療傷寒狂熱。本註又云。小便不通。臍下滿悶者。用此一兩。臘茶五錢。絕細研成。煎生薑甘草梢。三錢調下。不通。又再服之。旋可以取效也。

海藻

海帶

昆布

海藻



海藻味苦鹹。氣寒。無毒。一云有小毒。東海所生葉類萍藻。根着水底石上。莖如亂髮而烏。七夕採收。性反甘艸。治項間瘰癧癭瘤。消頸下癭囊利水道通癃閉成淋。瀉水氣除脹滿作腫。辟百邪鬼魅。止偏墜痂瘕。〇又種麤長。乃名海帶。柔軟堪以繫物。入藥多用。催生。亦療風淫。兼下水濕。〇昆布亦係海菜。治與海藻功同。散結潰堅。並著奇効。

雷公云。凡使。先須用生烏豆并紫貝天葵。和海藻三件。同蒸一伏時候。日乾用之。

讀按。榮氣不從。外爲癰腫。堅硬不潰。伏此可消。蓋三藥味俱鹹。經云。鹹能軟堅。隨各引經藥治之。則堅無不潰。腫無不消也。

蜀漆

常山

常山

常山 味苦辛。氣寒。無毒。川蜀多生。湖浙亦有。擇如雞骨。入藥方靈。忌茲菜雞肉葱。畏玉札勿令犯。截溫瘧。吐痰沫殊功。解傷寒。陰陽寒熱立效。水脹堪逐鬼蠱能消。勿滾熱下咽必露冷過宿。凡服此須頭晚煎熟。露天空下一宿次早纔服。年老久病人全忌。形瘦稍虛者少煎蓋性悍兒。嘔逐甚捷。功不掩過者也。○苗名蜀漆 味苦純陽。五月收採陰乾。使用稻蓑桔梗。散火邪錯逆。破癰瘕癥堅。除痞結積凝。辟蠱毒鬼疰。久瘧兼治。欬逆。且調切勿服多。亦防嘔惡。叶雷公云凡使。春使莖葉。夏秋冬用根。用酒浸一宿至明漉出日乾。搗少用。勿令老人久病服之可忘。

甘遂

甘遂 味苦甘。氣大寒。有毒。多產京西川谷。二月採根陰乾。狀若連珠。使宜瓜蒂。反甘艸。惡遠志。破癥堅

積聚如神。退面目浮腫立効。食停胃內有之卽嘔水結胷中。非此不解。蓋氣直透所結之處。專于行水攻決利從穀道出也。凡用斟酌。切勿妄投。

雷公云。凡採得後。去莖于槐砧上細剉。用生甘艸墨汁更漉出用東流水淘六七次。令水淸爲度。漉出于上器中熬令脆用之。

滁州白斂



白斂

白斂味苦甘氣平微寒。無毒一云有毒。隨處蔓生。淮林猶盛。根如雞鴨卵。三二五同窠採。待中秋時黑皮洗淨。破片以竹穿日曝。入藥與白及竝行。反烏頭使。代赭。明亦眼除熱散結氣止疼。理小兒溫瘧驚癇。療女子陰产腫痛。殺火毒。爲火煨湯聖藥。治外科。敷背癰疔腫神丹。

白及

【釋名】白及本草名甘根。別錄名連及草。藥性論名白給。

【集解】弘景曰：白及生山谷。葉似杜若。根如菱米。節節連生。故有連及之名。

【修治】敩曰：凡使。勿用赤及。其根大而白。用之。

【氣味】苦。辛。平。微寒。陽中之陰。無毒。

【主治】主痱腫。敗疽。傷陰。死肌。胃中邪氣。賊風鬼擊。骨熱。除賊風鬼擊。骨熱。緩不收。去潰瘍敗疽。死肌腐肉。敗。山根。額之下。鼻之上。止衄。塗瘡。癬。作糊。甚粘裱畫多用。

【發明】時珍曰：白及性收斂。故能治肺損吐血。金瘡傷陰。癰腫瘡癬。手足皸裂。凡外科功專收斂。不煎湯服。惟熬膏敷。除賊風鬼擊。骨熱緩不收。去潰瘍敗疽。死肌腐肉。敗。山根。額之下。鼻之上。止衄。塗瘡。癬。作糊。甚粘裱畫多用。

白附子

【釋名】白附子本草名獨腳烏頭。別錄名禹餘糧。

【集解】弘景曰：白附子。出東萊。狀如烏頭。

【修治】敩曰：凡使。勿用烏頭。其根大而白。用之。

【氣味】甘。辛。氣溫。純陽。無毒。一云有小毒。巴郡涼

白頭翁



州俱多。砂磧卑濕纔有獨莖發葉甚細。周匝生於穗間。形類天雄。入藥炮用。治面上百病。可作面脂。主血痺冷疼。且行藥勢。甌諸風冷氣。解中風失音。摩醋擦身背汗斑尤去疥癬。用茄蔕裹邊撚藥擦三日。愈忌澡洗研末。收陰囊濕癢。併滅瘢痕。

白頭翁

【釋名】

【時珍曰】白頭翁。老翁。名由此得。交秋收採。向日曝乾。一云陰乾。入藥搥痌。蠶實爲使。主治溫瘧陽狂寒熱。治癥瘕積聚腹疼。逐血愈金瘡。甌風煖腰膝。消瘰癧。散癭瘤。小兒頭禿。瘡腥及兩鼻血衄。神効。男子陰痿偏腫。併

【氣味】甘苦。有小毒。山谷田野。在處有之。苗作叢。柔細稍長。葉生杪。有毛不澤。毛細白色。風來反靜。風去則搖。與獨滑赤剪苗三者無差異也。近根底處。白茸寸餘狀類老翁。名由此得。交秋收採向日曝乾。一云陰乾。入藥搥痌。蠶實爲使。主治溫瘧陽狂寒熱。治癥瘕積聚腹疼。逐血愈金瘡。甌風煖腰膝。消瘰癧。散癭瘤。小兒頭禿。瘡腥及兩鼻血衄。神効。男子陰痿偏腫。併

百節骨痛殊効。牙齒痛亦除。赤毒痢必用。經云。腎欲堅急食苦以堅之。痢則下焦虛。故必用此純苦之劑以堅之也。

并州商陸

商陸

商陸味辛甘酸。氣溫有毒。一名樟柳。多產郊原。葉如牛舌舒長。純青色。莖高三尺。柔脆。青赤色。秋開花作桑色赤白兩般。花赤者。根赤。相同。花白者。根白無異。

白根入藥。劑專利水對證可煎。赤根見鬼神。甚有毒。貼腫堪用。黨鹵莽誤服。必痢血喪身。釋文又云。如人形者有神。其根有似人形。雙手雙足者能通神。今術家每云樟柳神者。即此是爾。

實亦入神之藥。花名葛花尤良。若陰乾搗末水吞。能治健忘善惕。服後臥思所事。開心復記。詳明。並噎雖娠孕婦切忌

雷公云。凡使勿用赤葛。緣相似。其赤葛花莖有消筋腎之毒。故勿餌。章陸花白年多。後仙人

成德軍王不留行

江寧府王不留行

王不留行

王不留行 即剪金花

味苦甘。氣平。陽中之陰。無毒。江浙近道俱有。莖青。七八寸長。葉尖如小匙頭。花開係黃紫色。子如黍粟。殼黑微圓。三月採根莖。五月取花

採之。用作脯可下酒也。每修事先以銅刀刮去上皮了。薄切以東流水浸兩宿。然後漉出架瓤蒸以豆葉一重一重如斯。蒸從午至亥。出仍法豆葉曝乾了。細剉用若無豆葉。只用豆代之。

謨按白根治水。方載多般。或取根雜鯉魚熬湯。或咀粒攙米粟煮粥。或搗生汁調酒。或和諸藥爲丸。空心服之。並可獲効。赤根貼腫。方亦不同。

喉痺窒塞不通。醋熬敷外腫處。石癰堅如石者。搗擦取軟。成膿。如或搗爛加鹽。慈敷無名腫毒。古讚云。其味酸辛。其形類人。療水貼腫。其効如神。斯言盡之矣。

子。先灑酒蒸一伏。復浸漿水一宵。微火焙乾。妝畱待用。主金止血。逐痛。治女科催產。調經。除風痺風痙內寒。消乳癰背癰外腫。出刺下乳。止衄。瘕煩。

蒲公草

蒲公草 卽黃花地丁也

【蒲公草】

【釋名】耩耨草。俗呼孛丁。田側道傍。逢春滿地。葉如苦苣。有細刺。花類金錢開莖端。斷其莖。中虛如葱狀。白汁竟流。開罷花飛絮隨起。絮中有子。落地則生。庭院有之。因風吹至採宜四月五月。經入陽明太陰。煎汁同忍冬。臨服加醇酒。潰堅腫。消結核。屢著奇功。解食毒。散滯氣每臻神效。

秦州穀精草



江 盜 府 穀 精 草



穀精草

穀精草 味辛。氣溫。無毒。生長穀田中。採收三月後。花白葉細。圓小似星。故又名帶星草也。理咽喉痺塞。止牙齒風疼。口舌諸瘡。眼目瞖膜。並堪煎服。取効霎時。又餵馬驢騾。能殺蟲類內。益力健步。長毛生

旱蓮艸

旱蓮艸

旱蓮艸 一名鱧腸。味甘酸。氣平。無毒。濕地多生。苗若旋復

花細而白色。實圓而作房。摘斷枝莖。汁出漸黑。或煎酒服。或熬膏敷。染白髮回烏。止赤痢變糞。治眉稀少。可望速生而繁。火瘡發紅能使流血立已。

施州金星艸

金星艸味苦。氣寒。無毒。多生陰濕石上。葉長凌冬不凋。背有黃點兩行。狀若金星相對。故因得此名也。五月採收。風乾入藥。解毒消腫。專理外科。凡百初起惡瘡。但諸未潰陽毒。沿頸瘰癧。發背癰疽。或刺碎煮酒頻吞。或研末調酒旋服。或煎汁淋洗。或搗爛敷塗。并可建功。立能獲効。諸丹石毒悉解。硫黃毒亦能感。根搗浸眞蓖蔴油塗頭。大生毛髮

佛耳草

佛耳草

味酸。氣熟。無毒。郊原野坂。處處有之。春生苗。只餘。夏開花黃色。葉與馬齒莧類。細小微有白毛。俗呼黃蒿。人每收採。搗爛和米粉作粿。柔軟而香。美。可嘗。藥劑凡資。曝乾綴用。以款冬爲使。治寒嗽及痰。去肺寒。大升肺氣。忌勿過服。損目失明。

燈籠草

燈籠草

味苦。氣大寒。無毒。在處俱有。八月採收。花實根莖。並堪入藥。苗高三四尺許。花紅而類燈籠。故此爲名。專主熱嗽蓋因苦而除燥熱。輕能治上焦



故也。丹溪嘗云。燈籠草。治熱痰嗽。佛耳草。治寒痰嗽。

三白草

〔三白草〕味甘辛。氣寒。有小毒。出自襄州。屬生臨池澤。每交初夏之月。葉端半白如霜。農人候以蒔田。



燈心艸

〔燈心艸〕味甘。氣寒。屬金與火。無毒。江南澤地叢生。苗



燈心艸

采白草葉便秀。故此爲異。用取其根。利大小
腸膀氣。除痞滿去瘧。破堅癖。蝕痰疥腫。仍消積聚
尤卻。

莖圓細長直。多採蒸熟。向日曝乾。折取中心白瓤。用之然燈照夜。此謂蚹熟蚹不入醫方。務求生剝者爲良。搥碎煎湯液纔勃。通陰竅。利小便。除瘴閉成淋。消水濕作腫。鉢擂乳香少入。油潤全無罐藏米片多加。分兩不耗 根搥煎服。功力尤優。○ 燈花 止小兒夜啼。亦能治大人喉痺。金瘡敷上。血禁肌生

蛇舍蚹

蛇舍蚹

味苦。氣微寒。無毒。一云有毒。石上上竝生。迷近處咸有。一莖五葉七葉。兩種略殊。當用細葉黃花。此等纔妙。昔田父見蛇含。看別傷蛇。即活。嘗採治癰腫。去內惡毒立瘥。由此得名。外科多用。主驚癇寒熱邪氣。心腹邪氣。除濕痺疽痔惡瘡。鼠瘻惡瘡。諸丹石燥毒殊功。但蛇蠍蜂傷悉効。人家多種。亦令無蛇。又用搗爛成膏。堪續已斷手指。○ 其根 收取。乃名 女青 搗細末帶之。則疫癘不犯。主蠱毒。

而逐邪惡。殺鬼魅以除辟不祥。

水紅艸

水紅艸　即大參

味鹹。氣微寒。無毒。一云味辛。有毒。雖生各處。多在水傍。苗莖高尺餘。葉大。色赤白。五月採實。用者最稀。去痺氣。除惡瘡。下水氣。解消渴。去熱

明目。奇効咸臻。○馬蓼葉大同前。甲濕之地亦產。

夏收採曝乾入劑。主腸中蟲蛭輕身。○水蓼生淺

水中。大葉上有黑點。根莖並採。可用煎湯。將脚止

霍亂轉筋。消脚氣腫滿吞服止蛇毒攻內。去疝癖

脹疼。水蠱黃腫腹膨。用蒸汗出立愈。二月勿食。傷

腎弱陽。若合魚鮓食之。令陰冷痛欲絕。○毛蓼冬

根不死。葉上有毛。亦主瘰癧癰疽。引膿長肉。○白

蓼紅蓼造酒並佳。

山茨菇

山茨菇根

山茨菇根味辛苦有小毒俗呼金燈籠多生沙濕地初春萌孽葉如韭葉長寸二月開花狀若燈籠色白瓣有黑點子結三稜生叢纔交其苗即稿依時掘地可得遲久腐爛難尋與老鴉蒜略同在包裹上分別蒜却無毛光禿茨菇包裹有毛得之去皮生焙任用生搗爲拔毒敷藥頻摸則靈焙研合玉樞神丹必資作主消癰疽無名疔腫散癮癧有毒惡瘡蛇虺嚙傷並服神效

山豆根

山豆根

萱艸 根

萱草根 俗名鹿蔥 味甘氣凉屬木無毒。園圃多生。五月開花。療渴消疸遍身通黃。絞生根汁嚥下。治沙淋小便澀痛。煮熟嫩苗食之。咀和酒煎爲破腦傷風要藥。搗薑汁用。係大熱衄血僂方。安五臟輕身。利胷膈明目。久久服餌。歡樂無憂。稽康云。合歡觸怒。萱艸忘憂。是也。〇宜男 係花之字。孕婦佩則生男。丹溪曰。性下行。走陰分。名宜男者。寧無微意存焉。

山豆根 味苦氣寒無毒。各處山谷俱有。廣西出者獨佳。俗呼金鎖匙。苗長一尺許。葉兩傍而有曲紐子成簇而色鮮紅。粒似豆圓。名因此得。凡資療病。惟取其根。口嚼汁吞。止咽喉腫痛要藥。水調末服。除人馬急黃捷方。敷蛇蟲咬傷。去血氣腹痛。

蘆根

蘆根

蘆根味甘。氣寒。無毒。洲渚多生。秋冬。纔取。掘土擇甘美者有効。露出。及浮水上者損人。解酒毒退熱除煩。止嘔噦。開胃下食。食魚蟹中毒即劫。懷胎孕發熱悶嘔。○花白名曰蘆蓬。并主卒霍亂危急。煮汁吞飲。要時可安。

雷公云。凡使須要逆水蘆。其根逆水生。并黃泡脆厚者。味甘。採後去節鬚。并土赤黃了。然後細剉用之

菰根

菰根



菰根味甘。氣大寒。無毒。多生江湖陂澤。葉如蒲葦尖長。抹馬甚肥。作薦誠輭。江南呼爲茭艸。即此是焉。四時取根。搗爛絞汁。止小便。利解渴。主腸胃熱除

煩。久浮水面者燒灰。延片火灼瘡敷愈。用雜清調蓀菜
卽春生芟筍。煮食治心腹卒疼。雜鯽魚爲羹。解酒
毒開胃。丹石熱發。頓食卽差。須防滑中。不宜多食。
又蓀首。當作蓀手。係歲久中生白臺。與小兒臂同
故取爲名。噢食少追風去熱。止上膈渴。消食多發
氣弱陽。令下焦冷滯。食同白蜜。痼疾復生。臺中有
黑者。茭蘲名。用之治小兒赤痢效。葉利五臟亦驗。
食巴豆人忌之。子細若青麻黃。名胡米。俗每合
黍粟。煮過荒年大抵蓀之種類。皆極冷利。不可過
食。惟服金石人相宜爾

苧根

苧根 味甘。氣寒。無毒。鄉落地多種養。宿根春自發生。
葉取飼池魚。面青背白。皮剝績暑布。一年三收。根
輕虛白黃。採無時入藥搗敷。小兒赤遊丹毒。及諸
癰疽發背乳房。煎熨療女人胎動不安。併產前後發

羊蹄根

熱煩悶。塞胎漏下血。署箭毒蛇傷。時疫大渴狂叫。非此莫却。金石服多燥熱。飲下立除。苧皮雷藏。產婦堪用。作枕眠止血暈。安臍上。去腹疼。漬苧汁嘗。大解消渴。蠱咬中毒。一飲即蘇。故近蠱室種之。則蠱竟不產也。

羊蹄根

【羊蹄根】味甘氣寒。屬水。無毒。葉如萵苣。多產道傍。根取醋摩。善走血分。主小兒頭禿疥癩。除熱。治女子陰蝕浸淫。殺蟲去痔瘡。除風癬。或採多熬膏加蜜。用防風研末和丸。秬樓甘艸酒吞。治前諸證益妙。日服二次。每次服三十丸。【葉】作菜茹。小兒痱蟲立追。食多滑腸作瀉【實】苦澀平。赤白雜痢能止。

綿州芫花

芫花

芫花味辛苦。氣溫。有小毒。川谷甚多。遠近俱有。葦紫花白。一二尺長。密開花。盈舊枝莖。如紫稍作穗。木出葉。採嫩苞蓋。向晴日曝乾。花落葉生。不堪用也。得之者煮醋數沸。漉出漬水一宵。復曝乾收。纔免毒害。反甘草。使決明。散皮膚水腫發浮。消胸膈痰沫善唾。欬逆上氣能止。咽腫短氣可安。歐疝瘕癰疽除蠱毒鬼瘧。令人虛損。久服不宜。汁漬線絲。繫痔易落。○根採尤毒。乃名蜀桑搗爛堪毒魚。研末能敷疥。

謨按芫花。瀉濕利水爲要。夫水者。脾胃腎三經所主。有五臟六腑十二經之部分。上而頭目。中而四肢。下而腰膝。外而皮毛。中而肌肉。內而筋骨。脉有寸關尺之殊。診有浮中沉之異。必當審

其病在何經何臟。乃可用之。倘若懏投。爲害非淺。

蕘花

蕘花

味苦辛。氣寒。有毒。生咸陽川谷。及河南。中牟。苗似胡妥刺無。花類芫花色白。狀極細。四五月採。力甚猛。熬令赤收。入藥劑中。急欲行水。有是證者。斟酌投煎。破積聚大堅痕癥瘕。療痰痰痰效逆。上氣咽喉內腫痛。疰氣可散。臍腹下痃癖。氣塊能消。

淄州貫衆

貫衆

味苦。氣微寒。有毒。在處山谷有。背日陰濕生。莖有三稜。皮係赤色。葉青綠。如小雞翅。根紫黑。似老

鴟頭故本經款中亦載。曰此謂草鴟頭也。一說根形如大瓜。下有黑鬚毛。二月八月採根陰乾。赤小豆瞿菌爲使。惡諸毒。理金瘡惡毒。殺三蟲。去寸白蚘蟲。仍除頭風。更破癥瘕。

鳥芺 芡



鳥芺 芡

味甘。氣平。微寒。無毒。苗似龍鬚。葉如芋狀。根黑皮薄。肉白有毛。又二種。無毛者亦同。今人謂之芡實。本經載曰烏芋。鳥鳥喜食。又得此名。水田蒔之。在處有之。三月三日採根曝乾。主產後血悶攻心。理產難子胞不下。壓丹石。除胸膈痞氣。下石淋。退面目黃疸風腫。能消痺熱堪邯。開胃進食。益氣溫中。性善毀銅。着之即碎。故爲消堅制積要劑也。多食則生他証。卒食則嘔水來。孕婦食動胎。小兒食臍痛。葉

採搗爛。蛇咬可敷。

水萍艸

水萍 味辛酸。氣寒。無毒。係柳絮隨風飛起。入池沼得水生成。小者藻。背面俱青。大者萍。面青背紫。下無根蒂。水面漂浮。入藥拯病。惟萍可用七月半採。依法曝乾。竹篩攤開。水盆架住。曬向烈日。纔得燥乾。盆無水則不燥。研末細羅。蜜丸彈大。豆淋酒化。空心頓吞。發汗驟來。颼風速退。仍治時行熱病。堪浴遍身癢瘡。生採煎湯。消水腫利小便。去暴燥。止消渴。夏夜蚊蠓燒烟可去。

謨按普濟大風丹云。東京開河。掘得石碑。梵書天篆。無有曉者。林靈素逐字釋解。乃是治中風方。歌曰。天生靈艸無根株。不在山間不在岈。始因飛絮逐東風。泛梗青青飄水上。神仙一味去沉疴。採時須是七月半。的甚攤風與中風。酒下

三九都汗散。

河中府大戟

大戟 味辛甘。氣大寒。陰中微陽。有小毒。種甚猥賤。處處有之。春發紅芽。日漸叢長。凡資入藥。惟採正根。

大戟 味辛甘。氣大寒。陰中微陽。有小毒。種甚猥賤。處處有之。春發紅芽。日漸叢長。凡資入藥。惟採正根。

傍。附誤煎。冷瀉難禁。惡藜蘆。反甘艸。海藻。芫花。畏菖蒲蘆根鼠屎。每與甘遂同利小便。消水腫腹滿急疼。除中風皮膚燥痛。破蠱毒。破堅癥。通月信墮胎。散頸癭逐瘀。〇苗名澤漆 味苦兼辛。退邪熱皮膚。卻浮腫面目。大腹水氣立遣。陰氣不足堪扶。

雷公云。凡使勿用附生者。若服令瀉氣不禁。即煎蘑菰子湯解。夫採得於槐砧上細剉。與細剉羊葉拌蒸。從巳以至申。去羊葉晒乾用之。

滁州蚤休

蚤休

蚤休 一名紫河車 叶 味苦。氣微寒。有毒。川谷俱有。江淮獨多。不生傍枝。一莖挺立莖中生葉。葉心抽莖。年久發三四層。上有金線垂下。故又名金線重樓。俗呼七葉一枝花也。圖經云。葉如鬼臼。根若肥薑。凡入藥中。惟採根用。主驚癎搖頭弄舌。除濕熱發腫。作瘡下三蟲。解百毒。或磨酒飲。或摩醋敷。

淄州 閭茄

閭茄

閭茄 味辛酸。氣寒。有小毒。近產河陽。原出高麗。苗逐春煖方起。葉類大戟。常青。花色黃。結子絕無根。皮

赤似雞冠根斷則流汁。黑凝如漆。故云漆頭。五月採根陰乾。惟取頭黑者勝。使甘艸節惡麥門冬。畏素問中云去惡血。古姚僧垣云用治癰疽。作散頻敷。肉滿便止。破癥瘕。殺疥蟲。逐敗瘡死肌。除大風熱氣。善忘不樂。亦著本經。〔弘景曰〕其根色白因醫取黑頭入劑。採多燒熟鐵焠之。作假代真。主治不異敷潰瘍作散載占方亦多。

衛矛

衛矛

〔釋名〕鬼箭羽

〔時珍曰〕陳藏器本草以衛矛、鬼箭羽分爲二物。今考其形狀氣味主治皆同。蓋一物也。

〔集解〕〔時珍曰〕衛矛處處山谷有之。莖類栢皮褐黃。葉似山茶青綠。幹有三羽狀似箭翎。削取皮羽陰乾。拭淨亦毛酥炙。〔一說只使箭頭每用酥一分。緩炒酥盡爲度。〕任煎湯液。專治女科。能墮妊娠。善療血氣。遣邪祟。殺蠱毒。破癥結。通月經。腹滿消胎立瘳。

崩中下漏即止。消皮膚風腫。去腹臟白蟲。產後血絞肚痛。殊功。惡疰卒暴心痛。捷效。

右 州 狼 毒

〔狼毒〕

〔狼毒〕味辛。氣平。不大毒。出陝西郡州似商陸苗葉。採根八月。肉白皮黃。重實者良。入水即沉。浮虛者劣。使黑大豆。惡麥句薑。厥積聚。痰癖。癥瘕。痠瘕。去惡瘡鼠瘻。瘜肉。逐欵逆上氣。殺蠱毒鬼精。走獸飛禽。亦堪殺害。

宋 康 軍 淫 羊 藿

〔淫羊藿〕

州 淫 羊 藿

〔淫羊藿〕即仙靈脾。味辛。氣寒。無毒。莖細而堅。葉圓而薄。所

在俱有。凌冬不凋。俗呼爲三枝九葉艸也。但生處不聞水聲者爲美。凡採製。須先酒浸過曝乾。劉碎。對拌羊脂。每一斤。用羊脂四兩。火炒脂盡爲度。羊食合。故此著名。治男子絕陽不興。治女子陰絕不產。鄒老景昏耄。除中年健忘。益骨堅筋。增力強志。久服有損。明載大經。

凡使先須時呼伽藍脾。須用夾刀夾去葉雷公云。四畔乾枝盡。後細剉。用羊脂相對拌炒過待羊藿令爲度。每修事一斤。用羊脂四兩爲度也。

羊躑躅

羊躑躅

羊躑躅

味辛。氣溫。有大毒。向陽山谷。逢春則生。起苗一尺餘高。結蔬二月半後。葉如桃葉深綠。花似瓜花正黃。羊誤食之。躑躅而死。故本經竟名羊躑躅。今南人反呼黃杜鵑。依時採花。陰乾入藥。主風溫。

藏肌肉裏。濈濈痺麻。治賊風在皮膚中。淫淫掣痛。鬼疰蠱毒。並治瘟瘧惡毒齊瘕。

解州藜蘆

藜蘆

藜蘆 味辛苦。氣寒。有毒。近道俱有。深谷多生。及芍藥細辛。及五參。人參。沙參。玄參。丹參。苦參。勿用。惡大黃。使黃連。

月採根陰乾。去蘆微炒。入藥專能發吐。不厪煎湯惟作散用。主頭禿疥瘡。療腸癖瀉痢。殺諸蟲除蠱毒。去死肌。愈惡癩。治喉痺不通。理風痰上壅。亦能醫馬塗癬。併敷馬刀爛瘡。

秦州莨菪

雷公云。凡採得去頭。用糯米泔汁煮。從巳至未。出瞭乾用之。

莨菪

莨菪子 音浪蕩子

卽天仙子。味苦甘。氣寒有毒。山谷俱生。苗高四尺許。葉闊三指。夏開白花。實同罌粟作房。子如黍米成粒。五月收採。向日曝乾。主風癇癲狂。療濕痺拘急。助足健行。除見鬼。理齒蛀蝕。免出蟲。久服輕身。走及奔馬。炒熟方益。生則瀉人。別說云。煮一二日。尚入土萌芽。用者尤宜審也。

續隨子

一名千金子。味辛。氣溫。有毒。苗如大戟葉中抽莖開花黃小多層。結實青而有殼。人家亭圃每種觀

廣州續隨子

別揭重饒。勿用誤服。傷人心大煩悶。眼生暹火

瞻。又因秋種冬生。春秀夏實。故又名曰拒冬。實也用取仁紙裹壓以重石去油。復研成霜。方可入藥宜一切宿滯積聚。敷諸般疥癬惡瘡。逐水利大小二腸。散氣除心腹脹痛。蛊蟲毒鬼疰。消痃癖瘕癥通月經。下痰飲。不可過服。防毒損人。其莖中白汁旋收。敷白癜面皯。即去。

明州蓖麻



儋州蓖麻

蓖麻

蓖麻子

味甘辛。氣平。有小毒。園圃中俱種。胡地者益良。子如牛蜱色斑。葉類火麻厚大。得名由此。其性善收。剝殼取仁。脩製忌鐵鹽湯入砂鍋煮透。半日爲度撈起以石臼搗糜用敷無名毒疽。吸出有形滯物刺骨立起。膿血盡追。塗足心。下胎孕子胞如神。塗

巔頂收生腸脫肛甚捷。塗口眼喎僻。即牽正復元

左患塗右。
右患塗左。見効急除。久則反損。因性峻急故也。亦

堪服餌。方法須依。歐卒什風癇。取仁一兩。黃連切
椀。入砂鍋中。文火旋煮。水盡復添。務過三日兩夜
爲度。取去黃連。只用仁粒一兩。水一成豆粒。作十二段。荊芥湯送下。
竹刀刮四段。每服五粒。仁風乾。不得見日。每日一粒。
食遠日三服。不拘年久日近。並効。載衛生寶鑑。消

中滿水脹。年壯人水研十粒。服之。去惡沫旋
加至二十粒。三日一服。差。載經文。兼逐

尸疰惡氣。又主寒熱風虛。服過者。一生忌食。豆入
喉悞犯之。頃刻作腹脹傾命。攝生之士。不可不知。
油榨取。敷疥癩瘡瘍。調銀硃可爲印色。葉搗蒸敷

腳氣風腫。熨顏上即止。卽紅。油塗炙蒸熨之
誤按病分血氣。藥別陰陽。丹溪云。蓖麻子屬陰。
主吸出有形質之滯物。故取胎產胞衣。剩骨膿
血者用之。荔枝肉屬陽。主散無形質之滯氣。故
消癰癢赤腫者用之。苟不明此理。而錯用治。則
不應也。

葷
撥

蕈撥

蕈撥 味辛。氣大溫。無毒。出番國中。產竹林內。苗作叢。高二尺許。葉圓緣闊二寸餘。五月開花白色作表。七月結子。小指般長。秋末收子陰乾。辛烈過於蒟醬。嶺南海舶貿易常多。老黑者不堪。紫褐者爲上。消宿食下氣除胃冷溫中。痃癖陰疝痛立瘥。霍亂冷氣疼遊走。禁水洩虛痢。止嘔逆醋心。得訶子人參桂心乾薑爲丸。治臟腑虛冷腸鳴洩痢神效。仍殺腥穢。食味堪調。久服走瀉真陽。令人腸虛下重

根名蕈撥沒黑硬近似柴胡。能治諸勞傷陰汗寒疝核腫

雷公云。凡使先去頭醋浸一宿劖乾。以刀刮去皮粟了。令淨方用。免傷人藏。令人生氣

舒州鬼臼



齊州鬼臼

鬼臼

味辛。氣微溫。有毒。齊杭襄峽最多。深山陰地纏

有獨莖起土內。一葉竪莖端。狀如傘蓋。一云葉六七。每年長一莖。莖佑爲一莖也。要求眞採之。勿貿假誤也。垣衣所畏。制伏可資。辟瘟疫惡氣不祥。殺蠱毒。鬼疰精物。去目赤膚腎。療喉結風邪。不入湯煎。惟作散用。

乾苔

乾苔味鹹。氣寒。一云溫。無毒。卽地面青苔是也。滲濕有背陰生。療心腹悶煩。研調水飲。治霍亂嘔吐。採煎汁嘗。發諸般瘡疥殺蟲。下一切丹石去毒。但服不可過劑。令人少血痿黃。○生老屋上者。名屋遊。利膀胱吊氣。及浮熱在皮膚間。○生古牆側者。名垣衣。主黃疸心煩。致暴熱攻腸胃內。○陟釐生水石面。止洩痢強胃氣。消穀溫中。○土馬騮生土牆頭。涼骨蒸。止鼻衄。敗毒殺蠱。○井苔從井底見。療水腫漆瘡熱瘡。○船苔向船底求。治五淋。鼻洪吐血。○昔邪生山石。去皃時熱驚癇。○菟松生菟溝。通女人經絡閉澀。

一莖。類小箭幹。葉出莖端。如纖。根橫而不發鬚花開葉心。其色黃白。二月八月用。惟採根。甘。卅水。煮一伏時。漉出曝乾。任。凡煎服。主鬼疰卒忤中惡。及百精毒。去瘟瘧時行疫癘。併心腹邪。強脚脈。益膂力。腰腿諸疾。並可。除。今醫不審其眞。每每以徐長卿充代。乖戾殊甚。夫長卿赤箭鬼箭雖皆有鬼督郵別名。而治大相異也。務辯的實。切勿混淆。

凡採並細剉了。搗用生甘卅水煮一伏時。漉出用也。

蜀葵花

紅蜀葵花

黃蜀葵花





原件短缺

P78后缺