

慎微李定著

常用處方集

增訂二版

新醫叢書

杭州新醫書局發行

增訂弁言

常用處方集爲已故李定教授平生得意之作，十餘年來斐聲全國，醫界奉爲圭臬。氏於民十八九年間彙輯此書，已有如許豐富之成就，非學驗廣博，曷足臻此。

但學術時有進步，迴顧近十餘年來之新醫藥，尤有長足進展。昔日之認爲豐富完全者，今日則已有不同之評價。除非加以澈底之增補，殊不足以適合今日之需要。鑒是之故，爰將本書增入新藥新方，俾使本書內容能與時代並進，不脫節，不落伍。

原書除附編外，共計三十三章；增補後加入化學治療及內分泌各一章，共計三十五章。其中解熱劑章增改爲解熱治瘧劑；止痢劑增改爲治痢劑；補血強壯劑增改爲補血強壯滋補劑；脚氣劑增改爲維生素劑；消毒劑增改爲消毒防腐劑；局部麻醉劑增改爲麻醉劑等。至其他各章亦略有增入。原書處方共計 505 個，增訂後共計 692 個較原書增多 187 個處方。附編中急性中毒及其處置項下增入磺胺類中毒一節。

增入之新藥名詞，大都未經審定，爰採用較爲通用者列入。若干成藥則採用各藥廠之譯名或逕以原名列入。

脫稿之後，校讀一遍，深覺未免有續貂之譏。對於新藥之未經列入者尙多，但多屬於同類製品，學者已可由此而窺其餘。至於其他遺漏之處，恐亦不免，尙望識者不吝指正。

中華民國三十七年一月

新醫同仁研究社謹識

常用處方集

目錄

第一章	清涼劑	1—3
第二章	解熱治瘧劑	4—15
第三章	健胃劑	16—26
第四章	鎮吐劑	27—29
第五章	催吐劑	30—31
第六章	瀉下劑	32—41
第七章	止瀉劑	42—48
第八章	治痢劑	49—53
第九章	驅蟲劑	54—60
第十章	灌腸劑	61—63
第十一章	胃腸洗滌劑	64—65
第十二章	祛痰劑	66—76
第十三章	鎮咳劑	77—80
第十四章	息喘劑	81—84
第十五章	吸入劑	85—86
第十六章	含嗽劑	87—89
第十七章	強心劑及興奮劑	90—105
第十八章	利尿劑	106—110
第十九章	尿防腐劑	111—115
第二十章	發汗	116—117

第二十一章	止汗	118—120
第二十二章	止血	121—128
第二十三章	補血，滋補，強壯劑	129—145
第二十四章	結核劑	146—153
第二十五章	驅梅劑	154—166
第二十六章	鎮痛劑	167—176
第二十七章	催眠劑	177—181
第二十八章	鎮靜劑	182—188
第二十九章	化學治療劑	190—203
第三十章	麻醉劑	204—213
第三十一章	維生素劑	214—220
第三十二章	內分泌劑	221—229
第三十三章	消毒防腐劑	230—239
第三十四章	眼科	240—254
A.	點眼水	240—246
B.	眼軟膏	247—251
C.	眼散布料	252
D.	眼洗滌及電包科	253—254
第三十五章	耳鼻咽喉科方	255—263
A.	耳科方	255—258
B.	鼻科方	259—263
C.	咽喉科方	264—266
第三十六章	皮膚科及生殖器科方	267—288
A.	皮膚病方	267—283
B.	生殖器病科方	284—288

附 編

(一)處方及處方箋	289—290
(二)處方箋中服法用語	290—293
(三)處方應用拉丁略語註解	293—297
(四)計量及記法	298—299
(五)對於小兒用藥之注意點(用量, 矯 味, 劑形)	300—301
(六)常備藥表	302—310
(七)毒藥表	310—313
(八)劇藥表	313—325
(九)極量對照表	326—333
(十)法定藥名與別名對照表	336—346
(十一)急性中毒及其處置	347—365
A. 急性中毒急救之概要	347—348
B. 急性中毒症候, 急救及治療	349—365
(十二)配合禁忌一覽表	366—376
(十三)常用磺胺類藥物劑量表	377
內服藥時間表	378

常用處方集

第一章 清涼劑 *Temperantia*

第 1 方 鹽酸清涼(酸甜)水 *Limonada hydrochlorica.*

稀鹽酸 0.5 *Acid. hydrochloric. dilut.*
0.5

糖漿 10.0 *Sirup. simpl.* 10.0

餾水 加至 100.0 *Aq. destill.* ad 100.0

右一日量，三回分服。D. S 3 mal in 1 Tage.

主治 各種熱性病。

說明 本劑有清涼，止渴，助消化等作用。稀鹽酸量可增至 0.8—1.0。糖漿可改用橙皮或覆盆子糖漿 *Sirup. Cort. Aurant. S. Rub. Id.*

清涼水之配製，稀鹽酸之外，可用枸橼酸 *Acid. Citric. (0.5%)* 酒石酸 *Acid-tartaric. (0.5)* 稀磷酸 *Acid. phosphor. dilut. (1%)* 稀硫酸 *Acid. sulfuric. dilut. (0.5%)* 乳酸 *Acid. lactic. (1%)* 製之，而稱之為某酸清涼水，其中稀硫酸性者有止血作用，乳酸性者有止癩作用，可各因其宜而用之。

本方可伍下列諸藥。

1. 苦酊 *Tinct. amar.* 一回量 0.5—2.0
2. 杏仁水 *Aq. Prun. armeniac* 一回量 0.5—1.0

3. 莨菪酊 Tinct. Scopol. 一回量 0.5—1.0
4. 硫酸鎂 Magn. sulfuric. 一回量 5.0—10.0—30.0
5. 紅(葡萄)酒 Vin. rubr. 一回量 10.0—30.0
6. 狄茄令 Digalen 一回量 0.3—1.0—2.0
7. 康吡箭毒酊 Tinct. Strophanth. 一回量 2—10 滴
8. 番木鱈酊 Tinct. Strychn. (Vomicae) 一回量 5—20 滴
9. 波希鼠李流膏 Extract. Cascar. sagrad. fluid. 一回量 1.0—4.0
10. 麥角浸膏 Extract. Secal. Cornut. 一回量 0.05—0.2
11. 安替必林 Antipyrin. 一回量 0.3—0.5—1.0
12. 霹藍密藤 Pyramidon. 一回量 0.1—0.5
13. 鹽酸奎寧 Chinin. hydrochloric. 一回量 0.1—0.5—1.0
14. 阿片酊 Tinct. Opii 一回量 3—10—20 滴
例如熱性病人心機衰弱時可用下方。

第 2 方

稀鹽酸	6.5	Acid. hydrochl. dilut.	6.5
狄茄令	1.0	Digalen.	1.0
糖漿	10.0	Sir. simpl.	10.0
餾水	加至 100.0	Ap. dest.	ad 100.0

右一日量，三回分服。D. S. 3 mal in 1 Tage.

主治 各種熱性病人心機衰弱之徵者。

說明 餘可類推，如便秘則伍以硫酸鎂，下痢

則伍以阿片酞是。

清涼水加重碳酸鈉飽和之，則成飽和劑 Saturationes 即賽耳退兒水 Selterswasser。有矯味，鎮吐，利尿等作用，處方如下。

第 3 方 賽耳退兒水 Selterswasser.

沸騰散 (Pulvis acrophorus)

酒石酸	1.5	Acid. tartari.	1.5
重碳酸鈉	2.0	Natr. bicarbonic.	2.0
糖漿	10.0	Sir. simpl.	10.0
水	加至 100.0	Aq. destill.	ad 100.0

右一日量，三回分服。D. S. 3 mal in 1 Tage.

說明 配法先將結晶碳酸鈉與其他所欲加之藥物製成溶液，後加酸類之粉末或溶液，見泡沫發生即成。酸類用酒石酸或枸橼酸，糖漿可用可不用，不用者曰無糖賽耳退兒水。

本劑可伍下列諸藥。

1. 苦酞 Tinct. amar. 一回量 0.5—2.0
2. 番毛地黃酞 Tinct. Digitalis. 一回量 5—20 滴。
3. 磷酸可待因 Codein. phosphoric. 一回量 0.005—0.02—0.05
4. 碘化鉀 Kal. jodat. 一回量 0.1—0.5—1.0
5. 溴化鉀 Kal. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
6. 溴化鈉 Natr. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
7. 莨菪酞 Tinct. Scopol. 一回量 0.5—1.0
8. 莨菪浸膏 Extract. Scopol. 一回量 0.02—0.05

第二章 解熱治瘧劑

Antipyretica, et Antimalaria.

第 4 方

安替必林	0.5 Antipyrin.	0.5
乳 糖	0.5 Sacchar. lact.	0.5

右爲一包，頓服。M. f. pulv No. 1

S. Auf 1 mal z. n.

主治 流行性感胃，肺炎，傷寒，結核，回歸熱，丹毒，以及其他各性熱病。

說明 本方可伍咖啡英 Caffein. 0.05—0.2 用之。凡解熱藥二種併用時，其作用增強，副作用減弱，例如安替必林 0.26 阿司必林 0.26 乳糖 0.5 爲一包，其作用較本方強是也。

第 3 方

安替必林	1.0 Antipyrin.	1.0
乳 糖	1.0 Sacchar. lact.	1.0

右混和均分三包，M. f. pulv div. in

一日三回，一回一 part. aeq. No. 3

包。

S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 與前方同，兼治風痺症，頭病，神經痛。

說明 安替必林亦可爲水劑用之。

本方可伍下列諸藥。

1. 咖啡英 Caffein. 一回量 0.05—0.1—0.3
2. 精製樟腦 Camphor. dep. 一回量 0.05—

0.3

3. 薩羅耳 Salol. --回量 0.3—1.0—2.0
4. 霹藍密藤 Pyramidon. --回量 0.1—0.5
5. 非那賽汀 Phenacetin. --回量 0.3—0.5—1.0
6. 莨菪浸膏 Extract. Scopol. --回量 0.02—0.03
7. 鹽酸海洛因 Heroin. hydrochloric. --回量 0.002—0.005
8. 磷酸可待因 Codein. phosphoric. --回量 0.003—0.01—0.03
9. 杜奧他耳 Duotal. --回量 0.2—0.5

安替必林水劑可伍下列諸藥。

1. 溴化鉀 Kal. bromat. --回量 0.5—1.0—2.0
2. 溴化鈉 Natr. bromat. --回量 0.5—1.0—2.0
3. 杏仁水 Aq. Lauro Cerasi --回量 0.5—1.0—1.5
4. 安息香酸鈉咖啡英 Caffeine-Natr. benzoic. --回量 0.1—0.5
5. 碘化鉀 Kal. iodat --回量 0.1—0.5—1.0
6. 硫酸鎂 Magn. sulfuric. --回量 5.0—10.0—30.0
7. 柳酸鈉 Natr. salicylic. --回量 0.5—1.0—2.0
8. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. --回量 0.5

—2.0

9. 莨菪醇 Tinct. scopol. 一回量 0.5—1.0

第 6 方

霹藍密藤 0.3—0.5 Pyramiden. 0.3—0.5

乳 糖 1.0 Sacchar. lact. 1.0

右混和均分三包， M. f. pulv. div. in

一日三回，一回一 part aeq. No. 3

包。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 結核症之消耗熱，流行性感胃，傷寒，
風痺，頭痛，神經痛諸症。

說明 本品解熱作用，比安替必林強三倍，故
僅可用其三分之一量。

本方可伍下列諸藥。

1. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 一回量 0.5
—2.0

2. 澱粉酶 Diastase. 一回量 0.1—0.3

3. 杜奧他耳 Duotal. 一回量 0.2—0.5

霹藍密藤亦可製為水劑用之。

第 7 方

非那賽汀 0.3—0.5 Phenacetin. 0.3—0.5

右一包量，給同量 f. pulv. D. tal. dos. No. V.

五包，附澱粉囊， ad Capr. amylac.

一日三回。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 結核症發熱，流行性感胃。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 安替必林 Antipyrin. 一回量 0.3—0.5—
1.0

2. 薩羅耳 Salol 一回量 0.5—1.0—2.0
3. 鹽酸海洛因 Heroin. hydrochloric.
一回量 0.002—0.005
4. 磷酸可待因 Codein. phosphoric.
一回量 0.005—0.02—0.05
5. 溴化鉀 Kal. bromat. 一回量 0.5—1.0—
2.0
6. 溴化鈉 Natr. bromat. 一回量 0.5—1.0
—2.0
7. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 一回量 0.5
—2.0

第 8 方

愛爾邦錠

Elbon-Pastillen.

右給一管二十片， D. 1 Originalpackung zu
每片含1.0，一日三 20. je 1.0

四回，一回一片。 S. 3—4 mal tgl. 1 Stuck.

主治 慢性結核性發熱，肺炎。

第 9 方

邁雷汀 0.6 Maretin. 0.6

乳 糖 2.0 Sacchar. lact. 2.0

右混和均分六包， M. f. pulv. div. in

一日三回，一回一 part. aeq. No. 6

包。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 流行性感胃，結核症發熱。

第 10 方

鹽酸奎寧 0.3—0.5 Chinin. hydrochloric.

0.3—0.5

右爲一包，給同量 f. pulv. D. tal. dos.
 五包，一日二三回 No. V.
 ，一回一包，澱粉 S. 2-3mal tgl. 1 Pulver,
 紙包服或盛膠囊服 in Cblate od. Kapseln,
 用。 zu nehmen.

第 11 方

鹽酸奎寧	1.0	Chinin, hydrochloric.	1.0
餾水	8.0	Aq. destill.	8.0
稀鹽酸	3滴	Acid. hydrochloric, Dil.	

Ctt III'

覆盆子糖漿 加至100.0 Sirup. Rub. Id. ad 100.0
 右混和一日數回， M. D. S. Mehrm. tgl.
 一回一茶匙。 1 Teelöffel.

第 12 方

鹽酸奎寧	3.0	Chinin, hydrochloric.	3.0
麥芽浸膏(餾)	適量	Extract. Malt.	q.s.

右混和爲丸三十粒，ut f. pil. No. 30.
 服法依示。 S. Nach Verordnung.

第 13 方

鹽酸奎寧	2.0	Chinin, hydrochloric.	2.0
阿片酊	0.5	Tinct. Opii	0.5
亞拉伯樹膠漿	50.0	Mucilagin. Gumm. arabic.	50.0

右混和分二回灌腸。M. D. S. zu 2 Klystieren.

主治 (凡鹽酸奎寧劑) 瘧疾，產褥熱，流行
 性感胃，敗血症，膿毒症，丹毒，肺炎。

說明 瘧疾於發作前六時間頓服 0.5-1.0-1.5
 卽第卅方一至三包，第卅方五至十五丸。

產褥熱，敗血症，丹毒等症，一日二三回，一回三至五丸，流行性感胃，一日六至十丸分服，肺炎亦然，不能內服時，試以灌腸。

奎寧劑，鹽酸奎寧外硫酸奎寧 *Chinin. sulfuric.* 鞣酸奎寧 *Chinin. tannic.* 均為常用，但其作用較弱，故其用量須大，又二烷炭酸奎寧 *Chinin. aethylcarbon.* 即歐奎寧 *Euchinin* 苦味極微，適用於小兒，婦人，神經過敏者。

第 14 方

硫酸奎寧	1.0	<i>Chinin. sulfuric.</i>	1.0
柯柯脂	6.0	<i>Ol. Cacao</i>	6.0

右混和為藥栓一個 *ut f. suppos. D. tal.*

，給同量三個，必 *dos. No. 3*

要時一個。 *S. Bei Bedarf. 1 Zäpfchen.*

說明 不能內服奎寧劑時用之。

第 15 方

歐奎寧	1.0	<i>Euchinin.</i>	1.0
-----	-----	------------------	-----

右為一包，給同量 *f. pulv. D. tal. dos.*

十包，一日三回， *No. X. S. 3 mal tgl.*

一回一包。 *1 Pulver*

主治 各種熱性病。

說明 鹽酸奎寧服後時見耳鳴，重聽，弱視，等副作用，而本品無之。

第 16 方

阿利斯安欣	1.0	<i>Aristochin.</i>	1.0
-------	-----	--------------------	-----

右爲一包，給同量 f. pulv. D. tal. dos.

六包，一日二三回 No. 6

，一回一包 S. 2—3 mal tgl. 1 Pulver

主治 流行性感胃及其他熱性病。

說明 本品爲奎甯誘導體，無味無臭，且無副作用，而效力亦佳。

下列之 Aethylhydrocuprein 製劑，有謂其作強於奎寧，以之治肺炎及瘧疾者。

- a. 鹽酸奧撥妥欣 Optochin. hydrochloric. 爲白色苦味粉末，用量一回 0.5，一日三回。
- b. 鹽酸雷密琴 Remijin. hydrochloric. 一回量 0.2—0.3 一日三四回，宜食後服。
- c. 鞣酸雷密琴 Remijin. tannic 一回量 0.4，一日三四回，小兒流行性感胃或肺炎，亦多用之，其用量三個月以上小兒一回 0.03—0.05，二至五歲兒，一回 0.05—0.1，六至十二歲兒一回 0.15—0.25。

第 17 方

柳酸鈉 0.5—1.0 Natr. salicylic. 0.5—1.0

右爲一包，給同量 D. tal. dos. No X.

十包，一日 2—8 回， S. 2—8 mal tgl

一回一包。 1 Pulver.

主治 各種熱性病各種風痺症，漿液性肋(胸)膜炎，心囊炎，腹膜炎，腦膜炎。

說明 本品有害胃作用，宜加同量之重碳酸鈉，以預防之，亦可製爲水劑，此時加重酸

鈉外更可加薄荷水或苦酞等，但不宜加糖漿，因加糖漿其味愈惡也。

本品忌與酸類配合，凡腎炎，胃腸炎，咯血忌服，本方可伍下列諸藥。

1. 重碳酸鈉 *Natr. bicarbonic.* --回量 0.5—2.0
2. 苦酞 *Tinct. amar.* 一回量 0.5—2.0
3. 薄荷水 *Aq. Menthae* --回量 3.0—5.0
4. 紅酒 *Vin. rubr.* 一回量 10.0—30.0
5. 醋酸鉀液 *Liq. kalii. acetic.* --回量 2.0—10.0
6. 溴化鉀 *Kal. bromat.* --回量 0.5—1.0—2.0
7. 溴化鈉 *Natr. bromat.* --回量 0.5—2.0
8. 安息香酸鈉咖啡英 *Caffeine-Natr. benzoic.* 一回量 0.1—0.5
9. 莨菪浸膏 *Extract. Scopol.* --回量 0.02—0.05
10. 莨菪酞 *Tinct. Scopol.* --回量 0.5—1.0
11. 碘化鉀 *Kal. jodat.* (與此配合，原屬禁忌，但常伍用)。

附註 薄荷水簡易製法，取薄荷油 1.0，微溫
 餾水 500.0 混和振盪後，以濾紙濾過之
 即得。

第 18 方

柳酸鈉	10.0	<i>Natr. salicylic.</i>	10.0
餾水		<i>Aq. destill.</i>	
亞拉伯樹膠漿	各 150.0	<i>Mucilag. Gumm.</i>	

arabic. āā 150.0
 右混和一日數回灌腸。 M. D. S. Mehrm. tgl. zu klystieren.

說明 與前方同，不能內服時用之。

第 19 方

沙利必林 0.5—1.0 Salipyrin. 0.5—1.0
 右爲一包給同量十包，一日三回，一回一包。 f. pulv. D. tal. dos. No. X. S. 3 mal. tgl 1 Pulver.

主治 各種熱性症。

說明 本品即柳酸安替必林 Antipyrin. salicylic. 兼二者之效而有之，對於流行性感胃，有特效云。

第 20 方

薩羅(耳) 0.5—1.0 Salol 0.5—1.0
 (=柳酸困基) (=Phenyl. salicylic.)
 右爲一包，給同量十包，一日三四回，一回一包。 D. tal dos. No. X. S. 3—4 mal tgl. 1 Pulver.

說明 各種風痺症，結節性紅斑，神經痛，蕁麻疹，及各種熱性症。

第 21 方

阿司必林 1.5 Aspirin. 1.5
 乳糖 1.0 Sacchar. lact. 1.0
 右爲散均分三包，一日三回分服。 M. f. pulv. in part. aep. No. III

S. 3 mal in Tage z. n.

主治 各種風痺症，坐骨神經痛，頭痛，腰痛，乾性肋膜炎，滲出性肋膜炎，咽喉炎，流行性感冒，結核症，等發熱。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 芳香散 Pulvis aromaticus 一回量 0.2—0.5—1.0
2. 杜氏散 Pulv. Doveri. 一回量 0.2—0.4—1.0
3. 非那賽汀 Phenacetin. 一回量 0.3—0.5—1.0
4. 莨菪浸膏 Extract. Scopol. 一回量 0.02—0.05
5. 安息香酸鈉咖啡英 Caffeino-Natr. benzoic. 一回量 0.1—0.5
6. 番毛地黃葉末 Fol. Digital. pulverat. 一回量 0.04—0.2
7. 磷酸可待因 Codein. phosphoric. 一回量 0.005—0.02—0.05
8. 鞣酸蛋白 Tannalbin. 一回量 0.5—1.0—2.0
9. 澱粉酶 Diastase. 一回量 0.1—0.3

安替必林，鹽酸奎寧，澱粉酶等與阿司必林配合之時，則起潮解，故宜用蠟紙包，包數不宜多，僅與一包頓服，或與三包一日量為適當，且須多加乳糖。

阿的平片(瘧滌平) Atebrin tab. (Atabrine tab.)

右給一管十五片， D. 1 Originalpackung zn 15
每片含 0.1gm, je 0.1
一日三四回，每回 S. 3—4 Mal tgl.
一片。 1 Stuck.

主治 除對惡性瘧之有性生殖幼蟲效力稍感不足外，對其餘瘧原蟲之功力強大無比，故無論三日瘧，四日瘧，均可用之。

說明 阿的平性極平和，用時極少流弊，偶有皮膚發現黃色者，但並非黃疸，停藥後數日即退。

第 23 方

百司母困片(撲瘧母星)Plasmoquinine tab.

右給六片，每片含 D. zn6 je 0.02
0.02，一日三四回 S. 3—4 Mal tgl.
，每回一片。 1 Stuck

主治 惡性瘧，三日瘧，四日瘧，以及一切因瘧而起之各種併發病之發熱。

說明 百司母困能殺惡性瘧之有性生殖幼蟲，如與奎寧同用，可以統治各型瘧疾，如與阿的平同用，應每隔二小時分服。

第 24 方

奎諾百司母困片 Quino-Plasmoquine tab.

每片含奎寧 0.3, S. 3—4 Mal tgl.
百司母困0.01, 每 1 Stuck
日服三四次，每次
一粒，食後服。

主治 各型瘧疾。

說明 本品服二三日後，即可熱退病消，服五六日後，週身血液中之瘧蟲均可完全撲滅。

【注射劑】

1. 鹽酸奎寧針 (Quinine Hcl. Amp.) 每針含量 0.25 及 0.5，每次注射一針，通常於臀部肌肉內，靜脈注射每公撮應加入十公撮之 5% 葡萄糖液緩緩注入，主治瘧疾。
2. 巴苦納恩 (Bagnon) 每針 2c.c. 及 5c.c. 兩種，每 2c.c. 內含 Quinine Hcl. 0.136, Caffeine 0.0344, Urethan 0.0284，臀部肌肉及靜脈注射均可，每日 2—5c.c.，主治瘧疾，肺炎，流行性感胃等。同類製劑有 Febnon, Bagsal, Fibrung. 等。
3. 特郎普明 (Transpulmin) 本品為奎寧樟腦油溶液，供肌肉注射，每日 1—2c.c.，主治肺炎。同類製劑有 Transpoin, Transpul-sal 等。
4. 阿的平針 (Atebrin Amp.) 每針含量 0.1 及 0.3 兩種，供肌肉注射。注射時每 0.1 化 2c.c. 無菌蒸餾水應用，主治與阿的平片同。
5. 百司母困針 (Plasmoquine Amp.) 每針含量 1c.c. (百分之一成溶液) 供肌肉注射，每日 1—3c.c.，主治與百司母片同。
6. 洒撲淋 (Salpalin) 係一種柳酸鹽及錫鎂合劑，主治各種炎性熱症，供靜脈注射，同類製劑有 Pectol 等。

第三章 健胃劑 Stomachica

第 25 方

稀鹽酸	2.0	Acid. hydrochloric. dil.	
		2.0	
糖製胃蛋白酶	4.0	Pepsin. saccharat.	4.0
糖漿	20.0	Sirup. simpl.	20.0
體水加至	200.0	Aq. destill.	ad 200.0
右混和一日三回二	M. D. S. 3 mal tgl. in 2		
日分服飯後。	Tage nach der Mahlzeit.		

主治 胃酸缺乏症，胃消化不良。

說明 本方稀鹽酸量可減少為 1.0，糖製胃蛋白酶可改用胃蛋白酶 Pepsin. 2.0，且可伍用複方鷄納酞 5.0，此外遇必要時，第一方下所列諸藥可酌量採取伍用。

Acidolpepsin-Tablet. 作用與本方同，原製一管二十片，一日三回，一回一二片，溶於半盞水中，食後服之。本錠劑分第一第二兩種，第一種含酸量較大，可視其適應症而用之。

第 26 方

重碳酸鈉	3.0	Natr. bicarbonic.	3.0
煨製礞	1.5	Magn. ust.	1.5
莨菪浸膏	0.06	Extract. Scopol.	0.06
右混和均分三包，	M. f. pulv. div. in part.		
一日三回，一回一	aeq. No. III		
包。	S. 3 mal tgl 1 Pulver.		

主治 胃酸過多症，急性及慢性胃炎。

說明 本劑有中和胃酸，鎮靜刺激及疼痛作用

本方可伍下列諸藥。

1. 歐龍膽末 Pulv. Gentian. --回量 0.2—1.0
2. 大黃末 Pulv. Rhizom. Rhei 一回量 0.1—0.3，爲下劑一回 0.5—2.0
3. 次硝酸鐵 Bismut. subnitric. 一回量 0.5—1.0—1.5
4. 沈降碳酸鈣 Calc. carbonic. praecipitat. 一回量 0.5—2.0
5. 薄荷油糖 Elaecosacchar. Menth. 一回量 0.5—2.0
6. 坦那耳彬 Tanalbin. 一回量 0.5—1.0—2.0
7. 澱粉酶 Diastase 一回量 0.1—0.3
8. 表飛鳴 Biofermin. 一回量 0.3—0.5
9. 鞣酸奧雷克辛 Crexin. tannic. --回量 0.3—0.5
10. 安替必林 Antipyrin. --回量 0.3—0.5—1.0
11. 薩羅耳 Salol 一回量 0.5—1.0—2.0
12. 替奧可耳 Thiocol --回量 0.5—0.1—2.0
13. 草酸銻 Cerium. oxalic. 一回量 0.05—0.1—0.3
14. 阿片末 Pulv. Opii --回量 0.01—0.1
15. 磷酸可待因 Codein. phosphoric. --回量 0.005—0.02—0.05

16. 非那賽汀 Phenacetin. 一回量 0.3—0.5—1.0
17. 杜氏散 Pulv. Doveri. 一回量 0.2—0.4—1.0

附註 油糖者，白糖五十分與揮發性油一分混和製之。如僅須少量則取白糖 2.0 加油即薄荷油或茴香油，或橙皮油一滴混和之即得薄荷油糖或茴香油糖或橙皮油糖。

第 27 方

重碳酸鈉	3.0	Natr. bicarbonic.	3.0
苦 酊	1.5	Tinct. amar.	1.5
餾 水	100.0	Aq. destill.	100.0

右一日量，三回分 S. 3 mal in 1 Tage z. n. 服。

主治 消化不良。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 糖漿 Sirup. simpl. 一回量 3.0—5.0
2. 薄荷水 Aq. Menthae 一回量 3.0—5.0
3. 大黃酊 Tinct. Rhei 一回量 2.0—4.0
4. 番木鱉酊 Tinct. Strychn. 一回量 5—20 滴
5. 番毛地黃劑 Digitalis-Praeparate.
6. 康毗箭毒酊 Tinct. Strophant. 一回量 2—10 滴
7. 阿片酊 Tinct. Opii 一回量 1—10—20 滴
8. 莨菪酊 Tinct. Scopol. 一回量 0.5—1.0
9. 硫酸鎂 Magn. sulfuric. 一回量 5.0—30.0

10. 波希鼠李流膏 Extract. Cascar. sagrad.
fluid. --回量 1.0—4.0

第 28 方

重碳酸鈉		Natr. bicarbonic.	
茴香油糖	各 10.0	Elaeosacchar. Foeniculi	
		āā 10.0	
大黃末		Pulv. Rhizom Rhei	
生薑末	各 2.0	Pulv. Zingiber.	āā 2.0

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.
一回一刀尖。 1 Messerspitze.
主治 因胃酸過多而起之消化不良。

第 29 方

煨製鎂	1.5	Magn. ust.	1.5
澱粉酶	1.0	Diastase	1.0

右混和均分六包， M. f. pulv div. in part.
一日三回，一回一 aeq. No. 6
包。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.
主治 與前方同。
說明 本方調製因煨製鎂容積過大，可投於乳
鉢中，滴入苦酞或番木鱈酞 0.5 研和之，
即可減其容積，後再混以澱粉酶。

第 30 方

鷄納皮煎劑	4.0:90.0	Decoct. Cort. Chinae	
		4.0:90.0	
稀鹽酸	1.0	Acid. hydrochloric dil.	1.0
糖漿	加至 100.0	Sirup. simpl.	ad 100.0

右一日量，三回分 S. 3 mal in 1 Tage z. n.

量。

主治 食慾不佳，諸種急性慢性疾病之恢復期常用之。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 胃蛋白酶 Pepsin. 一回量 0.2—0.5
2. 苦劑 Tinct. amar. 一回量 0.5—2.0
3. 礆砂 Ammon. Chlorat. 一回量 0.3—1.0
4. 杏仁水 Aq. Prun. armeniac 一回量 0.5—1.0—1.5

第 31 方

康德郎煎劑 5.0:90.0 Decoct. Condurango
5.0:90.0

稀鹽酸 1.0 Acid. hydrochloric dil. 1.0

糖漿 加至 100.0 Sirup. simpl. ad 100.0

右一日三回用服。 S. 3 mal in 1 Tage z. n.

主治 各種消化不良症。

說明 本方中之稀鹽酸可改用大黃酊或複方鷄納酊，此外可伍下列諸藥。

1. 胃蛋白酶 Pepsin. 一回量 0.2—0.5
2. 生薑糖漿 Sirup. Zingiber. 一回量 4.0—10.0
3. 番木鱈酊 Tinct. Strychni 一回量 5—10 滴

第 32 方

大黃浸劑 5.0:150.0 Inf. Rhizom. Rhei 5.0:150.0

重碳酸鈉 6.0 Natr. bicarbonic. 6.0

薄荷油 2 滴 Ol. Menth. 2 滴

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.
 一回一食匙，食後 1 Esslöffel
 服。 nach dem Essen.

主治 與方前同。

第 33 方

鷄納酊	2.0 Tct. Chinae	2.0
大黃酊	2.0 Tct. Rhei	2.0
生薑酊	2.0 Tct. Zingiber.	2.0
餾 水	加至 100.0 Aq. d. still.	100.0

右一日三回分服。 S. 3 mal in 1 Tage z. n.

主治 與前方同。

說明 本方配法，爲便利計，其中三酊各10.0
 混和盛以滴瓶，一日三回，一回三十滴和
 水服之亦可。

第 34 方

大黃末	Rhizom. Rhei pulverat.
精製酒石	各 10.0 Tartar. depurat. āā 10.0

右混和盛以小盒與 M. f. pulv. D. ad Scatul.
 之，一日三回，一 S. 3 mal tgl 1 Teelöffel
 回一茶匙和水服。 in Wasser z. n.

主治 腸蠕動不振而起之消化不良症。

第 35 方

番木鱉酊	2.0 Tct. Strychn.	2.0
芳香酊	Tct. aromat.	
複方鷄納酊	各 20.0 Tct. Chinae Composit.	
	各 20.0	

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.

一回 20—30 滴和 20—30 Tropfen
水服。 in Wasser z. n.

主治 胃弛緩症，食慾不佳。

第 36 方

番木鱘酊 Tct. Strychn.
海狸香酊 各 10.0 Tct. Castorei āā 10.0
顯茄酊 5.0 Tct. Belladonn. 5.0

右混和一日五六回 M. D. S. 5—6 mal tgl.

，一回三十滴，和 30 Tropfen
水服。 in Wasser z. n.

主治 神經性消化不良，胃腸機能微弱性消化不良等症。

第 37 方

番木鱘酊 1.0 Tinct. Strychn. 1.0
龍膽酊 1.0 Tinct. Gentian. scabr. 1.0
桂皮水 5.0 Aq. Cinnamom. 5.0
餾水 加至 100.0 Aq. destill ad 100.0

右一日三回分服。 S. mal 3 in Tage z. n.

主治 消化不良，胃腸弛緩症，弱視，運動麻痺。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 一回量 0.5—2.0
2. 溴化鈉 Natr. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
3. 莨菪酊 Tinct. Scopol. 一回量 0.5—1.0
4. 大黃酊 Tinct. Rhei 一回量 2.0—4.0

5. 硫酸鎂 Magn. sulfuric. 一回量 5.0—10.0—30.0
6. 柳酸鈉 Natr salicylic. 一回量 0.5—1.0—2.0
7. 雷否耳氏液 Liq. Fowler. 一回量 2—6 滴

第 38 方

古倫僕根煎劑 2.0:90.0 Decoct. Rad. Colombo
 糖 漿 加至 100.0 Sirup. simpl. ad 100.0
 右一日量三回分服。 S. 3 mal in 1 Tage z. r.

主治 慢性腸卡答兒，赤痢，結核症慢性下痢。

說明 古倫僕根為粘滑性苦味藥，煎劑外亦可為浸劑或散劑用之。一日數回，一回 0.5—2.0

急性腸卡答兒或下痢時，以蓖麻子油或甘汞等清理後，不用次硝酸鐵，阿片等止痢而可投此方。

第 39 方

鞣酸奧雷克辛 0.5—1.0 Oresin. tannic 0.5—1.0
 乳 糖 2.0 Sacchar. lact. 2.0

右混和均分三包， M.f.pulv.div.in part.
 一日三回，一回一 aeq. No. III S. 3 mal
 包，食前一二時間 tgl. 1 Pulver 1—2 St.
 服。 vor der Mahlzeit.

主治 各種消化不良症，以及因貧血，神經衰弱等而起之食慾不振，通常連服四五日後，須稍停幾日再服。

第 40 方

澱粉酶	3.0	Diastase	3.0
-----	-----	----------	-----

乳 糖	1.0	Sacchar. lact.	1.1
-----	-----	----------------	-----

右混和均分六包， M. f. pulv. div. in
 一日三回，一回一 part. aeq. No. 6
 包，食後服。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver

主治 澱粉消化不良症。

說明 本品服用，務於食時前後或和食物服之
 。並可伍下列諸藥。

1. 莨菪浸膏 Extract. Scopol. 一回量 0.02—0.03
2. 番木鱉浸膏 Extract. Strychn. 一回量 0.01—0.03
3. 糖製胃蛋白酶 Pepsin. saccharat. 一回量 0.5—1.0
4. 表飛鳴 Biofermin. 一回量 0.3—0.5
5. 披奧該寧 Biogenin. 一回量 0.3—0.5
6. 拉克妥酶 Lactostase. 一回量 0.2—0.5

高蜂澱粉酶 Taka-Diastase. 作用較強
 ，故用量可少，一回量 0.1—0.2 已足。

第 41 方

胰 酶	3.0	Pankreatin.	3.0
-----	-----	-------------	-----

乳 糖	1.0	Sacchar. lact.	1.0
-----	-----	----------------	-----

右混和均分六包， M. f. pulv. div. in part.
 一日三回，一回一 aeq. No. 6 S. 3 mal tgl.
 包，食後服。 1 Pulver nach dem Essen.

主治 各種消化不良症。

說明 胰酶自豚胰腺抽出，能消化蛋白及澱粉。
此外與胰酶作用相類者，有下列諸藥。

- a. 狄該斯汀 Digestin. 一回量 0.1—0.3
- b. 阿尼莫斯他啐(酶) Animostase 一回量 0.1—0.2
- c. 普羅他米拉啐(酶) Protamylase 0.1—0.3

第 42 方

果百雅 24.0—48.0 Capaya 24.0—48.0

糖 水 加至 100.0 Aq. ad. 100.0

右混和，一日三回 M. D. S. 3 Mal tgl

，每回一食匙。 1 Esslöffel.

主治 消化不良，腸胃疾患。

說明 本品為植物性消化劑，內含番瓜酶及澱粉酶。通常多用其為佐藥，例如加入咳嗽劑中。

第 43 方

流質太卡帶 24.0 Liq Taka Diastase 24.0

阿司特司

糖 水 加至 100.0 Aq. ad. 100.0

右混和，一日三回 M. D. S. 3 Mal tgl

，每回一食匙。二 Esslöffel.

日分服。

主治 澱粉消化不良。

說明 本品係一由麥麩之微菌提煉而成，氣味芬芳，極合婦孺之用，尚有片劑及粉劑二種，臨床應用更為簡便。

第 44 方

流質加里 24.0 Liq Kali Peptic 24.0
配百的克

醫 水 100.0 Aq. ad. 100.0

右混和，一日三回 M. D. S. 3 Mal tgl
，每回一食匙。 1 Esslöffel.

主治 食慾不振，消化不良。

說明 本品可配伍其他健胃藥等。

第 45 方

寶青春片 15粒 Efozyden tab No. 15

一日三次分服。 S. 3×1

主治 食慾不振。

說明 本品內含各種維他命及酵素，同樣製品
有食母生 (Zymasun) 等。

第 46 方

阿即多爾 6 片 Acidol-Pepsin tab No. 6
配符新片

一日三次分服。 S. 3×1

主治 胃酸缺乏，胃炎，食慾不振。

說明 本品為鹽酸及配符新所合成，有強酸性
及和酸性兩種，須視需要而定。

第 47 方

歐力新 1.0 Orexin 1.0

一日三次分服。 S. 3×1

主治 消化不良，食慾缺乏。

說明 本品能促進胃液之分泌，故胃潰瘍及胃
酸過多，均不可服本品。

第四章 鎮吐劑 Antiemetica.

第 48 方

重碳酸鈉 1.0 *Natr. bicarbonic.* 1.0
 薄荷油糖 0.3 *Elaeosacchar. Menth.* 0.3
 右混和頓服。 *N. f. pulv. S. auf 1 mal z. n.*
 主治 胃痛嘔吐。

第 49 方

鹽酸可開因 0.1 *Cocain. hydrochloric.* 0.1
 (鹽酸嗎啡 0.1) (*Morphin. hydrochloric*
 0.1)

杏仁水 10.0 *Aq. Prun. armeniac.* 10.0
 右必要時服十五滴。 *S. Bedarf 15 Tropfen.*

主治 與前方同。

說明 鹽酸可開因極量一回 0.05, 除上方外亦
 可以此量加於賽耳退兒水 100.0 中, 分三
 回服之。

第 50 方

草酸鈣 0.2—0.3 *Cer. oxalic.* 0.2—0.3
 煨製鎂 0.5 *Magn. ust.* 0.5
 薄荷油糖 1.0 *Elaeosacchar. Menth.* 1.0

右混和均分三包, *M. f. pulv. div. in*
 一日三回, 一回一 *part. aeq. No. III*
 包。 *S. 3 mal in 1 Tage z. n.*

主治 惡阻, 船暈, 神經性嘔吐諸症。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 重碳酸鈉 *Natr. bicarbonic.* 一回量 0.5

—2.0

2. 莨菪浸膏 Extract. Scopol. 一回量 0.02

—0.03

3. 鹽酸可開因 Cocain. hydrochloric.

一回量 0.01—0.05

第 51 方

碘 酊	5 滴	Tinct. Jodi	Gtt V
碘 化 鉀	0.5—1.0	Kal. jodat.	0.5—1.0
餾 水	100.0	Aq. destill.	100.0

右混和一日三回分 M. D. S. 3 mal in
服。 1 Tage z. n.

主治 尿毒症，嘔吐，惡阻。

第 52 方

氯 仿	1.0	Chloroform.	1.0
含醑纈草酊	19.0	Tct. valerian. aether.	19.0

右混和每一時二十 M. D. S. stündl. 20

滴。見效爲度。 Tropfen bis Wirkung.

主治 嘔吐，胃痛，吃逆。

第 53 方

硫酸阿托品	0.01	Atropin. sulfuric.	0.0
餾 水	10.0	Aq. destill	10.0

右半筒皮下注射。 S. 1/2 Spritze zur
subkutan. injekt.

主治 腹膜炎嘔吐。

第 54 方

薄 荷 腦	0.5	Menthol.	0.5
醇(酒精)		Spirit.	

糖 漿 各 25.0 Sirup. simpl. āā 25.0
 右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.
 一回一茶匙。 1 Teelöffel.

主治 嘔吐，船暈。
 說明 如於妊婦嘔吐，則酒精可改用葡萄酒。

第 55 方

半 夏 4.0 Tuber. Pinelli tuberifer. 4.0
 茯 苓 2.0 Pachym. Cocos. 2.0
 薑 根 1.5 Rhizom. Zingiber. 1.5
 鹽 水 100.0 Aq. destill. 100.0

右先加水 150.0 煎 f. Dec ct. 100.0
 至 100.0 濾過，一 S. 3 mal in 1 Tage z. n.
 日三回分服。

主治 各種嘔吐症。
 說明 本方煎劑，亦可加糖漿，苦酊，薄荷水
 用之。

第 56 方

乳兒鎮吐劑

- a. 1% 重碳酸鈉溶液 Natr. bicarb-
 onic. Lös. (1%)，每服一兒匙。
- b. 阿內斯退辛 Anaesthesin. 以本品
 0.2 樹膠漿水 20.0 混和，於授乳前
 十分時間服以 5.0
- c. 阿利品 Alipin 製成 1—2% 水溶
 液，於授乳前十分時間，服以 5.0

第 57 方

顛 茄 酊 1.0 Tct. Belladonna 1.0
 鹽 水 30.0 Aq. ad 30.0

一日三次分服。 S. 3×1

主治 各種嘔吐。
 說明 本方可加入其他鎮靜劑等以加增其效力

第五章 吐劑 Emetica.

第 58 方

吐根末 0.5—1.0 Rad. Ipecacuanh.
pulverat. 0.5—1.0

乳 糖 0.5 Sacchar. lact. 0.5

右爲一包，給同量 M. f. pulv. D. tal dos
三包，每十五分時 No. III. S. 1/4 stündl
間服一包，見效爲 1 Pulver bis zur
度。 Wirkung.

主治 排除胃內毒物或不消化食物。

說明 凡吐劑禁用於妊娠末期，動脈瘤，重症
心臟病，腹膜炎，吐糞症，脫腸，有咯血
腸出血傾向的病人。

本方可添加吐酒石 Tartar. stibiati
0.03，但對於老人小兒不可添加。

第 59 方

吐根浸劑 3.0:50.0 Inf Rad. Ipecacuanh.
3.0:50.0

右每十分時間服一 D. S. 1 Esslöffel voll alle
食匙，見嘔吐爲度 10 Minuten bis zum
。 Erbrechen.

主治 與前方同。

說明 小兒減量每服一茶匙。

第 60 方

硫 酸 銅 1.0 Cupr. sulfuric. 1.0
糖 漿 10.0 Sirup. simpl. 10.0

餾 水 30.0 Aq. destill. 30.0

右每十五分時服一 D. S. Alle 15 Minuten 1
茶匙，奏效爲度。 Teelöffel bis zur Wirkung.

主治 諸中毒症，以此催吐。

第 61 方

鹽酸阿朴嗎啡 0.01 Apomorphin. hydrochloric.
0.01

乳 糖 0.5 Sacchar. lact. 0.5

右爲一包，給同量 N. f. pulv. D. tal. dos.

五包，每十五分間 No. V. S. 1/2 stündl.

服一包，見效爲度。 1 Pulver bis zur Wirkung.

主治 排除胃內毒物或不消化食物。

第 62 方

鹽酸阿朴嗎啡 0.1 Apomorphin. hydrochloric.
0.1

稀 鹽 酸 0.1 Acid. hydrochloric. dil. 0.1

煮沸餾水冷後 10.0 Aq. Coctae et refrigerat.
q. s. 10.0

右混和盛以黑瓶， M. D. ad vitr. nigr.

半筒乃至一筒皮下 S. 1/2 Spritze subkutan.
注射。

主治 與前方同。

說明 不能內服吐劑者以此注射，小兒用 1/10
—1/2 筒。

本注射液有製成盛以安瓿販賣者。

第六章 下劑 Laxantia.

第 63 方

蓖麻子油	15.0 Ol. Ricin.	15.0
薄荷油	1 滴 Ol. Menth.	1 滴

右混和頓服。 M. D. S. Auf 1 mal z. n.

主治 便秘，中毒，消化不良，赤痢，疫痢。

說明 本品有不快臭味，故有其製劑多種如下

- a. 導能 Donan. 一回量 30.0—40.0
- b. 利奇諾兒 Ricinol. 爲粉狀蓖麻子油劑。
- c. 利奇可兒 Ricicol. 亦粉狀蓖麻子油劑。

第 64 方

藥喇叭根末	0.2 Tuber. Jalap. pulverat.	0.2
乳 糖	0.3 Sacchar. lact.	0.3

右混和給等量十包 M. f. pulv. D. tal. dos.

，一日二回，一回 No. X. S. 2 mal tgl. 1

一包。 Pulver.

主治 各種便秘。

說明 藥喇叭根末屬緩下劑頓服量 0.5—1.0

本方可伍下列諸藥。

1. 甘汞 Calomel 一回量 0.2—0.5—1.0
2. 大黃末 Pulv. Rhei 下劑一回量 0.5—2.0
3. 桂皮末 Pulv. Cinnamom. 一回量 0.3—1.0
4. 精製酒石 Tartar. de urac. 下劑一回量

3.0—5.0

5. 蟯螯素 Santonin. 一回量 0.05—0.1

第 65 方

藥喇叭皂 1.5 Sap. Jalapin. 1.5
 藥喇叭根末 0.5 Tuber. Jalap. pulverat. 0.5
 右混和爲丸二十粒 M. f. pil. No. XX.
 , 每服二三粒。 S. 1 mal 2—3 Pillen.
 主治 便閉, 頑固便閉。

第 66 方

大黃末 Rhizon. Rhei pulverat.
 煨製鐵 各 5.0 Magn ust. āā 5.0
 重碳酸鈉 Natr bicarbonic.
 乳 糖 各 20.0 Sacchar. lact. āā 20.0
 右混和盛以小盒, M. f. pulv. D. ad scatul.
 一日三回, 一回一 S. 3 mal tgl. 1 Teelöffel.
 茶匙。
 主治 便閉, 常習便閉。

第 67 方

水製大黃酊 Tinct. Rhei aquosi
 茴香水 各 30.0 Aq. Foeniculi āā 30.0
 右混和每時一食匙。M. D. S. Stündl. 1 Essl-
 öffel.
 主治 各種便閉。
 說明 本方可伍下列諸藥。

1. 芳香酊 Tinct. aromatic. 一回量 1.0—3.0
2. 苦酊 Tinct. amar. 一回量 0.5—2.0
3. 雷瑣辛 Resorin. 一回量 0.2—0.5—1.5

第 68 方

鹽大黃散 Pulv. Magn. Cum Rheo
 (小兒散) 0.5—1.0 (Pulv. infanti) 0.5—1.0
 右爲一包，給同量 f. pulv. D. tal. dos.
 十包，一日數回， No. X. S. Mehrm. tgl
 一回一包。 1 Pulver.

主治 胃酸過多症兼便秘。

說明 本劑由碳酸鎂 10.0 大黃末 3.0 茴香油
糖 7.0 混和製成。

第 69 方

番瀉葉煎劑 4.0:90.0 Decoct Fcl. Sennae
 4.0:90.0
 糖 漿 加至 100.0 Sirup. simpl. ad 100.0
 右一日量，三回分 S. 3 mal in Tage z. n.
 服。

主治 宿便症。

說明 本方可添加硫酸鎂用之，腸炎時忌用瀉
葉。

第 70 方

番瀉葉末 Fol. Sennae pulverat.
 精製硫黃 各 1.0—1.5 Sulfur depurat. āā 1.—1.5
 右混和均分三包， M. f. pulv. div. in
 一日三回，一回一 part. aeq. No. 3
 包。 S. 3 mal tgl 1 Pulver.

主治 痔疾(緩下劑)

說明 本方可添加煨製鐵，精製酒石等用之。

第 71 方

番瀉葉糖漿 Sirup. Sennae
 甘露糖漿 各 20.0 Sirup. Mannae āā 20.0
 右混和每小時服一 M. D. S. 1 Teelöffel
 茶匙。 stündl.
 主治 小兒便閉。

第 72 方

蘆 薈 5.0 Aloe 5.0
 藥喇叭皂 3.0 Sap. jalapin. 3.0
 酒 精 適宜 Spirit. q.s.
 右為五十丸，一回 M. f. pil. No. L
 三乃至五粒。 S. 1 mal 3—5 Pillen.
 主治 各種便閉。
 說明 蘆薈作用於大腸下部，兼有通經之效，
 故於痔疾，腸炎，月經時為禁忌。

第 73 方

蘆 薈 浸 膏 Extract. Aloes
 大 黃 浸 膏 各 5.0 Extract. Rhei āā 5.0
 顛 茄 浸 膏 0.1 Extract. Belladonn. 0.1
 甘 草 末 及 羔 各 適 宜 Pulv. et Succ. Liquirit. āā q.s.
 右為丸五十粒，朝 ut f pil. No. L
 夕各服一粒。 S. Morgens u. abends 1
 Pillen
 主治 弛緩性便閉。

第 74 方

波希鼠李流膏 3.0 Extract. Cascar. sagrad.
 fluid. 3.0

橙皮糖漿 10.0 Sirup. Cort. Aurant. 10.0

水 加至 100.0 Aq. destill. ad 100.0

右一日量三回分服。D. S. 3 mal in 1 Tage z. n.

主治 常習便閉。

說明 藥房賣出之糖衣波希鼠李流膏錠一片中
含本流膏0.13故大人可服!—10片一回。

本方可添加大黃酊，稀鹽酸等用之。

第 75 方

伊斯替集錠 Istizip-Pastillen.

右就床前服 1/2— D. S. 1/2—2 Ständl. vor

2 片。 dem Schlafengehen.

主治 各種便閉。

說明 本品見效須在 10—12 時間後。

第 76 方

硫酸鎂 5.0—15.0 Magn. sulfuric. 5.0—15.0

水 100.0 Aq. destill. 100.0

右一日三回分服。 D. S. 3 mal in 1 Tage z. n.

主治 常習便閉，宿便，黃疸症，小兒赤痢，
疫痢。

說明 本方宜於空服時服，調製之法宜加少量
稀鹽酸，則易使溶解。

硫酸鈉 Natrium sulfuricum (芒硝)、
亦用爲下劑，一回 15.0—30.0 溶於多量
水中空腹內服，鉛，石炭酸中毒，尤好用
之。

本方可伍下列諸藥。

1. 稀鹽酸 Acid. hydrochloric. dil. 一回量

0.2—0.5

2. 苦酞 Tinct. amar. 一回量 0.5—2.0
3. 薄荷水 Aq. Menthae. 一回量 3.0—5.0
4. 杏仁水 Aq. Lauro-Ceras. 一回量 0.5—1.0—1.5
5. 柳酸鈉 Natr. salicylic. 一回量 0.5—1.0—2.0
6. 重碳酸鈉 Natr bicarbonic. 一回量 0.5—2.0
7. 烏羅脫羅品 Urotropin. 一回量 0.5—1.0
8. 康吡箭毒酞 Tinct. Strophant. 一回量 2—10 滴
9. 重酒石酸鉀 Kal. bitartaric. (Tartar. dep.) 下劑一回量 3.0—5.0
10. 番木鱉酞 Tinct. Strychn. 一回量 5—20 滴
11. 番毛地黃劑 Digitalis Praeparate.
12. 安替必林 Antipyrin. 一回量 0.3—0.5—1.0
13. 溴化鉀 Kal. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
14. 溴化鈉 Natr. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
15. 醋酸鉀液 Liq. kal. acetic. 一回量 2.0—10.0

第 77 方

人工加爾
斯泉鹽

5.0—15.0 Sal. Carol. factit. 5.0—15.0

餾 水 10.0 Aq. destill. 100.0

右一日三回分服。 D. S. 3 mal in 1 Tage z. n.

主治 與前方同。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 苦酞 Tinc. amar. 一回量 0.5—2.0
2. 大黃酞 Tinct. Rhei. 一回量 2.0—4.0
3. 番木鱘酞 Tinct. Strychn. 一回量 5—2.0
滴
4. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 一回量 0.5 2.0
5. 莨菪酞 Tinct. Scopol. 一回量 0.5—1.0

第 78 方

重酒石酸鉀 15.0 Kal. bitartaric. 15.0

苦 酞 1.0 Tinct. amar. 1.0

糖 漿 10.0 Sirup. simpl. 10.0

餾 水 加至 100.0 Aq. destill. ad 100.0

右一日量三回分服。 D. S. 3 mal in 1 Tage z. n.

說明 本方有緩下，利尿，清涼，止血之效，
并可伍下列諸藥。

1. 醋酸鉀液 Liq. kal. ace. 一回量 2.0—10.0
2. 番毛地黃劑 Digitalis-Praeparate.
3. 康吡箭毒酞 Tinct. Strophanth. 一回量 2—
10 滴

第 79 方

煨製礬 1.0-2.0-5.0 Magn. ust. 1.0 2.0-5.0

右爲散均分三包， f. pulv. div. in part.

一日三回，一回一 aep. No. III.

包。 S. 3mal tgl. 1 Pulver.

主治 便閉，胃酸過多，酸中毒，砒中毒，重金屬中毒。

說明 本品爲下劑用量一回 1.0—5.0，制酸用量一回 0.2，乃至 0.5，解毒用量亦須大，並和多量水爲煨製藥乳。

本方可伍下列諸藥。

1. 薄荷油糖 *Elaeosacchar. Menth.* 一回量 0.5—2.0
2. 大黃末 *Pulv. Rhei.* 下劑一回量 0.5—2.0，健胃劑 0.1—0.3
3. 莨菪浸膏 *Extract. Scopol.* 一回量 0.02—0.05
4. 澱粉酶 *Diastase.* 一回量 0.1—0.3
5. 番哥耳 *Fagol.* 一回量 0.2—0.5

第 80 方

甘 末	0.2	<i>Calomel.</i>	0.2
乳 糖	0.3	<i>Sacchar. lact.</i>	0.3

右混和給同量四包 *M. f. pulv. D. tal. dos.*
 每二時間服一包，*No. 4 S. 2 stündl. 1 Pul-*
 見效止。 *ver bis Wirkung*

主治 各種便閉。

說明 本方可伍藥喇叭根末用之。

第 81 方

二困駢困酸酞	<i>Phenolphthalein.</i>
(=普耳該) 0.1-0.3	(=Purgen) 0.1—0.3

右混和給等量四包 *f. pulv. D. tal. dos. No. 4*
 一日二回，朝夕 *S. 2 mal morgens u.*

各一包。 abends 1 Pulver.

主治 各種便閉，尤宜於小兒，老人，妊婦，及平臥病人之便閉。

說明 普耳該為緩下劑，有製成丸錠販賣，現行之拉克沙安兒 Laxatol 為其誘導體，作用相同，惟用量須倍之。

第 82 方

甘 油 Glycerin
常 水 各 5.0 Aq. fontan. āā 5.0

右混和灌腸。 M. D. S. Zur Klystieren

主治 宿便症。

第 83 方

• 甘油藥栓(坐藥) 5 個 Suppos. Glycerin. V.

右遇必要時一個插 S. Bei Bedarf 1 Zäpfchen.

入。

主治 各種便閉。

第 84 方

藥肥皂末 5.0 Pulv. Sapon. medicat. 5.0

常 水 300.0 Aq. fontan. 300.0

右混和灌腸。 M. D. S. Zur Klystieren.

主治 宿便症。

說明 本劑配製法，先加甘油少量於皂末內，拌和之後，再加微溫湯，則得平等溶解之藥皂液矣。

通利灌腸肥皂液，除藥用肥皂外，亦可用鉀肥皂 Sapo. kalini (0.5—1%)，或普通肥皂製之。

第 85 方

鎂 乳 30.0 Milk of Magnesia 30.0

空腹頓服。 S. Auf. 1 mal z. n.

主治 各種便秘。

說明 本品藥性甚為平和，惟奏效較緩。

第 86 方

阿 加 路 30.0 Agarol 30.0

空腹頓服。 S. Auf. 1 mal z. n.

主治 各種便秘。

說明 本品藥性甚為平和，惟奏效較緩。

第 87 方

流動石蠟 15.0—20.0 Liq Paraffin 15.0—20.0

頓服。 S. Auf. 1 mal z. n.

主治 宿便症。

說明 本品奏效確實。

第七章 止瀉劑 Antidiarrhoeica.

第 88 方

阿片末	0.1 Pulv. Opii	0.1
乳糖	2.0 Sacchar. lact	2.0

右混和均分三包， M. f. pu v. in part.
 一日三回，一回一 aeq. No. III. S. 3mal
 包。 tgl 1 Pulver.

主治 各種下痢症，對於腸蠕動亢進，其效尤著。

說明 凡用止痢劑，須先以下劑排除腸內蓄積，於熱性痢疾，尤宜注意此點。

本方可添加鞣酸蛋白 Albumin, tannic. 2.0 或鞣酸 Acid. tannic 0.1 用之。

第 89 方

阿片酊	1.0 Tinct. Opii	1.0
鑷水	100.0 Aq. destill.	100.0

右一日量，三回分 D. S. 3mal in 1 Tage
 服。 z. n.

主治 各種下痢症。

說明 阿片酊大都添加於第 1 方，第 22 方第 24 方中用之。

第 90 方

阿片酊	2.0 Tinct. Opii	2.0
桂皮水	50.0 Aq. Cinnamom.	50.0
沙雷灌漿	100.0 Mucilag. Salep.	100.0

右混和每一二時間 M. D. S. 1-2 stündl.

服一食匙。 1 Esslöffel.

主治 腸卡答耳下痢。

第 91 方

霍亂滴水 Choleratropfen.
 阿片酊 5.0 Tinct. Opii 5.0
 含鐵續草酊 10.0 Tinct. Valerian. aether.
 10.0

薄荷油 3 滴 Ol. Menth. Gtt III.

右混和，必要時取 M. D. S. 10-20 Tropfen

10-20 滴和水服。 nach Bedarf in Wasser z. n.

主治 各種下痢症。

說明 本劑功效與一般止瀉水同。

第 92 方

阿片浸膏 Extract. Opii
 番木鱉浸膏 各 0.2 Extract. Strychn. āā 0.0
 古倫僕浸膏 0.2 Extract. Colombo. 2.2
 甘草末及羔 適量 Pulv. et Succ. Liquirit.
 q. s.

右混和爲丸二十粒 ut f. pil. No. 20. comsp.

，以石松子末爲衣， Lycopod. S. 2 mal tgl.

一日二回，一回一 1 Pillen.

粒。

主治 腸炎下痢。

第 93 方

阿片吐根散 Pulv. Ipecacuanh. Opiat.
 (=杜氏散) 1.0—1.5 (=Pulv. Doveri) 1.0—1.5
 乳 糖 2.0 Sacchar. lact. 2.0

右混和均分三包， M. f. pulv. div. in part.
 一日三回，一回一 aeq. No. 3 S. 3mal tgl.
 包。 1 Pulver.

主治 與前方同。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 次硝酸泌 Bismut. subnitric. 一回量 0.5—1.0—1.5
2. 坦那耳彬 Tannalbin. 一回量 0.5—1.0—2.0
3. 古倫僕末 Pulv. Colombo. 一回量 0.5—2.0
4. 甘汞 Calomel. 一回量 0.2—0.5—1.0
5. 安替必林 Antipyrin. 一回量 0.3—0.5—1.0

第 94 方

次硝酸鐵	2.0	Bismut. subnitric.	2.0
乳 糖	1.5	Sacchar. lact.	1.5

右混和均分三包， M. f. pulv. div. in
 一日三回，一回一 part. aeq. No. 3
 包。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 各種下痢症。

說明 鐵製劑除次硝酸鐵外，次柳酸鐵 Bismut. subsalicyl. 次沒食子酸鐵 Bismut. subgallic. (即代耳馬妥耳 Dermatol) 鐵蛋白 Bismutose 等均可為同樣之處方，鐵蛋白尤適於小兒。

本方可伍下列諸藥。

1. 重碳酸鈉 *Natr. bicarbonic.* 一回量 0.5—2.0
2. 煨製礬 *Magn. ust.* 一回量 0.2—1.0
3. 歐龍胆末 *Pulv. Gentian.* 一回量 0.2—1.0
4. 澱粉酶 *Diastase.* 一回量 0.1—0.3
5. 胃蛋白酶 *Pepsin.* 一回量 0.2—0.5
6. 表飛鳴 *Biofermin.* 一回量 0.3—0.5
7. 披奧該寧 *Biogenin.* 一回量 0.3—0.5
8. 阿片末 *Pulv. Opii* 一回量 0.01—0.1
9. 莨菪浸膏 *Extract. Scopol.* 一回量 0.02—0.05
10. 坦那耳彬 *Tannalbin.* 一回量 0.5—1.0—2.0
11. 杜氏散 *Pulv. Doveri.* 一回量 0.2—0.4—1.0
12. 鹽酸嗎啡 *Morphin. muriat.*
一回量 0.001—0.005—0.03
13. 鹽酸海洛因 *Heroin. hydrochloric.*
一回量 0.002—0.05
14. 磷酸可待因 *Codein. phosphoric.*
一回量 0.005—0.05
15. 薩羅耳 *Salol.* 一回量 0.3—0.5—1.0
16. 古倫僕末 *Pulv. Colomb.* 一回量 0.5—2.0
17. 安替必林 *Antipyrin.* 一回量 0.5—1.0—2.0

18. 阿司必林 Aspirin. --回量 0.5—1.0

19. 番哥耳 Fagol. 一回量 0.2—0.5

第 95 方

硝酸銀	0.02	Argent. nitric.	0.02
餾水	60.0	Aq. destill.	60.0

右爲灌腸料。 S. Als Klysma

主治 大腸卡答耳，赤痢。

第 96 方

鞣酸	0.15	Acid. tannic	0.15
阿片末	0.06	Pulv. Opii	0.06
乳糖	2.0	Sacchar. lact.	2.0

右混和均分三包， M. f. pulv. div. in part.

一日三回，一回一 aeq. No. 3 S. 3 mal tgl.

包。 Pulver.

主治 各種下痢症。

說明 鞣酸功效，內服不如以其 0.5—2% 溶液 200.0 灌腸，此時可加阿片酞 7—8 滴，至內服用鞣酸化合物可也。

第 97 方

鞣酸蛋白		Albumin. tannic.	
(=坦那耳彬)	1.5—3.0	(=Tannalbin)	1.5—3.0
白糖	2.0	Sacchar. lact.	2.0

右混和均分三包， M. f. pulv. div. in part.

一日三回，一回一 aeq. No. 3 S. 3mel tgl. 1

包。 Pulver.

主治 各種下痢症。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 次硝酸錫 Bismut. subnitric. 一回量 0.5—1.0—1.5
2. 阿片末 Pulv. Opii 一回量 0.01—0.1
3. 阿司必林 Aspirin. 一回量 0.5—1.0
4. 安替必林 Antipyrin. 一回量 0.3—0.5—1.5
5. 代馬安耳 Dermatol. 一回量 0.3—1.0
6. 薩羅耳 Salol 一回量 0.5—1.0—2.0
7. 番哥耳 Fagol. 一回量 0.2—0.5
8. 莨菪浸膏 Extract. Scopol. 一回量 0.02—0.05

第 98 方

古倫僕
根煎劑

15.0:180.0 Decoct. Rad. Colombs

15.0:180.0

阿片酊 1.5 Tinct. Opii 1.5

藥蜀葵糖漿 加至 200.0 Sirup. Althaeae ad 200.0

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.

一回一食匙。 1 Esslöffel

主治 慢及腸卡答耳下痢。

第 99 方

白陶土 10.0—15.0 Bol. alb. 10.0—15.0

右給等量六包，一 D. tal. dos. No. 6

日三回一回一包， S. 3 mal tgl. 1 Pulver in

食前和水服。 Wasser vor dem Essen.

主治 夏期下痢，自家中毒，各種中毒，疫痢，赤痢，霍亂。

第 100 方

骨炭末	5.0	Carbo oss. pulverat.	5.0
白陶土	10.0	Bol. alb.	10.0
餾水	100.0	Aq. destill.	100.0

右混和灌腸。 M. D. S. Zu klystieren.

主治 與前方同。

第 101 方

血炭	Carbo Sanquin.
(或獸炭)	10.0—20.0 (S. Carbo Animal)
	10.0—20.0

右給等量五包，一 D. tal. dos. No. V.

日一包，晨空腹時 S. 1 mal tgl. 1 Pulver in
和水服。 Wasser morgens niichtern

主治 與前方同。

第 102 方

砒炭銀片	6—9 片	Agsicol tab.	6—9 片
------	-------	--------------	-------

一日三次，每次二 S. 3 mal tgl. 2—3 stück
片。

主治 與前方同。

說明 本品係白陶土，獸炭及硝酸銀之合劑。

第八章 治痢劑 Anti Dysentery

第 103 方

磺胺脒	12.0	Sulfaguanidine	12.0
重曹	12.0	Natr. Bicarb.	12.0

服法口授。 S. As ordered

主治 桿菌痢疾。

說明 第一次服 4.0，以後每隔四小時服 1.5，日夜連服，不可間斷。服藥期間多飲開水，忌鹽類瀉劑，蛋，鹹魚，肉，豆類及不易消化食物。

第 104 方

琥珀磺鹽 吡嗪	12.0	Sulfasuxidine	12.0
重曹	12.0	Natr. Bicarb.	12.0

服法口授。 S. As ordered

主治 桿菌痢疾。

說明 第一次服 4.0，以後每隔四小時服 1.5，日夜連服，不可間斷。服藥期間注意點與上同。本品為治桿菌痢之最佳者。

第 105 方

磺胺噻唑	7.0	Sulfathiazole	7.0
重曹	7.0	Natr. Bicarb.	7.0

服法口授。 S. As ordered

主治 桿菌痢疾，各種腸道外傳染之腹瀉，腸炎等。

說明 第一次服 2.0，以後每隔三小時服 1.0

，日夜連服，不可間斷。服藥期間注意點與上同。

其他尚有 Sulfadiazine, Sulfanilamide, Sulfapyridine 等均堪應用。

上列數方可伍下列諸藥：

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Ex. Scopolia | 莨菪浸膏 |
| 2. Bismut subnitrat. | 次硝酸銻 |
| 3. Tannalbin | 鞣酸蛋白 |
| 4. Carb. Animal | 骨炭末 |
| 5. Kaolin | 白陶土 |
| 6. Biofermin | 表飛鳴 |
| 7. Dover's Pulv. | 陀氏散 |
| 8. Dermatal | 代馬吐爾 |
| 9. Salol | 薩羅爾 |
| 10. Vitamin B. | 維他命 B. |
| 11. Gentiana Pulv. | 龍胆末 |
| 12. Resorein | 雷瑣辛 |
| 13. Diastase | 澱粉酶 |
| 14. Pepsn saech | 食糖胃蛋白酶 |
| 15. Euchinine | 無味奎寧 |
| 16. Agsicol | 矽炭銀 |

第 106 方

藥特靈丸 3—6 粒 Yatren Pill No. 3—6.
 一日三次，每次一 S. 3 mal tgl. 1 Pill.
 至二粒。

主治 急慢性阿米巴痢疾及其併發症。

說明 本品第一日每次服一粒，第二日起每次

服二粒，連服一星期，可以根治。小兒及泄瀉甚劇者，可用其散劑，劑量可比照丸藥之份量，丸劑每粒含藥特靈 0.25gm.。同類製劑尚有Quinolidine, Amebacidie, Quinoxyl, Mixiod, Andysen 等。

第 107 方

雷佛奴兒 0.05 Rivanol 0.05

與六包，一日三次 S. 3 mal tgl 1 Pulv.

，二日分服。

主治 傳染性泄瀉。

說明 本品可伍下列諸藥：

- | | |
|-------------------|------|
| 1. Tannalbin | 鞣酸蛋白 |
| 2. Bismuth subnit | 次蒼 |
| 3. Carb. Animal | 骨炭末 |
| 4. Agsicol | 矽炭銀 |
| 5. Salol | 沙羅兒 |
| 6. Dover's. Pulv. | 陀氏散 |
| 7. Diastase | 澱粉酶 |
| 8. Kaolin | 白陶土 |
| 9. Biofermin | 表飛鳴 |
| 10. Ex. Scopolia | 莨菪膏 |

第 108 方

慰歐仿 0.75 Vioform 0.75

一日三次分服。 S. 3×1

主治 阿米巴痢疾。

說明 本品亦係澳製劑，含碘 37.5—41.5%。

功效與藥特靈彷彿，上項劑量須連服十日，對於肝病病人，用時應加注意。

第 109 方

硫酸鈉	20.0 Sod. Sulph.	20.0
荳蔻酊	3.0 Tr. Cardamon	3.0
餾水	加至 100.0 Aq. ad	100.0

一日三次分服。 S. 3 mal tgl. 1 Esslöffel

主治 急慢性痢疾及泄瀉。

說明 此方對於腸內有炎症者，可用以減輕其炎症，兼有輕瀉作用。但對於後期病例之有脫水現象者忌用。硫酸鈉調硫酸鎂，其功效亦彷彿。此方可伍下列諸藥：

- | | |
|--------------------|------|
| 1. Tct. Digitalis | 毛地黃酊 |
| 2. Digalen | 狄加令 |
| 3. Digifomin | 狄吉福民 |
| 4. Tct. Belladonna | 顛茄酊 |
| 5. Tct. Strychnine | 番木必酊 |
| 6. Tct. Amarae | 苦味酊 |

第 110 方

甘汞	0.1 Calomel	0.1
陀氏散	1.2 Pulv. Doveri	1.2

分爲六包，二日量。 S. Div. No. 6. 3×2

主治 腸炎，各種泄瀉。

說明 兩藥均用小量，俾甘汞得在腸內停留相當時間，以奏消毒之效。服數日後用一劑硫酸鈉以消除之爲妥。

第 111 方

斯砒螺刺脫片 3 粒 Spirocid tab. No. 3

每次一粒。 S. 3×1

主治 阿米巴痢疾。

說明 本品係一種砒製劑，連服四日，後應停服四日，不按規定，往往有不良反應。同樣製劑有 Stovarsol 等。

【注射劑】

1. Emetine Hcl. (鹽酸依米汀)：專治阿米巴痢疾，每日用 0.03 者二支，或 0.05 者一支，連用一星期左右，可與內服藥特靈或其他藥合併治療。
2. Solu-Thiazon (聖露消治龍) 或 Sulthia (史太安) 或其他類似製劑：專治細菌性痢疾，每日用其 5% 溶液 5—10c.c. 同時內服 Sulfathiazole。
3. Sulfquanidine 及 Sulfasuxidine 之鈉鹽溶液，每日用其 5% 溶液 5—15c.c. 肌肉注射，同時內服其散劑，急性病例償用之。

第九章 驅虫劑 Antihelmithica

第 112 方

蛔 蒿 素 (山道年)	0.02—0.05	Satonin.	0.02—0.05
甘 汞	0.01—0.03	Calomel	0.01—0.03
白 糖	0.5	Sacchar. alb.	0.5

右混和爲一包，給 M. f. pul. D. tal. dos.
 同量五包，朝夕各 No. V. S. Morgens u.
 一包。 abends 1 Pulver.

主治 蛔虫。

說明 本方之甘汞，可以大黃，藥喇叭末代
 用，但不可用蓖麻子油，因山道年易溶於
 油，被吸收而起中毒也，服用亦以食後爲
 宜。

第 113 方

海人草煎劑 5.0:100.0 Decoct. Digeni simplic.
 5.0:100.0

右一回服或三回分 D. S. 1 mal S. 3 mal.
 服。 z. n.

主治 蛔虫。

說明 海人草亦名鷓鴣菜，有驅除蛔虫之效，
 作用比山道年和緩副作用亦微，其製劑名
 滅疳寧 Macnin 有粉液錠糖四種。本方
 可添加番瀉葉 Fol. Sennae 4.0 合煎用
 之。

第 114 方

海人草素 1.0—2.0 Digenin 1.0—2.0

鹽 水 10.0—20.0 Aq. destill. 10.0—20.0
 糖 漿 5.0 Sirup. simpl. 5.0
 右一回服用。 D. S. Auf. 1 mal Z. N.

主治 蛔虫。

第 115 方

立麝香草腦 2.0—3.0 Thymol. 2.0—3.0
 亞拉伯樹膠末 2.5 Pulv. Gum. arab. 0.5
 右混和給等量十包 M. f. pulv. D. tal. dos.
 ，一日 2—4 回， No. X. S. 2—4 mal tgl.
 一回一包，飯前少 kurz vor der Mahlzeit in
 刻用澱粉紙包服。 Oblaten z. n.

主治 十二指腸虫。

第 116 方

美上荊芥油 Ol. Chenopodii
 (=內馬安兒)10-15滴 (=Nematol) Gtt. X-XV.
 右爲膠囊劑，三五 D. ad capsul ge.atin.
 粒一回頓服，經二 No. III—V. S. Auf 1
 三時間後投下劑蓖 mal nach einigen Stunden
 麻子油。 Ol. Ricin. z. n.

主治 十二指腸蛔虫，蛔蟲。

說明 本品亦可加多量白糖爲散劑用之。服本
 劑後忌酒精飲料，如用量過大，起中毒發
 重聽等症狀。

第 117 方

綿馬(羊 6.0-8.0-10.0 Extract. Filicis.
 齒)浸膏 6.0—8.0—10.0

右於早晨空腹半時 D. Z. Morgens nüchtern

間內，分數回和咖啡服完，)經二時間後服下劑以瀉之)。
 innerhalb $\frac{1}{2}$ Std. in einige mal in Kaffe z. n. (2 Std. danach Lansas)

主治 蟯虫。

說明 本方亦可分盛8—10個膠囊服用，或加甘草末爲丸六粒，五分時服一粒。下劑以番瀉葉浸劑加硫酸錳爲佳，忌蓖麻子油。

綿馬中毒主爲失明，間有發痙攣而死者，此大抵見於貧血病人，故使用前，宜檢查其體格營養，心臟狀態，而加以注意，凡高年，衰弱，貧血，妊娠，胃潰瘍等病人，勿用爲宜。

第 118 方

綿馬浸膏	Extract. Filicis
羅望子	Pulpa Tamarind.
番瀉葉	各 8.0 Fal. Sennae pulverat.
	aa 8.0

右混和爲散劑，分爲二份晨一時間以內服完。
 ut f. electura div. in part. aeq. No. II. D. S. Morgens inner. halb 1 Std. z. n.

主治 蟯虫。

第 119 方

綿馬素油	10.0 Filmaronöl	10.0
右晨空腹時頓服。	S. Morgens Nüchtern Auf	1 mal z. n.

主治 蟯虫。

說明 本品間綿馬抽出之有效成分，與蓖麻子

油配合製成，每瓶十克，適為一服量，應用之時，以服用後經一時間再服蓖麻子油 20.0 為佳。

第 120 方

加麻刺	3.0	Kamala	3.0
羅望子		Pulp. Tamarind.	
糖漿	各 5.0	Sirup. Simpl.	āā 5.0

右混和為祇劑，晨
空腹一時間內服完
。

ut f. electura.
S. Morgens Nüchtern
innerhalb. 1 Stund z. n.

主治 蟯虫。

說明 加麻刺作用較綿馬緩和，故適用於小兒，婦人，虛弱者，用量大人 6.0—8.0—12.0 小兒 1.0—3.0

第 121 方

李托蘭錠	20 片	Putolan (Bayer)	20 Tabl.
------	------	-----------------	----------

右一日三回，一回 D. S. 3 mal tgl 1 Tabletten
一片，服一星期間。1 Woche lang

主治 一般腸寄生虫，用於蟯虫尤佳。

說明 服一星期左右時日，乃投下劑如蓖麻子油，倘未根治，停一星期再依法服用。

第 122 方

醋(食醋，常醋)	30.0	Acetum	30.0
餾水	100.0	Aq. destill.	100.0

右為灌腸料。 S. Als klysınna

主治 蟯虫。

說明 醋為淡黃色透明液，含有 3—5% 純醋

酸。

第 123 方

肝油	50.0	Ol. Jecoris Aselli	50.0
餾水	120.0	Aq. destill.	120.0

右爲灌腸料。 S. Als Klyisma

主治 蟯虫。

說明 蟯虫用灌腸劑除上兩方外，可用 0.5—1.0% 鹽酸奎寧水或 0.2—0.5%，鞣酸水，肛門部用灰白軟膏搽布。

那弗他林 Naphthalin. 亦爲蠅虫驅除劑一。

第 124 方

赫昔雷鎖辛	0.5	Hexylresorcinol	0.5
-------	-----	-----------------	-----

一次吞服。 S. one dose

主治 蠅虫病。

說明 上方爲五歲小兒之用量，通常其用量爲每歲 0.1，最大劑量應以 1 公分爲限。服藥前 48—24 小時，宜食流質食物，用藥前 12 小時，勿進任何食物，此藥一次服完，以開水吞下，勿使嚼碎，因嚼碎後能損害食道粘膜及使局部麻醉。服藥後五小時內，勿進任何食物，惟可自由飲水，五小時後可進流質食物，服藥 24 小時後服硫酸鎂一劑。

第 125 方

四氯化炭 *ic.c.* Carbon Tetrachloride *ic.c.*
 裝入膠囊，一次吞 S. one dose in oblet

服。

主治 鉤虫病，薑片虫。

說明 四氯化炭劑量為每歲 0.13 公撮，最大劑量不得超過 2 公撮。

用法 第一日下午四時服硫酸鎂一劑，晚餐少食，且以流質為宜，第二日免進早餐，晨七時服藥，十時服硫酸鎂一劑，俟大便通後，可進流質澱粉類食物。在治療期數日內，切勿食油類，酒類及肉類等物品。如有不良反應，可靜脈注入葡萄糖酸鈣 (Calcium Gluconate)。有肝病者忌用此藥。

第 126 方

四氯二烯 1.0 Tetrachlorethylene 1.0
裝入膠囊，一次服 S. one dose in oblet
下。

主治 鉤虫病。

說明 此藥每歲用 0.2 公撮，最大劑量不得超過三公撮。若患者年幼，膠囊不能吞下，可將藥混合白糖同服。其用法與注意各點與四氯化炭同。

第 127 方

鞣酸石榴素 0.1 Pelletierinae tannate 0.0
一次服下。 S. one dose

主治 條虫病。

說明 此藥能致眩暈，眼花，疲倦，頭痛，甚或痙攣及麻痺等症狀。

用法 第一日免進午膳及晚膳，惟可飲水或茶

，晚六時服硫酸鎂一劑，大便通後，服藥。過兩小時後，服硫酸鎂一劑，必要時灌腸（鹼灌腸）。

劑量為歲 0.03 公分，最大劑量不得超過 0.3 公分。

第 128 方

乙駢困導 1.0 Naphtholum 1.0

服法口授。 As ordered

主治 薑片虫。

說明 劑量為五歲以下 0.8—1.5 公分，六歲以上為 2.5—4.0 公分。分三次服，每隔半小時一次。

用法 第一日早，午餐少，晚餐免食，並服硫酸鎂一劑，第二日不進早餐，開始服藥，三包服完後，隔二小時，服硫酸鎂一劑，以後可以漸次進食，服藥數日內忌食油類。

第十章 滋養灌腸劑

Clysmata nutrientia

第 129 方

牛 乳	200.0	Lact vaccin.	200.0
卵 黃	2 個	Vitell Ov.	II
食 鹽	2.0	Natr. chlorat.	2.0

右混和爲一回灌腸料。 M. D. S. Zur 1 Klystier.

說明 滋養灌腸之先，宜行清潔灌腸，以排積便。

本方爲普通滋養灌腸劑，合計熱量有，230 卡羅里，用時須微溫，日可二回，但不可逾三回。

本方可添加葡萄糖 15.0—20.0 紅酒 15.0 阿片酞 7—8 滴及澱粉 5.0 用之，乳兒勿加阿片酞。

第 130 方

鮑阿司氏滋養灌腸劑	Clysmata nutrient. n. Boas.		
牛 乳	250.0	Lact. vaccin.	250.0
卵 黃	2 個	Visell. Ov.	II
紅(葡萄)酒	15.0	Vin. rubr.	15.0
澱 粉	5.0	Amyl.	5.0
食 鹽	2.0—3.0	Natr. Chlorat.	2.0—3.0

右混和爲灌腸料。 M. D. S. Zur Klystier.

說明 本劑合計含熱量 300 卡羅里。

第 131 方

郎伊培氏滋養灌腸劑 <i>Clysmata nutrient. n. Leube.</i>			
牛 乳	300.0	<i>Lact. vaccin.</i>	300.0
配 液 頓	60.0	<i>Peptpn.</i>	60.0
右混和灌腸。 <i>M. D. S. Zu klystieren.</i>			
說明 本劑尋常多用之，含有熱量 300—450 卡羅里。			

第 132 方

郎伊培氏滋養灌腸劑 <i>Clysmata Nutrient. N. Leube.</i>			
牛 乳	800.0	<i>Lact. vaacin.</i>	200.0
鷄 卵	3 個	<i>Ov.</i>	III
食 鹽	3.0	<i>Natr. Chlorat.</i>	3.0
澱 粉	40.0	<i>Amyl.</i>	40.0
右混和灌腸。 <i>M. D. S. Zu klystieren.</i>			
說明 本劑含有熱量 550 卡羅里。			

第 133 方

郎伊培氏滋養灌腸劑 <i>Clysmata nutrient. n. Leube</i>			
葡 萄 糖	60.0	<i>Sacchar. Uvae</i>	60.0
牛 乳	250.0	<i>Lact. vaccin.</i>	250.0
右混和灌腸。 <i>M. D. S. Zu klystieren.</i>			

第 134 方

卵 黃	2 個	<i>Vitell. Ov.</i>	II
小 兒 粉 (內斯耳氏)	30.0	<i>Pulv. infant. (Nessl)</i>	30.0
紅 酒	30.0	<i>Vin. rubr.</i>	30.0
生理食鹽水 (0.9%)	250.0	<i>Sol. Natr. Chlorat</i>	

physiolog. (0.9%) 250.0
 右混和灌腸。 M. D. S. Zu klystieren.

第 135 方

曼周氏滋養灌腸劑 Clysivata nutrient. n.
 Mathieu.

卵 黃	1 個	Vitell. Ov.	1
食 鹽	2.0	Natr. Chlorat.	2.0
水	200.0	Aq.	200.0
阿 片 酊	5—10 滴	Tinct. Opii	Gtt 5—10

右混和灌腸。 M. D. S. Zu klystieren.

說明 本方視病人之狀態，卵黃可增為二個，
 水之半量可代以牛乳，且可加糊精 Dextrin 10.0—20.0。

第 136 方

糊 精	100.0	Dextrin.	100.0
醇(酒精)	9.0	Alkohol.	9.0
食 鹽	2.5	Natr. Chlorat.	2.5
水	300.0	Aq.	300.0

右混和灌腸。 M. D. S. Zu klystieren.

第 137 方

糊 精	150.0	Dextrin	150.0
醇	30.0	Alkohol	30.0
食 鹽	7.0	Natr. Chlorat.	7.0
水	1000.0	Aq.	1000.0

右混和為點滴灌腸 M. D. S. Zur Tropfklystier.
 料。

第十一章 胃及腸洗灌劑

Mitteln fuer Magen und Darmspuelung.

第 138 方

硼	酸	5.0—10.0	Acid. boric.	5.0—10.0
水		500.0	Aq.	500.0

右爲胃洗灌料。 S. Zur Magenspüfung.

主治 胃擴張，胃異常發酵。

第 139 方

柳	酸	0.5—1.0	Acid. salicylic.	0.5—1.0
水		500.0	Aq.	500.0

右爲胃洗灌料。 S. Zur Magenspüfung.

主治 胃擴張，胃慢性卡答耳，大腸慢性卡答耳。

第 140 方

重	炭	酸	鈉	10.0	Natr. bicarbonic.	10.0
水				500.0	Aq.	500.0

右爲胃洗灌料。 S. Zur Magenspüfung.

主治 胃酸過多症。

第 141 方

過	錳	酸	鉀	1.0	Kal. permanganic.	1.0
水				1000.0	Aq.	1000.0

右爲胃洗灌料。 S. Zur Magenspüfung.

主治 嗎啡，阿片，磷，鎘，鎘酸化合物，等中毒時用之。

第 142 方

鞣	酸	1.0—2.5	Acid. tannic.	1.0—2.5
---	---	---------	---------------	---------

水	500.0 Aq.	500.0
---	-----------	-------

右爲胃或腸洗滌料。S. Zur Magen od.
Darmspülung

主治 大腸卡答耳，赤痢諸症。

第 143 方

重碳酸鈉	10.0 Nat. bicarbonic.	10.0
食鹽	8.0 Natr. Chlorat.	8.0
水	1000.0 Aq.	1000.0

右爲腸洗滌料。S. Zur Darmspülung.

主治 大腸卡答耳，赤痢，疫痢諸症。

說明 腸洗滌料，除上列兩方外，下列諸藥亦
多用之。

- a. 明礬 Alumen 0.2% 溶液。
- b. 坦那耳彬 Tannalcin 0.5% 溶液，用
時振盪之。
- c. 硝酸銀 Argent. nitric. 0.1—0.2%
溶液。
- d. 沙雷潑漿 Mucilag. Salep. 1% 溶
液。
- e. 硼酸 Acid. boric 2% 溶液。
- f. 骨炭末 Carbo oss. pulverat 10% 混
和液，注腸用。

第十二章 祛痰劑 Expectorantia.

第 144 方

吐根浸劑 0.3:90.0 Inf. Rad. Ipecacuanh.
• 0.3:90.0

杏仁水 4.0 Aq. Lauro Ceras. 4.0

糖漿 100.0 Sirup. Simpl. ad 100.0

右一日量，三回分 D. S. 3 mal in 1 Tage

服。 z. n.

主治 支氣管卡答耳，以及其他呼吸道卡答耳。

說明 吐根劑用於乾咳，喀痰粘稠者。作用和緩，故適於老人小兒及衰弱者。而有咯血症，胃腸障礙者忌服。

本方可伍下列諸藥。

1. 磷酸可待因 Codein. phosphoric.
一回量 0.003—0.02—0.03
2. 鹽酸嗎啡 Morphin. muriat.
一回量 0.001—0.003—0.03
3. 鹽酸海洛因 Heroin. hydrochloric.
一回量 0.002—0.003
4. 阿片酊 Tinct. Opii 一回量 5—10—20 滴
5. 阿片安息香酊 Tinct. Opii benzoic.
一回量 20—30 滴
6. 溴化鉀或鈉 Kal. s. Natr. bromat.
一回量 0.5—1.0—2.0
7. 碘化鉀 Kal. jodat. (與嗎啡，杏仁水配合

- 禁忌)一回量 0.1—0.5—1.0
8. 莨菪酊 Tinct. Scopol. 一回量 0.5—1.0
 9. 莨菪浸膏 Eztract. Scopol.
一回量 0.0—0.03
 10. 礪砂(氯化銨) Ammon. Chlorat.
一回量 0.3—1.0
 11. 銨茴香精 Spirit. Ammon. foeniculac.
一回量 0.2—1.0
 12. 銨番茴香液 Liq. Ammon. Anisat.
一回量 5—15 滴
 13. 美遠志劑 Senega-Praeparate.
 14. 歐蜀葵糖漿 Sirup. Althaeae.
一回量 3.0—5.0
 15. 番毛地黃劑 Digitalis-Praeparate.
 16. 安息香酸鈉咖啡英 Caffeino-Natr.
benzoic.

第 145 方

吐根浸劑 0.3:90.0 Inf. Rad. Ipecacuanh.
0.3:90.0

礪 砂 1.5 Ammon. Chlorat. 1.5

美遠志糖漿 加至100.0 Sirup. Senegae ad 100.0

右一日量，三回分 D. S. 3 mal in 1 Tage

服。 z. n.

主治 與前方同。

說明 礪砂能溶解濃痰使稀而易咯出。

第 146 方

吐根浸劑 0.15:40.0 Inf. Rad. Ipecacuanh.

0.15:40.0

溴化鈉	1.0	Natr. bromat.	1.0
莨菪浸膏	0.01	Extract. Scopol.	0.01
歐蜀葵糖漿	加至50.0	Sirp. Althaeae	ad 50.0
右混和一日三四回 M. D. S. 3—7 mal tgl.			
，一回一茶匙。 1 Teelöffel			
主治 六七歲小兒氣管支炎而咳嗽劇烈者。			

第 147 方

吐根末	0.1	Pulv. Rad. Ipecacuant.	0.1
金硫黃	0.1	Stib. sulfurat. aurantiac.	0.1
乳糖	1.5	Sacchar. lact.	1.5
右混和均分三包， M. f. pulv. div. in. part.			
一日三回，一回一 aeq. No. 3 S. 3 mal tgl.			
包。 1 Pulver.			
主治 支氣管炎及其他呼吸器道炎。			
說明 本方亦用於咯痰粘稠，不易咯出者。倘咳嗽劇烈，則添鹽酸嗎啡或海洛因用之可也。			

第 148 方

杜氏散	1.0	Pulv. Dover.	1.0
安替必林	2.0	Antipyrin	2.0
右混和均分三包， M. F. pulv. div. in part.			
一日三回，一回一 aeq. No. 3 S. 3 mal tgl.			
包。 1 Pulver.			
主治 與前方同。			

第 149 方

美遠志浸劑 4.0:90.0 Juf. Rad Senegae 4.0:90.0
 杏仁水 4.0 Aq. Lauro-Ceras. 4.0
 糖漿 加至 100.0 Sirup. simpl. ad 100.0

右一日三回分服。 D. S. 3 mal in 1 Tage z. n.

主治 與前方同。

說明 美遠志根為浸劑外，亦可為煎劑，作用為催起咳嗽及充進氣道粘膜分泌，使痰稀薄易咯出，故為咯血症者忌用，有胃腸障礙者亦然。

本方可伍下列諸藥。

1. 歐茴香精 Spirit. Ammon. faeniculat.
一回量 0.2—1.0
2. 鉍茴茴香液 Liq. Ammon. anisat.
一回量 5—15 滴
3. 櫻樹皮素 Brocin. 一回量 0.3—0.5—1.0
4. 吐根糖漿 Sirup. Ipecacuanh.
一回量 3.0—5.0
5. 歐窺葵糖漿 Sirup. Althaeae.
一回量 3.0—5.0
6. 鹽酸嗎啡 Morphin. Muriat.
一回量 0.001—0.005—0.03
7. 鹽酸海洛因 Heroin. hydrochloric.
一回量 0.002—0.005
8. 鹽酸可待因 Codein. phosporic.
一回量 0.005—0.02—0.05
9. 阿片酊 Tinct. Opii 一回量 5—10—20 滴
10. 阿片安息香酊 Tinct. Opii benzoic.

一回量 20—60 滴

11. 莨菪酊 Tinct. Scopol. 一回量 0.5—1.0
12. 酞菪浸膏 Extract. Scopol. 一回量 0.02—0.05
13. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 一回量 0.5—2.0
14. 柳酸鈉 Natr. Salicylic. 一回量 0.5—1.0
15. 安酸必林 Antipyrin. 一回量 0.3—0.5—1.0
16. 溴化鉀或鈉 Kal. S. Natr. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
17. 碘化鉀 Kal. jodat (與嗎啡杏仁水配合禁忌) 一回量 0.1—0.5—1.0

第 150 方

美遠志浸劑 2.0:90.0 Inf. Rad. Senegae 2.0:90.0
 銀荷香精 0.5 Spirit. Ammon. faeniculat.
 0.5

右一日量六回合服。D. S. 6 mal in Tage z. n.
 (小兒用) (Für Kinder.)

主治 與前方同。

第 151 方

櫻樹皮素 2.0—3.0 Brocin 2.0—3.0
 苦 酊 2.0 Tinct. amar. 2.0
 圖 水 加至 100.0 Aq. destill. ad 100.0

右一日三回分服。D. S. 3 mal in 1 Tage z. n.

主治 支氣管炎，肺炎，喘息，百日咳。

說明 Brocin 因櫻樹皮製出，有粉液錠三種

製劑，忌與酸類配合，作用為抑制氣道分泌，溶解粘液，即使痰易咯出，兼有鎮咳之效，一回量 0.3—0.5—1.0

本方可伍下列諸藥。

1. 糖製胃蛋白酶 Pepsin. saccharat.
一回量 0.5—1.0
2. 番毛地黃劑 Digitalis präparate.
3. 杏仁水 Aq. Lauro-Ceras 一回量 0.5—1.0
—1.0
4. 美遠志糖漿 Sirup. Senegae. 一回量 2.0
5.0
5. 磷酸可待因 Codein. phosphoric.
一回量 0.005—0.02—0.05
6. 柳酸鈉 Natr. Salicylic. 一回量 0.5—1.0
—2.0

第 152 方

鹽酸阿朴嗎啡 0.01 Apomorphin. hydrochloric.
0.01

歐蜀葵糖漿 Sirup. Althaeae.

餾 水 各10.0 Aq. destil. āā 10.0

右混和盛以黑瓶與 M. D. in vitr. nigr.

之，一日數回，一 S. Mehrm. tgl.

回十滴。 10 Tropfen.

主治 小兒氣道卡答耳使痰易咯出。

說明 此劑每十滴含鹽酸阿朴嗎啡 0.00025，
和糖水服。

第 153 方

礮砂	5.0	Ammon. Chlorat.	5.0
甘草蒸	2.0	Succ. Liquirit.	2.0
餾水	加至 200.0	Aq. destill.	ad 200.0

右混和一日數回， M. D. S. Mehrm. tgl.
一回一食匙。 1 Esslöffel.

主治 急性或慢性氣道炎而痰濃厚者。

第 154 方

鑊番茴香液	5.0	Liq. Ammon. anis.	5.0
歐蜀葵糖漿	30.0	Sirup. althaeae.	30.0
餾水	加 100.0	Aq. destill.	ad 100.0

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.
一回一食匙。 1 Esslöffel

主治 與前方同。

第 155 方

安息香酸		Acid. benzoic	
樟腦末	各 0.1	Camphor. trit.	aa 0.1
乳糖	0.5	Sacchar. lact.	0.5

右混和給同量十包 M. f. pulv. D. tal. dos.
，以蠟紙包之，一 No. X. ad chart. cerat.
日三回一回一包。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 支氣管炎，肺炎，肺氣腫諸症。

說明 安息香酸有祛痰兼興奮作用，用量一回
0.1—1.0 散劑外亦可為水劑用之。

第 156 方

金硫黃	0.03	Sib. sulfurat. aurantiac.	
		0.03	
礮砂		Ammon. Chlorat	

乳 糖 各 0.3 Sacchar. lact. āā 0.5
 右混和給同量五包 M. f. pulv. D. tal. dos.
 ，一日三回，一回 No. V. S. 3 mal tgl.
 一包。 1 Pulver.

主治 氣管，支氣管卡答耳其痰濃厚者。

說明 金硫黃亦為溶痰使稀而易咯出之藥，屢
 添加阿片，鹽酸嗎啡，煖酸可待因，樟腦
 ，甘朮，吐根末等用之。

第 157 方

含水松雙醇 Terpin. hydrat.
 白 糖 各 0.2 Sacchar. alb. āā 0.2
 右混和給同量十包 M. f. pulv. D. tal. dos.
 ，附澱粉紙，一日 No. X. ad Caps. Amylac.
 三回，一回一包。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 與前方同，此外支氣管膿漏，肺壞疽，
 百日咳等症亦用之。

說明 本方可伍用安替必林，狄奧寧諸藥。

第 158 方

碘化鉀 0.5—1.0 Kal. jadat. 0.5—1.0
 苦 甾 2.0 Tinct. amar. 2.0
 鹽 水 100.0 Aq. destill. 100.0

右一日量三回分服。D. S. 3 mal in 1 Tage z. n.

主治 慢性支氣管炎，此外梅毒，甲狀腺肥大
 ，腺病性諸症，及漿液性滲出，骨盆內滲
 出，喘息，動脈硬化症，神經症，乾癬，
 水銀或鉛之慢性中毒均用之。

說明 碘化鉀用於梅毒須大量，其法自小量增

至每日量用 5.0—8.0

碘化鉀服用因特異體質，發中毒者有之，腎臟炎及熱性病人之服用宜注意，此時或用性質較和之碘化鈉 *Natr. jodat.* 爲合劑投之。

本方可伍下列諸藥。

1. 重碳酸鈉 *Natr. bicarbonic.* 一回量 0.5—2.0
2. 硫酸鎂 *Magn. sulfuric.* 一回量 5.0—10.0—30.0
3. 硝酸鉀 *Kal. nitric.* 一回量 0.5—1.0—2.0
4. 醋酸鉀液 *Liq. kalii-acetic.* 一回量 2.0—10.0
5. 溴化鉀 *Kal. bromat.* 一回量 0.5—1.0—2.0
6. 溴化鈉 *Natr. bromat.* 一回量 0.5—1.0—2.0
7. 否雷耳氏水 *Liq. Fowler.* 一回量 2—6 滴
8. 杏仁水 *Aq. Laurc-Ceras.* 一回量 0.5—1.0—1.5
9. 美遠志劑 *Senega-Praeparate.*
10. 吐根劑 *Ipecacuanha-Praeparate.*
11. 莨菪浸膏 *Extract. Scopol.* 一回量 0.02—0.05
12. 康吡箭毒酊 *Tinct. Strophanth.* 一回量 2—10 滴
13. 番木鱉酊 *Tinct. Strychn.* 一回量 5—20 滴

第 159 方

克利西佛 30.0 Cresival 30.0

一日量，三次分服 S. 3×1

主治 頑痰不化，氣管支炎，感冒，肺炎，百日咳等。

說明 本品係硫酸克蘭沙鈣之溶液，味頗甘美，適合婦孺之用，可配合其他鎮咳，祛痰，健胃，強心諸藥，同類製劑甚多，如 Cresucal, Sineco, Ephesul (含 Ephedrine), Sirol 等。

第 160 方

山大叶辛 30.0 Sadatussin 30.0

一日量，三次分服 S. 3×1

主治 感冒，肺炎等。

說明 本品係 Caphaeline Hcl, Sodium Benz, Squill 等所配合之糖漿狀液體。

第 161 方

安嗽精 6.0 Antihustin Liq. 6.0

一日量，三次分服。S. 3×1

主治 傷風感冒，氣管支炎。

說明 本品係中藥之遠志，桔梗，川貝母等提煉而成。可配伍其他各種鎮咳，祛痰，強心，利尿，健胃諸藥。

第 162 方

安嗽露 45.0 Antihustin syr. 45.0

一日量，三次分服。S. 3×1

主治 與安嗽精同。

說明 本品係由安嗽精加入氯化銨，海葱，及糖漿等混合而成，適合婦孺之用。

第 163 方

白松糖漿 60.0 White pine syr. 60.0

一日量，分三次服。S. 3×1

主治 感冒。

說明 咳嗽之頗為劇烈者及有熱度者，不宜用之。

第 164 方

須羅靈 1 瓶 Sirolin 1 bottle

每次二茶匙，一日 S. Two tablespoonfuls.

三次。 T. I. D.

主治 各種咳嗽。

說明 本品為糖漿狀粘稠液體。

第十三章 鎮咳劑 Bechica.

第 165 方

鹽酸嗎啡 0.005 0.01 Morphin. muriat.

0.005 0.01

(或磷酸 0.02-0.05) (S. Cedein. phosphoric.

可得因 0.02-0.05)

乳 糖 0.5 Sacchar. lact. 0.5

有混和給同量五包 M. f. pulv. D. tal. dos. No. V.

，頓服一包。 S. Auf. 1 mal 1 Pulver.

主治 劇烈咳嗽，尤適於乾咳。

說明 鹽酸嗎啡應用極廣，鎮咳之外，尤多用於鎮痛，鎮吐，催眠，鎮痙諸症，處方參看各該章下。

第 166 方

鹽酸嗎啡 0.1 Morphin. muriat. 0.1

杏仁水 Aq. Lauro Ceras.

餾 水 各 5.0 Aq. destill. āā 5.0

有混和盛以滴瓶， M. D. ad vitr. guttat.

取十乃至十五滴和 S. 10—15 Tropfen in

水服。 Wasser.

主治 與前方同。

第 167 方

鹽酸海洛因 Heroin. hydrochloric.

(=鹽酸雙醋 0.05 (=Diacetylmorphin.

酸基嗎啡) hydrochl.) 0.05

巴旦杏水 15.0 Aq. Amygdal. amar. 15.0

右混和咳嗽發作時 M. D. S. Bei Anfall

•取15滴和水服。 15 Tropfen in Wasser.

主治 劇烈咳嗽症，肋膜炎，肺癆。

說明 海洛因止咳之功優於嗎啡，劇咳在夜間者，宜於傍晚服一回，夜間再服一回，各15滴。

鹽酸海洛因亦可加乳糖為散劑用之。此時可伍下列諸藥。

1. 安替必林 Antipyrin. 一回量 0.3-0.5-1.0
2. 阿司必林 Aspirin. 一回量 0.5-1.0
3. 杜奧他耳 Duotal. 一回量 0.2-0.5
4. 莨菪浸膏 Extract. Scopol. 一回量 0.02-0.05

第 168 方

狄奧寧	Dionin	
(鹽酸二氫嗎啡)	0.1 (=Aethylmorphin.	
	hydrochl.)	0.1
甘草末	0.5 Pulv. Liquirit.	0.5
白糖	5.0 Sacchar. alb.	5.0

右混和均分十包， M. f. pulv. in part aeq.
 一日三四回，一回 No. X. S. 3-4 mal tgl.
 一包。 1 Pulver.

主治 各種苦咳症。

第 169 方

烹安盼錠	Pantopon-Fastill.
右給二十片，每片	D. 20 Tablett. je 0.01
含 0.01 遇必要時	S. Bei Bedarf 1-3 Stück.

服一二片。

說明 本品可代用鹽酸嗎啡，惟用量須倍之。
錠劑之外，有注射液安瓿含 1cc m。

第 170 方

莨菪浸膏	0.06	Extract. Scopol.	0.06
乳 糖	2.0	Sacchar. lact.	2.0

右混和均分三包， M. f. pulv. div. in part
一日三回分服。 aeq. No. 3 S. 3 mal in 1
Tage z. n.

主治 呼吸器疾病的咳嗽。

說明 莨菪浸膏亦可為水劑用之。

本方可伍下列諸藥。

1. 安替必林 Antipirin. 一回量 0.3—0.5—1.0
2. 阿司必林 Aspirin. 一回量 0.5—1.0
3. 柳酸鈉 Natr. salicylic. 一回量 0.5—1.0—2.0
4. 重碳酸鈉 Nart bicarbonic. 一回量 0.5—2.0
5. 煨製鎂 Magn. ust. 制酸一回量 0.2—0.5—1.0
6. 歐龍膽根末 Pulv. Rad. Gentian. 一回量 0.2—1.0
7. 杜奧他耳 Duotal. 一回量 0.2—0.5
8. 番哥耳 Fagol. 一回量 0.2—0.5
9. 樟腦 Camphor. 一回量 0.03—0.3

第 171 方

黑莨菪浸膏	0.06	Extract. Hyosciami.	0.06
-------	------	---------------------	------

杏仁水 4.0 Aq. Lauro-Ceras. 4.0
 餾水 加至 100.0 Aq. destill. ad 100.0
 右一日三回分服。 D. S. 3 mal in 1 Tagē z. n.
 主治 急性支氣管卡答耳及其他咳嗽症。

第 172 方

顛茄浸膏 0.25 Extract. Bel'adonn. 0.25
 巴旦杏水 15.0 Aq. Amygdal. amar. 15.0
 右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl. 20
 一回20滴和水服。 Tropfen iv Wasser. z. n.
 主治 與前方同。

第 173 方

顛茄浸膏 0.03 Extract Belladonn. 0.03
 歐蜀葵糖漿 30.0 Sirup. Atthaeae. 30.0
 餾水 加至 100.0 Aq. destill. ad 100.0
 右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.
 一回一茶匙。 1 Teelöffel.
 主治 二三歲幼兒百日咳。

第 174 方

糖製百里香浸膏 Extract. Thymi saccharat.
 (=派吐清) 100.0 (=Fertussin) 100.0
 右一日三四回， D. 3—4 mal tgl. 1/2—1
 回半乃至一茶匙。 Teelöffel.
 主治 二至五歲小兒百日咳支氣管炎。

第 175 方

磷酸可待因 0.075 Codein Phosphor 0.075
 杏仁水 10.0 Aq. Armenia 10.0
 糖漿 10.0 Simple syr. 10.0
 餾水 加至 100.0 Aq. ad. 100.0
 一回量，三次分服。 S. 3×1
 主治 各種劇烈咳嗽。
 說明 此種止咳劑往往與其他祛痰劑合併應用。
 初咳不宜應用。

第十四章 息喘劑 Antiasthmatica.

第 176 方

碘化鉀 Kal. jodat.

說明 參看第十一章第 130 方。

第 177 方

碘化鈉 1.0—2.0 Natr. jodat. 1.0—2.0

溴化鈉 3.0 Natr. bromat. 3.0

鹽 水 100.0 Aq. destill. 100.0

右混和一日三回分 M. D. S. 3 mal in 1 Tage
服。 z. n.

主治 支氣管喘息，慢性支氣管炎。

第 178 方

硫酸阿托品 0.01 Atropin. sulfuric. 0.01

甘草末及羔 適量 Pulv. et Succ. Liquirit.

q. s.

右混和爲丸二十粒 ut i. pil. No. 20.

，初日服一回一粒 D. S. 1 steigend bis 4

，漸增至一回四粒 Pill. tgl. da absteigend.

，再漸減。

主治 喘息休止期或發作連續時。

說明 硫酸阿托品錠每片含量 0.0005，(亦有
0.00025)一日三回，一回一二片。(一回
極量 0.001，一日極量 0.003.

第 179 方

鹽酸奎寧 4.0 Chinin. hydrochloric. 4.0

亞 硫 酸 0.06 Acid. arsenicos. 0.06

硫酸阿托品	0.03	Atropin. sulfuric.	0.06
龍膽浸膏	4.0	Extract. Gentian. scabr.	
	4.0		

右混和爲丸六十丸 ut. f. pil. No. 60.
 以伊利斯末爲衣， Comsp. pulv. irid. forent.
 一日一粒漸增至一 D. S. tgl. Pill. allmähmlich
 日四粒。 steigend bis auf 4 Pill.

主治 與前方同。

第 180 方

碘化鉀	4.0	Kal. jodat.	4.0
祛痰菜酊	6.0	Tinct. Lobeliae	6.0
阿片酊	12.0	Tinct. Opii	12.0
餾水加至	100.0	Aq., destill.	ad 100.0

右混和一日三四回， M. D. S. 3 ual tgl.
 一回一兒匙乃至一 1 Kindlöffel bis 1
 食匙。 Esslöffel.

主治 與前方同。

第 181 方

亞硝酸五烷		Amyl. nitros.	
純醇	各 0.5	Alkohol. absolut.	āā 5.0

右混和 2—10 滴， D. S. 2—10 Tropfen aufs
 滴於手帕上吸入。 Taschentuch zum Einatmen

主治 喘息發作時，用此頓挫之。

說明 吸入令病人橫臥行之，因有時亦致失神也。

第 182 方

亞硝酸低鈉	0.5—2.0	Natr. nitros.	0.5—2.0
餾水	150.0	Aq. destill.	150.0

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.
 一回一食匙。 1 Esslöffel.

主治 與前方同。

第 183 方

硝基甘油錠(0.0005) Nitro-glycerin. Pastill
 (0.0005)

右給一管二十五片 D. 1 O. P. zu 25 Tablett.
 ，一日一回，一至 S. Tägl. 1—2 Stück.
 二片。

主治 與前方同。

第 184 方

鹽化腎上腺素液 Sol. Adrenalin. hydrochlor.
 (千倍) (1:1000)

右給五安瓿，各含 D. 5 Ampull. je 1cc m.
 1cc m. 一回1/2-1 S. Subkntan. 1/2—1
 筒皮下注射。 Spritze.

主治 與前方同。

說明 本劑一日可注射數回，但一回不可注射
 1.0 以上，注射後時見顏面蒼白，心悸充
 進，胸內苦悶，呼吸困難等副作用，但暫
 時可恢復，用於老人宜注意。

Epinephrin Ciba 爲化學的合成之腎上
 腺素其用量用法效果悉與天然之腎上腺素
 同，而其耐久性過之。

第 185 方

氯化鈣	10.0 Calc. chlorat.	10.0
(或乳酸鈣)	6.0) (s. Calc. lactic.	6.0)

糖漿 20.0 Si:up. simpl. 20.0
 水 加至 200.0 Aq. destill. 200.0

右混和一日三四回 M. D. 3—4 maltgl.
 ，一回一食匙。 1 Esslöffel.

主治 支氣管喘息，慢性支氣管炎。

第 186 方

麻黃素片 (6 片每片 Ephedrin tab. No. 6
 含 0.03)

一日量，三次分服。S. 3×1

主治 支氣管喘息，慢性支氣管炎。

說明 鹽酸麻黃素有製成安瓿劑注射者。

第 187 方

拉西特靈 0.025-0.05 Racedin 0.025—0.05
 一次頓服。 S. one dose

主治 哮喘，風疾等。

說明 本品亦係一種精製之麻黃精，亦有製成
 片劑及安瓿劑者，片劑每片含 0.05，安
 瓿劑每 c.c. 含 0.03。此藥初服宜用小
 量，如 0.025 或更小，以後可逐漸增加。

第 188 方

速伏靈針 1 公撮 Rephrin Amp. 1 c.c.
 皮下注射。 S. For Hypodermic

主治 哮喘及一切喘逆氣急。

說明 本品為副腎精及麻黃精之合劑，每安瓿
 1 公撮，每公撮含拉西特靈 (即麻黃精)
 0.03，蘇漢來拉寧 (即副腎精) 0.0002。
 本品絕對不可注入靜脈。

第 189 方

盧密拿粒吞 3 粒 Luminalettes No. 3
 一日三次分服。 S. 3×1

主治 氣管支性氣喘，癱瘓等。

說明 本品每粒含盧密拿 0.015 公分，故服一
 粒不致有催眠作用。

第十五章 吸入劑 Inhalationsmittel.

第 190 方

重碳酸鈉		Natr. bicarbonic.	
食鹽	各 4.0	Natr. chlorst.	āā 4.0
(甘油)	4.0)	(Glycerin.	4.0)
餾水	加至 400.0	Aq. destill.	ad 400.0

右爲吸入料。 D. S. Zur Inhalation.

說明 本方用於急性慢性氣管卡答耳有祛痰及緩和刺戟之效，咳嗽劇烈時可加阿片酊10—15滴，上氣道充血高度時，可加鹽化腎上腺素液（千倍）數滴，則吸入之後即生快感矣。

如專爲鎮咳或鎮靜時，可用下列諸藥液。

- 1—1.5% 杏仁水液 Aq. Lauro-Ceras, 1—1.5% Lös.
- 0.2—0.5% 阿片酊液 Tinet. Opii 0.2—0.5% Lös.
- 0.5—2% 溴化鉀液 Kal. bromat., 0.5—2% Lös.

第 191 方

氯化銨	1.0—4.0	Ammen. chlorat.	1.0—4.0
(甘油)	20.0)	Glycerin.	20.0
水	加至 400.0	Aq.	ad 400.0

右爲吸入料。 D. S. Zur Inhalation.

說明 用於急性慢性氣道炎痰濃厚時。

第 192 方

石灰水		Aq. Calcariae	
水	各 200.0	Aq.	āā 200.0

右爲吸入料。 D. S. Zur Einatmung.

說明 本劑能溶解痰膜，故可用於白喉，纖維性支氣管炎。

第 193 方

鞣酸	2.0—8.0	Acid. tannic.	2.0—8.0
水	400.0	Aq.	400.0

右為吸入料。 D. S. Zur Einatmung.

說明 本劑有收斂制止分泌之效。

第 194 方

立爾香草腦	2.0	Thymol.	2.0
水	400.0	Aq.	400.0

右為吸入料。 D. S. Zur Einatmung.

說明 本劑用於支氣管膿漏，腐敗性支氣管炎。

第 195 方

松節油	30.0	Ol. Terebinthin.	30.0
-----	------	------------------	------

右朝夕各用十滴， S. 10 Tropfen morgens u.
加於盛有熱湯之皿 abends in einem Gefäss
內吸入。 mit kochenden Wasser zu
inhalieren.

說明 本劑用於慢性喉炎，腐敗性支氣管炎，支氣管擴張症，肺壞疽，肺癆諸症。有防腐及制限分泌之效。

第 196 方

複方安息香酸酒	5.0	Tct Benz. co.	5.0
鹽水	加至 200.0	Aq. ad	200.0

右為吸入料。 D. S. Zur Einatmung.

主治 氣管支炎。

第 197 方

青黴素溶液	200.0	Penicill in Sol.	200.0
-------	-------	------------------	-------

右為吸入料。 D. S. Zur Einatmung.

主治 肺炎，氣管枝炎，支氣管擴張等。

說明 每 c.c. 含 100—300 國際單位。

第十六章 含嗽劑 Gargarisma

第 198 方

硼 酸	8.0 Acid. boric.	8.0
水	400.0 Aq.	400.0

右爲嗽口料 D. S. Zum Gurgeln.

主治 口內炎，咽炎，喉炎。

說明 本劑亦可爲吸入料用。

第 199 方

硼 砂	5.0 Boracis	5.0
水	250.0 Aq.	250.0

右爲嗽口水 D. S. Zum Gurgelwasser.

主治 與前方同。

說明 本劑作用爲防腐收斂。

第 200 方

氯 酸 鉀	8.0 Kal. Chloric.	8.0
水	400.0 Aq.	400.0

右爲嗽口水 D. S. Zum Gurgelwasser.

主治 各種口內炎，口內惡臭，僑口瘡，壞血病等症。

說明 此爲最通用之劑，汞毒性口內炎尤好用之並可用此嗽口預防之。

第 201 方

過氧化氫液	100.0 Liq. Hydrogen. peroxydat.	100.0
-------	---------------------------------	-------

右用二茶匙，和微 D. S. 2 Teelöffelvoll auf

溫水一杯嗽口。 1 Tasse Warmwasser zu

gurgeln.

- 主治 各種口內炎，咽炎。
- 說明 本品含其3% 防腐力強大，故好用之。過氧化氫製劑尚有下列數種。
- 配希特羅耳 Perhydrol. 爲其 30% 液，以比一分，水九分混和之，即成 3% 液，可依本方法用之，或再用其一分，水二十九分混和成 1% 液，即可爲嗽口用矣。
 - 奧克息夫耳 Oxyful 及卡泰羅耳 Katharol. 爲過氧化氫 3% 液，依前法用之。
 - 彼羅聰 Pyrozon. 分二種，一爲其 3% 液一爲其 25% 液，依上法計算用之。

第 202 方

過錳酸鉀	0.2—0.4 Kal. permanganic.	0.2 0.4
水	200.0	200.0

右爲嗽口水 D. S. Zum Gurgelwasser.

主治 各種口內炎，口內惡臭。

第 203 方

明礬	0.8 Alumen	0.8
薄荷水	20.0 Aq. Menth.	20.0
水	400.0 Aq.	400.0

右爲嗽口水 D. S. Zum Gurgelwasser.

說明 本劑有消炎，收斂，防腐，止血之效，時以福紅 Fuchsin 着微紅與之。

第 204 方

立麝香草腦	0.5 Thymol.	0.5
安息香酸	6.0 Acid. benzoic.	6.0

拉塔星亞酊	30.0	Tinct. Ratanh.	30.0
薄荷油	3 滴	Ol. Menth.	Gtt VI.
酒精(醇) 加至	200.0	Spirit.	ad 200.0
右混和用半茶匙和 水一杯嗽口。		M. D. S. 1/2 Teelöffel auf 1 Tasse Wasser zu gurgeln.	

主治 各種口內炎，口內惡臭。

第 205 方

薄荷腦	1.0	Menthol	1.0
硼酸	30.0	Acid. boric.	30.0
右混和用其一刀尖 和水半立持嗽口。		M. D. S. 1 Messerspitze auf 1/2 L Wasser zu gurgeln.	

主治 與前方同。

第 206 方

雷佛奴兒水	400.0	Rivanol sol.	400.0
右為嗽口用		D. S. Zum Gurgelwasser	

主治 咽，喉，口腔，各種炎症，及齒槽膿
漏。

說明 上為千分之一溶液，有時可加雙氧水等
其他消毒劑。

第 207 方

朵貝爾氏溶液	400.0	Dobell's sol.	400.0
右為嗽口用		D. S. Zum Gurgelwasser	

主治 與前方同。

說明 此溶液係由硼砂，石炭酸，甘油，薄荷
胞等配合而成。

第十七章 強心劑及興奮劑

Cardiotonica et Excitantia

第 203 方

番毛地黃 0.5:90.0 Inf. Fol. Digitalis

葉浸劑 0.5:90.0

調 漿 加至 100.0 Sirup. simpl. ad 100.0

右一日量，三四分 D. S. 3 mal in 1 Tage

服。 z. n.

主治 慢性心臟衰弱，心瓣膜病，血行障礙諸症。

說明 連用番毛地黃劑，則有起蓄積作用之虞，但小量即一日量 0.05—0.1 雖連用數月亦無不可，大約服至全量 4.0—5.0 須停一二星期，是為普通用法，間亦有用至全量 2.0 現著明作用者，應用期間須注意心音及脈搏，此外本品貯久失效，宜擇新鮮者用之。

本方可伍用下列諸藥。

1. 康毗箭毒酞 Tinct. Strophanth 一回量 2—10 滴
2. 安息香酸鈉咖啡英 Caffeino-Natr. benzoic. 一回量 0.1—0.5
3. 紅酒 Vin. rubr. 一回量 10.0—30.0
4. 海葱酞 Tinct. Scillal. 一回量 10—20 滴
5. 醋酸鉀液 Liq. kal. acetic. 一回量 2.0—10.0

6. 重酒石酸鉀 Kal. bitartaric. 一回量 0.5—2.0
7. 硝酸鉀 Kal. nitric. 一回量 0.5—1.0—2.0
8. 狄午雷汀 Diuretin. 一回量 0.3—0.5—1.0
9. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic.
一回量 0.5—2.0 加此可助其效力。
10. 安替必林 Antipyrin. 一回量 0.3—0.5—1.0
11. 麥角浸膏 Extract. Secal. Cornu.
一回量 0.05—0.5
12. 否雷耳氏水 Liq. Fowler. 一回量 2—6 滴
13. 杏仁水 Aq. Lau. o Ceras. 一回量 0.5—1.0—1.5
14. 阿片酊 Tinct. Opii 一回量 5—1—20 滴
15. 鹽酸嗎啡 Morphin. muriat.
一回量 0.001—0.005—0.03
16. 罌茴香醃 Spirit. Ammon. foeniculat.
一回量 0.2—1.0
17. 吐根糖漿 Sirup. Ipecacuanh. 一回量 3.0—5.0
18. 糖製胃蛋白酶 Pepsin. saccharat. 一回量 0.5—1.0
19. 苦酊 Tinct. amar. 一回量 0.5—2.0
20. 橙皮酊 Tinct. Cort. aurant. 一回量 1.0—4.0

第 209 方

番毛地黄 0.5:90.0 Inf. Fol. Digital. 0.5:90.0
藥液劑

8. 藥喇叭根末 Pulv. Tuber. Jalap.
一回量 0.2—0.5
9. 鹽酸奎寧 Chinin. hydrochloric.
一回量 0.1—0.5—1.0
10. 歐龍膽末 Pulv. Rad. Gentian.
一回量 0.2—1.0

第 211 方

番毛地黃葉末	0.1 Pulv. Fol. Digital.	0.1
精製樟腦	0.1 Camphor. dep.	0.1
咖啡英	0.3 Coffein.	0.3
乳糖	0.5 Sacchar. lact.	0.5

右混和頓服。 M. f. pulv. No. 1.
D. S. Auf. einmal z. n.

說明 心臟衰弱時可每三時一包。

據上列第 165 方及第 167 方，番毛地黃劑可視症狀添加其他主藥，茲舉其二三方法於次，餘可類推之矣。

- (1) 如對於心臟性浮腫，可酌加狄午雷汀，醋酸鉀液，硝酸鉀，甘汞。
- (2) 如對於心臟性呼吸困難可酌加鹽酸嗎啡。
- (3) 如對於主動脈閉不全，動脈硬化症，可酌加麥角浸膏。

第 212 方

狄茄令	2.0—3.0 Digalen	2.0—3.0
糖漿	20.0 Sirup simpl.	20.0
儲水	加至 200.0 Aq. destill.	ad. 200.0

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal in
二日分服。 2 Tage z. n.

主治 慢性心臟衰弱，心臟膜病，血行障礙。

秋茄令包裝三種，溶液一瓶 15.0 錠劑
一管 12 片或 25 片每片含 0.5，注射液
一盒六安瓿，每安瓿 1.1 cc 其液劑可添
加於他種方劑，如清涼水，養耳退兒水，
吐根浸劑中用之，較爲便利。

第 213 方

番毛地黃酊	1.5 Tinct. Digital.	1.5
糖漿	10.0 Sirup. simpl.	10.0
餾水	加至 100.0 Aq. destill.	ad 100.0

右混和一日三回分 M. D. S. 3 mal in
服。 1 Tage z. n.

主治 心機障礙，心臟性呼吸困難，心臟性浮
腫。

說明 番毛地黃酊之效果，不甚可靠，此宜注
意。

本方可伍下列諸藥。

1. 康地葛毒酊 Tinct. Strophanth.
一回量 2—10 滴
2. 海葱酊 Tinct. Scillal. 一回量 10—20 滴
3. 阿片酊 Tinct. Opii. 一回量 5—10—20 滴
4. 含醞類草酊 Tinct. Valerian. aether.
一回量 0.5—1.5
5. 苦酊 Tinct. amar. 一回量 0.5—2.0
6. 杏仁水 Aq. Lauro-Ceras. 一回量 0.5—

1.0—1.5

番毛地黃劑除上列者外，尚有多種，茲舉其二三於次。

- a. 地莖佛林 Digifolin. 有粉，錠，液，三種。粉 0.1，錠每片均與番毛地葉末 0.1 之效力相等，故其用量可由此知之。
- b. 地芰他民 Digitamin. 有瓶裝液 15.0 及注射液安瓿（一安瓿 1cc）二種，內服一回 0.5—1.0，注射一回 1/2—1 筒。
- c. 烹芰他耳 Pangital. 有粉，液及注射用安瓿三種，用量粉或液每回 0.5—1.0 一日數回，注射一回 1/2—1 筒，一日不可用六筒以上。

第 214 方

熙毗箭毒酊	0.5—1.0	Tinct. strophant.	0.5—1.0
糖漿	10.0	Sirup. simpl.	10.0
鹽水	加至 100.0	Aq. destill.	ad 100.0

右一日量，三回分 D. S. 3 mal in 1 Tage

服。 z. n.

主治 心臟病，心肌機能不全，肺氣腫，急性心臟衰弱，重症肺炎。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 番毛地黃酊 Tinct. Digital. 一回量 5—20 滴
2. 醋酸鉀液 Liq. kal. acetic. 一回量 2.0—10.0
3. 溴化鉀 Kal. bromat. 一回量 0.5—1.0—

- 2.0
4. 溴化鈉 *Natr. bromat.* 一回量 0.5—1.0—2.0
 5. 杏仁水 *Aq. Lauro-Ceras.* 一回量 0.5—1.0—1.5
 6. 纈草酊 *Tinct. Valerian.* 一回量 0.5—1.5
 7. 番木鱒酊 *Tinct. Strychn.* 一回量 5—10 滴
 8. 硫酸鎂 *Magn. sulfuric.* 一回量 5.0—10.0—30.0
 9. 苦酊 *Tinct. amar.* 一回量 0.5—2.0

第 215 方

康毗箭毒酊	2.5	<i>Tinct. Strophanth.</i>	2.5
番毛地黃酊		<i>Tinct. Digital.</i>	
番木鱒酊	各 5.0	<i>Tinct. Strychn.</i>	āā 5.0

右混和一日三四回，*M. D. S. 3 mal tgl. so*
 一回用與小兒年齡 *viel Tropfen, wie das*
 數用同之滴數。 *Kind Jahre zählt.*

主治 小兒心臟疾病。

第 216 方

海葱末	0.1	<i>Bulb. Scilliae pulverat.</i>	0.1
(醋酸鈉茶葉素 0.15)		<i>(Theophillin. natr.</i>	
		<i>acetic.</i>	0.15)

(磷酸可待因 0.03) (*Codem. phosphoric. 0.03*)

右盛以膠囊與同量 *D. tal. dos. ad caps.*
 15個，一日三四回 *gelatin. No. 15 S. 2—3*
 ，一回一個。 *mal tgl. 1 Kapseln.*

說明 海葱劑與毛地黃劑同，用番毛地黃劑無效時，可試用或兩者併用如下方。

第 217 方

海 葱 末	Bulb. Scill. pulverat.	
番毛地黃葉末	Fol. Digital. pulverat	āā
		0.05
白 糖	Sacchar. alb.	0.3
右混和與同量十包	M. f. pulv. D. tal. dos.	
，一日數回，一回	No. X. S. Mehrm. tgl.	
一包。	1 Pulver.	

第 128 方

硫酸斯派退因	0.2 Spartein. sulfuric.	0.2
巴旦杏仁水	Aq. Amygdal. amar.	10.0
右混和一日三回，	M. D. S. 3 mal tgl.	
一回二十滴。	20 Tropfen.	

主治 心機衰弱，心臟性浮腫。

說明 硫酸斯派退因亦可為 1% 溶液，行皮下注射，一回半筒至一筒。

第 219 方

樟 腦 末	0.1—0.2 Camphor. trit.	0.1—20
乳 糖	Sacchar. lact.	0.5
右混和給同量十包	M. f. pulv. D. tal. dos.	
，以蠟紙包之，一	No. X. ad Chart. cerat.	
日三回一回一包。	S. 3 mal tgl. 1 Pulver.	

主治 心機衰弱，虛脫，急性傳染病經過中。

說明 樟腦適於急性心機衰弱，因其作用迅速出見也，然其排泄亦速。

第 210 方

精製樟腦	1.0	Camphor dep.	1.0
醫 醇	10.0	Spirit. aether.	10.0

右混和每時間一回 M. D. S. Stündl.

，一回十滴，或一 10 Tropfen

日數回。 oder mehrm. tgl.

主治 痲痺時心機衰弱，尤宜於老人。

說明 醫醇亦稱合弗曼氏液 Liq. Hoffmanni
由蠟一分醇三分混和而成，可單味用之，
每瓶 10—30 滴，和糖水服。

第 221 方

精製樟腦	3.0	Camphor. dep.	0.3
白 蘭 地	十滴	Cognac.	Gtt X
亞拉伯樹膠漿		Mucilag. Gumm. arab.	
糖 漿 各	10.0	Sirup. simpl.	aa 1.00
餾 水 加至	100.0	Aq. destill.	ad 100.0

右混和一日數回， M. D. S. Mehrm. tgl.

一回一茶匙。 1 Teelöffel.

主治 小兒心機衰弱，虛脫。

第 222 方

精製樟腦	1.0	Camphor. dep.	1.0
洋柳蠟油	9.0	Ol. Olivar.	9.0

右混和一日數回， M. D. S. Mehrm. tgl.

一回一二筒，皮下 1—2 Spritze subkuten.

注射。 Injekt.

主治 由一切疾病而起之心機衰弱，虛脫。

說明 此通名曰樟腦油 Ol. Camphorat. 亦可

以精製樟腦 2.0 洋椒搥油 8.0 (有更伍以醚 Aether 2.0) 混和製之。在日本藥局方通記以 Oleum Camphoratum. 在德國藥局方則附記 (forte) 一字即強樟腦油之意也。樟腦油安瓿每個 1 c.c.

年來有樟腦水溶液製出，茲舉其要於次。

- a. 康佛根 Camphogen. 爲安瓿劑，安瓿內容 1 c.c. 爲 2% 溶液故含樟腦 0.02. 用量大人一回一二安瓿爲靜脈內或肌內注射。小兒用 $1/3$ — $1/2$. 此外有爲 4% 溶液者，一安瓿 1 c.c. 中含樟腦 0.04, 用法同。
- b. 加德明 Gadamin. 亦爲安瓿劑，一安瓿內容 1 c.c. 含樟腦 0.1, 一回一安瓿爲靜脈內或皮下注射。
- c. 可羅那金 Calonasin. 亦爲安瓿劑，一安瓿內容爲 2 c.c., 5 c.c., 10 c.c. 三種，均爲 0.5% 樟腦溶液，一回一安瓿，爲靜脈內或皮下注射。

樟腦水溶液行皮下注射，亦有微痛，致徐徐施行爲宜。

第 23 方

科德舒爾錠

Codochol Pastill.

有給一管二十片各
含 0.1 一日 2—4
回，一回一片。

D. 1 O. P. zu 20 Tabl.
je 0.1 S. 3—6 mal tgl.
1 Stück.

主治 心機衰弱，虛脫，急性傳染病經過中。

第 224 方

咖啡英	0.3 Coffein.	0.3
乳糖	1.0 Sacchar. lact.	1.0

右混和均分爲三包 M. f. pulv. div. in part
，一日三回分服。 aeq. No. 3 S. 3 mal in
1 Tage z. n.

說明 咖啡英之作用，爲恢復腦之疲勞狀態，
使呼吸深長，亢進脊髓反射性，擴張心臟
動脈，增進腎分泌。

本方可伍樟腦末或安替必林用之。

第 225 方

安息香酸	0.1—0.3 Caffeino-Natr. benzoic.	
鈉咖啡英	0.1—0.3	
乳糖	0.3 Sacchar. lact.	0.3

右混和給同量十包 M. f. pulv. D. tal. dos.
，一日三回，一回 No. X. S. 3 mal tgl. 1
一包。 Pulver.

主治 心機衰弱。

說明 安息香酸鈉咖啡英亦可爲水劑，而伍 F
列諸藥。

1. 醋酸鉀液 Liq. kal. acetic. 一回量 2.0—10.0
2. 番毛地黃劑 Digitalis-Praeparate
3. 康毗箭毒酊 Tinct. Strophanth. 一回量 2—10 滴
4. 安替必林 Antipyrin. 一回量 0.3—0.5—1.0

5. 霹藍密藤 *Pyramidon*. 一回量 0.1—0.5
6. 柳酸鈉 *Natr. salicylic*. 一回量 0.5—1.0—2.0
7. 糖製胃蛋白酶 *Pepsin. saccharat.* 一回量 0.5—1.0
8. 水化氯醛 *Chloral. hydrat.* 一回量 0.5—1.0—2.0
9. 苦酞 *Tinct. amar.* 一回量 0.5—2.0
10. 橙皮酞 *Tinct. cort. aurant.* 一回量 1.0—4.0

安息香酸鈉咖啡英可製成 2% 水溶液，煮沸滅菌之，爲皮下注射，一日數回（約隔二時間），一回 1\2—1 筒，此液有製成安甌劑販賣。

柳酸鈉咖啡英 *Caffeino-Natr. salicylic*. 亦爲藥用，其用法主治均與安息香酸鈉咖啡英同。

第 226 方

醇	10.0 Spirit.	10.0
醚	1.0 Aether.	1.0
糖 漿	20.0 Sirup. simpl.	20.0
水	100.0 Aq.	100.0

右混和一日數回， M. D. S. Mehrm. tgl.
一回一食匙。 1 Esslöffel.

主治 急性傳染病經過中心機衰弱。

說明 本方價廉，適用於施療醫院。

第 227 方

白蘭地	50.0 Cognac.	50.0
卵黃	2 個 Vitell. Ov.	II.
桂皮糖漿	15.0 Sirup. Cinnamom.	15.0
桂皮水	150.0 Aq. Cinnamom.	150.0

右混和每時一食匙。M. D. S. stündl. 1
Esslöffel.

主治 與前方同。

第 228 方

硝酸番木鱈素	0.01 Strychnin. nitric.	0.01
滅菌餾水	10.0 Aq. destill. steril.	10.0

右一日一回，一回 D. S. 1 mal tgl. 1 Spritze
一筒皮下注射。 zur subkutan. Injekt.

主治 心機衰弱，心肌麻痺。

說明 本品有製成安瓿販賣。

第 229 方

鹽化腎上腺素液	Sol. Adrenalin hydrochl.
(千倍)	(1:1000)

右一回 1/2—1 筒 S. 1/2—1 Spritze
皮下注射。 subkutan.

主治 心機衰弱，虛脫。

說明 詳細參看第 149 方。

第 230 方

林該耳氏液	Ringer'sche Lösung.
	(Liq. Ringeri)

食鹽	8.0 Natr. chlorat.	8.0
重碳酸鈉	0.1 Natr. bicarbonic.	0.1
氯化鈣	0.1 Calc. chlorat.	0.1

氯化鉀	0.075 Kal. chlorat.	0.075
餵水	加至100.0 Aq. destill. ad	100.0

有混和澱粉爲皮下 M. Steril.

或靜脈內注射。 S. Zur subkutan. od. intravenös.

主治 心機衰弱，虛脫，各種傳染病經過中及中毒症等用之。

說明 於本液一立特中加鹽化腎上腺素(千倍)液 10—15 滴用之尤佳。

附記 呼吸中樞興奮劑及生殖神經興奮劑。

a. 樂百齡 Lobelin. 爲注射液安甌劑，有大人用及小兒用兩種，行肌內或靜脈內注射，(於小兒亦可行皮下注射)以治呼吸促迫，呼吸困難，行將窒息諸症，於此等危急時可隔數分時注射一回，同時注射強心劑。

b. 鹽酸育亨賓 Yohimbin. hydrochlor. 其製劑有錠劑及安甌劑兩種，錠劑每片含 0.005，一日三回，一回一二片內服，安甌劑每支含 0.001，每日皮下注射一回，專治神經衰弱，陰萎，早洩，夢遺，發育不全諸症。

第 231 方

狄吉福林液	2.0—3.0 Digiforlin Liq.	2.0—3.0
糖漿	10.0 Sirup. Simple	10.0
餵水	100.0 Aq. ad.	100.0

一日三次，二日分 S. 3×2

服。

主治 各種疾病之心臟衰弱。

說明 毛地黃製劑。

第 232 方

卡代柴而	2.0—3.0	Cardiazol	2.0—3.0
糖漿	10.0	Sirup. Simple	10.0
餾水	100.0	Aq. ad	100.0

一日三次，二日分 S. 3×2

服。

主治 與上方同。

說明 毛地黃製劑。

第 233 方

可拉明液	1.5—3.0	Coramine Liq.	1.5—3.0
糖漿	10.0	Sirup Simple	10.0
餾水	100.0	Aq. ad.	100.0

一日三次分服。 S. 3×1

主治 虛脫，急性心臟衰弱。

第 234 方

旁的加兒液	2.0—3.0	Pandigal	2.0—3.0
糖漿	10.0	Simple Sirup	10.0
餾水	100.0	Aq. ad	100.0

一日三次，二日分 S. 3×2

服。

主治 各種疾病之心臟衰弱。

說明 上列四方均可佐以其他利尿，退熱，健胃，鎮靜等劑。其他強心藥甚多，因現時臨牀上較少應用，且為篇幅所限，故從

略。

【注射劑】

1. 可拉明 (Coramine) 每安瓿 1.7 c.c. 一日可注射二三次，對於突然發生之虛脫與心臟衰竭及小兒科常用之。皮下注射。
2. 狄加令 (Digalen) 每安瓿 1 c.c.，一日一二次，效用較為持久，但長用有蓄積作用。皮下注射。
3. 維他康福 (Vita-Camphor) 一回注射 1.0-2.0，多用於急性心臟衰弱，呼吸麻痺，新生兒假死，虛脫等。
4. 康福那星 (Camphonasin) 係樟腦水溶液，每安瓿 2 c.c.，每日用 2-6 c.c.，多用於急性心臟衰弱，虛脫等。同類製品有康福星 (Camphosin)，Camphorin ether 等。靜脈，皮下注射均可。
5. 狄吉安靈 (Digitolin) 亦為毛地黃製劑，每次注射 1 c.c.。
6. 硝酸士的年 (Strychnine nitrat) 多用於呼吸麻痺，心臟衰弱等，每次注射 1 c.c.，皮下注射。
7. 安納咖 (Caffein Sod. Benz) 強心利尿劑，每次皮下注射 1 c.c.。
8. 鹽酸腎上腺素 (Adrenalin Hcl.) 血管收縮劑，每 c.c. 注射半至一公撮，皮下注射，切勿注射入靜脈。
9. 葡萄糖液 (Glucose Sol.) 多用其 20% 溶液，每次注入 20-50 c.c.，或加入康福那星，安納咖等以增強其效力。

第十八章 利尿劑 Diuretica.

第 235 方

醋酸鉀液	10.0	Liq. kal. etic.	10.0
糖漿	10.0	Sirup. simpl.	10.0
餾水	加至 100.0	Aq. destill.	ad 100.0

右混和一日三回分 M. D. S. 3 mal in 1

服。 Tage z. n.

主治 因腎病而起之浮腫。

說明 本方可伍下列諸藥。

1. 硝酸鉀 Kal. nitric. 一回量 0.5--1.0—2.0
2. 精製酒石 Tartar. depurat. 一回量 0.5—2.0
3. 狄午雷汀 Diuretin. 一回量 0.3—0.5—1.0
4. 熊果葉浸劑 Inf. Fol. Uv. urs.
(一回量 8.0:90.0)
5. 烏羅脫羅品 Urotropin. 一回量 0.5—1.0
6. 海耳密妥耳 Helmitol. 一回量 0.5—1.0
7. 番毛地黃劑 Digitalis-Praeparate.
8. 康毗箇毒酊 Tinct. Strophant. 一回量
2—10 滴
9. 安息香酸鈉咖啡英 Caffeino-Natr.
benzoic. 一回量 0.1—0.5
10. 硫酸鎂 Magn. sulfuric. 一回量 5.0—10.0
—30.0
11. 碘化鉀 Kal. jodat. 一回量 0.1—0.5—1.0
12. 柳酸鈉 Natr. salicylic. 一回量 0.5—1.0

—2.0

13. 番木鱉鹼 Tinc. Strychn. 一回量 5—20 滴

14. 苦酞 Tint. amar. 一回量 0.5—2.0

15. 薄荷水 Aq. Menth. 一回量 3.0—5.0

第 236 方

硝 酸 鉀 0.5 Kal. nitric. 0.5

番毛地黃葉末 0.1 Pulv. Fol. Digital. 0.1

乳 糖 0.5 Sacchar. lact. 0.5

右混和爲散給同量 M. f. pulv. D. tal. dos.

十包，一日數回， No. X. S. Mehrm. tgl.

一回一包。 1 Pulver.

主治 水血性浮腫，肋膜炎，心囊炎等症。

說明 對於腎性浮腫及有胃腸炎者宜注意。

第 237 方

柳酸鈉柯柯素 Theobromin. natr.
salicylic.

(=狄午雷汀， 5.0 (=Diuretin) 5.0

利尿素)

乳 糖 2.0 Sacchar. lact. 2.0

右混和均分六包， M. f. pulv. div. in part.

一日三回，一回一 aeq. No. 3 S. 3 mal tgl.

包。 1 Pulver.

主治 各種浮腫症。

說明 本劑利尿力頗強，用法以服二三日，停二三日，再服爲妥。又本散劑不能久貯，以每二日份配製爲宜。

狄午雷汀亦可爲水劑用之，此水劑不可

添加糊漿重碳酸鈉及硫酸銨又不可使成酸性，是宜注意。

狄午雷汀錠 Diuretin-Tablett, Knoll.
) 每片含 0.5, 一日數回, 一回一片。

第 238 方

狄午雷汀	1.0	Diuretin.	1.0
番手地黃葉末	0.05	Pulv. Fol. Digital.	0.05
鹽酸嗎啡	0.003	Morphin. muriat.	0.003

右混和爲散，給同 M. f. pulv. D. tal. dos.
量十包，一日三回 No. X. S. 3 mal tgl. 1
, 一回一包。 Pulver.

主治 心臟性浮腫。

第 239 方

醋酸鈉柯柯素		Theobromin. natr. acetic.	
(=阿古林)	0.5	(=Agurin)	0.5
乳 糖	0.3	Sacchar. lact.	0.3

右混和爲散給同量 M. f. pulv. D. tal. dos.
十包，一日數回， No. X. S. Mehrm. tgl.
一回一包。 1 Pulver.

主治 各種浮腫，於心臟性浮腫尤佳。

阿古林服法與狄午雷汀同，連服二日後，停數日乃再服用。又其水劑忌配糊漿，重碳酸鈉等亦與狄午雷汀同。

阿古林錠 Agurin-Tablett. 每片含 0.5
, 一日三回，一回一片。

第 240 方

醋酸鈉葉茶素	2.0	Theopyllin. natr. acetic.	
--------	-----	---------------------------	--

2.0

桂皮水 50.0 Ab. Cinnamom. 50.0

餾 水 加至 200.0 Aq. destill. ad 200.0

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.

一回一食匙，食後 1 Esslöffel nach dem

服。 Essen.

主治 各種浮腫症。

說明 醋酸鈉茶葉素亦可為散劑，一回 0.15
或伍番毛地黃藥末 0.03 為一包用之。一
日三回，一回一包，食後服。

有歐非林 Euphyllin. 者，含 78% 茶
葉素，利尿力頗大。有製成錠劑即歐非林
錠 Euphyllin-Tablett. 每片含 0.1，一
日三五回，一回一片。

歐非林可為藥栓劑，即以歐非林 0.36，
柯柯脂 2.0 混和為藥栓一個，一日二回，
一回一個。

第 241 方

尿 素 10.0—20.0 Ureae 10.0—20.0

餾 水 200.0 Aq. destill. 200.0

右混和一日數回 (M. D. S. Mehrm tgl.

或每二時) 一回一 (od. 2 stündl.) 1 Esslöffel

食匙。 z. n.

主治 由肝臟心臟疾病而起之浮腫症。

第 242 方

甘 汞 0.1 Calomel. 0.1

阿 片 末 0.01 Pulv. Opii 0.01

乳 糖 0.5 Sacchar lact. 0.5
 右混和爲散給同量 M. f. pulv. D. tal. dos.
 十包，一日三四， No. X. S. 3 mal tgl.
 一回一包。 1 Pulver.

主治 心臟性浮腫。

說明 此方長服，須注意求毒性口內炎，嗽口以防之。

利尿劑除上列諸方外，強心劑章所列之番毛地黃劑，咖啡英劑，皆可應用可參看之。

第 243 方

重酒石酸鉀 4.0 Kal. Bitartaric 4.0
 苦 味 甜 4.0 Tct. Amarac 4.0
 餾 水 100.0 Aq. ad. 100.0

一日三次，二日分 S. 3×2

服。

主治 浮腫症。

【注射劑】

1. 洒利尿 (Salyrgan) 係一種易溶解之有機性汞鹽，利尿作用甚爲彰着，但有心臟炎及腎炎者忌用。由心臟衰弱而起之水腫，可用之。每次注射 0.5—1.0 c.c.，每隔二三日注射一次，供肌肉注射，靜脈注射務須緩緩注入。
2. 拿佛阿色羅 (Novasurol) 亦係一種水銀製劑，用量與洒利尿同，但此藥反應頗大，有流弊發生，用時務宜謹慎。
3. 伊格羅新 (Igrosin) 水銀製劑，用量及注意點與洒利尿同。
4. 阿維坦 (Avitan) 係 3% 醋酸鈉茶葉素，每回 5.0—10.0 靜脈注射，治心腎性水腫，腹水等。
5. 強心劑中毛地黃，咖啡英製劑均可用作心臟性水腫之利尿劑。

第十九章 尿防腐劑

Harnantiseptica.

第 244 方

烏羅脫羅品	Urotopin	
(二六一—	1.5—2.0 (=Hexamethylentetramin)	
婦回錠)	1.5—2.0	

右均分三包，一日 f. pulv. div. in part aeq.
 三回，一回一包， No. III. S. 3 mal tgl. 1
 以澱粉紙包服，或 Pulver in Oblaten oder
 瀉於水服之。 Wasser z. n.

主治 膀胱炎，腎盂炎，腎石症，痛風，急性
 傳染病恢復後有攜菌之疑者。

說明 本方可伍重碳酸鈉用之，亦可配製水
 劑。

第 245 方

新烏羅脫羅品	Neu-Urotropin	
(=海耳密安耳)	5.0 (=Helmitol)	5.0
餾 水	80.0 Aq. destill.	80.0
覆盆子糖漿	Sirup. Rub. Id. ad 100.0	
加至	100.0	

右混和一日四回， M. D. S. 4 mal Tgl.
 一回一茶匙。(小 1 Teelöffel (Für Kind)
 兒用)

主治 與前方同。

說明 烏羅脫羅品與新烏羅脫羅品均有製成錠
 劑一錠含 0.5，一日三回，一回一片。

第 246 方

薩羅耳 Salol.
 (=柳酸因基) 0.3-0.5 (=Phenyl. salicylic.)
 0.3-0.5

右給同量十二包， D. tal. dos. No. 13
 一日三四回，一回 S. 3-4 mal tgl. 1
 一包。 Pulver.

主治 膀胱炎，腎盂炎。

說明 本品每與烏羅脫羅品併用，或交代用之。

第 247 方

熊果葉煎劑 8.0:90.0 Decoct. Fol. Un. Urs.
 8.0:90.0

糖漿 加至 100.0 Sirup. simpl. ad 100.0
 右一日三回分服。 D.S. 3 mal in 1 Tage z. n.

主治 諸種膀胱疾病及腎臟疾病，淋疾。

說明 本劑有尿防滯作用外兼有利尿之效。

本方可伍下列諸藥。

1. 醋酸鉀液 Liq. Kal. acetic. 一回量 2.0—10.0
2. 烏羅脫羅品 Urotropin. 一回量 0.5—1.0
3. 薩羅耳 Salol. 一回量 0.5—1.0—2.0
4. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 一回量 0.5—2.0
5. 番木鱈醇 Tinct. Strychn. 一回量 5—20 滴
6. 鹽酸嗎啡 Morphin. muriat.

一回量 0.001—0.005—0.03

7. 溴化鉀 Kal. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0

8. 溴草酊 Tinct. valerian 一回量 0.5—1.5

9. 莨菪浸膏 Extract. Scopol. 一回量 0.02—0.05

第 248 方

古巴香脂 0.5 Balsam. Copaiv. 0.5

右盛以膠囊與同量 D. ad caps. gelatinos tal.

三十個，一日六回 dos. No. 30

，一回一個，食後 S. 6 mal tgl. 1 Kapseln.

服。 n. d. Essen.

主治 慢性膀胱炎，淋疾。

說明 本品易起胃腸障礙及發生蕁麻疹等副作用，久服須注意胃腸。

第 249 方

古巴香脂 Balsam. Copaiv.

芳香酊 各 7.0 Tinct. aromat. āā 7.0

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.

一回十五滴。 15 Tropfen.

主治 與前方同。

第 250 方

古巴香脂 5.0 Balsam. Copaiv. 5.0

熾製錐 適宜 Magn ust. d.s.

右混和為丸五十粒 ut f. pil. No. L.

，一日三回，一回 S. 3 mal tgl. 5 Pillen.

五粒。

主治 與前方同。

第 251 方

白檀油 0.3—0.5 Ol. Santal. 0.3—0.5

右盛入膠囊與同量 D. ad caps. gelatinos.

三十個，一日三回 tal. dos. No. 30

，一回一個。 S. 3 mal tgl. 2 Pillen.

主治 與前方同。

說明 白檀油製劑甚多，茲舉其二三於下。

- 哥那生 Gonosan. 爲膠囊劑，每個含白檀油 0.24，一日三回，一回一二個。
- 生替耳 Santyl. 一日三回，一回 20 滴，爲膠囊或和於牛乳中服之。
- 替雷橫耳 Thyresol. 一日三回，一回二十滴，和水或牛乳服，有製成錠劑，每片含 0.3，一日三回，一回一二片。
- 阿羅生 Allosan. 一回 0.5—1.0，一日數回，爲散或錠劑用之。

第 252 方

菓澄茄末 50.0 Pulv. Fruct. Cubebar. 50.0

右一日三回，一回 D. S. 3 mal tgl.

一刀尖，澱粉紙包 1 Messerspitze

服。 in Oblaten z. n.

主治 膀胱炎，淋疾。

第 253 方

菓澄茄末 Pulv. Cubebar

古巴香脂 各 10.0 Balsam. Copaiv. 各 10.0

煨製 錘 適量 Magn. ust. q.s.

右混和爲丸百粒， ut. f. pil. No. C.

一日 10—12 粒。 S. Tägl. 10—12 Pillen.

主治 與前方同。

附膀胱或尿道洗滌劑。

a. 1—2%結晶硼酸 Acid. boric. cryst. 液
400.0

b. 0.05%硝酸銀 Argent. nitric. 水 1000.0

說明 本劑應用，宜初淡後漸增濃即由0.05%
漸至0.1—0.15%是也。

c. 0.05%過錳酸鉀 Kal. permanganic. 液
500.0

d. 0.1%柳酸 Acid. salicylic. 液 500.0

說明 以上各液，均有防腐收斂作用，可為膀
胱炎或尿道炎之洗滌料，洗滌須由醫師行
之。

【附記】 少量之硼酸粉，磺胺劑，(如Sulfan-
ilamide, Sulfathiazole, Sulfadiaz-
ine 等) 青黴素 (Penicillin) 黃色素
(Trypaflavin) 等均可作為尿道防腐及
消毒劑。詳見化學治療劑章。

第 257 方

鹽酸片羅卡品 0.3 Pilccarpin. hydrochloric.
0.3

甘草末及羔 各3.0 Pulv. et Succ. Liquirit.
āā 3.0

右混和爲丸三十粒 ut f. pil. No. 30

，一日三回，一回 S. 3 mal tgl tgl.

一粒。 1 Pillen.

主治 與前方同。

第 258 方

柳酸鈉 Natr. salicylic.

阿司必林 Aspirin.

說明 此二藥亦常用爲發汗劑，以治感冒，風
痺諸症，其用法，處方可參看解熱劑章。

第 259 方

精製樟腦 0.3 Camphor Depureta 0.3

乳 糖 1.0 Sacch Lact. 1.0

一日三次分服 S. 3×1

主治 感冒，風痺症而有心臟衰弱現象者。

說明 此藥之發汗作用因其直接刺激發汗中樞
之故。

第二十一章 止汗劑 Anthidōtica.

第 260 方

硫酸阿托品 0.005 Atropin. sulfuric. 0.003
 白陶土 適量 Bol. alb. q.s.
 右爲丸二十粒，分 ut i. pil. No. 20.
 晚服一二粒。 D. S. Abends 1—2 Pillen.

主治 肺癆盜汗，其他發汗過多症。

說明 本方一丸中含硫酸阿托品 0.00025，爲一個極量 1/4 故一回用量不可逾四粒。

第 261 方

硫酸阿托品 0.01 Atropin. sulfuric. 0.01
 巴旦杏仁水 10.0 Aq. Amygdal. amar. 10.0
 右盛以滴瓶，晚服 D. ad vitr. guttat.
 十滴。 S. Abends 10 Tropfen.

主治 與前方同。

說明 硫酸阿托品可製 0.05% 溶液爲皮下注射，一回一筒，亦有製成安甦劑。

第 262 方

阿加利進 0.1 Agaricin. 0.1
 杜氏散 2.0 Pulv. Dover. 2.0
 乳 糖 3.0 Sacchar. lact. 3.0
 右混和均分十包， M. f. pulv. div. in part.
 就床前服一二包。 aeq. No. X. S. Vor dem
 Schlafengehen 1 2 Pulver.

主治 肺癆盜汗。

第 263 方

- (=福爾買林) 100.0 (=Formalin.) 100.0
 右取二匙匙和水一 S. 2 Esslöffelvoll auf 1 L.
 立脫爲足浴。 Wasser zum Fussbad.
- 第 268 方
 坦諾切 10.0 Tannolorm. 10.0
 右爲散布料。 D. S. Streupulver.
 主治 發汗過多症，惡臭汗，腋臭，火傷，燙傷。
- 第 269 方
 醋 10.0 Acetona 10.0
 右加倍量水爲洗滌料。 S. Mit Wasser auf doppelt verdünnt zum Waschen.
 主治 盜汗，汗過多症。
- 第 270 方
 東良岩浸膏 0.02 Ex. Scopolia 0.02
 乳 糖 0.2 Sacch Lact 0.2
 一次頓服。 S. one dose. At Bedtime
 主治 各種盜汗。
- 第 271 方
 乳酸鈣 1.0 Calcium Lact 1.0
 臨睡一次頓服。 S. one dose. At bed time.
 主治 盜汗。
 說明 由副交感神經之興奮起因之盜汗，可應用之。
- 第 272 方
 鞣酸 5.0 Acid Tannic 5.0
 餾水 加至 100.0 Aq. ad. 100.0
 塗擦用 For Rub.
 主治 發汗過多症，臭汗，腋臭。

第二十二章 止血劑 Haemostyptica.

第 273 方

白明膠	10.0—20.0	Gelatin. alb.	10.0—20.0
調 水	180.0	Aq. destill.	180.0
食 鹽	2.0	Natr. Chlorat.	2.0
樟皮水	加至 200.0	Aq. Cinnamon.	ad 200.0

右混和一日六回， M. D. S. 6 mal tgl.

一回一食匙。 i Esslöffel

主治 各種出血症，如咯血，衄血，腎出血，
子宮出血，初生兒惡吐症，出血素質。

本方可伍下列諸藥。

1. 乳酸鈣 Calc. lactic. 一回量 0.5—1.0—3.0
2. 氯化鈣 Calc. Chlorat. 一回量 0.5—1.0—2.0
3. 鹽化腎上腺素液 Sol. Adrenalin hydrochlor. (千倍) 一日 1.0
4. 阿片酊 Tinct. Opii 一回量 5—10—20 滴

第 274 方

白明膠	5.0—10.0	Gelatin. alb.	5.0—10.0
鹽 水	100.0	Aq. destill.	100.0
食 鹽	0.8	Natr. chlorat.	0.8

右混和爲灌腸料。 M. D. S. zu klystieren

說明 病人不能內服時，施此灌腸。

第 275 方

10%滅菌	10.0—40.0	Liq. Gelatin alb. steril	
白明膠液	(10%)	10.0—40.0	

右爲皮下或肌內注 S. Subkutan od.
射。 intramuskulör.

主治 各種內出血症。(參看上文第221方)

說明 本品有由藥廠製成，盛以玻璃管，每管
10.0 或 40.0，有更伍以他項止血藥，如
阿那普托膠 Anaptol-Gelatin. (有 10.0
及 20.0 兩種) 是也，用時溫至攝氏 37
度使溶解，行皮下或靜脈內注射，皮下注
射部位，以背部，胸部爲宜。

鈣奇內 Kalzine. 爲5%氯化鈣與10%
白明膠之抱合體，一回5.0—10.0 皮下注
射。

第 276 方

氯化鈣	3.0—10.0	Calc. chlorat.	3.0—10.0
薄荷水	10.0	Aq. Menth.	10.0
餾水	加至 100.0	Aq. destill.	ad 100.0

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.
一回一食匙。 1 Esslöffel.

主治 各種出血症，蕁麻疹，皮膚搔癢症，喘
息，小兒痙攣。

第 277 方

結晶氯化鈣	2.0	Calc. chlorat. crystalisat.	2.0
餾水	20.0	Aq. destill.	20.0

右滅菌，爲靜脈內 D. S. Steril. zur intravenös.
注射一回5.0—10.0 Injektion. 5—10. c.c.
主治 與前方同。

說明 本劑有製成各種濃度之安甌劑販賣。
本劑皮下注射有疼痛，惟其1%溶液，
亦可行於皮下。

第 278 方

乳 酸 鈣 3.0—5.0 Calc. lactic. 3.0—5.0
右一日量數回分服。S. Mehrm. in 1 Tage z. n.
主治 與前方向。
說明 本品亦可製水劑用之，有製就鈣劑販賣，
每片含 0.25

第 279 方

食 鹽 50.0 Natr. chlorat. 50.0
右一日數回，一回 D. S. Mehrm. tgl. 1
一茶匙，和微溫湯 Teelöffelvoll in 1 Tasse
一杯服。 Warmwasser z. n.
說明 此為家庭藥，用於咯血及其他出血症。

第 280 方

醋酸鉛(鉛糖) 0.1—0.2 Plumb. acetic. 0.1—0.2
阿 片 末 0.05 Pulv. Opii 0.05
乳 糖 1.5 Sacchar. lact. 1.5
右混和均分三包， M. f. pulv. div. in part.
一日三回，一回一 aeq. No. 3 S. 3 mal tal.
包。 1 Pulver.
主治 各種內出血症。

第 281 方

麥角 5.0 8.0:180.0 Inf. Secal. Cornut.
浸膏 5.0—8.0:180.0
桂皮糖漿 加至 200.0 Sirup. Cinnamom. ad 200.0

右混和一日數回， M. D. S. Mehrm. tgl.
一回一食匙。 1 Esslöffel.

主治 與前方向同。

說明 麥角之止血作用，特著於子宮出血。
麥角須妥為貯藏，如經過一年以上者，
其效遂不確。

本方可伍下列諸藥。

1. 鹽酸嗎啡 Morphin. Muriat.
一回量 0.001—0.005—0.03
2. 鹽酸海洛因 Heroin. hydrochloric.
一回量 0.002—0.005
3. 磷酸可待因 Codem. phosphoric.
一回量 0.005—0.02—0.03
4. 杏仁水 Aq. Lauro-Ceras. 一回量 0.5—
1.0—1.5
5. 阿片酊 Tinct. Opii 一回量 5—10—20 滴
6. 蘇草酊 Tinct. Valerian. 一回量 0.5—1.0
7. 莨菪浸膏 Extract. Scopol. 一回量 0.02—
0.03
8. 番毛地黃劑 Digitalis-Praeparate.
9. 硫酸鎂 Magn. sulfuric. 一回量 5.0—10.0
—30.0
10. 稀鹽酸 Acid. hydrochloric. dilat.
一回量 0.2—0.5
11. 苦酊 Tinct. amar. 一回量 0.5—2.0
12. 芳香酊 Tinct. aromat. 一回量 1.0—3.0
13. 橙皮酊 Tinct. cort. aurant. 一回量 1.0

—4.0

第 282 方

麥角浸膏	1.0	Extract. Secal. Cornut.	1.0
乳 糖	2.0	Sacchar. lact.	2.0

右混和均分五包，
 一日數回，一回一
 包。

主治 與前方同。

說明 麥角浸膏亦可為水劑，並可配伍前方下
 所列諸藥。

第 283 方

麥角流膏	20.0	Extract. Secal. Cornut.	
		fluid.	20.0

右一日三回，一回 D. S. 3 mal tgl.

15—20 滴，和水 15—20 Tropfen in

服。 Wasser z. n.

主治 與前方同。

第 284 方

受爾哥汀錠	10 片	Ergotin Tabletten,	X.
-------	------	--------------------	----

右一日數回，一回 D. S. Mehrm. tgl.

一二片。 1—2 Tabletten

說明 本錠劑每片含 0.25，與麥角 1.0 相當
 ，又其注射液安甌劑，有安甌 (cc. 皮下
 注射。

第 285 方

金印草流膏	10.0	Extract. Hydrastis. fluid.	
		10.0	

右一日三回，一回 D. S. 3 mal. tgl.
 15—30滴，和糖水 15—30 Tropfen in
 服。 Zuckerwasser z. n.

主治 子宮出血及其他內出血。

第 286 方

鹽酸金印 10 片 Hydrastinin. hydrochl.
 草蓼錠 Tablett. X.

右一日數回，一回 D. S. Mehrm. tgl. 1
 一片。 Stück.

主治 與前方同。

第 287 方

鹽酸可塔寧錠 Cotarnin. hydrochl.
 (司替撥替新) Tablett. (=Stypt.cin)

右給一管 20 片， D. 1 O. P. zu 20
 每片含 0.05 一日 Tabl. je 0.05
 三回，一回二片。 S. 3 mal tgl. 2 Stück.

第 288 方

鹽化腎上腺素液 5.0 Sol. Adrenalin. hydrochl.
 (千倍) (1:1000) 5.0

右一日數回，一回 D. S. Mehrm. tgl.
 10—15滴，和水服 10—15 Tropfen
 (或以 1/2—1/5 1/2—1/5 in Wasser z. n.
 筒皮下注射)。 (oder 1/5—1/2 Subkutan)

主治 各種內出血症。

說明 本藥內用止血之效不確，外用止血時以
 棉花塞鼻腔。

第 289 方

氯化高鉄液 1.0 Lig. Ferr. sesquichlorat.
1.0

糖 漿 30.0 Sirup. siml. 30.0

右一日數回，一回 D. S. Mehrm. tgl. 1
一茶匙，和水一杯 Tee. öffelvoll in 1 Tasse
服用。 Wasser z. n.

主治 胃腸出血。

說明 氯化高鉄液內用止血，效亦不確，表面
出血如衄血，以綿球浸擦布之有效。

第 293 方

可阿古連(安甌)(3%) Coagulen Amp.(3%)

右給五安甌各含 S. 1 O. P. zu 5 Amp.
5 cc. 一日數回， je 5 cc. S Mehrm. tgl.
一回一管，爲皮下 1 Amp. zur subkntan.
注射。 Injekt.

主治 各種內出血症。

說明 可阿古連安甌劑有三種，即 20cc. 一安
甌裝包，1.5cc. 五安甌裝包，3cc. 五安
甌裝包，(均爲 3% 液)。

此外有錠劑，散劑，錠劑每管五片裝包
，散劑爲 2.5 一小瓶及 10.0 一瓶兩種裝
包，惟錠散亦不可爲內服用，須依照其規
定方法溶化後，乃可內服，故不如取其變
成注射液之安甌劑，以爲內服之爲便也。

本劑安甌中見有沉澱物時，於未開管之
前放入熱湯內，10—15 分時間，即溶化
矣。

本劑成分由動物血及製血器官中抽出。此外下列二者，亦為臟器製劑之止血藥。

- a. 克郎台 Clauden. 自肺臟抽出，通常用其 5% 溶液為皮下或肌內注射，一日可 1—3 回。有安甌劑。
- b. 奧朴司坦汀 Opostatin. 自脾臟抽出，有安甌劑，一安甌 2cc. 為皮下或肌內注射。

可阿古運，克郎台，奧朴司坦汀均可內服及外用，外用方法，或以消毒紗布浸貼出血部或以其粉末散布，加以壓定繃帶。

第 291 方

得羅保根 1.0 Thrombogen 1.0

一日三次分服 S. 3×1

主治 各種內出血症。

說明 本品係動物腦，脾，肺臟之抽出劑，有注射劑，粉劑，錠劑等。

【附註】 嗎啡，鴉片等能使血壓下降，且有鎮靜作用，故多用於各種內出血症，惟劑量宜小不宜大。腎上腺素，腦垂體素等能收縮血管，亦可用於各種出血症，但有時則因其收縮血管適足以增加血壓，以致出血反有增劇之虞，故用時不可不慎。腎上腺素用為局部止血劑如鼻衄血時，則無此流弊。

第二十三章 補血劑及強壯劑

Haematica et Roborantia

第 292 方

還原鐵	0.2 Ferr. reduct.	0.2
乳 糖	1.0 Sacchar. lact.	1.0

右混和均分三包， M. f. pulv. in part. aeq.
 一日三回，一回一 No. 3 S. 3 mal tal. 1
 包，食後服。 Pulver n. d. Essen.

主治 各種貧血症。

說明 凡鐵劑均宜食後服，服後忌茶及果實與含碳酸物。此外熱性病人，血行器器質疾病，及有咯血傾向者均忌服。

本方可伍鷄納皮末，或薄荷油糖用之。

第 293 方

還原鐵丸	Pilulse Ferri reducti.	
還原鐵	3.0 Ferr. reducti.	3.0
歐龍膽根末	0.6 Rad. Gentian. pulverat.	0.6
歐龍膽根浸膏	1.8 Extract. Rad. Gentian.	1.3

右混和爲丸三十粒 ut f. pil. No. 30.

，一日三回，一回 S. 3 mal tgl.

二粒。 2 Pillen.

主治 與前方同。

說明 本方之還原鐵調換乳酸鐵，或枸橼酸鐵時，則稱乳酸鐵丸 Pilulae Ferri lactici 或枸橼酸鐵丸 Pilulae Ferri citrici.

奎 鐵 丸		Pilulae Ferri et Chinini.
還 原 鐵		Ferr. reduct.
鹽 酸 奎 寧	各1.5	Chinin. hydrochloric. $\bar{a}\bar{a}$ 1.5
龍 膽(根)浸膏	適量	Extract. Gentian. scabr.
		q.s.

右混和爲丸三十粒 ut f. pil. No. 30.

，一日三回，一回 D. S. 3 mal tgl.

一二粒。 1—2 Pillen.

主治 與前方同。

第 295 方

砒 鐵 丸		Pilulae Ferri arsenicosi
還 原 鐵	1.8	Ferr. reduct. 1.8
亞 砒 酸	0.03	Acid. arsenicos. 0.03
黑 胡 椒 末		Piperis nigri pulverat.
甘 草 末	各0.9	Rad. Liquirit pulverat.
		$\bar{a}\bar{a}$ 0.9

亞拉伯樹膠漿 1.3 Macilag. Gummi. arad. 1.3

右混和爲丸三十粒 ut f. pil. No. 30.

，一日三回，一回 D. S. 3 mal tgl.

二粒。 2 Pillen.

主治 各種貧血症。

第 296 方

糖 漿 炭 酸 鐵	10.0	Ferr. carbonic. saccharat.
	10.0	

鷄 納 皮 末 5.0 Cort. Chin. pulverat. 5.0

右混和盛以盒子， M. f. pulv. dc. ad. scnt.

一日三回，一回一 S. 3 mal tgl. 1 messersnitze

刀尖，糖水送服。 in Zuckerwasser.

主治 病後恢復期之貧血症。

第 297 方

精製碳酸鐵		Ferr. carbonic. saccharat.	
白 糖		Sacchar. alb.	
重碳酸鈉	各 5.0	Natr. bicarbonic.	āā 5.0
(沒 藥	3.0)	(Myrrhae	3.0)
大 黃 末	3.0	Pulv. Rhizom. Rhei	3.0

右混和，盛以盒子 M. f. pulv. dt. ad Scat.

，一日三回，一回 S. 3 mal tgl.

一刀尖。 1 Messerspitze.

主治 各種貧血症。

第 298 方

乳 酸 鐵	1.0	Ferr. lactic.	1.0
乳 糖	10.0	Sacchar. lact.	10.0

右混和爲散，一日 M. f. pulv.

三回，一回一刀尖。 S. 3 mal tgl. 1 Messerspitze.

主治 與前方同。

第 299 方

硫酸低鐵	4.5	Ferr. sulfuric.	4.5
煨製鐵		Magn. ust.	
甘 油	各 0.6	Glycerin.	āā 0.6

右混和爲丸三十粒 ut f. pil. No. 30.

，一日三回，一回 S. 3 mal tgl. 2 Pil'en.

二粒。

主治 與前方同。

第 300 方

李勞德氏丸	Pilulae Blaudi.		
乾燥硫酸鐵	9.0 Ferr. sulfuric. sicc.	9.0	
炭 酸 鉀	7.0 Kal. carbonic.	7.0	
歐蜀葵根末	1.0 Rad. Althaeae pulverat.	1.3	
煨 製 鎂	0.7 Magn. ust.	0.7	
甘 油	4.0 Glycerin	4.0	

右混和爲丸百粒， ut. f pil. No. C.
 一日三回，一回二 S. 3 mal tgl. 2—3
 三粒。 Pillen.

主治 貧血兼便秘。

第 301 方

蘆薈鐵丸	Pilulae Aloës et Ferri.		
乾燥硫酸鐵	Ferr. sulfuric. sicc.		
蘆 薈 末	各 2.5 Aloës pulverat.	āā 2.5	
酒 精	適量 Spirit.	q.s.	

右混和爲丸五十粒 ut f. pil. No. L.
 ，一日三回，一回 D. S. 3 mal tgl.
 一二粒。 1—2 Pillen.

主治 與前方同。

第 302 方

蘋果鐵酞	Tct. Ferr. pomat.		
大 黃 酞	Tct. Rhei		
(或苦酞)	各 20.0 (S. Tct. amar.)	āā 20.0	
右混和一日三回，	M. D. S. 3 mal tgl.		
一回 20 滴，和水	20 Tropfen in Wasser		
服。	z. n.		

主治 各種貧血症兼消化不良症。

第 303 方

砒 鐵 酞	Tincturae Ferri arsenicalis	
鱘 葉 鐵 酞	15.0 Tinct. Ferr. pomat.	15.0
亞 砒 酸 鉀 液	Liq. kalii arsenicos.	
(= 否 雷 耳 氏 水)	5.0 (=Sol. Fowler)	5.0

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.
 一回 3—12 滴，自 3—12 Tropfen
 少量新增又漸減 in allnählich steigender
 u. wieder fallender dosis.

主治 慢性貧血症。

說明 本方兩藥有時以 12 : 3 之比較製之，尋常鱘葉鐵酞一回 10—40 滴，否雷耳氏水一回 2—6 滴。

第 304 方

枸 橼 鐵	Ferr. citric. oxydat.	
重 炭 酸 鈉	Natr. bicarbonic.	
乳 糖	各 10.0 Sacchar. lact.	aa 10.0

右混和爲散，一日 M. D. S. 3 mal tgl.
 三回，一回一刀尖。1 Messersoitze.

主治 各種貧血症。

第 305 方

鐵 酒	50.0 Vin. Ferri	50.0
-----	-----------------	------

右一日數回，一回 D. S. Mehrin. tgl.
 一食匙服用。 1 Esslöffel.

主治 與前方同。

第 306 方

精製碳化鐵 0.1 Ferr. jodat. saccharat. 0.1

乳 糖 0.5 Sacchar. lact. 0.5

右混和爲散給同量 M. f. pulv. D. tal. dos.

十包以蠟紙包之， No. X. ad Chart. cerat.

一日三回一回一包。 S. 3 mal tgl. 1 Pulver.

主治 梅毒性或腺病性貧血。

第 307 方

碘化鐵糖漿 9.0 Sirup. Ferr. jodat. 9.0

糖 漿 9.0 Sirup simpl. 9.0

鑿 水 加至100.0 Aq. destill. ad 100.0

右一日量三回分服。 D. S. 3mal in 1 Tage z. n.

主治 與前方同。

說明 欲久服時可給碘化鐵糖漿 52.0 令一回

服 20 滴，一日三回和糖水服之，小兒一

歲以內一回 2—4 滴，二至五歲一回 4—8

滴，六至十二歲一回 8—15 滴，各一日數

回。鐵劑除上列諸方者外尚有多種茲舉其

要於下。

a. 蛋白鐵液 Liq. Ferr. albuminat. 一回一二茶匙，一日三四回，和水或牛乳服。

b. 非拉汀 Ferratin. 爲鐵蛋白化合物，爲散劑或錠劑，散劑一回 0.5—1.5，澱粉紙包服，錠劑每片 0.25 一回 2—4 片，用於萎黃病及其他貧血症。

c. 非拉安才 Ferratose. 爲非撒汀溶液，一回一食匙，一日三四回。

- d. 碘非拉妥才 Jodferratosc. 與糖漿碘化鐵類似，主治亦同，一回一食匙，一日三四回。
- e. 孛路妥才 Blutose. 爲有機性鐵化合物之鹼性液一回一茶匙乃至一食匙，一日三四回。
- f. 脫利非林 Triferrin 用量一回 0.3，一日三回，爲散劑或錠劑用之，其溶液稱脫利非羅耳 Triferrol. 一回一食匙，一日三回，爲水劑用之。

此外屬於鐵劑由動物血液製出者，爲數亦夥，茲舉其名稱，以資參攷。

- (a) 海苜羅彬 Haemoglobin. 一回 1.0—3.0 和糖水服。
- (b) 海邁妥該 Haematogen. 一回 1—3 茶匙，和葡萄酒服。
- (c) 海苜耳 Haemol 一回 0.1—0.5 爲散，丸錠劑服用。
- (d) 海邁耳部明 Haemalbumin. 一回 3.0—4.0 溶水服之。
- (e) 海邁妥烹 Haematopan. 一回一刀尖，和牛乳服。

第 308 方

亞細亞丸	Pilulae asiaticae.	
亞砒酸	0.05 Acid. arsenicos.	0.03
黑胡樹末	1.0 Piperis. nigr. pulverat.	1.5
甘草末	3.0 Rad. Liquirit. Pulverat.	3.0

亞拉伯樹膠漿 適量 Mucilag. Gumm. arab. q.s.

右混和爲丸五十粒 ut f. pil No. L.

，一日二三回，一 S. 2—3 mal tgl.

回一粒。 1 Pillen.

主治 慢性貧血，慢性營養障礙，重病衰弱狀態。

第 309 方

亞砒酸 0.2 Acid. arsenicos. 0.2

還原鐵 10.0 Ferr. reduct. 10.0

鹽酸奎寧 2.5 Chinin. hydrochloric. 2.5

番木鱉浸膏 1.0 Extract. Strychn. 1.0

甘草末及蒸 各適量 Pulv. et Succ. Liquirit.

aa q.s.

右混和爲丸二百粒 ut f. pil. No. 200.

，一日三回，一回 D. S. 3 mal tgl. 1 Pillen

一粒，漸增量至一 allnählich steigend auf 3

日三回，一回二粒 mal tgl. 2 und wieder

，後又漸減。 fallend.

主治 與前方同。

說明 以上二方，其一丸中含亞砒酸 0.001，與谷雷耳氏水三滴相當，亞砒酸用量，一回極量 0.005，一日極量 0.015，凡亞砒酸劑在食前一刻時服爲宜。

砒鐵療法，通常以六星期間爲一治療期，達一期時須停服三四星期再行依法服用。

連續服用之時，須時時注意其中毒症狀

，如胃腸炎，結合膜炎，支氣管炎，末梢神經麻痺等症。

第 310 方

亞砷酸	0.1	Acid. arsenicos.	0.1
乳酸鐵	10.0	Ferr. lactic.	10.0
番子地黃葉末	2.5	Pulv. Fol. Digital.	2.5
甘草末及羔	各適量	Pulv. et Succ. Liquirit.	
		aa q.s.	

右混和爲丸百粒， ut f. pil. No. C.

一日三回，一回一 D. S. 3 mal tgl.

粒。 1—2 Pilen.

主治 貧血兼心臟擴張症。

第 311 方

舌雷耳氏水	0.5	Liq. Fowler.	0.5
苦酞	1.0	Tinct. amar.	1.0
糖漿	10.0	Sirup. simpl.	10.0
蒸餾水	加至100.0	Aq. destill.	ad 100.0

右混和一日三回分 M. D. S. 3 mal in 1

餐。 Tage z. n.

主治 惡性貧血，白血病，惡液質，慢性瘧疾，惡性癩疾，慢性皮膚可，舞蹈病諸症。

說明 舌雷耳氏水爲亞砷酸之代用品，可添加苦酞，複方鵝納酞，桂皮水，薄荷水之任何一種爲單純之方劑，亦可伍下列諸藥。

1. 蘋果鐵酞 Tinct. Ferr. pomat.

一回量 1.0—2.0

2. 蛋白鐵液 Liq. Ferr. albuminat.

一回量 3.0—5.0

3. 番毛地黃酊 Tinct. Digital. 一回量 5—20 滴
4. 溴化鉀 Kal. bromat. 一回量 0.5—1.0—2.0
5. 纈草酊 Tinct. Valerian. 一回量 0.5—1.5
6. 杏仁水 Aq. Lauro Ceras. 一回量 0.5—1.0—1.5
7. 碘化鉀 Kal. Jodat. 一回量 0.1—0.5—1.0
8. 鷄納酊 Tinct. Chinase. 一回量 2.0—4.0

第 312 方

託拿福賜芬 1c.c. Tonophosphan 1c.c.

肌肉注射。 For intramuscularly

主治 軟骨症，貧血，結核，虛弱，神經衰弱等。

說明 本品係一種磷製劑，拜耳藥廠出品。

第 313 方

亞砷酸 0.1 Acid. arsenicos. 0.1

鹽酸奎寧 1.0 Chinin. hydrochloric. 1.0

歐龍膽末 各 2.5 Pulv. et Extract.

及浸膏 Gentian. 各 2.5

右混和爲丸五十粒 ut f. pil. No. L.

，一日二回，一回 D. S. 2 mal tgl.

一粒。 1 Pillen.

主治 慢性瘧疾，瘧疾惡液質。

第 314 方

咖可地爾酸鈉 0.5 Natr. kakodylic. 0.5

白陶土 適宜 Bol. alb. 適宜

蜜混和爲丸二十粒 ut f. pil. No. 20.

一日 1—5 粒。 S. 1—5 Pillen tgl.

主治 白血病，舞蹈病，乾癱，貧血症，惡性瘧疾。

說明 噶可地爾酸鈉含有砒素 54%，作用與亞砒酸相峙，而害胃腸之弊較微，故適於治療用。

噶可地爾酸鈉有注射安甌劑，其內容濃度不一，有 0.01, 0.03, 0.05, 0.1 四種，且有一盒二十安甌，置各種濃度者，適於砒素療法增減之順序，如由 0.01 漸至 0.1，再減至 0.01 是也，此爲弱療法，由增減至 0.15 謂之強療法，無謂弱療法強療法均隔日或隔數日一針。

砒素劑注射液安甌種類頗多，有爲單味砒素者，有伍番木鱉素或兼伍以甘油磷酸鈣者如所拉純 Solarson，奧柏泰純 Optarson，阿司托寧 Astonin 愛司法 (Esfar)，補爾神 (Blusen)，奧福神 (Orphosen)，阿沙松 (Arsozon) 等，大都一安甌內容爲 ic.c. 一盒十二安甌。

第 315 方

葉片酸 15 Mg. Folie Acid 15 Mg.
肌肉注射。 For m. inj.

主治 巨血球性貧血，斯潑慮等。

說明 葉片酸治療貧血爲最近之發明，現時中外製品甚多，大都用於注射，亦有製成片

劑內服者。

第 316 方

縮提肝膏 1c.c. Liver Extract conc. 1c.c.
肌肉注射 For M. Inj.

主治 惡心貧血等。

說明 依照美國藥典，每公撮含 15 單位，繼續注射兩日，十日後再注射 1 公撮。普通貧血每半個月注射 1 公撮已足。

第 317 方

肝 膏 1c.c. Liver Extract 1c.c.
肌肉注射 For M. Inj.

主治 各種貧血症。

說明 每 c.c. 含 1 單位及 2 單位，每 1—2 日注射 1c.c.，至血象正常為止。

第 318 方

肝 補 選 2c.c. Campolen 2c.c.
肌肉注射 For M. Inj.

主治 各種貧血症。

說明 每 1—2 日注射 2c.c.。

肝臟製劑甚多，國產品中有力佛肝 (Livex) 利凡命 (Livemin) 等。如能生食牛肝或羊肝每日公 25—50 分，則其效更佳。

第 319 方

磷 0.01 Phosphorus, 0.01
肝 油 100.0 Ol. jecoris Aselli 100.0

右混和一日一二回 M. D. S. 1—2 mal tgl.

，一回一茶匙。 1 Teelöffel.

主治 佝僂病，骨軟化症，生骨困難症。

說明 磷之用量，一歲以內小兒一回 0.0001，
二至五歲小兒一回 0.0002—0.0003，六至
十二歲小兒一回 0.0003—0.0005，大人一
回 0.0005—0.001。

第 320 方

沉降磷酸鈣	7.5 Calc. phosphoric.	
	praecipit.	7.5

沉降碳酸鈣	16.0 Calc. carbonic.	
	praecipit.	16.0

乳 酸 鐵	1.5 Ferr. lactic.	1.5
-------	-------------------	-----

乳 糖	25.0 Sacchar. lact.	25.0
-----	---------------------	------

右混和盛以盒子， M. f. pulv. D. ad sact.

一日三回，一回一 S. 3 mal tgl. 1

刀尖。 Messerspitze.

主治 貧血，佝僂病，骨軟化症，骨折，結核
，授乳婦。

第 321 方

甘油磷酸鈣	2.0 Calc. glycerophosphoric.	
	2.0	

(或甘油磷酸鈉	5.0) (Natr. glycerophosphoric.	
	5.0)	

醫 水	200.0 Aq. destill.	200.0
-----	--------------------	-------

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.

一回一食匙。 1 Esslöffel.

主治 衰弱狀態，神經衰弱。

說明 治瘰癧上應用極廣，無機磷化合物外，近更用有機性磷化合物，茲舉其一二於次。

- a. 歐奇林 Eu'irin. 粉末狀，含磷 17%，用是一回 0.5 一日三回，為散劑用之，或為錠劑，膠囊劑用之。
- b. 菲蒂 Phytin. 為植物性磷質，粉末狀，一回 0.5 一日二回，食前服，此外有錠劑每片含 0.25，一回二片，一日二回，及膠囊劑每個含 0.25，一日二回，一回二個。

第 322 方

所買安司	15.0	Somatose	15.0
一日三次分服	S. 3×1		
主治	各種虛弱症。		
說明	製成之蛋白質。		

第 323 方

鷄納皮煎劑	Decoct. Cort. Chin.
說明	鷄納皮製劑參看健胃劑第 27 方及第 30 方。

第 又 方

肝油	100.0	Ol. Jecoris Aselli	100.0
右一日二三回，一	D. S. 2—3 mal tgl.		
回一食匙。	1 Esslöffel		
主治	初期結核，腺病，佝僂病，眼乾燥症，夜盲症。		

說明 肝油爲滋補藥，故爲強壯劑用之，用量一回一歲以內約 5.0，二至五歲約 10.0，六至十二歲約 15.0，大人 15.0—30.0 一日可二三回，發熱，胃腸炎，瘧疾等時忌服。

肝油可伍磷 Phosphorus. 木焦油 Kreosot, 碘化鐵 Ferr. jodat. 麥芽糖 Extract. Malti 等服之，又因其味不佳，可和於茶，牛乳，薄荷水中服之。

第 324 方

保利他命 6.0 Polytamin 6.0
一日三次分服 S. 3×1

主治 各種貧血，胃病，衰弱症。

說明 本品係亞米諾酸製劑，尚有含碘保利他命 (Jod Polytamin)，規那保利他命 (China Polytamin)，信石保利他命 (Arsen Polytamin) 等。

第 325 方

散拿吐瑾 15.0—30.0 Sanatogen 15.0—30.0
一日三次分服 S. 3×1

主治 各種衰弱症及貧血。

說明 本品係乳酪及甘油磷酸鈉之製成品，通常多沖入牛乳中作爲補品。

第 326 方

海而平 1c.c. Helpin 1c.c.
肌肉注射 For M. Inj.

主治 貧血，衰弱，結核病。

說明 係一種油狀注射液，每日注射一次，至病體恢復為止。

第 327 方

胖得榮 1 瓶 Pantramine 1 bottle
每服一湯匙，日服 3 Tablespoonfuls daily
三次。

主治 貧血，衰弱症。

說明 本品係亞米諾酸合劑，氣味芳芬，極合婦孺之用。

第 328 方

米太通 1 瓶 Metatone 1 bottle
日服 15c.c.，三次 15c.c. Daily
分服。

主治 貧血，衰弱症。

說明 本品係乙種維生素及甘油磷，鈣之合劑。

第 329 方

拍拉托 1 瓶 Platol 1 bottle
日服六茶匙。 6 Teaspoonfuls daily

主治 各種虛弱症。結核。

說明 本品為魚肝油之轉化物及鉀，錳，鈣，奎寧等之次磷酸鹽所合成，同類製品有純淨康幅多，純淨補力多等。

第 330 方

幾怪拍拉托 1 瓶 Platol Compound 1 bottle

日服六茶匙。 6 Teaspoonfuls daily

主治 虛弱兼有呼吸器病者。

說明 本品係由拍拉托中加入幾阿蘇，怪阿蘇二藥以加增其對呼吸系統之力量。同類製品有幾怪康福多，幾怪補力多等。

第 331 方

乳白魚肝油 1 瓶 Cod-Liver-Oil with Hypophosphites 1 bottle

日服三食匙。 3 Tablespoonfuls daily

主治 肺結核，營養不良，佝僂病，夜盲症等。

說明 本品係由魚肝油中加入各種磷，鈣質所合成，味較魚肝油略佳。亦有加入麥芽以成爲麥精魚肝油者。

- 【附記】
1. 滋補劑之製成品甚多，如羅氏大補藥，拜耳健身素等等，以上僅略舉其較爲常用者數種而已。
 2. 補血劑之最常用者爲肝臟製劑，砒，鐵，磷，奎寧，葉片酸等。
 3. 強壯滋補劑最常用者爲各種維他命（詳維他命製劑章）土的年，鈣，碘，魚肝油，亞米諾酸等。

第二十四章 結核劑

Tuberculosemittel.

第 332 方

木焦油	0.3 Kreosot.	0.3
乳糖	2.0 Sacchar. lact.	2.0

右混和均分三包， M. f. pulv. div. in part.
 一日三回，一回 -- aeq. No. 3 S. mal tgl. 1
 包，澱粉紙包服。 Pulver in Oblaten.

主治 呼吸器慢性炎症，結核，此外腸內異常
 發酵，下痢，傷寒等亦用之。

說明 木焦油有製成丸劑，即木焦油丸 *Pilulae
 Kreosot.* 販賣，每丸含木焦油 0.05，一
 日三回，一回 1—3 丸，久服可漸增量至
 一日三回，一回 5—6 丸。

第 333 方

木焦油	1.0—3.0 Kreosot.	1.0—3.0
肝油	200.0 Ol. Jecoris Asell.	200.0

右混和一日二回， M. D. S. 2 mal tal.
 一回一食匙，食後 1 Esslöffel nach den
 服。 Essen.

主治 與前方同。

說明 此二藥亦可為膠囊劑，即以木焦油 0.1，
 肝油 0.3，盛一膠囊，給同量 100 粒，一
 日三回至一回一粒，服一星期後每回增一
 粒，可增至一回五粒，日服 15 粒。

第 334 方

炭酸木焦油	Kreosot. Carbonic.	
(=克遼瑣他耳) 5.0	(=Kreosotal)	5.0
卵黃 1個	Vitell. Ov.	1.
桂皮水 70.0	Aq. Cinnamom.	70.0
右混和爲乳劑，一	M. f. Emulsio.	
日三回，一回一食	S. 3 mal tgl. 1	
匙。	Esslöffelvoll.	

主治 結核，支氣管炎，肺炎，百日咳。

說明 炭酸木焦油較單木焦油爲易服，害胃性亦微，除爲乳劑外，可爲丸劑，可運以其 0.5 和咖啡，牛乳，肝油中服之，一日二三回，久服漸增至一回 1.5，一日 5.0。

木焦油之代用品除炭酸木焦油外，下列數種，亦可採用。

- a. 蘇草酸木焦油 Kreosot. valerianic. 亦稱愛奧瑣脫 Eosotum. 爲無臭味黃色油狀液，用量一回 0.2—0.3 一日二三回，和肝油服，或爲膠囊劑用之。
- b. 普諾伊民 Pneumin. 爲無臭味黃色不溶性粉末，用量一回 0.3—0.5 一日二三回，爲散劑用之。
- c. 番哥耳 Fagol. 爲無味白色粉末，用量一回，0.2—0.5 爲散劑用之，性質平和，常用於結核症外，亦用以治腸內異常發酵。

第 335 方

炭酸癩菌木醇

Gaujaeol. carbonic

(=杜奧他耳) 0.5 (=Duotal.) 0.5
 乳 糖 1.0 Sacchar. lact. 1.0

右混和均分三包， M. f. pulv. div. in part.
 一日三回，一回一 aeq. No. 3 D. S. 3 mal
 包，食後服。 in 1 Tage z. n.

主治 慢性結核，下痢，腸內異常發酵。

說明 桂奧他耳不溶於水，僅可為散劑或散丸劑用之。其丸劑有製成販賣品，每丸含 0.05，一回三粒，一日三回。

本方可伍下列諸藥。

1. 重碳酸鈉 *Natr. bicarbonic.* 一回量 0.5—2.0
2. 煨製礬 *magn. ust.*
一回量 制酸 0.2—0.5，下劑 1.0—5.0
3. 澱粉酶 *Diasase.* 一回量 0.1—0.3
4. 歐龍膽末 *Pulv. Rad. Gentian.*
一回量 0.2—1.0
5. 安替必林 *Antipyrin.* 一回量 0.3—0.5—1.0
6. 阿司必林 *Aspirin.* 一回量 0.5—1.0
7. 霹藍密藤 *Pyramidon* 一回量 0.1—0.5
8. 磷酸可待因 *Codein. phosphoric.*
一回量 0.005—0.02—0.05
9. 抗咳素 *Antitussin (Dihydrocodein)*
一回量 0.01—0.03
10. 鹽酸嗎啡 *Morphin. muriat.*
一回量 0.001—0.005—0.01

11. 鹽酸海洛因 Heroin hydrochloric.
一回量 0.002—0.003
12. 莨菪浸膏 Extract. Scopol.
一回量 0.02—0.05
13. 次硝酸鉍 Bismut. subnitric.
一回量 0.5—1.0—1.5
14. 甘油磷酸鈣 Calc. glycerophosphoric.
一回量 0.5—1.0
15. 次亞磷酸鈣 Calc. hypophosphorosum.
一回量 0.2—0.5
16. 亞砷酸 Acid. arsenicos.
一回量 0.0005—0.002

第 336 方

杜奧他耳	0.8 Duotal.	0.8
次亞磷酸鈣	1.0 Calc. hypophosphoros.	1.0
霹藍密藤	0.4 Pyramidon	0.4
澱粉酶	0.8 Diastase	0.8
歐龍膽末	0.3 Pulv. Rad. Gentian.	0.3

右混和均分三包， M. f. Pulv. div. in part.
一日三回，一回一 aeq. No. 3 S. 3 mal in 1
包。 Tage 1 Pulver.

主治 肺結核，有熱兼消化不良時用之。

第 337 方

癒創木醇磺酸鉀	Kal. sulfogvajacolic.	
(—替奧可耳)	0.5—1.0 (—Thiocol)	0.5—1.0
右爲散，給同量十	f. pulv. D. tal. dos.	
包，一日三回，一	No. X. S 3 mal tgl.	

同一包。

1 Pulver

主治 慢性結核，下痢，腸內異常發酵。
說明 本品可溶於水，故可為水劑。

愈創木醇製劑為數亦夥，茲舉其二三於次。

- a. 須羅靈 Sirolin. 由替奧可耳 10.0 橙皮糖漿 100.0 混和製成，其一食匙約與替奧可耳 4.0 相當，用量一日三回，一回 4.0—8.0 和牛乳或咖啡服，小兒一回 1.0—2.0。
- b. Calc. sulfo-Guajacose. 為愈創木醇磺基酸鈣，用量一日三回，一回一茶匙至 1 食匙。
- c. 桂皮酸愈創木醇 Guajacol. cinnamyllic. 即司替拉可耳 Styracol. 為無色結晶不溶於水，為散劑，一回量 0.5—1.0，一日三回。

第 338 方

替奧可耳	1.0 Thiocol	1.0
莨菪浸膏	0.06 Extract. Scopol.	0.06
溴拉爾	0.6 Bromural	0.6
歐龍膽末	0.3 Pulv. Rad. Gentian.	0.3

右為散均分三包， M. f. pulv. div. in part.
一日三回分服。 aeq. No. 3 S. 3 mal in 1
Tage z. n.

主治 肺結核盜汗。

第 339 方

伊希替奧耳 (魚肝油)	0.3 Ichthyol.	0.3
----------------	---------------	-----

水 100.0 Aq. destill. 100.0

右一日三回分服。 D. S. 3 mal in 1Tage z. n.

主治 結核性下痢，慢性下痢。

說明 魚石油亦可爲丸劑，每丸含 0.1，一日三回，一回一丸。

魚石油製劑即魚石油蛋白化合物之伊希他耳彬 Ichthalbin 較爲多用，爲散劑，一回 1.0—3.0，一日三回，或爲丸劑，每丸含 0.3。

第 340 方

碘仿甘油 Jodoformglycerin.

碘 仿 5.0—10.0 Jodoform. 5.0—10.0

純 甘油 加至 50.0 Glycerin. ad 50.0

右混和一回 5.0— M. D. S. 1 mal 5.0—

10.0—20.0 注入結 10.0—20.0 zur Injektion

核病腔內。 in Tuberculöse Höhlen

主治 關節結核，結核膿瘍。

說明 每星期注入一次，須續行 4—8 次，用時振盪之使碘仿浮遊均勻。

第 341 方

碘仿小桿 Jodoformstäbchen.

碘 仿 1.0 Jodoform. 1.0

柯 柯 脂 2.0 Ol. Cacao 2.0

甘巴坦杏油 適量 Ol. Amygdal. dule. q.s.

右混和爲一小桿外 ut f. Stäbchen No. 1.

用。 S Ausserlich.

主治 結核膿管。

第 342 方

鏈 徽 素 1.0—3.0 Streptomycin 1.0—3.0
肌肉注射。 For M. inj.

主治 結核病(其他詳化學治療劑章)

說明 每公分用無致熱性之蒸餾水八西西溶解之，每三小時注射一次，將所用劑量平均分配之。每個病人須治療 2—4 個月，共需鏈徽素一百數十公分。本品具有相當毒性，聽神經尤易受損。

第 343 方

使他肺安定 0.1 mg. Stepharanthine 0.1 mg.
一次頓服。 One dose

主治 結核病。

- 說明 (1)本品對於結核病之療效尚未十分確定，但對於實驗性結核確有着效。
- (2)本品對於各個病人之藥量不同，伸縮性甚大。成人每日量為 0.01—1 mg.。(即十分之一片至十片)。
- (3)本品輕症用量須多，而重症用量須少。
- (4)使用本品可用漸須微量或極微量使用法，並插入間歇時間。
- (5)使用本品如感稍微發熱，咳嗽，嗜睡及其他自覺症狀時，應減輕或暫時停藥，待病狀稍退(4—5日)再服用適量。
- (6)服用本劑時如覺症狀減輕，應減少用量，每隔一二日停服一日。
- (7)如用注射法，則每星期注射一次，(0.2

—0.5 mg)，注射日停止內服，但其他各日須照常服用。

【附註】(1)結核病之特效治療劑僅鏈黴素及使他肺安定二種，但他肺安定雖在試管內實驗證明其對結核菌有抑制作用，但對於人體結核病之功效迄尙未有定評，故臨床醫師不宜作冒險之實驗性嘗試。鏈黴素之功效雖尙差強人意，但因其對每個病人之需用量太大，費用太昂，非貧富不足以負責。且其臨床應用時所致之毒性反應亦令人恐懼，故仍距吾人之理想太遠。

(2) 普通對於結核病之治療，均不外以下兩途：一為對症治療；另一即設法增加患者之抗禦力量。亦有企圖以鈣質包圍結核組織以防止其蔓延者。故所用藥品多為葡萄糖鈣，(Calcium Glucose) 葡萄糖酸鈣，(Calcium Gluconate) 維他命甲，丁，(如Cod Liver Oil, Halisun, Haliverol, Navitol, 等) 維他命B.C., (如 Benerva, Beetomin, Vitasin, Vibemin, Thiamin Hcl, Rodoxon, Ascorbic Acid, Cebion, Cetasin, Ceetomin, Vicemin, Cevalin 等) 幾怪合劑，(如幾怪拍拉托，補力多，康福多等各種補劑等類。

第二十五章 驅梅毒劑 Antisymphilitica.

第 344 方

碘化鉀 Kal. jodat.

說明 參考祛痰劑章。

第 345 方

碘化鉀 6.0 Kal. jodat. 6.0

煨製鎂 15.0 Magn. ust. 15.0

亞拉伯樹膠末 2.0 Pulv. Gumm. arab. 2.0

右混和爲丸六十粒 M. f. pil. No. 60.

，一日三回，一回 S. 3 mal tgl.

三粒。 3 Pillen.

主治 梅毒尤宜於第三期梅毒。

說明 碘化鉀錠 Pastilli kalii jodat 每片含 0.25。

第 346 方

碘化鉀 0.5—1.0 Kal. jodat. 0.5—1.0

碘化鈉 0.5—1.0 Natr. jopat. 0.5—1.0

重碳酸鈉 3.0 Natr. bicarbonic. 3.0

餾水 100.0 Aq. destill. 100.0

主治 與前方同。

說明 碘化鉀與碘化鈉應用相同，而鈉鹽較和緩。碘化鉀之代用劑如下。

a. 珊約錠 Sajodin. 有製成錠劑，一管二十片，每片 0.5，一日三回，一回一二片，食後一時間服。

b. 約狄品 Jodipin. 爲黃色油狀液，一回

一茶匙至一食匙，食後服。

- c. 利破沃碘 Lipojodin. 有製成片劑，每片含 0.3 一日三回，一回一二片，食後服。
- d. 碘仿坦 Jodfortan. 亦有製成片劑，每片含 0.25，一日三回，一回 1—3 片，本品含有鈣質，可自預防碘中毒。

第 347 方

柳 酸 汞 1.0 Hydrarg. salicylic. 1.0
 甘草末及燕 各適量 Pulv. et Succ. Liquirit.
 aa q.s.

右混和爲丸百粒， ut f. pil. No. C.

一日三回，一回一 S. 3 mal tgl. i

粒，食後服。 Pillen n. d. Essen.

主治 各期梅毒，第二期梅毒尤效。

說明 本丸劑每丸含柳酸汞 0.01，爲一回極量 $\frac{1}{2}$ ，故一回至多可服二粒。

凡服水銀劑時，須主意口腔，直腸，腎臟等之狀態，並宜時嗽口以防汞毒性口內炎之發生，注射時同。

本劑內服，以三星期爲一治療期，滿後須停止三星期後再服。

第 348 方

鞣 酸 汞 0.03 Hydrarg. tannic. 0.03
 乳 糖 0.5 Sacchar. lact. 0.5

右混和給等量三十 M. f. pulv. D. tal. dos.

包，一日三回，一 No. 30. S. 3 mal tgl. 1

回一包，飯後服。 Pulver nach der Mahlzeit.

主治 與前方同。

第 349 方

黃碘化汞	0.9	Hydrarg. jodat. (flav.)	0.9
阿片末	0.3	Pulv. Opii	0.3
甘草末及羔	各 1.2	Pulv. et Succ. Liquirit.	
		aa	1.2

右混和爲丸六十粒 ut f. pil. No. 60.

，一日三回，一回 S. 3 mal tgl. 1 Pillen.

一粒。

主治 與前方同。

第 350 方

紅碘化高汞	0.1	Hydrarg. bijodat. (rubr)	
			0.1
碘化鉀	5.0	Kal. jodat.	5.0
餾水	150.0	Aq. destill.	150.0

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.

一回一食匙。 1 Esslöffel.

主治 與前方同。

第 351 方

紅碘化高汞	0.2	Hydrarg. bijodat. (rubr.)	
			0.2
碘化鉀	0.2	Kal. jodat.	0.2
食鹽	0.075	Natr. chlorat.	0.005
餾水	10.0	Aq. destill.	10.0

右混和隔日一回， M. D. S. Jeden 2 Tag

半至一筒肌肉注射 1/2—1 Spritze zur

intramusculär. Injektion.

主治 梅毒症。

說明 一筒中含紅碘化汞 0.02，爲一回極量。

第 352 方

甘 汞 0.01-0.02 Calomel 0.01-0.02

(坦那耳彬 0.3) (Tannalbin 0.3)

乳 糖 0.5 Sacchar. lact. 0.5

右混和給同量三十 M. f. pulv. D. tal. des.
包，朝夕各一包。 No. 30. S. Morgens u.
abends 1 Pulver.

主治 小兒梅毒。

第 353 方

甘 汞 0.1 Calomel 0.1

液狀石蠟 10.0 Paraffin. liquid. 10.0

右混和一星期，一 M. D. S. 1 mal wochenlich
回肌內注射，半至 1/2—1 Spritze. zur
一筒。用前振盪之 intramuskulär Injektion.
vor Gebracht umschtteln.

主治 小兒，乳兒梅毒。

說明 乳兒體重每尅用 0.001

第 354 方

昇汞(氯化高汞) 0.2 Hydrarg. bichlorat.
(sublimat) 0.2

食 鹽 2.0 Natr. chlorat. 2.0

醫 水 10.0 Aq. destill. 10.0

右混和每星期二三 M. D. S. 2—3 mal

回，一回一筒肌內注射。 wöchentlich 1 Spritze zur intramuskulär. Injektion.

主治 梅毒症。

第 355 方

精化高汞	0.1 Hydrarg. cyanat.	0.1
醫水	10.0 Aq. destill.	10.0

右混和一日一回， M. D. S. 1 mal tgl. 1/2—1
一回半至一筒皮下或肌內注射。 Spritze zur subkutan. u. intramuskulär.

主治 與前方向。

說明 汞劑注射液，有製成安甌劑者，茲舉其要於下。

- a. 伊邁密可耳 Imamicol. 隔日一回半至一安甌肌內注射，以二十回為一治療期行至十回，須停止一星期乃再行。
- b. 阿數羅耳 Asuroi. 隔二三日一回，1—2 安甌肌內注射。
- c. 諾凡數羅耳 Novasuroi. 隔二三日一回，1—2 安甌肌內注射。
- d. 愛內瑣耳 Enesol. 水銀外兼含砒素，一星期一回，一安甌肌內或皮下注射。
- e. 愛母排林 Embarin. 隔日或每日一回，半至一安甌肌內或皮下注射。

第 356 方

新洒爾之爾散	0.6 Neosalvarsan	0.6
滅菌食鹽水	100.0 Natr. chlorat steril.	
(0.4%)	(0.4%)	100.

右爲靜脈內注射。 S. Zur intravenös.

主治 各期梅毒症。

說明 新洒爾乏爾散，淡黃色之粉末也，包裝有六種，即

第一號 0.15 第二號 0.3 第三號 0.5
 第四號 0.6 第五號 0.76 第六號 0.9

用量一歲以下一回 0.025—0.075，二至五歲 0.1—0.2，六至十二歲 0.2—0.3，大人 0.4—0.9，而此外更須視病人之體重營養狀態各器官狀態，酌量增減之。

調製用液切不可加溫，以在攝氏 21 度以下爲宜。食鹽水可調用鹽水。其用量如本方用 100.0 則其溶液爲稀薄溶液，如減用 10.0 則爲濃厚溶液，即新洒爾乏爾散 0.15，滅菌食鹽水或鹽水 2.5 之比是也。

注射法準以一般所行之靜脈注射法，須注意不可漏出於靜脈管外，萬一漏出，宜速施濕布電包。

注射回數，大抵一星期一回，多至三回，以注射至全量 5.0 爲一治療期。

本治療宜兼施水銀，碘，或銻劑療法。

本劑不能靜脈注射之時，得施肌內注射

，其法將新洒爾乏爾散製成 5% 溶液（即新洒爾乏爾散 0.1 滅菌鹽水 3.0 之比）注射於臀肌或大腿側肌內，注射前數分時，先於該部注射 0.5% 諾服卡因 Novocain 液 1—3 cc. 以防疼痛。

如靜脈內肌肉注射均不能施行時，則試灌腸，其法取新洒爾乏爾散 0.1—0.3，餾水 10.0—15.0 製成溶液，先行清潔灌腸，後將此溶液徐徐灌入，然其效果實不能如注射治療之正確。

最宜注意新洒爾乏爾散，極易變化而生猛毒，故製液之時，須細心察其盛器安穩，有裂隙者，其內容有受酸化之虞矣不可用，一旦開瓶之後用剩者不可再用。

第 357 方

聖露洒爾佛散 4c.c. Solu Salvarsan 4c.c.

靜脈或肌肉注射。 For V. or. M. inj.

主治 與前方同。

說明 係一種溶液劑，分 1, 2, 3, 4, 5, 6 c.c.，共六種，可供肌肉注射，但藥力不持久，副作用亦多。

第 358 方

新銀洒爾乏爾散 0.4 Neosilbersalvarsan 0.4

滅菌餾水 10.0 Aq. destill. steril 10.0

右為靜脈內注射。 D. S. Zur intravenös.

主治 與前方同。

說明 本劑包裝有 0.2, 0.3, 0.4, 0.45 等四種，為黑褐色粉末。

用量一歲以內一回 0.02—0.05，二至五歲 0.05—0.1，六至十二歲 0.15—0.3，大人 0.3—0.5，調製用液即滅菌餾水，視主藥之量用 5.0—15.0，但切不可用食

鹽水。

本劑注射約隔四日一回。

本劑溶液雖經一小時尚堪使用，然每次所用，以新製者為佳。

第 359 方

迷奧洒爾乏爾散 0.3 Myo-Salvarsan 0.3

滅菌 鹽 水 3.0 Aq. destill. steril. 3.0

右為肌內或皮下注 S. Zur intramuskulär oder
射。 subkutan. Injektion.

主治 各期梅毒，遺傳梅毒。

說明 本劑包裝有 0.15, 0.3, 0.45, 0.6 四種。小兒量用對於其體重一尅用 0.01, 皆製為 10% 溶液用之。一星期二回，以五至八回，為一治療期。

第 360 方

約 哈 1.0—1.5 Joha 1.0—1.5

右為肌內注射。 S. Zur Intramuskulär.

主治 各期梅毒症。

本劑為洒爾乏爾散之含碘者，故尤適於第三期梅毒，其 1 c c. 中含洒爾乏爾散 0.4 為油狀液，封盛於玻璃小管中，便於使用。

第 361 方

鏡洒爾乏(安甌) Bismosalvan-Amp.

(2cc.) 10 支 (2cc.) X.

右隔日一回，一安 S. Jeden 2Tag 1 Amp.

甌肌內注射。 zur intramuskulär.

主治 各期梅毒症。
 說明 本劑爲奎甯鐵鹽 Quinine-Bismuth-Jodide 之洋橄欖油液，呈朱紅色。一盒十安瓿，一安瓿 2 cc。
 鐵劑尚有下列各種。

- a. 脫雷泡耳 Trepol. 爲安瓿劑，一安瓿 2.5 cc. 每日一回，一安瓿肌內注射，以三十回爲一治療期，滿後休息十日再續行之。
- b. 新脫雷泡耳 Neotrepol. 用量用法，與前者同。
- c. 模他諾耳 Muthanol. 爲安瓿劑，一安瓿 2cc. 隔日一回半至一安瓿肌內注射，至全量 20.0 爲一治療期。
- d. 梅乃落(密拉諾耳) Milanol. 爲安瓿劑，內容 1.5cc. 隔日一回，一安瓿肌內注射，至全量 15.0 爲一治療期。

第 362 方

水銀(灰白)軟膏 3.0 Unguent. Hydrarg.
 (ciner.)

3.6

右爲一包，以蠟紙 D. tal. dos. No. 12

包之，與同量十二 ad chart. cerat.

包，一日一回爲搽 S. Tal. 1 Päckchen zu
 擦料。 einreiben.

主治 各期梅毒症，尤宜於第二期。

說明 對於小兒一日搽擦用 0.5，並須加同量
 豚脂 Adep. suill. 混和之後用以減其

刺激性。

揉擦部位，須日日改換，如始於左上肢而右上肢，背部，胸部，左下肢右下肢是。第七日休息後依法反覆行之。一面須注意口內炎，嗽口以防之。

第 363 方

水銀布

Mercolint

右外用。

S. äusserlich.

說明

此布以含有 90% 水銀之軟膏，浸潤於綿布片製之。一回用量約含有 10.0 水銀之布片，懸貼胸前，水銀受體溫而漸蒸發，由呼吸道吸入銀水，發生驅梅效力。

汞灰粉 Mercuriol. 由白汞混於鉛及鎂與水銀之合金製成之灰色粉末也。另製絨布小袋，盛本粉 2.0 乃至 3.0 於其中，懸於胸前襯衣之下，初每日懸掛，後隔日，連用至 30—40 日間，其作用之理與前者同。

第 364 方

水銀硬膏

50.0 Emplastr. Hydrarg. 50.0

右外用。

S. äusserlich.

主治

初期硬結，潰瘍性膠膜性梅毒。

第 365 方

油酸汞

1.0 Hydrarg. oleinic. 1.0

凡士林

4.0 Vaseline. 4.0

右外用。

S. äusserlich

主治

梅毒性皮膚病搽布。

說明 本劑可代水銀軟膏爲搽擦料。

第 366 方

昇汞錠(0.5) 10片 Pastill. Hydrarg.
bichlorat(0.5) X.

右投二片於浴水內溶之。

主治 乳兒高熱梅毒。

第 367 方

硝化高汞 0.04 0.08 Hydrarg. cyanat. 0.04-0.08
水 400.0 Aq. 400.0

右爲嗽口水。 D. S. zu gurgeln.

主治 梅毒性咽潰瘍。

第 368 方

約替奧 10.0 Jothion 10.0
洋橄欖油 30.0 Ol. Olivar. 30.0

右外用。 S. äusserlich

主治 梅毒性腺腫搽布。

說明 約替奧含有80%碘黃色油狀液也。和以洋橄欖油或凡士林(約25%濃度)爲搽擦料，使其徐徐吸收而呈碘之作用。

第 369 方

馬法生 0.06 Mapharsen 0.06
滅菌鹽水 10c.c. Steril. Aq. dest. 10c.c.

靜脈注射。 For V. inj.

主治 各期梅毒。

說明 (1)本品靜脈注射須快，一劑須於15—30秒鐘內全部注入。如此迅速注射，可減少局部疼痛及靜脈栓塞之危險。

- (2)本品療效較新六〇六為高。
- (3)本品副作用之發生率較新六〇六低。
- (4)本品注射不慎而洩出血管外時，局部刺激性較新六〇六輕。
- (5)本品不忌空氣，氧化後並不加增其毒性。
- (6)本品每星期注射一次。

第 370 方

台盼腫膜	1.0 Trypa:samide	1.0
滅菌鹽水	10.0 Steril. Aq. dest	10.0

靜脈或肌肉注射。 For. V. or M. inj.

主治 神經性梅毒，梅毒性麻痺。

說明 (1)本品對於其他一般梅毒病例無效。

(2)本品對於視神經有特殊毒性，用藥後有 10% 呈眼症狀(眼前閃光感)，需立即停藥，否則，有進行至失明可能。

(3)對於梅毒性早期麻痺，其療效較任何其他藥劑為高。

(4)成人劑量每次 1—3gm.，每星期一次，連用十二星期為一治程。

(5)有強壯作用，用藥後病人體重恆增。

(6)有一種英國貨名新克里爾 (Neocryl)，據謂治療神經梅毒更佳，且對視神經之毒性亦較低，但目前尚未能證實。

第 371 方

阿西他生	0.5 Acetarsons	0.5
空服頓服。	One dose A.c.	

主治 梅毒。

說明 (1)本品專供內服，其代表品為斯砒螺刺脫，(Spirocid)。

(2)本品大都用以治療先天梅毒，惜其療效不確，而副作用甚多。

(3)本品之 Diethylamine 衍化物，製成溶液，可供肌肉注射。

第 372 方

青黴素 2,400,000單位 Penicillin 2,400,000 i.u.
注射用。 Pro injection

主治 各期梅毒。

說明 二百四十萬單位作七日半內分配注射，如與馬法生作合併治療，則療效在佳。

杭州宋經樓 新醫書局發行

茂木藏之助原著
新醫同仁研究社增訂

外科學·各論(下)

精裝一厚冊 二十七元

本篇所論者純為骨盆及四肢外科。四肢外科為臨症醫師所最常遭遇者，其中尤以骨與關節之疾患為最多見。本篇將其一一詳細論列，俾學者能籍此一冊而洞悉其祕奧。所附銅圖七百十幅，更為本書生色。

備有書目★函索即奉

第二十六章 鎮痛劑 Anodyna.

第 373 方

阿片末	0.05 Pulv. Opii	0.05
乳糖	0.5 Sacchar. lact.	0.5
右混和給同量十包	M. f. pulv. D. tal. dos.	
，一日數回，一回	No. X. S. Mehrm. tgl.	
一包。	1 Pulver.	

主治 下腹部，腸部之疼痛。

說明 本方應用可參看止痢劑章下第 75 方
阿片酊 Tinct. Opii 亦可用於止痛，處
方法參看止痢劑章下之第 76, 77 方。

第 374 方

阿片浸膏	0.2 Extract. Opii	0.2
顛茄浸膏	0.1 Extract. Belladonn.	0.1
番木鱉浸膏	0.1 Extract. Strychn.	0.1
歐龍膽末及 浸膏	各適量 Pulv. et Extract. Gentian, aa q.s.	

右混和爲丸十粒， ut f. pil. No. X.

每三時一粒，見效 D. S. 3 stündl. 1 Pillen
爲度。 bis Wirkung.

主治 腸痙痛。

第 375 方

阿片藥栓	Suppositoria Opii	
阿片浸膏	0.05 Extract. Opii	0.05
(或顛茄浸膏	0.02) (S. Extract. Belladonn.	
	0.02)	

柯柯脂 2.0 Cl. Cacao 2.0
 右混和爲藥栓，給 ut f. snppos. D. tal. dos.
 同量五個，一日三 No. V. S. 3 mal 1 Stück
 回一回一個插用。 einführen.
 主治 腹痛，裏急後重。

第 376 方

煮安盼一安甌 (2%, Pantepon-Amp. (2%,
 1.1cc.) S. 1.1cc.) V.
 右一日1—3回每回 D. S. 1—3 mal tgl.
 2/3—1 安甌皮下 2/3—1 Amp. zur
 注射。 subkutan. Injektion.

主治 各種發作性疼痛。
 說明 煮安盼錠亦可應用，一回1—2片內服。

第 377 方

歐可達耳錠 Eukodal-Tablett.
 右給一管二十片， D. 1 O. P. zu 20 Tad. je
 每片含 0.005, — 0.005. S. 3 mal tgl.
 日三回，一回1/2 1/2—1 Tapletten.
 —1 片。

主治 與前方同。
 說明 本品作用與阿片同。

第 378 方

鹽酸嗎啡 Morphin. muriat.
 說明 本品可鎮一切疼痛，及治疼痛性不眠症，
 處方法可參看鎮咳劑章下第 131, 132
 方。
 本品爲鎮痛劑，可加相當之磷酸阿托品

用之。如於第 131 方添加硫酸阿托品 0.0001 (一回量)，於第 132 方可添加 0.002。

第 379 方

鹽酸嗎啡	0.1	Morphin. muriat.	0.1
硫酸阿托品	0.005	Atropin. sulfuric.	0.005
滅菌鹽水	10.0	Aq. destill. steril.	10.0
右混和	1/2—1 筒	D. S. 1/2—1 Spritze	
皮下注射。		zur subkutan.	

主治 一切官疼症，疼痛性不眠症。

說明 本劑一筒中含鹽酸嗎啡 0.01，有製成阿托嗎啡安甌劑 Atro-Morphin Amp. 販賣。

第 380 方

鹽酸嗎啡		Morphin. muriat.	
顛茄浸膏	各 0.01	Extract. Belladonn. āā	0.01
柯柯脂	2.0	Ol. Cacao	2.0

右混和爲藥栓，與 ut f. suppos. D. tal dos
同量五個，一日一 No. V. S. 1—2 mal 1 Zäp-
二回，一回一個。 fchen.

主治 痲痛，裏急後重。

第 381 方

磷酸可待因	Codein. phosphoric.
-------	---------------------

說明 本品可以治胃痛及其他疼痛症。處方法參看鎮咳劑章下第 131, 132 方。

第 382 方

磷酸可待因	Codein. phosphoric.
-------	---------------------

顛茄浸膏 各 0.02 Extract. Belladonn. āā 0.02
 重碳酸鈉 0.5 Natr. bicarbonic. 0.5
 次硝酸銻 0.2 Bismuth. subnitric. 0.2
 右混和爲散劑同量 M. f. pulv. D. tal. dos.
 五包，一日1—3回 No. V. S. 1—3 mal tgl.
 ，一回一包。 1 Pulver.

主治 胃痛。

說明 因胃酸過多發痛時，每包可加煨製銻0.2用之。

第 383 方

磷酸可待因 0.02 Codein. phosphoric. 0.02
 阿司必林 0.25 Aspirin. 0.25
 非那賽汀 0.5 Phenacetin. 0.5
 右混和與同量五包 M. f. pulv. D. tal. dos.
 ，一日 1—3 回， No. V. S. 1—3 mal tgl.
 一回一包。 1 Pulver.

主治 頭痛。

第 384 方

朗達腦錠 Laudanon-Tablett.
 右與一管十片各含 D. 1 O. P. zu 10 je 0.01
 0.01，一日數回， S. Mehrm. tgl.
 一回一二片。 1—2 Tabletten.

主治 各種疼痛症。

說明 本品爲嗎啡之代用品，此外嗎啡製劑如
 狄奧寧，鹽酸海洛因等，亦可用於鎮痛。
 方法參看鎮咳劑章下。

第 385 方

重碳酸鈉	6.0	Natr. bicarbonic.	6.0
煨製鎂	3.0	Magn. ust.	3.0
莨菪浸膏	0.12	Extract. Scopol.	0.12
右混和均分六包，		M. f. pulv. div. in part. aeq.	
一日三回，一回一		No. 6 S. 3 mal tgl. 1	
包。		Pulver.	

主治 胃酸過多症，胃痛。

第 386 方

黑莨菪浸膏		Extact. Hyosciam	
黑莨菪葉末	各 1.5	Fol. Hyosciam. pulverat.	
		āā 1.5	
右混和爲丸三十粒		ut f. pil. No. 30	
，一日三回，一回		S. 3 mal tgl.	
一粒。		1 Pillen.	

主治 腸痙痛。

第 387 方

硫酸阿托品		Atropin. sulfuric.	
說明		本品可用以治胃痛，痙胃，神經痛，吃	
		逆。處方法參看喘息劑章下。惟服法則與	
		治喘息異，可一日一二回，一回一二粒。	

第 388 方

硫酸阿托品	0.005	Atropin. sulfuric.	0.005
滅菌餉水	10.0	Aq. destill. steril.	10.0
右混和一回1/2-1		M. D. S. 1/2—1 Spritze	
筒皮下注射。		zur subkutan. Injektion.	

主治 胃潰瘍，痙痛。

說明 本劑有製成安瓿劑。

第 389 方

安替必林	0.5	Antipyrin	0.5
非那賽汀	0.25	Phenacetin.	0.25
咖啡英	0.03	Coffein.	0.03
枸橼酸	0.01	Acid. citric.	0.01

右混和給等量十包 M. f. pulv. D. tal. dos.
 , 一日一至三回, No. X. S. 1—2 mal tgl.
 一回一包。 1 Pulver.

主治 神經痛, 偏頭痛。

第 390 方

非那賽汀	0.4	Phenacetin.	0.4
霹藍密藤	0.2	Pyramidon.	0.2

右混和與同量五包 M. f. pulv. D. tal. dos.
 , 一日 1—3 回, No. V. S. 1—3 mal tgl.
 一回一包。 1 Pulver.

主治 與前方同。

說明 解熱劑之大部, 均可用為鎮痛劑。如安替必林, 霹藍密藤, 非那賽汀, 柳酸鈉, 阿司必林等均足以治頭痛, 神經痛, 風痺症疼痛是也。單味使用處方, 可參看解熱劑章。然近多取數者合併使用, 如上二方是也。是因合併使用其作用增強, 副作用減弱之故, 而多數合併製劑之出此亦基於是。

第 391 方

密古雷寧		Migraenin	
(=枸橼酸安替必林咖啡英)	0.5	(=Antipyrinocaffein. citric.)	0.5

右爲散給等量五包 F. pulv. D. tal. dos. No. V.
 , 一日一至三回, S. 1—3 mal tgl.
 一回一包。 1 Pulver.

主治 偏頭痛, 頭痛, 神經痛。

說明 本品由安替必林 90 分, 咖啡英 9 分
 , 枸橼酸 1 分製成, 白色之粉末也。亦
 有製成錠劑販賣。

第 392 方

凡拉蒙錠 Veramon-Tablett.

右給一管十片每片 D. 10 P. zu 10 je 4.0
 含 0.4, 一日 1—3 回 S. 1—3 mal tgl.
 , 一回一片。 1 Tabletten.

主治 頭痛, 牙痛, 創傷痛及其他疼痛。

本品由霹靂密藤與佛羅拿抱合而成, 爲
 淡黃色粉末, 亦可爲散劑, 一回 0.4—0.6
 一回一至三回。

此等併合製劑, 爲數尙多, 茲舉其二三
 於次, 以便採用。

- a. 脫利該民 Trigemim. 爲白色結晶性粉
 末, 一回 0.5 乃至 1.5 一日一至三回爲
 散劑用之, 以治神經痛, 頭痛及牙痛。
- b. 拉克妥芬寧 Lactophenin. 爲無色無臭
 結晶, 一回 0.5 至 1.0, 以治偏頭痛,
 神經痛。
- c. 西脫羅芬 Citrophen. 爲白色結晶性粉
 末, 難溶於水, 爲散劑, 一回 0.5—1.0
 一日一回乃至數回, 以治三叉神經痛, 後

頭神經痛，肋間神經痛，坐骨神經痛，電擊痛，關節風痺疼痛。

- d. 抗神經素 Antinervin. 爲白色粉末，一回 0.5—1.0 爲散劑，一日一至數回，以治頭痛，神經痛。

第 393 方

凡痛定片 Vartondin tab.
 右給一管十片，每 D. 10 P. zn 10 je 4.0
 片含 0.4，一日 1—3 S. 1—3 Mal tgl
 回，每回 1—2 片。 1—2 tab.

主治 與前方同。

說明 與前方同。

第 394 方

痛必靈片 Tonbelin tab.
 右給一管十片，每 D. 10 P. zn 10 je 4.0
 片含 0.4，一日 1—3 S. 1—3 Mal tgl
 回，每回 1—2 片。 1—2 tab.

主治 與前方同。

說明 與前方同。

第 395 方

阿那雌信 1.0 Anesthesia. 1.0
 一日三次分服 S. 3×1

主治 肝胃氣痛，月經痛等。

說明 本品多用於外科，但現時內科亦慣用之。

第 396 方

散利痛片 Saridon tab

右給十片，一日三 D. 10 P.

回，每回1—2片。 S. 1—3 Mal 1—2 tab.

主治 各種神經痛，頭痛，牙痛，月經痛等。

說明 本品係水楊酸鈉製劑。

第 397 方

加 當 片 3 片 Gardan tab. No. 3

一日三回分服 S. 3×1

主治 風濕痛，神經痛，腰痛等。

說明 本品係罌藍米洞與羅瓦而精之合劑。

第 398 方

羅瓦而精片 3—6 片 Noralgin tab. 3—6 tab.

一日三回分服 S. 3×1

主治 骨節腫痛，坐骨神經痛等。

說明 本品係水楊酸製劑。亦可用其安甾劑作注射用。

第 399 方

阿 托 方 1.5—3.0 Atophan 1.5—3.0

一日三次分服 S. 3×1

主治 急慢性痛風症。

說明 本品有利尿作用，兼有止痛，消炎，退熱之效，為痛風之靈藥。另有安甾劑以為注射之用。

第 400 方

秋水仙酊 3.0 Tct. Colchinin 3.0

顛茄酊 1.0 Tct. Belladonna 1.0

苦味酊 3.0 Tct. Amarae 3.0

餾 水 100.0 Aq. ad. 100.0

一日三次分服 S. 3×1

主治 急性痛風。

說明 本劑有止痛消炎之效。亦可配伍其他強心，鎮靜等藥。

第 401 方

鹽酸喜那美 仁錠 3—5 錠 Sinomenin HCl. 3—5 tab.

一日三次分服 S. 3×1

主治 神經痛等。

說明 本品為國產藥防已膏提質。杭州民生藥廠亦有同樣製品，名喜美靈。本品亦有安瓿劑供注射者。

第 402 方

康普樂片 3—6 片 Compral tab. 3—6 tab.

一日三次分服 S. 3×1

主治 各種神經痛。

說明 本品係霹藍米洞與復倫泰之合劑。

杭州宋經樓 新醫書局發行

赤松純一 原著
新醫同仁研究社增訂

耳鼻咽喉科學

精裝一厚冊沖皮面十八元 紙面十六元

本書以同仁會第七版作藍本，內容新穎充實，插圖清晰豐富，學理實際，同時並重。現聘請專家將最新各種技術及新療法，分別增入，另插入銅圖二百餘幅，使讀者更易理解去舊補新，益臻完善矣。(後附索引)全書由十五萬言增至二十八萬言。

備有書目 ★ 函索即奉

第二十七章 催眠劑 Hypnotica.

第 403 方

水化氯醛	2.0—5.0	Chloral. hydrat.	2.0—5.0
橙皮糖漿	25.0	Sirup. Cort. Anrant.	25.0
等 水	50.0	Aq. dest.	50.0

每晚服一二食匙。 M. D. S. Abends
1—2 Esslöffel.

主治 神經性不眠症及其他不眠症，此外為鎮
靜劑以治破傷風，腦膜炎諸症。

說明 本劑適用於就睡困難症。

有胃腸中管耳或循環器疾者禁忌。

本方可伍下列諸藥。

1. 溴化物劑 Brom-Præparat.
2. 鹽酸嗎啡 Morphin. muriat.
一回量 0.001—0.005—0.03
3. 阿片膏 Tinct. Opii. 一回量 5—10—20 滴
4. 番木鱉樹 Tinct. Strychn. 一回量 5—
20 滴
5. 阿拉伯樹膠漿 Mucilag. Gummi. arab.
一回量 3.0—5.0

伍鹽酸嗎啡時易起中毒，須特別注意。

水化氯醛往往用其單味 1.0 溶於適量水
中頓服，或添加氯化鉀 1.0 頓服，此外可
用下方灌腸。

第 404 方

水化氯醛	2.0	Chloral. hydrat.	2.0
------	-----	------------------	-----

阿拉伯樹膠漿 50.0 Mucilag. Gumm. arab. 50.0

右混和爲灌腸料。 M. D. S. Als. Klysma

主治 與前方同。

說明 小兒減量用 0.1—0.5

本方可添加阿片酞 10—15 滴用之，且對於小兒，以不加阿片酞爲宜。

第 405 方

溴拉爾 0.3—0.6 Bromural. 0.3—0.3

右爲散給同量五包 F. pulv. D. tal. dos. No. V.

，晚服一包。 S. Abends 1 Pulver.

主治 神經性不眠症及其他不眠症。

第 406 方

佛羅(拿)那耳 0.3—0.5 Veronal 0.3—0.3

乳 糖 0.5 Sacchar. lact. 0.3

右爲散給同量五包 F. pulv. D. tal. dos. No. V.

，晚服一包。 S. Abends 1 Pulver.

主治 與前方同。

說明 本方可添加鹽酸嗎啡 0.01 用之，又本品不可連服一星期以上，即服用五六日須停服若干日。

佛羅那耳鈉 Veronal Natrium 亦名寐狄(拿)那耳 Medinal. 每回 0.3—0.7，主治與佛羅那耳同。

佛羅那耳與寐狄那耳均有製成錠劑販賣，每片 0.5。

第 407 方

阿特靈 1.0 Adalin 1.0

右晚間頓服。 S. Abends anf einmal, z. n.

主治 與前方同。

說明 本品有製就錠劑，晚服一二片。

第 408 方

地阿路錠 Dial-Tablett.

右給一管十片每片 D. 1 O. P. zu 10. je 0.1,
含0.1,晚服一片。 S. Abends 1 Tabletten.

主治 與前方同。

說明 本品毒性較佛羅那大，一回不可服三片
以上，爲是。

第 409 方

索佛(拿)那耳 0.4-1.0 Sulfonal 0.4-1.0

右爲散給同量三包 F. pnlv. D. tal. dos. No. III.
，晚取一包，和多 S. Abends. 1 Pulver in
量溫湯服。 Warmwasser.

主治 不能熟眠症，特發性不眠症，神經性不
眠症。

說明 本品亦不可連服一星期以上。

要之凡催眠劑如須長時日服用時，以備
數種交代用之爲妥。

催眠劑除上列者外爲數尙夥，茲舉其要
於下。

- a. 道密奧耳 Dormiol. 爲水化氯醛製劑，
無色之油狀液也，一回 0.5—2.0 爲水劑
或膠囊劑，晚服一回。
- b. 腦羅那耳 Neuronal. 爲灰白色結晶性
粉末，一回 0.5—1.0 爲散劑或錠劑晚服

一回。

加茂精 Calmotin. 爲日本製之溴拉蘇，一回 0.4—0.6 爲散劑用之，有製成錠劑。

d. 勃羅怕那耳 Propenal. 爲白色結晶性粉末，作用與佛羅那耳相似，一回 0.1—0.3 爲散劑或錠劑，晚服一回。

e. 路密那耳 Luminal. 爲白色結晶，爲散劑一回 0.1—0.3 晚服一回，有製成錠劑，每片含 0.1 或 0.3。

路密那耳鈉 Luminal-Natrium. 爲路密那耳之鈉鹽，可以製注射液及藥栓處方如下。

(1) 路密那耳鈉 2.0 Luminal-natr. 2.0
滅菌 餾 水 8.0 Aq. dest. steril. 8.0
右爲皮下注射一回 1.5—2.0。

(2) 路密那耳鈉 0.5 Luminal-natr. 0.5
柯 柯 脂 1.0 Ol. Cacas. 1.0
右爲藥栓一個，晚間使用。

f. 狄地阿路 Didial. 作用較地阿路強用於劇重之不眠症，晚服一二片。

g. 脫利奧那耳 Trional. 爲索佛那耳製劑，而性較索佛那耳和緩，一回 0.4—1.0 爲散劑或錠劑，晚服一回。

h. 阿米他爾 Amytal. 爲錠劑每片含 0.1 於就床前三十分服一二片，亦可爲鎮靜劑每四時間一片。

第 410 方

朋乃諾片 Bonanox tab 0.3—1.0

晚服一片 S. Abends 1 tab.

主治 神經性不眠症。

說明 本品爲禮惠洋行出品，副作用較少。

第 411 方

菲諾巴比通 0.05-0.15 Phenobarbitone 0.05-0.15

晚服一包 S. Abends 1 Pulv.

主治 神經性不眠症。

說明 本品爲英國實威出品。

第 412 方

伊維本片 1 片 Evipan tab. 1 tab.

臨睡頓服 S. Abends 1 tab.

主治 睡眠不足，睡眠欠酣。

說明 本品服後在五至二十分鐘內即可安睡，但其功效僅能維持四五小時。醒後並無不快之感覺，有則亦甚爲輕微。

杭州宋經樓
新醫書局發行

黎澍雄一 原著
新醫同仁研究社校訂

產科手術學

精裝一厚冊 十四元

產科之學，端賴手術。蓋當孕婦分娩之時，如有困難，往往因數分鐘乃至數小時之牽延，可致母子二人之生命垂危！故在此時期，應當機立斷，立即施行各種手術，以挽救此兩垂危之生命，不容再三考慮，貽誤時機！是則產科手術學，在事先不得不有充分之研究矣。

備有書目 ★ 函索即奉

第二十八章 鎮靜劑 Sedativa.

第 413 方

溴化鉀 1.5—2.0 Kal. bromat. 1.5—2.0

煨製鐵 1.0 Magn. ust. 1.0

右混和均分三包， M. f. pulv. div. in part.

一日三回，一回一 acq No. 3 S. 3 mal in

包。 1 Tage z. n.

主治 神經過敏症，如神經衰弱，神經性不眠症，頭痛，神經性心悸亢進，臟躁症，舞蹈病，生殖器興奮狀態等症。

說明 凡服溴素劑，須節製食鹽之攝取，至溴素中毒時，可多服食鹽以解之。

第 414 方

溴化鉀 1.5—2.0 Kal. bromat. 1.5—2.0

苦 酊 2.0 Tinct. armr. 2.0

饅 水 加至100.0 Aq. destill. ad 100.0

右混和一日三回分 M. D. S. 3 mal in 1 Tage

服。 z. n.

主治 與前方同。

說明 注意與前方同，本方可伍下列諸藥。

1. 溴化鈉 Natr. bromat.

一回量 0.5—1.0—2.0

2. 溴化銨 Ammon. bromat.

一回量 0.5—1.0

3. 纈草酊 Tinct. valerian.

一回量 0.5—1.5

4. 水化氯醛 Chlral. hydrat.
一回量 0.5—1.0—2.0
5. 磷酸可待因 Codin. phosphoric.
一回量 0.005—0.0—3.05
6. 真若野 Tinct. Scop. l. 一回量 0.5—1.0
7. 櫻樹皮素 Brocin 一回量 0.3—1.0—1.0
8. 杏仁水 Aq. Lauro Ceras.
一回量 0.5—1.0—1.5
9. 番毛地黄劑 Digitalis Praeparate.
10. 康毗箭毒劑 Tinct. Strophanth.
一回量 2—10 滴
11. 安息香酸鈉咖啡英 Caffeino Natr.
benzoic. 一回量 0.1—0.5
12. 碘化鉀 Kal. jodat.
一回量 0.1—0.5—1.0
13. 香雷耳氏水 Liq. Fowler. 一回量 2—6 滴
14. 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic.
一回量 0.5—2.0
15. 安替必林 Antipyrin.
一回量 0.3—0.5—1.0
16. 番木鱉劑 Tinct. Stychn. 一回量 5—20 滴
17. 歐龍膽劑 Tinct. Gentian.
一回量 1.0—3.0
18. 賽耳退兒水 Selterswasser 第三方
19. 硫酸鎂 Magn. sulfuric.
一回量 5.0—10.0—30.0

溴化鉀	2.0	Kal. bromat.	2.0
阿拉伯樹膠漿		Mucilag. Gumm. arab.	
餾水	各 50.0	Aq. destil.	aa 50.0
右混和灌腸。 M. D. S. zu klystieren.			
主治 妊娠嘔吐。			

第 416 方

溴化鈉	2.0	Natr. bromat.	2.0
餾水	50.0	Aq. destil.	50.0
右晚服一二茶匙。 D. S. Abends 1—2 Teelöffel.			
主治 夜尿症。			

第 417 方

溴化鉀	2.0	Kal. bromat.	2.0
溴化鈉	2.0	Natr. bromat.	2.0
溴化銨	1.0	Ammon. bromat.	1.0
苦酞	2.0	Tinct. amar.	2.0
餾水	加至 100.0	Aq. dest.	ad 100.0
右混和一日三四分服。 M. D. S. 3 mal in 1 Tage 服。 z. B.			
主治 神經衰弱，癲癇。			

第 418 方

溴化鉀		Kal. bromat.	
溴化鈉	各 10.0	Natr. bromat.	aa 10.0
溴化銨	5.0	Ammon. bromat.	5.0
枸橼酸	8.0	Acid. citric.	8.0
酒石酸	11.12	Acid. tartaric.	11.12
重碳酸鈉	25.0	Natr. bicarbonic.	25.0
右混和一日數回， M. D. S. Mehrm. tgl			

一回一二刀尖。 1—2 Messerspitze.

主治 神經衰弱及其他神經興奮症。

第 419 方

溴化鈣 15.0 Calc. bromat. 15.0

纈草酊 20.0 Tinct. Valerian. 20.0

餾水 加至300.0 Aq. destill. ad 300.0

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.

一回一食匙，食後 1 Esslöffel nach der
服。 Mahlzeit.

主治 神經衰弱，神經性心悸亢進。

第 420 方

溴蒙可耳 0.5—1.0 Bromocoll 0.5—1.0

右爲散給同量十包 F. pulv. D. tal. dos. No. X.

，一日三回，一回 S. 3 mal. 1

一包。 Pulver.

主治 神經衰弱，癱瘓，舞踏。

說明 本品有製就錠劑每片 0.5，治癱瘓須用
大量。

第 421 方

鈣蒙那耳 1.0—2.0 Calmonal 1.0—2.0

右爲散給同量十包， F. pulv. D. tal. dos. No. X.

一日三回，一回一包。 S. 3. mal tgl. 1 Pulver.

主治 與前方向同，此外亦用爲催眠劑，治神經
性不眠症。

說明 本品含有溴素 27%，鈣 68% 及尿素
60%有製就錠劑每片含 1.0。

第 422 方

溴拉爾

Bromural

說明

見催眠劑章下第408方。用爲鎮靜劑以治神經衰弱及神經興奮各症。

溴素劑爲數極多，茲再舉其要於下。

- a. 孛羅乏林 Brovarin. 一回 0.3—0.5
- b. 珊孛羅民 Subromin. 一回 0.5—1.0
- c. 崔孛羅邁耳 Zebromal. 一回 1.0—2.0
- d. 阿特蒙 Adamon. 一回 0.5—1.0
- e. 加茂精 Calmotin. 一回 0.3—0.5

以上諸藥均爲散劑或錠劑用之，且多有製成錠劑。

- f. 孛羅米品 Bromipin(10%)爲黃色油狀液，一回一茶匙乃至一食匙。
- g. 賽道孛羅耳 Sedobrol. 爲由溴化鈉與植物性浸膏配合而成，都爲錠劑用之。一日數回，一回一二片，溶於多量溫湯中服之，味美適於小兒婦人云。
- h. 孛羅古利汀 Bromglitin. 爲溴素與植物蛋白之結合體，專爲錠劑服用，一回一至三片，一日數回。

第423方

繡草根浸劑 5.0:90.0 Inf. Rhizom.

Valerian. 5.0:90.0

溴化鉀 2.0 Kal. bromat. 2.0

糖漿 加至100.0 Sirup. simpt. ad 100.0

右混和一日四回分 M. D. S. 4 mal in 1 Tege

服。 z. n.

主治 臟躁症，神經衰弱，舞蹈病，癲癇諸症。

說明 本方可添加龍膽劑或浸膏用之。

第 424 方

顯草酊	2.0 Tinct. Valerian.	2.0
阿片酊	1.0 Tinct. Opi	1.0
薄荷水	4.0 Aq. Menth.	4.0
糖漿	10.0 Sirup. simpl.	10.0
腦水	加至100.0 Aq. destill.	ad 100.0

右混和一日三回分 M. D. S. 3 mal in 1 Tage
服。 z. n.

主治 臟躁症，癲癇發作。

第 425 方

顯草酸龍腦膠囊 (0.25) Bornyval Perle(0.25) 20個 XX.

右一日三回，一回 D. S. 3 mal tgl. 1—3 Stück
一至三個，食後服。 nach dem Essen.

主治 臟躁症，各種神經症，不眠症。

說明 新顯草酸龍腦膠囊 Neobornyval-Perle
(0.25)主治，用法均同。

顯草劑除上列者外尚有。

- a. 顯草酸鋅 Zinc. Valerianic. 一回0.02—0.05，為散劑或丸劑，一日數回，以治臟躁症，癲癇，偏頭痛，神經病，心悸充進諸症。
- b. 泛利道耳 Validol. 一回 10—15 滴，一日數回，和白糖或葡萄酒服，以治臟躁

症，暈船，妊婦嘔吐，及其他神經症。

第 426 方

抱水克羅拉兒	2.0	Chloral Hydrat	2.0
溴化鉀		Kali. Brom.	
溴化鈉		Natr. Brom.	
溴化銨	各 1.0	Ammonia Brom.	2ā 1.0
苦味酞	3.0	Tet. Amarae	3.0
餾水	100.0	Aq. dest.	100.0

一日三次分服。 S. 3×1

主治 臟躁症，不眠症。

第 427 方

溴素樟腦	0.3	Camphor Monobrom.	0.3
------	-----	-------------------	-----

一日三次分服。 S. 3×1

主治 性神經鎮靜劑。

說明 本品多用於強陽作痛，性慾過於旺盛諸症。

第 428 方

色多波液	12.0	Sedobrol Liq	12.0
糖漿	10.0	Syr. Simple	10.0
鹽水	60.0	Aq ad	60.0

一日三次分服。 S. 3×1

主治 神經過敏，神經衰弱，神經性不眠症，臟躁症，顛顛等。

說明 本品係含溴之脂肪及植物性浸膏，使用較大量亦頗為安全，且不發生腸胃障礙等副作用。

第二十九章 化學治療劑

【前言】 本章所列化學治療劑，僅磺胺類，青黴素，及治療黑熱病與住血吸蟲病之銻劑等數種。其餘化學治療劑如六〇六，馬法生等詳於驅梅毒劑章；百司母困，阿的平詳於瘧疾劑(退熱劑)章；藥特靈，慰歐仿等詳於痢疾劑章。鏈黴素，使他肺安定詳於結核劑章等等。

第 429 方

氨苯磺胺 7.0 Sulfanilamide 7.0

服法口授。 As ordered.

主治 各種溶血性鏈球菌傳染，淋球菌，肺炎球菌，腦膜炎球菌，痢疾桿菌，大腸菌等所致之傳染病。

說明 此方所列為一日量之中等劑量，嚴重病例可增加至 9—10gm.。第一劑例用較大量，如全日劑量為 6.0 時，則第一劑用 2gm.，其餘平均分配五包，每四小時一次，日夜連服。其類似製品甚多，如 Prontosil, Rubiazol, Pronzin, Sulfamidine, Proseptasine, Sulfolid, 1162 F, Therapol, Prontylin, Streptocide, Sulfamidgl 等。

第 430 方

烏利龍 7.0 Uleron 7.0

重曹 7.0 Sod. Bicarb. 7.0

服法口授。 As ordered

主治 主用於淋菌傳染。

說明 用法與上方同，同類製品有 Urontal. Urganin 等。

第 431 方

磺胺醋胺	7.0	Sulfacetamide	7.0
重曹	7.0	Sod. Bicarb.	7.0
服法	口授。 As ordered		

主治 與氨基磺胺同。

說明 用法與氨基磺胺同，毒性較小，功效較大。同類製品有 Albucid. Neo-Gerison 等。服藥期間宜多飲開水。

第 432 方

磺胺嘧啶	7.0	Sulfapridine	7.0
重曹	7.0	Sod. Bicarb.	7.0
服法	口授。 As. ordered		

主治 與氨基磺胺大致相若，對於葡萄狀球菌，腦膜炎球菌，肺炎球菌，淋球菌所致之各種傳染，其價值較氨基磺胺為高。

說明 服法與氨基磺胺同。服藥期間多飲水，副作用較大，尤易致惡心嘔吐。大健嵐 (Dagenan) 為其代表製品。

第 433 方

磺胺噻唑	7.0	Sulfathiazole	7.0
曹曹	7.0	Sod. Bicarb	7.0
服法	口授。 Ao ordered		

主治 磺胺劑中治葡萄狀球菌傳染功效最佳，其他與氨基磺胺略同，功效則勝之。

說明 服法與氨基磺胺同，但其排洩甚速，遇較重病例，每日劑量可增加至 10—12gm.,

服藥間隔應縮短至三小時一次，並多飲水。
 製劑有 Thiazon, Sulthia, Cibazol, Thizamide 等。

第 434 方

磺 胺 胍	9.0	Sulfaguanidine	9.0
重 曹	9.0	Sod. Bicarb.	9.0

服法口授。 As ordered

主治 桿菌痢疾，腸管內各種傳染。

說明 第一次用 4 gm.，以後每隔四小時服 1 gm.。本品在腸中不易吸收，故對腸中傳染特佳。服藥期間多飲水，其他注意點與一般磺胺藥同。

● 第 435 方

琥珀磺醯胺噻唑	8.0	Sulfasuxidine	8.0
重 曹	8.0	Sod. Bicarb.	8.0

服法口授。 As ordered

主治 與磺胺胍同。

說明 第一劑用 2 gm.，以後每四小時 1 gm.。本品功效與磺胺胍完全相同，毒性較低，劑量較小。

第 436 方

磺胺密啶	5.0	Sulfadiazine	5.0
重 曹	5.0	Sod. Bicarb.	5.5

服法口授。 As. ordered

主治 溶血性鏈球菌，肺炎球菌，腦膜炎球菌，葡萄狀球菌，淋球菌，鼠疫桿菌，痢疾桿菌，大腸菌，敗血性梭菌，軟下疳桿菌

，花柳性淋巴肉芽腫瀉過性毒傳染病等。

說明 本品除對葡萄狀球菌，其療效略次於磺胺噻唑外；對痢疾桿菌及腸管疾患其療效略次於 Sulfaguanidine 及 Sulfasuxidine 以外，其餘皆較以上其他磺胺劑為高，且毒性亦最小，久稱常用磺胺劑中之最優秀者。服法為第一劑 2gm.，以後每隔六小時 1gm.，但對於較為嚴重之病例，可酌增其劑量至每日 8—9gm.，四小時一次。

第 437 方

磺胺甲基噻啉	5.0	Sulfamerazine	5.0
重曹	5.0	Sod. Bicarb.	5.0
服法	口授。 As ordered		

主治 與磺胺噻啉同。

說明 本品與磺胺雙甲噻啉，(Sulfamethazine) 均為最新出品，毒性反應更小，用量亦可稍稍減少。較之磺胺噻啉又有百尺竿頭，更進一步之概矣。

第 438 方

酞醯磺胺噻啉	7.0	Sulfathalidine	7.0
重曹	7.0	Sod. Bi carb.	7.0
服法	口授。 As ordered		

主治 桿菌痢疾，腸管內傳染。

說明 本品功效較 Sulfasuxidine 強 2—4 倍，毒性亦低。

第 439 方

磺胺嘧啶純	5.0	Sulfapyrazine	5.0
-------	-----	---------------	-----

重曹	5.0 Sod. Bicarb.	5.0
服法	口授。 As ordered	
主治	與 Sulfadiazine 同。	
說明	服法及毒性與 Sulfadiazine 相仿。	
第 440 方		
益解紛	5.0 Irgafen	5.0
重曹	5.0 Sod. Bicarb.	5.0
主治	與 Sulfadiazine 相仿，對肺炎尤有特效。	
說明	參照 Sulfadiazine 方下。	
第 441 方		
磺胺噻唑	3.0 Sulfathiazole	3.0
氨基磺胺	3.0 Sulfanilamide	3.0
外用	For External	
主治	各種傳染性創傷。	
說明	用本劑撒布於局部，可以在其周圍維持相當水準以達制菌之效，達數日之久，但每次所用不得超過 6 公分，以防吸收中毒。磺胺劑中外用者以此兩種為最多，亦可分別單獨使用。其他如 Sulfagunidine, Sulfasuxidine, Sulfadiazine 亦為優良之外用劑。	
第 442 方		
磺胺噻唑顯微細晶	Sulfathiazole Microc-	
	30.0 rystals	30.0
花生油	加至 100.0 Peanut oil	ad 100.0
外用。	For External	

主治 各種傳染性創傷，尤多用於腹腔內，手術創內，耳鼻內。

說明 本品稱為顯微細晶混懸液，為目前磺胺劑中之最優秀局部應用劑，因其吸收緩慢，對組織少毒性。

第 443 方

氨基磺胺	5.0 Sulfanilamide	5.0
凡士林	100.0 Vaseline	100.0

外用。 For External

主治 皮膚創傷。

說明 本劑亦可配伍其皮膚科藥劑，如亞鉛華，柳酸等。Sulfathiazole 亦甚多調為油膏劑外用者。

【附註】 (A) 磺胺劑之鈉鹽溶液，可以供肌肉注射，靜脈注射，脊管注射。肌肉注射用 20% 溶液，多用 Sulfathiazole 及 Sulfadiazine，靜脈注射用 5% 溶液，可用 Sulfanilamide, Sulfapridine, Sulfathiazole, Sulfadiazine, Sulfacetamide 等；脊管內注射用 0.8% 溶液。

(B) 磺胺劑使用後常發生各種毒性反應，輕者如手足發麻，耳鳴重聽，惡心嘔吐，食慾不良等，此時可略減其劑量，甚或不必要；較重反應，如皮膚發疹，發紺，視覺，聽覺障礙，肝炎，腹瀉，血尿，尿閉等情形，則應立即停藥，並使服大量開水，以促排洩；危險之毒性反應如溶血性貧血

，顆粒性白血球減少症，胃腸出血，尿中毒，酸中毒，心肌炎，關節炎等時，則除停藥及大量飲水外，更須按各該病狀施以救治。

- (C)服氨基磺胺宜少飲開水(遇中毒時例外)服其他磺胺劑宜多飲開水。(但服磺胺噻唑則又不宜太多飲。)
- (D)服磺胺藥期間忌服鹽酸瀉劑或其他酸瀉劑；忌蛋類食品，鹹魚，鹹肉及其他不易消化之食物。
- (E)服氨基磺胺不必定加重曹，服其他磺胺劑則重曹為必需。
- (F)服藥期間應隨時注意其中毒症狀，可能時常計算其白血球及血色素定量。
- (G)病人中有一部份有抗磺胺性，故用藥數日絲毫未見效者，即應考慮改用他藥。
- (H)磺胺劑可以互相配合應用，每種劑量減少，可以防免各種反應。
- (I)漣潔羣著磺胺類之研究及其臨床應用一書，可以參閱。

第 444 方

青黴素	200,000單位	Penicillin Sodium	
鈉鹽			200,000 i.u.
滅菌蒸餾水	20公撮	Aq. dest. Steril.	20 c.c.
注射用。		Pro injection	

主治 癰，癰，丹毒，蜂窩織炎，膿性關節炎，肺炎，氣管支炎，腦膜炎，急性闌尾炎

，產褥熱，各種菌血症，淋病，腹膜炎，中耳炎，乳突炎，心內膜炎，白喉，文生氏咽峽炎，腎炎，梅毒，炭疽，氣性壞疽，顆粒性白血球缺乏症等。

- 說明 (1) 目前青黴素有四種，即青黴素甲，乙，丙，丁，即 Penicillin F. G. X. K.)，注射多用其鈉鹽。其中最純者亦即最佳者為結晶性青黴素乙鈉鹽 (Cryst. Penicillin G. Sodium)。
- (2) 青黴素大都用作肌肉注射。亦有用靜脈內持續滴入法；肌肉內持續滴入法，脊管內注射者。肌肉注射都用每公撮含一萬單位溶液，(結晶性青黴素乙鈉鹽可以每公撮含 4—5 萬單位其他則用每公撮含 500—5000 單位溶液。
- (3) 青黴素之注射須每隔三小時一次，日夜連續注射。普通病人每日劑量約為二十萬單位，平均分八次注射完畢，(即三小時一次)較重病例或特重病例則每日可用三十萬，至四十萬或五六十萬單位。
- (4) 青黴素溶解後更易失效，故須貯藏於冰箱中，普通溶解後如放置 4—5 日，即已失效。

第 445 方

青黴素鈉鹽 3,750,000 單位

Penicillin Calcium
3,750,000 i.u.

白蜂蠟 1.35公分 White Bees-wax 1.35 gm.
 花生油 加至30公撮 Peanut oil ad 30.0
 注射用。 Pro injection

主治 與上同。

說明 (1)本劑即稱為青黴素油蠟懸浮液。(Penicillin-oil-Beeswax Suspension)

(2)普通青黴素溶液吸收甚速，排洩亦快，故須每三小時注射一次，頗為麻煩。用本劑注射於肌肉，可在體內維持藥效18—24小時，故通常每日僅需注射一次。

(3)本處方係英國藥局方，現市上所售者均為每公撮含青黴素三十萬單位者，一日一次注射已足。

(4)注射針頭宜粗，注射器宜滅菌而乾燥者。

第 446 方

青黴素鈣 1,000,000單位 Penicillin Calcium 1,000,000 i.u.
 羊毛脂 1.5公分 Wool Fat 1.5 gm.
 橄欖油 3.5公撮 Oliver oil 3.5 c.c.
 混和，作成膠囊20 M. F. Di. No. 20 in
 個。 Capsule.

主治 與上同。

說明 (1)本劑製法甚煩，茲不贅。

(2)青黴素在胃中易被破壞，故須滲入羊毛脂，橄欖油等基礎，製成特種膠囊，以免被胃液所破壞。

(3)本劑用量較大，不合經濟原則。

第 447 方

青黴素鈣	60,000單位	Penicillin Calcium	60,000 i.u.
磺胺嘧啶	30公分	Sulfathiazole	30gm.
混和外用		M. F. Pro External	

主治 各種手術創，各種傳染性創傷。

說明 本劑須用滅菌手續調製。

第 448 方

青黴素鈉	75000單位	Penicillin Sodium	75000 i.u.
氯 甲 酚	0.015公分	Chlorocresol	0.015 gm.
氫 化 鈉	0.42公分	Sodium Chloride	0.42 gm.
蒸 餾 水	加至30c.c.	Aq. dest.	ad 30 c.c.
滴眼用。		Pro Eye Drops	

主治 化膿性結膜炎，角膜潰瘍，眼食炎，角膜結膜炎，沙眼，初生兒眼炎。

說明 本品除滴眼外，兼可為滴鼻劑。

第 449 方

青黴素片劑	1 瓶	Penicillin Lozenges	1 bottle
用法口授。		As ordered	

主治 咽喉炎，扁桃腺炎，白喉，齒齦炎，齶槽膿漏等。

說明 本品每片含青黴素500及1000單位，用此藥一片放於下齒齦與頰溝之間隙，每小時一片，令其緩緩溶解，可以在口腔及咽喉部份維持頗高濃度，一部份則被吸收。

第 450 方

青黴素鈉 或鈣鹽	50000單位	Penicillin sodium (or calcium)	50000 i.u.
-------------	---------	--------------------------------	------------

皂化蠟	7.0公分	Emulsifying wax	7.0 gm.
硬石蠟	5.0公分	Paraffin	5.0 gm.
液體石蠟	41.0公分	Paraffin Liq.	41.0 gm.
氯甲酚	0.1公分	Chlorocresol	0.1 gm.
蒸餾水	47.0公撮	Aq. dest.	47.0 c.c.

製成乳膏外用。 M.S. Creams Pro External

主治 各種傳染性皮膚創傷。

說明 本劑即稱青黴素乳膏。

第 451 方

青黴素鈣	50000單位	Calcium penicillin	50000i. u.
羊毛醇軟膏	100公分	Gint. of wool alcohols	100 gm.

外用。 For External

主治 與上同。

說明 羊毛醇軟膏之處方如下：

羊毛醇(Wool Alcohols)	5 gm.
硬石蠟(Paraffin)	24 gm.
凡士林(Vaselin)	10 gm.
液體石蠟(Liq. Paraffin)	60 gm.

加溫熔和，攪拌至冷即得。

第 452 方

青黴素鈣	100,000單位	Calcium Penicillin	100,000 i. u.
------	-----------	--------------------	---------------

黃石脂	90公分	Vaselin Yellow	90 gm.
羊毛脂	10公分	Lanolin	10 gm.

眼科用。 For Ophthalmie

主治 前房蓄積性潰瘍，角膜潰瘍，結膜炎，

臉邊炎。

說明 本劑需每隔1—2小時用一次。

第 453 方

青黴素鈉 100,000單位 Penicillin Sodium 100,000
i. u.

磺胺醋胺 20gm. Sulfacetamide 20 gm.

蒸餾水 加至100公撮 Aq. dst. ad 100 c.c.

右為洗劑。 For Washing

主治 瘻管，癩孔，皮膚傳染疾患，火傷等。

說明 本品每公撮僅含一千單位，故作為洗劑及敷料。

第 454 方

青黴素鈣 300,000單位 Penicillin Calcium 300,000
i. u.

磺胺噻唑 30 公分 Sulfathiazole 30 gm.

右為吸入劑。 M. F. Snuffs

主治 鼻部傳染性疾患。

說明 取二英寸見方之紙一張，對角摺轉，使留摺痕，然後鋪平，其中心部置藥粉一小堆。頭部向後仰起，一鼻孔用手指閉住，將藥粉傾入另一鼻孔，同時用力一吸，則藥粉自然吸入。另一鼻孔亦如法泡製。

第 455 方

青黴素鈣 500,000單位 Penicillin Calcium 500,000
i. u.

可可立脂 1 公分 *öl cacao*, 1 gm.

製成栓製一個。 M. F. Saposit No. 1

說明 以此藥塞入肛門，俾由直腸吸收以達全身。亦有製成陰道栓劑以治療子宮頸糜爛等疾患者。

- 【附註】 (A)青黴素之安定度甚低，遇潮遇熱均易失效，故均須密封後置入冰箱。
- (B)青黴素之調製均須無菌操作，故事實上臨床醫師僅能用外國製成品。
- (C)關於青黴素之種種可參閱連潔羣著青黴素之研究及其臨床應用一書。

第 456 方

福 錫 40 公撮 Fouadin 40 c.c.
注射用。 Pro injection

主治 日本住血吸虫病。對黑熱病及腹股溝肉芽腫亦有效。

說明 (1)本品為目前較進步之三價錫劑，含錫 13.5%。療效略差於酒石酸錫鉀，但其毒性遠較後者為輕。故對於住血吸虫病，目前已少用酒石酸錫鉀及鈉矣。

(2)用其 7% 溶液作肌肉注射，局部反應甚少。第一日用 1.5c.c.，第二日 3.5c.c.，第三日 5 c.c.，以後間日注射 5c.c. 至總量達 40 c.c. 為一治程。

第 457 方

安錫胃林 50 公撮 Anthiomaline 50 c.c.
注射用。 Pro injection

主治 住血吸虫病。腹股溝肉芽腫。

說明 (1)本品含錫 16%，副作用較酒石酸錫鉀為

小，但與效驗則與其相等。亦為目前優秀之三價銻製劑。

- (2) 用6%溶液作肌肉注射。第一日 1 c.c.，第二第三日各 2 c.c.，第四日 3 c.c.，以後間日 3 c.c.，直至總量 40—60 公撮為止。

第 458 方

新斯銻波霜 3.0 Neo Stibosan 3.0
注射用。 Pro injection

主治 黑熱病（卡拉阿薩），皮膚什利曼氏原虫病。

說明 (1) 本品包裝有 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 1.0, 2.0, 及 3.0 公分七種，成人普通第一日用 0.2 gm.，以後每日注射 0.3 gm.，繼續用 10—12 日，即為一療程，大多數病例可以痊癒。兒童劑量（體重在十三公斤以下者）開始用 0.05 公分，以後用 0.1 公分。

(2) 本品為裝於安甌之粉劑，臨用時用蒸餾水溶化，一份藥溶化於四份蒸餾水，例如 0.3 公分則用 1.2 公撮溶解之，供肌肉注射。如靜脈注射，則用其 5% 溶液為妥。例如 0.3 公分溶解於六公撮蒸餾水中。

(3) 本品含銻 40%，應用極少反應，至為安全。

第 459 方

敏利斯錫貝明 2.0 Urea Stibamine 2.0
 注射用。 Pro injection

主治 與上同。

說明 本品第一劑量爲 0.1 gm., 以後每次加
 0.05 gm., 至一次最高量達 0.25 gm.,
 乃按此量繼續注射, 至全量 1.5—2.5gm.
 爲止。溶解及使用方法同上。

第 460 方

聖露斯錫波霜 100 公撮 Solu Stibosan 100 c.c.
 注射用。 Pro injection

主治 與上同。

說明 (1) 本品每公撮含五價錫 20 mg., 其溶液
 甚爲安定。

(2) 100 公撮分作十日注射, 第一劑較少,
 以後各劑同。

(3) 本品靜脈, 肌肉, 皮下均可注射。但皮
 下注射究不甚妥。

(4) 國產中聖露斯錫新等。

第 461 方

縮濃斯錫
 波霜溶液 20 公撮 Concentrated Solustibosan
 注射用。 20 c.c. Pro injection

主治 與上同。

說明 本劑每 c.c. 含量約爲聖露斯錫波霜之
 五倍, 故其劑量可類推。

【附註】 其他應用於黑熱病之藥劑尙有 Diamid-
 ines 之化合物, 其最著者有 Stibamidine,
 Propamidine, Pentamidine 等。

第三十章 麻醉劑

Anaesthetica.

第 462 方

鹽酸可開因	0.5	Cocain. hydrochloric.	0.5
硼 酸	0.15	Acid. boric.	0.15
餾 水	5.0	Aq. destill.	5.0

右爲塗布料。 S. Zum Einpinseln.

主治 粘膜炎症，充血症（鼻咽喉粘膜）。

說明 本方應用須由醫師行之。

鹽酸可開因溶液爲塗布用之濃度爲 5—10%，一回用量約 10—15 滴。點眼用 1—2—3 /，每回用 2—3 滴。

第 463 方

鹽酸可開因	1.0	Cocain. hydrochloric.	1.0
餾 水	10.0	Aq. destill.	10.0
鹽化腎上腺素液（千倍）	2 滴	Sol. Adrenalin. hydrochl. (1:1000)	Gtt II.

右爲塗布料。 S. Zum Einpinseln.

主治 與前方同。

第 464 方

鹽酸可開因	1.0	Cocain. hydrochl.	0.1
食鹽水(0.9%)	100.0	Sol. Natr. chlorat. (0.9%)	100.0
鹽化腎上腺素液（千倍）	5 滴	Sol. Adrenalin. hydrochl. (1:1000)	Gtt V.

右爲浸潤麻醉料。 S. Zur Infiltration-Anaesthesia.

說明 外科手術時注射皮下以起局部麻醉。本方溶液 50.0 含鹽酸可開因 0.05，為一回之極量，故一回用量不可超過 50 c.c. 尋一回用 5—10—50 c.c.

凡鹽酸可開因溶液添加鹽化腎上腺素液，足以防其吸收而使其作增強持久。

第 465 方 舒來希氏液 Schleich'sche Lösung,

鹽酸可開因	0.2	Cocain. hydrochl.	0.2
鹽酸嗎啡	0.025	Morphin. hydrochl.	0.025
食 鹽	0.2	Natr. chlorat.	0.2
石炭酸水(5%)	2 滴	Sol. Acid. carbolic.	
		(5%)	Gtt II.
醫 水	100.0	Aq. destill.	100.0

右為皮下注射料。 S. subcutan. Injektion.

說明 此稱舒來希氏第一液，遇手術部疼痛劇重，知覺銳敏時用之。

第二液製法將上方鹽酸可開因量 0.2 減為 0.1 即得，為日常手術時所用。

第三液製法將上方鹽酸可開因量減為 0.01，鹽酸嗎啡量減為 0.005 即得，遇手術部廣闊，需大量時用之。

近更改良之如下方。

第 466 方

鹽酸可開因	0.05	Cocain. hydrochl.	0.05
阿 利 品	0.05	Alypin.	0.05
食 鹽	0.2	Natr. chlorat.	0.2
醫 水	100.0	Aq. destill.	100.

右爲皮下注射劑。 S. Subkutan. Injektion.

說明 應用與上方同。

第 467 方

鹽酸可開因	0.05	Cocain. hydrochl.	0.05
食鹽水(0.9%)	5.0	Sol. Natr. chlorat.	
		(0.9%)	5.0

鹽化腎上腺素 液(千倍)	5 滴	Sol. Adrenalin. hydrochl. (1:1000)	Gtt V.
-----------------	-----	---------------------------------------	--------

右一回二筒 以內 S. 1 mal Innerhalb 2 Spritze.
皮下注射。 zur subkutan Injektion.

說明 本方溶液爲導導麻醉 Leitungsanaesthesie 用。如指趾等手術時結紮其近側端，而注射其神經絡過處。又脊髓麻醉 Rhachianaesthesie 亦用之。

第 468 方

鹽酸可開因	0.5	Cocain. hydrochl.	0.5
拉諾林	18.0	Lanolin.	18.0
洋橄欖油	2.0	Ol. Olivar.	2.0

右混和爲軟膏外用 ut f. unguent.

。 S. äusserlich.

主治 有痛皮膚病。

第 469 方

鹽酸可開因	0.02	Cocain. hydrochl.	0.02
柯柯脂	2.0	Ol. Cacao	2.0

右混和爲藥栓，給 ut. suppos. D. tal. dos.

同量五個，一回一 No. V. S. Bei Bedarf 1

個。 Zäpfchen

第 470 方

鹽酸可開因 0.05 0.1 Cocain. hydrochl. 0.05-0.1
 乳 糖 2.0 Sacchar. lact. 2.0
 右混和均分五包， M. f. pulv. div. in part.
 一日一二回，一回 aeq. No. V. S. 1—2 mal'
 一包。 tgl. 1 Pulver.

主治 胃痛嘔吐。

說明 鹽酸可開因有製就錠劑每片含 0.005，
 ，一回 1—4 片。

第 471 方

鹽酸可開因 0.5 Cocain. hydrochl. 0.5
 鹽酸嗎啡 0.5 Morphin. hydrochl. 0.5
 木 焦 油 5.0 Kreosot. 5.0
 右混和外用。 M. D. S. äusserlich.

主治 蛀齒疼痛。

說明 以極小綿球浸本液塞入蛀齒窩腔內。

第 472 方

諾服開因 0.25—0.5 Novocain. 0.25—0.5
 滅菌鹽水 5.0 Aq. destill. steril. 5.0
 鹽化腎上腺素 5 滴 Sol. Adrenalin. hydrochl.
 液 (千倍) (1:1000) Gtt V,
 右爲塗布料。 S. Zur Einpinseln.

主治 鼻，咽，喉粘膜炎症，充血症。

說明 諾服開因毒性較鹽酸可開因輕，約爲其
 1/5，溶液又可加熱滅菌，故多用之，其濃
 度與一回用量約如下。

- (1) 粘膜炎用 5—10% 溶液
- (2) 點眼用 2—5% 溶液
- (3) 粘膜炎注射如拔牙用 1.5% 溶液 1 c.c.
- (4) 浸潤麻醉用 0.5% 溶液 100 c.c. 以內。
- (5) 傳導麻醉用 2% 溶液 5 c.c. 以內
- (6) 脊髓麻醉用 5% 溶液 3 c.c. 以內

第 473 方

諾服開因	0.5	Novocain.	0.5
生理食鹽水	100.0	Sol. Natr. chlorat. physi-	
		olog.	100.0
鹽化腎上腺素 液 (千倍)	10 滴	Sol. Adrenalin. hydroch. (1:1000)	Gtt X.

右為浸潤麻醉料。 S. Zum Infiltrationanaesthesie.

說明 此即 0.5% 諾服開因溶液，一回用 100 c.c. 以內，一般外科手術須局部麻醉時多用之。

第 474 方

諾服開因	0.1	Novocain.	0.1
生理食鹽水	5.0	Sol. Natr. chlorat. physi-	
		olog.	5.0
鹽化腎上腺素 液 (千倍)	5 滴	Sol. Adrenalin. hydrochl. Gtt. v.	

右為傳導麻醉料。 S. Leitungsanaesthesie.

說明 指趾外科手術時用之。一回用 5 c.c. 以內。

第 475 方

諾服開因	0.15	Novocain.	0.15
滅菌蒸水	3.0	Aq. desüll. steril.	3.0
鹽化腎上腺素 液(千倍)	5 滴	Sol. Adrenalin. hydrochl. (1:1000)	Gtt. v.

右爲脊髓麻醉料。 S. Rhachianaesthesiae.

說明 下肢手術時用之，一回用 3 c.c. 以內。

局部麻醉藥除上列可開因，諾服可開因外尚有多種，均可代可開因而應用，前舉其要於下。

- a. 培他歐開因 Beta-Eucain. 毒性較微，其溶液耐熱滅菌，點眼用 2%，拔牙用 2—3% 浸潤麻醉用 0.1%，後二者中可加鹽化腎上腺素液(千倍)所加之量約於其 10 c.c. 中加三滴。
- b. 鹽酸脫羅怕可開因 Tropicocain. hydrochloric. 其溶液亦能耐熱滅菌，應用濃度粘膜塗布用 10—20%，點眼用 3—10%，齒科用 4—5% 一回 1—2 c.c.，脊髓麻醉用 5% 一回 1 c.c. 溶液可用食鹽水製之。
- c. 阿利品 Alypin. 亦能耐熱滅菌，應用濃度塗布用 2—10%，點眼用 1—5%，齒科用 2%，浸潤麻醉用 0.1—0.5%，脊髓麻醉用 2%。
- d. 斯托乏因 Stovain. 能耐 120 度熱滅菌，應用濃度，塗布用 5%，齒科用 1%，

傳導麻醉用 0.5—1%，脊髓麻醉用 4—5%。

- c. 阿柯因 Acoïn. 眼科愛用之，點眼用 0.1%，以 0.8% 食鹽水製之，點後眼結合膜，角膜之知覺鈍麻矣。

第 476 方

奧托仿 0.5—1.0 Orthoform 0.5—1.0

右給同量五包，發 D. tal. dos. No. V.

作時服一包。 S. Bei Anfall 1 Pulver.

主治 發作性胃痛(胃潰瘍，胃癌)宜食後服。

第 477 方

阿內斯退辛 0.3—0.5 Anaesthesin 0.3—0.5

右給同量十包，一 D. tal. dos. No. X.

日三回，一回一包。 S. 3 mal. tgl. 1 Pulver.

主治 胃痛，嘔吐，暈船。

第 478 方

阿內斯退辛 0.2 Anaesthesin 0.2

次硝酸銻 0.3 Bismuth. subnitric. 0.3

右混和與同量十包 M. f. pulv. D. tal. dos.

，一日三回，一回

一包。 Pulver.

主治 胃潰瘍。

第 479 方

阿內斯退辛 2.0 Anaesthesin. 2.0

柯柯脂 1.5 Ol. Cacao 1.5

右混和為藥栓，與 ut. f. suppos D.t.d.No.X.

同量十個，一日一 S. 1—2 mal tgl.

二回，一回一個。 1 Zäpfchen.

主治 肛門裂創，痔疾。

第 480 方

阿內斯退辛	0.5—1.0	Anaesthesin	0.5—1.0
拉諾林		Lanolin.	
凡士林	各10.0	Vaselin.	āā 10.0

右混和爲軟膏外用 ut f. Unguent.
S. äusserlich.

主治 土皮剝脫，潰瘍，創傷，皮膚炎，癢疹
性皮膚病。

第 481 方

阿內斯退辛		Ar.aesthesin.	
(或奧托仿)		(S. Orthoform)	
乳 糖	各 5.0	Sacchar. lact.	āā 5.0

右混和爲散，用吹 M. f. pulv. D. S. Mittels
粉器噴布。 Pulverblässer einstauben

主治 與前方同。

第 482 方

普魯卡因	1.0	Procain	1.0
鹽化腎上腺素	10 滴	Adrenalin Hcl.	
液(千倍)		(1:1000)	10 i.u.
滅菌蒸餾水	100.0	Aq. dest. Steril.	100.0

右爲傳達麻醉及浸 S. zum Infiltration.
潤麻醉料。 Anasthesia x. Leilung.
Sanasthesia.

說明 一般外科之四肢及肌膚手術多用之，亦
有以其 3—6% 溶液作脊椎麻醉者。

第 483 方

本妥卡因	0.5	Pantocain	0.5
鹽化腎上腺素 液(千倍)	10 滴	Adrenalin Hcl. (1:1000)	10 i.u.
滅菌蒸餾水	100.0	Aq. dest. Steril.	100.0

右爲浸潤麻醉料。 S. Zinn. Infiltration Anesthesia

說明 一般外科之四肢及肌層手術多用之。脊椎麻醉用本妥卡因“L”。

第 484 方

哥羅仿 (麻醉用)	50 c.c.	Chloroform	50 c.c.
--------------	---------	------------	---------

吸入麻醉用 Pro Narcosi

說明 此爲常用之吸入麻醉劑，麻醉功用卓著，但對於有心臟疾患者禁忌使用，對於嬰兒，老人，肥胖及虛弱者亦宜小心應用。

第 485 方

依打(麻醉用)	60c.c.	Aether	60 c.c.
---------	--------	--------	---------

吸入麻醉用 Pro Narcosi

說明 依打之使用較哥羅仿略爲安全，但其麻醉功用亦較次於哥羅仿。

第 486 方

哥羅仿		Chloroform	
依打	各 30c.c.	Aether	各 30 c.c.

吸入麻醉用。 Pro Narcosi

說明 用兩種各等份配合後，可以收兩藥之長處而摒絕其短處，目下外科醫師多喜用之。

第 487 方

純 醇	10 c.c.	Alcohol absolute	10 c.c.
奇 羅 仿	20 c.c.	Chlorform	20 c.c.
依 打	30 c.c.	Aether	30 c.c.

吸入麻醉用。 Pro Narcosi

說明 此稱為英法合劑。

【附註】 全身麻醉之症狀及經過如下：

1. 第一期（麻醉開始期）：意識存在，患者欲除去口罩，或故意停止呼吸。漸後則意識稍混濁，有時發生惡心，流涎，顏面潮紅，反射作用仍存在，脈搏及呼吸無顯着變化。
2. 第二期（興奮期）：興奮狀態如高歌，狂叫，談笑，哭泣，怒吼，欲起立，轉移手足，除去口罩等，脈搏，呼吸稍增加，反射尚存，瞳孔稍散大。
3. 第三期（深醉期）：手術可於此期中進行，患者高度興奮忽然鎮靜，意識完全消失，肌肉弛緩，痛覺及反射均消失，顏面蒼白，脈搏細緩，呼吸安靜，瞳孔漸漸縮小，角膜反應消失。

由開始麻醉至深醉期所需之時間，應人而異，但一般約 4—5 或 7—8 分鐘。此期中如麻藥過量，則迅即中毒，其症狀為瞳孔極度擴大，呼吸急促甚至停止，脈搏細數，終至死亡。

4. 第四期（覺醒期）：如中止麻醉，即次節覺醒，脈搏，呼吸，反射，瞳孔，意識均漸復正常。一如大夢初醒然，亦有再發輕度之興奮者。

第三十一章 維生素劑

第一節 甲種維生素 (Vitamin A)

第 488 方

魚肝油 1 瓶 Cod-Liver-oil 1 bottle

服法口授。 As Ordered

主治 結膜乾燥症，夜盲症，角膜軟化症，瀰
胞性結膜炎，皮膚乾燥症及缺脂症等。（
其他見丁素項下處方）。

說明 (1)魚肝油有兩種，一為鱈魚肝油，另一為
比目魚肝油，其中以比目魚肝油中甲素
之含量較高。

(2)按照美國藥典規定，魚肝油每 c.c. 至
少應含甲素 850 單位。或人劑量每次
10 c.c.，每日三次，飯後服。孕婦及
授乳婦略增其劑量，兒童則需視其需要
增減。

(3)食物中甲素最豐者有牛肝，豬肝，雞蛋
黃，鰵油，鱒魚，骨髓，鰻，牡蠣牛奶
等。

(4)俗稱魚肝油精者即魚肝油之縮濃劑，（
Cod Liver oil concentrated）有油劑
及膠囊劑兩種，按規定每公撮縮濃劑甲
素之含量不得少於 50,000 單位，不得
多於 65,000 單位，但事實上須視各種
商品之良窳而異。

第 489 方

胡蘿蔔素油劑 1 瓶 Carotene in oil 1 bottle
服法口授。 As ordered

主治 與上同。

說明 (1) 本劑內含一種胡蘿蔔素，因其一經入人體後即變成甲素故也，故稱甲種維生素元或甲素元。成人每次服 1—2 c.c.，每日三次。(本品每公分含甲素 7,500 單位)。

(3) 食物中含本素較豐者有苜蓿，胡蘿蔔，莧菜，紅薯，蘿蔔菜，洋葱，芥菜葉，菠菜，黑豆，白菜等。

第二節 乙種維生素(Vitamin Bcomplex)

第 490 方

硫胺(乙種維生素) 5.0公絲 Thiamin Hydrochloride 5.0 mg.

一日三次分服。 S. 3×1

主治 各種脚氣病，神經炎等。

說明 (1) 1.0mg. 之硫胺含 330 國際單位。成人每日之需要量均自 1.2mg. 至 2mg.，嬰兒約自 0.3—0.6 mg.，妊娠後期及授期約為 1.8 mg. 至 2.0 mg.，熱性病人之需要量甚高，通常每日予以 5—10 mg.。

(2) 食物中含本品較豐者有瘦豬肉，豬腰，火腿，牛肝，煮蛋黃，牛肉，羊肉，釀母，米糠，花生米，全麥麵粉，糙米，

乾黃豆，菠菜，白菜，葡萄菜等。

- (3)本品之製劑甚多，較着者有 Benerva, Betaxin, Thiamine Hcl, Betalm, Vitasin, Vibemin, Beetomin, Paranutrin 等。
- (4)本品有片劑及注射劑兩種，各因需要而定其劑量。

第 491 方

核黃素(乙2種 5.0mg Riboflavin (Vilamin B₂)
維生素) 5.0 mg.

一日三次分服。 S. 3×1

主治 因核黃素缺乏而起之唇炎，角膜炎，舌炎，皮脂溢性皮炎。

說明 (1)成人每日需要量約自 1.6—2.6 g.，授乳婦為 2.5—3.0 mg. 兒童需要量較低。治療都用較大量如 3.0 mg.—5.0 mg. 或 10 mg. 等。

(2)食物中含本品較多者有乾糧母，豬肝，牛肝，小米，魚卵，沙丁魚，蛤蜊，雞蛋，豇豆，番茄，紅薯，麵粉，瘦豬肉，黃豆等。

(3)本品又稱乳黃素，卵黃素，後經美國醫藥會定名為核黃素(Riboflavin)。歐美各大廠家均有出品，為片劑內服。

第 492 方

菸鹼酸 100 公絲 Nicotinic Acid (Niacin)
100 mg.

一日三次分次。 S. 3×1

主治 陪拉格拉（癩皮病）。因菸鹼酸缺乏之腦病，皮炎，舌炎等。

說明 (1)本品亦為乙種維生素之一種。商品中有 25 mg., 50 mg., 100 mg., 之片劑，及 2.5% 及 10% 之注射液（菸鹼酸鈉）。

(2)食物中含菸鹼酸較豐者有肝浸膏，米糠浸膏，乾釀母，羊肝，豬肝，豬腰，火腿，瘦豬肉，牛肉，脫脂奶粉，雞蛋，全麥，糙米，苜蓿，白菜，白米，白麵粉等。

第 493 方

葉片酸 20 公絲 Folic acid 20 mg.

一日三次分服。 S. 3×1

主治 各種原因之巨血球細胞性貧血。

說明 (1)葉片酸有針劑及片劑二種，針劑供肌肉注射。

(2)葉片酸亦為乙種維生素之一員。

(3)食物中含本品較多者有肝浸膏，Difeo 釀母浸膏，豬肝，牛腎，牛肉，牛心，牛腦等。

【附註】乙種維生素中尚有對氨安息香酸 (P-Aminobenzoic acid, 簡稱 PAB)，煙基吡啶 (Pyridoxine)，左旋生酸 (Pantothenic acid)，生素 (Biotin)，胆素 (Choline)，肌醇 (Inositol) 等數種。但對於人體之營養價值

尚未完全明瞭，故不贅。

第三節 丙種維生素(Vitamin C)

第 494 方

丙種維生素 150公絲 Vitamin C 150 mg.
一日三分服。 S. 3×1

主治 壞血病，結核症，長期熱症，各種出血症。

說明 (1)本品又稱抗壞血病酸。

(2)本品有片劑及針劑二種。針劑可供靜脈及肌肉注射。

(3)食物品含丙素較多者有黃刺梨，青辣椒（大而圓），柚汁，綠莧菜，豌豆苗，芥菜葉，橙汁，青菜，美國金山橙汁，福州桔，油頭桔，羊肝，小白菜，菠菜，波菜，豬肝，紅薯，番茄，天台密桔，牛乳等。

(4)本品之製劑甚多，較著者有 Redoxon, Cebion, Cavalin, Cetasin, Cantan, Vicemin, Ceetomin 等。

第四節 丁種維生素(Vitamin D)

第 495 方

魚肝油 1 瓶 Cod liver-oil 1 bottle
一日分三次服。 S. 3×1

主治 佝僂病，手足搖擻症，骨質軟化病，結核病。（其他見甲素項下處方）。

說明 (1)標準之魚肝油每公撮應含丁素 85 單位以上。成人每次 10 c.c.，每三次，嬰

兒約自 10 滴至 40 滴不等。

(2) 有機會與日光時常接觸者，需要丁素極少。

(3) 濃縮魚肝油（即魚肝油精）中丁素之含量按規定應在五千萬單位以上（每公分）。嬰兒佝僂病之治療應用其縮濃劑較為方便。

第 496 方

鱈肝麥角醇油劑 15 滴 Viosterol in oil 15 drops

一日三次分服。 S. 3×1

主治 與上同。

說明 (1) 此係美國純丁素製品，其丁含 Vitamin D₂ 每公分 10,000 國際單位。

(2) 英國之純丁素製品稱 Calciferol，每公分含 Vitamin D₂ 3,000 國際單位。

第 497 方

鱈魚肝油 3.0 公分 Cod-liver oil with viosterol

3.0 c.c.

一日三次分服。 S. 3×1

主治 與上同。

說明 (1) 本品係魚肝油加入人造丁素者，每公分含丁素 360 單位以上，甲素 850 單位以上。（成人及重症病例每日可用 6—7 c.c.）。

(2) 比自魚肝油加入人造丁素者，則其甲素含量更高。嬰兒及兒童每日量僅需 15 滴

(3) 倘按病例之丁去治療劑量須大，每日服一萬至二萬單位。

【附註】(A) 食物中含丁去較豐者有脂肪，植物油（如花生油，菜油等）。動物脂肪（如豬油等）雞蛋黃，牛乳，奶油，豬肝，牛肝，豆漿等。

(B) 日光之照射可供給大量丁去，故貧苦兒童應多與日光接觸。

第五節 子種維生素(Vitamin K)

第 498 方

甲 萘 醌 1.5 公絲 Menadione 1.5 mg.
一日三次分服。 S. 3×1

主治 閉塞性黃疸，斯潑虛，乳粥樣瀉，潰瘍性大腸炎所併發之出血症，新生兒凝血酶素元缺乏之出血症，肝本身病變所致之凝血酶素元缺乏性出血等。

說明 (1) 國產藥中有生化出品之慨托命 (Keetomin) 等。

(2) 維生素K 有片液，膠囊劑及供靜脈注射用之水溶液等。

(3) 食物中本品較多者有菠菜，花椰菜，苜蓿，番茄，肝花生米，雞蛋等。

【附註】(A) 戊種維生素(Vitamin E)：本品對於人體之營養價值尚未完全明瞭，植物油及綠葉中含量較豐。此種維生素對於習慣性流產，進行性肌營養不良等似有關係。臨床上亦有用之以減輕或停止充血性心臟衰竭及胸絞痛等，但結果尚未證實。

(B) 己種維生素(Vitamin P)：本品對於人體之營養價值尚未完全明瞭。食物中以新鮮蔬菜及水果含量較豐。高血壓之有血細管脆性者，及血管性紫癍，用本品似有效驗。

第三十二章 內分泌劑

第 499 方

甲狀腺素 1 公絲 Thyroxinum 1 mg.
靜脈注射用。 Pro intravenously

主治 甲狀腺機能缺損，即粘液水腫及克汀病。
肥胖病，喘息。

說明 甲狀腺內分泌之主要作用，即為促進新陳代謝。一旦其機能缺損時，即發生粘腫等現象。

第 500 方

甲狀腺粉 0.18 公分 Thyroidum 0.18 gm.
一日三次分服。 S. 3×1

主治 同上方。

說明 甲狀腺粉價格較廉，臨床上用以口服，其功效並不亞於甲狀腺素之注射。

第 501 方

副甲狀腺浸膏 20單位 Parathyroid Extract 20i.u.
注射用。 Pro injection

主治 副甲狀腺機能減退，手足搖擻症。

說明 (1)本品可供皮下或靜脈注射。應用時須注意，頗有中毒危險。

(2)甲狀腺劑商品中較著者有拜耳之 Elityran，羅氏之 Thyroxin 及 Thyreoglandol，派德之 Thyreoid 等。

第 502 方

胰島素 1 瓶 Insulin 1 bottle.

注射用。 Pro injection

主治 糖尿病，營養不良，早老性癱瘓之休克。

說明 (1)本品每瓶十公撮，每公撮含 20, 40, 80, 及 100 單位四種。

(2)糖尿病者之劑量，須視人而定。小量每日注射十單位，供一次注射；中等量每日注射四十單位，分二次注射；每日用四十單位以上者，則分三或四次注射。注射時間以在飯前十五至二十分鐘最為相宜。普通供皮下注射，如需要亦可靜脈注射。

(3)本品為糖尿病之特效藥，但不能治愈之。足量之胰島素能使病人完全不發症狀，享受正常之生活，停藥則症狀復發。

(4)尚有含鋅胰島素，(Zinc insulin)及含鋅血球蛋白胰島素，(Globin insulin with zinc)皮下注射後可以緩緩吸收，對於特異性病人較為適用。

第 503 方

腦垂體後葉 0.3公撮 Pituitarium Posterium 0.3
c.c.

注射用。 Pro injection

主治 分娩後期休克，外科休克，手術後腸痙攣，尿崩症。

說明 (1)本品每 c.c. 含十單位。最多不得超過十單位之劑量，即 1 c.c.。供肌肉注

射。

(2) 商品中有 Hypophysin, Pituitrin, Pituitary, Pituglandol, Tonephin, Pitapophysia 等。

(3) 本品除含子宮收縮成份外，兼含血壓增高成份。

第 504 方

腦垂體前葉浸膏 1 瓶 Anterior Pituitary Extract
1 bottle

注射用。 •Pro injection

主治 垂體型侏儒症。

說明 (1) 本品係美國施貴寶藥廠出品，每瓶 15 公撮，每公撮含 2,000 生長單位。

(2) 本品供肌肉注射，開始每次 1 公撮，漸增至 3 公撮，每星期注射 3 次。

(3) 商品中較著者尚有 Prolan, Preloban, Antuitrin 等。

第 505 方

垂體腺激動素 1 瓶 Pituitary Gonadotropin
1 bottle

注射用。 Pro injection

主治 女性： 垂體功用不全所致之卵巢衰弱症，如經閉，月經過多，月經過少，不對期，不育及幼稚性。

 男性： 性腺機能不全。

說明 本品為美國施貴寶藥廠出品，每瓶 5 公撮，含 125 鼠單位。供肌肉注射。 最

兩三次每日注射 25—100 單位。

第 506 方

催乳素 1 瓶 Prolactin 1 bottle
注射用。 Pro injection

主治 功用性子宮流血，期間流血，經痛及月經過多，粉刺與經痛及月經過多併發者，經前挫傷，經期過短，催乳。

說明 本品亦垂體前葉製劑，每瓶 5 公撮，內含 200 單位。每日注射 200 單位。隔一二日注射一次，連續注射三四次。越數日後視需要再繼續注射。

第 507 方

阿阿福爾命 2.0 公撮 Oophormin 2.0 c.c.
注射用。 Pro injection

主治 卵巢機能之缺陷，更年期障礙，性器發育不全所致之心身障礙，（如無月經，月經過多，過少，月經不調，不妊等）流產，乳汁分泌不全等。

說明 本品為濾泡刺激素，每日或隔日注射 2 公撮。

第 508 方

嫻闊好萌， 10000 單位 Ovahormon-Benzoat 10,000
本佐， i. u.

注射用。 Pro injection

主治 同上方。

說明 (1) 本品為結晶性嫻闊好萌與安息香酸化合物之油溶液，有一千，一萬，五萬及二十

五萬單位四種，每日或間日肌肉注射一公撮，單位輕重視需要而定。

- (2) 商品中相似製品較著者尙有 Ovaglandol, Proklimon, Proginon, Uden, Ovarin 等。

第 509 方

路脫倫 1 公撮 Lutren 1c.c.
注射用 Pro injection

主治 卵巢功能失常而起之子宮病，如痛經，子宮出血，不易結胎，小產，大出血，妊娠嘔吐等。

說明 (1) 本品爲「拜耳」出品之卵巢黃體製劑，每公撮含兩個家兔單位。

- (2) 每日或隔二三日肌肉注射 1 公撮，連續注射三四日。如遇需要，可在隔數星期再如法注射數次。

第 510 方

西斯多滿新 1 公撮 Sistomensin 1c.c.
注射用 Pro injection

主治 與上同。

說明 (1) 本品爲「汽巴」出品之卵巢黃體製劑。其用法如上方（路脫倫）略同。

- (2) 「汽巴」之另一著名卵巢黃體製劑名阿葛滿新 (Agomensin) 專治子宮發育不全所起之月經障礙，乳汁分泌不全等。

第 511 方

黃體酮油劑 1 公撮 Progesterone in oil 1c.c.

注射用

Pro injection

主治 習慣性流產，痛經，經閉，子宮出血等。

- 說明 (1)本品「施貴賓」出品之卵巢黃體製劑，分每公撮含1公絲，2公絲，5公絲三種。對於流產，出血等每日或間日五公絲，繼續數月之久；對於痛經等則開始用2公絲，月經前3—6日增至五公絲。
- (2)卵巢黃體製劑除上列數種外較著者尚有「先靈」之 Proluton，「羅氏」之 Luteo-glandol，「三共」之 Geneglandol，信誼之 Prosteron 等。

第 512 方

蓋世維雄

10 公絲 Testoviron

10mg.

注射用

Pro injection

主治 性器之神經衰弱，（性慾減退，勃起力減退，遺精，早泄等）更年期障礙，（倦怠，頭痛，精力減退，記憶力及視力減退）早衰，內分泌性肥胖症，睪丸缺陷症（如陰萎，雜型，類宦官症，睪丸摘出後之心身障礙）。

- 說明 (1)本品為男性睪丸荷爾蒙製劑，功效王道。但須注意二者係睪丸內分泌缺乏所引起之病症，始堪應用。否則，以致其他流弊，不可不慎。最近一般醫家有濫用之趨勢，殊屬非是。

(2)本品有 5mg., 10mg., 25mg. 三種每

裝，用 5mg. 者多不能發生作用，故一經診斷確定後，應開始予以 10mg. 肌肉注射，間日或隔二日注射一次，視症狀輕重連用八次或十二次。如遇需要則隔數月後再注射亦可。

- (3) 本類製劑最近市上極多，為醫者須鑒別其是否偽品。較著之商品有拜耳之 *Ergon*，「汽巴」之 *Androstin*，「羅氏」之 *Testeglandol*，「武田」之 *Enarmon*，「鹽野」之 *Porolan*，「信誼」之 *Testison*，生化之 *Testero* 等。

第 513 方

鹽酸腎上腺素 1:1000 *Adrenalin Hcl.* 1:1000

0.5 公撮

0.5 c.c.

注射用

Pro injection

主治 急性血管麻痺，循環障礙，血糖低下，子宮出血等。

說明 (1) 本品為副腎髓質之荷爾蒙，供皮下注射，切不可誤入靜脈。

(2) 同類商品有 *Suprarenin Hcl*, *Supraglandol*, *Paranephrin*, *Adnadin* 等。

第 514 方

英特寧

1 公撮 *Internin*

1c.c.

注射用

Pro injection

主治 *Addison* 氏病，*Basedow* 氏病，神經衰弱，嗎啡中毒等。

說明 本品係副腎皮質荷爾蒙，供皮下注射。

切不可誤入靜脈，同類製品尚有 Iliren 等。

【附註】其他之臟器製劑擇其較重要者，簡述於下：

(A)心臟血管製劑：

(1)Lacarnol。 (2)Cardinon。

(3)Myoston。

內服一次20—15滴。注射 1.0--2.0

。對於狹心症，心臟性哮喘，各種心臟衰弱，肌肉痿麻賈斯等有效。

(4)Arklemin。 (5)Telaruten。對於動脈硬化症，高血壓症，雷諾氏病有效。

(B)肝臟製劑：

(1)Campolon。 (2)Livex。 (3)Livemin。

(4)Liver Extract。對於惡性貧血有效。

(C)脾臟製劑：

(1)Opostatin。 (2)Fibrogen。 (3)Thrombagen。專作止血劑。

(D)胸腺製劑：

(1)Thymoglandoi。 (2)Thymophysin。

對於發育不全，佝僂病，Basedow氏病，萎黃病等有效。

(E)肺臟製劑：

(1)Clauden。 (2)Thrombogen。(脾，肺抽出劑)專作止血劑。

(F)松果腺製劑：

(1)Epiglandol。 (2)Gl. pineale sicca。

能抑制性慾。對於月經困難，偏頭痛有效。

(G) 上皮小體製劑：

(1) Parathyroidine。 (2) Para-Thyroid。
對於手足搖擻症，子癇， Basedow 氏病有效。

(H) 胃製劑：

(1) Secretamin。 (2) Ochimon。 (3) Stimulin。 對於食慾不振，胃液缺乏，消化不良有效。

杭 州 宋 經 樓 新 醫 書 局 發 行

茂木藏之助原著
新醫同仁研究社增訂

外 科 學 · 各 論 (中)

精裝一厚冊 三十元

本篇所包含者為腹部外科及泌尿器外科二編。全書四百十六幅。腹部外科為一般外科醫師所最能表現其才能者，其中包括腹壁外科，膽外科，胰臟外科，肝膽外科，脾外科，胃及十二指腸外科，腸外科，肛門及直腸外科等。泌尿器外科包括外科腎，膀胱外科，生殖器及其附屬器官之外科等。學者手此一編，對於此兩部份之外科可以運用如意矣。

備有書目，函索即奉

第三十三章 消毒防腐劑

Desinfecientia.

第 515 方

氯石灰(漂白粉)	Calcaria chlorata	
1.0-5.0-25.0		1.0-5.0 25.0
水	500.0 Aq.	500.0

右爲洗滌料。 D. S. Waschung.

說明 本方應用於頑固性創瘍，癰潰瘍，慢性淋疾性及有惡臭性陰道分泌過多症等之洗滌。

第 516 方

過羥化氫液	50.0 Liq. Hydrogen. peroxydat.	
	50.0	

右爲洗滌料。 D. S. Waschung.

說明 用以洗滌創瘍，化膿性創，惡臭性潰瘍，能溶解膿血，且有消毒作用，或用此原液或更稀釋(三倍)用之，有製劑數種，詳細可參看第十五章第 160 方。

第 517 方

過錳酸鉀	0.2—0.4 Kal. permanganic.	0.2—0.4
水	2000.0	2000.0

右爲胃洗滌料。 D. S. Zur Magenspülung.

說明 本液用於毒鼠藥中毒時洗胃。

本液用途甚廣，其濃度則隨用途而異，如嗽口料用其 0.1—0.2%，鼻腔陰道洗滌料用其 0.5—1.0%，膀胱洗滌料用其

0.05%，惡臭創面洗濯及其他創面洗濯用其 1—2%。

第 518 方

碘酊(碘酒) 10.0 Tinct. Jodi 10.0
右為塗布料 D. S. Zur Pinselungen.

主治 腺腫，癰，蜂窠組織炎(癰)凍瘡，肋膜炎，風痺性疾患，此外多用於手術部皮膚之消毒。

說明 碘酊製法先取碘十分，碘化鉀七分，溶於十分水中，再加稀酒酊百分即得。

對於薄弱皮膚或須一再使用時可用稀碘酊 Tinct. Jodi diluta. 用碘酊十一分，酒精二十分，餾水二分混和製之。

第 519 方

碘仿 3.0 Jodoform. 3.0
右為撒布料 D. S. Zur Streupulver.

主治 外傷創面。

第 520 方

碘仿 2.5 Jodoform. 2.5
黃凡士林 25.0 Vaseline. flavi 25.0

右混和為軟膏外用。ut f. Ung. D. S. äusserlich.

主治 火傷。

第 521 方

碘仿 2.0 Jodoform. 2.0
秘魯香脂 6.0 Balsam. Peruvian. 6.0
柯柯脂 Ol. Cacao
白蠟 各適宜 Cer. alb. q. s.

右混和爲藥栓十個 ut f. suppos. No. X.
 , 一日一二個。 D. S. tgl. 1—2 Zäpfchen.

主治 痔疾。

說明 碘仿有特異臭，多用亦有中毒之虞，是以多用其代用品，如下列各種。

- a. 約道耳 Jodol.
- b. 阿利斯妥耳 Aristol.
- c. 伊瑣仿 Isoform.
- d. 迨馬妥耳 Dermatol.
- e. 愛羅耳 Airol.
- f. 歐羅芬 Europhen.

第 522 方

硼 酸 Acid. boric.

氯化鋅(鋅華)各10.0 Zinc. oxydat. āā 10.0

右混和爲撒布料。 M. D. S. Streupulver.

主治 濕疹，糜爛。

說明 本方可加澱粉 Amyl. 10.0 用之。

第 523 方

硼 酸 5.0 Acid. boric. 5.0

甘 油 5.0 Glycerin. 5.0

祕魯香脂 1.0 Balsam. Peruvian. 1.0

凡 士 林 30.0 Vaseline. 30.0

右混和爲軟膏外用。 ut f. ung. D. S. äusserlich.

主治 創傷，剝脫，皸裂，糜爛，火傷。

說明 硼酸有緩和的防腐作用，爲撒布料軟膏劑用外，亦可爲洗濯料用，其濃度創面洗濯用 3—4%，胃，膀胱，尿道，陰道洗

濯用 1—3%，眼洗滌用 2—4%，含嗽用同。

第 524 方

硼砂甘油	Borax-Glycerin		
硼 砂	5.0 Boracis		5.0
甘 油	25.0 Glycerin.		25.0

右混和爲塗布科。 M. D. S. Zum Einpinseln.

主治 口內炎，鷺口瘡諸症。

說明 硼砂爲收斂性防腐劑，故亦可爲嗽口料
(1—5%) 洗眼料 (1—5%)

第 525 方

蟻 醛 液	Formaldehyd. solut.		
(福爾買林)	100.0 (Formalin)		100.0

右取 1—2 食匙， D. S. 1—2 Esslöf. auf
和於一立特水中爲 1 L. Wasser zu antiseptische
防腐洗滌料。 Finselung.

說明 手，器具，器械，衣類，寢具，病室內
各部等之消毒等用之。

第 526 方

石 炭 酸	2.0 Acid. carbolic.		2.0
甘 油	5.0 Glycerin		5.0
稀 酒 精	200.0 Spirit. vini dilut.		200.0

右爲塗布料。 D. S. Eintupfen.

主治 皮膚癢癢症。

第 527 方

石 炭 酸	1.0 Acid. carbolic. (Phenol)		1.0
碘 酊	Tinct. Jodi		

鞣酸	各 2.0	Acid. tannic.	āā 2.0
蠟軟膏	30.0	ung. cerei	30.0

右為軟膏外用 ut f. ungt. S. äusserlich.

主治 凍瘡。

說明 石炭酸為消毒藥，其溶液濃度視用途而異，器械等消毒用 2—3% 對於皮膚病為塗擦及軟膏劑用 1—5% 須注意預防石炭酸壞疽，Karbholgangrän. 之發生。

第 528 方

利環耳(拉沙耳)	8.0	Lysol	8.0
水	400.0	Aq.	400.0

右為洗滌料。 D. S. Zu waschen.

說明 用於手，器具之消毒。

利環耳即焦油醇肥皂液 Liq. cresoli. saponatus 無刺戟及腐蝕性，故好用之，其濃度廁所，痰盂，糞便，尿等消毒用 5—10%，手器具等消毒用 1—3%，外科治療或創傷洗滌用 0.2—0.5% 液，陰道洗滌用 1—2% 液。

第 529 方

昇汞	0.012	Sublimat.	0.012
硼酸	30.0	Acid. boric.	30.0
乳糖	60.0	Sacchar. lact.	60.0

右混和為撒布料。 M. D. S. Streupulver.

說明 此為消毒性撒布料。

昇汞即氯化高汞 Hydrargyr. bichlorat 其消毒力極強，應用濃度，器械（除金屬

性)或手消毒用一千倍或二千倍液，創面或結合膜洗滌用三千或五千倍液，爲防其沉降計，常加同量之食鹽，並着紅色以喚起注意。

昇汞錠 *Pastilli Hydrarg. nichlorat.*
每片含昇汞 0.5，便於攜帶及緊急時使用。

因昇汞對於金屬有腐蝕性，出有二三代用品如下。

- a. 蘇孛拉民 *Sublamin.* 對於銀，鎳，錫，皮膚等無侵蝕性，消毒力亦強，手消毒用一千倍，陰道洗滌用二千倍，洗眼用五千倍液。
- b. 阿斯退羅耳 *Asterol.* 其消毒力弱四倍，但無刺戟性對於金屬器械亦無腐蝕性，器械消毒用 0.2—0.4%

第 530 方

雷瑣辛	1.0 Resorcin	1.0
沉澱硫黃	5.0 Sulph. Praecipit	5.0
黃凡士林	50.0 Vaseline Yellow	50.0
製成油膏	M. F. Ung.	

主治 瘰癧，濕疹，禿髮，糠疹等。

說明 雷瑣辛防腐力甚強，較大之濃度，有角質軟化功用，而小濃度則有促成角化之作用。

第 531 方

洋樟腦	3.0 Naphthol	3.0
-----	--------------	-----

黃凡士林	100.0	Vaselin Flav.	100.0
製成油膏		M. F. Ung.	
主治	疥癬，牛皮癬，鬚瘡，瘰癧等。		
說明	本品外用有防腐作用，長久使用可能致表面腐蝕而致壞死。		

第 532 方

松焦油	10.0	Pix Lipuida	10.0
昇華硫黃	10.0	Sulf. Sublimat.	10.0
氧化鋅	10.0	Zinc Oxide	10.0
黃凡士林	30.0	Vaselin Flav.	30.0
製成油膏外用		M. F. Ung. 外用	
主治	慢性濕疹，白癬，疥瘡等。		
說明	本方即各士肥氏木焦油糊劑 (Teer Pasta Dohi) 臨床上應用甚多。		

第 533 方

魚石脂	10—15.0	Ammo. Sulf. Ichthyol	10—15.0
黃凡士林	100.0	Vaselin Flav.	100.0
製成油膏貼用		M. F. Ung. 貼用	
主治	皮腫皮膚早期炎症等。		

第 534 方

漂白粉	200.0	Calcaria chlorata	200.0
晶性碳酸鈉	400.0	Cryst. Nat. Carbon.	400.0
硼酸	適量	Acid Boric	g.s.
	(約 25—40gm.)		
水	10 餅	Ag. dest.	10 餅
說明	本方即稱迨金氏溶液 (Dakin's sol.)		

多用其為各種創傷之洗滌料，價廉物美，
 臨床上甚多用。惟本劑配合後不宜放置兩
 週以上。

第 535 方

蘇白粉	12.5	Calcaria Chlorata	12.5
錳酸	12.5	Acid Boric.	12.5
鹽水	1000.0	Aq. dest.	1000.0

右為洗滌料 For Washing

說明 本劑即稱依瑣溶液 (Eusol Sol.) 亦為
 價廉物美之外科洗滌料，防腐殺菌之力甚
 強，配合後亦不應久置。

第 536 方

汞溴紅	2.0	Mercurochrome	2.0
鹽水	100.0	Aq. dest.	100.0

外用 For Extern.

說明 本品為甚有效之消毒劑，有深達作用而
 無刺激性，故多用於皮膚粘膜之消毒。亦
 可以用其 2%—5% 之軟膏劑作為創面消
 毒用。

第 537 方

酒精 95%	70.0	Alcohol 95%	70.0
鹽水	30.0	Aq. dest	30.0

外用 For Extern

說明 為消毒防腐劑，皮膚擦劑，有消炎，清
 涼等作用。可任意與氫仿，醚，甘油，其
 他揮發油，碘片，紅汞，樟腦，水枝酸等
 相配合。

第 538 方

脫呂帕非拉文 1.0 Trypoflavine 1.0

留 水 1000.0 Aq. dest. 1000.0

洗滌用 For Washing

說明 本品爲殺菌消毒劑，有強大之深達作用。其 10% 溶液可作爲口腔炎，鷺口瘡之嗽口料；淋病性尿道炎用 1—4:10000 倍之溶液洗滌，一日二次。膀胱洗滌用 1:3000—4000 倍溶液。

第 539 方

雷佛奴兒 2.0 Rivanol 2.0

留 水 1000.0 Aq. dest. 1000.0

洗滌用 For Washing

說明 本品殺菌力亦強，且刺激性較少。對傳染性創傷用 1:500 倍溶液；如用於子宮之洗滌用 1:2000 倍溶液，口腔作爲嗽口料用 1:1000 倍溶液。

【附註】殺菌防腐劑甚多，本章爲篇幅所限，未能詳載，如青黴素及磺胺類之某幾種溶液及粉劑或混懸液，均屬良好之殺菌消毒。詳見化學治療劑章。至於其他防腐殺菌劑僅列舉其名稱如下，以備參考。

- (1) 水楊酸 (Acid Salicylic)；
- (2) 氯酸鉀 (Kali Chlorie)；
- (3) 煨石灰 (Calcaria Usta)；
- (4) 石灰水 (氫氟化鈉溶液 Liq. Calcii Hydroxid.)；

- (5) 甘汞 (Calomel) ;
- (6) 黃降汞 (Hydrag. Oxid. Flav.) ;
- (7) 白降汞 (Hydrag. Praecipitat Album) ;
- (8) 硝酸銀 (Argent Nitrie) ;
- (9) 強蛋白銀 (Protargol) ;
- (10) 硼砂 (Borax) ;
- (11) 龍胆紫 (Gentiana Violet) ;
- (12) 次王藍 (Methylen Blau) ;
- (13) 螢光黃 (Florescein) 。

杭州 宋 經 樓 新 醫 書 局 發 行

於 達 望 教 授 著

製 藥 化 學

精裝一厚冊 三十三元

近年科學進步迅速，藥學方面所表現者，尤為顯著。但我國教育實業衛生國防各方面所應用之藥品，年以億萬計，大都仰給外邦。利權外溢，莫此為甚！國人當急起直追，速謀仿製，以求自給自足，方克有濟。本書共四十餘萬言，六百餘頁，銅鈔版插圖一百三十餘個，凡現行藥品之製造法，性質、鑑別法、檢定法、含量測定、用途等，均列舉而條析之，可作藥學所之教本、藥廠、藥房、醫院、化驗檢音處所之參考書籍。第一版於二十四年印行，迭即售罄。茲因社會各界需要之殷，特增訂再版。

備 有 書 目 ， 函 索 即 寄

第三十四章 眼科 Augenkrankheiten.

A. 點眼水 Augentropfen.

第 540 方

硼 酸	0.3	Acid. boric.	0.3
硼 砂	0.03	Boracis.	0.03
餾 水	10.0	Aq. destill.	10.0

右混和爲點眼水 M. D. S. Augentropfen.

一日三次。 3 mal tägl.

主治 慢性單純性結合膜炎。

第 541 方

硫酸銻(皓礬)	Zinc. sulfuric.	0.01—0.03
		0.01—0.05

食 鹽	0.1	Natr. chlorat.	0.1
-----	-----	----------------	-----

茴 香 水	2.0	Aq. foenicul.	2.0
-------	-----	---------------	-----

餾 水	8.0	Aq. destill.	8.0
-----	-----	--------------	-----

右混和爲點眼料。 M. D. S. Augentropfen.

主治 結合膜炎。

第 542 方

硫 酸 銻	0.03	0.05	Zinc. sulfuric.	0.03-0.05
-------	------	------	-----------------	-----------

鹽酸可開因	0.05	Cocain. hydrochloric.	0.05
-------	------	-----------------------	------

餾 水	10.0	Aq. destill.	10.0
-----	------	--------------	------

右混和爲點眼料。 M. D. S. Augentropfen.

主治 結合膜炎。

說明 本方可加食鹽 0.1 或鹽化腎上腺素液(千倍) 1.0 製而用之。

第 543 方

硝酸銀 0.03—0.2 Argent. nitric. 0.03—0.2

餾 水 10.0 Aq. destill. 10.0

右混和盛以黑瓶 M. D. ad vitr. nigr.

爲點眼料。 S. Augentropfen.

主治 急性結合膜炎，沙眼，膿漏眼。

本方應用須由醫師手行之，點後即以食鹽水洗滌。

第 544 方

普奈哥(耳) Protargol.

(=蛋白銀) 0.2—0.5 (=Argent. proteicat)

0.2—0.5

餾水(或甘油) 10.0 Aq. dest. (or. Glycerin)

10.0

右混和盛以黑色瓶 M. D. ad vitr. nigr.

爲點眼料。 S. Augentropfen.

主治 結合膜炎，膿漏眼。

第 545 方

科拉哥耳(擬膠銀) Collargol. 0.3—0.5

0.3—0.5

餾 水 10.0 Aq. destill. 10.0

右爲點眼料。 S. Augentropfen.

主治 與前方向。

第 546 方

硫酸銅 0.2 Cupr. sulfuric. 0.2

甘 油 Glycerin.

餾 水 各 20.0 Aq. destill. aa 20.0

右一日三回點眼。 D. S. 3 mal tgl.
einzutropfen.

主治 慢性沙眼。

第 547 方

硫酸銅	0.01—0.1	Cupr. sulfuric.	0.01—0.1
食鹽	0.1	Natr. chlorat.	0.1
茴香水	2.0	Aq. foenicul.	2.0
餾水	8.0	Aq. destill.	8.0

右混和爲點眼料 M. D. Augentropfen
一日三次。 S. 3. mal tägl.

主治 與前方同。

說明 上二方硫酸銅可增用 0.5，斯時點眼一日一回，且點後須即時水洗之。

第 548 方

替奧息那民		Thiosinamin.	
安替必林	各 1.0	Antipyrin.	āā 1.0
餾水	10.0	Aq. destill.	10.0

右爲點眼料。 D. S. Augentropfen.

主治 角膜翳。

說明 替奧息那民有使斑痕軟化吸收之效，點眼後須稍加按摩。

第 549 方

狄奧寧	0.1—0.5	Dionin.	0.1—0.5
餾水	10.0	Aq. destill.	10.0

右一日一二回， D. S. 1—2 mal tgl.

一回一滴點眼。 1 Tropfen. in Augen.

主治 眼痛，角膜炎，角膜翳，前房及玻璃體

內滲出物稠濁。

說明 鎮痛用2%液。又狄奧寧作用與腎上腺素，完全相反如用5%液於結合膜囊，足使血管極度擴張，起充血及結合膜與臉之浮腫。故凡動脈硬化症，腎炎，心臟病，腺病質者對此作用特著，宜注意及之。

第 550 方

鹽酸可開因	0.05	Cocain. hydrochloric.	0.05
鹽化腎上腺素液		Sol. Adrenalin. hydrochl.	
(千倍)	0.5	(1:1000)	0.5
餾 水	10.0	Aq. destill.	10.0

右一日二回點眼。 D. S. 2 mal tgl.
einzuträufeln

主治 春季卡苔耳，鞏膜炎，眼痛。

第 551 方

鹽酸片羅卡品		Pilocarpin. hydrochloric.	
	0.1—0.2		0.1—0.2
餾 水	10.0	Aq. destill.	10.0

右為點眼料一日二 D. S. Augentropfen 2
回。 mal tgl.

主治 綠內障。

說明 本方為縮瞳劑。如為急性炎綠內障時可加鹽化腎上腺素液(千倍)0.5—1.0用之。

第 552 方

柳酸依色林	0.05-0.1	Eserin. salicylic.	0.05-0.1
硼 酸	0.1	Acid. boric.	0.1
餾 水	10.0	Aq. destill.	10.0

右混和盛以黑色瓶 M. D. ad vitr. nigr.
 爲點眼料，一日 S. Augentropfen.
 二三回。

主治 與前方同。

第 553 方

氫溴酸莨菪素 Scopolamin. hydrobrom. 0.005—0.01 0.005—0.01
 水 1.00 Aq. destill. 10.0

右爲點眼料，一回 D. S. Augentropfen
 1—3 滴點眼。 1—3 Tropfen. ins Augen.

主治 虹膜炎，虹膜後癒着。

說明 本方爲散瞳劑，毒力極強。因其有亢進
 眼內壓作用，臨用時須注意 (1)老人及有
 素因者。(2)須告知病人點眼後有一時視
 力減退之症候。(3)點眼時須指壓鼻淚管
 以防入鼻腔，而起顏面潮紅之副症候。

第 554 方

硫酸阿托品 0.05 0.1 Atropin. sulfuric. 0.05 0.1
 水 10.0 Aq. destill. 10.0

右爲點眼料，一日 D. S. Augentropfen.
 二三回，一回一二 2—3 mal tgl. 1—2 tropfen
 滴點眼。 ins Augen.

主治 與前方同。

說明 本品亦爲散瞳劑，毒力亦強，所用盛瓶
 宜附標記，以便注意。至臨用時對於病人
 之注意，與用氫溴酸莨菪素同。

以上兩方均可添加鹽酸可開因 0.1 配製。

用之。

又以上兩方點眼，用量過大或滯留時，易發中毒，故以製軟膏用之爲妥。

第 555 方

阿久羅	0.5	Argyrol	0.5
餾水	10.0	Aq. dest.	10.0

右混和盛以黑色瓶 M. D. Ad vitr. Nigr.
爲點眼料。 S. Augentropfen.

主治 結合膜炎，膿漏眼。

第 556 方

雷梯奴兒	0.05	Rivanol	0.05
餾水	10.0	Aq. dest.	10.0

右爲點眼料 D. S. Augentropfen

主治 結膜炎，虹膜炎。

說明 本品一日數回點之，可以減輕其炎症。

第 557 方

青黴素鈉 75,000單位 Penicillin Sodium
75,000 i.u.

氯甲酚	0.015公分	Chirocresol	0.015 gm.
氯化鈉	0.42公分	Sodium Chloride	0.42 gm.
蒸餾水	至 30公撮	Aq. dest. od	30 c.c.

右混和爲點眼料 M. D. Augentropfen

主治 化膿性結膜炎，虹膜炎，膿漏眼，前房蓄積性潰瘍，角膜潰瘍，眼瞼炎，砂眼等。

說明 青黴素之點眼劑須用與淚液等滲壓者。故每公撮含青黴素二千五百單位者，通常

多以生理鹽水調製；如每公撮含一萬單位時，則可用 0.15% 之食鹽水調製。但等滲壓係屬最合理想，實驗並不十分重要。又氮甲酚之加入亦並非必需。

用此藥須每隔半至一小時或二小時點一次。

【附註】 Sulfadiazine 之 5% 溶液可以點眼，以治療，結膜炎，角膜潰瘍等，但現時似不多用。

杭州宋經樓 新醫書局發行

樓 彥 則 增 訂

外 科 學。總 論

精裝一厚冊 三十元

外科一書，向乏完整，雖有綱要，手術學等出版，惜均屬一鱗半爪，難應學者需要。日茂木藏之助為近世醫學泰斗，其所著之外科學總論，各論上、中、下、圖文並茂，夙稱善本，經湯氏等翻譯，及同仁會刊行，風行全國，惜是書早經絕版。但醫學之進步，日新月異，陳舊版本，萬難適合學者應用，同人等為忠實介紹最新醫學文獻，年前商請外科專家樓彥則先生，本其多年之經驗技術，將近代新到外科各種新醫藥文獻分別增入。補新去舊內容，為之改觀矣，新五號排印，插圖二千餘幅，確係善盡美之巨著，醫校採作課本，開業醫師備為進修，均極適宜。

備有書目，函索即奉

B. 眼軟膏 Augensalbe.

第 558 方

硼 酸 0.5—1.0 Acid. boric. 0.5—1.0
 美國製白凡士林 20.0 Vaseline, am. alb. puriss.
 20.0

右混和爲軟膏外用。ut f. ungt. S. ausserlich.

說明 此稱無刺戟軟膏 Reizlose Salbe 有弱
 消毒及收斂之效。亦可以美國製白凡士林
 10.0 與拉諾林 10.0 爲基質製之，凡眼軟
 膏基質均然。

第 559 方

硫酸鋅 0.05—0.1 Zinc. sulfuric. 0.05—0.1
 美國製白凡士林 10.0 Vaseline, am. alb. puriss.
 10.0

右混和爲眼軟膏點 ut f. ungt. Ophthalmic. S.
 眼。 ins Augen einzustreichen.

主治 慢性結合膜炎，痧眼。

第 560 方

硫酸銅 0.1—0.5 Cupr. sulfuric. 0.1—0.5
 美國製白凡士林 10.0 Vas. am. alb. puriss. 10.0

右混和爲軟膏一日 ut f. ungt. S. 1 mal
 一回滴眼。 tgl. einzustreichen.

主治 與前方同。

第 561 方

狄奧寧 0.2 Dionin 0.2
 拉諾林 Lanolin

美國製白凡士林 各5.0 Vas. am. alb. puriss. āā 5.0
 右混和爲軟膏點眼 ut. f. ungt.
 。 S. Zum Einstreichen

主治 角脈炎，角膜翳，眼痛。

第 562 方

鹽酸可開因 0.2 Cocain. hydrochloric. 0.2
 美國製白凡士林 10.0 Vas. am. alb. puriss. 10.0
 右混和爲軟膏，一 ut. f. ungt.
 日二至五回，以玻 S. 2—5 mal tgl. ins
 璃細棒取少許入病 krankte einzustreichen
 眼塗布之。 adde 1 Glasstäbchen.

主治 眼痛。

第 563 方

奧托仿 0.4 Orthoform. 0.4
 拉諾林 Lanolin
 美國製白凡士林 各2.0 Vas. am. alb. puriss. āā 2.0
 右混和爲軟膏點眼 ut f. ungt. S. Zum
 。 Einstreichen.

主治 眼痛，分泌過多，角膜損傷。

第 564 方

彼得氏硬膏 Peters. Pasta.
 魚石油 0.15 Ichthyol. 0.15
 氧化鋅 5.0 Zinc. oxydat. 5.0
 澱粉 3.0 Amyl. 3.0
 美國製白凡士林 15.0 Vas. am. alb. puriss. 15.0
 右混和爲硬膏，一 ut f. Pasta. S. 1—2 mal
 日一二回點眼。 einzustreichen.

主治 急性結合膜炎，重桿菌結合膜炎。
 說明 魚石油可單以美國製白凡士林製為軟膏用之，惟其濃度須視症候而異，如春季卡答耳則以 10.0:0.1—1.0 之比，臉緣炎，麥粒腫，急性淚囊炎則以 10.0:30.—10.0 之比配成用之。

第 565 方

特樂固明 1 管 Trachomine 1 tube
 主治 砂眼。
 說明 本品為硫酸銅製劑，裝在小型牙膏管中，每日一二次點眼。

第 566 方

沉降硫黃 2.0 Sulfur. praecipit. 2.0
 氯化鋅 Zinc. oxydat.
 澱粉 各 1.00 Amyl. āā 1.00
 美國製白凡士林 20.0 Vas. am. alb. puriss. 20.0
 有研和為軟膏，一 ut f. ungt.
 日二回塗布臉緣。 S. 2 mal. tgl. den
 Lidrand einfetten.
 主治 臉緣炎。

第 567 方

沉降硫黃 1.0 Sulfur. praecit. 1.0
 柳 酸 0.5 Acid. salicylic. 0.5
 (或一二氫雙輪 (od Resorcin. 0.2—0.5)
 0.2—0.5)
 美國製白凡士林 20.0 Vas. am. alb. puriss. 20.0
 有混和為軟膏，一 ut. f. ungt. S. Abends

間塗布患處。 zu einstreichen.

主治 臉緣炎，毛瘡。

第 568 方

迨馬妥耳 5.0 Dermatol. 5.0

美國製白凡士林 15.0 Vas. am. alb. puriss. 15.0

右混和爲軟膏外用。 ut. f. ungt. S. äusserlich.

主治 灼傷，樹枝狀角膜炎，匍行狀角膜炎。

第 569 方

白降汞 0.1—0.5 Hydrargyr. praecipit.

alb. 0.1—0.5

美國製白凡士林 10.0 Vas. am alb. priss 10.0

右緻密混和爲軟膏 ut exactissime f. ungt.

取豌豆大塊於就寢 S. Vor dem Schlafengehen

前塗布臉緣。 ein erbsengrosses Stück

auf. den Lidrandern.

主治 臉緣炎，卡答耳性結合膜炎，脂漏性濕疹，硬性下疳。

第 570 方

黃降汞 0.05-0.2-1.0 Hydrarg. oxydat. flav.

0.05-0.2-1.0

美國製白凡士林 10.0 Vas. am. alb. puriss. 10.0

右緻密混和爲軟膏 ut exactissime f. ungt.

，盛以褐色玻璃盒， D. S. in einen brauen Gl-

取豌豆尤塗入眼後 asbehälter, 1—2 mal tgl.

，三至五分時按摩 ein erbsengrosses Stück ins

，一日一二回。 Augen bringten und 3—5

Mintzen Massage Machen.

主治 角膜翳，險緣炎。

第 571 方

磺胺噻唑	0.5	Sulfadiazine	0.5
白凡士林(消毒)	10.0	Vaselin white (Steril)	10.0

右綴密混和爲軟膏 ut exactissime f. ungt.
點眼。 S. Zum Einstreichen.

主治 結膜炎，角膜潰瘍等。

說明 磺胺噻唑，氨基磺胺亦可應用。

第 572 方

青黴素鈣	100,000單位	Penicillin Calcium	
		100.00 i.u.	

黃石脂	90 公分	Vaselin flav.	90 gm.
-----	-------	---------------	--------

羊毛脂	10 公分	Lanolin	10 gm.
-----	-------	---------	--------

右混和爲軟膏點眼 ut f. ungt. S. Zum
Einstreichen.

主治 化膿性結合膜炎，虹膜炎，角膜潰瘍，
眼險炎，砂眼等。

說明 本劑須在無菌手續下調製。製成後密封
在室溫中可以放置 4—6 六個月。每二小
時點眼一次。

C. 眼散布料 Streupulver.

第 573 方

瀉製甘汞 0.5 Hydrarg. chlorat.
vapor. parat. 0.5

右以毛筆撒布 D. S. Mit einem Haarpin-
seln aufzustäuben.

主治 濕疹，結合膜炎。

第 574 方

愛羅耳 5.0 Airoi. 5.0

右為撒布料。 D. S. Streupulver.

主治 分泌過多，肉芽發生遲緩，角膜創面。

說明 本品可製為 5% 軟膏用於角膜潰瘍，初
生兒膿漏眼。

第 575 方

適馬妥耳 5.0 Dermatol. 5.0

右為撒布料。 D. S. Streupulver.

說明 為防腐收斂劑撒布於清潔創面而保護之

D. 眼之洗滌及罨包料

第 576 方

硼	酸	20.0—30.0	Acid. boric.	29.0—30.0
水		1000.0	Aq.	1000.0

右爲眼水，洗滌或 罨包。 D. S. Augenwasser zu spülen oder umschlagen.

主治 結合膜炎，瞼緣炎。

第 577 方

硼	酸		Acid. boric.	
硼	砂	各 4.0	Boracis	āā 4.0
食	鹽	2.0	Natr. chlorat.	2.0
水		400.0	Aq.	400.0

右混和爲眼水，一 日數回罨包。 M. D. S. Augenwasser mehrm. tgl. umschlagen.

主治 與前方同。

第 578 方

硫	酸	錳	0.1—0.2	Zinc. sulfuric.	0.1—0.2
杏	仁	水	20.0	Aq. Lauro-Cerac.	20.0
餾	水	100.0	Aq. destill.	100.0	

右混和爲眼水，一 日三回，洗眼。 M. D. S. Augenwasser 3 mal tgl. spülen.

主治 與前方同。

第 579 方

硼	砂		Boracis	
重	炭	酸	鈉	Natr. bicarbonic.
食	鹽	各 4.0	Natr. chlorat.	āā 4.0

瀉 水 400.0 Aq. destill. 400.0

右爲眼水藥包。 D. S. Augewasser
umschlagen.

主治 與前方同。

第 580 方

昇 汞 0.2 Sublimat. 0.2

食 鹽 0.2 Natr. chlorat. 0.2

水 1000.0 Aq. 1000.0

右爲眼水洗滌或藥包，(須着紅色與
D. S. Augewasser spülen
od. umschlagen (Rosa fär-
ben) 之)。

主治 與前方同。

杭 州 宋 經 樓 新 醫 書 局 發 行

茂木藏之助原著
新醫同仁研究社增訂

外科學·各論(上)

精裝一厚冊 三十元

本書所包含者爲頭部及面部外科，頸部外科，胸部外科，脊椎外科等編。各部份之損傷及炎性疾病，已因磺胺類，青黴素等新藥之應用，在治療方面皆相當之改革；其他對於腫瘤之剷除，面部成形之矯正成形手術，胸部內容各種疾患之外科治療等等，無不扼要而詳盡。其中鉅圖六百四十幅，尤能增加學者對於內容之瞭解，讀後留得深刻明鮮之印象。

備 有 書 目 · 函 索 即 奉

第三十五章 耳鼻咽喉科

Ohren-, Nasen-, Halskrankheiten.

A. 耳科 Ohr.

第 581 方

重碳酸鈉	0.5	Natr. bicarbonic.	0.5
甘 油		Glycerin.	
餾 水	各 5.0	Aq. destill.	āā 5.0

右一日二回，取四 D. S. 2 mal tgl 40 Tropfen
十滴加溫點耳。 erwarmte einzuträufeln.

主治 耳垢積堆，點之使軟化，乃洗去之。

第 582 方

碘 酊		Tinct. jodi	
酒 精	各 15.0	Spirit.	āā 15.0

右混和爲塗布料。 M. D. S. zu austupfen.

主治 外耳道炎。

第 583 方

硝酸銀	0.3	Argent. nitric.	0.3
秘魯香脂	3.0	Balsam. peruvian.	3.0
黃凡士林	30.0	Vsaelin. flav.	30.0

右爲塗布料。 D. S. Zum Einpinseln.

主治 耳鼻凍瘡潰瘍。

第 584 方

白降汞	2.0	Hydrarg. praecipit. alb.	
	2.0		

拉諾林 Lanolin.

凡士林 各 25.0 Vaselin. āā 25.0
右爲塗布料。 D. S. Zum Einpinseln
主治 耳廓濕疹，外耳道癬。

第 585 方

硼酸 0.1 Acid. boric. 0.1
甘油 10.0 Glycerin. 10.0
右混和一日三四回， M. D. S. 3 mal tgl.
用10—15滴點耳。 10—15 Tropfen ins Ohr.
主治 中耳炎。

第 586 方

硼酸 5.0 Acid. boric. 5.0
石炭酸 5 滴 Acid. carbolic. Gtt̄ v.
右混和耳道內吹入 M. D. S. Zum Einblasen
。 in dem Gehörgang.
主治 急性中耳炎，有膿性分泌物時取少許吹
入耳道。

第 587 方

硼酸 0.5 Acid. boric. 0.5
再釀酒精 30.0 Spirit. vini rectific. 30.0
右混和爲點耳料。 M. D. S. Zum Ohrtropfen.
主治 與前方同。

第 588 方

鹽化腎上腺素液 Sol. Adrenalin hydroc
 (千倍) 1.0—2.0 hloric. (1:1000.) 1.0—2.0
普泰哥(耳) 0.4—1.0 Protargol. 0.4—1.0
甘油 5.0 Glycerin 5.0
鹽水 15.0 Aq. destill. 15.0

右爲點耳料。 D. S. Zum Ohrtropfen.

主治 急慢性中耳炎。

第 589 方

青黴素鈉 20.000i.u. Penicillin Sodium 20.000i.u.

鋸 水 10c.c. Aq. dest. 10c.c.

右爲滴耳料 D. S. Zum. Ohrtropfen

主治 外耳道及中耳炎症。

說明 本劑應每隔一二小時滴入數滴。或改用飽浸青黴素乳膏之紗布條塞入，每日交換數次。或用青黴素鈣和磺胺粉劑以吹粉器吹入。嚴重病例同時併行全身治療。

第 590 方

磺胺噻唑 1.0 Sulfathiazole 1.0

耳道內吹入 S. Zum Einblasn in dem Gehorgang.

主治 外耳道及中耳炎症。

說明 本品亦可混懸於甘油內滴入。

第 又 方

過氧化鈉 Natr. peroxydat.

硼 酸 各 5.0 Acid. boric. 各 5.0

右混和爲撒布料。 M. D. S. Zum Streupulver.

主治 慢性中耳炎。

第 591 方

石 炭 酸 0.5 Acid carbolie 0.5

甘 油 10.0 Glycerin. 10.0

右混和一日三回， M. D. S. 3 mal tgl.

用 5—10 滴點耳。 5—10 Tropfen ins ohr.

主治 中耳炎。

第 532 方

劑他根 10.0 Otalgan 10.0

右為點耳料。 D. S. Zum Ohrtropfen

主治 急慢性中耳炎。

【附註】其他止痛之點耳藥有 10% Tutocain 或 Cocain, 消炎點耳藥有 1—2% Yatren 液, 1% Neoparman 液或千倍 Trypsolavin 等。洗滌劑用雙氧水, 電包劑用 Antiphlogistin, 1% Plumb Acet 等。

B. 鼻科 Nase.

第 593 方

薄荷腦	0.5	Menthol.	0.5
硼酸		Acid. boric.	
乳糖	各 10.0	Sacchar. lact.	āā 10.0
有混和爲鼻腔撒布料。		M. D. S. Zum Betrauen in die Nase.	

主治 急慢性鼻炎。

第 594 方

鹽化腎上腺素液		Sol. Adrenalin. hydrochl.	
(萬倍)	10.0	(1:10000)	10.0
諾服開因	0.5	Novocain.	0.5
普泰哥(耳)	0.2	Protargel.	0.2
有混和爲鼻腔塗布或注入料。		M. D. S. Zum Bepinseln od. ausspritzen der Nase	

主治 急性鼻炎。

說明 本方有消炎，鎮痛，止血之效。

第 595 方

鹽酸可開因	0.1—0.2	Cocain. hydrochloric.	
		0.1—0.2	
鹽水	5.0	Aq. destill.	5.0
有爲塗布料。		D. S. Zum Bepinseln.	

主治 慢性鼻炎。

第 596 方

純碘	0.3	Jodi puri	0.3
鹽化鉀	0.5	Kal. jodat.	0.5

甘 油	40.0	Glycerin.	40.0
右爲塗布料。		S. Zum Bepinseln.	
主治	乾性鼻炎。		

第 597 方

薄荷腦	0.5	Menthol.	0.5
洋椒澆油	10.0	Ol. Olivar.	10.0
右爲塗布料。		S. Zum Bepinseln.	
主治	臭鼻症。		

第 598 方

狄奧寧	1.0	Dionin.	1.0
硼 酸	9.0	Acid. boric.	9.0
右混和一日數回，		M. D. S. Mehrm. tgl.	
爲嗅入料。		Zum Schnupfpulver.	
主治	臭鼻症。		

第 699 方

狄奧寧	0.1	Dionin	0.1
薄荷腦	0.5	Menthol.	0.5
乳 糖	5.0	Sacchar. lact.	5.0
右混和一日數回，		M. D. S. Mehrm. tgl. zum	
爲嗅入料。		Schnupfpulver.	
主治	臭鼻症。		

第 600 方

銻 水	5.0	Aq. Ammon.	5.0
石 炭 酸	5.0	Acid. carbolic.	5.0
酒 精	15.0	Spirit.	15.0
右混和爲嗅入料。		M. D. S. Zum Schnupfung.	
主治	急性鼻炎，塗少許於手帕嗅入之。		

第 601 方

氯化高鉄液 4.0 Liq. Ferr. sesquichlorat.
1.0

留 水 100.0 Aq. destill. 100.0

右爲鼻腔注入料。 D. S. zuspritzen der Nase.

主治 衄血。

第 602 方

鹽化腎上腺素液 Sol. adrenalin. hydrochl.
(千倍) (1:1000)

氯化高鉄液 各 10.0 Liq. Ferr. sesquichlorat.
aa 10.0

右外用。 S. äusserlich

主治 衄血，鼻手術後出血，塗布或以棉塊浸
本液栓塞。

第 603 方

鹽酸麻黃素 0.1 Ephedrine Hcl. 0.1

留 水 10.0 Aq. dest. 10.0

右爲塗布料。 D. S. Zum Bepinseln.

主治 急慢性鼻炎。

說明 本方有消炎之效。

第 604 方

猶卡列油 3.0 Eukalypt oil 3.0

福馬林 1.0 Formalin 1.0

凡士林 10.0 Vaseline 10.0

流動石臘 10.0 Paraffin Liq 10.0

右爲塗布料。 D. S. Zum Bepinseln.

主治 急性鼻炎。

第 605 方

猶卡列油	2.0	Eukalypt oil	2.0
薄荷	0.1	Menthol	0.1
安息香酞	10.0	Tct. Benzoin	10.0
酒精	30.0	Alcohol	30.0

右混和爲吸入料。 M. D. S. Zum Schnupfung.

第 606 方

磺胺噻唑	1.0	Sulfathiazole	1.0
甘油	10.0	Glycerin	10.0

右爲塗布料。 D. S. Zum Bepinseln.

主治 副鼻竇炎，急性鼻炎。

說明 亦可以改用 Sulfadiazine。本品應於排膿或洗滌後注入鼻腔。

第 607 方

青黴素鈉	50,000 i. u.	Penicillin Sodium	50,000 i. u.
乳化蠟	7.0	Emulsifying wax	7.0
硬石蠟	5.0	Paraffin	5.0
液體石蠟	41.0	Paraffin Liq.	41.0
氯甲酚	0.1	Chlorocresol	0.1
蒸餾水	47.0	Aq. dest.	47.0

右爲塗布料。 D. S. Zum Bepinseln.

主治 鼻副竇炎，急性鼻炎。

說明 本劑須在無菌手續下調製，調製後密封貯藏，過久則失效。

本劑爲乳狀，先排膿或洗滌後再置入。與本身治療同時進行。

第 608 方

青黴素鈉	75,000 i.u.	Penicillin Sodium	75,000i.u.
氯 甲 酚	0.03	Chlorocreosol	0.03
氯 化 鈉	0.27	Sodium Chloride	0.27
蒸 餾 水	30c.c.	Aq. dest.	30c.c.

右爲滴鼻水。 D. S. Nasal tropfen

主治 鼻副竇炎，急性鼻炎，鼻創傷。

說明 洗滌後用此水滴入，一日數次。

鼻科疾患亦可以用青黴素之噴霧劑。

杭 州 宋 經 樓 新 醫 書 局 發 行

木下正中原著
新醫同仁會究社校訂

助 產 學

精裝一厚冊 十八元

西醫助產之所以異於舊式穩婆者，蓋因其有科學之根據，並非全恃不可靠之經驗者。本書對於之助產所需之基本知識，以及生理分娩之各種技術與處置，縷述甚詳。學者可由此爲階梯，尤使學者便利不少。故各地助產學校多採作爲教本。

備 有 書 目 • 函 索 即 奉

C. 咽喉科 Hals.

第 609 方

硝酸銀	0.2—1.0	Argent. nitric.	0.2—1.0
鹽水	10.0	Aq. destill.	10.0

右混和盛以黑瓶， M. D. in vitr. nigr.
為塗布料。 S. Zum Bepinseln.

主治 咽炎，表在性舌炎。

第 610 方

普泰哥(耳)	0.2	Protargol.	0.2
鹽水	10.0	Aq. destill.	10.0

右混和盛以黑瓶， M. D. in vitr. nigr.
為塗布料。 S. Zum Bepinseln.

主治 與前方同。

第 611 方 盧戈耳氏碘液 Sol. Jodi Lugol.

碘化鉀	1.0	Kal. jodat.	1.0
碘酊	4.0	Tinct. jodi	4.0
鹽水	加至 40.0	Aq. destill	ad 40.0

右混和外用。 M. D. S. Äusserlich

主治 咽喉炎。

說明 本劑有消炎鎮痛之效。

第 612 方 曼特耳氏液 Mandle'sche Lösung.

碘	0.5—1.0	Jod.	0.5—1.0
碘化鉀	1.0—2.0	Kal. jodat.	1.0—2.0
甘油	30.0	Glycerin.	30.0
薄荷油	5 滴	Ol. Menthol.	Gtt v.

右混和為塗布料。 M. D. S. Zum Bepinseln.

主治 乾性咽卡若耳。

第 613 方

昇 汞 0.015 Sublimat. 0.015

甘 油 10.0 Glycerin. 10.0

右爲塗布料。 S. Zum BepinseIn.

主治 咽喉梅毒。

第 614 方

鹽化腎上腺素液 Sol. Adrenalin. hydrochl.
(五千倍) 20.0 (1:5000) 20.0

右爲塗布料。 S. Zum BepinseIn.

主治 咽喉炎，喉炎，鬱血性及肥厚性鼻炎。

第 615 方

鹽酸可開因 0.1—0.2 Cocain. muriat. 0.1—0.2
(或諾服開因 0.5—2.0) (od. Novocain. 0.5—2.0)

鑷 水 10.0 Aq. destill. 10.0

右爲塗布料。 S. Zum BepinseIn.

主治 咽喉結核疼痛。

第 616 方

薄 荷 油 Ol. Menthol.

阿內斯退辛 各 0.5-1.0 Anasethesin. 各 0.5 1.0

洋 橄 欖 油 10.0 Ol. Olivar. 10.0

右爲塗布料。 S. Zum BepinseIn.

主治 咽喉結核疼痛。

第 617 方

乳 酸 2.0—10.0 Acid lactic. 2.0—10.0

鑷 水 10.0 Aq. destill. 10.0

右爲塗布料。 S. Zum Bepinseln.

主治 咽喉結核性潰瘍。

說明 此液塗布須由醫師行之，塗布之先，宜塗鹽酸可開因液以止痛。

治梅毒在潰瘍可用 10% 鉻酸液塗布，此鉻酸液用鉻酸 Acid. Chromic. 3.0 箇水 Aq. destill. 27.0 製之。

第 618 方

氨基磺胺片 6 粒 Sulfamylamide tab No 6
用法口授 As Ordered

主治 文森氏咽喉炎，急性扁桃腺炎，喉頭炎，口腔炎等。

說明 本品用其每片含 0.5 gm 者，每二小時一粒，含於口內，聽其自然溶化。重症須與全身治療同時進行。其他磺胺類如 Sulfathiazole, Sulfadiazine 等亦堪應用。

第 619 方

青黴素片 24 粒 Penicillin Troches No 24
用法口授 As ordered

主治 與上同。

說明 用其每片含青黴素一千單位者，置於下齒齦與頰間之隙縫處，令其緩緩溶解，每小時一粒，可以維持相當高之濃度，而達治療目的。

第 620 方

青黴素鈣 Penicillin Calcium
300,000 i.u. 300,000 i.u.

鹽酸麻黃鹼 0.15 Ephedrine Hel. 0.15

生理食鹽水 30 公撮 Sormal Salz 30 c.c.

右爲噴霧劑 S. Zum Sprays

主治 與上同。

說明 用特種噴霧器噴射而出，令患者張口，可在口腔及喉頭維持甚高濃度。

第三十六章 皮膚生殖器(病)科

Haut-und Geschlechtskrankheiten.

A. 皮膚病 Hautkrankheiten.

- 第 621 方 乾燥粉 Pulv. exsiccant.
 氯化鋅(鋅華) Zinc. oxydat.
 滑石粉 各 25.0 Talc. Pulver. āā 25.0
 右混和爲散布料。 M. D. S. Streupulver.
 主治 紅斑，汗疹，濕性濕疹。
 說明 本劑有吸收皮面水分之效，滑石粉可以澱粉代之。
- 第 622 方 拉瑟氏鋅華油 Zinköl nach Lassar.
 氯化鋅 20.0 Zinc. oxydat. 20.0
 洋橄欖油 30.0 Ol. Olivar. 30.0
 右外用。 D. S. äusserlich.
 主治 濕性濕疹，火傷，急性皮膚炎，滲出性紅斑，痘瘡癰爛面諸症。
 說明 本劑可單用治以上各症外，并可爲基質，伍以吐美諾耳 Tumenol，披替羅耳 Pityrol，阿內斯退辛 Anaesthesin. 等用之。
- 第 623 方 拉瑟氏糊劑(混膏) Lassar'sche Pasta.
 氯化鋅 Zinc. oxydat.
 澱粉 各 12.0 Amyl. āā 12.0
 (硼酸或柳酸 1.0) Acid. borie. S. salicylic. 1.0)

黃凡士林 加至 50.0 Vaselin. flav. ad 50.0

右混和爲劑劑外用。M. f. Pasta D. S. äusserlich.

主治 紅斑期及落屑期濕疹，癢批疹，癩瘡諸症。

第 624 方 維爾遜氏軟膏 Ungt. Wilsoni.

氧化鋅 5.0 Zinc. oxydat. 5.0

安息香酸 1.0 Acid. benzoic. 1.0

豚 脂 30.0 Adeps. suillus 30.0

右混和爲軟膏外用。ut. f. ungt. D. S. äusserlich.

主治 疥疹，苔癬狀變化。

說明 以上兩方，均可伍以他藥如柳酸 Acid. salicylic. 吐美諾耳 Tumenol, 披替羅耳 Pityrol. 等 5% 用之。

第 625 方 士肥氏拉諾林劑 Lano in pasta. Doli.

氧化鋅 Zinc. oxydat.

滑 粉 各 25.0 Amyl. āā 25.0

柳 酸 0.5 Acid. salicylic. 0.5

拉 諾 林 50.0 Lanolin. 50.0

右混和爲劑劑外用。M. f. Pasta D. S. äusserlich.

主治 與前方同。

說明 本劑亦可伍以吐美諾耳，披替羅耳等藥用之。

第 626 方 內瑟氏劑 Neisser'sche Pasta.

吐美諾耳 Tumenol. ammon.

氧化鋅 Zinc. oxydat.

滑 石 各	12.5	Talc. venet.	āā 12.5
黃 凡 士 林	50.0	Vaselin. flav.	50.0
右爲搗劑外用。 M. f. Pasta D. S. äusserlich.			

主治 水泡破潰，帶狀疹糜爛面，癩面，肉芽面，毛瘡。

第 627 方

氯化鋅		Zinc. oxydat.	
白 明 膠	各 15.0	Gelatin. alb.	āā 15.0
甘 油	25.0	Glycerin.	25.0
水	45.0	Aq.	45.0

右混和用時加溫搽 M. D. S. Zum Bepinfeln unter erwärmen.
布。

主治 小兒顏面及手掌濕疹。

說明 用本劑可無須繃帶。

第 628 方

薄 荷 腦	0.5—3.0	Menthol.	0.5—3.0
酒 精	100.0	Spirit.	100.0

右爲搽布膏。 D. S. Zum Bepinseln.

主治 皮膚癢癢症，癢疹，蕁麻疹，苔癬，腋臭。

第 629 方

薄 荷 腦	1.0	Menthol	1.0
石 炭 酸		Acid. Carbolic.	
柳 酸	各 2.0	Acid. salicylic.	āā 2.0
酒 精	100.0	Spirit.	100.0

右混和外用。 M. D. S. äusserlich.

主治 與前方同。

第 630 方

薄荷腦		Menthol.	
石炭酸	各 0.5	Acid. carbolic.	āā 0.5
柳酸	1.0	Acid. salicylic.	1.0
拉諾林	10.0	Lanolin.	10.0
凡士林	50.0	Vaselin.	50.0

右混和為軟膏外用。ut f. ungt. D. S. äusserlich.

主治 與前方同。

第 631 方 土肥氏鱷油粥劑 Teerpasta, Dohi.

氯化鋅		Zinc. oxydat.	
硫黃華		Sulfur. sublimat.	
樺木鱷油	各 10.0	Ol. Rusci	āā 10.0
豚脂	30.0	Adeps suill.	30.0

右混和為粥劑外用。ut f. Pasta D. S. äusserlich.

主治 肛門及陰戶癢癢症，濕疹，固定尋麻疹，慢性濕疹，手掌足底皸裂性及胼胝性濕疹，陰部濕疹，脂漏性濕疹，尋常性乾癬，紅色苔癬，慢性尋常性毛癢，頭部白癬，黃癬，紅色陰癬，癩風，疥癬。

說明 本劑除毛髮部外，搽布之後，均須撒布鋅華於其上。

第 632 方 維爾慶孫氏軟膏 Ungt. Wilkinsoni.

沉降硫黃		Sulfur. praecipitat.	
樺木鱷油	各 20.0	Ol. Rusci	āā 20.0

綠肥皂	Sapo viridis		
黃凡士林	各 40.0 Vaseline. flva.	aa	40.0
白 堊	5.0 Calc. carbonic.		5.0

右混和爲軟膏外用。ut f. ungt. D. S. äusserlich.

主治 癢疹，慢性濕疹，紅色苔癬，白癬，黃癬，紅色陰癬。

說明 本劑刺激性較前方士肥氏劑強，除毛髮部外，搽布後，亦須撒布銹華。

以上兩方，可伍披替羅耳 5%，或吐美諾耳 5%，或吐美諾耳護 1% 用之。

第 633 方

諾羅仿	1.0 Novoloform		1.0
硼酸軟膏	10.9 Ungt. Acid. boric.		10.0

右混和外用。 M. D. S. äusserlich.

主治 火傷潰瘍，下腿潰瘍，壞疽。

說明 本劑有鎮痛，止癢之效。

第 634 方

鞣酸	2.5 Acid. tannic.		2.5
樟腦醑	50.0 Spirit. camphorat.		50.0

右混和爲搽布料。 M. D. S. Zum Bepinseln.

主治 第一度凍傷。

第 635 方

碘 酊	2.0 Tinct. jodi		2.0
石炭酸	1.0 Acid. carbolic.		1.0
鞣酸	2.0 Acid. tannic.		2.0
拉諾林	30.0 Lanolin.		30.0

右混和每晚搽布。 M. D. S. Jeden Abend zu pinseln.

主治 凍傷。

第 636 方

鉛糖(醋酸鉛)	2.0 Plumb. acetic.	2.0
水	200.0 Aq.	200.0

右爲覆包料。 D. S. Zu umschlagen.

主治 急性皮膚炎，急性濕疹。

第 637 方 蒲羅氏液 Liq. Burowi

鉛 糖	5.0 Plumb. acetic.	5.0
明 礬	1.0 Alum.	1.0
水	100.0 Aq.	100.0

右爲覆包料 D. S. Zu umschlagen.

臨用時以六至十倍 Schütteln u. verdünnung

水振盪稀釋之。 1:6—10. mit Wasser.

主治 與前方同。

第 638 方

迨馬妥耳	20.0 Dermatol.	20.0
------	----------------	------

右爲撒布料。 D. S. Streupulver.

主治 創傷，火傷。

說明 本品有乾燥及收斂作用。可伍以倍量之氯化鋅，用於帶狀疱疹，陰部疱疹，足汗。

第 639 方

迨馬妥耳	2.0 Dermatol.	2.0
單 軟 膏	20.0 Ungt. simpl.	20.0

右混和外用。 M. D. S. ausserlich.

主治 凍瘡，潰瘍，火傷。

第 640 方

愛羅耳 5.0 Aiol. 5.0

右為撒布料。 D. S. Streupulver.

主治 腐敗性潰瘍，軟性下疳，創傷，火傷。

說明 本品可以單軟膏為基質，製成 10% 軟膏貼用之。

第 641 方

枯 藥 5.0 Alura. ust. 5.0

澱 粉 20.0 Amyl. 20.0

滑石粉 30.0 Talc. 30.0

右混和為撒布料。 M. D. S. Streupulver.

主治 腋臭。

第 642 方

坦諾仿 5.0 Tannoform. 5.0

澱 粉 25.0 Amyl. 25.0

右為撒布料。 D. S. Streupulver.

主治 手汗，足汗，汗疹，液臭。

第 643 方

坦諾仿 10.0 Tannoform. 10.0

氯化鋅 Zinc. oxydat

澱 粉 Amyl.

滑石粉 各 15.0 Talc. venet. āā 15.0

右混和為撒布料。 M. D. S. Streupulver.

主治 與前方同。

說明 坦諾仿亦可為 10% 醇，用以搽擦手汗足汗等症。

第 644 方

硼 酸	5.0	Acid. borcic.	5.0
氯化鋅		Zinc. oxydat.	
滑石粉	各 20.0	Talc.	āā 20.0

右混和爲撒布料。 M. D. S. Streupulver.

主治 與前方同。

第 645 方 硼酸軟膏 Ungt. Acidi. borici. (Bor-salbe)

硼 酸	0.5—1.0	Acid. boric.	0.5—1.0
甘 油	1.0	Glycerin	1.0
單 軟 膏	8.0	Ungt. simpl.	8.0

右外用。 D. S. ausserlich.

主治 腐敗性潰瘍，膿痂疹，清潔創傷保護。

第 646 方

流動石炭酸	0.5	Acid. carbolic. liquef.	0.5
薄荷腦	1.0	Menthol.	1.0
拉諾林		Lanolin.	
凡士林	各 50.0	Vaselin.	āā 50.0

右混和爲軟膏外用。 ut f. ungt. D. S. ausserlich.

主治 癢疹，皮膚癢癢症，尋麻疹。

第 647 方

雷 琅 辛	2.0	Resorcin.	2.0
醇	100.0	Spirit.	100.0

右爲搽布料。 D. S. Zum Eintupfen.

主治 脂漏性濕疹，乾性脂漏，腋臭。

說明 本方可加柳酸 Acid. salicylic. 1.0 用

之。

第 648 方

既登(坎他 利斯)酞	10.0 Tinct Cantlarid.	10.0
柳 酸	2.0 Acid. salicylic.	2.0
蓖麻子油	10.0 Ol. Ricin.	10.0
醇	80.0 Spirit.	80.0

右混和爲搽布料。 M. D. S. Zum Eintupfen.

主治 秀頭症(使之再生)

第 649 方 培耳次氏水 Bälzwasser

氫氧化鉀 (苛性鉀)	1.0 Kal. caustic.	1.0
甘 油	60.0 Glycerin.	60.0
醇	40.0 Spirit.	40.0
餾 水	100.0 Aq. destill.	100.0

右混和搽擦。 M. D. S. Zu verreiben.

主治 乾燥性及皸裂性皮膚，在冬期搽擦皮膚，預防皸裂，及凍瘡等。

第 630 方

苛 性 鉀	1.0 Kal. caustic.	1.0
餾 水	10.0 Aq. destill.	10.0
糯 米	適量	

右外用。 D. S. äusserlich.

說明 此爲去痣劑，米浸數時間後，膨漲透明，乃研和之或即取米珠心少許，點於痣上，經時拭去之。視其經過，數日間反覆用之，其痣自落。

第 651 方

三氯醋酸	5.0	Acid. trichloracetic.	5.0
水	1.0	Aq.	1.0

右混和以綿球浸取 M. D. S. Zum Bepinseln
出塗患部。 mit Wattestäbchen.

主治 疣贅，雞眼。

第 652 方

柳 酸	1.0	Acid. salicylic.	1.0
冰 醋 酸	10.0	Acid. acetic. glaciale	10.0

右混和外用。 M. D. S. äusserlich.

主治 疣贅，雞眼。

第 653 方

凍瘡酊 Pernio-tinctur.

碘 酊	1.0	Tinct. jodi	1.0
蓖麻子油	3.0	Ol. Ricin.	3.0
醇	6.0	Spirit.	6.0
火 棉	50.0	Collodi	50.0

右混和外用。 M. D. S. äusserlich.

主治 凍瘡。

第 654 方

克利薩羅彬 (苛極素)	5.0	Chrysarobin. (Pulv. Goa)	5.0
拉 諾 林	30.0	Lanolin.	30.0
凡 士 林	20.0	Vaselin.	20.0

右爲軟膏外用。 ut f. ungt. D. S. äusserlich.

主治 寄生性皮膚病，如寄生性圓行疹，頑癬，糠皮癬，鱗屑癬，限局性濕疹諸症。

第 655 方 烏那氏複方軟膏

鞣三醇 (焦性 沒食子酸)	2.5 Pyrogallol	2.5
柳 酸	1.0 Acid. salicylic.	1.0
魚 石 油	1.0 Ichthyol.	1.0
凡 士 林	44.0 Vaseline.	44.0

右混和爲軟膏外用。ut f. ungt. D. S. äusserlich.

主治 狼瘡，鱗屑癬。

第 656 方

萘酚醇 (那弗妥耳)	5.0 Naphtol. (Beta-naphtol.)	5.0
醇	100.0 Spirit.	100.0

右爲搽布料。 D. S. Zum Bepinseln.

主治 疥癬，手足腋等部之多汗症。

第 657 方 拉瑟氏剝離膏 Lasser's Schaelpasta.

那弗妥耳	10.0 Naphtol.	10.0
沉降硫黃	50.0 Sulfur. praecipit.	50.0
凡 士 林	Vaseline.	
綠 肥 皂	各 25.0 Sapo yirid.	

右混和外用。 M. D. S. äusserlich.

主治 酒皸鼻性瘰癧，汗斑。

說明 塗貼本劑厚層於患部，經三十分或一時
間後，以綿浸洋橄欖油或揮發油拭去之。
撒布鉉華粉於其上，反覆塗布至剝離爲止

第 658 方

那弗妥耳	5.0—10.0 Naphtol.	5.0—10.0
精製硫黃	30.0 S. fur. depurat.	30.0

綠肥皂	50.0	Sapo virid.	50.0
豚脂	100.0	Adep. suill.	100.0

右爲軟膏外用。 ut f. ungt D. S. aeusserlich.

主治 疥癬。

第 559 方 按斯內耳氏剝離膏 Jessner's Schälpa-
sta,

雷瑣辛		Resorcin.	
柳酸		Acid. salicylic.	
精製硫黃		Sulf. depurat.	
銻華	各 4.0	Zinc. oxydat.	āā 4.0
凡士林	20.0	Vaselin.	20.0

右混和外用。 M. D. S. aeusserlich.

主治 尋常性瘰癧。

第 560 方 溫烏那氏剝離膏 Schaelpasta nach
Unna

銻華剝劑		Pasta Zinci	
雷瑣辛	各 40.0	Resorcin.	āā 40.0
魚石油		Ichthyol.	
凡士林	各 10.0	Vaselin.	āā 10.0

右混和外用。 M. D. S. aeusserlich.

主治 瘰癧。

第 561 方

沉降硫黃		Sulf. praecipit.	
	2.0 5.0 10.0		2.0 5.0 10.0
柳酸	2.0	Acid. salicylic.	2.0
雷瑣辛	2.0	Resorcin.	2.0
凡士林	100.0	Vaselin.	100.0

右爲軟膏外用。 ut f. ungt. D. S. äusserlich.

主治 脂漏症。

第 662 方

秘魯香脂 10.0 Balsam. peruvian. 10.0
 醇 100.0 Spirit. 100.0

右爲塗布料。 D. S. Zum Bepinseln.

主治 疥癬。

第 663 方

流動蘇合香 140.0 Styrax. liquid. 140.0
 洋橄欖油 Ol. Olivar.
 醇 各 20.0 Spirit. āā 20.0

右爲塗布料。 D. S. Zum Bepinseln.

主治 疥癬。

說明 先使病人洗浴拭乾後，塗以本劑，每日一回，二日後再入浴，不癒可反覆用此法。

第 664 方

水銀(灰白)軟膏 30.0 Ungt. Hydrarg. ciner. 50.0

右外用。 D. S. äusserlich.

說明 本品多用於梅毒症此外如毛蟲即陰毛蟲，等之驅除亦用之。此時塗之於毛根部及皮膚約經十二時間，以肥皂水洗去之。

第 665 方

精製石(洋)油 Petrol. depurat.
 洋橄欖油 各等分 Ol. Olivar. āā

右混和外用。 M. D. S. äusserlich.

主治 髮蝨。

說明 搽布本劑於毛髮，經十二時間後以肥皂水洗之。再搽以醋經數時間後，剷去蝨卵。

第 666 方

柳 酸	3.0	Acid. salicylic.	3.0
錫 華		Zinc. oxydat.	
澱 粉	各 25.0	Amyl.	āā 25.0
凡 士 林	50.0	Vaselin.	50.0

右為軟膏外用。 ut f. ungt. D. S. acusselich.

主治 頭部黃癬菌甲(可使脫除)

第 667 方

立麝香草腦	0.3—0.5	Thymol	0.3—0.5
甘 油	3.0	Glycerin	3.0
醇	30.0	Spirit.	30.0

右混和搽布。 M. D. S. Betupfen.

主治 癢疹。

第 668 方 樟腦(酉)醑 Spirit.(Tinct.) Camphor.

樟 腦	1 分	Camphor.	I.
醇	7 分	Spirit.	VII.
餾 水	2 分	Aq. destill.	II.

右為搽布料。 D. S. Betupfen.

主治 風痺疼痛，神經痛，凍傷。

第 669 方

魚 石 油	10.0-20.0	Ichthyoi	10.0—20.0
醇	加至 100.0	Alkohol.	ad 100.0

右爲搽布料。 D. S. Betupfen.

說明 本劑有消炎，鎮痛，鎮癢之效。

第 670 方 魚石油軟膏 Ungt. Ichthyoli (Ichthy
lsalbe)

魚石油	5.0	Ichthyol	5.0
凡士林(豚脂)	45.0	Vaselin. (Adep. suill.)	45.0

右混和爲軟膏外用。 ut f. ungt. D. S. ausserlich.

主治 癬瘡，火傷，凍傷，帶狀水疱疹，紅頭
，丹毒，癩疹，濕疹，鱗屑癬等症。

第 671 方 碘仿火棉 Jodoformkollodium

碘仿	1.0	Jodoform.	1.0
火棉	9.0	Collodium.	9.0

右混和爲搽布料。 M. D. S. Betupfen.

主治 火傷，潰瘍，乾性下疳，一切無菌性創
面。

第 672 方

柳酸	2.0	Acid salicylic	2.0
錳末	4.0	Mydrarg. Ammonia	4.0
凡士林	30.0	Vaselin Flav.	30.0

右混和爲軟膏外用。 ut f. nngt. D. S. Ausse
rlich.

主治 癬，膿疱病等。

說明 本劑有殺菌作用。

第 673 方

西洛芳	1.0	Xeroform.	1.0
白軟石臘	30.0	Petrolat alb. ad	30.0

右混和爲軟膏外用。 ut f. ungt. D. S. Ausser-

lich.

主治 膿痂病。

第 674 方

地 地 蓉 10.0 D. D. T. 10.0

滑 石 粉 加至100.0 Talcum Powderad 10.0

有為撒布料。 D. S. Streupulver.

主治 頭蝨等。

說明 本劑撒布於頭髮乾後，以手帕包裹，次日以篦梳清理頭髮，再以本劑撒布，連用數日，可以斷根。

第 675 方

地 地 蓉 1.0 D. D. T. 1.0

凡 士 林 10.0 Vaseline 10.0

有混合為軟膏外用。ut f. ungt. D. S. Ausserlich.

主治 寄生性皮膚病。

第 676 方

磺 胺 噁 唑 0.5 Sulfathiazole 0.5

凡 士 林 10.0 Vaseline 10.0

有混合為軟膏外用。ut f. ungt. D. S. Ausserlich.

主治 傳染性皮膚病。

說明 磺胺劑用於皮膚病者除磺胺噁唑外，其他如氨基磺胺，磺胺醋胺，磺胺嘧啶等均堪應用。其形式除軟膏劑外，尚有粉劑，混懸液，及特製之磺胺薄膜（治火傷，詳見連潔羣編磺胺類之研究及其臨床應用一書）等，本章因為篇幅所限，故不贅。

第 677 方

青黴素鈣 50,000單位 Calcium Penicillin 50,000
i. u.

羊毛醇軟膏 100公分 Int. of wool Alcohols
100 gm.

右混合爲軟膏外用。ut f. ungt. D.S. Ausserlich.

主治 膿疱瘡，癬，鬚瘡，丹毒，火傷等。

說明 (1)羊毛醇軟膏之製法如次：

羊毛醇 (Wool Alcohol) 6 gm.

硬石蠟 24 gm.

凡士林 10 gm.

液體石蠟 60 gm.

加溫熔和，攪拌至冷即得。

(2)青黴素應用於皮膚病之形式除軟膏外，尚有乳劑，噴霧劑等。(詳見連潔羣著青黴素之研究及其臨床應用一書)。

【附註】(1)應用於皮膚病之處方甚多，不勝枚舉。一部份可參看消毒防腐劑章，一部份參看化學治療劑章。

(2)商品成藥之用於皮膚病者，爲數至夥，難以一一列舉，但其成份仍不外以上數十處方所列者，其惟一長處即因用機器調製，藥末研磨精細，調製勻淨，不致有粗糙刺激之弊。

(3)青黴素之各種形式，須在精密之無菌操作下調劑，普通醫院，藥房及開業醫師，均無此種設備及習慣，故事實上僅能向市上購買製成品耳。

(4)近有一種美國商品名 Insect repellent，塗於皮膚上可以避免昆蟲之侵襲，其原料不知爲何，因手頭參考文獻不多，無法增入。

B. 生殖器病 Geschlechtskrankheiten.

第 678 方

昇	汞	0.01—0.03	Sublimat.	0.01—0.03
安	替必林	0.5—1.0	Antipyrin	0.5—1.0
餾	水	200.0	Aq. destill.	200.0

右一日二三回，— S 2—3 mal tgl. 1 Spritze in
回一筒尿道注入。 in die Harnröhre zu injizieren.

主治 尿道卡答耳。

第 679 方

過錳酸鉀	0.02—0.05	Kal. hypermanganic.	0.02—0.05
------	-----------	---------------------	-----------

餾	水	200.0	Aq. destill.	200.0
---	---	-------	--------------	-------

右一日二三回，— S. 2—3 mal tgl. 1 Spritze
回一筒尿道注入。 in die Harnröhre zu injez
ieren.

主治 尿道卡答耳。

第 680 方

普	泰哥耳	0.5—2.0	Pretargol	0.5—2.0
甘	油	0.5	Glycerin	0.5
(食	鹽	1.5)	(Natr. chlorat.	1.5)
餾	水	200.0	Aq. destill.	200.0

右爲尿道注入料。 S. Zur Injektion in
die Harnröhre.

主治 淋病性尿道炎。

第 681 方

伊	希他干	0.03—0.1	Ichthargan	0.03—0.1
---	-----	----------	------------	----------

解 水 200.0 Aq. destill. 200.0

右爲尿道注入料。 D. S. Zur. Injekt. in d.
Harnröhre

主治 淋疾性尿道炎。

第 682 方

次硝酸鉍 2.0—4.0 Bismuth, subnitric, 2.0—4.0

餾 水 200.0 Aq. destill. 200.0

右夕刻一筒尿道內 D. S. Abends 1 Spritze in
注入臨用前振盪之 die Harnröhre zu injizieren,
。 vor dem Gebrauch zu schütteln.

主治 與前方同。

第 683 方

甘 汞 Calomel
代馬妥耳 各 5.0 Dermatol 5.0

右爲撒布料。 D. S. Streupulver.

主治 硬性下疳。

第 684 方

水銀硬膏 Emplastr. hydrarg. ciner.

肥皂硬膏 各 10.0 Emplastr. saponat. 10.0

右混和外用。 M. D. S. aeußerlich.

主治 硬性下疳。

說明 取本膏少許，敷於布片上，而貼患部。
硬性下疳亦可用 0.5% 白降汞凡士林軟膏貼治之。

第 685 方

利 瑣 耳 4.0—8.0 Lysof 4.0—8.0

水 400.0 Aq. 400.0

右爲洗滌料。 S. Zu spülen.

主治 膿性白帶下。及其他傳染性陰道炎。

說明 利瑣耳性和緩，可作爲家庭常備之消毒防腐性洗滌劑也。

產婦科洗滌劑除利瑣耳外，下記諸藥亦爲常用。液之溫度，以微溫即攝氏36—37度爲宜，有時亦用42，3度溫水。

- a. 1—2% 硼酸 Acid. boric. 液，爲一般陰道洗滌料，亦適用於家庭。
- b. 1—3% 重碳酸鈉 Natr. bicarbonic. 液，用於陰道炎而分泌物粘稠並呈強酸性反應者。
- c. 0.01—0.02% 過錳酸鉀 Kal. perman-ganic. 液，亦爲常用洗滌劑。能除惡臭，是以適用於有惡臭性分泌物各症，如子宮癌。
- d. 0.05—0.1% 昇汞 Sublimat. 液，殺菌力固強然易於中毒，故須由醫師用之。
- e. 0.01—0.1% 過氫化氫液 Liq. Hydro-geni. peroxdati. 應用於膿性白帶下，及陰道潰瘍諸症。
- f. 乳酸 Acid. lactic. 製爲0.5% 液，應用於分娩前可防產褥熱。

第 686 方 魚石油(陰道)球 Ichthyol-kugel

魚石油	0.1—0.2 Ichthyol	0.1—0.2
柯柯脂	2.0 Ol. Cacao	2.0

右混和爲陰道球一個。 ut f. globulus vaginalis No. 1.

主治 子宮實質炎，骨盆腹膜炎，骨盆結締組織炎。

說明 陰道洗滌後，塞入本劑，有消炎之效。

第 687 方 魚石油莨菪球 Ichthyolscopoliakugel
 魚石油 0.1—0.2 Ichthyol. 0.1—0.2
 莨菪浸膏 0.03—0.05 Extract. Scopol. 0.03—0.05
 柯柯脂 2.0 Ol. Cacao 2.0

右混和爲陰道球一個。 ut f. globulus vaginalis No. 1.

主治 與前方向。

說明 本劑有消毒止痛之效。

陰道球除上二劑外，碘魚石油球 Jod.-Ichthyolscopoliakugel. 及魚石油銀球 Ichthyolsilberkugel. 亦爲常用，均有消炎止痛之效，含碘者兼有消毒吸收之效。

第 688 方 魚石油甘油 Ichthyolglycerin
 魚石油 5.0—10.0 Ichthyol 5.0—10.0
 甘油 40.0 Glycerin 40.0

右爲栓塞料。 S. Tamponsmittel.

主治 子宮內膜炎，子宮外膜炎，頸管炎，卵巢炎，淋疾等症。

說明 用綿球浸本液栓塞。

本劑亦常用於皮膚炎症如丹毒等症。

第 689 方
 雷佛奴兒 1.0 Rivanol 1.0

- | | | |
|--|-----------------------|----------|
| 鹽水 | 1000.0 Aq. dest. | 1000.0 |
| 右爲洗滌料。 D. S. Waschung. | | |
| 主治 男性尿道炎，女性陰道炎。 | | |
| 第 690 方 | | |
| 碘仿 | 2.0 Jodoform | 2.0 |
| 代馬妥兒 | 8.0 Dermatol | 8.0 |
| 右爲撒布料。 D. S. Streupulver. | | |
| 主治 軟性下疳。 | | |
| 第 691 方 | | |
| 藥特靈 | 1.0—2.0 Yatren Powder | 1.0—2.0 |
| 外用。 D. S. Extern. | | |
| 主治 白帶，子宮頸炎，陰道炎。 | | |
| 說明 以此粉用噴射器噴入陰道。 | | |
| 第 692 方 | | |
| 代末剛片 | 1 瓶 Devegan tab | 1 bottle |
| 右爲栓劑。 S. Tamponsmittel | | |
| 主治 滴蟲性白帶等。 | | |
| 說明 先將陰道拭淨，然後用本品一片塞入後陰穹窿，每日用一至三次，每次一兩片，塞入愈深愈妙。 | | |
| 【附註】生殖器病局部用藥頗多，因各該疾病之情況而異，一般刺激性較少之軟膏劑及洗滌劑，擦劑等均堪應用，可參看消毒防腐及皮膚病劑章。 | | |

(一) 處方及處方箋

醫師爲治病使用一種或二種以上藥物，以文字開明，曰處方。記處方於紙上者，曰處方箋 (Receptum 或 Prescriptum)。醫師應病人之請求，得錄方授之，藥師接受處方箋，則應負調劑授藥之義務。

1. 處方箋應記載之事項

醫師處方時，應記明下列事項：

1. Inscriptio: 日期，住址，患者姓名，年齡
2. Invocatio: Recipe (取)之略字 R 或 Rp
3. } Ordinatio: 記載藥物名稱及其分量並指示藥
4. } 師關於藥物調劑之方法
5. Signatura: 記明藥劑用法，用量以告病人
6. Subscriptio: 醫師簽名
7. Adscripti: 附記

藥物名稱多用拉丁文字記載，用法及調劑方法，各以其本國文字記載之。

2. 處方之組成

處方中所記藥物，視其應用之目的，得分爲下列之四種：

1. 主藥 Basis oder Heilmittel: 例如嗎啡，洋地黃葉等。
2. Adjuvans oder Unterstützungsmittel: 佐藥例如鹽類酸類等。
3. 成形藥 Constituans oder gestaltgebendes mittel: 例如蒸餾水，植物粉末，浸膏等。
4. 調味藥 Corrigenens oder Verdesserungsmittel: 例如糖漿，油糖，粘液劑，芳香水等。

茲舉處方例如次：

處方：	Rp	
鹽酸阿朴嗎啡(結晶)	0.04	Apomorph mur cryst 0.04
鹽酸嗎啡	0.02	Morph mur. 0.02
苦杏仁水	5.0	Aqua amygd amar. 5.0
祛痰藥酒	20.0	Elix Pector 20.0
蒸餾水	30.0	Aqua destill 30.0
糖漿	15.0	Syr Simpl 15.0
以上混合		M. D. S. 4 mōl täglich einen
用法一日四次每服一茶匙		Teelöffelvoll

(二) 處方箋中服法用語

國	語	英	語
每二小時服一食匙		One tablespoonful	every two hours
每三小時服一酒杯		I Wineglassful	every 3. hours
每三小時服一酒杯		One wineglassful	every three hours

每食後服二茶匙	2 tablespoonful after each meal.
每小時服半茶匙	1/2 tablespoonful every hour
每食後服二茶匙	2 teaspoonful after each meal
一日三次每服一食匙	One tablespoonful 3 times a day
一日數次每服一小兒匙	Half tablespoonful many times a day
一日三次每服一湯匙	A knife-pointful 3 times a day
一日三次每服一包	One powder times a day
一日三次每服一丸	One pill three times a day
一日三次分服	To be taken 3 times a day
一日三次分服	To take 3 x daily
一日三次二日分服	To be taken 3 times a day for 2 days
一日三次二日分服	To take 3 times daily for 2 days
一日三次每服十滴	10 drops 3 times a day
咳嗽時服十五滴	15 drops for coughing
發熱時頓服	To be taken at once for fever
川澱粉紙包藥頓服	To be taken at once with wafer

用穀粉紙包藥蟬服	To take at once with wafer
每服一茶匙	One tablespoonful as needed
每食後服一丸	One pill after each meal
頓服	To be taken at once.
臨臥頓服	To be taken before going to bed.
臨臥頓服	To take at once by going bed.
空腹時頓服	To be taken in jejune
朝夕頓服	To be taken at once morning and evening
內服	Internally.
外用	Externally.
含嗽劑	Mouthwater
含嗽劑	To gargle.
襪包劑	For fomentation.
襪包劑	to fomentation.
撒布劑	Strewing powder
塗敷劑	to painting

塗擦劑	For friction
洗滌劑	For washing
注射劑	For injection.
皮下注射劑	For subcutaneous injection.
吸入藥	to inhalation.
灌腸藥	to clyster.
點眼藥	Collyria.
點耳藥	Eardrops
用法口述	as ordered

(三) 處方應用拉丁略語註解

醫師處方時得使用下列拉丁略語

略	語	全	語	中	語
a, aa		ana		各	
add, addat.		adde, addatur		、加	

ad lib.	ad libitum	隨意
ad rat.	ad rationem	合計
ad us.	ad usum	用
aeq	aequalis	同一
bol.	bolus	巨丸
c.	cum	以
Conc-- cont	Concisa.	剉切，搗碎
Chart	Charta	紙
Ch. c.	Charta cerata	蠟紙
Col.	Cola, colatur, colatural	濾過，濾液
Conc	Concentratus, concisus	濃厚
Consp	Consperge, conspergantur	撒布
Cont	Conturde	搗碎
Coq	Coque	煮沸
Comp	Compositus	複方
D.	Desis, da, detur	一日量，授與

dec.	Decoctum	煎劑
d. t. d.	dentur tales doses	授與同量
dec.	decoctum	煎
dil.	dilutus	淡，稀薄
disp.	Dispensa dispensentur	分
div.	Divide, dividatur	分
d. in p. aequ.	Divide, in partes aequales	分爲等量
ext.	Extende, extendatur	展延
f.	Fiat, Eiant.	爲，配製
F. m.	Eiat mixtura	爲水劑，配製水劑
Filtr.	Filtra. Filtretur	濾過
Gtt.	Gutta, guttae guttas	滴
Guttat.	Guttatim	按滴
h.	Hora	時
Inf.	Infusum, infunde	浸
L. a.	Lege artis	按法

M.	Misce, misceantur	混合
m. d. s. od M DS	Misce, da, signa	混合，授與，記明
M. d. u.	More dicto utenbus	按照口述服用
M. i.	Misce, fisl	混合
M. f. pulv.	Misce fiat pulvis	混合配製散劑
M. pil.	Massa pilularum	丸劑塊
Obd.	Obduce. obducantur	覆
OLL.	Olla	壺，罐
P.	Pulvis	散劑
P. aeq	Partes aequales	等分
Past	Pasta, Pastillus	糊膏，錠劑
Pd.	Ponderis	重量
P. P.	Pro paupore	貧用
pracc.	Praecipitatus	沉澱
q. l.	quantum libet	任意量
Q. S.	Quantum satis	適量

R. No. Rp.	取
Reit	反復
rep.	反復
S.	記載
S. a.	依法
S. s. n.	記名
Scat.	紙盒
Sol.	液體，溶液
Solv.	溶解
Sub.	加微
Ungt.	軟膏
Us	使用
V.	玻璃瓶

計量及記法

藥物之秤量，以法國克拉母 Gramme 制為最便。民國四年，我國頒布權度法，稱之為公分，其上進式如下：

0.001	=	Milligramme	毫克	公絲
0.01	=	Centigramme	厘	公毫
0.1	=	Decigramme	釐	公釐
1.0	=	Gramme	克	公分
10.0	=	Dekagramme	尅	公錢
100.0	=	Hektogramme	尅	公兩
1000.0	=	Kilogramme	尅	公斤

藥物之容量，用立方釐 Cubic centimeter 之制，其記法如下。

1 c. c. m	一立方釐
10 ,, ,, ,,	十 ,, ,, ,,
100 ,, ,, ,,	百 ,, ,, ,,
1000 ,, ,, ,,	千 ,, ,, ,,

千立方釐亦稱之為一立特 Liter (公升)

容量計數，僅適用於水或與水比重相等之液體，如其比重輕於水或重於水，則不得以容積計量，須秤量之。故凡處方上記 180. c. c. m 為指容量言，若記以 180.0 宜酌定之。

一立方釐以下，不使計量時，則以滴 Gutta,

Minimum 數代量之，此時宜注意液之性質，茲記各液 1 c. c. m 之滴數約如次表。

水	1 c. c. m	=	16—20 滴
油	,, ,,	=	20—25 滴
醇，酊	,, ,,	=	30 滴
醚	,, ,,	=	50—60 滴
磷酸	,, ,,	=	10—16 滴
樹脂	,, ,,	=	12 滴

歐美各國，有以刀尖或匙或杯，量粉散或水液者，其相當之量約如下。

1 Messerspitze	一刀尖	=	1.0—2.0
1 Teelöffel	一茶匙	=	4.0
1 Kindlöffel	一兒匙	=	8.0
1 Esslöffel	一食匙	=	15.0
1 Weinglas	一酒杯	=	100.0—120.0
1 Wasserglas	一水杯	=	150.0—180.0

英國度量 1 Grain = 約 0.06

對於小兒用藥之注意點

用量 乳兒及小兒藥物用量，各方書所載，亦不無上下之處，茲舉其二三標準於次。

弗黎息開G. Friesicke氏等處方書之記載如下表。

初生兒	1/25
1個月兒	1/20
2個月	1/17
3個月	1/13
4—5個月	1/11
6個月	1/10
7—9個月	1/9
10—12個月	1/8
2歲	1/6
3—4歲	1/5
5—6歲	1/4
7歲	3/10
8—9歲	1/3
10—11歲	4/10
12—13歲	1/2
14歲	6/16
15歲	7/16
16歲	3/4
17歲	8/10
18歲	8/10—1/1

幼 Young 氏常用下式算出小兒藥用量。

$$\text{大人量} \times \frac{\text{小兒年齡數}}{\text{小兒年齡數} + 12} = \text{用量}$$

例如或種藥物大人一回量 0.3，八歲兒應用幾何？

$$0.3 \times \frac{8}{8 + 12} = 0.12$$

如用於生後三個月之乳兒須幾何？三個月即 $\frac{1}{4}$ 年故

$$0.3 \times \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} + 12} = \frac{0.3}{49} = 0.003$$

唐澤氏等所著兒科處方新書之記載，如次表。

一歲以內	1/15—1/12
一至二歲	1/8
二至四歲	1/6
四至六歲	1/4
六至十歲	1/3
十至十五歲	1/2

矯味 小兒嫌惡苦辛辣諸味，而芳香亦非其所好，獨甘味為適用，故於水劑須加糖漿，散劑如乳糖白糖可也。

劑形 丸劑錠劑非年長兒，不能吞下，故以水劑散劑為宜，散劑一包全量，宜在 0.5 以內，多亦不可過 1.0。水量一日全量，約如下表。

初生兒	10.0—15.0
一至三歲	20.0—30.0
四至六歲	30.0—40.0
六至十歲	40.0—50.0
十至十五歲	50.0—60.0

(四) 常備藥表

(本表所載者乃每一醫院或藥房均應常備之藥品)

中名	英式拉丁名
亞刺伯膠	Acacia
醋酸基羧二氫鹽基固(非那西汀)	Acetphenetidinum
醋柳酸	Acidum acetylsalicylicum
硼酸	Acidum boricum
枸橼酸	Acidum citricum
稀鹽酸	Acidum hydrochloricum dilutum
柳酸	Acidum salicylicum
鞣酸	Acidum tannicum
酒石酸	Acidum tartaricum
豚脂	Adeps Suillus
羊毛脂(無水羊毛脂)	Adeps lanae
精製磁(麻辟用磁)	Aether purificatus

醇(酒精)	Alcohol
明礬	Alumen
譚基比林(雙一雙譚基安魯比林)	Amid pyrina
氯化銨	Ammonii chloridum
澱粉	Amylum
白喉抗毒素(白喉血清)	Antitoxinum diphthericum
破傷風抗毒素(破傷風血清)	Antitoxinum tetanicum
鹽酸阿朴嗎啡	Apomorphinae hydrochloridum
杏仁水	Aqua armeniaca
蒸餾水	Aqua destillata
硝酸銀	Argenti nitras
強蛋白銀(蛋白銀)	Argento-proteinum
硫酸阿託品	Atropinae sulphas
次硝酸銻	Bismuthi subnitras
安息香酸鈉咖啡因	Caffeinae sodio-benzoas
氯化鈣	Calcii chloridum

乳酸鈣	Calcii lactas
氯化鈣(煨石灰)	Calx
精製樟腦	Camphora
精製氯仿(麻醉用氣仿)	Chloroformum purificatum
金雞納皮	Cinchona
桂皮	Cinnamomum
鹽酸可卡因	Cocainae hydrochloridum
磷酸可待因	Codeinae phosphas
煤溜油醇	Creosotum
硫酸銅	Cupri sulphas
澱粉酶	Diastasum
洋地黃葉	Digitalis
鹽酸吐根素	Emetinae hydrochloridum
麥角流浸膏	Extractum ergotae liquidum
甘草浸膏	Extractum glycyrrhizae
甘草流浸膏	Extractum glycyrrhizae liquidum

真礬浸膏	<i>Extractum scopoliae</i>
還元鐵	<i>Ferrum reductum</i>
龍胆	<i>Gentiana</i>
甘油	<i>Glycerinum</i>
甘草	<i>Glycyrrhiza</i>
精製棉(脫脂棉)	<i>Gossypium purificatum</i>
炭酸應創木醇	<i>Guaiacolis caroonas</i>
六個一烯四醇	<i>Hxamina</i>
黃氫化汞	<i>Hydrargyri oxidum flavum.</i>
氯化高汞(昇汞)	<i>Hydrargyri perchloridum</i>
氯化低汞(甘汞)	<i>Hydrargyri subchloridum</i>
碘	<i>Iodum</i>
碘仿	<i>Iod formum</i>
吐根	<i>Ipecacuanha</i>
白陶土(瓷土)	<i>Kaolinum</i>
乳糖	<i>Lactosum</i>

樟腦殘劑(樟腦油)	<i>Linimentum camphorae</i>
鹽酸腎上腺素溶液	<i>Liquor Adrenalini hydrochloricæ</i>
錫溶液	<i>Liquor Ammoniac</i>
氯化高鐵溶液	<i>Liquor ferri perchloridi</i>
蟻醛溶液	<i>Liquor formaldehydi</i>
二氯化氫溶液	<i>Liquor hydrogenii dioxidi</i>
醋酸鉀溶液	<i>Liquor potassii acetatis</i>
亞砷酸鉀溶液	<i>Liquor potassii arsenitis</i>
次醋酸鉛溶液	<i>Liquor plumbi subacetatis</i>
碳酸鎂	<i>Magnesium carbonas</i>
硫化鎂(煅鎂)	<i>Magnesium oxidum</i>
硫酸鎂(礬鹽)	<i>Magnesium sulphas</i>
薄荷腦	<i>Menthol</i>
鹽酸嗎啡	<i>Morphinae hydrochloridum</i>
薄荷油	<i>Oleum menthae</i>
魚肝油	<i>Oleum morrhuae</i>

洋橄欖油	Oleum olivas
蓖麻油	Oleum ricini
白檀油	Oleum santali
胡麻油	Oleum sesami
松根油	Oleum terebinthinae
阿片(鴉片)	Opium
胰島	Pancreatinum
液狀石臘	Paraffinum liquidum
黃石脂(石脂)	Paraffinum molle
酸脂酶	Pepsinum
非納宗(安替比林)	Phenazonum
困醇(石炭酸)	Phenol
柳酸困(薩羅)	Phenylis salicylas
醋酸鉛(鉛糖)	Plumbi acetat
重酒石酸鉀	Potassii bitartras
溴化鉀	Potassii bromidum

氯酸鉀	Potassii chloras
碘化鉀	Potassii Iodidum
過錳酸鉀	Potassii p̄e mangans
複方吐根散	Pulvis Ipecacanhae compositus
鹽酸奎寧	Quininae hydrochloridum
硫酸奎寧	Quininae sulphas
大黃	Rheum
山道寧	Santonidum
軟肥皂(鉀肥皂)	Sapo mollis
番瀉葉	Senna
重碳酸鈉(重曹)	Sodii bicarbonas
焦性磷酸鈉(硼砂)	Sodii bonas
溴化鈉	Sodii bromidum
氯化鈉(食鹽)	Sodii chloridum
柳酸鈉	Sodii salicylas
錫製茴香醋	Spiritus ammoniae foeniculatus

精製硫黃	Sulphur lotura
糖漿	Syrupus
柳酸鈉柯柯豆素	Theobrominae sodio salicylas
麝香草腦	Thymol
橙皮酊	Tinctura aurantii amari
頭茄酊	Tinctura belladonnae
複方樟腦酊	Tinctura camphorae composita
複方龍膽酊(苦味酊)	Tinctura gentianae composita
碘酊	Tinctura iodi
番木鱉酊	Tinctura nucis vomica
阿片酊	Tinctura opii
康吐箭毒子酊	Tinctura strophanthi
拔地麻酊(類草酊)	Tinctura valerianae
賦形軟膏(單軟膏)	Unguentum
汞軟膏	Unguentum hydrargyri
含銨氯化汞軟膏(白降汞軟膏)	Unguentum hydrargyri ammonia

Unguentum hydrargyri oxidi flavi
Uva Ursi
Zinci sulphas

黃氧化汞軟膏(黃降汞軟膏)
熊果葉
硫酸鋅

(五) 毒藥表

(本表所載者均應放置鎖閉櫃中與其他藥品隔別貯藏之)

中名	英式拉丁名
稀氫精酸	Acidum hydrocyanicum dilutum
烏頭素	Aconitina
腎上腺素(副腎素)	Adrenalinum
鹽酸二烷嗎啡	Aethylmorphinae hydrochloridum
鹽酸阿朴嗎啡	Apomorphinae hydrochloridum
碘化砒	Arseni iodidum
三氧化砒(亞砒酸)	Arseni trioxidum
阿新凡納明(鹽酸二沉二錳基砒因)	Arsphenamina

阿託品	Atropina
硫酸阿託品	Atropinae sulphas
可卡因	Cocaina
鹽酸可卡因	Cocaina hydrochloridum
磷酸可待因	Codeinae phosphas
秋水仙素	Colcoicina
鹽酸吐根素	Emetinae hydrochloridum
麻黃素	Ephedrina
鹽酸麻黃素	Ephedrinae hydrochloridum
阿片浸膏	Extractum opii
氫溴酸后馬託品	Homatropinae hydrobromidum
紅碘化高汞	Hydrargyri iodidum rubrum
黃氧化高汞(黃降汞)	Hydrargyri oxidum glavum
紅氧化高汞(紅降汞)	Hydrargyri oxidum rubrum
氯化高汞(昂汞)	Hydrargyri perchloridum
柳酸汞	Hydrargyri salicylas

氫溴酸莨菪素

鹽酸嗎啡溶液

亞砒酸鉀溶液

鹽酸士的寧溶液

硝基甘油溶液

鹽酸嗎啡

硫酸嗎啡

新阿斯凡納明(二噻二噻基砒因一

烷亞磺酸鈉)

巴豆油

阿片(鴉片)

鹽酸怕怕非林

燐

柳酸毒扁豆素

硝酸足羅卡品

磷丸

Hyoscyaminae hydrobromidum

Liquor morphinae hydrochloridi

Liquor potassii arsenitis

Liquor strychninae hydrochloridi

Liquor trinitilini

Morphinae hydrochloridum

Morphinae sulphas

Neoarsphenamina

Oleum

Opium

Papaverinae hydrochloridum

Phosphorus

Physostigminae salicylas

Pilocarpinae nitras

Pilulae phosphori

阿片鉛丸	Pilulae plumbi cum opio
氫溴酸司可朴拉明	Scopolaminae hydrobromidum
雙一烷砒酸鈉	Sodii cacodylas
硫酸金雀花素	Sparteïnse sulphas
康吡箭毒子素	Strophanthinum
士的寧	Strychnina
鹽酸士的寧	Strychninae hydrochloridum
硝酸士的寧	Strychninae nitras
甲狀腺素	Thyroxinum
阿片酊	Tincture opii

(六) 劇 藥 表

(本表所載者均屬藥性猛烈之品應與他藥隔別貯藏之)

中 名	英 式 拉 丁 名
醋酸基福基因	Acctenilidum

醋酸基氧二烷噻基因(非那西汀)	Acetphenetidinum
海葱醋	Acetum scillac
鹽酸	Acidum hydrochloricum
硝酸	Acidum nitricum
硫酸	Acidum sulphuricum
三氯醋酸	Acidum trichloroaceticum
烏頭	Aconitum
醚	Aether
精製醚(原醇用醚)	Aether purificatum
氮基安息香酸二烷	Aethylis aminobenzoas
溴二烷	Aethylis bromidum
鏡基炭酸二烷(氧二烷尿素)	Aethylis carbamas
氧二烷	Aethylis chloridum
盧骨素	A'oinum
鏡基比林(雙一烷噻基安替耳林)	Au idopyrina
鹽酸阿米利卡因(虎酸阿里品)	Amy tricaicainae hydrochloridum

亞硝酸五燒

酒石酸銨鉀 (吐酒石)
白喉抗毒素 (白喉血清)
破傷風抗毒素 (破傷風血清)

杏仁水

硝酸銀

硝酸銀棒 (硝酸銀加硝石)
巴比特魯 (雙二燒巴比土酸)

可溶性巴比特魯 (雙二燒巴比土酸
鈉)

顛茄藥

顛茄根

安息香酸

溴仿

苯化氯醛四燒

咖啡因

Amylis nitris

Antimonii et potassii tartras
Antioxinum Diphthericum
Antioxium tetanicum

Aqua armeniaca

Argenti nitras

Argenti nitras induratus
Barbitalum

Barbitalum solubile

Belladonnae folia

Belladonnae radix

Benzaldehydum

Bromofornium

Butyl-chloral hydras

Caffeina

題

藥

英

39

枸橼酸咖啡因	Caffeina citraa
安息香酸鈉咖啡因	Caffeina sodio benzoas
藤黃	Cambogia
一溴樟腦	Cambhora monobromata
大麻	Cannabis
斑蝥	Cantharis
四氯化炭	Carbonen tetrachloridum
溴雙二烷醋酸基尿素	Carbromalum
草酸鈣	Cerii oxalas
水化氯醛	Chloralis hydras
氯亞明	Chloramina
氯仿	Chloroformum
精製氯仿 (麻醉用氯仿)	Chloroformum purificatum
三氧化鉻 (鉻酸)	Chromii trioxidum
秋水仙球莖	Colechicum cornus
秋水仙子	Colechicum semen

斑駁火棉糖	<i>Colloidum cantuariensis</i>
樂西瓜甙	<i>Colocynthis</i>
氯化可塔寧	<i>Cotarninae chloridum</i>
炭酸木溜油	<i>Creosoti carbonas</i>
木溜油	<i>Creosotum</i>
煤溜油毒	<i>Cresol</i>
硫酸銅	<i>Cupri sulphis</i>
雙氯亞明	<i>Dichloramina</i>
洋地黃葉	<i>Digitalis</i>
鹽茄硬膏	<i>Euplastrum bellapomae</i>
斑蝥硬膏	<i>Euplastrum cantharidis</i>
汞硬膏	<i>Euplastrum hydrargyri</i>
鉛硬膏	<i>Euplastrum plumbi</i>
麻黃	<i>Ephedra</i>
麥角	<i>Ergota</i>
鹽酸優卡因	<i>Eucainae hydrochloridum</i>

狸鼠流浸膏	<i>Extractum aspidii liquidum</i>
颠茄流浸膏	<i>Extractum belladonnae</i>
颠茄流浸膏	<i>Extractum belladonnae liquidum</i>
大麻流浸膏	<i>Extractum cannabis</i>
大麻流浸膏	<i>Extractum cannabis liquidum</i>
秋水仙浸膏	<i>Extractum colchici</i>
藥西瓜浸膏	<i>Extractum colocynthis</i>
複方藥西瓜浸膏	<i>Extractum colocynthis compositum</i>
麥角流浸膏	<i>Extractum ergotae liquidum</i>
北美黃連流浸膏	<i>Extractum hydrastis liquidum</i>
莨菪浸膏	<i>Extractum hyoscyami</i>
吐根流浸膏	<i>Extractum ipecacuanhae liquidum</i>
番木鱉浸膏	<i>Extractum nucis vomicae</i>
番木鱉流浸膏	<i>Extractum nucis vomica liquidum</i>
東莨菪浸膏	<i>Extractum scopulae</i>
丙醇甘油 (石炭酸甘油)	<i>Glycerium Phenolis</i>

總劑水藥
 尿酸總劑水藥
 黃碘化低汞
 氯化低汞
 合證氯化低汞（白降汞）
 汞白鹽
 油酸高汞
 氯化乙種北美黃連素
 北美黃連根
 莨菪
 碘仿
 碘
 吐根
 藥喇叭根
 顛茄茶劑
 鹽酸腎上腺素溶液

Guaiacool
 Guaiacolis carbonas
 Hydrargyri iodidum flavum
 Hydrargyri subchloridum
 Hydrargyrum ammoniatum
 Hydrargyrum cum creta
 Hydrargyrum oleatum
 Hydrastinia hydrochloridum
 Hydrastis
 Hyoscyamus
 Iodoformum
 Iodum
 Ipecacuanha
 Jalapa
 Linimentum belladonnae
 Liquor adrenalini hydrochloricus

錫溶液 (錫水)	Liquor ammoniac
濃錫溶液 (濃錫水)	Liquor ammoniac fortis
蟻醛溶液	Liquor formaldehydi
複方碘溶液	Liquor Iodi compositus
腦垂體溶液	Liquor Pituitarii
困痺溶液 (石炭酸水)	Liquor Phenolis
次醋酸鉛溶液	Liquor Plumbi subacetatis
氫氧化鉀溶液 (苛性鉀溶液)	Liquor Potassii hydroxidi
氯化鋅溶液	Liquor zinci chloridi
北美山梗菜	Lobelia
一炷紫	Methylrosanilinum
殊次藍	Methylthioninae chloridum
番木鱈	Nux vomica
苦杏仁油	Oleum armeniacae amarae
揮發芥子油	Oleum sinapis volatile
三疊醋酐	Parakdehydum

非納宗 (安替比林)	Phenazonum
因基巴比特魯 (因基二烷巴比有酸)	Phenobarbitalum
可溶性因基巴比特魯 (因基二烷巴比上酸鈉)	Phenobarbitalum solubile
因醇 (石炭酸)	Phenol
液狀因醇 (液狀石炭酸)	Phenol liquefactum
非諾夫他林 (二因醇並因酸羧)	Phenol phthaleinum
柳酸因 (薩羅)	Phenylis salicyas
腦垂體粉 (蝶鞍腺粉)	Pituitarium
醋酸鉛 (鉛糖)	Plumbi acetas
普達非倫根	Podophyllum
重鉻酸鉀	Potassii bichromas
氯酸鉀	Potassii chloras
氫氧化鉀 (苛性鉀)	Potassii hydroxidum
碘化鉀	Potassii iodidum
鹽酸普魯卡因	Procainae hydrochloridum

複方吐根散	<i>Pulvis ipecacuanhae compositus</i>
火棉	<i>Pyroxylium</i>
藥喇叭脂	<i>Resina Jalayae</i>
普達非倫脂	<i>Resina Podophylli</i>
間位因二醇 (雷瑛萃)	<i>Resorcinol</i>
山道寧	<i>Santoninum</i>
海葱	<i>Scilla</i>
東莨菪葉	<i>Scopolia</i>
氫氧化鈉 (苛性鈉)	<i>Sodii hydroxidum</i>
碘化鈉	<i>Sodii iodidum</i>
亞硝酸鈉	<i>Sodii nitris</i>
曼陀羅葉	<i>Stramonium</i>
康毗箭毒子	<i>Strophanthus</i>
索佛拿	<i>Sulphonmethanum</i>
一烷素佛拿	<i>Sulphonethylmethanum</i>
顯茄橙	<i>Suppositoria belladonnae</i>

複方鉛橙	Suppositoria plumbi composita	鹽
嗎啡橙	Suppositoria morphinae	藥
磷酸可待因糖漿	Syrupus codeinae Phosphatis	藥
磷酸鐵奎寧土的寧糖漿	Syrupus ferri Phosphatis cum quina et strychnina	
仰酸鈉柯柯豆素	Theobrominae et Sodii salicylas	
茶葉素	Theophyllin	
麝香草腦	Thymol	
碘麝香草腦	Thymolis iodidum	
甲狀腺粉	Thyroideum	
烏頭酊	Tinctura aconiti	
颠茄酊	Tinctura belladonnae	
複方樟腦酊	Tinctura camphorae composita	
大麻酊	Tinctura cannabis	
斑蝥酊	Tinctura cantharidis	
複方氣仿嗎啡酊	Tinctura chloroformi et morphinae composita	

藥西瓜酊	<i>Tinctura colocynthidis</i>
洋地黄酊	<i>Tinctura digitalis</i>
北美黃耆酊	<i>Tinctura hydrastis</i>
櫻酊	<i>Tinctura iodi</i>
稀碘酊	<i>Tinctura iodi mitis</i>
秘製北美山梗菜酊	<i>Tinctura lobeliae aetherea</i>
番木鱒酊	<i>Tinctura nucis vomica</i>
海葱酊	<i>Tinctura scillae</i>
東莨菪酊	<i>Tinctura scopoliae</i>
康世箭毒子酊	<i>Tinctura Strophanthi</i>
三硝基因醇(必苦酸)	<i>Trinitrophenol</i>
氯酸鉀錠	<i>Trochisci potassii chloratis</i>
山道寧錠	<i>Trochisci santonini</i>
舊結核菌素	<i>Tuberculinum</i>
鱈肝軟膏	<i>Unguentum belladonnae</i>
五倍子阿片軟膏	<i>Unguentum alla cum opio</i>

含汞氯化高汞軟膏 (鹵降汞軟膏)	unguentum hydrargyri ammoniaci
複方汞軟膏	unguentum hydrargyri compositum
硝酸高汞軟膏	unguentum hydrargyri nitratis
黃氧化高汞軟膏 (黃降汞軟膏)	unguentum hydrargyri oxidi flavi
碘軟膏	unguentum iodi
困氣軟膏	unguentum phenolis
痘苗	vaccinum variolae
傷寒混合疫苗	vaccinum typhosum
吐酒石酒	vinum antimoniale
醋酸鋅	zinci acetas
氯化鋅	zinci chloridum
磺胺基固醇鋅	zinci phenolsulphas
硫酸鋅	zinci sulphas
瓊草酸鋅	zinci valerianas

(七) 極量對照表

藥 品 名	(德國)		(日本)	
	一回極量	一日極量	一回極量	一日極量
Acetanilidum (Antifebrinum) 醋酸基經基固	0.5	1.5	0.3	1.0
Acetphenetidinum (Phenacetinum) 非那西汀	—	—	1.0	3.0
Acidum agaricinum 落葉松菌素	0.1	—	0.1	—
Acidum arsenicosum 亞砷酸	0.005	0.015	0.005	0.015
Acidum carbolicum (Phenol) 石炭酸 (困尊)	—	—	0.1	0.3
Acidum diaethylbarbituricum (Veronal) (巴比特魯)	0.75	1.5	0.5	1.0
Acidum hydrocyanicum dilutum 稀氰酸	—	—	0.1	0.3
Acidum phenylæthylbarbituricum (Luminal) 魯米那	0.4	0.8	—	—
Aethylmorphinum hydrochloric. (Dionin) 鹽酸二乙嗎啡	0.1	0.3	0.03	0.1
Agaricinum 落葉松菌素	0.1	—	0.1	—
Amylenum hydratum 第三戊醇	4.0	8.0	—	—

Amylium nitrosum 亞硝酸五燒	0.2	0.5	0.2	0.5
Antifebrin (Acetanilidum) 醋酸基阿基因	0.5	1.5	0.3	1.0
Antipyrinum (Pyrazolonum Phenyldimethylc.) 安替比林	—	—	1.0	3.0
Antipyrinum coffeno-citric. (Migacnin) 米格來靈	—	—	1.0	3.0
Antipyrinum salicylicum (Salipyrin) 沙利比林	—	—	1.0	3.0
Apomorphin hydrochloricum 鹽酸阿朴嗎啡	0.02	0.06	0.02	—
Aqua amygdala amar 苦杏仁水	2.0	6.0	2.0	6.0
Aqua lauroceraai 月桂櫻水	2.0	6.0	—	—
Aqua pruni macrophyllae (Bakutiwasser) 大葉櫻水	—	—	2.0	6.0
Argentum nitricum 硝酸銀	0.03	0.1	0.03	0.1
Arsacetin (Natrium acetylarsanilicum) 阿爾薩錫吞	0.2	—	—	—
Alropinum sulfuricum 硫酸阿託品	0.001	0.003	0.001	0.003
Bromoformium 溴仿	0.5	1.5	—	—
Bulbus scilliae 海葱	—	—	0.2	1.0
Camphora monobromata 溴化樟腦	—	—	0.3	1.0
Cantharides 斑蝥	0.05	0.15	0.03	0.1

Berium oxalicum 草酸鉍	—	—	0.3	1.0
Chloralum hydratum 水化氯堊	3.0	6.0	2.0	6.0
Chloroformium 氯仿	0.5	1.5	—	—
Cocainum hydrochloricum 鹽酸可卡因	0.05	0.15	0.03	0.15
Codeinum nitricum 硝酸可卡因	0.05	0.15	—	—
Codeinum phosphoricum 磷酸可待因	0.1	0.3	0.1	0.3
Colchicinum 秋水仙素	0.002	0.05	—	—
Coffeinum 咖啡因	—	—	0.5	1.5
Coffeinum natrium-benzoicum 安息香酸鈉咖啡因	—	—	1.0	3.0
Coffeinum natrium-salicylicum 柳酸鈉咖啡因	—	—	1.0	3.0
Cuprum sulfuric. qua emetic. 硫酸銅 (催吐用)	—	—	1.0	—
Diacetylmorphinum hydrochloricum (Heroin) 鹽酸海洛因	0.005	0.015	0.005	0.015
Dihydrooxycodionumhydrochloricum (Eukodal) 優科達	0.03	0.1	—	—
Dionin (Aethylmorphinum hydrochloricum) 鹽酸二烷嗎啡	0.1	0.3	0.03	0.1
Emetinum hydrochloricum 鹽酸吐根素	0.05	0.1	0.05	皮下注射

Eukodal (Dihydrocodeinonum hydrochloricum) 度	0.03	0.1	—	—
科達				
Extractum belladonnae 颠茄浸膏	0.05	0.15	—	—
Extractum cannabis indicae 大麻浸膏	—	—	0.05	0.15
Extractum colobynthidis 藥西瓜浸膏	0.05	0.15	0.05	0.15
Extractum filicis 綿馬浸膏	10.0	10.0	—	10.0
Extractum hyoscyami 莨菪浸膏	0.15	0.5	0.1	0.3
Extractum opii 阿片浸膏	0.075	0.25	0.1	0.3
Extractum scopoliae 東莨菪浸膏	—	—	0.05	0.15
Extractum secalis cornutti 麥角浸膏	—	—	0.3	1.0
Extractum strychni 番木鱉浸膏	0.05	0.1	0.05	0.1
Filmaroneel 綿馬素油	20.0	20.0	—	—
Folia belladonnae 颠茄葉	0.2	0.6	—	—
Folia digitalis 洋地黄葉	0.2	1.0	0.2	1.0
Folia hyoscyami 莨菪葉	0.4	1.2	0.5	1.0
Folia scopoliae 東莨菪葉	—	—	0.15	0.5

Folia stramonii 曼陀羅葉	0.2	0.6	0.2	0.6
Fructus colocynthis 藥西瓜瓠	0.3	1.0	—	—
Glandulae thyroideae siccatae 乾燥甲狀腺	0.5	1.0	0.3	0.6
Guajacal 蘇利木醇	—	—	0.3	0.1
Gutti 藤黃	0.3	1.0	—	—
Herba lobeliae 北美山梗菜	0.1	0.3	0.1	0.3
Heroin hydrochloricum 鹽酸海洛因	0.003	0.015	0.003	0.015
Homatropium hydrobromatum 氫溴酸后馬託品	0.003	0.003	0.001	0.003
Hydrargyrum bichloratum (Sublimat) 氯化高汞	0.02	0.06	0.02	0.06
Hydrargyrum bijedatum (rubrum) 紅碘化汞	0.02	0.06	0.02	0.06
Hydrargyrum chloratum (Calomel) inj 氯化低汞	0.1	—	0.1	皮下注射
Hydrargyrum cyanatum 銻化汞	0.01	0.03	—	—
Hydrargyrum iodatum (flavum) 黃碘化汞	—	—	0.02	0.06
Hydrargyrum oxycyanatum 氰化汞	0.01	0.3	0.01	0.03
Hydrargyrum oxydatum (flavum) 黃氯化高汞	0.02	0.06	—	—
Hydrargyrum oxydatum via hum. par. 濕法製黃降汞	0.02	0.06	—	—

Hydrargyrum salicylicum 柳酸高汞	0.15	—	0.02	0.06
Hydrastininum chloratum 氯化乙種北美黃連素	0.05	0.15	—	—
Hydrastinum hydrochloricum 鹽酸甲種北美黃連素	0.05	0.15	—	—
Jodoformium 碘仿	—	—	0.2	0.6
Kreosotum 木溜油	0.5	1.5	0.5	1.5
Lactophenin (Lactylphenatidin) 乳酸芬納替丁	—	—	0.7	2.0
Liquor kalii arsenicosi (Solut. Fowler) 亞砷酸鉀溶液	0.5	1.5	0.5	1.5
Lobelinum hydrochloricum 鹽酸北美山梗菜素	0.02	0.1	0.02	0.1
Luminal (Acidum phenylaethylbarbituricum) 魯米那	0.4	0.8	—	—
Luminal-Natrium (Natrium phenylaethylbarbitur.) 魯米那	0.4	0.8	—	—
米那納				
Medinal (Natrium disethyloarbituricum) 第第那	0.70	1.5	—	—
Methylsulfonal (Trional) 推屋拿	1.0	2.0	1.0	2.0
Migraenin 米格來靈	—	—	1.0	3.0
Morphinum diacetylicum (Heroin) 海洛因	0.095	0.05	—	—
Morphinum hydrochloricum 鹽酸嗎啡	0.03	0.1	0.03	0.1

Narcophin 拿可芬	0.03	0.1	—	—
Natrium acetylsanillium (Asacetin) 阿沙西汀	0.2	—	—	—
Natrium diethylbarbituricum (Medinal) 寐第那	0.75	1.5	—	—
Natrium nitrosum 亞硝酸鈉	0.3	1.0	0.3	1.0
Natrium phenylacetylbarbituricum (Luminal-natr.) 魯米那鈉	0.4	0.8	—	—
Oleum chenopodii anthelmintici f. 荊芥油	0.5	1.0	0.3	1.0
Oleum crotonis 巴豆油	0.03	0.15	0.05	0.15
Opium concentratum (約含嗎啡50%者) 濃縮阿片	0.03	0.1	—	—
Opium pulve atum 阿片末	0.15	0.5	0.15	0.5
Papaverinum hydrochlorium 鹽酸罌粟素	0.2	0.6	—	—
Paraldehydum 三氯醇醛	5.0	10.0	—	—
Phenacetinum (Acetphenetidin) 非那西汀	—	—	1.0	3.0
Phenolum (Acidum carbolicum) 石炭酸	—	—	0.1	0.3
Phosphorus 黃磷	0.001	0.003	0.001	0.003
Thyestigminum salicylicum (Eserin) 柳毒馬豆素	0.001	0.003	0.001	0.003

Physostigminum sulfuricum 砒酸毒扁豆素	0.001	0.003	0.001	0.003
Pilocarpinum hydrochloricum 鹽酸毛茛菪品	0.3	0.04	0.02	0.04
Plumbum aceticum 醋酸鉛	0.1	0.3	0.1	0.3
Podophyllum (Resina podophylli) 檳榔白脂	0.1	0.3	1.0	0.3
Pulvis ipecacuanhae orfiatus (Pulvod veri) 複方吐根散	1.5	5.0	1.0	3.0
Pyramidon (Dimethylamidoantipyrin) 匹拉米董	—	—	0.3	1.0
Pyrazolonum phenyldimethylicum (Antipyrin) 安替比林	—	—	1.0	3.0
Pyrazolonum phenylimethylicum salicylicum (Salipyrin) 沙利比林	—	—	1.0	3.0
Radix scopolia 東莨菪根	—	—	0.1	0.3
Resina Jalapa 藥喇叭	—	—	0.5	1.5
Resina pharbitidis 牽牛子脂	—	—	0.5	1.5
Santonium 山道寧	0.1	0.3	0.1	0.3
Scopolaminum hydrobromicum 氫溴酸可利拉明	0.001	0.003	0.0005	0.015
Secale cornutum 麥角	—	—	1.0	5.0
Semen strychni 番木鱉	0.1	0.2	0.1	0.2

Solutio arsenicalis Fowleri (Liq. kal. arsenicos)	0.5	1.5	—	—
亞砷酸鉀注射液				
Stibium kalio-tartaricum (Tartarus Stibiatus) 吐酒石	0.1	0.3	0.1	0.3
Strophanthinum 康地高尿酸素	0.001	0.005	—	—
Strychnum nitricum 硝酸士的寧	0.005	0.01	0.005	0.01
Sulfonalum 素佛拿	1.0	2.0	1.0	2.0
Suprarenin (Adrenalin Epinephron etc) 腎上腺素	0.001	—	0.001	—
Tartarus stibiatus (Stibium kalio tartaricum) 吐酒石	0.1	0.3	0.1	0.3
Theobrominum natr salicylicum (Diuretin) 柳酸鈉阿柯	—	—	1.0	3.0
豆素				
Theococou, Theophyllinum 補鳥精及茶葉素	0.5	1.5	0.5	1.5
Tinctra cantharidum 斑蟊酒	0.5	1.5	0.5	1.5
Tinctura colchici 秋水仙酒	2.0	6.0	—	—
Tinctura colocynthis 藥西瓜酒	1.0	3.0	—	—
Tinctura digitalis 洋地黃酒	1.5	5.0	1.5	5.0
Tinctura jodi 碘酒	0.2	0.6	0.2	0.6

Tinctura lopo iae 北美山梗菜酊	1.0	0.3	1.0	3.0
Tinctura opii crocata 番紅花阿片酊	1.5	5.0	—	—
Tinctura opii simplex 阿片酊	1.5	5.0	1.5	5.0
Tinctura scopoliae 東莨菪酊	—	—	1.0	3.0
Tinctura strophanthi 康毗箭毒子酊	0.5	1.5	0.5	1.5
Tinctura strychni 番木鱉酊	1.0	2.0	1.0	2.0
Triolum (Methylsulfonalum) 雅星拿	1.0	2.0	—	—
Tropacocain hydrochloricum 鹽酸託派可卡因	—	—	0.1	0.3
Veratrinum 綠葉蕨素	0.002	0.005	—	—
Veronal (Acidum diethylbarbituricum) 巴比特魯	0.75	1.5	0.5	1.0
Veronal-natrium (Natrium diethylbarbitur) 巴比特魯鈉	0.75	1.5	—	—
Yohimbinum hydrochloricum 鹽酸育亨賓	0.03	0.1	—	—
Vinum opii aromaticum 芳香阿片酒	—	—	1.5	5.0
Zincum sulfuricum qua emeticum 硫酸鋅 (催吐用)	—	—	1.0	—

(八)法定藥名與別名對照表

法	定	藥	名	別	名
醋發基羅基固	Acetamidum			安替丹布林	Antifebrinum acetylamino benzene
醋柳酸	Acidum acetylsalicum			阿司匹林	Spirinum
	Acidum acetylosalicylicum				
醋鞣酸	Acidum acetyltannicum			鞣尼長	Tannigenum, cetannin
	Tannicum acetylicum				
巴比特魯	Barbitalum			巴比通	Barbitonum,
(雙二叔巴比)	Acidum diaethylbarbituricum			(雙羅魯)	Veronalum, Malonum etc.,
士酸)					Hypnogen
鹽酸，氫承酸	Acidum hydrochloricum			鹽酸	Acidum muraticum
固基巴比特魯	Phenobarbitalum			魯米那	Luminalum
(固基二叔巴比)	Acidum phenylasthybarbituricum				Luminal, Gardenal
比士酸					

藥名	化學名	別名	藥名
辛可林	Cinchoninum	阿託方	Atophanum
(內基氯制內 友酸)	Acidum Phenylchinolinicarb- onicum	數寧	Phenoquin, Agotan
鞣酸	Acidum tannicum	副腎素	Tanninum
腎上腺素	Adrenalinum	本佐卡因	Epinephrlaa Suprareninum
鄰基安息香酸	Aethylis aminobenzoas	阿奈西辛	Adrenine, Renaglrudin
二氮	Aethylum aminobenzoicum	伏與寧	Benzocain
鹽酸二氮嗎啡	Aethylmorphinae hydrochloridum	數那平	Bnestlic inum, A-resthone
解酸蛋白	Aethylmorphinum hydroch- loricum	匹那米董	Proninon
縮基比林	Albumini tannas		Tannaloinum
雙一烷亞基安	Albuminum tannicum		Pyramidonum, Aminopyrina
	Amidopyrina		
	Dimethylamidoantipyrinum		

替比林			
磺酸基魚石油	Ammonii Ichthyosulphonas	魚石脂	Ichthyol
酸氫	Ammonium ulfoich hyolicum		Ichthyolum
八角茴香	Anisum stellatum		Illicium
酒石酸鉍鉀	Antimonii et Potassii tartaras (Stibio-kalium tartaricum)	八角茴香 吐酒石	Antimonium tartaratum (Tartarus emeticus)
強蛋白銀	Argento-proteinum Forte	普他葛	Protargol
(蛋白銀)	Argentum profenicum		Protargolum, Argein, Protargen
阿斯凡納明	Arsenammina	酒爾佛散	Salvarsanum
(鹽酸二沉二 銨基砒因)	(Dioxydiamidoarsenodenzol um Hydrochloricum)		Arsenobenzol, Diarsenol, Arsenobillon
綿馬(貫衆)	Aspidium (Rhizoma Filicis)	綿馬貫衆	Filix mas
可溶性巴比特	Barbitonumsolubile	(佛羅拿鈉)	Veronal natrium, Veronal-

	Sodium Medial
雙二烷巴比土 (Natrium diaethylbarbituricum)	
酸鈉	
次沒食子酸鐵	Bisinuthi subgallas
	Bismutum subgalicum
溴雙二烷醋酸	Carbromalum
基尿素	
二烷炭酸奎寧	Quininae Aethylcarbonas-
	Chininum aethylcarbonicum
氯化可塔寧	Cotarninae chloridum
	Cotarninum chloratum.
斑蟊硬膏	Emplastrum cantharidis
	Emplastrum cantharidum
葡萄糖 (澱粉糖)	Glucosum (Sacharum amyliccum)
硼酸甘油	Glycerinum acidj borici
	Glyceritum boroglycerini
	Dermatolum
	Adalinum, Planadalin,
	Uradal
	Euquinia
	Euchininum
	Styptizinum
	Emplastrum calefaciens
	Dextrosium

代馬安耳

阿達林

優奎寧

司替浦替斤

發熱硬膏

右旋糖

甘油製藥酸

碳酸癒創木醇 六個--烯四醇	Guaiajacolum carbonicum Hexamina	甘油	Duotalum
伊惟本鈉	Hexamethylenetetraminum	優洛託品	Urotropinum, Methenominata, Aminoform
氯化低汞 (甘 汞)	Hexobarbitone soiubile	卡羅美	Evipan natrium
重酒石酸鉀	Hydrargyri subchloridum		Calomelas
癒創木醇味醇 鉀	Hydrargyrum chloratum	精製酒石	Tartars depuratus
會硫鉀	Potassii bitartaras		Thiocolum
靈溶液	Kalium bitartaricum		Sulfer sulfuris
靈溶液	Kalium sulfoguaiajacolum		Aqnor ammonias
靈溶液	Potassii Sulphurata		
靈溶液	Kalium sulfuratum		
靈溶液	Liquor ammoniae		
靈溶液	Liquor ammoniae caustici		
靈溶液	Liquor ammoniae for is		

Liquor ammoniac caustici fortior	濃鹽水	Aquor ammoniac fortior
Liquor ammonii acetatis	醋酸亞液	閣得兒氏精
Liquor ammonii aceticus	醋酸液	Spiritus Mindereri
Liquor formaldehydi	福爾馬林液	Formalinum
Formaldehyd solutus	福爾馬林液	Formalinum
Liquor Iodii compositus	複方碘液	魯葛爾氏液
Liquor Jodi compositus	複方碘液	Solutio Lugoli
Liquor Potassii arsenitis	亞砷酸鉀溶液	佛來兒氏膏
Liquor Kalii arsenicosi	亞砷酸鉀溶液	Liquor Fowleri
Neocinchophenum	新辛可芬	Neoatophanum
Methylum Phenylethimolium rdonicum	因基氣朋因安 酸--烷	新阿託方
Sulphonethylmethanum	一烷索佛拿	Trional
Methylsulfonalum	一烷索佛拿	Trionalum
Phenobarbitalum Solubile	可溶性因基巴	Luminal-sodium

比非魯			
困基二烷巴比	Natrium Phenylæthylbarbit-		Luminal-natrium
士酸鈉	uricum		
新阿斯凡納明	Neosphenamin		
二氧二硫基砷	Natrium dioxyliantarsen-	新酒爾佛散	Neosalvarsanum,
困一烷亞砷	obonzoimonomethanulfini-		Novæserbenzol
酸鈉	cum		
大風子油	Oleum Hydrocarpæ	大風子油	Oleum chaulmoogae, Ol,
			gynocarpiae
肉豆蔻油	Oleum myr sticæ	肉豆蔻油	Oleum nucistac
柯柯豆油	Oleum theobromatis, oleum	柯柯豆脂	Cutyrium cacao
	cacao		
阿片(鴉片)	Opiurn	米可紐	Meconium
液狀石蠟	Paraffinum liquidum	液狀石蠟	Petrolatum liquidum
黃石脂(石脂)	Paraffinum moile	軟石蠟	Petrolatum
	(Vas linum flavum)		

白石脂	Paraffinum molle album (Vaselinum album)	白軟石蠟	Petrolatum Album
柳酸因	Phenylis Salicylas Phenylum salicylicum	薩羅	Salol Salolum
炭酸鐵丸	Pilulae ferri carbonis Pilulae ferri carb nici	佛勞氏丸	Filiulae Blaudi
氧化鉛	Plumbi monoxidum, plumbum oxydatum	氯化鉛	Lithargyrum
酒石酸鉀鈉	Potassli et sodii tartas (Tartarus natronatus)	塞尼謝氏鹽	Sal Seignettii
鹽酸普魯卡因	Procainae hydrochloridum Procainum hydrochloricum	奴佛卡因	Novocainum, Kerocain, lanocain
複方吐根散	Pulvis Ipecacuanhae compositus	阿片吐根散	Pulvis Ipecacuanhae et opsi
因那位三礫	Pyrogallol, Pyrogallolum	斗佛兒氏散	Pulvis Doveri

糖精	Progallolum	焦性沒食子酸	Acidum Pyrogallicum
	Saccharin	Glusidum,	
		Benzosulfimid	
氯溴酸司可林	Scopolamine	氯溴酸莨菪	Hyoscinne
茛明	hybromicum	辛	Hydrobromatum
	Scopolaminum	Hyoscinnin	
	hydrodromicum	hydrobromatum	
醃醃	Spiritus aetheris.	霍夫曼氏液	Liquor Hoffmanni
	Spiritus aethereus		
亞硝酸二烷醃	Spiritus aethylis nitricus	甘硝石醃	Spiritus nitri dulcis
	Spiritus aetheryis nitrosi		
氨苯磺醃胺	Sulfanilamide	Prontosil,	
磺醃胺吡定	Sulfapyridine	Dagenan, M & B693	
沈降硫黃	Sulphur Praecipitatum	Lac sulfuris	
	Sulfur praecipitatum		

<p>磷酸鐵粉 的藥糖漿</p>	<p>Syrupus ferri phosphatis cum quina et strychnina Syrupus ferri phosphoricum chinino et stryconino, solum purificatum</p>	<p>拜耳氏藥糖漿 Syrupus Eastoni</p>
<p>精製滑石</p>	<p>Calcium depuratum</p>	<p>精製滑石 Creta gallica</p>
<p>佛羅納利柯氏 藥</p>	<p>Theobrominae sodio-salicylas Theobromino-Natrium salicylicum</p>	<p>利尿藥 Diureticum</p>
<p>複方蘇丹藥 酒</p>	<p>Tinctura chloroformi et morphinae composita Tinctura chloroformite Morphini composita</p>	<p>克羅酒 Chlorodyna</p>
<p>複方樟腦酒</p>	<p>Tinctura camphorae</p>	<p>樟腦阿片酒 Tinctura opii camphorata</p>

composita	安息香阿片 酊	Tinctura opii benzoica
Tinctura opii	勞丹	Laudanum
脫呂帕弗拉文		Acridilin, Flavine,
藥特靈		Euflavine
		Carbarsonne, Chinicorin
		Entero Vioform
氯化辛	鮮華	Flores Zinci
Zinci oxidum		
Zincum exydatum		

急性中毒及其處置

A. 急性中毒急救之概要

凡遇急性中毒症，須先檢明毒物存在之部位（創傷，胃腸，肺，血液）而設法排除其毒物於體外。茲述各部位中毒排除毒物之法於下。

a. 排除創傷內之毒物。

緊紮創傷上部，並吸吸之，洗滌（用水或消毒水）之，燒灼之。

b. 排除胃內之毒物。

施胃洗滌法洗出之，如其毒物為強酸類或強鹼類或為昇汞等，有腐蝕性者局部已被腐蝕，致胃管（胃消息子）難以通過食道，則宜改用吐劑，使其吐出，如牙關緊急，或病人不肯開口，則用細胃管自鼻孔插入胃內，行胃洗滌。然胃部被腐蝕劇甚之時，嚴禁洗胃，此又不可不知。

胃洗滌劑 第 140, 141, 142 方。

吐 劑 第 58, 60, 62 方。

一時不得洗胃器械藥劑，則可以指刺戟腭（口蓋）使起嘔吐，亦為一法。

欲緩和或防止胃內毒物之吸收或腐蝕，可投粘滑劑，吸着劑如下方。

處方

亞拉伯樹膠漿 Mucilag. Gumm. arab. 20.0

橙皮糖漿 Sirup. aurant. cort. 2.00

餾水 Aq. destill. 加至 200.0

右混和一日數回，一回一食匙內服。

處方

骨炭末 Carbo. oss. pulverat. 50.0

右一日數回，一回一兒匙至一食匙，和水服。

此外有領單對症的解毒劑者。如酸類中毒，則服以鹼類藥物或食物。鹼類中毒，則服以酸類藥物或食物。使其互相中和，失其毒作用，斯為要點。

c. 排除腸內之毒物。

投下劑以瀉之，行腸洗滌以清洗之，及以藥物注腸內，吸收毒物。

下劑 第33, 76, 77 方。

腸洗滌劑 第 142, 143 方。

注腸劑 骨炭末 10.0 和水 100.0。

d. 排除肺內之毒物。

使呼吸新鮮空氣。

e. 排除血液中之毒物。

行瀉血法，取去血液 500—600 c. c. 前用生理食鹽水或林該氏液 (Liquor Ringeri 第 100 方) 500—1000 c. c. 注入皮下或靜脈內。

稀釋毒素並促進其排洩，如大量飲水，注射生理鹽水及葡萄糖液等。

毒物排除法施行外，對於中毒所發生之各症狀，亦宜分別治療。或投強心劑，利尿劑。或施氧氣(酸素)吸入或人工呼吸，或氣管切開等是也。

B. 急性中毒症候急救及治療

1. 酒類急性中毒 Alkohol Acute Vergiftung.

【症候】嘔吐，意識消失，知覺純麻，瞳孔縮小，昏睡，粘稠冷汗，脈細且徐，喘鳴，譫妄，呼氣酒臭。

【急救及治療】冷水灌注，頭部冷罨包或置冰囊，四肢溫包，飲以濃茶，或咖啡，樟腦油皮下注射。

2. 烟草素急性中毒 Nikotin Acute Vergiftung

【症候】惡心嘔吐，流涎，吃逆，頭痛，顏面蒼白，下痢，流產，冷汗脈搏細徐，心悸亢進，瞳孔散大，震顫，痙攣。

【急救及治療】用20%鞣酸 Acid. tannic. 水洗胃。服碘劑，興奮劑。施亞硝酸五烷吸入(第181方)。人工呼吸，冷水灌注頭部。

處方

碘 Jod. 0.05—0.08

碘化鉀 Kal. jodat. 0.1—0.15

餾水 Aq. destill. 250.0

右一回一酒杯內服。

3. 咖啡英茶中毒 Kaffeinvergiftung.

咖啡豆內含 1—1.5%，茶內含 4% 咖啡英。本品一回極量 0.5，一日 1.5。過服之則發中毒。

【症候】不安，惡心，嘔吐，眩暈，苦悶，不眠，心悸亢進，發汗，脈數，震顫，譫妄，虛脫。

【急救及治療】服以吐劑，溴素劑(第413, 414方)，鹽酸嗎啡(第163方)，水化氯醛(第 方)，以及拖行人工呼吸。

4. 肉類中毒 Fleischvergiftung.

一切肉類獸肉魚肉，臘腸等中毒均屬之。

【症候】嘔吐，下痢，胃痛，頭痛，發熱，瞳孔散大，臉下垂，眩暈，譫妄，痙攣，咽麻痺而嚥下困難，心臟麻痺。亦有發副傷寒狀之症候。

【急救及治療】吐劑胃洗滌，下痢，瀉血，林該氏液注入，興奮劑。

5. 貝殼類中毒 Muschelvergiftung.

蛤乳蠣，蝦，蟹等之中毒均屬之。

【症候】嘔吐，下痢，痙攣，尋麻疹，紅斑，頭痛，眩暈，苦悶，膀胱肌痛。

【急救及治療】用吐劑或洗胃以排除其內容。繼之以下劑及興奮劑。

6. 菌類中毒 Pilzvergiftung.

因誤食毒菌 Gifige Pilze. 而發。

【症候】發嘔吐，腹痛，下痢，(往往為血性下痢)口渴，眩暈，頭痛，流涎，發汗，胸內苦悶，遲脈，尿閉，視力障礙，瞳孔散大，血色素尿，黃疸，昏睡搖擗，虛脫，麻痺。

【急救及治療】以0.5%鞣酸水洗胃。投以吐劑，下劑，興奮劑。飲以牛乳，卵白水。此外行阿托品注射，林該氏液注入。氧氣吸入。

7. 磷急性中毒 Phosphor Acute Vergiftung.

此中毒見於自殘者服洋火頭或毒鼠粉。因誤服而起者亦有之。

【症候】初發噯氣，嘔吐，胃痛，兼發下痢。吐物有蒜臭，置暗發磷光。第二三日發肝腫大，黃疸。至第

五日左右，症候加重，腹痛嘔吐之外，更現不安，苦悶，衰脫狀態，脈細而弱及不整，時或發冷血，皮下溢血，子宮出血，血便，終至昏睡，心麻痺而死。

磷中毒之重症者，症候劇烈，不數時間死亡。一般預後，以能經九日以上者方為佳良，得延生命。

【急救及治療】 以0.1%過錳酸鉀液洗胃，服以硫酸鎂液(0.5—1%)一回一匙至一食匙，或服以松根油 Ol. Terebintin. (松根油 0.5 卵白二個，糖漿，30.0 淨水 180.0 以上數者混和，初每三十分間，次每一時，後每二時間一匙)。此外則投以鹽類下劑眼製鹽，硫酸鎂，吸着劑(骨炭末)，興奮劑。

能使磷溶解而易致吸收之藥物及飲食物，如蓖麻子油 Ol. Ricin. 脂肪油牛乳，酒釀飲料等均禁忌服用。

8. 嗎啡及阿片急性中毒 Morphinum und Opium acute Vergiftung.

此中毒起於藥劑之誤用及自殘者。

【症候】 初則頭痛，嘔吐，倦意，弱視，癢感，皮膚初潮紅後蒼白，發汗。繼之起昏睡，及鼾聲，呼吸淺表且不規則，脈搏遲軟，肌肉弛緩，瞳孔縮小，尿閉。最後發宣斯妥克 Chyene Stokes 氏式呼吸，肺水腫，約經 6—8 時間而死。

【急救及治療】 一再以0.1%過錳酸鉀液洗胃。施硫酸阿托品，咖啡英，硝酸番木鱈素，樂百齡Labelin. 樟腦油等注射，瀉血及林該氏液注入，人工呼吸(一二日間)，氧氣吸入，冷水灌注。

嗎啡吸收後，仍排泄於胃內，故洗胃宜反覆行之。因病人意識消失，洗胃之時，須注意防止液體之誤嚥。

9. 砒(素)石急性中毒 Arsenik acute Vergiftung

此中毒之發生爲自殺，他殺，及誤用。

【症候】 紊亂狀之胃腸卞答耳，胃部灼痛及壓痛，口渴，結合膜炎，支氣管炎，腓腸痙攣，頭痛，眩暈，失神，運動麻痺，青藍現象 Cyanose, 脈搏細小，四肢厥冷，呼吸頻數，尿閉，昏睡，譫妄，虛脫。重者一日內死亡。有經 6—8 日死亡者。

【急救及治療】 速投吐劑(硫酸銅 0.2—0.5, 或硫酸鋅 0.5—1.0), 及行胃洗洗, 內服解毒藥劑。

處方

煨製鎂	Magnesia usta	70.0
溫水		500.0

右每五分時，服一食匙。用時振盪使浮游。

處方

砒石解毒劑 Antidotum Arsenici. 由二液混和而成。即

甲液	過硫酸鐵液	Lfg. Ferr. Sulfuric.	
		oxyda.	100.0
	水	Aq.	250.0
乙液	煨製鎂	Magn. ust	15.0
	水	Aq.	250.0

緻密研和。

甲乙二液臨用混和。每 10—20 分時，服一食匙。

此外予以發汗劑，利尿劑，及注射樟腦油，或狄茄令等強心劑。

10. 水銀中毒 Quecksilbervergiftung.

水銀急性中毒，大都起於誤用水銀鹽類如昇汞，諾服數羅耳等藥。服此圖自殺者，亦間有所見(輕粉)。

【症候】因內服而中毒者，消化管被腐蝕而發劇痛，及起赤痢狀之下痢與嘔吐，吐物始白，見光線而漸黑變。口腔發潰瘍性口內炎，有惡臭及流涎。水銀一部由腎排泄，發發腎炎，蛋白尿，血尿及尿閉，死前見痙攣，發揚狀態。

【急救及治療】服以多量牛乳，卵白水。行洗胃。藥劑用蓖麻子油，阿片劑，炭末，興奮劑等。

11. 石炭酸中毒 Carbolvergiftung.

原因為藥用錯誤或自殺。而木焦油，拉沙耳等中毒均屬之。

【症候】口腔咽食道，胃均被腐蝕，而發劇痛，嘔吐，頭痛，眩暈，斯性呼吸，意識障礙，興奮狀態，發汗，脈初徐後數，陷於昏睡。尿色暗綠或黑。

【急救及治療】胃洗滌，飲以卵白水，肥皂水，及煨製鐵水(15:100)。石炭酸在大腸極易吸收，尙宜投下劑如硫酸鎂，蓖麻子油，尤以硫酸鎂為宜。此外為對症的，可投以興奮劑，粘滑劑。

12. 強酸類中毒 Saeurevergiftung.

指鹽酸 Acid. chloric. 硝酸 Acid. nitric. 硫酸 Acid. sulfuric. 等中毒而言。

【症候】凡強酸中毒，因消化器被腐蝕，發劇痛，嘔吐穿孔性腹膜炎及腎炎。症之重者，聲門浮腫，肺水腫，及陷於虛脫而死。

以上所述，為諸強酸中毒共有之症候。至其相異之處，可於口角及吐物檢得之。如鹽酸中毒，口角無腐蝕

痕，吐物褐綠色，咽被白膜。硝酸中毒，口角呈黃色，舌亦然，吐物亦黃色。硫酸中毒，口角有褐色斑，吐物黑色。

【急救及治療】 飲以牛乳，卵白水，肥皂水，石炭水，煨製藥水等之鹼劑，及粘滑劑。注射樟腦油。至洗胃與服吐劑等均屬禁忌。

13. 鹼類腐蝕劑中毒 Vergiftung d. alkalische Aetzmittel.

苛性鉀 *Kal. caustic.* 苛性鈉 *Natr caustic* 鹽 *Ammoniak* 等中毒屬之。

【症候】 口角，口腔粘膜，舌，軟腭等均被腐蝕，發炎症。消化管亦為所犯，起劇痛，血性嘔吐，血性下痢。重者眩暈，數脈，痙攣，陷於虛脫而死。

吸入煙氣所發之中毒症候，都在氣道。即聲門浮腫，支氣管炎，支氣管肺炎，肺水腫。其炎症為炎症，足以起咳嗽，呼吸困難。

【急救及治療】 飲以多量清水，牛乳，及酸性液如醋，枸櫞汁，2% 酒石酸水。對疼痛則行水化氯鹽 *Chloral hydrat* 注腸。聲門浮腫時則施氣管切開。

14. 催眠劑中毒 Vergiftung d. Hypnotica.

催眠劑之種類頗多，誤服或為自殺服之，致中毒者，為吾人所屢招遇。茲舉數種催眠劑之中毒症候及救治法於下。餘可推類及之矣。

阿特靈 *Adalin* 中毒

【症候】 嗜眠，反射減退，昏睡，知覺消失。

【急救及治療】 胃洗滌，皮膚刺戟，樟腦油注射，林該耳液注入。

佛羅拿 Veronal 及佛羅拿鈉 Veronalnatrium 中毒。

【症候】 惡心，嘔吐，頭痛，眩暈，酪酊狀態。甚至意識消失，呼吸淺表，脈搏細小，瞳孔縮小，青紫現象 Cyanose，四肢厥冷，昏睡。

【急救及治療】 胃洗滌，冷水灌注。注射樟腦劑，番木鱈素劑。內服興奮劑。下劑，利尿劑。人工呼吸。

索佛拿 Sulfonal 及脫那耳 Trional 中毒。

【症候】 嗜眠，無反應，搖動。

【急救及治療】 胃洗滌，服興奮劑，下劑，利尿劑，施行人工呼吸。

水化氯醛 Chloral. hydrat 中毒

【症候】 意識不清，昏睡，弱性呼吸，瞳孔縮小，知覺消失，角膜反射消失，虛脫狀態，終至血沉沉着，心臟麻痺而死。時亦見興奮，疼痛。

【急救及治療】 以 1—3% 過氧化氫水洗胃。內服鹽類下劑。注射硫酸阿托品，番木鱈素及咖啡英劑。施行嗅入及人工呼吸。

15. 氯仿中毒 Chloroformvergiftung.

【症候】 吸入中毒發意識消失，知覺及反射消失，脈搏遲緩，瞳孔散大，終至呼吸及心臟麻痺。內服中毒，發意識消失等症狀外，更發胃痛及急性胃炎。

【急救及治療】 新鮮空氣吸入，人工呼吸，驅神經通電。注射樟腦油，番木鱈素，咖啡英劑。嗅入亞硝酸五烷。心臟摩擦皮膚刺戟。係於內服中毒者加胃洗滌。

16. 可開因中毒 Cocainvergiftung.

【症候】 精神不清及發揚，狀似酒精中毒，呼吸脈

搏頻數，起窒息感而苦悶。口內乾燥，身出冷汗，心悸亢進，瞳孔散大痙攣，言語困難，時發譫妄，昏睡虛脫。

【急救及治療】用 1—2% 鞣酸水或 0.1—0.5% 過錳酸鉀水洗胃。吸入亞硝酸五烷。注射樟腦劑，硫酸阿托品，嗎啡。低下頭部，冷水灌注面部，人工呼吸。

17. 阿托品中毒 Atropinvergiftung.

莨菪素 Scopolamin 顛茄 Belladonna 中毒均屬之。

【症候】都為副交感神經麻痺症狀。煩渴，口腔咽等乾燥，嚥下困難，惡心，嘔吐，皮膚潮紅(猩紅色)瞳孔散大，眼調節障礙，脈搏呼吸，頻數，眩暈，譫妄，昏睡。

【急救及治療】胃洗滌(鞣酸水)，吐劑。飲以多量茶或咖啡注射樟腦劑，及注射與阿托品拮抗藥之嗎啡(50.01—0.02)。片羅卡品(0.01—0.02)。兼投以蓖麻子油，硫酸鎂等下劑。

18. 番木鱈素中毒 Strychninvergiftung.

【症候】嚼肌之牽引及強直感，四肢緊張及強直。由接觸騷聲之刺激，發強直性痙攣及搖擻，牙關緊急，角方反張。皮膚及腱反射亢進。脈搏細小，呼吸困難，發青藍現象 Cyanose。精神不安在意識明瞭時，極感痛苦。此發作持續約半分至一分時，休止數分至半時間，又復發作，如斯反覆，終至窒息而死。

【急救及治療】用 1—2% 鞣酸水，或 0.1—0.5 過錳酸鉀水洗胃。內服盧戈耳氏液(碘 0.1, 碘化鉀 0.5, 水 200.0 每五分時服一食匙)及吐劑。對痙攣皮下注射嗎啡，行氯仿吸入。水化氫醌液注腸。

19. 麥角中毒 Mutterkornvergiftung.

【症狀】 有則惡心，嘔吐，腹痛，下痢。縮其肢體，頭痛，遲脈，肌萎縮，知覺鈍麻。終至昏睡，譫妄，虛弱，呼吸障礙而死。在妊婦則流產。

【急救及治療】 洗胃，吐劑，下劑，興奮劑，**碳酸**劑，阿片劑。

20. 鉛中毒 Bleivergiftung.

鉛化合物如醋酸鉛 Plumb. acetic. 氯化鉛 Plumb. oxydat. 炭致鉛 Pl. carbonic. 等中毒屬之。以內服醋酸鉛中毒為多見，白粉屢含鉛質。

【症候】 口腔乾燥，咽及胃部灼痛，嘔吐，流涎。大便初黑色至帶血液，終發便秘。尿含蛋白。脈徐而硬。神經症狀為譫妄，痙攣，昏睡及虛脫。

【急救及治療】 用 0.5—1% 硫酸鎂或硫酸鈉液洗胃。或用吐劑阿片嗎啡注射。排除胃內容後，服以硫酸鎂或硫酸鈉 5% 溶液一回一食匙，以防腐蝕。並服以牛乳呷血水等對腹痛用阿片劑。

21. 番毛地黃中毒 Digitalisvergiftung.

【症候】 惡心，嘔吐，流涎，下痢，不整脈，瞳孔散大，呼吸困難，痙攣，昏睡，虛脫。終至心臟停止於收縮期而死。

【急救及治療】 胃洗滌，興奮劑，下劑。阿托品為本中毒拮抗劑，故可以之注射或內服。

22. 碘中毒 Jodvergiftung. (碘劑)

【症候】 結合膜，鼻咽粘膜發卡答耳，胃痛，嘔吐，痙攣，頭痛，蛋白尿，血尿，皮疹，呼吸困難，脈持細數，青藍現象 Cyanose 及虛脫。

【急救及治療】服以澱粉粥，牛乳，卵白水。以2—8%重碳酸鈉洗胃。此外有投以硫酸鐵，乳酸鈣諸劑者。

23. 碘仿中毒 Jodoformvergiftung.

【症候】頭痛，眩暈，不眠，嘔吐，下痢，皮膚瘙癢，黃疸，精神異常（沉鬱，發揚，強迫觀念，拒食等）脈細而數，痙攣，吃逆，昏睡。

碘仿外用，間亦發異常現象。如局部浮腫，潮紅，丘疹，水疱，皮膚炎，痒感，發熱。

【急救及治療】洗胃，吐劑，下劑，利尿劑及其他對症療法。

24. 溴氣及氯氣中毒 Brom und Chlorvergiftung.

【症候】吸入中毒，氣道粘膜，被其刺戟起炎症，發聲門痙，咳嗽，血痰，呼吸困難，胸痛，肺炎。鼻眼粘膜亦受其害，發噴嚏，流淚，重症者發眩暈，昏睡。內服中毒之時，口腔粘膜呈黃色及腫脹，吐出帶黃褐色塊並發溴氣。

溴化鹽 Bromsalze 如溴化鉀 Kal. bromat 中毒，大都屬慢性，發倦怠，記憶力減退，反射及運動機能減弱，陰萎，嗜眠，有見皮疹，（溴瘡瘡）。

【急救及治療】吸入中毒時，須移之於新鮮空氣中，并令吸入水蒸氣或餾氣。內服中毒時，服以澱粉糊，牛乳，卵白水，鹼劑。內服溴化鹽中毒時，須即時停止投藥，與以多量食鹽，促溴 Br. 之排泄，溫浴與發汗法亦可應用。

25. 柳酸中毒 Salicylsäurevergiftung.

【症狀】 惡心，嘔吐，眩暈，倦怠重聽，耳鳴，發疹，發汗，視力障礙，腎炎，蛋白尿，出血，脈搏徐緩，血壓沉降，譫妄，虛脫。

【急救及治療】 中止投藥，服以鹼劑促柳酸之排泄，並減尿之酸性刺激。

26. 奎寧中毒 Chininvergiftung.

【症候】 頭痛，眩暈，耳鳴，重聽，嘔吐，精神不清，發疹，皮下出血，蛋白尿。症之重者，譫妄，失神，痙攣，延髓麻痺而死。

【急救及治療】 行胃洗滌(1—2%鞣酸水)。內服鞣酸及興奮劑。對於興奮狀態痙攣投與水化氫醯。

27. 安替必林中毒 Antipyrinvergiftung.

密古雷寧 Migraenin 霹藍密藤 Pyramidon 中毒亦屬之。

【症候】 發疹(紅斑狀)，麻疹狀，猩紅熱疹狀，(蕁麻疹狀)多在口邊，結合膜炎，支氣管炎，顏面浮腫，間有至虛脫者。

【急救及治療】 強心劑，興奮劑。

28. 蠅蒿素(山道年)中毒 Santoninvergiftung

【症候】 嘔吐，下痢，黃視症，紫視症，眼花閃發，尿呈黃色，眩暈，步行蹣跚，瞳孔散大，肌搖擻，搐攣，意識消失，呼吸困難，假死。蠅蒿素尿加鹼類汁顯猩紅色。

【急救及治療】 胃洗滌，吐劑，下劑。對搖擻痙攣用水化氫醯。虛脫狀態用興奮劑。油類下劑及牛乳禁忌。

29. 美荊芥油中毒 Vergiftung d. Öl. Chen-

opodii.

【症候】嘔吐，頭痛，眩暈，心悸亢進，四肢痠感，黃疸，瞳孔散大，昏睡，重聽，呼吸麻痺。病雖治癒，而重聽每久時殘存。

【急救及治療】投以下劑（蓖麻子油硫酸鈉），服以濃咖啡茶，注射樟腦油，咖啡英劑。為預防中毒計，使用本劑後，即繼服蓖麻子油下劑。忌飲酒類。

30. 綿馬中毒 Farnkrautvergiftung.

【症候】急性胃腸卞答兒，發熱，頭痛，眩暈，心悸亢進，痙攣，譫妄，麻痺，青藍現象 Cyaunse, 呼吸困難，心臟衰弱，黃視，失明，言語障礙，黃疸，腎炎。

【急救及治療】洗胃，飲以卵白水，投以阿片劑，興奮劑。

31. 氯酸鉀(鹽剝)中毒 Vergiftung d. Kal. Chloricum.

【症候】惡心，嘔吐，胃痛，下痢，尿量減少而色暗。呼吸困難，青藍現象 Cyanose 昏睡，譫妄，虛脫。

【急救及治療】以 0.5% 重碳酸鈉水洗胃…投吐劑，利尿劑(醋酸鉀液)。行瀉血法及林該氏液注入。此外予以阿片劑興奮劑強心劑。

酸類及酸類飲料宜禁而勿用。

32. 硝酸銀中毒 Vergiftung d. Argent nitricum.

【症候】口腔咽粘膜均被腐蝕，始呈白色繼黑色。並起胃痛嘔吐，下痢，終發譫妄痙攣。

【急救及治療】 速飲以2%食鹽水 500.00—1000.0及每十分時一回一食匙之含食鹽卵白水（卵白一個，食鹽 5.0 水 100.0 此外服以牛乳，粘滑汁，下劑（蓖麻子油）。

33. 草(蟻)酸中毒 Oxalsäurevergiftung.

【症候】 口腔咽粘膜被腐蝕，嘔吐，胃痛，知覺異常，蟻走感，指麻痺感，瞳孔散大，下痢，蛋白尿或尿閉，牙關緊閉，呼吸困難，心臟衰弱，虛脫。

【急救及治療】 飲以卵白水，石灰水，白堊末，並煨製鈣水，注入林該氏液為其他對症療法。忌吐劑及洗胃。

34. 銅中毒 Kupfergiftung.

此指硫酸銅，綠青，銅礬等之中毒。

【症候】 發激烈嘔吐，吐物呈青綠色，胃痛，腹痛，血性下痢裏急後重，黃疸，顏面，眼瞼浮腫，頭痛，眩暈，瞳孔散大，感覺異常，脈細不整，呼吸困難，痙攣，虛脫。此外蛋白尿或血尿。

【急救及治療】 服以牛乳，卵白水，獸炭，煨製澆水，行胃洗滌(0.1%黃色血滴鹽 Ferrocyankalium 液。此外投下劑阿片劑，鐵劑。

處方

煨製鎂 Magnes. ust.	4.0
卵白水	20.0
水	80.0

右每五分時服二食匙

處方

鐵粉 Ferr. pulverat.	14.0
--------------------	------

硫黃華 Sulfur. sublimat. (Flor. sulfuris) 8.0
糖漿 Sirup. simpl. 60.0

右每五分時服一食匙。

本中毒症長用脂肪，油類(蓖麻子油)及酸類(醋等)

35. 銻及鉍化合物中毒 Vergiftung d.

Bismut- und Baryumverbindang.

此者於裏克斯光線檢查消化管時，用大量內服，發生中毒者有之。

【症候】銻化合物中毒時，發大腸卡答兒，裏急後重，口內炎，腎炎諸症狀。鉍化合物中毒，起惡心，嘔吐，下痢，眩暈，心悸亢進，痙攣，及腎炎諸症狀。

【急救及治療】鉍中毒時，用利尿劑及燬製錳。如中毒時，投以下劑(硫酸鈉)及興奮劑。

36. 吐酒石中毒 Brechweinsteinvergiftung.

金硫黃 Stibium sulforatum auranticum 中毒亦屬之。

【症候】劇烈嘔吐，腹部酸痛，水瀉，煩渴，眩暈，痙攣，虛脫。

【急救及治療】飲以大量淨水，牛乳，粘滑汁，卵白水，肥皂水。用1%鞣酸水，洗胃，但須注意施行。

37. 腎上腺素中毒 Adrenalinvergiftung.

【症候】血壓異常亢進(至後沉降)心悸亢進，胸內苦悶，不安，口唇蒼白，呼吸急促及不整，終至心臟麻痺，呼吸停止而死。

【急救及治療】亞硝酸五烷 Amylnitrit 吸入。

38. 亞硝酸五烷 Amylnitritvergiftung.

【症候】 眩暈，運動不確，脫力，血壓沉降，脈搏細軟，以及失神。

【急救及治療】 令吸新鮮空氣，注射樟腦劑，咖啡英劑，行瀉血法及注入林該氏液，人工呼吸。

39. 片羅卡品中毒 Pilocarpinvergiftung.

【症候】 流涎，發汗，流淚，鼻涕增加，胃腸卡答兒，瞳孔縮小，視力障礙，脈搏不整，虛脫。

【急救及治療】 用2%鞣酸水洗胃，注射硫酸阿托品以治之。

40. 氰酸中毒 Blausaurevergiftung (Cyankalium.)

氰酸在治療上大都用其製劑，如杏仁水 Aq. prun. armen. 巴旦杏仁水 Aq. Amygdalar. amarar 瑪路櫻水 Aq. prun. macrophyll. 等。故服此等製劑之中毒即氰酸中毒。

【症候】 激烈者起叫喚，苦悶，瞳孔散大，痙攣而死。輕緩者發眩暈，脫力，苦悶，瞳孔散大，意識消失，痙攣，四肢厥冷，青藍現象，呼吸麻痺而死。呼氣有氰酸臭氣。

【急救及治療】 即時以0.1—0.2過氫酸鉀液或2%過氫化氫液水洗胃。如不能洗胃則注射阿朴嗎啡吐劑。內服鹼類劑興奮劑。行瀉血法，注入林該氏液。

41. 硫化氫中毒 Schwefelwasserstoffvergiftung.

【症候】 大都發生於入陰渠或船艙工作者。劇激者即死亡。輕緩者發頭痛嘔吐倦怠，下痢，遲脈，呼吸及心動不整，瞳孔散大，搖擗，青藍現象，痙攣。

【急救及治療】 新鮮空氣，人工呼吸，冷水灌注，氧氣吸入，林該氏液注入，及興奮劑投與。

42. 炭素氣中毒 Kohlenoxydvergiftung. 及 炭酸氣中毒 Kohlensäurevergiftung.

【症候】 耳鳴，頭痛，眩暈，惡心，嘔吐，顫動脈搏動，眼花閃爍，倦怠，顏面潮紅，青紫現象，意識消失，體溫低降，失神，蒼白，呼吸徐緩，乃至停止，癱瘓，麻痺，虛脫而死。

【急救及治療】 新鮮空氣，氧氣吸入，人工呼吸，皮膚刺戟，四肢溫包，服以興奮劑高而 300.0—500.0，食鹽水或林該氏液注入 600.0—1000.0。

43. 蛇毒 Schlangengift.

【症候】 此中毒由咬傷而起。傷部及其附近發疼痛，腫脹，變色(青色或黑色)。其腫脹蔓延極速。淋巴管及腺亦炎腫。此外為全身症候，頭痛，發熱，眩暈，發汗，嘔吐，蛋白尿，呼吸困難，心臟衰弱，癱瘓，昏睡麻痺。

【急救及治療】 咬傷如在肢部，則緊紮其上部，用吸角吸取其傷口，吸角蓋在傷口上，如無傷口，則作切創。或自緊紮部向咬傷部按摩使傷液流出。或將咬傷部燒灼，摘出。或以苛性鉀，硝酸銀腐蝕之。或注射 1—2% 過錳酸鉀液 2—3 cc. 於傷部周圍。此外服以酒精飲料，注射番木鱈素。如毒已吸收更宜施洗胃，投下劑。

44. 蟲毒 Insektegift.

【症候】 螫刺傷部及其附近起炎症。時見發熱，頭痛，蕁麻疹乃至發失神。

【急救及治療】如螫刺尚在傷口中，則注意除去之，塗以饅水，施醋酸鋁液即蒲羅氏液(第637方)電包。

45. 磺胺中毒 Sulfonamidesvergiftung.

【症候】症狀甚多，輕者祇需停藥。其症狀如手足發麻，惡心嘔吐，耳鳴重聽，食慾不良，味覺不清，頭痛，眩暈等。重者如發紺，白血球減少，顆粒性白血球減少，酸中毒症狀，胃腸出血，腹瀉，血尿，尿閉，腎絞痛等。各症狀並非一齊發現，大多僅一二種。

【急救及治療】普通立即停藥，大量飲水，注射葡萄糖酸鈣及三種維他命。特殊症狀如顆粒性白血球減少，胃腸出血，尿閉等，仍以治各該病方法治療之。

新 醫 書 局 發 行

方 植 民 校 閱

高 等 考 試 醫 事 人 員 試 題 解 答

普 通

一 厚 冊 十 二 元

本書內容計分上下二篇；上篇係述各級醫事人員應考須知，舉凡準備參加考試之一切手續，及檢定應考資格之各種法規等，詳備無遺。下篇再分醫師、牙醫師、藥師、助產士、護士、藥劑士、衛生行政人員等門類，彙集歷屆高普考試題，分別詳述標準解答，俾供有志參加高普考之醫藥人員之唯一的參考資料。

備 有 書 目 ★ 函 索 即 奉

配合禁忌一覽表

(主藥)	(製劑)	(配合藥)	(理化學的變化)
亞 砷 酸	水劑	炭酸鈣	生難溶於水之亞砷酸鹽
		石灰水	生成不溶性之鹽類
		酸化鐵	生亞砷酸之化鐵
鹽 類	水劑	阿兒卡利類	生鹽類而失其各自固有之效力
		浸膏類	其成分多分解
		植物鹽基	分解而變性者多
		有機酸鹽類	遊離其酸而失其效力
		黃白質, 膠質, 澱粉, 糊膠	生膠狀物質
絲 酸 (坦寧酸)	水劑	金屬鹽類	生難溶性鹽且析出其金屬而著明變色
		石灰水	初為灰白色, 次為暗綠色, 終變黑而沉澱
		炭酸阿兒卡利	初無色, 次綠色, 終變為黃色
鹽	丸劑	純鐵 (鐵粉或還元鐵)	漸漸抱合減各藥幾分之效力

安替比林	水劑	水溶液	易與他鹽類生複鹽，當注意之
硝酸銀	水劑	{ 硫酸，鹽酸及其鹽類	生對應之銀鹽而為白色沉澱
	丸劑	{ 醋酸，酒石酸，靑酸	還元銀而變黑
	散劑	{ 及其鹽類，杏仁水	生對應之難溶性之銀鹽，發生黃色之沉澱
次硝酸鉍	水劑 散劑	{ 碘，溴及其鹽類	生銀鹽或分解而析出銀
		{ 植物鹽基，植物性粉末	漸次分解而帶黃白色
		{ 坦寧酸含有物	漸化生硫化鉍
石灰	水劑	{ 硫酸化鉍	化生橙赤色之碘鉍
		{ 碘鉍	中和而生酸鹽類（生白堊或不沉澱）
		{ 酸類	起交換分解而生白堊
石	水劑	{ 碳酸鹽類	沉澱石灰
		{ 鉍及其鹽類	生水酸化金屬發生白色或變色之沉澱
		{ 金屬鹽類	析出鹽基
昇汞	散劑	{ 植物鹽基含有物	分解而漸變為藍色或黑色
		{ 坦寧酸含有物	徐徐分解而變黑

鹽酸奎寧	雷瑣辛	分解而生一種之化合物，研碎之則生 粘膠性之物質
	丸劑 散劑	
	羧酸含有物	
	水溶液	
	甘汞，硝酸，亞酸化汞	
水化氫鹽	水劑	徐徐分解 交換分解 分解而生氮仿
	炭鹽阿兒卡利及有機 酸之阿兒卡利鹽類	
	銻鹽類	分解
	羧酸含有物	化合而變色
鹽酸可卡因	水劑	遊離可卡因而生白墨 生碘化合物而變色
	水劑	生碘化合物
	碘化合物	變色
咖啡英	水劑	生化合物而成白墨
	水劑	
	阿兒卡利鹽類	
	羧酸含有物	

洋地黄菜	浸劑	酒糟浸出液或其液中	生有毒性之托克辛及結晶性之第旗托	
		加溫稀鹽酸時		毒濁濁
		加稀鑷酸類而溫之		則分解為葡萄糖及第旗托倫，第旗托
		碘及其鹽類，炭酸阿兒卡利，鉛糖，鉛酸，鞣酸		寧，第旗他利雷汀均變質
金雞納皮	煎劑	醋酸鉀	生肉色絮狀之沉澱	
		阿兒卡利鹽類	游離植物性鹽基，生灰色絮狀之沉澱	
		炭酸阿兒卡利	鹽類游離植物性鹽基生灰色細微之沉澱	
		鹽類	生化合物而發生白聖	
		硫酸銨	與金雞納化合而生純白聖	
		亞砷酸鉀液	因其中含有之炭酸阿兒卡利而生灰白色沉澱	
		次亞磷酸鹽類	生汚灰色之沉澱	
		鞣酸及其他含有物	與金雞納化合而生白色之沉澱	
		赤酒，帕兒脫酒	金雞納鹽基與酒中之鞣酸化合生灰色細微沉澱但與酸配伍則無變化	

亞兒次青分解於葡萄糖希度落愛農

梅梯倫希度落愛農

析出植物鹽基而濁濁

析出其金屬而多為帶褐灰色

漸漸黑變

成膠狀之塊

漸次生沉澱

成膠狀之凝塊

分解

成膠狀物析出

變質

生酸鹽類而遊離醋酸

生肉色絮狀之沉澱

分解而變質

沉澱灰紫色不明之物質

生赤褐色之沉澱

酸類

植物鹽基含有物

金屬鹽類

石灰水

蛋白質類

優洛託品

氫化高鐵

鉛鹽類

酒精製劑及醋製劑

炭酸阿兒卡利耳寧酸

鎂酸類

金雞鈉及其製劑

水化氫醌

赤酒，帕兒脫酒

錳鐵配液通液

熊果葉

阿拉伯樹膠

醋酸鉀

浸劑

水劑

水劑

甘 汞	水劑 散劑	酸類及酸性鹽類	析出亞酸化汞及金屬水銀而變黑，時於鹽酸變為猛毒之昇汞
		碳酸阿兒卡利及石灰水	化生亞酸化汞鹽而黑變
		碘酸類	生亞碘化汞，發生猩紅色沉澱
		碘鹽類及其製劑	化生碘化汞及昇汞
		浸膏類	析出昇汞及水銀而黑變
		白糖，嗎啡含有物	其他還元性物質，化生昇汞出水銀而黑變
		銨鹽類	化生黑色之含銨鹽酸化汞
		鉀酸化物及氫化鐵及碘鐵	還元水銀
		青酸含有物	分解而化生青酸汞鹽化汞
		銨及其鹽類	分解銨而易於爆發，生碘化淡紫
碘	水劑	金屬及其鹽類	化生碘化合物，多生黃色之沉澱
		澱粉及其含有物	化生碘化澱粉而黑變
		脂肪油，揮發油及碳酸鈣	} 分解而變色
		阿兒卡利上鹽類	
		阿拉伯樹膠乳劑	分解而變為黃褐色
酒精製阿兒卡利液	生黃色小葉狀之碘仿結晶		

碘	鉀	水劑	鑷酸類酸性鹽類 硝酸銀 植物鹽基 水銀及鉛鹽類	游離碘而變為黑褐色 沉澱黃色之碘化銀 構成鉛化合物而生變碘之沉澱 化生對應之金屬碘化合物
藥酸嗎啡		水劑 散劑	酸化鐵鹽，過硫酸鐵，氫化高鐵，游離碘 巽鹽類 坦寧酸含有物 重金屬鹽類	構成化合物 生白色之沉澱 還元金屬而變褐灰色 發生炭酸而構成其鹽類 析出植物鹽基而濁濁
重碳酸鈉		水劑 散劑	酸類及酸性鹽類 植物鹽基含有物 坦寧酸及其含有物 金屬鹽類	分解 析出金屬而變色 析出植物鹽基而生灰白色濁濁或沉澱 還元而析出其金屬則成褐色
阿	片	水劑 散劑	炭酸阿兒卡利 金屬鹽類 坦寧酸含有物 番木鱉及其製劑 鴉片拿及其製劑	游離植物鹽基而生灰色之沉澱 生抱合而不溶性之沉澱

醋	酸	鉛	水劑	樹膠及其含有物 石灰水 碳酸鹽類 坦寧酸含有物 鏷酸類 碘及其鹽類	生白色之沉澱 生水酸化鉛而析出絮狀之沉澱 沉澱白色之碳酸鉛 生帶黃白色之沉澱 化生其酸之鉛鹽發生白色沉澱游離醋 酸 生黃色之鏷鉛
吐	根		浸劑	鞣酸及其含有物 硝酸及碳酸亞兒卡利 阿兒卡利鹽	共使愛梅汀游離而生灰白色之沉澱
善	納	茄	根	鹽類 錳含有物及其鹽類 阿兒卡利類	善納茄根及沙和寧分解為葡萄糖及沙 和克寧 化生不明之物質而呈黃色
番	木	醋	浸劑	炭酸阿兒卡利類 碘鉀 坦寧酸及含有物 金屬鹽類	共析出植物鹽基而生灰白色之沉澱
及	齒	膏	膏(齒)		

碘鉀及阿兒卡利鹽

溫炭酸阿兒卡利

坦寧酸及其含有物

酒精含有物

重金屬鹽類

坦寧酸含有物

水酸液

甘水

植物鹽基含有物

酸類及酸性鹽類

碘及其溶液

炭液鹽類

植物鹽基含有物

石灰水

硫酸含有物

碘鉀

阿片

浸劑

水劑

水劑

水劑

沉澱灰白色之愛兒過汀

{ 分解愛兒過汀而化生多重之脫利梅梯兒亞明發生一種之臭氣

沉澱愛兒過汀及司克雷落汀酸

使司克雷落汀酸及司發雅林酸游離

游離析出司克雷落愛利脫林而生藍雲灰色之沉澱

分解而黑變

漸次分解而生黃色之沉澱

生昇汞及還元汞而黑變

使植物鹽基游離沉澱

中和而失其效力

生氯化淡素而爆發

生鹽基性鐵化汞及酸性炭酸汞

分解或構成複鹽

分解而面漸變黑

生鞣酸類

生過碘汞之猩紅色沉澱，過剩者溶解分解而生複鹽

麥角

碘鐵糖漿

鋇苗香精

昇汞

過錳酸鉀	〔有機物 水劑〕	錳及其鹽類	自己還元酸化有機物而變褐或脫色 生錳鉀及酸水酸化錳之絮狀沉澱
非洲防已根	煎劑	〔有機酸及其鹽類 硬鉀 酸類〕	酸化而爆發點火 分解而生碘化佩兒部林之結晶性沉澱 分解而生黃色之沉澱
鹽酸海洛英	水劑	〔鋰苗香精及鋰含有物 羧酸類〕	沉澱而溶解其過剩者 沉澱
碘非拉托善 ，其他蛋白 化合物	水劑	酸類	分解
優洛託品	水劑	〔坦寧酸及其含有物 酸類〕	生白色之沉澱 分解
阿司匹林	水劑 散劑	〔阿兒卡利類 阿兒卡利類 安替比林 鹽酸奎寧 澱粉酶 安息香酸鈉咖啡因〕	分解 分解 分解 易於溶解

利尿素 水劑 酸類
 酒精
 蛋白質 水劑 酸類
 坦寧酸
 昇汞
 (卵黃)
 分解而析出柳酸及柯何豆素
 不溶解蛋白質
 沉有凝固蛋白質之渣
 沉降蛋白
 變質

新醫書局發行

張崇熙醫師編著

外國文醫藥名詞拚讀法

十元

增訂三版一厚冊

新醫藥發源歐西，一切醫藥名詞，均有拉丁文或德文原名，現吾國坊間醫書，雖多有中文譯出，但所譯不一，且易生誤解，故吾人欲澈底研究，非先明瞭外國文拚讀法不為構，本書編者張崇熙博士有鑒及此，特編拚讀法一書，詳述拚讀條例，並註中文字音，不借西文諸同志得此自修，均可於極短時間，達到自修拚讀之目的，醫書中所載原名甚多，將來研究，如遇懷疑，更可利用該書。隨時檢閱。初學一覽瞭然。可免思慮難解之苦。

備有書目★函索即奉

常用磺胺類藥物劑量表

藥品	病症類別	特重症	電	中等症	輕症
磺 胺 嘧 啶	血中有效水準 按體重每公升之每日劑量 成人每日劑量 首次劑量 以後各劑 間隔時間	15—20mg%	10—15mg%	5—10mg%	3—5mg%
			0.1—0.15	0.1	0.05
			6—9	6	3
			6—1	4	2
磺 胺 噻 唑	血中有效水準 按體重每公升之每日劑量 成人每日劑量 首次劑量 以後各劑 間隔時間		4	1	1
			1.5	1	1
			每4小時1次	每4小時1次	每6小時1次
			0.15	0.1	0.05
磺 胺 噻 唑	血中有效水準 按體重每公升之每日劑量 成人每日劑量 首次劑量 以後各劑 間隔時間	0.2	0.8	0.6	0.3
		12	4	4	3
		6	2	1	1
		4	1	1	1
磺 胺 噻 唑	血中有效水準 按體重每公升之每日劑量 成人每日劑量 首次劑量 以後各劑 間隔時間	1.5	每4小時1次	每4小時1次	每4小時1次
		每4小時1次	每3小時1次	每4小時1次	每4小時1次
		0.15	0.1	0.05	0.05
		9	6	4	1
磺 胺 噻 唑	血中有效水準 按體重每公升之每日劑量 成人每日劑量 首次劑量 以後各劑 間隔時間	6	4	2	1
		1.5	1	1	0.5
		每4小時1次	每4小時1次	每5小時1次	每3小時1次

藥名	碘劑	酸類	鐵 砒 銅 鋅	硝酸銀	甘 汞 藤 酸 酒 精	燐 酸 鹽 類 肝 油 水 飴
內服時間	空腹時	消化時	食物攝取後	食前	胃安靜時	食前或食時

內服藥時間表

新醫叢書之一

常用處方集

增訂二版

中華民國三十七年十二月十五日出版

中華民國三十八年九月一日再版



著者	慎微	李定
增校者	新醫同仁	研究社
總發行	新醫書局	
	總局：杭州中正街三六九號	
發行者	新醫書局	
	分局：上海漢口路六六八號	
印刷者	新醫書局印刷工場	
	杭州：中正街皮市巷新開弄一號	

基本定價二十元

常用處方集勘誤表

頁	行	誤	正
4	16	常用磺胺醴類	常用磺醴胺類
9	8	Aethylcarbon	Aethylcarbon
10	27	加重碳酸鈉外	加重碳酸鈉外
18	1	非那賽汀	非那賽汀
23	5	雷香耳氏液	否雷耳氏液
26	2	Kalipeptic	Caripeptic
33	8	當習便秘	當習便秘
33	17	全 上	全 上
36	4	全 上	全 上
36	12	全 上	全 上
36	18	全 上	全 上
48	14	與前方同	與前方同
54	3	Santonin	Santonin
57	18	服一星期間	服一星期間
58	27	裝入膠囊	裝入膠囊
59	11	裝入膠囊	裝入膠囊
59	18	膠囊不能吞下	膠囊不能吞下
62	3	Leptpn	Pepton
64	6	胃洗滌料	胃洗滌料
88	23	收斂	收斂
89	25—26	薄荷劑等	薄荷劑等
93	22	主動脈閉不全	主動脈瓣閉鎖不全
95	15	嘔吐箭毒素	嘔吐箭毒素
103	21	早洩	早洩
105	19	Nitral	Nitrat
111	16	Neu	Neo
119	20	皮膚發汗過多症	皮膚發汗過多症
121	3	白明膠	白阿膠

121	19	白明膠	白阿膠
137	21	慢性皮膚可	慢性皮膚病
137	23	薄荷水之任何一種	薄荷水之任何一種
139	23	Folie	Folic
151	15—16	結核病肚腔內	結核病灶腔內
152	9	聽神經	聽神經
154	17	jopat	jodat
175	14	Noralgin	Novalgin
177	4	Anrant	Aurant
191	6	Biearb	Bicarb
191	8	桿菌痢疾	桿菌痢疾
192	21	Biearb	Bicarb
193	24	Miecro-	Miecro-
195	19	連潔羣	連潔羣
195	24	injection	injection
197	24	特種膠囊	特種膠囊
198	8	Penieillin	Penicillin
198	27	Penieillin	Penicillin
199	27	Ophthalmie	Ophthalmic
211	9	上皮剝脫	上皮剝脫
211	9	癢痒	癢痒
214	21	Liocr	Liver
218	15	天台蜜桔	天台蜜桔
220	19	膠囊劑	膠囊劑
222	16	zine	zinc
223	8	Extract	Extract
236	9	zine	zinc
236	10	Flao	Flav
237	9	Soll	Sol.
237	26	水枝酸等	水楊酸等
238	23	Chlorie	Chloric

245	19	Chlocresol	Chlorocresol
250	24	取碗豆尤塗入眼後	取碗豆油塗入眼後
257	24	Carbolie	Carbolic
259	13	Protargel	Protargol
265	25	Sormai	Nórmal
269	9	白明膠	白阿膠
269	10	Glycerin	Glycerin
274	2	boric	boric
274	15	Liquef	Liquid
275	3	Cantharid	Cantharid
275	8	禿頭症	禿頭症
275	5	蓖麻子油	蓖麻子油
276	14	蓖麻子油	蓖麻子油
303	3	Amidpyrina	Amidopyrina
306	1	樟腦碘劑(樟腦油)	樟腦擦劑(樟腦油)
306	2	腎上腺素溶液	腎上腺素溶液
306	11	硫化鎂(煨鎂)	煨製鎂(氯化鎂)
307	10	酸睛酶	酸睛酶
309	4	麝香草腦	麝香草腦
311	15	氯化高汞(昂汞)	氯化高汞(昂汞)
312	10	巴豆油 Oleum	巴豆油 Oleum Cro- tonis
314	2	Scillac	Scillac
337	8	Bnesthesinum	Anesthesinum
337	13	鞣酸蛋白 Tannaloitum	鞣酸蛋白 Tannalbin
358	10—21	記憶力減退	記憶力減退
358	21	減弱	減弱
359	11	行胃洗滌	行胃洗滌
359	21	步行蹣跚	步行蹣跚
370	2	漸漸黑髮	漸漸髮黑

