


聖濟總錄

七十八

庫文閣内	
内閣文庫	
番號	漢 12609
冊數	200 ( 81 )
函號	300 212





大學東  
校典藉  
局之印



大德重校聖濟總錄卷第七十八

泄痢門

下痢裏急後重 痢兼渴

痢兼腫 痢後脫肛

疝腫 濕腫

總錄七十八



下痢裏急後重

論曰下痢裏急後重者有痕聚也經所謂大瘕泄者裏急後重數至圍而不能便莖中痛是矣法當和冷而祛蘊滯則脾胃和平飲食腐化其膿血自消大腸自固也治裏急後重下赤白痢及下部疔痛當歸散方

當歸切

黃連去須炒

乾薑炮

黃蘗去麤皮蜜炙各壹兩

右四味搗羅為散每服三錢匕濃煎烏梅汁調下空心食前日二服若腹中疔痛加當歸下赤加黃連下

白加乾薑

大醫外經卷之八十八

治後重下痢赤白滯下腹內結痛當歸黃連湯方

當歸切焙

黃連壹兩半

赤茯苓去黑皮

地榆壹兩

犀角屑參

甘草炙

厚朴去麤皮生薑

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一聚

大拍碎同煎至八分去滓空心溫服日再

治大病後重下赤白痢腹中疔痛石鍾乳湯方

石鍾乳別研

黃連壹兩

防風去

附子炮裂去

黃蘗去麤皮

當歸切

乾薑壹兩

蜀椒去目并閉口者

右八味除鍾乳外剉如麻豆再同和勻每服四錢匕

水一盞半煎至八分去滓溫服空心食前日二服

治冷熱不和下痢赤白臍腹作痛裏急後重聖功散方

乾薑炮

五倍子各壹兩

訶梨勒煨去

甘草炙

右四味搗羅為細散每服二錢匕食前米飲調下

治腸虛冷熱不和赤白下痢裏急後重訶梨勒湯方

訶梨勒煨去

草豆蔻去皮

延胡索各半

乾薑壹兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食前溫服

治後重下膿血如聖散方

臭橘

葶藶各壹兩

右二味同搗碎炒令煙出放冷搗羅為細末每服二

錢至三錢匕茶清調下

治藏氣不調裏急後重勻氣湯方

蒼朮

米泔浸壹宿  
去皮切暴乾

厚朴

去麩皮生薑  
汁炙各肆兩

甘草

生剉  
參兩

乾薑

生剉  
參分

右四味廬擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食前溫服夏末秋初最宜服

治熱痢下重者白頭翁湯方

白頭翁

黃蘗

黃連

秦皮

右四味廬擣篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

食前溫服日二

治冷痢裏急後重當歸丸方

當歸

胡椒

黃連

厚朴

阿膠

乾薑

右六味除阿膠擣羅為末用好醋調阿膠為膏和劑

丸如梧桐子大每服十五丸食前橘皮湯下加至二

十九

治腹痛虛滑裏急後重心胸痞悶逆滿或傷冷暴瀉手足厥冷脉息沉伏訶梨勒丸方

訶梨勒炮去核壹兩肉豆蔻去殼半兩白礬熬令汁枯壹兩

木香兩半龍骨貳兩烏頭炮裂去皮臍

縮沙人兩各壹

右七味搗羅為末粟米粥和為丸如梧桐子大每服二十九丸食前粟米飲下

治藏寒下痢臍腹撮痛腸鳴脹滿裏急後重不思飲食

日漸羸瘦勝金丸方

黃連去須伍兩龍骨肆兩草豆蔻去皮

赤芍藥當歸切乾薑炮

地榆各參橡實各參乾桑葉

木香各貳赤石脂煨赤研代赭各肆兩

右一十二味搗羅為細末醋煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九至三十九煎艾醋湯下空心食前服

治洞泄殞泄裏急後重薑桂散方

乾薑炮參兩甘草壹兩剉或味用沙糖煎兩水微化開同炒乾

桂去麤皮壹分

右三味搗羅為散每服二錢匕白湯調下兼治腹痛  
止虛渴

治膿血雜痢後重疼痛日久不差通神丸方

沒藥 五靈脂 乳香各壹錢

巴豆霜半錢

右四味各研細再同研勻滴水丸如黃米大每服七

丸煎生木瓜湯下小兒三丸隨歲數加減空心食前

服

治下痢赤白日久不差裏急後重取冷積玉粉丸方

白丁香直者研 粉霜研分 硫黃研

膩粉研

硃砂研各半兩

乳香鎔過研壹分

右六味再同研勻用生薑自然汁煮棗肉研和作劑

每服旋丸如豌豆大臨臥煎生薑棗湯下七丸未動

次夜服十丸老少以意加減

治下痢赤白裏急後重大腸虛滑丹砂丸方

丹砂研

草烏頭末

乳香研各壹錢匕

巴豆大者去皮心研柴枚

右四味再同研令勻細用醋煮麩糊和丸如梧桐子

大每服一丸冷乳香湯下不拘時候

治下痢腹脹裏急後重木瓜飲方



乾木瓜焙 白芷 厚朴去蘆皮生

白木剉 木香各壹兩 桂去塵

黃連須去 當歸剉 縮砂蜜皮

龍骨 訶梨勒皮煨各壹兩半

陳橘皮去白焙 杏仁去皮尖雙人炒拾伍枚

赤石脂兩

右一十四味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎取

八分去滓溫服

痢兼渴

論曰痢不差則腸胃虛弱津液減耗不能上潤於咽嗑

故口舌焦乾而內煩使人引飲飲多則濕氣淫溢肌肉

虛浮而痢亦不差也

治下痢冷熱相衝藏府氣不和順本來下虛津液耗少

日乾咽燥常思飲冰人初不許飲水毒氣更增煩躁轉

甚宜急與湯飲救之不得令至過度止渴栝樓根湯方

栝樓根剉 甘草剉 白茯苓去黑皮各半兩

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半麥門冬一分

去心棗二枚擘破同煎至七分去滓不拘時溫服

治久痢食即嘔吐煩渴不可忍烏梅湯方

烏梅肉炒半兩 黃連去須炒 白茯苓去黑皮

黃芩去黑心 龍骨各半兩 訶梨勒炮去核

厚朴去麤皮生薑汁炙剉壹兩 阿膠炙令燥半兩

右八味麤搗篩每服五錢七漿水一盞生薑三片同煎至七分去滓空心溫服日午再服

治痢後渴不止石膏丸方

石膏別研入 麥門冬去心焙 栝樓根

茯苓去木 知母焙 黃連去須

枸杞根皮 白茯苓去黑皮各壹兩 胡粉炒黃色半兩

右九味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下晚食前再服或作散冷熱水調二錢七

服亦得

治泄痢藏府虛燥煩渴不止黃芩湯方

黃芩參分去黑心秤 石膏碎 苳草炙

枳殼去麤皮炒 黃蘗去麤皮剉 女萎

栝樓根剉 白茯苓去黑皮各半兩 檉皮去麤皮剉

淡竹葉各分切

右一十味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓空心溫服未止再服小兒量大小服之

治泄痢上膈虛熱煩渴引飲口瘡不下食困劣人參湯

方

人參

白茯苓去黑皮

木香

麥門冬焙心

葛根剉

前胡去蘆頭

梔子人

黃耆剉

陳橘皮湯浸去白

訶梨勒炮去核

半夏湯洗

甘草炙

右一十二味麤搗篩每服四錢匕水一盞半生薑三

片陳米一合同煎至七分去滓空心溫服日晚再服

治下痢煩渴黃連丸方

黃連去須炒

當歸切焙

烏梅肉炒

右三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

空心米飲下日晚再服痢甚者鎔蠟為丸服

治熱痢黃膿發渴四肢煩悶黃連丸方

黃連去須壹兩半

黃芩去黑心

黃蘗去麤皮

治熱艾葉炒壹兩

右四味搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十

丸空心飯飲下日晚再服

治痢兼渴麥門冬湯方

麥門冬去心壹兩半

烏梅碎柴

右二味用水二盞煎取一盞去滓分溫二服空心晚

食前服

治吐痢後大渴飲水不止陳米湯方

治痢陳廩米水海淨

右一味用水二盞煎至一盞去滓空心溫服晚食前

再煎服

治痢後渴糯米汁方

糯米合

右一味以水一盞半同研絞取汁空心頓服之

治痢兼腫

論曰下痢身體浮腫者久痢所致也痢久則胃氣弱而腸虛胃者土也所以化水穀而充肌肉若胃土氣衰不能勝濕則水氣妄行流溢皮膚故痢而兼腫也得小便

利者乃愈

治夏月暴冷忽壯熱泄痢引飲變通身浮腫脉沉細小

數澤漆湯方

澤漆炒壹兩 吳茱萸湯洗焙 赤茯苓去黑皮

白朮炒 桔梗炒 當歸切

犀角鎊 青木香人見 海藻洗去鹹

芍藥 大黃炒各兩

右一十一味剉如麻豆每服以水二盞煎藥五錢匕

取八分去滓溫服下後消息五六日可與女麴散

治利後虛腫水腫者服此藥小便利得止腫亦消女麴

散方

女麴兩

乾薑炮

細辛去苗

椒目微炒

附子炮裂去皮臍

桂去麤皮各壹兩

右六味搗羅為散酒服一錢匕不知加至三錢匕日

三若婦人產後虛滿服此大良

治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血澤漆湯方

澤漆葉微炒伍兩

桑根白皮炙令黃色剉

郁李人湯浸去皮尖

杏人湯浸去皮尖及雙人者炒

香

人參各壹兩

白朮剉

陳橘皮湯浸去白焙乾各壹兩

右七味麴搗篩每服五錢匕水二盞入生薑三片煎

取八分去滓溫服後半時辰再服取下黃水數升或

小便利為度

治下痢後脾胃虛弱不能制輸水氣致身腫脹滿桑白

皮湯方

桑根白皮炙令黃色剉

赤茯苓去黑皮

郁李人湯浸去皮尖麩

陳橘皮湯浸去白焙壹兩

海藻洗去鹹炙壹兩半

赤小豆炒半升

右六味麴搗篩每服五錢匕用水一盞半煎取八分

去滓溫服日三

治痢後徧身浮腫茯苓湯方

赤茯苓去黑皮 白朮剉微炒 防已各壹兩

黃芩去黑心 射干 澤瀉各參兩

桑根白皮炙黃色剉參兩 澤漆葉切微炒壹兩

右八味麤搗篩每用五錢匕先以水三盞煮大豆一合取二盞去滓內藥煎取一盞分為二服未差頻服

兩料

治下痢體腫香菽散方

大豆炒熟搗去黑皮用壹合

右一味搗羅為散用粥清調一錢匕服日二三

治虛勞下痢心胸壅悶喘促四肢腫滿細辛飲方

細辛去苗葉 防已 桂去麤皮

當歸切炒各半兩 枳殼去瓢炒 白朮

赤茯苓去黑皮 赤芍藥各參分 黃耆剉壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑三片煎至七分去滓溫服不拘時

治痢後四肢浮腫喘息促急坐卧不安小便不利防已湯方

防已 豬苓去黑皮 桑根白皮

赤茯苓去黑皮 海蛤 陳橘皮湯浸去白

檳榔剉煨 紫蘇用莖

木通剉各

木香 白朮各半

右一十一味麤搗篩每服三錢匕以水一盞入生薑

三片煎至七分去滓溫服不拘時

治下痢後虛損臍下痛四肢浮腫木香湯方

木香 五加皮剉 桑根白皮剉

檳榔剉煨 桃人湯浸去皮尖及雙人微炒

郁李人湯去皮尖微炒 松節剉貳

薏苡人 陳橘皮湯浸去白

右九味麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至六分去

滓不拘時候稍熱服

治痢後四肢浮腫麻人湯方

大麻人 商陸 防風去

附子炮裂去皮臍 陳橘皮湯浸去 防已各壹

右六味剉如麻豆每服五錢匕以水一盞半入赤小

豆一百粒同煎至八分去滓食前服

痢後脫肛

論曰下痢脫肛者因大腸虛弱冷氣壅滯至圍不能便

極力於下肛門脫出故謂之脫肛溫其藏則愈古方有

坐湯溫熨之藥皆良法也

治肛門不收裏急後重磁石散方

磁石火煨醋淬兩 桂去麤皮壹兩 蛎皮壹枚炙令黃熟

右三味搗羅為末每服二錢匕米飲調下慎舉重及急衣帶斷房室周年乃佳

治痢後脫肛蝸牛散方

蝸牛參柴枚燒灰細研 磁石火煨醋淬壹兩細研

右二味重合研如粉每服二錢匕空心米飲調下日午再服

治痢後脫肛萆薢散方

萆薢子炒黃半兩 龍頭貳枚燒灰 鐵精半兩研

右三味搗羅為末每服二錢匕空心米飲調下日晚再服仍將藥末少許裏肛上炙故麻履底按入即不出

治瀉痢日久脫肛疼痛黑聖散方

大蜘蛛壹枚用瓠子葉兩重裹以線繫定合子內燒令黑色勿太過

右一味細研入黃丹少許研勻每先用白礬葱椒煎湯洗浴拭乾後將藥摻在軟帛子上將手掌按托上肛頭即不下

治冷熱不和下部痛裏急後重虛滑或結澁腸頭脫出

礪砂丸方



礞砂飛壹

硫黃研

白礬研各壹分

已上三味同研勻用萊蕪一枚重五兩者割開留元蓋子剜作坑子填上件末在內將瓦蓋用竹簽定以麩劑十五兩裏了開地坑子一枚方一尺鋪馬糞厚三寸安麩毬在上更以馬糞蓋之上發火燒候麩黑即止去麩將萊蕪藥爛搗如膏更入後藥

肉豆蔻去殼

葫蘆巴各半兩

訶梨勒皮

附子炮裂去皮臍

補骨脂炒各壹兩

藁香子炒壹分

右六味搗羅爲末通前藥膏同搗滴少好酒和納令勻丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心食前

溫米飲下四日

治洞泄肛門脫出豬肝散方

豬肝壹片如慢火熬乾

黃連去須

阿膠炒令燥

芎藭各壹兩

烏梅取肉貳兩半熬

艾葉半兩醋炒

右六味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下白米飲亦可食前日再服

治肛門脫出壁土散方

故屋東壁上土伍合

皂莢參挺各長壹尺各

右二味搗羅土爲細末傅肛頭取皂莢炙暖更互熨入則止

治脫肛不收蒲黃傳方

右用蒲黃一味以豬脂和傅肛上手按抑令入日三

三愈

治積冷下痢脫肛枳實熨方

枳實一枚石上磨令滑澤鑽安柄子蜜塗炙令煖熨之冷更易之肛縮入即止

疝蠱

論曰疝有五種久變為蟲蠱一曰白疝令人皮膚乾燥而無潤澤之氣二曰赤疝令人毛髮焦枯三曰蟻疝令人腰脊強重四曰疝蠱令人下部攣急背強不能俯仰

五曰黑疝患者必死令人五藏俱損或下瘀血此蓋腸胃虛弱嗜甘味過度致脾氣緩弱穀氣衰微榮衛虛損腸間諸蟲因虛而動蟲蝕於上則手足煩疼心中懊懣嘿嘿不欲飲食腰脊無力食不知味精神恍惚夜夢顛倒喉咽生瘡齒齦黯黑損爛膿血俱出胃氣逆則變嘔噦下蝕腸胃便痢膿血或下瘀黑久不已則肛門爛開漸至危殆

治久患疝痢不差兀子礬散方

兀子礬燒研

黃連去須各

白礬燒研

龍骨研

雲母粉研各壹兩

桂皮去麩

麝香研各半兩 無食子燒染

右八味搗研為散空心生薑汁調下三錢七日再服

治積年疝痢羸瘦面色萎黃方

硫黃研 黃連去須 艾各壹兩

蜜壹合

右四味以水二升先煮黃連艾取半升後內硫黃末

更煮三五沸絞去滓又內蜜更煮三五沸分三服

治疝痢久不差羸瘦欲死方

新出羊糞壹升

右一味以水一升漬經宿明日絞汁頓服之日午唯

食煮飯極重者不過三服差

治久痢赤白疝濕諸疾五皮湯方

槐皮 桃皮 樗根白皮

柳皮 棗皮各以患人手把外截壹握

右五味細剉用水二盞煎至一盞去滓空心溫服未

止再服

治久痢變疝下部生惡瘡惡寒壯熱二白湯方

桃白皮 槐白皮各切壹升 苦參切伍

熟艾三月三日者伍合 大棗拾枚

右五味以水五升煮取二升半去滓內熊膽一棗許

大攪令勻取二升灌下部餘分三服

治久痢成疳灌洗方

樗根白皮豐握搗絞取汁參合 大麻油熬如車脂

酢泔淀各取 椒肆兩去合口 鼓合

右五味以水五升先取椒鼓煎絞取汁二升和樗汁

麻油泔淀等三味分爲兩分用一分灌下部隔一日

更取餘者復灌其藥溫用唯得食煮飯葱白爛煮蔓

菁芥等五六十日外以鹿脯下飯

治丈夫婦人小兒久痢成疳百方不差方

丁香 黃連去須各

右三味搗研爲散每以一錢匕取竹筒吹入下部小兒量度減之不過三四土差治疳痢不止方

苦參 甘草制 雄黃各二兩

右三味搗羅爲細末先以水五升煮葱白五寸豉一

合蜀椒三十粒至三升入藥末三撮於汁中候冷熱

得所先飲少許豉汁食一日飯乃側臥徐徐灌下部

訖多時卧不出爲佳大急乃出之於淨地當有疳濕

蟲如白馬尾頭黑是其効也若重者肛大難差當取

桃枝綿裹頭浸前件藥汁適寒溫烙之近脊點烙一

上三十度乃差

治久痢成疳便下白色食不為肌膚石榴丸方

石榴皮焙

橡實

附子

炮裂去皮

無食子

梔

厚朴

去蘊皮生薑汁炙

乾薑

炮各壹兩半

右六味搗羅為末米飲和衆手丸如梧桐子大每服

三十九食前生薑湯下日再

濕蠶

論曰凡下痢不止或時氣之餘為水濕所乘客於腸胃令九蟲皆動侵蝕府藏故為濕蠶之病所謂蠶者蟲動於匿而難知故也謂其蟲因濕而動故名濕蠶其證上

則蝕脣口下則蝕肛門上脣生瘡是蟲蝕五藏令人心

煩懊懷下脣生瘡是蟲蝕下部令人肛門傷爛若胃虛

氣逆則變為嘔噦甚即府藏被傷齒上下斷皆生瘡齒

色黯黑是其候也下痢出瘀血者不可治

治濕蠶痢不止蕪荑丸方

蕪荑人微炒

吳茱萸

湯洗

乾薑

炮各半兩

枳殼

去麩炒

黃連

去須炒各參分

右五味搗羅為末煮漿水飯和丸如梧桐子大每服

二十九空心日午米飲下

治濕蠶痢蕪荑黃連丸方

蕪荑人微炒 黃連去須炒

右二味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸  
空心食前煖米飲下加至七丸

治疳蠱蝕下部苦參湯方

苦參 青葙子各壹兩 甘草炙

熊膽研各半兩

右四味除熊膽外麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎  
至八分去滓入膽余分攪和空心頓服日午再煎服  
之

治濕蠱痢蝕下部參連湯方

苦參壹兩 黃連去須炒 阿膠炙令燥

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去  
滓空心溫服日晚再服

治疳濕蠱蝕口齒及下部青葙子散方  
青葙子 甘草生剉各壹兩

右三味搗羅為散每服一錢匕食前煖生地黃汁調

治痢濕蠱下部瘡爛黃連湯方

黃連去須肆兩 熟艾炒 苦參

槐白皮各參兩

右四味細判如麻豆大每服五錢匕水二盞煎至八分去滓溫服重者不過三劑

治疔蠱蝕人下部通見五藏痢下膿血舉體不安徧身疼痛面無顏色手足虛腫苦參散方

苦參熬令汁盡 礬石各半 青箱子各半

藜蘆壹分

右四味搗羅為散每用二錢匕置竹筒中吹下部日三二度小兒只一錢匕

治疔蠱下部上攻移熱殺蟲豬膽煎方

豬膽壹枚 米醋伍合

右二味煎醋令百沸入膽汁更三五沸滿口飲之蟲死即差

治疔蠱無問所在皆治之方

右取死蝦蟇燒灰研末以油和塗瘡上

治疔蝕人諸處但是赤血痢久不差用之即差方

蝦蟇壹枚五月五日採燒灰研 金銀土鍋

人屎灰一方云髮灰各伍兩 麝香研壹分

銀末小豆許錯

右五味搗研為末每用少許傅瘡上即差痢者吹下

部

治疔蠹蝕下部生瘡膿血雜下身面有浮氣雄黃散方

雄黃

研

青箱子

各二兩

苦參

兩

礬石

熬令汁枯

雌黃

研

藜蘆

鐵衣

各壹兩

麝香

研半兩

右八味搗研為散每和酸棗大以竹管送內下部中

每日一小兒以大豆許此方能救死

治疔濕蠹下赤黑血肛門蟲蝕赤爛日夜疼痛熏黃散

方

雄黃

研

丹砂

研

食鹽

研

青黛

研

丁香

研

礬石

熬令汁枯研

鐵衣

梔子人

麝香

研各壹分

葇荑子

細辛

去苗葉

土瓜根

乾薑

炮

甜葶藶

紙上炒

菖蒲

蝦蟆

燒灰研

蜀椒

去目及閉口炒出汗

故靴底

燒灰研各壹錢

天靈蓋

枯腐者壹分

右一十九味搗研為散每用一錢匕以綿裹內下部

中日再易有瘡即傅其上

治疔濕蠹洗熨下部丁香散方

丁香

壹分

麝香

研壹錢

犀角

鎊

甘草

剉各參分



右四味搗研為散以鹽椒各三合豉二合水三升都煎至一升去滓乘熱用綿蘸洗熨下部冷即再煖用治疔濕蠹殺蟲青菴子散方

青菴子

雄黃 研

硫黃 研

蕪黃人

雷丸 各半

苦參 剉

狼牙 各參

藜蘆 去蘆頭 壹分

右八味搗研為散以綿裹一錢匕內下部中日再易之

治下部疔蠹瘡經年不差丁香散方

丁香

青黛 研

黃連 須

木香 研

石灰 研

蚘蛇膽 各半

麝香 壹錢 細研

右七味搗研為散每用半錢匕傅瘡上日三兩易

總錄七十八

大德重校聖濟總錄卷第七十八

