



湯科選粹目錄

第五卷

腎癰第六十一

內托羌活湯

痔瘡第六十二

良法治痔

內痔流血

腸紅

薰痔

五痔散

加味香蘇散

膽槐丸

乾葛湯

蝟皮丸

黑玉丹


痔良方

洗方

黃連阿膠丸

清心丸

槐角丸



痔瘡良方

加味連殼丸

秦艽湯

四順清涼飲

加味槐角丸

加味地黃丸

三神丸

川歸丸

豚胃丸

止痛丸

橘皮湯

五灰散

芎歸丸

槐地丸

七聖丸

秦艽白朮丸

皂角丸

釣腸丸

皂角煎丸

荆芷丸

直指收痔丸

無比丸

藥肚

四物解毒湯

槐花地榆散

椒子散

去痔法

獨葉丹

寸金散

蜈蚣油

神効散

五倍湯

槐花散

茄柯湯

蓮房枳殼湯

獨韭湯

東瓜湯

七物湯

羊甲散

獨菊湯

乳沒散

蓮房湯

神茄湯

莧菜湯

濯洗七方

雄黃散

神異散

寸金錠子

二子散

水銀棗子膏

千金散

熊膽膏

猪膽膏

延肛痔方

拔毒散

蝸牛膏

去毒散

田螺津

七蚰丹

羊臙散

膽麝散

雌雄靈煉散

神蘭散

礬鱉散

痔方二條

洗藥方

千金散

花蛛散

痔漏第六十三

連槐散

附子灸法

二條

牽牛酒

臟頭丸

連歸丸

蠟礬丸

齒髮散

蜂房散

骨碎補丸

大樓丸

秦艽蒼朮丸

秦艽羌活丸

代赭石丸

金寶膏

秦艽當歸丸

秦艽防風湯

當歸郁李湯

紅花桃仁湯

六灰丸

川練蠟皮丸

臟連丸

黃耆葛花丸

槐角丸

香薷丸

連腸丸

鯽魚散

平肌散

燠洗三方

內痔方

五烟神丹

藥線法

生肌散

治漏神方

腸風痔漏方

又秦艽蒼朮湯

股疽第六十四

附骨疽

青草蒼柏湯

漏蘆飲子

內托蒼朮湯

內托酒煎湯

檳蘇飲

三生散

神名膏

黃大下頰方

多骨疽第六十五

取朽骨法二條

鶴膝風第六十六

五積交加散 大防風湯

二防飲

歸耆湯

蒼龜丸

蒼栢散

丹溪歸地湯

換骨丹

還少丹

脛疽第六十七

臙瘡第六十八

黃耆丸

龍骨膏

馬齒膏

審土膏

小駐車丸

桐油膏

蘄艾膏

黃蠟膏

四生散

二蠟膏

黃丹膏

黃白膏

雙凍百草膏

龜甲散

蠟礬紙

七七膏

寒水石膏

爐灰膏

白玉膏

翠玉膏

隔紙膏

丹溪方

腎風瘡方

附

足瘍第六十九

手足折裂第七十

破傷風第七十一

瘍科選粹卷之五

匏

繡水陳文治 輯

東吳繆希雍參校

醫癰第六十一

醫屬膀胱經部分陰中之陰道遠位僻雖太陽多血
然運化難及比之他處尤爲喫緊初起便服活命
飲葱熨法務令消散

患此者毋傷脾胃毋損氣血但當固根本爲主若腫
硬作痛者形氣虛邪氣實也用托裏消毒散活命
飲初起亦可用勝金丹一粒金丹下法老弱人十

全大補湯人參養榮湯固其根本若不補養其患尤在結痂之後

若至毒成欲作膿者服內托羗活湯為主若至變證悉如惡候用藥法須加意調攝潰後多服補中益氣湯十全大補湯必旬日收斂方保無虞若不慎幃幙不戒食饌綿延成漏則終身之患矣若用尋常驅熱拔毒舒氣之藥虛虛之禍不可勝言延至過冬卽成冷漏垂珠左右兩處起癰爲騙馬墜此處微實但皮肉薄而紋緊口亦難合易成漏瘡初起惟消散之爲妙兩胛腠兩外踝俱近骨難愈亦

防成漏

發於尻名銳疽其狀赤堅不急治三十日死

尻醫尖也

背脊盡處發疽曰穿襠發多致成漏宜急治初起活命飲加羗活黃栢及內托羗活湯主之或用勝金丹追毒丸壯實者八陣散一粒金丹下之老弱人大補之

內托羗活湯

治醫癰腫痛兩尺脉緊按之無力

羗活

黃栢

各壹錢

防風

藁本

肉桂

連翹

甘草

炙

蒼朮

陳皮

右水酒各半煎服

補中益氣湯

方見掌疽條

十全大補湯

方見脫疽條

加味六君子湯

醫疽因脾虛不能消散不潰不斂

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮

甘草

川芎

當歸

黃耆

陽虛不能潰及潰而膿清不斂者補中湯氣血俱虛者十全大補湯

痔瘡第六十二

痔之爲恙非若他證之有外因也均由醉飽入房或入房忍泄或多燂厚味或飲食失節或勞傷元氣或飽食久坐以致溼熱風燥四氣下注於大腸鬱久成毒使然凡腸頭腫塊者溼也肛腫後墜者溼兼熱也出膿血者熱勝血也痛極者火熱也痛痒者風熱也大腸秘者燥熱也小便澀者肝火溼熱也瘡頭向上硬者熱多也瘡頭向下軟者溼多也無非本於肝脾腎三經之虛內經曰因而飽食筋脉橫解腸澀爲痔患此者因形而名曰牛奶曰鼠奶曰鷄心曰鷄肝曰蓮花曰翻花曰蜂窩曰穿腸

曰外痔此九痔之名也總而言之毒深者則形大毒淺者則形小非形異而別有所感也醫家因證而名肛邊如鼠奶者曰牡痔肛邊一枚生瘡陷入者曰牝痔結核腸內脫肛出血者曰腸痔大便清血隨下如線而射者曰血痔腸口頻頻發癰出血痛痒者曰脉痔此五痔之名也俱以五痔散主之然醫痔以涼血爲主宜用槐角槐花生地和血生血以川芎當歸桃仁行氣寬腸以枳殼清熱以芩連山梔行溼以黃柏防已澤瀉潤燥以麻仁大黃疎風以秦艽荆芥下陷者以防風升麻提之

凡氣弱者以人參黃耆補之氣不順者木香檳榔和之若肛門腫痛便難強力則肛出不收者爲氣痔宜加味香蘇散飲酒則發者爲酒痔宜乾葛湯侵淫溼爛歲積月累蝕腸穿穴者爲蟲痔宜蝟皮丸黑玉丹熱痔宜黃連阿膠丸清心丸槐角丸槐膽丹溼熱痔加味連殼丸或四物湯合敗毒散風溼痔宜秦艽湯燥痔四順清涼飲風熱痔加味槐角丸加味地黃丸三神丸下血者芎歸丸苦參丸痛者止痛丸痒者黑玉丹腫硬者豚胃丸陰精損者腎氣丸補中益氣湯十全大補湯若兼下疳瘡或

莖中出白津乃肝腎不足之變證禁服寒涼瀉火之藥否則為害不小語者咸云十人九痔意者專指厚味嗜慾者而言也若夫奔走力役之人間一有焉故治此疾者不但藥餌之合證須確守禁戒方獲保全若恣欲如初與夫調養失宜多至成漏穿臀透腸終身苦楚醫無良法或惑於方士之弄巧塗抹毒藥腐爛而歎悔之何及要之大便作痛者則潤燥除溼肚門墜痛者則瀉火除溼小便澀滯者則清肝導溼已成漏者則養血補精愈不求速欲不妄作自是可安矣東垣謂痔漏乃溼熱風燥四氣而合丹溪謂痔病因風熱燥歸於大腸也前法皆本乎二先生之意各書所載之方固皆歷有神驗者未必盡中病者之機因是而模倣加減庶幾得之矣

良法治痔

良方

當歸

淮生

枳殼

連翹

槐角

右五味上槐角用黑牛膽製的為妙

升麻

黃芩

黃柏

黃連

陳皮

荊穗

右六味中

防風

地榆

右三黃冬天用五分夏用壹錢伍分秋用柒分上

味多用中減些下少用水貳鍾煎空心下遇發服壹貳貼即愈

又止痔痛

良方

用蜂房壹個燒灰存性入蜜壹匙加葱白自然汁壹匙調勻搽之

又方

良方

用大五倍子壹個內裝真輕粉叁分用黃泥封固令乾炭火燒紅取出入土內埋一晝夜取起爲末加冰片壹分研細敷之全愈

又用五倍子肆兩皂礬貳錢煎湯薰洗日三四次

內痔流血

良方

淮生

陸兩

山藥

肆兩

茯苓

叁兩

丹皮

叁兩

山茱萸

肉肆兩

黃連

肆兩

黃柏

叁兩

知母

貳兩

人參

貳兩

槐仁

叁兩

皂角

叁兩

當歸

貳兩

天花粉

貳兩

右爲末入雄猪臟內扎住兩頭又用糯米壹升煮半熟撈起入甑內將藥腸放飯中候腸熟乘熱同飯一小半搗爛爲丸

腸紅

良方

烏梅

壹兩

五倍子

伍錢

槐米

叁錢

枳殼

壹錢

黃連

炒 叁錢

地榆

貳錢

荆穗

炒 叁錢

白芷

壹錢 伍分

升麻

壹錢

甚者加百草霜棕灰共為細末酒下叁錢

熏痔

脫肛 同

五倍子

棉花核

右等分為末於淨桶內燒煙坐薰之一方煎湯熏

洗亦妙

五痔散

治五痔不拘內外冷熱牡痔倍鱉甲牝痔倍
蛭皮腸痔倍猪甲血痔倍蛇退脉痔倍蜂房

蹄甲

猪左 懸

露蜂房

鱉甲

蛭皮

各伍 錢

蛇退

壹條

右俱炒焦為細末每貳錢入麝香少許井水調服

加味香蘇散

治氣痔

陳皮

枳殼

川芎

槐花

各伍 分

檳榔

木香

桃仁

蘇莖

香附

甘草

各貳分 伍釐

右薑棗水煎服

膽槐丹

十月上巳日取槐角子揀肥嫩結實者用新黃瓦

盆二個如法固濟埋於背陰墻下約二三尺深預

先尋黑牛膽五六枚臘月八日取出裝在膽內高

懸陰乾至次年清明日取出新磁罐收貯空心滾

白湯下一日一粒二日二粒以漸加至十五日服十五粒止以後一日減一粒至三十日復減至一粒止如此周而復始治一切痔漏功效如神

乾葛湯

治酒痔腫痛流血

乾葛

枳殼

半夏

白茯苓

生地黃

杏仁

去皮尖各五分

甘草

炙或分伍釐

黃芩

貳分伍釐

右入黑豆壹百粒薑叁片白梅壹個水煎服

蛭皮丸

諸痔出血裏急疼痛欲成漏者

槐花

艾葉

炒黃

枳殼

地榆

當歸

川芎

黃耆

白芍藥

枯礬

貫衆

各伍錢

蛭皮

壹兩

髮灰

叁錢

猪蹄甲

拾個炙焦雄者佳

皂角

壹個醋炙

右爲末蜜丸如桐子大每服伍拾丸米飲下

黑玉丹

治男婦痔漏腸風疼痛

蛭皮

牛角腮

各捌兩

雄猪蹄甲

一百枚

雷丸

芝麻

各貳兩

槐角

叁兩

頭髮

敗棕

各肆兩

苦練根

貳兩伍錢

右俱入罐內燒存性取出

乳香

壹兩

麝香

肆錢

爲細末酒糊丸如桐子大先嚼核桃壹枚溫酒下拾伍丸日貳服甚者叁服忌別藥

痔瘡方

王九

傳

良方

用大鷄壹隻罩定不與食俟飢甚移於淨地上用猪胰子肆兩剉碎喂之令其放糞收如此三兩日積至肆兩晒乾入後藥

透明礬

肆兩

葉子雌黃

陸錢

膽礬

伍錢

朴硝

壹兩

雄黃

陸錢

右用砂鍋寬快者諸藥皆為粗末頭次下鷄糞壹兩放在鍋底次以明礬壹兩次以膽礬次以雌黃次以朴硝次以雄黃然後盡下明礬次加鷄糞於上以新磁器蓋鍋頂簇炭火煨青煙盡為度放冷

取出鉢中乳碎入乳香沒藥各半兩同研極細瓶內收頓用藥時令患者側臥縮一腳不論痔之大小及在腸貼肉有漏無漏者用藥少許以津唾調勻敷之壹日叁五次壹夜壹貳次用藥之時先以溫湯拭淨方可敷藥庶得藥力透肉傳後黃水淋瀝不止最妙雖多不妨至叁貳日後痔自乾落儻硬煎湯頻洗瘡自脫腸自軟收上忌毒物酒色

附洗方

良方

枳殼

叁兩

朴硝

壹兩

當歸

荊芥

黃葵花

五倍子

各貳兩

川木賊

甘草

各壹兩

數味煎乘熱薰過仍洗雖年深痛不止者立止

黃連阿膠丸 治熱瀉血利及肺熱咯血

黃連 參二兩 赤茯苓 貳兩

右爲末水調阿膠壹兩和丸桐子大每服參拾丸

米飲下

清心丸 治諸痛痒瘡瘍皆屬心火此藥主之

黃連 壹兩 赤茯苓 茯神 各伍錢

右爲末蜜丸桐子大每服百丸米飲送下

槐角丸 治痔漏脫肛五種腸風下血等證

槐角 壹兩 地榆 黃芩 防風

當歸 枳殼 各捌兩

右爲末酒糊丸如梧桐子大每服參拾丸空心米

飲送下

痔瘡方 良方

當歸 上 淮生地 上 枳殼 上 升麻 中

連翹 上 槐角 上烏牛膽製極妙無有便如此用 黃芩 中炒

黃柏 中鹽酒炒 黃連 中鹽酒炒 陳皮 中 防風 下

荆芥 中 地榆 下 三黃寒天用伍分 夏用壹錢伍分 秋用柒分

右各味分上中下上多中減半下少每服水貳鍾

煎七分空心溫服遇發時就可服一二貼

加味連殼丸 治溼熱內甚飽食腸癖發為諸痔久而成瘻

黃連 壹兩

枳殼

厚朴 各伍錢

當歸 肆錢

木香

黃栢 各叁錢

荊芥 貳錢

蝟皮 壹個

右為末糊丸如桐子大每服叁拾丸溫水下

四物湯 方見掌疽條

敗毒散 方見疥瘡條

秦艽湯 治痔漏成塊下墜

秦艽

羌活 各壹錢貳分

黃耆 壹錢

防風 七分

升麻

麻黃

柴胡

甘草 炙各伍分

藁本 叁分

細辛

紅花 各少許

右水煎服

四順清涼飲

治血熱蘊結壅滯不通或一身盡熱或日晡肌熱或夜發熱皆血熱也

當歸

芍藥

大黃

甘草

右各等分水煎溫服

加味槐角丸

治痔漏通用及腸風下血

槐角

生地黄 各貳兩

當歸

黃耆 各壹兩

阿膠

川芎 各伍錢

黃連

條芩

枳殼

秦艽

防風

連翹

地榆

升麻 各壹兩

白芷 伍錢

右為細末蜜丸或酒糊丸如桐子大每服伍拾丸

漸至柒捌拾丸溫酒下

加味地黃丸

五痔滋陰必用之藥

熟地黃

黃耆

各壹兩伍錢

槐花

黃栢

杜仲

白芷

各壹兩

獨活

山茱萸

山藥

各捌錢

牡丹皮

茯苓

澤瀉

各陸錢

白附子

貳錢

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸空心米

飲送下

三神丸

治無酒色但飽食久坐成痔瘡

枳殼

皂角

煨

五倍子

炒

右各等分爲細末煉蜜丸如桐子大每服貳叁拾

丸溫水下

川歸丸

治痔下血不止

川芎

當歸

黃耆

神麴

地榆

槐花

各伍錢

阿膠

荊芥

木賊

髮灰

各壹錢

右爲末蜜丸桐子大每服五十丸米飲下

大苦參丸

方見脫疽條

豚胃丸

痔漏皆効

蝟皮

七錢

牡丹皮

黃連

各壹兩

槐花

貳兩

羌活六錢

右入猪肚內縫定煮爛去藥食肚如硬再服以患處軟方止或同藥為丸服亦可

止痛丸治痔瘡痛甚便燥者

羌活壹兩

大黃八錢

檳榔

木香

桂心

川芎各伍錢

郁李仁壹兩伍錢

右為末蜜丸桐子大每服參拾丸空心白湯下

橘皮湯憂思恐怒痔發腫痛大便難強努則肛脫

陳皮

枳殼炒

川芎

槐花炒各伍分

紫蘇葉莖

檳榔

木香

桃仁炒去皮

甘草炙

香附各貳分伍厘

右薑棗水煎服

五灰散治五種痔不問內外並宜服之

鱉甲

治牡痔

蝟皮

治牝痔

蜂房

治脉痔

蛇蛻

猪左足懸蹄甲即猪蹄上不著地爪也

右燒灰存性各等分與病相合者倍之新汲井水

調貳錢空心臨臥服

芎歸丸治痔下血不止

川芎

當歸

黃耆

神麴

地榆

槐花炒各伍錢

阿膠炒

頭髮燒灰

荊芥

木賊

各壹錢 伍分

右爲末蜜丸桐子大每五十丸食前米飲湯下

槐花地黃丸

治五痔臨陰必用

熟地黃

壹兩 六錢

乾山藥

山茱萸

各八錢

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各六錢

槐花

黃柏

杜仲

白芷

各壹兩

獨活

八錢

黃耆

壹兩 伍錢

白附子

貳錢

右爲末蜜丸桐子大每服五十丸空心米飲下

七聖丸

治大腸疼痛不可忍王叔和云積氣生於腸臟傍大腸疼痛陣難當但令稍瀉三二焦火莫慢多方立紀綱

羌活

壹兩

大黃

八錢

檳榔

桂心

木香

川芎

各伍錢

郁李仁

湯浸去皮尖另研壹兩伍錢

右除郁李仁另研其餘共爲細末煉蜜爲丸如梧

桐子大食前服每服叁五十九丸白湯下取微利則

痛止不可多服

秦艽白朮丸

治痔漏有膿血大便硬燥疼痛不可忍

皂角仁

燒存性

桃仁

去皮尖另研

秦艽

各壹兩

歸稍

酒浸

澤瀉

枳實

麩炒黃色

白朮

各伍錢

地榆

叁錢

右爲細末和桃仁泥再研勻麵糊爲丸如芡實大務要丸得光潤焙乾每服五六十丸空心白湯下

卽用飲饌壓之忌生冷及酒溼麵大辛熱之類

皂角刺丸

治脉痔痛而復痒

防風

槐花

各七錢伍分

蛇床子

白礬

枯

白蒺藜

炒去刺

槐角子

各叁錢

羌活

伍錢

蜂房

炒焦

五倍子

枳殼

炒各伍分

皂角刺

貳兩燒灰存性

右爲末醋調菜荳粉煮糊爲丸如桐子大每服五

十丸空心以苦練根煎湯下仍用熱童便入白礬

末澆洗肛門

鉤腸丸

治脉痔痛或痒時有膿血

枳殼

炒麩

附子

炮去皮臍

訶子肉

各貳兩

白礬

煨

綠礬

枯

括蕒

實貳個燒存性

蛻皮

貳個剉罐內燒存性

白附子

半夏

湯洗

核桃肉

拾伍個燒灰存性

南星

鷄冠花

剉碎炒各伍兩

右爲細末醋糊丸如桐子大每服叁五十九空心

臨臥酒下

皂角煎丸

治腸痔生核往來寒熱

滿尺皂角

叁尺去弦核醋煮

蛻皮

壹兩炙黃

白礬

壹兩煨

猪後垂蹄甲

拾枚燒灰存性雄者佳

桃仁

浸去皮炒

川芎

甜葶藶

炒焦

桔梗

各伍錢

薏苡仁

白芷

各壹分

右爲末煉蜜丸如桐子大每服五十九桑白皮煎

湯下仍以藩籬草根煎湯熏洗

荆芷湯

治氣滯發痔

荆芥穗

枳殼炒

槐花

紫蘇

香附子

甘草炙各等分

右爲末每服貳錢空心米湯調下

直指收痔丸

治諸痔通用

好阿膠炒

黃連

貫衆各伍錢

蛻皮炙焦

蜂房炒焦

蛇皮略炒

皂角刺略炒

當歸

川芎

槐花

尺長皂角去核醋炙

穿山甲

微火燒焦

猪後蹄懸甲

燒存性雄者佳各貳錢伍分

右爲末醋糊爲丸如桐子大每服七十九空心荆

芥煎湯下

無比丸

治一切痔

象牙屑

血竭各伍錢

沒藥

乳香

明雄黃

另研

明硃砂

各叁錢叁分

蜂房

炒

蟬退

牙皂莢

去皮弦炙各叁錢

右爲末用好黃蠟貳兩溶化布濾淨再入酒內煮化冷定再化和勻前藥急手爲丸如桐子大每服空心熱酒浸壹錢伍分嚼下本酒吞送七日効

藥肚

治痔

槐花肆兩

皂角刺壹兩 胡椒拾粒

川椒壹兩

右用獾猪肚壹個入藥於內扎定口煮熟去藥空

心食猪肚

四物解毒湯痔頭向上是大腸熱甚收縮而上者

枳殼 白朮 槐角 秦艽

右各等分用水煎服

槐角地榆散治五種痔瘡

槐角四兩 地榆 黃芩 當歸

防風 枳殼 生地黃 茯苓

雄黃 白礬 寒水石炒過 文蛤各貳兩

熊膽貳錢 牛黃壹錢 片腦貳錢

右為末入瓶內黃蠟封口不可泄氣用時看瘡大小大者參錢小者貳錢以滾湯貳碗入新瓶內包好重湯煮滾將瓶對瘡口薰之待溫傾出小鉢內

薰洗七次其瘡自愈

椒子散治痛痔

川椒子為末摻少許綿花片上放患處坐可止痛去痔法

痔在內先用草烏末津唾調搽肛門其痔自然翻出向外先用花蜘蛛絲纏定一時辰後略覺脹急

亦好忍不甚痛少頃愈覺輕鬆卻用大黑蜘蛛於瓶中煨枯為末唾津調搽漸覺發痒以熱湯洗之再搽則痒定矣如此七日痔枯無患

獨葉丹 治蟲痔

用桃葉貳拾片杵爛塞糞門即愈

寸金散

端午日取大蜈蚣壹條竹簽陰乾臨剪一寸煨存性桐油調塗輕則不發重則次年對周又發剪一寸煨塗斷根

蜈蚣油

生蜈蚣數條浸麻油內俟生微略熬化塗治甚効

瘡癰通治

神効散

凡富貴之人多因嗜慾飲酒過度喜怒不常致生痔漏或如鼠竅連珠或肛門腸腫流膿血其痛如割不可忍及諸腫痔漏與腸風下血此藥治之無有不効

苦參

川椒

苦葫蘆

芫荽子

槐花

枳殼

金銀花

小茴香

荊芥

白芷

椿樹皮

威靈仙

連翹

獨活

牡蠣煨

麻黃各壹錢

右加葱白參莖水五碗煎五七沸去渣以盆盛之

坐上薰洗甚効 一方加老黃茄貳個

五倍子湯

五倍子

朴硝

桑寄生

蓮房

荆芥

各等分

右煎湯先薰後洗

槐花散

槐花

荆芥

枳殼

艾葉

右以水煎入白礬量許先薰後洗

茄柯湯

治外痔如蓮實鼠妳疼痛之甚掃上即止

茄柯

槐花

各用陳者尤佳

冬瓜皮

枳殼

各等分

右煎湯先薰後洗洗後以真熊膽不拘多少以新

汲水調濃鷺翎掃之

蓮房枳殼湯

洗痔極効

乾蓮房

荆芥

各壹兩

枳殼

薄荷

朴硝

各伍錢

右爲粗末水參碗煎貳碗半熱薰洗

獨韭湯

薰洗最効

韭菜不拘多少先用盆盛熱湯盆上用木蓋壹個

畱一孔投韭菜於湯中卻以穀道坐對蓋竅令熱

氣熏之候溫用水洗瘡不數次腫消血止

東瓜湯

用東瓜皮一味煎湯熏洗

七物湯

薰痔最効

皂莢

判三錠

艾

把壹

鱉甲

判壹枚

草烏

貳個

乾蝦蟇

判壹個

雄黃

錢伍

麝香

分伍

右爲末拌勻穿地上一穴置炭火在內上用蓋密

惟畱一孔旋入藥末一撮在上薰

羊甲散

羊前蹄甲

防風

皂角

蛇床子

蓮蓬殼

杜仲

仙靈皮

遠志

魚腥草

右煎湯熱薰洗一日兩三次方可

獨菊湯

孩兒菊一味每次約用伍錢用河水入砂礮內煮

二十滾取於小盆內先熏後洗如此五六次其腫

自消矣

乳沒散

乳香沒藥血竭各等分爲末葱根鬚鷄子清共搗

如泥將薄磚一片置火箱上前藥鋪在磚上下用

火烘熱藥之周圍作布圈一個四固藥氣用草紙

墊定瘡洗淨坐於藥上薰過三炷香痔蟲自出如

此三次

蓮房湯

朴硝

荊芥

防風

五倍子

蓮房

枳殼

甘草節

地榆

右各剉碎煎湯薰洗

神茄湯

用老茄子九個面東斜切口念呪赫赫陽陽日出東方神茄到處痔漏消亡用茄煎湯以小腳盆一個用一盞蓋上開一竅對肛門坐於上薰之待水稍溫卻於盆內趁熱洗之直待水冷方止

莧菜湯

馬齒莧

螺螄

右先用馬齒莧煎湯洗次用螺螄活搗敷瘡紙封口空心以鹽湯調下枳殼末壹貳錢濯洗七方

- 一用黑礬炒裝入青布口袋夾在肛門
- 一用五倍子熬水洗
- 一用皮硝末熬水洗
- 一用韭菜熬水洗
- 一用芹菜熬水薰洗
- 一用苦葫蘆熬水洗

一用無花果葉熬水洗

雄黃散

雄黃分伍

沒藥

明淨參錢伍分

五靈脂

去石燒過斷煙

五倍子

泡過各壹錢

白礬

半熟半生共貳錢

右爲細末研令極細貼瘡口

寸金錠子

治痔

藤黃

硫黃

雄黃

雌黃

輕粉

粉霜

砒霜

麝香

黃丹

各壹錢

牡蠣粉

紅藤根

乾漆

各伍錢

右爲細末研勻煮陳米飯和搗爲丸如棗核大每

用壹丸入肛門中深二寸許吸住預用新磚敲成

圓毬貳個炭火燒赤醃醋中蘸過綿裹壹個於肛

門熨之兩丸互換來日大便下臭敗惡物除根

二子散

治大腸熱腫

木鱉子

五倍子

右各等分研細末調敷

水銀棗子膏

治蟲痔痒痛不止

水銀

壹兩

棗肉

貳兩

右和研水銀不見星捻如棗狀薄綿片裹納肛門

中明日蟲出若痛加韶粉參分

消痔千金散

搽大便諸痔腫痛不已

孩兒茶

分伍

冰片

分半

熊膽

分貳

甘草

分叁

赤石脂

黃連

分各叁

寒水石

分伍

硼砂

分壹

右爲細末猪膽汁調搽或入膽內用竹管套在膽

皮中以線縛口緊插入肛門內捫之自然痔愈

熊膽膏

治痔極効

熊膽

分伍

冰片

分壹

右細研末井花水調鷄翎掃痔上

猪膽膏

治痔

猪膽

七枚取汁

右用粗碗盛炭火熬成膏以單紙攤敷先用槐根

白皮煎湯洗痔後敷藥

治延肛痔瘡如神

良方

野菊花

錢伍

荊芥

兩壹

黃連

兩壹

枳殼

兩壹

猪牙皂角

兩壹

右藥絞碎煎滾湯用瓶盛了坐在瓶口上薰洗貳

叁次卽愈

拔毒散

敷痔腫痛

大黃

黃栢

白芨

石膏

黃芩

黃連

白斂

梔子

朴硝

右各等分爲末用井水調塗患處

蝸牛膏

敷痔極効

蝸牛壹枚

負殼有角者

冰片

麝香

各少許

右以腦麝研細入蝸牛內以磁器盛次早蝸牛自化取汁敷痔上

去毒散

爛痔

血餘灰

叁分

孩兒茶

貫連

血竭

乳香

各伍錢

蜂房

叁分

膽礬

壹分伍厘

黃丹

叁分

沒藥

伍分

鷄內金

燒灰壹分

右爲末先將葱鹽熱湯洗淨敷患處三五次愈

田螺津

右用田螺壹個做一泥團放田螺在內微露靨在外乘露水一宿將靨挑開入信枯礬少許露三四宿其螺肉皆化爲水點於瘡上其冷透腹者爲妙

七蚰丹

用蜒蚰七條搗爛敷瘡上妙

羊臍散

羊臍頭壹個裝皮硝在內繫緊兩頭用陽城罐仍用鐵絲丫髻放在內上用壹釘橫在罐口將鐵線

繫臟掛在內用油盞蓋口鹽泥固封火煨過取臟
 硝并滴下汁共研爲末先用槐柳枝防風荆芥川
 椒煎湯洗淨搽上藥末貳叁遍卽消如不消用雄
 猪左蹄懸甲切碎放在瓦上燒置於淨桶內蓋上
 畱一孔將患處薰之再搽前藥貳叁遍卽好
 膽麝散

熊膽 貳分

麝香 半分

黃連 叁錢

右爲細末水調敷患處先用花椒艾葉防風荆芥
 湯洗淨

地榆散 治痔瘡腫痛主方

地榆

黃耆

枳殼

檳榔

川芎

黃芩

槐花

赤芍藥

羌活 各壹錢

白歛

蜂房

甘草 各五分

右作一服水二鍾煎至一盞食前服

治痔主方

人參

黃芪

生地 涼血

川芎

當歸 和血

升麻

條芩 涼大腸

枳殼 涼血生血

黃連 等分

右以水煎或作丸亦可

黃耆葛花湯 治腸中積久熱毒痔痿下血疼痛方見

痔漏條

腸紅下血痔血

驗方

白芷

防風

生地

荆蕙炒黑

當歸

黃連

升麻

枳殼

山梔炒黑

右各等分水煎空心服

治痔瘡立効方

良方

收荔枝草即天麻蒂陰乾揉碎入大五蓓子內煨過存性爲末加輕粉三分和勻先用枳殼四兩煎湯洗過敷上先要包好陽勢不然此藥氣能令

發腫

神繭散

用蠶繭入男子指甲以滿爲度用童子髮纏裏燒灰存性蜜調敷之

一方翻花痔用荆芥防風朴硝煎湯洗之次用木鱉子鬱金研末入龍腦些少水調敷之若有熊膽和勻貼之尤妙

一方用白鷄膽叁枚取汁熊膽貳分伍厘片腦半分共研一處磁罐內收藏勿令泄氣用時以手指搽立効

礬驚散

土礬末

貳錢

木驚子

七個取仁研

右以水煎熏洗貳叁次如肛門熏熱以朴硝末水調淋之

痔瘡方

良方

用蜂房壹個燒灰存性入蜂蜜壹匙加葱白自然汁壹匙調勻搽上二三次止痛

又洗藥方

良方

用五倍子四兩皂礬貳錢煎湯薰洗一日三二次為妙

千金散

良方

專點內外痔瘡枯藥

白礬

叁兩

赤色信

壹兩研細

先將信置鍋底攤如餅大次用礬末蓋之火煨乾取出再以猛火中煨紅取出加辰砂壹錢乳香沒藥各壹錢

右共為末如用以唾津調稀塗痔上以紙封之日上二次至五日止藥十日自潰脫以生肌散敷之又藥條即此藥麵糊為之插入管内更用手法

花蛛散

良方

點內外痔

用蜘蛛不拘多少煨存性為末加冰片輕粉熊膽

枯礬

右爲末猪膽調塗痔上漸消先宜薰洗

痔漏第六十二

痔瘡綿延不愈溼熱鬱久乃穿腸透穴敗壞肌肉銷損骨髓而爲之漏焉久則內如稿白外如黑腐消涓流水如泔而稀初是溼熱久成溼寒

又有無痔之人肛門左右別生一竅流出膿血名爲草漏及原有痔漏肛邊別生一塊作膿穿痔孔而出乃食積注下宜服連魏散

大抵此患與諸毒成漏者俱宜大補氣血以大劑參耆芎歸白朮爲主及涼血清熱燥溼宜牽牛酒加味槐角丸臙頭丸枳巴丸連歸丸久則黑玉丹釣腸丸苦參丸蠟礬丸薰洗用齒髮散蜂房散平肌塞竅若久而成管必用毒藥腐爛而後新肉可生苟壯年酒色不慎晚歲氣血已虛潰而不合膿血愈多孔竅愈大元氣愈虛因至不起豈非弄巧成拙歟與其潰爛而死盍若保養以苟延歲月爲愈也患此者宜自斟酌業醫者當弗圖僥倖可也

連魏散

治食積痔漏

黃連

阿膠

山查

神麴

桃仁

連翹

槐角

犀角

右各等分爲末以少許置掌中時時舐之津液嚥下如參分消貳卽止不用

附子餅灸法

治癰瘡神効

附子爲細末以當歸汁作餅照瘡口大如錢厚置於瘡口艾炷大小亦如之灸令微熱乾則易之不可令痛若覺困倦次日再灸以肉平爲効仍貼養氣血膏藥

白附子餅灸法

用白附子爲末每壹錢用人頭上篋泥壹分作餅子如銅錢厚者貼患處量其漏罪大小用艾火灸之將痛取去另換又灸以四五艾爲止多則明日又灸看其生肉欲滿就將膏貼之

牽牛酒

治大腸渣滓自漏瘡中流出

黑牽牛末壹分入猪腰子內以線扎蓑葉包慢火煨熟空心細嚼溫酒送下

加味槐角丸

方見痔瘡條

臍頭丸

槐子

壹兩

牙皂

七分

黃連

四兩

糯米

壹升

右爲末用雄猪大腸壹條去油洗淨將藥入內兩

頭扎住砂礮內煮爛搗丸桐子大每服六七十丸
米飲下

連歸丸

痔漏及脫肛便血

當歸

全用

酒黃連

各四兩

防風

枳殼

各貳兩

右爲末用前浸黃連酒麵糊丸桐子大每服六七
十丸米飲下

黑玉丹

芎歸丸

苦參丸

方俱見痔瘡條

加味蠟礬丸

治新久諸漏

象牙

錢五

露蜂房

殭蠶

蛇蛻

血竭

木香

各叁錢

乳香

貳錢

白礬

貳兩

右爲末黃蠟四兩爲丸桐子大溫酒下貳拾丸

齒髮散

治漏瘡惡瘡生肌

人齒

頭髮

鷄臍脰

右各等分俱燒存性入麝香輕粉各少許爲末乾
摻乾者麻油調搽

蜂房散

治年久漏瘡或暫瘡復發或移於別處

露蜂房

炙黃叁分

穿山甲

龍骨

各壹分

麝香

少許

右爲末臘月猪脂調敷溼則乾摻

骨碎補丸

治瘻瘡

骨碎補

補骨脂

熟地黃

當歸

續斷

石楠

石斛

牛膝

杜仲

革薢

附子

白芍藥

川芎

兔絲子

沙參

羌活

防風

獨活

大麻

黃耆

右等分爲末蜜丸桐子大空心鹽湯下與大倮丸

間服

大倮丸

治瘻瘡

羌活

防風

細辛

附子

甘草

川芎

續斷

白芍藥

白朮

當歸

桂心

麻黃

黃耆

熟地黃

右等分爲細末蜜丸桐子大空心鹽湯下與骨碎

補丸間服

秦艽蒼朮湯

治痔核已破

秦艽

桃仁

去皮尖另研

皂角仁

燒存性各壹錢

蒼朮

米泔浸

防風

各七分

黃柏

酒洗五分

歸尾

酒浸

澤瀉

各叁分

檳榔

貳分另研

大黃

少許雖大便秘澁亦不可多用

右除檳榔皂角仁桃仁三味另研外餘藥細切作

壹服水參盞煎壹盞貳分去楂入檳榔等參味末
 子再上火煎至壹盞空心熱服少時以美膳壓之
 不犯胃氣也服藥日忌生冷硬物及酒麵大料椒
 薑等物若犯之其藥無効有膿者加白葵花頭五
 朶去萼心青皮五分入正藥中同煎木香參分爲
 細末同檳榔末入古人治此病多以歲月期之惟
 此藥効速

秦艽羌活湯

治痔漏成塊下墜不任痛痒

秦艽

羌活

黃耆

防風

各八分

升麻

甘草

炙

麻黃

柴胡

各五分

藁本

分

細辛

紅花

少許

右水貳鍾煎七分忌風寒房事

代赭石丸

治痔變漏膿血不止

代赭石

醋煨
滓研

磁石

煨者米醋數
沸滓七次研

枯白礬

牡蠣灰

龍骨

研

皂角刺

炒焦

蝟皮

炙焦

赤石脂

川椒

焙

木賊

焙

蜂房

炒

猪蹄

後左懸甲燒
灰存性爲末

右各等分爲細末神麴麵糊丸小豆大每服五十

丸空心艾湯下

金寶膏

漏瘡用之能去腐肉而不傷良肉

桑柴灰

五碗用沸湯拾碗淋汁以草紙壹層皮紙貳層墊箕底次放灰於上面淋洗

穿山甲

貳兩

信

壹錢另研

辰砂

壹字

粉霜

壹錢伍分

杏仁

七枚去皮同信末研塗穿山甲

麝香

伍分

右將灰汁澄清下鍋煎滾下甲末候煎乾一半下

麝香次下粉霜乾及九分下辰砂候成膏下石灰

以成塊為則磁罐密封不可見風

秦艽當歸湯

治痔漏大便結燥疼痛

大黃

煨四兩

秦艽

去蘆

枳實

各壹錢

澤瀉

歸尾

皂角仁

白朮

各伍分

紅花

少許

桃仁

貳拾個去尖細研

右咀咬作壹服水參盞煎至壹盞食前服

秦艽防風湯

治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏也此藥主之

秦艽

防風

歸身

白朮

各錢半

甘草

炙

澤瀉

各六分

黃柏

酒洗五分

大黃

煨

陳皮

各叁分

柴胡

升麻

各貳分

紅花

少許

桃仁

叁拾個去尖另研

右水參盞煎壹盞稍熱空心服避風寒忌房事酒

溼麵大辛熱之物

家傳神異散

治痔漏良方

乳香

定痛

沒藥

定痛

牛黃

消痔毒

冰片

收水止痛

熊膽去火毒藥毒

朴硝霜消痔除硬

青魚膽涼心透膽黃連清涼臟毒

黃栢消餘腫

赤石脂生皮

孩兒茶涼血解毒藥毒

輕粉去舊生新

白占滋潤肛門

右前十二味為末後一味入麻油少許熬化再入

前藥十二味藥料煎成膏貼之

當歸郁李仁湯

治痔漏大便硬努出大腸頭下血苦痛

郁李仁

皂角仁各壹錢

枳實七錢

秦艽去蘆

麻仁

歸尾

生地黄

蒼朮各五錢

大黃煨

澤瀉各叁分

右除皂角仁為末用水參盞煎壹盞入皂角仁末

和勻空心服避風寒忌酒色麵辛溼熱

紅花桃仁湯

治痔漏

黃栢壹錢伍分

生地黄壹錢

蒼朮六錢

澤瀉八錢

當歸稍

防風稍

猪苓各五分

漢防已

桃仁十個去尖

麻仁貳分

紅花少許

右水參盞煎壹盞溫服

六灰丸

穿山甲

羊角皮

猪懸蹄甲

黃牛角腮

人頭髮

刺蝟俱燒灰各叁錢

牛黃

麝香各壹錢

黃耆

當歸各壹兩

生地黄

人參各伍錢

硃砂參錢另研

雄黃貳錢另研

右爲末煉蜜丸如棗大硃砂爲衣空心酒下參拾丸壹月見効

川練蝟皮丸

蝟皮煨存性

雷丸壹錢皂角洗燒灰存性

川練白皮

黑芝麻炒黑

槐角子煨存性各伍錢

男髮自魚水浸煨存性七分

乳香貳錢

牛角腮童便浸七次煨存性壹兩

麝香貳分

雄猪前左腳懸蹄甲

四十九個童便浸七日煨存性

右爲末煉蜜爲丸如桐子大空心胡桃肉壹個細嚼同酒服拾丸弱者柒丸服過貳兩見効

臍連丸

黃連末四兩

雄猪大臍貳尺人糯米半升在內煮熟

右去臍將米飯和黃連末爲丸如棗豆大空心服五十丸白湯送下

黃耆葛花丸

黃耆

荳花黃赤小者

生地黃焙

葛花各壹兩

大黃

赤芍藥

黃芩

當歸各叁錢

蝟皮壹錢

白蒺藜

皂角子仁炒

檳榔各伍錢

右爲末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸至叁拾丸煎桑白皮湯或茴香槐子湯下

槐角丸

治痔瘻

槐角

當歸

地骨皮

蝟皮炙

右各等分爲末滴水丸每服貳叁拾丸食前溫水
下一日三服

連腸丸

痔漏遠年不愈者先以鷄子七枚每枚輕輕破頂

上一孔入明礬壹分飯內煮熟清晨食壹枚始用

後方

黃連

八兩

枳殼

六兩

甘草

四兩

雄猪大腸

壹副

右叁味爲末將猪腸切數段拌勻慢火煮壹日以
其汁拌糯米壹升大麥仁壹升炒熟同熟腸搗爛

爲丸如梧桐

子大每日卯午戌時白湯服壹百

伍拾丸忌燒酒

鯽魚散

鯽魚壹尾去腸入滿白礬瓦上燒存性爲末用鷄

翎蘸藥敷之立効

平肌散

黃狗頭骨

亂髮

穿山甲

各燒灰

右各等分爲細末瘡溼乾摻瘡乾津唾調敷

薰洗痔漏

五倍子

朴硝

桑寄生

蓮蓬殼

右以水煎先薰後洗

一方苦絲瓜綠礬等分煎湯薰洗

一方木鱉子五倍子為末調敷

洗藥 良方

苦參

當歸

荊芥

瓦花

鳳尾草

食鹽

地骨皮

右煎湯薰洗次以花蛛散敷之

內痔脫落腸頭不收 良方

蜜陀僧

枯礬

海螵蛸

黃栢末

百藥煎

冰片 少許

輕粉 各等分

右為末香油調塗以綿紙封之日換二次漸收

五煙神丹 治年久不愈惡瘡成癰百藥不効者此為神方

石膽

丹砂

雄黃

礬石

磁石 各壹兩

右為粗末用有蓋大瓦盆壹個裝五藥於內燒參

日叁夜取盒蓋上煙津以鷄翎取之注瘡內則惡

肉朽骨盡出而愈

藥線治法 若外痔并漏囊癰懸癰腎癰

芫花入土根

不拘多少搗自然汁於銅鉢內慢火熬成膏以生絲線入膏再蒸良久膏

濃為度浸線取起陰乾膏畱後用

一治外痔有頭者以藥線繫之候痔焦黑落下再用
綿裹猪鬃蘸藥膏納於竅中永不發

治痔漏神効方 良方

樵子 七枚 爲末 猪蘆肝 貳片 荔枝 七枚連核 燒存生

右用皮硝貳錢淹猪肝切碎炒燥爲末和勻二藥
每服貳錢好酒送下

生肌散

龍骨 壹兩 火煨 訶子 炮取肉 叁錢

右爲細末加輕粉叁錢和勻先洗瘡拭乾敷上每
日二次

秦艽蒼朮湯 良方 治腸 內外痔漏膿血不止神効忌 腥房事

桃仁 皂角 秦艽 蒼朮 各壹錢

澤瀉 伍分 黃栢 叁分 檳榔 伍分 木香 叁分

地榆 伍分 白朮 伍分 當歸 壹錢 白蜀葵 叁錢

芍藥 叁分 大黃 少許 枳殼 伍分 槐角子 伍分

右爲末將木香桃仁皂子別研用水貳鍾煎至七
分再添水壹鍾煎至六分空心溫服經年不過三

服應効如神

治腸紅痔漏 良方

甘草 伍錢 陳皮 壹兩 芍藥 壹兩 伍錢 白茯苓 壹兩

白朮

炒壹兩

生地

壹兩

黃柏

伍錢

山梔

伍錢

黃連

炒伍錢

知母

炒壹兩

地榆

炒壹兩

防風

伍錢

荊芥穗

錢伍

升麻

錢伍

當歸頭

壹兩去蘆炒

黃芩

炒伍錢

以上共爲細末蜜爲丸如桐子大每服五六十丸
鹽湯空心下

股疽第六十三

大股之內陰囊之側生毒在左爲上馬癰在右爲下
馬癰在肛門旁爲肚門癰俱屬足三陰厥陰經溼
熱七情憂憤所致宜內補黃耆湯內托羗活湯十
全大補湯及丹散等劑如通治法

大抵瘡瘍初發必腫痛氣血鬱積蒸肉爲膿其痛宜
也潰膿之後腫散肌寬故痛則漸減若痛還不止
是氣血不足宜大補之丹溪河間有虛甚之說
腿外側胯下生疽名伏兔發寒熱大作疼痛無頭屬
足陽明胃經早治爲上隔蒜灸灸而炮起者易治
急服活命飲加牛膝木瓜防已及紫金丹汗下之
毒在下部藥氣難達勢重者砭患處去毒血仍服當
歸拈痛湯虛者大補之

骨疽第六十四

疽發於骨之外皮肉全無赤腫者謂之附骨疽俗稱

貼骨癰外因風露寒溼所侵內因醇酒厚味所注與積痰瘀血相搏而成初起痛不能展側寒熱無汗宜青草蒼栢湯得微汗便可愈不効則掘地坑以火燒紅沃以小便令患人赤體坐於坑上使熱氣薰蒸腠理開則血氣通暢而愈矣

如再不効經久寒鬱爲熱因而便秘者漏蘆飲子主之若體弱不敢用下劑者須分經內托在尻

音考
臀肉尖

也宜內托羌活湯腿內近膝股蔓腫木硬者內托著柴湯腿外者內托酒煎湯左腿外側蔓腫長濶行走作痛以手按至骨大痛者黃連消毒散通用

檳蘇散敗毒散漫腫作光色者三生散或以神應膏爲丸如梧子大每服叁拾丸溫酒送下

丹溪云附骨癰熱在血分之極初起時但以青皮甘草節治之破後當養血此確論也

夫疽而發於附骨者因風邪搏於骨髓也故其痛於徹骨先以青皮行氣甘草節消毒繼而養血誠萬全之法也但膿成便當鍼刺若待全熟則內潰益甚收斂愈難矣潰後用平肌散或狗頭骨燒煙熏之亦是良法因併記之若起於伏兔

伏兔

穴在腿外膝
蓋上六寸

青草蒼栢湯

治環跳穴痛不已

蒼朮

黃栢

各叁錢

青皮

壹錢伍分

甘草

伍分

右水煎入薑汁少許調服虛者加牛膝壹錢夏加

黃芩八分冬加桂枝五分痛甚無汗加麻黃貳分

漏蘆飲子

治一切惡瘡腫毒丹癰癰瘰癧疔瘡魚腭五發癰疽目翳吹妳初起如傷寒表裏證具

者宜服

漏蘆

白斂

黃芩

麻黃

枳實

升麻

芍藥

甘草

朴硝

各伍分

大黃

壹錢

右水煎熱服

內托羌活湯

方見醫癰條

肉托蒼柴湯

治足太陰厥陰經分瘡生腿內近膝股或癰或附骨疽初起腫痛勢大

黃耆

貳錢

柴胡

壹錢

羌活

伍分

連翹

壹錢伍分

歸尾

七分伍厘

肉桂

叁分

生地黃

黃栢

各貳分

土瓜根

酒洗壹錢

右水貳盞酒壹盞煎熱服貳服即效驗過

內托酒煎湯

治足少陰經分癰生腿外側或因寒溼得附骨疽或微侵足陽明經分堅硬瘡

痛不能行

黃耆

歸尾

各貳錢

柴胡

壹錢伍分

連翹

肉桂

大力子

白芷

各壹錢

升麻

七分

黃栢

甘草

各伍分

右水酒各半煎服

黃連解毒散

方見療癰條

檳蘇飲

治風溼脚氣疎通氣道

蘇梗

香附

各貳錢

甘草

陳皮

檳榔

木瓜

各壹錢

右薑葱水煎

三生散

治附骨疽不辯肉色漫腫大痛

露蜂房

蛇退

頭髮

洗淨各等分

右燒灰存性研細酒下叁錢

神異膏

治諸般癰腫癰毒外科神藥人多忽之

香油壹觔入頭髮壹團鷄子大於銚中文武火熬

至髮枯入杏仁壹兩再煎枯黑濾去渣入黃耆柒

錢伍分玄參伍錢熬一二時久住火候火力稍息

入帶子蜂房壹兩蛇退伍錢以柳木不住手攪慢

火熬至枯黑濾去渣每淨油壹兩入黃丹五錢依

火候成膏

黃狗下頰方

治肚癰腹癰及腿上附骨疽此方治下部癰疽神効又可治發背

黃狗下頰連舌連皮毛劈下入罐鹽泥封固鐵器

蓋口煨一炷香煙清即止存性為妙視其骨灰正

黑者妙帶白則爲已過研細末加白斂末寒豆粉
參味各五錢爲率酒調空心服又將參味等分油
調敷患處其驗以出臭汗熟睡爲度此經驗過爲
下部神藥

平肌散

方見參藥條

多骨疽第六十五

瘡疽潰久不能收斂乃氣血不足兼之腎水素虧復
爲寒邪所觸患處之骨腫突而起日漸長高宜灸
以附子餅及葱熨法使寒邪祛散接補榮氣其骨
自脫仍內服十全大補湯腎氣丸亦有手背足背
等處腫硬一塊久而脫去一骨者均屬腎虛蓋腎
主骨也只宜用補中益氣湯腎氣丸則元氣漸復
骨出之後又服補劑若誤用尅伐之藥則真元愈
虛邪氣益甚鮮不至於危矣

十全大補湯

方見脫疽條

腎氣丸

方見掌疽條

補中益氣湯

方見掌疽條

取朽骨二法

取烏骨雞頸骨以上等砒霜實之鹽泥固濟火煨
通紅置地上出火毒去鹽泥將骨研細飯丸粟米

大以紙撚送入孔竅內外以膏藥掩之

石膽丹砂雄黃礬石磁石等分用瓦盒收貯於內炭火燒三晝夜啓開以鷄翎掃取蓋上煙灰注瘡內則惡肉破骨盡出

此卽痔漏條五煙神丹也

鶴膝風第六十六

鶴膝風者膝獨大而腿日瘦削如鶴之股故名多起溼痢後腳軟痛難行名痢風或傷寒餘毒不能發散風寒溼氣結於經絡及足三陰經虧損風邪乘之初起宜用葱熨法使之內消爲上否則內熱減食肌肉漸瘦肢體攣痛膝愈大則腿愈小凡有寒熱者宜五積交加散加烏藥殭蠶條忽發熱者無根虛火也十全大補湯大防風湯臍腹疼痛溺頻頭暈吐痰者八味丸發熱大渴而赤脉大血虛甚也歸蓍湯陰虛形瘦發熱者腎氣丸挾溼熱者蒼龜丸二炒蒼栢散食少面黃者六君子湯津乾中氣不足者補中益氣湯加五味子已潰者獨活寄生湯大防風湯膿清肌肉不生者八味丸慎勿鍼刺以致傷生

或曰膝腫痛非一端須要辨白若兩膝壅腫內外皆痛寒熱間作股漸細小膝愈腫大名鶴膝風急宜

隔蒜灸服大防風湯如前議湯藥若一膝引痛上下不甚腫而微紅名膝遊風宜聖授丹換骨丹防風通聖散加牛膝木瓜但膝之兩旁腫痛增寒壯熱晝夜偏劇腫處手不可近名膝眼毒膝蓋上腫痛爲膝癰二證宜服勝金丹紫金丹八陣散活命飲加牛膝

五積交加散

治寒熱身體重痛腰脚酸疼

卽五積散合人參敗毒散

大防風湯

痢後脚弱緩痛不能行履名曰痢風

熟地黃

防風

杜仲

薑汁拌炒斷絲

當歸

黃耆

白芍藥

各壹錢

附子

炮去皮

川芎

各七分

羌活

人參

川牛膝

酒浸

甘草

炙各五分

白朮

壹錢五分

右薑棗水煎空心服此方芎歸芍地以補血參耆

朮草以補氣羌活防風散風溼利關節牛膝杜仲

補腰膝附子行參耆之氣而走周身脉絡乃治氣

血兩虛挾風溼而成痿痺之聖藥豈直治鶴膝風

而已但不可以之治有餘也

二防飲

病後不謹致感寒溼或涉水履霜以致兩足痛痺如刀鏤虎咬膝臏腫大名鶴膝風用此

人參

白朮

黃耆

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

杜仲

薑汁拌炒

草薢

附子

熟各壹錢

防風

防已

羌活

牛膝

各七分

甘草

炙五分

右薑棗水煎空心服

歸耆湯

治虛火上攻頭目渾身胸背發熱

當歸

壹錢

黃耆

伍錢

右水煎服

蒼龜丸

治痢後腳弱漸小

白芍藥

蒼朮

龜板

各貳兩伍錢

黃栢

伍錢

右爲末粥丸如梧子大每服伍拾丸四物湯加陳

皮甘草煎湯下

蒼栢散

治一切風寒溼熱脚氣骨間作熱或腰膝臂

蒼朮

鹽炒

黃栢

酒炙各伍錢

右水煎服貳物皆有雄壯之氣如氣實加酒少許

氣虛加補氣藥血虛加補血藥痛加薑汁或爲末

爲丸皆可

丹溪歸地湯

治脚膝疼痛稍腫

生地

當歸

白芍藥

蒼朮

炒栢

各叁錢

木通

壹錢伍分

川芎

桂

各貳錢

右分作二貼煎壹盞服

換骨丹

通治風兼鶴膝

防風

牛膝

虎骨

炙酥

當歸

各壹兩

枸杞

貳兩伍錢

羌活

獨活

敗龜板

秦艽

草薢

杉節

蠶沙

各壹兩

茄根

貳兩

蒼朮

四兩

右浸酒飲或酒糊爲丸

還少丹

治足三陰經虛損患膝風證又補脾腎

肉蓯蓉

酒浸

遠志

甘草湯泡

茴香

巴戟

枸杞子

山藥

牛膝

石菖蒲

杜仲

熟地

五味子

白茯苓

楮實子

山茱萸

各等分

右爲末用紅棗同地黃打膏或加蜜爲丸酒下每

服百丸

脛疽第六十七

足小肚紅腫堅硬如石三四寸許大痛名黃鰓癰足

太陰與足厥陰二經溼熱或積怒所致宜五香湯

流氣飲加牛膝木瓜防已黃柏壯實者下之或萬

病解毒丹

足脛之間生瘡狀如牛眼或紫或黑膿水淋漓止處

卽爛名溼毒流注暴風急雨寒溼寒氣侵入腠理

所致宜防風通聖散加牛膝木瓜防已或當歸拈痛湯加牛膝

足小肚生疽寒溼煩燥何如曰此名腓肭發疽屬足太陰腎經腎水不足積熱所致宜活命飲加牛膝木瓜黃柏老弱人八珍湯加牛膝壯實者一粒金丹下之虛者補以腎氣丸

癰瘡第六十八

附腎風瘡

癰瘡或因磕損或因搔傷而成外癰屬足三陽內癰屬足三陰由溼熱下注瘀血凝滯且日逐步履裙風扇地女人名裙風褲口日午之後氣多下墜是

以經年不愈變而成頑相傳夾膏等方或効或不効蓋由氣稟與所感之不同也要之必因其人或屬陰虛或屬脾虛或屬陰火或屬肝火或脾氣下陷溼熱滯於下部必內服湯劑用升舉之法然後外貼膏藥則經絡調和皮膚自合

若慢腫作痛或不腫不痛屬三陰虛也或發寒熱俱宜八物湯十全大補湯

脾虛挾表邪者補中益氣湯加桔梗白芷

脾虛溼熱流膿口乾少食者補中益氣湯加白茯苓白芍藥晡熱加熟地黃炒黑黃柏挾怒氣加山梔

川芎有鬱者歸脾湯加山梔柴胡

若患處黑黯肢體惡寒飲食少思者屬肝腎虛敗宜八味丸內熱口乾者腎氣丸久不愈者大苦參丸腎臟虛風四生散黃耆丸若誤服攻伐之藥亦能殺人也

外治之藥仍宜分別內外膿外膿因風溼者洗以葱湯貼龍骨膏風熱者馬齒膏溼熱者蜜上膏血氣凝滯者小駐車丸加乳香少許摻之

內膿初起洗以鹽湯貼以蠟礬紙重者桐油膏痒甚者斬艾膏久不愈者內外膿通用爐灰膏點去瘀肉後貼黃蠟膏其他得効各方皆平時目擊有驗者併錄以俟取擇焉

大苦參丸 方見痔瘡條

黃耆丸 治腎臟虛風攻注手足頭面麻痺痛痒或生疥疥膿瘡癰腫

黃耆

烏藥

茴香

地龍

川椒

防風

川練肉

赤小豆

白蒺藜

海桐皮

葳靈仙

陳皮 各等分

右爲末酒糊丸梧子大每參拾丸空心溫酒下

龍骨膏

治外膿瘡

龍骨

乳香

蜜陀僧

沒藥

各貳錢

海鰮蛸

壹錢伍分

肥皂子

燒存性伍個

右清油調用綿紙作夾膏以鍼截眼縛貼瘡上隔日壹翻兩面貼之

馬齒膏

治參拾陸種風瘡多年惡瘡及癰瘡溼癬白

馬齒莧煎汁壹鍋澄去渣入黃蠟五兩慢火熬成膏塗瘡上

窑土膏

治外癰瘡

經年窑竈土或只用竈心土黃丹輕粉黃栢乳香沒藥赤石脂各等分清油調成膏用傘紙夾住茶過貼之以絹縛定縱痒不可動直待結痂方

揭未愈再貼

小駐車丸

黃連

六錢

乾薑

壹錢

當歸

貳錢

阿膠

叁錢

右爲末醋糊丸

桐油膏

治內癰

桐油

百草霜

黃丹

髮灰

鹿角灰

冷者方佳

乳香

各叁錢

右爲細末同熬成膏攤油紙上貼之血虛痛甚者猶宜如經年紫黑者先用爐灰膏去瘀肉

斬艾膏

治內癰

蘄艾

川椒

各伍錢

黃丹

參錢水飛炒

水粉

壹兩

輕粉

壹錢

右爲末熟麻油調膏隔紙貼之効

黃蠟膏

治內廉

香油壹兩入胎髮如梅大先熬化入白膠香黃蠟壹兩溶化後入生龍骨赤石脂血竭三末各壹兩攪勻候冷磁器收貯每用捏作薄片貼瘡上外以絹帛縛之三日後翻貼外面又以活血藥煎湯洗

四生散

治廉瘡久不愈并風癰疥癩血風等瘡

白附子

真者生用黃耆

獨活

蒺藜

各伍分

右爲末以猪腰子不下水者批開入前藥溼紙包裏煨熟空心連腰子細嚼鹽酒送下

二蠟膏

上舍陶萬程傳稱神効

黃蠟

白蠟

各四兩

百草霜

燒雜草乃佳伍錢

銅綠

貳兩

右用香油拾貳兩慢火熬油至黑滴水成珠爲度先下二蠟熔盡次下銅綠百草霜不住手攪勻離火再攪候凝方止作隔紙膏用鍼勾勾刺眼兩面輪貼各叁日內服黃耆丸方見前

黃丹膏

黃丹

淘洗七次淨取壹兩伍錢

黃連

錢五

川芎

錢五

海鰮蛸

錢叁

輕粉

水龍骨

朝腦

錢各貳

右爲極細末以生桐油調爲膏夾紙做成着肉面
鍼刺數十孔第一日用二貼第二第三日用一貼
第四第五日用一貼第六七日以後三日換一貼
尚存如錢大一處不能收口以松香四兩葱頭一
把共搗爛置於碗中以滾白水衝下良久去水取
藥捻成餅貼瘡上尚有鍼細一孔流水不完取蒜
頭葱頭內第二層白皮貼三四日卽好此方有効

黃白膏

黃蠟

錢七

銅綠

分壹

輕粉

白石膏

分六

右用麻油貳錢伍分與蠟熬化入銅綠等三味將
油紙攤膏先一日以豆腐作片子甘草水煮候溫
封瘡口以布繫定次早去腐換骨

雙煉百草丹

羯羊糞

灰燒

百草霜

燒雜草者佳

水龍骨

輕粉

陳螺螄殼

各等分

右共爲末熟桐油拌勻作夾膏

龜甲散

用活龜壹個去肉以醃醋壹碗炙殼醋盡爲度仍

煨令白煙盡存性合於地下一宿火氣去盡每灰壹錢入輕粉麝香各半葱湯洗淨乾摻

蠟礬紙

治內臍如神

麻油貳兩川椒四十九粒在銅杓內文武火煎黑色取起又入壹寸長槐枝四十九根煎至黑枯取起乃入好黃蠟壹兩研細輕粉貳錢枯礬壹錢候溶化卻將綿紙照瘡大小剪拾貳塊四角用紙釘住投入油內滲透為度弗使紙黃欲用之時先將槐枝葱椒煎湯洗瘡淨將前紙貼上外用油紙包裹紅絹緊縛一周時揭起去近肉紙壹層十二日

揭盡瘡愈

七七膏

治臍瘡如神

嫩槐條

嫩柳條

各四寸九分

頭髮

壹尺長四十九條

川椒

四十粒

真輕粉

叁錢

黃蠟

壹兩

右貳條并髮燒灰存性輕粉研極細用香油貳兩煎川椒至焦黑濾淨入蠟放冷方入輕粉又入三灰攪勻將綿紙照瘡大小剪十二片以藥塗盡用黃栢荆芥煎湯洗瘡淨將紙重重貼上用布條縛住其痒不可當次日揭開仍以前湯淨洗去紙壹層又貼六日日去六層俱着肉者即愈此奇方也

寒水石膏

寒水石

火煨童便漬
參次壹兩

乳香

沒藥

淨黃丹

各伍錢
血竭
錢參

右為細末以生桐油調勻用厚實油紙入滾水中煮過置藥於中線縫定着肉之面鍼戳數罪冬青葉洗瘡淨貼上

爐灰膏

治一切無名腫毒惡瘡及外痔瘰癧兼除癰點痣有膿者去膿無膿者就散惟好肉及罪上忌用如點瘰癧去蟾酥加輕粉壹錢懼痛者加乳香沒藥各壹錢癰瘡只用灰膏不必

藥用

右用響糖爐內灰壹升半風化石灰壹升炒紅以

竹箕盛貯用滾湯參碗慢慢淋自然汁鍋內慢火熬如稀糊先下巴豆末次下蟾酥各貳錢白丁香末五分炒石灰壹錢攪勻再熬如乾麵糊取起以磁罐盛貯勿令泄氣每用時以簪頭挑少許口呵氣調勻如泥以鍼撥開患處點之

翠玉膏

方見癰疽條

一丹溪治癰瘡以白膠香黃栢軟石膏各壹兩青黛五錢龍骨五分為細末香油調敷患處
一方鴿糞煨過研細溼用乾摻乾用桐油調

白玉膏

良方
治癰瘡

蘆甘石壹兩白占五錢

象牙末叁錢

輕粉五錢將草紙轉炷火上燒

好雄猪板油七錢槌干餘下和同一處將確盛之
臨用以油紙作膏貼在患處神効

隔紙膏增

當歸

白芷

黃連

文鴿

雄黃

沒藥

血竭

海螵蛸

黃栢

厚朴以上各五錢

黃丹六錢

乳香貳錢伍分

輕粉壹錢

右爲末研勻用清油調成膏用油紙以藥油攤上

貼瘡以帛纏定有膿解開拭乾再貼如此數次而

愈貼時以鹽湯洗淨拭乾片時後貼

男子兩足瘙痒生瘡連年累月不愈名腎風瘡

黃芪

牛膝各五錢

羌活

獨活

川芎

防風

白附子

木香各貳錢半

白蒺藜去刺壹兩

右爲末煉蜜丸如梧子每服叁拾丸鹽湯下再用

後敷藥

檳榔

木香

防風

白芷各貳錢

白芨壹錢

龍骨伍分

麝香壹字

蛇退壹條

臈粉

壹兩 伍錢

右爲末研勻先以鱔魚壹條同百部壹兩花椒胡椒參錢油貳兩熬令得法去藥以油搽瘡口卻敷前藥末油紙裹之叁日壹換上藥時先用柳枝甘草煎湯淨洗拭乾片時敷藥

足瘍第六十九

足發

脫疽

腳氣瘡

天蛇頭 腳墊毒

嵌甲 足跗發 拍蟹毒

代指 足跟疽 掌心疽

足發之證屬足三陰經精血虧損或足三陽經溼熱下注若色赤腫痛而潰膿者屬溼熱可治若色微赤腫而膿清者屬精血虧損難痊若色黯不腫不痛不潰膿煩熱作渴小便淋瀝者陰敗未傳惡證也

溼熱下注用隔蒜灸法活命飲以解壅毒次服補中湯六味丸以補精血色黯黑不痛者着肉用桑枝灸以行壅滯更用十全大補湯八味丸壯脾胃滋化源多有得生者若專攻其瘡復傷元氣必致不起

○脫疽發於足指潰則自脫故名脫疽難治狀赤黑者死否則可治如見赤黑治之不効急去之同於大手指疽或云唯大指名脫疽其餘指名散疽易

治

治法初起熅毒以萬病解毒丸醋磨煖塗之未成腫痛者除溼攻毒更以隔蒜灸之仍用托裏消毒散隨十二經引藥或用人參敗毒散加牛膝金銀花白芷大黃或活命飲次以托裏輕者或作蛇傷及瘡氣治之不可令見黑色

薛云赤色作痛自潰者易治色黑不潰者不治蓋色赤作痛者元氣虛而溼毒壅盛也先以蒜隔灸次活命飲托裏散次用十全湯加減八味丸自効色黯不痛者腎氣敗而虛火盛也亦用隔蒜灸桑枝灸次用十全湯加減八味丸則毒氣不致上侵元氣不致虧損庶可保生其有因修手足口咬者唯避湯火風毒服藥自愈

五神散

搽一切蛇蝎傷瘡毒氣

金線釣葫蘆

紫河車

各貳錢

續隨子

去殼

雄黃

各壹錢

麝香

少許

右爲末醋調塗之患毒盛者以刀割去死肉以末搽之

○腳氣瘡因腎虛爲風溼所搏攻於腳膝而名蓋氣血壅滯溼毒在膚腠不得宣通故令腳上生瘡若

風毒不散其瘡漸出黃水腫痛身熱日久難治

犀角散 治腳氣風毒生瘡腫痛

犀角 天麻 羌活 枳殼

防風 黃耆 白蒺藜 黃芩

白鮮皮 各七錢半 檳榔 壹兩 甘草 五錢 烏蛇 貳兩酒浸

右每服八兩水盞半生薑五片煎壹盞服

漏蘆湯 治腳氣腳上風毒腫痛

漏蘆 白斂 槐皮 五加皮

甘草 各七錢五分 蒺藜子 貳兩

右每以五兩水煎湯去風處淋洗

氈礬散 治腳爛瘡

竹蛀屑 氈灰 紅棗 燒灰 黃丹

白礬 枯 音粉

右等分爲末摻之

龍骨散 治腳疽及久遠惡瘡他藥不効者

龍骨 貳錢伍分 輕粉 貳錢伍分 檳榔 壹錢

豬豕糞 不俱多少新瓦上焙燥再入火燒紅研五錢

右爲末以蠶水或鹽湯洗瘡令見淨肉卻以真麻

油調敷之三五次愈

一方治腳疽以無名異浸桐油煎壹滾入花椒壹撮

蓼花葉同煎仍浸七日只壹味敷貼甚効

○甲疽足三陰經起於足指氣血沮而不行結於指甲之間此經絡之所流注非但肌肉之病也或得於裁剪或腳長履絢不適而侵肉皆令氣血沮遏至於潰爛成疽然足指居最下氣血易阻藥力難到虛弱之人尤宜大補免致不斂尤忌寒涼敷散綠礬散 治甲疽

綠礬

煨過 五錢

蘆薈

壹錢 伍分

麝香

壹字

右爲末照患指製一絹袋盛藥套指上以線紮住入而自愈 製綠礬法用綠礬五兩四 鐵盤內

以炭火封煨火熾礬溶流出液汁如鎔金者汁盡去火俟冷取其赤似黃丹者用之或以此礬爲主入乳香三分之一爲末用鹽湯洗淨拭乾敷之治傷甲肌浸淫腫痛流出黃水漸引上腳四邊腫爛如火燒瘡

勝金散

治甲疽神効

牡蠣厚頭生研爲末每服貳錢靛花研酒調下壹日叁服已潰者以前末敷之

一方以膽礬燒過同乳香末各等分敷之
一方以烏梅或白梅燒灰敷或搗爛裹指

○丹溪治嵌甲陷甲割甲成瘡歷久不瘥用黃栢烏頭尖等分爲末洗淨敷貼

華陀治嵌甲神方用礪砂乳香各壹錢膩粉伍分橄欖核叁枚燒存性黃丹壹錢以真麻油調先用鹽湯洗淨拭乾敷之二次効

○指頭漸腫熱痛爪甲結膿甚至爪甲俱脫謂之代指用烏梅核中仁爲末米醋調成膏以芒硝煎湯淋洗淨漬指於膏內或以猪膏和蚯蚓糞搗敷亦効

○手足指頭赤腫傍開一口疼痛謂之天蛇頭以雄黃研細入鷄子內浸患處一宿次早以蜈蚣燒煙薰之卽消若痛甚流血以雄黃蜈蚣全蝎爲末擦患處以油少許搽軟絹上包之或以總門草入鹽少許香油搗敷或以霜梅金線草船積汗香油搗敷並効

○足跗發又名足發背足面疽也屬足厥陰肝陽明二經之會多因溼熱乘虛而下注宜活命飲加木瓜肉桂牛膝及隔蒜灸之再用十全大補托裏溫中湯膿清者難瘥

百草膏

治脚面惡瘡百藥不効者

用羊糞參拾粒瓦上炙乾煙盡覆地上存性羅成白灰研細以紗篩去沙土先用椒湯洗淨麻油調敷痒加輕粉痛加麝香少許以山茶葉裹之絹條縛定

○足跟疽名兔齧屬足太陽經在足跟骨下此處乃陰陽二蹻發源之所由臟腑積熱所致忌毒藥敷貼宜隔蒜灸之服活命飲加牛膝肉桂或勝金烏金紫金等藥選用

薛云足跟乃督脉發源之所腎經所過之地若患瘡毒則蹻氣不能發生腎氣由此而泄三陰虧損者久不能斂必瀝盡氣血而亡故凡漫腫寒熱體倦少食屬脾虛下陷用補中湯若晡熱作頭痛目不清屬脾虛陰火逍遙散佐六味丸咳嗽有痰十全湯八味丸此皆當滋其化源勿治其外

婦人足跟足指腫痛足心發熱皆因胎產或經行失於調理虧損足三陰虛熱所致若腫痛或出膿用六味丸爲主佐以八珍湯胃虛少食者佐以六君子湯寒熱內熱佐以逍遙散晡熱甚頭目不清佐以補中湯大凡發熱晡熱內熱自汗皆陰虛假熱丹溪云火起九泉陰虛假熱也酒色過度多患之

婦人血虛兩足發熱晡熱月經過期足跟作痛何如
曰足熱晡熱月經過期肝脾血虛也胸痞吐痰飲
食不思脾胃氣虛也蓋胃爲五臟之根本胃氣一
虛諸病悉至必用補中湯加茯苓半夏胃氣漸復
佐以六味丸八珍湯爲必用之藥

捷應散

治脚溼氣成瘡痒不可當爬之則流黃水卽足跗條百草膏

一方腳跟瘡久不愈毒氣攻注用白朮爲細末先以
鹽漿水溫洗乾摻上二日一換卽能負重涉險
一腿肚上瘡初生如粟以後漸大爬搔不已相沿成
片黃水流出血不可忍久成痼疾難愈先用貫衆

煎湯淋洗後用百藥煎爲末唾津調逐漸塗敷

一腳脛生瘡名曰枵口或因磕損而成其瘡外狹內
寬皮薄極痒又痛黃水長流延蔓而生甚則十餘
年不愈且易染人須忌酒色用韭菜地下乾蚯蚓
糞爲末入輕粉清油或白狗血調敷

○腳墊毒人腳走長路緊被石塊腳底墊腫不能行
步痛不可忍急用舊草鞋浸於尿桶內一宿或半
日外用新磚燒紅將浸草鞋放在磚上以腫腳踏
在上火逼尿氣入裏卽消此症諸方不載如不早
治爛人腳甚至殺人走長路腳腫痛亦可用此法

卽消增

○拍蟹毒人大指次指隔界處或生腫毒痛不可忍
若不早治必爛人手用鮮蟹研爛塗患處立消增
○掌心疽生於足掌中名涌泉疽指縫間證治大同
足發足跗發若兩心發徹骨者不治如腳心皮微
破不深穴膿不多者易治湯藥用活命飲補中湯
腎氣丸托裏消毒散加牛膝檳榔杜仲潰後大防
風湯十全大補湯八味丸足心熱者屬陰虛宜四
物湯加知柏脾虧者補中益氣湯若專治瘡者死
大防風湯

熟地

防風

杜仲

當歸

白芍藥

黃芪

各壹錢

附子

川芎

各八分

川牛膝

甘草

炙

人參

羌活

各五分

白朮

壹錢伍分

右加薑水煎

手足折裂第七十

附腳爛

潤肌膏

治手足皴澁皮膚裂開疼痛不能見風

珠子瀝青

四兩

白色黃蠟

八錢

乳香

貳錢

右用鐵器先熬瀝青便下黃蠟乳香次下麻油半
酒栝務須軟硬適中以新布濾淨入水折疊揉洗

以白爲度磁器內收貯每用將裂口火上炙熱又以藥火上炙軟塗於患處外貼紙少許其縫自合一方治手足皴裂春夏不愈者用生薑汁紅糟白鹽臘月猪脂研爛擦入皴內一時雖痛少頃皮合再用則安

一方手足寒皴裂用台椒三四合煮浸半頃須臾再浸仍傅以猪羊腦髓甚妙

一方手足折裂作痛用清油五錢慢火煎沸入黃蠟壹塊再煎溶入水粉五倍末各少許熬紫色爲度以熱水泡手足火上烘乾後用藥敷以紙貼之其痛立止

一方腳跟皴裂以頭髮一大握桐油壹碗瓦器內熬候油沸髮溶濾淨收貯毋令塵入每用以百沸湯泡洗令軟敷上卽安一方加水粉

一方治腳縫溼爛用枯礬參錢黃丹五分爲末摻一方治腳指縫瘡以搏鵝掌上黃皮燒灰存性爲末摻之

一方指縫搔痒成瘡血出不止用多年糞桶箍篾燒灰敷之

一方腳指縫沙瘡以燕窩土略炒黃栢二味爲末香

油調敷痛者加乳香

一方治腳裂縫以蒸藕研成膏敷之

一方治腳裂縫以五倍子爲末同牛骨髓填縫內愈

破傷風第七十一

附發瘰

破法論

皮膚損傷人皆視爲微恙乃爲風邪所襲或諸瘡久不合口風邪內襲及湯洗火炙湯火之毒亦能傳播經絡燒爍真氣熱極生風寒熱間作瘡口起白痂急用玉真散貼之若傷在頭面急嚼杏仁和雄黃白麵敷瘡上則其腫漸消甚則口禁目斜身體強直角弓反張急用蜈蚣研細末擦牙吐出涎沫立愈若頭面青黑色額上汗珠不流眼小目瞪身上汗出如油有一於茲皆爲不治若痛不在瘡口者傷經絡也亦爲死證

丹谿云破傷風與傷寒壞證同治劉河間曰破傷風若初起風熱在表而裏氣尚平者善伸數欠筋脉拘極或時惡寒或筋惕而搐脉浮數而弦宜以辛熱治風之藥開衝結滯而愈猶傷寒之表熱拂鬱而以麻黃湯辛熱發散之義也但用辛熱藥須佐以寒藥恐致風熱反甚也或止以甘草滑石葱豉等藥發散尤妙

若表邪不已漸傳入裏裏又未甚而脉弦小者宜以退風熱開結滯之寒藥調之或微加治風辛熱之藥亦可猶傷寒之在半表裏而以小柴胡湯和之之義也

若裏勢已甚而舌強口禁項背反張驚惕搐搦涎唾稠粘胸腹滿塞便溺閉結或時汗出脉沉洪數而弦由風熱鬱甚於裏表熱稍罷則腠理疎泄心火熱甚故汗出也宜除風散結寒藥下之而後以退風熱開結滯之寒藥調理自然熱退結散而風愈矣

大凡破傷風在頭面則以白芷爲君防風頭佐之蓋去頭面皮膚之風也在身體及四肢則以防風爲君隨身稍用下部則以獨活佐之習瘍科者不知此義而可諉之內科乎故附之於集同志者併以此究治焉

類破傷風薛云大凡癰疽潰後筋糜肉爛膿血大泄陽隨陰散筋脉拘急口禁項背反張痰涎壅盛惡寒惕悸發熱此氣血俱虛而傳變與破傷風相類而主治之法當大補爲主若果係傷風亦須大補氣血兼以治風之藥不審則誤

上古治病有用砭石者故內經有砭石鍼石鑱鍼之類扁鵲云病在血脉者治之以砭石則砭血之法亦不能偏廢也但可施之於丹瘤時毒疔瘡此非病之在血脉歟若夫癰也疽也或發於筋骨豈可槩施乎因醫方載有此法庸俗之人緣此以弄強者誤人多矣外科樞要云治丹毒疔瘡紅絲走散或時毒瘰癧血壅盛用細磁器擊碎取有鋒芒者一塊劈開筋頭夾定仍以線縛住左手二指執懸患處高寸許右手另以一筋頻頻擊之令毒血遇砭而出是良法也然擊之不可太深內經云刺皮無傷肉若過於傷肉必生他患有泥於打寒俗法者不問病在何處輒於手臂上砭血成流一之不已而至於再三死而不悟習染難易良可慨夫

羌活防風湯

治破傷風初起在表

羌活

防風

川芎

藁本

白芍藥

當歸

各壹錢

甘草

地榆

細辛

各五分

右水煎熱服大便秘加大黃五分不可驟通

白朮防風湯

服羌活防風湯而自汗者宜服此

白朮

貳錢

黃耆

貳錢

防風

壹錢伍分

右水煎服

小芎黃湯

破傷風臟府秘小便赤自汗不止知無寒也宜下之先服此二三貼

川芎

貳錢伍分

黃芩

壹錢伍分

甘草

伍分

右水煎三服即止另用後藥

大芎黃湯

治破傷風邪傳於裏舌強口禁項背反張驚惕搐溺痰涎湧盛宜急服之

川芎

羌活

黃芩

大黃

各壹錢半

右水煎服以和為度

雄黃散

破傷風裏和服此未和不可服

雄黃

七釐

防風

壹分

草烏

七釐

右為細末溫酒調下

大羌活湯

治破傷風內外風去而在半表半裏之間宜服此急和解稍緩則邪入於內不可治

羌活

黃芩

菊花

麻黃

川芎

石膏

防風

前胡

細辛

甘草

枳殼

白茯苓

蔓荊子

各四分

薄荷

白芷

各貳分

右薑水煎服

防風湯

破傷風在表未傳入裏者急宜此湯調蜈蚣散服

防風

羌活

獨活

川芎

各壹錢貳分

右水煎調蜈蚣散

蜈蚣散

蜈蚣

黃赤足者各壹條

江鱧

錢叁

右爲細末防風湯調服

又蜈蚣散

蜈蚣

貳條

魚鱧

五錢炒

左蟠龍

五錢炒煙盡

右爲末用防風湯服下

玉真散

南星

防風

各等分

右爲末生薑汁酒調服傷處以此貼之

左龍丸

治破傷風漸傳入裏

左龍丸

即野鴿糞炒五錢

白殭蠶

炒

江鯉

各伍錢炒

雄黃

貳錢五分

右爲末飯丸如桐子大每服拾伍丸溫酒下如裏

證不已此丸另用半料入巴豆霜五分飯丸如桐

子大每服加此壹丸與前併服以利爲度利後更

服小羌活湯抽搐不已亦宜小羌活湯

小羌活湯

治破傷風裏證已利尚多抽搐

羌活

獨活

防風

地榆

各壹錢貳分

右水煎有熱加黃芩有痰加半夏

當歸地黃湯

治破傷風日久氣血漸虛邪氣入胃全在養血

當歸

熟地黃

白芍藥

川芎

藁本

防風

白芷

細辛

各壹錢

右水煎服

南星散 治破傷風發表

南星 錢叁 半夏 天麻 錢各伍 雄黃 錢貳伍分

右為細末每服壹錢溫酒調下如欲利則加大黃

地榆防風散 治破傷風在半表半裏頭有微汗身上卻無宜和之

地榆 防風 地丁香 馬齒莧

右各等分為細末每服叁錢溫米飲調之

江鰮丸 治破傷風驚而發搐臟腑秘澁病在裏也宜以此丸下之

江鰮 炒 野鴿糞 炒 白殭蠶 炒各五錢 天麻 錢貳

雄黃 錢壹 蜈蚣 黃赤足各壹條

右為細末以壹兩貳錢燒飯為丸如桐子大朱砂

為衣餘藥入巴豆霜壹錢亦以燒飯為丸如桐子

大不用朱砂為別每服用朱砂衣者拾丸無朱砂

者壹丸第貳服如無朱砂者貳丸以利為利利後

止服有朱砂衣者

以上十四方俱劉河間所立朱丹溪稱効者

杏仁散

杏仁 去皮研細 白麵 各等分

右和勻用新汲水調和如膏敷傷處

獨蟬散

蟬殼 略炒 壹錢

右為末酒調服七次乃効

防風散 治瘡瘍或身體疼痛風邪攻注攣急皮膚瘙癢麻木不仁頭覺昏悶牙關暫緊其勢將成

破傷風者

防風 壹兩

藁本

羌活

地骨皮

荊芥穗 各伍錢

右為細末每服叁錢溫酒調下

人甲散

治破傷風手足顫掉不已

人手足指甲

燒煙盡 六錢

朱砂 另研

南星 薑製

獨活 去皮各 貳錢

右為細末分三服酒調下立効

一方以全蝎拾個為末酒調日服三次

一方破傷風乃惡血凝心以烏鴉翎燒灰存性研細

酒調服壹錢

一方破傷風初覺有風急取蟻螬蟲壹貳條手捻住

待蟲口中吐些少水抹在傷處身上加衣稍厚片

時則瘡覺麻木兩脇微汗出立効如風緊急速取

此蟲四五個剪去尾將肚內黃水塗瘡口再滴些

須於熱酒內飲訖汗出愈

瘡瘍發痙因氣血虧損外邪所搏或虛鬱火所致其

狀牙關緊急四肢強勁腰背反張肢體抽搐有汗不惡寒曰柔痙風能散氣故有汗也無汗惡寒者曰剛痙寒能瀉血故無汗也皆由亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多與潰瘍及產後多患之乃敗症也宜大補氣血多有得生者若作風治者速其危也大槩補中益氣加山梔羌活川芎天麻芍藥門冬之類或十全大補八珍逍遙選用

瘍科選粹卷之五

終

瘍科選粹目錄

第六卷

癘風第七十二

醉僊散

通天再造散

防風通聖散

二聖散

換肌散

黃精丸

大造苦參丸

皂角刺散

栢葉丸

浮萍散

單服草麻

愈風丹

浴法

樺皮散

加減通聖散

神仙紫花丸

洗藥

敷藥

白花蛇丸

補氣洗浴湯

蠲痺散

凌霄花散

換骨丸

大麻風丸

紫雲風丸

活神丹

摩風膏

治諸風酒

搜風換骨奪命丹

風症方

治遍身風痛

治遍身去風

驚掌風第七十三

蒼耳散

仙掌丸

五脂膏

單方十二條

洗法

燠方

楊梅瘡第七十四

荆防敗毒散

換肌消毒散

蠲痺消毒散

神効方

驚膽膏

濯毒散

神秘七星散

三奇湯

洗方

擦法

楊梅瘡驗方

楊梅瘡

良方

初起方

點楊梅初起

楊梅點藥

良方增

白粉霜

楊梅結毒第七十五

黑虎丹

神妙起疴散

土茯苓酒

天花粉酒

解毒湯

椰灰散

僊遺根湯

乳香散

香鯽湯

祛毒湯

五烟

三灰膏

楊梅結毒方

又方

五靈丹

五皮散

單方二條

疥瘡第七十六

四順清涼飲

荆黃湯

烏荆丸

天門冬膏

活血生津飲

除溼丹

升麻葛根湯

蒼朮膏

何首烏散

當歸丸

連翹飲

敗毒散

苦皂丸

胡麻散

連歸湯

升麻和氣飲

當歸飲子

苦參散

苦參丸

麻黃飲

牛黃清心丸

竹葉石膏湯

平胃散

消毒飲

吳茱萸散

剪草散

硫黃餅

三黃散

丹溪一笑散

水銀膏

大楓子膏

大桤榔散

東垣一上散

藺茹膏

立効散

脂調膏

掃疥散

一擦光二方

疥癩方

巴豆膏

神異膏

一笑散

烏頭散

黃連散

香疥藥

四黃散

大楓膏

溼毒方

寒溼方

大楓水銀膏

溼瘡臙瘡膏

蠟油膏

水銀膏

薰筒

肥瘡

五龍膏

膿瘡方

單方五條

諸癬第七十七

打膿散

頑癬丸

消風散

祛風敗毒散

川槿皮膏

二娘子散

單方十九條

洗癬方

治癬通用五方

八寶散

定粉膏

洗方

烏蛇丸

白花蛇丸

宣風換骨散

硫黃散

一抹散

溼癬方

擦癬方

癰疹第七十八

附瘰癧熱瘡

沸子

瘰癧

加味羌活湯

羚羊角散

楓香丸

漏蘆丸

烏蛇膏

莽草膏

地骨皮湯

丹參散

黑末子

清熱方

七寶散

赤石脂散

玉女英

棟花粉

羚羊角散

秦艽湯

防風散

荊芥散

時毒第七十九

附天泡瘡

天行班瘡

葛根牛蒡湯

犀角升麻湯

梔子仁湯

通氣散

普濟消毒飲

漏蘆散

消毒丸

托裏溫經湯 升麻牛蒡湯

五利大黃湯

天泡斑瘡五方

諸瘡成漏第八十

陷脉散

烏金散二條 應効散

桂附丸

川芎細辛湯 神應膏

附子灸法

血風瘡第八十一

當歸飲

小柴胡湯 活血四物湯

三蛇丹

當歸拈痛湯 大馬齒膏

七珍膏

瘍科選粹卷之六目錄終

瘍科選粹卷之六

土

繡水陳文治 輯

東吳繆希雍叅校

癘風第七十二

癘風者俗呼爲癘風也名雖曰風未必皆因於風大都嗜慾無節勞動氣血熱發汗泄不避風冷淫氣與衛氣相干或熱血得寒及夏月勞甚而入寒泉洗浴或冬月酒後跣水履霜或饑餓宵行而感山嵐瘴氣或途中辛苦而遇風雪霧雨以致溼熱鬱於內而不散風寒客於表而不行人莫之知失用

發散焮鬱既久其病始作或自上虛癢或起白屑紫雲如癰風之狀或發紫泡疙瘡流膿其邪之初入也若氣先受之則起在上而上體多血先受之則起在下而下體多氣血並受其邪則甚重自頭面起而下者爲順風自足起而上者爲逆風不拘自上自下但以漸而起者爲輕早就醫藥爲治亦易忽而至於瘡痍遍體膿水淋漓鬚眉墮落手足指脫頑痺痛痒鼻塌眼爛齒豁唇竭病勢則甚矣古方謂此疾有三因五死一因於風毒卽丹溪所謂天地間殺物之風也二因於溼毒卽前所謂涉水履霜之類也三因於傳染同處之人素有內熱積毒故因其氣而得之也

五死者一曰皮死麻木不仁二曰脉死血潰成毒三曰肉死割切不痛四曰筋死手足緩縱五曰骨死鼻梁崩塌與夫眉落眼昏唇翻聲噎等證

宋洞虛云大風有五黑色不治餘皆可治虫食肝眉落虫食肺鼻崩虫食脾聲啞虫食心足底穿膝虛腫虫食腎耳鳴啾啾耳弦生瘡或痒或痛如鍼刺虫食身皮痒如虫行凡此皆屬於手足陽明經內經曰腸胃爲市無物不包所受之邪積於二府久

而傳之乃及於脾肺二藏肺主皮毛脾主肌肉故病在皮毛肌肉治法必先取陽明而後及於手足太陰

丹溪之法以在上者與醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳虫於穀道中出後用防風通聖散調理仍用三稜鍼刺委中穴出血張子和用汗吐下出血之法所發者臭汗所吐者臭涎所刺者皆黑血自額至顙以排鍼上下俱刺隔一日一次二十餘日方已內經惟用鍼法病機所載先樺皮散從少至多服五七日灸承漿穴七壯瘡愈再灸三灸之後服二聖散泄熱劉河間用疎風泄熱之法宋洞虛先下以再造散以稀粥將養半月勿妄動作勞後以醉仙散或吐或利雖至於顙喉頭面皆腫吞不得下流出惡涎或齒縫中出臭水血絲不能語言不能飲食俱不必懼但以竹筴灌稀粥或旬日半月一月面色漸白而安重者又與換肌散此數者皆先哲之治法不外乎吐惡涎出惡血下惡物自可全愈

若虛痒者四物湯加芩酒調浮萍末痒甚加荆芥蟬退皮皺而有白屑者白花蛇丸眉髮落者三蛇丹

栢葉丸眉落鼻崩者換肌散補氣養榮湯蝕眼者
蘆薈丸肢節廢者蠲痺散通用凌霄花散胡麻散
加味苦參丸大楓丸換骨丸大麻風丸紫雲風丸
活神丹腎氣丸四聖不老丹外用摩風膏浴癩方
因證用藥亦可謂詳盡矣但終身不得食鹽醬與
牛馬驢羸等肉茄子等類故丹溪切切戒人以絕
味斷欲再發則終不救曾醫五人惟一寡婦因貧
得免於死亦於本病外服四物湯百餘貼乃十分
全愈

孫真人云吾嘗治四五百人終無一人免於死非孫

真人不能活人蓋病人不能守禁忌云耳由此觀
之癘風非無治法非不能全愈特人之輕疾重欲
不能自惜死云耳醫家當以此首戒病人也

醉仙散

治大風病遍身癰癧瘰癧瘡疥麻木或去輕粉量加芩連

胡麻仁

牛旁子

蔓荊子

枸杞子

各一兩炒俱紫色

白蒺藜

苦參

瓜婁根

防風

各五錢五分

右爲末每壹兩五錢入研細輕粉貳錢和勻每日
辰午夕各以壹錢茶清調服服後五七日先於牙
縫內出臭涎渾身疼痛昏悶如醉後利下膿血惡
臭尿爲効證候重而急者須先以再造散下之補

養數日方服此藥必斷鹽醬醋諸般魚肉椒料水

果及煨燒炙燂與茄子等物止宜淡粥淡菜并烏

稍菜花蛇淡酒煮食以助藥力

通天再造散 大治癰風惡疾

大黃 錦紋者 壹兩 皂角刺 獨生經年黑大者壹兩五錢

鬱金 生用 五錢 白牽牛 頭末陸錢壹半生壹半炒

右為細末每服伍錢 人弱減半 日未出時冷酒調面向

東服當日利下惡物或臭膿或虫如虫色黑者乃

是多年虫色赤者係是近日所生三四日後再用

一服以虫盡為止但終身不得食牛馬驢羸等肉

大忌房事犯者必死

防風通聖散 凡風火之疾多生於熱熱者本也風者標也但氣壅筋攣肢體焦痿頭目昏眩

腰脊強痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽嗌不利胸膈痞悶咳嗽喘滿涕唾稠粘腹胃燥熱便溺

淋瀝夜臥盜汗睡語咬牙筋惕驚悸或腸胃拂鬱水液不輸止多小便或溼熱內餘時有

汗泄或亡液過多成燥淋閉或停溼而泄或表陽助邪併入於裏或陽極似陰表寒而戰

裏熱而渴或走注疼痛或真陰衰弱心火熱甚卒中僵仆或暴瘡不語或語不出聲或瘡

疥久不愈或頭生白屑或面生黑紫白等斑或面鼻生紫赤風刺癰癰或成癰風或腸風

痔漏及酒毒熱毒諸邪一切風熱燥鬱之證瘡瘍惡毒跌撲疼痛并熱結大小便俱宜此

防風 川芎 當歸 白芍藥 大黃

麻黃 薄荷葉 連翹 芒硝 製過各四分 石膏

黃芩

桔梗

各八分

滑石

貳錢肆分

甘草

壹錢

白朮

梔子

各貳錢

右水煎服

二聖散

大黃

伍錢

皂角刺

叁錢

右以皂角刺壹貳斤燒灰研細用大黃五錢煎湯

調服叁錢晨服樺皮散午煎升麻湯下瀉青丸晚

服此散皆疎泄血中風熱也

換肌散

癰風年深不愈眉毛脫落鼻梁崩塌服此藥不踰月取効如神

黑花蛇

白花蛇

並產斷黃酒浸各壹宿

地龍

去土各叁兩

當歸

細辛

白芷

蔓荊子

葳靈仙

荊芥穗

甘菊花

苦參

紫參

沙參

木賊

不灰木

甘草

炙

白蒺藜

天門冬

赤芍藥

何首烏

天麻

石菖蒲

胡麻子

草烏頭

去皮尖

蒼朮

米泔浸去皮

川芎

木鱉子

各壹兩

右爲細末每服五錢溫酒調下酒多爲妙

黃精丸

蒼耳葉

紫背浮萍

鼠粘子

各等分

烏蛇

酒浸去皮骨減半

黃精

倍前三味生搗汁和四味研細焙乾

右爲末神麴糊丸如梧子大每服七十丸溫酒下

瘰癧

加減大造苦參丸 治瘰癧風諸風赤白癰風

苦參 壹斤 防風 荊芥 蒼耳子

胡麻子 半生半熟 皂角刺 各拾兩 蔓荊子

牛旁子 黃荊子 枸杞子 何首烏

禹餘糧 蛇床子 各壹兩 白芷 壹兩伍錢

右為細末用皂角搗爛熬膏入前藥和勻為丸如梧子大每服五十丸茶酒任下

蒼耳魚 治瘰癧風

蒼耳草五月五日或六月六日寅時和露採取搗汁熬膏作錠子用一斤半鯉魚一尾剖開不去腸

鰾入膏一錠以線縫之用酒貳碗煮乾令患人吃

魚盡不過四五尾即愈忌鹽百日

皂角刺散 瘰癧風眼昏不辯人物眉髮自落鼻梁崩塌肌膚生瘡如癰

皂角刺壹貳斤蒸晒為末食後前大黃湯調服壹

錢旬日後眉髮再生肌膚光潤眼目復明

栢葉丸 瘰癧風眉髮脫復生

栢葉丸蒸九晒為末煉蜜丸如梧子大日用三服夜一服白湯下五六十丸百日後眉髮自生

浮萍散 張子和治風疥瘡及癰風

浮萍 紫背貳兩 荊芥 川芎 甘草 麻黃

白芍藥

當歸

各伍錢

右爲末每服壹兩入葱白豆豉水煎服以汗出爲度

單服革麻

癩風手指攣曲節間疼痛不可忍漸至脫落

革麻子

去皮

黃連

剉貳兩

右以小瓶入水壹升貳味同浸春夏叁日秋冬五日以革麻壹粒劈開兩半平旦就以浸藥水吞下漸加至四五粒微利不妨水少再添忌用動風物屢用得効

愈風丹

癩風手足麻木髮落眉脫遍身瘡癬皮膚瘙癢爬之成瘡及一切疥癬風疾皆効

苦參

壹斤研取頭末四兩

土桃蛇

烏梢蛇

白花蛇

各壹條酒浸貳三日去骨取肉日晒乾

右爲細末以皂角壹斤剉長寸許酒浸壹宿去酒以新汲水壹碗搗取濃汁去粗在銀石器內熬膏和前末爲丸如梧子大每服六七十丸煎防風通聖散送下隨以粥飯壓之日用叁服每日照後法洗浴以大汗出爲應再三日又浴叁浴乃安

浴法

桃柳桑槐楮五枝煎湯大缸浸坐沒頸壹日俟湯面如油卽係汗出

浮萍濃煎湯浴浸半日大効

樺皮散

肺臟風毒遍身瘡疥癰癤
瘙痒又治面上風刺粉刺

樺皮

四兩
燒灰

杏仁

貳兩去皮尖用水壹盞於銀
銚內熬水減半取出放冷乾

枳殼

去穰四兩用炭火燒
存性取出溼紙上冷

荆芥穗

貳兩

炙甘草

伍錢

右杏仁另研餘藥俱為末和勻磁盒內放

加減通聖散

此藥大瀉
惡毒穢積

大黃

陸兩

芒硝

皂角刺

獨生者去
尖各壹兩

防風

荆芥穗

川芎

桔梗

枳殼

去穰

石膏

柴胡

黃連

羌活

各伍錢

連翹

白芍藥

當歸

麻黃

梔子仁

甘草

滑石

黃芩

黃柏

各叁錢

生地黃

酒洗

熟地黃

酒洗各叁錢伍分

薄荷

貳錢

右分八服水煎日用貳服五六日又進貳服待補

養完又行貳次然後服神仙紫花丸

神仙紫花丸

癰風及諸般惡瘡風瘡其効如神
輕者壹料可愈重者貳叁料除根

白花蛇

用真正蘄黃州所產肉白而新者為佳
去頭尾各四五寸連皮骨用壹兩伍錢

何首烏

荆芥穗

葳靈仙

各四錢

麻黃

連根節

胡麻子

各壹錢

蛇床子

貳錢

以上六味細切同蛇用好酒壹大碗浸壹宿去蛇
床子通晒乾仍還原酒內再浸再晒酒盡為度待

晒極乾共爲細末另包

人參

草決明

各壹兩

當歸

柒錢伍分

胡天麻

猪牙皂角

各伍錢

木香

沉香

天麻

各貳錢伍分

肉豆蔻

煨壹枚

麝香

壹錢伍分鼻塞聲重者倍之

乳香

沒藥

各壹錢

明雄黃

辰砂

各五分

以上麝香等五味不見火各另研極細其餘各藥

俱研細和勻另包

防風

羌活

甘草

細辛

川芎

獨活

蒼朮

米泔浸壹宿

枇杷葉

去筋包焙乾

白芍藥

白蒺藜

金銀花

五加皮

白芷

苦參

各伍錢

胡麻子

白附子

米泔浸泡

麻黃

川牛膝

草烏頭

米泔浸泡

川烏

米泔浸泡

石菖蒲

各貳錢

以上爲細末另包

右以新鮮大風子去殼叁斤盛於磁罐內入好酒而以皮紙竹箬重重包口頓滾湯中勿令沒過罐口文武火煮極爛取出杵爲渣滓成油分作三分每分入第壹號藥六錢第貳號藥八錢第叁號藥壹兩五錢加糯米飯搗極膠粘丸如梧子大晒乾

勿見火每服貳拾丸漸加至五六十丸雞鳴時午時臨臥時各壹服茶清送下忌房事鹹酸酒醋糟醃猪羊雞馬驢肉魚腥煎炒水果五辛薑椒大料熱物蕎麥菜豆之類若不忘口斷欲藥必無功愈後犯禁再發必死猪羊雞肉終身皆忌其餘肉味愈後一年方可漸食此癰風之神方也

洗藥

地骨皮 荆芥

苦參

細辛 各等分

右剉片每用貳兩以水煎薰洗遍身汗出爲効然須缸大湯多浸洗良久爲佳

敷藥

瘡大爛者遍身塗之

黑狗脊

貳兩如無以杜仲代之

蛇床子

壹兩

寒水石

硫黃

白礬

枯各貳兩朴硝少許

右爲細末用臘猪油或香油調敷不爛不用

白花蛇丸

治頭面手足白屑瘡痒皮膚皴燥

白花蛇

壹條 當歸

川芎

白芍藥

生地黃

防風

荆芥

酒芩

連翹

胡麻子

何首烏

升麻

羌活

桔梗

各壹兩

右爲末將浸蛇酒和水打糊丸如桐子大每服七十丸茶清送下

補氣瀉容湯 治大風滿面連頸極痒眉脫鼻崩膚敗

以止痒補脾以升陽外用針
砭去惡血忌酒麵生冷物

升麻 連翹 各六分 蘇木 當歸 黃連

黃耆 全蝎 地龍 各參分 黃芩 四分 生地黃 四分

人參 貳分 甘草 壹分五厘 桔梗 五分 桃仁 三枚

右水酒各半煎減半入麝香少許梧桐淚壹分

虫水蛭各三枚白豆蔻貳分再煎熱服或為丸亦

好

蠲痺散 治癰風肢節拳攣
宜此養血祛風

羌活 獨活 皂刺 白芷 各五分

當歸 白朮 各壹錢五分 赤芍藥 壹錢 土茯苓

右水煎服

凌霄花散 治諸癰
風證

凌霄花 五錢 蟬退 地龍 殭蚕 全蝎 各柒枚

右為末每服貳錢溫酒調服服後於浴室中浸在

湯內一時許服藥則効

換骨丸 治一切疥
癬風痰

苦參 浮萍 各壹兩五錢 大黃 槐花 白芷

川芎 各壹兩五錢 蒼朮 壹兩 乳香 沒藥 沉香

木香 各叁錢 麝香 五分

右爲末用麻黃煎膏和丸彈子大每壹丸臨臥溫

酒化下忌風貳叁日

大麻風丸

治大麻風初起遍身瘡點五色不知痛痒手足麻木等證

苦參

叁斤

羌活

獨活

白芷

白欽

白蒺藜

天花粉

何首烏

各四兩

皂角刺

煨

當歸

各八兩

右爲末用皂角五斤切細溫水浸五日去粗慢火

熬成膏和丸梧子大每服百丸空心酒下

紫雲風丸

治血分受溼遍身發紫血疱痛痒有虫

何首烏

四兩

五加皮

殭蚕

苦參

當歸

全蝎

壹兩伍錢

牛旁子

羌活

獨活

白芷

細辛

生地黃

漢防已

黃連

芍藥

蟬退

防風

荊芥

蒼朮

各壹兩

右爲末煉蜜或酒糊丸梧子大每服七十丸溫酒

米飲任下

活神丹

大風病血虛者可常服之

羌活

玄參

當歸

熟地黃

各等分

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心白

湯送下

摩風膏

治疥癬風癩諸溼痒瘡及諸般惡瘡

萬斗選粹

萬風

紫雲石間

卷六

十三

蛇床子

錢五

大風子

拾四

杏仁

貳拾

枯礬

樟腦

各貳錢

川椒

輕粉

水銀

各叁錢

雄黃

壹錢五分

銀珠

壹錢

右爲末用烏柏油貳兩研勻爲丸如彈子大磁器

收貯每用些少呵熔遍擦之

治諸風疾煮酒飲貳十斤則遍身肉癢四十斤全愈

良方

人參

苦參

各壹兩

當歸

白朮

生地黃

木通

乳香

沒藥

各貳兩

獨活

薄荷

荊芥

防風

白蒺藜

各六錢

陳皮

半夏

天花粉

杜仲

川烏

去皮尖

厚朴

南星

茯神

金銀花

各壹兩

車前子

草烏

去皮尖

地骨皮

白芍藥

枳殼

乾薑

牛膝

黃芪

各壹兩五錢

甘草

茯苓

藁本

黃柏

川芎

黃芩

地榆

各貳兩

大風子

淨肉叁兩去油

土茯苓

貳斤

用無灰酒四十斤分作三次煮入罈以箬扎口上

以溼麵鋪蓋上煮以麵熟爲度埋土地三日取出

早晚壹服忌氣怒酒色雞魚鶩羊頭蹄肝腸等味

壹月見効四十日全愈

搜風換骨奪命丹

良方

專治三十六種風七十二般氣大麻癩風紫雲風
 白癩風驚掌風一切寒溼手足拘攣遍身骨節酸
 痛麻木不仁走氣刺痛破傷風諸般疔腫癰疽惡
 毒楊梅瘡已結毒未結毒遍身疥癩膿窠風癰積
 年久不愈者俱用此治之大病每用壹丸小疾半
 丸放入小嘴酒瓶內入無灰煮酒一大碗油紙封
 固隔湯煮二炷線香之久取出病人熱服以出臭
 汗為度切忌見風戒食諸魚羊肉雞鶩麩麩油膩
 炙燂煎炒辛辣發毒之物元氣厚者隔一日一服
 虛弱者三四日一服如大風等瘡至二十九病必
 愈矣此後又將二十九丸入有嘴罈內入無灰好酒
 三十碗浸之亦封固照前湯煮不可泄氣每飲三
 酒鍾拔去病根永不再發臨服用防風紫蘇鳳仙
 根槐枝荆芥薔薇根各用兩許煎濃湯洗浴過然
 後服之

真正五加皮

洗浮

猪牙皂角

去殼各壹斤捌兩

茅山蒼朮

壹斤米泔水洗晒乾

麻黃

去節去根五斤

紫背浮萍

隔水晒乾蒸過貳斤

右五味用長流水一桶砂鍋內煎至一半再入水

煎如此三四次細絹濾過查熬成膏以入後末藥

川烏 黑豆煮過

土木鱉子 油去

角沉香 黑色者

廣木香 火不見

真血竭 嫩紅者

滴乳香 炒

明天麻 大者

南星 醋炙三次以上八味各壹兩淨

羌活 洗壹兩五錢

白姜蚕 去絲嘴足壹兩貳錢

防風 洗去土去蘆

荊芥穗

錦紋大黃 大塊滋潤者已上三味各壹兩參錢

川甘松 去土

蒼耳子 去土炒

白芷稍 洗

真沒藥 另研

白蒺藜 去尖

川當歸 去蘆酒洗

姜黃

皂角刺 去尖去木已上入味各七錢

真正當門子麝香 參錢

大風子 去殼油五錢

牛旁子 五錢

右藥二十四味共重二十一兩五錢各件揀選道地材料精製照方擇天醫黃道吉日在靜室違避雞犬僧尼孝婦生人產房污穢不淨之處並漆器等物焚香修合將前藥各為極細末入前膏子藥內搜和為丸如彈子大每藥四丸用水飛硃砂衣次用金箔一片為衣陰乾不見火不見日

治風症 良方

大風子 肉參兩

烏蛇 壹條用火酒炙乾

苦參 貳兩

何首烏 壹兩

姜蚕 壹兩

姜活 壹兩

細辛 壹兩

獨活 壹兩

當歸 貳兩

赤芍藥 貳兩

大黃 壹兩

連翹 壹兩

石菖蒲壹兩

全蝎壹兩

蟬脫壹兩

牛膝壹兩

枳殼壹兩

防風壹兩

白蘚皮貳兩

薄芎貳兩

杜仲貳兩

山梔壹兩

桔梗貳兩

荊芥貳兩

蒺藜壹兩

麻黃壹兩

麝香參錢

胡麻子貳兩

防已壹兩

烏藥壹兩

蔓荊子貳兩

川芎貳兩

黃芩貳兩

青藤貳兩

葳靈仙壹兩

右爲末酒糊爲丸每服二十三丸日進二服

治遍身瘋痛良方

用白鳳仙花樹煎湯湯內加老酒一二鎰湯用多浴汗出卽愈

治遍身走瘋

光烏

參錢炒

白芷

壹錢五分炒

香附

壹錢五分炒

獨活

壹錢五分

右爲細末臨臥時溫酒調下前末藥每用五分閉口勿令泄氣藥盡則愈

鵝掌風第七十三

鵝掌風必生過楊梅瘡者始有之乎緣此瘡本乎風熱瘡雖痊可毒流枝末留而不去乃成風癬相傳塗抹各方効分彼此求其屢試屢驗者則未之見也今卽其近理而確知曾効者錄之以俟擇焉

蒼耳散

治鵝掌風

蒼耳子

金銀花

皂角刺

防風

荊芥

連翹各壹錢

天麻

前胡

蛇床子

猪牙皂角

甘草五分

土茯苓參錢

右加生薑一片川椒一撮水煎服

仙掌丸治驚掌風

烏藥

白芷各五錢

雄黃

朱砂

沒藥

乳香各貳錢

右爲末麵丸如桐子大每服二十九丸燒酒送下五七日見効

按二方未見出奇毒至枝末恐前藥未能直攻患處也

玉脂膏治驚掌風年久不愈一擦如掃

牛油

柏油

香油

黃蠟各壹兩

官粉貳錢

銀朱壹錢伍分

麝香伍分

右後參味研細前四味溶化待溫入三末攪勻搽癰上火烤再擦再烤其妙如神

一方用草麻子十粒蜜陀僧輕粉各五分共搗如泥摩擦火烘數次可愈

一方桐油調定粉搽上火炙効

一方桐油松香末搽上火炙効

一方荆芥輕粉各壹錢地骨皮五錢槐枝椿根防風
川椒石花各壹兩煎水洗立効

一方以禿菜根切片壹升砂鍋內用水五六碗煮爛
入皮硝壹兩攪勻將白布一塊繫在箸頭上蘸泡
患處次日又燒滾泡之五六日愈

一方乳香沒藥樟腦飛丹綠礬各等分爲末鵝油調
塗火灸

一方防風荆芥苦參白癬皮各貳錢分作四貼砂罐
內煎水燻患處溫則洗之藥味盡再換水

一方當歸紫花地丁苦參背陰蒿等分日逐以銅器
煮水洗

一方以鴿糞穿山甲燒煙燻

一方取口外名藍金子之根煎湯泡洗此已試之効
方藍金子之葉羊鹿食之卽死可見其毒矣但口
內無此物

一方歲靈甘草石菖蒲胡麻苦參何首烏各用叁錢
酒調下渾身癩疥一齊無

歲靈仙

甘草

石菖蒲

胡麻

酒炒

苦參

酒炒

何首烏

不犯鐵器用木槌打碎曬乾
餘藥俱爲末配取淨末等分

空心每服叁
錢好酒送下

一方用金釵草壹大握加蒼耳草一半朝東墻頭艸四分之一共煎百沸湯入瓶內患人之手擦麝香少許臂上以布纏之入手于瓶使不透氣三次即愈

金釵草一名千里光

鵝掌風洗法 良方

槐皮 地骨皮 花椒 大麥 艾葉

鵝糞 鷄糞 白芷

六味同煎湯先燻後洗每日數次愈後常用猪蹄湯洗

薰鵝掌風方 良方

用銅青壹兩研細以好醋調染匾栢葉陰乾先用皮硝湯洗手自乾又以桐油抹手用炭火漸將栢葉置火上燻手黃色上皮即愈

楊梅瘡第七十四

楊梅瘡之證多由於傳染或因下疳便毒久而爲瘡無非因於嗜慾所致雖虛難用補劑蓋溼熱已聚於經絡毒氣方發於肌膚若投參耆歸之類無益於氣血反滋溼熱矣初起惟以防風通聖散去麻黃用硝黃以去內毒待胃氣稍定再以一貼去硝黃用麻黃發汗以去外毒或用荆防敗毒散三

四劑次易換肌消毒散若肢節筋攣者蠲痺消毒散不數劑而自痊極重者二十劑終身無患矣若求速愈誤服丹方及用燠藥則流動筋骨爲害不小然此瘡大損精神患此之後面無光澤須待大平之後用養氣血藥壹貳拾劑庶耗散復聚然亦不能如初矣

荆防敗毒散

治楊梅瘡初發

荆芥

粉草

連翹

五加皮

川芎

羌活

獨活

各柒分

皂角刺

穿山甲

炒

歸尾

防風

蒼朮

炒

防已

酒

地骨皮

各壹錢

金銀花

白癬皮

各壹錢叁分

土茯苓

壹兩不犯鐵

右用水參碗煎壹碗作貳次攪酒服上部多服在

食後下部多服在食前若咽喉有瘡加牛旁子

換肌消毒散

治楊梅瘡服前方後瘡勢稍退宜易此方

土茯苓

五錢不犯鐵

當歸

白芷

皂角刺

薏苡仁

各壹錢

白癬皮

木瓜

不犯鐵

木通

金銀花

各柒分

炙甘草

五錢

右水煎服

蠲痺消毒散

治楊梅瘡肢節筋攣

薑黃

土茯苓

獨活

各伍錢

白朮

當歸

各壹錢

赤芍藥

錢壹

白芷

分伍

右水煎服

神効方

皂角子

四兩打碎炒焦爲末

何首烏

荆芥

苦參

天花粉

各壹兩

右爲末合一處每服壹錢用土茯苓五兩猪脂油

貳兩水六碗煎貳碗分作叁次服忌牛肉燒酒茶

鐵器

鵝膽膏

凡楊梅瘡發於面不便見人發於肛門不便大解以此解之立効

杏仁

柒個去皮尖

輕粉

膽礬

各五分

右爲極細末鵝膽調點瘡上

濯毒散

治楊梅瘡

防風

牛膝

葳靈仙

五加皮

當歸

連翹

白芷

各五分

猪牙皂角

天麻

各壹分伍厘

白豆蔻

叁個

土茯苓

壹兩五錢

右水煎早晚各壹服貳拾服全愈忌茶醋菜豆

腐雞羊肉

神秘七星散

治楊梅瘡先服四貼復加減叁貼柒日全愈

防風

皂角刺

天門冬

黃芩

瓜婁仁

金銀花

各五分

當歸

熟地黃

木瓜

薏苡仁

紫花蒂丁

白癬皮

木通

各壹錢

甘草

叁分

土茯苓

四兩

右水參鍾煎貳鍾分貳次服服過四貼去木瓜木通紫花蒂丁白蘚皮四味減土茯苓貳兩伍錢加桔梗柒分照前煎服忌椒酒牛肉

三奇湯

治楊梅瘡疳瘡便毒四服其毒即化為膿從大便出故名三奇治腫毒初起亦効

金銀花

貳錢

赤茯苓

一云赤芍藥

穿山甲

蛤粉炒

甘草節

各壹錢

白蒺藜

去刺貳錢

白殭蚕

炒

連翹

當歸

各壹錢五分

蜈蚣

壹條去頭尾

皂角刺

壹錢

大黃

實人五錢虛人叁錢

右水酒各半煎

洗方

烏藥

地榆

苦參

防風

荆芥

隨所用水加減

右等分煎湯浴洗淋浸極有奇効

擦法

瘡初起時用晉礬四兩研為細末患者坐重幃中擦手足心以盡為度七日汗出瘡愈

按此瘡傳方不一競稱神効然無確見徒足亂人心意以上之方乃的中肯綮者試之累驗用者弗惑焉

楊梅瘡驗方

白殭蚕炒去絲

野艾根

蟾蜍

川山甲炒

杏仁去皮尖及雙仁

皂角刺

肥皂核去黑衣槌碎

冷飯塊四兩

極精猪肉四兩

右藥入煮酒四碗同猪肉煮至貳碗服同猪肉食之查不用

楊梅瘡方良方

當歸

金銀花

連翹

防風

升麻各貳錢

土茯苓四兩忌茶鐵

酒二鍾煎至八分午時服渣再煎子時服如間一

次重服起連服貳拾貼除根永無筋骨疼痛之病

初起來藥方良方
患初起用此藥表利永無結毒之

大黃 川芎 威靈仙 麻黃 蟬脫各壹兩

用羊湯五碗煎至貳碗查再煎至壹碗作叁次服羊肉過口愚謂治梅瘡與治痘同法初起宜發散之劑毒盡透出辨虛實補瀉而兼解毒之劑若失於解散而後為結毒腫潰者有矣如過於解散而正氣虧耗漸為勞怯者有矣不可執寒涼一定之方而繆於施治也

點楊梅瘡初起良方

淡爐底

錢壹

麝香

厘七

硫黃

兩叁

右爲細末將雄鵝膽調點

楊梅點藥

良方

增

輕粉

硃砂

錢各壹

冰片

分壹

杏仁

四十粒

右爲末鵝膽調搽

白粉霜

專點梅瘡

水銀

兩壹

食鹽

明礬

火硝

衆礬

各貳兩五錢

硃砂

雄黃

錢各叁

內除水銀先將餘藥和勻漸入洋成罐內洋盡方下水銀慢火令乾有霜頭起爲度以空罐對合鹽

泥封固墾一地窟以水盆一個置窟內以空罐放

水盆內以泥壅之只畱上瓶武火煨三炷香爲度

取出上白藥每用壹厘冷水調點上三四日卽愈

楊梅瘡結毒第七十五

夫楊梅瘡初發勢盛者固爲可畏惟延綿歲月遍及肢體久則亦漸退減未至於傷生害命也若誤服方士丸藥及用燠藥之類目前固云暫好而毒流筋骨他年病發晝夜疼痛卒至肉腐骨朽其害豈可勝言然未聞有療此良方誠可慨也近得後方庶幾近理錄之以待試用者

黑虎丹

黑鉛

參斤用初出礦者槌成片以多槌為効

明乳香

錢參

右用磁瓶一個燒酒十五斤入鉛與乳香固封隔湯煮一晝夜取出埋地穴中出火毒早晚任意飲之酒後用瓦盆接所出小便自有粉出為驗至筋骨不疼為止

神妙起痾散

土萆薢

兩五

金銀花

兩壹

皂角刺

川椒

牛旁子

鬱金

當歸

黑鉛

參兩

右以鉛溶化入水銀五錢研為粉分五分前藥亦分五貼每貼水貳盞煎壹盞去粗入鉛粉再煎至八分濾淨服初服壹貼要出汗另用金銀花壹兩防風荆芥川椒各五錢煎水貳斗避風薰洗取汗為効患貳參十年者只四料四汗全愈

土茯苓酒

土茯苓

兩八

乳香

錢參

右用初出山鉛打大壺一把以可容燒酒十五斤為度計用鉛十斤盛酒與土茯苓乳香隔水煮一晝夜取出坐地孔中貳參日出火毒服之如前法按三方之意相同取物以類應之故也第其所佐

一方止用乳香一味一方兼用土茯苓二味恐未
足以盡其妙用盍若再濟以後方庶共成其効至
於起疔散則兼得之矣此蓋醫之以意度之以理
也並以錄之

天花粉酒

天花粉

四兩

蒼耳子

四兩

金銀花

四兩

當歸頭尾

四兩

上部加威靈仙壹兩

下部加牛膝壹兩

右用無漿絹爲囊盛貯前藥入生白酒內煮一晝
夜埋土地三日服盡毒消文治愚意酒必用醇力
方行藥此中加以黑鉛片二三斤庶幾廣其用也

俟明者裁定焉

解毒湯

皂角刺

薏苡仁

防風

天花粉

木瓜

白蘚皮

荆芥

金銀花

川芎

木通

各壹錢

土茯苓

貳兩伍錢

右用水參碗煎服按此方僅能解初發之毒若欲
除結毒之患與鉛酒兼用可也

柳灰散

椰子一個燒存性爲末

右每用貳錢炒熱入碗內以滾酒泡服被蓋取

汗

僊遺糧湯

僊遺糧

白者為佳壹兩

薏苡仁

白癬皮

木通

木瓜

防風

金銀花

各五分

皂莢子

四分

右虛損人加人參當歸各七分日服貳劑至暮又併二粗作一服輕者十餘日重者一月餘愈

乳香散

治楊梅瘡久不愈

乳香

沒藥

輕粉

雄黃

銅綠

各等分

右共為末先將人乳壹鍾熬至半鍾入藥再熬令乾搗爛搽上

香鯽湯

治輕粉毒久不愈

茜草

麻黃

烏藥

細茶

乳香

各壹錢

槐子

炒焦

川椒

各五錢

魚鰾

參錢用頃麻炒成珠去麻不用

右作一貼生薑五片葱五根通口服貳參劑即愈

不發

祛毒湯

治遠年楊梅風癰筋骨疼痛

土茯苓

貳斤

防風

荊芥

五加皮

白癬皮

木瓜

歲靈仙

各壹兩

當歸

酒洗

川芎

白芍藥

生地黃

酒洗

牛膝

白茯苓

杜仲

炒

白芷

地骨皮

青藤

槐花

黃連

各壹兩

右作十貼每貼水酒各半煎一鍾又煎粗攪勻作
貳次服藥粗晒乾參貼共煎湯候溫洗浴但初服
五貼瘡勢反盛乃毒氣攻外輕者十餘貼愈重者
亦不過貳拾貼定見奇効忌房事生冷煎燂雞鵝
羊并豬頭猪蹄魚蝦一應動氣之物

五烟

搽結毒已破者甚効方見痔漏條

三灰膏

土蜂窩

長脚蜂窩

油松節

各等分

右三味同燒過以碗罩住成炭研極細用香油煎
滾入黃蠟再煎方入三灰攪成膏貼瘡一二日即

變白生肌其方如神

楊梅結毒方

增

白砒

錢五

雄黃

分五

硃砂

錢五

水銀

錢五

輕粉

錢貳

硼砂

錢參

大黃

錢五

大管仲

錢柒

火硝

錢壹兩

五錢

右爲末入洋成罐以鐵油蓋蓋口鹽泥封固文武
火煨三炷香爲度取出用上升藥每服參厘土茯
苓煎湯送下一月全愈

又方

白砒

四兩碎如豆大以萊豆壹升煮一週時去豆再換煮

木香

兩壹

雄黃

錢五

硃砂

錢五

右爲末粘米糊丸如麻子大每服三四丸土茯苓湯送下服至三錢全愈

五靈丹

良方効

治楊梅結毒不問上下久近臭爛立

第一日土茯苓

六兩

麥門冬

去心壹錢

革麻肉

打碎壹錢

杏仁

去皮尖壹錢

白菓肉

打碎壹個

第二日土茯苓如前門冬革麻杏仁

各五分

白菓

五個

第三日土茯苓如前門冬革麻杏仁

貳分五厘

白菓

叁個

右每貼用水三四碗煎退一半約貳碗儘一日之飲以三方週而復始以瘡愈爲度每日爛猪肉須多吃以助生肌長肉之功

五皮散

良方

治楊梅結毒輕粉塊穿作痛

五加皮

真正者

海桐皮

白蘚皮

地骨皮

牡丹皮

各洗去沙土去心淨壹兩

乳香

沒藥

各壹錢半

川烏

草烏

用黑豆不拘多少水煮黑二鳥爲度去荳曬乾各五分

共爲末又冷飯塊四兩煎湯調下五分病在上食後服在下食前服

一方服飛龍奪命丹貳丸甚不參丸按飛龍奪命丹乃醫疔瘡之晒眩藥用以追毒厥有旨哉

一方在戰場中取殺過達倭腿脇等處骨連肉些少敲碎入磁瓶內以鐵燈盞鐵絲纏住黃泥拌鹽猪

毛炭灰搥熟封於瓶外二指厚陰乾取出在地下釘下三釘如香爐脚架瓶于上選堅炭滿架止露其頂以火煉之以官香三炷盡及臭氣十去其九卽退火冷下明日打開碾爲細末每壹兩入麻黃蘇木細末各壹錢五分糊爲丸如桐子大每服貳拾壹丸以陳醋脚調湯下連服叁日停止叁日又如前服叁日永不疼痛此瞽者顧松泉傳然未曾試以理評之或未足憑也

疥瘡第七十六

疥瘡有五乾溼虫砂膿也由於五臟蘊毒而發有風毒溼熱血虛風熱之別若癰腫作痛便秘或硬而發熱者爲風毒溼熱漫腫痒痛晡熱或時作寒熱體倦食少大便順利者爲血氣風熱此疥之大槩也

大抵乾者屬肺溼者屬脾虫者屬肝砂者屬心膿者屬腎若乾疥則搔痒皮枯屑起便秘爲心肝之火鬱於肺經宜四順清涼飲荆黃湯搜風順氣丸久者天門冬膏便利者乃相火鬱於肺經宜活血潤燥生津飲或四物湯加黃芩連翹天門冬久者腎氣丸久虛者烏荆丸如素有肺風面上多粉刺者

樺皮散

溼疥則骨腫作痛久則水流如黑豆汁便秘者乃溼熱之毒鬱於脾經宜防風通聖散或酒蒸或酒炒內大黃另用酒煨炒三次加木鱉子或用升麻葛根湯加天麻蟬脫氣滯者復元通氣散溼勝者除溼丹便利者爲脾虛溼熱宜補中益氣湯量加岑連清熱芎芷燥溼胃火作渴者竹葉黃耆湯脾鬱盜汗不寢者歸脾湯溺澀腹脹者胃苓湯加黃連久者二炒蒼栢丸溼勝者蒼朮膏脾肺風毒者何首烏散

砂疥者狀如砂子或痛或痒抓之有水焮赤乃心血凝滯也便秘者當歸丸或涼隔散合四物湯久者酒蒸黃連丸腦煩多痰者牛黃清心丸心煩口渴小便不利者連翹飲便利者活血四物湯久者當歸飲

虫疥則痒而不痛延蔓傳染便秘者乃肝風熱甚宜蘆薈丸或敗毒散磨羚羊角汁刺之久者苦參丸便利者屬肝經火鬱逍遙散磨羚羊角汁刺之久不愈者胡麻散然瘡屬肝經久則生虫手掌及指縫多生細虫腐間行走作痒有路以鍼尖挑取則

痒止水枯此等之瘡必敷洗方効

膿疥又謂之膿窠膿稠色厚焮痛便秘者爲溼熱宜五香連翹湯升麻和氣飲或竹葉石膏湯四物湯膿清色淡不痛而便利者爲腎經虛火宜逍遙散或八物湯加知柏或四生散腎氣丸此五疥屬各臟之分治也

若上體多則兼風熱下體多則兼風溼肥人多風溼瘦人多血熱又當以此意消息之但疥之爲溼南方最多北方甚少則其必本於溼也明矣患此者若瘦弱虛損則腎枯火炎當有便秘發熱作渴等

證止宜滋陰降火略加秦艽蒼耳連翹之類不可純用風藥及涼血之劑以致傷胃因皮膚而損臟腑也通用則連歸湯氣虛合四君子湯血虛合四物湯有風者合消毒飲有溼者合平胃散若夫散毒開鬱須用辛溫吳茱萸白芷之類也退肌熱則用苦寒芩連大黃之類也殺虫必須水銀此丹溪外治之三法故乾疥用吳茱萸散或黃連大黃爲末猪胆汁調搽溼疥一上散砂疥剪草散虫疥硫黃餅膿窠三黃散通用摩風膏洗用烏藥地榆苦參防風荆芥等分煎湯痒加蛇床子川椒腫加葱

白自無不効也

若退熱治乾痒出血須用芩連大黃或松香樟腦退
腫止痛須用寒水石白芷止痒殺虫用狗脊或蛇
床子枯礬或蕪荑水銀硫黃甚者加藜蘆斑猫乾
膿用無名異松皮灰頭瘡加黃連方解石脚瘡用
黃栢陰囊瘡用吳茱萸喜就火與湯者用硫黃溼
瘡用香油調乾瘡用猪油調此外治之不同者也
但疥癬之疾人咸忽之若藥不投證經年罔効誤
用攻代則害及腹心可不留意耶

四順清涼散

方見痔漏條

腎氣丸

方見掌疽條

樺皮散

方見癰風條

荊黃湯

荊芥穗

五錢

人參

貳錢伍分

大黃

壹錢伍分

甘草

壹錢

栝榔

壹錢五分

木香

七分五厘

輕粉

伍厘

右栝榔等三味爲細末而以荊芥穗等四味水煎
去渣調末服

烏荊丸

川烏

壹兩

荊芥穗

貳兩

右爲末醋煮麵糊爲丸如桐子大每服貳拾丸溫

酒送下

天門冬膏

天門冬去心水煎減半取出搗爛再煎入飴絞去粗粗入蜜再煎以滴水不散為度磁罐收貯每早滾白水或酒化壹貳匙服

活血潤燥生津飲

天門冬

麥門冬

五味子

瓜婁仁

麻子仁

甘草

當歸

生地黃

熟地黃

天花粉

各等分

右水煎

四物湯

方見掌疽條

補中益氣湯

方見掌疽條

防風通聖散

方見癰風條

歸脾湯

方見乳癰條

除溼丹

檳榔

甘遂

葳靈仙

赤芍藥

澤瀉

葶藶子

各貳兩

乳香

沒藥

各壹兩

黑丑

錢五

大戟

炒參兩

陳皮

四兩

右為細末麵糊為丸如梧子大每服五十丸溫水送下以利為度

升麻葛根湯

葛根

壹錢伍分

升麻

白芍藥

甘草

各壹錢

右水煎

復元通聖散

方見乳癰條

涼膈散

方見心癰條

胃苓湯

即平胃五苓

逍遙散

方見耳瘡條

二炒蒼栢丸

方見鶴膝風條

八物湯

方見乳癰條

五香連翹湯

方見初起湯藥條

四君子湯

方見乳癰條

蒼朮膏

用蒼朮貳拾斤俱細切以大砂鍋一隻量其可容
八九兩不等以新汲水煮之但水退壹寸即時加
足汁濃去粗又易水煎之蒼朮加水煎如初直待
蒼朮已盡方不加水用絹濾淨再熬成膏入白砂
蜜四斤又熬數沸每早白湯點服初或作熱或瀉
或有痰或作飽或善饑皆不妨碍久服則身輕骨
健蓋蒼朮氣雄通行脾腎二經語云若欲長生須
服山精即此味也一方加石楠葉三斤枸杞子楮

實子各貳斤

何首烏散

治脾肺風毒頭面遍身癰疥瘙痒及紫白癩風肌肉頑麻等證

何首烏

荆芥

防風

蔓荆子

歲靈仙

蚶皮草

甘草

各壹兩

右爲末每用貳錢白湯調下

當歸丸

治疥癰血熱便秘及痘疹已出嘔啞喘急便秘等証

當歸

錢五

黃連

壹錢五分

大黃

貳錢五分

甘艸

壹兩

右爲末以當歸熬成膏和丸梧子大每一二十九

米飲下

連翹飲

治諸熱表裏俱宜

連翹

車前子

瞿麥

牛旁子

滑石

赤芍藥

各五分

山梔仁

木通

蟬退

當歸

防風

各貳分

黃岑

荆芥

各八分

柴胡

甘草

各壹錢

右水煎

敗毒散

治傷寒發熱頭疼睛痛項強肢體煩疼傷風咳嗽鼻塞喘重及時行瘟疫瘴氣風溼風痰眩暈嘔噦等症如三陽經脚氣赤腫加大黃蒼朮皮膚疹痒加蟬脫心經蘊熱加黃芩

羌活

獨活

柴胡

前胡

枳殼

桔梗

川芎

赤茯苓

人參

各叁分

甘草

壹分五厘

右姜水洗

苦皂丸

治肺風皮膚瘙癢或生癰癬及遍身風熱細疹痛痒連腦頭臍腹及隱處并痰多不睡

苦參末

壹斤

右用皂莢貳斤以水壹斗浸揉取濃汁去粗熬成

膏和丸梧子大每服三十九丸荆芥薄荷酒下

胡麻散

治脾肺風毒攻衝遍身瘙痒或生瘡疥癰疹侵淫不愈及面上遊風如虫行狀紫白癰風頑麻或腎臟風攻注脚膝生瘡疥等証

胡麻

壹兩貳錢

荆芥

苦參

各八錢

何首烏

壹兩

甘草

葳靈仙

各壹錢

右爲末每服貳錢薄荷煎湯或茶酒蜜調下服後

頻頻浴身汗出立効

連歸湯

治諸瘡痛

黃連

當歸

各壹錢

連翹

黃芩

各柒分

甘艸

叁分

右藥黑瘦人合四物湯加大楓子黃栢肥白人加

荆芥羌活白芷蒼朮稟受實者合四物湯加大黃

芒硝水煎

升麻和氣飲

當歸

陳皮

各壹錢半

白芍藥

酒炒

枳殼

麩炒各八分

半夏

製

桔梗

黃炒

白芷

乾葛

白茯苓

炙甘草

各壹錢

乾姜

炮黑

大黃

各五分

升麻

叁分

右水煎

當歸飲子

治疥瘡為風溼所傷

當歸

黃耆

白芍藥

荆芥穗

何首烏

生地黃

防風

蒺藜

川芎

甘草

各七分

右水煎

苦參散

治遍身瘡疥經年不愈

苦參

蔓荊子

何首烏

荆芥穗

葳靈仙

各等分

右為細末每服貳錢酒調日用三服

苦參丸

治遍身瘡疥經年不愈

苦參

山梔子

防風

玄參

獨活

枳實

黃連

甘菊花

黃芩

大黃

各等分

右為細末蜜丸豌豆大每服五十丸不拘茶酒下

麻黃飲

治上體生瘡或痒或痛黃水浸淫結痂堆起蔓延於三陽之分根窠不大色帶紅腫此屬

熱溼

麻黃

去根留節

防風

蒼朮

各五錢

石膏

煨

羌活

各六錢五分

滑石

壹兩

陳皮

紫萍

黍粘子

各七錢半

黃芩

四錢

蒼耳草

生甘草

各叁錢半

硝砂

荊芥

各貳錢五分

薄荷葉

壹錢五分

右分十貼各用水以猛火煎成入好酒數滴去粗熱服須通身有汗其瘡自安汗不至足者必盡其劑

牛黃清心丸

乾山藥

七兩

甘艸

剉炒五兩

人參

神麴

炒

蒲黃

炒各貳兩五錢

犀角

貳兩

防風

白芍藥

當歸身尾

麥門冬

白朮

黃芩

各壹兩五錢

白茯苓

牛黃

柴胡

桔梗

各壹兩貳錢

大豆黃卷

炒

肉桂

去皮各壹兩七錢五分

羚羊角末

麝香

另研

龍腦

另研各壹兩

阿膠

炒珠

乾姜

炒

白欵

各七錢五分

雄黃

研飛盡八錢

金箔

壹千四百片入藥四百片爲衣

川芎

杏仁

去皮尖及雙仁者麴炒黃色另研各壹兩貳錢五分

大棗

壹百個去皮核蒸熟粘成膏

右除棗膏及杏仁金箔外牛黃龍腦麝香雄黃各另研爲細末入餘藥并金箔和勻再研先以杏仁入棗膏搗勻方將煉蜜與羣藥同入膏內爲丸每兩作十丸金箔爲衣每服壹丸食後溫水化下

竹葉石膏湯

竹葉

片三十

石膏

錢叁

半夏

錢貳

人參

壹錢五分

甘草

炙八分

麥門冬

錢壹

粳米

合半

右姜棗水煎

平胃散

蒼朮

貳錢調胃除溼和中

陳皮

壹錢四分和胃消痰溫中

厚朴

壹錢去滿除溼調中

甘草

八分調脾瀉火和中

右姜棗水煎入鹽少許溫服

消毒飲

黍粘子

壹錢六分

荆芥

壹錢貳分

甘草

四分

防風

貳分

右水煎服

吳茱萸散

治乾疥及春月發者宜此開鬱為主

吳茱萸

錢貳

寒水石

貳錢五分

白礬

錢貳

蛇床子

錢叁

黃栢

大黃

硫黃

輕粉

各壹錢

檳榔

壹個

樟腦

五分

右爲末香油調敷

剪艸散

治砂疥

寒水石

蕪荑

各貳錢

剪艸

枯礬

吳茱萸

黃栢

各壹錢

蒼朮

厚朴

雄黃

各五分

蛇床子

錢叁

輕粉

壹錢

右爲末香油調敷

硫黃餅

治瘡疥及冷瘡喜就火炙湯泡者

礬製硫黃壹兩研爲末少用水調成餅貼磁器碗底覆轉用蘄艾壹兩川椒叁錢爲末如燒香樣火燃烟起薰乾硫黃臨用再研先將桃柳桑槐楮五枝煎湯洗拭然後以麻油調搽

二黃散

治膿窠瘡退熱消腫止痛乾膿結痂

黃芩

錢叁

黃連

錢叁

大黃

錢叁

蛇床子

寒水石

各叁兩

黃丹

分五

白礬

錢壹

輕粉

白芷

無名易

白芷

各少許

右爲末先刺破油調傳之

丹溪一上散

治諸般疥瘡或痛或痒或喜火烘湯泡者

蛇床子

炒略

雄黃

研另

白膠香

銅銚溶過傾乾石頭上候冷研

黑狗脊

寒水石

另研各壹兩

白礬

黃連

各五錢

吳茱萸

錢叁

斑猫

十四個去翅足

右爲細末先用蒼耳草或羊不食草藤煎濃湯洗去瘡痂然後用香酒調敷一次可愈

水銀膏

水銀

川椒

焙

輕粉

枯礬

蛇床子

樟腦

各壹錢

大楓子

十五個去殼

右川椒等六味俱為極細末和勻入柏油搗煉成膏入水銀再搗以水銀不見為度

大楓子膏

大楓子仁 白油 油核桃仁 各六錢

朝腦 七錢 水銀 壹錢貳分 黑礬 叁分

右大楓子四味俱為極細末入白油水銀搗為膏以不見水銀為度塗患處

大槓榔散 治乾疥癬

硫黃 黑狗脊 輕粉 壹錢 紅娘子

大槓榔 各壹個

右為細末每用五分於手掌中臨臥時調油如糊兩手槎磨梅熱鼻肉聞之方磨擦疥上隔日再上甚者不過三次

東垣一上散 治溼疥腫痛作痒鼻爛

黑狗脊 五錢 蛇床子 炒五錢 熟硫黃 五錢 寒水石 五錢

雄黃 五錢通明手可破者佳 斑猫 叁個去翅足先研碎

右雄黃硫黃寒水石另研如粉次入斑猫和蛇床子黑狗脊為細末同研勻先洗疥癬透去痂油調藥手中擦熱聞三四次然後擦上即愈若痛甚腫滿高起者加寒水石一倍微痒加蛇床子瘡中有

虫加雄黃如喜火炙湯浴者加硫黃

藺茹膏

治手足瘡疥久而虫生及無名惡瘡風癬之類

藺茹

壹兩

黃連

蛇床子

枯白礬

水錢

各貳兩

黃蠟

壹兩

右用臘猪脂七兩熬化入藺茹等三味煮至焦紫色去粗入黃蠟浴開出火稍凝後下水銀枯礬攪至勻手指塗摩

立効散

全蝎

三十個

巴豆

三十粒

皂角

七條炒焦

右爲粗末以香油六兩煎至焦黃色去粗入大楓

子蛇床子枯白礬三細末各壹兩黃蠟貳兩同熬

成膏磁器收貯任意搽瘡

脂調散

治疥瘡膿窠神効

蛇床子

貳兩

藺茹

草烏頭

荆芥

花椒

苦參

各壹兩

雄黃

硫黃

明礬

各五錢

爲末猪脂調搽

掃疥散

治諸疥瘡熱瘡遍身瘡癩神効

大黃

蛇床子

黃連

金毛狗脊

黃栢

苦參

以上六味各五錢爲細末入後藥

水銀

茶末搗殺

硫黃 各四錢

雄黃 貳錢五分

黃丹 貳錢五分 輕粉 壹錢

大楓子

木鱉子 各五錢去殼爲細末同前六味末搗勻

同生猪脂調洗浴後擦搽此藥宜晒不可見火

一擦光 治疥瘡及婦人陰蝕瘡漆瘡火丹及諸惡瘡神効

蛇床子

苦參

蕪荑 各壹兩 雄黃 五錢

枯礬 壹兩貳錢

硫黃 五錢

輕粉 樟腦 各貳錢

大楓子 取肉

川椒 各五錢

爲末生猪脂調塗

又方 治同前兼治小兒癩頭瘡

蛇床子

硫黃

黃礬 各壹兩 大楓子肉

川椒

雄黃 各五錢

枯礬 貳兩 輕粉 另研貳兩

牛皮岸 薰牛皮煙岸如無以香盤煙岸代

黃丹 各壹兩

爲末生猪脂調搽

一治疥癬以臘月猪脂同生白礬杏仁加輕粉搗勻

擦之神効

疥癩方 春天發焦疥開鬱爲主不宜抓破

蛇床子

吳茱萸

白礬 各貳錢 黃栢

大黃

硫黃 各壹錢

樟腦 五分 寒水石 貳錢五分

檳榔 壹枚

輕粉

爲末猪脂調敷

巴豆膏

治一切蟲疥

巴豆

粒柒

蕪荑

硫黃

研

白礬

枯各五錢

猪脂

爲末煉猪脂成油入藥末調和令勻每丸

如蓮子大于手中槎之

神異膏

治一切瘡疥

雄黃

蛇床子

各叁錢

巴豆

粒七

皂角

壹定

輕粉

叁錢

全蝎

七枚

黃蠟

五錢

油

壹兩

先用皂角全蝎巴豆煎油變色去三味入黃蠟化開冷定入雄黃蛇床子末輕粉和勻成膏先以苦參湯洗却以藥擦之神効

一笑散

治渾身疥癩瘙痒成惡瘡

檳榔

藁本

硫黃

蛇床子

枯礬

文蛤

白膠香

各等分

爲末溼者乾敷乾者油調搽如頭瘡搽上不用剝甚者不過三五次平復

治遍身生熱毒瘡黃水淋瀝痛不可忍粘衣着被用

菖蒲三斗剉日晒乾爲末布席間卧于上覆以衣

被不五日其瘡如失

烏頭散

治溼疥

川烏頭

藜蘆

馬蘭根

石菖蒲

杏仁

苦參

硫黃

膩粉

枯礬

各五錢

爲末拌勻先以桃湯洗拭乾後以油水和之塗上

一日三次

黃連散

治溼疥生黃水皮膚瘙癢

黃連

貳兩

蛇床子

赤小豆

糯米

胡粉

各壹兩

水銀

壹兩五錢

爲末清油和研俟水銀星盡如膏塗之

香疥藥

治風癬瘡黃水瘡疥瘡牛皮癬

輕粉

水銀

樟腦

各叁錢

大楓子肉

川椒

各四十枚

柏油燭

杏仁

爲細末用絹包裹擦疥黃水瘡搽之効如神

治一切渾身疥癬經年不効者

百部

五錢

亂髮

木香

檳榔

苦參

各貳分

川椒

叁錢

鯽魚

壹枚不見水切片

右以油五兩煎前藥得所去藥却用麝香壹分膩粉壹兩倭硫雄黃各五錢同研勻入油內滾五七

沸貯用

四黃散

治風癬膿疥瘡煎方一應諸瘡毒皆宜服無不効增

赤芍藥

黃芩

黃連

黃柏

各壹錢

大黃 參二錢 朱分

防風

當歸身尾 壹錢 五分

木鱉子 壹個 去殼

金銀花

苦參 各壹錢 貳分

右用水壹鍾酒壹鍾煎至壹鍾後下大黃煎四沸取去露一宿五更服若腸風臟毒下血去木鱉子加槐花壹錢驗

大楓膏

搽膿疥瘡神効先服前煎藥貳服再搽三五日全可增

川椒

輕粉 水銀代亦可

枯礬

蛇床子 另研淨末

樟腦

各參分

蜂窩

火燒存性

蛇蛻

火燒存性各參分

柜油燭

參兩

大楓子

去殼四十九個

杏

不去皮尖四十九個

右將諸藥研細以柜油燭化開和勻調塗三五日

內愈

治溼毒瘡神効

良方

用煎銀淡底火內燒通紅在麻油內淬七次貳兩加松香壹兩枯礬壹兩溼者乾摻乾者麻油調搽

治寒溼等瘡

增

飛丹

四錢

黃連

五錢

蒼朮

五錢

松香

五錢

兒茶

壹錢

輕粉

五分

右為極細末用生葱頭十根搗爛加香油調如膏用梓樹葉攤以隔葉貼一二日再換如痛者加乳香沒藥各五分先用桑葉葱頭煎湯候溫洗淨貼

膏

大風水銀膏

良方 專治遠年近日瘡癰膿窠風癬及驚掌風用川椒葱白甘草煎湯洗去

腌膿軟絹拭乾後用藥一丸手內揉軟揩擦瘡上二三次神効忌食鷄鵝羊肉猪首腸蹄辛辣發毒之物

牙硝

綠礬

二味燒酒炒過

白礬

各四兩

同入楊硃確內鹽泥封固煨二炷香足取出為極

細末聽用

水銀

黑鉛

各貳兩

同入鐵杓內化開煨過為細末

胆礬

伍錢另研極細末

川椒

另研

杏仁

去皮尖另研

蛇床子

另研

半夏

硫黃

另研

檳榔

以水浸一宿細切

片同水磨二三

杜木鱉

去殼細切薄片另研

雄黃

另研共九味各貳兩

大楓子

去殼細切片

油核桃

各參兩貳味共研柏油燭貳斤

以上共十八味各為極細末和勻柏油化開為丸

溼瘡并癰瘡膏

增

黃蠟

壹兩

頭髮

壹拳大

香油

壹兩

輕粉

貳錢另研

猪膽

貳個

右先將香油熬四五沸次下黃蠟又熬四五沸再後下頭髮文火熬用槐柳條不住手攪候髮消化

濾淨後下輕粉略熬一時取起放磁碗內冷水浸少頃卽成膏一切溼瘡癰瘡貼半日黃水流出的乾加藥再貼一七全愈

又方

用大楓子肉杏仁松香花椒葱頭搗爛作餅如瘡大貼之每日一換先用米泔水洗淨貼之

臘油膏

治膿瘡滋溼不愈

猪板油貳兩熬去膜滴水成珠再下黃占白占各四錢化盡取起又下乳香沒藥輕粉各壹錢調如膏藥塗瘡上

水銀膏

治肥疥瘡

增

水銀

雄黃

枯礬

川椒

各叁錢

輕粉

貳錢

苦參

貳錢

蘆甘石

貳錢

蛇床子

貳錢

大楓子肉

五十個

右爲末以燭油調先以金銀花苦參防風荊芥當歸尾煎湯浴洗次以藥擦之

薰筒

治風溼疥癬

增

蒼朮

五錢

荊芥

壹兩

防風

壹兩

雄黃

五錢

川椒

叁錢

樟腦

壹錢

蛇床子

五錢

土木鱉肉

五錢

右爲末以艾先鋪粗紙上以藥末四錢勻摻捲作

筒先以煎湯浴之次燃火燻之取燒過藥存性擦之立効

專治肥疥瘡增

威靈仙

石菖蒲

苦參

胡麻各四兩

何首烏

四兩

甘草

貳兩

右剉用好酒十斤浸藥春夏二日秋冬四日夾瓶煮一時候冷漸服

五龍膏

治疥癬神効

硫黃

白礬

白芷

吳茱萸

川椒

各等分

右爲末香油調塗或止用枯礬輕粉加杏仁大楓子肉五錢搗膏擦之

膿瘡瘡方增

黃連

防風

荊芥

蒼朮

大黃

黃栢

黃芪

甘艸

金銀花

水煎服三四貼見効

又敷藥

水銀

貳錢

枯礬

壹兩

雄黃

貳錢

杏仁

貳錢

大楓子肉

壹兩

猪脂爲丸擦之

一方治砂疥以上蟻窠黃荆葉雉鷄毛等分燒存性油調敷

一方治疥取羊蹄根和猪脂塗上或着鹽少許卽焦
一丹溪治浸淫瘡痛不可忍者以刺薊末水調敷
一洗疥用何首烏艾等分煎濃汁洗之能解痛生肌
一丹溪方治諸瘡癰年久不愈用千年韭根炒存性爲末猪油調敷三次卽愈

諸癰第七十七

癰有五名曰溼曰頑曰風曰馬曰牛總而言之無非血分燥熱以致風毒客於皮膚也

凡溼癰痒如虫行搔之則有汁出風毒少溼氣多頑癰全然不知痛痒風癰卽乾癰搔之則有白屑風毒多溼氣少故爲乾癰馬癰微痒白點相連又曰狗癰此由腠理虛而受風血澁不能榮肌也牛癰如牛頸皮厚且堅其他曰魚鱗癰荷葉癰皆因形而名不出乎五者之類楊梅癰則因曾生楊梅瘡之餘毒也

初起有可下者打膿散去黃連金銀花穿山甲芒硝加赤白芍藥水酒各半煎熟入大黃再煎一沸露

一宿五更服亦有可汗者四物湯加荊芥麻黃各五錢浮萍壹兩葱豉煎服取汗經久不可汗下者止用防風通聖散去硝黃加浮萍年久不愈者體盛兼吞頑癬丸或龍虎丹另用何首烏白芷蘇木等分入猪油及鹽少許浸酒送下體虛者不可妄用風藥氣虛者何首烏散消風散血燥者四聖不老丹或腎氣丸久服自効有虫者俱宜間服蠟礬丸

薛云疥癬皆由脾經溼熱及肺氣客于肌膚所致風毒之浮淺者爲疥沉深者爲癬蓋癬乃發于肺之風毒而疥則兼乎脾之溼熱而成也久而不愈延及遍身浸淫潰爛或痒或痛其狀不一皆有細虫亦能染人

治法當以殺蟲滲溼消毒之藥敷之內服和脾清肺除風散溼之劑庶可除根

面上風癬初起痞癰漸成細瘡時作痛痒發於春月名吹花癬女人多有之此皆肺經蘊積風熱陽氣上升發于面部或在眉目之間久而不已恐成風疾治法惟清心火散肺經風熱然後以消毒散熱之藥敷之

風癰由惡風冷溼氣客于肌皮搏于血氣所生有如

錢文漸漸長開或圓或斜有匡闌但抓搔頑痺不

知痛痒內亦有虫

打膿散 治諸癰腫膿不潰

金銀花 錢壹

黃連 錢壹

黃芩 錢壹

黃柏 錢壹

當歸尾 錢壹

大黃 兩壹

甘草節 分柒 穿山甲 分柒

芒硝 錢叁

木鱉子 虎者七個 實者九個

右水煎五更服大便見膿小便見血為効

頑癰丸

浮萍

蒼朮

蒼耳 各壹兩

苦參 壹兩五錢

黃芩 錢伍

香附 錢貳伍分

右為末酒糊為丸白湯下

消風散

荊芥

甘艸 各貳兩

人參

白茯苓

殭蚕

川芎

防風

藿香

蛇蛻

羌活 各壹兩

陳皮

厚朴 各伍錢

右為細末凡風頭痛鼻流清涕者荊芥湯下瘡癰

溫酒下各貳錢

祛風敗毒散

治風瘡疥癰癰疹紫白癰風赤遊風血風腫瘡丹瘤上部者加桔梗壹錢下部

者去蟬退殭蚕加木瓜牛膝各壹錢

枳殼

赤芍藥

前胡

柴胡各五分

川芎

羌活各八分

荆芥

薄荷

牛旁子

蒼朮各六分

獨荷

殭蚕

連翹各半

蟬退

甘艸各三分

右姜水煎

四物湯

方見掌疽條

防風通聖散

方見癰風條

腎氣丸

方見掌疽條

風礬丸

方見初起湯藥條

易頭丸

能治癰方見癰風條

單苦參丸

能治癰卽苦皂丸方見疥瘡條

何首烏丸

能治癰卽何首烏散方見疥瘡條

川槿皮膏

川槿皮

白芨各貳兩

百部五錢

大楓子柒錢

栝榔

草烏

文蛤各叁錢

南星貳錢

草果

蟬脫

輕粉叁錢

硫黃貳錢

雄黃五個

枯白礬五分

麝香五厘

右輕粉以下五味各爲極細末川槿皮等十味用

釅醋四大碗慢火熬至一碗濾去粗再用慢火熬

成膏入輕粉等五味攪勻收磁瓶以穿山甲爬破

癬皮搽

二娘子散

治諸癬

川槿皮

滑石

白薇

各參錢

鷹條

半分

斑猫

去翅頭足十個

蚯蚓泥

乾者壹錢七分

青娘子

紅娘子

各四個

右爲末并花水調厚敷患處年久者五次新近者三次除根

一方治溼癬用枯礬黃連各五錢胡粉黃丹水銀各貳錢入猪脂貳兩研待水銀不見星收磁罐搽一方治溼癬多年不愈以蚕沙四兩薄荷五錢爲細

末乾摻上或用生油調搽大有神効

一丹溪方治溼癬以蘆薈壹兩甘艸五錢各爲末溫漿水洗癬敷之神効

一方治溼癬用蒼朮川椒各貳錢水煎三四沸頻頻薰洗一二日卽愈

一方治風溼癬并年久頑癬用川槿皮四兩半夏枳榔木鱉仁各五錢俱切片雄黃三錢斑毛白砒各壹錢俱研末用井水河水各一碗共浸一處日晒夜露三晝夜鵝翎掃癬上百發百中

一方治頑癬用川槿皮巴豆斑猫各壹錢生砒少許

共爲細末水調敷神効

一方治頑癰用人言壹分川椒五分飛礬叁分輕粉壹錢以蜜調用土大黃根擦之

一方治風癰用苦練根皮小麥川椒各等分水煎三五沸薰洗其効如神

方用大鮮南星搗如粉用好醋漂之其粉沉醋下者晒乾再用醋調塗

方治風癰用大楓子仁壹兩杏仁去皮尖川槿皮各五錢雄黃水銀輕粉黃丹各貳錢川椒細茶樟腦確口泥蛇床子各三錢爲細末以柏油調和搗

無水銀星爲度擦患處

一方治風癰卽乾癰用狼毒草烏各貳錢五分斑猫柒個研爲末津唾調塗

一方治風癰遇陰雨卽痒及搔破流黃水者以狼毒末塗之

一方天麻散浸油可搽風癰

方見頭瘡條

一方治馬癰用馬鞭草不犯鐵器搗自然汁半盞飲盡十日卽愈

一方獨蒜頭搗爛加明礬三兩入好醋一盃頓滾先以穀樹葉擦破用筆蘸塗

一方治牛皮癬用清油壹兩入全蝎七個巴豆貳拾粒斑猫十個熬焦濾渣入黃蠟壹錢候溶收貯頻搽

一方治魚鱗癬用鯉魚頭壹個五倍子三個俱燒灰杵細清油調鵝翎塗不拘遍數

一方治荷葉癬用川槿皮海桐皮甘艸大楓子仁栴榔半夏各五錢爲粗末以河水井水共壹碗先浸二宿春秋晒三日露三夜夏晒二日露二夜冬月晒七日露五夜絹濾去粗另用輕粉三錢研極細入前汁中和勻用時以熱湯洗癬淨穿山甲刮破

筆蘸藥塗上不日可愈頑癬楊梅癬並宜此方屢見神効但冬月夜露則凍不如春秋用之相宜

一方治楊梅癬用陳石灰大楓子枯礬各壹錢爲細末穀樹汁羊蹄根生薑蘸擦但穀樹北方所無不用亦可

洗疥癬通用方

金銀花

藤亦可

野菊花

苗亦可

苦參

各貳兩鮮者焙之

黃芩

黃栢

黃連

當歸尾

白芍藥

白芷

連翹

桔梗

羌活

甘艸節

防風

荆芥

皮硝

各壹兩

銅青

五兩

右用生料切碎以布袋盛之不拘多少濃煎無風煖處浴洗良久爲妙粗可再煎

治癰通用五方

一方治諸癰以槿樹皮不犯鐵器貳兩蘆薈參錢白芨參錢細研爲末刮癰出血用好醋調敷一次卽愈

一方治諸癰用麻油貳兩入巴豆草麻子各十四粒斑猫七個熬煎枯黑去粗入白蠟五錢蘆薈末三錢攪勻收磁罐刮破搽之

一方用川槿皮剪草木鱉子等分爲末醋調敷

一方以羊蹄根汁調膩粉敷三五遍卽瘥

一法癰瘡至劇湯火不能解痒後復痛乃溼淫於血

所致宜以痒時用鑽鍼刺出惡血磁鋒亦可三四

次卽愈

八寶散

治風癰及松皮頑癰久不愈者此方神効

藿香

破故紙

檳榔

大腹皮

雄黃

輕粉

硫黃

白礬

枯各壹兩

爲末香油搽擦日三五次

定粉膏

增

治乾溼癰風痺癰不拘久近

定粉

水銀

蕪荑

胭脂

各等分

右用陳豬脂壹兩同研成膏先以湯洗後以膏臨臥塗之一上即瘡

洗方

練實

半斤或以根皮代

練葉嫩枝

剉

凌霄花及藤

剉各壹升

枳殼

蛇床子

地榆

丹參

白英

苦參

各叁兩

右煎濃汁熱洗後用膏子

烏蛇丸

治風癰

烏蛇

酒浸去皮

附子

童溺浸一宿

白附子

天麻

各貳兩

全蝎

羌活

乳香

殭蚕

炒各壹兩伍錢

苦參

十兩

槐花

八兩

右爲末用生姜汁壹斤蜜壹斤同熬成膏入藥和

丸每服三四十九溫酒下夜臥荆芥湯下

白花蛇丸

治風癰

白花蛇

參兩酒浸

麥門冬

壹兩五錢

苦參

貳兩

黃芩

防風

白蘚皮

甘艸

枳殼

梔子仁

赤芍藥

大黃

蒼耳子

羌活

黃耆

白蒺藜

各壹兩

右爲末煉蜜重搗爲丸每服三十九薄荷酒下

宣風換肌散

治一切風癰疥癩疔瘡瘡

甘艸

黃芪

當歸

各壹兩

黃連

黃芩

各酒炒

大力子

炒

防風

白芷

荆穗

烏蛇肉

川芎

各五錢

羌活

蒼朮

何首烏

各叁錢

全蝎

十枚炒

右爲末酒調服每貳錢

硫黃散

治風毒癰

硫黃

雄黃

硃砂

麝香

吳茱萸

附子

生用各貳錢半

芭豆

去皮油

川椒

各壹錢

右爲末同研勻先用新布擦癰令水出卽用此藥

入醋一鍾調塗之不過三五次而愈

一抹散

增

治乾癰

南星

草頭烏

各壹枚生用

右爲末用羊蹄根搗汁絞取調塗不過三五次愈

溼癰方

增

黃連

明礬

各五錢

胡粉

黃丹

水銀

各貳錢

右爲末用猪脂一兩夾研令水銀不見星收用

擦癰方

良方

川槿皮

壹兩

大楓子肉

四十粒

雄黃

叁錢

木鱉子肉

七枚

杏仁

四十九粒
去皮尖

枯礬

貳錢

輕粉

壹錢

右俱研勻擦之

癰疹第七十八

附瘰

瘰癧

癰疹由於風邪客于肌膚遇風寒相搏則爲癰疹又有赤疹起于卒然如蚊咬煩極瘙之逐手而起因于風熱又有白疹風冷搏結所起遇冷或風則甚晴明則已脉浮爲風洪爲氣風氣相搏乃成癰疹丹溪云疹屬熱與痰宜清肺火降痰或汗下解之在表者消毒飲子防風通聖散加牛旁子在裏者大

柴胡湯四順清涼飲虛者補中益氣湯略同傷寒

施治

方論云緣肌有溼因涼燠之氣所折而成熱結成赤疹風熱相搏成白疹故赤疹得熱則劇得冷則減白疹遇雨而甚晴明而解一則熱氣鬱于內故惡熱一則熱氣散于外故惡冷

又有風痞癰者卽內經所謂汗出見溼乃生瘰癧又曰勞汗當風寒薄爲鬱乃爲瘰癧卽癰疹屬也小兒發痘之外又有出疹一二次者亦是君相二火未盡之毒

加味羌活湯

治風寒暑溼外搏肌膚發為癰疹增寒發熱遍身瘙痒

羌活

前胡

各壹兩

人參

桔梗

甘草

枳殼

川芎

天麻

土茯苓

各壹兩

薄荷

蟬蛻

去頭各參錢

為末每服參錢水一盞生姜三片煎溫服

羚羊角散

治同上

羚羊角

白鮮皮

白蒺藜

防風

麻黃

去節

甘艸

羌活

各壹兩

枳殼

五錢

人參

杏仁

去皮尖炒

生地黄

黃芩

各七錢五分

每服四錢水一鍾煎至半鍾入酒小半杯再煎一

滾服

楓香丸

治痒疹

楓香

白鮮皮

白蒺藜

蛇床子

羚羊角

各壹兩

川烏頭

炮去皮臍

藁本

仙靈脾

蔓荊子

莽艸

赤箭

各五錢

為末蜜丸重搗三百下丸食後溫水送下

漏蘆丸

治風癰疹

漏蘆

壹兩

枳殼

苦參

各參兩

防風

川大黃

烏蛇

右為末丸如前法

烏蛇膏

治風癰疹結腫攻衝遍身發痒及治筋脉攣急

烏蛇

木鱉子肉

當歸

枳殼

大黃

各壹兩

天麻

附子

烏喙

南星

桂心

細辛

去苗

吳茱萸

羌活

蒼朮

防風

牛膝

川椒

白芷

僵蚕

乾蝎

各五錢

右擇淨藥並生用以醱醋一碗浸一宿用臘月煉成猪板膏貳斤入前藥慢火熬看白芷黃黑色下火濾去渣淨入磁器盛之時時摩塗患處立効

莽草膏

治赤疹痒痛瘙之隨手而起

莽草

朱錢伍分

當歸

芎藭

大戟

細辛

芍藥

芫花

川椒

躑躅花

附子

蒴藿根

各壹兩

苦參

貳兩

猪板油

叁斤

右酒浸一宿入猪膏熬如上法看附子色變下火一治風腫癰疹用生白礬陳石灰各壹兩用生姜自然汁調和勻如白糊塗患處一日効

一治十種癰疹用石灰研極細末和醋漿水塗疹上

地骨皮湯

治風疹

地骨皮

八兩

當歸

四兩

白鹽

貳兩

白礬

壹兩

右每藥五兩水壹斗煎二三升去粗再煎至一升收斂器中用綿蘸拭患處

治風疹百治不効用白礬五兩爲末用好酒三合童溺一升煎如稀糊以綿蘸于上輕輕揩之應手消散

一治面目身體生斑或痒或癩子起腫不治能害人羚羊角燒灰研細以雞子清或水和塗極効一方用蚕沙煎湯亦効

丹參散

治風瘙皮膚赤白癰

丹參

人參

苦參

雷丸

牛膝

酒浸

防風

白附子

白花蛇

右爲末每服貳錢食前甘草湯下

座卽熱小癰内生血膿又曰熱瘡癰子

黑末子

治熱癰

用羊角連內骨燒存性爲末酒調三錢分上下服此方用之殊効嘗以治面上身中卒得赤班或痒或癩以此物爲末用雞子清塗之甚効

熱瘡癰子卽膿窠瘡也其初起但出黃汁者名肥瘡又名黃爛瘡治法略具疥門

膿胞瘡治法清熱爲主

黃芩

黃連

大黃

各錢參

蛇床子

寒水石

貳錢

黃丹

五分

白礬

壹錢

輕粉

白芷

無名異

木香

各少許

爲末麻油調塗

七寶散

治熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃芪

當歸

防風

荆穗

地骨皮

木通

各貳兩

白礬

壹兩

右爲粗末用藥一兩水三碗煎濃濾去粗稍熱淋

溲患處要避風一時

赤石脂散

治癰子磨破成瘡此藥止痛生肌

赤石脂

臘茶末

黃檗

各五錢

白麵

貳兩

龍腦

五分另研

右爲末研勻每以綿搥撲之

王女英

治癰子瘡

滑石

五錢

菜豆粉

四兩微炒

右如上法撲之

棟花粉

治癰子癢痒

用苦棟花焙乾爲末入蚌粉滑石末各少許研勻

傳之

一方治癰子用香粉入朴硝末枯礬末少許如常搥

撲

瘡癰由汗出當風風氣搏于肌膚而生或搔之成瘡
方治風熱生瘡癰先用丹參苦參各四兩蛇床子
參兩水煎湯乘熱洗之

羚羊角散

治風熱生瘡癰

羚羊角

烏梢蛇

酒浸

大黃

玄參

各壹兩

枳殼

白蒺藜

甘草

各伍錢

秦艽

防風

各七錢五分

右每服五錢水一鍾煎七分去粗入牛蒡子根汁
半合再煎溫服

秦艽湯

治風熱毒氣搏于皮膚遍身瘡癰

秦艽

壹兩

防風

黃芩

麻黃

去節

甘草

炙

玄參

犀角屑

牛蒡子

枳殼

升麻

各柒錢伍分

右每服五錢水一盞煎七分去渣溫服

防風散

治風癰

防風

貳兩

杏仁

貳兩

白殭蚕

炒貳兩

甘草

壹兩炙

爲細末每服三錢蜜水空心下或溫酒

荆芥散

治風熱皮膚瘙癢生瘡癰

荆芥

赤茯苓

苦參

各壹兩

蔓荊子

天麻

人參

防風

獨活

枳殼

各五錢

牛蒡子

黃芩

各七錢半

烏蛇肉

貳兩酒浸

右爲末服如上法

莽艸膏

方見癰疹

一治風熱皮膚瘙痒用芎藭麻黃根白芷各三兩雷丸五兩藿香貳兩藜蘆壹兩五錢爲末入英粉五兩相和逐日撲粉身中

時毒第七十九

附天包瘡天行班瘡

時毒者外科精義以爲四時邪毒之氣感之于人也其候發于鼻面耳項咽喉赤腫無頭有類瘡疽結

核有根又類癰瘰癧憎寒發熱頭痛肢體痛又類外感若五日以前精神昏亂咽喉閉塞語音不出頭面不腫食不知味爲必死之證惟其頭面不腫而醫無素識者莫不以他證擬之勢益危矣要在於人之精辯耳

凡遇此證或見赤腫或見結核或見咽喉閉塞便須以意度之診其脉浮數者邪在表也用葛根牛旁湯解毒升麻湯之類以發之脉沉濇者邪在裏也用梔子仁湯大黃湯之類以下之表裏俱病者犀角升麻湯或砭出惡血及用通氣散噓鼻取嚏以

泄其毒噉之無噤不可治矣噤出膿血不藥可愈
三四日不解不可大下惟宜和解用犀角散連翹
散之類七八日便利頭面腫起高赤宜托裏散黃
耆散之類十日之外則無虞矣

此證多傳染若同室之人常時噉鼻亦可無患大抵
時毒與大頭瘟證不甚相遠治法頗相類普濟消
毒飲似亦可以通用然不可誤認爲熱毒而不令
汗下以致誤人

葛根牛旁湯

葛根

貫衆

甘草

豆豉

牛旁

半生半炒
各貳錢

右水煎

犀角升麻湯

時毒風熱頭面腫痛或咽喉
不利或風熱髮直疔瘰等証

犀角

壹錢

升麻

壹錢

防風

壹錢

羌活

壹錢

白芷

伍分

白附子

伍分

防已

伍分

甘艸

陸分

黃芩

右水煎

梔子仁湯

時毒腫痛
大便秘結

鬱金

枳殼

升麻

山梔仁

牛旁子

大黃

右水煎

時毒腫甚

取嚏泄毒

玄參

壹錢五分

猪牙皂角

川芎

各壹錢

藜蘆

五分

羊躑躅花

貳錢五分

右爲末用紙燃蘸少許盡鼻內取嚏爲度

普濟消毒飲

時毒面上腫痛或咽喉不利若饑饉之後患之宜此仍當固胃氣

黃芩

叁錢

連翹

叁錢

人參

貳錢

陳皮

玄參

甘草

柴胡

桔梗

各壹錢

牛旁子

柒分

馬勃

柒分

板藍根

柒分

白殭蚕

五分

升麻

五分

右水煎服大便秘量加大黃

漏蘆散

治臟腑積熱發爲腫毒時疫疔瘡頭面紅腫咽嗑堵塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆

柒分

升麻

柒分

大黃

柒分

黃芩

柒分

藍葉

壹錢四分

玄參

壹錢四分

右水煎薰熱甚者加芒硝貳錢五分

消毒丸

治時毒疔瘡等証

大黃

牡礪

燒

白殭蚕

炒各壹兩

右爲細末蜜丸彈子大新汲水化下壹丸或用桔

梗黍粘子湯亦可

托裏溫經湯

麻黃

發來去梗節四錢

防風

辛散貳錢

升麻

四錢

白芷

各貳錢

葛根

鮮肌出汗
主治陽明

蒼朮

去膚勝溼
熱壹錢

人參

壹錢

當歸身

加血
散滯

甘艸

白芍藥

調中益氣
各壹錢半

每服壹兩先煎麻黃去沫下餘藥煎壹盞服以衣

覆煖臥使經血溫腠理開汗出腫減再一服去麻

黃加連翹黍粘子汗之即愈

升麻牛蒡散

治時毒瘡疹脉浮洪在表之證瘡發于
頭面胸膈之際

升麻

牛蒡子

甘草

桔梗

葛根

玄參

麻黃

各壹錢

連翹

貳錢

加姜三片水煎

五利大黃湯

治時毒腫痛便閉脉實者大効

大黃

黃芩

梔子

升麻

芒硝

加薄荷煎一方加連翹玄參大青甘草

防風通聖散及荆房敗毒散加玄參牛蒡子俱効

若有瘀血作膿用托裏消毒散

防風通聖散

方見癰風條

連翹散

方見惡候療治條

一方治天泡瘡從肚皮起者乃裏熱外發連服通聖

散外以蚯蚓泥略炒蜜調敷之

一方治天行班瘡須臾遍身皆帶白漿此惡毒氣也

但煮葵菜葉以蒜薹啖之即止

治天泡瘡 良方

硃砂

雄黃

石膏 煨

天花粉

枯礬

連翹

各五錢

黃丹 壹錢

右為末煉蜜丸清晨白湯壹錢四五分數日即愈

敷天泡瘡 良方

大黃

皮硝

防風

荊芥

共等分為末煎湯將瘡未潰者刺破以井花水調

藥搽上

又方

將生雄蟹膏搽瘡上即愈

諸瘡成漏第八十

凡癰疽之發不必拘于下部成漏雖在上部初發時

肉不變色或堅硬如石或按之不痛久而後方變

色覺痛漸軟成膿如泔而稀其瘡口必不易合日

久敗壞肌肉銷損骨髓變而為痔瘻此蓋腎移寒

於脾發為癰疽少氣脾移寒於肝發為癰疽拘攣

岐伯曰地之溼氣感則害人皮肉筋脉又曰生於

八風之變是外因於寒溼而為漏也至於臀癰則

氣血罕到懸癰則肉理如縷聽其自潰則攻蝕愈

深若用鍼烙又或誤傷良肉兼之平時縱情酒色元氣素虧或脾胃不足不能榮於氣血或藥過尅伐反至傷於榮衛故瘡口日久不合膿水清稀是內因於虛損而爲漏也

薛立齋云瘡瘍爲漏皆因元氣不足營氣不從逆於肉裏或寒氣相搏稽留血脉腐潰旣久陽氣虛寒外邪乘虛下陷卽成是患初成之時當用參耆歸朮溫補皮胃外用桑枝灸法以接陽氣使自消散可也蓋脉得寒則下陷凝滯肌肉故經云陷脉爲漏留連肉腠須用陷脉散桂附丸以溫補之丹溪

云漏瘡須先服補藥以生氣血用參耆朮芎歸爲主大劑補之外用隔附子灸法然必自知保重壯年之人十愈八九中年之人十愈四五衰暮之人終費調理可不慎歟若虛甚者須參耆歸朮膏

陷脉散

治漏瘡及遠年癰疽驚惕臥寢不安肢體製痛

乾生姜

炮

琥珀

另研

附子

炮去皮臍

大黃

煨各壹錢

丹參

叁錢

石硫黃

白石英

鍾乳粉

烏賊魚骨

俱另研各柒分

右爲末磁器內收貯勿令泄氣瘡溼乾傳溼乾用猪脂油和敷死肉不消者加朴硝貳錢

內塞散 治疳瘻不瘥諸瘡

附子 二個 官桂 去皮 赤小豆 甘艸 炙

黃耆 當歸 白茯苓 防風

白芷 桔梗 川芎 人參

遠志 厚朴 各壹兩

右爲末每服貳錢溫酒調下食前日進貳服

截疳散 治年深疳瘻瘡

蜜陀僧 白欬 白芨 黃丹 各壹兩

黃連 五錢 輕粉 龍腦 麝香 各五分

右前四味爲極細末後四味另研和勻或摻或經

以膏貼之

烏金散 治疳瘻要瘡

麝香 蟾酥 各貳分半 粉霜 硃砂

輕粉 各壹錢 銅綠 砒霜 白僵蚕

草烏頭 天南星 舶上硫黃 各伍錢

右爲細末紙撚經之或湯浸蒸餅爲錠子經瘡口

內

烏金散 治疳瘻惡瘡

橡斗子貳個一入黃丹一入白礬末兩個合定用

麻纏火燒研細加麝香少許洗瘡淨貼之

應効散

治氣瘻疳瘡

地骨皮

不以多少冬月自取陰乾

右爲細末每用紙撚蘸經瘡口內頻用自然生肉仍每日三次用米飲調服一次二錢以托其裏

骨碎補丸

治瘻瘡因入風之變與大瘻丸間服方見痔漏條

大瘻丸

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大瘻宜以此丸與骨碎補丸間服

方見痔漏條

加味十全湯

治瘻瘡寒而虛者方見潰後調攝條

桂附丸

治冷漏諸瘡

桂心

附子

炮裂米醋中浸再炮三五次去皮臍

人參

黃耆

陳皮

粉草

炙

白朮

各壹兩

木香

錢壹

乳香

錢貳

右爲細末蜜丸梧子大空心米飲下二三十丸原

方有厚朴無參耆陳皮丹溪云治冷漏與桂附丸

只因瘡久不合風冷乘之血氣不潮而成也厚朴

雖溫瀉衛尤速恐不若佐以參耆陳皮庶與病情

相得故易之

丹溪川芎細辛湯

治漏瘡

川芎

錢五

白芷梢

錢貳

細甘草

錢壹

右每日一服用隔年麻黃根刮去粗皮搥軟撚成

繩子撚入孔中至不可入則止日淺一日瘡好用膏藥貼之

神應膏

宋理宗漏瘡諸方不効獨此膏愈之其治腸胃癰作丸服之神効

當歸

壹兩壹錢

赤芍藥

壹兩伍錢

大黃

壹兩伍錢

白芷

壹兩

莪朮

壹兩

官桂

壹兩

玄參

壹兩叁錢

生地黃

壹兩貳錢

川續斷

壹兩貳錢

右九味用真麻油貳斤浸春五夏三秋七冬十如法熬焦去粗下丹如漏有孔者以膏紐入外另紙攤貼之

附子灸法

以附子浸溼切片如錢厚比瘡口大些貼於瘡上加艾炷灸之但令微熱不可令痛乾則頻頻易之不拘若干壯身倦且止明日再灸以肉平爲止若以附子爲末唾津爲餅亦可仍貼養氣血膏藥此丹溪之法屢有奇驗

東垣蟻螬虫灸法

方見灸法條

血風瘡第八十一

血風瘡者乃三陰經風熱鬱火血燥所致瘙痒不常搗破成瘡膿水淋漓內證肺熱盜汗惡寒少食體倦不可妄用風藥診係肝風血燥寒熱作痛者當

歸飲加柴胡山梔痛痒寒熱者小柴胡加山梔黃
 連夜熱譫語者小柴胡加生地肝脾鬱火食少寒
 熱者加味逍遙散脾虛肺熱盜汗不寐者歸脾湯
 加山梔熟地腎虛有熱作渴咳痰者腎氣丸遍身
 俱瘡者四物湯加浮萍黃芩等分甚者紫雲風丸
 換骨丸三蛇丹兩足痛痒者當歸拈痛湯如因飲
 酒後遍身痒如風瘡搗至出血又痛者用蟬蛻薄
 荷等分爲末每二錢水酒調服外治用風摩膏大
 馬齒膏七玢膏則愈矣

當歸飲

治遍身疥癬或腫或膿水侵淫或發赤疹
癰癤皆心血凝滯內蘊風熱所發宜服之

當歸

白芍藥

川芎

生地黃

防風

荊芥

疾藜

何首烏

黃耆

甘草

各壹錢

右姜水煎服

小柴胡湯

柴胡

黃耆

半夏

人參

甘艸

各壹錢

右加薑棗水煎

加味逍遙散

方見耳瘡條

歸脾湯

方見乳癰條

腎氣丸

方見掌疽條

活血四物湯

治諸疥癬經久不愈

當歸

川芎

芍藥

生地黃

各壹錢半

桃仁

九個

紅花

壹錢

蘇木

八分

連翹

黃連

防風

甘艸

各六分

右水煎服

紫雲風丸

方見癰風條

換骨丸

方見癰風條

三蛇丹

治大風手足麻木髮脫眉落遍身瘡癰瘙痒一切疥癬風痰皆効

土桃蛇

壹條

烏梢蛇

壹條

白花蛇

壹條

苦參

四兩

右爲末用皂角煎膏爲丸如梧桐子大每服六七

十丸煎防風通聖散送下仍以粥飯壓之日三服

三日一洗

當歸拈痛湯

治溼熱爲病肢節煩疼肩背沉重胸膈不利遍身疼痛足脛腫痛等證

當歸

防風

猪苓

澤瀉

茯苓

知母

各叁分

羌活

茵陳

黃芩

各五分

甘草

升麻

乾葛

苦參

人參

蒼朮

各貳分

白朮

壹分伍厘

右水煎溫服

摩風膏

方見癰風條

大馬齒膏

治兩足血風瘡并兩足背風溼瘡痛痒至骨者効

馬齒莧

焙乾五錢

黃丹

黃栢

枯礬

兒茶

各參錢

輕粉

壹錢

右爲末生桐油調攤油紙上用葱椒煎湯洗淨患處貼之

七珍膏

血風瘡極痒搗至見血此方極効兼治惡瘡

用香油一斤青槐枝百段陸續入油煎枯濾淨下

黃蠟四兩又下定粉十二兩提起微溫下後藥

乳香

伍錢

沒藥

伍錢

輕粉

伍錢

白花蛇

伍錢

孩兒茶

伍錢

朝腦

壹兩

麝香

朱分俱細末

右攪勻用紙攤貼

一東垣方血風瘡大風病相似好桑葉洗蒸一宿晒

乾爲末湯下貳錢



癰疽選料

血風癰

