

古今醫鑑二



033059

大醫院醫官金谿龔信編輯

翰林院 省菴王肯堂較正

金陵書林譽吾周四達梓行

瘧疾

脉瘧脉自弦。弦數者多熱。宜汗之。弦遲者多寒。宜溫之。弦緊宜下。浮大宜吐。弦短者傷食。弦滑者多痰。虛微無力為久病。洪數無力為虛。代散則死。

症 夫瘧有風瘧、暑瘧、濕瘧、食瘧、痰瘧、瘧母。諸瘧之不同，不過風、寒、暑、濕之外感七情五味之內傷之所致也。然內外失守，真邪不分，陰陽偏勝，寒熱交攻，乃成瘧也。有一日一發，有二日一發，有三日一發，有間一日連二日發，氣血俱受病，有夜與日各發，有發於午前，有發於午後，其始發之待，欠伸畏寒戰慄，頭痛或渴，或先寒後熱。

或先熱後寒，或單寒不熱，或單熱不寒，或寒少熱多，或寒多熱少。治瘧之法，當先發散外邪，有汗有汗，無汗無汗者，要有汗散邪為主，有汗者要無汗扶正為主。然散邪扶正，病不退者，又須分利陰陽，以紫苓湯最效。甚者或以截藥而除之，不二飲勝金丹之類，截之不愈，乃氣血大虛，要扶胃氣為本，露薑養胃湯、養胃丹之類，又有綿延不休，彌瀘越歲，汗吐下過，榮衛虧損，邪氣伏藏脇間，結為癥瘕，謂之瘧母。瘧瘧飲黃甲丸之類，蓋瘧有新久淺深，治有緩急，次序宜以脉症參驗，量其虛實而療之。機要謂太陽經為寒瘧，治多汗之陽明經為熱瘧，治多下之少陽經為風瘧，治多和之。此三陽受病，謂之暴瘧。在夏至後處暑前，乃傷之淺者。在三陽經，則總之為寒瘧。在處暑後冬至前，乃傷之重者。其三陰經瘧，作於子午卯酉日者，少陰瘧，作於寅申巳亥日者，厥陰瘧，作於辰戌丑未日者，太陰瘧也。

瘧疾

六瘧

古今醫鑑

卷三

王守仁撰

一凡瘧方來正發不可服藥服藥在於未發兩時之先不則藥病交爭轉為深害當戒之。

一平素虛弱兼以勞役內傷挾感外邪以致瘧疾寒熱交作肢體倦怠乏力少氣以補中益氣湯加黃芩芍藥半夏有汗及寒重加桂枝倍黃芪熱盛加柴胡黃芩渴加麥門冬天花粉。

一久瘧乃屬元氣虛弱蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐涎不食泄瀉腹痛手足逆冷寒慄鼓頷若候投以清脾截瘧二飲多致不起。

一瘧後飲食少進四肢無力面色痿黃身體弱虛以四君子湯合二陳湯加薑炒黃連麩炒枳實煎服。

一凡瘧後大汗出者乃榮血不足之候以人參養榮湯主之。
方散邪湯 三山陳氏傳 治三陽經瘧頭痛無汗發熱惡寒當發汗散

川芎 白芷 麻黃去節 防風 荆芥

古今醫鑑 卷三
羌活各一錢 甘草五分

白芍藥 酒炒 紫蘇
右剉一劑生薑三片葱白三莖水煎露一宿次早溫服○有痰加陳皮半夏○宿食不消吞酸惡食加麩炒枳實薑汁炒厚朴山查萊菔子○濕加蒼朮○挾氣加青皮蘇梗香附

○按右方治瘧無汗當發汗散邪為主
正氣湯 三山陳氏方 治虛弱瘧頭痛自汗寒熱往來當扶正散邪

柴胡 前胡 川芎 白芷 半夏薑製 檳榔 草果 青皮炒
桂枝 白芍炒各一錢 茯苓 甘草炙 陳皮 麥門冬去心各八分

右剉一劑生薑三片大棗二枚水煎預先熟服

○按右方治瘧有汗當止汗正氣為主
柴苓湯 此藥分利陰陽和解表裏之劑

柴胡 茯苓各八分 肉桂七分 甘草六分 人參去苦

黃芩炒 半夏薑製 諸苓 白朮炒 澤瀉各一錢

右到一劑生薑三片大棗二枚水煎溫服○無汗加麻黃○有汗加桂枝○寒多倍肉桂○熱多加黃芩○胸膈滿悶加枳殼桔梗不二飲秘方治一切寒熱瘧疾一服即止如神

常山 二錢 檳榔 一錢 雄 一錢 尖 銳 者 為 雄 平 亮 者 為 雌 知母 貝母 各 錢 半

右到一劑酒一鍾煎至八分不可過熱熱則不効露一宿臨發日五更溫服勿令婦人煎藥

勝金丸 治一切寒熱瘧疾胸膈停痰一服立効

常山 四兩 好酒 浸 宿 晒 乾 檳榔 草果 各 二 兩 蒼朮 二 兩 米 泔 浸 宿 晒 乾

右為細末將前所浸常山餘酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十丸未發前一日臨臥時冷酒送下即臥不可言語直至雞鳴時再進七十九忌食生冷熱物及雞魚麩麵之類不則不効矣

瘧靈丹 秘方 治一切瘧疾服藥不愈以此截之

雄黑豆 揀圓者為雄四十九粒 先一日水泡去皮頑爛 人言末 一錢 雄黃 一錢 為 衣

古今醫鑑 卷三

右於五月五日午時同搗為丸如芡實大陰乾收貯臨發日早晨面東無根水下一丸忌熱酒熱物踰時禁生冷魚腥三日此方百

發百中

龍虎湯 治熱瘧火盛舌卷焦黑鼻如煙煤六脉洪數弦緊此乃陽

毒入深所致先以青布摺疊數重新汲水漬之搭於心胸之上須臾再易如此三次熱勢稍退即服此藥無有不効

柴胡 黃芩 各 錢 半 半夏 薑 製 七 分 石膏 二 錢 五 分

黃蘗 二 分 知母 去 毛 山梔仁 各 錢 粳米 一 撮

右到一劑薑一片大棗二枚水煎溫服

○按右方治熱瘧清火之劑

天靈散 劉上舍傳 治瘧如神作瘧子藥不可用如瘧子

天靈蓋燒存性為末每服五釐黃酒空心送下

○按右方治諸瘧止截之劑

露薑養胃湯 治久瘧不愈三五日一發

蒼朮 米泔浸一宿晒乾

厚朴 薑炒

陳皮

半夏

薑製

草果 各一錢 人參 一錢半

茯苓 二錢

藿香 一錢

甘草 炙七分

右剉一劑烏梅一箇黑棗一箇水煎先以生薑四兩搗汁露一宿次早合入煎藥通口服忌生冷油膩

養胃丹

治久瘧經年累月虛弱之症宜此補之

人參 去芦

白茯苓

藿香

草果 各一

常山

蒼朮 炒各

半夏 泡二厚朴 薑炒

陳皮 各一

甘草 炙五

烏梅 四十九箇去核

右為末淡薑湯打糊為丸如梧子大每服七十九仍用淡薑湯下

○按右方治久瘧補虛之劑

瘧瘧飲

治瘧久不能愈名曰瘧瘧又曰老瘧

蒼朮 米泔浸

草果

桔梗

青皮

陸皮

良薑 各五錢

白芷

白茯苓

半夏 湯泡

枳殼 麩炒

古今醫鑑

卷三

乾薑 泡

甘草

桂心

蘇葉

川芎 各二錢

右剉每服五錢水煎入鹽少許空心溫服

黃甲丸

治瘧母成塊久不能愈

硃砂

阿魏

檳榔 各一兩

穿山甲

以一兩 酥炙炒

雄黃

木香 各五錢

右為細末泡黑豆去皮搗成泥為丸如梧桐子大每服五十九淡

薑湯送下忌生冷魚腥三日

○按右方治瘧母消塊之劑

痢疾

脈下痢之脈宜微小不宜浮洪宜滑大不宜弦急宜身涼不宜身熱

經所謂身涼脈細者生身熱脈大者死是亦大槩言之耳不可一

途而論也叔和云下痢微小却為生脈大浮洪無瘥日

症天痢乃濕熱食積三者下青黃赤白黑五色也濕熱傷血分則赤

痢疾

痢疾

傷氣分則白氣血俱傷則赤白相兼黃者食積黑者濕勝也其症
臍腹疔痛或下鮮血或下瘀血或下紫黑血或下白膿或赤白相
雜或下如豆汁或如魚腦髓或如屋漏水裏急後重頻欲登廁晝
夜無度

治法行氣和血開鬱散結瀉脾胃之濕熱消臟腑之積滯經云熱
積氣滯而為痢其初只宜立効散一服即愈或木香導氣湯以推
其邪以徹其毒皆良法也痢稍久者不可下胃虛故也調中理氣
湯加味香連丸之類擇便用之痢多屬熱亦有虛與寒者虛者補
之寒者溫之以神效參香散主之蓋痢之初邪毒正盛宜推蕩之
不可用粟殼訶子收澁之藥則淹纏不已痢之稍久真氣下陷宜
收澁之不可用巴豆牽牛通利之劑用之則必致殺人又有下痢
噤口而不食者亦有二也有脾虛有脾熱脾虛者參苓白朮散脾
熱參連湯或倉連煎之類入凡下痢純紅者如麀腐色者如屋漏
水者大孔開如竹筒者唇如朱紅者俱死症也如魚腦髓者身熱
脈大者俱半死半生

古今醫鑑

卷三

五

玉雲樓

方木香導氣湯 治痢疾初起腹痛紅白相雜裏急後重發熱噤口
不拘老幼先與一服甚効

大黃一錢五分 檳榔一錢二分 厚朴一錢二分 白芍一錢二分 黃連一錢二分 朴硝一錢二分
歸尾各八分 茯苓各八分 木香五分 小便便赤加滑石五分 木通一錢

右剉一劑水二鍾煎八分濾去渣空心熱服

開板丹 張小菴傳 治痢初起以此丹推蕩其邪毒

黃丹水飛 黃蠟各一兩 乳香沒藥各一錢 巴豆八箇杏仁皮尖去油

右將五味為末將黃蠟溶化後將藥末同蠟拌勻攪冷成塊每服
一九如黃豆大空心服紅痢冷甘草湯下白痢冷乾薑湯下水瀉
冷米湯下忌生冷油膩

按右方治痢以推其邪而徹其毒也

立効散 雲林製 治痢腹中疔痛赤白相兼卽止

黃連 四兩酒洗吳茱萸
兩同炒去茱萸用

枳殼 二兩麩炒

右爲末每服三錢空心酒送下泄瀉米湯下噤口痢陳倉米湯下

○按右方治熱積氣滯而爲痢者以黃連清熱枳殼破氣清平之劑
調中理氣湯 丹溪云調氣則厚重自除此也

蒼木 米泔浸炒 陳皮

木香 各八分 厚朴 薑炒七分

白木 炒

枳殼

白芍 火煨

檳榔 各一錢

右到一劑水二鍾煎一鍾濾去渣空心溫服○如赤痢厚朴芍藥

俱不必炒再加黃連條各一錢五分白痢只依本分

加味香連丸 此方治諸痢之總司

黃連 二兩炒

吳茱萸 水炮 白豆蔻 帶殼麩裏火煨一錢五分

木香 一錢

秘方加乳香沒藥 各一錢

右爲細末用烏梅二兩滾水泡去核搗和爲丸如梧桐子大每服

古今醫鑑 卷三 五言樓 三十丸白痢乾薑湯下血痢甘草湯下赤白相兼二味泡湯下白

瀉米湯下 ○按右方治痢調理之劑

倉廩散 治赤白痢疾發熱不退○凡下痢有積有暑如用藥不効

卽是腸胃有風邪熱也此方甚効○卽人參敗毒散加黃連陳倉

米薑棗煎服○噤口痢加石蓮肉七枚○痢後手足痛加檳榔木

瓜不蚤治則成鶴膝風

六一順氣湯 治痢不問赤白相雜肚痛裏急後重渾身發熱口乾

煩瀉用此通利卽止 方見傷寒門

○按右方治內外兩感發熱痢疾及時行疫痢之劑

納臍膏 何晴猴傳 治噤口痢危急之症用之立愈

黃瓜藤 不拘多少連莖葉經霜者晒乾燒灰存性出火毒

右用香油調納臍中卽効

點眼膏 黃質江傳 治一切赤白痢及噤口危急之症

六一散
紫霜 蒼朮
石芥 枳殼
芒硝 芍藥
五苓散

初胎糞炙乾一錢雄黃五分

黃連四分

片腦少許

右為細末水調點兩眼角神効

倉連煎 劉刺史傳

治噤口痢不拘赤白

陳倉米

赤痢用三錢白痢用七錢赤白相兼用五錢

黃連

赤痢用七錢白痢用三錢赤白相兼用五錢

右剉水一鍾半煎至七分露一宿空心温服

凡下痢噤口不食者雖曰脾虛蓋因熱毒閉塞心胸胃口所致用

參苓白朮散加石菖蒲一錢木香少許共為末陳米飲調下再服

倉連煎尤妙

噤口痢諸藥不効者糞缸中蛆不拘多少洗淨瓦上焙乾為末每

服一二匙米飲調服即能思食

噤口痢多是胃口熱甚用黃連一兩人參五錢煎湯終日呷之如

吐再強飲但得一呷下咽便好一方加石蓮肉三錢水煎服立効

外以田螺搗爛入麝香少許合臍上引熱下行故也又方用秤錘

古今醫鑑

卷三

七

燒紅用好醋澆之令病人吸其烟神効

○按前諸方皆治噤口不食之劑凡醫者用藥不必拘其赤白飲

食即吐諸物不納皆是毒氣薰蒸胃口熱甚切不可認胃寒噤

口而用辛熱之藥宜以前方選用或木香導氣湯去大黃煎熟

入韭汁陳倉米飲各一盞於內同服即愈

加減益氣湯 治痢日久不愈不能起床不食虛弱甚者

黃芪

人參

澤瀉

砂仁

地榆各五分

白朮

白芍藥

陳皮各一錢當歸七分

御米殼醋炒

升麻

甘草炙

木香

白豆蔻各三分

右剉一劑水二盞煎八分濾去渣空心温服

神効參香散 治臍氣怯弱冷執不調積而成痢或下鮮血或如豆

汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜裏急後重日夜

頻數無度無間新久

鴛粟殼去蒂穰 陳皮 各一兩 白茯苓去皮 肉豆蔻去裏

人參 白扁豆 木香 各三錢

右共為末赤痢每九分加製黃連末一分白痢每九分加製萊菔

末一分赤白相雜每服八分加黃連萊菔末各一分青色黃色無

加減每用一錢俱用米湯調下忌生冷油膩炙煇○製黃連萊菔

法二味等分不到碎以老酒浸一宿同一處炒燥分出各為極細

末另包聽前用

○按右方治痢久不愈元氣虛弱滑脫下陷止瀉之劑

薑茶湯 治痢疾腹痛不問赤白冷熱蓋薑能助陽茶能助陰二者

皆能消散又且調平陰陽况於暑毒酒食毒腎能解之也

老生薑細切三錢 細茶葉二錢

右用新汲水煎服○一方加連根萆菜一握三味同搗汁酒調服

三白湯杜守玄傳 治痢不拘赤白

白砂糖一兩雞子清一箇燒酒一鍾半 煎至八分温服立止

仙梅丸桑雙岡傳 治痢疾發熱發渴

細茶 烏梅水泡剥去核晒乾各一兩

右為末生蜜搗作丸如彈子大每服一丸冷熱水隨下

椿雞丸桑環川傳 治久痢不止

雪裏炭雞一隻吊死去腸毛入黃連一兩椿根白皮一兩於肚內

好酒煇熟去藥食雞神效

舒鳧飲劉桐川傳 治白痢如魚凍色久不愈者

白鴨一隻殺取血以滾酒和飲之立止

將軍飲 治痢膿血稠粘裏急後重晝夜無度不問新久及愈而又

發止而復作名曰休息痢

錦紋大黃剉一兩 右以好酒二鍾浸半日煎至七分去渣分作二次服以利為度

90 泄瀉

○按前諸方治痢簡易故附方末以備選用

○**症** 脉多沉傷於風則浮而弦傷於寒則沉而細傷於暑則沉而微傷於濕則沉而緩洩而腹脹脉弦者死又云脉緩時微小者生浮大數者死

○**症** 天泄瀉者注下之症也蓋大腸為傳送之官脾胃為水穀之海或為飲食生冷之所傷或為暑濕風寒之所感脾胃停滯以致關門

清濁不分發注於下而為泄瀉也內經又謂濕勝則濡泄又曰春

傷於風夏生飧泄又曰暴注下迫皆屬於熱又曰諸病水液澄澈

清冷皆屬於寒叔和曰濕多成五泄腸走若雷奔故分脾胃泄胃泄

大腸小腸大瘕為五泄也又有飧泄腎泄洞泄濡泄鶩泄之類各

各不同原其致病不過前云所感所傷而已矣丹溪又云泄屬濕

屬氣虛有火有痰有食積凡瀉水腹不痛者濕也飲食入胃不消

古今醫鑑 卷三 九

完穀不化者氣虛也腹痛瀉水如熱腸痛一陣瀉一陣者火也或

瀉或不瀉或多或少或少者痰也腹痛甚而泄瀉瀉後痛減者食積也

瀉下如抱壞雞子臭者或噦氣作酸者傷於食也

○**治** 治療之法須看時令分寒熱新久補脾胃消食燥濕利小便亦有升

提下陷之氣用風藥以勝濕若久瀉腸胃虛滑不禁者宜收澀之

○**治法** 之要孰有過於此哉

○**方** 胃苓湯 治中暑傷濕停飲夾食脾胃不和腹痛洩瀉作渴小便

不利水穀不化陰陽不分

蒼朮 米泔浸厚朴 薑汁炒 陳皮 猪苓 澤瀉

白朮 炒 白茯苓 白芍 炒 各一 肉桂 甘草 炒 各三

右剉一劑薑棗水煎溫服○一方加防風升麻以勝濕○食積加

神麩麥芽山查○水瀉加滑石○有痰加半夏烏梅○氣虛加入

參白朮○惱怒加木香○有熱加黃連○久瀉加肉豆蔻○暴痢

赤白相雜腹痛裏急後重去桂加木香黃連檳榔水煎服

○按右方治四時泄瀉之總司也

薑苓湯 治暑月泄瀉或欲成痢

黃連香薷飲合五苓散到一劑生薑煎服 方見中暑

藿香正氣散 治感濕泄瀉或兼暑者

依本方加黃連香薷○食加神麴山查 方見霍亂

○按右方治暑泄之劑

柴苓湯 治泄瀉發熱口渴裏虛之症

小柴胡湯 方見傷寒 合五苓散 方見中暑

右到一劑薑棗煎服 ○按右方治熱瀉之劑

理中湯 治脾胃虛冷中寒泄瀉四肢厥逆 方見中寒

○按右方治寒瀉之劑 方見補益

四君子湯 治氣虛脾泄不止者

古今醫鑑

依本方加烏藥 諸炒七分 ○右薑棗水煎服

參苓白朮散 治脾胃虛弱久瀉少食 方見補益

瑞蓮丸 何春元傳 治元氣大虛脾胃怯弱泄瀉不止不思飲食

山藥 炒 蓮肉 白朮 土炒 芡實 各二兩 人參 去芦

白茯苓 白芍藥 酒炒 橘紅 各一兩 甘草 炙五錢

右為末用雄豬肚一箇洗淨煮爛搗和藥末為丸如梧桐子大每

服百丸空心米湯送下

養元散 治泄瀉飲食少進

糯米 一升水浸一宿濾乾 乾山藥 少許 胡椒 少許

右各為細末和勻每日侵晨用半盞再入砂糖少許滾湯調服其

味極佳且不厭人大有滋補其女人子宮虛冷不能成孕久服之

亦能懷孕○一方加蓮肉去心芡實仁山藥各三兩亦効○一方

用糯米為末不拘多少入百草霜十分之二水和為餅烙熟食之

○一方單用糯米半生半炒煮粥食之亦効

○按右方治虛瀉之劑

安胃和脾散

治脾胃不和中脘痞塞腹痛脹滿不思飲食嗜臥無時嘔吐痰涎逆氣吐酸面黃肌瘦泄瀉不止四肢乏力沉困自汗盜汗等症

蒼朮二兩 薑炒

厚朴五錢 薑炒

藿香

砂仁各五錢

人參去芦

白朮去炒

白茯苓

木香火煨

檳榔各五錢

蓬朮火煨

澤瀉各五錢

甘草炙五錢

紅棗一十四箇去皮核焙乾

右共為細末每服二錢空心淡薑湯下

家蓮散

陳都堂傳

治經年久瀉冷泄及休息痢

蓮肉

泡去皮心微火焙乾四兩

厚朴

薑炒一兩

乾薑炒黑一兩

右共為細末每服二三匙米飲下一日三次

埋氣健脾丸

治脾胃虛弱久瀉久痢

古今醫鑑

卷三

依本方去桔梗加酒炒白芍藥其効如神

方見脾胃

實腸丸

黃賓江傳

治久瀉久痢虛滑不禁及脫肛臭椿樹根皮不拘多少切碎酒拌炒為細末用真阿膠水化開和為丸如桐子大

每服三五十丸空心米湯下

升氣實臟丸

雲林製

治久瀉元氣下陷脾胃衰憊大腸滑脫肛門墜下日夜無度飲食不思米穀不化湯水直過煩渴引飲津液枯竭肌瘦如柴寒熱互作

黃芪蜜炙

人參去芦

山藥

蓮肉去心

芡實各一兩

白朮土炒

白茯苓去皮

升麻酒炒

柴胡酒炒

乾薑炒黑

肉豆蔻

裹煨槌去油淨

粉草炙各五錢

椿樹根皮

酒炒二次四兩

右為細末阿膠水化開為丸如黍米大每服二錢用糯米半生半

炒煎湯送下

○按右方治滑泄止澁之劑

灸法

治吐瀉日久胃氣大虛死在旦夕

一天樞二穴

在臍傍各開二寸

氣海在臍

一寸半

百會 在頂心

右用艾灸五七壯卽愈

霍亂

脉代者霍亂代而絕者亦霍亂○又關脉滑爲霍亂吐瀉○氣口脉弦滑膈間有宿食留飲宜順其性以鹽湯探之○脉結促大皆不可斷以死脉洪大則易治脉微細氣少不語舌卷囊縮者皆不治也○滑而不勻必是吐瀉霍亂之候脉大勿訝

症 夫霍亂者揮霍變亂也蓋因內有所積外有所傷陽不升陰不降乖隔而成故心腹卒痛嘔吐下痢發熱惡寒頭痛眩暈或瀉而不吐或吐而不瀉先心痛則先吐先腹痛則先利心腹齊痛吐痢並作甚則轉筋入腹四肢厥冷而斃

治 急用芩湯泡洗艾灸臍中蓋陰陽反戾清濁相干治之惟宜藿香正氣散加生薑爲上不惟可以溫散風寒抑亦可以調理脾胃如身熱口渴者則以薤苓湯加減治之霍亂之後不可蚤與飲食恐胃中邪物吐瀉未盡其新穀入胃不能傳化必致不救雖候吐瀉過一二時儀甚方與稀粥少食以漸而將息可也其有不吐不瀉者名乾霍亂急以鹽湯多灌引其大吐令宿食殆盡隨症用藥調之既愈之後若煩熱多渴者以麥門湯主之

霍亂

古今醫鑑

卷二

一二

一霍亂轉筋用大藜一把煎湯盪洗北人以麥糠代之使腠理開泄腸氣散則愈也河間云熟氣燥燦於筋則攣瘳而痛也

一霍亂已死而腹中尚有煖氣者以鹽納臍中以艾灸莫計其數一霍亂心腹卒痛炒鹽二碗絹包頓於胸上并腹肚再以熨斗火熨氣透則蘇續以炒鹽絹包乘熱烙其背則萬無一失也

方藿香正氣散

治四時不正之氣寒溫時疫山嵐瘴氣雨濕薰蒸

或中寒腹痛吐利中暑冒風中濕身重泄瀉或不服水土脾胃不和或飲食停滯復感外邪頭疼發熱戰慄惡寒或嘔吐惡心胸膈

滿悶一切氣逆不安之症並能調治

藿香 一錢 紫蘇 錢半 陳皮 厚朴 薑製 半夏 薑製 大腹皮

茯苓 桔梗 白芷 各一錢 白木 炒 甘草 灸一錢

右剉一劑薑三片棗二枚水煎熟服○霍亂轉筋加木瓜○腹痛

加炒白芍藥寒痛加桂冷甚加乾薑○飲食不化加香附砂仁米

穀不消加神麩麥芽○心下痞滿加桔梗枳殼枳實○肉食不化

加山查○濕麵停積加蘿蔔子○中暑冒風加香薷白扁豆○時

氣增寒發熱加柴胡乾葛○口乾加麥門冬○小便不利合五苓

散○濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂合黃連香薷飲○心腹絞痛加

木香○若煩欲昏圍不通利者加檳榔枳殼

○按霍亂之疾未有不由內傷生冷外感風寒而致也余用藿香

正氣散治之百發百中一歲之內常治百人未有不効者但有

執者須加薑炒黃連寒甚加乾薑萬無一失又腹痛者加桂痛

甚者去藿香加吳茱萸小便不利加茯苓如乾霍亂加枳殼茯

苓肉桂最佳

加減薑苓湯 治霍亂身熱口渴此熱暑中也

猪苓 澤瀉 乾葛 各七分 白木 黃連

甘草 各五分 赤茯苓 天花粉 香薷 各一錢 扁豆 十四粒

右剉一劑生薑煎服○如熱極加石膏知母○泄瀉加升麻黃芩

滑石○腹痛加炒白芍藥 七分 桂 三分 寒痛亦加此

○按右方治霍亂屬熱者宜之

理中丸 治轉筋霍亂上吐下痢心腹疼痛及乾霍亂俗名絞腸痧

并真陰症手足厥冷嘉靖甲子年間梁宋之地人多患此自脚心

麻至膝死者不計其數時大方伯趙公出示此方患者咸蒙其惠

因述以廣其傳 人參 乾薑 炒 茯苓 甘草 灸各一錢

右為末煉蜜為丸每丸重一錢取一丸細嚼淡薑湯送下忌食米湯此卽理中湯改為丸取土能塞水之義若仍煎湯則不効矣

○按右方治霍亂屬虛寒者宜之

陰陽湯 治霍亂吐利腹痛服藥卽吐無法可施

用百沸活河水半碗及冷井泉水半碗合而服之卽安。

百沸湯 治霍亂吐瀉因飲冷或胃寒或失饑或大怒或乘舟車傷

動胃氣令人吐痢交作目眩頭暈手足轉筋四肢厥冷用藥遲緩

須臾不救

吳茱萸 木瓜

食鹽各五錢

右三味同炒焦用百沸湯煎隨病人冷熱服之○乾霍亂者俗名絞腸痧其症因宿食不消心腹絞痛欲吐不吐欲瀉不瀉揮霍撩亂所傷之物不得出湯故也死在頃刻急宜多灌鹽湯探吐之令物出盡却服理中湯更刺十井出血并委中出血

古今醫鑑

卷三

十四

鹽薑湯 治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉垂斃者

鹽一兩

生薑切五錢

右二味同炒色變以童子溺二盞煎至一盞温服

麥門冬湯 治霍亂愈後煩熱多渴小便不利

人參

白朮 炒各一錢 茯苓

陳皮

半夏 製各八分

小麥一百粒

麥冬

去心二錢 甘草七分

嘔吐

脈嘔而脈弱小便復利身有微熱厥者難治。

症夫嘔吐者飲食入胃而復逆出也有物無聲謂之吐有聲無物謂

之噦嘔吐謂之有聲有物蓋人以胃氣為主受納五穀榮養百骸

者也若胃虛之人不能攝養或為寒氣所中或為暑氣所干或為

飲食所傷或氣結而痰聚皆能令人嘔吐又有惡血停積胃口嘔

吐之間雜以痰血亦有胃熱火邪衝上而作嘔吐者有痰膈中焦

吐

食不得下者有氣逆者又內經云諸嘔吐逆衝上皆屬心火河間亦曰胃膈熱甚則爲嘔火氣炎上之象也所感不同

治 治法當以脉辨之中寒則脉沉緊四肢厥冷飲食不下當以温煖之藥調之挾暑則脉弦數而虛煩熱燥渴法當清涼之停食痰積者則當順氣和胃而消導之積血者化其血火逆者瀉其火此其治法之大要也

一嘔家聖藥是生薑千金之說信矣然氣逆作嘔生薑散之痰與水作嘔半夏逐之嘔有熱有寒生薑干寒症最佳若遇熱嘔不可無烏梅也

一胃中有熱膈上有痰令人時常嘔吐清水作噯氣吞酸等症用二陳湯加薑炒黃連炒梔子蒼朮川芎香附砂仁神麴山查少加木香以行滯氣

一時常吐清水或口甘不喜食冷涎自下而湧上者此脾熱所致二陳湯加白朮芍藥升麻土炒黃連黃芩梔子神麴麥芽乾薑或煎或丸隨時制宜

一時常惡心嘔吐清水胃口作痛得食暫止饑則痛甚此胃中行虵也二陳湯加苦煉根皮史君子煎服卽愈或用黑錫炒成灰檀榔等分米飲調服

方 煨薑散 西園製 治嘔吐惡心 生薑一大塊直切薄片勿令拆斷層層摻鹽于內以水濕芋藤密縛外又用紙包水蘸濕火煨令熟去紙搗爛和稀米飲服之

保 和湯 陳橋軒傳 治嘔吐不止飲食不下

陳皮 半夏 舊製 茯苓 各八分 甘草 各三分 砂仁 各三分

山梔子 薑汁炒 白朮 七炒 黃連 土炒各二錢 黃芩 土炒 藿香 各一錢

右到一劑生薑三片長流水和嬌泥澄清清水二鍾煎至一鍾稍冷頻服○吐逆甚加伏龍肝一塊同煎○因氣加香附枳實○心煩

嘔吐

古今醫鑑

卷三

十五

加竹茹 ○按右方治胃中痰火嘔吐之劑

椒茶餅 陳橘軒傳 止嘔吐治翻胃

川椒 去目隔紙三兩 芽茶 一兩五錢 桑白皮 末兩半 飛羅麵 兩半炒

右為細末煉蜜作餅每重一錢許細嚼米湯下

○按右方專治嘔吐之劑

比和散 治水穀不納聞食氣即嘔

人參 白木 神麴炒

藿香 人分 陳皮 砂仁 茯苓 各一錢 甘草 各五分

右到作一劑用十年已上陳倉米一合順流水二鍾煎沸泡伏龍

肝研細攪混澄清取一鍾薑三片棗二枚煎七分稍冷服別以陳

倉米飲時啜之日進三服即止

○按右方治胃虛嘔吐之劑

枇杷散 治胃虛多渴嘔噦不止

古今醫鑑 卷三 枇杷葉 去毛 橘紅 各一兩 半夏 湯泡 赤茯 去皮

人參 各五錢 麥門冬 去心 青竹茹 各一兩 甘草 四錢

右到生薑三片水二鍾煎一鍾空心服

竹茹湯 治飲酒過度嘔吐痰涎酸水飲食不下

竹茹 一錢五分 乾葛 二錢 半夏 製一錢 甘草 三分

右到一劑生薑三片水二鍾煎八分食前溫服

○惡心

症惡心者無聲無物但心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心非心經

之病其病皆在胃口上有虛有熱有寒有食有痰

治法虛者補之熱者清之寒者溫之食與痰者消之化之皆用生

薑及薑汁隨症佐藥其効最速

方二陳湯 見痰門加薑汁 治胃熱惡心

惡心

大半夏湯 即二陳湯去甘草加生薑 治胃寒惡心

小半夏茯苓湯即大半夏湯去陳皮倍加半夏

治心中兀兀欲吐

導痰湯竹茹砂仁薑炒黃連

治痰熱嘔吐惡心氣盛者

翻胃

脉浮緩者生沉瀆者死。○脉瀆而小血不足脉大而弱氣不足

症天翻胃者朝食而暮吐暮食而朝吐或食已即吐者是也膈噎者

謂五膈五噎也五膈憂恚寒熱氣也五噎憂思勞食氣也膈者在

心脾之間上下不通若拒格之狀也或結於咽喉時覺有所礙吐

之不出嘔之不下由氣鬱痰搏而然久則漸妨飲食而為膈也噎

者飲食之際氣卒阻滯飲食不下而為噎也翻胃也膈也噎也三

者名雖不同而其所受之病則一不巳內經謂三陽結謂之膈三

陽者大腸小腸膀胱也結熱結也小腸熱結而血脉燥大腸熱結

則不能圓膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後閉結下既不通

則反上行所以噎食不下縱下而復出也此陽火不下降而上行

古今醫鑑

卷二

十七

也故經曰少陽所致為嘔溲溢食不下此理明矣丹溪曰氣之初

病其端甚微或因些小飲食不謹或外冒風雨內傷七情或食味

過厚偏助陽氣積成膈熱或資稟充實表蜜無汗或性急易怒相

火上炎以致津液不行清濁相干氣之為病或痞或痛或不思食

或噎腐吞酸或嘈雜嘔噦醫者不求其本便認為寒遽以辛香燥

熱之劑投之時暫得快以為神方厚味仍前不節七情反覆相侵

舊病被劫暫開濁液易於攢聚或半月或一月前症復作如此延

蔓自氣成積自積成痰此為痰為飲為吞酸之由也良工未遇燥

劑又投痰挾瘀血遂成窠囊此為痞為痛為嘔吐噎膈翻胃之症

次第而作也猶謂虛而積寒非尋常草木可療竟以烏附佐助丹

藥專意服餌積而血液俱耗胃脘乾槁其稿在上近咽之下水液

可行食物難進間或可入食亦不多名之曰噎其稿在下與胃相

近食雖可下難盡入胃良久復出名之曰膈亦曰翻胃

惡心
翻胃

治 治富養血生津清痰降火潤燥補脾抑肝開鬱庶使病邪易伏胃氣開通雖然亦在病者之調攝耳吾觀張雞峯曰噎是神思間病惟內觀以自養此言深中病情嗚呼學者可不慎哉

一鉤玄云翻胃大約有四血虛氣虛有痰有熱血虛者脉必數而無力以四物湯養血為主氣虛者脉必緩而無力以四君子湯補氣為主有痰者脉必滑數以二陳湯為主有熱者脉必數而有九以解毒湯主之

一凡噎膈翻胃悉用二陳湯加薑汁竹瀝童便薑汁之類為治主

一若胸中覺有熱悶加土炒黃芩黃連瓜蒌仁桔梗之類

一若血虛瘦弱之人合四物湯少加杏仁泥紅花童便薑汁之類仍不可缺

一若朝食暮吐暮食朝吐或食下須臾即吐者此胃可容受而脾不能傳送也或大小腸閉結不通食返而上奔也加酒蒸大黃以

潤之脾不磨者加神麩麥芽之類以助其衰火也

一若氣虛肥白人膈噎者合四君子湯亦加竹瀝薑汁為要藥也

一若七情鬱結成氣噎者加香附撫芎木香檳榔瓜蒌仁砂仁之類

一若飲酒之人加砂糖驢尿入內服

一若膈噎大便燥結用大糞乃急則治其標之劑也仍用四物湯加童便薑汁多飲牛羊乳為上策也但不可以人乳代之蓋人乳內有飲食烹飪之火也

一若氣血兩虛則口中多出沫但見沫大出者必死糞如羊屎不治大腸無血故也年過五十者不治

一中年婦人翻胃以四物湯加帶白陳皮甯尖杏仁生甘草酒紅

花濃煎入驢尿以防生蟲數貼而愈

一治翻胃噎膈用螳螂洗淨入水中高四指以香油一小酒盞入

水中以二指捻白麵撒水上涎卽出次日去嚙雷水晒乾涎爲末
每服五分淡燒酒下

方主方 治一切翻胃噎膈爲總司要藥也

薑汁二兩 生薑牛兩 竹瀝牛盞 牛乳 童便各一盞

右五味和勻頓熱服○蓋薑菜汁能下膈上瘀血或加入煎劑內
同服尤效

順氣和中湯 雲林製 治嘔吐翻胃嘈雜吞酸痞悶噫氣噎膈心腹

刺痛惡心吐痰水

半夏製 神麩炒各六分 白茯苓七分 白木土炒八分

廣皮鹽水浸炒 山梔薑汁炒黑 香附醋炒各一錢 枳實麩炒五分

甘草炙二分 砂仁炒三分 黃連薑汁浸曬乾以猪膽汁拌炒六分

右剉一劑生薑三片長流水入嬌泥攪澄清水一鍾煎七分入竹

瀝童便薑汁不拘時細細溫服○心胃痛加薑汁三匙○如氣虛

古今醫鑑

卷三

一九

加人參黃芪各八分○如血虛加當歸七分川芎五分○如惱怒
或氣不伸舒加烏藥五分木香三分○如胸膈飽悶加蘿蔔子炒
六分○如心下嘈雜吞酸加吳茱萸四分倍黃連白朮○如嘔吐
不止加藿香七分○如大便閉結加蘇子麻仁桃仁杏仁俱研如
泥一錢再用白蜜時時服之

安中調氣丸 雲林製 治一切翻胃痰膈之症

廣皮二兩 半夏薑製一兩 白茯苓神一兩 白朮土炒二兩 枳實麩炒一兩 蘇子炒六錢

當歸酒洗 川芎各五錢 白芍鹽酒洗炒八錢 木香一錢 甘草炙三錢

香附三兩 長流水浸三日洗淨炒黃色 白豆蔻 蘿蔔子炒各

神麩炒 黃連薑汁浸曬乾猪膽汁拌炒各一兩

右爲細末竹瀝薑汁打神麩糊爲丸如菘豆大每服八十九不拘
時白湯送下清米湯亦可

○按右方治翻胃之總司也

四七調氣湯 西園公方 治七情四氣以致膈噎翻胃

紫蘇

厚朴 薑汁炒

茯苓

半夏

枳實 炒

砂仁

蘇子 炒

陳皮 各錢半

甘草 五分

右到生薑三片水煎服後以加味保和丸加人參二兩砂仁二兩
本香二兩服之收功

四子調中湯 治翻胃或大小便閉及痰氣壅盛

青皮 麩炒

陳皮

沉香

茯苓

木通

芒硝 各五分

白芥子 炒

枳實 麩炒

香附 炒

瓜蒌仁 炒

蘇子 炒各一錢

黃連 薑汁炒七分

半夏 製二錢

桃仁 去皮尖一錢五分

右到一劑生薑五片水煎稍熱服

○按右方治翻胃專因氣者

神奇散 方外人傳 治噎食翻胃三陽枯竭

當歸

白芍藥 酒炒

白茯苓

香附 醋炒

枳實 炒

藿香

古今醫略

卷三

赤茯苓

檳榔

木通

黃芩 炒

黃蘗 酒炒

知母 人乳炒

赤芍藥

天門冬 去心

麥門冬 去心

陳皮

半夏 薑製

甘草 各入一分

川芎

砂仁 各七分

生地黃 二錢

白朮 一錢土炒

烏梅 三箇

右到一劑水二鍾煎一鍾入童便一盞服

○按右方治翻胃血虛有火者

呂純陽降筆傳治翻胃方

人參

白豆蔻

蘇子 炒

枇杷葉 蜜炙

枳頭糠 一撮

赤茯苓

藿香

陳皮 各一錢

半夏

厚朴 製

白芥子 炒

檳榔 各入一分

良薑 三分

官桂

丁香 各二分

右到一劑生薑三片棗一枚水二鍾煎八分服

加味六君子湯 治脾胃大虛以致膈噎不食

六君子湯加炮乾薑白豆蔻黃連製吳茱萸

回生養胃丹 治真元虛損心胃不交精神耗散脾臟受濕飲食不

納五味不成津液反成痰涎聚於中脘不能傳道以致大腸燥澀
小便反多而赤或時嘔吐酸水久成翻胃結腸之症

蒼米米泔水浸三日洗淨晒蓮肉酒浸一宿四兩雄猪肚一箇

揉擦洗淨入蒼米蓮肉在內以線縫緊用好酒煮南星四兩細

爛取入石臼內搗如泥捻作小餅子烘乾加後藥橘紅切薑汁

浸一宿以伏龍肝同炒去半夏醋浸七日蒸熟橘紅土炒去

伏龍肝用伏龍肝土亦炒土用粟米各四兩薑人參白木白茯苓

厚朴薑汁蓬木醋炒草澄茄砂仁三稜醋炒白豆蔻

穀芽炒麥芽炒甘草各一兩丁香木香沉香各五錢

右為末稀麵糊為丸如梧子大每服一百丸空心陳米飲送下

○按右方治翻胃氣虛有寒者

加味保和丸方見傷食治實熱翻胃

保和丸三錢加黃連薑汁浸炒三錢山查肉三錢

右共為末米糊為丸如麻子大每服六十九煎入參竹瀝湯送下

可合醫鑑 卷三 十一

胭脂為衣

○按右方治翻胃有熱者

九仙奪命丹秘方治翻胃痰涎壅盛

南星薑製三錢人參三錢白礬枯過五錢枳殼炒一兩厚朴薑製五錢木香四錢

半夏薑製五錢豆蔻洗過一兩甘草三錢此方加阿魏三錢糖棗子五錢

右為末老米打糊為餅如錢大瓦上焙乾晴夜露過每服一餅細

嚼以薑煎平胃散送下忌酒煙爇

○按右方治翻胃痰涎壅盛者

沉香降氣丹長葛李治翻胃腹中有積塊

黑牽牛取頭末三兩大黃一兩酒檳榔一兩當歸一兩酒浸

良薑三錢蒼木一兩青皮炒一兩陳皮五錢

烏藥一兩砂仁五錢枳殼去穢炒一兩枳實五錢炒

香附一兩沉香三錢三稜三錢半夏五錢薑

炒

火煨

半夏五錢薑

汁

木香 三錢 不見火 莪木 三錢 火製 黃連 一兩 姜炒 黃芩 一兩 酒炒

右為末酒糊為丸梧桐子大每服六七十丸淡薑湯送下

○按右方治翻胃腹中積塊者
木香順氣丸 俞九河傳 治翻胃大便閉結者

沉香 五錢 木香 三錢 當歸 一兩 酒浸 白茯苓 去皮 一兩 山藥 一兩

郁李仁 淨 二兩 兔絲子 一兩 酒製 檳榔 二兩 牛膝 一兩 酒浸 二日

枳殼 炒 一兩 獨活 一兩 防風 一兩 火麻仁 淨 二兩 大黃 酒蒸 五錢

右為末煉蜜為丸如梧子大每服二十五丸白滾湯下

○按右方治翻胃大便閉結者
定生丹 秘方 治噎膈翻胃

雄黃 三錢 硃砂 三錢 阿魏 五分 炒 礞砂 五分 乳香 三錢 半夏 三錢

木香 三錢 沉香 一錢 肉豆蔻 錢 炒 葶豆 粒 四十 烏梅 四十箇 百草霜 三錢 為末

右為末將烏梅以熱湯泡冷軟剥去核研極爛入藥搗為丸彈子

大百草霜為衣陰乾每用一粒噙化嚥下以薑湯漱口復以陳麥

餅火燒熟細嚼壓之噲藥即燃官香一炷如香盡藥未化者難治

藥先化香未盡者可愈

○按右方治定翻胃之生死者

養血助胃丸 雲林製 治嘔吐翻胃愈後用此養元氣健脾胃生血

脈調榮衛清鬱氣收功保後
當歸 酒洗 一兩 川芎 一兩 白芍 鹽酒炒 一兩 熟地黃 薑汁浸 八錢

人參 去蘆 五錢 白茯苓 去皮 六錢 山藥 炒 一兩 白木 去蘆 土炒 一兩 三錢

扁豆 薑汁炒 六錢 蓮肉 去皮 心 一兩 甘草 炙 三錢

右為末薑打神麩糊為丸如梧桐子大每服六七十丸空心白滾

水送下

○按右方治翻胃收功保後之劑

欬逆

脈浮而緩者易治弦結而按之不鼓者難治○或結或促或微皆可治代者危右關脈弦者木乘土位難治○肺脈散者是心火刑於肺金也不治

病夫欬逆者氣逆上衝而作聲也俗謂之呃逆是也其發也或二五聲而止或七八聲而止或連續不絕收氣不回者然所得之由不同有因久病胃虛而得者有因傷寒失下而得者有因痰熱內鬱

火氣衝上而得者有因過服寒劑胃寒而得者有因水氣停痰心下痞得而得者大抵欬逆者不順之義

治治法當以降氣化痰和胃為主隨其所感而用藥其或病久脾胃衰敗而發欬逆額上出汗連聲不絕者最為惡候不治之證也

方鮮陳湯 治飢逆欲死
半夏 五錢 生薑 二錢 右剉一劑水煎服

溫中散 治吐瀉及病後胃中虛寒欬逆至三四聲或數聲相連收氣不回者難治
古今醫鑑 卷二 二三

丁香 柿蒂 人參 茯苓 橘皮 良薑 半夏 各一錢 甘草 三分 右剉一劑水煎服

羌活附子湯 治吐利後胃寒發飢
羌活 附子 炮法 小茴 乾薑 炮 木香 各二錢 丁香 一錢

橘參飲 治吐利後胃虛膈熱而欬逆者
橘皮 五錢 人參 二錢 竹茹 三錢 甘草 炙一錢

黃荆散 治傷寒發熱而欬逆者
黃荆子 不拘多少炒水煎服

欬法 治欬逆服藥無效者
好硫黃乳香 各等分 以酒煎急令患人嗅之

好硫黃乳香 各等分 以酒煎急令患人嗅之

雄黃酒

明雄黃一錢酒一盞煎七分急令患者飲其熱氣即止

吞酸

脈弦而滑兩寸或浮而弦或浮而滑或沉而遲或緊而洪或洪而數或沉而遲胸中有寒飲洪數者熱痰在膈間時吐酸水欲成翻胃之疾也

病丹溪曰吞酸與吐酸不同吐酸素問明以為熱東垣又言為寒何也吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成鬱積而久濕中生熱故從火化遂作酸水吐出非熱而何其有積之以此不能自涌而出俯於肺胃之間略不得上嚥不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表得溫暖則腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦得暫解非寒而何素問言執者主其本東垣言寒者言其標也

古今醫鑑

卷三

二十四

戴氏曰濕熱在胃口上飲食入胃被濕熱鬱遏其食不得傳化故作酸也如穀肉在器濕熱則易為酸也

原病式曰吐酸者肝木之謂也由火盛制金不能平木則肝木自盛故為酸也如飲食熱則易於酸矣必用糯米蔬菜以自養宜節厚味

方清鬱二陳湯

治吞酸刺心及吞酸嘈雜

陳皮一錢 半夏一錢 茯苓一錢 蒼朮八分 川芎八分 香附一錢

神麴炒五分 枳實炒入錢 黃連炒一錢 白芍七分 甘草三分 梔子炒一錢

右到一劑生薑三片水煎服或為丸服尤效

菜蓮丸

治鬱積吞酸

吳茱萸去梗湯泡 陳皮去白 黃芩陳壁土炒 黃連陳壁土炒

蒼朮米泔浸炒 右為末神麴糊為丸每六七十丸津液嚥下

○按右方治吞酸之劑

蒼連丸

治鬱積吐酸

蒼木

水泔浸一兩 陳皮 一兩

半夏

一兩薑汁炒

黃連

一兩半夏月倍用

白茯苓

一兩

吳茱萸

炒一兩冬月倍用

右為末蒸餅為丸如菘豆大每服三十九食後服

麴朮丸

治中脘宿食雷飲酸螫心痛口吐清水

神麴

炒三兩

蒼朮

米泔浸一兩半

陳皮 一兩 加砂仁 一兩

右為細末生薑汁煮神麴糊為丸如梧桐子大每服七十九薑湯

送下

○按右方治吐酸之劑

平肝順氣保中丸

雲林製

治鬱火傷脾中氣不運胃中伏火鬱積

生痰致令嘔吐吞酸嘈雜心腹脹悶常服順氣和中健脾胃進

美飲食化痰消滯清火抑肝

香附米

三兩童便浸三日炒

川芎

二兩

陳皮

去白三兩

白朮

四兩厚朴一兩

枳實

二兩

黃連

薑汁炒二兩

神麴

炒二兩

麥芽

炒七錢

木香

梔子

薑汁炒一兩

萊菔子

炒一兩

半夏

薑汁炒一兩

古今醫鑑

卷三

白茯苓

去皮一兩

砂仁

炒四錢

乾生薑

一兩

山查

取肉二兩青皮六錢香

甘草

炙四錢

右為末竹瀝打神麴糊為丸菘豆大每服百丸食後白湯送下日

進二服

○按右方治吞酸嘈雜噯氣兼治之劑

附噯氣

病胃中有火有痰

一云噯氣吞酸此係食鬱有熱火氣衝上用黃芩為君南星半夏陳

皮為佐執多加青黛

方星半湯

治胃中有鬱火膈上有稠痰故作噯氣

南星

半夏

石膏

香附

梔子

軟石膏丸

治食積痰火并瀉胃火

軟石膏不拘多少研細

右用醋糊丸如菘豆大每服二十九白湯送下

嘈雜

脈寸關緊而滑兩手弦滑胸中有留飲寸脈橫者膈上有橫積也
右關弦急甚者木乘土位欲作胃反難治

病夫嘈雜者是痰因火動其證似饑不饑似痛非痛如有懊懷不自
寧之狀者是也其證或無噯氣或無惡心漸至胃脘作痛痰火之
為患也

治治法以南星半夏橘紅之類以消其痰芩連梔子知母之類以降
其人蒼朮白朮芍藥之類以健脾行濕壯其本元又當節慾無有
不安者也

一肥人嘈雜三陳湯加撫芎蒼朮白朮炒梔子
一濕痰氣滯不喜食用三補丸加蒼朮倍香附

方化痰清火湯 治嘈雜

南星 半夏 陳皮 蒼朮 白朮 白芍 黃連 黃芩

古今醫鑑

卷三

二十六

梔子 知母 石膏 甘草

右劉生薑三片煎服去人參加香附貝母甚效
○按右方治痰火嘈雜之劑

養血四物湯 治血虛嘈雜

當歸 川芎 白芍 熟地黃 人參 茯苓

半夏 黃連 梔子 甘草

右劉生薑三片煎服去人參加香附貝母甚效

補心湯 治婦人心胸嘈雜氣盛血衰者

○按右方治血虛嘈雜之劑

諸氣

脈下手脈沉便知是氣沉極則伏瀆弱難治其或沉實氣蒸痰飲又

曰沉弦細動皆氣痛證心痛在寸腹痛在關下部在尺脈象顯然

症天天地之氣常則安變則病况人稟天地之氣五運迭侵於外七

情交戰於中是以聖人嗇氣如持至寶庸人投物而反傷太和此

軒岐所以論諸病皆因於氣有病皆生於氣遂有九氣不同之說
 氣本一也因所觸而為九怒喜悲恐寒暑驚思勞也其言曰怒則
 氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收暑則氣泄驚則氣
 亂思則氣結勞則氣耗夫人身之正氣與血為配血行脉中氣行
 脉外一呼脉行三寸一吸氣行三寸氣血並行周流乎一身之中
 灌漑乎百骸之內循環無端運行不悖此為生生不息之妙用也
 經曰一息不運則機絨窮一毫不續則穹壤判若內無七情之所
 傷外無六淫之所感何氣病之有哉其不善捍生者五志之火無
 時不起五味之偏無日不傷是以釀成膠痰固積留滯於六腑鬱
 火邪氣克塞乎三焦使氣血失其常候臟腑不能傳導是故外邪
 得以乘虛而奏襲矣以致清陽不升濁陰不降而諸般氣痛朝輟
 暮作而為膠固之疾非良工妙手莫易治焉若夫為脇痛為心腹
 痛為週身刺痛甚則為翻胃為膈噎等證即此之由也大抵男子

屬陽得氣易敗女人屬陰得氣易鬱是以男子之氣病常少女人
 之氣病常多故治婦人宜調其血男子宜調其氣以調其血此之
 謂也學者宜致思焉
 氣之為病非止一端有七情氣有鬱氣有逆氣有怒氣有熱氣有冷
 氣有厥氣有痰氣有虛氣有中滿氣有腹脹氣務要詳究不可雷
 同一例治焉

治諸氣瀆上下分消不可驟用局方金石烏附燥熱等劑

一七情憂結遂成鬱氣難治必瀆自能知戒庶幾可治

一鬱氣宜開鬱如蒼朮香附川芎青皮黃連半夏竹茹山梔枳殼
 連翹木香澤瀉之類

一逆氣在上者瀆用達之在中者瀆用調順在下者瀆用消導

一怒氣瀆用調肝經如柴胡青皮枳殼桔梗芫蕪藥半夏白芥子竹

茹木香萊菔子之類

一枳殼破滯氣然多服損胸中至高之氣○青皮瀉汗氣多則損真氣○香附快滯氣○陳皮泄逆氣○紫蘆散表氣○厚朴瀉胃氣○枳榔瀉至高之氣○藿香之馨香上行胃氣○沉香升降真氣○腦麝散真氣○木香行中下焦氣若此之類氣實所宜其中有行散者有損泄者用之能治氣之標而不能制氣之本

方四七湯 治喜怒哀思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯之不出嚥之不下此七情所為也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中阻嘔逆惡心並宜服之

半夏 五兩 茯苓 四兩 厚朴 四兩 紫蘆 二兩

右剉作十劑生薑七片棗一枚水煎熱服○梅核氣加桔梗枳實

○一方加枳榔 治男婦一切氣不和多因憂愁思慮忿怒傷神或臨食

古今醫鑑 卷三

憂感或事不遂意使抑鬱之氣留滯不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛脹噎塞不通噎氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦意面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸虛閉或因病之後胸中虛痞不思飲食並皆治之

青皮 五錢 陳皮 五錢 白茯苓 三錢 半夏 三錢 紫蘆 二兩

大腹皮 五錢 官桂 三錢 赤芍 三錢 桑白皮 五錢 木通 三錢 羌活 五錢

甘草 二錢半

右剉作五劑生薑三片棗一枚燈草十根水煎服

一方去芍藥羌活加木香枳榔香附枳殼莢末藿香桔梗善治憂

思鬱怒諸氣痞滿○性急加柴胡○多怒加黃芩○食少加砂仁

神麴炒○咳嗽加桔梗半夏○胸膈痞悶加枳實香附○三焦不

和加烏藥○氣閉加藜蘆子枳殼○氣滯腰疼加木瓜枳殼○上

焦熟盛加黃芩○下焦熱盛加梔子○氣滯腰疼加木瓜枳殼○

面目浮腫加猪苓澤瀉車前子木瓜葶藶麥門冬○氣塊加三棧
菝朮

○按右方治諸氣平和之劑

利氣丸

治一切氣滯心腹滿悶疼痛脇肋膨脹難消嘔吐酸水痰
涎不利頭目眩暈并食積酒毒及米穀不化或下痢膿血大小便
結滯不快風壅積熱口苦煩燥涕唾稠粘此藥最能流濕潤燥推
陳致新滋陰抑陽散鬱破結活血通經治氣分之聖藥也

大黃

生用六兩黑牛頭末六兩木香一兩枳榔一兩枳殼炒二兩香附米炒四兩

青皮

兩陳皮一兩菝朮煨一兩黃連一兩黃栢三兩

右爲細末水丸如梧桐子大每一百丸臨臥以淡薑湯送下以大
便通利爲度如不利再加丸數服務使通利爲愈

一塊氣

治諸氣積食及噎膈痞滿胸脇刺痛癥瘕疝氣並皆治之

青皮

一兩陳皮一兩三稜一兩菝朮一兩香附便製神麴三錢

麥芽

三錢蘿蔔子三錢炒白丑頭末三錢檳榔三錢鬱金三錢

黃連

酒炒三錢枳實三錢皂角三錢五分百草霜二錢五分

右爲末麪糊丸葶豆大每三十九視疾之上下爲食之先後熟酒
薑湯送下

〇〇青筋

證

夫青筋之證原氣逆而血不行俾惡血上攻於心也多由一切怒
氣相冲或憂鬱氣結不散或惱怒復傷生冷或房勞後受寒濕以
致精神恍惚心荒氣喘噎塞上壅嘔噦惡心頭目皆眩胸膈痞滿
心腹刺痛脇肋腰背頭腦疼痛口苦舌乾面青唇黑四肢沉困百
節酸疼或增寒壯熱遍身麻痺不仁手足厥冷顫掉默默不語不
思飲食等證皆惡血攻心而致之也自古以來無人論此但有患
此疾者無方可治惟以砭鍼於兩手曲池青筋上刺之出瘀血不
勝其數而疾有卽愈者有不愈者而變爲大患者常慣病此者或
有一月一次或兩三次者屢患屢刺莫之能愈愚惟慮人之生命

青筋

古今醫鑑

卷三

五九

青筋

以氣血為主故丹溪曰氣血和一疾不生虧則病生焉况此病先傷於氣而後復損其血不至於夭枉者蓋亦鮮矣雖然未有退血之法又不得不刺不刺則惡血攻心瀕死不救

治干製一方屢獲効驗名白虎九者西方肺金之謂也青筋者東方肝木之屬也以白虎而治青筋是金能尅木故耳何病之不愈哉此方之妙不惟代刺青筋之苦愈青筋之病而亦免後日之患其惠也不亦大乎此方兼治男子久患痢疾便血婦人崩漏帶下并一切打撲內損血不能散心腹痛欲死者服之其效不啻桴鼓之影响也按此青筋之病北人多患之南方有即痧証也

白虎九 雲林製

白虎仙丹古石灰谷神不製救人灾栢中爲末水飛過手上成九日曬來引宜燒酒一二盞每服瀆吞五十枚保全世患青筋症廣積陰功遍九域

古今醫鑑

卷三

三十

千年古石灰不拘多少刮去雜色泥土爲細末水飛過

右晒乾量可丸如梧桐子大每服五十九看輕重加減燒酒送下此藥能順氣散血化痰消滯治青筋初覺頭疼惡心或腰痛或腹疼或遍身作痛不思飲食卽進一服當時血散若過三五日青筋已老多服取効又治心腹痛及婦人崩漏帶下或因氣惱致病或久患赤白痢疾或打撲內損血不能散服之大効

太公九 宋杏川傳

治緊陰青筋心腹疼痛

乾薑 二兩

白礬 枯過一兩

右爲末用糯米糊爲丸如菜豆大每服三十九滾水下如不止再飲滾水三口

治煩人因氣打青筋後卽心荒發熱口乾或膈脹悶惡心嘔噦等証宜分心氣飲加麥門冬黃連生地 方見諸氣

痞滿

痞滿

厥胸痞脈滑為有痰結弦伏亦痞濇則氣劣

證 夫痞與否同不通泰也由陰伏陽蕩氣與血不運而成處心下位中央填滿痞塞皆土邪之為病也與脹滿有輕重之分痞則內覺痞悶而外無脹急之形脹滿則內脹而外亦有形也前人皆指誤下而致之蓋誤下則裏氣虛故傷寒之表邪乘虛入於心下雜病則所受之邪氣亦蓄心下因而致痞也亦有不因誤下而得之者有中氣虛弱不能運化精微而為痞者有飲食痰積不能施化而為痞者有濕熱太甚土來心下為痞者

治

古方治痞用黃連黃芩枳實之苦以泄之厚朴半夏生薑之辛以散之人參白朮之甘以補之茯苓澤瀉之淡以滲之大棗與濕同治使上下分消可也又曰肥人多是濕瘦宜蒼朮半夏砂仁茯苓滑石以燥之瘦人多是中焦鬱熱宜枳實黃連以導之葛根升麻以發之如飲食後因感風寒以致飲食不消而作痞者宜藿香砂

古方醫鑑

卷三

三十一

仁草豆蔻吳茱萸以溫化之如脾胃氣虛弱轉運不調飲食不化為痞者當消導其胸中窒塞宜陳皮白朮神麩麥芽山查以助化之或以保和丸枳實導滯丸而木香化滯湯主之有傷寒下早而作痞桔梗湯小陷胸湯主之有傷寒下多則亡陽而痞者四物加參苓白朮柴胡升麻少佐陳皮枳殼以監之有大病後元氣未復而胸滿氣短者補中益氣湯橘皮枳朮丸主之有虛實之殊焉實痞大便閉而能食者厚朴枳實湯主之虛痞大便秘者芍藥陳皮治之上逆元兀欲吐者則宜吐之所謂在上者因而越之世人苦於痞塞喜行利藥以求速効雖暫時通快痞若再作益以滋甚是皆不察天下多所謂亡陰之意也

方 木香化滯湯

治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞滿不思飲食

當歸稍

枳實炒各兩陳皮四兩

乾生薑

木香各六分柴胡七分

草豆蔻

錢半夏一錢

紅花少許

甘草炙

右剉一劑生薑煎食遠服

黃連消痞丸 治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不安

黃連 一兩 黃芩 二兩 枳實 七錢 半夏 九錢 陳皮 五錢 茯苓 三錢

白朮 三錢 猪苓 五錢 澤瀉 一錢 姜黃 一錢 乾生薑 二錢 甘草 三錢

右為末蒸餅為丸如梧桐子大每服五七十九白湯下

○按右方治氣鬱實痞專消之劑

加減益氣湯 治內傷心下痞滿方見內傷

脉緩有痰而痞加半夏黃連○脉弦四肢乏力便難而心下痞加

黃連柴胡甘草○大便秘燥加黃連桃仁少加大黃當歸身○心

下痞劣悶加白芍黃連○心下痞腹脹加白芍沙仁五味如天寒

少加乾薑或中桂○心下痞中寒者加附子黃連○心下痞嘔逆

者加陳皮生薑黃連冬月加黃連少加丁香藿香○能食而心痞

加枳實 三錢 黃連 三錢 ○如不能食心下痞者勿加依本方○食

已心下痞則服橘皮枳朮丸

枳實消痞丸 治右關脉弦心下虛痞惡食懶倦開胃進飲食

人參 三錢 白朮 三錢 白茯苓 三錢 黃連 三錢 枳實 五錢 半夏 三錢

厚朴 薑製 麥芽 炒半 乾生薑 二錢 甘草 二錢

右為末湯浸蒸餅為丸加梧桐子大每服七十九食遠白湯下

大消痞丸 治一切心下痞及年久不愈者

黃連 八錢 黃芩 七錢 枳實 五錢 半夏 四錢 陳皮 四錢 厚朴 四錢

白朮 二兩 猪苓 五分 澤瀉 三錢 薑黃 一兩 乾生薑 二錢 人參 四錢

神麴 炒 二砂仁 二錢 甘草 二錢

右為末蒸餅為丸如梧桐子大每服五十九至百九空心白湯下

○按右方治內傷虛痞消補兼施之劑

胸腹中窄狹
腹中窄狹須用蒼朮若肥人自覺腹中窄狹乃是濕痰流灌臟腑氣

不升降燥飲用蒼朮香附行氣○如瘦人自覺胸中窄狹乃是濕熱薰蒸臍腑宜黃連蒼朮。

方 枳實散 治心下堅而盤

枳實一錢 是炒 白朮三錢 是炒 右剉水煎溫服

蟠桃酒 治氣結聚心下不散

桃樹上不落乾桃子三兩為末每服二錢空心溫酒調下

○**脹滿**

脈脹浮大是出厄虛大命須努力浮大當發汗虛小當利小便也脹滿脈弦脾制於肝洪數熱脹遲弱陰寒浮為虛滿緊則中實

浮則可治虛則危急

證 天中滿腹脹者其面目四肢不腫而肚腹脹起中空似鼓者是也丹溪曰心肺陽也居上肝腎陰也居下脾居中亦陰也屬土經曰

飲食入胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺肺朝百脈通

十人醫鑑

卷三

三三三

調百道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而有乾

健之運故能使心肺之陽降肝腎之陰升而成天地交之泰是為

平人也今也七情內傷六淫外侵或飲食之不節或房勞之致虛

則脾土之陰受傷而轉輸之官失職胃雖受穀亦不能運化故陽

自升陰自降而成天地不交之否清濁相干隧道壅塞氣化濁血

瘀鬱而為執熱留而久氣化成濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹

是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓故名曰鼓其病膠固難

治又名蠱者若蠱侵蝕有蟲之義理宜補脾大養肺金以制木使

脾無賊邪之慮滋腎水以制火使肺得清化之令却鹽味以防助

邪斷妄想以保母氣遠音樂戒暴怒無有不安醫者不察病起於

虛急於獲効病者苦於脹滿喜行利藥以求欲速殊不知得了一

時之快不二三日之間脹滿復作愈盛於前真元已耗去死則不

遠矣古方惟禹餘糧丸制肝補脾殊為切當然恐其溫熱之藥大

脹滿

脹滿

多亦須隨證順時加減用之俗謂氣無補法者以其痞滿壅塞似難於補不思正氣虛而不能運行邪氣着而不出所以為病經曰壯者氣行則愈怯者着而成病氣虛不補何由以行且此病之起固非一年根深勢篤欲取速效自求禍耳知王道者可以語此其或病之淺脾胃尚壯積滯不固者惟可畧以疎導若以峻攻之策吾不敢也

治凡胸腹脹初得是氣脹宜行氣疏導之劑木香檳榔枳殼青皮陳皮厚朴之類久則成水脹宜行濕利水之劑

一 如肥胖之人腹脹者宜利濕為主胃苓湯主之

一 瘦人腹脹者是熱宜黃連厚朴白芍香附之類

一 色白腹脹者必是氣虛用人參白朮苓朮陳皮厚朴之類

一 因有故蓄血而腹脹者用桃仁紅花甚者用桃仁芩氣湯利之

一 因食積而腹脹者有熱宜利氣九或保和九加木香檳榔阿魏

古今醫鑑

卷三

三十四

之類有寒者用丁香砂仁木香厚朴香附神麩之類

一 因外寒鬱內熱而腹脹者用升麻乾葛藿香官桂之類

一 因多怒而腹脹者用青皮陳皮香附木香梔子蘆薈之類

一 心腹脹滿或痛咳嗽痰涎喘促大便閉前後心背痛分心氣飲

加三稜莪朮檳榔香附烏藥

方家傳正氣散 治心腹脹滿或出遠方不服水土

蒼朮 陳皮 厚朴 藿香 半夏 烏藥

枳殼 香附子 大腹皮 甘草

右剉生薑棗子煎溫服

和榮順氣丸 雲林製 治脾弱血虛心腹脹悶兩足虛腫

當歸 酒沉 川芎 六分 白芍 酒洗 白朮 土炒 一錢半 茯苓 一錢

蒼朮 木洲製 一錢 陳皮 去白 枳實 炒 一錢 神麩 炒 一錢

香附 醋炒 牛膝 酒洗 一錢 木瓜 一錢 獨活 酒洗 澤瀉 一錢 薏苡仁 炒 一錢

木通 一錢 甘草 三錢

右劉一劑生薑煎服

行濕補氣養血湯 治氣血虛弱單鼓腹脹浮腫。

人參 大補 補脾 白朮 濕滯 白茯苓 養血 川芎 行血 蘓梗 利氣

白芍藥 欲脹 陳皮 泄滿 厚朴 寬脹 大腹皮 寬脹 木通 利水 萊菔子 消食

木香 逆氣 海金沙 甘草 調諸藥扶胃氣

右劉散薑棗煎服○氣虛倍參朮茯苓○血虛倍芎歸白芍○小

便短少加猪苓澤瀉滑石○服後腫脹俱退惟面目不消此陽明

經氣虛倍用白朮茯苓

消脹飲子 彭大參傳 治脹蠱單腹脹

猪苓 澤瀉 人參 白朮 茯苓 半夏

陳皮 青皮 厚朴 紫蘇 香附 砂仁

木香 檳榔 大腹皮 木通 萊菔子 甘草 各等分

古今醫鑑 卷三 三五

右劉生薑五片棗一枚水煎服

○按右方治脹滿消 施之劑

廣茂潰堅湯 治中滿腹脹有積聚如石堅硬令人坐卧不寧一便

澁滯上氣喘促或通身虛腫。

厚朴 薑製 黃連 黃芩 益智仁 草豆蔻 當歸

半夏 廣茂 升麻 紅花 吳茱萸 生甘草

柴胡 澤瀉 神麴 青皮 陳皮 口乾加甘葛

右劉一劑生薑煎食遠溫服忌醋酒濕麪

○按右方治熱脹之劑

香利湯 治中寒下虛心腹膨脹不喜飲食脉浮遲而弱。

厚朴 薑製 大腹子 泡去皮 臍七錢 木香 三錢

右劉薑七片棗二枚水煎服。○按右方治寒脉之劑

金陵酒丸 王進士傳 治鼓腫

真沉香一兩 牙皂一兩 廣木香二兩 檳榔一兩

右為末用南京燒酒浸十次曬乾用京酒為丸每服三錢重者四錢五更燒酒送下水鼓水自小便而出氣鼓放屁水鼓加苦葶藶五錢炒酒送下再服

調胃散

蒼朮 白朮 茯苓 白芍藥 桔梗 紫蘆 檳榔 陳皮 甘草

小便閉加車前子 ○腹脹加枳殼

金蟾散 李用峯傳 治氣鼓如神

大蝦蟇一箇以砂仁推入其口使吞人腹以滿為度用泥罐封固炭火煨令透紅烟盡取出候冷去泥研末為一服或酒或陳皮湯送下候撒屁多乃見其効 ○按右方治氣鼓之劑

大三稜煎丸 治心腹堅脹脇下緊梗胸中痞塞喘滿短氣常服順

古今醫鑑 卷三

氣寬中消積滯除膨脹大治癥瘕積塊消脹軟堅緊獲良驗

三稜生細到半斤搗為末以酒青皮二兩 蘿蔔子炒二兩

神麴炒二兩 麥芽炒二兩 砂少用磁器研爛入水少許調生於

乾漆炒三兩 杏仁湯去皮尖炒

右為末三稜膏為丸如梧桐子大每服十五丸至二十九食遠米湯下 ○按右方治實脹之劑

調中健脾丸 治單腹脹及脾虛腫滿膈中閉塞及胃口作痛並皆神効

黃芪二兩 人參二兩 白朮六兩 茯苓二兩 陳皮二兩 鹽炒

紫蘆子二兩 半炒 蘿蔔子一兩 半炒 山查肉三兩 炒

草豆蔻一兩 酒炒 澤瀉二兩 薏苡仁三兩 炒 沉香六錢

五加皮三兩 炒 瓜蒌一兩 用六瓜蒌二個錢一孔每箇入川

入瓜蒌內外以綿紙糊定再用綿筋鹽泥封固炭火煨通紅為度取出擇去其黑皮一併入藥

右共為細末煎荷葉大茯苓皮湯打黃米糊為丸如梧桐子大每服

百九日進三次。白湯下此藥不傷元氣大有補益勿輕觀之。

○按右方治虛脹之劑

牛皮丸 方外人傳 治腹中水響如雷。上攻即嘔吐胸膈脹滿。或手

足作腫。

黑丑 頭末 九錢 木香 九錢 陳皮 九錢

右為末。黃蠟化開為丸如梧桐子大。每服三十九。黃酒送下。

〇〇 水腫

脉水腫之證。有陰有陽。察脉觀色。問證。須詳陰脉沉遲。其色青白。不

渴而瀉。小便清澁。脉或沉數。色赤。而黃燥。莖赤溺。兼渴為陽

病。夫腫者鍾也。寒熱氣所鍾聚也。為病有十。水之分其本。乃濕熱所

致。內經曰。諸濕腫滿皆屬脾土。夫脾虛不能制水。水漬妄行。故通

身面目。四肢皆浮而腫。名曰水腫。或腹大如鼓。而面目四肢不腫

者。名曰蠱脹。朝寬暮急。是血虛。暮寬朝急。是氣虛。朝暮急。血氣俱

古今醫鑑 卷三 三十七

治法。身有熱者。水氣在表。可汗之。身無熱者。水氣在裏。可下之。其

間通利。小便順氣和。脾俱不可。緩然證。雖可下。又可度其輕重。不

可。過用大戟。芫花。甘遂等利水。猛烈之劑。一發不收。峻決者。易回

閉者。難。水氣復來。而無可治之也。

一凡腫病。見大便滑泄。與夫唇黑。缺盆平。臍突。足平。背平。或肉硬

或手掌平。又或男從脚。下腫而上。女從身上腫而下。並不治也。又

曰。膨病。水氣。人面黑者。肝絕也。面目凸者。肺絕也。臍中突出者。脾

絕也。兩手無紋者。心絕也。下疝。脚腫者。腎絕也。此五證。內顯一證

不可治也。

一患人腹上。用手按之。有窩者。可治。脉壯者。易治。脉微者。難痊。

一遍身腫。煩渴。小便赤澁。大便閉。身熱。脉沉數者。此屬陽水。以八

正散主之。

一遍身腫。不煩渴。大便溏。小便少。不澁。身不熱。脉沉者。此屬陰水。

水腫

水腫

以胃苓湯王之

一水氣浮腫因於氣者以分心氣飲加猪苓澤瀉車前子葶藶水瓜麥門冬

一通身皮膚光腫如泡手按成窟舉手即滿者是因脾虛不能制水水漬妄行故也法當補脾使脾氣得實則自健運切不可下忌食羊肉腰已上腫宜發汗腰已下腫宜行小便此仲景之妙法

一病人六數脈四肢腫滿腹痛發熱小便少大便閉治以溫中養胃非也皆由三焦蓄熱大小便閉無發泄故流出經絡五臟克溢而成腫脹宜敗毒散加麻黃防風枳實發散次以利氣丸下之或八正散

方消腫調脾順氣湯劉司寇傳治水腫消脹滿順氣和脾除濕利水

蒼朮 陳皮 厚朴 草菓 砂仁 猪苓

木香 檳榔男雄女雌 大腹皮 香附 枳殼 澤瀉

古今醫鑑

卷三

三八

人參 木瓜 桑白皮 大黃 甘草 牽牛女用黑男用白

右劉生薑煎服

加減胃苓湯雲林製

治水腫

蒼朮米泔製一錢半 陳皮去白一錢 厚朴薑炒八分 甘草炙三分 猪苓八分

澤瀉一錢 白朮去蘆一錢 赤茯苓去皮一錢 神麴炒八分 山查去核七分

砂仁炒七分 香附薑汁炒一錢 檳榔八分 水瓜一錢 大腹皮六分

右劉一劑生薑燈心煎服 ○按右方消中利水和藥之劑

蘇沉破結湯車少參傳

紫蘇 薄荷 枳實 麥門冬 當歸 川芎

大黃 木通 甘遂 白礬 白豆蔻 木香

沉香減半已上三味另為木 牙皂 生薑 細茶各一錢

右作二服水煎五更早服忌口

回生丹 治浮腫腹脹返

青皮

陳皮

三稜

莪朮

連翹

五味各三錢用酒炒

砂入藥

木香

甘遂炒

商陸

澤瀉

木通炒

乾漆炒

薑薤子

炒各三錢

赤茯苓

桑白皮

炒椒目炒各五錢

胡椒

炒一黑牽牛一兩生

右為末醋湖為丸如菴豆大每服十五丸至二十九第一服用生

葱二十四根搗碎同溫酒五更下第二服用陳皮桑白皮煎湯第

三服用射于湯下切忌食鹽

推車丸

毛惟中傳

治水腫氣腫單腹脹

沉香 一錢

木錢 一錢

巴豆生半熟

胡椒 一錢炒爆

右為末棗肉為丸如梧桐子大每服五六十丸消上用葱白搗爛

熱酒下次日消中用陳皮湯下三次消下用牛膝湯下去三五次

不補自止後用拾皮散繫皮

按右方治消腫峻攻之劑

鷄體飲

劉同知傳

治水腫脹腹四肢發腫不問水腫氣腫濕腫皆

古今醫鑑

卷三

三十九

効乾鷄糞一升鍋內炒黃以好黃酒三碗淬下煮作一碗細濾去

渣令病人飲之少頃腹中氣大轉動作鳴從大便利下于大便及

臍上下先作皺起其腫漸消復如利未盡再服一劑以田螺二枚

滾酒焯熟食之即止續以溫粥調理平安

秘方

天友竹傳

治水腫脹滿

蠟蝦蟇二三枚裝在豬肚內好酒煮一伏時去蝦蟇將豬肚與酒

服盡大便屍如雷或水下其腫自消加砂仁尤妙一方加胡椒一

歲一粒同煮尤妙

法慈草藤膏 治十腫水氣五蠱瘴氣

草藤子去殼用麻草包壓去油薄攤在木杓內仰放在鍋中水面

上以鍋排蓋住煮二十餘沸以藥無白色為度取出每服六錢滾

水化開空心溫服不過二三次以小便大便利為効

○按右方消腫專攻之劑

導水餅秘方 治腫脹不服藥自去水

真水銀粉二錢 巴豆肉研去油 生硫黃一錢

右三味研成餅令勻先用新綿一塊鋪臍上次以餅當臍捺之外用帛縛如人行三里自然瀉下惡水待行三五次除藥以溫白粥

補之。

消河餠秘方 治腫臙膨脹。

大田螺四箇 大蒜去皮 車前子三錢 芡末

右三件研成餅貼臍中以手帕縛之貼藥後少頃小便出一二餅即愈。○按右方消腫外治之劑

積聚

脉脉來細而附骨者積也在寸口積在胸中在關上積在臍傍在尺部積在氣冲脉在左積在左脉在右積在右脉兩出積在中央脉來小沉而寔者脾胃中有積聚不下食食則吐。

古今醫鑑

卷三

四十

積聚

病夫積者陰氣也其發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也其始無根本上下有所畱止其痛無常處蓋氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟所生聚者六腑所成其肝積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不愈令人發欬逆病瘡連歲不愈心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心脾之積名曰痞氣在胃院覆大如盆久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚肺之積名曰息奔在右脇下大如覆杯久不愈令人酒浙寒熱喘發肺癰腎之積名曰奔豚在小腹上至心下若豚狀或上或下無時久不愈令人喘逆骨瘦少氣皆因陰陽不和臟腑虛弱風邪搏之憂喜乘之傷五臟逆四時乃鬱結而為積聚也。

瘕者微也腹中堅硬按之應手曰微瘕者猶假也腹中雖硬而忽聚忽散無有常處曰瘕瘕因傷食瘕是血主痞原傷氣癖則傷精瘕

癖者本因邪氣積聚而生也。痞者在腹內近臍左右各有一條。脈急痛如臂如指如弦之狀。癖者僻側在兩肋之間。有時而痛曰癖。夫痞之與癖皆陰陽不和。經絡痞膈。飲食停滯不得宣流。冷之氣搏結不散。得冷則發作疼痛。故曰痞癖也。

治 丹瑛曰：塊乃有形之物，氣不能成形，痰與食積死血也。在中為痰，飲在右為食積，在左為死血。大法鹹以軟之，堅以削之。行氣開痰為主，不可專用下藥。徒損其病，病亦不去。當消導使之鎔化，其死血塊去須大補。痞塊在皮裏膜外，次用補藥香附開之。兼二陳湯加補氣藥，先須斷厚味。

方 元氣湯 治五積六聚狀如癥瘕，隨氣上下發作，有時心腹疼。

氣窒塞小腹脹滿大小便不利。

三稜 菘木 青皮 枳椇 陳皮 藿香

益智仁 香附 肉桂 甘草

古今醫鑑 卷三

右劉生薑三片，棗一枚，水煎服。○心脾痛加烏藥枳殼。○脾滯合和四聖散。○一方加大黃檳榔。治大人小兒諸般痞積，面色痿黃，四肢無力，皆緣內有蟲積，或好食生米，或好食壁土，或好食茶炭，鹹辣等物。只此服除根，用水煎，一服露一宿，空心溫服，不得些少飲食，不然則藥力減而蟲積不行矣。服後少頃肚腹心爽，當如魚凍，或長蟲或血蟄，至日午蟲積下盡，方用溫粥止之。

治 俱保中丸 雲林製 順氣化痞理脾消滯散痞結除塊進飲食

陳皮二兩 半夏一兩 湯泡七 白茯苓一兩 半 白木一兩

香附一兩 醋炒 青皮四錢 去穢 木香三錢 不見火 檳榔七錢

菘木八錢 醋炒 三稜八錢 醋炒 萊菔一兩 砂仁四錢 薑汁炒

神麴一兩 麥芽六錢 白芥子一兩 黃連一兩 薑汁炒

真阿魏一錢 醋浸 山柰一兩 薑汁炒 乾漆五錢 盡烟 加人參五錢 尤炒

右為細末，薑汁酒糊為丸，如梧桐子大，每服八十九丸，食後白湯送。

1. ○按右方治積聚之總司也。

千金化氣丸 太醫院傳 治男子腹中氣塊痞痛。

青皮 陳皮 枳殼 香附 砂仁 白豆蔻

三稜 莪朮 藿香 半夏 草菓 乾薑

玄胡索 川芎 白芷 各一兩 檳榔 半兩 木香 五錢 丁香 二錢

小茴香 五錢 厚朴 大腹皮 白芍 各一兩 甘草 三錢

右劉生薑三片水煎空心温服

千金導氣湯 太醫院傳 治婦人滿腹氣塊遊走不定漉漉有聲

丁香 木香 砂仁 白豆蔻 香附 烏藥

枳實 倍 當歸 川芎 白芍 酒炒 白芷 白朮

青皮 陳皮 乾薑 煨 桔梗 厚朴 製 肉桂

三稜 醋炒 莪朮 醋炒 角茴 小茴 牛膝 紅花

杜仲 炒 乳香 沒藥 乾漆 醋炒 甘草

古今醫鑑 卷三 四二

右劉半水半酒薑葱煎熱服如飽悶不食加神麩麥芽山查發熱

加柴胡黃芩

勝紅丸 治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水男子酒積婦

人血積氣積小兒食積皆治

陳皮 莪朮 二味同醋煮 青皮 三稜 醋煮 乾薑炮

良薑 各一兩 香附 炒去皮二兩

右為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九薑湯下食前服。

○按右方治寒積之痢

開懷散 雲林製 治心下積塊作痞悶或發熱者。

青皮 去穢 陳皮 半夏 薑炒 白茯苓 皮去 三稜 醋炒 莪朮 醋炒

香附 檳榔 草豆蔻 倍用 柴胡 倍用 紅花

枳實 炒 甘草 口乾加乾葛

右劉一劑生薑煎服

紫香散 治心腹有氣一塊略痛又理心腹疼痛膨脹寒熱往來。

柴胡 七分

黃芩 七分

赤芍 五分

枳實 一錢

厚味 五分

香薷 五分

黃連 五分

地骨皮 一錢

三稜 一錢

莪朮 一錢

玄胡索 五分

甘草 三分

右到一劑水煎服

三稜煎丸 治飲食過傷痞悶疼痛食不消化久而成癖又治婦人

血積血塊乾血氣經閉不通。

大黃 八兩為末

三稜

莪朮 各一兩二味濕紙包裏煨為末

右先將大黃銀石器內好醋漬令平慢火熬乾入二味為丸如葶

豆大每服二三十丸食後白湯下。○量虛實加減不問男子婦人

小兒諸般積塊皆可服。

三稜化積丸

李九可方

三稜 六兩

莪朮 一兩

木香 一兩

檳榔 六兩

青皮 一兩

陳皮 一兩

香附 一兩

枳實 一兩

厚朴 一兩

砂仁 一兩

神麴 一兩

山查 四兩

古今醫鑑

卷三

四三

麥芽 一兩

南星 一兩薑湯泡

半夏 一兩薑製

蘿蔔子 一兩炒

大黃 三兩

黃連 一兩炒

桃仁 一兩去皮尖

乾漆 一兩炒

甘草 一兩

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服四十九漸漸加用白湯送下。

○按右方治熱積之劑

神化丹

秘方

消痞積破血氣下鬼胎通經絡及諸癖積血氣塊。

礪砂

乾漆 炒

血竭 各三錢

紅娘子 二十箇 去翅

乳香 一錢半

斑蝥 二十箇去翅足

右為末棗肉為丸如豌豆大每一丸至三五丸臨卧或米湯或薑

湯或紅花蘓木湯下。○按右方治積聚專攻之劑

〇〇〇

五疳

脉五疳實熱脉必洪數其或微瀉證屬虛弱○脉沉渴飲飲水小便不利者必發黃也。

疳夫疳者黃病也其證有五曰黃汗曰黃疸曰酒疸曰穀疸曰女勞

五疳

五疸

疸瀉有五者之分。而病原不過濕與熱鬱蒸於脾。使面目肢體發黃。如梔子水染也。

治法但利小便為先。溺白黃自退矣。若食積黃者。量其虛實下之。

一外有傷寒病。陽明內下。當下而不得下。當汗而不得汗。當分利而不得分利。故使濕熱拂鬱內甚。皆能令人發黃病也。先哲製茵陳五苓散。茵陳湯。茯苓滲濕湯之類以治之。

一又有時氣傷寒。傷風伏暑。解散未散。亦令人發黃。如有其狀。口淡。怔忡耳鳴。脚弱微寒。微熱水便白濁。此為虛証。不可妄用涼藥。愈傷氣血。

一疸病面黑黃色。而作渴腹脹者。難治。

方腎疸湯 治腎疸目黃甚。至遍身黃小便赤澀。

羌活 防風 藁本 獨活 柴胡各五 白朮五分

白茯苓二分 澤瀉三分 猪苓四分 蒼朮一錢 黃柏二分 人參三分

古今醫鑑 卷三 四四

乾葛五分 神麴六分 升麻五分 甘草三分

右剉作二劑水煎稍熱食前服。

○按右方治腎疸用風藥以勝濕也。

茯苓滲濕湯 治濕熱發黃汗黃尿赤。

猪苓 澤瀉 蒼朮 茯苓 陳皮 枳實

黃連炒 黃芩 梔子 防已 茵陳 木通

如不思飲食加砂仁神麴炒麥芽炒各等分。

右剉生薑煎服。

加減胃苓湯 治黃胖飲食無味四肢無力行步倦怠脉澀而濡。

蒼朮米泔製一錢半 陳皮去白一錢 厚朴薑炒八分 甘草炙三分 猪苓八分

澤瀉一錢 白朮去蘆一錢 赤茯苓去皮一錢 神麴炒八分 山查去核七分

砂石炒七分 香附薑汁炒七分 檳榔八分 木瓜一錢 大腹皮八分

藿香 木香 蘿蔔子 三棱 莪朮

青皮各七分 右剉一劑水煎服

○按右方治黃疸滲濕利水之劑

牛黃飲子 治酒疸食黃及水氣蠱證酒疸飲酒太過食黃宿食積

久以此面目甚黃遍身浮腫蠱證肚大如盆

黑牽牛 春八分夏九分 大黃 春八分夏九分

檳榔 春八分夏九分 甘草 春八分夏九分

右為細末每服五錢五更時面朝東南用井花水調服疾隨下而

不動面朝太陽吸氣三口疾速下蟲症全消酒疸宿食俱愈忌生

冷發物後服烏藥順氣散一二貼再服十全大補湯數貼

○按右方治五疸實熱之劑

酒蕒茵陳湯 蔣雲林傳 治酒疸遍身眼目發黃如黃金色者

茵陳一兩 好陳酒一鍾半煎至八分食遠溫服不數劑而愈

五疸神丹 孫柳唐傳 治五疸黃腫

古今醫鑑 卷三

綠礬不拘多少炒至白色為入瓶中火煨白尤佳

右為細末煮棗肉為丸如櫻桃大每服五九早晨午間晚上各一

服用冷陳酒送下忌醋生冷發物若有蟲服之亦吐出神効

○按右方治黃疸專攻之劑

退金丸 鄧陵蹇大尹傳 治黃腫及癖疾發熱

砂礬一箇裝青礬令八分滿外以鹽泥固濟炭火煨令通紅去泥

埋土中以徹去火毒將砂礬及礬俱為末水打麩糊丸如梧桐子

大每服二三十丸肉湯送下日進三服滾湯亦可忌魚腥麩筋等

發物

鐵砂丸 思恒傳 治黃疸腹內有塊

蒼朮 三兩米 香附 三兩 白朮 一兩 猪苓 一兩 澤瀉 一兩

茯苓 一兩 茵陳 五錢 牛膝 一兩 檳榔 一兩 木瓜 一兩

草菓 一兩 砂仁 一兩 枳殼 一兩半 青皮 一兩 陳皮 一兩

三稜醋炒 莪朮醋炒 當歸 神麴 青礬炒黑
右為末醋糊丸如梧桐子大每服九十九粒溫酒送下醋湯亦可

發熱

脈經曰脉大無力為陽虛脉微無力為陰虛無力為虛有力曰實
症天發熱者謂怫怫然發於皮膚之間則成熱矣與朝熱寒熱若同
而異潮熱者有時而熱不失其時寒熱者寒已而熱相繼而發至
於發熱則無時而發也○世間發熱證類傷寒者數種治各不同
外感內傷乃大關鍵張仲景論傷寒傷風此外感也因風寒之邪
感於外自表入裏故宜發汗解散之此麻黃桂枝之義也以其感
於春冬之間寒冷之月即時發病故謂之傷寒而藥用辛熱以勝
寒冷時非寒冷則藥當者變矣故春溫之月則當變以辛涼之藥
夏暑之月則當變以甘苦寒之藥故云冬傷寒不即病至春變溫
至夏變熱而其治法必因時而有異也又有一樣冬溫之病謂失

古今醫鑑

卷二

四六

其時而有其氣蓋冬寒時也而反病溫焉此天時不正陽氣反泄
用藥不可溫熱又有一樣時行寒疫却在溫暖之時時本溫暖而
寒反為病此亦天時不正陰氣反逆用藥不可寒冷又有一樣天
行瘟疫熱病多發於春夏之間沿門合境相同者此天地之厲氣
當隨時令參氣運而施治宜用劉河間辛涼甘苦之藥以清熱解
毒已上諸症皆外感天地之邪者也若飲食勞倦內傷元氣此則
真氣下陷內生虛熱故東垣發補中益氣之論用參芪等甘溫之
藥大補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足者也又若勞
心好色內傷真氣陰血既傷則陽氣偏勝而變為火矣是為陰虛
火旺勞瘵之證故丹溪發陽有餘陰不足之論用四物湯加黃柏
知母補其陰而火自降此用血藥以補血之不足者也益氣補陰
皆內傷證也一則因陽氣之下陷而補其氣以升提之一則因陽
火之上升而滋其陰以降下之一升一降迥然不同矣又有夏月

傷暑之病雖屬外感却類內傷與傷寒異蓋寒傷形寒邪客表有餘之證故宜汗之暑傷氣元氣爲熱所傷而耗散不足之證故宜補之故東垣所謂清暑益氣湯是也又有因時暑熱而食冷物以傷其內或過取涼風以傷其外此則非暑傷人乃因暑而自致之病治宜辛熱解表或辛溫理中之藥却以傷寒治法相類者也凡此數証外形相似而寔有不同治法多端而不可惑謬故必審其果爲傷寒傷風及寒疫則用仲景法果爲溫病爲熱病及溫疫也則用河間法果爲氣虛也則用東垣法果爲陰虛則用丹溪法如是則庶無差誤以害人性命矣今人但見發熱之証皆認作傷寒外感卒用汗藥以發表汗後不解又用表藥以涼其肌設是虛証豈不死哉間有頗知發熱屬虛而用補藥則又不知氣血之分或氣虛而補血或血虛而補氣誤人多矣故外感之與內傷寒病之與熱病氣虛之與血虛如水炭相反治之若差則輕病必重重病必死可不畏哉

治

一傷寒發熱是寒邪入衛與陽氣交爭而爲外熱陽氣主外爲寒所薄而失其職故爲熱其脉緊而有力是外之寒邪傷衛也治

外主

一傷暑發熱是人邪傷心元氣耗散而熱邪入客於中故發爲熱

汗大泄無氣以動其脉虛遲而無力是外之熱邪傷榮也治主內

一內傷發熱是陽氣自傷不能升達降下陰分而爲內熱乃陽虛

也故其脉大而無力屬肺脾

一陰虛發熱是陰血自傷不能制大陽氣升騰乃陽旺也故其脉

數而無力屬心腎

一大病後血氣兩虛遂成勞怯潮熱往來盜汗自汗或無汗燥熱

世俗便以地骨皮柴胡往往不効其病增劇故男血虛有汗潮

熱者人參養榮湯○氣虛有汗潮熱者補中益氣湯○血虛無汗

潮熱者茯苓補心湯○氣虛無汗潮熱者人參清肌散○女子血

虛有汗潮熱者。茯苓補心湯。○氣血兩虛無汗潮熱者。逍遙散其
咳嗽咯血。以人參五味子散骨蒸湯瀉骨散。已上皆勞熱之聖藥。
方 升陽散火湯 治男婦四肢發熱筋骨間熱如火烙捫之烙手。此
病多因血虛而得之。或胃虛過食冷物鬱遏陽氣於脾胃之中。火
鬱則發之。

生甘草 二錢 防風 二錢半 炙甘草 三錢 升麻 葛根

獨活 羌活 白芍 人參 各五錢 柴胡 八錢

右劉生薑三片。水煎服。忌生冷寒涼之物月餘。

四物二連湯 治血虛虛勞發熱五心煩熱晝則明靜夜則發熱。此
熱在血分也。

當歸 川芎 白芍 生地黄 黃連 胡黃連 照方每服五錢

右劉作劉水煎服。

清心蓮子飲 治發熱口乾小便赤澀夜則安靜晝則發熱。此熱在
氣分也。

加減逍遙散 治子午潮熱

本方加胡黃連麥門冬黃芩地骨皮秦艸木通車前子每以水浸

濕燈心煎

加減小柴胡湯 治虛損手心脚心發熱

本方加香附黃連前胡

小柴胡湯合五苓散

蟹甲飲 治病後食力未復邪熱未除房勞虛損一切骨蒸盜汗。

蟹甲 秦艸 柴胡 枳殼 知母 當歸 烏藥 地骨皮

右劉生薑三片。桃柳頭各七個空心午前臨卧各一服。渣再煎。忌

酒色貪婪酒醋魚腥燒炙煎煉芋頭山藥胡椒濕麪性熱等物。男

女同法。

三卷終

四八

卷三

女同法。

三卷終

大醫院醫官金谿韓信編輯

翰林院 省菴王肯堂較正

金陵書林譽吾周四達梓行

補益

補益

脈氣虛脈細或緩而無力右手弱血虛脈夫或數而無力左手弱陽虛脈遲陰虛脈弦真氣虛脈緊男子久病氣口脈弱則死強則生
女人久病人迎強則生弱則死

病夫虛者虛損也難經所謂五損脈者亦因虛而致損也一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脈血脈虛少不能榮於五臟六腑三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不為肌膚四損損於筋筋緩不能自收持五損損於骨骨痿不能起於牀反此者至脈之病也從上下者骨痿不能起於牀者死從下者皮膚而落毛者死治損之法

補益

卷四

奈何然損其肺者益其氣損其心者益其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精此治損之大法也夫諸虛於勞極未始不用氣體虛弱心腎有虧水火不自升降而致也或為寒暑勞役所傷或因色慾過度俱能成賊真氣以致肌體羸瘦腰膝無力小便頻數大便滑泄目眩耳聾遺精自汗甚則虛火上攻面赤發喘此皆諸虛之症也勞極者七情傷乎五臟也盡力謀慮勞傷乎肝應乎筋極曲運神機勞傷乎心應乎脈極意外過思勞傷乎脾應乎肉極預事而憂勞傷乎肺應乎氣極矜持志節勞傷乎腎應乎骨極此五勞應乎五極者也勞極精氣變生諸症

治治療之法當隨五臟六腑寒熱調之內經曰形不足者溫之以氣

精不足者補之以味然滋補之藥貴乎平和不可驟用峻補丹石燥熱之劑恐腎水枯竭虛火愈熾惟當斟酌輕重而用之斯得之矣

方四君子湯 大補陽氣虛衰

人參

白茯苓

甘草 灸各一錢

白朮 二錢炒

右剉一劑。薑棗煎服。有痰加陳皮。半夏。各六君子湯。○按是方治氣分之聖藥也。用人參補元氣。白朮健脾胃。甘草和中。茯苓滲淡引參下行。補下焦元氣。氣乃無形之氣。屬乎陽。乃君子之象焉。故名四君子湯。

四物湯 大補陰血虛損

生地黃

當歸 各二錢

川芎 一錢

白芍藥 炒一錢半

右剉一劑。水煎服。○按是方治血分之聖藥也。用當歸引血歸肝經。川芎引血歸肺經。芍藥引血歸脾經。地黃引血歸腎經。惟心生血。肝納血。脾統血。肺行血。腎藏血。男子化而為精。女子化而為月。水血乃有形之物。屬乎陰。故名四物湯。

八物湯 大補氣血兩虛

古今醫鑑

卷四

四君子湯合四物湯。薑三片。棗二枚。水煎服。

十全大補湯

治氣血兩虛兼助陽固衛

八物湯加肉桂一錢。黃芪一錢。薑棗水煎服。

人參養榮湯

治積勞虛損四肢倦怠肌肉消瘦面少顏色汲汲短氣飲食無味

人參

當歸

陳皮

黃芪 蜜灸

桂心

白朮

甘草 灸

茯苓 各一錢

白芍藥 二錢

熟地 酒浸 二錢

五味子 七分

遠志 去心炒 五分

右剉一劑。薑三片。棗二枚。水煎服。

固真飲子

治中年已上之人陰陽兩虛元氣不足頭每痛日晡微

熱少食力倦精氣時脫腰痛酸痛服之者每得良効

人參

乾山藥

當歸身 各一錢

熟地黃 二錢

黃蘗 炒一錢

白朮

山茱萸肉

補骨脂

澤瀉 各五分

五味子 十粒

白茯苓

陳皮 各八分

杜仲 炒斷絲

甘草 灸各七分

右劉一劑水煎服

九僊酒 太醫院傳 治諸虛百損

八物湯四兩加甘州枸杞子八兩用生薑二兩棗十枚煮好酒一壺不拘時隨量飲大有補益。

六味地黃丸 治形體瘦弱無力多困腎氣久虛震汗發熱五臟虧損遺精便血消渴淋濁等症此藥不燥不寒專補左尺腎水兼理脾胃少年水虧火旺陰虛之症最宜服之。

澤瀉 二兩

淮熟地黃 八兩薑汁炒

乾山藥 酒蒸四兩

山茱萸 酒蒸去核四兩

白茯苓 三兩

牡丹皮 去骨三兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每七十丸空心白湯下。○婦人血虛無子此方更效須加醋炒香附當歸各二兩。○虛勞加紫河車一具蒸爛搗為丸。○陰虛火動加酒炒黃蘗知母各二兩。○心腎不交消渴引飲加麥門冬三兩五味子二兩。○腰膝痛加酒洗

古今醫鑑

卷四

三

牛膝薑炒杜仲各三兩。○小便夜多去澤瀉加鹽酒炒益智仁三兩。○兼補右尺相火加製附子童便煮官桂各二兩。○遺精加牡

蠣三兩。○嗽加五味子三兩

神僊既濟丹

少保劉公方

專補諸虛百損五勞七傷滋腎水降心火補脾

土添精髓益氣和血壯筋骨潤肌膚聰耳明目開心益智強陰壯陽延年益壽此藥性氣溫而不熱清而不寒久服則坎離相濟陰陽協和火不炎而神自清水不滲而精自固此平補之聖藥也

山藥 酒蒸

牛膝 酒洗各三兩

杜仲 酥炙

巴戟 湯泡

五味子

白茯苓

枸杞 酒洗

小苧 鹽水炒

菴蓉 酒洗

石菖蒲 去毛

山茱萸 酒蒸去核晒乾

遠志 甘草水泡去骨晒乾

熟地 酒蒸

麥門冬 去心

黃蘗 酒炒

人參 去芦

知母 去毛

生地 酒蒸

甘菊 酒洗

山梔子 炒黑

天門冬 湯泡

兔絲子 酒洗

餅焙乾

龍骨 火煨過

廣橘紅 一兩

當歸 酒洗

龍骨 火煨過

廣橘紅 一兩

右爲末煉蜜和棗肉爲丸。如梧桐子大。每服七八十九。空心淡鹽湯送下。

天王補心丹 寧心益智壯力強精安神魂定驚悸怔忡祛煩熱化

痰涎稠濁

熟地 酒洗

白茯苓

丹參

栝子仁

去殼

百部

石菖蒲

牛膝 酒洗

杜仲 酥炙

當歸 酒洗

棗仁 炒

玄參

天門冬 去心

五味子

人參

白茯神 各二兩

遠志 甘草水

桔梗

甘草

麥門冬

各一兩

右爲細末煉蜜爲丸。如彈子大。金箔爲衣。每服一丸。臨臥燈心紅

棗煎湯細嚼送下。

治氣心風加茴香白朮木香硃砂芍藥減當歸栝梗五味百部杜

仲。一方加牛黃琥珀 二錢

接命膏 治氣血虛弱痰火上升及中風不語左癱右瘓腰疼膝痛

古今醫鑑

卷四

四

動履不便一切虛損。

人乳 二盞肥白女人

梨汁 一盞

右二味傾入銀錫罐中。入沸湯內頓滾有黃漆起開清爲度。每五

更後一服。大能消痰補血。

三才大補膏 劉太府傳

生地黃 一斤

熟地黃 一斤

天門冬

麥門冬

人參

甘枸杞

牛膝 各四兩

何首烏 八兩

右咬咀勿犯鐵器。同入大砂鍋內。用水二十碗煎至七碗。取汁別

貯藥查。如前再煮九次。共得汁七十碗。濾查極淨。別用中等砂鍋

入汁七碗。慢火煎熬。耗汁一碗。方添一碗。六十三碗皆添盡。則汁

已濃矣。蓋抵得汁六碗。却用山白蜜去蠟。可一斤半。同前藥入砂

鍋內。重湯煮汁。滴水不散。則成膏矣。磁罐盛之。埋土中七日。取出

如前再煮一晝夜。再埋一宿。乃分貯小罌內。封固以次取用。自思

至者但用桑柴火藥本尋常妙在火候不拘時以醇酒調服味美而功多若懲忿窒慾之人又深居簡出時服此膏亦可以擅其天年矣七年之艾不可不蚤爲之用也。

天真接命丹

方上異人傳

奉勸世人不可用

用無病室女月經首行者爲最次二次者爲中次四五次爲下然亦可用取法以黑鉛打一具形如黃衣冠子樣俟月信動時卽以此具令老媪置陰戶上以絹幅兜住接具取起頓磁器中再用前具再取約二三鍾許澄沉底紅如硃砂此爲母氣真元也其面如黃色浮起此爲發水也卽用綿紙輕輕拖滲去却用極細白淨好茯苓爲末用熟水浮去木屑取沉底者曬乾搗入紅鉛中如和麴然多寡軟硬以意消息打作薄薄餅子陰乾待用不可犯鐵器既乾研成細末以麻黃一大把剉煎成極濃膏子用綿布絞濾去渣入前末中以成丸爲度如棗豆大以老坑辰砂研細末爲衣用銀

古入醫書

卷四

五

藥罐盛之收存以黃蠟封口每服五十丸或七八十丸服後靜坐無風處所略微汗驗藥性流行充盈四肢經絡皮毛之間如服後發熱作渴此元氣虛藥性到也須服乳汁數盞以止之服藥後三日內蔬食不可喫油膩之物此藥進二三次或越三五年又進三二次立見氣力煥發精神異常草木之藥千百服不如此藥一二服蓋人自十六歲已往精氣漸減不但男女之慾足以損敗一與事應則視聽言動皆耗散精氣之原故禪氏面壁僊家坐關此藥採自人身產從元始非若金石草木之有偏勝實可全挽回造化之功養生君子珍之重之幸甚。

陽煉秋石法

京師傳

童便一缸牙皂煎水二三碗入缸內用柳條亂攪起白泡用杓撇去隨攪隨撇令泡盡澄清許久上去其泡下去其垢膩惟取中間清水入鍋內煎熬用木柴火先文後武熬二三碗又加童便半鍋

此等方藥
大損陰陽
九精以氣
去功亦多也
醫書卷三
每九年此症
銘天宮蓋
皆以車草
醫者用過
望不爲損
人利己也

又熬至乾又加又熬至缸中童便盡乃止熬至焦乾入香油一罐從鍋週圍傾入鍋底用極猛火燒過透紅無油氣連鍋撥起放地上待冷一時自然成塊而起研羅細末用淨水二碗入內攪勻如米湯樣澄一二日再攪起傾入好雪白連四紙十數層盛藥下用竹篾爲梢箕水浸一宿去竹內黃水令淨將紙放竹箕內下用磁器盛之濾下極清水於磁器內濾令乾收入鍋內將紙查再入水攪如上法濾之將先濾清水用廣鍋一口以缸瓦打磨令光如銀白入內用炭火熬令乾爲度掀起放紙上再將鍋打磨淨又熬第二次清水如上法只要潔淨得如雪之白

陰煉秋石法 京師傳

用童男童女便各二桶入半舊瓦缸內入淨水一桶柳棍攪千餘下澄半日待清括去清者半桶又入水一桶如前攪澄却括一桶如此七日一日兩次共十四次將清水盡傾去止雷秋石傾放皮

古今醫鑑

卷四

六

紙上下用杉木板或栢木板盛貯晒乾或日晒夜露取其日精月華或以人乳拌晒入丸藥內或單用棗肉爲丸如梧桐子大每服五七十九空心好酒送下大有補益善降虛火其功不可盡述

取紅鉛法

可要已極可格伊流流并異方

用室女經血或首經最佳以布帛用燒酒洗過晒乾用之以烏梅水澄之取出人乳香末少許乳汁爲丸如櫻桃大每隣一九取女人氣一口乳汁送下治諸虛百損五勞七傷神效

神僊伏氣秘法

劉雲箋傳

治諸虛百損五勞七傷延年益壽

靈籙

此以索索爲九
好術德生壽
此探斡之也亦
此或
此真身忠義
神仙對石方

係神師外道傳門
其期頭安忍作



即使修到神仙原仁人好
不為之也

津門海韻著 鈍翁誌 此書上有

先於辰戌時行安命之功於右鼻進藥吹氣

十六 十四 十二 一 八 六 四止
次日寅時行進陽火之功於左鼻進藥吹氣

三五 五 七 九 十一 十二 十五 十七止
於戌時退陰符仍照行十六至四止

每行之時先令病人仰面平枕口噙熱水或乳香酒一口然後令
童女照前數吹之吹法先取紅鉛用未破身童女所行經脉以夏

布揉洗令淨或淨花亦可搵下晒乾如用時將熟童便洗下晒乾
收起臨用時以童便化開滴於橐籥小頭口邊入鼻內將大頭令

童女口噙使力吹之如上法病人候吹氣即吸入童女忌葱蒜酸
辣之物久久行之能接補天年行後如覺內熱可服人乳即能解

三元丹 補虛損接天年

紅鉛 人乳各一兩 乳香 辰砂各一錢

百今醫鑑 卷四 秋石一錢用童便入瓦器內用搗碎新磚數塊入內浸七日取出

右共為末即以人乳調和將雞蛋一枚磕一孔傾出青黃不用紙
撮乾淨將藥末入內封固緊密放羣蛋內抱三七日取出在如梧

桐子大金箔為衣如乾再添入乳汁為丸每服三九人乳送下五
更空心服汗出至足為度不可見風

癩冷

癩冷者謂癩久而冷也癩者固也冷者寒之甚也人之臟腑稟受
不同亦或將理失宜遂致偏廢故方中有癩冷積熱之說癩冷中

寒也其病多由真陽虛弱胃氣不寬復啖生冷冰雪水酪諸寒之
物或坐臥陰寒久濕之地以致臟腑久癩而冷其為病也或手足

厥冷或腹中久痛滯泄無度或腰腿重痛如坐水中或陰痿不舉
寒精自出或久嘔逆飲食不進或自汗戰慄或大腑洞泄或小便

頻數此皆癩冷之為病也

治治之之法宜溫補下元健脾養胃祛寒邪固真氣使陽氣得復陰陽平和則無偏勝之患而病愈矣

凡脫陽症或因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣不接人事不省或傷寒新瘥誤與女人交接其症小腹緊痛外腎拳縮面黑氣喘冷汗

自由是名脫陽症須臾不救急用葱熨法更灸氣海在臍下一開元在臍下各五十壯內服薑附湯五積散之類然後可服黑錫丹

或灸男左女右手中指一壯再灸關元穴七壯凡陰症身靜而重語言無聲氣少難以喘息目睛不了了口鼻氣冷水漿不入大小便不禁面上惡寒有如刀刮先用葱熨法次服四

逆湯

方回陽返本湯雲林製治急陰症手足冷指甲青小腹疼痛外腎拳縮

人參 白朮 甘草 乾薑炒 半夏製 大附子製

陳皮各一錢 丁香 茯苓各八分 神麩炒六分 沉香五分 白豆蔻八分

右剉一劑生薑三片棗二枚鹽少許水煎服外於臍上用熟葱貼

冷則復易外腎并陰囊以絹帛紮任用炒鹽欵欵烙之再用炒鹽熨胸膈脇肋上下小腹如急陰不省人事用鹽填滿臍中艾火灸之以醒為度或大便閉結以利氣九通之

欽陽丹 治陰寒痼冷

丁香 砂仁 白豆蔻 乾薑炒 厚桂各一兩

紅豆 大附子 良薑炒 均薑炒各二兩 人參五錢

右為末好酒煮米糊為丸如梧桐子大每服五七十丸空心溫酒送下

黑豆酒 治症同前

黑豆不拘多少鍋內炒熟以好酒淬之就以碗蓋勿令泄氣候溫飲酒大効

回春散楊小川傳 治陰冷如神歌曰

痼冷

一錢白礬八分丹。二分胡椒細細研煇硝一分共四味醃醋調和
手內攤男左女右合陰處渾身是汗濕衣衫。此方用者如神効不
義之人不可傳。

助陽散 秘方 治極冷急症

芥菜子 七錢

乾薑 三錢

右為細末。水調作一餅。貼臍上。以絹帛縛住。上置鹽以熨斗熨之
數次。汗出為度。又將病人小便。奉陰莖。往上盡頭處。用艾炷灸七

壯神効。

回陽丹 秘方

乾薑 一兩

牡蠣 一兩

右為細末。以火酒調稠。搽手上。男子用雙手揉外腎。即愈。女子以
男子手搽藥。急按兩乳。仍揉擦熱汗出則愈。

固陽膏 秘方

治因女色致成陰症。

白公醫書蓋

卷四

生白礬 三錢

黃丹 二錢

乾薑 五錢

母丁香 十箇

胡椒 十五粒

右為末。用醋和得。所以男左女右手。握藥搶臍上。被蓋少頃。汗出
即愈。

○按右方治陰症外治之劑。

〇〇 虛勞

脉虛勞之脉。或浮大。或弦數。大者勞也。弦者亦勞。大弦易治。血氣未
衰。可斂而正也。弦者難治。血氣已耗。而難補。雙弦則賊邪侵脾。加
數則殆矣。又曰。骨蒸勞熱。脉數而虛熱。而滿少。必殞其軀。加汗加
嗽。非藥可除。

症天勞之為言。言劇也。故以勞瘵為難治之疾。古方雖分六極。六損

五勞七傷。五尺九蟲。十疰。二十四蒸之症。種種不同。大抵皆由年
少之時。嗜慾無節。起居不時。或七情六淫之所傷。或飲食勞倦之
有過。漸至真陰衰虛。相火熾熾。火旺則銷燬真陰。而發為蒸。芝燥

虛勞

婦人

傳屍

熱也蓋火衝於上焦者發熱之中則兼咳嗽喘急吐痰吐血肺癆肺癰等症其火結於下焦者發熱之中則兼淋濁結毒遺精盜汗驚悸腹痛等症也婦人則兼月水不通之類及其火熾既久氣必傷矣傷則不能運化水穀水穀停置而濕熱生蟲生積之由也蟲積日深變異莫測醫人心肺蝕入臟腑精華殆莫能救矣况其親炙之人薰陶日久受其惡氣多遭傳染是曰傳屍即前所謂九蟲十疰二十四蒸之類是也得病日淺猶當施治姑息日久或至發熱不休形體尪羸直氣將脫事不及矣

治治之之法惟滋陰降火是澄其源也消痰和血取積追蟲是潔其流也及灸膏肓催氏四花穴無有不效近世以來多以紫河車加補腎清心退熱之藥治之獲效者亦多矣醫者可不以補虛為王而兼去邪矣乎

凡虛陰症每日午後惡寒發熱至晚亦得微汗而解脉必虛濡而數

古今醫鑑

卷四

絕類瘧疾但瘧脉弦而虛脉大為辨耳若誤作瘧疾治之多致不

方滋陰降火湯

王節齋曰男子色慾過度損傷精血必致陰虛火

動之病腫中盜汗午後發熱哈哈咳嗽怠倦無力飲食少思甚則痰涎帶血咯血唾血或咳吐血身熱脉沉數肌肉消瘦此為勞瘵最重難治輕則用藥數十劑重者期以歲年然必須病人愛命堅心定志絕房室息妄想戒惱怒節飲食以自培其根不則雖服良藥亦無用也此病治之於蚤猶為不易若到肌肉消盡沉困着床六脉躁疾則更難為矣此方治色慾症先見潮熱盜汗咳嗽倦怠稱蚤服之愈可必也

當歸身酒洗一分 白芍藥酒炒 川芎各一錢 生地黃酒洗五分

熟地黃酒洗一分 天門冬湯泡去心一錢 黃蘗蜜炙七分 知母蜜炙一錢

陳皮七分 白木一錢三分 乾薑炒黑三分 甘草炙五分

主方

虛勞

一方去乾薑加玄參貝母麥門冬五味子甚效

右剉一劑生薑煎加竹瀝童便薑汁同服○若咳嗽甚加紫菀款冬花五味子杏仁○喘加桑白皮○若痰多加製半夏貝母瓜萸仁白茯苓○若潮熱甚加柴胡知母地骨皮○若盜汗多加酸棗仁牡蠣浮小麥○若遺精夢滑加龍骨牡蠣山茱萸肉○若赤白濁加白茯苓黃連○若兼衄血咳血出於肺也加桑白皮黃芩山梔子○若兼嘔血痰血出於脾也加桑白皮貝母黃連瓜萸仁○若兼咯唾血出於胃也加桔梗玄參側柏葉

此症屬火大便多燥然當愈加樽節愛養勿令泄瀉若脾胃一壞則前項寒涼之藥難用矣倘遇如斯急服理脾固本健胃之劑

理脾固本湯

白朮 炒一錢

白茯苓 一錢

半夏 製

陳皮 各八分

百金醫壁

卷四

十一

神麴 炒一錢

麥芽 炒一錢

甘草 炙七分

右剉一劑薑棗煎服候脾胃氣固然後用前本病藥

清離滋坎湯

雲林製

治陰血虛相火盛盜汗潮熱咳嗽吐痰一切虛

勞等症並加治之

生地黃

熟地黃 各二錢

天門冬

麥門冬

當歸 酒洗

芍藥 酒炒各一錢

山茱萸 酒蒸去核一錢五分

乾山藥 一錢

白茯苓 八分

白朮 土炒一錢

牡丹皮 一錢二分

黃蘗 蜜炙

知母 蜜炙

澤瀉 各八分

甘草 炙七分

右剉一劑水煎空心服○嗽盛加紫菀款冬花○痰盛加貝母瓜

萸仁○熱盛加地骨皮○心下怔忡加遠志酸棗仁○吐血加山

梔子芽花○鼻衄加桑白皮葎汁

○按右方治勞瘵陰虛火動者

東實西虛瀉南補北湯 治酒色過度妄泄真陰陰虛火動火旺痰

多發熱咳嗽咯血唾血等症

黃連心下痰滿止嘔吐之要藥也 黃蘗鹽水炒六兩補北方水陰

枯芩生用二兩清肺滋源 知母去毛三兩降北方火

貝母一宿清西方金消痰解煩 桔梗之地助子扶母之虛也

杏仁去皮及二兩半收斂藥散 五味子鹽水炒三兩滋少陰不足

紫苑去土二兩半用沉香煎水 當歸童便浸二兩補

赤芍藥生用二兩半平東方有餘 生地黃血酒洗三兩涼血生

天門冬湯泡去心四兩潤肺清痰中 天花粉一兩止渴生津

白朮健脾以生肺金 白茯苓二兩瀉諸經火

右剉每服八錢烏梅一箇燈心三分水煎溫服吐衄盛加茜根

大小薊藕節白茅根側柏葉京墨痰盛加半夏前胡竹瀝荆瀝

喘急加瓜蒌仁石膏葶藶桑白皮紫蘇子沉香枇杷葉執盤

加柴胡地骨皮連翹銀柴胡風盛加防風荆芥穗酸棗仁薄荷

甘菊花旋覆花寒盛加人參黃芪桂枝心下怔忡驚悸加茯

神遠志栝子仁酸棗仁脇下氣膨加枳殼青皮白芥子淋瀝

加猪苓澤瀉木通車前子小便澀加木通石韋滑石海金沙

遺精加牡蠣蓮子肉盜汗加黃芪牡蠣麻黃根浮小麥執燥

加滑石石膏火麻仁山梔子

二和湯雲林製 治咳嗽痰盛潮熱陰虛 熱地黃二錢 白芍藥 黃連薑汁 茯苓各一錢

當歸二錢 川芎五分 製半夏 枯芩 黃蘗炒 山梔剉 枳殼名八分

陳皮 杏仁去皮 桑白皮 五味子去毛 貝母去心

桔梗 白朮土炒 阿膠蛤粉炒成珠 馬兜鈴 甘草各等分

玄參 右剉一劑生薑三片水二碗煎八分空心服

清肺滋陰散杜次泉傳 治治色太過斷喪真陰陰火上升肺金受侮

以致唾痰稠濁咳嗽咽瘡

川芎酒洗 白木少 陳皮 黃蘗蜜炙 麥門冬 地骨皮

貝母去心 知母各一錢 白芍錢半 生地黃二錢 白茯苓 款冬花

遠志甘草炮 紫苑各八分 五味子六分 黃連五分 甘草四分 酸棗仁炒六分

右剉一劑加生薑一片竹瀝三匙煎服○心下怔忡夜臥不寐加

人參八分○心煩躁亂加枳實六分竹茹六分○如痰涎壅盛加

瓜蒌仁六分天花粉一錢○如咽喉有瘡用通隘散吹之

通隘散方見咽喉門

○按右方治勞瘵陰虛與有實熱者

坎離膏黃貫江傳 治勞瘵陰虛發熱咳吐咯血等症

川黃蘗 知母去毛 胡桃肉去皮 白蜜各四兩 生地黄

熟地黄 天門冬去心 麥冬去心 杏仁七錢

右先將黃蘗知母用童便三碗水三碗共六碗側栢葉一把煎至

三碗去渣入天麥冬生熟地於汁內再添木二碗煎數百沸濾汁

古今醫鑑 卷四 置一邊將天麥冬生熟地查搗爛如泥再用水二碗另煎約耗其

半和入前汁再將杏仁胡桃仁用水搗爛濾過汁再搗再濾勿潤

入查同蜜入前汁內慢火熬成膏子入水內去火毒每服三五匙

側栢葉煎湯空心調服忌犯銅鐵器

寧嗽膏京師傳 治陰虛咳嗽火動咯血服之飲肺

天門冬去心 杏仁去皮 貝母去心 百部

百合 白朮各四兩 款冬花五兩 紫苑三兩

右剉用長流水二十碗煎五碗濾查再煎如是者三次共得藥汁

十五碗入飴糖半斤蜜一斤再熬又入阿膠四兩白茯苓細末四

兩和勻如膏每服三五匙

玄霜雪梨膏秘方 生津止渴除咯血吐血及治勞心動火勞嗽久不

愈消痰止咳清血歸經

雪梨六十箇 去心皮取汁 藕汁十鍾 茅根汁十鍾

新鮮生地黃搗取汁十鍾 麥門冬搗爛前 薤蔔汁五鍾

右六汁再重濾去渣將清汁再入火煎煉入蜜一斤飴糖半斤 柿

霜半斤薑汁一盞入火再熬如稀糊則成膏矣。知血不止咳嗽

加側柏葉搗汁一鍾謹白汁半鍾 茜根汁半鍾俱去渣入前汁內

煎成膏服之

清火永真膏京師傳

生地黃四兩 天門冬六兩 款冬花茸六兩 下二味共一處

右以天門冬款冬花水熬取查搗爛再熬然後入地黃汁煎煉成

稠入白蜜一斤再煎再用五味子二兩另熬汁半鍾入膏內再煎

至稠粘為度每日用一二次

噙化丹秘方 治陰虛勞嗽

天門冬酒蒸 麥門冬酒蒸 知母酒炒 貝母炒 杏仁炒

紫苑炒 當歸酒洗 枳實炒 桔梗炒 半夏製

黃連炒 黃芩炒 花粉炒各一兩 生地各一兩 熟地各一兩

款冬花酒洗 薄荷水浸 阿膠蛤粉炒 青礞石煨各一兩 米仁炒七錢

右為末蜜一斤煉過為丸如彈子大每一丸噙化薄荷湯下一日

服四九午前午後各一丸晚下二丸

○按右方理勞嗽標本兼治之劑

六味地黃丸 治腎虛損久新憔悴盜汗發熱五臟齊損瘦弱虛煩

骨蒸痿弱咯血下血等症加五味子麥門冬各三兩

一方加紫河車一具治虛勞如神○按右方補虛勞治本之劑

抑心清肺丸秘方 治肺熱咯血咳嗽兼治血痢

黃連三兩 赤茯苓三兩 阿膠二兩

右以上二味為極細末水熬阿膠和丸如梧桐子大每服五六十

丸食後米飲送下蓋連苓有降心火之功阿膠具保肺金之力則

嗽除血止而病自愈矣

瑞連丸 方見泄瀉 治虛勞心火肺得其清其嗽自止矣。

理氣健脾丸 治虛勞發熱痰嗽泄瀉神效。

小金丹 方外異人傳 治勞瘵吐痰吐血發熱咳嗽。

啞芙蓉 一錢 硃砂 三分 麝香 三分

右為細末外用高良薑四兩切碎燒酒泡三日去酒入水十碗煎

至二三碗濾去渣慢火熬成膏再入乳汁半盞再熬入前藥為丸

如黃豆大金箔為衣每服一九先喫梨一片然後以藥丸嚙下再

喫梨一片痰嗽頓止發熱即退

治虛勞痰嗽四肢困倦氣血兩虛以人物湯加黃楸靈妙 知母貝

母麥門冬天門冬五味子瓜蒌仁陳皮等分

神灸法 治傳屍勞蟲

於癸亥日灸兩腰眼底陷中是穴每穴灸艾七炷若灸九炷十炷

尤妙先隔一日前點穴方睡至半夜子時一交癸亥日期便灸其

戶公醫鑑 卷四 一五

蟲從大便中出即用火焚之棄於江河中如蟲有黑嘴者則其在

肉已傷入腎臟矣此不可治蟲宜謹避瘵有數蟲如蜈蚣如小蛇

如蝦蟆如馬尾如爛麵如亂絲如蒼蠅如壁油蟲上紫下白形銹

足細而有口或如白蟻孔竅中皆出此勞瘵根毒若傳至三人則

如人形如鬼狀

子觀近世陰虛火動之疾十無一活何也蓋由色慾勞役之過七

情五味之偏遂致真元漸耗虛火上炎勞瘵之疾作矣方履霜之

始飲食如舊起居如常惟咳嗽一二聲自謂無恙且諱疾忌醫滅

身無悟及蔓延日久倒臥於床而堅冰已至矣良可哀哉若遇明

醫必用滋陰降火健脾之藥以培其本緩緩投以數十劑庶可少

濟如求治心亟切期旦夕服藥未幾數劑遂謂無功躁急心熱而

陰火愈動有等醫者見其無回生之理遽用峻藥劫之以紓目前

之急則將不俟終日而死期將至矣以余意揆之方疾之始作必

有處 勞瘵

失血

致謹於三事而後可。三者維何。一要遇明醫。二要肯服藥。三要能禁戒。三者缺一不治也。余敬書於方末。以為遺是疾者警云。

失血

脈諸症失血皆見其脈隨其上下以驗所出。大凡失血脈宜沉細。設見浮大後必難治。

症 夫失血之症非止一端。有吐血。有咳血。有唾血。有咯血。有衄血。有瀉血。雖有各色之異。大槩俱是熱症。但有新舊虛實之不同耳。或

妄言寒者。誤也。丹溪曰。血從上竅出。皆是陽盛陰虛。有升無降。血隨氣上。越出上竅。法當補陰抑陽。氣降則血歸經。

吐血者。吐出全血是也。因血溢妄行。流入胃脘。令人吐血。有因飲食過飽。負重傷胃。而吐血者。有因思慮傷心。及積熱而吐血者。有傷心肺。而吐血者。有因思傷脾。而吐血者。有因肺生癰疽。而吐血者。有從高墜下。傷損內臟。而吐血者。有傷寒不解。邪熱在經。隨氣上湧而吐血者。

古今醫鑑

卷四

上湧而吐血者。

吐血者。或因四氣傷於外。七情動於內。或飲食房勞。墜閃損傷。致榮血流聚。膈間滿則吐溢。世謂妄行。或吐瘀血。此名內傷。

治 有先吐血後見痰嗽者。是陰虛火動。痰不下降。四物湯為王。加清

痰降火藥。有先見痰嗽後吐血者。是積熱降痰。火為急。有暴

吐紫血成塊者。是熱傷血結于中。吐出為好用。四物湯加清熱藥

調之。吐血亦有因怒而得者。經曰。怒則氣逆。甚則嘔血。怒則暴

甚故也。吐血不止。用乾薑炮為末。童便調服。此從治之法也。

一咳血者。嗽出痰內有血者是也。因熱壅於肺。而成久嗽。損肺亦

能嗽血。壅於肺者。易治。不過涼之而已。損於肺者。難治。以其不足

也。熱嗽有血者。宜金沸草。加阿膠。勞嗽有血者。補肺湯。加阿膠。白

芩。嗽血損肺。宜薏苡仁。炒為末。煎熟。豬肺食之。如熱嗽咽痛。痰帶

血絲。或痰中多血。而色鮮者。並宜服金沸草散。如服涼劑不愈。此

非熱症宜杏子湯主之

一唾血者鮮血隨唾而出者是也此出於腎亦有瘀血內損肺氣
壅遏不得下降用天門冬知貝母桔梗黃蘗熟地黃遠志或加薑
一咯血者不嗽而咯出血疙瘡者是也用薑汁童便青黛入血藥
中用之或加入四物湯地黃膏牛膝膏之類

一衄血者鼻中出血也此出於肺以犀角升麻梔子黃芩芍藥生
地黃紫參丹參之類治之

一溺血者小便中出血也乃膀胱所致用炒黑山梔水煎服之或
用小蘗琥珀小蘗治下焦結熱血淋○溺血因血虛者四物加牛

膝膏

一下血者大便出血也乃臟腑蘊積濕熱之毒而成或因氣鬱酒
色過度及多食炙煖熱毒之物或風邪所冒或七情六淫所傷使
氣血逆亂榮衛失度皆能令人下血

古人醫鑑

卷四

十七

子嘗治諸虛吐衄咯血藥中每入童便一合其效甚速凡單用重
湯頓服無不効應蓋洩瀉降火滋陰又能消瘀血止吐衄諸血先
賢有言凡諸失血服寒涼十無一生服洩瀉百無一死斯言信矣
每用童便一鍾少入薑汁二三點攪勻徐徐服之日進二三次如
天寒却以重湯頓溫服服此但以進飲食相遠為佳

方

全生飲雲林製

止吐血衄血嗽血咯血唾血

藕汁磨薑

梨汁

茅根汁

生地黃汁

薑汁各一兩

刺刺菜汁

蘿蔔汁

白蜜

竹瀝

生薑汁

童便各半盞

共合一處頻頻冷服○按右方治諸失血之總司也

犀角地黃湯

治上焦有熱口舌生瘡發熱或血熱妄行或下血及

不嗽血自來者並皆服之

烏犀角鎊一錢半

生地黃二錢

赤芍藥一錢

牡丹皮一錢

加黃芩

黃連各一錢

訂飯

右到一劑水二鍾煎一鍾溫服

肝經血加條芩○心經血加黃連麥門冬○脾經腫血加白芍藥
百合○肺經衄血加天門冬山梔百部○腎經血加玄參黃蘗知
母○三焦湧血加連翹地骨皮○膽經血加柴胡淡竹葉○胃經
吐血加大黃乾葛○心胞血倍牡丹皮加茅根○大腸便血加炒
山梔炒槐花○小腸溺血加炒梔子木通牛膝茅根○積熱加大
黃芒硝○吐血不止加大黃桃仁
止血立應散 王雙湖方 治吐衄不止如神

大黃 酒浸

血餘 燒存性 各五錢 青黛

槐花 炒各一錢

右為末每服三錢用梔子牡丹皮各二錢煎湯食後調服○有熱
湯內加地骨皮三錢

清熱解毒湯 治吐血衄血

升麻 二兩 乾葛

赤芍藥

牡丹皮

黃連

黃芩

古今醫鑑

卷四

一人

桔梗

梔子

甘草

連翹 各五錢

黃蘗 八錢

生地黃 一兩

右到每劑一兩生薑一片水二鍾煎一鍾食後溫服
如發熱加前胡地骨皮○咳嗽金沸草桑白皮烏梅

○按右方涼血止血之劑

清熱滋陰湯

治吐血衄血使血瀉血

當歸 酒洗

川芎 酒洗

赤芍藥 各五錢

生地 酒洗 二錢

黃蘗 酒洗

陳皮 酒洗 各三分

知母 酒炒

白朮 炒

甘草 各五分

麥門冬

山梔 炒黑 各一錢 半 牡丹皮

玄參 各一錢

右到一劑水煎溫服○身熱加地骨皮一錢柴胡五分子芩一錢

○吐衄血加炒乾薑七分栝葉茜根大小薊各一錢○大便秘血加

炒槐花地榆百草霜各一錢○溺血加炒黑山梔子車前子小薊

黃連各八分○四病血俱用阿膠珠五分薑汁葑汁童便同服

○按右方止瘀血上新血之劑

止鼻衄方 劉尚書傳

百草霜 髮灰二物等分 清煙墨錢 童便一錢 韭汁一錢 無灰老酒一錢

右下三味合一處用墨濃磨調上二物冷服

陳槐湯 劉尚書傳 治吐血衄血不止

當歸頭尾 川芎 赤芍藥 黃芩 槐花 側柏葉備

烏藥 陳皮各二錢 山梔子七箇 藕節三分 細茶三錢

右用水二鍾煎一鍾不拘時執服

通閉止血丸 秘方 治鼻衄

枯白礬一錢 沉香三分 半夏四箇 糯米十四粒 麝香一分

右為末麵糊為丸如豌豆大每用二丸塞左右兩耳即服陳槐湯

治鼻衄良方

用大蚯蚓十數條搗爛并花水和稀患輕澄清飲重則并查汁調

服立愈

古今醫寶

卷四

一九

紫指法 治鼻衄不止

用線緊紫中指中節如左鼻孔出血紫右手指右鼻孔出血紫左

手指兩孔俱出左右俱紫之

鼻衄不止用水紙塔在鼻衝上隨用秘方

梔子炒黑 百草霜 龍骨火燬 牡蠣火燬 京墨 血餘煨存性

右為末用茅花水蘸濕蘸藥入鼻孔如無茅花將紙撚水濕煎藥

入鼻中真良法也

〇〇 自汗 盜汗

脉汗脉浮虛或澀或濡軟大洪散渴飲無餘〇脉大而虛浮而軟者

汗在寸為自汗在尺為盜汗傷寒脉陰陽俱緊當無汗若自汗者

曰亡陽不治

症夫汗者心之液也心動則惕然而汗出也有自汗者有盜汗者自

汗者不因發散而自然出也盜汗者睡而汗出及覺則不出矣自

自汗 盜汗

盜汗

古今醫鑑

卷四

二

汗之症未有不由心腎俱虛而得者故陰虛陽必奏發熱而盜汗陽虛陰必乘發厥而自汗此陰陽偏勝之所致也丹溪曰自汗屬氣虛屬痰與濕盜汗屬陰虛相火熾盛其傷寒傷暑傷風傷濕痰嗽等自汗各載本門其無病而汗常自出與病後多汗皆屬表虛衛氣不固榮血泄漏宜黃芪建中湯加浮麥煎黃芪六一湯或玉屏風散或身溫而常出冷汗或身冷而汗亦冷別無他病并屬本症凡汗出髮潤一不治也汗出如油二不治也汗凝如珠三不治也

治

治內傷及一切虛損之症自汗不休總用補中益氣湯少加附子麻黃根小麥其効捷如影嚮但升麻柴胡俱用蜜水拌炒以殺其升發湧汗之性又欲其引參芪等藥至肌表故不可缺也如左寸脈浮洪而自汗者心火炎也本方倍參芪加麥門冬五味子黃連各五分如左關脈浮弦而自汗者挾風邪也本方加桂枝芍藥若無陰虛只用桂枝湯可也如左尺脈浮洪無力而自汗者水

虧火盛也本方加黃蘗知母各五分熟地黃一錢壯水之劑以制陽光如右寸脈浮洪或伏而滑此挾痰也依本方加知母貝母天花粉各八分如右關脈浮洪無力而自汗者此脾元怯弱也只依本方倍參芪如右尺脈洪數無力而自汗者或盜汗相火挾心火之勢而凌伐肺金也宜當歸六黃湯

方

玉屏風散 治自汗痿理不密易感風寒

防風 一兩

黃芪 一兩

白朮 二兩

右劉生薑煎溫服○一方加浮小麥茯苓牡蠣麻黃根甘草

黃芪湯

治元氣虛弱自汗

黃芪 二錢 當歸 一錢 生地

天門冬

白茯苓 各一錢 麥門冬 一錢

五味子 七分

防風 五分

麻黃根 一錢 甘草 八分

浮小麥 一撮炒

右剉一劑水煎溫服

黃芪建中湯 治內虛挾外感自汗又補諸虛不足羸之少力大益

榮衛

黃芪

肉桂 各二錢

白芍藥

甘草 炙各三錢

右剉一劑薑一片棗二枚水煎服。

一方用煎浮小麥去渣入錫少許再煎令滾稍熱服○虛甚加熟

附子

鎮液丹 思邈見傳

防風

炒

白木 略炒

芍藥 酒炒

中桂 各二兩

黃芪

蜜炙二兩

大附子

二兩 麩裏煨去皮尖童便浸炒

右為末酒糊丸每服五十丸空心溫酒下加酸棗仁炒尤妙

○按右方治自汗之劑

當歸六黃湯 治盜汗之聖藥也

當歸

黃芪

生地黄

熟地黄 名一錢

黃蘗 炒

古人醫鑑

黃連

炒

黃芩 炒各七分

右剉一劑水煎臨臥服

黃芪六一湯

治虛人盜汗

黃芪

六兩

甘草

二兩各用蜜炙十數次出火毒

右剉每劑一兩小煎空心服○按右方治盜汗之劑

獨聖散 治自汗盜汗

用五倍子為末津唾調填滿臍中以絹帛縛定一宿即止或加枯

礬末尤妙

龍湯

治六脉乳動微駭男子失精女子夢交及自汗盜汗等症

桂枝

白芍藥

甘草

龍骨

牡蠣 各三錢

右剉一劑水煎溫服加棗子一箇同煎尤妙

○按右方治自汗盜汗兼治之劑

人血氣大虛形體羸瘦大汗如雨不止命在須臾諸

十全大補湯倍用參芪以童便製附子一劑即効服不

全安

暑濕氣鬱生涎上實下虛皆重而眩風浮寒緊濕細暑虛涎
弦而滑虛脈則無治眩暈法尤當審識先理痰氣次隨症治又曰
左手脈數熱多脈澀有死血右手脈實有痰積脈大是久病

大眩者言其黑暈者言其轉其狀目閉眼瞤身轉耳聾如立舟車
之上起則欲倒皆屬于肝風邪上攻所致然體虛之人外感六淫

內傷七情皆能眩暈當以脈症別之風則脈浮有汗項強不仁寒
則脈緊無汗筋

掣痛暑則脈虛煩悶濕則脈沉細重吐逆及其
七情所感遂使

臟氣不和鬱而生涎結而為飲隨氣上逆令人眩
暈肩稜骨痛眼不可開寸脈多沉此為異耳若疲勞過度下虛
實金鎗吐衄及

因而治之
眩暈之症人皆稱為上盛下虛所致而不明言其所以然之故
今皆虛

所謂虛者血與氣也所謂實者痰涎風火也原病之由有氣虛
乃清氣不能上升或汗多亡陽而致當升陽補氣有血虛者乃因

亡血過多陽無所附而然當益陰補血此皆不足之症也有因痰
涎鬱遏者宜開痰導鬱重則吐下有因風火所動者宜清上降火

若因外感而得者前論須分四氣之異皆當散邪為主此皆有餘
之症也世有所謂氣不歸元而為丹藥鎮墜沉香降氣之法蓋香

竄之氣丹藥助火其不歸元之氣豈能因此而復即內經所謂治
病必求其本氣之不歸求其本用藥則善矣

治丹溪曰痰在上火在下火炎上而動其痰也此症屬痰者多蓋無
痰不能作眩也雖有因風者亦必有痰又曰火動其痰二陳湯加

黃芩蒼朮羌活挾氣虛者亦以治痰為主兼補氣降火藥
一人因憂思勞苦發作眩暈眼暗耳鳴面赤口乾發熱氣喘有汗

不食六脈洪數用十全大補湯去桂加生地黃薑炒黃連麥門冬

五味子。陳皮。酒炒。黃柏。知母。
方清暈化痰湯 雲林製

橘紅 半斤 各一 白茯苓 一錢 黃芩 酒炒 八分 甘草 三分
川芎 八分 白芷 七分 羌活 七分 枳實 一錢 南星 製

防風 細辛 各六分 氣虛加人參 七分 白朮 一錢
有熱加黃連 六分 血虛倍川芎加當歸 一錢五分

右剉一劑。生薑三片。水煎。以此作丸亦可。
黑將軍散 秘方 治因痰火太盛。眩暈難當。

用大黃酒炒為末。清茶調下。○或用大黃酒浸九蒸。尤晒為末。成丸。如菉豆大。每服百丸。食後。臨臥。清茶送下。神效。

○按右方。治痰火眩暈之劑。
僊木通聖散 治風熱上壅。頭旋目眩。起則欲倒。即防風通聖散去

麻黃。芒硝。加霍香。砂仁。甘菊花。蒼木。○如風熱上攻。頭目昏眩。痛痰喘咳。嗽依本方去麻黃。芒硝。加甘菊花。人參。砂仁。寒水石。

○按右方。治風熱眩暈之劑。

半夏。白朮。天麻湯 治頭旋眼黑。惡心煩悶。氣促上喘。心神顛倒。目不敢開。頭痛如裂。身重如山。四肢厥冷。不能安睡。此乃胃氣虛損。

停痰所致也。
半夏 製一錢半 白朮 炒二錢 天麻 一錢半

右剉一劑。生薑三片。水二鍾。煎八分。食後溫服。

○按右方。治氣虛痰厥。眩暈之劑。
芎歸湯 治血虛眩暈。或去血過多之後。眩暈。

川芎 一錢五分 當歸 二錢五分
右剉一劑。水二鍾。煎八分。空心溫服。○按右方。治血虛眩暈之劑。

麻木。

麻木。

脈浮而濡。屬氣虛。閉前得之。麻在上。閉後得之。麻在下也。○脈浮。

而緩屬濕為麻痺脈緊而浮屬寒為痛痺脈澀而甚屬死血為木
不知痛痺

症丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血

治十指麻是胃中有濕痰死血宜二陳湯加蒼朮白朮陳皮茯苓桃
仁紅花少加附子行經又宜四物湯加上藥及羌活蘇木○如手
足麻痺因濕所致者香蘇散蒼朮麻黃桂枝白芷羌活木瓜水煎
脈體虛者用五積散亦好

一 如感風濕手脚或痛或木或遍身麻木用五積散主之

一 凡人手足麻木并指尖麻者皆痰滯經絡也宜二陳湯加竹瀝
薑汁白芥子以祛痰火散風氣更宜灸百會肩髃曲池風市足三
里絕骨此六處共十一穴以防中風癱瘓但年少者不可多灸

一 麻用補中益氣湯加當歸木香香附青皮川芎少加桂枝引經
○木用四物湯并二陳湯加桃仁紅花二方俱用竹瀝薑汁白芥

子凡人醫鑑

卷四

二四

子以行經至脇肋達痰之所在也竹瀝枳朮丸搜風順氣丸皆可
選用

一 麻木者因風溼熱不陷入血分陰中陽道不行亦有痰在血分
者其症合眼則渾身麻木痒者血不榮於肌腠治以參芪能助陽
道以當歸能行陰道二木苓甘藥以除濕熱柴升芍藥以升提之
痰加二陳治當活法

方加減補中益氣湯 治十指盡麻面目皆麻此氣虛也

依本方加木香大附子麥門冬防風羌活烏藥

人參益氣湯 治手指麻木四肢困倦忌情嗜臥

黃芪二錢

人參

甘草各二分

白芍藥七分

柴胡

甘草灸

升麻各六分

五味子三十粒

右剉一劑水煎稍熱服

○按右方治氣虛麻木之劑

麻木

開結舒經湯 治七情六鬱氣滯經絡手足麻痺

紫蘇 陳皮 香附醋炒 烏梅 川芎 蒼朮米泔浸二羌活

南星製半夏製 當歸各八分 桂枝 甘草各四分

右剉生薑三片入薑汁竹瀝服○按右方治氣鬱麻木之劑

清風散 治身體麻木遍身結核北人謂之生飯南人謂之鼓槌俗謂風疔瘡俱屬熱氣滯

防風 羌活 獨活 連翹 當歸

生地黃 檳榔 黃連 鼠粘子炒 防己各五分

荆芥 木香各三分 赤芍藥 蒼朮 陳皮

半夏製 白茯苓 升麻各一錢 烏藥 牛膝

玄參各七分 金銀花 木瓜各六分 草薺二錢 白蒺藜炒八分

右剉一劑生薑三片葱白五寸水二鍾煎八分熱服

○按右方治風氣麻木之劑

百八醫鑑

卷四

三五

癲狂

○癲脈搏大滑者生沉小緊急則不治○執狂脈實大生沉小死癲

脈虛可治實則死

症 天癲者喜笑不常而顛倒錯亂之謂也狂者狂亂而無正定也故

心執盛則多喜而為癲也肝熱盛則多怒而為狂也甚則棄衣而

走登高而歌踰垣上屋罵詈不避親疎是蓋得之陽氣太盛胃與

大腸實熱燥火鬱結於中而為之耳此則癲狂之候也大抵狂為

痰火實盛也治當大吐大下癲為心血不足多為求望高遠不遂

其志者有之

治以安神養血兼降痰火

心風者何蓋君火者心因怒發之相火助盛痰動於中挾氣上攻

迷其心竅則為癲為狂所怒之事膠固於心輒自言譎失其條序

謂之心風與風何相干若痰不盛者則有感亦輕

癲狂

狂言譫語鄭聲辨

狂者大開目與人語所未嘗見之事為狂也。譫語者合目自言日用常行之事為譫語也。

鄭聲者聲顛無力不相接續造字出於喉中為鄭聲也。

陽附陰則狂陰附陽則癲脫陽者見鬼脫陰者目盲又畜血症則重復語之。

方防風通聖散 方見中風 治一切癲狂風疾暴發之症。

○按右方治癲在初起多有實熱風邪宜之。

寧志化痰湯 陳白芷方 治癲狂心虛痰盛之症。

牛膽南星 半夏 製 陳皮 茯苓 天麻

人參 黃連 薑汁炒 酸棗仁 石菖蒲 各一錢

右剉一劑生薑五片水煎服再服清心養血湯。

清心養血湯

古今醫鑑

卷四

二六

人參 白朮 茯神 遠志 水泡去骨 棗仁 炒

川芎 生地黃 各一錢 甘草 五分 當歸 一錢五分

右剉一劑加圓眼五箇水二盞煎八分空心服。

○按右方補虛化痰清火寧心之劑。

黃白丹 妙方 治五癲五癩。

黃丹 一兩 白礬 一兩

右用磚一塊鑿一窩可容二兩許置丹在下礬在上用木炭五斤

煨令炭盡取為末以不經水猪心血為丸如菉豆大每服三十九

陳皮湯下。

獨參丸 治狂邪發作無時披頭大叫不避水火

苦參 不拘多少

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十五丸薄荷湯下。

河車丸 治久患心風癲氣血兩虛之症。

川芎

人參

遠志

甘草

白朮

白朮

白朮

右剉一劑生薑煎服

育魂丹

杜御史方 治一切驚癇癩邪等症

膽星

半夏

扶神

黃連

遠志

白朮

白朮

栝子仁

棗仁

乾山藥

白附

天麻

竹茹

竹茹

竹茹

白礬

陳皮

全蝎

川芎

羚羊角

犀角

犀角

犀角

枳實

辰砂

牛黃

麝香

飛金

飛金

飛金

飛金

右為細末竹瀝打甘草膏為丸如芡實大每服空心淡薑湯送下

小兒諸疾薄倚湯調下

加減壽星湯

吳郡堂傳 治癩症

南星

防風

防風

防風

皂角

皂角

皂角

皂角

香附

青皮

猪苓

澤瀉

赤茯苓

赤茯苓

赤茯苓

赤茯苓

白茯苓

麥門冬

白朮

荆芥

細辛

細辛

細辛

細辛

古今醫鑑

卷四

卷四

卷四

卷四

卷四

卷四

卷四

右剉生薑煎服先二貼用麻黃三錢續以防風通聖散去白朮

清神丹

秘方 治同前

石菖蒲

辰砂

辰砂

辰砂

辰砂

辰砂

辰砂

辰砂

右為末猪心血打麪糊為丸如梧桐子大每服七八十九空心白湯送下服前育魂丹除根

壯膽星

珠砂

珠砂

珠砂

珠砂

珠砂

珠砂

珠砂

右為末竹瀝猪心血和丸如梧桐子大每服七八十九空心白湯送下

丑寶丹

大醫院傳

祛風清火

順氣豁痰

益志除驚

安魂定魄

一切怔

一切怔

仲癩瘡難狀之疾並皆調治

牛黃

琥珀

琥珀

琥珀

琥珀

琥珀

琥珀

琥珀

礞石

沉香

沉香

沉香

沉香

沉香

沉香

沉香

犀角

雄黃

雄黃

雄黃

雄黃

雄黃

雄黃

雄黃

大黃

大黃

大黃

大黃

大黃

大黃

大黃

大黃

大黃

大黃

大黃

大黃

大黃

大黃

大黃

大黃

五癩

天麻膏炒 蝉蛻去足各五錢 石菖蒲一兩 狸蠶七錢 猪心二具用血
 右為末竹瀝猪心血和丸如菉豆大每六七十丸臨臥薄荷湯下
 ○按右方治癩專攻之劑

健忘

症天健忘者陡然而忘其事也盡心力思量不來為事有始無終言譚不知首尾皆主於心脾二經蓋心之官則思脾之官亦主思此由思慮過多傷於心則血耗散神不守舍傷於脾則胃氣衰憊而慮愈深二者皆令人事卒然而忘也蓋心生血因血少不能養其真臟或停飲而氣鬱以生痰氣既鬱脾不得舒是病皆由此作治然治之法必先養其心血理其脾土凝神定智之劑以調理亦當以幽閑之處安樂之中使其絕於憂慮遠其六淫七情如此日漸安矣

方歸脾散

治憂思過度勞傷心脾令人轉盼遺忘心下怔忡

古今醫鑑

卷四

二十九

黃芪炙

人參

白朮

茯神去木

當歸

酸棗仁

龍眼肉

遠志各二錢

木香一錢

甘草炙五分

右剉一劑薑棗煎服

加減補心湯 治諸虛健忘等症

人參

白朮

石菖蒲

甘草各三錢 陳皮

白茯苓

當歸身

白芍炒

生地黃 遠志泡去心

麥門冬去心 酸棗仁炒

黃柏酒炒

知母酒炒各五錢

右剉一劑水煎服

加味定志丸 陳白堊方 治健忘

當歸身

酒浸

白芍藥

生地黃

酒洗切

石菖蒲

川芎各二兩

人參六錢

遠志

甘草水炮去骨

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二錢臨臥白湯送下

紫河車 治癩狂健忘怔忡失志及恍惚驚怖人心神不守舍多言

不定此藥大能安心養血定神

聰明湯 治不善記而多忘者

白茯苓

遠志肉 甘草水泡 石菖蒲去毛一寸九節者佳

右各三兩製後共為極細末每日用三五錢煎湯空心食後服一日不拘數次久久服之能日誦千言

狀元丸 治健忘開心通竅定智寧神多記

石菖蒲

去毛一寸九節者佳

地骨皮 去木

白茯苓 去皮木

遠志肉

甘草水泡去心名一兩人參 去声三錢

巴戟天 去骨五錢

右為末用白茯苓去皮二兩粘米二兩共打粉外用石菖蒲三錢打碎煎濃湯去渣煮糊為丸每日食後午時臨臥服三十五丸

怔忡驚悸

脈心中驚悸脉必大結飲食之悸沉伏動滑

病夫怔忡者心中躁動不安惕惕然如人將捕是也多因富貴戚戚

口今醫鑑

卷四

三十

貧賤不遂所願而成屬血虛有慮便動屬虛時作時止者痰因火動瘦人多是血少肥人屬痰

夫驚悸者驀然而跳躍驚動如有欲厥之狀有時而作者是也屬

血虛或時覺心跳亦是血虛蓋人之所主者心心之所養者心血

一虛神氣不守此驚悸之肇端也又曰驚怖之謂怔忡健忘驚

悸三症名異而病同

方 硃砂安神丸 治血虛心煩懊懣驚悸怔忡胸中氣亂

硃砂

五錢水飛

黃連

酒洗六錢

甘草炙二錢半

生地黃

一錢半

當歸 二錢半

右為細末蒸餅為丸如黍米大每服三五十丸食後臨臥津嚥下

安神補心湯

當歸 一錢

川芎 七分

白芍 炒一錢

生地黃 二錢

白朮 一錢

酸棗仁 炒八分

麥門冬 去心

茯苓 二分

黃芩 一錢

玄參 五分

甘草三分 遠志 甘草水泡去心八分

一方去遠志麥門冬黃芩玄參加陳皮栝子仁酒炒黃連剉一劑

水煎服

養心湯 治憂愁思慮傷心驚悸不寧及勤政勞心痰多少睡心神

不足

遠志去心薑炒 黃耆蜜炙各八分 白茯苓

茯神

當歸

生地黃各一分 半夏麩六分 栝子仁

酸棗仁炒

川芎各七分

甘草炙三分 辣桂少許 五味子十四箇 人參五分

右剉薑棗煎食前服

○治停水怔忡加檳榔赤茯苓

參歸腰子 治心氣怔忡而自汗者不過一二服即愈

人參

當歸各五錢

猪腰子一箇

右先將以腰子用水二碗煎至一碗半將腰子細切入二味藥同煎至八分吃腰子以藥汁送下有吃不盡腰子同上二味藥渣焙

古今醫鑑

卷四

三一

乾為細末山藥糊為丸如梧桐子大每服三五十丸米湯下

琥珀定智丸 劉尚書方 專補心生血定魄安魂扶肝壯膽管轄神魂

驚戰虛弱氣乏之病並皆治之

南星半斤先將地作坑用炭十斤在坑內燒紅去灰淨用好酒十日取出 真琥珀一兩半角 乾人乳用薑汁製

大珠砂二兩公猪心割開入內用 好揀參去芦

白茯苓去芦 白茯神去皮本 石菖蒲二兩猪膽汁炒

遠志水泡過去心二兩猪膽

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每夜臥時鹽湯送下五七十丸

曬乾人乳法用人乳數碗入瓦盤內莫攪動四圍曬乾刮一處乾則再刮乳乾以薑汁拌晒用

鎮心湯 雲林驗方 治心荒立應

當歸一錢 山梔子炒 川芎各七分 生地黃 片苓

白芍各八分黃連六分

酸棗仁炒

麥門冬

去心遠志製各一錢

虛煩

右剗一劑生薑煎服

病天虛煩者心胸煩擾而不寧也。多是體虛之人。揖養有乖。榮衛不調。使陰陽二氣有所偏勝也。又或陰虛而陽盛。或陰盛而陽虛。內經曰。陽虛則外寒。陰虛則內熱。陽盛則外熱。陰盛則內寒。令人虛煩。多是陰虛生內熱所致。虛勞之人。腎水有虧。心內火蒸。其煩必踴。吐瀉之後。津液枯竭。煩而有渴。惟傷寒大病之後。虛煩之症。却無霍亂。臨病宜審之。

方溫膽湯 治病後虛煩不得臥。及心膽虛怯。觸事易驚。短氣悸乏。或復自汗並治。
巢氏病原曰。心煩不得眠。心熱也。但虛煩不得眠者。膽冷也。

半夏七錢 竹茹 枳實各三錢 陳皮四錢 白茯苓去皮 甘草多二錢二分半

右剗作一劑薑棗煎服

方加酸棗仁炒 遠志肉 五味子 熟地黃 人參。

竹茹石膏湯方見傷寒 治大病後表裏俱虛。內無津液。煩渴心燥。熱與傷寒相似。但不惡寒。身不疼痛。不可汗下。宜服之。

病不寐有二種。有病後虛弱。及高年人陽衰不寐者。有痰在膽經。神不歸舍。亦令不寐。

治虛者。用六君子湯。加炒酸棗仁。黃芪。痰者。用溫膽湯。減竹茹一半。

加南星炒酸棗仁。傷寒不寐者。當求之本門。酸棗仁炒熟。便補膽虛寒。不眠。生用。便瀉膽實熱。而多睡。

驚悸健忘怔忡。失志不寐。心風皆是。膽涎沃心。以致心氣不足。若用涼劑。太過則心火愈微。痰涎愈盛。而病益深。宜理痰氣。

方高枕無憂散雲林製 治心膽虛怯。晝夜不睡。百方無効。服此一劑。如

不寐

虛煩

不寐

古今醫鑑

卷四

積實各三錢

陳皮四錢

白茯苓去皮甘草多二錢二分半

不寐

人參五錢 軟石膏三錢 陳皮 半夏薑汁炒 白茯苓 枳實

竹茹 麥門冬 龍眼肉 甘草各一錢 酸棗仁炒一錢

右剉水煎服

溫膽湯方見虛煩 治大病虛煩不得眠此膽寒也依本方加入參茯苓

神遠志尤良

酸棗仁丸 治膽氣實熱痰迷不睡

酸棗仁炒二兩 栝子仁炒另研 遠志去心 防風去芦各二兩

生地黃酒洗 枳實各五錢 青竹茹二錢半

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸不拘時熱水下

酸棗仁湯 治多睡及不睡

酸棗仁和及微炒 入參去芦 茯苓去皮各等分

右為末每一錢水一盞煎七分如不要睡即熱服如要睡即冷服

治勞心膽冷夜臥不睡

古今醫鑑

卷四

三十三

定志丸加酸棗仁去殼炒 栝子仁去殼炒

右為末煉蜜丸如梧子大硃砂乳香為衣每服五十九聚湯下

便濁

脉兩尺脉洪數必便濁遺精心脉短小因心虛所致必遺精便濁一

病夫赤白濁者由腎水虛少膀胱火盛小便去澀所以成濁也蓋因

思慮過度嗜慾無節俾心腎不交精元失守為赤白二濁之患焉

赤者心虛有熱由思慮而得之白者腎虛有寒因嗜慾而致也河

間謂白濁亦屬乎熱丹溪謂胃中濁氣下流滲入膀胱赤者溼熱

傷血分白者濕熱傷氣分

治天率皆是濕痰流注宜燥中宮之濕用二陳湯以治痰加蒼朮白

朮以燥濕加柴胡升麻以提胃中之氣全在活法以治之也

如醉飽後色慾不節傷脾損腎脾來乘腎土尅水也至小便黃濁

其脉脚部洪數腎脉微澇其症尿下桶如山梔子汁澄下桶底如

便濁

方清心連子飲 治心中發熱煩燥思慮憂愁抑鬱小便赤濁或有

沙漠夜夢走泄遺瀝瀝痛便赤如或酒色過度上盛下虛心火炎

上肺金受尅故口苦咽乾漸成消渴四肢倦怠男子五淋婦人帶

下赤白五心煩熱此藥温平清心養神秘精大有奇功

石蓮肉 人參各二錢 赤茯苓 黃芪各二錢 麥門冬

地骨皮 車前子 黃苓各一錢 甘草一錢 一方有木通

右到一劑水煎温服○熱加柴胡薄荷各一錢○上盛下虛加酒炒

滋腎飲 治白濁初起半月者極効

川草薺 去麥門冬法遠志 黃栢酒浸 兔絲子酒炒 五味子酒炒

右各等分剉作劑竹葉三箇燈草七根大黃少許水煎空心服

草薺飲 治真元不足下焦虛寒小便白濁頻數無度漩白如油光

彩不定漩脚登下凝而膏糊

益智仁 川草薺 石苴蒲 烏藥

一方加茯苓甘草○右剉作劑水煎入鹽一捻空心温服腎虛加

山藥牛膝 杜仲便赤加澤瀉麥門冬

三神湯 東泉叔方 治遺精白濁

蒼朮 七錢 川草薺 七錢 小茴香 一兩

右到生薑三片煎入鹽一捻同服

水火分清飲 治赤白濁

益智仁 草薺 石苴蒲 猪苓 車前子 澤瀉

白朮 陳皮 枳殼 麻黃各一錢 甘草五分 赤茯苓一錢

遺精

○按右方赤白濁兼治之劑

古今醫鑑

卷四

三四

脈遺精便濁當驗於尺結乳動緊二症之的

病天精者五臟六腑皆有而腎為都會關司之所又聽命於心焉蓋遺精之症有四一曰夢中交而遺者乃心虛神交也二曰下元虛敗精不禁而遺者乃腎虛精滑故也三曰壯年氣盛久節勞慾經絡壅滯而遺精乃曠夫滿而溢也四曰情縱於中所願不得而遺者乃情不遂欲而泄也若夫壯年氣盛及情動於中者但舒其情自愈至若夢中交泄則當治其心腎虛精滑則當固其真斯治之要也

夫夢遺精滑者世人多作腎虛治而用補腎溫精之藥不効殊不知此症多屬脾胃飲食厚味痰火溼熱之人多有之蓋腎藏精精之所生由脾胃飲食化生而輸歸於腎今脾胃傷於濃厚溼熱內鬱中氣濁而不清則其所化生之精亦得濁氣腎王秘藏陰靜則寧今所輸之精既有濁氣則邪火動於腎中而火不得寧靜故遺而滑也此症與白濁同丹溪論白濁為胃中濁氣下流滲入膀胱而云無人知此其色心太重妄想過度而致遺滑者自從心腎治之但兼脾胃者多又當審察治之

古今醫鑑

卷四

三五

治凡二八童男陽氣暴盛故情動於中志有所慕而不得遂成夜夢而遺精也其心脉數腎脉澹慎不可補清心乃安惟清心蓮子飲臨臥服及定心丸王之

夜夢鬼交而遺宜溫膽湯去竹茹加人參遠志石蓮肉酸棗仁炒白茯苓

方養心湯 治用心過度心熱遺精恍惚多夢或驚而不寐者

人參 山藥 茯苓 麥門冬 當歸身 白芍

石蓮肉 遠志 酸棗仁 雞頭實 蓮花鬚 子芩 酒洗

右剉一劑加生薑三片棗一枚水煎服○氣虛加黃芪白木血虛

加熟地黃遺久氣阻加川芎升麻去子芩

定心丸 治妄想太過遺精

人參

白木

茯苓

枳實 麩炒

石蓮肉 去心 陳皮

萆子

炒各一兩 遠志 去骨

酸棗仁

半夏 各五錢

牡蠣 煨三錢

甘草 炙一錢半

右為末神麩糊為丸如梧桐子大每服五十九空心鹽湯下久則加

乾薑炒黑三錢檮根白皮五錢○按右方治妄想太過遺精之劑

加味二陳湯 治遺精

陳皮 一錢

半夏 一錢半 薑炮

茯苓 一錢半

白木

桔梗 各一錢

石菖蒲 七分

黃栢 二分

知母 三分

梔子 炒黑一錢半

升麻 酒炒

柴胡 酒炒

甘草 各一錢

○右剉一劑生薑煎服

檮根白皮丸

白木

枳實 麩炒

茯苓

柴胡

升麻 各二錢

黃栢 薑水炒

知母 薑水炒

牡蠣 煨各三錢

萆子 炒一兩

芍藥 炒五錢

右為末神麩糊為丸每服五十九空心鹽湯下久不止加檮根白皮七錢

○按右方治溼熱傷脾遺精之劑

黃連清心湯

在心

治心有所慕而作夢遺此君火既動而相火隨之治

黃連

生地黃

當歸

人參

遠志

茯神

酸棗仁 炒

石蓮肉

甘草○右剉作劑水煎服

三黃丸

治遺精有熱者

黃芩 降陰火

黃栢 日胃火

黃連 瀉陽明之溼熱

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九白湯下

西園曰遺精是用心過度積熱所致當用黃連今用黃芩未知孰

是○按右方治實熱遺精之劑

保精湯

雲林製

治陰虛火動夜夢遺精或發熱

當歸

川芎

白芍

沙參

麥門冬

去心 生地黃 薑汁

黃栢 酒炒

知母 蜜炒

黃連 薑汁

梔子 薑便

乾薑 炒黑

牡蠣 火炙

山茱萸 去核取肉 ○右剉水煎空心服

固精丸 治心神不安腎虛精自泄

黃栢

酒炒

知母 酒炒各

牡蠣 煨

芡實

蓮菴

遠志 去心

山茱萸肉

茯苓 各三錢

右為末煮山藥糊為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十九空心

鹽湯送下

百粉丸 西園公製

治腎虛火動遺精

黃栢

童便炒

知母 童便炒

蛤粉 略炒

牡蠣 火煨

山藥 酒炒

右為末搗爛飯為丸如梧子大每服五七十九空心鹽湯溫酒任

下○按右方治腎虛火動遺精之劑

固本鎖精丹 秘方

治元陽虛憊精氣不固夢寐遺精夜多盜汗遺泄

不禁並治此藥大補元氣澀精固陽神效

黃芪

人參 各二兩半

枸杞子

鎖陽

山藥 各二兩

古今醫鑑

卷四

三十七

石蓮肉

海蛤粉 各二兩

五味子 二兩

黃栢 二兩酒拌晒

乾炒黑色

右為末用白木六兩水五碗煎二碗倒過水汁另放再用水四碗

煎至二碗去滓與前二碗同煎熬至一碗如膏搜和前藥末為丸

如梧子大每服五十九加至六七十丸空心溫酒或淡鹽湯下

○按右方治精氣兩虛遺精之劑

白龍丸 賈閣老傳

治虛勞腎損夢中遺精白淫滑泄盜汗等症

鹿角霜 二兩

龍骨 生用一兩

牡蠣 火煨二兩

右為細末酒打麵糊為丸如梧子大每三五十丸空心或鹽湯或

酒下不惟治遺之疾且能固精壯陽神效

○按右方治精滑止澀之劑

縮陽秘方 張嶺南傳

此藥二劑

其法難曉能延年入神法也

水蛭尋起九條入水碗養任至七月七日取出陰乾秤有多少入

射香合香三味一般多研細末蜜少許為餅遇陽暈時即將少許

擦左腳心，卽時痿縮過日復興再擦。

淋閉

少陰脉細而數爲氣淋，婦人則陰中生瘡。○盛大而堅者，生虛紐而澇者死。鼻頭色黃，小便必難。脉浮弦澇爲不小便。○關格頭汗者死。

病

夫淋者，小便淋瀝澀痛，欲去不去，不去又來，曰淋。蓋因恣食膏粱之味，濕熱之物，或燒酒炙燂之類，鬱遏成疾，以致脾土受害，乏力不能運化，精微清濁相混，故使肺金無助而水道不清，漸成淋閉之候。或謂酒後房勞，或七情鬱結，以致心腎不交，水火無制，清陽不升，濁陰不降，而成天地不交之否。古方有五淋之別：氣、砂、血、膏、勞也。氣淋則小便澀滯，常有餘瀝不盡；砂淋則莖中痛溺不得，卒出乃精氣結成砂石與溺俱出，出則痛止；血淋則遇熱卽發，小便澀痛，有血不痛者，名溺血膏淋。則尿管如膏浮凝如脂，勞淋則遇房勞卽發，痛引氣冲也。又云：小腸有氣則小便脹，小腸有血則小便澀。小腸有熱則小便痛，治之但當行滯清熱，疎利小便，不可用補氣藥。蓋氣得補則愈脹，血得補則愈澀，熱得補則愈盛。又有挾冷而淋者，其狀先寒戰而後小便，謂冷氣與正氣交爭，冷氣勝則寒戰而淋，正氣勝則寒戰解而得便溺也。治當逐散寒邪，扶正氣則自平矣。

治

閉者，小便急滿不通也。有氣虛有血虛有痰有熱，有風閉皆宜吐之以提其氣，氣升則水自降。蓋氣承載其水也。譬如滴水之器，上竅閉則下竅不出，使吐之是開上竅之法也。氣虛以參朮升麻等先服後吐，或就參芪藥中調理探吐之。血虛四物湯先服後吐，或芎歸湯探吐痰多二陳湯先服後吐，痰氣閉塞二陳加木通香附探吐實熱者當利之，或八正散大便動而小便自通。

遺尿失禁，靈曰：膀胱不利爲癆，不約爲遺。大抵熱則燥澀爲癆，寒

淋閉

古今醫鑑

卷四

三十一

則不禁為遺亦有虛熱而滑者法當溫補其溺自禁或久關元五壯亦効東垣曰小便遺失者肺氣虛也以參芪補之

小便不禁或頻數古方多以為為寒而用溫澁之藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火邪妄動水不得寧故不能禁而頻數來也故年老人多頻數者是膀胱血少少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以收澀之藥如牡蠣山茱萸五味子之類不可用溫藥也病本屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致小便多水益虛矣故宜補血補血瀉火治其本也澀之收之治其標也

治五淋用補中益氣湯有殊効○按此方治淋多謂膀胱之氣虛損不能運用水道故滯而不通而成諸淋也用此養元氣故有効焉

方五淋散 治肺氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋尿血

赤茯苓二錢 赤芍藥二錢 山梔子二錢 當歸一錢

甘草五分 芩黃芩六分

一方加生地黃澤瀉木通滑石車前子各等分 右剉散水煎空心服

八正散 治心經蘊熱臟腑閉結小便赤澀痛閉不通及熱淋血淋如酒後縱慾而得者則小便將出而痛既出而痒以此藥王之

車前子 瞿麥 滑石

山梔子 大黃 木通 甘草各等分

右剉作劑燈心前空心服○小便淋漓頻數無度加牛膝

琥珀散太醫院傳 治血淋神方

琥珀 蒲黃各二兩 生地黃 大小蘗 當歸各一兩半 瞿麥

梔子各一兩 血餘四兩 甘草三錢 酸漿草自然汁五碗

右共研為末將酸漿草汁和諸藥曬乾為末每服三錢空心米飲調下

阿膠散秘方 治血淋

阿膠二兩 猪苓 澤瀉 赤茯苓 滑石各一兩 車前子五錢

右剉水煎空心服。

治血淋用乾柿餅燒存性為末每服二錢空心米飲調下

高尚書方 治小便下血多是濕熱

五苓散加蒼朮三分一劑而愈。

散滯茴香湯見御堂傳 治諸淋并婦人赤白帶下

小茴香 當歸 烏藥 荊芥穗 黃連

木通 扁竹各一錢 砂仁 薄荷各人分 香附子五分

右剉一剉淡竹葉十片水煎空心溫服。

琥珀鬱金丸 治水火不既濟膀胱受心火所熾而浮囊中積熱或

癰閉不通或遺泄不禁或白濁如泔水或膏淋如膿或如梔子汁

或如砂石米粒或如粉糊相似疼痛不已俱熱症也此藥治之

黑牽牛頭末炒 大黃酒浸 真琥珀研 黃芩各二兩

古今醫鑑 卷四 黃連 鬱金各一兩 滑石 茯苓各四兩

右共為末水丸如梧子大每服五十九丸空心熟水下

六味地黃丸 治老人虛寒者患死血作淋痛不可忍倍茯苓澤瀉

又治小便頻數不禁去澤瀉用益智仁

治冷淋諸藥不効用四君子湯加猪苓澤瀉木通連進二服又以

兔絲子研極細用雞翎管吹入小便孔內極効

○按右方治諸淋之劑

通關丸 治小便不通熟在下焦血分兼治諸淋

黃柏酒洗 知母酒炒 滑石各二兩 肉桂三錢 木通一兩

右為末水丸如梧子大每服百丸白水下

一方治小便不通腹脹疼痛欲死野地蕪藜子不拘多少焙黃色

為末溫黃酒調服

一方用蚯蚓五七條研爛投涼水一碗攪勻澄清去泥渣飲水即

時通大解熱疾不知人事欲死者服之立効。
一方用頃麻燒灰存性爲末黃酒調服登時就通。

一方用皮硝煎化青布蘸水搭臍上并小便上熱則易之即通。

若小便不通兩尺脈俱沉微乃陰虛也會服通滑之藥不効者用大附子一箇重一兩者炮去皮臍鹽水浸遼澤瀉切作四劑每劑

燈草七根煎服。

治小便不通諸藥無効或轉胞至死此法用之小便自出用猪尿胞一箇傾出水用鵝毛去頭尾插入竊孔內綿縛定以口吹氣令滿胞內線管下再繫住將管口放在小便頭上向孔竅解後下線手搓其氣透裏小便自然出神効。

一陰陽關格前後不通尋常通利大腑小水自行中有轉胞一症諸藥不効失救則脹滿悶亂而死于嘗以甘遂末水調敷臍下內以甘草節煎湯飲之及藥汁至臍一藥相反胞自轉矣小水來如

古今醫鑑

卷四

四十一

泉湧此急救之良訣也。

○按右方治小水不通之劑

縮泉丸

治脬氣不足小便頻數一日夜百餘次。

益智仁

天台烏藥

大如臂者

右各等分爲末酒煮山藥打糊爲丸如梧子大每服五七十九臥

時鹽湯送下
既濟丸 治小便不禁

兔絲子

酒洗益智仁

炒茯苓

韭子

炒肉蓯蓉

當歸

各五錢

知母

各五錢

石棗

酒洗

牡蠣

右爲末麪糊爲丸每服百丸空心鹽水下。

一方小便不禁有熱者用去桂五苓散加黃連黃柏梔子石棗五

味子水煎服。

一方治虛弱不禁用五苓散合四物湯加石棗五味子水煎空服。

救之極效

一方治遺尿失禁破故紙炒爲末每服二三錢空心熱水調下
宜氣海穴灸之

一方治夜多小便益智仁二十箇和皮剉赤茯苓二錢水煎臨睡
熱服虛老人宜八味地黃丸加益智仁去澤瀉

○按右方治小便不禁之劑

關格

脉兩寸俱盛四倍以上經曰人迎大四倍於氣口大四倍於人迎名
曰關此謂俱盛四倍蓋以其病甚而至於上則遏絕下則閉塞關
格俱病者言也

病天關格者謂膈中覺有所碍欲升不升欲降不降欲食不食此爲
氣之橫格也必用吐以提其氣之橫格不必在出痰也有痰以二
陳湯探吐之吐中便有降有氣虛不運者補氣藥中升降

丹溪曰此症多死寒在上熱在下也寒在胸中遏絕不入無人之
理故曰格熱在下焦填塞不通無出入之由故曰關格則吐逆關

則不得小便
內經曰人迎與氣口俱盛四倍以上爲關格關格之脉羸不能極

於天地之精氣則死矣

方兩枳三陳湯 治關格上焦痰壅兩手脉盛是也

陳皮 半夏 各二錢 白茯苓 一錢半 南星

枳殼 枳實 甘草 各一錢

右剉一劑水煎服用鵝毛於病人咽喉中探吐之如病虛弱不可
用也

一方 治關格吐逆小便不通藿香平胃散合五苓散加薑棗煎服

○閉結 大小便不通

脉多伏沉而結脾脉沉數下連於尺爲陽結二尺脉虛或沉細而遲
爲陰結右尺脉浮爲風結老人虛人脉結脉雀啄者不治○多面

黃可候

閉結

口人醫鑑

卷四

四十三

病天閉結者大便不通內經云北方黑色入通於腎開敷於二陰藏精於腎又云腎王大便秘難者取足少陰天腎主五液津液潤則大便如常若饑飽失節勞役過度損傷胃氣反食辛熱厚味之物而助火_三伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥然結燥之疾不一有熱燥有風燥有陽結有陰結文有年老氣虛津液不足而結燥者法云腎惡燥急食辛以潤之結者散之如少陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以苦瀉之陽結者散之陰結者溫之仲景云小便利而大便硬不可攻下以脾約丸潤之食傷太陰腹滿而食不化腹響而不能大便者以苦泄之如血燥而不能大便者以桃仁酒製大黃通之風結燥者以麻仁大黃利之如風滯而不通者以郁李仁枳實皂角仁潤之犬抵治病必究其原不可一槩用巴豆牽牛之類下之損其津液結燥愈甚復下復結極則以至導引於下而不通遂成不救噫可不慎哉

浴凡臟腑之閉不可一例治療有虛實之分胃實而閉者能飲食小便赤當以利氣丸三黃丸脾約丸之類下之胃虛而閉者不能飲

食小便利厚朴湯王之蓋實閉物也虛閉氣也若胃中停滯寒令之物大便不通心腹作痛者備急丹主之若食

傷太陰氣滯不通者利氣丸主之大便閉服承氣湯之類不通者以四物湯加檳榔枳殼桃仁紅花

方潤腸湯秘方治虛老人大便閉結

蜂蜜一兩 香油五錢 朴硝一撮

右合一處水一鍾煎數沸溫服

東流飲 卷同知傳治大便秘結閉塞良方

細茶一撮 生芝蔴一撮 生桃仁七枚 大黃二錢或甘草五分

右用長流水生搗碎服立效○按右方治實熱閉結之劑

厚朴湯

治胃虛而閉不能飲食小便清利

厚朴

薑汁炒二錢四分

白木 四錢

枳實 炮炒一錢半

陳皮 一錢

半夏

一錢八分 甘草 炙二錢

三和湯

右剉作二劑每薑三片煎食遠溫服○按右方治胃虛閉結之劑

三和湯

治七情之氣結於五臟不能流通以致脾胃不和心腹痞

悶大便閉結

羌活

紫蘇 去梗木瓜

沉香 各一錢

木香

白木

檳榔

川芎

甘草 炙

陳皮 各七分

大腹皮 一錢

六磨湯

治氣滯腹急大便閉結

沉香

木香

檳榔

烏藥

枳殼

大黃

右各磨濃汁

合一處重湯煮溫服之即通

○按右方

治氣滯閉結之劑

古今醫鑑

卷四

四十四

通幽湯

治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥閉氣不

得下治在幽門以辛潤之

當歸 一錢

生地黃

熟地黃

甘草 各五分

升麻

桃仁 各一錢

紅花 三分

大黃 煨

火麻仁 各三錢

右作一劑

水煎去渣調檳榔末五分食前稍熱服

潤腸丸

治老人血少腸胃乾燥大便閉結幾日不行甚至七八日

難下色如猪糞小如羊糞者

當歸

生地黃

枳殼

桃仁

火麻仁 各等

右為末煉蜜為丸如梧子大每服四五十丸清米飲下

活血潤燥丸

治久病腹中有實熱者脾胃中伏火大便閉澀不思

飲食及風門血閉時常結燥

當歸 稍一錢

防風 三錢

羌活 一兩

大黃 一兩 濕紙裏煨

皂角仁 燒存性

桃仁 一兩

火麻仁 二兩半 研

右爲末煉蜜爲丸。如梧子大每五十九白湯下。二三服後須以蘇子麻仁粥。每日早晚服之。二味不拘多少研爛水濾取汁煮粥食之。能順氣滑大便。○按右方治血虛閉結之劑。

治大便不通神方 方外異人傳

皮硝水化 香油一盞 皂角末少許

用竹管一頭套入谷道中。一頭以猪尿胞將三味入內。放竹管裏用手着力一捻樂入即通。○按右方治閉結下取之劑。

顛倒散 周芭崖方 治臟腑實熱或小便不通或大便不通或大小便俱不通

大黃三錢 滑石三錢 皂角三錢

如大便不通加大黃三錢 如小便不通加滑石三錢 如大小便俱不通。大黃滑石各加三錢。○右爲末空心溫酒調下。

倒換散 治大小便不通

古今醫鑑 卷四 四十五

大便不通大黃二兩杏仁三錢。○如小便不通大黃三錢杏仁一兩水煎服。

治大小便不通

六七月間尋牛糞中有大蜣螂不拘多少用線穿起陰乾收貯。用時取一箇要全者放淨磚上四面以炭火烘乾以刀從腰切斷。如大便閉用上半截小便閉用下半截各爲末新汲水調服。二便俱閉則全用之。○按右方治大小便不通之劑。

○痔漏

痔漏

因沉小實者易治浮洪而軟弱者難治。

病天痔漏者肛門邊內外有瘡也。若成癰不破者曰痔。破潰而出膿血黃水浸淫淋漓久不止者曰漏也。由于風熱濕燥合而致之。其

狀有五曰牡曰牝曰脉曰血曰腸痔是也。又有酒痔氣痔蟲痔翻花痔。螻蛄痔古方分爲二十四種各狀不同究其所因亦不過久

痔漏

嗜辛熱炙燔新酒及房慾憂思蘊積熱毒憤鬱之氣所成也或藏於肛門之內或突出肛門之外蘊積深者其狀大蘊毒淺者其狀小大如雞冠蓮花核桃之狀小如牛奶雞心櫻桃之形或流膿水或出鮮血有妨行坐痛苦無任久而不愈則成漏矣

治宜祛風除濕清熱解毒斯得痔漏之要者也

二十四症痔歌 痔症分三八 患君仔細看 莫交年月久 見者膽心

寒菱角看形怪 蓮花不可觀 穿腸并鼠奶 酒色兩相干 莫顧花 怨蜂窠亦不寬 雌雄同氣血 子母及腸盤 玄珠尤可怪 勾腸痛若 鐵核桃與流氣 見者便心酸 栗子於中大 雞心在外安 珊瑚形可 惡那更脫肛 難內痔紅不出 搭腸裏內盤 垂珠更難治 日久有雞 冠切莫輕刀火 令君性命殘 用功無半月 去病更除根

方秦丸蒼木湯 治痔病若破為之漏疾大便閉澀必作大痛皆由 風熱所乘食飽不通氣逼大腸而作也受病者燥氣也為病者胃

濕也胃刑大腸則化燥火以乘燥熱之實勝風附熱而來是濕熱 風燥四氣而合故大腸頭成塊者濕也大痛者風也若大便燥結 者王病兼受火邪熱結不通也

秦丸去芦一錢 桃仁去皮研一錢 蒼木米泔浸七分 皂角仁燒存性一錢 防風七分
黃栢酒浸五分 當歸稍五分 澤瀉五分 檳榔二分 大黃二分不可用多

右剉一劑水煎空心服○若久漏加鹿茸一錢海藻一錢甘草五分服藥日忌生冷硬物及酒濕麵大料物乾薑之類犯之則藥不効矣

秘方 治痔瘡坐臥不得諸藥不効惟此藥妙發時一點即好 用大田螺八九箇針破頂蓋入白礬末少許置地上尖底埋土中其頂蓋仰天經一宿次日取蓋上水水汁以雞翎搽瘡上五七次

止痛即消 治痔瘡 秘方

用半新馬桶一箇入磚一塊放桶底上古法新磚一塊燒紅於磚上上用全竭兩三枚燒煙患人坐桶上熏之不二三次即愈

治痔瘡 劉夷門傳

用大雄雞一隻置地板上却不與食吃伺饑甚却移於淨地上用猪胰子四兩剉碎旋喂雞令其撒糞旋收之如此兩三日候雞糞積至四兩晒乾入後藥

明礬 四兩 膽礬 五錢 葉子雌黃 六錢 雄黃 一錢 朴硝 一兩

石各為細末或砂鍋或銀鍋雖完大者先將雞糞二兩鋪在鍋底次以白礬一兩次以膽礬次以雌黃然後盡下白礬在內再以雞糞蓋在上面用新碗蓋鍋頂簇炭火煨青煙盡為度放冷取出細研入乳香沒藥各五錢同研極細入盒內收之每用時令患人縮一脚用藥少許以津唾吐在手心中調勻以新筆蘸藥付之一日三五次一夜兩三次先用溫湯洗淨軟綿搥乾方可付藥付後有

黃水淋瀝不止最妙三二日痔乾枯剝落倘硬煎湯頰洗忌毒物

酒色効

神蘭散 古方 治疔痔有神効

蠶繭內入男丁指甲以滿為度外面用童子髮縛裹燒存性蜜調付之仍於臘月入日取黑牛膽入槐角子以滿為度百日開用空心酒吞十餘粒極妙

○按右方治痔之劑

五九散 傷王方 治痔漏如神

白牽牛 頭末 大黃 五倍子 乾蓮蕊 各一兩 黃連 三錢

礬紅 五錢 以皂角煉紅 當歸 五錢 沒藥 一錢 乳香 一錢 葉焙乾

右共為末初服五分二服六分三服七分四服八分五服九分為止每日清晨用牙猪肉湯半碗加無灰酒一小鍾調下忌猪腸肚

鹽肉燒酒

三八全應丸 張明山方 治痔漏効驗

刺蝟皮 一箇連刺 當歸 酒洗 槐角 酒浸炒 黃連 酒炒

地骨皮 酒炒 甘草 蜜炙各二兩 乳香 二錢 核桃 十八箇內取

右為末醋糊為丸如梧子大每服三十五丸白湯或酒早晚二服

一月後平復

地手丸 古方 治痔漏通用

槐角 二兩涼血 當歸身 黃芪 各一兩 生地黃 二兩生血

川芎 五錢 阿膠 五錢以上皆補虛 黃連 一兩瀉火 連翹 一兩瀉經

黃芩 一兩瀉火 枳殼 一兩寬腸 秦艽 一兩去大腸風 防風 一兩

地榆 一兩涼血 升麻 一兩散火 白芷 五錢引諸藥入大腸

右為末酒糊丸如梧子大每服五六十丸加至七八十丸空心米湯下或酒任下

秘方 治痔漏

古今醫鑑 卷四 四八

用蜜半盞煉成絲用雄膽一分入蜜內再煉入水成珠不散將猪
絲綿裹燃成燃將蜜捺在燃上仍用真米片熊膽各半分研細捺
在燃上插入漏眼內底至盡頭則止如眼多醫好一箇又醫一箇
不可一齊上燃如外皮肉潰爛用黃蠟黃丹麻油煎膏貼瘡上縛
緊一七見効如外肉効遲恐瘡久受風濕用五倍子花椒煎水洗
每一眼用燃三根至夜換

治痔漏方 用雙橋傳

用鯨魚一箇放在罈內入麝香一二分於內燒滾水傾入罈內泡
驚令患人將大便坐於罈口上熱氣薰蒸良久將水洗痔不記遍
數却將鯨頭燒灰摻上再將鯨肉作羹食之神効

治痔瘡方

刺蝟皮 雄黃 北艾

右為末每作核桃大炷子用竹筒加小酒盃大長尺餘一頭留節

鑽一竅裝入於內燒煙令竅透瘡口薰之久則瘳不可當稱歎再

洗痔漏陳教論傳

花椒

艾葉

蔥頭

五倍子

皮硝

馬齒菜

茄根

右為散水煎先薰後洗當時痛止指日可愈

追風補腎十漏大金丹 治漏庚申甲子成除日合

當歸

熟地

麥門冬

破故紙

肉蓯蓉

山藥

白茯苓

枳殼

白芷

杏仁各二人

人參

生地

小茴

鹿茸

川烏

木香

青木香

砂仁

厚朴

青皮

陳皮

烏藥

肉豆蔻

天麻

乳香

沒藥各一

大附子一

丁香

硃砂各五

大茴

枳實各三

香附

松節各四

百今醫鑑

卷四

甲九

右為末煉蜜丸如彈子大。金箔為衣。每服一丸空心酒化下

按治痔之法不過涼血清熱而已至於治漏初則宜涼血燥濕久則宜澀竅殺蟲而兼乎溫散也或曰痔漏屬火何故而用溫澀之藥殊不知痔止出血始終是熱漏流膿水始是濕熱終是濕寒此方雖溫散又兼補養故丹溪云漏當大補氣血為主有所自矣

懸癰

治懸癰此瘡生谷道外腎之間初發甚痒狀如松子四十日赤腫

如桃治遲則破而大小便皆從此出不可治矣

五國老湯 治懸癰

用橫紋大甘草二兩截長三寸許取出山澗東流水一碗不用井

水河水以甘草蘸水文武火慢炙不可急性須用三時久水盡為

度劈視草中潤透却以無灰酒二碗煮至一碗溫服一日一服半

月消盡為度

懸癰

將軍散

大黃煨

貝母

白芷

甘草節

右為末酒調空心服○虛弱加當歸一半

腸癖

腸癖

脈便血則孔數則赤黃實脈瘵閉熱在膀胱

病夫腸癖者大便下血也又謂腸風臟毒是也皆由飽食炙博生冷酒色并傷坐臥當風榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑因熱乘之血滲腸間腸風邪氣入臟臟毒是臟中積毒風則散之熱則清之寒則溫之虛則補之停滯則疏滌之

治腸風下血必在糞前是名近血色清而鮮其脈必浮宜敗毒散王

之○臟毒下血必在糞後是名遠血色黯而濁其脈必沉滯香連丸主之○臟寒下血無痛脈沉微經云陽虛陰必走宜以薑桂之

類溫則血歸經也○積熱下血純下鮮血甚則兼痛脈洪數宜三

黃丸主之或敗毒散加黃連○腸風者邪氣外入隨感隨見所以

其色清也臟毒者蘊積毒久而始見所以其色濁治腸風以散風行濕藥治臟毒以清濕涼血藥又要看其虛實新久之不同新者實者宜降之瀉之虛者久者宜升之補之故治法有所異也

方枳殼散 治大便秘

枳殼二兩黃連兩槐花五錢地榆五錢白芍一兩甘草二錢半

右剉五劑水煎空心服

一方加當歸生地黃防風各五

海上方 治腸風下血痔漏脫肛

絲瓜根經霜一二次收採洗淨夜露十餘宿懸當風處陰乾每服三五錢剉散水煎熱去渣滴香油如錢大空心溫服忌雞燒酒一日一服即効

乾柿散 治腸風臟毒腸癖神効

懸癰腸癖

乾柿不拘多少焙乾燒存性每服三錢水飲調下
槐黃丸 周後峰傳 治腸風臟毒使血痔瀝神効

黃連 四兩酒炒

槐花 四兩炒

右為末入猪大湯頭長一尺內扎往用萋菜三斤水同煮爛去菜
用腸藥搗爛丸如梧子大如濕加神麩丸每八十九空小米湯下
大便下血如流水不止 胡雲閣傳

黃連

全華酒煎服

○按右方治便血清熱之劑

解毒四物湯 宗師傳 治大便秘下血不問糞前糞後腸風臟毒等症

當歸 酒洗八分 川芎 五分 白芍 炒六分 生地黃 錢一 黃連 炒六分 黃芩 炒八分

梔子 炒黑八分 黃栢 炒七分 地榆 八分 槐花 炒五分 阿膠珠 六分 栢葉 炒六分

右水煎空心服○腹脹加陳皮六分○氣虛加人參三分白木三

分木香三分○腸風加荆芥五分○氣下陷加升麻五分○心血

古今醫鑑

卷四

五十一

不足加茯苓六分○虛寒加炒乾薑五分

○按右方治下血虛弱之劑

脫肛

病天脫肛者肛門翻出也乃虛寒下脫其病或由腸風痔漏久服寒

涼坐努而下脫或因久痢裏急窘迫而脫下又有產婦用力過多

及小兒叫號怒氣久痢久瀉不止風邪襲虛而脫也蓋肺與大腸

為表裏肛者大腸之門肺實熱則閉結肺寒虛則肛出腎主大便

故肺腎虛者多有此症

治若大腸濕熱用升陽除濕湯若血熱用四物湯加條芩槐花血虛

四物湯加白朮茯苓兼時加槐花黃連升麻虛熱用補中益氣湯

加芍藥腎虛六味地黃丸

方升陽除濕湯 自下而上者引而竭之

柴胡

升麻

防風

猪苓

澤瀉

蒼朮 陳皮 神麩 麥芽 甘草

右劉水煎。空心温服。○胃寒腸鳴。加益智半夏。

提氣散

黃芪 人參 白朮 當歸 白芍

乾薑 柴胡 升麻 羌活 甘草

右水煎服

治肛門邊腫硬痛痒

用白礬三分碎研。用熱童便二盞化開。洗痔上一日二三次。洗之。

二槐丹 劉桐川傳 治脫肛

槐角 槐子 各等分

右為末。生羊血調成塊。晒乾。或微焙乾。毋令血熱。每服二錢。空心

黃酒送下

秘方

古今醫鑑 卷四

用鱉一箇。水煮留湯。洗肛。將鱉食之。又留骨燒存性。敷肛上。神效。

治脫肛

用烏龍尾。鼠糞。和之。燒煙於桶內。令坐其上。薰之。數次。即上不脫。

為效

腋氣

方烏龍丸 許昌徐憲副方 治腋氣神方

當歸 一兩 懷生地黃 一兩 白茯苓 二兩 蓮蕊 五錢 焙

枸杞子 一兩 石蓮肉 一兩 丁香 五錢 木香 五錢 青木香 五錢

乳香 京墨 各五錢 水片 一分 半研

右為末。用陳米飯。荷葉包。燒過。搗爛。入地黃為丸。如黃豆大。麝香

一分。黃酒化為衣。每服三四十九。臨臥半饑。半飽。用砂仁一二分

炒入黃酒內。送下。婦人加烏藥三錢。醋炒。香附米三錢。童便炒。

收功後藥 徐憲副傳

脫肛

腋氣

人參

當歸

生地黃

乳香

沒藥

官桂

木香

麝香

青皮

陳皮

白芷

良薑

麻黃

米殼

甘草各一錢

右剉水煎服。出汗外用川椒枯礬各一兩為末。擦腋下。終身忌鹹魚羊肉去大小便不可與女同廁。

秘傳奇方

治體氣

大田螺

一箇

巴豆

去殼

膽礬

一豆許

麝香

右將螺用水養三日去泥土。搗起螺膺入礬豆麝在內以線拴住。放磁器內。次日化成水。須五更時將藥以手自抹在腋下。不任手抹藥。直候腹內欲行。臍臍却任手。先要揀空地。面去大便黑糞。極臭是其驗也。以厚土蓋之。不可令人知之。如不盡。再以藥水抹之。又去大便。以日用後藥擦之。永去病根。

枯礬

一兩

蛤粉

五錢

樟腦

一錢

古今醫鑑

卷四

五三

右為末。每以少許擦之。

治體氣方

枯礬

一錢

輕粉

三分

蛤粉

二錢

蜜陀僧

五分

右為末。研勻。每少許擦之。

諸蟲

方化蟲丸

鶴虱

三錢

胡粉

炒

枯礬

苦練根

檳榔

各五錢

右為末。麵糊丸。如梧子大。每十五丸。米飲入真芝麻油一二點。打勻服之。其蟲下者。化為水。大者自下。

下蟲散

史君子

一錢

去殼

檳榔

一錢

雄黃

五分

右為末。每服大人二錢。苦練根煎湯下。

遇仙丹

古方

諸蟲

腹氣

聖安牛四兩半

二錢五錢

莪木五錢

茵陳穗

五錢

神木

五錢俱生用

右爲末。每藥末四兩用飛羅麵一兩却將皂角五錢煎水煮麵糊丸。如梧子大。每服三錢。壯盛者五錢。小兒減半。五更雞鳴時茶清送下。

○凡人得病。皆因飲酒食肉。生冷過度。致使心膈脹滿。嘔惡吞酸。常吐清水。面黃肌瘦。不思飲食。或成氣塊。初病未覺。漸成大患。此藥能治五勞七傷。山嵐瘴氣。水腫肚腹。脾胃心肺諸病。齶齶咳嗽。痰涎壅滯。酒積氣塊。翻胃吐食。十膈五噎。嘔逆惡心。腸風痔漏。血毒積痢。熱氣上攻。頭目瘡癩。下部淋瀝。女人血蠱。氣腫寒熱。往來婦人。月水不調。赤白帶下。鬼胎小兒。五疳蟲積。誤吞銅鐵。食惡毒物。並治病淺者。一服見效。病根深者。再進一服。必候惡物下盡爲度。所下其蟲曰穿心蟲。曰血蠱。曰傳尸蟲。曰積血蟲。曰細蟲。長蟲寸白。

一百八

卷四

五十四

蟲其狀不一。或作五色。或如爛魚凍。若一次未見。蟲積更看二三次。下來病根纔去。此乃玉莖略。因赴度東安撫。在任得沾山嵐瘴氣。肚腹脹滿。百藥無效。偶遇道人。付此藥一劑。服之下。蟲一條。形狀如蛇。長三寸餘。病乃愈。傳留此方。騰空去。世稱遇仙丹也。

遇仙丹治病甚多。全在醫士診視的確。然後下藥。要

驗無比。倘或俗儉庸輩。胡亂用之。恐誤事。蓋

醫之一道。全在人之心術。俾驗及今。法行

通十年。每用平常之藥。救治大症。便

他人以平常草藥。輒尔害人。生乃用之。當不

先往廿四年戊戌閏三月十二日。勤翁書。叶年六十六

