新刊醫學集成

二

後學 義烏 傅滋 續註

○疔瘡百二十七

夫疔瘡者以其突起狀如疔盖故曰疔瘡按諸家所因論皆熱毒所致但愚近見因食腐敗猪羊牛馬等肉而生者為多然亦不離於熱毒久客於經絡蔵府因觸而發其瘡初生一頭四腫痛青黄赤黒無復定色煩躁悶乱或憎寒頭痛或嘔吐心逆以針刺瘡不痛無血是其候也或論由井肥過度不忍房慎以致邪毒蓄結而生經云膏粱之変足生疔瘡是也其名雖有十三種一曰麻子疔其狀初起頭如黍米大色稍黒四辺微赤多痒忌麻子油衣并入麻田二日石丁狀如黒豆甚硬刺不入肉忌噉石灰三日雖疔狀雖頭黒蕊四畔紅暈起有水出色黄大如錢孔形高忌房室四曰雖丁狀稍黄向裏蕊亦紅炙瘡四面起漿心凹色赤如錢孔忌房室五曰火丁狀如蹋火燒灼瘡頭黒蕊四辺有紅暈有如赤栗者忌火

第六曰癤疔發狀色黯黑有白粗疹中潰有膿水流出瘡形大小如鼈面忌弗治與癰疽七日三十六日生二若滿三十六藥所不治忌嗔怒慾恨入曰死

眼疔其狀瘡頭黑皮浮生形如小豆狀似蛇眼忌毒藥九曰盤唇疔其狀大如鼈面四邊皆赤有黑粟泡起忌盜十曰水洗疔其狀大如錢形如錢孔頭白裹黑醬汁出中硬忌飲暖水七洗疼河十一曰刀鐮疔狀潤如韭葉長一寸肉黑如漆絡可以藥治不可亂攻十二曰浮瘟疔狀瘡體曲貞小許不合長而狹如薤葉內黃外黑七處刺之不痛十三曰牛狗疔其狀肉色鮮起指之不陷又有身上隆痛不見瘡頭謂之暗疔其十三種疔瘡初起瘡心先痒後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重心驚眼花甚者痘節為難治其痲子疔治未潰痒九所忌者若觸犯必難治也若春脹瘡痛劇甚者痲起也治法不甚相遠但瘡發於手足頭胸背骨節間最急若毒入腹則頃間沉綿似醉脈黑或見火光或身冷自汗唇遶黑暈端狂譫妄語直視者皆毒氣入內不可治實治之之法不問諸症並急用奪命丹下其毒之藥九毒丸及內托

散二活散雄射湯等隨病所加引經藥如丁巳黃去用金銀白芷散加減十宜散調之可以斷安世人不識視為小病忽而不治及至危殆雖有良醫妙藥亦莫能為也良可痛哉

壽命丹 附方 巴豆肉一兩炒 黃丹 朱砂三分 雄黃 乳香 麝金箔各五錢 大黃一兩 輕粉一錢 研

右為末糊丸綠豆大隨虛實服之以下其毒如無以雄黃丸代之

雄黃丸 巴豆十四粒 射香少許 雄黃 麝金 大黃 皂角 全蝎各一錢

右為末水丸綠豆大茶下二十九按此藥多只四五丸足矣

化毒丸 片腦子五分 射香五分 硇砂一錢 朱砂 雄黃各二錢

軽粉 十枚 貼蝉退二十枚去土 取蟾酥九粟豆大每一丸放舌上取涎一

雄射丸 急解疔瘡毒神効 雄黄 朱砂三味不可先 各一錢 射錢 粟豆粉二錢以末乳香一錢上另研 白丑 黄蘗根 地丁即大薊根 牡砺 薑蚕 大黄 牛旁子 金銀花 青木香 梔子 荆芥 朴硝 甘草 胡桃肉 介 右十四味對細用酒一椀浸火許擂細又加水一椀同煎至半去查及濁脚入前五味調勻作一服須審病所加引藥欲利加大黄硝

二消散 羌活 當歸 為藥 芎藥 連翹 金銀花 天花粉 甘草 白丑七錢半 紅花 蘇木

荊芥　蟬退　乾葛　烙三　檀香　仁　為末　搽耳煎湯下

一法出用良新物方

軟生奪命丹　南星　半夏　巴豆各一錢去殼不去油

硇砂　礦霜　醋煮黃丹　乳香各半錢　射一字

班毛中形若十六枚去翅足生用　右九味另末和勻以蜡酥為丸粟米大陰乾每服大人十丸或十五丸十歲前小兒三五丸酒下能飲者多些忌熱物熱飲食一日當一瘡如醉狀是應仍以針刀刺瘡口破以此丸三五丸研細稻草心蘸撚入瘡口中候血出拭淨再撚日三次拔出疔毒乃止晡午日合

充尉散　急慢疔瘡　益母草本草云充尉子一名益母草辛甘微寒无毒其莖梢付丁腫服其汁使丁腫自消所在有之四方擇節生葉似芋葉但背青不同嗅之畧臭節間生白花四月采葉連花用之右一味燒存性為末先以小尖刀十字劃開丁根止痛処令血出次建丁根開破令血出用刀尽捻去血拭乾以稻草心蘸藥撚入瘡口遍付到底良久當有紫血出捻令血尽拭乾再撚入藥見紅血即止一日夜撚藥三五度重者二日根爛出輕者一日出看瘡根益脹起即是根將出以針鈚之根已出仍付藥生肌勿差或根消爛不自覺勿憂之内服救生奪命丹如无丹即服忍冬酒日夜連進三二剂

急治不可緩也若得症便發寒熱半身麻木嘔吐不食痛應心脇者最急三五日便死須急用小刀尽去丁根見血是根尽未見血再去令尽若已見丁三四處只去先生着根其餘不須去但如前治之若是陽証形氣壯實者以鋒針刺瘡四畔多出血以洩毒氣針刺所屬經絡而瀉之忌風寒房室酒肉一切毒物

○天疱瘡百二十八

用通聖散及蚯蚓坭晒炒蜜調付　從肚皮起者裡熱發外用通聖散或野菊花棄木根煎湯洗黃栢末付之　或光谷刺葉剪去刺尖杵細香油調付

○惡瘡百二十九

治一切惡瘡神効　血竭　乳香　沒藥　銅綠　枯礬　黃丹　穿山甲炙各一錢　輕粉　蟾酥各半分　麝香少許為細末用蝸牛研如泥和丸綠豆大每一丸重者二丸葱白一寸嚼爛裹藥熱酒送下取汗酒多尤妙

○諸瘡百三十

諸瘡痛不可忍者用苦寒藥加芩連詳上下用根稍又引經藥則可又云諸瘡以當歸黃連為君梔翅耳草黃芩為佐若稟受壯盛宜四物加大承氣湯下之若

性急黑瘦血熱之人因瘡而痛四物加芩連大力子甘草在下焦加黃柏肥胖之人乃是溫熱宜防風羌活荊芥白芷蒼术連翹又云禀受弱者補中益氣加苦寒藥可也

○膿瘡百三十一

用　白膠香黃柏石膏各一兩　青代半兩龍骨五分末香油調付

又方　香油入頭髮如梅大煎三五沸去髮入白膠香黃蠟各一兩煉化入生龍骨赤石脂血竭粉各一兩攪勻候冷瓷器盛提作薄片貼瘡口外以竹箸包之

三日當渴藥再以活血藥洗之又方箸子剪去兩頭以黃柏煮汁冷調和白膠香草麻同搗成膏攤箸楮面折縛光而脫之先以清水洗乾

○下疳瘡百三十二

用 青代海蛤粉蜜陀僧黃連為末付○又方鷄內金炙燒存性為末付○爐甘石黃丹賦粉柏輕粉為末付

陰蝕 狗脊連柏黃丹水銀光粉赤石脂為末干付

○頭瘡百三十三

用 豬油二錢半生半熟雄黃水銀各二分半和勻付之

松香一兩研忽管盛湯內煮去燼輕粉五分乳香三錢無名異火

枯九半兩　為末香油調

○陰胞瘡一百三十四

用　大茸草濃煎湯放冷浸洗之以海螵蛸末付陰瘡用射香杏仁研末以小袋貯內陰內

○血絲瘡一百三十五

其血絲瘡狀如細線巨細不一上下行至心即死於瘡頭上截經刺之以出血後嚼萍草根塗之效

○手瘂瘡一百三十六

用　皂角枯九輕粉黃連黃柏末付○楸樹受風霜處粗皮炙為末清由調付又以楸葉煎湯洗之

○砂瘡百三十七

用　柵地藤燒灰付之　二

○瘡瘭瘡百三十八

用　牡礪煅為末以玄參膏丸服一

○疥瘡百三十九

用　馬鞭草　不犯鉄　取原汁半盞飲十日效亦治馬疥瘡

上散　治諸般疥　晨茉黄三錢蛇床子雄黄另研

黑狗脊入寒水石另研白膠香煎濃過石片上乾另研各一兩研黄丹半兩

白丸　黄連各半兩班毛十四枚去翅足右為極細末以香油桐油調付先用蒼耳草或羊不食草勝煎湯洗去

痂付 此東垣方先用黃白膠香白丸黃連炒痛甚腫加寒水石一倍不苦痒只加狗脊微降加蛇床子如瘡中有虫加雄黃炒蓋火炙湯浴者加硫黃

一方治出瘡 白丸 硫黃一錢為極細末用香油些少煎沸投鷄子清於油中令熟取油調付先須洗去痂

白癜風癬百四十

芥白癜風 肥皂生礬硫黃枯九雄黃為末以皂搗勻浴後擦之

追風丹 治白癜風 蒼木泔浸焙 何首烏 荆芥穗各四兩 為末用肥皂角一斤去皮弦熬成膏和丸酒下

○瘰癧百四十一

用新蟹黃付之。松毛炤熏之。柳葉煎湯洗之。苦硝煎湯洗。猪油熬塗之或鷄子黃塗或黃芦木煎湯洗

○無名赤腫百四十二

拔毒散 丹溪 治丹毒流走不定 寒水石 石膏各四兩 黃柏 甘草各一兩 右末水調塗腫處外以紙貼之

冰澄膏 治赤毒腫痛 大黃 黃柏 黃芩 白芨 南星 朴硝 黃菊 葵花各等分 為末水調澄去水以柔柳枝攪貼干以津液潤之

防風羌活散　治流毒　葉沽　柴胡　錢名二　荊芥
秦艽子　牛蒡　防風　木通　生地　當歸
蒼朮　芣苢　赤芍　名一　滑石　薏水煎服
凡一切無名赤腫遊走不定大人名天蛇毒小兒名赤
遊腫用風風退煎湯洗拭乾以磕蛇圭燒過取膽
蜈公一條去毒炙為末香油調如膏收之每用如豆
大用醋一盞化開刷之
小兒赤遊腫　用鈹針於腫流處出血次服犀角消毒飲
○櫻桃癤百四十三
櫻桃癤狀如櫻桃赤肉努出者　宜九蝦為末付　香油調

或烏梅肉炒焦為末香油調付

豬脊出如蛇頭長數寸者以　硫黃末付之。或烏梅肉搗為餅貼豬上又燒灰研細付之

腳肚上細磨如粟漸大擂之不已成片黃水出痒不可忍久成瘡疾　腳肚細磨百四十四

百桑煎研蜜津調逐暈付或石榴皮煮汁洗之

又方　柳樹半兩龍骨一分輕粉五分猪尿半兩燒為末香油調付或猪毛燒灰雄黃等分為末香油調付

。癩頭百四十五

用防風通聖散為粗末酒洗晒五次再為末茶清下二錢磨用臍月豬脂煎胡荽子六渣以油付。或芙蓉根為末香油調付須先用松毛撏拭煎湯洗

瘡瘍附方

黃連消毒散　治癰發於腦項或背太陽經分膿勢外散熱毒瘀發麻木不痛者宜先多之

羌活　防風　歸尾　連翹各四分　炒連　獨活　桔梗各五分　黃芪　蘇木　防己　澤瀉各二分　人參　甘草二分　右剉水煎服　知母　陳皮　生地　酒柏各五分

內托復煎散　托裏健胃

茯苓　白芍　人參　黃芪　地骨皮

桂　甘草　防己　當歸各一兩　白朮　防風三兩

右剉先以蒼朮一斤水五升煎至三升去朮入前十二味再煎至三四盞取清汁分三四次終日飲之查如前再煎

防風敗毒散　防風一人參　赤芍　甘草

前胡　川芎　羌滑　獨活　桔梗　枳殼等分

右剉葱頭薑棗水煎冬月加木香

五香連翹湯　沉香　丁香　乳香　木香

射香　連翹　獨活　升麻　木通　桑寄生　等分

大黃隨實盡用為粗末每三錢水煎服

單煮大黃湯

大黃一味酒水煎以利為度

小五香湯

沉香　木香　乳香　霍香

連翹各二錢　射香　為末每二錢水一盞煎七分溫服

托裏散

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脉洪弦實欲作膿者三服消盡　大黃　牡蠣　瓜蔞根　朴硝　皂角刺　連翹各三錢　川歸　金銀花　赤芍　黃芩各一錢　右剉每服半兩水酒各半煎服

又托裏散

黃芪　麥冬草各五兩　當歸　甘草各八錢

為末每半兩酒煎服

奪命散 治一切癰疽惡瘡 天花粉 防風 各半兩 川歸 乳香 各一錢 川山甲六錢用輕粉炒黃 皂角針燒 金銀花 陳皮 各三錢 貝母一錢去心 赤芍 甘草節 各六錢 沒藥二錢 每服一兩無灰酒一大椀煎至半椀隨病上下服

烏金散 治癰疽丁腫時毒附骨疽諸惡瘡等証若瘡黑陷如石堅凹肢冷脉細或時昏胃譫語循衣煩渴危篤者服此汗之則愈 蒼耳頭 小草烏頭 火麻頭 木賊去節 蝦蟆頭 樺皮節炙 麻根節去鬚 右等分入麪器內攪和同濟炭火內煅

早煅至申時研黑焰色為度研末每服二錢重者三錢熱酒下未汗再服後以鱉毒散利之

萬全散　景天末一兩　乳香末半兩　甘草湯下一錢

神仙追毒丸　五倍去虫　山茨孤去壳取皮　續隨子去壳取霜一兩

太戟一兩半　射香三字一方加辰砂雄黃　右三味為末入續隨子射香令勻糯米糊丸分作四十粒每服一粒井花水下

紫葛湯　紫葛即五葉藤　忍冬藤　天喬麥　金絲草等分

右剉煎湯溫洗色黑者加米醋一盞

正鉄箍散　貝母去心　白芷　金絲草灰　二兩

或加龍骨等火為末凉水調貼瘡上香油調尤妙

大蚊籐散　芙蓉葉四兩　猪苓皮　木鱉子各四兩　白芷
桕　寒水石　赤小豆　白斂　貝母各二兩
大黃　白芨　紫金皮各兩　防風半兩　真地青
羌滑　爲細末凉水調圍瘡疽四畔如肉脫去白
及白斂加生地逆瘉巴蕉油調付

三消散　退熱極証赤腫欲開　朴硝　焰硝　大黃
梔子仁　寒水石炒黑　南星等分爲末生地青汁調塗乾清亦可

烏金散　圍貼陰証癰疽瘤退赤腫　草烏半兩　大黃
糯米　赤小豆　皂角　五倍　白芨　白斂
貝母　路蜂房各半兩　山甲二片　爲末醋調圍貼腫處

老皮散　千年冷　蜜陀僧　輕粉　貝母　白石脂
石膏　龍骨　各少為末乾付外以鉄篩散貼之

追毒膏　松香四兩　血竭一錢　乳香一錢　輕粉十錢　沒藥一錢半

右將草麻肉松香沒藥隨時加減搗成膏火熬得所次入後四件和勻攤貼如蠶肉不潰出雄黃末付之外貼此藥

膏針丹　信一錢　礬酥　硇砂　輕粉　雄黃
乳香　黃丹各五分　江子十五枚　寒食麪三錢如無以飛羅面代之

右末滴水丸如粳糊樣小麥大先以針挑疽頂令見小血次付

千宜散　人參　黃芪　當歸各二兩　川芎　桂各一兩　厚朴　桔梗各半兩　防風　白芷　甘草各一兩

為末每三錢酒下木香湯亦可

豬蹄湯　白芷　甘草　羌活　黃芩　蜂房　赤芍藥　歸頭等分為粗末每服二兩猪前蹄一隻約重半斤以白水三椀上煮去油花及下肉汁將汁煎藥又去藥查澄清軟綿洗之

生肌散　寒水石煅二兩　龍骨一兩　白石脂二兩　漂石一兩　黃丹五分為細末付瘡口外次長肉膏貼之

破瘡口　龍骨　白斂　乳香　沒藥　末付

長肉膏　香油一斤　鼠一枚　黃芪　人參　玄參各半兩
血餘二兩　夜合半兩　當歸半兩　右用香油入諸藥煎枯枝攪不住手候油變黑色髮消濾去再上火入黃丹十兩藥成入龍腎末半兩血竭末半兩攪勻收貯

又方　黃連　黃芪　防風　歸頭各一兩　桂枝　大黃各七錢　枳殼半兩　白芷　玄參　生地　甘草節各半兩　牡牛膝二兩半

右剉用麻油煎令焦黑浮起為度去渣留淨油三斤入黃丹一斤半煎成熬藥再入阿膠三兩黃蠟一兩半攪勻磁器貯定痛加木香麝拗

碧玉膏　治癰疽腫毒軟痛　乳香二錢（研）銅青一錢（乳香末可銅青錢）
草麻仁　木鱉各五分　末濱者加巴豆三五粒為細末
和勻置石面上鉄斧搥打一二百下如硬添草麻軟
加松香以得所為度貼之

白玉膏　治濱瘍排膿上痛　乳香末　芸香末各一錢
鉛粉二兩　草麻肉一兩　右共安石上搥打成膏乾濕得所貼

白膏子　治頑癬疥癩一切痒瘡兼痒搔動瘡膿以紙
蘸藥擦之不須多只要擦得入肉休打入面目及男
女前後陰并妳上休洗熱　北硫黃二兩另研如粉
北一兩半　石另研　臘月豬脂八兩　右次豬脂重湯煎洋入

二味研末和勻窖收春加相油減豬油憂加灰石灰古郭上取者

黑膏子　治膿窠瘡瘭膿水浸淫不絕若治頭瘡先以溫鹽汁先去痂付之　麻黃　豬脂各半斤　巴豆去殼二十一粒　草麻肉一百粒　班毛十八枚去翅足　右同煎令焦隱去滓取淨油調大風子細末付之

異香膏子　治疥癬癩瘡小兒頼頭腳氣下注瘡黃蠟一兩半　班毛十枚去翅足　草烏　巴豆肉　南星皂角各一兩　麻油一斤　豬脂熬淨白膠香一名黑香半斤　右以麻油先煎班毛巴豆草烏南星皂角五味令焦

黑浮起濾去滓次入黃蠟白蠟香猪脂煎成膏磁器盛貯漸加和後項藥末重湯頻洋用

吳茱萸　蛇床子　枳殼　雄黃各一兩　川椒半兩　藜蘆　白芷　黃柏　夏枯草　苦參　枯礬各一兩　爲細末和入前膏子上

萬應至寶膏　治癰疽諸發腫痛瘡癤風寒濕氣疼木疼痛打撲損傷閃肭蹉跌墜高落馬青腫疼痛追膿生肌長肉收口未破者當中通一竅貼之

松香　澄青各二斤　麻油一斤

右先以芝油煎熱次下松香澄青出盡柴慢火煎枯

枝攪之候沫消如油之清蒐即止令軟硬得所布濾入水盆去渣衆手引接令色白可乳水上為度仍置水中頻待後藥水同煎

天花粉　貝母　黃連　草烏　黃栢　大黃　赤歙　細辛各二錢半知母　半夏　白芨　威靈仙　馬蹄香　馬鞭草　杏仁各半兩　白芷二兩　獨活四兩　桃柳槐嫩枝各一兩春月不用

右二十味剉東流水七八盆浸之冬六日夏二日濾去渣留清汁查再煎取清汁入松香澄青膏子內同煎至七八分乾却下生姜葱汁各半盆米醋小半盆

巴豆草麻子各四十九粒研碎同煎至十分乾方以
後項藥末細撒下攪勻停火入射香二錢半再攪勻
磁器收藏　沉香　木香　血竭　當歸　天麻
犀角　牛膝　沒藥　白花蛇或烏蛇酒炙各三錢　虎骨
降真香　馬勃　五靈脂炒　南星　生地
官桂　乳香一本鼈子　自然銅煅醋碎七次各半兩
五加皮　蜂房各七箇半　為末入前膏內
琥珀膏　治離疽發背丁瘡瘰癧流注蛇犬傷
歸頭　黃芪稍　甘草稍　露蜂房　草麻
木鼈子　防風稍　枸杞根　川芎

皂角　升麻　芍藥　白斂　獨活
川椒　藁本　葛蒲　降真香　官桂
瓜蔞　蘇木　白芷　杏仁　黃連
梔角各一兩　麻油四斤
右剉如芡實大香油浸七日下
鍋煎至焦黑浮油上為度濾去查再下淨羊油四兩
真酥二兩黃丹二片慢火熬成膏藥却入後項藥末
令勻畧煎一沸磁器收貯
安息香　零陵香　甘松香　沉香　木香　丁香　霍香
乳香　朱砂　雄黃　琥珀　云母各二錢半
髮灰半兩　輕粉　射香各一錢
右為細末入前膏內
拈九一兩為劑

雲母膏治一切癰腫傷折等病

蜀椒閉口者去目炒出汗　白芷　沒藥　赤芍藥
肉桂　當歸　鹽花　葛蒲　木香
黃芪　白芨　芎窮　射香　龍膽草
白斂　防風　厚朴　茜草　麒麟竭
棠胡　松脂　人參　黃芩　桔梗
夜合皮　乳香　附子　高良薑　柴芩各五錢
硝石　甘草　雲母各四兩　桑白皮　柏葉
水銀研入硫黃末同研如星子細入膏中攪勻　槐枝　柳枝各二兩
陳皮一兩　清油四斤　黃丹十四兩

右除雲母硝石麒麟竭沒藥射香乳香黃丹鹽花八味另研外並對細入油浸七日文火煎以柳篦不住手攪候匝沸乃下火沸定又上火如此三次以藥老黃色為度去查再熬後入丹與入味末乃不住手攪將凝又熬滴水中成珠為度磁器收之候温將水銀彈上用時光刮去水銀或服貼隨宜用之其功甚大也

太乙膏　治一切癰疽瘡癤貼之神効並可內服須詳證作湯使

玄參　白芷　當歸　肉桂　大黃
赤芍　生地黃各一兩

右剉用麻油二斤浸夏三日冬十日去查將油熬得
所入黃丹一斤以滴水中不散為度

墮傷一百四十六

脉法　傾仆內有血腹脹滿脉堅強者易治小弱者難治肝脉搏堅而長色不青必墮若搏在脇下令人嘔逆

丹溪云因瘀血為病或痰涎發於上也又云傾仆者同中風証惡血歸內留於肝經脇痛自汗治宜破血行經。損傷妙在補氣血俗工不知惟在速効多用自然銅以接骨此藥必煅方可服新出火者其火毒與金毒相剋挾香熱藥毒雖有接骨之功其燥散之禍

甚於刀劒成之。或打閃肭疼痛皆血滯諸可下之忍痛則傷血故也

治法　蘇木活血黃連降火白朮和中童便煎服在下者可下瘀血但先須補托在上者宜飲韭汁或和粥吃切不可飲冷水血見寒則凝但一系血入心即死一老人墜馬腰痛不可轉側脉散大重取則弦小而長予謂惡血雖有不可驅逐宜乜補接為先用蘇木參芪芎歸陳皮甘草服半月脉散漸收食進次前藥調下自然銅等藥一月而愈

附方

復元活血湯 治從高墜下惡血留於脇下疼痛不可忍

大黃酒浸一兩　柴胡半兩　瓜蔞根　穿山甲炮　川歸各三錢
紅花　甘草各二錢　桃仁五十五介去皮尖

上銼散每服半兩水酒各半煎至一盞去滓通口服以利為度

乳香應痛丸 治痛不可忍

乳香　沒藥
黑豆二十一立　桑科棗各一枚　破故紙炒二兩

每五錢醋一盞煮温服

紫金丹 治骨節折傷疼痛

川烏炮　草烏炮各一兩　五靈脂半錢　木鱉子黑丑各半兩　威靈仙　骨碎補
射香　沒藥　蚣毛　狗脊　紅娘子各二錢半
自然銅煅醋淬七次　地鱉焙乾為末各二兩　杵為藥　青皮

陳皮　醋糊丸桐子大酒下十九

元戎和味四物湯　治虛人不可下者四物湯加川芎

三因鷄鳴散　治一切損傷瘀血凝滯疼痛欲死

大黃一兩酒浸　杏仁三七粒去皮尖右研細酒一椀煎六分鷄鳴時服至晚取下瘀血即愈若取藥不及者急以熱小便灌之

○閃肭脫臼一百四十七附

痲痺散　治跌撲損肭脫臼手足偏歪　木香一錢　赤芍　防風各半兩　枳殼　無名異　白芷各一兩　末藥　乳香各二錢　紫金皮一兩　草烏一枚去皮川歸

牛草各半兩 射一錢 為末酒下一錢

三粉膏 治閃肭脫臼赤腫青黑腫痛

黍米粉半斤炒無蒜瓦大 麪漿粉半斤 右用葱一片同炒成黑炭十兩和勻好醋調貼三次後水調入少醋骨折處亦用此付

○骨折一百四十八節

接骨一字散 凡骨折先頭端捏整筋骨端正如臼冬用綿包杉木夾定夏用扇柳皮夾之在手臂及足脛用三片足上脫綿如籬狀綿纏縛定次脫此自然銅半兩醋七次煅研末麝乳香 沒藥各半兩

射一字　為末酒下一字

合歡散　接骨後服此　生地　赤芍　川歸
蘇木　木香　降真草　松根（路上人踏者）合歡皮
芣草　右剉每七錢水二盞煎一盞入童便半盞
酒少許服（一方有防風荊芥）

經驗方　治打顛折骨損斷服此藥自頂心尋病至下
遇病處則颯颯有聲覺藥力習習往來則愈
自然銅（製同前）一兩　川烏（去皮臍）　松明節　乳香　血竭三錢
龍骨　地龍　水蛭（各半兩炒）　沒藥　蘇木　降真香
上㕮咀十介酒浸炒黃　右末每五錢酒下

紫金丹　定痛接骨（方見墮傷門）

○金瘡一百四十九

脉法　出血多脉沉細微緩者生浮大數實或急疾者死寒血留內兩脇腫脹不能食者死去血後脉弦者生沉者死

金瘡血出過多者四物加參芪服之（集驗云凡身體傷血出者必渴甚不可以水飲之又食干食肥膩之物不但解渴而已若食薄粥則血帶而出必死所當忌者犯之多不救矣夫不可治者有九焉一曰傷腦二曰傷天窓三曰傷鼻中脉四曰傷脛骨陰腋五曰傷心六曰傷乳七曰傷鳩尾八曰傷小腸九曰傷五臟凡此九者皆不可傷也又不可治者四焉一曰膝骸出二曰脊中節離二曰直視三曰應不甘寒痛不任熱傷經也四曰血出不止前赤後黑強自加肉腐臭寒為壞

堆起火城中間放水蛭炙乾每用一條研末用水調
燃作小繩撚接斷處用赤白石脂蜜調護患處如斷
多日斷處畧刮去二邊斷處黑筋令見血方用藥仍
用桑柴白皮夾定留孔出水用山茱萸葉湯洗再付藥
○出箭頭一百五十三

蜣螂膏　治箭入內　蜣螂十枚自死者　土狗子三枚　血餘少許
先將蜣螂去殼取腋下白肉與三味同研如泥生香
油調貼候內微痒即以二手熨之其箭頭自出

又方　巴豆肉　蜣螂肉　同搗塗上微痒其箭自出

雌黃散　治箭頭入骨不問遠年自出　蜣螂肉

雌黃　威靈仙名二錢三不灰木半兩燒赤色一錢

朝生花即牛糞上開一錢　為末次活鼠一箇取血先如粟米大用一丸內瘡口其蟲自出

○灸瘡百五十二

鬼代丹　受灸不痛　麝花一兩　白丑炒　木耳炒名半兩

蜜丸彈子大先用葱細切臨期嚼一撮酒下先服蘇合香丸二丸次服此二丸酒下未打又再服

又方　治灸瘡　真蒙直粉名炒為末鷄子清調刷之重者次以人溺和酒飲之

凡灸瘡先用草帚三十張手將令極軟於破處輕重隨

瘡雖愈此四者皆不可療也

方　急以石炭厚付之最妙瘡深不宜速合者加滑石末。又方老杉樹皮為末付之。又方松香末付加琥珀尤效。製石灰二兩松香　白石脂　乾松洗地松　石膏煅各半兩青皆半兩　胡椒　飛丹各二兩半為細末付傷處久者加乳香龍胆赤石脂

立應散　治血不止　寒水石煅一兩半　花蕊石　黃丹　沒藥各半兩　黃藥子七箇半一方加　乳香二錢為末付生肌定痛最妙

金瘡內漏　凡金瘡通內血出者為內漏二脇脹不能食者死若有瘀血搏在腹內宜桃仁丸去其瘀血脉

弦生沉者死

桃仁丸　蚯虫三十介去翅足　水蛭三十个炒　大黄三两炒　桂一两半

桃仁三十枚去皮尖為細末蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎三沸食前服

鉄精木散　治金瘡腸胃突出　磁石醋煅七次

滑石鉄精木各三两為末粉於脾上外用補縫其皮後另以煅子磁石細末粥飲下一錢七日三服補縫之法用蒲東系白皮作線縫之

傷經　砍傷血筒血出如湯泉者是　鋼末付之又用葱一片炒乘熱熨之

續筋　凡為左器所傷欲續筋者用新磚一片平放四圍

約趁去皮肉及令細血條頻七換紙直至紙上絶無
血水碎肉淨了不更經水以緋箭一方比瘡濶二三
分周圍剪開些少以防貼上患迫用飛羅面井花水
調成稠膏放下一壁先以芍藥細七勻摻瘡上令一
服藥末皆盡却以熨膏薄攤緋帛上便可行百許步
即時不疼冷應如水一二日間周圍乾起逐漸剪去
只一服收功忌生葷雞魚椒料等毒物房室尤戒

湯火油傷

湯火油傷一百五十二

桐油二分水一分攪勻入黃丹軟石膏
末付之。大黃煨石膏研細桐油二分水一分拌抹

上。滷灰查付亦良。寒水石油調付或加大黃黃柏。寒水石牡礪粉消青代輕粉水調或油調。先用涼酒洗吹以老松樹皮或柿樹皮燒灰香油調付。九湯火傷皮紅未破爛者不可用大寒涼之藥調之反用酒掃拔其熱毒出外則不爛矣

。蛇咬一百五十三

治蛇咬　急以麻繩咬屬上下於無風處重者以刀劃其傷肉小便洗淨鉄物路之然後填以蚯蚓泥古石灰末綿片繫札之輕者針刺瘡口并四畔出血小便洗淨以蒜切如錢厚着瘡屬灸三五壯用赤脚蜈公

燒存性椎黃白蓽各等分射少許為末酒下二錢取醉又以此付之亦可後用大青小青牛膝汁服之。

野狐木根治蛇咬。射香白蓽馬蹄香青木香酒煎服用針挑破傷處用天青乘熟乘一錢搗盒之

治一切蛇咬　貝母為末酒調盡量服之頻之酒咬處為水流出候水盡即以藥查付咬處即愈。細辛白蓽雄黃等分為末入射香少許酒下二錢或青木香煎服亦可

。蠍咬一百五十四

先以針刺傷處出血冷水漬之水稍温則易之或薑汁

蒙以帛浸水塌之頻換或吳茱萸生烏頭末皆可付
○蜂咬一百五十五
用人溺洗以桑樹汁付之○生苧梗釜之
○諸物骾一百五十六
治骨骾　楮實為末霜梅肉和丸彈子大含化或臭用末吹鼻依建出
勒為末砂糖丸彈子大含化或臭用末吹鼻依建出
之或南鵬砂滌洗腹中含化○魚骨骾用威靈仙
青皮陳皮等分酒水各半煎細呷嚥之即化白鮓食
之亦治○稻芒骾取鵝涎灌之即下○硬骨并猪毛
骾用生苧麻拿住尾餘九口嚼爛嚥去滓吞之即出

以頭垢九枚下十數九遂吐出之

○自縊救法一百五十七

九自縊高懸者徐徐抱住解繩不得截斷上下安脚卧之以一人用脚踏其二肩以手挽其髮常令弦急勿使緩縱之人以手按摩胸中數摩動之一人摩脅脅盡伸之若以強直但漸摧之并按其腹如此一時頃須得氣從口出呼吸眼開仍引按不住須臾以生桂湯及粥清灌之令漸開漸七能咽乃止更令二人以管吹其二耳此法最好無不活者自旦至暮雖冷亦可救暮至旦陰盛為難

一法須按定其心勿令截繩當起解之其心下尚温者先用皂角末吹入二鼻用舊鞋一片蓋在鼻口令二人以竹管極吹二鼻耳即活。又法用梁上塵少許入四箇竹筒令四人各執一箇齊吹二耳二鼻用力極吹更灸二足大指横文中各七壯則活婦人灸二手大指上次二穴（一云大指端中二穴）。溺水救法一百五十八

用牛一頭令肚横覆在牛背上兩邊用人扶策徐徐牽牛而行以出腹中之水如醋即以蘇合香丸之類或老薑擦牙若無牛以活人於凳上仰卧令即於好人

身上水出即活後服蘇合香丸

一法皂角末吹入㕮道如無皂角末可灸臍中五十壯則水從㕮道中出經宿者亦可活若落水冷凍身強直口眼閉尚有微氣者用皂角一斗炒煙以布三五重裹熱厥其心頭冷則易之得心頭煖氣通自轉口開以稀粥稍稍嚥下仍依前法灸之則愈

○凍死救法一百五十九

九凍將死有微氣者灰炒煙以囊盛熨心頭上冷即易之若不先温其心便以火炙則冷氣與火爭必死

○魘鬼救法一百六十

用半夏末少許吹入鼻中心頭温者可治或灸人中穴
及二脚大母指内離甲一韭葉許各灸三五壯即活
卒忤死者一百六十一
即俗謂冲惡鬼打尸厥是也急以皂角末吹入二鼻内
即活或灸掌後一寸二筋間各四壯并人中穴
九夜驚者切忌灯火照之但令人痛嚙其踵及足大母
指即活後以皂角末吹入兩鼻内又未活灸二足大
指上各七壯婦人灸間使各十四壯
馬咬一百六十二
九馬咋及踏人灸瘡上并腫處用婦人月經布或人糞

或馬糞末或鼠糞燒為末和豬脂但取前一件皆可
付又服重便韭汁亦良
○手足皹裂一百六十一
用　瀝青二兩　黃皮一兩　共熬攪勻乘熱貯先以熱
湯令皮軟拭干將藥於慢火上暴炙付之
手足皹裂春夏不愈者　薑汁　紅糟　鹽　豬脂　研爛煖熱
擦入皹內一時雖痛少頃使皮軟皹合再用即愈
又方　頭髮一大握　桐油一盞　先將器內熬候油沸髮溶
出火以瓦器收貯用時須先用沸湯泡洗令軟付上
（一云加水粉）○五倍為末以牛筒骨髓調填縫內或白礬

末水調付

凍瘡　茄根濃煎湯并以雀兒腦髓塗之

指縫爛瘡　鵝掌黃皮焙末摻之

○婦人門一百六十四

脉法　平而虛者乳子陰搏陽別者妊子搏者近於下別者出於上氣血和調陽施陰化也少陰脉動者妊子三部浮沉正等按之無絕者妊娠初時寸微小五至尺數滑疾重手按之散者並三月重手按之不散者五月又寸微脉滑尺數流利往來雀啄者妊左手沉疾實大為男反此者主產右脉沉實疾大為女反此者

主蠹妊三月而渴脉反遲欲為水分後腹痛者必墮
妊五六月脉數必壞脉緊必胞滿脉遲必腹滿而嘔
脉浮必水壞為腫妊六七月脉弦發熱惡寒其胎踰
腹上痛小腹如扇子臟閉故也當以附子温之妊六
七月暴下斗餘水必倚而墮妊七八月實大牢強弦
者生沉細者死妊月足身熱脉亂者吉脉浮而緊半
産而墮陽浮則亡血絶産惡寒。浮而腹痛引腰脊
為欲生一呼三至或沉小而滑或盡脉轉急如切繩
者便生也。微而濇者少陰大者皆無孕氣血氣故也

左手沉實為男右手浮大為女左右手俱沉實生二男左右手俱浮大生二女尺脉左偏大為男右偏大為女左右尺俱大產二女左右尺脉俱浮生二男俱沉生二女（大抵以尺脉為主）

漏血下赤白日下數升脉急疾死遲者或虛小者生緊者大者死

新產脉沉小緩滑皆生實大弦緊皆死沉細附骨生弦疾不調死。產前脉細小濇弱產後脉洪數皆死

經水　兩尺弱小者血枯經閉左寸沉結為結尺滑肝沉寸關如故而尺脉絕者皆月水不利也沉緊為寒

氣客於血室血凝結積作病也

褚氏療師尼寡婦別製方蓋有為也蓋此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則為勞倉公傳治一女腰背痛寒熱狀以寒熱治倉公曰病得之欲男子不可得也何以知之診其肝脉弦出寸口是以知之蓋男子精盛以思室女人血盛以懷胎也

經水一百六十五

丹溪云經水者陰血也陰必從陽故其色紅亦火色也血為氣之配氣熱則熱氣寒則寒氣升則升氣降則

降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁成塊者氣之凝也痛行而痛者氣之滯也來後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也錯雜妄行氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也人但見其紫者黑者作痛者成塊者悉指為風冷而行溫熱之劑禍不旋踵矣良由病原論月水諸病皆由風冷乘之宜其相習而成俗也按岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天真之陽降脈者壬癸水名曰天癸也然沖為血海任主胞胎腎氣全盛腎脈通經血漸盈應時而下所以謂之月事者平和之氣常以三旬一見次修月盈則溢也

經不通者或因墮胎娶產傷血或因久患潮熱腸

血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而
不生血宜生血補血除熱調之劑隨證用之或因七
情傷心心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經
使血生而自行
雖著云經脈不行多有脾胃損傷而致者不可便認作
經閉血死輕用通經之藥過有此証便須當其脾胃
如何若因飲食勞倦損傷脾胃少食惡食泄瀉疼痛
或因誤服汗下致剋傷其中氣以致血少而不行者
只宜補養用白朮為君茯苓為臣佐以黃芪甘
草陳皮麥芽芎歸柴胡等藥脾旺則能生血而經血

自行矣又有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾
治脾胃經病素有血塊凝結方宜行血通經
經不通用馬鞭草五汁熬膏為丸或燒存性為丸紅花
當歸煎湯送下
血枯經閉者四物加桃仁紅花一云用越曲丸又云陰
虛潮而身躰疼痛者四物加蒼术牛膝煅龜皮丹草又
方煉蛇丸加蒼术酒為藥為丸煎藥送下又方治經
不行或胸膈閉只亮各半兩
取杜牛膝汁半鍾空心調下
軀脂滿經閉者導痰湯加黃連川芎之類不可服地黃
以其泥膩故也如用必薑汁炒過
肥人腰多佔住血海因而下多者用必漸啓用南星蒼

术川芎香附作丸服肥胖飲食過度經水不調者是
溫痰宜蒼术半夏滑石茯苓香附芎歸肥人不及期
而來多者痰多血虛有熱者亦用前丸子藥中更加
黃連白术丸服
過期若血虛也四物加參芪陳皮白术升麻之類若肥
白人是痰多二陳加南星蒼术滑石芎歸香附過期
作疼乃虛中有熱過期而色淡者痰多也二陳加歸芎
不及期者血熱也四物加芩連之類肥人亦兼痰治又
云不及期者氣血俱熱宜柴胡黃芩當歸芍藥生地
香附之類

紫黑色又有塊者血熱也四物加芩連香附
將行作痛者血實也（又云瘀滯有瘀血）桃仁紅花黃連香附
臨行時腰疼腹痛此乃瘀滯有瘀血四物加桃仁紅
花我朮玄胡香附木香發熱加黃芩柴胡又云肚痛
者四物加陳皮玄胡牡丹皮甘草之類
經不調而血水淡白者宜補氣血參芪芎歸香附白芍
藥腹痛加阿膠艾葉玄胡索
行後作痛者氣血虛也宜八物

固經丸　治經水過多不止　黃芩　龜板
白芍藥各一兩　黃柏　三錢　香附二錢半　酒糊丸服

又云三補丸加香附鳥梅又云四物加白
朮黃芩按良方論出損傷經衝任盡首所致蓋衝
脉為一身之海手太陽小腸之經手少
陰心之經也此二經為表裏主下為月水若勞傷經
脉衝任氣衰故不能約制經血令月水不斷也凡不
止而合陰陽則冷氣上入孫臟令人
身孔面目痿黃亦令人絕胎不產也

東垣治一夫人病炎熱月事不至若數年矣又加喘嗽
醫者悉以蛤蚧柹附等投之予曰不然夫人病陰為
陽所傷大忌溫劑以涼血和血之藥服自愈果然

滑伯仁治一婦年三十每經水將來三五日前齒下牙
痛如刀刺狀寒熱交作下如黑豆汁既而水下同之
無娠脉二尺沉濇欲絕餘部皆弦急曰此由下焦虛

濕邪氣搏於沖任沖為血海任主胞胎為血室故經事將來邪與血爭而作疙痛寒氣生濁下如豆汁宜治下焦遂以平散苦溫理血之劑令先經期十日服之凡三次而邪去經調是年有孕一婦暑月中病經事沉滯寒熱自汗咳嗽有痰體疹陣作脇刺痛診其脉弦數六至有餘曰此二陽病也經云二陽之病發心脾女子得之則不月二陽陽明也陽明為金為燥化今所以不月者因其所遘也陽明本為燥金遘於暑暑火也以火燥金　　愈燥矣血者水類金為化源宜月事沉滯不來也　　醫用燥熱藥予曰未

得寒則止得温則行得熱則消搏則燥復加燥劑如
益乾而病必甚以柴胡飲子清陽隨水流温潤燥三
五進而經通餘病亦除
抱一翁治一女病腹脹如鼓四體骨立衆醫或以為蠱
為蟲為祟也翁診之曰此氣搏血室彼曰服亏歸堇
積歲月非血藥乎予曰失於順氣也夫氣道也血水
也氣有一息之不運則血有一息之不行經曰氣血
同出而異名故治血必先順其氣俾經絡得通而後
血可行乃以蘇合香丸投之三日而腰作痛翁曰血
欲行矣急以苦硝大黄峻逐之下污血黑塊如瓜者

數十枚遂愈肯所以知之者以六脉弦滑而且數弦為氣結滑為血壅實邪血故氣行而大下

呂先生治一女在室病不月諸醫療皆不得其狀視之腹大如娠求其色脉即脏固詰之曰汝病非有異憂則鬼靈所憑耳女不答傳令詢之曰是夕果夢與男子交由是感疾公言誠是也翁曰女面色不赤不白鬼也脉不大不小者常也病因與脉色同雖劇無苦乃以桃仁煎下血類豚肝六七枚俱有竅如魚口病已經血逆行或血腥嘔血或吐血用非汁服之

附四物湯　治冲仕虛損月事不調臍腹疼痛

一川芎　芍藥　熟地黃等分水煎
經候少斷漸不通手加煩疼漸瘦潮熱脉微數去芍
地加澤蘭葉三倍甘草等分經候過多去熟地加生
地黃芩白术身熱脉數頭昏加柴胡黃芩微少或脹
或痛或肢節疼加玄胡沒藥白芷等分為末酷湯下
心腹疼痛只服芎歸二味氣冲經脉故月事頻併臍
下多痛加芍藥經欲行臍腹疼痛加玄胡茴楠若練
炒木香減半澁少加棕花紅花遇來過斷或往來寒
熱先服小柴胡後以四物和之
琥珀湯　治經脉壅滯脇肋腫脹腹刺痛及產後惡

路不快血上攻心迷悶不省欲死或血氣壅滯腹痛

三稜　莪朮　赤芍　劉寄奴　牡丹皮
肉桂　熟地黃　烏藥　玄明粉　川歸各一兩
一方加蒲黃菊花　右用烏豆一升生薑半斤切作片子以米醋四升同煮豆爛為度焙干　後五味同杵為末每二錢酒下若尋常氣血痛者一服效

地理丸　治經水不調氣塞血塊腹痛

生地黃一斤杵爛汁和　老生薑一斤杵汁和地津干為末
玄胡索　川歸　川芎　白芍各一兩　人參
桃仁各一兩半　木香　末藥各一　香附子半斤

右末醋糊丸梧子大薑湯下七十丸又名交加地黃丸

通仙散 治經閉血隔　大黃一兩鼈蟲

茴香　蒴蓄各一錢　麥牙四錢　為末酒下三錢

琥珀散 治經閉不通腹中成塊

水蛭石灰炒　蝱虫去翅足糯米炒　琥珀各五錢　川歸酒浸

芫花醋煮炒干　桂枝　大黃各一兩　桃仁去皮尖各一兩

右末以糯米醋熬膏丸蘇木湯下三十丸

通經散 治經候不通臍腹疼痛或成血瘕瘕

川椒　蓬朮　干漆炒煙盡　當歸一錢半　青皮

乾薑　大黃　桃仁炒　川烏炮　桂心各一錢

右為末將一半用米醋熬成膏子和餘藥成劑丸如梧桐子大醋湯下五十丸一方無川烏有紅花

地黃通經丸　治經不行結積成塊臍下如覆杯

熟地黃二兩　蝱虫天頭足翅　水蛭糯米炒　桃仁各五十介

右末煉蜜丸桐子大酒下五丸加至七丸

過期不行　玄胡索一錢　香附　枳殼各五分

為末取杜牛膝汁半鍾調下

瘀血為痛　香附四兩醋煮　蒲黃　乾薑各二兩　牡丹皮　大黃蒸　當歸各二兩　川芎　紅花各半兩

桃仁一兩為末炊餅丸梧子大酒下五十丸

治瘀傷經夜則妄語

瓜蔞子 砂仁 各一兩

黃連半兩 吳茱萸十粒 桃仁五十枚 紅曲二錢 麻祖木

為末童汁化炊餅丸桐子大湯下一百丸

當歸散 治經脉不通當歸川山甲

蒲黃炒 各半兩 辰砂一錢 麝香少許 為末酒下二錢

紅花當歸散 治血臟虛竭或積瘀血經候不行時作腹痛腰膀重疼小腹堅硬及室女經不行

紅花 歸尾 紫威 牛膝 炙甘草

蘇木各二兩 桂心一兩半 赤芍九兩

劉寄奴五兩

右為末空心酒下三錢

消遙散　治血虛煩熱月水不調腹脹痛潮熱寒熱
八物湯減人參芎地加柴胡茵芧水煎服

當歸散　治經候不勻或三四月不行或一月再至
四物湯減地黃加黃芩白朮山茱萸為末酒下二錢

六合湯　治經事不行腹中結塊疼痛
四物湯加桂遂朮等分水煎服

崩漏一百六十六

脉法　洪數而疾為熱微遲或弦細為寒虛小或
滑而遲者為治急疾或緊大實數者難治寸口脉微
遲尺脉微弦微遲為寒在上焦但吐爾尺脉弦微如

此即小腹痛引腰脊必下血也寸口弦而大弦則為
臧大則為乳臧則為寒乳則為虛虛寒相搏脉則為
革必半產漏下尺怠而弦大風邪入少陰之證女子
赤白漏下日數斗脉怠疾不治雖者生尺寸虛者漏
血脉浮不可治也
冊溪云有虛有熱熱則流通虛則下陷東垣有治法但不言熱而
主於寒學者宜再思之經曰陰虛陽搏謂之崩觀此
可知按東垣所論由脾胃氣虛下陷於腎與相火相
合蒸熱下迫而致若其色紫黑如豬肉之臭中
有白帶者脉必弦細寒作於中亡有赤帶者脉洪而
疾為熱明矣若腰痛或脐下痛先見寒熱或二腸鳴
急或脾胃症狀或陽脫困熱心煩不慎或因暗勞此
氣不足其火壯於血脉致脾胃虛大乘其中形容枯

不病者比心病也不行於陰治當先說惡死之言使心不動以大補氣血之劑舉養脾胃以加鎮墜心火之藥治其陰補陰潛陽睡自止矣又或悲哀太甚則動搖經絡而陽氣內動發則心不崩數溲血也蓋腎水真陰既虧不能鎮守包絡相火故血走而崩也脾胃者血氣之根本數傷則身心者血之府脈者人之神俱不足而生火故也此皆東垣等論備言所致病機之詳始無餘蘊何不言慈而生於寒哉

急則治其標白芷湯調下百草霜甚者燒灰服或用搗頭骨一作狗頭骨燒存性或加五靈脂半生半炒俱酒調服五靈脂忌與人參同一云凌消丸末酒下後以四物加乾薑調治緩則治其本四物加參連參芪香附乾薑之類。因勞者參芪稀補氣。因寒者乾薑。因熱者四物加芩連。因血過多者以五靈脂末

一服當分寒熱蓋五靈脂紙行紙止。一法香附白
並九服。崩中白帶用椒目末或白芷末粥九服
四物加荊芥穗止血神妙一云加炙灰一云
崩漏多因氣陷使而下發則燥濕血也以香附末炒黑
婦身白芍藥炒熟地白术各一錢川芎黃芪蒲黃地
榆人參各五分升麻三分甚者加宗毛灰調服
婦人血病宜用當歸若肥白人與人參同用瘦人與
生地黃香附同用
一婦墮胎後血不止食少中滿倦怠煩躁脉沉大而
數重取漸弦予作怒氣傷肝感動胃氣以二陳加川

芍白木砂仁二十貼而安（又一條見醫門）

東垣治一婦時冬患暴崩不止先當失血自後一次縮十日今次不止性急而多驚必因心氣不足飲食不節得之診視掌中寒脉沉細而緩間而沉數九竅微不利四肢無力上喘氣短促不調果有心氣不足脾胃虛弱之候證胃當心而痛左脇下縮急當脐有動氣腹中鳴下氣大便難虛證極多且先治其本餘症可以悉去安心定志補益其氣調和脾胃大益元氣補其血脉令養其神以大熱之劑去冬寒凝在皮膚少加生地黃去命門相火不令四肢癱弱貧連一分

生地黃三分炒白際皮桂枝各五分草豆蔻仁大棗
黃芪人參麻黃不去節各一錢五分杏仁五箇一服
而愈胃脘痛者客寒犯胃也以草豆蔻丸一十五丸
痛立止再與肝之積藥除其積之根源遂愈
一婦血崩不止以當歸蓮花心白綿子紅花等花各
一兩剉細以白皮紙裹定泥固燒存性為末加血竭
為引用酒下不止加麝粉一錢又不止加射香為引
酒下○一婦患崩漏醫莫能效數年證有四十餘種
以調經升麻除濕湯治之愈 又一條見帶門
雜著云一婦患胎漏忽血崩甚暈去服童便而醒少頃

後運急服荊芥隨醒隨運服止血止運之藥不効忽又嘔吐一次其童便藥汁滿於胸膈也即以手探吐之未後吐出飯及菜概許詢之適方飯後着惱少頃遂悟曰因飽食胃氣不行故崩甚血既大崩胃氣益虛而不能運化宜乎崩運不止而血藥無効也急宜調理脾胃遂用白术五錢陳皮麥芽各二錢煎一服量止再服崩止遂專理脾胃藥服十數服胃氣始完後加血藥服之而安若不醒其食滯而專用血崩血暈之藥豈不誤哉

附方

婦人血崩

方

金毛狗脊二兩 茅花

川芎 防風 荊芥 升麻

柴胡各一錢升陽 生地黃五分 黃連 黃芩

黃柏各三錢京 川歸阳流五錢 黃芪補血 草豆蔻

神曲治胃弱客寒 人參氣生 白朮加久 麻黃

荊穗各等加久 附子 肉桂血氣俱大寒加久 右剉水煎

崩不止 香附炒黑二兩 歸尾炒二兩半 五靈脂炒一兩

為末酯下 紫草煎服大能止血

調經升麻除瀝湯 治痛下惡血月事不調或暴崩不

止或下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或素
心氣不足因飲食勞碌致心火乘脾其人必怠惰嗜
臥四肢不收无力氣短迎氣上冲其脉緩而弦急按
之洪大皆中之下得之脾土受邪也脾主滋榮周身
心主血七主脉二者受邪病皆在脉心者血之府也
脉者入之神也心不主令胞絡代之故曰心之脉主
屬心絲心絲者胞絡命門之脉也主月事因脾胃虛
而心包乘之故痛下月水不調也況脾胃者血氣陰
陽之根蒂也當除濕去熱益風氣上伸以勝其濕故
云火鬱則發之也

川歸　　鉤滑各五

黃芪錢半 各

蒼朮 黃芪

光滑 蒼朮

柴胡 光滑

炙甘草 升麻

實荊子七分防風

名作一服水五盞煎至一盞空心熱服又炙血海二七壯此乃從權之法用風勝濕為胃下陷而氣迫於下以散其血之暴崩也并惡血之物住後必以黃芪人參炙甘草當歸之類以補之於補氣升陽湯中加和血藥是也若惡物不絕尤宜究根源治其本經只益脾胃退心火之亢乃治其根蒂也再月帶漏不止此方立

涼血地黃湯

治腎水陰虛不能鎮守胞絡相火故也

黃芩　荊芥　蔓荊子各一分　黃柏　知母
藁本　細辛　川芎各二分　黃連　羌活
柴胡　升麻　防風各三分　生地黃　當歸各五分
甘草　紅花　水煎去滓作一服水煎空心熱服

丁香膠艾湯　治崩中不止心氣不足勞役及飲食不節二尺脉俱弦緊而洪按之無力自覺臍下如冰常欲厠衣下白帶白滑之物多間有如屋漏水下時或有鮮血右尺脉微甚

四物湯加丁香阿膠生艾葉

胎經脉漏下不止其色鮮紅時發時止

因勞役脾胃虛弱氣短氣逆自汗不止身熱悶亂惡見飲食倦怠無力大便時泄再因心氣不足故下脫

柴胡二分　炙甘草　生地黃各三分　陳皮　熟地各五分　黃芪一錢半　蒼朮　當歸　白芍藥　白朮各二錢

右作二服水煎空心熱服

小薊湯　治崩中不止　小薊汁一盞　生地汁一盞　白朮半兩

右件入水一盞煎服

荊芥散　治崩中不止

荊芥穗於香油燈上燒令焦色為末童便下三錢

如聖散　治血山崩　棕櫚灰　烏梅各一錢　乾薑炮一錢半

為末每服二錢烏梅酒調下

蓮蓬燒灰米飲下最治血崩

一方　川歸　川芎　桃仁　紅花
黃芩　紫蘇　防風　羌活　荊芥
甘草　乾薑　右水煎有塊者尤妙

○求嗣一百六十七

脉法　微弱而濇為無子為精氣清冷微而濇者少陰大者皆無孕氣血虛故也

丹溪曰胥閻東垣論云經水斷後一二日血海始盡精勝其血感者成雾四五後血脉已旺精不勝血感者

成女此確論也易曰乾道成男坤道成女夫乾坤陰陽之性情也左右陰陽之道路也男女陰陽之儀象也父精母血因感而會精之施也血能攝精成其子此萬物資始於乾元也血成其胞此萬物資生於坤元也陰陽交媾胎孕乃成所藏之處名曰子宮一絲在下上有兩岐一達於左一達於右精勝其血則陽為之主受氣於左子宮而男形成矣精不勝血則陰為之主受氣於右子宮而女形成矣夫婦人之無子者悉由血少不足以攝精也血之少也固非一端然欲得子者必須補其陰血使無虧欠乃可推其有餘

以成胎孕舉世何乃輕用桑桂丸等熱劑煎熬臟腑血氣沸騰禍不旋踵有服艾者不知艾性至熱灸則下行食則上行多服致毒咎將誰執昔建平王問求男之道褚澄對曰合男女必當其年男纔十六歲而精通女雖十四而天癸至必二十而嫁皆欲陰陽氣充實而后交合則交而孕已而育已而為子堅壯強壽況今之世風俗日渝資稟日薄未笄之女天癸始至已近胃色陰氣早泄未完而動是以交而不孕已而不育已而子脆不壽此五之所以無子也然婦人有所產皆女者有所產皆男者誠能訪求多男婦人於宮府有男之道也王曰善未聞生六男夫婦恆婦人子宮乾澁不能攝愛精華宜滋陰養以四物加黃柏香附之類（按東垣有六味地黃丸治婦人血少陽亦有子之道也）

云黑瘦性急之人經水不調不成胎者為子宮乾燥不能藏受精華用涼血降火燥血不可用辛燥之藥服盛者或飲食素厚乃躯脂滿溢閉塞子宮宜行血溫燥痰南星半夏川芎活石防風羌活或導痰之類

東垣治叔和娶得子至二歲後身主紅絲瘤不軟變三四子肾病瘤而死問何由而孀予細思而得之乃父腎中伏火精氣中多有紅絲以氣相傳於子故有此疾遇觸而動發於肌肉之間俗云胎瘤是也今試視之果如所言宜以滋腎丸方見補門數服以瀉腎之火邪補真陰之不足忌消辛熱之物其妻與六味地黃丸方見虛損以養陰血受胎五月之後以黃芩白朮二味作

散咳五七服後生子前證不復作矣

灸法　中極　子宮

○斷孕法一百六十八

婦人生理不順怕產者宜服九龍丹令脂膜生滿子宮則不受孕如後再要孕者以車前子為末每一錢酒調服脂膜自開又再孕矣　枸杞子　金櫻子　山查子　佛座露　熟地黃　芡實　蓮肉　白茯苓　川歸等分為末酒糊丸每三五十丸或酒或湯下男子服之亦精清腰健

斷孕丸　黃芩半斤為末用水銀三錢研勻水調丸綠

法　白麪一升無灰酒五升作糊煮至一半濾去查分作三服經水至前日覺次早五更及天明各吃一服經即行終身無子矣

○欲墮一百六十九

欲墮方　附肉桂　牛膝各一兩　瞿麥半兩　瓜蔞根二錢

法　蠶布帶一尺燒灰醋湯下永不產也

去胎散　有孕二三箇月欲去者服之　鬼箭羽　獨滑　牡丹皮　赤芍　蘇木　乾漆　川牛膝　紅花等分　右水煎入蚯蚓水蛭各一錢炒為末空心服之即下若四箇月後決不可服恐損母也

○產前一百七十

脉法 見前編婦人門

丹溪云 產前當清熱養血九產前有病先以白朮黃芩安胎為主然後用治本病之藥加肌熱者以參苓痛腹痛以白芍藥并草有氣加宿砂香附或枳殼食少加神曲麥芽惡阻雖用醫利必用補養為主饑要不脫產之病從厥陰經論之無犯胃氣及上二焦謂之三禁不可汗不可下不可利小便發汗若同傷寒下早之溺利大便則已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法雖不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣產病天行從證增損四物是也妊娠所忌之藥詳見傷寒門

○墮胎一百七十一

丹溪云 乃氣血虛損不足榮養而墮猶枝枯則果落葉凋則花墮又有勞慾飢情內火便動亦能墮胎猶盛

風其木人折其枝起火能銷物造化自然病源乃謂
風冷傷於子藏此未得病情者也大抵因於內熱而
虛者於理為多蓋孕至三月正屬相火所以易墮不
然何以黃芩熟艾阿膠為安胎妙藥耶（又方見產後門）
一婦有胎即墮其脉左大無力重取則濡乃血少也以
其妙年只補中氣使血自榮濃煎白术湯調黃芩末
一錢服之至三四兩得保全安而生（又見前漏門）
雖著云半產多在三箇及五月七月除跌撲損傷外若
前次三箇月而墮則下必如期復然蓋先於此時受
傷故後至期必應乘其虛也半產者產後須多服養

氣血固胎元之藥以補其虛損下次有胎先於二箇半月後即服固胎藥十數服以防三月之墮至四箇半月再服八九貼防過五月又至六箇半月後服數貼以防七月及至九箇月內服達生産散十數貼可保無虞其有連墮數次胎元損甚者服藥須多久則可以留用四物加參朮陳皮茯苓甘草阿膠條芩艾葉多氣加香附宿砂有痰加薑製半夏調理妊娠在於清熱養血條芩乃安胎聖藥清熱故也暑月宜加用之養胎全在脾胃譬如鍾懸於梁折則墮矣故白朮補脾為安胎君藥若因氣悶致胎不安宜川芎陳皮

茯苓甘草多加宿砂少佐木香以行氣一

○固胎一百七十二

加減方 以八物湯減茯苓加陳皮炒術七錢貧者少加黃連黃柏糯米煎服血虛不安加阿膠痛加續斷

○安胎一百七十三

安胎飲 治孕成之後覺胎氣不安或腰微痛或服間作疼或飲食不受者服之或五六箇月常服數服

四物湯加白术人參陳皮黃芩甘草砂仁紫蘇薑水煎

又方 白术黃芩炒神曲砂仁炒白术酒炒黃芩各等分為末每服二錢水一盞煎至七分食前服

天行不息所以生七而不窮羌蒼子活血行氣有補陰

之妙命名益母以其行中有補也故曰胎前無滯產後無虛黃芩白朮乃安胎之聖藥恰以黃芩為寒而不敢用反謂溫熱藥能養胎殊不知胎孕宜清熱凉血使血循經而不妄行乃能養胎黃芩安胎乃上中二焦藥降大下行也必取細條放水中沉者用之宿砂八九箇月內不但名順安胎胎扁行氣故也

胎因火動逆上作喘者急用條芩香附之類為末酒下

胎動不安　芎歸文蓼阿膠各二錢甘草一兩　水煎服

附白朮散　安胎　白朮　川芎　黃芩

牡礪　和玄滑下二錢

○胎不動一百七十四

立效散　治胎不動下墜腹冷如冰

川芎　川歸等分　水煎服

胎產百七十五　妊娠而漏下也

丹溪云胎漏氣虛血虛有熱血虛以養胎氣虛以攝胎氣虛有熱則不能攝血血虛有熱則不能養胎故胎動不安或下血或漏下或小腹痛或腰痛或墜痛或脹痛或胎動而不安或胎動而下血或胎動而腹痛或胎動而腰痛或胎動而墜痛或胎動而脹痛或胎動而漏下或胎動而小

○胎痛

因血少四物加香附為末紫蘇湯下許氏云妊娠婦人惟在胎湯助陰

壅此等藥甚多然胎前惟惡藉若陰陽交差則生他症惟扶拔散瘀所以御陽四物陽明以助陰故用然枳殼散若寒寒單服之恐有胎寒則痛之患以內補丸治之則陽不敢強陰不致弱而陰陽調停有益胎嗣此簡人未之論也古方有地黃當歸湯治胎痛以川芎一兩熟地黃二兩為末水煎服或酸丸服名內補丸服最之尤妙

○惡阻

[附]溪云惡阻乃有孕而惡心或吐阻其飲食也多於夏一云或白治相持也治用二陳湯之類或白术丸服又云肥人是痰虛人是熱

婦女嗜酸物乃一臟之虛也如嗜酸物乃肝臟正能養脾而虛也

一婦孕二月嘔吐頭眩醫以參朮川芎陳皮茯苓服之愈重脉弦左為甚此惡阻病必怒氣所激問之果然肝氣既逆又挾胎氣參朮之補大非所宜以茯苓湯下柳青丸廿五丸五服稍安脉象數口乾苦食則口酸意其腸間滯氣未盡行以川芎陳皮山楂生薑茯苓煎湯下柳青丸十五丸而愈但口酸易乾此肝熱未平以熱湯下柳青丸二十粒愈後兩手脉平和而右甚弱其胎必墮此時肝氣既平可用參朮以防之

服之一日而胎果自墮矣

附方

茯苓半夏湯 千金治惡阻心悶吐逆頭眩四肢煩疼痰癉逆噁惡食汗惡寒黃瘦 半夏泡七次 生薑五兩 茯苓 熟地各三兩 橘紅 細辛 人參 芎藭 紫蘇 川芎各二兩 甘草各半兩 右剉每服四錢水煎服

參橘散 治惡阻 陳皮 茯苓各一兩 麥門冬 白朮 石斛 甘草各半兩 水煎 方有人參竹葉

壯娠血塊百七十劑

許學士治妊娠血塊如盤　香附四兩去毛　桃仁兩去皮尖
海石二兩研末　白术二兩　右為末神曲糊丸
如轉胞加木通上百七十八

附方八味丸治鴨胞門又治秘

胎腫百七十九

用溪云有孕而手足或頭面通身浮腫者是也蓋濕多
用山栀子一合炒為末米飲下先服亦可

三因鯽魚湯治妊娠水氣　白术一兩　大腹皮　陳皮
白术散　亦治　白茯苓各半兩　右為末每二錢米飲下一方有桑白皮

一婦人年三十八汗娠水腫以鯉魚煮吻加五苓散入麥
澤加蒼朮一錢等朴陳皮五分羅漢子炒車前子澤
石各一錢水一貼若尿急加若尿澄小便不利加牽
牛甚者車前子澤瀉川散其濕毒自消防已治勝已下
濕熱腫如內傷胃弱者不可用也

○千氣百八十

附天仙藤散　治成胎之後自腳而漸腫并腰膝支喘
悶飲食不美狀如水氣或脚指縫間有黃水出者名
曰子氣　天仙藤炒香附米炒陳皮　甘草
烏藥等分　右剉每服三錢薑三片水瓜三片紫蘇三

葉空心食前服日三次腫消止藥

○寒熱百八十一

附小柴胡云半夏治胎婦寒熱

血虛加四物氣虛加參朮

○胎婦心痛百八十二

附方治胎婦心痛因宿寒搏血亡凝其氣故痛

五靈脂　蒲黃炒　為末醋下又医按見心痛門

○子煩百八十三

子煩心煩悶亂煩悶為子煩因二火為之病則苦煩悶

茯苓　麥門冬　黃芩　防風　竹葉　水煎

竹葉湯　白茯苓四分　防風　麥門冬各三兩
右剉每四錢竹葉五片煎方見知母竹瀝無竹葉

○子癎百八十四

附子癎　妊娠中風頭項強直筋脉攣急言語蹇澁發
延不利或時發搐不省人事名曰子癎

羚羊散　羚羊角鎊　獨滑　酸棗仁炒熬各一
五加皮五分　防風　當歸　川芎　茯神
杏仁名以去皮尖　木香　甘草各三分
右㕮咀一貼薑水煎服

○子淋百八十五

附方安榮散　治妊娠小便澁少名曰子淋

麥門冬　通草　滑石各三錢　當歸　燈心
甘草各半兩　人參　細辛各一錢　為末麥門湯下二錢

○妊娠病百八十六

胎漏　詳見前門

○子懸百八十七

附方紫蘇飲　治胎氣不和湊上心腹脹滿疼痛為子懸

大腹皮　製見後　川芎　白芍藥　陳皮
蘇葉　當歸各一兩　人參　甘草各半兩　薑水煎

○胎死作喘百八十八

呂元膺治經歷哈敖侍人病喘不得卧衆作肺受風邪

治之召診之氣口盛於人迎一倍脈陰弦動而疾二
尺短而離經告曰病蓋得之毒藥動血以致胎死不
下牽迫而上冲非風寒也乃以催生湯倍芎歸煮二
三升服之夜半下一死胎啼止略飲餐嘱曰病毒誠
有懷以室人見嫉故藥夫之衆所不知也乘衛而去

下死胎　桂心射香當門子一箇為末酒調服

又方　芎歸湯調以射香當門子三粒大黄一錢末上

赤童虫末蛭末服之

又方　朴消半兩　童便下

胎衣不出百八十九

胎漬傷不安腰痛腹滿擔心短氣者

阿膠散　即四物湯加艾葉阿膠黃芪甘草薑棗水煎

○妊娠調理百九十

妊娠常服　四物去地黃加黃芩白朮為末酒下

又宜隨症加減用之可也

知母飲　治心脾壅熱咽渴煩悶多驚

赤茯苓　黃芩　黃芪各三兩　知母　麥門冬

甘草各二兩　桑白皮　每服四錢水煎加竹瀝服之

東胎丸　七八箇月服　黃芩（咳夏一兩春秋七錢半冬半兩）白朮二兩

茯苓七錢　陳皮三兩　忌火　右末粥丸桐子大湯下四十丸

九箇月服　黃芩（怯弱者減半）　白朮（各一兩）　滑石　枳殼（各七錢半）

右為末粥丸湯下（一云八九箇月必用順氣枳殼紫蘇煎）

達哺生散　八九箇月服數貼甚妙　白朮　當歸（各一錢）

大腹皮（三錢緊要云此藥不宜用許多三錢宇恐誤今用一錢足矣陳真人云謂鵝鳥多擾此胎宜先以酒洗乃以烏豆汁洗方可用今人多不依此製當見一婦服之即下血而死其可忽諸）

人參　陳皮　紫蘇莖葉（各九分）　白芍藥（名一錢）

炙甘草（一錢）右作一貼入黃楊腦七箇葱五葉煎服夏加黃芩或黃連五味春加川芎防風秋加澤瀉冬加宿砂或通加枳殼宿砂胎動加金銀花根氣上加紫蘇地黃胎上逼鼻亦同性急如柴胡多怒加黃芩倉

小加宿砂陽加麥門冬黃芩能食加黃楊腦有痰加
黃芩半夏

臨月服　當歸　川芎　黃芩　陳皮
白朮　香附各一錢　白芷五分　甘草三分

右剉水煎調益原散一錢虛加人參一錢

胎熱將臨月　三補丸加香附灶白芍藥餌餅丸服

胎肥將臨難產臨月服之　炙甘草一枳殼炒二兩　一方
加川歸二兩木香二兩　一方加香附一兩為末每二錢湯點

益母丸　安胎順氣及橫生逆產胎前產後一切等證

益母草 即野天麻五月五日採陰乾不可犯鉄器拆為末煉蜜丸彈子大每一丸酒二元臨產童便和酒下或煎白湯調下加油蜜童便和勻治難產

催生散 白芷 炒焦 百草霜 滑石為末等歸湯下

紅蒿 即馬蘭見下胎甚妙臨產煮食之

無憂散 治胎肥氣逆或瘦人血少胎弱難產

當歸 川芎 白芍 各一兩 枳殼半兩 乳香三錢 木香半錢 血余灰二錢 甘草 為末每二錢水煎服

催生如意散 臨產腰疼方可服 人參 乳香 各一錢 硃砂半錢 研細臨產用雞清一筒調之再用薑汁調冷服治橫生倒產者服之自順

催生丹　治生理不順或橫或逆

兎腦髓臘月取去皮膜研如泥　乳香另研五分　妙丁香二半

射香五分半另研　為末以兎腦和丸如雞頭大陰乾油紙

裹每一丸水下即產

乳香膏　滴乳為末猪心血丸桐子大朱砂為衣每一

丸面東酒下如胎未下再服若胎乾先與四物湯

補脾丸加潤下丸可作催生用服此必無產難見胖員與腧門

脉法　君溪云　難產多是氣血虛亦有氣血凝滯不能轉運者

○難產百九十二

一細勻易產大浮緩氣散難產

亦有八九箇月内不謹者

難產作膏地黃膏牛膝膏天麻膏亦妙

難產多見於貧閭安逸之人富貴家其實艱辛苦者少有也古方瘦胎飲一論內胡陽公主作也實非極至之言何者見有此方其難自若予族姊苦於難產後遇胎孕則觸而去之予甚憫焉視其形肥而動於針指精思旬日忽悟曰正與湖陽公主相反彼奉養之人其氣必實耗其氣使和平故易產今肥人知其氣虛久坐知其氣不運而愈弱久坐腿胎因母氣弱不能自運耳當補其母之氣歸元讓而動氣

今其有孕至五六箇月遂以大全紫蘇飲加補氣藥與十數貼因得男而甚快後遂以此方隨母之形色性稟參以時令加減與之無不應者因名其方曰大造生散方見前

大全方中別有方可選用茲以緊要論方補於其下

附方

治難產

宿砂　香附　枳殼　甘草

為末湯下又一錢在下

滑石

為末湯下又一錢在下

蓋母草為末以香油蜜小便各半盞和勻調下

天麻丸即前孟母丸易產除產有病

如聖散　黃蜀葵花焙乾為末湯下二錢神妙或漏血胎下難產痛劇者併進三服良久腹中氣寬胎滑即時產下如無花以子研小半合酒下妙

濆傷死胎不下煎紅花或酒調下一云蜀葵子四十九粒研細酒下

難產　蛇退一條全　鹽布帛一塊入新產中鹽泥固濟燒存為末煎榆白湯下

難產并胞衣不下并死胎　草鞋子一乙丘大者研膏塗脚心胞衣即下若下急洗去否則腸下

一方　臍帶毛頭一枚燒灰為末煖白煎湯下二錢立生

○驗胎死百九十三

其證產母舌青黑及胎上冷或指甲青青青服過甚者
口中作臭此皆胎已死也
先以平胃散一貼酒水各一盞煎至一盞添入朴硝
半兩再煎數沸溫服胎化血水而下

鹿角散 治因熱病胎死腹中

鹿角屑一兩 葱白五莖 豆豉半合 水煎服

當歸湯 治胎死不下 當歸三兩 川芎二兩

為末酒水各半調下四錢未下再服

香桂散 下死胎 射香五分 桂心二錢 作一服酒下

一方 朴硝二錢 童便調下又一剉衣

下胎丸　半夏生　白歛炮各半　為細末薑汁米丸桐子大食後半夏湯下二三丸漸加至五七丸如未効漸廣大其藥愈白安散主之又不効以大聖散主之

宿熱人血人參荊芥散

礞砂散　下死胎　礞砂研細　當歸各一兩　為細末分二服酒下如重車行五里不下再進一服

一云難産者乃敗血衆其子吟　射香

塩豉一兩燒紅為末　以新瓦焼紅淬水下二錢

又方　百草霜　白芷　伏龍肝

為末童便調醋下未下再服

○盤腸產百九十四

或曰有盤腸產者臨產則子腸先出而後產子產子之後其腸不收醫莫能治其法以醋半盞冷水七分調停噴婦面每噴一縮三噴收盡此良法也

一法　半夏末搐鼻中即收

或大蒜搽以麻油潤了點燈起煙以烟熏鼻中即止

○胞衣不下百九十五

古方論胞衣不下者由先時用力太過體已疲極不能更用力產胞經停之間而外冷氣乘之則血道乾澁故胞衣不出須急治之不宜於兒也又曰多由生子

後漏血入衣中衣為血所脹故不得下治之稍緩脹滿腹中上沖心胸疼痛急者急服奪命丹以去衣中之血血散脹消胎衣自下更用牛膝湯亦効

胎衣不下　朴消一錢　童便下熱飲立下

奪命丹　附子半兩炮　牡丹皮兩　乾漆一兩炒煙盡　為末以醋一升大黃末一兩熬成膏和丸如桐子大酒下七丸

牛膝湯　治胞衣不出腹脾脇脹急痛即殺人脹此胞即爛下亦下死胎　牛膝　瞿麥各四兩　當歸三兩　通草　滑石各八兩　葵子五兩　水九升煮三升分二服

胞衣不下或子死腹中或血沖王脊閉或血暴下及胞

乾而不散者名半夏湯　半夏曲平一两　桂七錢一
大黃半兩　桃仁三十介去皮尖　為末先以四物湯三二服
次以此藥三錢益水煎服未効次服下胎丸見前