

永樂大典

卷九百八十一

永樂大典 卷九八一

永樂大典卷之九百八十一 二支

兒 小兒證治十四

小兒慢脾風

論

切切新書茅先生方小兒生下有中慢脾風候時時吐嘔頻頻咬齒手足掣瘈舌卷頭低兩眼上視先頭低而次第高此候久瀉痢而下冷藥只止瀉痢不治得脾是以脾虛弱臟腑乘虛故此所治先用引氣散調一日後便下一醉膏通下後用治脾散夾鎮心丸建脾散常服之即愈若更喘吐五硬如角弓風死候不治玉訣方小兒慢脾風候是傷寒疹子膚醫未明表裏便即宜利臟腑更使冷熱藥相通故小兒發搐眼不到脾因極不醒手足不收此病但回陽醒脾調治方愈若更吐瀉必定損命也許叔微本事方治小兒有陽痲陰痲慢脾風三證皆搐搦上視陽痲者俗所謂急驚也陰痲者俗所謂慢驚也皆可隨證治之惟慢脾因吐瀉脾胃受風為難治雖得藥近世多用土附子及青州白丸子金液丹合用之如醒脾丸皆

永樂大典卷九百八十一

一

要藥也楊仁齋直指方慢脾風之候面青額汗舌短頭低眼合不開困睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不收或身冷或身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛度惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若癘驚則無驚可癘但脾間痰涎虛熱往來其眼合者脾用氣之神志沉迷痰涎凝滯然爾世所謂慢風難療者慢脾風是也然慢脾一名虛風凡小兒或吐或瀉之後面色虛黃大勢虛損若因虛而發熱雖此必得慢脾風候見搐頭斜視以手摸人昏困喜睡額上汗多身亦粘汗其聲沉小而焦即是脾風之證不必皆由急慢風傳次而至又當識之治法大要土胃回陽黑附湯川烏散金液丹白丸子各半生附四君子湯可斟酌用胃氣漸復則其功散筆溫平而調理之如蝎附散陰痲散靈砂震靈等亦可參用若其眼半開半合手足不冷證候尚在慢驚則勿用回陽 或已入慢脾而陽氣未甚脫者亦不可用硫黃附子凡眼回陽湯刺手足漸暖者仍以醒脾散等繼其後以調之 慢脾下痰輕者神保既濟丹白僵蠶丸重者辰砂膏甚則七寶妙砂夾慢驚慢脾逆惡證候諸藥不效者如有太衝脉則取百會穴灸之此治慢脾風之大要法也 凡百會穴詳具于後慢脾身冷粘汗

直卧如尸喘嗽頭軟大小便不禁背插口喙頭搖者最難為力演山省翁
 活幼口議慢脾風候治法其議曰慢脾風候即是慢驚風所傳元由吐
 瀉脾虛驚與風傳入故曰脾風謂其脾家受風若更逐風無風可逐若也
 退驚無驚可療但有瘵涎虛熱來去兒病至此所以難醫蓋由證與候驚
 與風傳經已極總歸虛虛惟脾所受何故不曰胃風胃屬陽其病即傳陰
 臟故無胃候兒既尚有胃氣可以一向生胃兼與回陽即漸甦醒若更一
 向攻擊驚風脾亦不受而又傳散諸經不可得而加藥若見眼合即是脾
 風宜服下項藥 議治慢脾風乃是不不得已而設其疾危如燈無油漸見
 昏滅錢氏所用全液丹又青州白丸子各半細研和勻飯飲薄荷湯下一
 錢半錢許此乃截風回陽又一方以四君子湯加黑附子末四分之二脚
 手冰冷者用和對半上蓋棗子煎與服此方古人用之豈不同常所較下
 項良方亦盡世之善也 議治慢驚慢脾須禁腦麝粉水銀粉霜之類
 及寒涼動臟腑等或以燥熱但不可用只宜回陽醒脾湯使與服議慢脾
 風候十箇孩兒九箇以艾炷之須當斟酌病候有已未脉絕之理若也一
 賦絕即不可用藥謂如眼無光指甲黑四肢垂痺五體俱冷並不可起強
 下藥 議慢驚風候至於痰涎在膈之時諸候皆盡喉中聲如拽鋸一二

永樂大典卷九百八十一

二

日之間不散但只閉目此乃虛之盛也只是虛痰飽養其氣未有所知之
 者直便下去痰涎其兒隨時化去宜用下項妙砂丹服之乃良議嬰孩所
 患急驚慢驚慢脾三者皆由風痰所作以漸傳及未有初得病而便慢脾
 或急驚傳來或即吐瀉而得久利其氣虛脫而得傷寒表裏俱虛傳入陰
 證亦成慢候久嗽成癩亦傳慢候霍亂吐利亦傳慢候脾困久睡亦作慢
 候吐血亦傳慢候壅積衝心亦傳慢候肝風筋急亦傳慢候大小便閉亦
 作慢候心虛煩躁亦作慢候煩渴引飲亦傳慢候腹疔痛亦傳慢候睡
 裏咬牙亦傳慢候日夜汗出亦傳慢候走馬疳急亦傳慢候諸般丹毒亦
 傳慢候龍帶纏腰亦傳慢候膀胱疝疔卵腫莖曲亦傳慢候 凡此皆由
 四體浮腫亦傳慢候以上小兒所患諸疾皆能傳作慢驚風候由慢驚
 乃傳作慢脾脾氣既絕胃氣已盡無可得而治療故也 議嬰孩五臟易
 冷易熱易虛易實醫方並不治腑受病曰脾不病耳曰非也小兒在腑有
 疾自愈者有之在臟不可不治臟者陰屬腑者陽屬謂小兒先陰而後陽
 又曰小兒乃純陽之氣在腑則順在臟則逆故前賢皆理其臟未言治腑
 也又腎一臟常主虛不可攻療若有腎臟患但清心肺緣心與腎即既濟
 也肺與腎乃子母也無與腎藥及諸補藥若治腎臟即他病發生故戒止

不可療 誤嬰孩慢候皆由臟虛陽虧陰虛感小兒所患臟病陽虛陰虛者無不入慢候而斃惟吐與瀉利與積致入慢候其證速也虛又速也宜
和且平更用調脾養胃萬萬不可過劑用冷熱湯藥若失之即吁哉切切
新書茅先生方小兒受慢脾風歌 四肢逆冷體沉迷困宜吐瀉補運脾
胃冷而涎擁肺心主毒熱面青時如此呼為慢脾候更加喘嗽不通賢
小兒形證論四十八候慢驚傳慢脾歌 慢脾只因傷取轉吐瀉虛涎脾
胃存四肢逆冷頻頻嘔沉困難醒豈易明眉紅目閉手微搐病行心藏及
脾神昏者鎮心為上法更開闢竅細詳論莫令加喘頭先軟眼白濛濛命
不存 此病是驚風傳入胃胃無有虛涎下大青丹一二服更將搐鼻散
開關大青丹方見急驚風門搐鼻散方見本門次用醒脾散方見本門中
又四十八候慢脾將死候歌 驚入風癇轉在脾直眠不動即如尸搐搦
已休牽掣定為他安好不生疑便通大小難收乳過體如冰汗若泥瞑目
不開長似睡睡中不覺赴幽期 又四十八候慢脾候肺歌 慢脾多睡
重重取吐瀉傳脾胃轉虛逆冷四肢多重困虛涎脾伏感難除生風肺藏
淨邪權任喚千聲氣不舒莫使目瞑無項欬十中難保一人楚湯民望嬰

孩妙訣總要吐瀉成虛風歌 吐瀉才止便惡心胃虛脾弱汗相侵舌出
唇燥雙眼閉搐頭髮直起如針觸胸氣震兩脇動口生瘡白命難任未生
此證宜先治有瘡胃閉命瀕沉 又歌曰 未候慢脾先要困睡中吐舌
更搐頭吐沫作怪生氣息顛頭十顆汗珠流睡裏多驚驚哭起面黃脉細
最堪憂醒脾助胃成功劫傷你依前命也休 吐後止驚歌曰 吐乳從
未胃氣實妳滿胃中生吐逆吐多過身有風主驚邪本是從斯得吐定無
過腦後溢吐出妳未無變色先與定吐後祛風如此醫派無費力 又歌
曰 慢脾之候脉微微昏昏只睡難辨之或若搐頭并口噤萬中無有一
能醫 凡有此疾先用奪命散青州白凡末煎如稀糊入家調控下涎然
後服祛風醒脾等藥經濟小兒保命方書慢脾風證歌 脾風先要睡吐
舌更搐頭面青毛髮直脚手曲如鉤吐妳腥臊氣十顆淚珠流來汗道腸
効只恐瀉不休 慢脾風證若是急驚傳來而尚有陽證其陽即虧不必
回陽文不可治陽只可祛風調胃均平陰陽可冷可熱可暖可急是也
慢脾死證此病屬陰因吐瀉胃氣虛變成慢驚慢脾風四肢逆冷面色青
黃沉困氣喘此是陰成後了陽氣不舒脾胃空虛生涎肺藏受風氣青高
脈滑此慢驚也不得下涼藥取吐先用發汗藥運陽後下驚藥如加白痰

去眼睛若更氣急。瀉下黑色。喉逆不治。死候。慢驚慢脾二證歌。長吁
多困面青黃。呢乳痰土胃氣傷。風或涎多驚。瘰癧脾利偏。藥為序。若
有此等形證。可下竹瀝散。及通關梅花飲。于無與能。麝砂膏。小兒命散。
次與司氣調胃藥。

方

茅先生方活脾散治小兒慢脾驚風。

羊糞二十一兩

丁香一百粒 胡椒五十粒

右為末。每服半錢。用多年東日照處壁上煎湯調下。

醒脾散治小兒慢脾風。

馬芹子

白礬

丁香

右三味等分。為末。每服一錢。用炙橘皮湯調下。

一醉膏治小兒慢脾風。

花蛇草

蝎尾

天南星心

川烏脾

大附子側

蜈蚣五粒

右六味各半錢。土用使棗肉五十箇。用前藥研成一塊。子以磁屑滴
水和。丸黍米大。每一丸。用薄荷自然汁磨化。下後。通下。可依依形候。

永樂大典卷九百八十一

四

用一串藥子調理。

四十八候醒脾散方

天南星一箇。去皮。俾用木砂入。在而。且。臍內。不。滿。以。地。裏。慢。火。炮。

白朮一分

右為末。每服半錢。更入麝少許。煎冬瓜子湯調下。如為丸。以生葱涎
丸。如粟米大。每服十丸。鴈砂湯下。後與調胃散。方見種熱門中。

四十八候傷鼻散

瓜蒂一錢 細辛一錢

右為末。用半字吹入鼻中。打噴嚏。下候。眼開。便將大青丹下。積熱。并
下驚涎。後調氣。大青丹方。見。慢驚風門。

慈眼觀證。沒石散。慢脾候。此藥醒脾。

沒石子二兩

朱砂三錢

滑石研

白礬

丁香各二錢

半夏一兩

生薑三兩。使細。日。浸。水。一。椀。時。中。

夏。碎。研。入。以。水。用。麝。取。出。以。地。一。錢。乳。鉢。內。使。細。搜。作。餅。子。炙。

熟為末

右為末。每服半錢。以冬瓜子煎湯調下。不拘時候。

永樂大典

卷九八一

劉氏家傳治小兒慢脾初至者皆可服其狀用睡不醒或啼不已

全蝎兩箇以竹針穿穴灸香熱木之 麝香許

朱砂 西壁土兩兩火半有聲泥在干以四研

右和勻乳汁調下一字二三歲已去量添至半錢或三字亦得又濃

煎金銀湯調下又蜜湯亦得

胃虛餅子治小兒吐瀉後生風慢脾者多效火瀉者亦治

丁香五十粒 藿香葉許一分木香 韶粉

大附子炮各一棗子大一云各二錢

石馬木攪勻生薑自然汁作餅子○用鹿燈蓋內水煮軟化開服或

要急用作散子八棗子一枚煎

皂活膏治小兒急慢驚風或因吐瀉後脾胃虛傳作慢脾之疾

皂活 獨活 人參 白茯苓

肉桂 木香 防風二上各三錢

水銀 硫黃 全蝎各二錢 金銀箔各三十片

真麝香一分

右馬細木蜜和為膏每服一黃豆大薄荷湯化下

張氏家傳醒脾去虛風

大附子一錢去皮併炮 大全蝎七錢 大白附子三箇炮

天麻二錢

右件為細末每服半錢濃煎冬瓜子湯調下

釣藤飲子治小兒因吐或瀉體虛發搐作慢脾魚口直視睡不醒眼目不

開 釣藤 防風 麝香 麻黃各一分去節用

蝎梢 蟬殼各十枚

右為細末每服一字半錢二錢大小加減薄荷湯調入醋一滴調勻
服如四稍服送八附子三兩片開水五分薄荷一葉煎二分煎服連
進三二服或吐瀉體冷多睡用附子半錢炮去皮臍為末或作到散
白朮一錢肉豆蔻一箇甘草炙一寸棗一箇水六分慢火煎至三分
溫二服作兩服體便暖只煎四君子湯加沉香橘皮喫五六分更喫
暖驚藥三兩服乳母忌口不得再驚

莊氏家傳小續命丸治慢脾風

附子大一枚 麻黃黃許大 蝎梢七枚

右為末生薑麴丸黃米大量兒加減十凡至百丸治小兒大瀉危

治慢脾極妙煎散子

乾薑半兩 甘草一分

右同於一篋合子內用火煨存性為末取須冷好通引力大便不及則以丸散每服一錢或半錢濃煎烏梅湯調下臨時更看男女大小加減服之須是目垂面白慢脾形候即與喫

孔氏家傳治小兒慢脾驚風

右以代赭石不拘多少細研水飛過研冬瓜仁湯調下量兒大小與半錢或一錢小兒因疳瀉後眼戴上三日不乳目睛通黃如金色取將消絕止服三服全愈

王氏手集治小兒慢脾風萬安散方

厚朴上炭炙以水一盞煮後細切焙乾 乾蝎七箇尾節全
右以代赭石不拘多少細研水飛過研冬瓜仁湯調下量兒大小與半錢或一錢小兒因疳瀉後眼戴上三日不乳目睛通黃如金色取將消絕止服三服全愈

右並濟羅極細再入乳鉢內與米砂研千百遍每服半錢或一字煎金銀薄荷湯調下但小兒服藥後微汗出是效凡小兒欲作慢驚必先壯熱多睡頻吐若吐止即驚止吐不定作慢驚號為難治有此吐證以金液丹主之此方傳與人必不信但只與藥金液丹研細令細以滴水為丸黃米大用米砂青黛為衣每服五十九以上以下不濟事用米飲下定吐效生丹亦甚佳然有十三四不能止者此方百無一失若有雖止已成慢脾者萬安散救之亦無失者但費心力耳不然十有八九不救此二方不可具述千萬秘之非至誠好事者不可妄傳

吉氏家傳米砂散治慢脾風

米砂 天麻各一錢 僵蠶七箇 天南星一箇

白花蛇頭下四一塊七十九 麝少許 蜈蚣一條

右為細末每服一字薄荷湯下

活脾散治小兒脾肉成慢脾風

天南星去皮 半夏 白附子各半

右為木每服半錢一錢小者一字用冬瓜子七粒薄荷二片酒少許或入水少許同煎

朱氏家傳獨精膏治小兒久病後或吐瀉主驚悸成慢脾候

嗎積不以多少為細末一兩用新好者

右用石榴一枚開作瓦子去子以無灰酒半盞調搗末入石榴以瓦子蓋定置文武火上時時攪動熬成膏子取出放冷每服一錢用全銀薄荷湯調下急驚勿服

治小兒慢脾風吐奶霍亂吐瀉

丁香一錢 藿香三錢

右為末鍊蜜為丸如茶豆大每服三丸或大既吐瀉米飲下半錢

安師傳治小兒慢脾風藥方小兒果醫不效用此藥全可

附子也製去肝木香不見人 肉苁蓉煨 土硫黃月燒水同

度命者不用其則失而者酒土

右等分為細末每用冬瓜子四十九粒水六合煎至三合入藥一錢再煎至一合為一服治身冷汗出至虛緩搖者

長沙醫者毛彬傳銀白散治小兒胃虛吐瀉煩渴成慢脾者

永樂大典卷九百八十一

七

乾葛 人參去蘆 白茯苓 山藥

白橘豆各半兩半夏一分湯洗去滑薑乾成餅炒黃

糯米一合酒洗薑汁浸一宿炒黃

右件同為細末每服二錢水八分薑二片同煎六分溫服

長沙醫者鄭愈傳醒脾散治小兒吐瀉脾虛生風已上二十二方出切切

辨書

藿香葉 人參 白茯苓各一錢 天南星一箇重七

錢者去心人磁沙一錢丁香一錢在兩星內上面封用星心末封

已便火煨熟切碎

右件為細末每服半錢入冬瓜子少許同煎至三五沸溫服

許叔微普濟本事方醒脾元治小兒脾風因吐利後虛因昏睡欲生風厥

厚朴 白木 舶上硫黃 天麻各半兩

全蝎 防風 人參 官桂各一分

右為末酒浸蒸餅和丸如鷓頭大每服一丸棧研溫米飲下

又方

全蝎二箇青薄荷葉包煨 白木檳面大二錢

麻黃長五寸十箇去節
右細末二歲以下一字三歲以上半錢薄荷湯下量大小加減服
人參散治脾風多困

人參

冬瓜仁各半兩天南星一兩切片用漿水薑汁炙

右細末每服一錢水半盞煎二三分溫服

蝎梢丸治小兒胎虛氣弱吐利生風昏困嗜卧或潮搐

全蝎

白附子各半兩

通明味黃

半夏一兩切半薑汁炙

右為末薑汁糊丸如麻子大每服三十粒荆芥湯下更有大小加減

服

濟急捷用單方萬靈散治小兒吐瀉變為慢脾風百療不能治者但覺繞
吐瀉即與服

右用天南星可一兩者先築地為一深坑子可數寸深以炭火二三
斤煨令地赤以酒一瓊許沃之乘熱置天南星於坑中急以泥覆令
室候冷取出為末以防風煎湯調一字或半字量兒大小虛實與服

永樂大典卷九百八十一

八

極有殊効須得天南星破裂乃可用

李檀小兒保生要方羌活膏治小兒胃虛吐瀉生風

羌活

天麻

防風各半兩

人參

白茯苓

蝎梢

桂各二錢

朱砂一錢

水銀

研黃二錢重與水銀同研如泥

右先將八味為細末入水銀硃黃勻煉蜜為膏每服一皂子大用荆
芥薄荷湯化下食前服更量度加減

楊俊家藏方銀白散治小兒吐瀉之後脾胃虛弱貪睡露睛漸生虛風

人參

白茯苓

白朮

山藥

天麻

全蝎去毒微炒白糯米炒七味各一兩

甘草一分炙

右伴以咀每服二錢水六分薑土薑一片棗一枚同煎至三分去滓

溫服乳食空

醒脾散治小兒脾胃昏睡面色青白内生虛風不進乳食

人參

白朮

白糯米炒

白附子

天麻

酸棗仁

土月已上七味各等分

永樂大典

卷九八一

右件為細末每服半錢煎生薑東湯調下乳食前
湯凡望嬰孩妙訣總要凡有此疾宜暫斷乳控令胃乾飢甚當用藥令乳
母曠其姊與之十枚一二服乳法

人參

木香

藿香

沉香

橘皮

神麩

麥蘖

丁香或干餘各等分

右件以咀每服秤四錢水一椀薑十片紫蘇十葉棗三枚砂瓶內煮
至半碗乳母食後捏去奶汁盡方澄服半盞許即仰臥宴待令藥入
乳之路次令兒喫數口不遇飽此乃良法也唯定一日了急宜截風
宜服八仙散兩日後醒脾方錄十條

八仙散方治虛風

天麻

白附子

花蛇肉

防風去蘆

南星也

半夏麩

冬瓜子

全蝎各等分

加川烏尤妙

右件以咀每服一錢水半盞生薑二片煎至二分加棗子煎去滓有
熱加薄荷

又方

永樂大典卷九百八十一

九

真川烏一枚土去皮

全蝎等分

人參二錢

甘草炙一錢

右四件細切分三服水二盞生薑二十片煎至半盞逐旋服

吉州傳醒脾散方用之果驗

白朮

人參去蘆

橘紅

甘草炙

白茯苓

全蝎已上各半兩

白附子也

南星二枚炮

半夏麩一分

木香一分

倉陳米二百粒

右為細末每服一錢水半盞生薑二片棗子半枚煎至二分逐旋服
之不可頓服之必吐

又方定吐

青州白丸子

金液丹各半貼五靈脂一錢

青皮末一錢

右四件一處和劑餅糊丸如黍米大湯加減送下

又方治脾風

附子炮一錢

蝎七枚

白附子三箇炮

南星炮二錢

右末每服半錢水三分盞生薑一片冬瓜子五粒擘破同煎至半分

蓋犬小加減

十便良方溫白丸治小兒脾胃氣虛泄瀉瘦弱冷疳洞利及因吐瀉或久病後成慢驚身冷痲疾

天麻二分 白礬錢 白附子 乾蝎

天南星一分

右為末湯浸寒食麵和丸如茶蓋大於寒食麵內養七日取出不暇養亦得每服七丸漸加至三十丸空心薑末飲下即效

魏氏家藏鳩附散治小兒吐瀉日久或大病後生風時發搐搦目睛邪視手足痲痺胃悶昏塞牙體強硬前牙反張又越上枕大又文節

天南星一枚大者重二兩使伴附子一枚重七錢使伴

已上二味生薑四兩取汁及好酒一盞於銀石器中同煮令汁盡培乾

白附子七枚炮全蝎七枚也 辰砂子兩利研代赭石二兩火煨

研細

右伴為木麝香腦子少許煎薄荷湯調下不拘時候少時再進一服小兒身上有小红斑點出即驗也

永樂大典卷九百八十一

十

醒脾散治小兒慢驚脾困及大患後全不進乳食

大天南星一兩每兩切作五六塊用土薑一兩切片厚朴一兩切

碎水三升煮令兩至連揀去厚朴土薑只用兩至薄切焙乾

冬瓜子一百二十粒都愈方用三十粒 白茯苓子兩去皮

右為細末每服一錢水半盞薑一片煎三分溫服或用粳米煎湯調下亦得

郭誦明方便集人參溫脾散治慢脾風大治脾虛胃冷作吐瀉此藥極溫調脾胃

人參 白茯苓 肉豆蔻 丁香

木香 黃芪 白附子 藿香

陳皮湯浸去白焙乾 白礬錢 直者 防風

羌活 冬瓜子仁微炒取仁 山藥

芎藭已上各半兩 北南星半兩每兩使伴四分同時

全黃土裏內一盤黃豆大白為度洗出泥用 甘草一錢使伴

右為細末三歲兒每用一錢水一盞薑三片淮棗一箇煎至五分去滓溫服不計時候量兒大小加減又宜服四君子湯

楊仁齋直指方黑附湯治慢脾風或四肢厥冷生胃回陽

附子也士氏二錢

木香一錢半 白附子一錢

甘草炙十錢

右到散每服三字薑五片煎取其半以匙送下若手足暖而蘇者即

止後劑

川烏散驅風回陽

真川烏生一分全蝎

木香各半分

右為末每服三字薑四片煎取其半旋清入口中嘔吐者加丁香

全液丹凡兩分額白丸子等分祛風回陽二藥為末每服半錢陳米飲調下

主附四君子湯助胃回陽四君子湯加生附子末四分之一厥逆者對加

每服半錢薑五片慢火煎煎以匙送下

蝎附散回陽氣豁風痰

全蝎七箇

附子也二錢 南星也

白附子也

木香各一錢

右為末每服半錢薑四片慢火煎煎旋服

陰痢散祛風豁痰回陽正胃

白附子

黑附子

南星

半夏已上各五分

一分半

右為末并水浸七日逐日換水浸訖控乾次入全蝎末二錢每服一

字生薑湯調下

靈砂正胃回陽能止嘔吐溫利痰涎但渴者宜用為細末以少許米飲調

下或用糕糊凡如粟米大乾兩三丸米飲灌下

震靈丹方見前不願治慢脾風吐瀉不止每服一丸研細人參南木香煎

湯來熱調下

已上諸藥溫熱並乳食前服

神保既濟丹方見前慢脾風

白僵蠶九方傳慢脾陽氣未甚脫者可用亦能散風

牛膝曝南星二錢

全蝎也

直僵蠶少

錢子地龍乾 五靈脂各一錢

右為末水煮生半夏糊丸麻子大每服五丸薑湯下

辰砂膏治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐

黑附子一枚八錢重者去皮臍頂上剉一孔入辰砂末一錢重月
附子末塞之以炭火三斤燒存性為度 南星炮半兩

白附子炮 川五靈脂 蝎梢各一分

右為末煉蜜丸桐子大每服一丸生薑汁泡湯調下

七寶妙砂丹利痰奇效慢驚慢脾通用須以木香佐之開元通寶錢背後
上下有兩月片者其色淡黑頭小諸錢以一箇放鐵匙頭於炭火內燒少
頃四圍上下各出黃白珠子將出候冷傾入盞中只作壹服南木香煎湯
送下人參煎湯亦得

木事人參散治慢脾風神昏痰厥

人參半兩 炮白南星一兩切片以生薑汁并煎水各半慢

大黃半兩

石末每一錢水一盞薑三片冬瓜仁搗細少許同煎取半盞作兩三
次灌下

木香湯治慢風慢脾得效

南星炮 白附子炮 天麻 木香
橘皮 白茯苓 石蓮肉各一分黃耆

永樂大典卷九百八十一

十二

白朮 石菖蒲 甘草炙各半分

右為末每服半錢薑棗煎服

助胃膏治慢風吐瀉不進乳食

人參 白朮 石蓮肉各二錢丁香
檀香 舶上茴香炒 白豆蔻 木香
甘草炙各一錢

右為末粟米糊丸桐子大每一丸陳米飲調下脾困不醒用冬瓜子
仁煎湯下

沉附湯治慢脾風厥冷吐瀉

沉香 丁香 木香 黑附子炮
白附子炮 全蝎炒 藿香 天麻各等分

右為末每半錢炙甘草生薑煎湯調下身溫則去附子

演山省翁活切口議白腫器丸治嬰孩慢脾風候痰涎潮感不化宜與此
方

製牛膝五味者一分 白礬器士碎炒錢子炮龍
五靈脂川者 全蝎炒 半夏末各一錢用生薑汁浸

右仲為末水養半夏末糊尤如麻子大每服三十丸煎金銀薄許湯下
 下 識曰脾家有風乃虛所致驚搐所由生也痰涎是故作也陰病
 不暴其實眩臂若也意惡投之衝烈愈見害重誠為不可所以禁却
 腦府通利開竅之藥悉無利益治者所宜者今選用妙方頗以活人
 白僵蠶丸一味去痰尤能截風既已傳入慢脾則風痰混致驚熱交
 臨醫工有候藥用當權未敢決之可否候未脫去陽者直宜與服之
 若陽虧陰盛至危至急候變非常精神色脉脈於人情者當服下
 項良方

附魂丸治嬰孩小兒慢脾風候四肢冷厥服之尤佳

黑附子尖二石去灰土月 蝎梢七箇 熟硫黃末一錢匕

右仲為細末土薑自然汁和丸如菴豆大每一歲二十九米飲下

黑附湯治慢脾痰厥四肢逆冷

黑附子也取末二錢重 白朮一錢 南星炮一錢

甘草炙 半夏各一錢湯洗七次

右以咀每服二錢水小小盞土薑三小片煎一箇煎至半去滓通口
 以匙挑與服所覺手足暖其候漸醒藥即止之

辰砂膏治嬰孩小兒慢驚風傳慢脾風候看冷痰在兩潮作不散此疾虛
 火不可頓下其兒搐緩昏困至重者宜服此方

大黑附子一箇八九錢重者去皮臍頂上刺一孔入粉霜同炒各
 半錢白在乳十月附木薑燒灰存性 天南星炮十兩

蝎梢 尾活各一分 朱砂半兩兼過

右為末以朱砂和勻煉蜜為丸鷄頭子大每服一丸至兩丸煎金銀
 薄許湯入酒五滴煎化與服 議曰此三方皆用黑附子直不可執
 謂性熱兒在切小疑與服之其兒志脾風脚手冷者有微有暴審其
 輕重輕即用湯或即以丸重即以膏服之皆效須候手足暖陽氣回
 即為之快矣既以溫煖更以醒脾正胃藥兼服除是慢驚傳入慢脾
 候方可與服之硫黃其功甚速又且逐風化痰醒脾正胃溫煖臟腑
 補益腸胃奪命回陽省活危困至良至驗切不可倉皇妄投丸散或
 兩太過不及之時則致咎于後方宜乎受不至誕誕故也

七寶妙砂丹治嬰孩小兒慢驚風及慢脾候神情昏困兩上有虛痰不能
 得化不可服已宜輕粉恐動臟腑只將神仙所留妙方與服其痰須臾自
 下良火神情已定眼目微開漸與溫平藥調理胃氣無順理驚風藥與服

勿更攻擊其方乃一文開元通寶銅錢其錢背上下有兩月子只有一箇
月子者不用錢色淡黑顧小諸錢將錢頓起頭於炭火內燒霎時四維
上下各出黃白珠子過弦都是將出候冷傾放茶盞中入朱砂木少許只
作一服煎金銀薄苛湯送下多收此錢准備緩急或先燒成珠子收拾亦
得此方墜下小兒虛癩別無它作證候者用之乃保十全功效無可疑訝

錢樣 (三)

誤曰調治嬰孩小兒慢脾風候無過前件藥對證起效須審慢脾已傳
未傳之理其兒眼開未合尚在慢驚脚手不冷之時未可便與回陽
且與七寶妙砂丹一二服眼合沉困陰證極盛者方可與服回陽凡
服回陽醒脾湯劑手足漸暖仍與觀音全蝎散及醒脾散兼服凡慢
脾風候最為惡證只可全方調治雖曰緊急不得併雜用之泛泛不
惟無益枉勞其功虛延其候開養其疾此疾傳陰陰重病感如燈無
油只見次第脫去若不助陽主胃只知截風去驚兒疾轉見增重且
兒陰證未至十分與藥加其寒涼攻得陰重陽虧難以救療若也本
其陽氣隨陰而化所謂劑之在始無在於末醫慢脾風證候如其所

永樂大典卷九百八十一

十四

述用藥猶可救治若鄙夫意見不同難以省活嗟哉
備急養要方救小兒慢脾風及脾積疔方

黃連

草麻

乳香各等分

右三味為末捻成餅子臍心內灸五七壯腹內響可治不響則難治也
又方朱復丹十四粒青州白丸子二十八粒硃砂一鷄頭大麝香當門子一箇
右研為細末燈子糞棄子二箇取肉為丸如蘿蔔子大每服三十丸
溫熱水下量大小加減之

經濟小兒保命方書治小兒嬰孩因驚而發吐瀉住後外證多壞眼慢不
能開變成慢驚慢脾之候四稍微冷目睛碧色或因天吊急驚搐搦久則
傳成慢候也若有前項形證宜便下竹瀝散

全蝎十四枚每箇用薄荷兩葉裹定以黃麻酒浸軟纏定用竹節
夾在大土瓦令黃去索只用蝎兩隻一箇重二錢研碎用乳香一

分青皮一分同而呈砂令黃只用兩星

辰砂一分

犀角一分 鐵痰粉好者二錢重

牛黃半錢

腦子 麝香各一半

右作末以磁合收之凡小兒有前項形證半歲一字一二歲半錢燒

竹瀝敷清湯荷湯放溫溫調勻灌下服此藥後日開四肢溫暖可相
夾保赤散亦復散勻氣散白朮散與調理更下一二服通關梅花飲
子龍麝砂膏則疾自除不再作也

艾元英如宜方全蝎散治因吐利成驚風胃虛神昏困乏搐搦欲成慢脾

黃耆 人參 天麻各二錢 木香

甘草 蓮肉製各一錢 橘豆各二錢 茯苓一錢半

白芷 全蝎 防風 羌活各一錢

右吹咀煎不拘時溫服

孫氏仁存方小兒慢脾驚風似搐而不搐此名痰厥似睡而
四肢與口中氣溫合睡露睛或啼哭如鴉聲此病得之於大病之餘吐瀉
之後或誤取轉藥致脾胃虛損風邪乘之此證已危矣其脈過命難治
法當與通關竅進乳食為先方在後因類
太白再主丸治證如前

陽起石 煨酒洋生硫黃 南星 大附子 炮去皮臍

右等分為末用蒸餅為丸如菜豆大陳米飲下五丸至七丸

丁沈散治證如前

永樂大典卷九百八十一

十五

丁香 沉香 人參 白茯苓

白朮 白橘豆

右等分為末每服半錢飯飲調下着大小加減

曾世榮活幼心書曰真湯主吐瀉痢後胃虛脾慢四肢口鼻氣冷沉困不

省人事

人參 附子 湯浸炮裂去皮臍 白茯苓 去皮

白朮 四味各二錢半 山藥 去土厚皮 黃耆 去水蜜炙

肉桂 去粗皮 甘草 湯洗去灰燼通口味各二錢

右件吹咀每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空心溫服或無時

天麻飲治慢脾風搐不省人事

天麻 川烏 炮裂去皮臍 二味各半兩

右件吹咀每服二錢水一盞薑三片慢火煎若稀糊無時動與溫服
危亦林得効方黑附湯治慢脾風面青額汗舌短頭低眼合不開口中極
頭吐舌頰嘔腥臭噤口咬牙手足微搐不收或身冷或身溫而四肢冷其
脈沉微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已
極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逆風則無風可逆若療驚則無驚可

瘵但脾間痰涎虛熱往來其脈合者脾困氣乏神志沈迷痰涎凝滯而然
商世所謂慢風雜瘵者慢脾風是也

附子炮去皮三錢 木香一錢半 白附子一錢

甘草炙半錢

右剉散每服三錢水一盞生薑五片煎取一半以匙送下若手足暖
而蘇者即止

川烏散脈風回陽

真川烏生一分 全蝎去毒 木香各半錢

右為末每服三字生薑四片煎取其半旋滴入口中嘔吐如丁香

金液丹青州白丸子祛風回陽理痰二藥等分為末每服半錢陳米飲調

下方見大方科痛令類青州白丸子方見風科通古類

主附四君子湯助胃回陽

右以四君子湯加主附子末四分之一煎逆者對加每服半錢薑五
片慢火熟煎以匙送下

竭附散回陽氣豁風痰

全蝎七箇 白附子二錢 南星一錢 白附子一錢

木香各一錢

右剉散每服半錢水一盞生薑四片慢火熟煎旋服

靈砂正胃回陽能止嘔吐濕利痰涎傷瀉者勿用研為末以少許米飲調
下或米糕丸如粟米大小兒兩三丸米飲灌下下方見大方科痛令類

震靈丹治慢脾風吐瀉不止每服一丸研人參南木香煎湯乘熱調下

表當時大方濟生散治吐瀉後壯熱多睡眼目上視時發驚悸手足痲癢

成慢脾風醫草安呂眼粉下之頃時作定復作如故十無一存

厚朴去毒皮用甘草五寸拍破水二碗文火煮令水減半去甘草

不用只用厚朴于木一錢 白木片切 蜜炙黃色一錢

人參一兩 陳皮去白 五味 紫苑

乾薑也 杏仁各七錢半去皮尖雙仁 肉桂去毒皮

甘草炙各半兩

右為細末每服三錢水一盞生薑三片棗子一箇煎至七分食前溫
服

人參散治脾風多困

人參 冬瓜仁各半兩 南星一兩 切片漿水薑汁煮存性

永樂大典

卷九八一

右為細末每服一錢沸湯調下
小兒慢肝風

論

切切新書治小兒形證論四十八候慢肝風欬痰兒眼濕羞明日春不宣
弓夏不通秋被毒風傷脾得次傳肝腎利尋環先調五臟患方退速得肝
風便有功蓋為小兒元氣壯此名立號慢肝風此病脾與肝相克見日
眼不開未出月有目腫者或出血者

方

甘肅湯四十八候慢肝風羞目目腫出血 甘草一錢以醋磨塗之
右為末每服半錢米泔調下

四十八候云又欲去血目腫不開方

蒼朮不以多少入在醋中練得定煮熟將藥氣衝眼後更嚼藥以汁
咽吐滓尤妙

小兒胎驚

論

和劑局方論小兒胎驚證胎驚風者因乳母觸胃寒暑邪氣傷入於胎中

生兒之後洗浴當風冷觸於臍邪氣不除變成胎驚之候百日之內煩煩
煩躁啼哭無時目睛上視睡中搐搦或身冷頭面赤黃如青黃水者可與
保生散每服一字薄荷乳汁調下更用琥珀丸調理乳母更用脹和氣藥
調理張洪醫方妙選謹按嬰兒在母胎中之時脾厥木具神氣微弱動靜
喘息莫不隨母母有所動胎必感之母若調適失宜食飲不節喜怒不常
坐臥當風過酒房勞一切禁忌致生下兒形多怯弱頭顛開肝或乳養失
理洗浴當風則令兒壯熱吐乳心神不寧手足抽掣身體攣身眼目反張
此乃胎驚風病也葉仙論胎驚候說云凡母懷胎之日曾受驚氣傳入胎
中致孩兒生下青紅色口唇時動夢裏多驚五心常熱額門不合動多驚
叫身體壯熱此胎驚候也楊仁齋直指方其有初生百日頻頻吐乳可未
噴去睡裏多驚眼翻肚脹手足攣急煩躁多啼者當作胎驚風裏之夫胎
驚風以胎婦調適平常飲酒嗜欲忿怒驚懼母有所觸胎必感之或外挾
風邪有傷於胎故子來母氣上下即病也其候月內溫將綠眼握拳噤口
咬牙身腰強直逆潮嘔吐搐掣驚啼腿縮頰開或頰赤或面青眼合胎風
眼合不可誤作慢肝矣月溫無其有着噤撮口之類亦此一證之所發也
視其眉間黃色紅赤鮮明者可治若黑青黑者不治虎口指紋曲入裏

者可治。紋反出外者不治。治法：鮮散風邪，利驚化涎，調氣貼臍。甚則以朱
銀九利之石壁經三十六種胎驚候歌。未出胎中一月來，母驚成患子
臨胎腰宜哭時先口撮面青拳搐縮雙腮，眼閉咬牙筋脉急，風涎云服
開膠土注云：眼有眵此是受氣之時。若陰未持胎多驚而落也。陽未持
則胎難驚而落也。陽弱則子足細肌肉瘦陰弱則肉情甚，然皆不能重其
天年若日月滿而驚而落者，使口撮腮臉起如拳，鼻多塞口，鼻不開甚不
可作驚風醫。先當微探汗次治驚，調氣乳母當服調氣藥，孩兒胎額門去
邪任喚千聲，眼不開醫者見形，須問母方知此患所從來。退却風涎為治
療，涎去驚邪自不回。夫次則目瞑不開，若先治驚則作吐或瀉。在秋夏必
作脾風，始初見之亦不可作脾風治。恐汗不出而作利，俱也。風涎候歌括
一：同何注云：此為年音次與生銀九二方與上法同，並見急慢驚風門中。
小兒形證論四十八候胎驚歌：一曰後說云：此患在胎中時，母受驚，生下
後二十五日發也。若不定或三十五日別日者，不是胎驚。醫人不識，多
作驚風候矣。自閉腰直，腮縮拳握，只與疳疔凡下涎，口見一切痲門，或
下半死大青丹方見急慢驚風門。湯氏望嬰孩妙訣：總要胎驚歌。兒
出胎中一月來，母驚成患子。臨胎面青拳搐，牙關緊腰直，身強哭泣，衣身

永樂大典卷九百八十一

十八

熱涎潮難得睡，睛斜眼閉不伏開，欲知病本源因母累及孩兒帶得來。逃
熱鎮驚為妙手，風涎墜下命須迴。經濟小兒保命方書胎中驚：憂懼胎
中累受驚，土來緣此病，停心身肌軟，弱唇乾縮，戰慄多啼睡，不寧臉弄淡
青兼目碧，印堂浮紫，患將深，靈丹次第安心，用免致孩兒性命傾。小兒
胎中累受驚，則心氣不足矣。若有此候，當用安神壓驚鎮心丸散，驗方主
之。若有印堂浮紫痰涎吐沫上搐，搦不時者，皆為惡候也。

方

額額經牛黃丸治小兒胎驚及癩或心熱

牛黃

龍齒

馬牙硝

鐵焙粉各一分

右為細末，鍊蜜丸如梧桐子大，每日乳食前熱水調破一丸，灌下，令
母忌口。

張洪醫方妙選聖星丹凡諸癩皆宜服之曾經大効

天南星揀四十九箇一般大者五月五日取活蝎四十九箇用瓦
器內或以鹽泥固濟吊於淨室中至臘日取出揀天南星蝎蜋着
處有小窠子者其餘不用只將蝎蜋天南星以酒浸一宿焙乾碾
為細末次用好辰州朱砂一分細研水飛真牛黃麝香龍腦各一

錢研如

右件再一處研拌勻。用生薑汁和如梧桐子大。每服一粒至二粒。煎人參薄荷湯化下。神驗。

白金散治諸癩潮發不瘡者

好白礬露半兩。揀淨湯洗。炒微黃色。搗羅為細末。次用

天竺黃一分。細研。真牛黃一錢。麝香

龍腦各半錢。並細研。

右件同拌勻。每服半錢。用生薑自然汁調。放溫灌之。

烏金膏治胎癩潮發頻併

烏梢蛇一條。水浸去皮骨。酒浸一宿。焙乾。蠶紙一張。燒灰。

蟬殼半兩。全蠍半兩。

已上搗羅為細末。次用

好米砂半兩。細研水飛。龍腦

麝香各半錢。細研。金箔二十片。細研。

右件一處研勻。煉蜜和成膏。如皂皂大。每服一粒。煎人參薄荷湯化下。

大一散凡胎癩病屢亦宜常服

天漿子二十一兩。乾者微炒。乾蝎梢二十一兩。

防風半兩。天麻半兩。

已上搗羅為細末。次入

朱砂半兩。細研水飛。麝香一錢。細研。

右件再研細。每服半錢。乳汁調下。

天南星煎方治胎癩潮發逆者

白附子一兩。乾蝎半兩。炒。

白花蛇一兩。酒浸去皮骨。炙令乾。天麻半兩。

已上搗羅為細末。用好酒兩大盞。攪令勻。於慢火上熬。不住手攪。以

酒盡為度。次入

好米砂半兩。細研水飛。臘粉一分。牛黃半錢。

麝香半錢。龍腦半錢。並細研。

右件都入膏子內。一處和。看硬軟成膏。如皂皂大。每服一粒。取竹瀝

化下。不計時候。

祛風散治胎癩多啼叫

胡黃連半兩取末 全蝎一分取細末
犀角一分有取末 天竺黃一分別研

麻黃一分去節為末

右件都研令勻細。每服半錢。研入麝香一字。乳汁調下。

鐵粉散。驚風或多面赤口乾。大便不利。尤宜服。

鐵粉半兩研 真珠末一分別研 鬱金一分研

胡黃連取末一分 牛黃一分研

右件拌勻研細。每服一字。溫蜜湯調下。

毛活膏治胎痢。昏困不省。

毛活一兩 烏蛇肉一兩酒浸一宿焙乾 獨活一兩

天麻半兩 全蝎半兩 白礬露半兩微炒

人參半兩去蘆頭

右件搗羅為細末。煉蜜和成膏。每服一皂。皂大用麝香荆芥湯化下。麝香膏治胎痢不得安卧。

麝香一分研 牛黃一分 全蝎二十一分取末
白附子一分取末 蘇蛾一分微炒取末

永樂大典卷九百八十一

白礬露一分微炒取末

右件都拌勻研細。煉蜜和膏。如皂。皂大。每服一粒。煎人參荆芥湯化下。

珠珀丹治胎痢。昏困涎成。

乾蝎一分微炒 天漿子一分微炒 露蜂房一分微炒

已上三味搗羅為細末。次用

朱砂半兩細研水飛 水銀一分用粟飯一分同結為砂

子細研 牛黃一分細研 麝香一分細研

右件都一處拌勻研細。用白麵糊和如黍米大。每服五粒。煎金銀薄荷湯下。乳後。

朱砂膏治胎驚

朱砂 粉霜 水銀砂子各一分
乳香 牙硝各半錢 輕粉

右為末。入麝香少許。麝肉為膏。如皂。角子大。煎胡湯化下。

切切新書孔氏家傳治小兒胎驚涎成。不飲乳。

半夏一枚。灰火內炮令黃色。研令細。生薑自然汁為丸。如粟大。乳。

永樂大典

卷九八一

汁下一丸無時服

王氏子集如聖消驚丸治新生兒在胎中之時其母宿懷驚憂喜怒舉動驚胎致兒生後常驚悸眠睡不穩精神恍惚搖頭上視溫壯多睡反折啼叫口眼相引

羚羊角屑

犀角末

麝香各一分

牛膽礬

天南星四兩

天麻

人參

白茯苓各一兩

白礬搗碎

全蝎炒各半兩朱砂一兩三錢半

龍腦一錢

右件為細末煉蜜為丸一兩作八十九一方加朱砂一兩半黃一分每服一丸麝香湯化下兒小塗乳上令吮之常服磨一切驚癇石方

救急如神書

湯氏望嬰孩妙訣總要胎癇曰胎驚者兒在母腹中十相具足或妊婦驚怪懶撲夫驚而心主血脉應之於胎故主下未滿月而發驚者是也初生嬰兒難以用藥凡有此候急取猪乳細研辰砂半黃各少許調抹口中功効不可具述此法諸家方書並不曾載自余傳之始東宮吳觀察新得一子及一月病此因用之驗今已一周又入麝香當門子尤佳

永樂大典卷九百八十一

二十一

又方胎癇驚風皆可服

全蝎頭尾全者用土薄荷葉裹外以麻線纏火上炙燥為度碾為末別研生朱麝香各少許煎麥門冬湯調下

楊仁齋直指方六一散治胎驚

天漿子去殼微炒

南星

白附子各微炮

天麻

防風

茯苓各二錢

全蝎

朱砂各一錢 麝香少許

右為末每服半錢乳汁化下

參竭散治胎驚定心神

天漿子

天竺黃

人參

朱砂

全蝎

天麻

蟬蛻等分

麝香少許

右為末煉蜜丸桐子大每服一丸金銀湯下

猪乳膏治胎驚最妙

琥珀

防風一錢

朱砂半錢

右為末猪乳調一字拭入口中

全蝎散治諸驚胎癇

全蝎一箇 琥珀 朱砂各少許

右為末每服一字 麥門冬煎湯調下

獨活湯治胎驚發散風邪

羌活 獨活各一分 檳榔 天麻

麻黃去節 甘草炙半升

右到散每服半錢 水煎服於內加商星木蜜調可貼額用

朱眼凡治胎風壯熱痰厥翻眼口噤取胎中穢受之毒亦治驚積但量用之

水銀一錢 慈石研如泥 白附子一錢半 蝎一錢

商星一分 朱砂一分 天漿子 牛黃

蘆會各半升 磁石半錢 和水銀研 腦子一字

麝半錢 直僵藤少許

右為末粟米糊凡芥子大每一丸薄荷湯下如未通利加至二丸

千金龍膽湯治胎驚月中痰厥發熱凡胎風撮口吐熱皆可

龍膽草 鈞藤 紫胡 黃芩

北棗 赤芍藥 茯苓 甘草炙各半兩

永樂大典卷九百八十一

二十二

蠟眼二枚 去翅足 大黃二分 酒洗

右為末每服一錢 北棗煎服或加防風麥門冬以導心熱黃芩減半用

水麝散治胎風心熱痰壅

人參 朱砂各一分 牛膽南星 天竺黃

牙硝 鐵粉各半分 麝少許

右為末每服一字 土薑薄荷湯調下

危亦林得効方治兒在胎中受驚故生未滿月而發驚

右用朱砂研細同牛黃少許取猪乳汁調稀抹入口中入麝香當門

子尤妙

小兒驚悸

論

太平聖惠方論曰大小兒驚悸者由心藏虛熱為風邪所乘邪搏於心則令多驚不安驚不已則悸動不定也聖濟總錄論曰心藏神而思熱小兒體性多熱若感風邪則風熱搏於府藏其氣鬱憤內乘于心令兒神志不寧故發為驚若驚甚不已則悸動不寧是為驚悸之病濱山省翁活切口誠恐博喘息誤曰驚悸屬心喘息得因而言否愚曰非心主之君心所受

其疾不作喘發是知肝臟虛肺臟虛氣不安恐悸傷乎肝肺受其驚而受其喘須求水飲肝受其驚發喘細細若張口大喘者肝肺俱不利鎮心安神調氣定喘必未盡善當於損益氣丸散瀉心補肝立見功效所迷疑難是請探賸母躁高志經濟小兒保命方書驚悸客忤證歌 累累連驚恐心虛膽積憂願青浮碧色津液出唇派目上牙微噤青番似樹潮安神無正胃早治自然瘳 小兒驚悸客忤乃累遺驚撲氣虛而作也只足此證辨虛實檢方對藥調理若見四肢悚慄不止面色黑目上視無光涎派不收牙噤氣冷此證不治

方

外臺必效方釣藤湯療小兒壯熱時氣驚悸并熱瘡出

釣藤

人參

炸蟬

子苓

蛇蛻皮

防風

澤瀉

石膏

竹瀝

右十味切以水二升并竹瀝煎取七合細細服之以差為度

又方

茯神

炸蟬

人參

釣藤

牛黃

杏仁

龍齒

麥門冬

蛇蛻皮

右凡味切以水二升煎取六合去滓下牛黃末分六服消息服之令盡差

太平聖惠方茯神散治小兒心熱驚悸煩亂

茯神

龍齒

寒水石

川升麻

石膏

麥門冬

甘草

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓入竹瀝

半合更煎一兩沸量兒大小以意加減

人參散治小兒驚悸情思不安

人參

麥門冬

龍骨

茯神

甘草

犀角

右件藥搗羅為散每散一錢以水一小盞煎至五分去滓入地黃

汁半合更煎一兩沸量兒大小以意加減溫服

炸蟬散治小兒風熱驚悸

蚌蟬半兩去翅足微炒
麥門冬半兩去心焙
茯神半兩
龍齒三分細研
人參三分去蘆頭

鈞藤三分
牛黃二錢細研
杏仁二分湯浸去皮尖雙仁。麩炒
蛇蛻皮五寸燒灰
右件藥搗細羅為散入研了藥都研令勻每服以新汲水調下半錢

量兒大小加減服之

遠志煎治小兒身體壯熱驚悸心神不寧宜安心神

遠志去心
羚羊角屑
茯神
甘草炙微赤剉

杏仁湯浸去皮尖雙仁麩炒
散花洗去蘆頭

龍骨
防風去蘆頭已上各半兩
龍膽一分去蘆頭

炸蟬一分去翅足
百合一分
牛黃一分細研

麝香一分細研川升麻三分
川大黃一分剉微炒

酥三分
右件藥先研牛黃麝香二味為粉除酥蜜等二味蟲搗用水三升合

銀鍋內煎至半升以新綿濾去滓却入鍋內下牛黃麝香酥蜜等以柳花不住手攪慢火熬如稠錫方止入瓷合內盛每服取兩豆許大

用溫水調服日三四服量兒大小加減服之
鐵粉煎治小兒心熱多驚悸晝夜甚象鬼神所著

鐵粉一分
牛黃一分細研
菖蒲三分
酥三分

犀角屑
人參去蘆頭
茯神
百合

防風去蘆頭
川大黃剉碎
青黛細研
細辛

遠志去心
芍藥
麻黃去根節
薯蕷

甘草炙微赤剉已上各半兩
蜜半斤

右件藥先蟲搗諸藥用水三升入銀鍋中煎至半升以新綿濾去滓却入銀鍋內入研了藥及酥蜜以慢火熬不住手以柳花攪如稠錫收於瓷合中每服以溫水調二大豆許日三四服量兒大小加減服之

金泥煎治小兒心熱多驚悸

金薄七十五片水銀一兩半
遠志一兩去心
菖蒲三分

龍膽三分去蘆頭
龍齒三分
人參三分去蘆頭

赤茯苓三分
青黛一分
酥四分
麝香一分

虎睛一對微炙牛黃一分
甘草一分炙微赤剉

炸蟬三枚去足翅
蜜半斤
鈞藤二分

永樂大典

卷九八一

右件藥水銀金薄同研如泥又別研麝香虎睛牛黃青黛四味如粉其餘藥搗篩為散入銀鍋中先以水二升文火煎取半升以新綿濾去滓再入鍋內下酥蜜及金泥并研了藥等慢火煎不住手以柳篦攪如稠錫入瓷合內或每服取二大豆許以溫水調服日三四服量兒大小加減服之

天竺黃細研 黃連去骨 紫胡去苗 羚羊角屑
蔓荊子 犀角屑 防風去蘆頭 子苓

川升麻 麥門冬去心焙 甘草炙微赤剉 玄參
白茯苓微炒去刺 朱砂細研 木香已上各一分

龍腦細研 麝香細研 牛黃細研已上各一分

右件藥搗羅為末與研了藥都研令勻煉蜜和丸如棗豆大每服以溫水化下五丸量兒大小以意加減

牛黃凡治小兒驚悸壯熱黃瘦髮豎
牛黃一錢細研 朱砂半兩細研 水犀通
天竹黃細研 白附子炮裂 茯神 犀角屑 黃連去骨

永樂大典卷九百八十一

二十五

羚羊角屑 防風去蘆頭 玄參 枳殼炒微黃去瓢
甘菊花 人參去蘆頭 黃耆剉 甘草炙微赤剉

黃芩已上各一分

右件藥搗羅為末入研了藥都研令勻煉蜜和丸如棗豆大每服以淡竹葉湯研下五丸日三四服量兒大小加減服之

天竺黃細研 黃連去骨 川大黃剉碎微炒
杜蘅粉 黃芩 梔子仁 遠志去心已上各

半兩

右件藥搗羅為末煉蜜和丸如棗豆大每服以新汲水下五丸量兒大小加減服之

竹瀝磨犀角飲子治小兒心熱驚悸

竹瀝二合 犀角

右件藥將犀角於竹瀝內磨令濃量兒大小分減服之日三四服
靈苑方抱龍丸詳一切熱化風痰治大人小兒風癩驚癇陽毒狂躁及心熱驚悸夜卧不安胃弱瘦瘵頭痛心神恍惚等疾論林院方

天南星一斤土末砂細研水飛紫石英研末 白石英研末
 犀角瑇瑁各一兩 牛黃研 阿膠剉碎炒如珠子
 藿香 麝香研各半兩 金箔五十片 雄黃水磨通明者
 四兩研

右件一十一味搗羅細研為末更入乳鉢內研如粉以黃牛膽四十
 五箇取汁和丸如櫻桃大每服一丸以鹽一捻和藥細嚼新水吞下
 如牛膽少以煎水相和諸疾服之心膈清涼如冰雪便覺精神爽快
 也

辰末虎睛丸壓驚傳鎮心藏兼治小兒諸驚癇此方極滋養進食甚有功效

辰錦末砂 白茯苓 黃芩 山梔子仁

人參各一兩 虎睛一對并人干黃 腦麝

犀角屑各一分 鈞藤 大黃州濕紙裏煨熟各四兩

右件一十二味並搗羅為末以中蜜為丸如雞頭肉子大每服一
 丸至二丸用金銀湯下人參湯亦得之上二方新切切新書

聖濟總錄紫金散治小兒驚悸不安 龍腦 石膏 牛黃並研如粉

永樂大典卷九百八十一 二十六

甘草土用各一分
 右五味先搗龍腦石膏為末與諸藥同研如粉每服半錢也用淡竹
 瀝調服三四歲兒每服一錢七日三服早晨午間日晚各一量兒大
 小以意加減

鈞藤湯治小兒壯熱時氣驚悸并熱瘡出 鈞藤 人參 炸蟬 微炙去翅足一兩

黃芩去黑心一兩 蛇蛻皮微炙令黃色三十

龍齒研如粉一兩 防風去土半兩澤瀉半兩

右八味搗搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞入竹瀝半合石蜜少許
 同煎至四分去滓分溫二服空心午後各一服更量兒大小以意加減

人參湯治小兒壯熱驚悸并熱瘡出

人參三兩 茯苓神木半兩龍齒研如粉一兩

鈞藤一分 炸蟬去足頭地微炙二枚 麥門冬去心焙一兩

杏仁去雙人皮夫匙炒令熟一兩半 蛇蛻皮微炙令黃

右八味搗搗篩一二歲兒每一錢匕水半盞煎至三分去滓入牛黃
 二寸

一豆許大分溫二服空心于後各一量兒大小以意加減
牛黃散治小兒心熱驚悸

牛黃研一分 天竺黃研半兩 白茯苓去黑皮半兩 鉛白霜研半兩
玄明粉研一兩 人參半兩

右六味搗羅人參茯苓為末同牛黃等研為散一二歲兒每服半錢
七用薄荷湯調服三四歲兒每服一錢七日三服早晨午間日晚各
一量兒大小以意加減

大丹砂丸鎮心神涼咽膈墜驚悸退壯熱化風涎

丹砂研公米匙甘草炙 白茯苓去黑皮各二兩
人參一兩 馬牙消研 蓮砂研三錢 牛黃研半錢

龍腦研 麝香研各一錢

右九味搗研為末鍊蜜和丸如鷄頭大每服一丸用竹葉湯化下食
後臨睡服大小以意加減之

丹砂丸治驚悸退壯熱止涎軟利咽膈除眠睡不穩

丹砂二兩細研水飛 半夏湯洗七遍二兩
乳香研半錢 人參 白茯苓去黑皮各半兩

天南星炮裂一兩 牛黃研二錢 龍腦研一錢

右八味搗研為末用白麵糊和丸如麻子大三歲兒服十九至十五

丸不拘時用竹葉乳香湯下量兒大小加減
天竺黃散治小兒驚熱筋脉抽掣夜卧驚悸四肢煩熱

天竺黃研半兩鬱金研公米一分 粉霜研一分
鉛白霜研一分 山梔子仁半兩

右五味搗研為散一二歲兒每服半錢七用新汲水調服三四歲兒
每服一錢七日二早晨日晚各一更量兒大小以意加減

麥門冬湯治小兒虛熱驚悸睡中時叫

麥門冬去心焙一兩半 人參半兩 龍骨一兩

茯苓去木三分 甘草炙一分 犀角屑半兩
右六味搗篩一二歲兒每服一錢七水七分人生地黃汁少許同

煎至四分去滓溫服日三四服量兒大小以意加減
茯苓湯治小兒風熱驚掣心忪恐悸

茯苓去木一分 龍齒半兩 寒水石研一分升麻三分
石膏研一兩 麥門冬去心焙三分

右六味麤搗篩一二歲兒每服一錢匕水七分入竹瀝少許煎至四分去滓溫服日三夜一董兒大小以意加減

真珠元治小兒風熱心神驚悸睡卧不安

真珠末 菴活去蘆頭 防風 鈞藤

龍腦 天竺黃研 升麻 半黃各一分

茯神去木 人參 羚羊角屑 犀角屑各一分

鉛霜 龍腦 麝香各一分研

右一十五味搗研為末煉蜜丸如棗豆大每服用荆芥薄荷湯研下

五九日三四服常服化一切驚涎

大鎮心丸治小兒精神不真寂寐多驚心忪恐悸四肢戰掉舉動欲倒狀

類暗風或煩躁多啼退驚風化痰壅壯心氣益精神

主年用羚羊角一分 羚羊角屑 龜甲絲末

赤箭各半兩 牛黃研 茯神去木 遠志去心

真珠末研 人參 桂去粗皮 天竺黃研

蛇脫皮炙令焦黃 龍腦研各一分 鐵粉研一分

麝香研 葛蒲各半兩 丹砂研半分 金薄研

珠薄研

右一十九味搗研為末煉蜜丸如梧桐子大每服一丸至二丸食後

臨卧薄荷湯化下更量大小加減

金薄元治小兒驚悸眠睡不穩

金薄四十九片丹砂 水銀 膩粉各半兩

麝香 牛黃 青黛 犀角末

白僵蠶瓦者炒碎殼去土 白附子 乾蝎去土炒

天麻酒浸一夜焙乾 麻黃去節 天南星炮各一分

右一十五味青黛已上七味研勻餘者搗羅為末同七味再細研用

生蜜和勻成劑旋丸如梧桐子大每服一丸薄荷自然汁化下量兒

大小加減

鄭端友全嬰方寧心膏治小兒精神不定恍惚不寧恐畏多哭如人將捕

眠睡驚覺常服鎮心除百病

人參 白木 白茯苓 茯神

山藥 薤活 甘草炙各一錢朱砂二錢

腦麝各一字

永樂大典

卷九八一

右為朱煉家九如鷄頭大。二歲一丸薄荷湯化下。李橙小兒保生要方朱砂膏安神鎮心去痰熱。小兒常用。

人參 茯神 防風 山藥
甘草 黃耆 麥門冬 去心 各半兩

朱砂六錢 麝香半字
右為細末 研勻 煉蜜九如櫻珠大 金箔為衣 每服半粒 或一粒 薄荷

湯化下 不拘時候
七寶丹治驚悸安睡去風

人參半兩 紫河車一分 白茯苓一分 龍齒
甘草一分 麝香一分 研

右同為細末 煉蜜九如雞頭大 每服半丸 薄荷湯化下 不拘時候
楊侯家藏方百枝膏治小兒稟賦怯弱 易感驚邪 心神恍惚 眠睡不安 常服安心神 壓驚悸

人參 去蘆頭 防風 去蘆頭 天麻 三味 各一兩
白附子 炮 麥門冬 湯浸 去心 焙乾 研 白僵蠶 炒 去絲 首
羌活 去蘆頭 石菖蒲 五味 各半兩 朱砂 二錢 別研

永樂大典卷九百八十一

二十九

麝香 一錢 別研
右件為細末 次入朱砂 麝香 研勻 煉蜜為丸 每一兩作四十九丸 每服

一丸 溫荊芥湯化下 食後臨卧
酸棗仁丸治小兒心神不安 眠睡不穩 常服 壓驚 邪寧 眠睡

酸棗仁 炒 人參 去蘆頭 朱砂 別研 乳香 別研 四味 各
二錢 白茯苓 去皮 真珠末 二味 各一錢

右件為細末 煉蜜為丸 每一兩作四十九丸 每服一丸 荊芥湯化下 二
歲以上 兒服二丸 食後

魏氏家藏方安神丸治小兒驚鎮心 歲熱化痰涎 小兒常服 永無驚悸之
疾

琥珀 如無 以茯神代之 人參 去蘆 遠志 去心
天麻 花蛇 肉 酒 浸 去骨 白附子 炮

麻黃 去節 羌活 大川烏 炮 去皮 臍
蟬蛻 洗 去土 并 去白粉 南木 香 不見火 真珠末

白僵蠶 直者 炒 去絲 金蠟 土 薑 汁 炙 各 半 兩
朱砂 二錢 別研 金銀薄 各 三十 片 別 研 入

麝香一錢別研

右為細末煉蜜為丸如龍眼大朱砂為衣。一九作四服。月薄芎湯下

治小兒鎮心壓驚降逆

朱砂細研過水篩過 白僵蠶炒去黑取直者洗淨用

白附子洗淨去水浸燥候冷取出切片 天南星炮乳去毒

皮各半斤 麝香半錢別研乾蝎一兩燒火炒令熟

右為細末麵糊為丸如粟米大每服十九煎金銀薄荷湯下如遇驚取下痰涎後且以此藥服一二服無不効驗或有虛汗用麻黃根煎湯下

龍腦青金丸鎮心壓驚退潮熱治盜汗殺瘡細瘰癧大醫瀉痢安五臟益顏色治瘡疥長肌膚

腦麝一字別研青黛別研 雄黃水煎別研朱砂別研

胡黃連 蘆會 膩粉別研各一分

右為細末搗爛浸蒸餅為丸如菉豆大曬乾入麝匙內貯之每服二

丸至三丸一切驚悸體熱瘡疥薄芎湯下一切瘡氣瀉痢細蟲米飲

下常服百病不生

辰砂安驚丸理風熱泄感身體恂急睡中不穩鎮心上驚

永樂大典卷九百八十一

三十

天麻 甘草炙 白附子炮各一分

人參去蘆 防風去蘆 茯神去木各半兩

川芎二錢 朱砂二錢半留為衣

右為細末煉蜜為丸如鷄頭大每服一九至兩丸用薄芎煎湯下

大朱砂丸治小兒心氣不足不省人事多恐懼

朱砂別研 人參去蘆 石菖蒲 遠志去心

麥門冬去心 甘草炙 茯神去木各半兩

酸棗仁去皮炒別研 全蝎石灰炒去毒

杏仁去皮尖各一分 麝香少許別研

右為末煉蜜化如鷄頭大每服半丸煎木香麥門冬湯化下

八物參朮丸平補心氣安神鎮驚除高熱痰實

麥門冬去心 遠志去心 菖蒲 茯神去木

白茯苓去皮各一兩 白朮半兩 人參一兩去蘆頭

牛黃二錢別研 右同為細末次研入牛黃煉蜜丸如黍米以朱砂為衣每服二三十

小定志丸治嬰孩某賦不足心神睡卧不寧常服壓驚邪止夜啼

北熟水下
酸棗仁去心炒人參去蘆
白茯苓各二錢去木
遠志去心水洗微炒一錢
乳香半錢別研

右為末煉蜜為丸如粟米大每服二十粒別研生朱砂為衣人參湯下
陳自明管見大全良方金箔鎮心丸治小兒風壅痰熱心神不寧驚悸煩
渴唇焦頭赤夜卧不安謔語狂妄

人參洗去苗 茯苓去皮 甘草各五十兩 山藥 白五十兩
木砂研碎一百兩 麝香五兩研 龍腦十兩
牙消粘過一十五兩 金箔一十二百片為衣

熬河車肉黑豆水煮軟切片焙乾二十五兩
右為細末煉蜜為丸每一兩半作五十九丸以金箔為衣每服一丸薄
荷湯化下含化亦得食後臨卧常服安心鎮神散邪熱涼咽膈止驚
啼

五福化毒丹治小兒痘積毒熱驚悸狂躁煩亦咽乾口熱生瘡夜卧不寧
謔語煩渴頭面身體多生瘡癩

永樂大典卷九百八十一 三十一

玄參洗焙 桔梗各六兩 茯苓去皮五兩 人參去蘆
牙硝粘過 青黛研各二兩 甘草別炒一兩半

麝香研下錢 金銀箔各八片為衣
右為細末入研藥勻煉蜜為丸每兩作十二丸一歲兒一丸分四服

薄荷湯化下及瘡疹後餘毒上攻口齒涎血臭氣生地黃自然汁化
一丸用鷓鴣翎掃在口內熱疔肌肉黃瘦雀目夜不見物陳粟米泔化
下食後臨卧服

楊仁齋直指方溫膽湯治驚悸煩疾

半夏梨 枳實各二錢半 茯苓半兩 橘紅
甘草各一錢半 酸棗仁溫湯浸去核二錢半

右到散每服一錢入竹茹少許用薑棗煎服
定心丸治驚悸煩躁

北參 遠志薑梨焙 伏神 天麻
犀角各一分 防風 朱砂一錢 麝香一牙

右為末煉蜜為丸每服一丸薄荷湯調下
御藥院方安神丹治小兒心神不寧因卧多睡及痰涎壅塞恍惚不定

朱砂 人參各二錢半 高乳香半兩 酸棗仁炒去皮一兩

右五味為細末 蜜丸如榛子大 金箔為衣 每服一丸 人參湯下 每兩作三十丸

丹砂鎮心 尤治小兒心神不寧 有時驚悸 目睛偏視 痰涎不利 甚則癩癧 服之安眠 心神靜止 搐

朱砂一兩 石研半黃一錢 生龍腦 麝香各一錢 鉛白霜 天竺黃各二錢 玉珀研 天麻明者二兩

人參 茯苓白者去黑皮 甘草各半兩

右一十味為細末 與研藥同研 勻細末 蜜丸如鷄頭實大 每服一丸

煎金銀薄荷湯化下 曾世榮活幼心書 茯神湯治心氣不足 虛而驚悸 日常煩哭及嬰孩土下 羸瘦多驚 宜子母同服 自然有效

茯神去皮木以一兩 人參去蘆 當歸去蘆 凡酒洗 二味各半兩 甘草炙三錢 右件以咀 每服二錢 水一盞 煎七分 無時溫服 有微熱煩躁 入麥門

永樂大典卷九百八十一 三十二

冬去心同煎 表當時大方安神丸 治上焦多熱 驚悸不已

麥門冬各半兩 去心 馬牙硝 白茯苓去皮 乾山藥 寒水石 朱砂一兩 甘草

龍腦一字 右為細末 煉蜜丸如芡實大 每服半丸 砂糖水調下

永樂大典卷之九百八十一

永樂大典

卷一〇三三

直錄總校官侍郎臣高拱

學士臣翟景淳

分校官編修員王希烈

書寫儒士臣宣錫

國器監員臣敖河

臣李耀文