

T7903/2955(10)

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF  
HARVARD - YENCHING INSTITUTE  
AT HARVARD UNIVERSITY  
DEC 5 1952

10.



傷寒藥方目錄

第一 諸方評

第二 麻黃乾葛湯

第三 麻黃知母石膏湯

第四 麻黃連翹赤小豆湯

第五 麻黃杏仁薏苡甘草湯

第六 桂枝湯

第七 桂枝甘草湯

第八 桂枝石膏湯

第九 桂枝大黃湯

第十 麻黃湯

第十一 麻黃升麻湯

第十二 麻黃杏仁甘草石膏湯

第十三 麻黃附子細辛湯

第十四 麻黃甘草附子湯

第十五 桂枝麻黃各半湯

第十六 桂枝葛根湯

第十七 桂枝二麻黃一湯

第十八 桂枝人參湯

哈佛大學哈佛藥宗  
圖書館珍藏印



第十九 桂枝附子湯

第二十 桂枝括萎葛根湯

第二十一 桂枝二越婢一湯

第二十二 桂枝加厚朴杏子湯

第二十三 桂枝芍藥湯

第二十三 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨  
杜厲救逆湯

第二十四 桂枝加芍藥新加湯

第二十四 桂枝去芍藥加附子湯

第二十五 桂枝加知母石膏升  
麻湯

第二十五 桂枝去桂加茯苓白朮湯

第二十六 越婢湯

第二十六 茯苓白朮湯

第二十七 大青龍湯

第二十七 大青龍加黃芩湯

第二十八 小青龍湯

第二十八 小青龍去麻黃  
加茯苓湯

第二十九 小青龍去半夏加  
括萎湯

第二十九 小青龍去麻黃  
加杏子湯

第三十 葛根湯

第三十 葛根解肌湯

第三十一 葛根柴胡湯

第三十一 葛根葱白湯

第三十二 葛根黃芩黃連湯

第三十二 葛根橘皮湯

第三十三 葛根半夏湯

第三十三 葛根龍胆湯

第三十四 小柴胡湯

第三十四 小柴胡加茯苓湯

第三十五 小柴胡加桂湯

第三十五 小柴胡加五味子湯

第三十六 小柴胡去半夏加  
參芍藥湯

第三十六 小柴胡去朮加蠟湯

第三十七 小柴胡去參朮加  
五味子乾姜湯

第三十七 小柴胡去黃芩  
加芍藥湯

第三十八 小柴胡加乾姜  
杜厲湯

第三十八 柴胡桂枝湯

第三十九 柴胡桂姜湯

第三十九 柴胡龍骨杜厲湯

第四十 五苓散

第四十 辰砂五苓散

古今醫統易經卷之十四藥方目錄



第五九 小建中湯

第六十 黄芪建中湯

第六一 大柴胡湯

第六二 調胃承氣湯

第六三 大承氣湯

第六四 小承氣湯

第六五 桃仁承氣湯

第六六 梔子豉湯

第六七 梔子栝皮湯

第六八 梔子乾姜湯

第六九 梔子升麻湯

第六十 梔子厚朴湯

第七一 枳壳梔子湯

第七一 梔子烏梅湯

第七二 枳壳梔子大黃湯

第七二 猪苓湯

第七三 黃芩湯

第七三 黃芩芍藥湯

第七四 黃芩半夏生姜湯

第七四 黃連湯

第七五 黃連阿膠湯

第七五 梔子仁湯

第七六 黃連橘皮湯

第七六 黃連龍骨湯

第七七 黃連犀角湯

第七七 黃連解毒湯

第七八 黃連一物湯

第七八 黃連瀉心湯

第七九 大黃黃連瀉心湯

第七九 酒煮黃連丸

第八〇 升麻湯

第八〇 升麻葛根湯

第八一 升麻六物湯

第八一 陽毒升麻湯

第八二 升麻梔子湯

第八二 升麻紫甲湯

第八三 玄參升麻湯

第八三 白虎湯

第八四 白虎加人參湯

第八四 白虎加桂湯



第九十七 白虎蒼朮湯

第一百 竹葉湯

第一百 竹葉石膏湯

第一百二 茵陳湯

第一百三 茵陳五苓散

第一百四 茵陳梔連三物湯

第一百五 茵陳茯苓湯

第一百六 茵陳四逆湯

第一百七 小茵陳湯

第一百八 茵陳吳茱湯

第一百九 茵陳附子湯

第一百十 大陷胃湯

第一百十 小陷胃湯

第一百十一 大陷胃丸

第一百十二 抵當湯

第一百十二 抵當丸

第一百十三 陽旦湯

第一百十三 陰旦湯

第一百十四 三物白散

第一百十四 小半夏湯

第一百十五 大半夏湯

第一百十五 半夏瀉心湯

第一百十六 小半夏茯苓湯

第一百十六 半夏生姜湯

第一百十七 半夏桂甘湯

第一百十七 薑汁半夏湯

第一百十八 厚朴半夏甘草湯

第一百十八 甘草瀉心湯

第一百十九 三黃瀉心湯

第一百十九 生姜瀉心湯

第一百二十 附子瀉心湯

第一百二十 赤茯苓湯

第一百二十一 茯苓甘草湯

第一百二十一 茯苓甘桂大棗湯

第一百二十二 茯苓桂甘白朮湯

第一百二十二 調中湯

第一百二十三 四逆湯

第一百二十三 當歸四逆湯

第一百二十四 通脈四逆湯

第一百二十四 通脈四逆加豬胆汁湯



第百零九 茯苓四逆湯

第百一十 四逆散加五味乾姜湯

第百一十一 當歸四逆加吳茱萸湯

第百一十二 附子湯

第百一十三 甘草附子湯

第百一十四 理中湯

第百一十五 治中湯

第百一十六 芍藥甘草附子湯

第百一十七 朮附湯

第百一十八 羌活附子湯

第百一十九 茵陳四逆湯

第百二十 四逆散

第百二十一 真武湯

第百二十二 附子散

第百二十三 甘草乾姜湯

第百二十四 理中丸

第百二十五 附子防風湯

第百二十六 薤白散

第百二十七 桔梗半夏湯

第百二十八 白通湯

第百二十九 白通加猪胆汁湯

第百三十 理中石膏湯

第百三十一 四順湯

第百三十二 增減理中湯

第百三十三 乾姜黃芩黃連人參湯

第百三十四 金匱引風湯

第百三十五 百合知母湯

第百三十六 百合洗方

第百三十七 大青四物湯

第百三十八 五物木香湯

第百三十九 正陽散

第百四十 枳實理中湯

第百四十一 四順丸

第百四十二 乾姜附子湯

第百四十三 脾約丸

第百四十四 柴胡半夏湯

第百四十五 百合地黄湯

第百四十六 犀角地黄湯

第百四十七 青黛一物湯

第百四十八 黑奴丸



第百九 黑膏

第百十 紫雪

第百十一 李根湯

第百十二 吳茱萸湯

第百十三 旋復代赭湯

第百十四 大橘皮湯

第百十五 小橘皮湯

第百十六 橘皮湯

第百十七 橘皮乾姜湯

第百十八 桔梗湯

第百十九 桔梗枳壳湯

第百二十 桔梗半夏湯

第百二十一 漢防已湯

第百二十二 防已黃芪湯

第百二十三 防風白木牡礪湯

第百二十四 海蛤散

第百二十五 楨榔散

第百二十六 五積散

第百二十七 束湯

第百二十八 桃花湯

第百二十九 沖和湯

第百三十 來復丹

第百三十一 靈砂

第百三十二 柿蒂湯

第百三十三 破棺丹

第百三十四 杏仁湯

第百三十五 木瓜散

第百三十五 烏梅丸

第百三十六 牛蒡根湯

第百三十六 地榆散

第百三十七 厚朴湯

第百三十七 厚朴丸

第百三十八 人參散

第百三十八 酸棗仁湯

第百三十九 敗毒散

第百三十九 葱豉湯

第百四十 連鬚葱白湯

第百四十 蒂花湯

第百四十一 栝皮湯

第百四十一 麥門冬湯



第百九 救逆湯

第百十 黑錫丹

第百八 羊肉湯

第百九 三建湯

第百七 姜蕤湯

第百十 括萎根湯

第百六 延胡散

第百九 射干湯

第百五 金沸草散

第百八 文蛤散

第百四 牡礪澤瀉湯

第百七 猪膚湯

第百三 猪胆雞子湯

第百六 驚甲散

第百二 白頭翁湯

第百五 烏扇湯

第百一 赤石脂丸

第百四 赤石脂禹餘糧湯

第百 蒿蘆苦酒湯

第百三 香薷湯

第百九 香薷散

第百二 消暑丸

第百八 清暑益氣湯

第百一 除濕湯

第百七 霍香正氣散

第百 絳雪

第百六 治懸桃仁湯

第百三 雄黃鉉散

第百五 萬金參通散

第百六 鼠矢豉湯

第百四 獾鼠養湯

第百七 規視散

第百三 竹皮湯

第百 天水散

第百二 防風通聖散

第百三 小續命湯

第百一 續命加姜汁湯

第百六 續命去附減佳一倍物湯

第百 川芎石膏湯

第百七 補中益氣湯

古今醫統

卷之二

三

古今醫統

卷之二

三



第一頁 安神丸

第一頁 柴胡飲子

第二頁 七宣丸

第二頁 鶴頂丹

第三頁 消蘊湯

第三頁 扁豆湯

第四頁 竹茹湯

第四頁 雞清散

第五頁 海藏大羌活湯

第五頁 參蘇飲

第六頁 香蘇散

第六頁 芎蘇散

第七頁 十神湯

第七頁 消風百解散

第八頁 換金正氣散

第八頁 二香散

第九頁 神木散

第九頁 冲和散

第十頁 百木散

第十頁 萬安散

第一頁 乾葛湯

第一頁 縮脾飲

第二頁 桂苓甘露飲

第二頁 六和湯

第三頁 枇杷葉散

第三頁 木瓜湯

第四頁 養胃湯

第四頁 清脾湯

第五頁 保真湯

第五頁 對金飲子

第六頁 杏仁煎

第六頁 應手方

第七頁 陽證結胸

第七頁 逍遙散

第八頁 再造散

第八頁 黃龍湯

第九頁 芩連消毒飲

第九頁 六神通解散

第十頁 氣漸

第十頁 六法方鈔

古今圖書集成醫部全錄



傷寒藥製煎煮法

古今醫統大全卷之十四

古今醫統大全卷之十四

福集

右春坊右中允翰林院脩撰震川何損俸梓

新安東臯徐春甫編集

武林靈石皇甫蒿校正

傷寒門下

小便不利

膀胱主分津液熱畜於內津液不下行故不利也有邪氣結於下焦聚而不散則小腹硬滿而痛小便所以不利也凡不利者宜導而滲泄之若引飲過多下焦蓄熱或中濕發黃水飲停留皆先利小便有汗下後忘津液胃中乾竭則有利小便之戒有小便不利而頭出汗者乃為陰脫閉革之疾也

古今醫統大全卷之十四



和鮮傷寒五六日已汗復下小便不利心煩桂枝湯 小柴胡湯  
分利太陽汗後脈浮小便不利微熱而渴 五苓散 渴甚者猪  
苓湯

清利傷寒七八日身黃如橘小便不利腹微滿者 頭汗出小便  
不利渴飲水椽瘕熱在內必發黃並用 茵陳蒿湯

攻下小便不利大便乍難乍易微熱胃中有燥糞也 大承氣湯  
選用 有潮熱兼大便泄小便不利 柴苓湯

濕風濕自汗身重不利者陰氣也 甘草附子湯  
熨法小便不通其因有二熱鬱不通用田螺搗朴硝少加麝香如  
泥貼臍上自通寒凝小水不利者用炒鹽熨臍下當通然則寒

熱不可不詳審也  
灸陰寒甚而小便不通陰囊縮入腹痛欲死灸 石門穴  
仍服四逆湯

小便自利

傷寒小便自利正因不當利而反自利也如大陽陽明自汗者不  
應利小便而反自利者寒為膀胱不禁熱為畜血使然是亦傷寒  
之一證也津液竭而病危矣夫安得不有治乎

和 太陽病小便自利以飲水多心下悸 桂枝茯苓甘草湯

血 太陽身黃小便當不利今反自利其人如狂為下焦畜血 抵

當湯 傷寒有熱小腹滿應小便不利今反自利為有血也抵



當丸 尿血玄胡散

大便閉小便自利知其熱在內微用承氣湯 下之

**溫**大便自通小便清利知其內虛寒也 四逆湯 真武湯去茯

苓用

**蜜導**陽明自汗應小便不利而反利津液內竭也糞雖硬不可攻

宜蜜導豬胆汁法

**小便數**

傷寒小便數者乃小便頻來而短少也腎與膀胱俱虛客熱乘之  
虛不能制水也 又有膀胱積熱則水行澀澀則小便不快故澀  
淋而數起也 若大便難小便數是為脾約約者儉也脾主為胃

行其津液今胃強脾弱約束不行致小便數而大便難也

**下**太陽汗吐下後小便數而胃不和譫語者少與調胃承氣湯

大便硬者小承氣湯 小便數大便堅脾約丸

**溫**大陽自汗四肢拘急難以屈伸心煩微惡寒脚攣急小便數者

不可行桂枝宜與甘草乾姜湯 芍藥甘草湯

**發黃**

傷寒發黃證通身面目皆知如薰黃如梅如橘是因當汗不汗而

生黃也當利小便却不利小便亦生黃也瘀熱在裏身必發黃胸

中水穀不消太陰脾土應於肌肉濕熱所蒸而至肌黃治須泄熱

滲溫為先 有頭汗出齊頸而還渴飲水滌者畜血也 大抵不



三古今醫統卷之十四  
外表裏鬱熱所致其風寒所鬱者間而有之傷寒至於發黃為病  
之已甚也是以有不治者多矣 寸口近掌無脉鼻氣冷者不治  
形體如烟薰直視搖頭者為心絕死 環口黧黑柔汗發黃為脾  
絕死

**發汗**發熱一身盡痛面目俱黃太陽中濕麻黃湯 連翹赤小豆

湯 脉浮而緊發黃者不可下 麻黃各半湯 身熱不去瘀  
血在裏而黃小便微利 麻黃連翹赤小豆湯

**和**解往來寒熱一身盡疼 小柴胡加梔子湯 脉浮絃咳嗽短

氣無汗脇痛鼻乾嗜臥一身及面目盡潮熱小便不利 柴

枳湯

**發**熱頭汗渴欲飲水小便利大便反快而黃者 五苓散加

茵陳湯 小便不利四肢沉重似瘡不欲飲 茵陳五苓散

服此而小便如皂莢汁則黃從小便出也

**陰**黃傷冷中寒脉弱氣虛小便如常變為陰黃理中加茵陳

湯 韓祗和云因下火過脾胃虛津液竭飲水自傷此陰濕傷

脾變黃 茵陳茯苓湯 茯苓橘皮湯 小茵陳湯 茵陳四

逆湯 茵陳茺萸湯

**發**鼻初覺發黃以瓜蒂散吹鼻內口擒水搐之鼻中出黃水驗

傷寒發班熱甚而傷血血熱不散裏實表虛熱氣乘虛出於皮膚



而為班也輕則疹子甚則如錦紋或病本屬陽誤投熱藥或當汗不汗當下不下或汗下未解皆能至此 有下之太早熱氣乘虛入胃故發班下之太遲熱留胃中亦發班 陽證熱藥過多胃熱焦爛亦皆發班也 有表虛裏實熱毒不散所以不可輕發汗不可輕下 陽毒發班者若熱毒深入班發紫黑是毒陷於內不可治也班赤者逆黑者十死一生

**消散** 陽毒已深內外結熱舌卷焦黑鼻如烟煤狂言見鬼面赤班如錦文五日可治六七日不可治 陽毒升麻湯 人參白虎湯 始用熱熾發為赤班或咽痛 玄參升麻湯 表證多者 防風通聖散去硝黃

鮮利溫毒發班而嘔者 葛根橘皮湯 嘔吐清汁眼赤口瘡下

痢 黃連橘皮湯

**鮮** 傷寒五六日班出猪膽雞子湯 蕪咽痛紫雪細細嚙之

發赤班 大青四物湯 發班通用升麻湯 犀角地黄湯

熱多玄參升麻湯 黃連四物湯 青木香一物湯

**涼** 血溫毒發班久月大煖人受不正之氣至春發為班爛癩疹如錦紋謂之溫毒陽脉浮救陰脉實大 黑膏化毒母

**下** 溫毒身無大熱渴煩大便實腹痛有赤班癩疹者 調胃承氣湯 班見無大熱脉虛秘悶 當歸丸

**清** 補汗下後胃虛極而發班者此火遊於外所致 白虎加人參



白朮

**狐惑**

傷寒不發汗變為狐惑狐惑二字取其進退猶豫不決之意也因  
內胃食少腸胃空虛三蟲食噉人五臟故唇口生瘡上唇生瘡  
垂食其臍為惑下唇生瘡更食其肛為狐其候齒燥聲啞惡飲食  
面目乍赤乍白乍黑舌上白胎唇黑有瘡細肢沉重喜眠其咽乾  
口瘡其者死

**清熱黃連犀角湯**

**涼血唇瘡聲啞桃仁湯**

**殺蟲雄黃錢散為膏納穀道中**

**多眠**

凡病者多不得眠傷寒反多眠者其說有四一太陽病欲解則多  
眠此神將復也一少陰病脉沉細但欲寐此神昏也一風溫為病  
當不了了亦多眠也一狐惑病四肢沉重喜睡上下唇有瘡此神  
恍惚也大抵陽氣虛陰氣盛則目瞑故多眠乃邪氣傳于陰而不  
在陽也昏昏閉目者陰司闇也默默不言者陰主靜也

**和解**太陽病脉細多眠外已解也 小柴胡湯

**瀉**少陰尺寸脉俱沉細但欲寐者少陰證也 四逆湯

風溫陽脉浮滑陰脉濡弱多汗或發汗後身猶灼熱喘息多眠風

溫也 萎蕤湯



不得眠

陽盛陰虛則晝夜不得眠蓋夜以陰為主陰氣盛則目閉而臥安若陰為陽所勝故終夜煩擾而不得眠也所謂陰虛則與夜爭是也大抵傷寒不眠者蓋熱也諸陽相併陰陽未獲所以不眠有汗多不眠汗為心液汗多則神脫故不眠有大熱而神不清亦不眠有大下則動血心主血亦不眠瘥後熱氣與諸陽併陰氣未復亦不眠

**和解** 吐下後晝夜不眠 酸棗仁湯 吐下後心中懊憹虛煩不

眠者 梔子豉湯

**清熱** 大熱嘔錯語不眠 黃連解毒湯 少陰病二三日已上心

煩不眠 黃連雞子湯

**與水** 太陽大汗出胃中乾不得眠欲飲水者少少與之

**利下** 後而渴不眠 猪苓湯 脉浮小便不利不眠者 五苓

散

**溫下** 後復發汗不得眠無表證脉沉 乾姜附子湯

短氣

短氣者呼吸短促而不能相續也千金方云少氣不足以息是也似喘而不搖肩似呻吟而無痛者短氣也心腹脹滿邪在裏而為實心腹喘滿邪在表而為虛有停水心下亦有短氣隨證攻治無不愈矣



**更汗**短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈 葛根加人參湯

**兩解**有短氣腹滿而喘有潮熱者此短氣之實也 大柴胡湯

**溫經**腹濡滿而短氣者邪在表而為虛也 跌陽脈浮而緊則為

痛微則為虛相搏則為短氣之虛也 風濕相搏汗出短氣小

便不利惡風不欲去衣 甘草附子湯

**分利**水停心下短氣 五苓散

**下乾**嘔短氣汗出不惡寒此表解裏未和 十棗湯 大陽病下

之早心下硬為結胸 大陷胸湯

**蚘厥**

蚘厥者食即吐蚘此為臍寒蚘上入膈故時或發煩須臾復止得

食而嘔又煩又煩者蚘聞食氣其入當自吐蚘或因發 汗胃中

冷故長虫出又有胃氣困乏雖飢不能食食到口蚘聞食氣而上

虛寒并於胃中所以食與蚘并吐而出也 仲景止用烏梅丸

**溫活**人書謂吐蚘為胃中虛冷先用 理中丸 或四逆湯

**利渴**吐蚘 理中加大黃入蜜以利之

**水氣**

水氣為水飲也水為至陰其性寒有內熱得水則消身熱內寒得

水而寒相搏故水停心下

**兩解**表不解心下有水氣乾嘔發熱喘渴或利或小便不利少腹

滿 小青龍湯 心下有水氣喘而欬熱不渴服湯已渴者此



寒去欲解 小青龍湯

**分利** 中風傷寒六七日欲渴飲水水入即吐有表裏證名水逆

五苓散

**下結** 胃無大熱此水結在脇但頭汗出 大陷胸湯

**溫** 少陰腹痛小便不利四肢疼痛下利此有水氣或咳嘔或小便

利 真武湯 厥而心下悸宜先治水 茯苓甘草湯

**百病**

百脉一宗舉身皆受病無經絡之狀大抵病後虛勞臟腑不平變而成此其病似寒無寒似熱不熱欲食不食欲卧不卧欲行不行以寒非寒似熱非熱默默不知所苦服藥即吐有如見鬼小便赤

此為百合但因病中失調餘證在陰則攻陽反下之在陽則攻陰反汗之此為逆各不得解故成百病

**和** 通用小柴胡湯加百合知母粳米生姜

**清涼** 血百合知母湯 百合地黄湯

**洗浴** 一月不解變成渴者用百合一升水一斗漬一宿煖溫洗身

**陰陽易**

男子病新瘥婦人與之交曰陽易婦人病新瘥男子與之交曰陰易此則正氣將復却被淫慾之邪動易也故曰易其候身重氣乏腹中絞痛頭不能舉足不能立四肢拘急百節解散熱上冲肖眼中生花 男子則陰腫腹內攻刺 婦人則裏急腰膝連腹內痛



若手足拳拳其脉離經皆不可治或榮衛虛精髓竭翕翕少氣手足不能舉動者引歲月而死此內寒六氣又動七情其害若此豈不慎哉其不易自病者名女勞復謂之陽脫邪盛亦不可治

**通治**陶云其證有寒熱不若寒病用燒棍散入熱藥中調下

病用燒棍散入寒藥中調下緣此通治易證以為切當

**導陰氣**燒棍散 段鼠橋皮湯

**利**小便不利 五苓散

**溫**當歸白朮湯 乾姜湯

**勞復**

凡病將愈為勞動而病復作者謂之勞復非但強力持重若梳沐

動氣憂愁思慮則勞神皆復也

**鮮**新瘥後津液未復氣血尚虛少勞之則生熱而病復作脉浮者

微汗以鮮之 枳殼梔子湯 鼠矢豉湯 猴鼠矢湯 當歸

白朮湯 乾姜湯

**和**勞役復發熱者 冲和湯

**清**差後渴熱 竹葉石膏湯 勞復發熱欲絕 麥門冬湯

**食復**

病後新瘥胃氣未完但得少食糜粥常令稍飢不可過飽若恣所欲頓食至飽或食肥膩膾炙果品等稍不消化則邪氣乘機而復作發執煩燥而病愈甚謂之食復



吐宿食未克者 枳實梔子豉湯吐之

**消**腹滿煩熱 二陳湯加山查麥芽砂仁神麩

**下**飲食稍多經數日不愈脉沉實熱甚便秘譫語 大柴胡湯

枳實大黃湯

**補**消導後熱不退者 補中益氣湯

**過經不解**

傷寒十餘日過經不解胸滿而嘔日晡潮熱大便微利本大柴胡

證醫以丸藥下之非其治也 傷寒法以十二日愈十二日不愈者再傳所謂過經是也

**解**有潮熱者實也先與小柴胡湯 以解外後服柴胡加芒硝

大陽過經十餘日下之後四五日柴胡証在與小柴胡湯 嘔

不止心下微煩為未解 大柴胡湯

**下**傷寒十三日日過經不解譫語以有熱也當以湯下之內實者

調胃承氣湯 大陽過經十餘日心下欲吐背痛大便反澹腹

微滿微煩若不經吐下者當與柴胡湯 若曾經吐下者則邪

氣乘虛入胃為實 調胃承氣湯

汗後不解

汗後而病不解寒熱如舊或表邪未盡或邪傳裏或邪氣乘虛內

客宜各因其證而治之

**汗**曾服麻黃桂枝若脉洪大形為瘡狀再發汗必解 麻黃湯

**表裏**熱解發熱汗出不解心下痞硬嘔吐下和 大柴胡湯



清服桂枝大汗出大渴煩不解脉洪大白虎加人參湯

下發汗後不惡寒但惡熱及蒸蒸發熱者實也 調胃承氣湯

發汗後不可更行桂枝汗出而喘無大熱者麻黃杏仁甘草湯

分利大陽病發汗後大汗出胃中乾燥不得眠欲飲水者少少與

之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴 五苓散 發

汗已脉洪數煩渴 五苓散

和中汗後腹脹滿 厚朴生姜人參湯 汗過多心下悸欲得發

顫 桂枝甘草湯

溫經發汗後病不解反惡寒者表虛也 芍藥甘草附子湯 脉

細身倦者方可服 太陽病發汗汗出不解仍發熱心中悸身

暈動振欲辟地真武湯 發汗後身疼痛脉沉者 桂枝加

芍藥人參湯 太陽發熱遂不止其人惡風小便難四肢拘急

難以屈伸桂枝加附子湯 大汗出熱不去內拘急四肢疼下

利惡寒 四逆湯 發汗後臍下悸欲作奔豚 桂枝甘草大

東湯

下後不解

身熱不去利不止胸腹滿渴煩活人云去傷寒之邪不過汗吐下

之三法也三法得當病勢易衰則愈矣倘三法失宜加以病勢危

惡則傳變不已誠可慮也况發汗吐下後邪氣乘虛而未散或壅

窒而未盡則當量其虛實以治之先賢謂知邪氣之虛實發汗吐



下之不差溫補鍼灸之適當則十全之功可自得矣

**吐**傷寒五六日大下後身熱不去心中結痛未欲解也 梔子頭

湯 下後心煩腹滿卧起不安 梔子厚朴湯

**清熱**太陽桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解喘而汗出

者 葛根湯 黃連黃芩湯

**下**陽明下之心下懊憹而煩 梔子豉湯 有燥屎者大承氣湯

**溫**大陽下後脉促胃滿去桂枝芍藥湯 微寒去芍藥加附子丸

藥下之身熱不去微煩 梔子乾姜湯

**解**錯雜之邪 六七日大下後寸沉而遲手足厥逆下利脉不至咽

喉不利唾膿血瀉利不止為難治 麻黃升麻湯

**下後熱**

下後有熱血氣虛也大陽陽明之故也仲景云大發其汗使陽氣

微又下之使陰氣弱其人亡血病當寒後乃發熱無休止陰陽既

虛氣血俱弱故其熱不可止息所用葶藶梔子亦酸苦湧泄之義

也

**吐**陽明下之仍發熱心下懊憹飢不能食頭汗出 梔子豉湯

**利**服桂枝湯或下之仍頭頂強無汗翕翕發熱心下滿微痛小便

不利 桂枝湯去桂加茯苓白朮湯

壯陰大下後則傷血故脉瀯 葶藶苦酒湯

**汗後惡寒**



汗後惡寒但表解未盡則為輕證法當再汗之若陽微於外寒積於內厥逆自利則用四逆湯若陽微於外熱伏於內大便實者下之若汗後脈不為汗衰比前躁疾者此名陰陽交交者死

此篇可與不得

汗及前惡寒例兼着

**發表**汗後惡寒表未解者汗之 麻黃湯

**兩解**汗後熱不退大便實微惡寒者先解表表解後用 大柴胡

湯 小承氣湯

溫汗後陽微惡寒大便不實者 芍藥附子甘草湯 汗後惡寒

自利厥逆者 四逆湯

**汗吐下不解**

三法俱用之後而病不愈者其有虛實之故也若非餘邪未盡必是陰陽兩虛於斯時也當斟酌審之或可瀉則瀉可補則補庶不殺人也

**和**五六日已發汗復下之胃腸滿微結小便不利渴而不嘔但頭

汗出往來寒熱心煩為未解 柴胡桂姜湯 太陽汗吐下解

後心下痞硬噫氣不除 旋覆代赭石湯

**解**太陽先發汗不解而復下之脈浮者則知病在外當瀉解外

桂枝湯

清吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上

乾煩飲水者 白虎加人參湯



**温**汗下之後病仍不解燥煩不得眠 茯苓四逆湯 大汗若大

利而厥者 四逆湯 下後復發汗晝日煩燥不得眠夜而安

靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱 乾姜附子湯 下後

復發汗脉微細而振寒者此内外俱虛也 吐下之後食入口

即吐 乾姜黃連黃芩人參湯

**吐**發汗吐下後虛煩不眠劇者反覆顛倒心中懊懷 梔子豉湯

發汗若下之煩熱胃中空 梔子豉湯

**下**吐下後不大便五六日至十餘日日晡發潮熱不惡寒獨語如

見鬼循衣摸床脉弦者生濇者死但發熱譫語 大承氣湯

吐下後復脹者邪熱入胃也 調胃承氣湯 大陽吐下後

微煩小便數大便硬 小承氣湯

**和經**吐下後心下逆滿氣上冲胃頭眩脉沉緊發汗則動經

身為振搖 茯苓桂枝白朮甘草湯

**急下急温**

夫傷寒急下急温者病勢已迫將有變也故稱急者非若他證尚

可緩也少陰屬腎主水口燥咽乾乃熱邪内炎腎水將竭故當急

下如腹脹不大便土勝水也亦當急下陽明屬胃土汗多熱盛急

下以存津液腹滿痛為土實急當下之 熱病目不明熱不已者

死今目睛不和證亦危矣須急下 少陰急温二證内寒已甚急

温無疑也

温無疑也

温無疑也

温無疑也



少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之 大承氣湯 少陰

病自利純清水心下必痛口燥咽乾者急下之 上方同 少陰病六

七日腹脹不大便急下之 上方同 陽明發熱汗多者急下之 上方同

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱急

下之 上方同 發熱不解腹滿痛急下之 上方同

溫 少陰脉沉急溫之 四逆湯 少陰膈上有寒飲乾嘔不可吐

急溫之 四逆湯

**傷寒見風**

外證是傷寒診其脉是傷風脉浮而緩也故曰傷寒見風見風脉

也外證寒多熱少不煩手足微厥是也

解表傷寒見風風則傷衛寒則傷榮衛傷者桂枝湯榮傷者麻黃

湯榮衛俱傷 大青龍湯 煩燥者用 不煩燥者 桂枝麻黃各半湯

**傷風見寒**

外證是傷風診其脉則是傷寒脉浮而緊者是也其證惡風發熱

多煩或手足微溫

解表傷風見寒脉似桂枝而無汗病似麻黃而反煩燥是也 大

青龍湯 脉若緩而有汗者桂枝湯 脉緊不煩燥者麻黃湯

**類傷寒四證**

痰証 食積 虛煩 脚氣

痰證 似傷寒證增寒壯熱惡風自汗背滿氣上冲咽不得息此中

腕有痰但頭不痛項不強為異若痰涎盛者亦隱隱頭疼寸口



脉浮若有脉伏以意參之二陳湯 柴胡半夏湯 大半夏湯

金沸草散 氣上冲者瓜蒂散

**食積** 似傷寒發熱惡寒吐逆頭疼但身不痛為異左手脉平和右

手脉緊盛是以知其傷食也 食在上脘胃滿嘔吐者宜吐之

瓜蒂散 心腹滿痛大柴胡湯下之 或用治中湯 五積散

吞下木香檳榔丸

**虛煩** 惟煩熱與傷寒相似不惡寒不頭痛不身疼為異此煩熱者

蓋虛也表既虛不可汗裏不實不可下若攻之者多死惟宜竹

葉石膏湯 虛煩不止者梔子升麻湯 白虎湯 嘔吐

者大半夏加陳皮湯 內寒外熱者陰旦湯 驚悸痰

虛煩者温膽湯 傷寒汗吐下後虛煩不得昭者 梔子

豉湯 上盛下虛虛煩自利者竹葉湯去石膏加附子若既濟

湯 婦人挾血虛而煩者四物湯加人參麥明冬竹葉甘草

**脚氣** 似傷寒頭痛身熱大便秘肢節痛嘔但無脚弱為異或始因

足腫疼痺或緩弱小腹不仁或心悸轉筋食則吐胃滿此病多

因寒濕傷足毒邪冲心發則類傷寒足膝必難動便寒傷三陽

所患必冷 越脾湯 小續命入姜汗 暑中三陰所患必熱

小續命湯去附加桂 脚腫者木瓜散 檳榔散 太便秘者

脾約丸

**三陽合病**



傷寒合病者或兩經三經齊病不傳者為合病 三陽合病腹滿身重難以轉側口中不仁譫語遺尿皆不可汗下

**清熱和表裏白虎湯**

**合病**

**太陽陽明合病**脉浮而長大便秘小便利其脾為約 脾約丸

惡寒者升麻葛根湯 不惡寒反惡熱大便不秘者白虎湯不惡寒反惡熱大便秘或譫語者調胃承氣湯 喘而胃滿者不可下麻黃湯 但嘔而不利葛根加半夏湯

**太陽少陽合病**脉浮而弦脇下硬滿往來寒熱及有餘證者並與

小柴胡湯 自下利者黃芩湯 嘔者黃芩加半夏生姜湯

**少陽陽明合病**脉弦而長因發汗因利小便已而胃中燥實大便

難也調胃承氣湯 脉長自利者為順脉滑而數者為負負者

尅賊脉滑而數者有宿食大承氣湯

**併病**

傷寒併病者一經先病未盡又過一經之傳者為併病又始初二陽合病後則一陽氣盛一陽病衰歸併於一經也故曰併病

**太陽陽明併病**太陽病發汗汗出不徹轉屬陽明續自微汗出不

惡寒若面色怫鬱痛無常處是陽明復併回太陽當再汗之愈

麻黃湯 太陽證未罷桂枝麻黃各半湯 微汗之 太陽證

罷但陽明證者下之宜大承氣湯



太陽少陽併病心下痞而眩少陽也頸項太陽也 若頭痛眩冒時結胃心下痞硬當刺肺俞肝俞大椎 慎勿下

**太陽不勝陽明不負**木相尅為順負者失也**少陽脉勝陽明脉負**是鬼賊相尅為道

**熱病**

夏月傷寒是為熱病發熱頭痛肢體重痛惡寒惡熱其脉洪盛用藥不可太温如桂枝麻黃青龍其性頗熱須加苓連涼劑不然則有黃斑之变也惟九味羌活湯 最當 凡熱病脉三日後仍數邪克在經宜用桂枝石膏湯 或值淫雨或病人有濕蒼木白虎湯 夏至後謂之脫發梔子升麻湯

**瘟病**

發於春三月及夏至以前是也發熱咳嗽頭痛身痛口渴脉來浮數温病當分治

**解肌**熱甚者升麻葛根湯 解肌湯

**和**不渴者小柴胡湯加桂 咳者小柴胡加五味子渴者去半

夏加瓜蒌根人參 虛煩者竹葉石膏湯

**下**發渴煩燥大便秘 大柴胡湯利之

**温瘧**

重感於寒变为温瘧脉尺寸俱盛兼絃而數

**和**解先熱後寒小柴胡湯 或白虎加桂湯



**清熱**但熱不寒止用白虎湯

**溫毒**

陰脉實大陽脉洪數發熱發斑隱疹咳無心悶

**清熱**玄參升麻湯

**涼血**黑膏

**風濕**

**發汗**敗毒散 獨活湯 許氏用續命湯減麻黃附子

**解肌**柴胡桂枝湯 白木湯

**清熱**汗後發熱無下證知母石膏湯

踈風頭目昏眩四肢煩痛荆芥散 金匱引風湯

**濕溫**

其人傷濕因而中暑名曰濕溫發熱頭疼胸間多汗兩脛冷安言脉陽濡而弱陰小而急病類傷寒不可發汗汗出必不能言耳聾耳不知痛在身青面色變名曰重暍必死

**清暑熱**東垣清暑益氣湯 白虎加蒼朮湯

**分利**五苓散

**溫冷**香飲子茯苓白朮湯

**降痰**消暑丸 橘皮湯

**中濕**

中濕證脉沉緩一身盡痛及身黃大便反快小便澀是也



利五苓散

温小便自利木苓附子湯 小便不利大便反快甘草附子湯

中暍

夏月自汗煩渴為中暍面垢背寒身不痛外證大率似熱病中暑有四證可審自汗一也煩渴二也脉虛三也面垢四也但不惡寒不身痛為中暍手足雖冷脉雖虛不可用熱藥當以清暑之劑及利小便為佳

清暑香薷飲

中暍手足微冷煩渴四支不痛白虎湯

中暑發熱不惡寒竹葉石膏湯

中暍身熱惡寒汗出而渴

及太陽中暍發熱惡寒身重脉絃細小便已洒然毛聳手足冷

勞則熱手足汗口爛而燥俱宜白虎加人參湯

分利發熱頭痛小便不利色赤 頭痛惡寒心煩燥心下不快

五苓散 益元散

和發熱頭痛煩燥小柴胡湯

豁痰痰逆惡寒者橘皮湯

降火熱甚者黃連解毒湯加香薷

熨法昏憤不省人事葱餅熨臍

臍結

臍結之候其狀如結胃飲食如故時時自下利舌上白胎臍痛引陰筋不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜此臍結也仲景謂病



脇下素有痞連在臍旁痛引小腹入陰筋者此名臟結死蓋昔宿積之結于脇為痞今因傷寒邪氣入裏與宿積相合使真藏之氣結而不通致連在臍傍痛引小腹入陰筋而死仲景無治法舌上白胎者不可攻

**和**小柴胡湯

**藏**關元穴

**舌上胎**

傷寒三四日已後舌上有膜白滑如胎甚者或澁或黃或黑皆熱氣之淺深也邪氣在表者舌上則無胎邪氣傳裏津液結搏則舌上生胎也寒邪初傳未全成熟在半表半裏或丹田有熱胃上有

寒邪初傳入裏也惡寒者必欲嘔也腹中痛者必欲利也

**和**陽明病脇下鞭滿而喘發熱汗出不大便而嘔舌上白胎者小

柴胡湯 脉陰陽俱緊舌上滑胎小柴胡去半夏加人參栝藹

湯 腹痛理中湯

**吐**陽明脉浮緊咽燥腹滿而喘發熱汗出惡熱心中懊懣舌上胎

者梔子豉湯

**下**若熱聚於胃則舌為之黃是熱已深也金匱曰舌黃未下者下

之黃自去黑滑皆然經曰若舌黑者反為熱之極也又曰熱病口乾舌黑者死

**清熱**七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌乾燥而



煩欲飲水數升者 白虎湯加人參

杜學士三十六般辨視舌色法

清碧學士杜先生曰凡傷寒熱病傳經之邪比雜病不同必須以脈與證及舌三者併看表裏汗下之法方免無差不悞人命且如脈者血之腑也屬陰人初得病者時邪與正氣相搏未讓脈必滑而有力也病久熱甚氣衰脈必微細無力方數甚也只好養陰退陽此議脈之妙也又如證者初病有惡寒發熱後必有渴欲水燥熱之類也或有逆厥而狂者此熱證傳經之邪也始終熱證實熱故無寒也傷寒為病初頭痛必有發熱而惡寒渴水之證一病便不逆泄痢但寒而無發熱此寒證也且如識證之妙者如火者

本心之官也竅於舌心屬火主熱象離明人初得病在表則舌自紅而無白胎等色表邪入於半表半裏之間其舌色變為白胎而滑見也切不可不明表證故邪傳之間其舌色初為白胎邪入於裏則舌必見黃色乃胃邪之象宜調胃承氣湯下之胎黃自去而疾安矣若醫不以決第而悞用湯丸失於遲下其胎必黑變為舛証此為難治若見胎如黑漆之光者十死一生此心火與邪熱二火相乘亢極變為黑色如火之炙物極則焦而形黑也乃臟腑皆受邪毒自深胃中積熱之極宜速下之瀉去胃中實火庶幾回生若下之遲死期必矣今撰三十六舌法於左并方法源流可決死生之妙也



二十六舌法

白胎舌 治宜小柴胡湯 或梔子豉湯

火烙舌 宜涼膈散 或大柴胡湯下之

紅星舌 將發黃宜茵陳蒿湯

生斑舌 宜玄參升麻湯 或化斑湯

黑炭舌 宜竹葉石膏湯 大熱宜調胃承氣湯下之

黑圈舌 過經未解宜大承氣湯下之

人裂舌 宜涼膈散加黃連主之

虫碎舌 宜小承氣湯下之

厥陰舌 宜理中丸或四逆湯主之

裏黑舌 調胃承氣湯下之 或解毒湯調之

瘟毒舌 黑色者主死

死蜆舌 百者無活主死無疑 凡見舌尖白根黃此為表證未

解須宜解表然後可攻之如大便秘者宜涼膈散泡硝

黃熟服 小便澀者宜五苓散加木通合益元散入姜

汁白湯調下

舌見弦白心黑 脉沉微者難治 脉見浮滑者可汗 沉實者

可下 若初病見此者危急調胃承氣湯下之

舌見尖上白胎二分根下黑一分 必有惡寒身疼如飲水者五

苓散 自汗渴者白虎湯 下痢者解毒湯 此亦危証



舌見白胎中有小黑點亂生當有表証其病之來雖惡宜服涼膈散微表之退即下之用承氣湯

舌見兩弦灰色中有黑暈痕二條此熱乘腎當急下之用解毒湯加酒泡大黃為末調服

舌見微黃色者初病則得之不自白而變黃者必見譫語此由失汗表邪入裏也必用汗下兼以雙解毒湯

舌見白胎帶黃色者必泄宜服解毒湯 惡寒者五苓散

舌見醬黃色肥光者 必表未解宜小柴胡湯合天水散 可下者大柴胡湯

舌中見黑胎者同上治

舌見黃色者必先見白胎變黃色也此為表而傳裏也熱已入胃急下之調胃承氣湯 若不早下必至黑色而不可救白中見

黑胎者同治

舌見白胎而自汗出者不可下宜白虎湯加人參

舌見白胎滑者脉在肌肉為邪在半表半裏必往來寒熱宜小柴胡湯和之

舌見白而胎滑者時時自下利小腹引陰筋此名臟結之証為邪併入臟深為難治

舌見四圈白而中有黃者必作煩渴嘔吐之證兼見表者五苓散合益元散 服之黃盡方可下之



舌見黃而有小黑點者熱必深也邪傳六腑將入五臟急下之調胃承氣湯 次進解毒湯 亦為十存四五也

舌見根黃尖白表少裏多宜天水散一合涼膈散二合和而服之如嫌未散防風通聖散主之

舌見乾而澀者膈邪傳胃併毒極深必煩渴急宜下之大承氣湯若見發黃茵陳蒿湯 血証抵當湯 表有水腫在脇內十棗湯 結胃者大陷胃湯 痞滿者大黃瀉心湯

舌見四邊微紅中央成黑灰色行路痕者此由失下熱退可愈雖四五下之方退大承氣湯 五次下之而胎色不退者不治

舌見黃而中有黑點亂生者其証必渴譫語脉滑者生脉瀉者死循衣摸床者死下之見黑糞者死 大承氣

舌見黃而中有黑至尖者熱毒邪氣已深而感者下之十有九死宜用九味羌活湯 不惡寒下利調胃承氣湯

舌見弦紅心黑者傷風表未解也宜雙解毒散加雙解毒湯微汗之表証罷可下之如結胃煩燥日直視者下之非結胃不可下

舌見根黑尖黃微隱隱不見如黑灰色根黑尖黃須有黑行其脉實宜下之大承氣湯 脉浮而渴者涼膈散 其能活者十有

三四

舌見灰色無惡寒惡風雖脉浮者亦可下之 若惡風寒雙解毒

湯 下之見黑糞者不可治



舌見根黑尖黃脉滑者可下之 脉浮者養陰退陽 若惡風寒者微汗之 雙解毒散下之不成利者用解毒湯 舌見大黑而有亂紋者脉滑實急下之十得一生 脉浮數無力者不治

古今醫統大全傷寒補遺

晝夜偏劇

一熱入血室為陰虛則夜不寧而病劇 汗下過多為亡陽陽虛則晝不安

**和鮮**婦人傷寒發熱晝則明了暮則譫語為熱入血室以陰虛而

熱邪乘虛而入故暮譫晝了 小柴胡加牡丹皮湯

**濕**下之後復發汗晝則煩燥不得眠夜而安靜不嘔不渴無表裏

證脉沉微身無大熱者 乾姜附子湯 為下而復汗以亡陽

故晝煩而夜靜

飲酒復劇



傷寒時證汗後和平身涼安靜却因飲酒復劇發熱煩悶乾嘔呻吟錯語不得臥 黃連解毒湯

**瘧後昏沉**

傷寒瘧後十數日或半月二十日終不惺惺常昏沉如失精神言語錯謬似鬼祟似風非風或無寒熱或潮熱有寒熱如瘡皆緣發汗未盡餘毒在心胞絡所致 知母麻黃湯

**出汗不均** 為汗不流是汗出蓋覆不周則汗出不均致腰背手足

搖擗或冷或熱 牛旁根散

**水氣** 大病瘧後從腰已下有水氣者 牡礪澤瀉散

**壞證**

傷寒病中又感寒暑燥濕風熱異氣而成壞証或經汗吐下溫鍼乃不解小柴胡湯證罷亦成壞證况病已過經熱留厥府証候多變久而不瘥陰陽錯亂死復紀綱大率以表證多者 知母麻黃湯 若諸藥不効者用 蠶甲散 若柴胡証在則不為逆

**不仁**

謂不柔和則痛痒寒熱屈伸灸刺皆不自知皮膚不榮謂之不仁經曰虛邪乘寒則為鬱冒不仁蓋其血氣虛少不能周流于身是為邪氣所伏故肌體頑麻不知痛痒又因少陰腎氣微精血少氣逆心下陽氣退熱歸陰 與陰相動令身不仁此為屍厥其乘寒之厥鬱冒不仁即此屍厥可知矣若脉浮而洪身汗如油喘而不



仁水漿不入即體不仁此為命絕

**溫**直指方用 甘草乾姜湯 桂枝為藥加乾姜各半湯

**灸**中極穴 一名玉泉

**鍼**昔越人入號太子病屍厥以鬱冒不仁為可治 刺之而得痊

**火邪**

火邪者謂其不當用火而用之故謂之火邪凡傷寒汗不出服發汗藥至於再三而汗不行此津液內涸也其證故危若尋常汗症藥未至切而汗不行遽以火迫於床榻之下劫奪取汗炎氣薰灼熱邪交併變為驚狂等証實者則煩燥不已虛者真陽脫亡當量其虛實而解散之 大陽汗下心下痞表裏俱虛復加燒刺首

面青膚潤者難治色黃手足溫者可治 太陽中風以火劫之因

火熱兩陽相結薰灼發熱于外身必發黃執搏于內則小便難火

熱大甚則手足燥擾循衣摸床為難治小便利者火氣未劇尚可

治也

涼血太陽病以火薰之不得汗發燥不鮮必下清血必為火邪

犀角地黄湯

發汗脈浮宜以汗解用火炙之邪無從出病從腰以下必重而痺

名為火逆 麻黃杏子薤白甘草湯

循衣摸床

傷寒若吐 不鮮不大便五六日已上至十餘日日晡潮熱不惡



寒獨語如見鬼狀劇者則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視若微者發熱譫語大承氣湯 若一服而利即止復看脉弦者生瀉者死仲景云循衣摸床者不可治

下大承氣湯 小承氣湯 可選而用之

**直視**

直視者目睛不能轉動也水精為志火精為神心使之也傷寒直視為邪氣壅勝冒其真氣使神志不衛於心精氣不榮於目則為直視多不治也衄家不可汗汗則目上脉緊直視不能動狂言直視則為腎絕搖頭直視則為心絕皆臟氣已脫也直視喘滿不知人下反循衣摸床者直視者死

**下**其或目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者非直視乃內實也急下之 大柴胡湯 大承氣湯 選用之

**遺尿**

仲景云溲便遺失狂言反目直視者此腎絕也 風溫被下必失溲三陽合病一焦氣絕不歸其部不可汗下

**溫**陰陽俱虛下焦脫用附子

**清**三陽合病腹滿身重難以轉側身不仁譫語遺尿發汗則譫語

下之則額上生汗手足厥冷自汗而熱 白虎加人參湯

**下膿血**

陽病下利便膿血協熱也 必陰下利便膿血協寒也膿為陳積



血為新積熱則清寒則固此為治之大畧也

**清**下後脉數不解下利不止必協寒而便膿血 犀角地黃湯

**固**少陰下利不止腹痛便膿血 桃花湯

**傷寒十勸**

李子建傷寒十勸不可不知醫家病家知此十勸則不致悞所益非輕况傷寒之病與雜證不同投藥一差生死立判

一傷寒頭痛及身熱便是陽證不可服熱藥

傷寒病傳三陽三陰共六經內太陰病頭不疼身不熱少陰病有反發熱而無頭疼陰病有頭疼而無發熱故知頭疼身熱即是陽證若妄投熱藥決致死亡

二傷寒必須且攻毒氣不可補益

邪氣在經絡中即隨證早攻之只三日四日痊安若妄補正氣使毒氣流熾多致殺人

三傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥

傷寒不思飲食自是常事不知邪氣在胃故亦不飢雖不飲食亦不死如理中丸人參黃芪之類不可輕服若陽病服之熱邪增重多致不救丁香巴豆之藥尤不可服

四傷寒腹疼亦有熱證不可輕服溫煖藥

仲景論腹滿時痛之證有曰痛甚者加大黃夫痛甚而加大黃意可見也於身冷厥逆而腹痛者方是陰証須消息之每見腹痛便



授執藥多致殺人

五傷寒自利當看陰陽證不可例服補藥熱藥止瀉藥

自利惟身不熱手足溫者屬太陰 身冷四逆者屬少陰厥陰

其餘身熱下利皆屬陽隨証依仲景法治之若陽證誤投熱藥者

多不治

六傷寒胃脇痛及腹脹滿不可妄用艾灸

常見村落間病傷寒無藥使用艾灼多致毒氣隨火而盛膨脹發

喘而死不知胃脇痛自屬少陽腹脹雖屬太陰仲景以為當下之

證此外惟寒厥陰證可灸之

七傷寒手足厥冷當看陰陽不可例作陰証

傷寒有陽厥陰厥醫者少能分辨陽厥若投熱藥殺人多速於用刃

蓋陽病不至於極熱者不能發厥仲景所謂熱深厥亦深又與熱

藥寧復生乎但看初得病而身熱至三四日後熱氣已深大便秘

小便赤或譫語昏憤及別有熱証而發厥必是陽厥急用承氣湯

下之若初得病身不熱大便秘自引衣蓋身或利小便數不見

熱證而厥逆即是陰厥方可用四逆湯之類二厥所以使人疑者

緣為其脉皆沉然陽厥脉沉而滑陰厥脉沉而弱又陽厥指爪時

溫或時發熱陰厥則常冷此為可別

八傷寒病已在裏即不可用發汗藥

傷寒證須看表裏如發熱惡寒則是在表宜發汗如不惡寒反惡



熱即是裏證若一例發汗則所出之汗不是邪氣乃泄真氣邪氣未除真氣先泄死者必矣又別有半表半裏之證及無表裏之證皆不可下亦皆不可汗但隨證治之

凡傷寒飲水為欲愈不可令其恣飲過度

凡病人大渴欲飲水當與之以消熱氣故仲景以飲水為欲愈人見此說遂令病人縱飲因而為嘔為喘為咳逆為下利為腫為悸為水結胃為小便不利者多矣且如病人欲飲一碗只與半碗常令不足為善

十傷寒病初安不可過飽及勞動或食羊肉行房諸厚味飲酒

病方愈不必再服藥脾胃纔復不可過食不能消化病即再作謂

之食復病方愈氣盡尚虛勞動太早病即再來謂之勞復若食羊肉及行房者犯之必死食諸厚味并飲酒者再作必重

### 傷寒禁忌

傷寒病服藥中病即已不必盡劑千金方云傷寒新差後食猪肉

羊血魚膾肥膩等味必大下利若食餅餌前煇瓜果等物胃氣尚

虛不能克化必更作熱皆難治也 又云新病差后但得少食糜

粥常令稍飢不可過飽不可恣慾妄食雖思勿與也 又忌大肉

諸般骨汁 本草註羊肉熱病瘥後食之發熱殺人 又新差後

當靜臥切勿早起梳沐勞動多言用心使意此皆令勞復 又新

差後未滿百日氣力未平復而犯房室者皆再熱作而死不治此



新愈後之大禁也

陶氏傷寒十四法

一傷寒發狂奔走人難制伏老於病人房內着火一盆用醋一碗傾於火上其醋氣入鼻內即安方可察其陽狂虛實用藥無差若病初起頭痛發熱惡寒方除已後登高棄衣而走踰牆上屋罵詈叫喊大渴欲死脉來有力迺因邪傳入裏陽盛發狂當用寒藥下之凡見舌卷囊縮者不治○若病初起無頭痛身微熱西赤戴陽煩燥脉來沉微無力欲坐卧涼水中乃因寒極而發燥即是陰證似陽當用熱藥溫之此為陰燥凡見厥冷下利譫語者不治 若醫者不察其脉以虛陽上昂而躁誤為實熱反

與涼藥使渴成躁急則氣消而成大害矣須察脉來有力無力此為良法

一傷寒腹中痛甚將凉水一碗與患者飲之其痛稍可者屬熱痛當用涼藥清之清之不已而或遶臍硬痛大便結實煩渴屬燥糞痛急用寒藥下之若食積痛者同治若小腹硬痛小水自利大便黑身目黃者屬蓄血痛亦用寒劑加行血藥下盡黑物則愈此三者皆痛随利減之法也○若飲水痛甚者屬寒當用溫藥和之和之不已而成四肢厥冷腹痛嘔吐瀉利急用溫藥投之須察脉來有力無力此為良法

一傷寒直中陰經真寒證甚重而無脉或吐瀉脫元氣而無脉將



好酒姜汁各半盞與病人服之其脉來者可治當察其陰用藥不拘脉之浮沉大小但指下出見者生如用此法脉不至者必死又當問病人身有痛處要知痛甚者脉必伏不為凶如無痛證用此法而脉不至者凶又問病人平素原有出部位之脉當覆手取之有脉者無事若原不出部今覆取而有之亦為陰陽之錯亂也宜和陰陽正取覆取俱無脉者必死

一傷寒舌上生胎不拘滑白黃黑俱用井水浸青布片於舌上洗淨後用生薑片子時時浸水刮之其胎自退凡見舌上黑胎芒刺者必死此熱毒入深腎水克心火也此謂腎水克心火恐悞也既云熱毒入深或腎水不能制火邪也若發黃者用生薑杵時時週身擦之其黃自退若心

胃脇下有邪氣結實滿悶硬痛又法用生薑一觔搗去汁炒微燥帶潤用絹包於患處欵欵熨之稍可又將查和勻前汁炒乾再熨良久豁然寬快

一傷寒鼻衄成流久不止者將山梔炒黑色為細末吹入鼻內外將水濕草紙搭於鼻冲其血自止若滴點不成流者其邪在經未解照後秘方用藥不在此法

一傷寒熱邪傳裏服藥後用鹽炒麩皮一升將絹包於病人腹上欵欵熨之使藥氣得熱則行大便秘通矣

一傷寒吐血不止用韭汁磨黑罌之其血見黑必止如無韭汁用鷄子清亦可正謂赤屬火而黑屬水也故有相制之理焉



一傷寒直中陰經真寒證或陰毒證身如被杖腹中絞痛嘔逆沉重不知人事四體冷如水石指甲唇青藥不得入口六脉沉細或無脉欲絕者將葱束縛一握切去根葉留白三寸許如餅先將麝香半分填於臍中後加葱餅於上以火熨之爛則易之換  
 二三餅稍醒灌入生姜汁煎服回陽救急湯 如不醒再灸關元穴氣海穴二三十壯使熱氣通其內邪氣出於外以回陽氣於至陰之中用此法手足溫和汗出即醒者為有生也如用此法手足不溫汗出不省人事者必死也

一傷寒熱病熱邪傳裏亢極無解用黃連煎水一盞放井中頓冷浸青布搭於背上稍熱則易之待熱勢稍退則除不可又清夏

用此法冬不宜用

一傷寒服藥吐出不納者隨用竹管重納內關後將生姜自然汁半盞熱飲其吐即止太凡服寒藥熱飲服熱藥寒飲中和之劑溫和服之如要取汗雖辛甘之劑亦宜熱服如要止汗雖辛甘溫劑亦宜溫服

一中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絕者先用皂莢末搥紙燒烟冲入鼻中有嚏可治隨用吐痰法將皂莢末五分半夏白礬各三分為細末姜汁調服探吐後服導痰湯加減治之無嚏者不可治

一治乾霍亂不得吐者用滾湯一碗入皂莢末三分鹽一撮調服



探吐莫與米湯設與即死是穀氣反助邪氣也

一 中寒卒倒昏迷不省者先用熱酒姜汁各半盞灌下稍省後服加味理中飲為效如不飲酒者只用姜汁灌之依法調治此證臘月甚有之餘月幾希矣

一 傷寒若兼十餘日已上尚有表證宜汗者羌活沖和湯 微汗之十餘日若有裏證宜下者可與大柴胡湯 下之蓋傷寒過經王氣多虛恐麻黃承氣其湯大峻誤用麻黃令人亡陽誤用承氣令人不禁故有此戒若表證尚未除而裏證又急不得不下者只得以大柴胡湯通表裏而緩治之又老弱及氣血兩虛之人有下證者亦用大柴胡下之不傷元氣如其年盛氣壯者

不在禁例當隨酌宜而治之

傷寒死候

凡看傷寒要識死證死脉親切一一理會免致臨病疑惑但見死證須以脉叅之如果不治切莫下藥倘有判決各將誰歸

汗後熱退脉靜者差

陰陽諸證脉平吉

陽證見陰脉者死

陰陽毒過六七日者不治

脉浮而滑身汗如油喘息不休水採不入身體不仁乍靜乍喘者死

傷寒咳逆上氣脉散者凶

陽反獨留體如烟薰直視搖頭心先絕也

汗後髮潤喘不休者肺先絕 唇吻反青四肢戢戢汗出肝氣



先絕也

環口黎黑虛汗發黃脾氣絕

三部脈盛大汗出不解者死

陰陽尺寸俱虛熱不止者死

身軀喘粗見陽脈而躁者死

汗後微熱不解未可言死如轉

索者即日死也

譫語微熱脈浮大手足溫欲汗

出脈暴出者死

陰衰欲絕而陽暴獨勝則脈出

一曰陰氣先絕陽氣後竭熱

逆冷脈沉細者一日死

赤斑者五死一生

黑斑者十死一生

兩感傷寒者死

大發溫家汗則成瘧又曰熱而

瘧者死

發少陽汗則譫語 發少陰汗

則動血

者死名下厥上竭發動氣汗者死

發風溫汗者死

汗後為愈今汗不為汗衰謂之

陰陽交交者死

不得汗者死

發熱脈躁疾狂言不能食謂之三死

咳逆不止者死

藏結者死 結背証而占上有白胎者是也

厥陰舌卷囊縮者死

脈代者死

少陰吐利煩躁四逆者死

結舌證悉具煩躁者死

發厥至七八日膚冷而躁無時暫安者曰臟厥不治

陰陽頭痛重眼花四肢拘急小腹絞痛手足率者死

厥而下利當不能食者曰除中不治

少陰病厥逆無脈與白通猪胆湯脈暴出者死微續者死



若病人寒熱而厥面色不澤冒昧而手忽無脉或一手無脉必  
是正汗出多用綿被蓋覆包手足温煖急投五味子湯 服之  
暍時必大汗而解矣 投藥無汗脉不至者死  
死者雖多凡至危極處皆是死也

**傷寒刺灸** 保命集

傷寒三陽頭痛何法刺之蒼曰手之三陽足之三陽皆會於頭者  
謂諸陽之會其受邪伏留而不去故曰三陽頭痛視其色脉知在  
何經

如脉浮而緊過在足太陽宜刺 腕骨 火 京骨 水  
如脉浮而長過在手陽明宜刺 合谷 衝陽 土

脉浮而弦過在手足少陽宜刺 陽池 丘虛

風府 風池

傷寒邪在三陰內不得通以為腹痛手足三陰皆會于腹如脉弦  
而腹痛過在足厥陰肝經手太陰肺經宜刺 太衝 木

太淵 金 太陵

如脉沉而腹痛過在足少陰腎經手厥陰心包經絡宜刺

太谿 大陵

脉沉細而腹痛過在足太陰脾經手少陰心經宜刺

太白 神門 三陰交

傷寒下後結胃痞氣者足三陰之終手三陰之始胃中結痞過在



少陰腎經手厥陰包絡宜刺兩經之井原

以瀉胃中之氣

如心中結痞過在足太陰脾經手少陰心經宜刺兩經之井原

以瀉心中之氣

胃中痞結過在足厥陰肝經手太陰肺經宜刺兩經之井原

以瀉胃中之氣

或上中下三腕應痞結而瀉之

灸法惟直中陰經真寒證四肢厥冷腹痛唇青指甲青下利清俱

宜灸氣海關元二穴

在臍下隨灸其一穴陽氣回止

其餘三陽證候俱不宜灸

傷寒諸証所屬

頭痛項強太陽

頭搖裏

頭汗在裏

獨頭面搖病

額汗風

面戴陽面赤色下虛也

面沸鬱表未

面慘不光傷寒

面光不慘中風

面乍黑乍白乍赤感

面斑斑如錦文陽毒

面垢中暑又肝病

目痛明陽

目睛黃小腸熱

目中生花陰易

目中不了了邪氣勝有內實

睛不和內未

目直視不能瞬將發

目脉赤將

耳聾少陽

鼻乾陽明

鼻中燥必

鼻如烟煤陽毒熱極

鼻鼾風



口苦陽少

口燥陰少

口破唇赤應下而久行也

舌黑熱極

聞食氣胃虛

喜忘如狂畜血

筋跳肉瞤汗下虛也

身痛如被杖陰毒

身微腫風品

身黃小水不利熱鬱

口禁產病

口難言榮不足

唇瘡感狐

懊懣胃虛

叉手摸心汗多虛故也

漱水不欲嚥必作

洒然毛聳惡寒濕暑

一身盡痛風熱

身重多睡風濕

身上如虫行表虛

身痒陽虛汗未盡

腹脹氣不和

多眠神倦風濕

倦臥內寒手足溫可治逆冷者不可治也

坐而伏短氣也

腸垢熱也

咽中瘡上實下虛

咽痛陰少

舌上芒刺熱結甚也

鄭聲精氣奪而神不全

背惡寒陰陽

飢不能食邪在胃中

不眠神虛

手足瘈瘲瘧病攝也

下利清穀內寒

鴨澹寒也

怔忡即心下悸汗多或水逆而然

譫語邪氣盛而神識昏

聲啞感孤

咽乾腎虛燥不可汗



咳逆水寒相搏

第二傷寒藥方評

評麻黃桂枝二湯

活人書云服麻黃湯發煩目眩者必衄服桂枝湯吐者其後必吐

膿血頭痛發熱無汗惡風宜麻黃湯是應解表而用麻黃者

頭疼發熱汗出惡風宜桂枝湯是應解散而用桂枝者二者均為

解散正分輕重不可不察也仲景云無汗不得服桂枝有汗不得

服麻黃古人有汗者當解肌無汗者當發汗是大陽一經尚有差

別有况不分陰陽而用藥乎當汗而下即死當下而汗亦死所以

云桂枝下咽陽盛則斃謂當下而反汗也陽盛者內熱而邪在裏故當下也誤投桂枝發汗是陽盛即斃也

承氣入胃陰盛乃亡謂當汗而反下也陰盛者惡寒而邪在表故當汗也誤投承氣攻下是陰盛而亡也可

古今醫統卷之二十四 平



見麻黃桂枝承氣者死生之係業醫者可不慎哉

評桂枝石膏湯

傷寒三四日外服諸湯不瘥身熱脈數邪氣猶在經絡未入藏府者桂枝石膏湯主之此方夏至後可代桂枝証用若加麻黃可代麻黃湯青龍湯用有汗脈緩為桂枝証無汗脈緊為麻黃青龍証

評白虎湯

證治論云白虎湯性涼惟夏至後用之謂如土地七八月猶熱處有壯熱為病相度尚可用白虎湯服之自然汗解然白虎湯用石膏故亦治傷寒不專於治暍也或問曰夏月若果見麻黃桂枝証

亦豈得不用而固用白虎湯也曰此說尤妙但臨時看證用之假如虛弱人老人不可用白虎也蓋白虎性涼若下利腹痛者勿用當改服小柴胡湯

或問夏至後皆可用白虎湯耶荅曰白虎治中暍并汗後一解表藥耳非正傷寒藥也今之醫者見六月中病多云中暍不辨熱病用藥太涼况夏月陰氣在內尤宜戒之證治論云白虎亦治傷寒不專治暍活人書云白虎治中暑并汗後一解表藥耳其二說雖頗異大抵隨時審證當用即用不可執一說也

評小柴胡湯

傷寒五六日嘔而發熱者小柴胡湯証具却以他藥下之柴胡証



仍在者復以小柴胡湯與之此雖已下不為逆若得小柴胡湯必蒸蒸而振發熱汗出而解難為汗下者必用小柴胡故又名三禁湯今見傷寒多用小柴胡下問陰陽表裡皆與之豈不為害也不知小柴為少陽表裡和解之藥惟嘔惡心寒熱怕風惡寒在表親切傷寒但嘔便屬少陽止用小柴胡湯和解蓋少陽邪未入裏而在表裏之間是邪欲入胃氣充而不納故嘔出若邪稍入裏氣未和當用大柴胡湯微下之自然熱退身涼何有壞証若只邪在皮膚惡寒熱作脈浮而促則當解表用九味羌活湯所以有謂解表未開不得攻裏表氣尚存攻之為逆

### 評大柴胡湯

或問傷寒有表復有裏証用大柴胡湯之緩劑下之何如答曰大柴胡湯傷寒下藥與三承氣湯之次也其間應下尚有表証多或虛弱易動者宜用大柴胡湯緩方為至穩若血虛人更加當歸虛弱用之穩為其有人參甘草和中故也

傷寒發熱汗出不解心下痞硬嘔吐而利非大柴胡湯不可也此非是有陽明嘔吐又非霍亂吐利謂之太陽大柴胡証也故緩以下之為穩也

### 評三承氣湯

或問曰承氣湯既有三等之殊治之必有淺深緩急次第可得聞乎曰太陽傳于陽明者自表之裏無形傳至有形故用大承氣湯



急下之以其硝黃猛烈故也少陽傳于陽明為逆傳來者陽明居  
太少之中故從乎中治宜小承氣湯之緩也若夫正陽陽明為本  
經傳于有形故用調胃承氣湯之緩劑無太少二氣之傳故不用  
厚朴枳實燥藥所謂有緩急次第之用者此也大承氣湯下藥之  
最急者大柴胡湯下藥之最緩者調胃承氣湯急之次者小承氣  
湯緩之次者

春甫按**大承氣湯**治三焦俱實否滿燥堅全故用厚朴枳實苦寒

瀉滿芒硝咸以除堅大黃之苦以瀉實熱此為胃實不大便發熱

狂言膽語三焦俱實而用之者也**小承氣湯**治上焦積熱而成否

實以厚朴枳實去否大黃瀉實熱不用芒硝則不傷下焦血分之

真陰此為上焦實熱而用之者也**調胃承氣湯**治邪在中焦則有

燥實堅三証故用甘草調胃和中芒硝潤燥大黃瀉實不用朴實

以傷上焦之元氣也**桃仁承氣湯**治中焦瘀血積熱經曰中焦如

嘔血之源也中焦熱甚則血瘀凝故有腹痛不可按又有彥語則

以調胃承氣加桃仁肉桂以破之亦不用朴實以傷上焦此則諸

承氣因証立方而不容以不易名也上文謂無形有形緩急次第

惟見其大畧焉豈若直以三焦證治而論不亦深切著明也哉

傷寒論潮熱條云設當行大承氣湯亦須先與小承氣湯不轉矢

氣者不可攻也

仲景云陽明病不大便六七日恐有燥糞欲行攻法少與小承氣



湯腹中轉矢氣者此有燥糞也乃可以大承氣攻之若不轉矢者此先硬後溏也切不可攻之攻之必腹脹不能食也凡傷寒攻熱邪皆用湯液滌蕩執積不可用圓子藥攻不可不知也

### 評大青龍湯

大青龍湯治病與麻黃湯証相似但病尤重而又加煩躁者用大青龍湯也以其風并傷寒俱盛故青龍湯添麻黃合桂枝湯藥味在內更加石膏所以為緊此治榮衛俱病者也大抵感外風者為傷風感寒冷者為傷寒故風則傷榮寒則傷衛桂枝主傷衛麻黃主傷榮故大青龍主榮衛俱傷者此也

李先知云脉緩有汗為桂枝湯証脉緊不煩為麻黃湯証大青龍

湯証脉似桂枝反無汗似麻黃反煩躁是也若不審証誤用青龍發汗傷人多矣故仲景云脉微弱汗出惡風者不可服青龍服之則逆厥筋惕肉瞤此為逆也宜服真武湯仲景特設此藥以救之

### 評十棗湯

十棗湯治身涼乾嘔短氣筋痛者當行瀉是表証已罷方可用之表未解者不可行也以其藥性太猛切戒輕用

裏有水證條云身涼表證罷効而脇下痛者十棗湯痞證條云脇下痛乾嘔短氣身涼不惡寒汗出無表證者十棗湯乾嘔證條云身涼汗出乾嘔脇痛不惡寒此表証已解裏未和也十棗湯主之可見十棗湯非敢輕用必審表證罷惟身涼脇痛乾嘔有水氣



而裏未和者方用之以棗十枚為君消水藥不過一錢不敢輕用可知矣

### 評九味羌活湯

易老九味羌活湯為鮮利兩感傷寒而設經曰兩感於寒者死不治以其一日太陽與少陰俱病則頭痛口乾而煩滿二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不欲食譫語三日少陰與厥陰俱病則身籠裏縮而厥水漿不入不知人此為藏府俱虛內外俱病欲表之則有裏欲下之則有表故云兩感者不治然所感有淺深虛實之異虛而感之深者必死實而感之淺者猶或可治故易老有九味羌活湯之製也其黃芩生地為裏熱之藥羌活細辛為鮮表之藥

亦和平表裏之輕劑耳然非正傷寒之主藥也陶氏謂其可代麻黃桂枝青龍三方之用噫亦過矣但用之於傷風見寒傷寒見風頭身疼痛惡寒發熱而兼有裏証者宜用之大抵終是輕劑若果當發汗必用麻黃而羌活防風豈可比也若表虛有汗則用桂枝若有汗而煩必用青龍羌活豈可代也非即病正傷寒而九味羌活用於春秋之時比之麻黃青龍則又穩也知者審諸

**第二** 麻黃湯 治太陽脉浮緊頭痛身疼發熱惡寒無汗而喘

麻黃二錢

桂枝一錢

甘草五分

杏仁八枚

右剉每服水盞半先煎麻黃數沸後加生姜三片棗一枚內餘同煎至八分去渣溫服覆取汗蓋麻黃性熱惟冬時正傷寒無



汗者用之若春夏不可輕用服之必發斑發黃如用者要石膏  
知母黃芩

**第三** 麻黃乾葛湯 治太陽發熱無汗惡寒 剛症

麻黃 赤芍藥各三錢 乾葛半錢 豉半合

右水二盞葱白一莖煎八分溫服取汗

**第四** 麻黃升麻湯 大下後脈沉遲尺脈不至咽喉不利厥逆泄利

不止者

麻黃八錢 升麻 當歸各四錢 知母

黃芩 萎蕤各二錢 石膏 白朮

芍藥 天門冬 桂枝 茯苓

甘草 乾姜各一錢

右水三升三合先煎麻黃一二沸去沫入諸藥煮取二升分三服次第入盡汗出愈

**第五** 麻黃知母石膏湯 治太陽無汗夏至後服

麻黃湯 加知母一錢 石膏二錢

**第六** 麻黃杏子甘草石膏湯 治太陽汗後喘

麻黃八錢 杏仁三十箇 甘草四錢 石膏一斤

右水四盞先煮麻黃減一盞去上沫內諸藥煎取二盞分二服

**第七** 麻黃連翹赤小豆湯 治傷寒瘀熱在裏身目發黃中濕身痛

麻黃 連翹 甘草各四錢 桑白皮



赤小豆各一兩 杏仁三十箇 大棗八枚 生姜七錢  
右水四盞先煮麻黃二三沸掠去上沫內諸藥煎取二盞分三服半日盡

**第八**

麻黃附子細辛湯 治少陰發熱脉沉微汗之

麻黃 細辛各六錢 附子一箇

水四盞煎麻黃減去一盞去上沫內諸藥煎取二盞分三服

**第九**

麻黃杏仁薏苡甘草湯 治風濕相搏一身盡痛

麻黃 薏苡仁各半兩 甘草一錢 杏仁十箇

右水三盞煎至一盞分二服避風微汗

**第十**

麻黃甘草附子湯 治少陰無表裏證

麻黃三錢 甘草一錢 附子一錢

右水三盞半煎至一盞分二服取微汗

**第十一**

桂枝湯 治太陽中風發熱汗出鼻鳴乾嘔加黃苓名陽旦湯

桂枝 赤芍藥各二錢 甘草一錢 生姜五片

大棗三枚

右水五盞半煎八分溫服取微汗夏至前加黃苓夏至後加知母

數不可行行桂枝

**第十二**

桂枝麻黃各半湯 治太陽脉浮緩如瘧 無汗身疼

桂枝五錢 芍藥 甘草 麻黃各三錢

杏仁二十箇 生姜三錢 大棗四枚



右水四盞先煮麻黃二三沸去沫內諸藥煎至三盞分三服

**十三** 桂枝甘草湯 治發汗過多叉手捐心心下悸欲得汗

桂枝錢三 甘草錢一 水一盞煎八分溫服

**十四** 桂枝葛根湯 治傷風項背強 有汗不惡風柔症

桂枝湯 加葛根 煎服

**十五** 桂枝石膏湯 治熱病 夏至後同桂枝用

桂枝湯 加石膏 煎服

**十六** 桂枝二麻黃一湯 服桂枝形如瘧得汗必解

桂枝 芍藥錢四 麻黃錢二 甘草錢三

杏仁十六枚 生姜錢四 大棗五枚

水三盞先煎麻黃一二沸去沫內諸藥煎三盞分二服

**十七** 桂枝大黃湯 治閉脈沉實按之痛大便秘

桂枝湯 加大黃量強 芍藥減甘草煎服

**十八** 桂枝人參湯 太陽下之早脇熱利不止心下痞表裏不解

桂枝 甘草各二錢 人參 白朮

乾姜各一錢 水二盞先煎田味至三盞半後內桂枝煎至一盞服

**十九** 桂枝附子湯 治風濕身疼脈浮虛瀼

桂枝湯 加附子煎

**二十** 桂枝括萎葛根湯 治有汗柔症

桂枝 芍藥各二錢 括萎根 乾葛各一錢



三古今醫經傳集 卷之十四 九  
甘草六分 水二盞姜七片棗一枚煎八分温服

**五** 桂枝二越婢一湯 治太陽發熱惡寒脉微弱

桂枝 芍藥 甘草炙各一分 麻黃一分

石膏三錢 生姜四錢 大棗四枚

水三盞煎一盞半如法煎分二服

**五** 桂枝加厚朴杏子湯 太陽下之微喘者表未解也

桂枝湯 加杏子 厚朴煎服取微汗

**五** 桂枝芍藥湯 治脉浮腹痛

桂枝湯 加芍藥一倍

**五** 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯 脉浮以火劫之二陽

驚悸卧起不安

桂枝 蜀漆各錢 甘草六分 牡蠣一分

龍骨一錢 生姜一錢 大棗二枚

右水二盞光煮蜀漆減半盞煎諸藥至一盞温服

**五** 桂枝芍藥人參新加湯 汗後身痛脉沉

桂枝湯 加人參 芍藥一倍 生姜一倍 煎服

**五** 桂枝去芍藥加附子湯

桂枝一錢 甘草一錢 生姜半錢 大棗一枚

附子五分 水盞半煎八分服

**五** 桂枝加知母石膏升麻湯 熱病身至後用

三古今醫經傳集 卷之十四 九 二十



桂枝湯 加知母 石膏各一錢 升麻分五 水煎服

桂枝去桂加茯苓白朮湯 服桂枝或下後不解腹滿小便利

芍藥 茯苓 白朮各二錢 甘草

水一盞半生姜三片棗一枚煎至八分去渣服小便利則愈

越婢湯 治風痺脚弱

石膏 白朮各二錢 麻黃分七 附子分五

甘草分三 水鍾半加姜三片棗一枚煎八分

茯苓白朮湯 治濕溫

茯苓 乾姜 甘草 枳

水二盞煎八分溫服

大青龍湯 治傷寒頭痛發熱無汗而煩燥者

麻黃錢三 桂枝錢一 杏仁枚五 甘草

石膏半雞子大一塊 生姜錢一 大棗枚一

水鍾半煎分二服溫服

大青龍加黃芩湯

大青龍湯 加黃芩煎服

小青龍湯 治傷寒表不解心下有水氣嘔噦發熱而欬或渴

或利或小便不利小腹滿而喘者

麻黃 桂枝 芍藥各一錢 甘草分五

乾姜 細辛各五分 五味子粒十二 半夏錢一



水二盞煎服

**三十四** 小青龍去麻黃加茯苓湯

小青龍湯減麻黃加茯苓

**三十五** 小青龍去半夏加瓜蒌湯

小青龍湯去半夏加瓜蒌

**三十六** 小青龍去麻黃加杏子湯 治太陽汗干飲水多咳而喘

本方去麻黃加杏子煎服

**三十七** 葛根湯 治太陽無汗惡風剛痙太陽陽明合病

葛根一錢 麻黃一錢 桂 芍藥

甘草各六分 生姜五片 大棗二枚

水二盞如法煎一盞服取微汗

**三十八** 葛根解飢湯 發熱而渴不惡寒并痙

葛根二錢 黃芩 芍藥 麻黃各一錢

甘草 桂各五分 水二盞棗一枚煎如脉浮再服取汗

**三十九** 葛根柴胡湯

柴胡一錢半 蒼朮 荆芥 麻黃各一錢

甘草 當歸各五分 水二盞加生姜三片棗一枚煎服

**四十** 葛根葱白湯 治已汗未汗頭痛

葛根 芍藥 知母 川芎各一錢

生姜三錢 葱白五寸 水二盞煎一盞服



**四十一** 葛根黃芩黃連湯

葛根 黃芩錢各一 黃連錢二 甘草分五

水二盞煎服

**四十二** 葛根橘皮湯 治溫毒發斑心煩嘔逆

葛根 橘皮 杏仁 知母

麻黃 黃芩分各八 甘草分五 水二盞煎服

**四十三** 葛根半夏湯

本方 加半夏 如法煎服

**四十四** 葛根龍胆湯 治身重汗出風濕脈浮

葛根錢二 石膏錢一 麻黃 升麻

芍藥 桂枝 生姜 甘草

黃芩分各八 水二盞煎至八分服

**四十五** 小柴胡湯 治傷寒四五日往來寒熱胸滿心煩喜嘔少陽發

熱風溫身熱

柴胡錢二 黃芩 人參 半夏錢各一

甘草分五 水二盞姜三片棗一枚煎服

**四十六** 小柴胡加茯苓湯 治小便難潮熱腹滿

本方 加茯苓 煎服

**四十七** 小柴胡加五味子湯 治溫病而渴不惡寒嗽者

本方 加五味子 煎服



四 小柴胡加桂湯 治身熱欲近衣 身熱不渴

柴胡 黃芩 半夏 甘草

桂各五分 生薑三片 大棗一枚

水二盞煎一盞溫服

四九 小柴胡去半夏加人參括蕒湯 治發熱而渴

本方去半夏 加人參 括蕒仁 煎服

五十 小柴胡去棗加牡蠣湯 治水結胸

本方去棗 加牡蠣 煎服

五十一 小柴胡去參棗加五味子乾姜湯 治少陽寒熱自利泄瀉

本方去人參棗 加五味子 乾姜 煎服

五十二 小柴胡去黃芩加芍藥湯 下後陰弱生熱脈微惡寒

柴胡 半夏 人參 芍藥各一分

甘草五分 水二盞加姜三片棗一枚煎服

五十三 小柴胡加乾姜牡蠣湯 治痞而胃脇滿脹

本方 加乾姜 牡蠣 煎服

五十四 柴胡桂枝湯 治風濕汗後身熱 心下煩熱妨悶 動氣

柴胡二錢 桂枝一錢 甘草七分 人參一錢

半夏 芍藥各七分 黃芩一分 生薑三片

水二盞棗二枚煎一杯溫服

五十五 柴胡桂姜湯 治往來寒熱胃脇滿小便不利嘔而不渴



柴胡一分錢五分

黃芩

桂枝

乾姜各一分

甘草五分

牡蠣七分

括萎根一分

水二盞煎一盞溫服

**五**

柴胡龍骨牡蠣湯 傷寒八九日下之胃滿邪驚小便不便譫

語驚狂亡陽煩燥臥起不安一身盡痛

柴胡一分錢二分

龍骨

桂枝

鈔丹

人參

黃芩

茯苓

牡蠣

半夏各六分

大黃八分

生姜五分

大棗一枚

水二盞煎至一盞內大黃煎三五沸溫服

**五**

五苓散 治小便不利而渴中暑煩燥霍亂

猪苓

澤瀉

白朮

茯苓各一分

桂五分

右為細末每服二錢白湯調下

**五**

辰砂五苓散

治傷寒表裏未解頭痛發熱心胃鬱悶唇口

乾焦神昏狂言妄語如見鬼及瘡癩煩悶未省諸執清水道五

苓散 加辰砂研末調服

**五**

小建中湯 傷寒三四日心中悸而煩少陰惡寒手足倦而溫

桂枝一分錢

芍藥二分錢

甘草六分

錫糖三匙

生姜五片

大棗一枚

水盞半煎八分內錫令化溫服

**卒**

黃芪建中湯 尺脉遲傷寒身痛汗後身痛弱脉可服

黃芪一錢半

芍藥二分錢

桂一分錢

甘草六分

三古今醫統卷之十四下 二十五



生姜片五

棗二枚

水二盞煎一盞去渣入錫一大匙煎沸服若微瀉利或嘔者不用錫

**空**

大柴胡湯 治身熱不惡寒反惡熱內實大便難

柴胡一錢二分

黃芩

芍藥各一錢

半夏八分

大黃七分

枳實四分

生姜三片

大棗一枚

水二盞煎一盞去渣再煎至八分入大黃

**空**

調胃承氣湯 太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘澀語嘔逆

大黃六錢清酒洗

芒硝一合

甘草一錢

水盞半煎八分去渣內硝微煎服

**空**

大承氣湯 傷寒胃實譫語五六日不大便腹痛煩渴少陰口燥咽乾日晡發熱脈實三焦俱有邪盛用之

大黃五錢

芒硝一合

厚朴一錢

枳實一錢

水二盞先煎朴實至盞半加大黃煎至一盞去渣內硝一二沸服得利止服

小承氣湯 六七日不大便腹脹滿 陽明無表証汗後不惡

**空**

寒潮熱狂言而喘專寫上焦之否熱

大黃四錢

厚朴一錢

枳實一錢

水二盞煎一盞溫服

**空**

桃仁承氣湯 外証已解小腹急大便黑小便不利中焦積

桃仁

**空**

水二盞煎一盞溫服



証也

桃仁十箇

桂

甘草各一錢

大黃半二錢

芒硝一錢半

水二盞煎一盞去渣內硝煎二沸溫服

**栝**

栝子豉湯 治吐下後心中懊憹大下後身熱不去心中庸

肥栝子四枚打碎

香豉兩半

水二盞先煎栝子至一盞內豉同煎至七分服得汗止服

**栝**

栝子栝皮湯 溫家發黃傷寒發黃

栝子四枚

栝皮三錢

甘草二錢

水二盞煎八分服

**栝**

栝子乾姜湯 醫以丸藥下之者身熱不去

栝子七枚

乾姜三錢

水二盞煎八分服

**栝**

栝子升麻湯 治虛煩不止三月至夏至前謂之晚發可服

生地黄二錢

栝子三枚

升麻一錢

柴胡二錢

石膏一錢半

水二盞煎一盞溫服

**栝**

栝子厚朴湯 太陽下後腹痛起卧不安

栝子五枚

厚朴三錢

枳實一錢

水二盞煎一盞溫服得吐止後服

**栝**

枳殼栝子湯 治勞復發熱

枳殼一枚

肥栝子三枚

香豉一兩

清漿水二盞空煎至一盞半內二藥煎至一盞入豉煎八分服覆

取微汗

古今醫統卷之二十四



七十一 梔子烏梅湯 治傷寒差後不得眠

梔子

黃芩

甘草 各一錢

枳殼 二錢

烏梅肉 二箇

水二盞 生姜五片 竹葉二七片 豉五十粒 煎至八分服

七十二 枳殼梔子大黃湯 治食後發熱

枳殼 一枚

梔子 三枚

豉 兩

大黃 如圍棋子大 三四枚入

水煎如法溫服

七十三 猪苓湯 治嘔而渴 心煩不得眠 熱在下焦 小便不利

猪苓

澤瀉

滑石

茯苓

阿膠 各錢半 水二盞 煎四味至一盞 去渣內阿膠 煎八分 溫服

七十四 黃芩湯 太陽少陽合病 下利而協熱利

黃芩 三錢

芍藥

甘草 各一錢

大棗 二枚

水盞半 煎一盞 服嘔者加半夏伍分 生姜五片 煎服

七十五 黃芩芍藥湯 衄後脈微

黃芩湯 去大棗 煎服

七十六 黃芩半夏生姜湯 治乾嘔而利

黃芩湯 加半夏 生薑 煎服

七十七 黃連湯 腹滿痛 大便秘 胃中有熱 腹痛欲嘔

黃連

甘草

乾姜

芍藥 各一錢

人參

半夏 各五分

大棗 一枚

桂 五分



水二盞煎一盞服

**七十九** 黃連阿膠湯 一名黃連雞子湯 治溫毒下利膿血少陰煩燥不得臥

黃連 錢二 阿膠 錢半 黃芩 芍藥 錢一

雞子黃 一枚

水二盞煎三物至一盞去渣內膠煎一二沸再內雞子黃勻服

**八十** 梔子仁湯 發狂煩燥面赤咽痛潮熱

梔子 赤芍藥 大青 知母 各五分

升麻 黃芩 石膏 杏仁 各一分

柴胡 七分 甘草 四分 豉 五十粒

水二盞煎一盞溫服

**八十一** 黃連橘皮湯 治溫毒發狂下部生瘡

黃連 錢一 橘皮 杏仁 枳實 各七分

麻黃 葛根 各六分 厚朴 甘草 各五分

水盞半煎八分服

**八十二** 黃連龍骨湯 少陰脈沉腹痛咽痛體猶有熱煩苦

黃連 錢二 黃芩 芍藥 各八分 龍骨 五分 為末

水盞半煎八分服

**八十三** 黃連犀角湯 治狐惑

犀角 三錢 黃連 錢二 烏梅 四箇 木香 一分

水盞半煎八分入角汁木香汁和勻服



三古今醫錄終傳寒 卷之十四下 二十九  
**八十四** 黃連解毒湯 大熱乾嘔譫語呻吟不眠

黃連二錢 黃芩 黃柏 梔子各一錢

水二盞煎一盞溫服

**八十五** 黃連一物湯

黃連一味濃煎汁服

**八十六** 黃連瀉心湯

黃連 生地黃 知母各錢半 甘草五分

水盞半煎八分溫服

**八十七** 大黃黃連瀉心湯 治胃實不大便譫語

大黃四錢 黃連 黃芩各錢半

右三味為粗末以麻沸湯盞半漬之酒更絞去查服

**八十八** 酒煮黃連丸 治暑毒發熱而渴不惡寒

黃連四兩以無灰好酒浸面上過二寸重湯煮乾焙羅為末

右麵糊丸梧桐子大每服五十丸熱水吞下

**八十九** 升麻湯 無汗而喘小便不利而煩渴

升麻 蒼朮 麥門冬 麻黃各錢一

黃芩 石膏一錢 淡竹葉十片

水二盞煎一盞溫服

**九十** 升麻葛根湯 治無汗惡寒發斑小兒瘡疹疫屬通用

升麻 葛根 芍藥 甘草一分



水二盞煎一盞寒多熱服熱多溫服

**九十一** 升麻六物湯

口瘡赤爛赤班

升麻

梔子各錢半

大青

杏仁

黃芩各一錢

水盞半煮白二盞煎八分溫服

**九十二** 陽毒升麻湯

治陽毒赤班狂言吐膿血

升麻一錢半

犀角磨

射干

黃芩

人參

甘草各八分

水盞半煎至八分內犀角汁和勻服

**九十三** 升麻梔子湯

升麻

柴胡

梔子三枚

石膏錢半

**九十四** 升麻鱉甲湯

升麻一錢

當歸

甘草

鱉甲各錢半

雄黃另研三分

蜀椒三分

水盞半煎八分內雄末和勻服

**九十五** 玄參升麻湯

玄參

升麻各錢半

甘草八分水盞半煎八分溫服

**九十六** 白朮湯

治汗後脉洪大而渴虛煩中暍

知母三錢

石膏五錢

甘草一錢

粳米撮

水二盞煎一盞米熟去滓溫服

**九十七** 白朮人參湯

一名化班湯

治赤班口燥煩渴中暍

白朮湯

加入參

煎服



白痢加桂湯

白痢湯

加桂

煎服

白痢蒼朮湯

治溫濕疫癘秋後熱濕而燥

白痢湯

加蒼朮一倍

煎服

竹葉湯 陽明汗多而渴衄而渴欲飲水水入即吐差後渴

竹葉二七

麥門冬

人參各一錢

甘草四分

石膏二錢

半夏八分

粳米一撮

水二盞煎一盞米熟去渣入生姜汁一匙再煎一沸服一方無石膏

竹葉石膏湯

竹葉湯

加石膏

茵陳湯 治頭汗出欲發黃

茵陳蒿三錢

大黃二錢

肥梔子三枚

水二盞煎一盞茵陳至半內二味煎八分服

茵陳五苓散 頭汗出發黃秋感疫厲及黃瘡

茵陳蒿三錢

五苓散二錢

和勻每服二錢食前米湯調服或濃煎茵陳湯調五苓散

茵陳梔子三物湯 大便自利而黃

茵陳蒿二錢

梔子

黃連各錢半

水二盞煎八分溫服

茵陳茯苓湯



茵陳錢二

茯苓

桂去皮各一錢

猪苓七分

滑石

當歸各二錢

**真**茵陳四逆湯

陰黃四肢厥冷

茵陳錢一

甘草炙一錢半

附子錢一

乾姜炮錢半

水煎溫服

**真**小茵陳湯

茵陳錢三

附子錢一

甘錢一

水盞半煎八分溫服

**真**茵陳吳茱萸湯

茵陳湯

加吳茱萸

水煎服

**真**茵陳附子湯

茵陳湯

附子

水煎服

**真**大陷胃湯 治大結胃手不可按

大黃錢四

芒硝錢三

甘遂末分二

水二盞煎一盞內芒硝煎二沸去渣內甘遂末和勻服得利則止服此藥極峻必不得已而用之

**真**小陷胃湯 治小結胃

黃連錢半

半夏錢三

括萋實

水二盞先煎括萋至一盞半內諸藥煎八分溫服

**真**大陷胃丸 治結胃項強如柔瘰狀下之則和

古今醫方易集 卷之二十四 三三



三十一 全醫經傳身... 卷之十四  
三十一

大黃 一兩六錢

葶藶

芒硝

杏仁 各二錢半

上二味為細末內杏仁芒硝合研為脂丸彈子大別搗甘遂二分白蜜半合白水七分半溫調頓服一宿乃下不下再服

三

抵當湯

治血結育譫語瘀血狂言小腹滿漱水不欲嚥

水蛭

蛭虫 各十枚

桃仁 十枚

大黃 錢八

水二盞煎一盞查去溫服血未下再服

四

抵當丸

當汗失汗熱毒深入吐血身黃喜忘發黃

水蛭

蛭虫 各五枚

桃仁 六枚

大黃 錢二

為細末作一丸水二盞

五

陽旦湯

春末夏至前宜服

枝枝湯

加黃芩

煎服

六

陰旦湯

治身大熱欲近衣此內寒外熱

芍藥

甘草 各一錢

乾姜

黃芩 各錢半

桂枝 五分

大棗 一枚

水二盞煎一盞溫服取小汗

七

三物白散

治痰實結育

貝母

桔梗 各三分

巴豆 一錢去皮油

右為末內巴豆研勻以白飲和服強人四五分弱人減之病在高等上必吐在高等下必利不利進熱粥一盃若利過不止服冷粥

一盃即止

八

小半夏湯

治水結育

九

十

十一



半夏錢四

白茯苓二錢

水二盞煎一盞去渣入姜汁一匙再煎二沸服

**百九** 大半夏湯 治傷寒痰證

半夏

茯苓

生姜各二錢

水一盞煎一盞臨卧服胃不利加陳皮

**百八** 半夏瀉心湯

半夏錢一

黃連分五

人參

甘草

黃芩

乾姜各一錢

水盞半姜五片棗五枚煎八分温服

**百七** 小半夏茯苓湯 水結育

半夏錢三

赤茯苓錢二

水盞半煎八分去渣入姜汁二匙煎二沸温服

**百六** 半夏生姜湯 治欬逆水穀不下而嘔吐

半夏錢五

生姜一兩

水二盞煎一盞分二服

**百五** 半夏桂甘湯 非時暴寒伏於少陰脉微弱次必下利一名腎寒服此

半夏

桂枝

甘草各三錢

水盞半生姜五片煎至八分去渣旋旋呷之

**百四** 姜汁半夏湯 胃中似喘不喘似嘔不嘔散心積積無邪者

半夏錢五

生姜自然汁半盞



水盞半同姜汁煎至八分温服

**百三** 厚朴半夏甘草人參湯

厚朴三錢

半夏一錢

甘草

人參各五分

水盞半姜五片煎八分温服

**百六** 甘草瀉心湯

即半夏瀉心湯 加甘草 煎服

**百七** 三黃瀉心湯

心下痞按之濡其脉關上浮者可服惡寒者不可服 即附子瀉心湯 去附子煎服

**百八** 生姜瀉心湯

下痢心下痞腹中雷鳴 甘草瀉心湯 減甘草一半 加生姜一倍煎服

**百九** 附子瀉心湯 心下痞惡寒汗出

附子三錢

大黃六錢

黃芩

黃連各一錢半

水盞半先煎附子至七分次取百沸湯二盞漬三黃末一時取汗和附子湯服

**百十** 赤茯苓湯

赤茯苓

陳皮

人參各一錢

白朮

川芎

半夏各六分

水盞半煎八分去滓温服

**百十一** 茯苓甘草湯

茯苓

桂枝各二錢

甘草一錢

生姜五大片

水盞半煎八分温服

水氣承心振寒而燥自汗不渴



**真** 茯苓甘桂大棗湯 汗後臍下悸欲作奔豚

茯苓錢二 甘草分七 桂枝錢一 大棗三枚

甘瀾水見製法中

甘瀾水二盞煎茯苓至一盞半內諸藥同煎至八分服

**真** 茯苓桂甘白朮湯

茯苓錢三 桂枝半錢 甘草 白朮各一錢

水二盞煎一盞溫服

**真** 調中湯 治疫厲夏感寒邪下血

大黃錢一 桔梗 葛根 黃芩

芍藥 白朮 藁本 甘草各六分

水二盞煎一盞溫服得利熱便退安常治多年下血腸風亦差

**真** 四逆湯 太陰自利不渴陰症脉沉身痛

附子錢三 甘草 乾姜各錢半

水二盞煎八分服

**真** 當歸四逆湯 下之厥逆者

當歸 桂枝 芍藥 細辛各一錢

甘草 通草各七分 大棗三枚

水盞半煎七分服

**真** 通脉四逆湯 厥逆下利脉不至

即四逆湯加甘草一倍



**百五** 通脉四逆加猪膽汁湯 吐利止汗而厥四肢拘急脉微欲死

通脉四逆煎起 加猪膽半盃和勻温服其脉即来

**百六** 茯苓四逆湯 汗下後煩躁不得眠

茯苓錢三 人參 附子 乾姜各一錢

甘草分八 水二盃煎一盃温服

**百七** 茵陳四逆湯

茵陳錢二 附子 乾姜各一錢 甘草各一錢

水盞半煎八分温服

**百八** 四逆散加五味乾姜湯 少陰四肢厥逆或泄利而嗽

甘草 枳殼 柴胡 芍藥各一錢

五味子九粒 乾 右為末每服二錢米飲調服

**百九** 四逆散

甘草 枳殼 柴胡 芍藥各等分

為細末每服二錢米飲調下 嗽加五味子悸者加桂腹痛加

附子泄利虛者加濃煎韭白湯調

**百十** 當歸四逆加吳茱萸生薑湯 下之而厥逆者

本方中 加吳茱萸 生薑 煎服

**百十一** 真武湯 治陰証脉沉身痛少陰腹痛小便不利

附子錢三 生薑錢五 白朮錢一 茯苓

芍藥各二錢 水三盃煎一盃半分二服



**真** 附子湯 陰証脉沉身痛少陰背惡寒口中和

附子生二錢 人參 白朮 茯苓

芍藥各一錢 水二盞煎一盞分二服

**真** 附子散

附子二錢 乾姜一錢 桂心 當歸

白朮 半夏各一錢半

右為細末每服二錢水一盞生姜三片

**真** 甘草附子湯 風濕小便不利大便反快

甘草炙 附子各一錢 白朮 桂枝各錢半

水二盞煎一盞溫服微汗解

**真** 甘草乾姜湯 少陰小便色白病形悉具吐逆而渴動氣下之

反劇身雖有熱反欲倦

甘草二錢 乾姜一錢 水二盞煎七分服

**真** 理中湯 治太陰自利不渴痰多而嘔腹痛溏霍亂

人參 白朮 乾姜各一錢 甘草一錢

水二盞煎一盞服 腹痛甚加附子寒而吐者加生姜小便不

利加茯苓腎氣動者去朮

**真** 理中丸 痞而胃寒厥陰饑不能食食即吐霍亂寒多不渴

理中湯為細末煉蜜丸彈子大沸湯化下一丸

**真** 治中湯 心腹連脇滿痛



理中湯

加青皮

煎服

**真**附子防風湯

附子

防風

羌胡各八分

白朮錢半

桂心

茯苓

乾姜各五分

五味子

甘草四分

生姜片五

水盞半煎八分服

**真**芍藥甘草附子湯

芍藥

甘草

附子各二錢

水盞煎八分溫服

**真**霹靂散

陰盛鬲陽身冷脉沉煩燥欲飲水

附子一枚五錢

用冷灰埋之取出細研入真臘茶一大錢同研

分作二服每服水一盞煎六分臨熟入蜜一匙候溫冷服之須

史燥止得睡汗出瘥

**真**木附湯

治濕溫小便不利

白朮錢二

附子

乾姜

甘草各錢半

水盞半棗二枚煎八分服

**真**桔梗半夏湯

腹脹

桔梗

半夏

陳皮

水盞半生姜五片煎八分服

**真**羌活附子湯

治咳逆

羌活

附子各一錢

乾姜棗許大

茴香



木香各五分 水盞半棗二枚煎八分服

**夏** 白通湯 少陰下利

葱白三錢 附子三錢 乾姜半錢

水盞半煎七分半服

**夏** 白通加猪胆汁湯 下利厥逆脉不至

附子三錢 乾姜半錢 葱白二錢 童便半合

猪胆汁三錢 水盞半煎八分去渣入童胆汁和勻

**夏** 正陽散 陰毒寒証面青黃色四肢厥冷

乾姜五分 附子一錢 甘草五分 麝香一分

皂莢一錢 為細末水一盞煎五分執服

**夏** 理中石膏湯 治霍亂轉筋

理中湯 加石膏 煎服

**夏** 枳實理中丸 寒實結胃

枳實十六片 乾姜 白朮 甘草

人參 茯苓各一兩

為細末煉蜜丸彈子大熱湯化下連進二三

**夏** 四順湯 沉脉而身無熱不欲見光腹痛手足冷下利

理中湯 加甘草一倍 煎執服之

**夏** 四順丸 少陰十餘日下利不止手足冷

理中丸 加甘草一倍 為丸服



**真** 增減理中丸 太陰下之胃滿硬諸胃宜服此

人參 白朮各二兩 甘草 乾姜各兩半

黃芩錢五 枳殼錢十二

為細末煉蜜丸彈子大沸湯化下有汗出加牡蠣

**真** 乾姜附子湯 下後復發汗晝夜不得眠無表証脉微者

乾姜錢二 附子錢三 水盞半煎七分頓服

**真** 乾姜黃芩黃連人參湯 寒氣內格食入即吐

乾姜 黃芩 黃連 人參

水盞半煎八分溫服

**真** 脾約丸 老人津少大便秘

大黃 枳實 厚朴 白芍藥各五錢

麻子仁兩一 杏仁分三

為細末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸溫水下未通再加二十

丸即通

**真** 金匱引風湯

大黃 乾姜 龍骨各二兩 桂枝

甘草 牡蠣各一兩 凝水石 滑石

赤石脂 白石脂 石膏 紫石英各三兩

右十二味杵為粗末以囊盛之取三指一撮井花水二盞煎三

沸去渣溫一盞



**夏**

柴胡半夏湯 痰熱頭痛手足煩熱

柴胡一錢

半夏

白木各八分

甘草

人參

黃芩

麥門冬各六分

水盞半姜五片棗一枚煎八分服

**夏**

百合知母湯 百合病

百合七枚

知母一兩

先以水洗百合漬一宿洗去白沫別以水二盞煮取一盞去滓

又以水二盞煎知母至一盞去查相和煎取一盞半分二服

**夏**

百合地黄湯 治百合病

百合七枚

生地黄汁一盞

先洗漬百合如前法以水二盞煎取一盞去查內地黃汁煎取

盞半分二服大便當如漆中病止服

**夏**

百合洗方 治百合病

百合升一

水一斗漬一宿後溫暖洗身洗已食煮餅勿用

鹽豉

**夏**

犀角地黄湯 衄後脉微發狂發黃當汗不汗內有瘀血血証

大便黑漱水不欬嚔

犀角一錢

生地黄四錢

牡丹皮

芍藥各一錢

水盞半煎八分內犀角服

**夏**

大青四物湯 一名阿膠

治赤斑

本草綱目卷之二十四



大青錢二

阿膠

甘草各一錢

豉合

水豨半煎八分去渣入阿膠候洋温服

**青黛一物湯** 治赤斑

青黛如棗大 水研服

**五物木香湯**

青木香五分 丁香 薰陸香各一錢 藜香三厘

白礬錢一 水豨半煎七分温服盛者加犀角輕者去礬

**黑奴丸** 陽毒發斑大渴煩燥

黃芩 釜底煤 芒硝 竈突墨

梁上塵 小麥奴 麻黃各一錢 大黃一錢

為細末煉蜜丸彈子大新汲水化服飲水盡足當發寒汗出差若一時頃不汗再服一丸須見微利若不大渴不可服

**黑膏** 治温毒發斑嘔逆

生地黄二兩六錢 好豉一兩六錢

猪膏十兩合露之前令三分減一絞去滓入雄黃豆大麝香少許攪和勻分三服毒從皮中出則愈忌蕪菜

**紫雪** 暑中三陽所患必熱煩燥發斑者

升麻六錢 黃金十兩 寒水石 石膏各四兩八錢

犀角 羚羊角各一兩 玄參一兩六錢 沉香

木香 丁香各五錢 甘草八錢



右水五大碗煮金至三碗去金入諸藥再煎至一升濾去渣投  
朴硝三兩二錢微火煎以柳木條子攪勿停手候欲凝入盆中  
更下研朱砂麝香各三錢急攪勻候冷凝成雪也每服一錢  
七細細嚥之

**夏** 李根湯

甘李根白皮錢一半夏錢半

當歸八分

生姜錢半

茯苓

桂枝

芍藥

黃芩各八分

甘草四分

水盞半煎八分服

**夏**

吳茱萸湯 嘔而胃滿吐利手足厥冷煩燥欲死

吳茱萸

生姜各三錢

人參一錢

水盞半棗一枚煎一盞服

**夏**

旋覆代赭湯 汗吐下後心下痞

旋覆花錢半

人參一錢

代赭石

甘草各八分

生姜二錢

半夏一錢

大棗二枚

水二盞煎一盞溫服

**夏**

大橘皮湯 嘔噦胃滿虛煩不安

陳皮

甘草一錢

人參二錢

水盞半姜五片煎八分服

**夏**

小橘皮湯 嘔吐手足厥

陳皮三錢

生姜



水盞半煎八分服

**夏** 橘皮湯 傷寒痰逆惡心

陳皮錢三

人參錢半

甘草分八

水盞半竹青一丸姜五片棗一枚煎八分熟服

**夏** 橘皮乾姜湯一名橘皮半夏生薑湯 咳逆噦惡心

陳皮

通草各錢半

人參

乾姜各錢一

水盞半煎八分服

**夏** 桔梗湯 少陰咽痛

桔梗錢三

甘草錢三

水盞半煎八分溫服

**夏** 桔梗枳殼 痞証胃滿不痛

桔梗

枳殼各錢三

水盞半煎八分溫服

**夏** 桔梗半夏湯 腹脹

桔梗

半夏

陳皮各錢二

水盞半生薑五片煎服

**夏** 漢防已湯 治風濕脉浮身重汗出

漢防已錢二

黃芪

白朮各錢一

甘草分七

水二盞姜五片棗一枚煎八分服

**夏** 防已黃芪湯 治全

即防已湯 加甘草一倍

**夏** 防風白朮牡蠣湯



防風

白朮

牡蠣

各等分

為細末每服二錢米飲調服汗止服小建中湯

**夏**

海蛤散

海蛤

滑石

甘草

各一兩

芒硝

五錢

為細末每服二錢以雞子清調下

**夏**

檳榔散

治脚濕

橘葉

一大握

沙木

一握

小便

酒

各半盞

水盞半煎一盞調檳榔二錢食後溫服

**夏**

五積散

治感

脚氣食積心腹滿痛嘔吐項背拘急

川芎

蒼朮

桔梗

陳橘皮

枳殼

各七分

吳白芷

官桂

人參

各五分

厚朴

芍藥

白茯苓

當歸

乾姜

麻黃

半夏

各八分

甘草

各五分

水二盞煎八分姜三片葱白三莖同煎取微汗

**夏**

十棗湯

心下痞硬脇痛乾嘔短氣汗出不惡寒

芫花

甘遂

大戟

各等分

水盞半先煎大肥棗十枚取八分內藥末弱人半錢強人一錢

平旦溫服若下少病不除明日再服加半錢利石糜粥和養

**夏**

桃花湯

少陰下利膿血并溫毒下利

赤石脂

五兩二錢一分全用一半為末

糯米

三合

乾姜

三錢



水三碗煮米令熟去渣溫服二碗內赤石脂末方寸七日三服  
病愈止服

**夏**

沖和湯即九味羌活湯

治傷寒兩感春分代桂枝麻黃湯用

羌活

防風

蒼朮

各一錢

甘草

白芷

川芎

生地黄

黃芩

各一錢半

細辛

水二盞姜三片棗一枚煎一盞熱服取汗有汗者去蒼朮加白  
朮渴葛根石膏

**音** 來復丹

硝石一兩

飛黃一兩明淨者

太陰玄精石

一兩五靈脂二兩水研飛過

青皮

陳皮

去白各二兩

先以硫黃同硝石銚慢火炒以柳筋攪不住手令陰陽氣相入  
不可大炒過以傷藥方再研極細各二氣丹玄精石五靈脂各  
製淨末青橘皮亦研淨末方入二氣味諸石末和勻醋打糊莞  
豆大每服三十丸空心粥飲吞下

**靈砂丸**

水銀八兩

硫黃二兩

右二味新銚銚炒成砂子入固濟礮打火三炷香過宿取火研  
為細末今市肆煉銀珠者彼是謂之氣砂又謂礮口砂其價與  
殊相等藥肆中缺辰砂則亦將此砂研碎混入內賣充辰砂醫



之謂靈砂即此砂是也每用為細末糯米糊丸麻子大每服三四丸空心米飲棗湯人參湯任下忌猪羊魚菜豆粉量人增至七八粒

**三** 柿蒂湯

柿蒂 丁香各錢半

水盞半姜五片煎八分温服

**三** 破棺丹

大黃二兩半 主半熱 芒硝一兩

為末煉蜜丸彈子大每服半丸或一丸二丸食後童便入酒各半化服或白湯合酒化服

**三** 杏仁湯 身熱惡風風濕微腫

杏仁七枚 桂五分 麻黃 芍藥

天門各錢半 水盞姜十片煎一盞分二服

**三** 木瓜散 脚腫宜服

乾木瓜 大腹皮 紫蘇 羌活各錢

木香 甘草各五分 水盞半煎八分服

**三** 烏梅丸 治蚘厥

烏梅七十箇 細辛 附子 人參

栝皮 桂枝各兩半 乾姜二兩半 黃連四兩

蜀椒 當歸各一兩



十味各搗末以苦酒漬烏梅一宿去核薰之五升米飯在下飯  
熟搗梅成泥入諸藥和勻入蜜杵三千下丸梧子大先服米飲  
下十九丸漸加至二十九丸忌生冷滑物

**三頁** 牛旁根湯 汗不流是汗出時蓋覆不密故腰背手足搖擗

牛旁根 麻黃 牛膝 天南星 各六錢

右細剉於砂盆內研細用好酒一升同研以新布濾取汁後用  
炭火半秤燒一地坑內通赤去火掃淨投藥汁在坑內再燒令  
赤黑色取出於鉢內細研每服半錢酒調下日二服

**三頁** 地榆散 傷寒熱毒不鮮晚即壯熱腹痛便膿血

地榆 犀角 剉 黃連 茜根

黃芩 梔子仁 八分

水二盞韭白五莖煎一盞溫服

**三頁** 厚朴湯

厚朴 姜製一錢 白朮 二錢 陳皮 半夏 各八分

枳實 甘草 各六分

水三盞半姜三片棗二枚煎七分溫服

**三頁** 厚朴丸

陳皮 五錢 人參 七錢 白朮 藿香

當歸 各五錢 細辛 二錢 厚朴 五錢

右為末煉蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎六分和查執服



人參散

人參

梔子

藍葉

白蘚皮

甘草各一錢

水盞半煎七分服

酸棗仁湯

汗下後晝夜不得眠

酸棗仁炮去皮

甘草

知母

麥門冬各一錢

茯苓

川芎各六分

乾姜三分

水盞半煎七分溫服

敗毒散

柴胡

前胡

桔梗

甘草

人參

茯苓

羌活

獨活

枳殼

川芎各半分

水二盞薑三片煎一盞服

葱豉湯

傷寒二三日頭項痛惡寒脈緊無汗

葱白七莖

豉半合

乾葛四錢

麻黃二錢

水二盞先煮麻黃六七沸去沫內葛煎十餘沸下豉煎八分服

如人行五六里再服良久煮葱豉粥熟吃以衣覆取汗

連鬚葱白湯

已汗未汗頭痛如破

生姜二兩

連鬚葱白切半

水三盞煎一盞半分二服

茅花湯 鼻血不止



茅花一大把無花用根

水二盞煎一盞分一服

**真** 栝皮湯 熱毒入深吐血

栝皮錢三

黃連

黃芩各一錢半

水二盞煎一盞去渣入阿膠再煎一二沸溫服

**真** 麥門冬湯

麥門冬

甘草各二錢半

粳米湯一盞半棗二枚竹葉十五片煎八分溫服

**真** 救逆湯

**真** 黑錫丹見眩暈門

**真** 羊肉湯

當歸酒浸

白芍藥各二兩

附子炮四錢

龍骨四錢

生姜二兩

牡蠣二兩煨

桂枝七錢

右為粗末每服一兩羊肉四兩葱白五寸打破水五盞熬至

半瀝去渣分三服

**真** 三建湯

天雄

附子

大川烏各一錢三分

水二盞姜十片煎八分不拘時服

**真** 姜豉湯 治風溫冬溫春月傷寒

姜豉

石膏各一錢

麻黃

白薇

姜活

杏仁

甘草

川芎各六分



青木香分五

乾葛錢一

水盞煎八分温服

**百五** 括萎根湯

治風温大渴

石膏錢三

括萎根

人參

防風

甘草

乾葛各一錢

水盞半煎八分服

**百五** 延胡散

尿血

延胡索錢三

朴硝錢一

水盞半煎七分温服

**百五** 射干湯

治夏月暴寒伏熱於內咳嗽嘔吐

射干

當歸

麻黃

肉桂

枳實

紫苑

獨活

陳皮各七分

甘草分五

生姜錢一

半夏錢一

杏仁七粒

水二盞煎八分温服

**百五** 金沸草散

治頭痛熱甚胃膈有痰

前胡

旋覆花各一錢

半夏

細辛

甘草各五分

荆芥穗七分

赤茯苓分六

水盞半姜五片棗一枚煎八分服

**百六** 文蛤散

病在陽反巽以水熱攻於內寒更益堅欲飲水不竭

文蛤末為

沸湯調服方寸匕

**百九** 牡蠣澤瀉湯

治病差後從股以下有水氣

牡蠣

澤瀉

蜀漆

商陸

葶藶

海藻

瓜蒌根各等分



為細末米飲調服方寸匕小便得利為佳

**真** 猪膚湯 少陰下利咽痛背滿而煩

猪膚 五兩

水四碗煮取二碗加白蜜二合白粉二合熬香和令得所分二服

**真** 猪膽雞子湯 傷寒五六日出斑

猪膽 二合

雞子 一枚

苦酒 三合

和勻煎三沸強人盡服弱人煎六七沸服汗出差

**真** 驚甲散 傷寒八九日不差諸藥不效名壞傷寒

驚甲

升麻

前胡

烏梅

黃芩

犀角 剉

枳實 各七分

生地黄 錢

甘草 五分

水盞半煎八分溫服

**真** 白頭翁湯 脇熱而利渴而下利

白頭翁

黃栢

秦皮

黃連 各錢半

水盞半煎八分溫服

**真** 烏扇湯 目中閉塞

生烏扇

即射干苗如無用射干

猪脂 各四兩

二味合煎藥成去渣取半雞子大薄綿裹內喉中

**真** 赤石脂丸 脇熱而利

赤石脂

乾姜 各一兩

黃連

當歸 各二兩

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服三十九米飲下



**真** 赤石脂禹糧湯 痞而下利不止當治下焦

赤石脂 禹餘糧各三錢 水盞半煎八分溫服

**真** 葶藶苦酒湯 發狂煩燥面赤咽痛大下傷血發熱脉瀉

葶藶 苦酒升 艾汁升

煎取七分作三服

**真** 香薷湯 暑邪霍亂

香薷 白扁豆 厚朴各二錢 甘草

茯苓各一錢 為細末每服二錢沸湯點服入此鹽花亦可

**真** 香薷散 中暍霍亂

香薷半錢 厚朴姜汁炒 黃連各二錢 姜炒紫色

水盞煎一盞去渣用新汲水浸極冷順服之效不得犯鉄器

**真** 消暑丸 傷暑發熱頭痛煩熱

半夏醋煮 甘草生 茯苓各四兩

為末姜汁糊丸梧桐子大每服五十九丸熟水下

**真** 清暑益氣湯方見暑門 汗出身熱脉虛

**真** 除濕湯

半夏 厚朴各一錢 藿香 陳皮各六分

蒼木一錢 甘草五分

水盞半生姜七片棗一枚煎八分溫服

**真** 藿香正氣散 治傷寒頭痛發熱內因痰飲外因感冒中脘痞



藿香正氣散加減見濟世  
 霍亂轉筋加木瓜。腹痛  
 加炒芍藥寒痛加官桂  
 冷甚加乾姜。飲食不化  
 心下痞悶加香附砂仁。  
 米穀不化加神曲麥芽。  
 肉食不化加山楂。心下痞  
 加枳實青皮。中暑冒風  
 加香茹扁豆時氣怕寒  
 發熱加柴胡葛根。發  
 熱加麥門冬淡竹葉。口  
 渴泄小便不利合五苓散  
 感風寒內傷飲食霍  
 亂轉筋吐瀉合五苓散。  
 寒濕相搏霍亂轉筋  
 煩渴悶亂合黃連香茹  
 散。心腹絞痛加木香。  
 若頻欲登園不直利  
 者加枳殼。轉筋不止  
 男子以手挽其陰女子  
 以手牽其乳近兩邊  
 此千金妙法

滿嘔逆惡心增寒壯熱咳嗽

藿香 紫蘇 桔梗 前胡

陳皮 半夏 茯苓 甘草

白朮 厚朴 白芷 大腹皮

水二盞薑三片棗一枚煎一盞熱服取汁

**百毒** 絳雪

龍腦 一分二 朋砂 一錢 玢珠 三錢

右研勻每服一字摻於舌上津嚥之

**百毒** 治惡桃仁湯 傷寒不發汗變狐惑唇口生瘡聲啞

桃仁 槐子 艾 各三錢 棗 十枚

水二大盞煎盡半分二服

**百毒** 雄黃蛻散 狐惑唇瘡聲啞

雄黃 桃仁 苦參 青箱子

黃連 各半

為末以生艾搗汁和丸如小指尖大綿裹內下部中無艾亦可

**百毒** 萬全木通散 小便難而黃

木通 赤茯苓 車前葉 滑石 各一錢

水二盞煎七分去渣溫服

**百毒** 猥鼠糞湯 男子陰易及勞復

蕪根 猥鼠糞 十四枚兩 頭尖者是



水盞半煎七分去查再煎三沸溫服得汗效未汗再服

**鼠矢散** 勞復發熱

梔子 十四枚

雄鼠矢 二十七枚

枳殼 三枚

水盞半葱白二寸香豉三十粒煎八分溫服

**燒裊散** 陰陽易

裊燒灰存性以近陰處者男用  
裊婦人裊襦女用男子裊襦

水調服方寸匕以小便利陰頭腫即愈

**竹皮湯** 病復交接勞復外腎腫腹中絞痛

刮竹青皮 一大丸如雞子

水二盞煎八分去查溫服

**天水散** 治中暑身熱嘔吐煩渴水泄小便赤澁大能止瀉止

吐鮮渴解百藥酒食等毒治時疫瀉兩感傷寒及婦人下乳

催行兼以乳乳癰孕婦勿服

滑白 飛六兩

甘草 炙一兩

為極細末每服三錢蜜溫湯調下無蜜飲湯白水俱可日三服

要除熱結新汲水下要汗煎葱白豉湯調二三服熱甚者多服

**防風通聖散**

方見中風門

**小續命湯** 治二症通用

方見風門

**小續命加姜汁湯** 治寒 三陽脚氣



小續命湯煎成去渣加入姜汁二匕再煎一沸服

**續命去附減桂加芍一倍湯** 治脚氣暑中三陽所患必熱

**川芎石膏湯**

方見頭痛門

**補中益氣湯** 治內虛傷寒發熱

方見內傷門

**安神丸**

方見驚悸門

**紫胡飲子**

方見熱門

**七宣丸**

方見秘結門

**鶴頂丹**

方見究源門

**消蘊湯**

方見無求子

**扁豆湯**

方見無求子

**竹茹湯**

方見煩燥門



雞清散

方見聲音門

海藏大羌活湯

方見風門

參蘇飲 治四時感冒傷寒頭痛發熱惡寒咳嗽聲重唾涕稠

粘此藥解肌寬中快壅及勞瘵潮熱往來孕婦傷寒並治

八參

蘇葉

乾葛

前胡

陳皮

枳殼

半夏

茯苓各八分

木香

桔梗

甘草各五分

水二盞姜五片棗一枚煎一盞熱服

香蘇散 四時感冒傷寒發熱惡寒頭痛咳嗽

香附子

紫蘇各錢半

陳皮

甘草各一分

水一盞加葱姜煎七分熱服如頭疼甚川芎白芷名芎芷香蘇

散

芎蘇散 治証同前

川芎

紫蘇葉

乾葛

桔梗

柴胡各七分

茯苓

甘草

半夏各六分

枳殼

陳皮各五分

水一盞半姜三片棗一枚煎八分熱服

十神湯 治時令不正瘟疫妄行感冒風寒發熱憎寒頭痛咳



嗽無汗此藥不問陰陽兩感一切發散宜此

川芎

甘草

麻黃各八分

乾葛

紫蘇

升麻

赤芍藥各一錢

白芷

陳皮

香附子各六分

水盞半姜五片葱白二寸煎八分熱服微汗愈

**宣**

消風百解散

治四時傷寒頭痛發熱及風寒咳嗽鼻塞聲

重或喘急

荊芥穗

白芷

陳皮

麻黃

蒼朮各一錢

甘草五分

水盞半加姜葱煎熱服嗽甚者加烏梅

**宣**

不換金正氣散

治四時傷寒時行瘟疫及山嵐瘴癘寒熱往

來霍亂吐泄下利及出遠方不伏水土者並宜此

厚朴姜炒

陳皮

藿香

半夏姜汁

蒼朮各一錢

甘草五分

水盞半姜三片棗一枚煎八分熱服

**宣**

二香散

治暑傷風傷寒不敢服麻黃桂枝初以此藥解表發

散為妙及治寒濕暑熱嘔吐腹滿瀉利瘴氣飲冷頭痛身熱

香薷

香附

紫蘇葉

蒼朮

厚朴各八分

陳皮七分

甘草

扁豆各六分

水盞半姜三片棗一枚煎八分熱服



宣

神木散

治四時瘟疫傷寒發熱惡寒頭痛項強身痛咳嗽鼻

塞聲重

蒼木錢半

羌活

白芷

細辛

川芎

藁本各六分

甘草五分

水盞薑三片葱三寸煎八分熱服為末葱白湯調服亦可

宣

冲和散

治寒溫不節將理失宜乍暖乍寒脫衣飲冷早行冒

霧寒溫不時陰晴不節如此氣候侵犯為邪傷人則身重痛酸

項背拘急鼻塞身重氣息不利不敢輕汗輕下只此藥為穩便

蒼木錢三

荊芥穗

甘草各七分

水盞半加生姜三片棗一枚煎服

宣

白朮散

治傷寒雜病一切吐瀉霍亂煩渴虛損氣弱及傷酒

積嘔噦

白朮

人參

茯苓各錢

甘草

木香

藿香各五分

葛根分八

右為細末白湯調下二三錢

宣

萬安散

蘇葉

陳皮

香附子

桔梗各八分

白芷

半夏

甘草各六分

前胡

藁本

乾葛各五分

水盞半姜三片煎八分熱服取微汗



**夏** 乾葛湯 治傷寒頭不可忍也

乾葛

麻黃

石膏

各二錢

川芎

八分

水二盞姜五片葱白五寸煎一盞熱服取汗

**夏** 縮脾飲

治伏暑熱煩渴燥悶霍亂乾嘔及中酒嘔噦

宿砂

草果

各八分

乾葛

錢半

烏梅

三箇

扁豆

生姜

各一錢

水盞半煎八分冷服溫服隨意

**夏** 桂苓甘露飲

治中暑傷寒霍亂吐瀉頭痛口乾煩渴飲冷

方見暑門

**夏** 六和湯

治傷寒冒暑伏熱不分陰陽煩悶霍亂轉筋吐瀉寒

熱交作脾氣不和胃滿咳嗽頭疼目脹并中酒煩渴婦人胎前產後俱服無傷

人參

砂仁

甘草

藿香

半夏

扁豆

赤茯苓

杏仁

木瓜

各七分

香薷

厚朴

姜汁製各一錢

水二盞姜三片棗二枚煎溫服

**夏** 枇杷葉散

治傷寒冒暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

或陰陽不和霍亂轉筋吐利煩燥

枇杷葉

去毛炙五箇

白茅根

麥門冬

厚朴

姜製

香薷

各七分

陳皮

丁香

木瓜

各六分



水盞半姜三片煎服煩燥甚者沉冷服

**育益** 木瓜散 治傷寒霍亂吐利不已舉體轉筋入腹悶絕

乾木瓜錢二 吳茱萸錢一 茴香 甘草各七

水盞半加姜四片蘇葉十片食醬一撮煎服仍搗蒜貼足心

**育益** 養胃湯 治傷寒久而成瘧寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心

身體痛慄、振寒面色青白不進飲食脉弦遲

人參 藿香 半夏 白茯苓各一

厚朴 甘草 橘皮 草果

蒼朮各六 水二盞姜五片棗一枚煎寒甚加附子

**育益** 清脾湯 治瘧熱多寒少

方見瘧門

**育益** 保真湯 治四時傷感不問陰陽二証纔覺便服有效

藁本 川芎 蒼朮各一 甘草六

水一盞姜三片煎服

**育益** 對金飲子一名平胃散 治四時傷寒極効又治諸疾皆愈和脾胃進

食快氣

方見脾胃門

**育益** 杏仁煎 治傷寒聲重暴嗽語言不出

桑白皮 五味子各一 杏仁三 紫苑

貝母 木通各八 蜜二



右將五味同煎水四五碗煎至碗半去渣再將杏仁及連皮生  
姜兩半同蜜搗成膏入藥汁內一處收貯每服以匙挑入口噙  
化日四五服

**三頁** 應手方 治傷寒舌出寸餘連日不收

梅花冰片 為末擦舌上應手而收  
重者須用一錢方收

**三頁** 陽証欲死結育 無可藥者

白頸蚯蚓 十餘條搗爛入蜜半盞冷水  
半碗灌服無蜜用砂糖亦可

**三頁** 逍遙散 傷寒汗後血氣未平過勞者謂之勞復犯房室謂之

陰陽易此証最難治曾有舌出數寸死者多矣此湯極妙

人參 知母 竹青 柴胡

黃連 甘草 滑石 生地黃

犀角 萆薢及根 各等分

水二盞姜三片棗二枚煎八分入燒裊襠末一錢調服有粘汗  
出為効

**三頁** 再造散 治傷寒頭痛發熱惡寒無汗用發汗藥二三劑汗不

出者醫家不識此証不論時令遂復用麻黃重藥及火劫取汗  
誤殺者多矣殊不知此者為陽虛不能作汗故名曰無陽

人參 黃芪 桂枝 甘草

熟附 細辛 羌活 防風

川芎 煨生姜 夏月加黃芩 石膏



水二盞棗二枚煎一盞溫服

**黃龍湯**

心下硬痛下利純清水譫語發渴身熱醫家有不識此証便呼為漏底傷寒即用熱藥止之是猶抱薪救火誤人多矣殊不知此因熱邪傳裏胃中燥糞結實此利非內寒而利乃曰飲湯藥而利也名曰積熱利証宜急下之身有熱者宜用此湯身無熱者用煎六乙順氣湯

大黃

芒硝年高及身弱者去之枳實

厚朴

甘草

人參

當歸

水盞半姜三片棗二枚煎服

**黃芩**

芩連消毒飲 治天行時疫大頭痛發熱惡寒頸項腫脉洪痰痺

此方治之

柴胡

甘草

桔梗

川芎

黃芩

荆芥

黃連

防風

羌活

枳殼

連翹

射干

白芷

先用大黃煎利二三次 後依本方去大黃加入人參當歸調理

水二盞姜三片煎有痰者加竹歷姜汁調

**六神通聖散**

治時行三月後謂之晚發頭痛身熱惡寒脉洪數先用羌活中和湯不愈後服此湯

麻黃

甘草

黃芩

石膏各一錢

滑石錢半

蒼朮

川芎

羌活



細辛各五

水二盞姜三片豉一撮葱白一寸煎八分服取汗中病止

**竟生**

氣漸凡入病家須避其氣漸不使染著為上此一醫人之患

雄黃丸

雄黃一兩

丹參

鬼箭羽

赤小豆

炒各二兩

右為細末煉蜜丸梧桐子大空心溫水下五丸雖與病人同床

合被不能染也

又法以雄黃末塗鼻孔中行動後容位而入男子病邪氣出於

口女人病邪氣出於陰門其相對坐立之間必須識其向背

**竟矣**

六法方鈔六法者汗吐下利溫和也治法蓋不出此六字之

外傷寒并雜病知此六法其庶乎得仲景丹溪之旨也

汗法

桂枝湯

麻黃湯

雙解散

升麻湯

參蘇飲

香蘇飲

小柴胡湯

餘法加連鬚葱桃葉蒸法出汗凡邪之在表者宜汗之而愈

吐法

梔子豉湯

大承氣湯

藜蘆散

人參湯

五苓散

餘法加三山丸合解毒散煎凡病之在胃鬲者宜吐之

下法

小承氣湯

大承氣湯

調胃承氣湯

瀉心散

舟車丸

破棺丹



餘法加牽牛丸甘遂末凡病之在裏而邪實於腸胃者宜下之

利法

**五苓散天水散**

餘法用田螺麝香敷臍凡患小便赤澀陰陽不分者利之而愈

溫法

**理中湯五積散四逆湯薑附湯三建湯**

餘法用硫黃丸燒酒煎服凡病陰症虛寒脉沉遲者必溫之

和法

**小柴胡湯建中湯**

凡病非表非裏不寒不熱不可汗下者宜和之

**三見丸傷寒藥製煎者法**

○製藥法 傷寒門藥之最要者莫如麻黃大黃附子茱萸之屬其

製法不比泛常是故不可不附於後也

麻黃去節先以滾醋湯畧泡片時撈起放乾備用庶免太發如

冬月嚴寒臍理至密當生用不必製

大黃須錦紋者佳切片用酒拌勻燥乾備用不傷陰血如牛壯

人實熱者生用不必製

附子頂正圓平大者佳去皮臍先用鹽水姜汁各半盞用砂碓

煮五七沸後入黃連甘草各半兩再加童便半盞煮七八沸

住火良久撈起磁器盛貯伏地氣一晝夜取出晒乾備用庶



無毒

菜萸用半熟鹽湯泡片時炒燥備用庶無小毒

猪膚傷寒咽痛下利而煩者用之和蜜粉煮羹本草中未載今人用之不審通用厚皮而尚連肉在上者有之若帶肉於上則反作殃所謂膚者惟削薄皮面一層而已其皮肉之皮亦不可用方為膚也

甘瀾水取水一斗置大盆內以杓揚之上有水砂數千顆相聚一團取用之

漆水行漆之水取其急流而有声亦通達之義也

大青要莖葉兼用

飴糖即米與麥共熬者如蜜樣佳

○解藥法 傷寒治法無非汗下温涼有汗之而不止者即用麻黃

而不得其法也有下之而不止者即用大黃之不得其法也有温之而至燥熱者用附子之不得其法也凡犯此者必知其解救之法庶可矣

用麻黃後汗出不止者將病人頭髮披水盆中足露出外用炒糯米半升龍骨牡蠣防風各一两研為細末周身撲之隨後秘方用藥免致下陽之禍

用大黃後瀉泄不止者以烏梅二箇炒粳米一撮乾姜三錢人參白朮炒各半兩生附皮一錢甘草一錢升麻少許燈心一



用五加皮酒浸

用五加皮酒浸

用五加皮酒浸

用五加皮酒浸

用五加皮酒浸

用五加皮酒浸

用五加皮酒浸

用五加皮酒浸

用五加皮酒浸

用五加皮酒浸

用五加皮酒浸

用五加皮酒浸



