

薄奇湯下 內加制辰砂三錢名辰砂六一
散 治狂言妄語驚搐用防風荆芥薄奇天
麻煎湯候冷調下 本方加鬱金名牛黃亦
一治痘後瘡癩癰毒及天行瘟疫冷水調下
多服大効

退火丹 治痘初出標大熱不退或稠密成片者
神効

六一散 一料加雄黃飛過 三錢 經薑藤燒存性 一
錢外用紫草木通蟬退地骨皮紅花大力子

羌活片苓灯心煎湯候冷調下極能解毒稀
痘

四苓散

白朮 赤茯苓 澤瀉 猪苓
右為細末每服一錢

三黃丸

黃芩五錢 黃連 大黃各二錢半 為細末雪水搗丸
菴荳大辰砂為衣每服五七十九灯心湯下
備急丸

木香二錢 大黃 黑丑頭末各五錢 為細末神麩

糊丸每服五七丸 山查湯下

甘桔湯

甘草二錢 桔梗一錢 水煎服

三荳湯

赤小荳 黑荳 菘荳各一升 甘草三兩 三荳用水

淘淨用水八升入甘草同煮荳熟為度逐日

空心面東任意食荳飲汁服七日未不出

代天宣化丸 即韓氏五瘟丹也

甘草甲巳年 黃芩乙庚年 黃栢丙辛年 山梔丁

年君 黃連戊癸年 連翹佐 山荳根佐 牛旁子佐

先視其年所屬者為君次四味為臣君藥加

一倍臣減半佐又減半共為末冬至日修合

取雪水煮升麻汁打麵糊為丸辰砂為衣竹

葉湯下

五積散

白芷 川芎各三分 桔梗一分 芍藥 茯苓

炙甘草 當歸 桂枝 半夏各二分 陳皮

枳壳 麻黃分各五 蒼朮錢一厚朴分四 右除桂枳
壳二味為粗末外十二味為末慢火炒令轉
色攤冷次入二味末令勻水一盞半生姜三
片煎一盞溫服

辰砂散

辰砂錢一 絲瓜近蒂三寸連子燒灰存性為末
蜜水調服多者可少少者全無絲瓜解痘最
妙紫草甘草湯調服尤佳

連翹湯 總解諸毒散風清熱痘後一切發熱癰

毒赤腫 連翹 防風 瞿麥 荆芥穗 木

通車前子 當歸 羌胡 赤芍 滑石

蟬退 黃芩 山梔子 甘草各五分 紫草五分

水煎服

連翹升麻湯

連翹錢一升麻 葛根 桔梗 甘草各七分 木通

分八牛旁子錢一 白芍藥分五 薄荷葉許少 淡竹葉灯心

水煎服

消毒飲 治咽喉腫痛上膈熱盛 一方加升麻

牛旁子

錢二

荆芥

錢一

甘草

防風

各五分

水煎服

翁仲仁十神解毒湯

專治身發壯熱腮紅臉赤

毛焦色枯已出未出三日已前痘點煩紅燥渴

欲飲睡卧不安小便赤澁以熱盛也並皆治之

歸尾

生地

紅花

丹皮

赤芍

桔梗

木通

大腹皮

連翹

川芎

此方治血熱

痘疹以涼血活血為主佐以桔梗川芎有開

提發散之功引以大腹皮木通有疎利熱毒

之効臣以連翹丹皮有解毒之良用此以治

血熱痘疹則能內外分消熱毒雖盛庶幾解
散表裏自然和平矣古人用黃連解毒湯恐
驟用寒涼不惟冰伏熱毒及出不快抑且熱
毒為其所抑則鬱於臟府或肚痛腹脹內潰
而死者有之豈若以方用之為穩當若不得
已而用黃連芩柏亦須酒炒一以製其寒涼
之性二以助其上行之勢借連柏以解毒耳


加減法

身熱壯盛加

葛根前胡

毒盛綿密加

荆芥



鼠粘加 天花粉竹加 小便血加 犀角

大便黑加 犀角黃連加 吐血乾嘔加 犀角黃連

發紅斑加 犀角黃連加 小便赤加 山樨

小便短澁加 猪苓澤瀉加 小便秘加 滑石

大便秘加 枳殼加 嘔加 橘紅加 泄瀉加 猪苓澤瀉

大便秘喘加 枳殼加 煩躁加 麥門冬

煩渴狂亂譫語加 知母加 門冬加 猪苓澤瀉

咽喉痛加 甘草加 犀角

以上並用灯心十四根水煎服



羌活散鬱湯 專治實熱擁盛鬱遏不得達表氣

粗喘滿腹脹煩躁狂言譫語睡卧不寧大小便

秘毛豎面浮眼張若怒並有神効并為風寒外

搏出不快者同治

防風 羌活 白芷 荆芥 桔梗 地骨皮

川芎 連翹 甘草 紫草 大腹皮 鼠粘

子 右為粗散水一鍾燈心十四根煎六分温

服

身初發熱及見點之際毒氣壯盛外為風寒所

抑或肌肉粗厚腠理堅閉肌竅不通經絡阻塞
使清氣不得引毒達表循竅而出則熱毒擁遏
於內為腹脹為喘急為秘結為狂煩為驚搐為
失血皮燥毛直面急眼脹睡卧不寧驚啼多哭
以熱毒擁遏之症辨認不差急宜用發散開提
之劑佐以和解透肌之法則熱毒不擁而其出
自易矣羌活白芷防風有升提發散解毒之長
桔梗有開提勻氣之能荆芥連翹犀角善解鬱
熱地骨皮消擁熱於筋骨之間且能肅清臟府

紫草滑肌通竅太腹皮引熱下行使內外有所
分消用此以治熱擁之症效大而功用極妙若
驟用寒涼如芩連升麻之類則熱為寒氣所抑
不得伸越逗遛經絡為疽為癰者有之冰伏硬
閉者有之至於人參黃芪白朮茯苓溫補之劑
誤用則其擁盛禍不旋踵他如丁香桂木香姜附
之類以熱攻熱殺人立至尤宜戒慎故發熱之
初至見點之後並宜以本方處治依後法而加
減之

加減法

初發熱壯熱腮赤面赤毛焦皮燥咳嗽

喘急加升煩渴加天花粉腹脹喘急鼻塞面赤

若怒毛直加麻便秘加當歸甚則加木嘔吐加

猪苓澤瀉禁用半夏丁香香洞瀉加升禁用白木

陳皮草薤龍喘嗽惡風加紫蘇失血加犀角地搖加

骨等劑清發斑加黃連黃鼻衄加犀角小便赤澀加

山施地驚悸加木通不思食加中傷食加中查

麥芽煩紅赤色加生地紅花丹

見標二三日間出不快利加木力子山查蟬

皮急肉緊身壯熱甚加葛根

見標三日之內並依本方加減及三日後痘

瘡出齊血包已成而前症悉平不得復用此

方恐發散太過難於行漿另有方藥在後其

禁用藥劑並從血熱痘症法而裁治之

太乙保和湯又名紫草專治血熱痘症服十

神解毒湯後熱症悉去內外和平見點三日之

後不易長大粗肥者用之則能保和元氣活血

解毒助痘成漿易易易落也

桔梗 紫草 川芎 山查 木通 人參
紅花 生地 甘草 糯米五十粒

右用燈心七根姜一片水一鍾煎至六分溫服

便澀腹脹加大腹皮 繁紅 不潤加 常滯

出不快者加鼠粘子 陷塌加 黃芪

痛加白芷 不勻加 防風 水泡加 白朮 嗽加 五味

門冬渴加 麥門 痒加 白朮

七八日後漿足身復壯熱便秘煩渴腹脹喘急

前胡枳殼湯漿足禁用此方另立湯飲在後

益元透肌散 專治擁熱痘症服羌活散鬱湯後

擁症悉開氣血和平見點三四日後不肥大者

不成漿者用之則能自氣解毒透肌達表領出

元陽助痘成漿而易結膿窠也加減以保和湯

同論漿足之後另有保嬰百補湯在後 按此

即大乙保和湯去生地紅花加蟬退鼠粘陳皮

水一鍾加燈心十四根束二枚煎六分溫服

○血熱癰症禁忌

血熱痘症熱毒彌盛然毒氣無所分消只宜重用
升提發散使毒得以達表而從外解引以滲泄
使熱得以潤下而從內消佐以清涼消毒行血
涼血之劑則痘雖稠密亦能消散而易出易化
聚也所謂輕其表而涼其內十神解毒湯蓋得
安表和中解毒三法盡善誠痘科之神方也凡
溪曰熱者清之實者平之其以方之謂歟是故
發熱至見點之後三日以前毒氣未盡達表內
外彌盛血熱之症悉具辯症不差並只以本方

處治之切不得用參芪白朮茯苓補氣之藥於
熱症未聚之前如誤而用之是謂實其實腹脹
氣喘狂亂譫語咽喉腫痛口舌生瘡變症百出
所謂邪得補而愈盛也嘔吐泄瀉慎不得用半
夏丁桂乾姜木香藿香訶子肉果如誤而用之
則是以熱助熱氣得熱而愈亢也燥症必至咽
疼狂亂失血便秘無所不至矣至於龍骨枯礬
澀滯之物且能使氣道阻塞是欲其出而反閉
其門也腹脹之患生而喘急之勢至矣尤宜戒

之及至血包已成氣血定位頭頂白光勢將行
漿又宜易方另行別議

三仁膏 治痘疹大便堅實不宜下者服以潤通

火麻仁 炒去壳 松子 去壳去 桃仁 去皮炒

右研爛加芝麻一合微炒研細入蜜水研極
爛以帛濾去殼同前三仁蜜湯調下看大小
用之

見標三日証治活法

發熱三日後退涼見標飲食二便如常形色淡紅

踈朗林過碍手者上吉不須藥

發熱一日便出者凶乃表虛毒盛也急用羌活散

加紫草牛旁蟬退煎調紫草膏或保嬰丹若治

之早十救二三 若服後熱盛不退宜羌活散

調退火丹 若無保嬰丹用纏荳藤灰加辰砂者大

之矣

報痘時煩躁不寧腰腹痛不止口氣大臭痘見紫
色者死

標色白皮薄而光根窠全無紅色或根帶一線紅

三五日即長如菜莖大此痘決不能灌漿久後成一包清水擦破而死不可因其好看妄與下藥

標出全不起頂如湯泡灯火燒者一樣十日後痒癩而死

標出時一片紅斑如錦紋者六日死遍身如蛇皮者死黑斑如痣狀肌肉成塊黑者立時死

凡見標疎少則毒輕不必妄治密則毒盛但要磊落大小分明不相粘連成片可用前藥進之或

托裏解毒之劑快斑湯消毒飲主之使其易發易靨如出太密粘連糝糊其毒尤甚托裏解毒之劑宜多飲之以防痒癩黑陷之變更察外疔可治則治不可治則勿治

凡痘子初出最要唇白潤澤其毒則輕如唇焦裂舌燥有芒為毒火熾盛表裏鬱遏急宜解之黃連解毒湯加大力子標後身熱未退清地退火湯

凡見標先要頭面稀疎磊落頸項胸前稀少其毒

則輕如面上一片糳糊未發壅腫蒙頭纏項胸
前布密以毒盛也慎勿治之

凡頭面未見標而手足先出他處未起而手足先
起他處未收而手足先收者以陽火太旺宜早
解毒抑陽扶陰之劑四物湯合黃連解毒湯主
之如他處俱起而手足起遲他處俱收而手
足不收者以脾胃虛弱不能行其氣血達於手
足宜補脾胃十全大補湯桂枝芍藥湯
凡初見標之時磊落似稀疎之狀其後漸加

日多一日以毒伏於裏氣虛弱不能使
出須大補而兼解毒庶可十救二三也十宣散
加無價散

石谷程氏曰凡發熱見標密無毫縫空地稠若黍
種者急用三元秘方救之每一歲兒用茜根芫
荑子各三錢荔枝四枚若不起加葡萄一錢半
好酒一鍾煎至五分候冷每用半盞挽熟水半
盞時時慢喂之一日服盡次日再用水煎如
前慢喂之但服此藥之後不可雜食他物以

國家中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

傷胃氣小者只許食乳大者只吃粥若口渴即
以此藥水飲之一以止渴又能清熱解毒切忌
油膩煎炒恐滯腸作瀉則悞矣或十歲二十
歲藥後一歲加起依數增加作一劑服之如年
多劑大不能盡煎可分作二三確煎之按前
藥用酒煎者活血也後用水者清熱也熱盛必
作渴代茶飲之足可解毒蓋前症不可補補則
助毒又不得不補不補則不起發宜當解毒解
毒又作瀉不解毒又攻內茲用三味代之既能

解毒又可溫脾活血誠為千金良劑

凡痘發熱一二日便出或一齊雄出密如蚕種紅
紫無縫急宜服之此時切忌保元恐溫補助毒
以其血未活而漿不能化故用此三元解之俟
其色淡血活熱勢已退然後進補庶為萬全
凡皮肉間壘然紅點稠密急用纏莖藤加製過
辰砂末連進二三服或薄奇湯調退火丹仍以
牛旁為末敷顛門上以散熱毒非惟能使痘疎
又且免使侵眼又方生地黄牛旁子搗成膏

貼面頰額角能退痘毒

一已出未出之時口鼻出血以血熱錯經妄行不可妄投熱劑宜用生犀薄酒磨服如鼻血不止胎髮灰吹入鼻中即止口鼻既血又木小便下血恐胃為熱毒所傷腐壞而然不可不知一出與地皮相平無與起之意乃是紅斑急用涼血解毒羌活散加酒炒芍藥紅花紫草蟬退木通占米連進二三劑退之夾疹同以治治之遲則紅變黑黑則逆而難治

大凡用紫草必用占米以制其冷性俾不損胃無洩瀉之患惟大熱大便燥者不必占米

大凡用當歸活血須以芍藥收之免辛散助熱一標出他處未見獨出數粒於山根之上為毒盛氣虛犯上或發三五粒一塊者皆不吉之兆也急宜涼血解毒以防危急若腮頤地角之間踈踈朗々淡紅潤澤三四次出者為氣正道尊上吉症也

一出皮膚乾燥枯澁必難起壯用溪中白色石子

數枚燒紅以井水淬之使薰蒸瘡上或置被下薰之頃刻潤澤瘡即起發又能解穢

一色淡不紅活者血虛也以四物湯加減服之但地黃大能滯血不可輕用不得已須姜汁炒過人乳補血甚捷加酒少許佐之且血非氣不行又加四物於保元之中為陽生陰長之義

一瘡正出好飲水者以乃脾胃虛弱津液枯涸故也如恣飲則必傷脾洩瀉及發泡難靨之患保元湯加麥冬五味子止之

一瘡未起壯而頭面先腫者乃陰虛陽盛大下四物湯加入乳好酒服之以補陰與陽齊然陽易補陰難補宜急勿遲否則悞事

一出即變黑者以為惡候如有起與急用托裏解毒之劑少用保元大加紫草紅花服之外用四聖散點之然早能涼血解毒必無此患亦多因脾胃衰弱血熱所致凡紅變白白變黃者生紅變紫紫變黑者死

一瘡全藉氣勻血活腠理疎通則出快而稀疎亦

無餘症倘遇寒凍及勞役瘦弱之人血凝氣滯
出則不快蓄於皮膚之間肌肉之上進退兩難
日久變成黑紫禍不旋踵凡有以候當按令急
與和劑如羌活散之類以疎利之其毒氣隨痘而出庶
無變症保合太和之兆也 如頭面出不快以
太陽經當用荊芥甘草羌活防風天麻湯 如
胸腹出不快以少陽經當用升麻紫草木通紫
蘇羌活湯 如四肢出不快當用芍藥紫蘗葛
根甘草葱白連翹羌活湯各加生姜連進二服

痘即出快

賊痘

凡賊痘與好痘一般但捉先起壯皮嫩嬌軟內係
淡膿當用保元湯加占米煎服亦能回漿
一出其色掀赤抹過皮軟不碍指以係賊痘過三
日變成水泡甚至紫泡黑泡者危症也若未成
紫黑宜少進保元大加紫草蟬退紅花鮮之或
灯草木通湯調六一散利去心經蘊熱而紅紫
自退如已成水泡白泡或灰白色則保元中大

下四卷利之，以千金妙法也。不然則遍身抓破，黑爛而死。

起壯三日証治活法

凡四、五日来起壯，活動一線紅暈，而有根窠，此為上吉。蓋有根窠，方見氣勻血活。血活則毒化成漿，收功結痂全藉此也。若無根窠，必是氣凝血滯，按法速治。

凡起壯肥滿，乳食如常，不必服藥。
一四、五日来起壯，肥大中有一小孔，自頂直下至

脚不黑不白，與痘色相並，此名蚌痘，由表虛腠疎而然。若不早治，大洩元氣，不能起發，灌膿急用保元湯，大加占米、川芎、肉桂，提起內膿，以實其孔。庶為佳兆。三二劑後，孔自塞滿，若孔色黑，乃疔也，以疔法治之。

一頂陷色白皮薄，光洞者，氣虛也。火照內外，光明者是。大進保元，倍加酒炒黃芪、肉桂、川芎、丁香、人乳、酒漿和服。

一根窠淡枯，澁不澤，血虛也。宜保元加酒炒紅花

川芎當歸為藥加山查以消參芪之滯再加木香一二分調氣氣調而血自活矣

四五月痘色不宜紅紫乃熱毒不化若血熱仍當涼血解毒兼氣虛者保元加紫草木通紅花生地之類解之

一地紅血散乃血不附氣保元加當歸大加白芍藥以收斂之蓋為藥味酸用之為君使血得以附氣且又能活血化聚此最上一乘之法切記切記

一洩瀉按寒熱急治至要再不宜瀉

若起壯遲緩根脚不紅活者以無價散一歲看木

小用之好酒調服或保元加入乳好酒丁香占

米山查血虛者加當歸鹿角膠

一黑陷及痘疔外用四聖散以油胭脂調點之內

以涼血解毒如紫草紅花木通茜根少加保元

進之其疔自退疔退看其虛實仍以保元補之

一煩躁者內必有熱可用木通以引其火下行或

以六一散灯心湯調俟冷服之 譫語者加三

制辰砂夏月井泉水服

如飲食不進者痘色何如未可輕投藥劑蓋其間
有毒氣未盡者且山查紅花子紫草等藥清而
解之如脾胃虛弱痘色淡白宜保元加山查
扁豆神麩嘔吐加藿香

一倒痘頭面上未出從足底出起逆而上之縱起
壯灌膿回至心窩下則毒攻入內大叫一聲昏
迷而死雖踈快亦不免死乃逆症也候其出齊
至頭面遂早丟去下身不洽只將保元大加川

芎以升提之漸使其自上而下起壯灌膿自
上而下收斂結痂如常痘一般此鮮有知其妙
者宜謹誌之此逆痘若治之早以黃連解毒
湯一帖以護其心可十全三五遲則百無二三
矣

翁仲仁曰三日四日自痘當出齊點至足心勢方安
定猶有陸續不出之狀或隱於皮膚之內不
見不起者古名不快若非風寒鬱遏之因必有
氣虛不振之過是以四日已前痘毒方出身表

宜涼四日已後毒出已定身宜溫涼則氣血和平痘色必然潤澤溫則腠理開通其毒易以成漿故至此而身不微熱雖未必至於冰伏而痘瘡斷乎不長四五日來血包已成候當肥大而粗頂宜發光而白故根紅而頂白者已具行漿之勢若還赤色過頭雖見嬌紅可愛延綿六日依然到頭空殼虛花皮薄而光亮如灯內含是水頂尖而根脚不紅行漿勿實是以毒熱盛而未解則為紫為黑壅而不起則為陷為癩滯而

不榮則為乾為枯為青為灰怯而不振則為不快為停漿或有肉先腫脹而痘反不起者漿則滯而不行面已虛浮而痘反退伏者毒則遏而不進故身不熱而痘不起已成冰硬之形赤色若還不變溫之可興氣血弱而不振遂成不快之狀紅潤依然如舊補之可生紫色乾枯切忌溫中帶補只宜活血鬆肌為壅為滯烈藥雖然可發透肌尤是良方溘洩惟於溫補瀉甚佐以升提

凡起壯時痘之根脚全然不起其頭面皮肉紅腫如瓜之狀者死。起壯時腰腹或疼或止遍身紫點如蚊蚤咬全不起發者死。起壯時痘伏陷不起腹中膨脹不能飲食氣促神昏者死。畧能飲食用消膠藥治之。起壯時遍身黑陷悶亂不寧神昏氣潰者死。起壯時根窠紫色乾燥不活全然不起發者死。

頂陷不起須看年壽上痘起則不必憂如年壽上不起急與升天散一二服。

痘半起忽然平陷而色白者急與內托散或補中益氣湯

痘色紅鮮反乾燥而不克肥者以火盛而血不足也宜退火涼血輕清之劑四物快斑湯主之。痘克肥而帶濕者以脾中有濕而氣不足也宜瀉濕補氣兼風藥治之。蓋風能勝濕也。四君快斑湯主之。

一痘不起發不拘五陷用獨聖散或胡荽酒。若黑陷腹脹用猪尾膏。

一痘乾尅不起者外用冰楊湯洗之內服補中益氣湯

一起脹時手足見而復隱起而復塌者死此根本已摧枝葉先萎之象也

凡假壯之痘其中有數粒起壯者是也至十二三日決不能回

漿結靨內攻而死矣 白痘者可急進保元加

川芎丁香生占米提氣灌膿而愈此內托法也

內托散即保元加川芎便是不必千金內托散正壯之時痘雖起發而皮膚不碍手按之水漿就出內色不暗是也

灌膿三朝症治活法

灌膿時根窠紅潤肥滿如黃蠟色飲食二便如常者上吉不瀕服藥

灌膿時皮白而薄純是清水與水泡相似者三四日後遍身抵破而死

灌膿時吐利不止或二便下血乳食不化痘爛無膿者死若二便不下血猶可用止瀉及消食之藥

灌膿時二便閉目合聲唾腹中脹滿肌肉黑者死

一頂陷無膿為逆

火照之內外光洞手按之軟陷者無膿也火照之內暗不光洞

按之如鼓者有膿也

急用保元加歸為肉桂木香占米煎

成入人乳好酒温服

有一等肥白痘其色白不作膿俗名木痘以其人

原有痰也用二陳四物湯合而服之一消一補

仍將小麥粉作麵調與食之立時膿起紅活但

不可妄投入參占米而助胃中痰火恐防口疳

寒戰咬牙乃陰盛陽虛也大用保元加川芎肉桂

丁香主之甚者加鹿茸

痘灌膿痛不止者氣滯也少用保元加山查木香

以行滯氣如膿血已滿可大用四苓以利之而

痛自止

凡灌膿三朝之內身涼痘灰白色或不進飲食寒

氣逆上嘔吐或腹脹或瀉清水手足厥冷無陽

症也急用二神加入保元連進數服温而補之

痒塌不止者血盛也少用保元大加何首烏牛旁

子蟬退考藥木香紅花 若將醫時微痒者不

必治 有氣血虛而痒者十全大補湯加何首

烏虛甚者加鹿角膠

一發白泡如彈子大者用專針挑破去水以活石末敷之仍服保元加白朮留皮茯苓以利皮膚之水如前後發紫泡是毒盛溢於皮膚之上必死

夫膿者血之化也有血方有膿無血則無膿痘至灌膿大勢已定故此時必以有膿為主有膿則生無膿則死痘至七日若頂陷不能灌膿者必由先失調治故也急看根窠血聚別無雜症速

宜大補氣血以充其頂頂滿膿足猶可回生若頂陷而色灰白以氣血俱離無能為矣

一頂陷無膿服內托藥而暫起不久又陷者膿未充足故也宜內托散倍加參芪當歸煎和入乳占米好酒服 若色灰白散成倒塌皮薄易破者用滌羊補漿湯保元湯加芎藭升麻入乳好酒

一痘色紅紫漿不滿足散成乾枯黑陷者當歸活血散合解毒湯加升麻石膏乾葛

一 遍身灌膿忽然一日變白變紅變紫者不可不察白者為虛宜內托散 變紅紫為熱宜當歸活血散合解毒湯

一 痘起壯灌膿俱好至八日大便忽秘常欲去而不能去急用歸尾枳殼芝蔴各三錢紫草生地黃芩各一錢煎服即通若失治至屬時忽然發熱而死 翁仲仁三仁膏尤妙

一 頂平脚潤漿不滿足十全大補湯加木香乾姜 一 遍身無皮膿水流沾衣簾不能轉動者用秘傳

茶葉方或敗草散內服內托散去桂加荆芥穗 一 痘發痒滿面抓去而面上瘡痕隱然點點有起發之勢以猶可治急以托裏發毒止痒之藥用內托散加蟬退立驗

一 痘抓破而出血者以陽瘡出血也宜當歸涼血湯主之

一 灰白慘黯皮薄擦破無膿血者不治 二 使不通目閉声啞腹中脹滿肌肉黎黑者不治 一 瘡爛無膿吐利不止二便下血乳食不化者不

治

一痘未起頂但脚漸濶至七八日乾枯瘡皮皺起誤認結痂收靨者多不可救急與補血解毒之劑庶可回生

一灌膿時眉心鼻準耳輪唇口及兩頰先有焦枯黑靨者以名倒陷不治

○收靨三朝証治活法

凡收靨自上而下者順自下而上者逆痘至收靨大勢已定亦有膿不滿足似靨而非真

靨者以時極宜明辯若七日之間面自腫惟覺退痘雖似乾而痂薄如帛或有內症未除以痘極險時也失治則凶變立至急以補血涼解之劑庶或轉移

一痘至十日血盡毒解其膿漸乾如蒼蠅色或如葡萄色從口鼻兩傍或面部收起至胸腹而下然後頷上與脚背一齊結靨逐漸剝落內症全無身漸輕快飲食二便如常者吉或手足心或手指尖或陰上先收者俱吉

一人中者任督二脉交會之衢也凡痘自初出至收靨俱要在以部位先見者佳謂陰陽和暢也一痘收靨自人中平分上下髮際以上陽中之陽也謂之孤陽足膝以下陰中之陰也謂之孤陰孤陽寡陰所以痘瘡之收至此二處每遲留而後靨也不必施治

一鼻梁上痘先焦者任是凶逆亦不死

一痘當靨而流漿不已者因表散太過則斑爛流永或飲水多則漂蕩流永俱服保元湯加防風

白芷白朮或除濕湯外以敗草散敷之

一當靨不靨而膿充足服回漿散或象牙散

一痘有靨至頭或至腰而下身數日不靨者此乃熱毒太盛不能收靨故也治當有熱則清之若小使不利者四苓散加苓連滑石木通大便秘結者當歸解毒湯利之

一痘當靨不靨忽然變動灰白頂陷吐瀉腹脹寒戰咬牙者急與內助丹若痒塌氣促足冷者加附子有水泡者大加白朮行去惡水而膿自

乾矣

一血盡漿足溫潤不斂者內虛也保元加苓朮以助收斂結痂或六君子湯

一當靨不靨發熱譫語目閉口喘手足大亂屬于氣小水不利者以熱毒乘於肺經無陰氣以收之然也急用清金導赤飲主之

一漿未稠濃頂未飽滿面腫忽退目閉忽開瘡脚散濇色白皮皺乾燥似靨非靨此因津液枯竭血氣虛少內証未除之故此症之極險者也急

用四君子加麥門冬牛蒡子荆芥連翹桔梗救之若誤認作結痂無事致成危殆悲哉

一膿後不能結痂反成腐爛和皮脫去者以倒靨也係中氣不足急用保元湯加當歸牛子連翹薄桂木香治之其頭面瘡已破者復加腫灌手足遍身原無瘡處又復出一層謂之補空若治之頭面不腫空處不補不旋踵而告變矣

一收靨時忽泄膿血痂皮者以亦倒靨之症乃脾強腎弱為順利盡自愈不必施治如利下水穀

不分者以腎強脾弱也急用陳氏木香散送下
荳蔻丸

一痘因冬月嚴寒被寒氣鬱遏而不能靨者以桂枝解毒湯治之

一痘因夏月炎暑熱氣薰蒸而不能靨者甘露解毒湯微利之

一遍身俱收惟頭與足不收者以陰陽不和故也以四物湯去地黃加牛膝升麻牛旁紅花荆芥之類

一多服熱藥以致熱毒猖狂痘爛不靨者小柴胡湯合回漿散或天水散或猪尾膏外以黃連輕粉為末相油調敷或用猪胆汁研芒硝如膏塗之
古人用猪尾膏獲効神速者蓋以熱毒蘊併於心經致熱毒內外灌注而不結痂用以方者以血歸心引龍腦以涼之而行營衛况營衛得香則行遇臭則止也

一收靨時有臭氣帶腥者佳全無氣息尚有餘毒未發也若臭氣如爛肉不可近雖似結痂未可

為真急以清熱活血緩則無濟

一瘡欲收而唇口乾紫連結查滓頰紅者將成肺
癘也宜解毒湯來冬知母百合甚則大連翹飲
一凡痘係危症氣血本虛多服補劑而漸有膿色
將收靨雖有熱者只可於補劑中加涼藥可也
若謂將靨而去補劑竟與涼藥更加下利藥欲
令速靨是速其斃也蓋虛者復虛毒反內攻而
死此必然之理又已然之驗也

逆症不治

痘當靨遍身未見青膿黃色之漿而

口唇上下痘先黃熟者毒氣內攻於脾也不治
一痘收靨時不要飲食口唇常如食物而動不止
者不治

○落痂症及靨後餘症

痘瘡收後痂厚落遲離肉不粘者吉

一痂落疤帶紅色而不凹凸更無他症飲食二便
如常者吉

一自食痘痂者雖有他症不死

一痘已結痂而不焦落者餘熱為害也大連翹飲

去紫草加地骨皮

一痘痂至半月或一月不落或發痒者以因表發大過致肌肉不密無力收斂故也宜人参固肌湯

一痂不落反見昏迷沉睡不省人事者以脾胃太虛也宜人参清神湯

一痂雖乾好但半邊掀起半邊粘着不能脫落者以過用辛熱之藥熱留肌表也宜升麻葛根湯加防風荆芥蟬退連翹以去肌表之熱即落矣

一痂紅紫者乃血熱毒盛也當涼血解毒

一痂白者血不足也不治雖過四十日還死以因漿水淡故痂白急用保元湯合四物湯加白朮陳皮紅花老米

一痂後身熱不退或寒熱往來用小柴胡湯虛則補中益氣湯俱加黃芩

一痂後唇乾口渴熱甚不解者大連翹飲主之

一痂後虛煩不眠者竹葉石膏湯 煩渴譫語者辰砂益元散

一痲後口噤殭直腹痛澆臍冷汗如雨痛定汗止而脉弦緊者因疝受風寒也宜散風養血用釣藤湯加紅花木香川芎芍藥當歸甘草白朮青皮官桂生姜

一痲落肌肉尚嫩出見風早遂成癩癰有膿汁出者燒牛糞灰敷之痲不落搗搗抵搔致成瘡風瘡者宜消毒飲加苦參當歸外用金華散或乳香韶粉散遺毒生瘡不已者活血當歸湯宜灸風池曲池三里則永不發

一痲後遍身青紫癩瘰口噤痰响者由氣血虛弱而受不正之氣也用蟬退一錢姜汁薄荷汁入酒一盞調服得汗即愈

一痲後手足忽然拘攣不能屈伸轉動者由血少不能養筋或因風寒濕三氣使之然耳不可輕用發散反耗其血只補脾養血則瘳當歸桂枝湯治之

一痲後赤火丹毒惡候也從頭上起者過心即死從足下起者過心腎即死內服玄參化毒湯

一痲後牙齦生瘡時_二出血謂之牙宣呼吸息謂之息露以走馬疔也_一由熱在陽明急用_二蠶退散敷之_一如唇腫面浮穿鼻破頰潰喉腐肉飲食不入者死

一痲後發癰者皮膚間隱_二起成疔瘡_一由毒氣未得發盡藏於皮膚或發痒搔之而成者或因受風_二火相持而成者_一以吉兆也欲發出無使停留以_二變他疾_一如發太甚不已者內服防風葛根湯外用_二蠅子水洗之_一如無用_二六一散拂拭之

一痲後兩目不開_二色見明者_一謂之羞明_二性向暗處_一敢開也涼肝明目散主之若暗中亦不敢開者_二以即防目中_一有瘡以_二望月沙散_一治之


大宮詹少溪吳馭閱校



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

金
鐘
之
聲
系

社
○
112



NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

小兒金鏡痘疹心印卷之五上

新安生生子孫一奎著輯

○異痘須知

夫痘有似凶而吉有似吉而凶者不可不知

天根痘

諸痘不起壯而天庭或晚星起灌者乃精氣外生故曰天根十有九生

天空痘

諸痘壯氣而天庭或晚星不壯者乃血不灌頂也故曰天空十無一

明朗痘


諸痘不起而太陽太陰獨起者吉日為明太陽太陽之謂也

明蝕痘

諸痘起壯而太陽太陰不起者凶

海溢痘

諸痘不起而耳後方員一寸獨起者名曰宿海溢是腎經旺也可治



海枯痘

諸痘起而耳後方員一寸獨不起

又云

頭面遍身四肢耳上俱已起灌膿惟齒乾如不急救

有根痘

九痘出頭面多四肢密者十分危險若地角方員畧有數粒圓如珠者上有十

生蓋腎為根本

無根痘

諸痘俱不好而地角方員陷伏乾枯或灰白不起者腎水絕也不治

抱鼻痘

面部俱稀而鼻梁左右密如蚕種者此毒聚於脾胃也名曰抱鼻痘其危矣

單瑣口

面部俱稀而口角有一粒黑痘較諸痘獨大者名曰單瑣口

雙瑣口

若口角兩邊各有一粒者名曰雙瑣口皆惡候也

瑣項托

痘出遍身稀疎惟項下稠密一片以至於項名瑣項托願亦為不治之症

猪頭痘

出而頭頸窩太多者急用山豆根參桔梗甘草生地芩歸山查木通荆芥牛

子水煎遲則毒結于喉而死

逆痘

上少下多者名逆痘以此無太害

兩頭痘

初標時省自胃而上身臍而下俱有而中間一截全無者是也七日內急用

參芩芪湯去桂加蘼葉桔梗山查白芷厚朴紫草防風木通再加黃耆三十粒水煎救之出七日則難救矣

鬼捏痘

痘出遍身全無點粒其斑成片恰如打傷痕一服故名鬼捏不治

鬼痘

痘標既定手足背俱多而頭面全無者名曰鬼痘又曰無頭痘五日之內可

賊痘

救五日之外難救蓋氣血下行不能上
先急用升麻川芎白芷藜蘆前胡甘草
桔梗防風當歸第失姜水煎服如不治
曲池生毒一月見骨而死若身上四肢
稀少者不可
遂作鬼痘者
痘初出便如綠莖過十日便如黃莖大
再一日又如員眼大名曰賊痘其痘根
窠與頂全無血色形雖起脹按至虛軟
至四五日上下出血而死但此諸痘
獨大其大甚速者就是

蛇皮痘

不必大如員眼也
頭面遍身再無空地平塌而色白者俗
名蛇皮以此必乾枯不能作漿至十一二
死且必
夜標紅潤至四五日忽變陷伏不起將
至裏虛以名為藥患急用扶表裏為上

藥患痘

九焦痘

當額地閣顛骨背脊耳後手足皆有
二箇黑陷者名曰九焦痘不治

伏陰痘

痘不貫膿而瀉膿血
故名伏陰急宜溫裏

空倉痘

痘雖肥滿而內實乾枯全無血水
乃空倉也決死之症

石白痘

痘中有凹而四弦特起明亮好音內實
漿液不化以手摸之其硬如石因形死
石白故名之以此

菜萸痘

痘不甚起而中亦有凹四弦皆有縐紋
以其形似菜萸故名之也若得根窠紅
活者服內托散去防風白芷頂中發黑
點者保元湯加芫桂身壯熱者入酒炒
黃

虫痘

痘瘡痒甚者不必夏月中蠅生蛆雖寒
月亦有用簪挑去而愈或謂用柳條鋪

下令兒卧於上則蛆自出以蓋毒留於皮膚延綿日久臍腐熱腐故耳壁之腐草為蚩朽木生蠹其理一也

血疱痘

血疱痘者血協熱毒而自漿也刺癩血統紅者尚可治急與犀角地黃湯加白芍以制血解毒血黑者不治身熱者小柴胡湯加生地血漿不能收靨者紫草煎湯調下

血靨痘

痘出稀少四五日胖如碗豆六七日血靨痂乾亦似丹砂九日而痂落以氣血充足毒少故隨出隨痂不及釀膿也以此痘極佳百無一二

白漿痘

痘初起發瘡頭便帶白漿者以此疲癩痘也但有以便不可治主七日死

四圍痘

本瘡或發似粟米不待養漿即加搔痒

漏瘡痘

瘡出頭有孔膿水漏出堆聚乾結其色如天疱瘡及癩頭之形者或清水非膿無事自破水去而乾黑者以此皆屬氣所為傳染相似俗名漏瘡未有能治者矣起腫時瘡上有小孔不黑不白名曰蚌痘皆膜理不密而有是痘大泄元氣急用保元湯加丁香肉桂其孔一密而痘自起矣

蛀痘

其形如豆壳灰白全無血色擦破而後血出亦無膿血故曰隱血班也不治

隱血班

痘已出齊或未齊如赤萍萍微高起若爬出有血急以解毒升發藥救之如成爛痘則無妨矣

赤萍瘡

瘡已出齊紫色不起不灌漿如浮萍貼在肉上者不治

紫萍瘡

白萍瘡

同上

草尾珠

其痘遍身俱陷惟腕骨一團飽滿如珠以症可治補托灌膿即痊矣

盧廉夫曰黑痘多屬血熱熏痘本為惡証世醫恒棄而不治然形狀多端仍可解救須當辨而治之俾血不活者則難救矣

一痘紫黑或黑點子隱在皮膚之間者無此

散或人牙散用猪尾血三五滴酒調下小兒

三分大
入五分

一初出便是黑點急用紫草茸二三錢醇酒半盞煎至三分瀝查與服為妙

一其形如痣皮膚發青紫紋者服透肌散或加防風荆芥

一形如牽牛而色瘀敗又黑痕併黑靨者並用蟬退二十五箇紫草茸一錢水煎服

一痘黑如煤炭血不紅活者用活血散一錢酒煎紫草湯下

一痘黑而皮膚皆黑成片者化毒湯加蟬退地骨皮酒炒黃芩

一痘黑大而軟者氣弱而熱毒盛也用保元

加紫草

一痘焦黑潮熱煩躁者小無比散并水磨犀

角調下下錢

氣血兩敗痘

近看猶如水蓼花 遠望胭脂
紫可誇 臨漿清水 不成膿
古聖神農 無治法

復出痘

先見標一二點于面部或口唇上下如
常起脹貫漿收靨不知者以為痘本稀
先故也然以火照之紅點隱隱然藏于
皮膚之內急用內托解散則痘復出不
無顧下決發一毒不急散
其毒而發其痘即死

雲翼子二十八般異痘姑錄于后以備參者

一彤雲繞頂

遍身痘好但頭頂一片紅赤者
乃熱毒盛于膀胱也須清利之

一紫雲灌頂

遍身痘好但頭頂紫乾陷伏不
起者不治

一烏紗覆頂

其症必咽喉啞塞鼻氣大粗乃
血衰氣敗而无陽脫也不治

一梨花漫頂

用保元湯加天樞
尤或可救

一雲掩天庭

遍身磊落光澤惟額上一片血
瘡如雲者乃心家客熱甚也急
磨犀玳

一紫萍鋪額

其症熱甚咽痛悶亂發狂用小
無比散加玄參升麻犀角

一烏紗落額

不治

一灰撲印堂

其症心家少血也若兼腹脹咽
乾用保元湯加白芍涼血解毒

一楊花撲面

好湯用內托散加天雄

一赤珠繞唇

此乃脾經極熱也小比散加雄黃用

一烏飯沾唇

此証必聲啞神昏目精不轉四肢厥冷喉响如鋸三朝七日乃死期

一霞錦穿胃

此因火毒淫盛不治之症

一紫雲佈胃

此症血枯氣滯毒來攻胃也症必咬牙戰掉口唇焦裂頃刻命傾

一黑棋排胃

三朝決死

一柳絮飛膏

此乃血氣枯弱也保元湯加芎歸附主之

一桃花映背

此症清火解毒可生

一紫萍浮背

不治

一黑砂落背

不治

一雪鋪魚背

此血已枯也不治

一赤鱗穿腹

此症必大便秘小便淋瀝乃胃家熱甚也用五苓甘露以和解

一黑段纏腹


此症必肚內膨脹啞二日終矣聲音

一白梨墮腹

氣血衰敗也半月之間發驚而死

一葡萄落地

唇間紅紫一片若葡萄者兩日命終



一 爛粟居腎

遍身俱好惟腎上一片如粟壳臭爛者托補下元可轉

一 榴花散野

諸痘俱好惟四肢紅赤而唇口崩裂者乃心脾肺三經熱也須涼血清

天鮮毒

一 黑珠遍躰

四肢枯黑如火燒狀頭口中涎出氣冷朝夕死矣

一 楊花墮枝

手足獨灰白者氣凝血滯也八珍湯加附子治之

○ 婦女痘

童女出痘與童男相同無以議也但天癸通者則治法不能不異且夫發熱之初適遇經水如期而至則熱隨血解痘出亦輕不須服藥者過三

四日而熱不止痘不出者以熱入血室血必妄行為內動中虛之患宜涼血地黄湯加人參治之

一 非經行之期於發熱之際而經忽至者此毒火內熾逼血妄行之故必痘多而毒盛急用涼血解毒湯倍加連翹牛蒡使熱得清毒得解痘得出經得止始無他變遲則內虛痘必陷矣柳花散佳

一 正當起發灌漿之時適遇經行過三日不止痘

應起發而不起發應灌漿而不灌漿頂平形塌或灰白或黑陷以爲經血去多陰血虧耗必爲陷伏壞疔矣急以八物湯去地黃加黃耆木香熟附子以調元氣或葫荑酒噴之使痘起發灌漿或出增痘者爲吉若寒戰咬牙喘急腫滿手足厥冷者爲內脫不治之症矣

一 起發灌漿之時經水適來忽口瘡而不能言者乃血入少陰不能上榮於口也宜先以當歸養心湯主之俟其能言後以太補湯治之或猪心

血調服亦可

一 經水不斷之時適逢出痘身發壯熱神思昏沉言語狂妄如見鬼神尋衣撮空以行經之後血室空虛天行邪熱乘虛而入犯於衝脉蓋肝藏血開竅於目神思昏者魂亂也目妄見者視亂也妄言者肝移熱于心也宜瀉肝散或小柴胡湯加生地丹皮

一 正直崩漏不正氣血俱虛之後適逢出痘以必不能勝任宜大補其氣血以十全大補湯八物

湯加木香黃芪官桂主之使裏氣充足毒無留
停更能飲食則可保全否則倒塌不治矣

一向來經閉不通血海乾涸遠逢出痘毒氣拂鬱
於衝任之間二陽之併發其熱必甚若攻擊之
則血妄行不止痘亦不出為喘急為腫脹為陷
伏矣瀆調其心脾使毒得發洩庶可以保其生
以歸脾湯逍遙散治之脾和食進然亦方可收
功

二痘瘡起發至泡漿數日最宜表裏無病飲食如

常若當以時忽然行經者人但知厭穢以觸正
痘殊不知以乃本身之血不為之厭但恐血去
裏虛防生陷伏之變急宜救裏解毒大補湯主
之

一妊婦最忌出痘蓋熱能動胎胎落則血氣衰敗
痘必不能起發灌漿命其危矣故孕婦出痘深
為可慮蓋痘之用藥多主溫補如半夏肉桂之
類皆妊婦所忌而烏附又非痘家所宜凡遇此
症者不問輕重悉以清熱安胎為主不可觸動

其胎宜安胎散加黃芩芍藥主之血動者四物湯加芩連治之及單胎散佐之身熱足冷腹脹者八物湯加木香脾氣虛不進飲食毒發不出者四君子湯加木香糯米紫草胎動不安者安胎散加砂仁痘出稠密者參芪內托散加紫草芍藥當歸單身熱有外邪無內疔者參蘓飲加木香更以如聖散為主隨疔加減如初發熱加升麻葛根連翹痘出太甚加酒炒黃芩木力子山查連翹不起發加大力子白芍藥白芨渴加麥

冬知母天花粉痰多加半夏所謂可擾而擾似乎無擾故雖有胎不忌半夏也

一痘正在起發灌漿之時忽遇坐草分娩之期以氣血俱虛之候宜大補湯加熟附子主之以補氣血固表裏若產後小腹急痛者此血未盡也黑神散畧與行之不必拘泥若寒戰咬牙腹脹作渴足冷身熱者以脾胃內虛外作假熱也木補湯加熟附一二劑更用四君子湯加黃芪當歸陳皮木香多服止者吉不止者凶

小兒金鑑
子疹後十日或半月之間適逢出痘以無胎孕緊
累只以大補氣血為主以大補湯或八物湯去
芍藥痘出多加連翹大力子大便自利者加肉
苳蔻只照常一匙用藥施治不必妄為而多疑
之反致誤事

一痘疹要訣曰姪婦出痘收靨之時胎落者多無
事者發熱初出之時胎落者猶或可救若時當
起脹灌膿而有犯此者多死蓋血氣衰敗無以
逐其毒也

一痘已出未出不起不發隱在皮膚并治麻症斑
症用梅花一兩桃仁二錢絲瓜五錢辰砂二錢
甘草二錢為末每服五分參蘆湯下

一痘不問前後凡黑陷咬牙寒戰用梅花六錢州
山甲一兩仙靈脾五錢射香一錢為末每服三
五分咬牙寒戰加人牙二三厘內托散送下

快斑散

貫衆 赤芍藥 各一兩
甘草 升麻 枳殼 炒各五錢
右為末每服一錢水一盞竹葉七片煎至五

分溫服看大小與之按貫衆主腹中諸熱邪毒其性微寒凡痘瘡煩渴咽燥喘急大便秘小便赤澁目赤皆裏熱也急宜服之

西來甘露飲

清熱解毒如神凡發熱之初五日已前而熱不退痘色紅紫口渴大便結燥服之即能紅潤亦治疹家煩熱口乾咳嗽疹色枯燥或謔語喘急睡卧不安

絲瓜藤 霜降後三日近根二尺剪斷將根頭

一節倒挿入新瓦瓶中上以物掩之勿使灰塵飛入次日以好新罈一隻將瓶中之汁傾在罈中仍將藤照前挿入瓶內三日後汁收尽將罈封固收藏听後取用○春發熱煩躁口渴未見紅點將茜根一兩水煎濃汁二酒盃搯絲瓜藤汁二酒盃相和服之立安痘出亦輕○春已見標顏色紅紫及稠密者用紫草煎濃湯冲服便見紅潤○春夾斑者犀角紫草茜根煎湯冲服寒月用酒煎冲服○蓋以汁極能解毒清熱尤