丹溪心法附餘序

竊惟人之有生負陰抱陽而形神爰發故其爲情不能無感如喜怒之動於中寒暑之盪於外是以痾瘵攸萌而夭昏凶扎之患所不免也粵自

國立中央圖書館收藏

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

上古軒岐首出巫彭繼起內經作而醫道興矣迨至中古代有其人而醫道以傳秦漢以還下及近代若張長沙李東垣劉河間朱丹溪之四子者皆深於醫而各極其聖者也其所著方書口義傳布既久不能無舛而世之庸士往往昧此而不知變膠固拘泥藥罔奏功遂使微言奧義舉失其真毫釐之差千里之謬貽患可勝言哉予以多病懇

乞
賜休林下暇日檢方亦竊疑之
於是遠延方君過頻因出所
次丹溪心法附餘凡二十四
卷相與訂之夫方君名廣字
約之古菴其號新安儒醫也

嘗遊河洛旅寓陳留野亭劉
公亦雅重之恒以藥活人乃
謂是書超邁羣識尤切日用
雖經楊楚玉輩再纂而不能
備集脉訣之詳程用光氏翻
刻而不能盡芟附錄之誤於

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

是重加隱括訛者正之僞者去之且萃諸君子方論於下精切簡要不畔古經銓次成帙間亦竊附己意以發明之嗚呼三皇之書古稱墳典所謂內經乃其一焉實與周易分庭杭禮柰何人自易之目爲末枝則其道安得與典並傳哉方君沉潛古典有年矣惟是書之成幾易星霜而於藥脉證治分演詳明論著切當有識之士謂真有補於丹

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

溪不惑乎後學矣功亦偉哉吾省大方伯姚陳二公見而喜之因命工鋟梓以嘉惠人人甚盛心也方懇請爲序遂書此刻諸卷端外有地理書藥性書傷寒書若干卷亦君手自爲之欲同惠諸人而未果者兹固不贅及云

嘉靖十五年歲丙申秋七月朔旦

特進光祿大夫柱國少保兼太子太保禮部尚書

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

武英殿大學士知　制誥同知
經筵　國史總裁致仕臨潁
賈詠書于南塢草堂之暇

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘序

昔予每年艾時以家事繁冗不暇啜粥惟飲冷酒以致內傷脾胃遍身發出赤斑是時天疱瘡傳染斑與相類醫之者多不能辯遽

然而卒罔覺其咎蓋斑無頭粒瘡有頭粒易分別而不知爾厥後葬毋不得已而與鄰人訟三載始白既而感激乃志於學讀書之餘恒取醫書丹溪心法覽之見其所謂飲食內傷脾胃發出赤斑之論乃喟然悲歎其前病果誤於醫者正程夫子所謂病臥於牀委之庸醫譬之不孝者也終天之恨曷有窮耶由是

心之於醫若口之於芻豢不能釋也竊惟斯道肇自軒岐迄漢而下代不乏賢求其可以爲萬世法者張長沙外感李東垣內傷劉河間熱證朱丹溪雜病數者而已然而丹溪實又貫通乎諸君子尤號集醫道之大成者也先生既沒而其遺書則有丹溪心法傳于世蓋其術至精故其爲言至切寔保命之良規濟

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

人之妙訣也惜乎是書詳於法而猶畧於方袖珍等書則又詳於方而畧於法皆不便檢閱時祥符鄭尚宜張汝孝輩亦達於醫者也以予言爲然予於是乃将心法去訛留正羣方刪繁就簡合爲一書凡五年餘始脫藁不敢他有所名名之曰丹溪心法附餘其間病目分之以門藥方聚之以類每證之下先具心

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

法後附羣方俾法不離乎方方不離乎法又取丹溪本草衍義補遺及崔真人脉訣舉要王節齋明醫雜著附載于中而於醫之藥性脉理病機治法經絡運氣六者粗備其正誤補闕以俟後之君子然初學之士與養生之家或有取焉庶乎得醫道之正而不爲他岐所惑僭妄之罪固知無所逃矣謹序

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

嘉靖十五年丙申春三月

穀旦新安後學方廣序

立書本旨

予觀得醫道之全者丹溪一人發丹溪之蘊者心法一書然其書自程用光重訂之後若無餘憾第附錄不盡削去而與正法紊焉丹溪纂要醫學集成雖能備丹溪群書然因心法混淆而采取亦不免於差謬蓋丹溪群書其門人戴元禮趙以德刘叔淵已采載於丹溪心法之上矣而纂要集成二書又是將丹溪群書翻謄一次今以百年之後追想其人之言何若親炙領教之為的哉予幾微義蒐輯群書條陳潔白為醫書之折衷借乎丹溪心法而不得與焉袖珍方乾坤生意保生餘錄

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

等書雖備群方然其間有一等用藥辛香燥熱與夫瞑眩之劑定非氣血虛者所宜乎因此而留心焉今除玉機微義一書不煩之外謹將丹溪心法除去附錄止以正法正方具于前群書惟取切合病情之劑附于後彙分臚列集為一書名曰丹溪心法附餘將與玉機微義同驅並駕于世而醫之方庶幾乎備矣觀者詳焉

凡例

一病目謹依丹溪心法之舊凡有增入者註新增二字以別之其間以門而分者庶見病機之同也

一各證首具丹溪正法正方依程用光考索精確為醫門萬世之規矩準繩者也

一附諸賢論庶見病之源流治之方法也不能悉載其間有闕者君子宜扵玉機微義求之

一附脉理庶知病之陰陽表裏虛實寒熱之情也亦不能悉載其間有闕者宜扵脉經脉訣求之

一附諸方以輔丹溪所不及其間以類而聚者庶見治

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

法之異也然方書汗牛充棟不勝其多姑取不遠於理者列載于上以待君子采擇焉

一王節齋明醫雜著方論取附于各證之下蓋節齋深得丹溪之旨故備載以俟參考焉

一病證欠發明處藥方有疑難處予綴俗說以通之有廣按二字別之倘有差謬後之君子幸賜教焉

一丹溪本草衍義補遺雖另成一書然陝板蜀板閩板丹溪心法咸載之程用光重訂丹溪心法而徽板乃削去之亦不爲美今仍取載書首使人獲見丹溪用藥之旨也

門類目錄

外感門

中風　傷風　中寒　傷寒　中暑

中濕　瘟疫

內傷門

內傷　傷食　調補脾胃

風門

破傷風　胃風　痛風　痺　癘風

寒門

咳嗽　霍亂

暑門
癨 痢
濕門
瘧 泄瀉
濕熱門
呑酸 疸 水腫 鼓脹 赤白濁
痰門
痰 哮喘 喘 惡心 嘔吐
欬逆 翻胃 嘈雜 關格 癭氣
痰熱門

痓 癇 顛狂 驚悸怔忡 健忘
纒喉風喉痺
火門
火 吐血 咳血 嘔血 咯血
衄血 溺血 下血 腸風臟毒 痔瘡
漏瘡 脫肛 淋 小便不通 小便不禁
夢遺
風熱門
斑疹 頭眩 頭痛 頭風 眼目
耳聾 鼻病 口舌 牙齒

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

燥門
消渴　燥結
鬱門
六鬱　氣滯
寒鬱門
心脾痛　腹痛
火鬱門
脇痛　跌撲損傷　疥瘡　癰疽　疔瘇
諸瘡
濕鬱門
腰痛　疝痛　脚氣
積門
積聚痞塊
虛損門
發熱　惡寒　自汗　盜汗　瘦
厥　勞瘵　補損
婦人門
經病　崩漏　帶下　產前　產後
子嗣　諸病
小兒門

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

小兒諸病　痘瘡

雜治門

倒倉法　吐法　救急諸方　十危病方　備用要方
躰氣　汗癍　烏髭　駐顔　拾遺雜論
醫論　用藥大畧　製方之法　製造藥法　醫畧

賔按先儒曰學者必務知要知要則能守約守約則足以盡博矣至哉言也不獨可施於讀書窮理而已今予於醫道亦然夫醫經所言人有四百四病可謂博矣而丹溪定為病目一百可謂約矣然簡約之中又有樞要存焉何則醫之末流雖繁其本源也不過外感內傷二者而已故今定門類先之以外感內傷然外感又有風寒暑濕致疾之殊故繼之以風寒暑濕內傷又有溫熱痰火為病之異故繼之以溫熱痰火况外感內傷久而不治則成鬱積故鬱積次之鬱積之久而無以解則致虛損故虛損又次之至於婦人小兒有病不同於男子大人者故婦人小兒又其次之可謂博而約且要矣孰謂醫道無統紀也哉

目錄

卷首　甲集
丹溪本草衍義補遺
丹溪十二經見證
丹溪論
河間風熱濕燥寒論
診家樞要
十二經脉歌
卷之一　乙集
外感門上

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

中風　中氣　預防中風　傷風　胃風同治
中寒　傷寒　冒寒　溫熱病
卷之二
外感門下
中暑　暑風　注夏　中濕　濕熱
瘟疫　大頭病　冬溫病　嶺南諸病　運氣證治
卷之三　丙集
內傷門
內傷　傷食　調補脾胃
卷之四
風門
破傷風　胃風　痛風　歷節痛　肩背痛
痺　癘風　血風瘡　身上虛痒　癮疹
卷之五
寒門
咳嗽　肺痿　肺癰　霍亂
卷之六　丁集
暑門
瘧　痢
卷之七

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

濕門
痞　泄瀉
卷之八
濕熱門
吞酸　咳氣　疸　水腫　鼓脹
赤白濁
卷之九
痰門
痰　痰熱　哮喘　喘　惡心
嘔吐　欬逆　翻胃　嘈雜　關格
癭氣　戊集
卷之十
痰熱門
痓　癎　顛狂　驚悸怔忡　健忘
纏喉風喉痺　咽痛　咽瘡
卷之十一
火門
火　風熱　吐血　咳血　嘔血
咯血　衂血　溺血　下血　腸風臟毒
痔瘡　漏瘡　脫肛　淋　小便不通

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

小便不禁　夢遺
卷之十二　己集
風熱門
斑疹　頭眩　頭痛　眉眶痛　頭風
眼目　耳聾　鼻病　口舌　牙齒
卷之十三
燥門
消渴　燥結
卷之十四
鬱門
六鬱　氣滯　氣刺痛　諸氣
卷之十五
寒鬱門
心脾痛　腹痛　腹中窄狹
卷之十六　庚集
火鬱門
脇痛　跌撲損傷　疥瘡　天疱瘡　楊梅瘡
凍瘡　脚上爛瘡　頭面瘡　癰疽
乳癰　瘰癧　諸瘡
卷之十七

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

濕鬱門
腰痛　腎痛　疝痛　水腎偏墜　腎囊濕癢
脚氣　足跟痛　脚轉筋
卷之十八
積門
積聚痞塊
卷之十九　辛集
虛損門
發熱　胸中煩熱　虛熱　虛煩不眠　惡寒
面熱面寒　自汗　盜汗　痿　厥
手足十指麻木　勞瘵　補損　諸虛
卷之二十
婦人門（上）
經病　崩漏　帶下
卷之二十一　壬集
婦人門（下）
產前　產後　子嗣　補虛　斷子法
諸病
卷之二十二
小兒門（上）

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

小兒諸病

卷之二十三
小兒門（下）
痘瘡

卷之二十四
雜治門
倒倉法　吐法　救急諸方　十危病方　備用藥方
躰氣　汗癍　烏髭　駐顏　拾遺雜論
醫論　用藥大畧　製方之法　製造藥法　醫畧
丹溪先生墓表辭　丹溪翁傳

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷首　甲集

本草衍義補遺（凡一百五十三種）

石鍾乳為慓悍之劑經曰石鍾乳之氣悍仁哉言也天生斯民不厭藥則氣之偏可用於暫而不可久夫石藥又偏之意者也自唐時太平日久膏粱之家惑於方士服食致長生之說以石藥躰厚氣厚習以成俗造至宋及今猶未已也斯民何辜受此氣悍之禍而莫知能救哀哉本草讚服有延年之功而柳子厚又從而述美之予不得不深言也○唐本註云不可輕

服多發渴淋

硝屬陽金而有水與火亡善消化驅逐而經言無毒化七十二種石不毒而能之乎以之治病以致其用病退則已若玄明粉者以火煆而成當性温曰長服多服久服且輕身固胎駐顏益壽大能補益豈理也哉予觀見一二朋友不信予言而亡故書此為戒云○仙經以朴硝製伏為玄明粉硝是太陰之精華水之子也陰中有陽之藥也

曰滑石屬金而有土與水無甘草以和之勿用燥濕分水道實大府化食毒行積滯逐凝血解燥渴補脾胃降妄火之要藥也○凡使有多般勿悞使有黃滑石綠滑石烏滑石冷滑石皆不入藥又青黑色者勿用殺人惟白滑石似方解石色白於石上畫有白膩文者佳

鉛丹屬金而有土與水火丹出於鉛而曰無毒又曰凉予觀竊有疑焉曾見中年一婦人因多子於月内服鉛丹二兩四肢冰冷強直食不入口時正仲冬急服理中湯加附子數帖而安謂之凉而無毒可乎○鉛丹本謂之黃丹化鉛而成別有法唐本註炒錫作然經稱鉛丹則炒錫之說誤矣亦不為難辨盖錫則色

瞧暗鉛則明白以此為異爾

漿水味甘酸而性凉善走化滯物解消煩渴○宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理臟腑婦人懷姙不可食之食譜所忌也

自然銅世以為接骨之藥然此等方儘多大抵骨折在補氣補血補胃俗工惟在速効以罔利迎合病人之意而銅非煆不可用若新出火者其火毒金毒相扇挾香熱藥毒雖有接骨之功燥散之禍甚於刀劍戒之○石髓鉛即自然銅也凡使勿用方金牙其方金牙真似石髓鉛若誤餌吐煞人

二朮本草不分蒼白議論甚多四家本草言之詳矣○如古方平胃散蒼朮為最要之藥衍義為氣味辛烈發汗尤速其白朮味亦微辛苦而不烈除濕之功為勝又有汗則止無汗則發與黃芪同功味亦有辛能消虛痰

蓀無劍脊如韭葉者是菖蒲有脊一如劍刃而絕無韭葉之細未知孰是

山藥屬土而有金與水火補陽氣生者能消腫硬經曰虛之所在邪必湊之而不去其病為實非腫硬之謂乎故補血氣則留滯自不容不行○山藥即薯蕷也

本草不言山藥言薯蕷者盖上一字犯今英廟諱下一字曰蕷唐代宗名預故改下一字為藥如此則盡失當日之本名恐以山藥為別物故書之又乾之意者盖生溼則滑不可入藥熟則只堪啗亦滞氣也

鞠花屬金而有土與水火能補陰須味甘者若山野苦者勿用大傷胃氣○一種青莖而大作蒿艾氣味苦不堪啖者名苦薏丹溪所言苦者勿用語曰苦如薏是也惟單葉花小而黄味甘應候開者佳月令菊有黄花者也

甘草味甘大緩諸火黄中通理厚德載物之君子也下焦藥少用恐大緩不能直達此草能為衆藥之王經方少不用者故號國老之名國老即帝師之稱也為君所宗是以能安和草石解百藥毒

人參入手太陰而能補陰火與藜蘆相反若服一兩參入蘆一錢其一兩參虛費矣戒之○海藏云用時須去蘆頭不去令人吐蕭炳云人參和細辛密封經年不壞

薏苡仁寒則筋急熱則筋縮急因於堅強縮因於短促若受溼則弛弛因於寛而長然寒與溼未嘗不挾熱

三者皆因於湿熱外湿非內湿有以啓之不能成病故湿之病因酒麪為多而魚與肉繼以成之者甘滑陳久燒炙辛香乾硬皆致湿之因宜戒哉○丹溪先生詳矣又若素問言因寒則筋急不可更用此也凡用之須倍於他藥此物力勢和緩須倍用即見効蓋受寒使人筋急受熱使人筋攣若但熱而不曾受寒亦能使人筋緩受湿則又引長無力也

菟絲子未嘗與茯苓相共種類分明不相干涉女蘿附松而生遂成訛而言也○本草云續絕傷補不足強陰堅骨主莖中寒精自出溺有餘瀝鬼交泄精

肉蓯蓉屬土而有水與火峻補精血驟用反致動大便滑河西自從混一之后人方知其真形何曾有所謂鱗甲者○以酒洗淨去黑汁作羹黑汁既去氣味皆盡然嫩者方可作羹老者苦入藥少則不効

防風黃芪人之口通乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故鼻不受有形而受無形為多地主濁故口受有形而兼乎無形王太后病風不言而脉沉其事急若以有形之湯藥緩不及事今投以二物湯氣薰蒸如霧滿室則口鼻俱受非智者通神不可迴也

藍屬水而有木能使散敗血分歸經絡

决明子能解蛇毒〇貼腦止鼻洪作枕勝黒豆治頭痛明目也

芎多服致氣暴亡以其味辛性温也辛甘發散之過歟局方以沉麝檀腦丁桂諸香作湯較之芎散之禍孰為優劣試思之〇若單服既久則走散真氣既使他藥佐使又不可久服中病便已則烏能至此也春秋註云麥麴鞠窮所以禦濕詳見楚子伐蕭

五味子屬水而有木與金今謂五味實所未曉以其大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非除熱乎補腎非暖水藏乎食之多致虛熱蓋收補之驟也何惑之有又云火熱嗽必用之〇爾雅云菋一名荎藸又五味皮肉甘酸核中苦都有鹹味此五味具也

栝蔞實屬土而有水本草言治胸痺以味甘性潤甘能補肺潤能降氣胸有痰者以肺受逼失降下之令今得甘緩潤下之助則痰自降宜其為治嗽之要藥也又云洗滌胸膈中垢膩治消渴之細藥也〇雷公云栝蔞凡使皮子莖根効各別其栝并蔞樣全別若栝自圓黃皮厚蔕小苦其蔞唯形長赤皮蔕麄是陰人服其實詩所謂果蓏之實亦謂此也根亦名白藥其莖葉療中熱傷暑最効

苦參屬水而有火能峻補陰氣或得之而致腰重者以其氣降而不升也升傷腎之謂治大風有功況風熱細疹乎

鬱金本草無香屬火屬土與水性輕揚能致達酒氣於高遠也正如龍涎無香能散達諸香之氣耳因輕揚之性古人用以治鬱遏不能散者恐命名因於此始○周禮人凡祭祀之祼用鬱鬯又說文曰芳草也合釀之以降神

肉荳蔻屬金與屬土温中補脾為丸日華子稱其下氣以其脾得補而善運化氣自下也非若陳皮香附之駃泄衍義不詳其實謾亦因之遂以為不可多服○云多服則泄氣得中則和平其氣

大黃屬水屬火苦寒而善泄仲景用之以心氣不足而吐衄者名曰瀉心湯正是因少陰經不足本經之陽亢甚無輔著以致血妄行飛越故用大黃泄去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故芩救肺連救肝故肺者陰之主肝者心之母血之舍也肝肺之火既退宜其陰血復其舊衍義不明說而曰邪熱因不足而客之何以明仲景之意開後人之盲瞶也

葶藶屬火屬木性急善逐水病人稍涉虛者宜遠之且殺人甚捷何必久服而后致虛也○葶藶有甜苦兩等其形則一經既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治躰皆以行水走泄為用故不可久服

附子衍義論五等同一物以形像命名而為用至哉斯言猶有未善仲景八味丸附子為少陰之向導其補自是地黃後世因以附子為補誤矣附子走而不守取健悍走下之性以行地黃之滯可致遠亦若烏頭天雄皆氣壯形偉可為下部藥之佐無人表其害人之禍相習用為治風之藥殺人多矣治寒治風有必用者予每以童便煑而浸之以殺其毒且可助下行之力入鹽尤捷○又墮胎為百藥之長慎之

半夏屬金屬土仲景用於小柴胡湯取其補陽明也豈非燥脾土之功○半夏今人惟知去痰不言益脾蓋能分水故也○又諸血證禁服仲景傷寒渴者去之半夏燥津液故也又姙婦姜炒用之

常山屬金而有火與水性暴悍善驅逐能傷其真氣切不可偎過　也病人稍近虛怯勿可用也惟雷公云老人與久病切忌之而不明言其害外臺秘要乃用三兩作一服煎頓服以治瘧子恐世人因秘要之言

而不知雷公之意云○常山蜀漆根也

羊蹄草屬水走血分葉似蕒甘而不苦多食亦令人大腑泄滑亦取為菜○羊蹄經不言根圖經加根字今人生採根用摩塗癬疥立效俗呼為秃菜又詩云言採其蓄正謂此草

苧屬水而有土與金大補肺金而行滞血方藥似未曾用故表而出之或悪其賤○其根善能安胎又汁療渴甚驗

牽牛屬火善走有兩種黑者屬水白者屬金若非病形與証俱實者勿用也稍涉虛以其驅逐之致虛先哲深戒之不脹滿不大便秘者勿用

萆麻屬陰能出有形質之滞物故取胎產胞衣剩骨膠血者用之其葉治脚風腫○又油塗葉炙熱熨顖上止鼻衄効

荔子肉屬陽主散無形質之滞氣故消瘤贅赤腫者用之苟不明者則措用之而不應

燈心屬土火燒為灰取少許吹喉中治急喉痺甚捷○小兒夜啼亦用燈心燒灰塗乳上與喫

威靈仙屬木治痛之要藥量病稍涉虛者禁用採得流水聲響者知其性好走也採不聞水聲者佳○痛用

在上者服之此藥去衆風通十二經脉朝服暮効行
義治腸風根性快多服疏人五臟真氣

五倍子屬金與水噙口中善收頑痰有功且觧諸熱病
○口瘡以末摻之便可飲食即文蛤也其内多虫又
名百虫倉

金櫻子屬土而有金與水經絡隨道以通暢為和平昧
者取澁性為快遂熬為煎食之自不作靖咎將諸執
○沈存中云止遺泄取其温且澁須十月熟時採不
爾復令人利

萱草屬木性下走陰分一名宜男寧無微意存焉○俗
謂之鹿葱又嵇康養生論云合歡蠲怒萱草忘憂

茯苓得松之餘氣而成屬金仲景利小便多用之此暴
新病之要藥也若陰虛者恐未為相宜○其上有兎
絲下有茯苓之說甚為輕信又宋王微茯苓讃皓苓
下居彤紛上薈中狀鷄鳧具容龜蔡神侔少司保延
幼艾終志不移柔紅可佩

琥珀屬陽今古方用為利小便以燥脾土有功脾能運
化肺氣下降故小便可通若血少不利者反致其燥
急之苦○茯苓琥珀二物皆自松出而所禀各異茯
苓生成於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆治榮

而安心利水也云

松屬陽金用其節炒焦治筋骨間病能燥血中之溫也花多食能發上焦熱病○其花上黃粉名松黃拂取似蒲黃酒服輕身療病又樹皮綠衣名艾蒳合和諸香燒之其煙團聚青白可愛

柏屬陰與金性善守故採其葉隨月建方以取得月令之氣也此補陰之要藥其性多燥久得之大益脾土以滋其肺其柏子仁出乾州者佳

桂虛能補此大法也仲景救表用桂枝非表有虛以桂補之衛有風寒故病自汗以桂枝發其邪衛和則表密汗自止非桂枝能收汗而治之今衍義乃謂仲景治表虛誤矣本草止言出汗正內經辛甘發散之義後人用桂止汗失經旨矣曰官桂者桂多品取其品之高者可以充用而名之貴之之辭也曰桂心者皮之肉厚去其麁厚而無味者止留近其木一層而味辛甘者故名之曰心美之之辭也何必寘疑著此○桂固知三種之桂不取菌桂牡桂者蓋此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂經言甘辛大熱正合素問辛甘發散為陽之說又別說云以菌桂養精神以牡桂利關節又有一種柳桂乃桂之嫩

小枝條也尤宜入治上焦藥用也

楓香屬金而有水與火性疎通故木易有虫穴其液名曰白膠香為外科家要藥近世不知誤以松脂之清瑩者甚失本經初意也○楓樹上菌食之令人笑不止以地漿解之

竹瀝本草大寒泛觀其意以與石膏芩連等同類而諸方治產後胎前諸病及金瘡口噤與血虛自汗消渴尿多皆陰虛之病無不用縮手待盡哀哉內經曰陰虛發熱大寒而能補正與病對薑薤寒而能補世或用之惟竹瀝因大寒實疑是猶因盜嫂受金而棄陳平之國士也竹瀝味甘性緩能除陰虛之有大熱者大寒者言其功也非以氣言幸相與可否若曰不然世人喫筍自幼至老者可無一人因筍寒而有病瀝即筍之液也況假於火而成者何寒如此之甚

合歡屬土而有水與金補陰之有捷功也長肌肉續筋骨槩可見矣而外科家未曾錄用何也○又名夜合人家多植庭除間蠲人之忿

凌霄花治血中痛之要藥也且補陰捷甚蓋有守而獨行婦人方中多用何哉○云紫葳即凌霄花也善治酒齄熱毒甚良

龍腦屬火世知其寒而通利然未達其暖而輕浮飛揚局方但喜其香而貴細動輙與麝同用為桂附之助人身陽易於動陰易於虧幸思之

墨屬金而有火入藥甚助補性○墨當松煙為之者入藥能止血及産後血運崩中卒下血醋摩服之又主眯目物芒入目摩點瞳子又鄜延界內有石油燃之煙甚濃其煤可為墨黑光如漆松煙不及其識文曰延川石液者是不可入藥當附于此

秦椒屬火而有水與金有下達之能所以其子名椒目者正行滲不行穀道世人服椒者無不被其毒以其久久則火自水中起誰能禦之能下水腫温○凡使以蜀椒為佳子謂椒目治盗汗尤效又能行水

杉材屬陽金而有火用節作湯洗脚氣腫言用屑者似乎相近○又云削作楂煑洗漆瘡無不差

榧實屬土與金非火不可多啖則熱矣肺家果也引火入肺則大腸受傷識者宜詳○其子治寸白虫又五痔人常如果食之愈過多則滑腸

訶子下氣以其味苦而性急喜降經曰肺苦急急食苦以瀉之謂降而下走也氣實者宜之若氣虛者似難輕服○訶子即訶梨勒也六路黑色肉厚者良此物

雖澁腸又泄氣蓋其味苦澁又其子未熟時風飄墮者謂之隨風子尤珍貴小者益佳治痰嗽咽喉不利含三五枚殊勝又云治肺氣因火傷極遂鬱遏脹滿蓋其味酸苦有收歛降火之功也

胡椒屬火而有金性燥食之快膈喜食者大傷脾胃肺氣積久而大氣則傷凡痛氣痰大其禍也○一云向陰者澄茄向陽者胡椒也

椰子屬土而有水生海外極熱之地土人賴此解夏月暍渴天之生物蓋可見矣○多食動氣也

髮補陰之功甚捷○此即亂髮也燒灰研末調方寸匕治鼻衄欲死者立効更以末吹鼻中甚驗

人尿嘗見一老婦年逾八十貌似四十詢之有惡病人教之服人尿此婦服之四十餘年且老健無他病而何謂性寒不宜多服歟降火最速○人尿須童男者良又產後即溫飲一盃厭下敗血惡物不致他病也又熱勞方中亦用之

犀角屬陽性走散以諸角尤甚痘瘡後用此散餘毒俗以為常若不有餘毒而血虛者或以燥熱發者用之禍至人故不知○凡用須烏色未經湯水浸煑入藥已經浸煑不入藥用麄取茸犀取尖其精鋭之力盡

在是矣湯散用則屑之為末取屑一紙裹於懷中良久合諸色藥物絕為易搗

羚羊角屬木入厥陰經為捷紫雪方中用之近理○羚羊角今昔取有掛痕者陳藏器云取其耳聽之集集鳴者良亦強出此說未嘗遍試也今將他角附耳皆集集有聲不如掛痕一說盡矣然多偽之不可不察也

大世俗言虛損之病言陽虛而易治殊不知人身之虛悉是陰虛若果虛損其死甚易斂者亦難措手夫病在可治者皆陰虛也衍義書此方於大條下以為習俗所移之法惜哉○大[illegible]多食恐致消渴不與蒜同食必頻損人

鷄風之為病西北氣寒為風所中人者誠有之矣東南氣溫而地多濕有風病者非風也皆溫生痰痰生熱熱生風也經曰亢則害承乃制河間曰土極似木數千年得經意河間一人耳衍義云鷄動風者習俗所移也鷄屬土而有金與木火性補故助溫中之火病邪得之為有助而病劇非鷄而已與夫魚肉之類皆能助病者也衍義不暇及也又云鷄屬巽助肝火

鯽魚諸魚皆屬火惟鯽魚屬土故能入陽明而有調胃

實腸之功若得之多者未嘗不起火也戒之○文云諸魚之性無德之倫故能動火○鯽魚合蓴作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢

白殭蚕屬火而有土屬火與木得金氣殭而不化治喉痺者取其火中清化之氣從以治相火散濁逆結滯之痰耳○殭蚕然蚕有兩三番惟頭番蚕白色而條直者為佳其蚕蛾則第二番者以其敏於生育四月取自死者勿令中温中温有毒不可用

蝦蟇屬土與水味甘性寒南人多食之本草明言可食不患熱病由是病人喜食之矣本草之義盖是或炙或乾或燒或灰和在藥劑用之非若世人煑為羹入塩椒而啜其湯此物湿化火能發湿久則湿以化熱此土氣厚自然有火也衍義謂解勞熱之謂也非羹之謂也戒之○五月五日取東行者良又取眉間有白汁謂之蟾酥以油單裹眉裂之酥出單上收之入藥又人患齒縫中血出以紙紝子蘸乾蟾酥少許於血出處按之立止

蚯蚓屬土而有水與木性寒大解諸熱毒行湿病○凡使白頸自死者良然亦應候而鳴此物有毒人被其毒以塩水浸咬處又以塩湯飲之立差若治腎臟風

下產病不可闕也仍須塩湯送　王荆公所謂多壞大牢俱有味可能蚯蚓獨清廉者也

烏刀與蛤蚌螄蜆大同小異屬金而有水木土衍義言其冷而不言温多食發疾以其温中有火久則氣上升而下降因生痰痰生熱熱生風矣何冷之有

葡萄屬土而有水與木火東南食之多病熱西北食之無恙蓋性能下走滲道西北氣厚人之禀厚耳○俗呼其苗為木通逐水利小腸為佳昔魏玄帝詔群臣說葡萄云醉酒宿醒掩露而食甘而不飴酸而不酢冷而不寒味長汁多除煩解悁他方之果寧有匹之

杏仁屬土而有水與火能墜亦須細研用之其性熱因寒者可用○其實不可多食能傷筋骨

棗屬土而有火味甘性緩經曰甘先入脾衍義乃言益脾脾土也經言補脾未嘗用甘今得此味多者惟脾受病習俗移人衍義亦或不免○小兒患秋痢與蟲食之良

櫻桃屬火而有土性大熱而發濕本草調中益脾日華子言令人吐衍義發明其熱能致小兒之病舊有熱病與嗽喘得之立病且有死者矣○司馬相如賦云山朱櫻即櫻桃也又禮記謂之含桃可薦宗廟又王

維詩云絲是蠶園春薦後非干御苑鳥嘴殘

橘柚屬木而有土與水草於條下敘功用至五十餘字皆言橘皮之能非橘柚之謂也橘柚并言蓋有説者而名橘之大者曰柚則厚於橘衍義以柚為橘有無窮之患何至是之甚耶○其橘核炒去殼為末酒調服治腎疰腰痛膀胱氣痛甚良

柿屬金而有土為陰有收之義焉止血治嗽亦可為助○此物能除腹中宿血又乾餅治小兒痢尤佳

石蜜甘喜入脾其多之害必生於脾而西北人得之有益東南人得之未有不病者亦氣之厚薄不同耳雖然東南地下多溼宜乎其得之為害也西北地高多燥宜乎其得之為益也○石蜜今謂之乳糖也川浙最佳用牛乳汁沙糖相和煎之並作餅堅重○本草云石蜜除衆病和百藥

糖多食能生胃中之火此損齒之因也非土製水乃溫土生火熱也食棗多者齒病齲亦此意也

烏芋即經中鳧茨以其鳧喜食之茨草之別名故俗為之葧臍語訛耳○有二等皮厚色黑肉硬白者謂猪葧臍皮薄澤色淡紫肉軟者謂羊葧臍並下石淋効

胡桃屬土而有火性熱本草言其平是無熱也下文云

能脫人眉動風非熱何傷肺乎○衍義云過〻久至不
堪食又其肉煮漿粥下石淋良

茄屬土故甘而喜降火府者也易種者忌之食之拆者
燒灰治乳○本草言味甘寒久冷人不可多食損人
動氣發瘡及痼疾又根煮湯淋洗脚瘡其効拆蒂燒
灰以治口瘡皆甘以緩火之急

石榴味酸病人須戒之性滯其汁恋膈成痰榴者留也
○多食損肺其酸皮止下痢其東行根治蚘虫寸白
又其花白葉者主心熱吐血及衂血等乾之為末吹
鼻中立差

梨味甘濁者宜之梨者利也流利下行之謂也食療謂
産婦金瘡人忌之血虚戒之○衍義謂多食動脾惟
病酒煩渴人食之佳

橄欖味澁而生甘醉飽宜之然其性熱多食能致上壅
解魚毒○日華子云開胃下氣止瀉

冬瓜性走而急久病與陰虚者忌之衍義取其分散熱
毒氣有取於走而性急也○九月勿食俟被霜食之
不爾令人成反胃病又差五淋

苦丁香性急損胃氣吐藥不為不多胃弱者勿用設有
當吐之証以他藥他之可也病後産後宜深戒之仲

景有云諸亡血諸虛家不可與瓜蒂○花主心痛咳逆

莧本草分六種而馬齒在其數馬齒自是一種餘莧皆人所種者下血而又入血分且善走紅莧與馬齒同服下胎妙臨產時煮食易產○本草云利大小便然性寒滑故也又其節葉間有水銀

萊菔根屬土而有金與水本草言下氣速往往見者食之多者停滯膈成溢飲病以其甘多而辛少也其子推墻倒壁之功○俗呼為蘿蔔亦治肺痿吐血又其子水研服吐風痰甚驗衍義曰散氣用生薑下氣用萊菔

韭研取其汁冷飲細呷之可下膈中瘀血甚效以其屬金而有水與土且性急○韭能充肝氣又多食則昏神其子止精滑甚良又未出糞土為韭黄最不宜食之滯氣蓋含噎鬱未升之氣故如是孔子曰不時不食正謂此也又花食之動風戒之

香薷屬金與水而有徹上徹下之功治水甚捷肺得之則清化行而熱自下又云大葉香薷治傷暑利小便濃煎汁成膏為丸服之以治水脹病效○本草言治霍亂不可缺也

大蒜性熱喜散善化肉故人喜食屬火多用於暑月其傷脾傷氣之禍積久自見化肉之功不足言也有志養生者宜自知之〇久食傷肝氣損目令人面無顏色

香油須炒芝麻乃可取之人食之美且不致病若又煎煉食之與火無異戒之

飴屬土成於火大發濕中之熱衍義云動脾風是言其末而遺其本也〇此即飴糖乃云膠飴乃是濕糖用米麥而為即餳也

大麥初熟時人多炒而食之此等有火能生熱病人故不知〇大麥水浸之生芽為蘖化宿食破冷氣去心腹脹滿又云蘖微暖久食消腎不可多食戒之

粟屬水與土陳者難化衍義云生者難化熟者滯氣隔食生蟲〇所謂補腎者以其味鹹之故也

酒本草止言其熱而有毒不言其濕中發熱近於相火大醉後振寒戰慄者可見矣又云酒性善升氣必隨之痰鬱於上溺澁於下肺受賊邪金體大燥恐飲寒凉其熱內鬱肺氣得熱必大傷耗其始也病淺或嘔吐或自汗或疼痒或鼻齄或自泄或心脾痛尚可散而出也病深或消渴為內疸為肺痿為內痔為鼓脹

為失明為哮喘為勞嗽為癲癇為難明之病、非具眼未易處治可不謹乎○陶云大寒凝海惟酒不冰大熱明矣方藥所用行藥勢故也

醋酸舉世以之調和儘可適口若魚肉其致病以漸人故不知酸收也人能遠之○醋亦謂之醯俗呼為苦酒即米醋也可入藥能消癰腫散水氣

麵熱而麩凉飢年用以代穀須晒麥令燥以少水潤之舂去皮煑以為飯食之無麩熱之後患○治暴淋煎小麥湯飲之

漆屬金而有水與火性急能飛補用為去積滯之藥若有之中病積去後補性內行人不知也○生漆去長虫又漆葉見華佗傳同青粘服之去三尸虫利五臟輕身益氣使人頭不白彭城樊阿從之年五百餘歲

桑寄生藥之要品也自圖經以下失之而醫人不諳其的憒哉以於近海州邑及海外其地暖其地不蚕由是桑木得氣厚生意濃而無採捋之苦但葉上自然生出且所生處皆是光燥皮膚之上何曾有所為節間可容化樹子也此說得之於海南北道憲僉老的公云○衍義云似難得真者若得真桑寄生下咽必驗如神向承之吳山有求藥於諸邑乃遍令人搜摘

卒不得遂以實告甚不樂蓋不敢以偽藥罔人鄉邑有人偽以他木寄生送之服之逾月而死哀哉

丁香屬火而有金補瀉能走口居上地氣出焉肺行清令與脾氣相和惟有閏而甘芳自適焉有所謂口氣病者令口氣有而已自嫌之以其脾有鬱火溢入肺中失其清和甘美之意而濁氣上干此口氣病也以丁香含之揚湯止沸耳惟香薷治之甚捷故録之〇如釘長三四分紫色中有麄大如茱萸者俗呼為母丁香可入心腹之藥爾以舊本丁香根註中有不入心腹之用六字恐其根必是有毒故云不入心腹也

楝皮屬金而有水與火走手厥陰而有瀉火為補陰之功配細辛治口瘡有奇功

厚朴屬土而有火氣藥之温而能散瀉胃中之實也而平胃散用之佐以蒼朮正為上焦之温平胃土不使之大過而復其平以致於和而已非謂温補脾胃習以成俗皆為之補哀哉又云厚朴能治腹脹因其味辛以提其氣

桔梗能開提氣血氣藥中宜用之〇桔梗能載諸藥不能下沉為舟楫之劑耳

乾薑散肺氣與五味子同用治嗽見火則止而不移治

血虛發熱該與補陰藥同用入肺中利肺氣ノ腎中燥下溫入氣分引血藥入血也象云治沉寒痼冷腎中無陽脉氣欲絕黑附子為引用又云發散寒邪如多用則耗散元氣辛以散之是壯火食氣故也見火候故止而不移所以能治裏寒非若附子行而不正也凡止血須炒令黑用之生尤良主胷滿溫脾燥胃取以理中其實主氣而泄脾又人言乾薑補脾今言泄脾而不言補者何也東垣謂泄之一字非泄脾之正氣是泄脾中寒濕之邪故以薑辛熱之劑燥之故曰泄脾也

縮砂安胎止痛行氣故也○日華子云治一切氣霍亂

心腹痛又云止休息痢其名縮砂蜜也

香附子必用童便浸凡血氣藥必用之引至氣分而生血此陽生陰長之義也○即莎草根也一名雀頭香大能下氣除胷腹中熱又云長鬚眉

麥蘗行上焦之滯血腹中鳴者用之○化宿食破冷氣良（並見前大麥條）

神麯性溫入胃麩皮麪性凉入大腸俱消食積ノ紅麯活血消食○健脾暖胃赤白痢下水穀陳久者良

紅藍花破留血養血多用則破血少用則養血ノ本草

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

云產後血暈口噤腹内悪血胎死腹中並酒〻炎服又其子吞數顆主天行瘡子不出又其臙脂治小兒聤耳滴耳中妙

蒼朮治上中下濕疾皆可用之〇一名山精經曰必欲長生可服山精結陰陽之精氣故也（又見前）

白芍藥酒浸炒與白朮同用則能補脾與川芎同用則瀉肝與人參白朮同用則補氣治腹中痛而下痢者必炒後重不炒又云白芍惟治血虛腹痛諸腹痛皆不可治〇芍藥白補赤瀉又云赤者利小便下氣白者止痛散血又云血虛寒人禁此一物古人有言曰減芍藥以避中寒誠不可忽

木香行肝經氣火煨用可實大腸〇木香專泄胷腹間滯寒冷氣多則次之其崑崙青木香尤行氣又土青木香不入藥

梔子屈曲下行降火又能治塊中之火〇本草云去熱毒風利五淋通小便又云梔子雖寒無毒治胃中熱氣既亡血亡津液腑臟無潤養内生虛熱非此物不可去之

黄芩安胎者乃上中二焦藥降火下行也縮砂安胎者治痛行氣也若血虛而胎不安者阿膠主之〇治痰熱

者假此以降其火也○堅實者名子芩為勝破者名宿芩其腹中皆爛名腐腸可入肺經也其堅實條芩入大腸除熱也

黃連以姜汁炒辛散衝熱有功○日華子云治五勞七傷止心腹痛驚悸煩燥天行熱疾及目痛又宋王微云黃連味苦左右相因斷凉滌暑闡命輕身縉雲昔御飛毋上旻不行而至吾聞其人又梁江淹云黃連上草丹砂之次御孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以宜順道則利

枳實瀉痰能衝墻倒壁滑竅瀉氣之藥○枳實枳殼一物也小則其性酷而速大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實此其意也皆取其疎通決泄破結實之義

皂角刺治癰疽已潰能引至潰處甚驗○神仙傳云崔言者職隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏咫尺不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚瘡癬皆為惡疾勢不可救一道流不言名授其方曰皂角刺一二斤為久蒸久曬研為末食上濃煎大黃湯調一錢匕服一旬鬚髮再生而愈又鉄碪以煅金銀雖百十年不壞以搥皂角則一夕破碎

射干屬金而有木與火水行太陰厥陰之積痰使結核自消甚捷又治便毒此足厥陰溫氣因疲勞而發取射干三寸與生薑同煎食前服利三兩行効又治喉痛切一片噙之効紫花者是紅花者非○此即烏翣根為射干葉為烏翣又為扇又名草薑外臺云治喉痺甚捷

巴豆去胃中寒積無寒積者勿用

天南星欲其下行以黃栢引之○天南星今市人多以由跋小者似天南星但南星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾

石膏嘗觀藥命名固有不可曉者中間亦多有意義學者不可不察如以色而名者大黃紅花白前青黛烏梅之類是也以氣而名者木香沉香檀香麝香南香之類是也以質而名者厚朴乾薑茯苓生地黃之類是也以味而名者甘草苦參龍膽草淡竹葉苦酒之類是也以能而名者百合當歸升麻防風硝石之類是也石膏火煅細研醋調封丹爐其固密甚於石脂苟非有膏焉能為用此兼質兼能而得名正與石脂同意闕孝忠妄以方解石為石膏況石膏甘辛本陽明經藥陽明主肌肉其甘也能緩脾益氣止渴去火

其辛也能解肌出汗上行至頭又入手太陰〻少陽彼方解石止有軆重質堅性寒而已求其所謂石膏而可為三經之主者焉在哉醫欲責効不其難乎又云軟石膏可研為末醋研丸如菉豆大以瀉胃火痰大食積殊驗○生錢塘者如棋子白澈最佳彭城者亦好又有一種玉火石醫人常用之云味甘微辛溫治傷寒發汗止頭痛目昏眩功與石膏等故附之

白粉胡粉另是一種乃是錫粉非鉛粉也蓋古人以錫為粉故名胡粉不可入藥惟婦人用以附面喜其色類肌肉也又名鑞子粉即是錫也

鱉甲鱉肉補陰○鱉左傳云三足者為之能撥〻癸不可食凡使須九肋者佳藥性云治勞瘦除骨熱釅醋炙黃用又治心腹癥瘕堅積尤効

牛膝能引諸藥下行凡用下牛膝春夏用葉秋冬用根惟葉汁之効尤速○本草云男子陰消老人失溺及寒濕痿痺腰腿之疾不可缺也又竹木刺入肉塗之即出

茺蔚子即益母草產前產後諸疾行血養血難產作膏服○此草即益母也其苗擣取汁服主浮腫下水其子入緊面藥令人光澤又毛詩云中谷有蓷〻益母也

又云臭穢臭穢即莞蔚也

牛蒡子一名悪実絜古云主風腫毒利咽膈吞一粒可出癰疽頭主治秘訣云辛温潤肺散氣擣碎用之東垣云味辛平甘温主明目補中及皮膚風通十二經○其本去蔓時又為之鼠粘子根謂之牛菜作菜茹亦益人

鎖陽味甘可啖煑粥弥佳補陰氣治虗而大便燥結者用虗而大便不燥結者勿用亦可代蓯蓉也

水萍浮芹發汗尤甚麻黄○此是水中大萍非今溝渠所生者昔楚王渡江所得非斯实也又高供奉採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選甚癱風與緩風些小微風都不算豆淋酒内下三丸鐵幞頭上也出汗

青黛能收五臟之鬱火解熱毒瀉肝消食積○青黛殺悪虫物化為水又宮氣方小兒斑瘡羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病変成疳不問強羸女與男恰似春傍多変動還如瘦變困躭々又歌曰煩熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢癱腹中時々更下痢青黄赤白一般々眼澁面黄鼻孔赤穀道開張不欲看忽然瀉下成疳淀又却濃漿一團々唇焦嘔逆不乳哺壯熱增寒臥

不安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此、乃便是

青黛散孩兒百病服來看

馬鞭草治金瘡行血治血○通婦人月經及血氣肚痛効

木賊用發汗至易去節剉以水潤濕火上烘用○本草不言發汗至易傳寫之誤也又云味甘微苦無毒治目疾退翳膜益肝膽婦人月水不斷得禹餘糧當歸芎藭治崩中赤白得槐鵝桑耳腸風下血服之効

夏枯草無臭味治瘰癧臭草有臭味方作紫而藥即茺蔚是也　兩物俱生於春但夏枯草先枯而無子蔚臭草後枯而結黑子又云有補養血脉之功三月四月開花五月夏至時候復枯蓋稟純陽之氣得陰氣則枯也○本草云散癭結氣脚腫濕痺

燈籠草寒治熱痰嗽佛耳治寒嗽

蘭葉稟金水之清氣而似有火人知其花香之貴而不知為用有方蓋其葉能散久積陳鬱之氣甚有力入藥煎煑用之東垣方中常用矣東垣云味甘性寒其氣清香生津止渴益氣潤肌肉經云消諸痺治之以蘭是也消渴疳非此不能凉膽痺必用○即今之人栽植座右花開時滿室尽香

蒲公草又名蒲公英僞土開黃花似菊花化熱毒消惡腫結核有奇功在處田間路側有之三月開黃花味甘解食毒散滯氣可入陽明太陰經洗淨細剉同忍冬藤煎濃湯入少酒佐之以治乳癰服罷隨手欲睡是其功也睡覺病已安矣○麥熟有之質其脃有白汁四時常花〻罷飛絮〻中有子落處即生即今之地丁也治丁腫有奇功故書之

樗木皮臭椿根其性涼而能澁血○樗木臭踈椿木香实其樗用根葉莢故曰未見椿〻有莢惟樗木上有莢以此為異又有樗雞故知命名不言椿雞而言樗雞者以顯有雞者為樗無雞者為椿其義明矣

山査子消食行結氣健胃催瘡痛治婦人兒枕痛濃煎此藥汁入沙糖調服立効

杜仲潔古云性溫味辛甘氣味俱薄沉而降陽也其用壯筋骨及弱無力以行東垣云杜仲能使筋骨強○石思仙治腎冷暨腰痛患腰病人虛而身強直風也脚不利加而用之

漏蘆東垣云是足陽明本經藥○大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽通小腸治泄精尿血乳癰及下乳汁俗名莢蒿是也

薑黃東垣云味苦甘辛大寒無毒治癥瘕血塊、癰腫通月經消腫毒○姜黃真者是經種三年已上老姜迯其主治功力烈於鬱金又治氣為最

御米殼潔古云味酸澁主收固氣東垣云入腎治骨病尤佳○今人虛勞嗽者多用止嗽及濕熱泄痢者用止痢治病之功雖急殺人如劍深可戒之

烏桕木解蛇毒

鹵鹹一名鹵鹹或作鹼鹼去濕熱消痰磨積塊洗滌垢膩量虛實用之若過服則頓損人又云石鹼阿魏皆消磨積塊

繰糸湯口乾消渴者可用此止之此物屬火有陰之用能瀉膀胱水中相火以引清氣上朝於口按究原方治消渴以此湯飲之或以繭殼絲綿湯飲之効

麻沸湯成無已云瀉心湯以麻沸湯漬服者取其氣薄而泄虛熱也

潦水成無已赤小豆湯用潦水者亦取其水味薄則不助濕氣

白馬脛骨煅過再研用味甘寒可代黄芩黄連中氣不足者用之○其白馬莖味鹹能主男子陰痿房中術偏用又陰乾者末和蓯蓉蜜丸空心酒下四十丸

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

羊肉羊脛骨治牙齒疎豁須用之東垣云别録、羊肉味甘熱日華子治腦風并大風開胃肥健補中益氣又羊頭凉治骨蒸腦熱凡治目疾以青羊肝為佳

敗龜板屬金而有水陰中陽也大有補陰之功而本草不言惜哉其補陰之功力猛而兼去瘀血續筋骨治勞倦其能補陰者蓋龜乃陰中至陰之物禀北方之氣而生故能補陰治陰血不足止血治四肢無力酥酒猪脂皆可炙用○龜以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

天雄潔古云非天雄不補上焦之陽虚

蛤粉治痰氣能降能消能軟能燥同香附末姜汁調服以治痛以蛤蜊殻火煆過研為粉不入煎剤

鱓魚善補氣○本草云補中益血又婦人産前有疾可食

五靈脂能行血止血○此即寒號虫糞也本草云治心腹冷氣婦人心痛血氣刺痛甚効又止血行經血有功不能生血

人中白能瀉肝火散陰火該置於風露下三年者始可用也

人中黄性凉治温病日華子有方

新增補四十三種

防己氣寒苦辛陽中之陰治腰以下至足濕熱腫盛補膀胱去留熱通行十二經及治中風手脚攣急本草云漢防己君木防己使如陶所註即是木防己體用小同按木漢二防己即是根苗為名漢主水氣木主風氣又云木防己不入藥古方亦通用之治肺痿略血多痰漢防己葶藶等分為末糯米飲調下一錢甚效

當歸氣溫味辛氣味俱輕陽也又陽中微陰大能和血補血治血證通用雷公云若破血即使頭一節硬實處若止痛止血即用尾若一時用不如不使服之無效易老以為頭破血身行血尾止血又云身養血若全用和血別說云大補不足決取立效之藥氣血昏亂服之而定氣血各有所歸之名故名當歸本草云主欬逆上氣溫瘧及女子諸疾不足此說盡當歸之用矣

升麻陽中微陰主脾胃解肌肉間熱脾痺非升麻稍不能除手足陽明傷風引用之的藥及發解本經風和若元氣不足者用此於陰中升陽氣上行不可缺也本草云治肺痿欬唾膿血

細辛氣溫味辛手少陰引經之藥治諸頂頭痛諸風通用之藥獨活為使溫陰經去內寒故東垣治和在裏之表本草云主欬逆頭痛百節拘攣最能溫中下氣破痰利水道若單服末不可過半錢匕多即氣閉塞不通者死故書于此

藁本味辛苦陽中微陰太陽經本藥治寒氣鬱結及巔頂痛腦齒痛引諸藥上至巔頂及與木香同治霧露之氣是各從其類也

蘇木味辛甘鹹乃陽中之陰主破血産後血脹滿欲死排膿止痛消癰腫瘀血月經不調及血暈口噤極効

天麻氣平和味苦一名定風草即此是也其苗名赤箭主諸風濕痺四肢拘攣小兒癇驚及諸虛眩運非此不能除也凡使勿悞用御風草與天麻相似悞服則令人有腸結之患戒之慎之

赤箭謹按今醫家見用天麻即是此赤箭根今本草別是一物古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同天麻赤箭本為一物今所用不相遠然赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言根用之有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成熟而落從幹中而下至土而生似此粗可識

其外内主治之理

柴胡氣平味微苦陰中之陽乃少陽厥陰行經藥也去往來寒熱非柴胡梢子不能除本草治心腹去腸胃中結氣推陳致新除傷寒心下煩熱痰實生銀州者為勝衍義曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真臟虛損復受邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿丸用柴胡正合宜爾服之無不效日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若有此等病苟無實熱醫者槩而用之不死何待註釋本草一字亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮耳苟有明哲之士自何處治中下之學不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治傷寒寒熱往來如瘧狀用柴胡正合其宜

旋覆花甘微冷利有小毒主結氣脇下滿消胸上痰結唾如膠漆一名金沸草也衍義云行痰水去頭目風亦走散之藥病人涉虛者不宜多服利大腸戒之

澤瀉鹹寒陰中微陽入足太陽少陰經之藥除濕行水之功尤捷治小便淋閉去陰間汗若無此疾服之令人眼疾誠為行去其水故也仲景八味丸用之亦不

過接引桂附歸就腎經別無他意服此未有不小便多者小便既多腎氣焉得復實今人止泄精多不敢用

熟地黄氣寒味苦陰中之陽入手足少陰厥陰一名芐一名芑大補血衰者須用之又能填骨髓長肌肉男子五勞七傷女中傷中胞漏下血破惡血溺血初採得以水浸有浮者名天黄不堪用半沉者名人黄為次其沉者名地黄最佳也其花即地髓花可單服延年凡蒸以木甑砂鍋不可犯鐵器令人腎消男子損榮女損衛○生地黄大寒治婦人崩中血不止及產後血上薄心悶絕胎動下血胎不落墮折傷瘀血留血衄血吐血皆可搗飲之病人虛而多熱者勿用慎之

前胡本草云主痰滿胷脇中痞心腹結氣推陳致新半夏為之使

知母陰中微陽腎經之本藥主消渴熱中下水補不足益氣骨熱勞傳尸疰病產後蓐勞消痰止嗽虛人口乾加而用之

貝母本草主傷寒煩熱淋瀝瘕疝喉痺金瘡腹中心下結實滿咳嗽上氣日華子云消痰潤肺及燒灰油調

數人悪瘡至能歛瘡口　別說云能散心胷鬱結之氣殊有功則詩人所謂言采其蝱者是也蓋作詩者本以不得志而言之今用治心中氣不快多愁鬱者甚有功信矣

草荳蔻氣熱味辛入足太陰陽明經治風寒客邪在胃痛及嘔吐一切冷氣麪裹煨用衍義云虛弱不能食者宜此

玄胡辛温手足太陰經藥象云破血治婦人月水不調小腹痛及產後諸疾因血為病皆可療之

茴香氣平味辛手足少陰太陽經藥也破一切臭氣調中止嘔下食本草云主腎勞癩疝液云本治膀胱藥以其先丙故云小腸也能潤丙燥以其先戊故從丙至壬又手少陰二藥以開上下經之通道所以壬與丙交也○即蘹香子也

連翹苦陰中微陽升也入手少陰經瀉心火降脾胃溼熱及心經客熱非此不能除瘡瘻癰腫不可缺也治血証以防風為上使連翹為中使地榆為下使不可不知衍義治利有微血不可熱以連翹為苦燥劑虛者多致危困實者宜用之○連軺又名　本經不見所註但仲景方註云即連翹根也

國家圖書館_NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

大戟甘寒有毒主下十二水腹滿急痛積聚利大小腸通月水治瘀血能墮胎孕其葉名澤漆味甘無毒主治頗同

甘遂甘寒有毒惟用連珠者然經中不言此藥專於行水攻決為用入藥須斟酌之

麥門冬甘微寒陽中微陰治肺中伏火主肺保神強陰益精又補肺中元氣不足及治血妄行衍義云治肺熱及虛勞客熱若與地黃麻仁阿膠潤經益血復脈通心

天門冬苦甘大寒藥性云主肺熱欬逆喘息促急保定

故也又東垣曰生姜辛溫入肺如何是入胃口曰俗皆以心下為胃口者非也咽門之下受有形之物系謂之系便為胃口與肺同處故入肺而開胃口也又問曰人云夜間勿食生姜食則令人閉氣何也曰生姜辛溫主開發夜則氣本收斂反食之開發其氣則違天道是以不宜若有病則不然若破血調中去冷除痰開胃須熱即去皮若要冷即留皮

赤石脂氣溫味甘酸本草主養心氣明目益精治腹痛泄澼下利赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩漏產難胞衣不出○其五色石脂各入五臟補益澁可以去

脘石脂為收歛之劑胞衣不出澁劑可以下之是赤入丙白入庚也

玄參氣微寒味苦乃足少陰腎經之君藥也本草云主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風易老云玄參乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不濁以此論之治虛中氤氲之氣無根之火以玄參為聖藥也

欵冬花氣溫味甘辛溫肺止嗽本草主咳逆上氣喘急呼吸杏仁為之使日華子消痰止嗽肺痿肺癰吐血心虛驚悸衍義云有人病嗽多日或教以燒欵花兩三枚於無風處以筆管吸其煙滿口則嚥數日効

蘆根氣寒味甘本草主消渴客熱止小便金匱玉函治五噎膈氣煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉水三盞煮二盞服無時甚効

廣茂氣溫味辛平主心膈痛飲食不消破痃癖氣最良止痛醋炒用

京三稜辛苦主老癖癥瘕結塊婦人血脉不調心腹刺痛火炮用之

草龍膽苦寒治赤目腫痛睛脹瘀肉高起痛不可忍以柴胡為主治眼疾必用之藥也酒浸上行

車前子氣寒味甘主氣癃閉利水道通小便除濕痺肝中風熱衝目赤痛

麻黃苦甘陰中之陽泄衞中實去榮中寒發太陽少陽之汗入手太陰經

郁李仁陰中之陽破血潤燥

豉若鹹純陽去心中懊憹傷寒頭痛煩燥

瞿麥辛陽中微陰利小便為君

牡蠣鹹耎痞又治帶下溫瘧瘡腫為耎堅收歛之劑

十二經見証

足太陽膀胱經見証

頭若痛　目似脫　頭兩邊痛　淚出　臍反出

下腫便膿血　肌肉痿　項似拔　小腹脹痛按之欲小便不得

足陽明胃見証

惡與火聞木聲則驚　狂上登而歌棄衣而走　顏黑　不能言唇胗　嘔　呵欠　消穀善飲　頸腫

膺乳沖股伏兔胻外臁足跗皆痛　胸旁過乳痛

口喝

腹大水腫　奔響腹脹　跗內廉胕痛

髀不可轉膕似結腨似裂　膝臏腫痛　遺溺失氣

善伸數欠　癲疾　温浸　心欲動則閉戶獨處

驚

身前熱身後寒慄

足少陽膽經見証

口苦　馬刀挾癭

胷中脇肋髀膝外至胻絕骨外踝前諸節痛　足外

熱

寢寒憎風　體無膏澤　善大息

手太陽小腸經見証

面白　耳前熱苦寒　頞頷腫不可轉　腰似折

肩臑肘臂外後廉腫痛　臑臂內前廉痛

手陽明大腸經見証

手大指次指難用　耳聾煇煇焞焞耳鳴嘈嘈

耳後肩臑肘臂外背痛　氣滿皮膚殼殼然堅而不

痛

足太陰脾經見証

五泄注下五色　大小便不通　面黃　舌本強痛

口甘

食即吐食不下咽　怠墮嗜臥　搶心

善飢善味不嗜食不化食　尻陰股膝髀胻足背痛

煩悶心下急痛　有動痛按之若牢痛當臍　心下

若痞

腹脹腸鳴飧泄不化　足不收行善瘈脚下痛　九

竅不通

溏泄水下後出餘氣則快然　飲發中滿食減善噫

形醉皮膚潤而短氣肉痛　身體不能動搖　足胻

腫若水

足少陰腎經見証

面如漆　眇中清　面黑如炭　咳唾多血　渴

臍左

脇下背肩髀間痛　胷中滿大小腹痛　大便難

飢不欲食心懸如飢　腹大脛腫喘嗽　脊臀股後

痛

脊中痛脊股內後廉痛　腰冷如冰及腫　足痿厥

臍下氣逆小腹急痛泄　下腫足胻寒而逆　腸癖

陰下湿

四指正黑　手指清厥　足下熱嗜臥坐而欲起

凍瘡

下痢　善思　善恐　四肢不收四肢不舉

足厥陰肝經見証

頭痛　脫色善潔　耳無聞　頰腫　肝逆頰腫

面青

目赤腫痛　兩脇下痛引小腹　胸痛背下則兩脇

腫痛

婦人小腹腫　腰痛不可俛仰　四肢滿悶　挺長

熱　嘔逆

睾丸腫睾疝　暴痒　足逆寒　胻善瘛節時腫

遺瀝淋洩便難癃狐疝酒泄六人癩疝　眩冒　轉

筋

陰縮兩筋攣　善恐胸中喘罵詈　血在脇下喘

手太陰肺經見証

善嚏　缺盆中痛　臍上　肩痛　肩背痛　臍右

小腹脹引腹痛　小便數　溏泄　皮膚痛及麻木

喘少氣頰上氣見　交兩手而瞀　悲愁欲哭　洒

淅寒熱

手少陰心經見証

消渴　兩腎內痛　後廉腰背痛　浸淫　善笑善

驚善忘

上咳吐下氣泄　眩仆　身熱而腹痛　悲

手厥陰別脉經見証　主

笑不休　手心熱　心中大熱　面黃目赤　心中

動

手足陰陽經合生見証

頭項痛足太陽手少陰　黃疸足太陰少陰

面赤手少陰厥陰手足陽明

目黃手陽明少陰太陽厥陰足太陽

耳聾手太陽陽明少陽太陰足少陰　喉痺手足陽

明手少陽

鼻鼽衄手足陽明太陽　目𥊮𥊮無所見足少陰厥

陰

目瞳人痛足厥陰　面塵足厥陰少陽　咽腫足少

陰厥陰

嗌乾手太陰足少陰厥陰手少陰太陽　噦手少陽

足太陰

膈咽不通不食足陽明太陰　胷滿手太陰足厥陰

手厥陰

胸支滿手厥陰少陰　腋腫手厥陰足少陽

脇痛手少陰足少陽　胸中痛手少陰足少陽

善嘔苦汁足少陽足陽明逆

少氣咳嗽喘渴上氣手太陰足少陰

喘手陽明足少陰手太陰　臂外痛手太陽少陽（背一作臂）

掌中熱手太陽陽明厥陰　肘攣急手厥陰太陰

腸滿脹足陽明太陰　心痛手少陰厥陰足少陰

痔足太陽手足太陰熱　凄然振寒足陽明少陽

如人將捕足少陰厥陰　瘧足太陰足三陽

汗出手太陽少陰足陽明少陽　身體重手太陰少

陰

論五篇

不治已病治未病

與其救療於有疾之後不若攝養於無疾之先蓋疾成而後藥者徒勞而已是故已病而不治所以為醫家之法未病而先治所以明攝生之理夫如是則思患而預防之者何患之有哉此聖人不治已病治未病之意也嘗謂備土以防水也苟不以閑塞其涓涓之流則滔天之勢不能遏備水以防火也若不以撲滅其熒熒之光則燎原之焰不能止其水火既盛尚不能止遏况病之已成豈能治歟故宜夜卧早起於

發陳之春早起夜卧於蕃秀之夏以之緩形無怒而遂其志以之食凉食寒而養其陽聖人春夏治未病者如此與鷄俱興於容平之秋必待日光於閉藏之冬以之斂神慝志而私其意以之食温食熱而養其陰聖人秋冬治未病者如此或曰見肝之病先實其脾臟之虛則木邪不能傳見右頰之赤先瀉其肺經之熱則金邪不能盛此乃治未病之法令以順四時調養神志而為治未病者是何意耶盖保身長全者所以為聖人之道治病十全者所以為上工術不治已病治未病之說著於四氣調神大論歟有旨哉昔黃帝與天師難疑答問之書未嘗不以攝養為先始論乎天真次論乎調神既以法於陰陽而繼之以調於四氣既曰食飲有節而又繼之以起居有常諄諄然以養生為急務者意欲治未然之病無使至於已病難圖也厥後秦緩達乎此見晉侯病在膏肓語之曰不可為也扁鵲明乎此視齊侯病至骨髓斷之曰不可救也噫惜齊晉之侯不知治未病之理

亢則害承廼制

氣之來也既以極而成災則氣之乘也必以復而得平物極則反理之自然也大抵寒暑燥濕風火之氣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

木火土金水之形亢極則所以害其物承乘則所以制其極然則極而咸災復而得平氣運之妙灼然而明矣此亢則害承迺制之意原夫天地陰陽之機寒極生熱熱極生寒至神不測有以幹旋宰制於其間也故木極而似金火極而似水土極而似木金極而似火水極而似土蓋氣之亢極所以承之者反勝於已也夫惟承其亢而制其害者造化之功可得而成也今夫相火之下水氣承而火無其變水位之下土氣承而水無其栽土位之下木承而土順風位之下金乘而風平火熱承其燥金自然金家之疾陰精承其君火自然火家之侯所謂亢而為害承而迺制者如斯而已且嘗考之六元正紀大論云少陽所至為火生終為蒸溽（火化以生則火生也陽在上故終為蒸溽）是水化以承相火之意太陽所至為寒雪冰雹白埃是土化以承寒水之意也（寒雪冰雹水也白埃下承土也）以至太陰所至為雷霆驟注烈風（雷霆驟注土也烈風下承之木氣也）厥陰所至為風生終為肅（風化以生則風生也肅靜也）陽明所至為散落溫（散落金也溫承之火氣也）丁少陰所至為熱生中為寒（熱化以生則熱生也陰精承上故中為寒也）豈非亢為害則承迺制者歟昔者黃帝與岐伯上窮天紀下極地理遠取諸物近取諸身更相問難以作内

經至於六微旨大論有及於六氣相承之言以為制則生化外別盛衰害則敗亂生化大病諸以所勝之氣來於下者皆折其標盛也不然曷以水發而雹雪土發而驟飄木發而毀折金發而清明火發而曛昧此皆鬱極迺發以承所亢之意也嗚呼通天地人曰儒醫家者流豈止治疾而已當思其不明天地之理不足以為醫工之語

審察病機無失氣宜

邪氣各有所屬也當窮其要於前治法各有所歸也當防其差於後蓋治病之要以窮其所屬為先苟不知法之所歸未免於無差爾是故疾病之生不勝其衆要其所屬不出乎五運六氣而已誠能於此審察而得其機要然後為之治又必使之各應於運氣之宜而不至有一毫差誤之失若然則治病求屬之道庶乎其無愧矣至真要大論曰審察病機無失氣宜意蘊諸此嘗謂醫道有一言而可以盡其要者運氣是也天為陽地為陰陰陽二氣各分三品謂之三陰三陽然天非純陽而亦有三陰地非純陰而亦有三陽故天地上下各有風熱火濕燥寒之六氣其斡旋運動乎兩間者而又有木火土金水之五運人生其

中臟腑氣穴亦與天地相為流通是知衆疾之作而所屬之機無出乎是也然而醫之為治當如何哉惟當察乎此使無失其宜而後可若夫諸風掉眩皆屬肝木諸痛痒瘡皆屬心火諸濕腫滿皆屬脾土諸氣膹鬱皆屬肺金諸寒收引皆屬腎水此病屬於五運者也諸暴強直皆屬於風諸嘔吐酸皆屬於熱諸躁擾狂越皆屬於火諸痙強直皆屬於濕諸澁枯涸皆屬於燥諸病水液澄徹清冷皆屬於寒此病機屬於六氣者也夫惟病機之察雖曰既審而治病之施亦不可不詳故必別陰陽於疑似之間辨標本於隱微

之際有無之殊者求其有無之所以殊虛實之異者責其虛實之所以異為汗吐下投其所當投寒熱溫涼用其所當用或逆之以制其微或從之以導其甚上焉以遠司氣之犯中焉以辨歲運之化下焉以審南北之宜使小大適中先後合度以是為治又豈有差殊乖亂之失耶又考之內經曰治病必求其本本草曰欲療病者先察病機此審病機之意也六元正紀大論曰無失天信無逆氣宜五常大論曰必先歲氣無伐天和此皆無失氣宜之意也故素問靈樞之經未嘗不以氣運為言既曰先立其年以明其氣復

有以戒之曰治病者必明天道地理陰陽更勝既曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以為工矣諄諄然若有不能自已者是豈聖人私憂過計哉以醫道之要悉在乎此也觀乎原病式一書比類物象深明乎氣運造化之妙其於病機氣宜之理不可以有加矣

能合色脉可以萬全

欲知其内者當以觀乎外診於外者斯以知其内蓋有諸内者形諸外苟不以相參而斷其病邪之逆順不可得也為工者深燭厥理故望其五色以青黄赤白黑以合於五臟之脉窮其應與不應切其五脉急大緩濇沉以合其五臟之色順與不順誠能察其精微之色診其微妙之脉内外相參而治之則萬舉萬全之功可坐而致矣素問曰能合色脉可以萬全其意如此原夫道之一氣判而為陰陽散而為五行而人之所稟皆備焉夫五脉者天之真行血氣通陰陽以榮於身五色者氣之華應五行合四時以彰於面惟其察色按脉而不偏廢然後察病之機斷之以寒熱歸之以臟腑隨証而療之而獲全濟之効者本於能合色脉而已假令肝色如翠羽之青其脉微弦而

急所以為生若浮濇而短色見如草滋者豈能生乎心色如鷄冠之赤其脉當浮大而散所以為順若沉濡而滑色見如衃血者豈能順乎脾色如蟹腹之黄其脉當中緩而大所以為從若微弦而急色見如枳實者豈能從乎肺色如豕膏之白其脉當浮濇而短所以為吉若浮大而散色見如枯骨者豈能吉乎以至腎色見如烏羽之異其脉沉濡而滑所以為生或脉來緩而大色見如炲者死死生之理夫惟診視相參既以如此則藥証相對厥疾弗瘳者未之有也抑嘗論之容色所見左右上下各有其部脉息所動寸関尺中皆有其位左頰者肝之部以合左手関位肝膽之分應於風木為初之氣額為心之部以合於左手寸口心與小腸之分應於君火為二之氣鼻為脾之部合於右手関脉脾胃之分應於濕土為四之氣右頰肺之部合於右手寸口肺與大腸之分應於燥金為五之氣頤為腎之部以合於左手尺中腎與膀胱之分應於寒水為終之氣至於相火為三之氣應於右手命門三焦之分也若夫陰陽五行相生相勝之理當以合之於色脉而推之也是故脉要精微論曰色合五行脉合陰陽十三難曰色之與脉當參相

應然而治病萬全之功苟非合於色脉者莫之能也五藏生成篇云心之合脉也其榮色也夫脉之大小滑濇沉浮可以指別五色微甚可以目察繼之以能合色脉可以萬全謂夫赤脉之至也喘而堅白脉之至也喘而浮青脉之至也長而左右彈黃脉之至也大而虛黑脉之至也上堅而大此先言五色次言五脉欲後之學者望而切之以相合也厥後扁鵲明乎此述之曰望而知之謂之神切脉而知之謂之巧深得内經之理也下逮後世有立方者目之曰神巧萬全厥有旨哉

治病必求於本

將以施其療疾之法當以窮其受病之源蓋疾疢之原不離於陰陽之二邪也窮此而療之厥疾弗瘳者鮮矣良工知其然謂夫風熱火之病所以屬乎陽邪之所客病既本於陽苟不求其本而治之則陽邪滋蔓而難制濕燥寒之病所以屬乎陰邪之所客病既本於陰苟不求其本而治之則陰邪滋蔓而難圖誠能窮原療疾各得其法萬舉萬全之功可坐而致也治病必求於本見於素問陰陽應象大論者如此夫邪氣之基久而傳化其変証不勝其衆也譬如水之

有本故能游至汪洋浩瀚泝而趍下以漸大草之有本故能荐生莖葉實秀而在上以漸蓄若病之有本變化無窮苟非必求其本而治之欲去深感之患不可得也今夫厥陰為標風木為本其風邪傷於人也掉摇而眩轉瞤動而瘈瘲卒暴強直之病生矣少陰為標君火為本其熱邪傷於人也瘡瘍而痛痒暴注而下迫水液渾混之病生矣少陽為標相火為本其火邪傷於人也為熱而瞀瘛躁擾而狂越如喪神守之病生矣善為治者風淫所勝平以辛京熱淫所勝平以鹹寒火淫所勝平以鹹冷以其病本於陽必求其陽而療之病之不愈者未之有也太陽為標濕土為本其濕邪傷於人也腹滿而身腫按之而没滿諸痓強直之病生矣陽明為標燥金為本其燥邪傷於人也氣滯而膹鬱皮膚以皴揭諸澁枯涸之病生矣太陽為標寒水為本其寒邪傷於人也吐利而腥穢水液以清冷諸寒收引之病生矣善為治者濕淫所勝平以苦熱燥淫所勝平以若温寒淫所勝平以辛熱以其病本於陰必求其陰而治之病之不愈者未之有也豈非將以施其療疾之法當以窮其受病之源者哉抑嘗論之邪氣為病各有其候治之之法各

有其要亦豈止於一端而已其在表者汗而發之其入裏者下而奪之其在高者因而越之謂可吐也慓悍者按而收之謂按摩也藏寒虛奪者治以灸焫脉病攣痺者治以針刺血實畜結腫熱者治以砭石氣滯痿厥寒熱者治以導引經絡不通病生於不仁者治以醪醴血氣凝泣病生於筋脉者治以熨藥始焉求其受病之本終焉蠲其為病之邪者無出於此也

噫昔黃帝處於法宮之中坐於明堂之上受業於岐伯傳道於雷公曰陰陽者天地之道也綱紀萬物變化生殺之妙蓋有不測之神斡旋宰制於其間也人或受邪生病不離於陰陽也病既本於此為工者豈可他求哉必求於陰陽可也至真要大論曰有者求之無者求之此求其病機之說與夫求於本其理一也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

丹溪心法附餘卷首　終

附劉河間風熱濕燥寒論（出宣明論）　甲集

諸風　風本生熱以熱為本風為標言風者即風熱病也

諸熱　熱甚而生風或熱微風甚即兼治風熱或風微熱甚但治其熱即風自消矣

諸濕　濕本土氣火熱能生土濕故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥乾也濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能宣行即停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣尚多以為兼證當云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不得宣行亦能為濕雖有此異亦以鮮

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

矣或腑腫體寒而有水者以為畜熱入裏極深本非病寒也及夫寒熱吐瀉因得溫而成也

諸燥　燥乾者金肺之本肺藏氣以血液內損氣虛成風則皴揭風能勝溫熱能耗液皆能成燥故經云風熱火兼為陽寒溫燥同爲陰又燥溫亦異也然燥金雖屬秋陰而其性異於寒溫燥陰盛於風熱火也故風熱甚而寒溫同於燥也然中寒吐瀉亡液而成燥者亦以此矣故經云諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥也

諸寒　寒者上下所出水液澄澈清冷穀不化小便清白不澁身涼不渴本末不經有見陽熱證其脈遲者是也此因飲食冷物過多陰勝陽衰而為中寒也或冷熱相併而反陽氣怫鬱不能宣散怫熱內作以成熱證者不可亦言為冷當以成證辯之夫溫熱吐瀉當見陽脈若亡液氣虛亦能反見諸陰脈也當以標本明之不可妄治或熱證誤服白朮調中湯溫藥亦能開發陽氣宣通而愈別無加害也

附診家樞要

滑伯仁曰人之為病雖曰不過寒熱虗實四者而其脉多兼見也　熱則流而通凡浮大數長皆熱也　寒則堅凝凡沉小遅短皆寒也　實則形剛凡實滑弦緊皆實此虗則形柔凡虗濇濡緩皆虗也

細而推之浮為在表　沉為在裏　大数為熱　小遅為寒　長為熱流通　短為寒凝結　實為氣實　虗為氣虗　滑為血實為有痰　濇為血虗為有欝　弦緊為痛　弦堅為積聚　濡緩為濕　緩大為温熱

浮沉以舉按重輕言浮甚為散沉甚為伏　大小以盈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

麤言大以統洪小以該細　數遲以息至多少言數甚為疾數止為促　長短以部位之過與不及言　實滑弦緊以形狀有力言實以該牢革滑以統動弦甚為緊　虛濇濡緩以形狀無力言虛以統弱微濇以該芤緩止為結結甚為代此又合三十脉也自此以往儘推無窮知者觀之思過半矣

附十二經脉歌　甲集

○手太陰肺中焦生下絡大腸出賁門上膈屬肺從肺系
系橫出腋臑中行肘臂寸口上魚際大指內側爪甲根
支絡還從腕後出接次指屬陽明經此經多氣而少血
是動則病喘與咳肺脹膨膨缺盆痛兩手交瞀為臂厥
所生病者為氣咳喘渴煩心胸滿結臑臂之外前廉痛
小便頻數掌中熱氣虛肩背痛而寒氣盛亦疼風汗出
欠伸少氣不足息遺失無度溺變別

○陽明之脉手大腸次指內側起商陽循指上連出合谷
兩筋岐骨循臂肪入肘外廉循臑外肩端前廉柱骨傍

從肩下入缺盆内絡肺下膈屬大腸支從缺盆上入頸斜貫頰前下齒當環出人中交左右上侠鼻孔注迎香此經血盛氣亦盛是動頸腫并齒痛所生病者為鼻衂目黄口乾喉痺生大指次指難為用肩臑外側痛相仍

○胃足陽明交鼻起下循鼻外下入齒還出侠口繞承漿頤後大迎頰車裏耳前髮際至額顱支下人迎缺盆底下膈入胃絡脾宮直者缺盆下乳内一支幽門循腹中下行直合氣冲逢遂由髀關抵膝臏䯒跗中指内間同一支下膝注三里前出中指外間通一支别走足跗指大指之端經盡矣此經多氣復多血是動欠伸面顏黑凄凄惡寒畏見人忽聞木聲心振惕登高而歌棄衣走甚則腹脹乃賁響凡此諸疾皆骭厥所生病者為狂瘧濕温汗出鼻流血口喎唇裂又喉痺膝臏疼痛腹脹結氣膺伏兎䯒外廉足跗中指俱痛徹有餘消穀溺色黄不足身前寒振慄胃房脹滿食不消氣盛身前皆有熱

○太陰脾起足大指上循内側白肉際核骨之後内踝前上臑循䯒脛膝裏股内前廉入腹中屬脾絡胃與膈通侠喉連舌散舌下支絡從胃注心宮此經氣盛而血衰是動具病氣所為食入即吐胃脘痛更兼身躰痛難移腹脹善噫舌本強得後與氣快然衰所生病者舌亦痛

躰重不食亦如之煩心心下仍急痛泄水溏瘕寒瘧隨
不卧強立股膝腫疽發身黃大指痿

○手少陰脉起心中下膈直與小腸通支者還從肺系走
直上咽喉繫目瞳直者上肺出腋下臑後肘內少海從
臂內後廉抵掌中兊骨之端注少冲多氣少血屬此經
是動心脾痛難任渴欲飲水咽乾燥所生脇痛目如金
脇臂之內後廉痛掌中有熱向經尋

手太陽經小腸脉小指之端起少澤循手外廉出踝中
循臂骨出肘內側上循臑外出後廉直過肩解繞肩甲
交肩下入缺盆內向腋絡心循咽嗌下膈抵胃屬小腸
一支缺盆貫頸頰至目兊眥却入耳復從耳前仍上頰
抵鼻升至目內眥斜絡於顴別絡接此經少氣還多血
是動則病痛咽嗌頷下腫兮不可顧肩如拔兮臑似折
所生病兮主肩臑耳聾目黃腫腮頰肘臂之外後廉痛
部分猶當細分別

○足經太陽膀胱脉目內眥上顴額尖支者巔上至耳角
直者從巔腦後懸絡腦還出別下項仍循肩膊俠脊邊
抵腰膂腎膀胱內一支下與後陰連貫臀斜入委中穴
一支膊內左右別貫胛俠脊過髀樞臂內後廉膕中合
下貫踹內外踝後京骨之下指外側是經血多氣少也

是動頭疼不可當項如拔兮腰似折髀強痛徹脊中央膕如結兮腨如裂是為踝厥筋乃傷所生痔瘧小指廢頭顖項痛目色黄腰尻膕腳疼連背淚流鼻衄及顛狂

○足經腎脉屬少陰小指斜透湧泉心然骨之下內踝後別入跟中腨內侵出膕內廉上股內貫脊屬腎膀胱臨直者屬腎貫肝膈入肺循喉舌本尋支者從肺絡心內仍至胸中部分深此經多氣而少血是動病飢不欲食喘嗽唾血喉中鳴坐而欲起面如垢目視䀮䀮氣不足心懸如飢常惕惕所生病者為舌乾口熱咽痛氣賁逼股內後廉并脊疼心腸煩痛疸而澼痿厥嗜臥躰怠墮足下熱痛皆腎厥

○手厥陰心主起胸屬包下膈三焦宮支者循胸出脇下脇下連腋三寸同仍上抵腋循臑內太陰少陰兩經中指透中冲支者別小指次指絡相通是經少氣原多血是動則病手心熱肘臂攣急腋下腫甚則胸脇支滿結心中澹澹或大動善笑目黄面赤色所生之者為心煩心痛掌熱病之則

○手經少陽三焦脉起自小指次指端兩指岐骨手腕表上出臂外兩骨間肘後臑外循肩上少陽之後交別傳下入缺盆膻中分散絡心膈高裹穿支者膻中缺盆上

上項耳後耳角旋屈下至頗仍生頰一支出耳入耳前却從上關交曲頰至目内眥乃盡焉斯經少血還多氣是動耳鳴喉腫痺所生病者汗自出耳後痛兼目銳眥肩臑肘臂外皆疼小指次指亦如癈

○足脉少陽膽之經始從兩目銳眥生抵頭循角下耳後腦空風池次第行手少陽前至肩上交少陽右上缺盆支者耳後貫耳内出走耳前銳眥循一支銳眥大迎下合手少陽抵項根下加頰車缺盆合入胸貫膈絡肝經屬膽仍從脇裏過下入氣街毛際縈橫入髀厭環跳内直者缺盆下腋膺過季脇下髀厭内出膝外廉是陽陵外輔絶骨踝前過足跗小指次指分一支别從大指去三毛之際接肝經此經多氣乃少血是動口苦善太息心脇疼痛難轉移面塵足熱躰無澤所生頭痛連銳眥缺盆腫痛併兩腋馬刀挾癭生兩旁汗出振寒痎瘧疾胸脇髀膝至胻骨絶骨踝痛及諸節

厥陰足脉肝所終大指之端毛際叢足跗上廉太冲分踝前一寸入中封上踝交出太陰後循䐃内廉陰股充環繞陰器抵小腹俠胃屬肝絡膽逢上貫膈裏布脇肋俠喉頏顙目繫同脉上巔會督脉出支者還生目系中下絡頰裏還唇内支者便從膈肺通是經血多氣少焉

是動腰疼俛仰難男疝女人小腹腫面塵脫色及咽乾

所生病者為胸滿嘔吐洞泄小便難或時遺溺并狐疝

臨証還須子細看

附古菴藥鑑　甲集

治風門　升生

風為陽善行數變自外而入以鬱正氣故治風多行氣開表藥又風入久變熱熱能生痰宜用祛風化痰藥又熱極生風風能燥液宜用清熱潤燥藥

行氣開表藥

羌活（苦甘辛平微溫）　獨活（同上）　防風（甘辛溫）　細辛（大辛溫）

升麻（甘苦辛平微寒）　麻黃（苦甘溫）　白芷（辛溫）　藁本（辛苦溫）

天麻（辛甘平溫）　秦艽（苦辛平微溫）　威靈仙（苦溫）　蒼耳實（苦甘）

蔓荊實（苦辛微溫）　牡荊實（苦溫）　惡實（辛苦平）

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

紫蘇（辛甘温）　薄荷（辛苦凉温）　荊芥（辛苦温）

祛風化痰藥

天南星（苦辛平）　何首烏（甘苦微温）　白附子（甘辛温）　皂莢（辛鹹温）

藜蘆（辛苦寒）　瓜蒂（苦寒）　蟬蛻（鹹甘寒）　鈌（甘辛）

白殭蠶（鹹辛平）　白花蛇（甘鹹温）　牛黃（苦平凉）　虎骨（辛微温）

清熱潤燥藥

菊花（苦甘平寒）　密蒙花（甘平）　蒺藜子（苦辛微寒）　青葙子（苦微
寒）　木賊（甘微苦）　白薇（苦鹹平寒）　女萎（甘平）

巴戟天（辛甘微温）　天竺黃（甘寒）　五加皮（辛苦微寒）

主治各經風藥

肝（川芎）　心（細辛）　脾（升麻）　肺（防風）

腎（獨活）　胃（升麻）　大腸（白芷）　小腸（藁本）

三焦（黃芪）　膀胱（羌活）

已上諸藥發散風寒升散鬱火無治表温之劑

治熱門（沉藏）

治熱以寒寒藥屬陰故治熱多陰藥又鬱火宜發散宜用風門藥火鬱則發之升陽散火也夫熱燥皆屬陽宜與治燥門通看

治上焦熱藥

黃芩（苦平寒）　梔子（苦寒）　沙參（苦甘微寒）　玄參（苦鹹微寒）

前胡（苦微寒）　青黛（鹹甘寒）　山豆根（甘寒）　百部根（甘苦

微寒）　桑白皮（甘辛溫）　丹參（苦微寒）　白前（甘辛微寒）

桔梗（苦微溫）

治中焦熱藥

黃連（苦寒）　胡黃連（苦平）　連翹（苦平微寒）　葛根（甘平）

香薷（辛微溫）　石斛（甘平）　滑石（甘寒）　石膏（辛甘微寒）

玄明粉（辛甘寒）　茵蔯蒿（苦辛平微寒）　大黃（苦大寒）

芒硝（辛鹹寒）　犀角（甘辛鹹寒）　羚羊角（鹹苦寒）

治下焦熱藥

檗木（苦微辛寒）　柴胡（苦平微寒）　草龍膽（苦澁大）　防己（辛苦平寒）

車前子（甘鹹寒）　地膚子（苦寒）　石韋（苦甘平微寒）　通草（辛甘平）

地榆（苦甘酸微寒）　苦參（苦寒沉）　秦皮（苦寒）　文蛤（鹹平）

龜甲（鹹甘平）　鼈甲（鹹平）

主治各經熱藥

肝（氣柴胡血黃芩）　心（氣麥門冬血黃連）　脾（氣白芍藥血生大黃）　肺（氣石膏血梔子）

腎（氣玄參血黃柏）　膽（氣連翹血柴胡）　胃（氣葛根血大黃）　三焦（氣連翹血

地骨皮）　膀胱（氣滑石血黃柏）　大腸（氣連翹血大黃）　小腸（氣赤茯苓

血木通）　包絡（氣麥門冬血牡丹皮）

主治骨肉分勞瘵發熱藥

肝（氣當歸血柴胡）　心（氣生地黃血黃連）　脾（氣芍藥血木瓜）　肺（氣石膏血桑白

皮　腎（氣知母　血生地黃）膽（氣柴胡　血瓜蔞）胃（氣石膏　血芒硝）
大腸（氣芒硝　血大黃）小腸（氣赤茯苓　血木通）三焦（氣石膏　血
竹葉）膀胱（氣滑石　血澤瀉）
已上諸藥治上中下三焦内熱兼治湿熱之劑

治湿門（中化）

湿因氣虗不能運化水穀而生宜用補氣除湿藥又宜調中消導藥行湿利六小便藥外湿宜汗散宜用風門藥風能勝湿也夫湿寒皆屬陰宜與治寒門通看

補氣除湿藥

黃芪（甘微温）人參（甘微苦温微寒）甘草（甘平生寒熟温）
白术（苦甘辛温）茯苓（甘淡平）薯蕷（甘温平）

調中消導藥

蒼术（苦甘辛温性烈）半夏（辛微苦平生寒熟温）橘皮（辛苦温）
青皮（苦辛寒）枳殼（苦酸辛氣微寒）枳實（苦酸寒）厚朴（苦辛温）
射干　旋覆花（鹹甘温）大腹皮（辛微温）白藊豆（甘微
温）大麥蘖（鹹甘温）神麴（甘温）山查子
京三稜（苦辛平）蓬莪术（苦辛温）阿魏（辛平熱）使君子（甘温）
薏苡仁（甘微寒）罌粟殼（甘平性澁）

行湿利大小便藥

猪苓（甘苦淡平）澤瀉（甘鹹寒）瞿麥（苦辛寒）紫草（苦寒）

木瓜實（酸温）　赤小豆（辛甘酸温平）　百合（甘平）

葶藶（辛苦大寒）　牽牛子（苦寒）　大戟（苦甘寒）　芫花（辛苦温）

甘遂（苦甘大寒）　海藻（苦鹹寒）　昆布（鹹寒）

主治各經湿藥

肝（白术 一云川芎）　心（黄連 一云赤茯苓）　脾（白术）

肺（桑白皮）　腎（澤瀉）　胃（白术）　小腸（車前子）

三焦（陳皮）　膀胱（茵蔯）　大腸（秦艽）　心包絡（著）

巳上諸藥治上中下三焦内湿兼補氣調氣之劑

治燥門　降收

燥因血虚而然盖血虚生熱熱生燥是也宜用觧熱生津藥及滋血潤燥藥夫燥熱皆屬陽宜與治熱門通看

觧熱生津藥

天門冬（苦甘平大寒）　麥門冬（甘微苦平微寒）

知母（苦辛寒）　貝母（辛苦平微寒）　栝樓根（苦寒）　枇杷葉（苦平）

五味子（酸温）　地骨皮（苦寒）　蘭草（辛甘平寒）　梅實（酸平）

馬兜鈴（苦寒）　欵冬花（辛甘温）　紫菀（苦辛温）　阿膠（甘辛平微温）

訶梨勒（苦酸温真降）　淡竹瀝（甘辛寒）

遠志（苦温）　菖蒲（辛苦温）　酸棗仁（酸平）

牡丹皮（苦寒）

滋血潤燥藥

生地黃（甘苦大寒）　熟地黃（甘苦寒微温）　當歸（甘辛温）

芎藭（辛温）　芍藥（苦酸微寒）　麻子（甘平）　杏核仁（甘苦）

温　桃核仁（甘苦平）　紅藍花（辛甘苦温）

蜀葵花（甘寒）　郁李仁（酸苦平）　蘇方木（甘醎酸平）

槐實（苦酸醎寒）　栢實（甘辛平）　蒲黄（甘平）　牛膝（苦酸平）

枸杞（苦寒）　肉蓯蓉（甘酸醎微温）　瑣陽（甘醎）

鹿茸（苦辛温）

主治各經燥藥

肝（當歸）　心（麥門冬）　脾（麻仁）　肺（杏仁）

腎（枸杞仁）　大腸（硝石）　小腸（茴香）　三焦（山藥）

膀胱（茴香）　心包絡（栢仁）

已上諸藥治上中下三焦内燥熱補血和血之劑

治寒門（[illegible]）

治寒以熱熱藥屬陽故治寒多陽藥外寒宜汗散宜用風門藥寒從汗解也夫寒温皆屬陰宜與治温門通看

治上焦寒藥

附子（辛甘温大熱）　烏頭（辛甘温）　生薑（辛甘微温）　桂枝

治中焦寒熱藥

乾薑（辛温大熱）　桂（甘辛大熱）　高良薑（辛苦大温）　白豆蔻（辛大温）　草豆蔻（辛温）　肉豆蔻（苦辛温）　莎草根（甘辛氣微寒）　縮砂蜜（辛苦温）　益智子（辛温）　藿香（甘辛微温）

丁香（辛温）　巴豆（辛温）　蜀椒（辛大温）　胡椒（辛大温）

艾葉（苦微温）　韭子　白芥子（辛温）　萊菔子

木香（辛苦温）　檳榔（辛苦温）　紫真檀（鹹辛温）　沉香（辛温）

常山（苦辛寒）　草菓（辛温）　延胡索（辛苦温）　鬱金（辛苦寒）

蓽茇（辛苦寒）　五靈脂

治下焦寒藥

菟絲子（辛甘平温）　山茱萸（酸澁平微温）　懷香子（辛平）

吳茱萸（辛苦大熱）　補骨脂（苦辛大温）　杜仲（辛甘平温）

萆薢（苦甘平）　烏藥（辛温）

主治各經寒藥

肝（氣吳茱萸　血當歸）　心（氣桂心　血同上）　脾（氣吳茱萸　血同上）　肺（氣麻黄　血乾姜）

腎（氣細辛　血附子）　膽（氣生姜　血川芎）　大腸（氣白芷　血秦艽）　小腸（氣茴香　血大黄）

三焦（氣附子　血川芎）　膀胱（氣麻黄　血桂枝）　心包絡（氣附子　血川芎）

已上諸藥治上中下三焦內寒兼治温寒之剤

治瘡門

瘡屬熱屬毒故治瘡多清熱解毒藥亦因氣逆血滞又

宜行氣活血藥其內服藥已見於前五門下此惟載其外傅藥而已又有各門載不盡者亦附於此焉

傅諸瘡藥

白及（苦辛平微寒）　白歛（苦甘微寒）平　五倍子（苦平）酸　商陸（辛甘酸平）

茺蔚子（辛甘微溫）　蒲公草（甘平）　狗脊（苦甘微溫）平　蛇床子（苦辛）

平　蕪荑（辛平）　雷丸（苦鹹寒）　松脂（苦甘溫）

楓香脂（辛苦平）　乳香（辛苦溫）　沒藥（苦辛平）　麒麟竭（甘鹹）

平　龍腦香（辛苦溫）　麝香（辛溫）　蘆薈（苦寒）

樟腦（辛）　丹砂（甘微寒）　雄黃（苦甘平寒）辛　水銀（辛寒性滑）

重　硇砂（苦辛鹹溫）　蓬砂（苦辛溫）　無名異（甘平）

[illegible]　凝水石（辛甘寒）　五石脂（甘平）　石硫黃（酸甘溫）　礬石（酸濇寒）

砒霜（苦酸）　青礞石　伏龍肝（辛溫）　龍骨（甘平微寒）

牡蠣（鹹平微寒）　斑猫（辛寒）　蟾酥　鯪鯉甲（微寒）

烏賊魚骨（鹹微溫）　木鼈（苦平微寒）　水蛭（鹹苦平微）

寒　已上諸藥傅貼瘡腫及理氣血之劑

右五品藥性乃治風熱濕燥寒五氣切要之劑除治風門通用外治熱門宜與治燥門兼用治濕門宜與治寒門兼用熱燥屬陽寒濕屬陰故也盖瘦人血虚多熱燥肥人氣虚多寒濕宜仔細分類治之

又按藥有寒熱溫涼平和之氣辛甘淡苦酸鹹之味

升降浮沉之性宣通瀉補之能經曰補瀉在味隨時換氣故辛以散之（謂散其表裏怫鬱也）甘以緩之（謂緩其大熱大寒也）淡以滲之（謂滲其內温利小便是也）苦以泄之（謂泄其上升之火也）酸以收之（謂收其耗散之氣也）鹹以軟之（謂軟其燥結之大熱也）春氣温而宜凉藥夏氣熱而宜寒藥秋氣凉而宜温藥冬氣寒而宜熱藥（若病與時違不拘此例）病在上而宜升藥病在下而宜降藥病在外而宜浮藥病在內而宜沉藥故曰升降浮沉則順之（謂順其藥之升降浮沉之性也）寒熱温凉則逆之（謂逆治其時之寒熱温凉之病也）

○附藥鑑何哉盖欲人按病察方按方察藥俾藥性與病情相對坦然無疑槪然樂服則藥無不效病無不瘳者也夫醫之爲道曰藥性曰脉理曰病機曰治法曰經絡曰運氣六者不可缺一焉然學之之序必先於藥性何以言之良醫之用藥如良將之用兵良醫知藥之性則可以處方而愈疾良將知兵之法則可以破敵而取勝其理一也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之一

新安居士方廣（乙集）輯

刊

外感門上

中風一　附中氣　預防中風

丹溪心法

○中風大率主血虛有痰治痰為先次養血行血或屬虛挾火（一作痰）與濕又須分氣虛血虛　半身不遂大率多痰

國立中央圖書館藏

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

在左屬死血少（一作瘀）血在右屬痰有熱併氣虛　左以四物湯加桃仁紅花竹瀝姜汁　右以二陳湯四君子等湯加竹瀝姜汁　痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當用吐法一吐不已再吐輕者用瓜蔕一錢或稀涎散或蝦汁以蝦半斤入醬葱姜等料物水煮先喫蝦次飲汁後以鵝翎探引吐痰用蝦者蓋引其風出耳重者用藜蘆半錢或三分加麝香少許虀汁調若口噤昏迷者灌入鼻內吐之虛者不可吐　初昏倒急掐人中至醒然後用痰藥以二陳湯四君子湯四物湯加減用之　氣虛卒倒者用參芪補之有痰濃煎參湯加竹瀝姜汁　血虛用四物湯俱用姜汁炒恐泥痰故也有痰再加竹瀝姜汁入內服能食者去竹瀝加荊瀝　肥白人多濕少用烏頭附子行經凡用烏附必用童便煮過以殺其毒　瘦人陰虛火熱用四物湯加牛膝竹瀝黃芩黃栢有痰者加痰藥　治痰氣實而能食用荊瀝氣虛少食用竹瀝此二味開經絡行血氣故也入四物湯必用姜汁助之　遺尿屬氣虛以參芪補之筋枯者舉動則痛是無血不能滋養其筋不治也　脉訣內言諸不治證口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋痛髮直搖頭上竄面赤如裝或頭面青黑汗綴如珠皆不可治

○案內經已下皆謂外中風邪然地有南北之殊不可一途而論惟劉守真作將息失宜水不能制火極是由今言之西北二方亦有真為風所中者但極少爾東南之人多是濕土生痰痰生熱熱生風也邪之所輳其氣必虛風之傷人在肺藏為多　許學士謂氣中者亦有此七情所傷脉微而數或浮而緊緩而遲必也脉遲浮可治大數而極者死　若果外中者則東垣所謂中血脉中府中藏之理其於四肢不舉亦有與痿相類者當細分之局方風痿同治大謬發揮甚詳予和用三法如的係邪氣卒中痰盛實熱者可用否則不可

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

入方

肥人中風口喎手足麻木左右俱作痰治

貝母　瓜蔞　南星　荊芥　防風
羌活　黃栢　黃芩　黃連　白朮
陳皮　半夏　薄桂　甘草　威靈仙
天花粉　多食濕麪加附子竹瀝姜汁酒一匙行經

一婦手足左癱口不能言健啖

防風　荊芥　羌活　南星　沒藥
乳香　木通　茯苓　厚朴　桔梗
麻黃　甘草　全蝎

右為末湯酒下不効時春脉伏漸以淡塩湯虀汁每早一碗吐五日仍以白术陳皮茯苓甘草厚朴菖蒲日服二貼後以川芎山梔豆豉瓜蔕菉豆粉虀汁塩湯吐之吐甚快不食後以四君子湯服之以當歸酒芩紅花木通粘子蒼术姜南星牛膝茯苓為末酒糊丸服十日後夜間微汗手足動而能言

一人癱左

酒連　酒芩　酒栢　防風　羌活

川芎　當歸（半兩）　南星　蒼术　人參（一兩）

麻黄　甘草（三錢）　附子（三片）

右丸如彈子酒化下

一人躰肥中風先吐後以藥

蒼术　南星　酒芩　酒栢　木通

茯苓　牛膝　紅花　升麻　厚朴

甘草

附諸賢論

泝洄集曰人有卒暴僵仆或偏枯或四肢不舉或不知人或死或不死者世以中風呼之而方書亦以中風治之余嘗攷諸内經則曰風者百病之始也又曰風者百病之長也至其變化乃為他病無常方又曰風者善行而

數變又曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癘風或為偏枯或為風其卒暴僵仆不知人四肢不舉者並無所論止有偏枯一語而已及觀千金方則引岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰風痺觧之者曰偏枯者半身不隨風痱者身無痛四肢不收風懿者奄忽不知人風痺者諸痺類風狀金匱要略中風篇曰寸口脉浮而緊緊則為寒浮則為虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛絡脉空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入扵腑即不識人邪入扵臟舌即難言口吐涎沫由是觀之知卒暴僵仆不知人偏枯四肢不舉等證固為因風而致者矣故用大小續命西州續命排風八風等諸湯散治之及近代刘河間李東垣朱彥修三子者出所論始与昔人異矣河間曰中風癱瘓者非謂肝木之風實甚而卒中之亦非外中扵風由乎將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也多因喜怒思悲恐五志有所过極而卒中者由五志过極皆為熱甚故也俗云風者言末而忘其本也東垣曰中風者非外來風邪乃本気病也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

凡人年逾四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而如此彥修曰西北氣寒為風所中誠有之矣東南氣温而地多湿有風病者非風也皆湿土生痰痰生熱熱生風也三子之論河間主乎火東垣主乎氣彥修主乎湿反以風為虛象而大異於昔人矣吁昔人也三子也果孰是歟果孰非歟以三子為是昔人為非則三子未出之前固有從昔人而治愈者矣以昔人為是三子為非則三子已出之後亦有從三子而治愈者矣故不善讀其書者往往致亂以予觀之昔人三子之論皆不可偏廢但三子以相類中風之病視為中風而立論故使後人狐疑而不能決殊不知因于風者真中風也因于火因于氣因于湿者類中風而非中風也三子所論者自是因火因氣因濕而為暴病暴死之證與風何相干哉如內經所謂三陰三陽發病為偏枯痿易四肢不舉亦未嘗必因于風而後能也夫風火氣濕之殊望聞問切之間豈無所辨乎辨之為風則從昔人以治辨之為火氣湿則從三子以治如此庶乎析理明而用法當矣惟其以因火因氣因湿之證強引風而合論之所以真偽不分而名實相紊若以因火因氣因湿證分出

之則真中風病彰矣所謂西北有中風東南無中風者其然歟否歟

附脉理

脉訣舉要曰中風脉浮滑兼痰氣其或沉滑勿以風治或浮或沉而微而虛扶危溫痰風未可踈

附諸方

通關散　治卒中風邪昏悶不醒牙關緊閉湯水不下

細辛（洗去土葉）　猪牙皂角（去子各一錢）

右為末每用少許搐入鼻內候噴嚏服藥　一方加半夏一錢

不卧散　治中風卒倒不知人事用此搐鼻即甦

川芎（一兩半）　石膏（七錢半）　藜蘆（半兩）　生甘草（二錢半）

右為細末口擒水搐之

通頂散　治中風中氣昏憒不知人事急用吹鼻即甦

藜蘆　生甘草　川芎　細辛　人參（各一錢）

石膏（五錢）

右為末吹入鼻中一字就提頭頂中髮立甦有嚏者可治無嚏者不可治

搐鼻通天散　治卒暗中風倒地牙關緊急人事昏沉

川芎　細辛　藜蘆　白芷　防風

薄荷（各一錢）　猪牙皂角（刮去皮三箇）

右為細末用蘆筒細藥每用少許吹入鼻中

破棺散（經驗方）治中風牙關已緊無門下藥

天南星末（半錢）　龍腦（少許）

右五月五日午時合每用半錢蘸擦令熱牙自開

奪命散（楊氏家藏方）　治卒暴中風涎潮氣閉牙關緊急眼上視破損傷風搐搦潮作及小兒急驚風証並皆治之

甜葶藶　香白芷　天南星　半夏（湯泡去滑）

巴豆（去殼不去油各等分）

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

右為細末每服半錢用生姜自然汁一呷調下牙關緊急湯劑不下者此藥輒能治之小兒以利痰或吐為愈

解毒雄黃丸（和劑方）　治中風卒然倒仆牙關緊急不醒人事并解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉一應熱毒

鬱金（二錢半）　巴豆（去皮油十四箇）　雄黃（研飛二錢半）

右為末醋煑麵糊丸如菉豆大每服七丸用熱茶清下吐出頑涎立甦未吐再服如牙關急緊斡開灌下

稀涎散　治中風忽然若醉形体昏悶四肢不收涎潮搐搦氣閉不通

光明晉礬（一兩）　猪牙皂角（四箇肥實不蛀者去黑皮）

右為末每服半錢温水調下風涎自出又云每服一錢至二錢不妨須要研勻調服吐出痰涎便醒

独圣散

二圣散

三圣散

四靈散　已上四方並治痰涎壅盛口眼喎斜不能言者用此吐出痰涎稍醒方可進藥其四靈散又吐虛痰之劑也（方見吐法）

○已上諸方開關竅之劑

麻黄膏（宣明方）　治中風不省人事卒然倒地

右須王相日乙卯者採麻黄一秤揀去根一寸長取東流水三石三斗以無油膩鐺量大小盛五七斗者可先煑五沸掠去滓逐旋添水盡至三五斗以來漉去麻黄淘在盆中澄定良久用細羅子濾去滓取清者鐺內再熬至一斗再澄再濾取汁再熬至升半已來為度只是勤攪勿令着底恐焦了熬時忌鷄犬陰人澄時須蓋覆不得飛入塵土其藥放一二年不妨如膏稠用水解熬再勻　丸中風卒倒用此膏加入湯藥內服或用此膏丸藥

小續命湯（孜粹方）　經云陽之気以天地之疾風名之此中

風者非外來風邪乃本気病也凡人年逾四旬気衰之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而如此治法當和藏府通經絡便是治風然亦有賊風襲虛傷之者也治法輕重有三治各不同中血脉外有六經之形證則從小續命加減中府內有便溺之阻隔宜三化湯等通利之外無六經之形證內無便溺之阻隔宜養血通気大秦艽湯羌活愈風湯主之中藏痰涎昏冒宜至寶丹之類鎮墜若中血脉中府之病初不宜用龍射牛黄蓋射香入脾治肉牛黄入肝治筋龍腦入腎治骨恐引風深入骨髓如油入麪莫之能出又不可一槩用大戟芫花甘遂瀉大腸大便損其陰血真気愈虛和劑方云此藥治邪在血脉最妙

麻黄（去節） 人參（去芦） 黄芩（去腐） 芍藥

甘草（炙） 川芎 杏仁（去皮尖麸炒） 防巳

肉桂（各一兩） 防風（去芦一兩半） 附子（炮去皮臍半兩）

右㕮咀每服一兩生姜三片水二盞煎至一盞去滓通口服如治中風不審六經之形証加減雖治與不治無異也開則洒然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以加減續命湯隨証治之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

麻黃續命湯（拔粹方）　治中風無汗惡寒

麻黃　防風　杏仁

依本方加一倍宜針太陽經至陰出血崑崙舉蹻

桂枝續命湯（拔粹方）　治中風有汗惡風

桂枝　芍藥　杏仁

依本方加一倍宜針風府此二證太陽中風也

白虎續命湯（拔粹方）　治中風身熱無汗不惡寒

石膏　知母（一料中各加二兩）　甘草

依本方加一倍

葛根續命湯（拔粹方）　治中風身熱有汗不惡風

葛根　桂枝　黃芩

依本方加一倍宜針陷谷刺厲兌針陷谷者去陽明之賊也刺厲兌者瀉陽明之實也此二證陽明中風也

附子續命湯（拔粹方）　治中風無汗身凉

附子（加一倍）　乾姜（加二兩）　甘草（加二兩）

宜針隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風也

桂附續命湯（拔粹方）　治中風有汗無熱

桂枝　附子　甘草

依本方加一倍宜針太谿此一證少陰經中風也

羌活連翹續命湯（拔粹方）　無此四證六經混淆繫於少

陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁宜服

小續命（八兩） 羌活（四兩） 連翹（六兩）

右古之續命混淆無經今立分經治療又分各經針刺無不愈也治法厥陰之井大敦刺以通其經少陽之經絶骨灸以引其熱此通經引熱是針灸同象治法之大躰也服法並如前

三化湯（拔粹方） 治中風外有六經之形証先以加減續命湯隨証治之內有便溺之阻隔復以此導之

厚朴（姜製） 大黄 枳實 羌活（等分）

右㕮咀每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微利則已如內邪已除外邪已盡當從愈風湯以行中道久服大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此為常治之法也久則清濁自分榮衛自和矣

潤腸丸 治証同前老人宜服

麻子仁（另研） 大黄（酒煨各一兩半） 桃仁泥 當歸尾

枳實（去穣麩炒） 白芍藥 升麻（各半兩） 人参

生甘草 陳皮（各三錢） 木香 檳榔（各二錢）

右除麻仁桃仁外為末却入二仁泥蜜丸梧子大每服七八十丸温水食前下

大秦艽湯（拔粹方）治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知為血弱不能養於筋故手足不能運動舌強不能言宜養血而筋自榮

秦艽　石膏（各三兩）　甘草　川芎

當歸　羌活　獨活　防風（去芦）

黃芩　白芍藥　吳白芷　白朮

生地黃　熟地黃　白茯苓（各二兩）　細辛（五錢）

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服如天陰雨加生姜三大片如心下痞加枳實一錢煎

羌活愈風湯（拔粹方）治肝腎虛筋骨弱語言艱精神昏憒及治風濕內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯或肥而半身不遂心亂則百病生靜則萬病息此藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活　甘草（炙）　防風（去芦）　黃芪（去芦）

人參（去芦）　蔓荊子　川芎　細辛（去芦）

枳殼（去穰麸炒）　地骨皮　麻黃（去根）　知母（去皮）

獨活　白芷　杜仲（炒斷絲）　秦艽（去芦）

柴胡（去苗）　半夏（湯洗姜製）　厚朴（姜製）　防己

熟地黃　前胡（各二兩）　芍藥（去皮）　黃芩（去腐）

白茯苓（各三兩）　石膏　生地黃　蒼朮（各四兩）

桂（一兩）

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服如遇天陰加生姜三片煎空心一服臨卧再煎渣服　常服之藥不可失四時之輔如望春大寒之後加半夏柴胡人参各二兩望夏穀雨之後加石膏黄芩知母各二兩季夏之月加防巳白术茯苓各二兩望秋大暑之後加厚朴藿香各二兩桂一兩望冬霜降之後加附子官桂各一兩當歸二兩

祛風至寶丹（拔粹方）治風中臟痰涎昏冒及治諸風熱

防風　芍藥（各二兩半）　石膏　黄芩

桔梗　熟地黄　天麻　人參

羗活　獨活（各一兩）　川芎　當歸（各二兩半）

滑石（三兩）　甘草（二兩）　白术（一兩三錢）　連翹

荊芥穗　薄荷　麻黄（去根不去節）　芒硝

黄連　大黄　黄栢　細辛

全蝎（各五錢）　梔子（六錢）

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任下臨卧溫服

排風湯（和劑方）治中風邪氣入於五臟令人狂言妄語精神錯亂以至手足不仁痰涎壅盛

白蘚皮（一兩）　當歸（去蘆二兩）　肉桂（去粗皮）　芍藥

杏仁（去皮尖麩炒）　白术（二兩）　麻黄（三兩）　甘草

防風（去蘆各二兩）　芎藭（二兩）　獨活　茯苓（去皮各三兩）

右㕮咀每服五錢水一鍾姜四片同煎溫服不拘時

○廣按此方已上治風中血脉中腑中臟之劑也

防風天麻散（宣明方）治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯或暴瘖譂語內外風熱壅滯解頭目昏眩

天麻　防風　草烏頭　甘草

川芎　羗活　當歸尾　香白芷

白附子　荆芥穗（各半兩）　滑石（二兩）

右為末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運行微麻為度或煉蜜為丸如彈子大熱酒化下一丸或半丸細嚼白湯化下亦得散鬱結宣氣道如甚者更服防風通聖散

○廣按此方已下開鬱行氣散風泛治之劑也

踈風湯（授粹方）治半身不遂或肢體麻痺筋骨疼痛

麻黄（去節二兩）　益智仁　杏仁（炒去皮各一兩）　甘草（炙）

升麻（各五兩）

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服脚登熱水葫蘆以大汗出去葫蘆冬月不去

御風丹（聖惠方）治一切中風半身不遂神昏語蹇口眼喎斜婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦涎痰手足麻痺

川芎　白芍藥　桔梗　細辛

白殭蚕　川羌活　天南星（姜製各半两）

麻黃（去根節）　防風（去芦）　白芷（各一两半）　乾生姜

甘草（炒各七錢半）　朱砂（二錢半為衣）

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸熱酒化下食前日三服神昏有涎者加朱砂二錢半

續命煑散（大全良方）治風気留滯心中昏憒四肢無力口眼瞤動或時搐搦亡失津液渴欲飲水此藥能扶榮衛去虛風中虛自汗及產後中風自汗尤宜服之

防風　獨活　當歸　人參

細辛　葛根　芍藥　川芎

甘草　熟地黃　遠志（去心）　荊芥（各五錢）

官桂（七錢半）　半夏（五錢）　汗多不止加牡蠣粉

右㕮咀每服一两生姜三片水二盞煎至一盞去渣通口服

獨活湯（大全良方）治虛風昏憒不自知覺手足瘈瘲坐卧不寧或發寒熱若血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之

川獨活　羌活　人參（去芦）　防風

當歸　細辛　茯神（去木）　半夏

桂心　白微　遠志　菖蒲（去毛）

川芎（各五錢）　甘草（五錢）

右㕮咀每服一兩水二盞生姜五片煎至八分去渣食後溫服

防風湯（本事方）治中風內虛語言謇澁

石斛（一兩半酒炒）　乾地黃　杜仲（去皮切姜汁炒）　丹參（各一兩三錢五分）

防風（去芦）　川芎　麥門冬（去心）　桂心

川獨活（各一兩）

右㕮咀每服八錢棗子二枚煎至八分去渣溫服不拘

時水二盞煎

大防風湯（和劑方）去風順氣活血壯筋又治痢後脚痛緩弱不能行履名曰痢風或兩膝腫痛脚脛枯腊名曰鶴膝風

熟地黃（酒洗二兩）　白朮（二兩）　羌活（去芦一兩）　人參（去芦一兩）

川芎（酒洗）　附子（炮去皮臍各一兩半）　防風（去芦一兩）

牛膝（去芦酒浸一兩）　甘草（炙一兩）　川當歸（酒浸二兩）　黃芪（去芦炙二兩）

白芍藥（二兩）　杜仲（去粗皮炒令絲斷二兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜七片棗一枚煎至八

分食後溫服

芎歸飲　治中風後人事虛弱

芎藭　當歸（去芦酒浸）　防風（去芦各等分）

右㕮咀每服五錢水一鍾煎半鍾不拘時服

○已上諸方散風之劑

蘇合香丸　療傳尸骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘀血月閉痃癖丁腫驚癇及小兒吐乳大人狐狸等病　小兒用大緋絹袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近　凡人痰氣及中風痰涎壅上喉中有聲不能下者用青州白丸子同丸生姜自然汁化下立效　產婦中風小兒驚風牙關緊硬不開及不省者擦牙即開然後用風藥治之　小兒吐瀉驚癖先用火焙此藥然後用生姜葱白自然汁化開白湯調灌　脚氣衝心用草蔴子去殼搗碎和丸敷貼脚心疼痛立止　心腹絞痛中滿嘔吐姜湯化下　大人小兒傷風咳嗽姜葱汁白湯調下　中風狂亂如見鬼神者白湯調服

白术　青木香　硃砂（研水飛）　烏犀屑

沉香　麝香（研）　訶梨勒（皮煨取）　丁香

安息香（另為末用無灰酒一升熬膏）　蓽撥　白檀香

香附子（各二兩） 龍腦（研） 薰陸香（另研）

蘇合香油（入安息香膏內）各一兩

右為末研勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大取井花水溫冷任意下四丸老人小兒服一丸溫酒化服

烏藥順氣散 治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼痛肢躰頑麻手足癱瘓言語蹇澁者宜先服此藥疎通氣道然後進以風藥（氣升上為逆降下為順順氣者正所謂降氣也）

麻黃（去根節） 陳皮（去白） 烏藥（各二兩） 殭蚕（去嘴炒令絲斷）

川芎 枳殼（去穰麸炒） 甘草 白芷

桔梗（各一兩） 乾姜（炮半兩）

八味順気散 凡中風之人先服此藥順気後進風藥

白朮 白茯苓 青皮 陳皮

白芷 烏藥 人參 甘草（各等分）

每服六錢水一盞煎半盞溫服仍以酒化蘇合香丸間服妙

人參順気散（和劑方） 治感風頭疼鼻塞聲重及一應中風宜先服此藥疎通気道然後進以風藥

乾姜 人參（各一兩） 川芎（去芦） 甘草（炙）

桔梗（去傍枝） 厚朴（去皮姜製） 白朮（去梗） 陳皮（去白）

白芷　麻黃（去節各四兩）　葛根（三兩半）

右㕮咀每五錢水一盞姜三片棗一枚薄荷五葉煎至七分溫服

勻氣散（瑞竹方）治腰腿疼痛手足攣拳及治中風不語口眼喎斜半身不遂等證前代曾服有効

白朮（二兩煨）　天台烏藥（一兩）　天麻（半兩）　沉香

青皮（去穣）　白芷　人參（去芦）　甘草

紫蘇　木瓜（各二錢半）

右㕮咀作十服每服水一盞生姜三片煎至半盞去渣溫服

○虞按中風中氣之症乃痰火鬱滯便用散風瀉火豁痰之劑卒不能開宜先用此等開鬱行氣之藥治之鬱開氣行其病自已

○巳上諸方順氣之劑（中風先宜服此藥治中氣）

川芎石膏湯（宣明方）治風熱上攻頭目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞口瘡煩渴淋悶眼生翳膜此藥清神爽志宣通氣血治中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳染

川芎　芍藥　當歸　山梔子

黃芩　大黃　菊花　荊芥穗

人參　白朮（已上各半兩）　滑石（四兩）　寒水石（二兩）

甘草（三兩）　桔梗（二兩）　砂仁（二錢半）　石膏（一兩）

防風　連翹　薄荷葉（各一兩）

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後服水調亦得忌姜醋發熱物

防風通聖散（宣明方）論曰風寒熱諸疾之始生也人之藏府皆風之起謂火熱陽之本也謂曲直動搖風之用也眩運嘔吐謂風熱之甚也夫風熱怫鬱風火生於熱以熱為本而風為標凡言風者即風熱病也氣壅滯筋脉拘倦肢體焦痿頭目昏眩腰脊強痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽嗌不利胸膈痞悶咳嘔喘滿涕唾稠粘腸胃燥熱結便溺淋閉或夜卧寢汗咬牙睡語筋惕驚悸或腸胃怫鬱結水液不能浸潤於周身而但為小便多出者或湿熱内餘而時有汗洩者或因亡液而成燥淋閉者或因腸胃燥鬱水液不能宣行於外反以停湿而泄或燥湿往來而時結時泄者或表之陽和正氣（衛氣是也）與邪熱相合并入於裏陽極似陰而戰煩渴者（表氣寒故戰裏熱甚則渴）或虛氣又不已者（經言邪熱與衛氣并入於裏則寒戰也并出之於表則發熱大則病作離則病已）或風熱走注疼痛麻痹者或腎水真陰衰虛心火邪熱暴甚而僵仆或卒中久不語或一切暴瘖而不語語不出聲或瘖風癇者或洗頭風或破傷風或中風諸潮

搐并小兒諸疳積熱或驚風積熱傷寒疫疠不能辨者或熱甚怫結而反出不快者或熱極黑陷將死或大人小兒風熱瘡疥及久不愈者或頭生屑徧身黑黧紫白班駮或面鼻生紫赤風刺癮疹俗乎為肺風者或成風疠世傳為大風疾者或腸風痔漏并解酒過熱毒兼解

利諸邪所傷及調理傷寒未發汗頭項身躰疼痛者并

兩感諸証兼治産後血液損虛以致陰氣衰殘陽氣鬱

甚為諸熱証腹滿澁痛煩渴喘悶譫妄驚狂或熱極生風而熱燥鬱舌強口噤筋惕肉瞤一切風熱燥証鬱而惡物不下腹滿撮痛而昏者（惡物過多而不止者不宜服之）兼消除大小瘡及惡毒兼治墮馬打撲傷損疼痛或因熱結大小

便澁滯不通或腹急痛腹滿喘悶者竝皆治之

防風　川芎　當歸　芍藥

大黃　薄荷葉　麻黃　連翹

芒硝（將硝製過者是　已上各半兩）　石膏　黃芩

桔梗（各一兩）　滑石（三兩）　甘草（三兩）　荊芥

白朮　梔子（各二錢五分）

右為末每服三錢水一大盞生姜三片煎至六分温服涎嗽加半夏半兩姜製此藥不可無生姜同煎　劉廷瑞方有宿砂無芒砂其餘皆同

瀉青丸　治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧此是風熱煩躁之故也

當歸　川芎　梔子　羗活

大黃　防風　龍膽草（等分）

右為末蜜丸彈子大每服一丸竹葉湯化下

○廣按此劑乃瀉肝火之藥蓋肝主風風動則木搖故以以此藥主之又予嘗見中風之証多是老年因怒而成蓋老年腎水真陰衰虛火寡于畏適因怒動肝火火無所制得以上升心火得助邪熱暴甚所以僵仆不知人事也火載痰上所以舌強不語口眼喎斜痰涎壅盛也

治法先吐痰火以治其標次則豁痰瀉火以治其本豁痰用星附湯省風湯瀉火用防風通聖散瀉青丸之類是也　左癱右瘓者因氣血虛而痰火流注也血虛則痰火流注於左而為左癱氣虛則痰火流注於右而為右瘓治法左癱宜補血藥兼散痰火藥右瘓宜補氣藥兼散痰火藥急治則可久則痰火鬱結難治也

愈風丹　治風疾常宜服此調理

防風　連翹　麻黃　黃栢

黃連（各半兩）　川芎　當歸　赤芍藥

薄荷葉　石膏　桔梗　何首烏（各一兩）

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

熟地黃　羌活　細辛　甘菊花

天麻（各一兩）　黃芩（一兩半）　白朮　荊芥（各二錢半）

梔子（七錢半）　滑石（五兩）　甘草（二兩）　殭蚕（半兩）

熱甚加大黃朴硝（各一兩）　朱砂金箔為衣

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒化

下

龍星丹　治諸風熱痰涎盛

牛膽南星　朱砂（另研為衣各三錢）　片腦（另研三字）

牛黃（另研三字）　麝香（另研三字）　全蝎　防風

薄荷（各一錢）　黃芩　黃連（各二錢）　加青黛（另研一錢）

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸嚼化

○廣按此方既治風熱又兼理痰之劑夫中風之証多是溫土生痰痰生熱熱生風也若是瀉熱散風而不豁痰則病何由而止哉此方但是風熱兼痰為病無不治也

清涼丹　治風熱壅實上攻頭面口眼喎斜語言不正肌肉瞤動面若虫行及治傷寒熱盛狂言昏冒剛痓及一切風熱並皆治之

片腦（另研半兩）　牛黃（另研三兩）　蝎稍（去毒炒）　石膏（各一兩半）

白花蛇（酒浸取肉）　犀角屑　防風（去文）　甘草（炙）

珍珠末　硃砂（一）　大黃（各一兩）

南星（末四兩臘月黄牛膽製者）

右為細末研勻煉蜜為丸每兩作十丸每服一丸薄荷湯化下食後臨卧服

千金保命丹（徐同知方）治諸風瘈瘲不能語言心忪健忘恍惚去來頭目暈眩胷中煩鬱痰涎壅塞抑氣攻心精神昏憒又治心氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘慼虛煩少睡喜怒不時或發狂顛精神昏乱及小兒驚癇驚風抽搐不定及大人暗風并羊顛猪顛發叫

硃砂（一兩）　珍珠（二錢）　南星（一兩）　麻黄（去根節）

白附子（炮）　雄黄　龍腦（各半兩）　琥珀（三錢）

殭蚕（炒）　犀角（鎊）　麥門冬（去心）　枳殻

地骨皮　神曲　茯神　遠志（去心）

人參　柴胡（各一兩）　金箔（一百片）　牛黄（三錢）

天麻（半兩）　腦子（少許）　射香（少許）　膽礬（半兩）

牙硝（四錢）　毫車　天竺黄　防風

甘草　桔梗　白朮　升麻（各一兩）

蟬蛻（半兩）　黄芩（二兩）　荆芥（二兩）

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸薄荷湯化下不拘時候忌猪羊鰕核桃動風引痰之物及猪羊血更加大川烏炮去皮臍姜製半夏白芷川芎各一兩猪牙

皂角一兩和前藥丸服尤妙

真珠丸（本事方）治肝虛為風邪所干卧則魂散而不守舍狀若驚悸

真珠母（三錢另研）　當歸　熟地黃（各一兩半）

人參　酸棗仁　栢子仁（各一兩）

犀角　茯神　沉香（各五錢）

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服四五十丸金銀薄荷湯食後吞下日三服

活命金丹　治中風神不清

凉膈散加青黛藍根

右為細末煉蜜為丸如弾子大硃砂為衣金箔盖每服一丸茶清化開令後臨卧服（凉膈散見傷寒類）

豨薟丸（濟生方）治中風口眼喎斜時吐涎沫語言謇澁手足緩弱

豨薟草（一名火枕草生於沃土間帶豬苓氣者是）

右五月五日六月六日收採洗去土摘其葉不拘多少九蒸九暴每蒸用酒蜜水洒之蒸一飯久暴乾為末煉蜜丸如梧桐子大每服百丸空心温酒米飲任下

清陽湯（發華方）治中風口喎頰顋急緊胃中火盛必汗不止小便頻數

升麻　黃芪（[illegible]）　當歸身（各二錢）　葛根（一錢半）

紅花（一分）　蘇木（半錢）　炙甘草（一錢）　酒黃栢（一分）

生甘草（五分）　桂枝（一分）

右㕮咀作一服酒三盞煎至一盞三分去渣溫服

鷄舌散（聖惠方）　專治中風舌本強硬語言不正

蝎梢（去毒二錢五分）　茯神（去木炒一兩）　薄荷（焙一兩）（一方無茯神有茯苓）

右為末每服一二錢溫酒調下或以擦牙頰間亦好

轉舌膏　治中風瘈瘲舌塞不語

涼膈加石菖蒲遠志

右為末煉蜜為丸如彈子大硃砂為衣每服一丸薄荷湯化開食後或臨卧服　涼膈散見傷寒類

訶子湯　治諸風失音不語

訶子（四箇半生半炮）　桔梗（一兩半生半炒）　甘草（一寸半生半熟）

右為末每服五錢用童子小便一鍾煎至七沸調服甚者不過三服

竹瀝飲　治中風不語

用淡竹或苦竹或青水竹去枝葉截作一尺餘長劈作二片每用不拘多少或五六十片以新汲井水浸一宿如用急只浸一二時卻以磚二片側立閣竹仰於磚上磚內以熱火烘竹青熱磚外以碗盛竹流下清水以甁甁收貯外以冷水浸甁收用或沉井底亦好每用半鍾

與病人服之或入前藥內服亦可

一方　治中風面目牽引口偏不能言

獨活　竹瀝　生地黃汁

右等分水二盞煎至一盞通口食後服

一方　治肝臟中風心神煩熱言語蹇澁不得卧

竹瀝　荊瀝　葛根汁　生姜汁　白蜜（各一合）

右五味汁相勻頻頻服不拘時加童子小便尤妙

○已上諸方瀉火之剂（瘦人宜此）

蘇青丹　治風痰壅盛手足癱瘓及小兒驚風

青州白丸子末（三兩）　蘇合香丸末（一兩）

右二末和勻用姜汁麵糊為丸如梧桐子大淡姜湯吞下三四十丸

星香湯（易簡方）　治中風痰盛服熱藥不得者

南星（八錢）　木香（一錢）

右㕮咀每服四錢姜十片水一大盞煎七分溫服

星附湯（濟生方）　治中風痰壅六脉沉伏昏不知人

附子（生用去皮）　南星（生用各一兩）　木香（半兩不見火）

右㕮咀每服四錢水一大盞姜九片煎七分去渣溫服虛寒甚者加天雄川烏名三建湯痰涎壅盛聲如牽鋸服藥不下者宜於關元丹田二穴多灸之

○廣按風本於熱而生豈有虛寒之理用附子取效者因肥白人多濕故中節耳正丹溪所謂肥白人多濕少用烏頭附子行經是也非肥白人決不可用夫三建湯只可用於中寒陰毒之症豈可施於中風陽熱之症乎學者詳之

星附散（本事方）治中風雖能言口不喎斜而手足嚲曳者

天南星（姜製）　半夏（姜製）　人參　黑附子（去皮臍）

白附子　白茯苓（去皮）　川烏（去皮臍）　白殭蠶

沒藥（各等分）

右㕮咀每服五錢水酒各一盞煎至八分熱服併進得汗為度

大醒風湯（和劑方）治中風痰涎壅盛半身不遂及歷節痛風筋脉拘急

天南星（生用八兩）　防風（生用四兩）　獨活（生用）　附子（生去皮臍）

全蝎（微炒）　甘草（生用各二兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜十片煎七分溫服

三生飲　治卒中風昏迷痰涎壅併口眼歪斜脉沉無熱者可服

天南星（生用一兩）　川烏（生用半兩）　附子（生用去皮半兩）　木香（二錢半）

右㕮咀每服五錢水二盞姜十片煎八分溫服

省風湯（濟生方）治中風痰涎壅盛口眼歪斜半身不遂

半夏（生用）　防風（各一兩）　甘草（炙半兩）　全蝎（去毒二兩）

白附子（生用）　川烏（生用）　木香　天南星（生各半兩）

右㕮咀每服半兩水一盞姜十片煎七分溫服

省風湯（和劑方）治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胷膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憒一切風證可服

防風（去蘆）　天南星（生用四兩）　半夏（白好者湯泡七次去滑生用）

生甘草　黄芩（去腐各二兩）

右㕮咀每服一兩水二盞生姜十片煎至一盞去渣溫服不拘時

與導痰湯相合煎服尤妙　導痰湯（見痰類）

○廣按此方散風豁痰降火可謂標本兼治者也

滌痰湯　治中風痰迷心竅舌強不能言

南星（姜製）　半夏（湯泡七次各二錢半）　枳實（麩炒二錢）

茯苓（去皮二錢）　橘紅（一錢半）　石菖蒲　人參（各一錢）

竹茹（七分）　甘草（半錢）

右作一服水二鍾生姜五片煎至一鍾食後通口服一

○廣按中風不語雖是痰火上壅如此多有挾虛者此

藥豁痰清熱利氣補虛兼備可謂簡而當者也

三生丸　治痰厥頭痛中風痰涎壅盛者

半夏　白附子　天南星（各等分）

右為末生姜自然汁浸蒸餅為丸如菉豆大每服四五十丸食後姜湯下

青州白丸子（和劑方）治男婦風痰壅盛手足癱瘓嘔吐涎沫及小兒驚風並皆治之

半夏（生用七兩）　天南星（生用二兩）　白附子（生用二兩）

川烏頭（去皮臍生用半兩）

右搗羅為末以生絹袋盛於井花水内擺出未出者更以手揉令出以滓更研再入絹袋擺盡為度於甆盆中日晒夜露每日一換新水攪而復澄春五夏三秋七冬十日去水晒乾如玉片碎研以糯米粉煎粥清為丸如菉豆大常服二十丸生姜湯下不拘時如癱瘓風以温酒送下如小兒驚風薄荷湯下三五丸

加味青州白丸子（百一選方）治卒中風邪半身不遂口眼喎斜痰涎閉塞及小兒諸風並皆治之

白附子　天南星　半夏　川姜（各二兩一云川芎）

天麻　白殭蚕　全蝎（各一兩）　川烏頭（去皮尖半兩）

右並生用為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三五十

丸生姜湯下不拘時如癱瘓風溫酒下小兒驚風薄荷湯下

真方白丸子（瑞竹方）治中風痰涎壅盛口喎不語半身不遂及小兒驚風潮搐初覺中風可常服之永無風疾壅隔之患

大半夏（湯泡七次）白附子（洗淨畧炮）天南星（畧炮）川烏頭（去皮炮）

天麻　全蝎（去毒炒）　木香　枳殼（去穰麩炒各一两）

右為細末生姜汁打糊丸如梧桐子大每二十九食後臨卧茶清熱水下癱瘓風酒下日三服小兒驚風薄荷湯下二九

○廣按此方既是散風豁痰又能利氣比上二方尤為得之

上清白附子丸　治諸風痰甚頭目疼眩旋運欲倒嘔噦惡心恍惚不寧神思昏憒肢体倦痛頸項強硬手足頑麻常服除風化痰清利頭目

白附子（炮）　半夏（湯洗）　川芎　菊花

南星（炮）　殭蚕（炒）　陳皮（去白）　旋覆花

天麻（各一两）　全蝎（炒半两）

右為細末用生姜汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十九食遠生姜湯下

半夏飲　治風痰心腹煩滿嘔吐不欲飲食

半夏（湯洗）　麥門冬（去心）　赤茯苓（去皮）　白朮

桔梗　青皮（去白）　前胡　枇杷葉（去皮炙）

防風　大腹皮（各三分係七錢半）　厚朴（生姜汁製一兩）

右㕮咀每服三錢水一盞生姜三片煎至六分去滓不拘時熱服

龍腦丸　治中風身如角弓反張不語昏悶

龍腦（細研一錢）　麝香（細研）　蟬殼　牛黃（細研各二錢半）

乾蝎（炒）　南星（炮）　硃砂（研）　阿膠（炒）

香墨　白附子（炮）　防風（去芦）　羚羊角屑

肉桂（去皮）　羌活（各半兩）　烏蛇肉（酒浸去皮骨炙黃七錢半）

右為末入別研藥和勻煉蜜和擣三五百杵丸如菉豆大每服十丸用水酒下不拘時

牛黃定志丸　治心經中風精神不寧此藥壓驚鎮心化涎安神

牛黃（研）　龍腦（研）　乾蝎（炒）　殭蚕（炒）

白附子（炮各半兩）　雄黃（研一兩）　丹砂（研二兩）　天麻（酒浸焙）

甘草（炙各一兩）　琥珀（研七錢半）　半夏（湯洗七次焙乾炒黃色用二兩）

麝香（研三錢半）　烏蛇（酒浸去皮骨炙一兩）　南星（牛膽製半兩）

右為細末煉蜜為丸如鷄頭子大每服一丸細嚼荊芥

人參湯下食後臨卧服

琥珀壽星丸　寧神定志去風化痰

天南星一斤掘坑深二尺用炭火三十斤於坑内燒紅取出炭掃净用好酒五升澆之将南星趂熱下坑内用盆急蓋訖泥壅合經一宿開取出焙乾為末入琥珀末一两硃砂末五錢和勻以生姜汁煑糊熟然後入猪心血三具攪勻和末為丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十丸人參湯空心送下日三服神効

搜風丸　治風熱上攻目昏耳鳴鼻塞頭痛眩運及治燥熱上壅痰逆涎嗽心腹痞痛大小便結滯

人參　茯苓　天南星　薄荷（各半两）

藿香葉（二錢半）　乾生姜　白礬（生）　寒水石

半夏（各一两）　蛤粉　黄芩　大黄（各二两）

滑石　牽牛（各四两）

右為末滴水為丸如小豆大每服十丸生姜湯下加至二十丸日三服

○廣按此方治痰與熱兼利大小二便老年常服之藥也

不換金丹　治中風口喎

荊芥穗　白殭蠶　甘草（炙）　防風（各一两）

天麻一兩　川烏頭（生用）　白附子（生用）　羌活（去芦）

細辛（去葉）　川芎　蝎稍（去毒炒）　藿香（各半兩）

薄荷（三兩）

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任下如口喎向左用此藥右腮上塗之便正

三蜈散　治諸風口眼喎斜

蜈蚣（三條用蜜炙一條酒浸一條紙裹煨熟一條）

南星（三箇每箇切作四塊逐箇如蜈蚣法製）　白芷（半兩）

右為細末入真麝香少許熱酒調一錢食後服

牽正散（楊氏方）　治中風口眼喎斜半身不遂

肝肝氣上升為火火無所制火載痰纏遂致不救矣氣也火也痰也其實一源流也為治之法外感者分中血脉中府中臟之異而治之內傷者論是氣是火是痰之的而理之先用開關發之藥次用治本病之劑是也　又按中氣之証亦與中風相類但中風之証身溫有痰涎多不能治中氣之証身凉無痰涎須臾便醒其故何也夫中風中氣一源流也皆由忿怒所致人之喜怒思悲恐五志惟怒為甚所以為病之暴也蓋少壯之人氣血未虛真水未竭適因怒動肝火火畏於水不能上升所以身凉無痰涎然須臾便

醒者水旺足以降火也此名為中氣老衰之人氣血俱虛真水已竭適因怒動肝火火寡於畏得以上升所以身溫有痰涎然多不能治者水竭無以降火也此名為中風　雖然亦有少壯之人而中風不治者男子乃色慾過多下元水虧不能制火女人乃經後產後去血過多不能配氣適因忿怒動火而陽氣無所依附則隨火而發越矣陰也血也豈不為陽氣之根本乎

大烏藥順氣散　治諸風氣手足癱瘓

歸芎地黃芍藥[illegible]地龍　香附縮砂枳

白附子　白殭蠶　全蠍（去毒並生用）

右等分為末每服二錢熱酒調下不拘時

天仙膏（仁存方）　治卒暴中風口眼喎斜

天南星（大一箇）　白芨（二錢）　大草烏頭（一箇）　殭蠶（七箇）

右為末用生鱔血調成膏傅喎處竟正洗去

天南星膏（仁存方）　治證同前

天南星（不拘多少為末）

右用生薑自然汁調左喎貼右右喎貼左如正洗去

一方用草麻子去殼爛搗右喎塗左左喎塗右　或鱔魚血入射香少許塗之即正

治中風口喎灸法

以筆管五寸長插入耳內外以麪密四圍勿使透風一頭以艾灸七壯右喎灸左左喎灸右耳痛亦灸得

又灸法（仁存方）治口喎即灸

耳垂下用麥粒大艾炷灸三壯左喎灸右右喎灸左

○已上諸方豁痰之劑（肥人宜此）

○廣按中風之證有因外感有因內傷昔人言風者外感也東垣言氣河間言火丹溪言痰者內傷也外感者其人內有鬱熱以致腠理疎豁適遇暴風而卒中之也內傷者其人臟腑間有痰下元不虧適因忿怒傷

芩半與防風蘇桔并甘草　乳沒沉香停
姜棗均煎服　諸風氣立通

當歸　芍藥　生地黃　川芎
烏藥　陳皮　地龍　香附子
砂仁　枳殼　黃芩　半夏
防風　紫蘇　桔梗　甘草（各半兩）
乳香　沒藥　沉香（各二錢五分此三味為末煎熟藥加內服）

右用姜棗同煎

換骨丹（宣明方）治癱瘓風中風口眼喎斜半身不遂并一切風癇暗風並宜服之

我有換骨丹傳之極幽秘疎開病者心扶起衰翁臂
氣壯即延年神清目不轉南山張仙翁三百八十歲
槐皮芎朮芷仙人防首蔓十件各停勻苦味香減半
龍麝即少許硃砂作衣纏麻黄煎膏丸大小如指彈
脩合在深房勿令陰人見夜卧服一粒遍身汗津滿
萬病自消除神仙為侶伴

麻黄（煎膏）　仙朮　槐角子（取子）　桑白皮
川芎　香白芷　威靈仙　人参
防風　何首烏　蔓荊子（各一兩）　苦参
五味子　廣木香（各半兩）　麝香（少許研）　龍腦（少許研）
硃砂（研為衣不拘多少）

右為末桑白単搗細秤以麻黄膏和就杵一萬五千下每兩分作十丸每服一丸以硬物擊碎温酒半盞浸以物蓋不可透氣食後臨卧一呷嚥之衣蓋覆當自出汗即差（和胃湯調補）及避風寒茶下半丸蓋出汗入膏時如稠再入水少許煎動入藥唯少為妙其麻黄膏不可多其麻黄膏煉法見前

續命丹　一名神授保生丹

治男子婦人左癱右瘓口眼喎斜半身不遂失音不語遍身疼痛打撲傷損外感風邪及諸風癇暗風角弓反

張目睛上視搐搦無時但患風疾皆可服之

天南星（用米泔水浸七日每日換水削去皮臍薄切曬乾寒天加二日六兩）

川烏頭（清水浸七日每日換水去皮臍薄切曬乾寒天加二日六兩）

草烏頭（製法與前同去皮臍尖六兩）

五靈脂（清水淘去沙石曬乾用姜汁浸曬十日每日添姜汁直候其色轉黑曬乾六兩）

地龍（去土水洗淨曬乾四兩）　滴乳香（研）　沒藥

白殭蚕（鉄鐺炒絲斷淨去足嘴）　羌活　天麻（各二兩）

全蝎（去毒曬乾生用）　白附子（生用）　辰砂（研）　輕粉（研）

雄黃（研各一兩）　片腦（研一錢半）　麝香（研一兩二錢五分）

右為細末用姜自然汁煮糯米飯搜和作劑扵石臼内杵五千下丸成錠子曬乾以瓦罐收貯每服一錠生姜自然汁和好酒一盞磨化臨卧通口熱服以衣被厚蓋汗出為度服藥後忌諸動風之物三七日

○廣按癱瘓之証因虛而痰火流注為病當時遇治為妙若失之於初痰火停久便成鬱鬱久便生火火能傷氣耗血而病猶難治矣若疼痛則為實用疎通関節之藥而以服麝少許為引經如劉河間換骨丹之類可取效也其續命丹雖相倣換骨丹然麝香似乎太多耗散真氣必矣後人脩合此藥當知減去麝香為美若不疼痛則為虛服此疎通関節之藥亦要兼

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

服補氣血藥如左癱每日服四物湯一劑右瘓每日服四君子湯一劑如此則攻補兼施而癱瘓可愈矣

（其腦麝乃引經之藥龍腦既是一錢五分想射香只是一錢二分五厘恐傳寫之誤也）

腦麝祛風丸 治左癱右瘓最效

白花蛇（頭一箇帶頸三寸酒浸炙） 烏稍蛇（尾二箇長七寸酒浸炙）

川烏尖（七箇去黑皮） 附子底（四箇去黑皮）

南星（炮） 半夏（姜製） 白附子 防風

細辛 天麻 全蝎（去毒炒） 殭蚕（炒去嘴絲）

草烏（炮各半兩） 片腦（一分研） 射香（一分研）

右為細末生姜汁糊為丸如梧桐子大每服五十丸煎

小續命湯下

家寶丹 治一切風疾癱瘓痿痺不仁口眼喎斜者邪入骨髓可服

川烏 南星 五靈脂（姜汁製另研）

草烏（各六兩） 白附子 全蝎 没藥

乳香 辰砂（各二兩） 羗活 殭蚕（炒各三兩）

片腦（半兩） 天麻（三兩） 麝香（二錢半） 地龍（四兩）

雄黃 輕粉（各一兩）

右為末作散調三分不甆調五分或蜜丸如弹子大含化茶酒送

白龍丹　治男子婦人諸般風（症）左癱右瘓半身不遂口眼喎斜肩背疼痛手足頑麻語言謇澁行步艱難遍身瘡疥上攻頭目耳内蟬鳴痰涎不利皮膚瘙痒偏正頭疼一切諸風並皆治之

川芎　防風（各十二兩）　滑石（一斤）　草烏（十兩生用）

兩頭尖　甘草（各八兩）　川烏　桔梗

寒水石（各四兩）　何首烏（二兩四錢）　茴香（一兩七錢）　廣木香（一兩半）

地骨皮（一兩七錢）　白芨（一兩四錢）　藁本

甘松　白芷　香附子　良姜

薄荷　當歸　白芍藥　羌活

川椒（去子炒）　零陵香　藿香葉　全蝎（不炒）

細辛　荊芥穗　甘菊花　麻黄（去根各一兩）

人參　升麻　天麻　殭蚕（炒斷絲）

乾葛（各七錢）　蘄州白花蛇（一條去頭尾酒浸三日去骨皮將肉焙乾為末）

烏稍蛇（一條同上）　麝香（一錢同滑石為衣）　豆粉（四兩為糊出）

白麪（半斤蛇酒為糊出）

右四十一味為末蛇酒打糊為丸如彈子大滑石為衣晒乾收用每服一丸臨卧茶清或酒化服忌諸熱性物

○廣按丹溪曰予每治病用東垣之藥效仲景處方庶品味數少則藥方專精今白龍丹用四十一品藥可

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

謂大繁矣幸而有君臣佐使之分有二蛇可杖似可用爾

神効活絡丹　治風濕諸痺肩臂腰膝筋骨疼痛口眼喎斜半身不遂行步艱辛筋脉拘攣能清心明目寬膈宣通氣血年逾四十預服十數丸至老不生風病

白花蛇（二两酒浸焙乾）　烏稍蛇（半两酒浸焙乾）

麻黄（二两去節）　細辛（一两去土）　全蝎（一两半去毒）　两頭尖（二两酒浸）

赤芍藥（一两）　貫芎（二两）　防風（二两半）　葛根（一两半）

没藥（一两另研）　血竭（七錢半另研）　硃砂（一两另研）　烏羊屑（半两）

地龍（半两去土）　甘草（二两去皮炙）　丁香（一两去枝）　白殭蚕（一两炒）

乳香（一两研）　麝香（半两研）　片腦（一錢半另研）　官桂（二两去粗皮）

草豆蔲（二两）　川羌活（二两）　虎脛骨（一两酥炙）　玄參（一两）

牛黄（二錢半另研）　天麻（二两）　威靈仙（一两半酒浸）

藿香（二两去土）　天竺黄（一两）　敗龜板（一两炙）　人參（一两）

何首烏（二两）　白芷（二两）　烏藥（一两）　安息香（一两）

青皮（一两）　黑附子（一两去皮泡）　香附（一两）

白豆蔲（一两）　骨髓補（一两）　黄連（二两）　茯苓（一两）

黄芩（二两）　白术（一两）　熟地黄（二两）　松香脂（半两）

大黄（二两）　當歸（一两半）　木香（二两）　沉香（二两）

金箔（為衣）

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼溫酒茶清漱下隨證上下食前後服頭風擂茶下

側子散　治中風手足不隨言語蹇澁今用累効

側子（炮一兩）　附子（炮）　羅參　白术（煨）

白茯神（去皮）　肉桂　赤芍藥　當歸（去芦酒浸）

川芎　秦艽（去芦土各一兩）　防已（七錢半）　防風

麻黃　粉草（炙各五錢）　甘菊花（去梗）　北細辛（去苗）

白茯苓（去皮各二兩）

右㕮咀每五錢水一盞半姜三片棗一枚煎服不拘時

〇廣按用藥治病之法寒因熱用熱因寒用正治也今中風癱瘓之證本風火陽邪而用烏附等熱藥治之何哉蓋中風癱瘓乃痰死血結滯於臟腑經絡之間非烏附等熱藥而能開散流通之乎此非正治乃從治也書云從少從多各觀其事則從治之藥只可為引經而已丹溪云肥白人多濕少用烏附行經是也此方既用附子又用側子官桂助之其理安在哉本散削去始存以待肥白多濕之人減而用之中病則已不可過服非肥白多濕之人不可用也

烏荊丸（和劑方）　治諸風緩縱言語蹇澁遍身頑麻皮膚瘙痒又治婦人血風頭疼眩暈如腸風臟毒下血不止服

之尤効

川烏（炮去皮臍一兩）　荊芥穗（二兩）

右為末醋煑麪糊丸如梧桐子大每服二十丸温酒熱水任下

烏附丸（澹寮方）去風暖氣

川烏二十箇　香附子（半斤姜汁浸一宿炒）

右焙為末酒糊為丸梧子大每服十數丸酒下肌体肥壯及有風疾宜服

烏龍丸（秘方）治諸風

烏頭（三兩）　天南星　半夏麪　殭蚕（炒）

烏藥　白膠香（另研各半兩）

右為末酒糊梧桐子大每服四丸空心酒下

四生丸（簡易方）治中風左癱右瘓口眼喎斜

川烏（去皮）　五靈脂　當歸尾　骨碎補（各等分）

右為末用無灰酒打麪糊丸如梧桐子大每服十丸加至十五丸温酒下服此藥不可服靈宝丹

如聖散　治左癱右瘓半身不遂口眼喎斜腰膝疼痛手足頑麻語言蹇澁行止艱難偏身瘙癢上攻頭目耳内蟬鳴痰涎不利皮膚瘡癬偏正頭疼一切諸風及破傷風角弓反張蛇傷犬咬金瘡諸風滋等瘡並皆治之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

川烏　草烏　蒼术（各四兩）金釵石斛（一兩）

白芷　川芎（[illegible]）細辛　當歸

防風　麻黄　荊芥　何首烏

全蝎　天麻　藁本（各五錢）甘草（三兩）

人參（三錢）　两頭尖（一錢）

右為細末每服一錢臨卧用温茶或温酒少許調下切不可多飲酒服藥後忌一切熱物飲食一時恐動風氣服藥覺有麻是効也亦可敷貼

神仙飛步丹　治諸風濕癱瘓等証

蒼术（八兩）　草烏（四兩不去皮尖）　川芎　香白芷（各一兩）

右用生姜連鬚葱各四两搗爛和藥末拌匀以磁器盛藥於内紙封勿令出氣春三夏二秋五冬七日取出晒乾或焙乾與姜葱同為細末醋糊丸如梧桐子大每服十五丸空心茶酒任下忌發熱之物加至二十丸孕婦勿用

仙傳黑虎丹　治男子婦人虚弱血氣衰敗筋骨寒冷外感風濕傳於經絡手足麻木腰腿疼痛久則偏枯左癱右瘓口眼喎斜諸中風氣不能行履並皆治之

蒼术（米泔水浸二宿去皮切作片）　草烏（洗浄去皮切作片）

生姜（洗浄擂碎各一斤）　葱（連鬚葉白搗碎半斤）

右四味和一處拌勻罨之春五日夏三日秋七日冬十日每日一番拌勻候日數足晒乾

五靈脂（洗淨） 乳香（研） 沒藥（研各五錢） 穿山甲（火煨存性二兩）

自然銅（火煨醋淬七次一兩）

右同前藥為末用好醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心熱酒送下間日服尤妙婦人血海虛冷肚腹疼痛臨卧醋湯下止服二三十丸不可多服服後不可飲冷水冷物但覺麻木為效孕婦不可服

虎脛骨酒（济生方）治中風偏枯四肢不隨一切諸風攣拳者並治之

石斛（去根） 石楠葉 防風（去芦） 虎脛骨（炙）

當歸（去芦） 茵芋葉 杜仲（去粗皮炒絲斷） 牛膝（川者去芦）

川續斷 川芎藭 金毛狗脊（燎去毛）

川巴戟（去心各一兩）

右件剉如豆大以絹囊盛藥用無灰好臘酒一斗漬之十日後每服一盞有量服二三盞溫服

○廣按中風之証本風火陽邪宜用辛凉之劑以治之而中風成癱瘓既久者乃痰火拂鬱於辛凉藥中若無香熱之藥為之向導則將扞格而不能入也古方中或用腦射或用烏附或用酒浸正此意耳後人不

諸方中既有烏附腦射而又用酒浸不無積薪救火乎夫大寒凍海惟酒不氷其性寒飲熱飲今觀虎脛骨酒用藥辛凉最合其宜故特録之以為矜式若夫治風藥與補虛藥中如無烏附腦射皆可用浸酒假酒行藥勢及便於服餌也

舒筋保安散　治左癱右瘓筋脉拘攣身体不遂脚腿少力乾濕脚気及濕滞經絡走注疼痛久不能去用此宣通則愈

木瓜（五两）　萆薢　五靈脂　牛膝（酒浸）

續断　白殭蚕（炒）　松節　白芍藥

烏藥（去木）　天麻　威靈仙　黄芪

當歸　防風　虎骨（酒炙各一两）

右用無灰酒一斗浸上藥二七日紧封扎罎口待日數足取藥焙乾搗為細末每服二錢用藥酒半盞調下如酒盡用米湯調下　又方金毛狗脊一两却將乳香白膠香各一两同研入乾藥末内

一方　治風癱不能行動

防風（去芦）　萆薢　當歸　桔梗

敗亀板　虎骨　川牛膝　枸杞

秦艽　晚蚕沙（炒黄色）　羗活　乾茄根（飯上蒸過）

蒼朮（炒七次搥碎）　蒼耳子　五加皮各二两

右剉碎用絹袋盛藥以無灰酒一斗浸罎內密固煮滚封七日開取時不可以面向罎口恐藥気冲眼每日早午晚間病人自取酒一小盞服之不許多服病瘥藥盡以藥粗晒乾研為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸酒送下日三服忌食動風物

○廣按已上二方浸酒亦妙亦不讓於虎脛骨酒矣

靈應丹　治癱瘓四肢不举風痺等疾

用麻黃五斤去根節剉一寸取河水五斗以無油膩鍋煮至一斗以來漉去麻黃冷定用細羅子濾去滓取清者鍋內再熬成膏

白芷　桑白皮　蒼朮　甘松

浮萍各二两　川芎　苦參各三两

右為細末以麻黃膏為丸如彈子大每服一丸溫酒化下臨卧服隔二三日再服手足即時輕快及治卒中風邪涎潮不利小兒驚風服之立効但熬時要勤攪勿令着底焦了熬膏時忌雞犬婦人見之

全生虎骨散（簡易方）　治半身不遂肌肉乾瘦名曰偏枯忌用麻黃發汗恐津液枯竭惟當潤筋去風

當歸一两半　赤芍藥　川續斷　白朮

藁本　虎骨（各一兩）　烏蛇肉（半兩）

右為末每服二錢溫酒食後調下骨中疼痛加生地黃一兩臟寒自利者加天雄半兩

安魂琥珀丹　治中風左癱右瘓口眼喎斜心神不寧

天麻　川芎　防風　細辛
白芷　羌活　川烏（炮去皮臍）　荆芥穗
殭蚕（各一兩）　薄荷葉（三兩）　全蝎　粉甘草
藿香　硃砂（細研水飛各半兩）　麝香
珍珠　琥珀（各一錢）

右為細末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣空心茶清或酒送下一丸若蛇傷狗咬破傷風牙関緊急先用一擦牙後用茶清調下一丸如小兒初覺出痘疹即用茶清調一丸與服大能安魂定魄及疎風順氣

〇已上諸方治癱瘓之劑

〇預防中風（新增　出乾坤生意）

附諸賢論

夫聖人治未病之病知未來之疾此其良也其中風者必有先兆之證覺大拇指及次指麻木不仁或手足少力或肌肉微掣者此先兆也三年內必有大風之至經云急則治其標緩則治其本宜調其榮衛先服八風散愈

風湯天麻丸各一料為効宜常服加減防風通聖散預防其病則風疾不作而獲其安矣

愈風湯　初覺風動服此不致倒仆此乃治未病之聖藥也　又治中風症內邪已除外邪已盡當服此藥以行導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此乃常治之法也久則清濁自分榮衛自和矣

羌活　甘草　防風　當歸

蔓荊子　川芎　細辛　黄芪

枳殼　人參　麻黄　香白芷

甘菊花　薄荷　枸杞　柴胡

知母　地骨皮　獨活　杜仲

秦艽　黄芩　芍藥（各三两）　石膏

蒼朮　生地黄（各四两）　肉桂（一两）

右剉每服一两水二鍾生姜三片煎空心服臨卧煎滓服　空心一服呑下二丹丸謂之重劑臨卧一服呑下四白丹謂之輕劑立其法是動以安神靜以清肺　假令一氣之微汗用愈風湯三两加麻黄一两匀作四服加生姜空心服以粥投之得微汗則佳　如一旬之通利用愈風湯三两加大黄一两亦匀作四服如前服臨

卧服得利為度此藥常服之不可失四時之輔　如望春大寒之後本方中加半夏人參柴胡各二兩通前四兩謂迎而奪少陽之氣也　如望夏穀雨之後本方中加石膏黃芩知母各二兩通前四兩謂迎而奪陽明之氣也　季夏之月本方中加防己白朮茯苓各二兩通前四兩謂勝脾土之濕也　望秋大暑之後本方中加厚朴二兩藿香二兩桂一兩通前四兩謂迎而奪大陰之氣也　望冬霜降之後本方中加附子官桂各一兩當歸二兩通前四兩謂勝少陰之気也　如得春気候減冬所加四時類此此雖立四時加減更宜臨病之際叅察虛實寒熱土地之宜邪気多少此藥具七情六欲四気無使五臟偏勝及不動於榮衛如風秘服之永不結滯此藥與天麻丸相為表裏治未病之聖藥也若已病者更宜常服無問男女老幼驚癇搐搦急慢驚風四時傷寒等病服之神効

四白丹　能清肺気養魄謂中風者多昏冒気不清利也

白朮　砂仁　白茯苓　香附

防風　川芎　甘草　人參（各半兩）

白芷（一兩）　羌活　獨活　薄荷（各二錢半）

藿香　白檀香（各一錢五分）　細辛

知母（各二錢）　甜竹葉（三兩）　麝香（一錢另研）　龍腦（另研）

牛黃（另研各半錢）

右為末煉蜜丸每兩作十丸臨卧嚼一丸分五七次細嚼之煎愈風湯嚥下能上清肺氣下強骨髓

二丹丸　治健忘養神定志和血內以安神外華腠理

丹參　天門冬　熟苄（各一兩半）　甘草

麥門冬　白茯苓（各一兩）　人參　遠志

菖蒲　硃砂（研為衣各半兩）

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸至百丸空心服食前煎愈風湯送下

天麻丸　治風因熱而生熱勝則動宜以靜勝其躁是養血也

天麻　牛膝（二味用酒同浸三日焙乾）　萆薢

玄參（各六兩）　杜仲（炒斷絲七兩）　附子（炮一兩）　羌活（十四兩）

川歸（十兩）　生苄（一斤）

一方有獨活五兩去腎間風

右為末蜜丸如梧桐子大每服五七十丸空心溫酒白湯皆可下

加減防風通聖散　預防風疾常服取効

防風　川芎　當歸　芍藥

薄荷　麻黃　連翹（各半兩）　黃芩
桔梗（各二兩）　甘草（二兩）　荊芥　白朮（各二錢半）
烏藥　羌活　天麻　殭蠶
体虛気弱者磨木香　痰涎壅盛者加南星半夏枳
實

每服六錢水一盞半生姜三片煎服

牛黃清心丸（和劑方）治諸風緩縱不隨語言蹇澁心怔徤忘恍惚去來頭目眩冒胷中煩欝痰涎壅塞精神昏憒又治心気不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘慼虛煩少睡喜怒無特或發狂顛神情昏亂

白芍藥（一兩半）　羚羊角末（一兩）　人參（去芦二兩半）　芎藭（一兩二錢半）
白茯苓（去皮一兩二錢半）　防風（去苗一兩半）　阿膠（炒一兩七錢）
乾姜（炮七錢半）　白朮（一兩半）　牛黃（一兩二錢半）　麝香（研一兩）
犀角末（二兩）　雄黃（研飛八錢）　龍腦（研一兩）　當歸（去芦一兩半）
金箔（一千二百片内四百片為衣）　柴胡（去苗一兩二錢半）
甘草（剉炒五兩）　乾山藥（七兩）　麥門冬（去心一兩半）
桔梗（一兩二錢半）　杏仁（去皮尖取仁麩炒黃一兩二錢半別研）　黃芩（去腐一兩半）
神麯（研二兩半）　大棗（一百個蒸熟去皮核研成膏）　白歛（七錢半）
蒲黃（二兩半炒）　大豆黃卷（一兩七錢半炒）　肉桂（一兩七錢半去皮）
右除棗杏金箔二角末及牛黃麝香雄黃龍腦四味別

為細末入餘藥和勻煉蜜（并）棗膏為丸每兩作十丸以金箔為衣每服一丸食後溫水化下小兒驚癇即酌度多少以竹葉湯或溫酒化下

金箔牛黃丸　治風邪除熱（中下）

金箔十片（研）　牛黃（研）　龍腦（各一兩研）　犀角（鎊）

琥珀（研）　人參（各二錢半）　丹砂（水飛研）　白茯苓（去皮各二兩）

天麻　白花蛇（酒浸去皮骨炙各半兩）　白附子（炮）

殭蚕（炒）　（去絲）

右為細末入別研藥和勻煉蜜和搗二千杵丸如櫻桃大以金箔為衣每服一丸細嚼溫酒或溫薄荷湯下茶湯亦可常服半丸不拘時候

一方　治風病不愈者此藥寧心定志

人參　菖蒲　茯神（去木各等分）

每服五錢水一鍾生姜三片煎六分溫服

搜風順氣丸（聖惠方）　治腸胃積熱以致膈間痞悶大便結燥小便赤澁腸風痔漏腰膝酸疼肢節頑麻手足癱瘓行步艱辛語言蹇澁三十六般風及七十二般氣無不治之此藥宣通氣血清熱潤燥通利大小便則諸病自愈

車前子（一兩半）　白檳榔　大麻子（微炒去殼另研）

兎絲子（酒浸焙乾） 牛膝（酒浸一宿） 乾山藥（各二兩） 枳殼（去穰麩炒）
防風（去芦） 獨活（各一兩） 郁李仁（湯泡去皮研）
大黃（五錢半生半熟）

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服一十丸茶酒米飲任下早晨臨卧各一服久覺大腸微動以羊肚肺羮補之此藥膏粱之家肥甘太過以致大便結燥尤宜服之老人大腸無血大便結燥最宜

還奇湯　治眉骨痛不可忍此乃風疾先兆也

羌活 防風（各三錢） 甘草（二錢夏用生冬月炒）
黃芩（酒製冬月不可用熱甚可用）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食後時時温服免致風動倒仆

八風散　見風熱

（灸法）風池 百會 曲池 合谷 肩髃 風市 絶骨 環跳 三里等穴皆可灸之

傷風　二

（胃風同治）

乙集

丹溪心法

〇傷風屬肺者多宜辛溫或辛凉之劑散之

戴云新咳嗽鼻塞聲重者是也

附諸方

桂枝湯　治太陽經傷風頭疼身痛或翕翕發熱或洒洒惡風自汗（無汗者不可服）

桂枝　芍藥（各三兩）　甘草（炙一兩）

右㕮咀每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分去滓溫服不拘時候惟春初可依此方自春末夏至巳前宜加黃芩半兩夏至後宜加知母半兩石膏二兩或升麻半兩若病人素虛寒不用加減

神术散（和劑方）治四時瘟疫頭痛發熱及傷風鼻塞聲重

蒼朮（米泔浸五兩）　藁本（去土）　香白芷　細辛（去葉土）

羌活（去芦）　川芎　甘草（炙各二兩）

右為細末每服三錢水一盞姜三片葱白三寸煎七分溫服不拘時如傷風鼻塞用葱茶調下二錢

定風餅子（簡易方）治風客陽經邪傷腠理背膂強直言語蹇澁體熱惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵及飲酒過多嘔吐涎沫頭目暈眩常服消風去邪

川烏　南星　川芎　乾薑

甘草　半夏　天麻　白茯苓（各等分生用）

加白附子

右為末姜汁丸如龍眼大作餅子生硃砂為衣每服一餅細嚼熱生姜湯下不拘時

荆芥丸（楊氏方）治一切風邪上攻頭目咽膈不利或傷風發熱頭疼鼻塞聲重並皆治之

荆芥穗（二兩）　天麻　附子（炮）　白附子（炮）

烏藥　當歸（酒洗）　川芎

右為末煉蜜丸每一兩作十丸硃砂為丸食後細嚼茶吞下

○賡按已上二方治風邪客於經絡既久正邪交攻遂成風痰欝熱变見諸症故用辛温之劑以開發之乃從治之法也

○已上數方辛温發散之劑

金沸草散（和劑方）治肺經受風頭目昏痛咳嗽声重涕唾稠粘及治時行寒疫壯熱悪風

旋覆花（去梗二兩）　荆芥穗（四兩）　麻黄（去節）　前胡（去芦各三兩）

甘草（炙）　赤芍藥　半夏（湯洗七次姜汁浸各一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎八分温服

参蘇飲（和劑方）治感冒風邪發熱頭疼咳嗽声重涕唾稠粘此藥大觧肌熱寬中快膈或欬或勞瘵潮熱往來並

餘治之

木香　紫蘇葉　乾葛　半夏（湯泡七次姜製）

前胡（去苗）　人參（去芦）　茯苓（去皮各七錢半）　枳殼（去穰麩炒）

桔梗（去芦）　甘草（炙）　陳皮（去白各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜七片棗一枚煎六分去滓熱服不拘時（易簡方以氣盛不用木香）

冲和散（簡易方）治感冒風濕之氣頭目不清鼻塞声重肢躰倦怠欠伸出淚

蒼朮（米泔浸炒六兩）　荊芥穗（二兩）　甘草（一兩一錢半）

右㕮咀每服五錢水一盞煎八分去滓熱服不拘時

消風百解散（和劑方）治四時傷寒頭疼發熱惡寒及風壅咳嗽鼻塞聲重

荊芥　白芷　陳皮（去白）　麻黄（去節）

蒼朮（各四兩）　甘草（炙二兩）

右㕮咀每服五錢水一盞姜三片葱白三莖煎七分不拘時如咳嗽再加烏梅煎

川芎茶調散（和劑方）治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重

薄苛（去梗不見火八兩）　川芎（四兩）　羌活（二兩）

甘草（二兩）　細辛（去葉一兩）　防風（去芦一兩半）　白芷（二兩）

荊芥（去梗四兩）

右為細末每服二錢食後茶清調下常服清頭目一方無細辛

消風散（和劑方）治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻囔声重耳作蟬鳴及皮膚頑麻瘙痒癮疹婦人血風頭皮腫痒並皆治之

荊芥穗　甘草（炒各二兩）　陳皮（去穰洗焙半两）　人參（去芦）
茯苓（去皮用白者）　白殭蚕（炒）　防風（去芦）　芎藭
藿香葉（去梗）　蟬蛻（去土炒各二兩）　厚朴（去粗皮半兩薑製）
羌活（一兩）

右為細末每服二錢感風頭痛鼻流清涕者用荊芥湯茶清調下遍身瘡癬溫酒下

大辰砂丸（御藥院方）清頭目化痰涎及感冒風寒聲重頭目昏眩項背拘急皮膚瘙痒並皆治之

天麻（去苗一兩）　防風（去芦二兩）　細辛（去苗葉土半兩）　薄荷葉（半兩）
川芎（一兩）　甘草（炙一兩）　吴白芷（一兩）　硃砂（一兩為衣）

右以七味為細末煉蜜丸如彈子大硃砂為衣每服一丸細嚼食後生姜湯下茶清亦可

已上數方辛平發散之劑

人參敗毒散（和劑方）　治傷寒頭痛壯熱惡寒及風痰咳

嗽鼻塞聲重如心經蘊熱口舌乾燥者加黃芩

柴胡（去苗）　甘草（炙）　桔梗　人參（去芦）

羌活（去苗）　芎藭　茯苓（去皮）　枳殼（去穰麸炒）

前胡（去苗洗）　獨活（去芦各等分）

右㕮咀每服三錢水一盞姜三片薄荷少許同煎七分去渣温服

葱白散（和劑方）治四時傷寒頭痛壯熱肢躰煩疼小便赤澁及傷風鼻塞咳嗽痰涎山嵐瘴氣並皆治之

川芎　蒼术（米泔浸）　白术（各二兩）　麻黃（去根節三兩）

甘草（炙）　石膏[illegible]　乾葛（各一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞姜三片葱白二寸煎七分熱服不拘時如欲汗井進數服

羌活散（和劑方）治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘急及風邪寒壅頭痛項強鼻塞聲重肢節煩疼天陰風雨預覺不安

前胡（去芦）　羌活（去芦）　麻黃（去根節）　白茯苓（去皮）

川芎　黃芩　甘草（炙）　蔓荊子（去白皮）

枳殼（去穰麸炒）　細辛（去苗）　石膏（另研）　菊花（去梗）

防風（去芦各一兩）

右㕮咀每服一兩姜四片薄荷三葉水二盞煎至一盞

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

去楂温服

羌活丸（御藥院方）治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滞遍身拘急及風邪塞壅頭痛項強鼻塞聲重肢節煩疼天陰先覺不安

羌活（去芦）　甘菊花（去梗）　麻黄（去根節）　川芎

防風（去芦）　石膏（[illegible]）　前胡（去芦）　黄芩

細辛（去葉）　甘草（炙）　枳殼（去穰麩炒）　白茯苓（去皮）

蔓荊子（去白皮）各一兩　硃砂（一兩五錢為衣）

右為末水糊丸梧子大每服四十丸食後姜湯下

已上數方辛涼發散之劑

中寒 二

乙集

丹溪心法

主乎温散　有卒中天地之寒氣者有口得寒物者從補中益氣湯中加發散藥屬內傷者十居八九其法邪之所湊其氣必虛只用前湯中從所見之証出入加減必先用參芪托住正氣　氣虛甚者少加附子以行參芪之劑如果氣虛者方可用此法若胃氣大虛必當温散理中湯相宜甚者加附子　倉卒感受大寒之氣其病即發

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

非若傷寒之邪循經以漸而深也

戴云此傷寒謂身受肅殺之氣口傷生冷之物因胃氣大虛膚腠踈豁病者脉沉細手足厥冷息微身倦雖身熱亦不渴倦言動者是也宜急温之遲則不救矣與熱証若相似而實不同凡脉數者或飲水者煩燥動揺者皆熱病寒熱二証若水火然不可得而同治誤則殺人

附諸方

生料五積散（和劑方）治感冒寒邪頭疼身痛項強拘急惡寒嘔吐或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷外感風寒及寒温客于經絡腰脚酸疼及婦人經滯腹痛並皆治之

蒼朮（米泔水浸去粗皮二十四兩） 桔梗（去芦十二兩） 陳皮（去白）
麻黃（去根節） 枳殼（去穰麩炒合六兩） 厚朴
乾姜（各四兩） 白芷 川芎 甘草（炙）
茯苓（去皮） 肉桂 芍藥 當歸（各三兩）
半夏（湯泡二次）

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜三片葱白三根煎七分熱服冒寒用煨姜挾氣加呉茱萸婦人調經則入艾醋

廣按此藥氣味辛温發表温中開鬱行氣有殊功去

寒、温之聖藥也夫寒、温屬陰熱燥屬陽人之為病不過二者而已矣善用藥者以苦寒而瀉其陽以辛温而散其陰病之不愈者未之有也予嘗以防風通聖散為瀉熱燥之藥也生料五積散為散寒温之藥也不識明哲以為何如

正氣散（和劑方）治傷寒陰証憎寒惡風正氣遂冷

半夏　厚朴（各三兩並為末以生姜四兩研爛同為餅子微炒）

甘草（炒七錢）　藿香葉（二）　白术　陳皮（各一兩）

右為細末每服三錢生姜三片棗一枚水一盞煎七分食前稍熱服常服順氣寬中辟除瘟疫

理中湯（和劑方）治臟腑中寒口噤失音四肢強直兼治胃脘停痰冷氣刺痛

人參　乾姜（炮）　甘草（炙）　白术（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞煎服三因方加附子名附子理中湯

姜附湯（和劑方）治中寒昏不知人身躰強直口噤不語逆冷及腹臍冷痛霍亂轉筋一切虛寒並皆治之

乾薑（一兩）　附子（生去皮臍細切一枚）

右㕮咀每服三錢水一盞半煎七分食前温服　挾氣不仁加防風一錢　挾濕加白术　筋脉牽急加木瓜

肢節痛加桂二錢

四逆湯（和劑方）治傷寒自利脉微欲絶手足厥冷（四逆名者四肢逆冷也）

甘草（炙二兩）　乾姜（一兩半）　附子（去皮臍半兩）

右㕮咀每服五錢水一盞煎七分溫服不拘時

白术散（活人方）治陰毒傷寒心間煩燥四肢逆冷

川烏（炮去皮臍）　桔梗（去芦）　白术　附子（炮去皮臍）

細辛（各一兩）　乾姜（炮半兩）

右爲末每服二錢水一盞煎六分熱服不拘時

三建湯

大川烏　附子　天雄（並炮等分）

右剉每四錢水二盞姜十五片煎服

霹靂散

川附子一枚及半兩者炮熟取出用冷灰培之細研入真臘茶一大錢同和分二服每服水一盞煎六分臨熟入蜜半匙放溫服之

真武湯　治傷生冷飲食數日以後發熱腹痛頭目昏沉四肢疼痛大便自利小便或利或澁或嘔或咳並宜服之或已經發汗不解仍發熱者心下悸頭眩暈肉瞤動振振欲擗地者此由飲食停留中脘所致

白茯苓　白芍藥　白朮（各一兩）　附子一枚（炮）

每服水一鍾半生薑五片煎食前温服小便利者去茯苓大便利者去芍藥加乾姜咳加五味子細辛乾姜嘔去附子加生姜汁

搐鼻奪命散（德生堂方）　治陰証及中風不省人事大効

一方無細辛名通神散

藜蘆（二錢去芦）　川芎（二錢半）　穀精草　石菖蒲

東平薄荷　頭荊葉（各二錢）　細辛（二錢半）

右為細末先令患者喫葱茶一盞後噙水在口次以蘆管吹藥入鼻中即時痰嚔涕噴見効

一方葱熨法（秘方）　治陰証用葱白一大握如茶盞大用紙捲緊却以快刀切成一指厚片安於臍中以熱熨斗熨之待汗出為度一片未効再切一片熨之服後藥

胡椒（五錢）　滑石（煅七次五錢）　射香一錢

右為末酒調服之神効

治陰毒傷寒　用烏豆一合炒令黒烟起入水中煎三五沸服候汗出回陽立瘥

灸法　臍下一寸五分氣海二寸石関三寸関元皆可灸

補中益氣湯（見內傷）

傷寒　四　新增　附冒寒　温熱病

附諸賢論

心法曰凡証與傷寒相類者極多皆雜証也其詳出内經熱論自長沙以下諸家推明甚至千世之下能得其粹者東垣也其曰内傷極多外傷間而有之此發前人之所未發後人徇俗不能真切雷同指為外傷極謬其或可者蓋亦因其不敢放肆而多用和解及平和之藥散之爾若粗率者則必殺人切有感冒等輕証不可便認作傷寒妄治西北二方極寒肅殺之地故外感甚多東南二方温和之地外傷極少雜病亦有六經所見之証大世俗混而難别

賡按真傷寒證自冬至已後春分已前天氣嚴肅人之内有鬱熱者以致腠理踈豁加以不謹則傷於寒然謂之傷寒者乃寒氣自表入中自中入裏即病之名也何以明之人之平時榮衛周流無少間斷一旦邪氣入内阻碍正氣不得流行鬱而為熱仲景先師治此證在表發汗在中和解在裏攻下隨其所而驅散之不過使邪熱退而正氣復行也况人之經絡三陽三陰分布一身（太陽少陰經在身之後陽明太陰經在身之前少陽厥陰經在身之側）邪之所轉豈有定所黄仲理先生云風寒六氣之邪傷人或入於陽經或中於陰絡孰為之先孰為之後

爲可專以太陽爲受邪之始故各經皆能受邪但太陽經受邪居多爲差等爾以此觀之六經皆能受邪故取仲景六經見證七方發散以先之夫陰經受邪不復傳變惟用前方温經散寒而已陽經受邪傳入半表半裏又取小柴胡湯一方和解以繼之邪傳於裏理宜攻下又取大柴胡湯調胃承氣大小承氣湯四方以繼之此治真傷寒表中裏三證之大畧也然真傷寒證傳變不一其數滿百此外有傷風有兩感有三陽合病三陽併病春温夏熱暴寒時疫剛痓柔痓風温溼温風温中溼温毒中暍瘴氣温瘧諸證諸

方及傷寒六經傳盡七日當愈然猶未愈者謂之雜證不可枚舉仲景先師治傷寒三百九十七法一百一十三方變故無窮豈曰易哉學者宜於陸氏傷寒類證便覽陶氏傷寒六書求之此非廣所能周知亦非此書所能悉載也歟

附脉理

脉訣舉要曰寒傷太陽脉浮而濇及傳而變名狀難悉陽明則長少陽則弦太陰入裏遲沉必兼及入少陰其脉遂緊厥陰熱深脉伏厥冷在陽當汗次利小便表解裏病其脉實堅此其大畧治法之正至於大法自有仲景

傷寒有五脉非一端陰陽俱盛緊濇者寒陽浮而滑陰濡而弱此名傷風勿用寒藥陽濡而弱陰小而急此非風寒乃濕溫脉陽脉浮滑陰脉濡弱或遇於風變成風濕陽脉洪數陰脉實大更遇濕熱變成濕毒陽脉濡弱陰脉弦緊更遇濕氣變為濕溫陰陽俱盛重感於寒变為溫瘧同病異名同脉異經

附諸方

麻黄湯　治傷寒惡風寒發熱身疼無汗

麻黄（六錢）　桂枝（四錢）　甘草（炙三錢）　杏仁（二十箇）

右㕮咀水煎如法服

按此太陽經藥也

葛根湯　治傷寒惡寒項背強几几無汗惡風或下利

葛根（四錢）　麻黄　生姜（各三錢）　桂枝　芍藥（各二錢）

甘草（炙二錢）　大棗（三枚）

右㕮咀水煎如法服之

按此出太陽例陽明藥也

茈胡桂枝湯　治傷寒發熱潮熱脉弦自汗或渴或利

桂枝（二錢）　黄芩　人參　白芍（各四錢半）　甘草（炙）

半夏　生姜（各一錢泡）　茈胡（四錢）　大棗（二枚）

右㕮咀水煎服

按此出太陽例少陽經藥也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

桂枝湯　治傷風寒發熱自汗鼻鳴乾嘔者

桂枝　白芍　生姜（各三錢）　甘草（炙二錢）　大棗（二枚）

右㕮咀水煎如法服

按此出太陽例太陰經藥也

麻黃附子細辛湯　治感寒脉沉或微細反發熱或但欲寐者

麻黃　細辛（各四錢）　附子（炮二錢半）

右㕮咀水煎

按此少陰經藥也

當歸四逆湯　治感寒手足厥冷脉細欲絶者

當歸　桂枝　白芍　細辛（各三錢）　大棗（三枚）

甘草（炙）　通草（各二錢）

右㕮咀水煎

按此厥陰經藥也已上六經治寒之例隨脉證加減變法自有仲景論例並不詳録

桂枝麻黃各半湯　治傷寒見風脉發熱自汗或無汗

桂枝（二錢）　白芍　生姜　甘草（炙）　麻黃（各一錢半）

大棗（二枚）　杏仁（十一箇）

右㕮咀水煎

按此足太陽手足太陰手少陰經藥出太陽例治風寒

之劑也夫仲景論已上六經藥煞其中有發表解肌溫經不同蓋風寒有淺深榮衛有虛實故也學者審此則用藥湯液之源可得而悉

小柴胡湯（宣明方）治傷寒中風其病半在表半在裏筋脉拘急身躰疼痛寒熱往來或嘔或咳胸脇痞滿硬痛下之前後無問日數及汗後餘熱不解或無問瘟疫傷寒雜病蒸熱作發并兩感可和解者肌躰羸瘦倦怠少力

柴胡（三兩去苗）　黃芩　甘草　人參（各三錢）　半夏（一兩洗七次）

右剉如麻豆大每服五錢水一鍾煎至半鍾薑棗同煎不計時溫服

大柴胡湯（宣明方）治諸服小柴胡湯證後病不解表裏熱勢更甚而心下急鬱微煩或發熱汗出不解心下痞硬嘔吐不利（上屬太陽）或陽明病多汗或少陰病下利清水心下痛而口乾或太陰病腹滿或無表裏證但發熱七八日脉浮而數脉在肌肉實而滑數者及兩感諸證可微下者雙除表裏之熱并陽明少陽合病下利日晡發熱如瘧

柴胡（去苗半兩）　黃芩　芍藥（各二錢半）　大黃（半兩）

半夏（湯泡洗七次切作片子二錢）　枳實（三錢生用小者是也麩不去穰其効甚速）

右剉如麻豆大作三服水一盞半生薑棗子同煎至半盞溫服如未利再服

調胃承氣湯（宣明方）治諸發汗和解不惡寒但發熱蒸蒸然者或日深心下兀兀欲吐胷中痛便溏腹滿鬱鬱微煩先此時吐下者或日深裏熱譫語法當下之以銀粉巴豆燥熱大毒丸藥下之致使真陰損虛邪熱轉甚因而協熱下利不止及表裏熱下之太早乘虛而入不成結胷但為熱利不止心下滿硬或痛煩渴咽乾滑數而實諸腹滿實痛者煩渴譫妄小便赤大便鞕脉滑實緊

大黄　芒硝　甘草（各等分）

右剉每服臨期斟酌多少先煑二味熟去渣下硝上火煮二三沸頓服之以利為度未利再服

小承氣湯（宣明方）治傷寒日深恐有燥屎腹中轉失氣乃可攻之不轉失氣者必初硬後溏未可攻之攻之則腹滿不能食飲水而噦其後發熱大便復硬若腹大滿不通或陽明多汗津液外出腸胃燥熱大便必硬而譫語脉滑吐下微煩小便數大便結或下利譫語自得病二三日脉弱無太陽證柴胡證煩心心下結至四五日雖能食少少與小承氣湯和之令小安

大黄（半兩）　厚朴（去皮）　枳實（去穰各二錢）

右剉如麻豆大分作二服水一盞薑三片煎至半盞絞汁服未利再服

大承氣湯（宣明方）　治表裏俱熱病勢更甚者陽明脉遲汗出不惡寒反惡熱身重短氣狂語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘直視陽明裏熱極甚或吐下後不觧不大便五六日至十餘日日晡潮熱心胃燥熱而懊憹復如瘧狀脉沉實或小便不利大便乍難乍易喘冒不能卧或腹滿實痛煩渴譫妄脉實數而沉裏熱燥甚腸胃怫鬱留飲不散胷腹高起痛不可忍但嘔冷液大渴反不能飲強飲不能止喘急悶亂者

大黄（酒洗）　厚朴（姜製）　枳實（麩炒）　芒硝（各等分）

右剉每服看証斟酌多少先煮厚朴枳實二物至七分納大黄煑至五分去渣納芒硝煎一二沸通口服以利為度不利再服

冐寒（新增）

附諸方

九味羗活湯　治發熱惡寒無汗或自汗頭痛項強或傷風見寒脉傷寒見風脉並宜服之（此藥不犯三陽禁忌為四時發散之通劑也）

羗活　防風　蒼术（各一錢半）　甘草　川芎

白芷　生地黄　黄芩　細辛（各一錢一云細辛只用五分）

每服水一鍾半生姜三片葱白三根煎至一鍾温服食後取微汗為度如無汗啖稀熱粥助之

六神通解散　治時行三月後謂之晚發頭痛身熱惡寒脉洪數先用九味羗活湯不愈後服此藥

麻黄　甘草　黄芩　石膏　滑石

蒼朮　加川芎　羗活　細辛

水二鍾姜三片豆豉一撮葱白二莖煎之熱服取汗中病則已

喝起散　治秋冬傷風傷寒發散

麻黄　葛根　石膏　川芎　升麻

甘草（炙）　羗活　防風

春去麻黄加薄荷夏去麻黄加荊芥

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服

麻黄湯　治嚴冬傷寒頭痛發熱惡寒骨節疼痛喘滿無汗

麻黄（一兩半去節）　桂枝（一兩去皮）　甘草（半兩剉）　杏仁（二十箇湯泡去皮尖）

右㕮咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候衣覆以取汁　加石膏大棗生姜名大青龍湯治傷寒頭痛發熱惡寒無汗煩躁六脉浮緊者

已上數方發表之劑

人參養胃湯　和劑方　治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏疼不問風寒二證夾食停痰俱能治之但感風寒以微汗為度

半夏（湯泡）　厚朴（去皮姜製）　蒼术（米泔浸一宿去粗皮炒各一兩）　人參（半兩去芦）

橘紅（七錢半）　藿香葉（去土）　草果（去殼）　茯苓（去皮各半兩）　甘草（炙二錢半）

右㕮咀每服四錢水盞半姜七片烏梅一箇煎六分熱服兼治飲食傷脾証為痎瘧寒多者加附子名十味不換金散

藿香正氣散　傷寒頭疼增寒作熱上喘咳嗽反胃嘔惡氣瀉霍亂臟腑虛鳴山嵐瘴氣

大腹皮（洗）　白芷　白茯苓（去皮各一兩）　白术

厚朴（姜製炒）　桔梗　甘草（炙）　紫蘇（各二兩）

藿香　陳皮（去白各二兩）　半夏（湯泡洗七次二兩）

每服水一鍾半生姜三片棗一枚同煎熱服如欲汗加葱白二莖以衣被蓋再煎服冷嗽喘滿加人參杏仁五味子心腹痛加木香玄胡索嘔惡甚加生姜五片名順氣木香散

不換金正氣散（和劑方）　治四時傷寒瘟疫時氣及山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉下痢赤白並宜服若出遠方不伏水土者宜常服之

厚朴（去皮姜製）　藿香（去枝土）　甘草　陳皮（去白）　半夏（製）

蒼术（米泔水浸去粗皮各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞半姜三片棗二枚煎七分去

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

滓食前熱服

僧伽應夢人參散（和劑方）治傷寒躰熱頭痛及風壅痰嗽咯血等証

甘草（炙六兩） 人參 桔梗（微炒） 青皮（去穰） 白芷

乾葛 白朮 乾姜（炮五錢半） 一方加豆豉

右㕮咀每服三錢水一盞姜二片棗一枚煎七分去滓熱服

香蘇散（和剤方）治四時傷寒頭疼發熱惡寒

紫蘇葉 香附子（各二兩） 陳皮（一兩） 甘草（半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜葱煎七分空心熱服如頭疼加川芎白芷名芎芷香蘇散

和解散（和剤方）治四時傷寒頭痛煩燥自汗咳嗽吐痢

陳皮（洗） 厚朴（去皮製各四兩） 藁本 桔梗 甘草（炙各半斤）

蒼朮（去皮一斤）

右為粗末每服三錢水盞半姜棗煎七分不拘時熱服

八解散（和剤方）治四時傷寒頭疼躰熱惡風多汗嘔吐惡心咳嗽喘滿痞悶

人參（去芦） 茯苓（去皮） 甘草（炙） 陳皮（去白） 藿香（去土）

白朮（去芦） 厚朴（去皮姜製） 半夏（湯泡七次各一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞姜三片葱棗同煎不拘時服

十味和解散（楊氏方）治外感內傷寒邪頭痛發熱

白朮（二兩）　桔梗（一兩）　人參（去芦）　甘草（炙）　當歸（酒洗）

陳皮（去白）　枳殼（去穰麩炒）　赤芍藥　防風　厚朴（姜製半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片葱白三根煎熱服

○已上數方發表和中之劑

大柴胡湯　治外感風寒內傷飲食鬱結在裏身熱煩躁譫語譫妄大便不通繞臍刺痛

枳實（去穰麩炒半兩）　柴胡（去芦八兩）　大黃（一兩）　芍藥

黃芩（各三兩）　半夏（湯洗七次二兩半）

右㕮咀每服五錢水一盞姜五片棗一枚煎七分溫服微利為度此藥治傷寒內熱裏實用此下之若身體疼痛是表証未解不可服之

調中湯（活人方）　治夏秋之間暴寒折於盛熱熱結於四肢則壯熱頭疼傷寒於胃則下利或血或水脉数宜用此下之

大黃（去皮七錢）　葛根　黃芩　藁本（真者）　白朮

芍藥　桔梗　茯苓（去皮）　甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服五錢水盞半煎八分移時再服得利即止

防風通聖散　治風寒暑濕飢飽勞役及傷寒表不解半入於裏下証未全下後燥熱拂結於心內煩懊憹不得眠臟腑積熱煩渴頭昏唇焦咽燥喉痺目赤耳閉口舌

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

生瘡咳唾稠粘譫語狂妄腸胃燥澁便溺秘結及風熱壅滯並皆治之（方見中風類）

○已上數方發表攻裏之劑

○温熱病（新增）（夏至前發為温夏至後發為熱謂之伏氣傷寒）

附論

廣按經曰春傷於風夏必泄瀉夏傷於暑秋必痎瘧秋傷於湿冬必咳嗽冬傷於寒春必病温此言感時氣不即發藏於膚腠之間過期遇觸動而發也且以即病傷寒傷風與伏氣温熱病三者而言之傷寒則身熱無汗惡寒傷風則身熱有汗惡風二者皆邪自外入故表病裏和鼻塞而口不渴温熱病則邪自內出故身熱或有汗或無汗鼻不塞而口渴也傷寒傷風之邪循經而入以漸而深故治法要分三陽三陰清切表裏寒熱虛實明白方可施治不可一毫而少差也温熱之邪自內而出不過發攻表中裏三者之熱而已何難之有哉

附脈理

脈訣舉要曰陰陽俱盛病熱之極浮之而滑沉之散濇惟有温病脈散諸經各隨所在不可指名

附諸方

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

十神湯（和劑）方　治時令不正瘟疫妄行感冒發熱或欲出疹此藥不問陰陽兩感風寒並宜治之

川芎　甘草（炙）　麻黃（去根）　乾葛　紫蘇

升麻　赤芍藥　白芷　陳皮　香附子（各等分）

右㕮咀每服三錢水一盞半姜五片煎七分去滓溫服不以時候如發熱頭痛加連翹葱白中滿氣實加枳殼同煎

葛根解肌湯（和劑）方　治傷寒頭痛發熱惡寒肢體拘急胸膈煩悶

葛根（四兩）　麻黃（去節三兩）　肉桂（去皮一兩）　甘草（炙）　黃芩

芍藥（各一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞棗一枚煎八分去滓溫服

十味芎蘇散（澹寮方）治四時傷寒發熱頭痛

川芎（七錢）　紫蘇葉　乾葛（各一兩半）　桔梗（生二錢半）　柴胡

茯苓（去皮各半兩）　甘草（炙三錢）　半夏（湯泡六錢）　枳殼（去穰炒三錢）　陳皮（三錢半）

右㕮咀每服三錢姜棗煎服

升麻葛根湯（和劑）方　治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱及瘡疹已發未發疑似之間並宜服之

川升麻　白芍藥　甘草（炙各一兩）　葛根（一兩半）

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分熱服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

柴胡升麻湯（和劑方）治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾痰盛咳嗽涕唾稠粘

柴胡（去芦）前胡（去芦）乾葛（各一兩）荊芥（去根一兩半）赤芍藥（去芦）

石膏（煅各一兩）升麻（半兩）桑白皮　黃芩（去皮各六錢半）

右㕮咀每服五錢水一盞薑三片豉十餘粒煎熱服

香葛湯　治四時感冒不正之氣頭痛身疼項強寒熱嘔惡痰嗽腹痛泄瀉不問陰陽兩感風寒溫瘴並宜服之

紫蘇　白芍藥　香附子　川升麻　白乾葛

薄荷　陳皮（去白各一兩）白芷　大川芎　甘草（各半兩）

蒼朮（製一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑三片煎熱服不拘時

清熱觧肌湯　治傷寒瘟病天行頭痛壯熱

葛根（一兩）黃芩　芍藥　甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半棗二枚煎七分溫服日三次如三四日不觧脉浮者宜重服發汗脉沉實宜下之

○已上數方發表之劑

小柴胡湯　傷寒四五日寒熱往來胸脇滿痛或脇下痞鞕身有微熱或過經未觧潮熱不除半表半裏非汗非下之證瘥後勞復昏沉婦人傷風經水適断此為熱入血室故如瘧狀產後傷寒頭痛發熱小兒寒熱並治

柴胡二兩 半夏（湯泡七次九錢） 黃芩 人參 甘草（炙各七錢半）

右剉每服五錢水盞半生姜五片棗一枚煎食前服

咳嗽加五味子 胸中煩加括蔞根 渴加括蔞 脇下痞鞕加枳實 鼻衄加生地黃白茅花 痰盛或喘加桑白皮烏梅

凉膈散 一名連翹飲子 宣明方治傷寒表不解半入於裏下證未全下後燥熱怫結於內心煩懊憹不得眠臟腑積熱煩渴頭昏唇焦咽燥喉痺目赤煩燥口舌生瘡咳唾稠粘譫語狂妄腸胃燥澁便溺閉結風熱壅滞瘡疹發斑驚風熱極黑陷將死

連翹一兩 山梔子 大黃 薄荷葉 黃芩（各半兩）

甘草（一兩半） 朴硝（二錢半）

右為粗末每服五錢水一盞蜜少許煎七分温服量虛實加減 咽喉痛涎嗽加桔梗一兩荊芥半兩 咳而嘔者加半夏半兩生姜三片煎 衄血嘔血加當歸芍藥各半兩生地黃一兩 淋者加滑石四兩茯苓一兩 風眩加川芎防風各半兩石膏三兩 酒毒加葛根一兩 斑疹加葛根一兩荊芥赤芍藥川芎防風桔梗各半兩三歲小兒可服七八分 或疸熱甚黑陷腹滿喘急小便赤色而將死者此一服更加大承氣湯約以下

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

之得利者立効凡言加者皆以　本方加也以意消息

加減　退表裏熱加益元散効速　一方熱加竹葉[illegible]

○已上數方和解半表半裏之劑

大柴胡湯　治傷寒十餘日邪氣結在裏寒熱往來大便秘澁腹滿脹痛語言譫妄心中痞鞕飲食不下口生白胎不大便五六日繞臍刺痛時發煩燥及汗後如瘧日晚發熱或發熱汗出脉有力者可服之（方見前）

雙解散　即防風通聖散與益元散相合（宣明方）

治風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷以致氣血怫鬱變成積熱發為汗病雜病非此不除但覺不快便可用此通解小兒生瘡疹用此解出尤快　其大黃芒硝麻黃三味對証旋入自利去大黃芒硝自汗去麻黃

防風　川芎　當歸　赤芍藥　大黃

麻黃　薄荷　連翹　芒硝（各二分半）　石膏

黃芩　桔梗（各五分）　滑石（一半）錢　甘草一錢　荊芥

白朮　梔子（各一分二厘半）已上共六錢六分二厘半係防風通聖散

滑石（三錢）　甘草（五分）已上三錢五分係益元散

右㕮咀作一服水二盞生姜三片葱白一莖豆豉三十粒同煎一盞去滓熱服

○廣按溫熱之病皆因秋冬之時外感風寒內傷飲食

其時天氣收藏不能即發以致氣血怫鬱變成積熱至春夏之際又因外感內傷觸動積熱其時天氣升浮故能發出其熱自內達外用雙解散者正所以發攻表裏之熱也然表裏俱實者用此最妙如表裏或虛者亦未當也夫自汗屬表虛裏實宜用雙解散去麻黄若裏實甚者宜用大柴胡湯若表裏俱虛者宜用人參白虎湯夫泄瀉屬裏虛宜用雙解散去大黄芒硝或用五苓散若裏虛甚者宜用柴苓湯此雖予淺見之言亦未嘗外於理也（柴苓湯即小柴胡湯五苓散相同是也）

○已上數方發攻表裏之劑

人參白虎湯　治發熱自汗表虛者

石膏（五錢三分）知母（二錢）甘草（七分）人參（一錢）

右用水二盞加梗米五十粒煎至一盞溫服

柴苓湯　治發熱泄瀉裏虛者

柴胡（一錢六分）半夏（湯泡七次七分）黄芩　人參　甘草（各六分）

白朮　猪苓　茯苓（各七分半）澤瀉（一錢二分半）桂（五分）

右用水二盞生姜三片煎至一盞溫服

○廣按此方即小柴胡湯五苓散相合是也除傷寒表証不治外邪傳半表半裏及內傷發熱雜病發熱無不治也

〇已上数方補虛散邪之劑

温熱病治例

（出傷寒直格心要論）

夫傷寒者前三日法當汗㊀可用雙觧散連進数服必愈

若不觧者病已傳變

後三日在裏法當下殊不知下之太早則表邪乗虛入裏遂成結胸虛痞懊憹斑疹發黄之証輕者必危危者必死但當以平和之藥宣散其表和觧其裏病勢或有汗而未愈或無汗而愈㊁當用小柴胡凉膈天水三藥合而服之

病若半在表半在裏法亦當和觧㊂小柴胡凉膈二藥主之

若裏熱微者則當微下[四]大柴胡合解毒湯主之熱勢未退[五]又以大柴胡合三一承氣下之兩除表裏之熱病至七八日裏証已甚表熱漸微脉雖浮數[六]則以三一承氣合解毒下之

其病胸膈滿悶或喘或嘔陽脉緊甚者[七]可用瓜蔕散以通之

汗吐下三法之後別無異証者[八]凉膈散調之

病熱已去微熱者[九]以益元散服之無令再病此傷寒治法之大要也

或傷風自汗脉浮緩者[十]雙解去麻黄以汗之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

其病半表半裏〔十一〕白虎湯和解之

病在裏脈沉細者無問風寒暑温或表裏証俱不見或內外諸邪所傷有汗無汗心腹痛滿譫語煩躁畜熱內盛

但是脈沉者〔十二〕並用承氣合解毒下之

或中暑自汗〔十三〕解以白虎湯（直格云夏至前為温夏至後為暑是以至後不用白虎宜乎局方云立秋後不用白虎子和云若有白虎証亦不用乎知用斟審之耳）

白虎解後〔十四〕以五苓合天水調之多進數服無妨

或腹脹滿脈沉者〔十五〕亦當承氣合解毒微下之

或發汗之後熱不解脈尚浮者〔十六〕白虎加蒼术再解之

或裏熱內盛陽厥極深皆因失下而成此証以致身冷脈微昏憒將死切不得待以寒藥下之誤下即死又一輩庸醫妄言是陰厥便欲換易用玄武四逆温熱之劑投下下咽立死殊不知此証乃陰耗陽竭陰氣極弱謂之耗陽厥極深謂之畜熱佛鬱將欲絕者當此之証寒劑熱劑俱不可投但進〔十七〕凉膈解毒二藥以養陰退陽宣暢畜熱脈氣漸生得大汗而愈有無汗氣和而愈者

未愈〔十八〕加解毒合承氣下之次以〔十九〕解毒凉膈天水合而為一調合陰陽洗滌臟腑則其他別證自不生矣

有大下之後熱不退再三下之熱愈盛若下之不愈脈微氣虛力弱不加以法則無可生之理若輟而不下則邪

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN ROC

熱極盛陰氣極衰脉息斷絕必不可救似此之證是下之亦死不下亦死醫者到此救人活人一彈指間其不至手足失措者幾希矣（直格云傷寒汗後汗出不解或又不汗脉尚浮者白虎加蒼朮湯再解之又按餘論云傷寒下後自汗虛熱不已白虎加蒼朮人參一服如神汗止身涼此通仙之法也如此則汗下之後熱不退不問有汗無汗宜白虎加蒼朮解之又加人參亦妙仍服涼膈解毒調之）

經云三下而熱不退者即死後人有四五次下加至十數行而生者此乃偶誤中耳活者未一二死者已千百後斈切不可以為法但當依前用解毒合涼膈調之使陽熱徐退陰脉漸生庶不失人命

若傷飲不解散成結胸之証臨時擇用〔二十〕大小陷胸湯

兆累下之脉浮者不可下是表証未出〔二十一〕小柴胡合小陷胸湯救之脉雖浮而熱大極者〔二十二〕承氣徐徐踈利之

或有留飲過度濕熱內生自利不止其熱未退〔二十三〕解毒湯治之

陽毒生斑〔二十四〕涼膈加當歸

怫鬱熱盛在表燥而無汗濕熱在裏不能發於外相搏遂成發黄〔二十五〕茵蔯湯調五苓散甚者〔二十六〕茵蔯合承氣下之

煩心不得卧〔二十七〕梔子湯（又名梔子豆豉湯）

悮下太早遂成結胸虚痞〔二十八〕凉膈加枳殼桔梗剛柔二痓譫語發狂踰垣赴井皆陽熱極盛〔二十九〕承氣合解毒下之

汗下之後煩渴飲水〔三十〕則凉膈減桂五苓甘露益元選而用之小便不通五苓泄之大便閉結承氣下之更有外證加減通聖散方內隨證用藥

婦人証治皆然惟孕婦三四月并七八月不用硝其餘月分用之無妨小兒減劑服之

此中有古人治傷寒不傳之妙後之斈者其慎寶之

防風通聖散（見中風類）

歌曰

防芎歸芍大麻黃　薄荷芒硝半兩強
芩梗石膏各一兩　滑三草二要相當
荊芥白朮山梔子　二錢半重細消詳

右大黃芒硝麻黃三味對証旋入自利去大黃芒硝自汗去麻黃

益元散（宣明方）又名天水散六一散

治身熱吐痢泄瀉腸澼下痢赤白癃閉淋痛利小便偏主石淋蕩胃中積聚寒熱宣積氣通九竅六府生津液去留結消畜水止渴寛中除煩熱心燥腹脹痛悶補益

五藏大養脾腎之氣理內傷陰痿安魂定魄補五勞七傷一切虚損主癇痓驚悸健忘止煩滿短氣臟傷咳嗽飲食不下肌肉疼痛并口瘡牙齒疳蝕明耳目壯筋骨通經脉和血氣消水穀保元真觧百藥酒食邪毒耐勞役飢渴宣熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身注顏延壽及觧中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮恚怒驚恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并觧兩感傷寒能令遍身結滞宣通氣和而愈及婦人下乳催生産後損傷血衰陰虚熱甚一切熱證兼吹妳乳癰此神驗之仙藥也惟孕婦不宜服滑胎也

桂府膩白滑石（六兩）　甘草（炙一兩）

右爲末每服三錢（蜜少許）温水調下（無蜜亦得）日三服欲冷飲者新汲水調下觧利傷寒發汗煎（豆豉葱白）湯下四錢（每服水一鍾葱白五寸豆豉五十粒煎取汁一鍾調下）并三服効為度此藥是寒凉觧散鬱熱若病甚不觧多服此藥無害但有益而無損俗惡性寒無易得之賤物而不明素問造化之理故不取本草神驗之言而多不用焉若以隨證驗之乃凡人之仙藥也不可闕之

雙觧散　見前　即防風通聖散與益元散相合

小柴胡湯　見前

凉膈散（見前）

大柴胡湯（見前）

黃連解毒湯（宣明方）治傷寒雜病熱毒煩躁乾嘔口渴喘滿陽厥極深畜熱內甚世俗妄傳為陰毒者及汗吐下後寒凉諸藥不能退其熱勢者兩感証同治

黃芩　黃連　黃蘗　大梔子（各半兩）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎一鍾如腹滿嘔吐或欲作利者每服加半夏三枚生全用厚朴二錢茯苓二錢生姜三片煎熟服名曰半夏黃連解毒湯

三一承氣湯（宣明方）治傷寒雜病內外所傷日數遠近腹滿咽乾煩渴譫妄心下按之硬痛小便赤澁大便結滯或濕熱內甚而為滑泄熱甚喘咳悶乱驚悸狂顛目疾口瘡舌腫喉痺癰瘍陽明胃熱發斑脉沉可下者小兒熱極驚風潮搐煩喘昏塞并斑疹黑陷小便不通腹滿欲死或斑疹後熱不退久不作痂或作斑癰瘡癬久不已者怫熱內成疹癖堅積黃瘦瘧疾久新卒暴心痛風痰酒膈腸垢積滯久疰風熱暴傷酒食煩心悶乱脉數沉實或腎水陰虛陽熱毒甚而僵仆卒中一切暴瘖不語一名失瘖畜熱內傷陽厥極深脉反沉細欲絕或表之冲和正氣與邪熱并之於裏則裏熱亢極陽極似陰

又爲寒戰脉微而絶或風熱燥甚客於下焦而大小便澁滯不通者或産婦死胎不下及兩感表裏熱甚須可下者

大黄（錦文者） 芒硝 厚朴（去皮） 枳實（各半兩）

甘草（一兩）

右㕮咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至一鍾内芒硝再煎一沸去滓通口服不拘時

瓜蒂散（宣明方）治傷寒表証罷邪熱入裏結於胷中煩滿不得息而飢不能食四肢微厥而脉乍緊者宜以此吐之經云在上吐之在下洩之

瓜蒂（炒黄） 赤小豆（等分）

右為末香豉半合（豆豉是也）水一鍾半煑取汁半鍾調下一錢不吐加服亡血躰虚者不可服

白虎湯（宣明方）治傷風自汗桂枝證表未解半入於裏中暑自汗脉虛弱傷寒自汗脉滑數而實表裏俱熱三陽合病腹滿身重口燥面垢讝語發黄厥逆自汗和解兩感解頭痛止自汗雜病時疫煩渴發斑熱治小兒豆瘡瘖疹伏熱

知母（一兩半） 石膏（四兩為末） 甘草（一兩炙） 粳米（一合）

右剉如麻豆大抄五錢水一鍾煎至六分去滓溫服無

時候日三四服或眩欬嘔者加半夏半兩橘紅半兩每服生姜三片煎服　傷寒發汗不觧脉浮者加蒼术半兩名蒼术白虎湯　或汗吐下後煩渴口乾舌燥脉洪大加人參半兩名人參白虎湯　此藥立夏後立秋前可服春時秋後并亡血虛家並不可服不惡寒反惡熱大便不秘者亦可服

五苓散（宣明方）治傷寒中暑大汗後胃中乾煩燥不得眠脉浮小便不利微熱煩渴及表裏俱熱飲水反吐（名曰水逆）或攻表不解當汗而反下之痢不止脉浮表不觧自利（或一切留飲不散水停心下并兩感中濕而昏燥霍乱吐瀉驚風）

猪苓（去皮）　茯苓（去皮）　白术（各半两）　澤瀉（一两）

桂（去皮二錢半）

右為末每服二錢熱湯調下加滑石二兩尤加喘嗽煩心不得眠者加阿膠半两（炒）夏月大暑新水調服立愈

○廣按西北之地高燥又[illegible]居人多食葱蒜油烙麪食炙煎炒魚肉燒酒以致內火燔盛至春夏升浮之時適因所感而鬱火遂得以發於外發則煩渴飲水以致水停心下宜用此散治之如兼涉虛用柴苓湯尤妙（柴苓湯見前）

大陷胸湯（宣明方）治汗下之後不大便五六日舌乾而渴

日晡潮熱從心至小腹鞕滿而痛不可近脉當沉緊滑数或但胸結則無大段熱頭微汗出脉沉濇者水結也

大黄（去皮三錢）　芒硝（三錢半）　甘遂末（五分）

右剉如麻豆大分作二服每服水一鍾煎大黄至六分納硝一二沸絞汁調甘遂末二分半温服未快利再服勢惡不能利以意加服

大陷胸丸（宣明方）治發熱而下之太早熱入因作結胸者項亦強如柔痓狀下之則和也

大黄（半兩）　芒硝（二錢）　杏仁（十二箇去皮尖双仁草灰炒变色）

葶藶（三錢微炒）

右大黄為末下葶藶杵羅研杏仁硝如泥和彈子大每服一丸入甘遂末三字白蜜半匙水一鍾煮半鍾温服當一宿許乃下未利再服

小陷胸湯（宣明方）治小結胸心下按之痛脉浮而滑無大段熱表未罷不可下之下之即死水結胸亦宜服此

半夏（四錢湯洗全用不剉）　生姜（二錢切）　黄連（二錢剉）

栝樓實（大者半兩槌剉其殼子則不剉若剉其子者非也）

右以三鍾煮栝樓汁一鍾半納藥至一鍾絞汁兩次温服以微吐黄涎為愈

茵蔯湯（宣明方）治陽明裏熱極甚煩渴熱鬱留飲不散以

致溼熱相搏而身發黃但頭汗出身無汗小便不利渴引水漿身必發黃宜茵蔯湯調下五苓散利大小便

茵蔯蒿（一名山茵蔯一兩去莖）　大梔子（七箇色深堅實好者稍小者用小箇）

川大黃半兩

右剉如麻豆大水二鍾半慢火煑至一鍾絞汁溫服以利為度甚者再服當下如爛魚肚及膿血膠膘等物及小便多出金色如皂莢汁或見證將欲發黃此一劑分作四服調五苓散三錢（凡治發黃者無越此法妙）

梔子豆豉湯（宣明方）治汗吐下後胸滿痛頭微汗虛煩不得眠反覆顛倒心內懊憹乃燥熱怫鬱於內而氣不宣通故也

大梔子（七箇剉碎如小者用十箇）　豆豉（半合俗言鹽豆豉少氣者加甘草二錢半）

（嘔者誤以凡藥下之者用生姜半兩或用溫湯濯手足使心胸結熱宣通而已）

右剉如麻豆大或先以水二盞煑梔子至一鍾半納豉煑至半鍾絞汁溫服（凡加者皆用梔子先煑或吐止後服凡用梔子湯皆非吐人之藥以其燥熱鬱結之甚而藥頓攻之不能開通則熱發而吐因其嘔吐發逹鬱結則氣通津液宣行而已故不須再服也）

桂苓甘露散（宣明方）治傷寒中暑胃風飲食中外一切所傷傳受溼熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴不利間小便赤澁大便急痛溼熱霍亂吐下腹滿痛悶及小兒吐瀉驚

風

茯苓（一两去皮） 甘草（二两炙） 白朮（半两） 澤瀉（一两）

桂（半两去皮） 石膏（二两） 寒水石（一两） 滑石（四两）

猪苓（半两）

右為末每服三錢温湯調下新水亦得生姜湯尤良小兒每服一錢同上法

右共一十八方（并蒼朮白虎湯等）如無大承氣以三一承氣代之尤妙通三十九藥味調理傷寒曲盡其妙百發百中後之學者詳辨脉證審而用之起沉痾於反掌策奇功以活人方知其妙也

○已上諸方治温熱病切要之劑

小青龍湯（宣明）方治傷寒表未罷心下有水氣乾嘔發熱而咳或渴利或小便不利小腹滿喘

麻黄（去節湯泡去黄汁焙乾三錢○利者去麻黄加芫花彈子大○噎者去麻黄加附子二錢泡以開拂熱結滯○小便不利小腹脹滿去麻黄加茯苓四錢○喘者去麻黄加杏仁三錢去皮尖）

桂枝（三錢去皮） 芍藥（三錢） 半夏（二錢湯泡○渴者去半夏加瓜蔞根三錢）

細辛（三錢） 五味子（二錢） 甘草（三錢炙） 乾姜（三錢）

右剉如麻豆大每服五錢水一鍾半生姜四片煎至七分去滓温服

真武湯（活人）方治傷寒數日已後發熱腹痛頭目昏沉大

便自利小便或利或澁或嘔或咳或已經汗不解仍復發熱心下忪悸頭目眩暈皆由渴後飲水停留中脘所致並皆治之

芍藥（七錢半下利者可去之加乾姜半兩） 生姜（七錢半）

附子（炮一箇用四分之一嘔者去之加生姜二錢半） 白朮（五錢）

茯苓（七錢半去皮小便利者去之）

咳者加五味子一錢半細辛乾姜各二錢半

右㕮咀每服五錢水一鍾半煎八分温服不拘時

十棗湯（宣明方）治太陽中風下利嘔逆短氣不惡寒熱熱汗出發作有時頭痛似下痞硬引脇下水腫腹脹并酒食積腸垢積滯痃癖堅積畜熱暴痛瘧氣久不已或表之正氣與邪熱并甚於裏熱極似陰反寒戰表氣入裏陽厥極深脉微而絶并風熱燥甚結於下焦大小便不通實熱腰痛及小兒驚熱結乳癖積熱作發驚風潮搐斑疹熱毒不能了絶者

芫花（慢火炒變色仲景鄉俗異語言炒作熬下凡言熬者皆乾炒也） 大戟

甘遂（各等分）

右為末水一鍾棗十枚（劈開）煑取汁半鍾調半錢實人每服一錢

三黃瀉心湯 治傷寒陰證下之太早致心下痞按之軟

其脉関上浮者主之若未解未可攻宜先隨風寒二證揀桂枝麻黄湯表解即服此藥

大黄（蒸） 黄連 黄芩（各等分）

每服一兩剉如麻豆大沸湯二鍾熱漬之一時久去柤分二服温服或汗出惡寒加附子別煎汁入一合同服名附子瀉心湯

半夏瀉心湯 治心下痞满而不痛者

半夏湯（泡七次一兩一錢） 黄芩 人參（去芦） 甘草（炙）

乾姜（炮各一兩半） 黄連（半兩）

每服五錢水一鍾生姜五片棗一枚煎半鍾温服或傷寒傷風反下之日利數十行穀不化腹中鳴心下痞硬乾嘔心煩者加甘草人參名甘草瀉心湯或汗出觧後胃中不和心下痞硬乾噫食臭脇下水鳴下利者加生姜減乾姜名生姜瀉心湯

檳榔散（宣明方） 治傷寒陰病下之太早心下痞滿而不痛按之軟虛也

檳榔 枳殼（等分）

右為末每服三錢煎黄連湯調下不計時候温服

旋覆代赭湯（傷寒論） 治傷寒發汗若吐下觧後心下痞硬噫氣不除者

旋覆花　甘草（炙各三兩）　人參（二兩）　生姜（五兩）

代赭石（一兩）　大棗（十二箇）　半夏（半升湯洗）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服

枳實理中丸　三因方治傷寒曾經吐利後胸痞欲絕膈高起急痛者

枳實（去穰麩炒）　茯苓（去皮）　人參　白朮

乾姜（炮）　甘草（炙各等分）

右為末蜜和一兩作四丸米湯化下渴加栝樓根下痢加牡蠣　一方只用枳實麩炒為末米飲調服三錢日三服加桔梗等分尤妙

近効方　陽證結胸垂死

用活蚯蚓十條搗爛入水半碗蜜半鍾灌下

結胸灸法

巴豆（十四粒）　黃連（大者七寸）

右為末用津唾和成膏填入臍心以艾炷不拘壯數灸其上候腹中有聲為度灸畢湯浸用帛拭淨恐生瘡

丁香柿蒂湯　治欬逆噎汗陰證者

丁香　柿蒂（各一錢）　甘草（炙）　良姜（各半兩）

右為末每服二錢用熱湯點服不拘時

橘皮竹茹湯　活人方治陽證欬逆惡寒及吐利後胃虛膈

熱而欬者

橘皮（一升）　竹茹（一升半）　甘草（二兩半）　人參（半兩）

右㕮咀每服五錢水一鍾半生姜七片棗二枚煎至八分温服

小柴胡加生姜橘皮竹茹湯　治傷證咳逆潮熱

小柴胡湯　生姜　橘皮　竹茹

右㕮咀水煎温服

咳逆灸法（活人方）

其法婦人屈乳頭向下盡處骨間是穴丈夫及乳小者以一指為率正男左女右與乳相直間陷中動脉是穴艾炷如小豆大灸三壯

化斑湯　治斑毒

人參　石膏（各半兩）　玄參　知母

甘草（各一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半入糯米一合煎温服

梔子蘗皮湯（宣明方）治頭微汗小便利而微發黄者温熱相搏故也微者宜此甚者宜茵蔯湯下五苓散（見前）

黄蘗（半兩）　甘草（二錢半）　大梔子（十五箇）

右剉如麻豆大水三鍾煎至一鍾絞汁分次作一日温服之

桃仁承氣湯　治太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下但小腹脹結者是（方見出血類）

抵當湯（宣明方）治傷寒日深表証仍在畜熱下焦脉微沉不結胸發狂者小腹脹而硬小便自利者瘀血證也小便不利無血也或陽明畜熱内甚而喜忘或狂大便雖硬而反易其色黑者有畜血也無表裏證但發熱日深脉雖浮者亦可下之式已下後脉數胃熱消穀善飢數日不大便有瘀血也

桃仁（七箇）　大黄（一兩）　水蛭（炒）　虻虫（各十箇去翅足炒）

右剉如麻豆大分作二服水一鍾煮半鍾絞去滓温服未下再服

抵當丸（宣明方）治傷寒有熱小腹滿小便不利若為有血也當下之不可餘藥

桃仁（八箇）　大黄（一兩）　水蛭（炒）　虻虫（各七箇依前炒）

右為末蜜和作二丸每以水一小鍾煮一丸至六分温服晬時血未下再服

辰砂五苓散（和劑方）治傷寒表裏未解頭疼發熱心胸鬱悶唇口乾焦神思昏沉狂言譫語如見神鬼

五苓散内加辰砂末如桂分兩（方見前）

犀角地黄方　治傷寒及温病應發而不發汗内有瘀血

鼻衄吐血面黃大便黑者（方見吐血類）

竹葉石膏湯　傷寒將氣（一本表裏俱虛）遍身發熱心胸煩悶得汗已解內無津液虛羸少氣欲吐及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛頭不痛不可汗下者

石膏一兩六錢（研）　半夏二錢半（湯洗）　人參二錢（去蘆）　麥門冬五錢半（去心）

甘草（炙）二錢

右㕮咀每服五錢水一鍾半入青竹葉生姜各五片煎至半鍾去滓入粳米百餘粒再煎米熟去米溫服不拘時

又云竹葉十片

人參石膏湯（宣明方）治傷寒咳嗽不已心煩及風濕頭痛精神不利昏憒宜服

人參一錢半　半夏（湯泡洗）　大梔子　黃芩各三錢

川芎　白朮　茯苓（去皮）　知母各五錢

甘草（炙）一兩　石膏三兩

右㕮咀每服一兩水二鍾姜三片煎至一鍾去滓溫服

酸棗湯　治傷寒吐下後心煩乏氣晝夜不眠

酸棗仁　麥門冬　甘草　知母

茯苓　川芎　乾姜

右用五錢水一鍾煎七分溫服

溫膽湯（易簡方）治傷寒一切病後虛煩不得睡臥兼治心

膽虛怯

半夏　枳實（去穰各一兩）　橘紅（一兩半）　茯苓（五錢半去皮）

甘草（四錢炙）

右㕮咀每服四錢水鍾半生姜七片棗一枚竹茹一塊煎七分去滓食前熱服

加味温膽湯（秘方）治心膽虛怯觸事易驚夢寐不詳異象感惑遂心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏亦生諸證或短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲食無味

枳實（麩炒）　半夏（湯泡七次）　竹茹（各八兩）　橘紅（十二兩）

白茯苓（六兩）　甘草（四兩炙）　香附子（一斤半）　人參

柴胡（去芦）　麥門冬（去心）　桔梗（各六錢）

右㕮咀每服一兩生姜五片棗二枚水二鍾煎至一鍾温服不拘時

枳實梔子湯（千金方）治大病瘥後食復勞復者

枳實（二枚）　梔子（四箇）　豆豉（一升）

右㕮咀每服一兩用清漿水二鍾煎至一鍾去滓温服不拘時如有宿食加大黄如棊子大五六片

白朮散（和劑方）治傷寒病後氣脈不和食復勞復病證如初者

桔梗（三兩）　茯苓（去皮三兩）　乾姜（泡二兩）　白朮（四兩）　白芷

陳皮（去白）　香附子　甘草（炙）　青皮（去白）　山藥（各三兩）

右㕮咀每服五錢水一鍾姜三片棗三枚乾木瓜一片紫蘇二葉煎七分食前服　若吐瀉入白梅　喘入桑白皮杏仁　傷寒勞復入薄荷　膈氣入木通三寸射香少許　中暑嘔逆入香薷　產後血氣不和入荊芥　霍亂入藿香煎　氣厥為末入鹽湯調下

增損白朮散（御藥院方）治傷寒雜病後一切吐瀉煩渴虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦

白朮（一兩）　人參（一兩）　茯苓（一兩）　甘草（一兩半）　木香（半兩）

藿香（一兩）　葛根（一兩）　陳皮（一兩）　乾生姜（半兩）

右㕮咀每服四錢水一大鍾煎七分去滓溫服

茯苓半夏湯（宣明方）治傷寒雜病一切嘔吐或喘嗽疼痛痞滿頭痛者

茯苓（去皮二錢半）　半夏（一錢）　生姜（二錢半取汁）

一方加黃芩（二錢半去腐）　甘草（二錢）　陳皮（去白二錢半治風痰）

右剉如麻豆大水一鍾煎至四分絞汁下生姜汁溫服不計時候

赤茯苓湯　治胸膈滿悶頭痛已得汗者

陳皮　甘草　人參　半夏　川芎

白朮（等分）

右剉每服五錢水一鍾半生姜三片煎一鍾温服

梔子厚朴湯（宣明方）治傷寒下後心煩腹滿坐卧不安者

大梔子（七箇）　厚朴（姜汁製半兩）　枳實（二錢）

右㕮咀水一鍾煎七分去滓通口服不拘時

五味子湯　治汗下後氣閉咳嗽

五味子（半兩）　麥門冬（去心）　人參（一）　杏仁（去皮尖）　陳皮

生姜（各一錢五分）　棗子（二枚）

右剉每服二錢水二鍾煎一鍾作二服

甘桔湯　治咽痛

桔梗　甘草

右用水一鍾半煎至八分通口服

大橘皮湯　治汗後胃虚

陳皮　甘草（刃）各一　人參（兩）

右剉每服五錢水鍾半姜二片煎至一鍾温服

四逆湯（宣明方）治傷寒表熱未入裏誤以寒藥下之大早表熱不已又裏寒下利不止因表熱裏寒自利急以温裏利止又治少陰病脉沉下利厥逆煩渴嘔吐

甘草（一錢炙）　乾姜（二錢半）　附子（半箇生去皮臍附子以半兩者佳小者力弱大者性惡非古方之宜也不但以羨其大者要知古人之有則也）

右剉如麻豆大水二鍾煑至一鍾絞汁温服（或畜熱極深而手足）

（脉冷若不宜此方當以下之）

環證奪命散　治傷寒汗下後不解或投藥錯誤致患人困重垂死昏沉或陰陽二證不明七日以後皆可服

好人參（一兩去芦）

右為片水二鍾於銀石器内熬至一鍾温服病人喜冷以新水沉冷服之粗再煎服連進數服服至鼻尖上潤汗出是其應也（此藥不拘男子婦人傷寒時氣疫証二七三七不解不知人事者並宜服之）

○已上數方治傷寒温熱病汗下後雜証之劑

蜜煎導法　陽明病汗下後躰虛氣弱津液枯竭臓腑閉塞大便不行須宜蜜導

右用蜜一兩銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦可丸入皂角末塩少許捻作挺子如指許長二寸當令頭銳納穀道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膽汁導法　以大猪膽一枚瀉汁和醋少許灌穀道中如一食頃當大便　一方用蘿蔔子一勺研爛取汁入蜜調服

温粉撲汗法　凡發汗不欲多多即亡陽用此撲之即愈

白术　藁本　川芎　白芷

右為末一兩入米粉三兩勻和撲之

蒸法　以薪火燒地良久掃除去火以水洒之取蚕沙柏

葉穅麩相和鋪地上一寸厚以草席令病人當上卧溫覆之夏月熱只被單覆之汗移時立至俟周身至脚心皆汗如汗出不止乃用溫粉撲之移於寢處

水漬法　以青綿布數疊將水漬之稍挾去水搭於胸膈上須臾蒸熱又漬令冷如前用之仍數易新水日數拾易熱甚者置病人於水中熱勢漸退則已

湯漬法　以菉豆煑湯一鍋候稍溫用青綿布數疊蘸湯搭於胸膈冷則再蘸再搭日數拾易用被少覆移時病人得汗而愈蓋熱則腠理開通使內熱得以外達氣血宣通汗自出而病解矣又菉豆青布性凉能退熱故也

發汗法　凡發汗務要以衣被厚蓋汗出欲令手足俱周濈濈然一時許為佳不欲如水淋漓服藥中病即已不必盡劑三日內者可汗病在表惡寒者可汗

取汗法　傷寒初覺頭疼惡寒發熱身躰疼痛脉洪者用葱白一握姜豉一兩以水煮熱服以被蓋煖取汗如不汗更用葛根升麻煎服必汗若又不汗更加麻黄取汗

轉下法　凡轉下須体認得合下之証明白在陽明胃經則不拘日數過時失下則氣血不通四肢便厥不識反疑是陰厥復進熱藥禍如反掌若少陰腎經太陰脾經下證悉用藥已大便利者止不須盡劑陽明病得利瘥

取吐法　凡取吐服吐藥後不大吐當以手指探之便吐不吐稍增藥以吐為度若吐少病不除明日再服吐藥可至再三但人虛宜少吐藥力過時不吐者啜熱湯一升以助藥力不必盡劑吐訖稍待氣定方可食若服藥過多者飲水解之

○廣按温熱之病因外感內傷觸動鬱火自內而發之於外初以表裏俱熱宜用涼膈散雙解散之類辛涼之劑兩除表裏之熱久則表熱微而裏熱甚又宜用大柴胡湯承氣湯之類苦寒之劑以瀉之則熱退身涼而病自已也今人不諳伏氣温熱之證表裏俱熱認作即病傷寒之證表熱裏和便用麻黃湯桂枝湯五積散聖散子辛温之齐以發表則內熱愈甚而斑黃狂亂之證起矣或未用辛涼之劑以發表便用承氣湯苦寒之劑以攻裏則表熱未去而結胷虛痞之證作矣嗚呼傷寒温熱之源流發表攻裏之先後不可一毫而少差也

丹溪心法附餘卷之一 終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之二　　乙集

外感門下

中暑五　附暑風　注夏

〇暑證用黄連香薷飲　挾痰加半夏南星　如虛加參芪　暑病內傷者用清暑益氣湯　暑氣（一作風）是痰用吐

注夏屬陰虛元氣不足夏初春末頭疼脚軟食少躰熱

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

者是宜補中益氣湯去柴胡升麻加炒栢白芍藥挾痰者加南星半夏陳皮煎服又或用生脈湯　暑風挾痰挾火實者可用吐法

暑乃夏月炎暑也盛熱之氣着人也有冒有傷有中三者有輕重之分虛實之辯或腹痛水瀉者胃與大腸受之惡心者胃口有痰飲也此二者冒暑也可用黄連香薷飲清暑益氣湯蓋黄連退暑熱香薷消畜水或身熱頭疼燥亂不寧者或身如鍼刺者此爲熱傷在内分也當以解毒湯白虎湯加柴胡如氣虛者加人參此爲傷暑或咳嗽發寒熱盜汗出不止脉數者熱在肺經用清肺湯柴胡湯天水散之類急治則可遲則不救盛火爍金也此爲中暑凡治病須要明白辯别愼勿混同施治春秋間亦或有之切莫執一隨病處方爲妙

戴云暑風者夏月卒倒不省人事者是也有因火者有因痰者火君相二火也暑天地二火也内外合而炎爍所以卒倒也痰者人身之痰飲也因暑氣入而鼓激痰飲塞碍心之竅道則手足不知動躡而卒倒也此二者皆可吐内經曰火鬱則發之吐即發散也量其虛實而吐之吐醒後可用清劑調治之

入方　治暑渴

生芐　麥門冬　牛膝　炒柏

知母　葛根　甘草

古剉水煎服

附脈理

脉訣舉要曰暑傷於氣所以脈虛弦細芤遲體狀無餘

附諸方

黃龍丸　治伏暑發熱煩渴嘔吐惡心

黃連（二斤）

右以好酒五升煮乾為末麪糊丸梧子大熱湯下三十丸

玉露散（張子和方）治暑渴

寒水石　滑石　石膏　栝樓根（各二兩）

甘草（一兩）

右為細末每服五錢新水調服

枇杷葉散（和劑方）治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉（去毛炙三兩）香薷（七錢半）白茅根　麥門冬（去心）

甘草（炙）　乾木瓜（各一兩）丁香　陳皮（去心）

厚朴（去皮薑汁炙）

右為末每服二錢水一鍾薑三片煎服　如止渴躁去

丁香加知母冷水調下

○已上諸方止渴之劑

生脈湯　生津止渴

人參　麥門冬　五味子

右剉水煎服

人參白虎湯（徐同知方）治伏暑發渴嘔吐身熱脈虛自汗

人參（一錢半）　知母（二錢）　石膏（半兩）　甘草（炙一錢）

右㕮咀入粳米一合水二鍾煎至一鍾不拘時熱服如伏暑作寒熱未解宜和五苓散同煎服伏熱後或冷水沐浴或喫冷物清氣在脾不覺　令日晡作寒慄壯熱渾身洒淅宜加桂煎服出汗便解

竹葉石膏湯　治伏暑內外發熱煩躁大渴　見濕熱類

○已上諸方補虛止渴之劑

香薷飲（和劑方）治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並皆治之　一方加黃連四兩用姜汁同炒令老黃色名黃連香薷飲　如有搐搦加羌活煎服

厚朴（去皮姜汁炙熟半斤）　白扁豆（微炒半斤）　香薷（去土一斤）

右㕮咀每服三錢水一鍾入酒少許煎七分沉冷不拘時服熱則作瀉香薷須陳者佳

五物香薷飲（直指方）驅暑和中通用

香薷（去土二兩） 白扁豆（姜汁炒） 厚朴（去皮姜製炒） 白茯苓（去皮各一兩半）

甘草（五分）

右㕮咀每服五錢水二鍾煎至一鍾去滓温服

二香散 治暑温相搏霍亂轉筋煩渴悶亂（見霍乱類）

香薷縮脾飲（直指方）驅暑和中除煩止渴

縮砂仁 草果仁 烏梅肉 香薷

甘草（炒各兩半） 白乾葛 白扁豆（各一兩）

右剉每服三錢生姜五片水煎去滓微温服

縮脾飲（和剤方）消暑氣除煩渴止吐瀉霍亂

縮砂仁（四兩） 乾葛（二兩） 白扁豆（二兩） 烏梅肉

草果（炒去殼） 甘草（炙各四兩）一方無乾葛有乾姜

右㕮咀每服四錢水一大碗煎七分以水沉冷服

卻暑散 治冐暑伏熱頭目眩暈嘔吐泄痢煩渴背寒面垢

赤茯苓 生甘草（各四兩） 寒食麪 生姜（各一斤）

右為末每服二錢白湯調下

大順散（和剤方）治冐暑伏熱引飲過多脾胃受温水穀不分霍亂嘔吐臟腑不調

甘草（三斤） 乾姜 杏仁（去皮尖炒） 肉桂（去皮各六兩四錢）

右先將甘草用白砂蜜炒及八分黃熟次入乾姜同炒

却入杏仁候杏仁不作聲為度用篩篩淨後入肉桂一處搗羅為末每服三錢水一中煎至七分温服如煩躁井花水調下不拘時候以沸湯點服亦可

○廣按寒則傷形熱則傷氣何以言之人與天地同一槖籥夏月天之氣浮於地表則人之氣浮於肌表况被盛暑所傷膚腠疎豁氣液為汗發泄於外是表裏之氣俱虛矣不善攝生者暑熱傷於外生冷戕於中若之何而能運化也是以水穀停積而為温熱發為嘔吐為泄瀉甚則吐瀉俱作而揮霍悶亂也若不即病温熱怫鬱於內他日為瘧為痢之所由矣今大順

散非治暑熱之藥乃治暑月飲冷過多爲病之劑也歟

○已上諸方消導之劑

香朴飲子（聖惠方）治大人小兒伏熱吐瀉虛煩作亂

人參（去芦）　茯苓（去皮）　甘草（炙）　紫蘇葉

木瓜　澤瀉　香薷（去土）　半夏（湯泡七次）

白扁豆（炒）　陳皮　烏梅肉　厚朴（各四兩）

右㕮咀每服一兩水二鍾生姜三片棗一箇煎至一鍾食前熱服

六和湯（和劑方）治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄

瀉實熱交作痰喘咳嗽胸膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫嗜卧倦怠小便赤澁并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食婦人胎產中亦可服

縮砂仁　半夏（湯泡七次）　杏仁（去皮尖）　人參

甘草（炙各一兩）　赤茯苓（去皮）　藿香葉（去土）　白扁豆（姜汁略炒）

木瓜（各二兩）　香薷　厚朴（姜汁製各四兩）

右㕮咀每服一兩水二鍾生姜三片棗子一枚煎至一鍾温服

十味香薷飲（百一選方）治暑氣和脾胃

香薷（一兩）　人參（去芦）　陳皮（去白）　白术

黄芪（去芦）　白扁豆（炒去殼）　甘草（炙）　厚朴（去皮姜汁炒黑色）

乾木瓜　白茯苓（去皮各半兩）

右爲末每服二錢熱湯冷水任調下

清暑益氣湯（東垣方）治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦精神減少懶於動作胸滿氣促支節疼痛或氣高而喘身熱而煩心下膨悶小便黄而數大便溏而頻或痢或渴不思飲食自汗體虛

黄芪　蒼术（米泔制）　升麻（各一錢）　人參

白术　神麯　陳皮　澤瀉（各五分）

甘草（炙）　酒栢　麥門冬　當歸（各三分）

葛根（二分） 五味子（九粒） 青皮（二分半）

右㕮咀作一服水二大鍾煎至一鍾去滓大温服食遠

○已上諸方補瀉消導之劑

消暑丸（和劑方）治伏暑引飲脾胃不和

半夏一斤 甘草（生用） 茯苓（去皮各半斤）

右為末姜汁煑糊為丸如梧桐子每服五十丸熱湯下

解暑三白飲（和劑方）治冒暑伏熱霍亂嘔吐小便不利頭目昏眩

澤瀉 白术 白茯苓（各等分）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜五片燈心十莖煎八分不拘時服

五苓散（和劑方）治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤少如心神恍惚加辰砂如桂分兩又名辰砂五苓散（見濕熱）

加味五苓散（濟生方）治伏暑熱二氣及冒濕泄瀉注下或煩或渴或小便不利

赤茯苓（去皮） 澤瀉 猪苓（去皮） 白术（各一兩）

官桂（不見火） 車前子（各半兩）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜五片燈心十莖煎八分不拘時服

益元散（御藥院）方治中暑身熱小便不利此藥性凉除胃脘積熱又淡能滲溫故利小便而散溫熱也（見溫熱）

桂苓甘露飲（御藥院）方治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂瀉利

白茯苓（去皮） 白术 猪苓（去皮） 滑石（研各二兩）
寒水石（研） 甘草（炙） 澤瀉（各一兩） 肉桂（去皮半兩）

右為末拌勻每服二錢熱湯冷水任下入蜜少許尤好

桂苓甘露散（張子和）方

官桂（半兩） 人參（去蘆半兩） 藿香（半兩） 茯苓（去皮）
白术 甘草（炙） 葛根 澤瀉
石膏 寒水石（各一兩） 滑石（二兩） 木香（二錢半）

右爲細末每服二錢白湯下新水姜湯亦好

桂苓白术散（宣明）方治冒暑溫熱吐瀉轉筋腹痛小兒亦可服

官桂（去皮） 白术 猪苓（各五錢） 茯苓（去皮）
澤瀉（各一兩） 甘草（炙） 石膏 寒水石（各二兩）
滑石（四兩）

右爲末每服二錢熱湯新汲水或生姜湯調下劉廷瑞方不用猪苓

○已上諸方利溫清熱之劑

龍鬚散　一名甘草散（聖惠方）治中暑迷悶不省人事及泄瀉霍亂作渴一服即愈亦能解暑毒

白礬（生一兩）　五倍子（生一作五味子）　烏梅（搥去仁各二兩）

甘草（一兩半炙一方生用）　飛羅麪（一兩一方用清明日麪尤佳）

右為末入飛羅麪拌勻每服二錢新水調下　一方加柯子肉滴水為丸如彈子大細嚼水下名龍涎丸

二氣丹　治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或泄或嘔

硝石　硫黃（各等分）

右為末於銀石器內火炒令黃色再研用糯米糊為丸如梧桐子大每服四十丸新汲井花水下

來復丹（和劑方）治上盛下虛伏暑泄瀉如水

硝石（一兩同硫黃為末入鍋內以微火炒用柳條攪不可火大過恐傷藥力再研極細名二氣末）

船上硫黃（通明者二兩）　太陰玄精石（研飛二兩）

五靈脂（水澄過曬乾一兩）　陳皮（去白二兩）　青皮（去白二兩）

右先用五靈脂陳皮青皮為末次入玄精石末及二氣末拌勻好醋打糊為丸如豌豆大每服三十丸空心米飲送下

大黃龍丸（百一選方）治中暑身熱頭疼狀如瘧疾或煩渴嘔吐昏悶不食

船上硫黃　硝石（各一兩）　白礬　滑石（各半兩）

雄黄（半兩）　白麪（四兩）

右五味研末入麪和勻滴水丸如梧子大每服三十丸新水下

○廣按已上三方皆劫劑也夫暑熱流金爍石人到其時膚腠開豁氣液耗散而煩渴縱飲寒凉而不顧况氣液為汗發泄于外其中虛矣所以不能尅化水穀而停積膠固于内發為嘔吐泄瀉腹痛頭疼身熱諸證非石藥其性慓悍而能開散之乎

○已上諸方攻散暑毒之劑

暑病治例

出明醫雜著

王節齋曰夏至日後病熱為暑暑者相火行令也夏月人感之自口齒而入傷心包絡之經其脈虛或浮大而散或弦細芤遲蓋熱傷氣則氣消而脉虛弱其爲症汗煩則喘渴靜則多言身熱而煩心痛大渴引飲頭疼自汗倦怠少氣或下血發黄生斑甚者火熱制金不能平木搐搦不省人事治暑之法清心利小便最好暑傷氣宜補真氣為要又有惡寒或四肢逆冷甚者迷悶不省而為霍亂吐利痰滯嘔逆腹痛瀉痢此則非暑傷人乃因暑而自致之病也以其因暑而得故亦謂之暑病然治法不同也

若行人或農夫於日中勞役得之者是動而得之陽證也其病必苦頭痛發躁熱惡熱捫之肌膚火熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃天熱外傷元氣也宜清暑益氣用香薷黃連扁豆人參黃芪五味知母石膏之類

暑熱發渴脈虛用人參白虎湯（見前）或用竹葉石膏湯亦好（見溫熱）

東垣清暑益氣湯治長夏溫熱蒸人人感之四肢困倦精神少胷滿氣促支節痛或氣高而喘身熱而煩心下痞悶小便黃而數大便溏而頻或痢或渴不思飲食自汗躰虛此湯最好（見前）

若暑熱之時無病之人或避暑熱納凉於深堂大厦凉臺冷館大扇風車得之者是靜而得之陰證也其病必頭痛惡寒身形拘急肢節疼痛而煩心肌膚大熱無汗此為陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜用辛溫之劑以解表散寒用厚朴紫蘇乾葛藿香羌活蒼朮之類若外既受寒內復傷氷水生冷瓜果之類前藥再加乾姜縮砂神曲之類此非治暑也治因暑而致之病也

若外不受寒止是內傷氷水冷物腹痛泄瀉或霍亂吐逆宜縮脾飲（見前）或理中湯（見中寒類）加神曲麥芽

縮砂蒼朮此專治內溫中消食也

若吐瀉脈沉微甚者不可用凉藥可用大順散（見前）加熟附子等分或附子理中加炒芍藥

夏月多食冷物及過飲茶水致傷脾胃吐瀉霍亂故治暑藥多用溫脾消食治溫利小便之藥醫者要識此意

若旣傷暑熱復傷生冷外熱內寒宜先治其內溫中消食次治其外清暑補氣而以理脾爲主於前陰陽二條內相兼取用東垣清暑益氣湯已兼此意其用黃芪升麻人參白朮甘草麥門冬當歸五味黃柏葛根是清暑補氣也蒼朮神曲陳皮澤瀉青皮是治內補脾也

治暑風卒倒法　凡人中暑先着於心一時昏迷切不可與冷水飲并卧溫地其法先以熱湯灌或童便灌及用布蘸熱湯熨臍并氣海續續令暖氣透徹臍腹俟其甦省然後進藥若旅途中卒然暈倒急扶在陰凉處掬路中熱土作窩於臍中令人尿其內即甦却灌以人尿或攪地漿飲之半碗或車輪土五錢冷水調澄清服皆可　一方用大蒜三兩擣細嚼溫湯送下禁冷水即愈

補中益氣湯（見內傷類）

清肺湯（見咳嗽類）

中濕 六（陰湿熱）　乙集

丹溪心法

本草云蒼朮治湿上下部皆可用　二陳湯中加酒芩羌活蒼朮散風行湿　脾胃受湿沉困無力怠惰好卧去湿痰須用白朮　上部湿蒼朮功烈　下部湿宜升麻提之　外湿宜表散　內湿宜淡滲　若燥湿以羌活勝湿湯平胃散之類　若風湿相搏一身盡痛以黃芪防己湯　若湿勝氣實者以神佑丸舟車丸服之氣虛者桑皮茯苓人參葶藶木香之類　凡肥人沉困怠惰是湿熱宜蒼朮茯苓滑石　凡肥白之人沉困怠惰是氣虛宜二朮人參半夏草菓厚朴芍藥　凡黑瘦而沉困怠惰者是熱宜白朮黃芩　凡飲食不節脾胃受傷不能遞送宜枳朮丸　去上焦湿及熱須用黃芩瀉肺火故也又如肺有湿亦宜黃芩如肺有虛熱宜天門冬麥門冬知母用黃芩多則損脾　去中焦湿與痛熱用黃連瀉心火故也如中焦有實熱亦用黃連若脾胃虛弱不能運轉而鬱悶宜黃芩白朮乾葛若中焦湿熱積久而痛乃熱勢甚盛宜黃連用姜汁炒　去下焦湿腫及痛併膀胱有火邪者必須酒洗防己

黃柏知母草龍膽又云凡下焦有濕草龍膽防已為君甘草黃柏為佐如下焦腫及痛者是濕熱宜酒防已草龍膽黃柏蒼朮　若肥白氣虛之人腫痛宜二朮南星滑石茯苓。黑瘦之人下焦腫痛宜當歸桃仁紅花牛膝檳榔黃柏一

戴云濕有自外入者有自內出者必審其方土之致病源東南地下多陰雨地濕凡受必從外入多自下起以重腿脚氣者多治當汗散久者宜疎通滲泄西北地高人多食生冷濕麵重酪或飲酒後寒氣怫鬱濕不能越作致腹皮脹痛甚則水鼓脹滿或通身浮腫按之如泥不起此皆自內而出也辨其元氣多少而通利其二便責其根在內也此方土內外亦互相有之但多少不同須對證施治不可執一

附脉理

脉訣舉要曰或濡或細或濡或緩是皆中濕可得而斷

附諸方

麻黃白朮散　治感風濕身躰煩疼無汗發熱者

麻黃（去節三兩）　白朮（四兩）　甘草（炙二兩）　桂心（一兩）

杏仁（十六箇去皮尖）

右㕮咀每四錢水一鍾煎七分空心服

羌活勝濕湯（拔粹方）治脊痛項強腰似折項似拔上衝頭痛及足太陽經不行

羌活（去芦）　獨活（去芦各一錢）　藁本　防風（去芦各五分）

蔓荊子（二分）　川芎（二分）　甘草（五分炙）

如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也加黃栢一錢附子半錢蒼朮二錢水二鍾煎至一鍾去渣溫服食後

平胃散（和劑方）治脾胃不和不進飲食常服暖胃消痰

蒼朮（米泔浸五斤）　厚朴（姜制炒）　陳皮（各三斤二兩）　甘草（炒三十兩）

右為末每服五錢姜三片棗一枚煎服入塩一捻沸湯點服亦得

一方加草果名平胃草果散

一方　治風濕

用蒼朮一斤米泔浸竹刀刮去皮晒乾為片以半斤用童便浸一宿半斤用酒浸一宿焙乾為末每服一錢空心塩湯或酒調下常服除濕壯筋骨明目

防己黃芪湯　治風濕相搏客在皮膚四肢少力關節煩疼脈浮身重汗出惡風

防己（一兩）　甘草（炙半兩）　白朮（七錢半）　黃芪（一兩二錢五分）

右㕮咀每服一兩入姜棗煎　喘者加麻黃　胃氣不和加芍藥　氣上衝加桂枝　下有寒加細辛

朮附湯（和劑方）治風濕相搏腰膝疼痛四肢重著不嘔不渴大便堅硬小便自利

白朮（四兩）　附子（泡去皮臍一兩半）　甘草（炙二兩）

右㕮咀每服三錢水一鍾姜棗煎熱服

生附湯（直指方）治受濕腰痛腿腫

附子（生二錢半）　蒼朮（炒）　杜仲（姜炒半兩）　牛膝（酒浸焙）

厚朴（姜制）　乾姜（生）　白朮　茯苓（去皮）

甘草（炙各二錢半）

右㕮咀每服五錢姜三片棗一枚食前煎服

羌附湯（済生方）治風濕相搏手足掣痛不可屈伸或身微浮腫

羌活（去芦）　附子（泡去皮臍）　白朮　甘草（炙各等分）

右㕮咀每服五錢姜五片水一鍾煎七分溫服

除濕湯（百一選方）治寒濕所傷身體重著腰脚酸疼大便溏泄小便或澁或利

半夏（麯炒）　厚朴（姜製）　蒼朮（米泔制各二兩）　藿香葉

陳皮（去白）　白茯苓（去皮各一兩）　甘草（炙七錢）

白朮（生用一兩）

右㕮咀每服五錢水一鍾姜七片棗一枚煎七分食前溫服

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

○已上治外濕表散之劑

神仙飛步丹　治諸風濕癱瘓等証（見中風類）

仙傳黑虎丹　治感風濕傳於經絡手足麻木骨節遍身疼痛腰腿疼痛（見中風類）

乳香黑虎丹　治諸風寒濕客於經絡渾身骨節疼痛

蒼朮（三兩）　草烏（五兩）　白芷　五靈脂

羌活　川芎　自然銅（醋淬七次）　當歸（各二兩）

乳香（一兩）

右為細末酒糊為丸如梧桐子大百草霜為衣每服五七十丸臨卧温酒下忌熱物

○已上治外濕客于經絡既久踈通之劑

五苓散　治內傷飲食有濕小便赤少大便溏瀉（方見中著類）

赤茯苓丸（聖惠方）治內濕大過四肢腫滿腹脹喘急氣不宣通小便赤澁

葶藶（四兩）　防己（二兩）　赤茯苓（一兩）　木香（半兩）

右為末棗肉丸如梧桐子大每服五十丸桑白皮湯下

茯苓湯（秘方）治脾氣不實手足浮腫小便赤澁氣急喘滿

赤茯苓　澤瀉　香附子　陳皮

桑白皮　大腹皮　乾薑（各等分）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去渣温服不拘時

消腫丸（三因方）治水腫喘滿小便不利

白朮　黑牽牛（炒）　滑石　陳皮（各一錢半）

木通　茯神（去木）　半夏（湯泡七次）　通脫木

木香（各一錢二分半）　茯苓　瞿麥穗　丁香（各半兩）

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸灯草麥門冬湯下

○已上治內湿淡滲之劑

三花神佑丸（宣明方）治一切水湿腫病大腹實脹喘滿

輕粉一錢　大黃一兩　牽牛二兩　芫花（醋拌炒）

甘遂　大戟（各半兩）

右為末滴水丸小豆大初服五丸每服加五丸温水下無時日三服

○廣按世傳銀粉為治水腫鼓脹之藥以其善開湿熱怫鬱故也俱可少用為引經而已多則耗氣戒之戒之

舟車丸

大黃（二兩）　甘遂　大戟　芫花

青皮　陳皮（各一兩）　牽牛（頭末四兩）　木香（半兩）

右為細末水丸如梧桐子大每服六七十丸白湯下隨証加減

〇已上治濕勝氣實者之劑

枳朮丸　治飲食不節脾胃受傷不能運送（見痞滿）

升陽除濕湯　治脾虛不能運化濕勝泄瀉（見泄瀉）

大安丸　治脾胃有濕飲食減少（見傷食）

白朮和胃丸　治脾虛有濕不能飲食（見調胃）

〇已上健脾燥濕之劑

濕熱（新增）

附論

〇廣按濕熱之原盖因寒溫飢飽失常喜怒勞役過度以傷脾胃夫脾胃乃水穀之海也今脾胃受傷而動火火則薰蒸水穀而為濕熱者也又按胃司納受脾司運化今脾不能運化飲食飲食停積而生濕熱亦良多矣為治之法人壯實則專攻其濕熱人弱虛則攻補兼施而補脾消穀導水三者不可闕一也

附脉理

脉理提綱曰濕熱脉緩大

附諸方

神芎導水丸（宣明方）　治一切熱證常服保養除痰飲消酒食清頭目利咽膈能令徧身結滯宣通氣和而愈神強體健耐傷者病并婦人經病及產後血滯腰脚重痛小

兒積熱驚風潮搐名曰藏用丸亦曰顯仁丸加黃連薄荷川芎各半兩名曰神芎丸

大黃（錦紋者）　黃芩（中枯者各二兩）　牽牛　滑石（各四兩）

右為細末滴水為丸如小豆大溫水下十丸至十五丸每服加十丸日三服冷水下亦得煉蜜丸愈佳或久病熱鬱無問瘦悴老弱并一切證可下者始自十丸每服加十丸以利為度如常服此藥但除腸垢積滯不傷和氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾亦不困倦虛損煩遂病人心意或熱甚必須急下者便服四五十丸未利再服以意消息三五歲孩兒丸如麻子大凡此一法

此藥至善常服二三十丸不利藏府但有益無損或婦人血下惡物加桂枝半兩病微者常服病重者亦取利因而結滯開通惡物自下也此方除藏府滑泄者或裏寒脈遲者或婦人經病產後血下不止者但孕婦等則不宜服除此以外一切風熱雜病煩悶壅塞神氣不和或平人保養常服自顯其功若以效驗觀其藥味則非明本草造化之理者不可得而知其然也猶孔子讚易道明顯應化萬仁之善而不見其大道之用功故曰顯諸仁藏諸用因以云藏用丸亦其義也兼以世訛之久矣而反不喜此等妙方不肯服之每有久獲大効而鹹

懇求其方不得已而授之既見其方及生疑懼不復用焉亦有效而志信求其方務以廣傳救疾因衆議百端擬疑妄生謗訕致使俗醫皆畏之致道不能神但有妨病者後之君子但行其藥明顯諸人勿示其方而密藏諸用耳或以一法加黃連川芎薄荷等各半兩治一切頭目昏眩者愈加

○廣按此方瀉濕熱通利大小二便之藥也然濕熱內甚不從二便而逐導之何能使之去乎蓋諸病皆生於熱藏府為本經絡為標藏府之熱既去經絡之熱豈能留乎此河間劉先生議此方誠千載治熱病之筌蹄也果能依此方所云丸如小豆大每服十丸至十五丸以次而加以通利為度何患之有哉但有益而無損也又嘗論之地土有南北下濕高燥之殊人之賦質有肥白黑瘦之異所養有膏粱淡食之別所病有寒濕熱燥之差不可不詳審而明辨也若夫高燥之地黑瘦之人膏粱之家熱燥之病此藥切當若夫下濕之地肥白之人淡食之家寒濕之病此藥猶未當也古人所立之方君臣佐用主治引經範圍已定不可分毫移易但後人不善於用所施不當反生疑議良可嘆息

玄青丸（宣明方）治下痢勢惡頻併窘痛或久不愈諸藥不能湏此下之以開除溼熱痞悶積滯而使氣血宣通而愈兼宜利積熱酒食積黃瘦中滿水腫腹脹兼療小兒驚疳積熱乳癖諸証惟泄瀉者勿服（見痢類）

除溼丹（拔粹方）治諸溼客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急津液凝澁便溺不利目赤癮疹疽癰發背疥癬走注脚氣無首尾瘡瘍不可盡述

梹榔　甘草　威靈仙（二）　赤芍藥

葶藶（各二兩）　乳香　沒藥（各一兩）　牵牛

大戟（炒三兩）　陳皮（去白四兩）

爲末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸加至七八十丸温水下食前得更衣止如服藥前後忌酒二日藥後亦忌温麪兩三日食温淡粥補胃尤佳經驗良方有澤瀉青皮無葶藶

瘟疫（七　附大頭病　冬温病　嶺南諸病　運氣証治）

乙集

丹溪心法

瘟疫衆人一般病者是又謂之天行時疫治有三法宜補宜散宜降　熱甚者加童便三法中　入方宜

大黄　黄連　黄芩　人參

桔梗　防風　蒼朮　滑石

香附　人中黄

右為末神麯糊丸每服六七十丸分氣血與痰作湯使

氣虛者四君子湯　血虛者四物湯　痰多者二陳湯

送下　熱甚者童便下

又方溫病亦治食積痰熱降陰火

人中黄

飯為丸菉豆大下十五丸

又時疫方

半夏　川芎　茯苓　陳皮

山查　白朮　蒼朮　甘草

如頭痛加酒芩　口渴加乾葛　身痛加羌活薄桂防

風芎藥

○大頭天行病此為溫氣在巔高之上切勿用降藥東垣

有方

羌活　酒黄芩　酒蒸大黄

○冬溫為病非其時而有其氣也冬時嚴寒當君子閉藏

而反發泄於外專用補藥而帶表藥如補中益氣之類

作人中黄法

以竹筒兩頭留一節作一竅納甘草於中仍以竹木釘閉竅於大糞缸中浸一月取出晒乾大治疫毒

左手脉大於右手浮緩而盛按之無力

大病虛脫本是陰虛用艾灸丹田者所以補陽陽生陰長故也不可用附子止可多服人參

附諸方

十神湯　治時令不正瘟疫妄行

升麻葛根湯　治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱

柴胡升麻湯　治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾咳嗽涕唾稠粘

消熱解肌湯　治傷寒瘟病天行頭痛壯熱（俱見瘟熱類）

黃連橘皮湯　瘟毒發斑

黃連（四兩去土）　陳橘皮　杏仁（去皮尖）　枳實

麻黃（去節湯泡）　葛根（各二兩）　厚朴（姜汁炙）　甘草

每服五錢水一鍾煎溫服

小柴胡湯　治瘟疫內虛發熱胸脇痞悶

渴加瓜蔞仁

竹葉石膏湯　傷寒時氣表裏俱虛遍身發熱心胸煩悶

得汗已解內無津液虛羸少氣欲吐（俱見溫熱類）

化斑湯　治斑毒（見溫熱）

黃連解毒湯　治時疫三日已汗解或因飲酒復劇若煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不眠（見溫熱）

漏蘆湯　治臟腑積熱發為腫毒時疫疙瘩頭面洪腫咽嗌填塞水藥不下一切危惡疫癘

漏蘆　升麻　大黃　黃芩

藍葉　玄參（等分）

右㕮咀每服二錢水煎服　腫熱甚加芒硝二錢

消毒丸　治時毒疙瘩惡証

大黃　牡蠣　殭蚕（炒等分）

右為末煉蜜丸如彈子大新水化為丸　內加桔梗大力子湯尤妙

紫古雄黃丸　辟時疫可與病人同床傳着衣服亦不相染

雄黃（一兩研）　赤小豆（炒）　丹參　鬼箭羽（各二兩）

右為細末蜜丸每服五丸空心溫水下

治大頭病兼治喉痺歌

人間治疫有仙方　一兩殭蚕二大黃
姜汁為丸如彈子　井花調蜜便清凉

四君子湯

四物湯　俱見補損類

二陳湯（見痰類）

補中益氣湯（見內傷類）

○嶺南諸病（新增　出明醫雜著）

附諸方

春秋時月人感山嵐瘴霧毒氣發寒熱脇膈飽悶不思飲食此毒氣從鼻口入內也治當清上焦解內毒行氣降痰不宜發汗

黃連（一錢薑水洗炒）　黃芩（一錢酒拌炒）　升麻（一錢半）　生甘草（七分）
木香（一錢）　蒼朮（一錢半泔浸鹽水炒）　厚朴（一錢薑製）
枳實（一錢麩炒）　半夏（一錢湯泡七次）　桔梗（一錢去芦）　柴胡（一錢）
木通（一錢）

生姜五片水一鍾半煎七分食前熱服渣煎四分繼服

寒溫不節汗身脫衣巾感冒風寒之氣氣閉發熱頭疼此傷寒類也但嶺南氣溫易出汗故多類瘧重則寒熱不退輕則為瘧南方氣升故嶺南人得此病者卒皆胸滿痰涎壅塞飲食不進與北方傷寒只傷表而裏自和者不同治當解表清熱降氣行痰此方用於寒凉時月及雖在溫暖時而感冒風寒者

羌活（一錢半）　蒼朮（一錢泔浸）　柴胡（一錢）　黃芩（一錢）

橘紅（去白）一錢　半夏（湯洗）一錢　枳實一錢　甘草（炙）一錢

川芎一錢

生姜五片水一鍾半煎七分食前溫服渣煎四分隨服取汗出止服

瘴瘧時瘧寒熱往来

柴胡一錢半　知毋（半炒）一錢　蒼术（泔浸）一錢　黄芩（酒炒）一錢

乾葛一錢　陳皮一錢　半夏（湯洗）一錢半　川芎一錢

甘草七分（炙）

生姜三大片烏梅肉二箇水一鍾半煎七分食前清晨服渣煎四分午前服

瘧久者加人參一錢半當歸一錢汗多者去蒼术換白术加酒炒白芍藥各一錢半

後变成痢疾瘧後之痢從虛治用補脾胃藥

黄連（炒）一錢　木香一錢　縮砂一錢　黄芩（炒）一錢

橘皮一錢　白术一錢半　白芍藥（炒）二錢　甘草（炙）五分

當歸（酒洗）一錢

生姜三片水二鍾煎八分食前熱服

温暑之月民病天行瘟疫熱病治宜清熱解毒兼治內外

枯黄芩（酒炒）一錢　知母（酒炒）一錢　石膏一錢半　升麻一錢

黄連（酒炒）五分　生甘草七分　羌活三錢　白芍藥（酒炒）一錢

生地黃（酒洗五分）人參一錢半 乾葛一錢

生姜三片水一鍾半煎七分食前熱服渣煎四分繼

服 若胸膈痞悶痰涎壅塞者加枳實半夏各一錢

生姜汁四五匙 若脾胃不實加白朮一錢半

時氣發熱變為黃病所謂瘟癀也宜治內瀉溫熱

茵蔯一錢 黃連（水炒）一錢 姜山梔仁一錢 白朮一錢

白茯苓（去皮）一錢 厚朴（水炒）一錢 姜木通（去皮）一錢 木香七分

白芍藥（酒炒）一錢（炒）[illegible] 乾葛一錢半 人參一錢

生姜三大片水二鍾煎七分食前溫服渣煎四分（繼服）

運氣證治 新增 （出乾坤生意）

附諸賢論

運氣證治者所以參天地陰陽之理明五行衰旺之機考氣候之寒溫察民病之凶吉推加臨補瀉之法施寒熱溫凉之劑古人云治時病不知運氣如涉海問津誠哉言也今釐先賢圖訣撮其要領使人一覽而知其悉也矣

五運配十干之年

甲巳得合為土運 乙庚得合為金運 丁壬得合為木運 丙辛得合為水運 戊癸得合為火運

六氣為司天之歲

子午少陰君火 丑未太陰溫土 寅申少陽相火

卯酉陽明燥金　辰戌太陽寒水　巳亥厥陰風水

南政北政

甲己土運為南政蓋土居中央君尊南面而行餘四運以臣事之面北而受令所以有別也

十二支年分運氣

子午年少陰君火司天歲氣熱化之候

司天者天之氣候也

君火者手少陰心經也心者君主之官神明出焉君火乃主宰陽氣之本餘象生土乃發生萬物之源

陽明燥金在泉

在泉者地之氣候也

初之氣厥陰風木用事子上父下益辛瀉苦

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時　寒風切冽霜雪水冰蟄虫伏藏

民病　關節禁固腰脽疼中外瘡瘍

二之氣少陰君火用事火盛金衰補肺瀉心

自二月春分節起至四月立夏終止

天時　風雨時寒雨生羽蟲

民病　淋氣鬱於上而熱令人目赤

三之氣少陽相火用事君相二火瀉苦益辛

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　大火行熱氣生羽蟲不鳴燕百舌杜宇之類

民病　厥熱心痛寒更作咳喘目赤

四之氣太陰湿土用事子母相順瀉肺補腎

自六月大暑節起至八月白露終止

天時　大雨時行寒熱互作

民病　黃疸衄血咽乾嘔吐痰飲

五之氣陽明燥金用事心盛肺衰火怕水復

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時　温氣乃至初冬尤暖萬物尚榮

民病　寒熱伏邪於春為瘧

六之氣太陽寒水用事火衰心病瀉鹹益苦

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時　暴寒勁切火邪恣毒寒氣暴止

民病　生腫咳喘甚則血溢下連小腹而作寒中

丑未年太陰湿土司天歲氣湿化之候

太陰湿土者足太陰脾經也脾屬中央戊己土每季寄旺一十八日合為七十二日以應一歲六六三百六十日之成數也

太陽寒水在泉

初之氣厥陰風木用事主旺客衰瀉酸補甘

自年前十二月大寒節起至閏二月驚蟄終止

天時　大風發榮雨生毛虫

民病　血溢經絡拘強關節不利身重筋痛

二之氣少陰君火用事以下生上瀉甘補鹹

自二月春分節起至四月立夏終止

天時　太火至疫癘君令宣行溫蒸相搏暴雨時
降

民病　瘟疫盛行遠近咸若

三之氣少陽相火用事土旺剋水補腎瀉脾

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　雷雨電雹地氣騰溫氣降

民病　身重胕腫胸腹滿感冒溫氣

四之氣太陰溫土用事甘旺鹹衰補腎益膀胱

自六月大暑節起至八月白露終止

天時　炎熱沸騰地氣升溫化不流

民病　腠理熱血暴溢寒瘧心腹脹浮腫

五之氣陽明燥金用事土能生金益肝瀉肺

自八月秋分節起至十月立冬終止

國立中央圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

天時　大凉霧露降

民病　皮膚寒瘧痢甚行

六之氣太陽寒水用事以上尅下瀉脾補腎

自十月小雪節起至十一月小寒終止

天時　大寒凝冽

民病　關節禁固腰腿拘痛

寅申年少陽相火司天歲氣火化之候

少陽相火者三焦浮流之火火邪炎上上尅肺金金受尅腎水失毋則土盛下虛虛傷上攻變生諸疾致傷元氣

厥陰風木在泉

初之氣厥陰風木用事子父相逢瀉苦益辛

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時　熱風傷人時氣流行

民病　寒熱交作咳逆頭痛血氣不調心腹不快

二之氣少陰君火用事肺衰心盛制苦益辛

自二月春分節起至四月立夏終止

天時　暴風疾雨温湿相蒸

民病　上熱咳逆胸膈不利頭痛寒熱

三之氣少陽相火用事夏旺火熾補肺益大腸

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　炎暑亢旱草萎河輸

民病　煩熱目赤喉閉失血熱渴風邪人多暴死

四之氣太陰濕土用事火能生土瀉甘補鹹

自六月大暑節起至八月白露終止

天時　風雨時降炎暑未去

民病　瘧痢交作寒熱頭疼

五之氣陽明燥金用事肺金受邪瀉苦補辛

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時　寒熱風雨草木黃落

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

民病　寒邪風熱君子周密

六之氣太陽寒水用事心火受尅瀉鹹補苦

自十月小雪節起至十一月小寒終止

天時　寒溫無時地氣正寒霜露乃降

民病　感冒寒邪關節不利心腹痛

卯酉年陽明燥金司天歲氣燥化之候

陽明燥金者肺與大腸之氣象庚辛金也

少陰君火在泉

初之氣厥陰風木用事金木相尅補酸瀉辛

自年前十二月大寒節起二月驚蟄終止

天時　陰始凝風始肅水乃氷寒雨多花開遲

民病　寒熱浮腫失血嘔吐小便赤淋

二之氣少陰君火用事火盛金衰瀉苦益辛

自二月春分節起至四月立夏終止

天時　臣居君位大熱早行

民病　疫癘流行人多卒暴

三之氣少陽相火用事主盛客衰瀉心補肺

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　燥熱交合風雨暴至

民病　寒熱頭疼心煩作渴

四之氣太陰温土用事以下生上瀉辛益酸

自六月大暑節起至八月白露終止

天時　早秋寒雨有傷苗稼

民病　卒暴寒熱風邪傷人心疼浮腫瘡瘍失血

五之氣陽明燥金用事金盛木衰瀉肺補肝

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時　冬行春令草木生青風雨生虫

民病　寒熱作痢氣血不和

六之氣太陽寒水用事客來助土益苦瀉鹹

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時　氣候反溫蟄虫出現反行春令

民病　疫癘溫毒冊寒熱伏邪

辰戌年太陽寒水司天歲氣寒化之候

太陽寒水者足膀胱經也與足少陰腎經合為表裏

屬北方壬癸水

太陽溫土在泉

初之氣厥陰風木用事脾胃受邪瀉酸助甘

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時　氣早暖草早榮溫風至

民病　瘟疫寒熱頭疼嘔吐瘡瘍

二之氣少陰君火用事心火受邪瀉鹹補甘

自二月春分節起至四月立夏終止

天時　春寒多雨寒濕無時

民病　氣鬱中滿浮腫寒熱

三之氣少陽相火用事以上剋下瀉鹹助苦

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　暴熱乍涼疾風暴雨

民病　寒熱吐利心煩悶亂癰疽瘡瘍

四之氣太陰濕土用事木旺土衰瀉甘補酸

自六月大暑節起至八月白露終止

天時　風溫交爭雨生羽蟲暴風疾雨

民病　大熱短氣赤白痢瀉

五之氣陽明燥金用事金生水旺制鹹益苦

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時　溫熱而行客行主令

民病　氣虛客熱血熱妄行肺氣壅盛

六之氣太陽寒水用事水盛火衰瀉鹹助苦

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時　凝寒雨雪地氣正溫令行

民病　病乃憂慘孕嬪多災脾受溫肺旺肝衰

巳亥年厥陰風木司天之歲之氣風化之候

厥陰風木者足厥陰肝經也肝屬東方甲乙木春旺七十二日也

少陽相火在泉

初之氣厥陰風木用事脾胃受邪瀉酸補甘

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時　寒始肅客行主令殺氣方至

民病　寒居右脇氣滯脾胃虛壅

二之氣少陰君火用事火旺金衰瀉心補肺

自二月春分節起至四月立夏終止

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

天時　寒不去霜雪水冰氣施水草焦寒雨至

民病　熱中氣血不升降

三之氣少陽相火用事肺經受邪瀉苦益辛

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時　風熱大作雨生羽蟲

民病　淚出耳鳴掉眩

四之氣太陰濕土用事木土相刑瀉酸益甘

自六月大暑節起至八月白露節止

天時　熱氣返用山澤浮雲暴雨溽濕

民病　心受邪黃疸面為浮腫

五之氣陽明燥金用事以金刑木瀉肺益肝

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時　燥濕更勝沉陰乃布風雨乃行

民病　寒氣及躰肺受風脾受濕發為瘧

六之氣太陽寒水用事主助客勝瀉酸補甘

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時　畏火司令陽乃火化蟄虫出現流水不冰

地氣大發草乃生

民病　瘟疫心腎相制

○廣按運氣之說內經言之詳矣夫人在氣交之中與

天地相為流通苟不先立其年以明其氣臨病施治之際烏乎以用補瀉之藥哉此運氣證治不可不知也又嘗按而驗之多有不應何則陰陽之消長寒暑之更易或失其常在智者通其活變豈可膠柱鼓瑟按圖索驥也耶○又按時氣流行或有病者不病者蓋邪之所輳其氣必虛故虛者感邪而實者邪難入也又有一家傳染者蓋家有病人有憂患而飲食少飲食少則氣餒矣時與病人相近感其病氣從鼻口入也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之三　　丙集

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

內傷門

內傷八

丹溪心法

○內傷東垣內外傷辨甚詳世之病此者爲多但有挾痰者有挾外邪者有熱欝於內而發者皆以補元氣爲主看所挾而兼用藥如挾痰者則以補中益氣湯加半夏竹瀝仍少入姜汁傳送　九內傷發斑因胃氣虛甚是火游行

於外亦痰熱所致火則補而降之痰熱則微汗以散之切不可下恐生危證　內傷病退後燥渴不解者有餘熱在肺家可用參苓甘草少許姜汁冷服或茶匙挑姜汁與之虛者可用人參

○廣按外感內傷病之關鍵於此昧焉何足云醫夫外感張長沙已言之矣內傷李東垣已言之矣至於內傷挾外感丹溪言之者也況外感風寒則身熱鼻塞聲重左手脉洪盛乃有餘之症當發不當補內傷喜怒饑飽勞役則身熱口苦聲微右手脉洪盛乃不足之證當補不當發至於內傷挾外感之症又當補發兼施辨之不可不詳施之不可不當也予懷是論久矣及觀丹溪心法內傷條云內傷東垣內外傷辨甚詳世之病此者爲多有挾外邪者有挾熱鬱於內而發者有挾痰者皆以補元氣爲主看所挾而兼用藥此得吾心之同然者也但先生之言引而未發今予補之如內傷挾外感者則於補中益氣湯內春加川芎防風柴胡荊芥紫蘇薄荷之類夏加葛根石膏甘草薄荷升麻柴胡之類秋加羌活防風蒼朮荊芥之類冬加麻黃桂枝乾姜附子之類兩手脉俱洪盛而身熱鼻塞口苦無見也如內傷挾熱鬱於內而發者則

於補中益氣湯內加火鬱湯之類其人平素心胸脅悶手足心發熱小便赤脉沉数今脉洪数身熱是也如內傷挾痰者則於補中益氣湯內加半夏竹瀝姜汁之類其人肥白平素喘滿吐痰脉沉滑今脉洪滑躁是也噫嘻外感內傷不同發表補中有異如氷炭之相反天壤之懸隔學者茍無定見于中臨症畏懼鮮不眩惑也矣

火鬱湯（見發熱類）

附諸賢論

東垣曰甚哉陰陽之證不可不詳也徧觀內經中所說变化百病其源皆由喜怒過度飲食失節寒溫不適勞役所傷而然夫元氣穀氣營氣清氣衛氣生發諸陽上升之氣此六者皆飲食入胃穀氣上行胃氣之異名其實一也既脾胃有傷則中氣不足中氣不足則六腑陽氣皆絕於外故經言五藏之氣已絕於外者是六腑之元氣病也氣傷臟乃病臟病則形乃應是五臟六腑真氣皆不足也惟陰火獨旺上乘陽分故榮衛失守諸病生焉其中变化皆由中氣不足乃生發耳後有脾胃已受勞役之疾飲食又復失節躭病日久事息心安飽食太甚病乃大作槩其外傷風寒六淫客邪皆有餘之病當

爲不當補飲食失節中氣不足之病當補不當瀉今世醫者皆以飲食失節勞役所傷中氣不足當補之證認作外感風寒有餘客邪之病重瀉其表使榮衛之氣外絕其死只在旬日之間所謂差之毫釐謬以千里可不詳辨乎夫外感有餘之症寒熱甚而齊作鼻塞聲重頭常痛手背熱內傷不足之症寒熱微而間作口渴聲輕頭間痛手心熱於此可以稽驗矣　始受飲食勞倦所傷之病必氣高而喘身熱而煩及短氣上逆鼻息不調怠惰嗜卧四肢困倦不收無氣以動亦無氣以言皆爲熱傷元氣以甘溫之劑以補元氣即是瀉火之藥凡所受病捫摸之肌膚間必大熱必燥熱悶亂心煩不安或渴久病必不渴或表虛惡風寒慎不可以寒凉藥與之經言勞者溫之損者溫之惟以補中益氣湯溫藥以補元氣而瀉火邪內經云溫能除大熱正謂此也

王節齋曰東垣論飲食勞倦爲內傷不足之證治用補中益氣湯溯洄集中又論不足之中又當分別飲食傷爲有餘勞倦傷爲不足予謂傷飲食而留積不化以致宿食鬱熱熱發於外此爲有餘之證法當消導東垣自有枳朮丸等方治法具於飲食門矣其補中益氣方論卻謂人因傷飢失飽致損脾胃非有積滯者也故只用補

藥蓋脾胃全賴飲食之養今因飽飢不時失其所養則脾胃虛矣又脾主四肢若勞力辛苦傷其四肢則根本竭矣或專因飲食不調或專因勞力過度或飲食不調之後加之勞力或勞力過度之後繼以不調故皆謂之內傷元氣不足之證而宜用補藥也但須於此四者之間審察明白畧為加減則無不效矣

附脉理

東垣曰古人以脉上辨內外傷於人迎氣口人迎脉大於氣口為外傷氣口脉大於人迎為內傷此辨固是但其說本所未盡耳外感風寒皆有餘之證是從前客邪未也其病必見於左手左手主表乃陽行二十五度 內傷飲食及飲食不節勞役所傷皆不足之病也必見於右手右手主裏乃行陰二十五度 故外感寒邪則獨左手人迎脉浮緊按之洪大緊者急甚於弦是足太陽寒水之脉按之洪大而有力中見手少陰心火之脉丁與壬合內顯洪大乃傷寒脉也 若外感風邪則人迎脉緩而大或大於氣口一倍或兩倍三倍 內傷飲食則右手氣口脉大於人迎一倍傷之重者過在少陰則兩倍太陰則三倍此內傷飲食之脉 若飲食不節勞過甚則心脉變見於氣口是心火刑肺其肝木挾心火

之勢亦來薄肺經去侮所不勝寡於畏者是也故氣口脉急大而数特一代而濇也濇者肺之本脉代者元氣不相接脾胃不及之脉洪大而數者心脉刑肺也急者肝木挾心火而反尅肺金也　若不甚勞役惟右關脾脉大而數謂獨大於五脉數中顯緩特一代也　如飲食不節寒暑失所則先右關胃脉損弱甚則隱而不見惟內顯脾脉之大數微緩特一代也宿食不消則獨右關脉沉而滑經云脉滑者有宿食也

附諸方

補中益氣湯　治形神勞役或飲食失節勞倦虚損身熱而煩脉洪大而虚頭痛或惡寒而渴自汗無力氣高而喘

黄耆（一錢半）　人參　甘草（炙各一錢）　白术

當歸身　柴胡　升麻　陳皮（各半錢）

渴加葛根（五分）　嗽加麥門冬（一錢）

五味子（十五粒）

一方有白芍藥半錢（秋冬不用）黄柏三分以滋腎水瀉伏火紅花三分入心養血

右作一服水煎午前稍熱服

按立方本指云夫脾胃虚者因飲食勞倦心火亢甚而

乘其土位其次肺氣受邪須用黃耆最多人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃耆以益皮毛而閉腠理不令自汗上喘氣短損其元氣人參以補之心火乘脾炙甘草之甘溫以瀉火熱而補脾胃中元氣若脾胃急痛腹中急縮者宜多用之經云急者緩之白朮苦甘溫除胃中熱利腰臍間血胃中清氣在下升麻柴胡以引之引黃耆甘草甘温之氣味上升能補衛氣之散解而實其表也又緩帶脉之縮急二味苦平味之薄者陰中之陽引清氣上升也氣亂於胸中為清濁相干用陳皮以理之又能助陽氣之升以散滯氣助諸甘辛為用也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

脾胃氣虛不能升浮為陰火傷其生發之氣榮血大虧榮氣不榮陰火熾盛是血中伏火日漸煎熬血氣日減心主血血減則心無所養致使心亂而煩病名曰悗悗者心惑而煩悶不安也故加辛甘微溫之劑生陽氣陽旺則能生陰血更以當歸和之少加黃檗以救腎水能瀉陰中之伏火如煩不止少加生地黃補腎水水旺而心火自降如氣浮心亂以朱砂安神丸鎮固之則愈

若病日久者以權立加減法　若頭痛加蔓荊子三分痛甚加川芎五分頂疼腦痛者加藁本五分細辛三分諸頭痛併用此藥四味頭痛有痰沉重懶倦者乃太陰

厥陰頭疼加半夏半錢或一錢生姜三片　若耳鳴目黄頰頷腫頸肩臑肘臂外後廉痛面赤脉洪者加羌活一錢防風七分甘草三分藁本五分通其經血加黄芩黄連各三分消其腫　嗌痛頷腫脉洪大面赤加黄芩三分桔梗七分甘草三分　口乾嗌乾或渴者加葛根五分升胃氣上行以潤之　心下痞瞀悶者加芍藥黄連各一錢如痞腹脹加枳實三分厚朴七分木香砂仁各三分如天寒加乾姜　腹中痛者加白芍藥炒半錢炙甘草三分如惡寒覺冷痛加桂心半錢夏月腹中痛不惡寒反惡熱者加黄芩五分芍藥一錢甘草五分以治時熱　臍下痛者加真熟地黄半錢　如胷中滯氣加蓮翹青皮一分或二分壅滯可用氣促少氣者去之　如身体重疼乃風濕相傳加羌活半錢防風半錢升麻一錢柴胡半錢藁本根半錢蒼术一錢如病去勿再服　若大便秘澁加歸稍一錢　若久病痰嗽者去人參冬月加不去節麻黄秋凉亦加不去根節麻黄春月天温加佛耳草三分欵花一分勿加麻黄　若初病之人雖痰嗽不去人參必不增添若久病肺中伏火者去人參以防痰嗽增益耳　長夏濕土客邪太旺加蒼术白朮澤瀉上下分消其濕熱之氣濕熱大勝主食不消

故食減不知穀味則加麯以消之加五味子麥門冬助人參瀉火益肺氣助秋損也在三伏中為聖藥　脇下急或痛俱加柴胡甘草人參　多唾或唾白沫胃口上停寒也加益智仁　若胃脘當心痛加草荳蔻仁三分疲甚之人參耆白朮有用至一兩二兩者

朱砂安神丸　治心神煩亂怔忡兀兀欲吐氣亂而熱似懊憹狀

黃連（一錢半）　生地黃　當歸身　甘草（炙各錢半）

朱砂（一錢另研為衣）

右為末蒸餅丸黍米大每十丸或十五二十丸唾津下

升陽順氣湯　治因飲食不節勞役所傷腹脇滿悶短氣遇春則口無味遇夏雖熱猶寒飢常如飽不喜食冷

升麻　柴胡（各一錢）　黃耆（一兩）　半夏（三錢）

甘草（炙半錢）　陳皮（一錢）　人參（一錢）　神麯（一錢炒）

歸身（一錢）　黃柏（半錢）　草豆蔻仁（二錢）

右㕮咀每服三錢或半兩水煎入生姜三片

按論云脾胃不足之證須用升麻柴胡苦平味之薄者陰中之陽引脾胃中清氣行於陽道及諸經生發陰陽之氣以滋春氣之和也又引黃耆人參甘草甘溫之氣味上行充實腠理使陽氣得衛外而為固也凡治脾胃之

藥多以升陽補氣名之者也

參朮調中湯　瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食

黃耆（四分）　桑白皮（五分）　人參　甘草（炙）

白茯苓（各三分）　五味子（二十箇）　白朮（三分）　地骨皮

麥門冬　陳皮（各二分）　青皮（一分）

右㕮咀作一服水煎大溫服早飯後忌多言語勞役

按論云內經曰火位之主其瀉以甘以黃耆甘溫瀉熱補氣桑白皮苦微寒瀉肺火定喘故以為君肺欲收急食酸以收之以五味子之酸收耗散之氣止咳嗽脾胃不足以甘補之白朮人參炙甘草苦甘溫補脾緩中為臣地骨皮苦微寒善解肌熱茯苓甘平降肺火麥門冬甘微寒保肺氣為佐青陳皮苦辛溫散胷中滯氣為使也

升陽益胃湯　治脾胃虛則怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口乾舌乾飲食無味大便不調小便頻數食不消兼見肺病洒淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當以升陽益胃治之

柴胡　白朮　茯苓（渴者勿用）　澤瀉（各三錢）

羌活　獨活　防風（各半兩以秋旺故以辛溫瀉之）

黃耆（二兩）　人參　半夏　甘草（炙各一兩）

黄連（一錢） 陳皮（四錢） 白芍（五錢）

（何故秋旺用參朮芍藥之類反補盖脾胃虚則肺俱受邪故因時而補易為力也）

右每服三錢水煎入姜棗早飯後温服或加至半兩服藥後如小便罷而病加劇是不宜利小便當少去茯苓澤瀉若喜食初一二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚少胃氣（不得）轉運升發也須薄味之食或美食助其藥力益外浮之氣而滋其胃氣慎不可淡食以損力而助邪氣之降沉也可以少役形體使胃與藥得轉運升發慎勿大勞役使氣復之若脾胃得安靜為佳若胃氣稍強少食果以助穀藥之力經云五穀爲養五果爲助者也

○此類諸方俱是補益之劑

傷食

九 丙集

丹溪心法

○傷食惡食者胸中有物宜導痰補脾用二陳湯加白朮山查川芎蒼朮服之

○憂抑傷脾不思飲食炒黄連酒芍藥香附同清六丸末用姜汁浸蒸餅丸服

入方

治氣抑鬱倦不思飲食

香附　白芍（各一兩半）

白朮（二兩）　蒼朮　陳皮　黃連

黃芩　半夏（各二兩）　扁栢（七錢半）

右爲末姜汁麪糊丸

治心腹膨亨（內多食積所致）

南星（姜製一兩半）　半夏　瓜蔞仁（研和潤一兩半）　香附（一兩童便浸）

黃連（三兩姜製炒）　礞石（硝煅）　蘿蔔子　連翹（半兩）

麝香（少許）　又方加陳皮（半兩）

右爲末麯糊丸

一人因喫麪內傷吐熱頭痛

白朮（一錢半）　白芍　陳皮　蒼朮（各一錢）

茯苓　黃連　人參　甘草（各半錢）

右作一服姜二片煎如口渴加乾葛二錢再調理

補脾丸

白朮（半斤）　蒼朮　茯苓　陳皮（各三兩）

粥爲丸

二陳湯（見痰類）

清六丸（見泄瀉類）

附脉理

脉訣舉要曰氣口緊盛為傷於食食不消化浮滑而疾

心法附錄曰傷食之証右手氣口必緊盛胷膈痞塞噫氣如敗卵臭亦有頭痛發熱但身不痛為異耳

附諸方

荳蔻橘紅散（楊氏家藏方）溫脾養胃升降陰陽和三焦化宿食

丁香　木香（各一兩）　白豆蔻仁　人參

厚朴（姜製）　神麯（炒）　乾姜（炮）　半夏麯

橘紅（去白）　甘草（炙）　藿香葉（去土）　白朮（各半兩）

右㕮咀每服三錢水一盞生姜三片棗一枚煎七分去滓溫服

紅丸子（和劑方）壯脾胃消宿食并治冷癖

京三稜（水浸軟）　莪朮　陳皮（去白）　青皮（去白各五斤）

乾姜（炮）　胡椒（各二斤）

右為末醋煮麫糊丸如梧子大以礬紅為衣每服二十丸食後姜湯下

丁香爛飯丸（拔粹方）治食傷又治卒心痛

丁香皮　甘草（炙各二錢）　砂仁（三錢）　益智仁（三錢）

香附子（半兩）　甘松（三錢）　丁香　京三稜（炮）

木香　廣朮（炮各一錢半）

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每三十丸白湯下或細嚼亦可不拘時候

木香當歸散　實脾順氣消食

川芎　當歸　人參　官桂

三稜（炮）　莪术（炮）　青皮（炒）　厚朴

麥蘖　乾姜　小茴香（炒）　木香

陳皮　甘草　神麯（炒）　枳殼（各等分）

右㕮咀每服八錢水二盞生姜三片棗子一枚葱白三莖煎至一盞溫服大便閉倍加枳殼加檳榔一兩炒去乾姜食前服

○已上辛溫消導宿食之劑

麴蘖枳术丸　治為人所勉強食之故心腹滿悶不快

白术（二兩）　枳實　神麯（炒）　麥蘖麪（炒各一兩）

右為細末荷葉燒飯丸如桐子大每服五十丸溫水下

消食化氣香殼散　醒脾去積順氣化痰

青皮（炒）　陳皮（炒各四兩）　蘿蔔子（炒）　木香

三稜（炒）　蓬术（炒）　神麯（炒）　麥蘖（炒各二兩）

枳殼（炒二兩）　半夏（二兩半）　枳實（炒一兩）　香附子（一兩半醋浸）

檳榔　山查　草果（各一兩）

陳倉米（一升用巴豆二十粒炒黃色去巴豆不用）

右為末醋糊丸如桐子大每服四五十丸漸加至七八十丸食後淡湯或白湯下

一方　治食過飽滿悶

青橘皮（二兩湯浸去穰炒黄）　葛根（一兩）　縮砂（半兩）

右為細末濃煎茶調一二錢服乾舔喫亦可常服消食化氣醒酒

寬中丸（丹溪秘方）治胃膈痞悶停滯飲食

山查（不以多少蒸熟晒乾）

右為大作丸服

大安丸（丹溪秘方）脾經消導之藥

山查（二兩）　神麴（炒）　半夏　茯苓（各一兩）

陳皮　蘿蔔子　連翹（各半兩）　白术（二兩）

右為細末粥糊丸服

○已上辛平消導宿食之劑

除濕益氣丸　治傷濕麪心腹滿悶肢體沉重

枳實（麩炒）　白术　黄芩（各一兩）　蘿蔔子（炒熟去殻半兩）

神麴（炒一兩）　紅花（三錢）

右為細末荷葉燒飯為丸如菉豆大每五六十丸白湯下或姜湯下

二黄丸　治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩（二兩）　黃連（酒浸一兩）　升麻　柴胡（各三錢）

甘草（二錢）　枳實（半兩炒）

右為極細末湯浸蒸餅丸如菉豆大每五七十丸白湯下或姜湯下

白朮丸　治傷豆粉濕麪油膩之物

白朮　半夏（湯洗）　神麴（炒）　枳實（炒各一兩）

橘皮（七錢）　黃芩（半兩）　白礬（枯三錢）

右爲細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大一倍每五十丸白湯下量所傷加減服

○已上辛涼消導宿食之劑

木香見晛丸　治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

巴豆霜（半錢）　荊三稜（煨一兩）　神麴（炒一兩）　木香（二錢）

香附（半兩炒）　京三稜（煨半兩）　升麻（三錢）　柴胡（二錢）

草豆蔻（麪裹煨半兩）

右為末湯浸蒸餅丸如菉豆大一倍每二十丸白湯下量所傷服之

三稜消積丸　治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

丁皮　益智（各三錢）　陳皮　青皮（各五錢）

茴香（半兩炒）　炒麴　廣朮　京三稜（各七錢炮）

巴豆（和米炒去米五錢）

右為細末醋糊丸如梧桐子大每十丸至二十丸温姜湯下食前看虛實加减如更衣止後服

如意丸（濟生方）治氣虛積冷停食不消心下堅痞噫宿腐氣及霍亂吐瀉水穀不消一切食積之疾並皆治之

半夏（湯泡七次）　三稜　枳殼（去白）　檳榔

陳皮　乾姜　黃連　蓬朮（各二兩）

巴豆（三十七粒連殼同用前藥醋煮）

右除巴豆外餘藥剉如豆大用好酒煮乾用巴豆同藥焙為末薄糊丸如菉豆大每服十丸加至二十丸用茶清姜湯任下食後温服孕婦不宜服之

阿魏丸（濟生方）治脾胃怯弱過食肉麪生果之物停積中焦不能尅化以致腹脹刺痛嘔惡不食或利或秘並皆治之

百草霜（三錢）　巴豆（去皮心膜油七箇）　阿魏（酒浸化）　官桂（不見火）

蓬朮（炒）　麥糵（炒）　神麯（炒）　青皮（去白）

蘿蔔子（炒）　白朮　乾姜（炮各半兩）

右為末和勻用薄糊丸如菉豆大每服二十丸不拘時麪傷用麪湯下生果傷用麝香湯下

渥元劉山斎神効感應丸　常服消食除積滯不動藏府

丁香　木香　檀香　陳皮

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

角沉香（不見火）　青皮　黃連　砂仁

香附（去毛）　三稜（煨）　半夏（湯泡七次去衣）　莪朮（大剉用麩煨）

已上藥各一兩净研為細末外用肥烏梅有肉者一百枚去核巴豆三百粒肥白者去皮膜心右用磁器一隻盛巴豆以烏梅肉盖之却用陳米醋浸與烏梅肉平於甑上蒸以巴豆紅色為度却搗二件令極爛次用糯米粽和前件諸藥搜勻搗千百下以黑為度衆手丸如蘿蔔子大每服十丸飲食不消陳皮湯下氣滯茴香湯下酒後嘔吐痰涎生姜湯下

秘方化滯丸　理一切氣化一切積奪造化有通塞之功調陰陽有補瀉之妙久堅沉痼磨之自消暴積乍留導之立去

南木香（堅實者不見火）　丁香（去苞不見火）　青皮（四花者去穰）

紅橘皮（水浸去白）　黃連（大者各二錢半）　京三稜（慢火煨）

莪朮（慢火煨各四錢八分）　半夏麯（揀白净半夏研末搗生姜自然汁和為餅晒乾二錢五分）

前八味晒乾和研為細末

巴豆（去殼滚湯泡逐一研開去心膜以瓦器盛用好醋浸過一宿慢火熬至醋乾秤六錢重碾細將前藥末和再碾令勻入後烏梅肉膏巴豆若乾止用四錢五分）

烏梅（用肉厚者打碎去核細剉火焙乾為細末秤五錢重用米醋調畧清慢火熬成膏和入前藥）

右通和勻了用白麪八錢重水調得所慢火調糊為丸

如粟米大每服五七丸人盛者十丸五更空心用橘皮湯下　常服磨滯不欲通泄津液嚥下　停食飽悶枳殼湯下　但有所積物取本汁冷下　因食吐不止津液嚥下即止　食瀉不休及霍乱嘔吐俱用冷水下　赤痢冷甘草湯下　白痢冷乾姜湯下　心動石菖蒲湯下　赤白痢冷甘草乾姜湯下　諸氣痛生姜橘皮湯下　小腸氣痛茴香酒下　婦人血氣當歸湯下　若欲宣積滚姜湯下　仍加丸數未利再服利多飲冷水一口補住　小兒量歲數加减丸服癖積常服米飲下不拘時服　孕婦勿服此藥得熱則行得冷則止

海藏神應丸　治因一切冷物冷水及潼乳酪水腹痛腸鳴水穀不化

巴豆　杏仁　乾姜　百草霜（各半兩）

丁香　木香（各二錢）　黄蠟（一兩）

右先將黄蠟用好醋煮去滓將巴豆杏仁同炒黑烟盡研如泥將蠟再上火入麻油半兩溶開入在杏仁等泥子內同攪旋下丁香等藥末研勻搓作挺子油紙裹了旋丸每用三五十丸溫米飲下食前服

○已上辛溫熱藥逐宿食之劑

大柴胡湯　治內傷飲食鬱結在裏身熱煩燥日晡發熱

如癃脈實而滑數者用此微利（方見胃寒類）

三黃枳朮丸　治傷肉食濕麪辛辣味厚之物填塞悶亂不安

黃芩（二兩）　黃連　大黃（煨）　神麯（炒）

白朮　橘皮（各一兩）　枳實（炒半兩）

右為末湯浸蒸餅丸如菉豆大一倍每五十丸白湯下量所傷服之

枳實導滯丸　治傷濕熱之物不得施化而作痞悶不安

茯苓　黃芩（炒）　白朮　黃連（各三錢）

澤瀉（二錢）　大黃（一兩）　枳實（炒）　神麯

右為細末如上法丸七十丸

大枳殼丸（御藥院方）治一切酒食傷胸膈閉悶疼痛飲食不消兩脇刺痛嘔逆噁心並皆治之

蓬莪朮（煨香熟）　厚朴（去粗皮薑汁製）　人參（去蘆）　青皮

黑牽牛（炒）　枳殼（麩炒去穰）　茯苓（去皮）　木香

陳皮（去白）　白朮（各一兩）　檳榔　大黃（鍋煨各二兩）

半夏（湯泡七次）　麥蘖（微炒）　神麯（炒黃）　三稜（各一兩）

一方有乾生薑（五錢）

右為末薑汁糊丸如梧桐子大每服三四十丸薑湯下

常服美食

木香檳榔丸　治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹滿大小便結滯不利者並亦服之

木香　檳榔　青皮（去白）　陳皮（去白）

枳殼（麩炒）　廣茂（煨切）　黃連（各一兩）　黃栢（去粗皮一兩）

香附　大黃（炒各三兩）　黑牽牛（生取頭末各三兩）

右為末滴水丸如豌豆大每服三五十丸食後生薑湯送下加至以利為度

木香和中丸　和脾胃消宿食利胸膈化痰涎除隔熱進飲食

木香　黃芩　青礞石　枳殼

檳榔　青皮　橘紅（各半兩）　滑石（二兩）

沉香（二錢）　大黃（一兩二錢）　黑牽牛（頭末二兩三錢）

右為末水丸如梧桐子大每服五十丸薑湯或茶清下

○已上辛凉推逐宿食之劑

○廣按已上方中用巴豆大黃者蓋取其推逐積滯去而正氣自復矣如用石灰於田中殺稂莠稂莠死而禾苗自茂也夫巴豆性大熱號為斬關奪門之將若傷生冷硬物不能消化用之推逐可也若施之於傷濕熱之物則是以火濟火而反助病邪矣大黃性大寒號為將軍若傷（濕熱）之物不能轉運用之推逐

可也若施之於傷生冷之物則是以寒治寒而扞格不入矣又常論之人有虛實病有新久若夫少壯新病者固當用藥推逐急去為美若夫衰老久病者又當用藥消導漸去為佳東垣所謂輕則損其穀重則逐其滯是也　然病之新久要分而用藥寒溫不可不察丹溪所謂明知身受寒氣口與寒物而得病者於初得之時當與溫散溫利之藥若曰病得之稍久則成鬱久鬱即蒸熱熱久必生火若欲行溫散溫利之藥寧無助火添病邪惟當用辛涼以發表辛寒以理中則邪易伏病易退正易復而病安矣

葛花解酲湯（拔粹方）治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

白豆蔻　砂仁　葛花（各半兩）　木香（半錢）

青皮（三錢）　陳皮　白茯苓　猪苓

人參（各一錢半）　白术　神麯（炒）　澤瀉

乾生姜（各二錢）

右為細末和勻每三錢白湯調下但得微汗酒病去矣

論云此盖不得已用之豈可恃賴日日飲酒耶是方氣味辛溫偶因酒病服之則不損元氣何者敵酒病故也若頻服之損人天年也

○麴糵藥乃氣之偏可用於暫而不可用於久有病則病當之無病則正氣當之所以不可久也

除濕散　治傷馬乳并牛駱水一切冷病

車前子（炒）　澤瀉（各半兩）　神麴（炒一兩）　半夏（湯泡七次）

乾生姜（各三錢）　紅花　甘草（炙各二錢）　茯苓（七錢）

右爲細末每三錢七白湯調食前服

五苓散　見中暑類

○麴糵酒作濕熱治之之法或發汗或利小便使上下分消其濕是也已上三方並滲利之劑也

益脾丸　治飲酒不醉又益脾胃

葛花（二兩）　小豆花（一兩）　綠豆花（五錢）　木香（二錢半）

一方加草豆蔻（去皮一兩）

右件為末蜜丸如梧子大紅花湯下十丸或夜飲津液下五丸最妙

葛花散（御藥院方）治飲酒令人不醉

葛花　小豆花（各一兩）

右件為末每服三錢　仍進葛汁及枇杷葉飲倍能飲酒　又九月九日甘菊花末飲酒時先服方寸匕　又小豆花葉陰乾百日為末服之能消酒

烏梅丸　消酒食

神麴（炒）　烏梅　麥蘖　龍腦葉

右以茸草膏子為丸

硼砂丸　消酒清膈

硼砂（三錢）　片腦（五分）　麝香（半錢）　薄荷葉（一錢）

右以茸草膏子為丸硃砂為衣

不醉方

菉豆　赤豆　葛根（等分）

右為末當未飲之酒前用冷水調一匙或二匙服之令人不醉

方雞肶胵乾葛等分為末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸酒送下

神妙列仙散　治飲酒所傷以致遍身疼痛腰脚強跛手足頑麻胃脘疼痛胸膈滿悶肚腹膨脹嘔吐瀉利及酒食停久成一應積聚黃疸熱鼓並皆治之

木香　沉香（各一錢）　茴香（微炒）　檳榔（各一錢）

萹蓄（三錢）　大黃（一兩微焙炒）　麥蘖（一兩半）　瞿麥（五錢）

右為末每服三錢或五錢五更熱酒調下能飲者多飲二三盃不妨仰面臥手叉胸前至天明取下大便如魚腦小便如血為效忌生冷硬物及葷腥止啖米粥

○已上消導宿酒之劑

備急大黃丸　療心腹諸痛卒暴百病

大黃　乾姜　巴豆（去皮各一兩）

右精擇藥品為末蜜和更搗一千杵丸如小豆大每服三丸大小量之若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤尸厥卒死者以熱水或酒服之或口噤用木棒撐起牙關令下咽須臾差未差更與三丸以腹中鳴轉即吐便愈若口噤須折齒灌之令入為妙忌蘆筍猪肉冷水肥膩之物易水張先生叙獨行丸乃急劑也

瓜蒂散　治上部有脉下部無脉其人當吐不吐者死何謂也下部無脉此所謂木鬱也飲食過飽填塞胷中者太陰之分野經云氣口反大於人迎三倍食傷太陰故曰木鬱即達之吐者是也

瓜蒂　赤小豆

右二味為極細末每服一錢匕温漿水調下取吐為度若不兩手尺脉絕無者不宜便用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胸中窒塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如是食不得去者方用此藥去之○已上二方劫奪壅滞之劑

調補脾胃（十　新增）

附論

廣按內經曰胃者五臟六腑之海也水穀皆入於胃五藏六府皆禀氣於胃胃者五藏之本六府之大源也又曰胃為水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行合於四時五藏陰陽揆度以爲常也以此論之若夫飲食有節寒溫適宜則脾胃壯實而能納受水穀運化精微充溢五藏六府榮衛四肢百骸以供給日用動作云為若失飲食失節寒溫不適則脾胃虛弱不能納受水穀運化氣液則五藏六府失其所禀受四肢百骸失其所榮衛而日用動作云為失其所供給也況土為五行之本萬物藉土而生古人以扶持脾胃為王道之藥誠有旨哉今於調補脾胃條下謹述內經之旨及予鄙見欲人知節飲食適寒溫爲養脾胃之本倘脾胃虛弱又當以後開諸方擇而用之苟得脾胃壯實則外邪不能侵內邪不能起固本澄源之事也

附諸方

調中益氣湯　夫脉弦洪緩而沉按之中之下得一澀其證四肢滿悶肢節煩疼難以屈伸身躰沉重煩心不安

忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味大小便清利而數或上飲下便或大便澁滯不行一二日一見夏月飧泄米穀不化或便後見血見血膿胷滿短氣咽膈不通安臥嗜睡無力不思飲食

升麻（二分） 黃耆（一錢） 甘草（半錢） 蒼朮（四分）

木香（一分） 人參（五分） 柴胡（二分） 橘皮（二分）

右㕮咀作一服水煎食前熱服

如時顯熱燥是下元陰火蒸發也加生地黃黃栢

如大便澁坐不得或大便了而不了腹常逼迫血虛血澁也加歸身

白朮和胃丸　治久病不能食而臟腑或結或溏此胃氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕和脾胃進飲食

厚朴（製） 半夏（[illegible]） 白朮（一兩二錢） 陳皮（八錢）

檳榔 枳實（麩炒二錢） 木香（一錢） 人參（七錢）

甘草（炙三錢）

右為末生薑汁浸蒸餅丸如梧桐子大每三十丸溫水食遠服

補脾丸（丹溪秘方）　有脾虛而惡湯藥者製此丸用湯吞省口苦而易於從也

白朮（半斤） 蒼朮 茯苓 陳皮（各三兩）

芍藥（半兩）

右為末粥糊丸加潤下丸可作催生用上熱甚者加清金丸尤妙與此藥必無產患

潤下丸（見痰類）

青金丸（見嗽咳）

白术丸（心法秘方）同前

白术（一兩）　白芍藥（半兩）

冬月不用芍藥加肉豆蔻泄者炒丸服

右為末粥丸

一方枯礬半夏各一錢半治脾泄

養脾丸（和劑方）治脾胃虛冷心腹脹悶嘔逆惡心泄瀉

大麥蘖（炒）　白茯苓（去皮）　人參（去蘆各一斤）　白术（半斤）

乾姜（炮）　縮砂（去皮各二斤）　甘草（爁一斤半）

右為末煉蜜為丸每兩作八丸每服一丸細嚼姜湯下

思食調中丸（御藥院方）治脾胃久弱三焦不調氣滯胸膈痞悶不食嘔逆惡心或吐痰水

神麯（炒）　麥蘖（炒）　陳皮（去白）　半夏麯

烏藥（各一兩）　檳榔　人參（各七錢）　白木（一兩半）

木香　沉香（各半兩）

右為末蜜調白麪打糊丸如梧桐子大每服三十丸米

飲吞下

治中湯（和劑方）治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或泄瀉

人參（去蘆） 甘草（炙） 乾姜（炮） 白朮

青皮（去白） 陳皮（去白各一兩）

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓空心溫服嘔吐不已加半夏等分丁香減半名丁香溫中湯

補脾湯（三因方）治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不消

人參（去蘆） 茯苓（去皮） 草果（去皮） 乾姜（炮各一兩）

麥櫱（炒） 甘草（炙各一兩半） 厚朴（去皮姜製） 陳皮（去白）

白朮（各七錢半）

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分去渣空心溫服

溫脾散（本事方）開胃進食利氣散寒濕溫中

青皮（去白） 陳皮（去白） 縮砂仁 舶上茴香（炒）

良姜 桔梗 白芷 厚朴（各一兩）

木香 麥櫱 香附 白朮（各半兩）

甘草（一兩半） 紅豆 乾葛（各三錢）

右㕮咀每服三錢水一盞棗一枚煎七分去渣空心服

生胃丹 生胃消痰沫開胸膈進飲食

粟米（四兩溫水浸透炊作飯焙乾秉熱用生姜自然汁和濕再焙乾如是製七次）

天南星（三兩姜汁浸一宿次日用生姜自然汁和爲餅黃土泥裹南星餅乾慢火炊半日泥焦乾）（取出南星用藥）

人參　白朮　茯苓（各二兩）　陳皮

白豆蔻　縮砂　麥蘗（炒）　半夏麴

青皮　華澄茄　石蓮肉（各一兩）　南木香（三錢）

右爲末米粉糊丸如菉豆大每服五十丸姜湯送下

○啚按脾胃氣虛則不能運化水穀水穀停積則爲濕痰曰補氣曰消食曰燥濕痰三者不可偏廢也此方中人參白朮以補氣麥蘗砂仁以消食南星半夏以燥濕痰其餘茯苓滲濕陳皮青皮和氣白豆蔻華澄茄開膈南木香調氣石蓮肉清心可謂周而且備矣

肥白人氣虛有濕熱尤宜服之

道寧絕陽丹　治真元虛損心腎不安精神耗散脾土濕敗不能化食所食五味之物不成精液乃成痰涎聚於中脘不能傳導以致大腸燥澁小便多而赤或時嘔吐酸水久成翻胃結腸之證

蒼朮（堅實者米泔水浸三日再換淨水浸洗切晒乾以青鹽水浸一宿）

蓮肉（好者去心炊淨酒浸一宿各四兩）

右大公猪肚一箇壁上擦洗浸納入前二味以綿縫密用無灰酒煮爛取起入石臼中搗爛揑成小餅烘乾研

爲細末入後藥

南星（四兩淨切細以姜汁一小鍾浸一宿以竈心土同炒去土不用）

大半夏（四兩湯炮去泥晒乾為末以好醋浸七日蒸熟不麻為度入藥中）

橘皮（四兩剉以竈心土炒去土不用）　穀芽（炒）　厚朴

白朮　麥芽（炒）　甘草　人參

茯苓　白豆蔻　三稜　莪朮

縮砂　蓽澄茄（各一兩）　木香　丁香

沉香（各半兩）　粟米（四兩姜汁浸炒）

右為細末稀麵糊為丸如梧桐子大每服六七十丸空心米飲下

參朮理中丸（百一選方）治脾胃虛寒飲食不化胸膈痞悶或嘔吐痰水或腸鳴泄瀉

縮砂仁　川姜　麥蘖（各二兩）　白茯苓

神麯（炒）　人參（各一兩）　白朮（四兩）　甘草（炙一兩半）

右為末煉蜜丸每兩分作十丸空心用一丸姜湯嚼下

或加半夏麯一兩為末入盐點服亦可

大藿香散　治一切脾胃虛寒吐嘔霍乱心腹撮痛泄瀉不已最宜服之

（方見泄瀉類）

養胃湯（三因方）治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉或有外感寒熱如瘧骨節煩疼並皆治之

藿香（去梗） 厚朴（姜炒） 半夏（湯洗） 茯苓（各一兩）
草果 附子（炮） 甘草（炙） 陳皮（去白）
人參（各一錢） 白术（半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚烏梅半箇煎温服

天下受拜平胃散（濟衆）方 治脾胃不和嘔吐痰水胷膈痞滞不美飲食並治

厚朴（去皮） 陳皮（湯洗存白） 生姜 甘草（炙各三兩）
茅山蒼术（米泔水浸一宿去皮晒乾五兩剉） 南京小棗（二百枚去核）

右用水五升煮乾擣作餅子晒乾再加為末每服二錢塩湯點服泄瀉姜五片烏梅二箇水盞半煎服

平胃散（御藥院方） 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胷滿短氣嘔噦悪心噫氣吞酸面色痿黄肌体瘦弱怠惰嗜卧体重節痛常多自利或發霍乱及五噎八痞膈氣反胃宜服

厚朴（製） 橘皮（各五兩） 蒼术（泔浸八兩） 甘草
茯苓（各二兩） 人參（二兩）

右㕮咀水二盞生姜三片棗一枚煎至一盞去滓温服不拘時一方棗肉丸小豆大服五十丸姜湯下空心常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之

氣

加減平胃散（拔粹方）

治脾胃不和不進飲食常服暖胃消痰

蒼朮（米泔浸八兩）　厚朴（姜製炒）　陳皮（各五兩）　甘草（炒三兩）

右為末每服五錢姜三片棗一枚煎服入塩一捻沸湯點服亦可　若瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃散　一法加藿香半夏　若加乾姜為厚朴湯　若溫疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱加連根葱白五寸豆豉三十粒煎二三沸微出汗愈　若五勞七傷手脚心熱煩燥不安百節酸疼加柴胡　若痰嗽瘧疾加姜製半夏　若本臟氣痛加茴香　若水氣腫滿加桑白皮　若婦人赤白帶下加黃耆　若酒傷加丁香　若飲冷傷食加高良姜　若滑脫泄瀉加肉豆蔻　若風痰四肢沉困加荊芥　若腿膝冷痛加牛膝　若渾身虛壅拘急加地骨皮　若腿膝濕痹加兎絲子　若白痢加吳茱萸　若赤痢加黃連　若頭風加藁本　若轉筋霍乱加楠木皮　若七情六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重腿酸疼及婦人宮臟久冷月脉不調者加桂　若胃寒嘔吐多加生姜　一法加茯苓丁香各三两共成六味　若氣不舒快中脘痞塞加縮砂仁香附子各三两生姜煎服

若五苓散相併為對金飲子　若與六一散相合為黄白散　若與錢氏異攻散相合為調胃散　若欲進飲食加神麴麥蘖吳茱萸蜀椒乾姜桂為吳茱萸湯　若加藁本桔梗為和解散治傷寒吐痢　若加藿香半夏為不換金正氣散　若瘧疾寒熱加柴胡　若小腸氣加苦練茴香　五苓散六一散（方見暑門）異功散（方見本門）

調胃散（御藥院方）療陰陽氣不和三焦痞膈五勞七傷山嵐瘴氣八般瘧疾四時傷寒頭目肢節疼痛腹脹滿嘔吐惡心痰嗽手足虛腫五種膈氣噎塞寒熱水瀉諸痢脾胃不和飲食減少並皆治之

藿香　甘草（炙）　陳皮（去白）　厚朴（去皮每兩用薑二兩製）

半夏麴（每兩用生姜三兩半製）

右五味各二兩同為細末每服四錢水一盞生姜三片煎至半盞食溫服

異功散（拔粹方）治脾胃虛冷腸鳴腹痛自利不思飲食

人參　茯苓　白术　甘草（炙）

橘皮（各等分）

右㕮咀每服五錢生姜三片棗一枚水二盞煎八分溫服

六君子湯（聖惠方）治脾臟不和不進飲食上燥下寒服熱

藥不得者

人參　白朮（各一兩）　橘紅　半夏（湯泡七次）

枳殼（去穰麩炒）　甘草（炙半两）

右㕮咀每服一两生姜七片棗一枚水二盞煎至一盞

去滓温服

枳朮丸（拔粹方）治痞消食強胃（見痞類）

橘皮枳朮丸（衛生宝鑑）治老幼元氣虛弱飲食不消或臟

腑不調心下痞悶（見痞類）

半夏枳朮丸（拔粹方）治因冷食內傷

白朮　枳實（麩炒）　半夏（湯泡七次各半分）

右爲末用荷葉燒飯爲丸如梧桐子大每服五十丸白

湯下

木香乾姜枳朮丸（蘭室秘藏）破除寒滯氣消寒飲食

木香（三錢）　乾姜（半两炮）　枳實（一两炒）　白朮（一两半）

右件爲末用荷葉燒飯爲丸如梧桐子大每服五十丸

温水送下食前服

木香人參生姜枳朮丸（拔粹方）開胃進食

木香（三錢）　人參（三錢半）　乾生姜（一錢半）　枳實（一兩炒）

白朮（一兩半）　橘皮（四錢）

右件爲末用荷葉燒飯爲丸如梧桐子大每服三五十丸

丸溫水送下食前服

藿香安胃散（衛生寶鑑）治脾胃虛弱不能飲食嘔吐不待腐熟

藿香　丁香　人參（各二錢半）　橘紅（半兩）

右㕮咀水二盞生姜三片煎至一盞溫服不拘時

和中丸（拔粹方）治病久虛弱厭厭不能食而臟腑或秘或溏此胃氣虛也常服則和中理氣消痰去濕厚腸進飲食

厚朴（製一兩）　白朮（一兩二錢）　半夏（製一兩）　陳皮（去白八錢）

檳榔（四錢半）　木香（二錢半）　甘草（炙二錢半）　枳實（炒三錢半）

右為末姜汁浸餅為丸如梧桐子大每服三五十丸溫水下

枳縮二陳湯　理脾胃順氣寬膈消痰飲

砂仁　枳實　茯苓　半夏

陳皮　甘草（炙等分）

右剉每服六錢水一盞半生姜五片煎八分溫服

寬中進食丸　滋形氣美飲食

神麯（炒兩錢）　甘草（炙一錢）　木香（五分）　草豆蔻仁（五錢）

枳實（炒四錢）　半夏（七錢）　人參（一錢）　乾生姜（一錢）

青皮（一錢）　陳皮　白朮　白茯苓

澤瀉（各二錢）　猪苓（一錢）　砂仁（一錢半）　大麥芽（一兩）

右爲細末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服三四十丸溫米飲下食遠服之

參香散（三因方）治心氣不足諸虛百損常服調榮衛寧心志去脾胃寒濕進飲食

蓮肉（去心一兩）　甘草（炙七錢半）　人參　白木

白茯苓　丁香（[illegible]）　乾姜（炮各一兩半）　山藥

烏藥　砂仁（[illegible]）　沉香（各二錢）　橘紅

黄耆（[illegible]）　南木香（[illegible]）　檀香（各二錢半）

右每服四錢水一盞生姜三片棗一枚煎食前服一方加附子一枚

○虞按脾惡濕而好燥古方中多用燥藥爲脾濕故也然胃火亢甚口燥咽乾嘔噦不食又當以潤劑治之已上諸方治脾濕之劑已下諸方治胃火之劑也

參苓白术散（和劑方）治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉久大病後調助脾胃此藥最好

白术　人參　甘草　山藥

白茯苓（去皮各二斤）　白扁豆（一斤半去皮姜汁炒）　蓮子肉

薏苡仁　砂仁　桔梗（炒一斤）

右爲末每服二錢棗湯調下

七珍散（本事方）開胃養氣溫脾進食

人參　白朮　黃耆（蜜炙）　山芋

茯苓　粟米　甘草（各一兩）

一方加白扁豆一兩蒸用名八珍散

右為末每服三錢水一盞姜棗煎服

橘皮竹茹湯（濟生方）治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓（去皮）　橘皮（去白）　枇杷葉（去毛）　麥門冬（去心）

青竹茹　半夏（湯泡各一兩）　甘草（炙）　人參（各二兩）

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎至七分不拘時服

八珍湯（御藥院方）和血氣理脾胃

當歸（酒浸）　赤芍藥　川芎　熟地黃

人參　白茯苓　甘草　砂仁

右吹咀每服三錢水一盞姜七片棗三枚煎至七分空

心溫服

和中散（直指方）和胃氣止吐瀉

石蓮肉　茯苓（各二錢半）　藿香　人參

甘草（炙）　白扁豆　天麻　木香

白朮（各半兩）

右吹咀每服四錢水一盞姜三片煎七分去渣溫服

増損白朮散（御藥院方）生津止渴順氣下痰

白朮　葛根　茯苓　藿香葉

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

人參　木香（已上各一兩）　陳皮（二兩）　乾生姜（一[illegible]）

右㕮咀每服一兩用水二盞煎至一盞溫服不拘時

生姜和中湯（拔粹方）治食不下口乾虛渴四肢困倦

柴胡（二分）　升麻（三分）　藁本（半錢）　羗活（七分）

蒼朮（一錢）　黃芩（一錢生）　酒黃芩（一分）　葛根（半錢）

甘草（一分生）　甘草（炙一分）　橘皮（二分）　白朮（五分）

右㕮咀作一服水二盞生姜五片棗二枚煎至一盞去

滓溫服

凝神散　病後收斂胃氣清涼肌表

人參　白朮（[illegible]）　茯苓（二[illegible]）　山藥（各一兩）

粳米　扁豆（炒）　知母　生芐

甘草（炙各五錢）　淡竹葉　地骨皮　麥門冬（各二錢半）

右㕮咀每服五錢水一盞半姜三片棗一枚煎至一盞去

滓溫服

加減枳朮丸（明醫雜著）論曰人之一身脾胃為主胃陽主氣脾陰主血胃司納受脾司運化一納一運化生精氣津液上升糟粕下降斯无病矣人惟飲食不節起居不時損傷脾胃胃損則不能納脾損則不能化脾胃俱損納化皆難元氣斯弱百邪易侵而飽悶痞積關節吐逆腹痛泄痢等證作矣況人於飲食豈能一一節調一或

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

有傷脾胃便損飲食减常元氣漸憊矣故累古製枳术之丸東垣發脾胃之論使人常以調理脾胃為主後人稱為醫中王道厥有旨哉近世論治脾胃者不分陰陽氣血而率皆理胃所用之藥又皆辛溫燥熱助火消陰之劑遂致胃火益旺脾陰愈傷清純中和之氣變為燥熱胃脘乾枯大腸燥結脾臟漸絶而死期迫矣殊不知脾胃屬土屬濕位居長夏故濕熱之病十居七八況土居四季寒熱溫凉各依其時豈可偏用辛熱之劑哉今舉枳术丸方立加减法於後

白术（二兩去梗）　枳實（兩麩炒）

右為細末荷葉包飯燒取出杵爛和藥杵勻丸如菉豆大每服五六十丸清米湯下此法一補一消取飲食緩化不令有傷東垣加陳皮一兩名橘皮枳术丸治老幼元氣衰弱飲食少進久服令人多食而不傷

若元氣素弱飲食難化食多即腹中不和疼痛泄瀉此虛寒也加人參白芍藥（酒炒）神麯（炒）大麥芽（炒杵去皮各一兩）

縮砂（炒）木香（各五錢）

若素有痰火胸膈鬱塞吞酸噯氣及素有吞酸吐酸之證或有酒積泄瀉結痛此皆濕熱也加黃連（薑汁炒）白芍藥（酒炒）陳皮（各一兩）石膏生甘草（各五錢）縮砂木香（各二錢）川

芎（四錢）

若傷食飽悶痞塞不消加神麯大麥芽山查子（各一兩）有食積痞塊在腹者再加黃連厚朴瓜蔞（製各五錢）積堅者再加蓬朮（醋煑）昆布（各三錢）

若傷冷食不消腹痛溏泄加半夏（一兩薑製）縮砂乾薑（各炒）神麯大麥芽（各五錢）

若人性多氣惱夾氣傷食氣滯不通加川芎香附米（各一兩）木香黃連（一 姜製各五錢）

若胸膈不利人過服辛香燥熱之藥以致上焦受傷胃脘乾燥嘔吐膈噎反胃加黃連（薑炒）山梔子（炒各五錢）白芍藥當歸（各一兩）桔梗生甘草石膏（各五錢）胸膈頑痰膠結及大便燥秘再加芒硝（五錢）

若素有痰者加半夏（薑炒）橘紅白茯苓（各一兩）黃芩（炒）黃連（薑炒各五錢）

若人能食好食但食後反飽難化此胃火旺脾陰虛也加白芍藥（酒炒一兩半）人參（七錢）石膏（火煅一兩）生甘草（五錢）黃連（炒）香附米（炒）木香（各四錢）

若年高人脾虛血燥易飢易飽大便燥難加白芍藥當歸（各一兩）人參（七錢）升麻甘草（炙各四錢）山查子大麥芽桃仁（去皮尖各五錢）此老人常服藥也

加減保和丸　消痰利氣扶脾胃進飲食（古卷方）

山查　神麯（炒）　半夏（湯泡七次）　茯苓（去皮各三兩）

陳皮（先）　連翹　蘿蔔子（各二兩）　白术（五兩）

蒼术（米泔浸去粗皮）　枳實（去皮各一兩）　香附（去皮酒浸）　厚朴（姜汁製三兩）

黃芩（去腐酒浸炒）　黃連（去鬚酒浸炒各一兩）

右為細末姜汁麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸漸加至七八十丸食後並茶湯任下

橘連枳术丸（古菴方）健脾消痞清熱（見痞類）

○愚按脾胃虛弱不能運化水穀初時則為寒濕宜用辛香燥熱之劑以散之丹溪曰局方用燥藥為劫濕病也濕得燥則豁然而收正猶久雨山河溟濛地土厭濕不能生物必須杲日普照然後山川晴明地土和爽方能生物也若飲食停積日久濕能生熱熱從為火火能傷氣耗血則為燥熱宜用辛甘苦寒之劑以潤之正猶久旱山川蒸燥地土乾燥不能成物必須甘霖遍及然後山川清涼地土滋潤方能成物也故調補脾胃之劑須分新久之異燥濕之宜可也

○此類諸方一補一消之劑

○愚按內傷用藥曰補益之劑調補脾胃用藥曰一補一消之劑傷食用藥曰消導之劑曰推逐之劑其實一

源流也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之四　丙集

風門

破傷風　十一

丹溪心法

○破傷風多死　防風全蝎之類　非全蝎不開十箇為末酒調日三次　破傷風血凝心鴉翎燒灰存性研細酒調一錢

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

入方　破傷風發熱

瓜蔞子（九錢）　滑石（一錢半）　南星　蒼朮

赤芍　陳皮（一錢）　黃連　炒柏

黃芩　白芷（半錢）　甘草（些小）

右姜一片煎服

附諸方

防風湯（拔粹方）治破傷風同傷寒表証未傳入裏宜急服此藥

防風　羌活　獨活　川芎（各等分）

右㕮咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候服後宜調蜈蚣散大効

蜈蚣散（拔粹方）

蜈蚣（一對）　江鰾（五錢）　左盤龍（五錢炒烟盡）

右為末每服二錢用防風湯調下如前藥解不已覺轉入裏當服左龍丸服之漸漸看臟腑硬軟加巴豆霜

左龍丸（拔粹方）治直視在裏者

左盤龍（炒）　殭蚕（炒）　江鰾（炒各五錢）　雄黃（一錢）

右為末燒飯丸桐子大服十九酒下如裏証不已當於左龍丸內一半末入巴豆霜半錢燒飯丸桐子大同左龍丸一處每服加一丸漸加服至利為度若利後更服

後藥若搐痓不已亦宜服後藥羌活湯

羌活湯（拔粹方）

羌活　獨活　地榆　防風（各一兩）

右㕮咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣通口服有熱加黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃全氣養血為度

養血當歸地黃湯（拔粹方）

當歸　地黃　芍藥　川芎

藁本　防風　白芷（各二兩）　細辛（五錢）

右為麄末每服一兩水二盞煎至一盞通口服食前

○已上五方治破傷風自表入裏之劑

羌活防風湯（拔粹方）治破傷風邪初傷在表

羌活　防風　川芎　藁本

當歸　芍藥　甘草（各四兩）　地榆

細辛（各二兩）

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時量緊慢加減用之熱加黃芩二兩大便秘加大黃一兩緩緩令過

白朮防風湯（拔粹方）若服前藥過多有自汗者

白朮　黃芪（各一兩）　防風（二兩）

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

右㕮咀每服五六錢水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候破傷風臟腑秘小便赤用拔藥自汗不休故知無寒也宜速下之先用芎黃湯三二服後用大芎黃湯下之

芎黃湯（拔粹方）

川芎（一两） 黃芩（六錢） 甘草（二錢）

右㕮咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時候

大芎黃湯（拔粹方） 下藥

川芎（半两） 羌活 黃芩 大黃（各一两）

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

右㕮咀每服一两水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時

羌活湯（拔粹方）治半在表半在裏

羌活（去芦） 菊花（去梗） 麻黃（去根節） 白茯苓（去皮）

川芎 防風（去芦） 石膏（研） 前胡（去芦）

黃芩 蔓荊子 細辛（去葉） 枳殼（各一两）

甘草（炙一两） 薄荷 香白芷（各半两）

右㕮咀每服一两水二盞生姜五片煎至一盞去渣通口服食後渣再煎服

白朮湯（拔粹方）治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白朮 葛根 芍藥 升麻

黃芩（各五錢） 甘草（三錢半）

右㕮咀每服一两水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時

江鰾丸（拔粹方） 治破傷風驚而發搐臟腑秘澁知病在内可用下藥

江鰾（剉炒） 野鴿糞（炒） 白姜蚕（各五錢） 雄黄（一两）

蜈蚣（一對） 天麻（一两）

右為末作三分二分用燒飯丸桐子大硃砂為衣一分巴豆霜二錢半亦燒飯丸桐子大每服硃衣丸三十丸加巴豆霜丸一丸第二服加二丸加至利為度再服硃砂丸病愈止

○已上七方亦治破傷風邪表裏之劑

玉真散（瑞竹堂方） 治破傷風及金刃傷打撲傷損

天南星 防風（等分）

右為末破傷風以藥敷貼瘡口然後以溫酒調一錢如牙關緊急角弓反張用藥二錢童子小便調下或因毆打内有損傷以藥一錢溫酒調下打傷欲死但心頭微溫以童便灌下二錢併進二服天南星為防風所製服之不麻衛生寶鑑名定風散治癲狗咬破先口含漿水洗淨用綿乾貼藥更不再發無膿大有效

如聖散（聖惠方） 治破血傷風止血定疼

蒼朮（六两） 川烏頭（炮去皮四两） 防風 草烏頭（炮去皮）
細辛（各二两半） 两頭尖（炮去皮四两） 天麻 川芎
白芷（各两半） 蝎稍（微炒） 雄黃（各半两）
損骨加乳香（半两）

右為細末每服一錢酒調下不拘時服

一方 治破傷風手足顫掉不已者

人手足指甲（六錢炒絲烟） 硃砂（另研） 天南星（姜製）
獨活（各二錢）

右為末分作三服酒調下不拘時候

保命丹 治破傷風

辰砂 射香（一） 川烏（去皮尖） 大半夏（生各一錢）
藜蘆（去土三錢） 雄黃（半两）

右為末棗肉丸如雞頭實大每一丸嚼細温酒下若牙關急噤開灌下吐涎為效如吐不止生葱湯止之不吐涎用半丸大效

一字散 如前

金頭蜈蚣（一條去頭足炙） 天麻（半两） 草烏頭（去芦半两）
全蝎（十箇） 香白芷（少許）

右為末每服一字發熱茶清下發寒温酒或半夏茯苓湯下（出温熱類）

天麻丸　治破傷風神効

天麻　川烏（生去皮各三錢）　草烏（生）　雄黃（各一錢）

右為末酒糊丸桐子大每服十丸温酒下無時

元戎方治破傷風欲死者

川烏　南星　半夏（並生）　天麻（去芦等分）

右為細末每服一錢豆淋酒調下稍温服次以酒三盞投之

奪命散　治破傷風角弓反張牙関緊急

天麻　白芷　川烏（去皮各二錢）　草烏

雄黃（各一錢）

右為末酒糊丸梧子大每服十丸温酒送下不拘時

蜈蚣散　治破傷風搐搦角弓反張

蜈蚣（去毒炒一條）　全蝎（一對炒去毒）

右為細末如發時用一字或二字擦牙縫内或吹鼻中

烏稍散　治破傷風及洗頭風

烏稍蛇（酒浸一宿去骨六錢）　麻黃（一兩）　草烏

乾姜　附子（炮）　川芎　白附子

天麻（各半兩）　蝎稍（二錢半）

右為末每服一錢熱酒調下日三服重者三五日見効

治破傷風方　極有神効

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

初覺有風時急取熱糞堆內蠐螬虫一二箇用手捏住待虫口中吐些小水就抹在破傷處身穿稍厚衣裳待片時瘡口覺麻两脇微汗風出立効　如風緊急速取此虫三五箇剪去尾將肚內黃水塗瘡口再滴些小入熱酒內飲之汗出立効

○已上諸方攻散風毒之劑

胃風　十二

丹溪心法

○此因初飲食訖乘風凉而致其證脹滿食飲不下形瘦腹大惡風頭汗隔塞不通胃風湯正始此然亦看挾證加減脈右關弦而緩帶服

附諸方

胃風湯（拔粹方）治虛風證能食麻木牙關急搐目內蠕瞤

胃風面腫

白芷（一錢二分）　升麻（二錢）　葛根（一錢）　蒼朮（一錢）

甘草（炙一錢半）　柴胡　藁本　羌活

黃栢　草豆蔻（各三分）　麻黃（半錢不去節）　蔓荊子（一分）

當歸身（一錢）

右㕮咀水二盞姜三片棗一枚煎至一盞去渣温服

胃風湯　治風冷入於腸胃泄下鮮血或腸胃濕毒下如豆汁或瘀血

人參　茯苓　川芎　當歸

桂　白朮　白芍等分

右剉水煎入粟米百餘粒同煎腹痛加木香

痛風　十三　附肢節痛　肩背痛　丙集

丹溪心法

四肢百節走痛是也他方謂之白虎歷節風証大率有痰風熱風濕血虛　因於風者小續命湯　因於濕者蒼朮白朮之類佐以竹瀝　因於痰者二陳湯加酒炒黃芩羌活蒼朮　因於血虛者用芎歸之類佐以紅花桃仁　大法之方蒼朮川芎白芷南星當歸酒黃芩在上者加羌活威靈仙桂枝　在下者加牛膝防己木通黃柏　血虛格致餘論詳言多用川芎當歸佐以桃仁紅花薄桂威靈仙　治痛風取薄桂味淡者獨此能橫行手臂領南星蒼朮等藥至痛處

入方

治上中下疼痛

南星（薑製）　蒼朮（泔浸）　黃柏（酒炒　各二兩）　川芎（一兩）

白芷（半两） 神麯（炒一两） 桃仁（半两） 威靈仙（三錢酒拌）

羗活（三錢走骨節） 防己（半两下行） 桂枝（三錢行臂） 紅花（酒洗半錢）

草龍膽（半錢下行）

右為末麵糊丸梧子大每服一百丸空心白湯下

張子元血氣虛有痰白濁陰火痛風

人参（一两） 白朮（炒） 熟苄 川黄栢（炒黑各二两）

山薬 海石 南星（各一两） 敗龜板（酒炙二两）

瑣陽（半两） 乾姜（燒灰半两取其不走）

右為末粥丸一云酒糊丸

臂痛方

蒼朮（一錢半） 半夏 南星 [illegible] 白朮

酒芩（炒） 香附（各一錢） 陳皮 茯苓（各半錢）

威靈仙（三錢） 甘草（少許） 別本加羗活一錢

右㕮咀作一服入生姜二三片

二妙散 治筋骨疼痛因湿熱者有氣加氣薬血虛者加補血薬痛甚者加生姜汁熱辣服之

黄栢（炒） 蒼朮（米泔浸炒）

右二味為末沸湯入姜汁調服二物皆有雄壯之氣表實氣實者加酒少許佐之 若痰帶熱者先以舟車丸或導水丸神芎丸下伐後以趂痛散服之

趂痛散

乳香　没藥　桃仁　紅花

當歸　地龍（酒炒）　牛膝（酒浸）　羗活

甘草　五靈脂（酒淘）　香附（童便浸）

或加酒芩炒酒栢

右為末酒調二錢服

八珍丸　治痛風走注脚疾

乳香　没藥　代赭石　穿山甲（生用各三錢）

羗活　草烏（生用各五錢）　全蝎（二十一箇炒）　川烏（生用一兩不去皮尖）

右為末醋糊丸如梧子大每服二十一丸温酒送下

四妙散　痛風走注

威靈仙（酒浸五錢）　羊角灰（二錢）　白芥子（一錢）　蒼耳（一錢半一云蒼术）

右為末每服一錢生姜一大片擂汁入湯調服　又二妙散同調服

又方　治酒濕痰痛風

黄栢（酒炒）　威靈仙（酒炒各五錢）　蒼术　羗活

甘草（三錢）　陳皮（一錢）　芍藥（一錢）

右為末每服一錢或二錢沸湯入姜汁調下

治氣實表實骨節痛方

滑石（六錢）　甘草（一錢）　香附　片芩（各三錢）

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

右為末姜汁糊丸如梧子大每服五七十丸白湯吞下

又方

糯米（一盞）　黄躑躅根（一握）　黒豆（半合）

右用酒水各一碗煎徐徐服之大吐大瀉一服便能行動

治食積有腿痛

龟板（酒浸炙一两）　酒栢葉　香附（半两）　辣芥子

凌霄花（一钱半）

右為末酒糊丸如梧子大煎四物湯加陳皮甘草湯下

附諸方

控涎丹　治一身及兩脇走痛（痰）挾死血者

甘遂（面裹煨）　大戟（製）　真白芥菜子（炒各等分）

右為末加桃仁泥糊丸如梧子大每服五七丸漸加至十丸臨卧姜湯下

龍虎丹　治走注疼痛或麻木不遂或半身痛

草烏　蒼术　白芷（各一两碾粗末拌發熱盦過入後藥）

乳香　没藥（各三钱另研）　當歸　牛膝（各五钱）

右為末酒糊丸如彈子大每服一丸温酒化下

乳香丸

白附子（炮）　南星　白芷　没藥

赤小豆　荆芥　藿香　骨碎補（去毛）

乳香（各一兩另研） 五靈脂 川烏（炮去皮臍尖） 糯米（炒各二兩）

草烏（炮去皮尖） 京墨（煅各五兩） 松脂（半兩研）

右爲末酒糊丸梧子大每服十丸至十五丸冷酒吞下茶亦得不拘時忌熱物

一粒金丹　治一切風疾走注疼痛手足癱瘓麻木不仁及白虎歷節等風

射香（二錢半） 好真墨（燒烟盡一錢半） 乳香

當歸（酒洗晒乾） 沒藥（各七錢半） 白膠香（另研） 草烏（去皮臍）

地龍（去土） 木鱉子（去油） 五靈脂（各一兩半）

右為細末與前藥和勻用糯米糊為丸如雞頭實大每服一丸溫酒化下遠年近日寒濕脚氣臨發時空心服一丸脚面黑汗出為効初中風不醒人事牙關不開研二丸酒調灌下立醒

天麻丹　治諸風癱瘓及白虎歷節風

烏頭（八兩） 蒼朮（四兩） 全蝎（一兩） 荆芥

防風 天麻（各二兩）

右為細末用豆腐和勻作餅入銅銚以水滿煮藥至半沉半浮者性為度取出待半乾為丸如梧桐子大以硃砂為衣臨卧時先嚼木瓜一片以好酒吞下二三十丸服後覺昏沉吐涎痰一二時為効

金棗丹　治一切風疾等証

川烏（去皮臍生用）　防風（生用）　兩頭尖　香白芷
獨活　荊芥　蔓荊子（各四兩）　白朮
羌活　細辛（去土各半兩）　全蝎　威靈仙
天麻　殭蚕（各二兩）　木香　雄黃（各一兩）
蒼朮（八兩泔浸）　川芎（五兩）　乳香（一兩）　何首烏（一兩八錢）
没藥　草烏（各一兩五錢）　藁本（二兩五錢）　當歸（三兩）

右為細末以糯米糊丸如棗樣大金箔為衣每服一錠傷風流涕好酒調服　諸般頭風細茶調服薄荷湯亦可　中風不語生姜湯調下　左癱右瘓好酒調下　白虎歷節風遍身走痛生姜湯或好酒調服　破傷風昏倒在地牙関緊急用好酒調服仍將敷患處　雷頭風并乾癬麻痺温酒調服　洗頭風温酒調服　偏正頭疼及夾腦風研為末吹鼻孔中吐涎再用生姜汁調藥塗两太陽穴仍用茶清調服　風狗咬傷嚼水洗淨敷之　蜈蚣傷口嚼水洗過敷之　蛇傷入白礬少許敷患處以津唾調搽亦可　蝎傷唾調搽　痔漏口漱漿水洗過敷之　多年惡瘡口不合著口漱塩水洗過敷徐合　嗽喘桑白皮湯調服　紅絲魚眼穪脚腦疽發背疔瘡裏外臁瘡用自己小便洗過井水調敷薄紙

貼上再用裹外搽之　丹瘤井花水調藥毛翎掃三二次　不發炙瘡口噙水洗過貼三二次知大可方止

乳香黑虎膏　治諸風寒濕骨節渾身疼痛（見中濕類）

虎骨散（和劑方）治風毒邪氣乘虛攻注經絡之間痛無常處晝靜夜甚筋脉拘攣不得屈伸

蒼耳子（微炒三兩）五加皮（一兩）骨碎補（三兩）虎脛骨（酥炙二兩）

沒藥（三兩）當歸（去苗三兩）天麻（一兩）自然銅（醋淬細研）

防風（去苗）肉桂（去粗皮各三兩）敗龜板（酥炙二兩）騏驎竭（細研）

白芷　赤芍藥　白附子（炮各三兩）梹榔（一兩）

羌活（去苗一兩）牛膝（去苗二兩）

右為末入研藥令勻每服一錢溫酒調下不拘時

趂痛丸（澹寮方）治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷損

草烏頭（三兩不去皮）熟地黄（或用生者）南星　半夏麯

白殭蚕　烏藥（用半兩晉乾）

右為末酒糊丸如梧桐子大晒乾每服五七丸空心溫酒下如跌撲傷損姜汁和酒研十數丸塗傷處如卒中倒地姜汁茶清研五七丸灌下立醒

虎骨丸（御藥院方）治經絡凝滯骨節疼痛筋脉攣急遇陰寒愈痛

乳香（另研）　沒藥（另研）　赤芍藥　當歸
熟地黃　虎骨（酥炙各一两）　血竭（二錢半另研）

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香一錢末在内麻纏定每令透氣好酒二升煮酒盡取木瓜去皮研入蜜杵和丸如梧桐子大每服三五十丸酒下

麒麟竭散　治寒濕搏於經絡以致氣血凝泣疼痛不可忍者　拔粹方

血竭　乳香　沒藥　白芍藥
當歸　水蛭（炒令烟盡）　射香（各二錢）　虎脛骨（酥炙黃半两）

右為末每服三錢溫酒調下食前

透骨丹　治風濕腰腿筋骨疼痛

天麻散（秘方）治風濕疼痛黃腫

天麻　全蝎（各四两）　地黃　木瓜（各二两）
沒藥　乳香　川山甲（各研）　川芎
烏頭（各二两）　牛膝（二两酒浸一宿）　當歸（三錢）

右為末每服三錢空心溫酒調服

○廣按風寒濕入於經絡以致氣血凝泣津液稽留久則怫鬱堅牢阻礙榮衛難行正邪交戰故作痛也須氣味辛烈暴悍之藥開鬱行氣破血豁痰則怫鬱開榮衛行而病方已也又嘗論之成怫鬱乃有形之物

不過痰與血也巳上方中有偏於豁痰者有偏於破血者有均治痰血者在人對証施治不差可也

小續命湯（見中風類）

二陳湯（見痰類）

舟車丸（見中濕類）

神芎導水丸（見濕熱類）

○肢節痛

丹溪心法

肢節痛須用羗活去風濕亦宜用之　如肥人肢節痛多是風濕與痰飲流注經絡而痛宜南星半夏　如瘦人肢節痛是血虛宜四物湯加防風羗活　如瘦人性急燥而肢節痛發熱是血熱宜四物湯加黃芩酒炒黃栢　如肢節腫痛脉滑者當用燥濕宜蒼朮南星兼行氣藥木香枳殼檳榔在下者加漢防巳　若肢節腫痛脉澁數者此是瘀血宜桃仁紅花當歸川芎及大黃微利之　如倦怠無力而肢節痛此是氣虛兼有痰飲流注宜參朮星半（丹溪無肢節痛條此文又純似丹溪語姑書以如者）

○肩背痛（新增）

附諸方

通氣防風湯（拔粹方）肩背痛不可廻顧者此太陽氣鬱而不行以風藥散之脊痛項强腰似折項似拔者此是太陽經不通也

羌活　獨活（各一錢）藁本　防風

甘草（各半錢）川芎　荊子（各三分）水煎服

當歸拈痛湯（拔粹方）治濕熱爲病肢節煩痛肩背沉重胸膈不利及遍身疼痛下疰於足脛痛腫不可忍（見脚氣類）

蒼朮復煎散（拔粹方）治寒濕相合腦痛惡寒煩悶脊骨胛眼痛膝臏痛脈沉洪

蒼朮（四兩水二椀煎至一椀去渣入下項藥末再煎一沸温服）羌活

升麻（一此方無）澤瀉　柴胡　藁本

白朮（各半錢）黃柏（三錢）紅花（少許）

右爲末先煎蒼朮二分之二後下衆藥同煎切忌酒麪

加減當歸飲子（聖惠方）治肩胛痛

防風　當歸　柴胡（各一兩半）芍藥（一兩）

生地黃（一兩半）黃芩　人參（各一兩）黃連（半兩）

甘草（一兩三錢）滑石（六兩）大黃（一兩半）

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去渣食後通口服

人參益肺散（拔粹方）治肩背痛汗出小便數而少者風熱乘肺肺氣鬱甚也當瀉風熱則愈

柴胡　升麻　黃芪（各一錢）　羌活

防風　人參　甘草　陳皮（各半錢）

藁本（三分）　青皮　黃芩　白豆蔻（各二分）

右㕮咀都作一服水二盞煎至一盞去渣通口服如面色白脫色氣短者不可服

舒經湯（濟察方）治臂痛不能舉有人常苦左臂痛或以為飲或以為風為濕諸藥悉投繼以針艾俱不効得此方而愈盖是氣血凝滯經絡不行所致非風非飲非濕腰以下食前服腰以上食後服一名通氣飲子

片子薑黃（四兩無則用嫩蓬莪朮代之）　甘草（炙）　羌活（各一兩）

海桐皮（去外皮）　當歸　赤芍藥　白朮（各一兩）

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片磨沉香水少許煎至一盞去渣通口服

治背痛

薑黃（四兩）　甘草（炙）　羌活（一兩）　白朮（一兩）

右㕮咀水二盞煎隨意至一盞去滓溫服食後

痺　十四新增　丙集

附諸醫論

神珍方曰凡痺病自有五種皮痺脈痺肌痺骨痺筋痺是

也多由躰虛之人腠理空踈為風寒湿三氣侵入於皮脉肌筋骨不能隨時驅散留滯於內久而為痺其為病也寒多則掣痛風多則引注湿多則重著爾

附脉理

脉訣舉要曰風寒濕氣合而為痺浮濇而緊三脉乃備

附諸方

防風湯（宣明方）風寒濕三氣合為痺風氣勝者行痺上下左右無留隨所至作防風湯主之　治行痺行走無定

防風　甘草　當歸　赤茯苓（去皮）

杏仁（去皮炒熟）　桂（各二兩）　黄芩　秦艽（三）

葛根（各二錢）　麻黄（半兩去節）

右為末每服五錢酒水各二盞棗三枚姜五片煎至一盞温服

茯苓湯（宣明方）寒氣勝者為痛痺大宜宣通陰寒為痛宜通氣温經而愈茯苓湯加減主之　治痛痺四肢疼痛拘倦浮腫

赤茯苓（去皮）　桑白皮（各二兩）　防風　官桂

川芎　芍藥　麻黄（去節各一兩半）

右為末每服五錢水一盞棗一枚煎至八分温服以薑粥投之汗泄為度効矣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

茯苓川芎湯（宣明方）温氣勝者爲著痺濕地水氣甚重者而不去多汗而濡者茯苓川芎湯主之　治著痺留注不去四肢麻木拘攣浮腫

赤茯苓　桑白皮　防風　官桂

川芎　麻黄　芍藥　當歸

甘草（炙各五分）

右為末每服四錢半水二盞棗三枚同煎至一盞去滓空心温服如欲出汗以粥投之

升麻湯（宣明方）陽氣多陰氣少陽熱共陰寒故痺藏腑熱熻然而悶也升麻湯主之　治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縱皮色變兼諸風皆治

升麻（三兩）　茯神（去皮）　人參　防風

犀角（鎊）　羚羊角（鎊）　羌活（各一兩）　官桂（半兩）

右爲末每服四錢水二盞生姜一塊碎竹瀝少許同煎至一盞温服

五痺湯（和劑方）治風寒濕之氣客留肌體手足緩弱麻頑不仁

片子姜黄（一兩洗去灰土）　羌活　白朮

防己（各二兩）　甘草（微炙半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半姜七片煎八分去柤病在

上食後服病在下食前服

蠲痺湯（濟生方）治手足冷痺腰腿沉重及身躰煩疼背項拘急

當歸（去芦酒洗）　赤芍藥　黄芪（去芦）　防風（去芦）

片子姜黄　羗活（各一两半）　甘草（炙半两）

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎八分去柤温服

防風湯（濟生方）治血痺皮膚不仁

川當歸（去芦洗）　赤茯苓（去皮）　川獨活（各一两）　甘草（炙半两）

防風（一两）　赤芍藥　黄芩（各一两）　杏仁（去皮尖半两）

秦艽（去芦一两）　桂心（不見火半两）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分去柤温服不拘時

茯苓湯（濟生方）治停蓄支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏（湯洗七次）　赤茯苓（去皮）　陳皮（各一两）　枳實（去瓤麸炒）

桔梗（去芦）　甘草（炙各半两）

右㕮咀每服四錢水一盞半姜七片煎七分温服

羗活湯（濟生方）治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定

羗活（去芦二两）　附子（炮去皮臍）　秦艽（去芦）　桂心

木香（不見火）　川芎　當歸（去芦）　牛膝（川者去芦酒浸）

甘草（炙各半兩）　桃仁（去皮尖麸炒）　骨碎補　防風（去芦各一兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎七分温服

虎骨散（济生方）治白虎風肢節疼痛發則不可忍

虎骨（酥炙二兩）　甘草（炙）　全蝎（去毒各半兩）　射香（研一分）

天麻　防風（去芦）　川牛膝（去芦酒浸）　白姜蚕（去糸嘴炒）

川當歸（去芦酒浸）　乳香（別研）　桂心（不見火各二兩）　白花蛇（酒浸取肉二兩）

右為末每服三錢豆淋酒調服

○虛按已上二方治白虎歷節風骨節疼痛即宣明所謂痛痺也蓋風寒濕三氣客於經絡為病不一或為痛或為痒或為麻痺不仁或為手足緩弱所以然者有新久輕重之分有濕痰死血之異济生防風湯茯苓湯所治已露許倪也斈者宜細心求之丹溪不言痺病蓋已該於痛風肾着痿厥條内矣但丹溪所言病之見証古人所言病之原因即中庸費隱之義也

續断丸（本事方）治風温流注四肢浮腫肌肉麻痺

當歸（炒）　川續断　萆薢（各一兩）　川芎（七錢半）

乳香（半兩）　天麻　防風　附子（各一兩）

沒藥（半兩）

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十丸温酒米飲任

下

〇廣按用附子大黄之劑多有所嫌者殊不知寒温交滿經絡四肢浮腫非附子性浮而不沉而能散之乎熱燥銷爍腸胃二便秘結非大黄性走而不守而能潤之乎故善用藥者下天無棄藥善用兵者天下無棄人况大黄附子乃藥中之元首用其所當用何嫌之有哉

增損續斷丸（本事方）治寒温之氣痺滞關節麻木疼痛

人參　防風　鹿角膠　白术（炮各七兩）

麥門冬　乾地黄　黄芪　續斷

薏苡仁　山芋　牡丹皮　桂心

山茱萸　白茯苓　石斛（各二兩）

右爲末蜜丸如梧桐子大每服五十丸温酒空心下

三痺湯（危氏方）治血氣凝滞手足拘攣風痺等疾皆療

川續斷　杜仲（去皮薑炒）　防風　桂心

人參　白茯苓　當歸　白芍藥

甘草（各一兩）　秦艽　生地黄　川芎

川獨活（各半兩）　黄芪　川牛膝　細辛（各一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞生姜三片棗一枚煎一盞去滓熱服

黃芪酒（濟生方）治風温痒痛筋脈攣急或身體頑麻

當歸（去芦）　雲母粉　茵芋葉　白朮

虎骨　萆薢　木香（不見火）　仙靈皮

川續斷　甘草（炙）　白芍藥　黃芪（去芦）

防風（去芦）　官桂（不見火）　天麻　石斛（去根各一兩）

右㕮咀用絹袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七冬十日每服一盞温煖服之常令酒氣相續為佳

防風天麻散（宣明方）治風麻痺走注肢節疼痛（見中風類）

癘風十五　附血風瘡　身上虛痒　癮疹

丹溪心法

○大風病是受得天地間殺物之風古人謂之癘風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳虫於穀道中出所出雖有上下道路之殊然皆不外乎陽明一經治此病者須知此意看其疙瘩與瘡若上先見者上體多者在上也若下先見者下體多者在下也上下同得者在上復在下也陽明經胃與大腸也無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受者甚重自非醫者神手病者鐵心罕有免此

夫從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見病勢之緩多忽之雖按此法施治病已全然脱躰若不能絶味絶色皆不免再發再發則終不救矣某曾治五人矣中間惟一婦人得免以其貧甚且寡無物可喫也餘四人三兩年後皆再發孫真人云吾嘗治四五百人終無一人免於死非孫真人不能治也蓋無一人能守禁忌耳此婦人本病外又是百餘貼加减四物湯半年之上方得月經行十分安愈

醉仙散

胡麻仁　牛蒡子　蔓荊子　枸杞子（各半两同炒黑色）

防風　瓜蔞根　白蒺藜　苦參（各半两）

右為末每一两半入輕粉二錢拌勻大人每用一錢空心日午臨卧各服茶湯調下喫後五七日間先於牙縫內出臭涎水渾身疼昏悶如醉利下臭屎為度量大小虛實加减與之証候重而急者須先以再造散下之候補養得還復與此藥喫須斷塩醬醋諸般肉魚腥椒料水果煨燒炙煿及茄子等物只宜淡粥煮熟時菜并烏稍菜花蛇用淡酒煮熟食之以助藥力也

再造散

錦紋大黄（一两）　皂角刺（一两半獨生經年黑大者）　鬱金（半两生）

白牽牛（頭末六錢半生半炒）一本無欝金牽牛二味

右為細末每服二錢（一云五錢）臨卧冷酒調服（一云日未出面東服）以净桶伺候泄出虫如虫黑色乃是多年赤色是為方近三四日又進一服直候無虫則絕根矣後用通聖散調理可用三稜針刺委中出血終身不得食牛馬驢騾等肉大忌房事犯者必不救

黄精丸

蒼耳葉　紫背浮萍　大力子（各等分）　烏蛇肉（中半酒浸去皮骨）

黄精（焙前三味生擣汁和四味研細焙乾）

右為末神麴糊丸如梧子大每服五七十丸温酒下

一方加炒栢生半甘草節

又方

蒼耳葉　浮萍　鼠粘子　烏蛇肉（等分）

右用豆淋酒炒等分為末每服一二錢豆淋酒調下

治麻風脉大而虛者

苦參（七錢半）　蒼耳　牛蒡子　酒蒸栢（一作酒炒各二兩）

黄精　浮萍（各一兩）

右為末用烏蛇肉酒煑如無蛇以烏鯉魚亦可糊丸服之候脉實再用通天再造散取虫

治麻風

四物湯加羌活防風陳皮甘草

又方

大黃　黃芩　雄黃（三兩）

右為末用樟樹葉濃煎湯入藥蒸洗

附論

廣按大風証者所因不一或因色慾當風或因醉卧濕地或乘熱脫衣或汗出入水或空心飢餓山行感山嵐瘴氣或勞役奔走途中冒觸雨陰露皆由內傷形躰不知避忌外感風濕毒氣入於皮毛血脈肌肉筋骨之間當時罔覺失於驅散停積既久以致榮衞不行內外薰蒸內則生蟲外則生瘡而臟腑經絡皆受患矣古人謂大風疾三因五死三因者一曰風毒二曰濕毒三曰傳染五死者一曰皮死麻木不仁二曰脈死血潰成膿三曰肉死割切不痛四曰筋死手足緩縱五曰骨死鼻梁崩塌與夫眉落眼昏唇翻聲噎甚可畏也所以然者蓋由邪正交攻氣血沸騰而濕痰死血充滿於經絡之中故生蟲生瘡痛痒麻木也治療大法內通臟腑外發經絡而蟲瘡痛痒麻木自出矣亦須首尾斷酒戒色忌食發風動氣葷腥鹽醬炙煿生冷之物清心寡慾方保無虞也今將所用

藥方次序開具于後

附諸方

消風散　第一日服

香白芷　全蝎　人參（各一兩）

右爲細末每服二錢先一日午間宜喫粥忌生姜胡椒葱蒜一切熱性之物晚間不可飲食次日空心温酒調下覺身漸潰爍為妙

追風散　第二日服瀉血追虫

大黄（錦紋者六兩）　欝金（小者一兩八錢）　皂角刺（一兩半）

右為末初服六錢或七錢大楓油一錢半净朴硝少許入内好酒一碗調化五更空心温服直待辰時又如前調藥一碗入熟蜜少許勿令患人知先以水與患人盥漱净然後服藥必以蜜觧口忌人與患者同坐卧良久腹中疼爲妙候瀉十數次以薄粥補之凡老弱者難治五十歲以下者可治精壯者十日三服謂初一日服消風散初二日服追風散初三日服磨風丸損弱者十日内一服稍痊如壯健人十日内三服每月後二十日一服須要記其日数

磨風丸　第三日服日進二次

川當歸　羌活　獨活　川芎

天麻　細辛　防風　荊芥

威靈仙　麻黄　何首烏　石京子

牛旁子　車前子　皺面草（即地松）　蒼耳草（各一兩）

右皆不見火曬乾為細末酒煮麪糊為丸如梧桐子大

每服三十丸食前溫酒下服後煎藥薰洗

洗藥

地骨皮　荊芥　苦參　細辛（各等分）

右剉片每用二兩以水煎薰洗遍身血出為効如洗務

要湯寬浸洗良久方佳

敷藥　第四日治瘡大爛遍身塗之

黒狗脊（二兩如無以杜仲代之）　蛇床子一兩　寒水石

硫黄　白礬（枯各二兩）　朴硝少許

右為細末用臘猪油或香油調敷不爛不必敷

一方

蜜陀僧　白附子　蒼耳子　細辛

香白芷（各等分）

右為細末用生姜汁調搽患處

一方

蛇床子根（燒灰存性）　雄黄　硫黄

白礬　草烏（各等分）

右為細末用香油或蜜水調敷患處

○已上諸方治大風次第之劑

加減大造苦參丸　治大風瘡及諸風赤白癜風

苦參（一斤）　防風　荊芥　蒼耳子
胡麻子（半生半熟）　皂角刺（各十兩）　蔓荊子　牛蒡子
黃荊子　枸杞子　何首烏　禹餘粮
蛇床子（各三兩）　香白芷（一兩半）

右為細末用皂角搗爛熬膏入前藥勻為丸如梧桐子大每服五十丸茶酒任下

一方治大風肌頑麻木皮膚瘙痒遍身疥癩癮疹面上遊風或如虫行紫白癜風或賊風攻注腿脚生瘡者

川烏　白芷　苦參　胡麻（炒）
荊芥　防風（各三兩）　當歸　川芎
獨活　羌活　白蒺藜　赤芍藥
白附子　山梔子（各一兩）　蔓荊子（一兩半）　何首烏
大楓子（去殼）　威靈仙（各二兩）　地龍（二兩）

右為細末先取烏蛇一條用好酒浸煮熟去骨取肉晒乾或焙同為末酒糊丸如梧桐子大每服四十丸茶湯下

一方

威靈仙　何首烏　地松草即皺皮　防風
蔓荊子　荊芥　車前子　細辛
牛旁子（酒浸）　猪牙皂角　當歸　蒼耳草
天麻　甘草　羌活　獨活
麻黃　澤蘭　川芎　苦參（各等分）

右為末酒糊丸如梧桐子大每服四十丸茶酒任下

一方

用蒼耳草於五月五日或六月六日五更時帶露採擣絞取汁熬成膏作錠子取一斤半重鯉魚一箇剖開不去肚腸入藥一錠在內以線縫之用酒二碗慢火煮乾為度令患人喫盡魚不過四五箇即愈忌塩百日

一方

用白花蛇一條先蒸糯米二斗缸底先用酒麯次將蛇以絹袋盛之頓於麯上然後以糯米飯和勻頓於蛇上用紙封缸口候三七日開取酒將蛇去皮骨焙乾為末每服溫酒一盞調蛇末少許服之仍以酒脚并糟做餅食之

一方

用蒼耳為末以大楓子油丸如梧桐子大每三四十丸荊芥湯送下茶湯亦可

一方　治大風眼昏不辯人物眉髮自落鼻梁崩塌肌膚生瘡如癬

用皂角刺一二斤蒸晒為末食後煎大黃湯調服一錢服一旬後眉髮再生肌膚光潤眼目復明

一方　治大風瘡令眉髮再生

用栢葉九蒸九晒為末煉蜜為丸如梧桐子大日三服夜一服白湯下每服五六十丸百日後生眉髮

一方　治大風後生眉毛

皂角荚（焙乾）　鹿角（燒存性各等分）

右為細末生姜汁調塗眉上一日二次則生

一方　治大風眉毛脫落肌膚拆裂

用防風通聖散加苦參天麻蟬蛻早晚各一服至百日必愈忌房事鹽醬葷腥生冷油膩之物

一方　治大風後斷根

於脚大栂指觔骨縫間約半寸灸三壯以出毒氣

四物湯　見補損類

通聖散　見斑疹類

防風通聖散　見中風類

○血風瘡　新增

附諸方

馬齒莧膏　治两足血風瘡并两脚背風湿瘡疼痒至骨

馬齒莧（切碎焙乾净五錢）　黄丹（飛）　黄栢

枯白礬　孩兒茶（各三錢）　輕粉（一錢）

右為細末和匀後入輕粉用生桐油調攤於厚桐油紙上用葱椒湯洗凈患處貼之

一方　治血風瘡

川椒　貝母　白芷　蛇床子（炒）

黄丹（飛）　枯白礬　黄連（各三錢）　輕粉（五錢）

右為細末生桐油調攤厚油紙上貼瘡紫定七日方開

忌胡椒生姜葱蒜一切熱毒物

當歸拈痛湯　治两足血風瘡痛痒等証　見脚氣類

○癮疹　新增

附諸方

胡麻散（和濟方）　治脾肺風毒攻衝遍身皮膚瘙痒或生瘡疥或生癮疹用手搔時浸淫成瘡久而不差愈而復作面上遊風或如虫行紫白癜頑、麻或腎臟風攻注脚膝生瘡宜服

胡麻（一两二錢）　荆芥穗　苦參（各八錢）　何首烏（炮焙一两）

甘草（炙）　葳靈仙（各一錢）

右為末每服二錢薄荷茶或酒或蜜湯調服服藥後頻

頻浴自得汗出立効

蒼耳丸　治諸風及諸風瘡癮疹白紫癜風

五月五日割取蒼耳草葉洗淨晒乾爲末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸日三服若身躰有風處或如麻豆粒此為風毒出也可以針刺黃汁出盡乃已

靈草丹　治一切風疾及癮疹紫白癜風瘤痒頑麻

採紫背浮萍草攤於竹篩內下着水晒乾爲細末煉蜜丸如弾子大每服一丸用黑豆淋酒化下及治脚氣打撲傷損渾身麻痺

一方

用乾浮萍四兩漢防已五錢濃煎熱湯洗白癜風一切疵疹疥癬神効

丹溪心法

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

身上虛痒血不榮於腠理所以痒也

右用四物湯加黃芩煎調浮萍末服之（見補損類）

又方

凌霄花一錢酒調下

附諸方

澡洗藥（御藥院方）治一切風疾燥痒淋洗

威靈仙（去土）零陵香　茅香（各一斤）乾荷葉

藁本（去土）　藿香葉　香白芷　甘松各半斤

右㕮咀每用四两生絹袋盛用水三桶熬数沸放稍熱於無風房内沐浴避風勿令風吹光膩皮膚去瘙痒

丹溪心法附餘卷之四終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之五　　丙集

寒門

咳嗽十六　附肺痿　肺癰

丹溪心法

○咳嗽有風寒　痰飲　火鬱　勞嗽　肺脹　春作是

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

春升之氣用清涼藥二陳加薄荊之類　夏是火氣炎上最重用芩連　秋是濕熱傷肺　冬是風寒外來以藥發散之後用半夏逐痰必不再來　風寒行痰開腠理用二陳湯加麻黃桔梗杏仁　逐痰飲降痰隨証加藥火主清金化痰降火　勞嗽四物湯加竹瀝姜汁補陰為主　乾咳嗽難治此係火鬱之証乃痰鬱其火邪在中用苦梗開之下用補陰降火之劑四物加炒栢竹瀝之類不已則成勞此不得志者有之倒倉法好　肺虛嗽甚此好色腎虛者有之用參膏以陳皮生姜佐之大槩有痰加痰藥　上半月多嗽者此屬胃中有火用貝母石膏降胃火

午後嗽多者屬陰虛必用四物湯加炒栢知母降火

黃昏嗽者是火氣浮於肺不宜用涼藥宜五味子五倍子斂而降之　五更嗽多者此屬胃中有食積至此時火氣流入肺以知母地骨皮降肺火　肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火踈肝以清痰四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝姜汁之類　嗽而脇下痛宜踈肝氣以青皮挾痰藥實者白芥子之類在後以二陳湯加南星香附子黛青皮姜汁　血碍氣作嗽者桃仁去皮尖大黃酒炒姜汁丸服　治嗽多用生姜以其辛散故也　痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰以

其不足　肺燥者當潤之屬熱者桔梗大力知母雞清聲啞者屬寒宜細辛半夏生姜辛以散之肺虛者人參膏阿膠為主陰不足者六味地黃丸為要藥或知母茯苓湯為妙　陰虛氣喘四物湯加陳皮甘草些小以降其氣補其陰白芍藥須用酒浸晒乾　湿痰帶風喘嗽者不可一味苦寒折之如千緡湯墜痰丸更以皂角蘿蔔子杏仁百藥煎姜汁丸噙化　湿痰帶風以千緡湯墜痰丸固捷痰積嗽非青黛瓜蔞不除有食積人面青白黃色不常面上有如蟹爪路一黃一白者是　欬逆嗽非蛤粉青黛瓜蔞貝母不除　口燥咽乾有痰者不用半夏南星用瓜蔞知母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用降陰分嗽　治嗽多用粟殼不必疑但要先去病根此乃收後藥也治痢亦同勞嗽即火鬱嗽用訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱遏脹滿不得眠一邊取其味酸苦有收斂降火之功佐以海石童便浸附瓜蔞青黛杏仁半夏曲之類姜蜜調噙化必以補陰為主　治嗽灸天突穴肺腧穴大瀉肺氣肺腧穴在三椎骨下两傍各一寸五分

○師云陰分嗽者多屬陰虛治之。有嗽而肺脹壅遏不得眠者難治　肺痿專主養肺氣養血清金　嗽而肺氣有餘者宜瀉之桑白皮為主半夏茯苓佐之瀉其有餘補

貝母飲水者不用瓜蔞恐泥膈不鬆快　知母止嗽清肺滋陰降火　杏仁瀉肺氣氣虛久嗽者一二服劫止　治酒嗽青黛瓜蔞容丸噙救肺　食積痰作嗽發熱者半夏南星為君瓜蔞蘿蔔子為臣青黛石堿為使

戴云風寒者鼻塞聲重惡寒者是也火者有聲痰少面赤者是也劳者盜汗出兼痰者多作寒熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者大槩耳亦當明其是否也

入方

杏仁（去皮尖）　蘿蔔子各半兩

右為末粥丸服

清化丸　治肺鬱痰喘嗽睡不安寧

貝母　杏仁　青黛

右為末沙糖入姜汁泡蒸餅丸如彈子大噙化

治久嗽風入肺

鵝管石　雄黃　鬱金　款花

右為末和艾中以生姜一片安舌上灸之以烟入喉中為度

治飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎紫蘇入韭汁就吞瓜蔞杏連丸

治欬嗽劫藥

五味子（五錢）甘草（二錢半）五倍子　風化硝（各一錢）

右為末蜜丸噙化（又云乾噙）

治欬嗽聲嘶者此血虛火多

青黛　蛤粉

右為末蜜調噙化

治嗽喘去温痰

白术　半夏　蒼术　香附（各一兩）

貝母　杏仁（去皮尖炒）黄芩（各半兩）

右為末姜汁打糊丸

治婦人形瘦有時夜熱痰嗽月經不調

青黛　瓜蔞仁　香附（童便浸晒乾）

右為末姜蜜調噙化

治一人風熱痰嗽

南星　海粉（各二兩）半夏（一兩）青黛

黄連　瓜蔞子　石鹼　蘿蔔子（各半兩）

防風　皂角炭（各三錢）

右為末神麯糊丸服

治勞嗽吐紅

人參　白术　茯苓　百合

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

紅花　細辛　五味　官桂
阿膠　黄芪　半夏　杏仁
甘草、　白芍　天門冬
右剉水煎若熱去桂芪用桑白皮麻黄不去節杏仁不去皮同煎

又方　治嗽血
紅花　杏仁（去皮尖）　枇杷葉（去毛）　紫菀茸、
鹿茸（炙）　木通　桑白皮　又云加大黄
右為末煉蜜丸噙化

嗽烟筒　治痰嗽久遠者
佛耳草　欵花（二錢）　鵝管石　雄黄（半錢）
右為末鋪艾上捲起燒烟吸入口內細茶湯送下

定嗽劫藥
訶子　百藥煎　荊芥穗
右為末姜蜜丸噙化

又方　治心煩欬嗽等証
六一散加辰砂服

青金丸　治食積火鬱嗽劫藥
貝母（炙）　知母（各半兩為末）　巴豆（去油膜半錢）
右為末姜泥丸辰砂為衣食後服每五丸白湯下一云

青黛為衣

青金丸　一名與點丸與清化丸同用瀉肺火降膈上熱痰

片子黄芩（炒）

右為末糊丸或蒸餅丸梧桐子每服五十丸

青化丸　與青金丸同用專治熱嗽及咽痛故苦能燥熱濕輕能治上

燈籠草（炒）

右為末蒸餅丸　又細末醋調敷咽喉間痛

又方　治痰嗽

礞石（半兩煅）　風化硝（二錢半）　半夏（二兩）　白术（一兩）

茯苓　陳皮（各一錢半）　黄芩（半兩）

右為末粥丸

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

又方　治欬嗽氣實無虛熱者可服汗多者亦用之

粟殼（四兩蜜炒去蒂膜）　烏梅（一兩）　人參（半兩）

款花（半兩）　桔梗（半兩）　兠鈴（一兩）　南星（薑製一兩）

右為末蜜丸彈子大含化

蒼沙丸　調中散鬱

蒼朮　香附子（各四兩）　黄芩（二兩）

右為末蒸餅丸梧桐子大每服五十丸食後姜湯下

人參清肺散　治痰嗽咽乾聲不出

人參（一錢半）陳皮（二錢半）半夏（一錢）桔梗（一錢）

麥門冬（半錢）五味子（一箇）茯苓（一錢）甘草（半錢）

桑白皮（一錢）知母（一錢）地骨皮（半錢）枳殼（一錢）

貝母（一錢半）杏仁（一錢）款花（七分）黃連（一錢）

右水煎生姜三片

四物湯（見補損）

六味地黃丸（見補損）

知母茯苓湯（見肺痿）

千緡湯

墜痰丸

二陳湯（俱見痰類）

附脈理

脈訣舉要曰欵嗽所因浮風緊寒數熱細濕房勞濇右關濡者飲食傷脾左關弦短疲極肝衰浮短肺傷法當欵嗽五臟之嗽各視本部浮緊虛寒沉數實熱洪滑多痰弦濇少血形盛脈細不足以息沉小伏匿皆是死脈惟有浮大而嗽者生外證內脈參考稱停

附諸方

華蓋散（和劑方）治肺感寒邪咳嗽聲重胸膈煩悶頭目昏眩

紫蘇子（炒）　赤茯苓（去皮）　陳皮（去白）　桑白皮

杏仁（去皮尖炒）　麻黄（去根節各一兩）　甘草（炙半兩）

右為末每服二錢水一盞煎七分食後温服

敗毒散　治傷寒發熱咳嗽頭疼

參蘇飲　治上膈有熱咳嗽聲重

金沸草散　治感冒寒邪鼻塞聲重咳嗽不已（並見傷風）

小青龍湯（和劑方）治感寒咳嗽喘息不得睡卧及治傷寒表證不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽氣喘（見温熱）

五物湯（濟寮方）治風寒咳嗽并氣喘急

麻黄（不去節）　杏仁（不去皮）　甘草（生用）　荆芥穗

桔梗各等分

右㕮咀生姜三片同煎温服咽痛甚者煎熟後加朴硝少許　一方去桔梗荆芥用半夏枳實等分

加味理中湯（千金直指）治肺胃俱寒咳嗽不已

甘草（炙）　半夏（湯洗）　茯苓（去皮）　乾姜（不炒）

白朮　橘紅　細辛　北五味

人參各等分

右㕮咀每服三錢姜棗煎食前服

易簡杏子湯（拔粹方）治咳嗽不問外感風寒內傷生冷痰飲停積悉治

人參（去芦）　半夏（湯泡）　茯苓（去皮）　甘草（炙）

芍藥　五味子（各一兩）　細辛　乾姜

官桂（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞半用杏仁去皮尖五枚姜五片烏梅一箇煎至七分去滓服　若新感冒加麻黃（等分）

橘蘇散（濟生方）治傷寒咳嗽身熱有汗惡風脉浮數有熱服杏子湯不得者

紫蘇葉　杏仁（去皮各一兩）　甘草（炙半兩）　白朮

橘紅　半夏（洗七次）　桑白皮（炒）　貝母（去心）

五味子（各一兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分温服不拘時

紫蘇飲子（拔粹方）治脾肺虛寒痰涎咳嗽

紫蘇葉　桑白皮　青皮（去白）　五味子

杏仁　麻黃　甘草　陳皮（各五錢）

人參　半夏（湯泡各三錢）

右㕮咀每服一兩生姜三片水二盞煎八分食後温服

人參荊芥散（濟生方）治肺感風和上壅咳嗽頭目不清言語不出咽乾項強鼻流清涕

陳皮（去白）　荊芥穗　桔梗　半夏（湯泡七次）

細辛（洗去土）　甘草（炙）　人參　杏仁（去皮尖）

遍章　麻黃

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎八分食後溫服

人參潤肺湯（聖惠方）治肺氣不足喘咳不已并傷寒壯熱頭疼身痛

人參　乾葛　桔梗　白芷

麻黃（去節）　乾姜（五錢）　白朮　甘草（炙各一兩）

右㕮咀每服八錢水一盞半生姜三片葱白一莖煎至八分溫服

橘皮湯（聖惠方）療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中有聲上氣頭痛

陳皮　紫菀　麻黃（去根）　杏仁（炒）

當歸　官桂　甘草　黃芩（各等分）

右㕮咀每服一兩水二盞煎八分去滓溫服食後

蠲煎散（御藥院方）順肺氣利咽膈上咳嗽化痰延

款冬花　茶花　甘草（炙各七錢半）　五味子（半兩）

桑白皮（炒）　桔梗　杏仁　紫蘇葉（各一兩）

右㕮咀每服四錢水二盞入黃蠟少許同煎臨臥服

柯子散　咳嗽聲音不出

柯子（三錢去核半煨半生）　甘草（二錢半炒半生）

木通（三錢）　桔梗（五錢半炒半生）

右每服水一盞半煎至八分入生地黃汁一小盞攪勻臨卧徐徐嚥

四聖散（聖惠方）治咳嗽有失聲音

晉鹽　葛根　槐花子　山梔子（等分）

右㕮咀水二盞加烏梅甘草少許煎一盞入蜜少許食後通口服

八味款冬花散（御藥院方）治肺經寒熱不調涎嗽不已

款冬花（洗焙）紫菀茸　五味子　甘草（炙各七錢半）

桑白皮　麻黃（去節）杏仁（湯泡去皮炒）紫蘇葉（各一兩）

右為粗末每服五錢水一盞半入黃蠟皂角子大煎至一盞熱服

○已上數方治感冒風寒新咳嗽之劑

三物湯　治感冒風邪鼻塞聲重語音不出咳嗽喘急（方見喘類）

杏參散　治胸脇脹滿上氣喘急咳嗽不得睡卧

桃仁（去皮炒）人參　桑白皮（蜜炙米泔浸焙）

杏仁（去皮炒）（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞姜棗煎不拘時

蘇沉九寶湯（簡易方）治老幼素有喘急遇寒暄不常發則連綿不已咳嗽哮乳夜不得睻

桑白皮　甘草　大腹皮　官桂

麻黃　薄荷　陳皮　紫蘇

杏仁（各六分）

右㕮咀每服三錢水盞半姜三片烏梅半箇煎六分服

平肺散簡易方治肺氣上壅喘咳痰實寒熱往來咽乾口燥

陳皮（一兩）　半夏（洗七次）　苦梗（炒）　薄荷（各七錢半）

紫蘇　烏梅（去核）　紫菀　知母

桑白皮（蜜炒）　杏仁（炒）　五味子（各錢分半）　甘草（半兩）

罌粟殼（蜜炒七錢半）

右㕮咀每服五錢水一盞姜三片煎六分食後溫服

瀉白散（濟生方）治肺臟氣實心胸壅悶咳嗽煩喘大便不利

桔梗（去芦炒）　地骨皮（去木）　甘草（炙）　瓜蔞子

升麻　半夏（湯泡七次）　杏仁（去皮尖）　桑白皮（炙各等分）

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎八分食前溫服

加減瀉白散（拔萃方）治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促

桑白皮（一兩）　地骨皮（七錢）　甘草　陳皮（去白）

青皮　五味子　人參（各五錢）　白茯苓（三錢）

右㕮咀每服一兩水二盞加粳米煎至一盞食煎溫服

青龍散（御藥院方）治咳嗽上氣不得臥

人參（去芦）　陳皮（去白）　五味子　紫蘇各一兩

右㕮咀每服一兩水二盞生姜五片煎至八分去滓食後溫服

加減三奇湯（拔粹方）治咳嗽上氣痰涎喘促胸膈不利

桔梗（去芦五錢）　半夏（洗七次）　陳皮（去白）　甘草

青皮（去白各半兩）　杏仁（三錢）　五味子（四錢）　人參

桑白皮　蘇葉各五錢

右㕮咀每服八錢姜三片水二盞煎至八分去滓通口服食後

人參潤肺散（直指方）治欬喘急痰壅鼻塞

麻黄（去根節二兩）　杏仁（去尖炒一兩半）　桔梗（半兩）　人參（去芦二兩）

阿膠（炒半兩）　甘草（炙一兩）　橘紅（二兩半）　貝母（去心炒一兩半）

右㕮咀每服八錢水二盞紫蘇三葉煎至八分去渣溫服食後

杏仁煎丸（瑞竹堂方）治老人久患肺喘咳嗽不已睡臥不安服之立効

杏仁（去皮尖）　胡桃肉（湯泡去皮衣）

右各等分研為膏入煉蜜少許和搜得宜丸如彈子大

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

每服一二丸食後臨臥細嚼姜湯送下

紫蘇半夏湯（拔粹方）治喘欬痰涎寒熱往來

桑白皮（二兩半）　陳皮（去白）　五味子（各五錢）　紫菀茸（五）

杏仁（去皮尖一兩炒）　半夏（湯泡一次）　紫蘇（各五錢）

右為粗末每服五錢生姜三片煎日進三服

清金湯（聖惠方）治男婦遠年近日咳欬上氣喘急喉中涎

聲胸膈滿氣逆坐臥不安飲食不下

粟殼（蜜炒半兩）　甘草（炙五錢）　陳皮（去白）　茯苓（去皮）

杏仁（去皮尖炒）　阿膠（炒）　五味子　桑白皮（炒）

薏苡仁　紫蘇　貝母（去心）　半夏麴

加百合　款冬花（各一兩）　人參（五錢）

右㕮咀每服八錢水一盞半生姜三片烏梅一箇煎至

八分食後服

潤肺膏　治咳嗽痰喘

紫菀　杏仁（去皮尖）　款冬花（各一兩）　麻黃

桔梗　細辛　訶子（各五錢）　枯礬（一錢）

生姜（二兩取汁）　清油（半斤）　蜜（一斤）　核桃肉（一兩）

右先將油煉香熟次入蜜又煉去沫却下末藥攪勻每

服二三匙臨臥白湯調服

奪命丹　上氣喘急經歲咳嗽齁𪖬久不愈（[illegible]）

信石（一錢）　白礬（二錢）　白附子（三錢）　南星（四錢）
半夏（五錢洗）

右先用信石與白礬一處於石器內火煅紅出火黃色為度切不可犯鐵器却和半夏南星白附子為細末生姜汁麵糊為丸如黍米大硃砂為衣每服七丸小兒三丸井花水吞下忌食諸惡毒熱物

○廣按此方治咳嗽痰喘刧劑也盖肺受火邪氣從火化有升無降加以脾湿生痰則上壅而為喘嗽滿悶不得安卧矣病作之時固宜用此藥以刧痰然病安之後即當用知母茯苓湯或人參五味子散寧肺湯以補虛可也

一方　治咳嗽痰喘

南星（炮）　半夏（湯泡各一兩）　甘草（三錢炙）　陳皮（去白一兩半）
杏仁（五錢去皮尖）　款冬花（二錢）　五味子（三錢）　人參（二錢）

每服水一鍾半生姜五片煎臨卧温服忌生冷油膩

○廣按此方治咳嗽痰喘攻補兼施也

烟筒喘嗽方

款冬花　佛耳草　凝水石　人參
白芷　金精石　銀精石（等分）　甘草（少用）

右為末不以多少用香爐燒烟蘆筒吸入肺管（用米糊）飲下

○已上數方治咳嗽喘急肺脹之劑（二）

半夏丸（濟生方）治肺臟蘊熱痰嗽胸膈塞滿

瓜蔞子（去殼另研）半夏（湯泡七次焙取末各一兩）

右二件和勻姜汁打麪糊丸梧桐子大每服五十丸食後姜湯下

玉液丸（和濟方）治風壅化痰涎利咽膈清頭目除咳嗽止煩熱

寒水石（燒令赤出火毒水飛過二十兩）半夏（洗焙為末十兩）白礬（枯十兩研細）

右合研麪糊丸如梧子大每服三十丸食後淡姜湯下

玉芝丸（和濟方）治風壅痰實頭目昏眩咳嗽声重咽喉不利

人參（去芦）乾薄荷　白茯苓（去皮）白礬（枯）

天南星（米泔浸焙各三兩）半夏（湯洗七次姜汁和作麪六十兩）

右為末生姜汁煮麪糊丸如梧桐子每服三十丸食後姜湯下如痰盛燥熱薄荷湯下

祛痰丸（端竹堂方）治風痰喘嗽

人參（去芦）、木香　天麻（各一兩）槐角子（七錢半）

陳皮（去白）茯苓（去皮）青皮（去穰）白朮（煨各一兩）

半夏（七錢半）牙皂角（去皮弦酥炙九錢）

右為細末生姜自然汁打糊為丸如梧桐子大每服五

七十丸食後臨卧温酒送下姜湯亦可

利膈丸（拔粹方）治風痰實喘滿咳嗽風氣上攻

牽牛（四兩生用）　半夏（湯泡二兩）　木香（半兩）　青皮（去白二兩）

槐角炒（一兩）　皂角（去皮弦酥炙二兩）　加檳榔

大黃（各五錢）

右為細末生姜麪糊為丸如梧桐子大每服五十丸生姜湯下

星香丸　治諸氣嗽生痰

南星　半夏（各三兩用白礬一兩研同水浸二味一宿）

陳皮（五兩米泔浸一周時去白取三兩）　香附子（三兩皂角水浸一晝時晒）

右四末不見火為末姜汁糊丸梧桐子大每服五十丸臨卧姜湯下

此方家傳秘方累驗

星辛丸　治諸般咳嗽

南星（姜制）　半夏麹　寒水石　枯礬

姜蚕（炒）　乾生姜（各一兩）

右為末生姜汁糊丸如梧子每服五十丸姜湯下食後

瓜蔞半夏丸　治咳嗽喘滿

瓜蔞　杏仁（去皮尖）　枯礬（各一兩）　半夏（湯泡二兩）

款冬花（一兩半）　麻黃（去根節一兩）

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

右為末用瓜蔞汁生姜自然汁用水糊為丸如梧桐子大每服三十丸食後臨卧淡茶湯下忌生冷鹹酸

三壹丸　治風痰壅逆咳嗽

南星（生用）　半夏（生用各一兩）　天麻（生用各一兩）　白麪（三兩）

右為細末同白麪和均滴水丸如梧桐子大晒乾每服三十丸以水一大鍾先煎令沸下之煮五七沸候藥浮起即漉出服乾用姜湯下

透羅丹　治痰實咳嗽胸膈不利

皂角（去皮弦酥炙）　黑牽牛（炒）　半夏　大黃（温紙包炒焙一兩）　巴豆（一錢去油另研）　杏仁（去皮尖麩炒一兩）

右爲細末生姜自然汁丸如梧桐子大每服三十丸姜湯下咳嗽甚者三四服立効

一方　取痰

藜蘆　人參（用芦各二錢）　牙皂角（去皮弦泡一錢）

防風（去皮一錢）　細辛（去土各二錢半）

右用酸漿水一碗食後溫服候吐痰覺胸中痰盡用冷葱湯時呷飲止為度

人參散（直指方）　治咳嗽痰壅通用

人參（去芦）　桔梗　半夏麯　五味子

細辛（去葉）　枳殼（制）　赤茯苓（去皮）　杏仁（不去皮各一分）

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

甘草（炙半分）

右㕮咀每服一两生姜五片烏梅半箇水二盞煎至八分服食後一方無杏仁烏梅不用痰款加紫菀添甘草

人參飲　治痰嗽

半夏（湯泡七次）　南星　寒水石　柴胡（去苗）

五味子　猪牙皂角　甘草（炙）　款冬花

熱加黄芩

右㕮咀每服八錢生姜五片水一盞半煎至八分臨卧通口服

人參飲子（百一選方）治痰欶寒熱壅盛

人參（去芦）　桔梗　半夏　五味子

赤茯苓　白术（各一兩）　枳殼　甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服三錢水一盞姜五片煎七分空心服治寒壅者加杏仁不去皮紫蘇各半两

辰砂半夏丸　治一切痰飲咳嗽

用大半夏一斤湯泡七次曬乾為末用生絹袋盛貯於磁盆內用淨水洗出去麄楂將洗出半夏末就於盆內日曬夜露每日換新水七日七夜澄去水將半夏粉晒乾每半夏粉一两入飛過細硃砂末一錢用生姜汁糊為丸如梧桐子大每七十丸用淡生姜湯下食後服

黃芩半夏丸　治上焦有熱咳嗽生痰

　黃芩末（一錢）　製過半夏粉（一兩）

右二味和勻用生姜汁為丸如梧桐子大每服七十丸用淡生姜湯送下食後服

天竺黃餅子　治一切痰嗽上焦有熱心神不寧其効甚驗

　牛膽南星（三錢）　薄荷葉（二錢）　天竺黃（二錢）　硃砂（二錢）　片腦（二分）　茯苓（一錢）　甘草（一錢）　天花粉（一錢）

右為末煉蜜入生地黃汁和藥作餅子每用一餅噙化下食後服

白茯湯（濟生方）　治五藏受溫咳嗽痰多氣喘身體重著脈來濡細

　白朮（二兩）　五味子　半夏（湯泡七次）　白茯苓（去皮）　橘紅（各二兩）　甘草（炙半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

○已上數方治痰飲咳嗽之劑

款冬花散（和劑方）　治肺感寒邪咳嗽喘滿胸膈煩悶痰涎壅盛喉中呀喘鼻塞流涕咽喉腫痛

　杏仁　阿膠（炒）　麻黃（去根節）　半夏（湯洗姜製）　款冬花（各兩）　桑葉　知母　甘草（炙）

貝母各二兩

右㕮咀每服二錢水一盞姜三片煎食前溫服

洗肺散　治咳嗽痰盛肺氣不利

黃芩（二錢）　半夏（三錢）　天門冬（去心）　麥門冬（去心）

五味子（各一兩半）　甘草（半錢）　杏仁（去皮尖）

右㕮咀作一服水二鍾生姜五片煎至七分食後服滓

再煎服

百花膏（濟生方）治喘咳嗽不已或痰中有血

款冬花　百合（蒸焙各等分）

右為細末煉蜜為丸龍眼大每服一丸食後細嚼姜湯

下嚥化尤佳

貝母散（御藥院方）治咳嗽多日不愈

貝母（去心）　桑白皮　五味子　甘草（半兩炙）

知母（一錢五分）　款冬花（二兩）　杏仁（三兩去皮尖麩炒）

右㕮咀每服一兩水一盞半生姜三片煎至八分去滓

溫服食後

人參散（聖惠方）治諸咳嗽喘急不出言語年久五服日近

三服效

人參　知母　貝母　半夏

杏仁　馬兜鈴（去皮用肉）　麻黃（不去節各半兩）　天仙藤（二兩）

右㕮咀每服八錢水二盞烏梅一箇蜜一匙煎至八分去滓温服食後臨卧服忌酒醋鷄麪鹹酸生冷

○䖍按古方治火鬱乾咳嗽者甚少治風寒濕咳嗽者甚多盖由不分内外所因新久之異故也夫形寒飲冷新咳嗽有痰固當以温寒散濕為主如人參半夏之類可也若夫氣動火炎久咳嗽無痰又當以清熱潤燥為先然人參半夏之類又在所禁如天門麥門知母貝母石膏瓜蔞之類可也世人徒知肺主皮毛外感風寒為寒殊不知傳裏鬱久變為熱也況肺為華盖而五藏六腑火自内起薰蒸焚灼作咳嗽者亦良多矣已上諸方頗合亦須加減可也

○已上數方治火鬱咳嗽之劑

鍾乳補肺湯（和濟方） 治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血腥臭喘乏不已

鍾乳（碎如米） 桑白皮（各三兩） 肉桂（去皮） 白石英（如米）
五味子（揀） 款冬花（去梗） 紫菀（洗去土） 人參（去芦各二兩）
麥門冬（去心三兩）

右除鍾乳白石英外同為粗末後入鍾乳等同拌勻每服四錢水一盞半姜五片棗一枚粳米三十粒煎七分用綿濾去滓食後服

人參潤肺丸（和劑方）治肺氣不足咳欬喘急久年不愈漸成虛勞及療風壅痰實頭目昏眩口舌乾燥涕唾稠粘

人參　欵冬花（去梗）　細辛（去葉）　甘草（炙各四兩）

官桂（去皮）　桔梗（各五兩）　杏仁（去皮炒四兩）　知母（六兩）

右為末煉蜜丸如鷄頭子大每服一丸食後細嚼淡姜湯下

人參養肺丸（和劑方）治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰肺咳嗽喘急胸中煩悸涕唾稠粘或有勞傷肺胃吐血嘔血並皆治之

人參（芦）　黃芪（去芦蜜炙各一兩八錢）　瓜蔞根

白茯苓（去皮各六兩）　杏仁（去皮炒二兩四錢）

皂角子（三百箇）　半夏（湯泡七次為末生姜和作麴四兩炒）

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼用紫蘇湯下如喘急用桑白皮湯下

團參飲子（濟生方）治憂思喜怒飢飽失宜致傷脾肺咳嗽膿血增寒壯熱漸成勞瘵者

人參　紫菀茸（洗）　阿膠（蛤粉炒）　百合（蒸）

細辛（洗去葉至土）　欵冬花　杏仁（炒去皮尖）　天門冬（湯泡去心）

半夏（湯泡七次）　經霜桑葉　五味子（各一兩）　甘草（炙半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎七分食後溫服

氣嗽加木香　唾血而熱加生地黃　唾血而寒加鍾乳粉　瘦極咳嗽加黃耆　損肺嘔血加没藥藕節　嘔吐肢滿不食加白术　咳而小便多者加益智仁　咳而面浮氣逆加沉香橘皮煎　大便溏者去杏仁加鍾乳粉

紫苑茸湯（濟生方）治飲食過度或食煎煿邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多唾血喘急脇痛不得安臥

紫苑茸（洗）　經霜桑葉　欵冬花　百合（蒸焙）
杏仁（去皮尖）　阿膠（蛤粉炒）　貝母（去心）　蒲黃（炒）
半夏（湯洗各一兩）　犀角（鎊）　甘草（炙）　人參（各半兩）

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片煎八分食後溫服

人參保肺湯　治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸潮熱見發熱類

補肺湯（拔粹方）治勞嗽

桑白皮　熟地黃（各三兩）　人參　紫菀
黃耆　五味子（各一兩）

右㕮咀每服一兩水二盞煎至八分入蜜少許溫服食後

寧肺湯（楊氏家藏方）治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾

人參（去芦） 當歸（去芦） 白朮 熟地黄

川芎 白芍藥 甘草（炙） 五味子

麥門冬 桑白皮 白茯苓（去皮半两）

阿膠（蛤粉炒一两）

右㕮咀每服一两生姜五片水二盞煎至一盞去滓通口服食後

五味黄芪散 拔粹方治嗽咯血成劳眼睛疼痛四肢困倦脚膝無力

麥門冬（去心） 熟地黄 黄芪 桔梗（各半两）

人參（三錢） 甘草 芍藥 五味子（各二錢）

右㕮咀每服八錢水二盞煎至八分去滓温服食後

温金散 大全良方治劳嗽

甘草 黄芩 桑白皮 防風（各一两）

杏仁（一十七粒製） 人參（去芦） 茯神（各五錢） 麥門冬（去心二錢半）

右以前五味用米泔水浸一宿晒乾次入人參茯神麥門冬三味同為末每服二錢水一盞蠟一豆大煎至八分食後温服

人參潤肺丸

人參 山藥 蓮肉 款冬花

蛤粉　杏仁（去皮尖各一两）　藕節（五两）　紅棗（去核蒸半斤）

大蘿蔔（一箇煮熟）

右為末棗肉丸梧子大每服五十丸白湯下食後

人參五味子散（聖惠方）治男女老稚諸虛百損氣血勞傷涎喘欬膿或嗽咯血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏一切虛損

人參　五味子　桔梗　白术

白茯苓　甘草（炙）　熟地黃　當歸（焙半两）

地骨皮　前胡（去苗）　桑白皮　枳殼（去穰炒）

黄耆（炙）　陳皮（去白）　柴胡（各三錢）

右㕮咀每服八錢水一盞半生姜三片煎至八分去滓溫服食後日三煩渴加烏梅青蒿煎咳膿血加知母阿膠煎尤妙

大寧嗽湯（直指方）治勞嗽諸嗽通用如神効

北五味　茯苓（去皮）　桑白皮（炒）　紫蘇

細辛　橘皮　枳殼（麸炒）　杏仁（麸炒去皮）

甘草（炙）　阿膠（炒）　粟殼（去穰蜜炒各二錢）

半夏（湯洗五錢）　勞嗽加川芎

右㕮咀每服一两水二盞棗二枚姜三片烏梅半箇煎至一盞溫服

加味人參紫菀散（直指方）治虛勞咳嗽

五味子　人參　紫菀茸　陳皮

貝母　紫蘇葉　桑白皮（炒）　白茯苓（各兩）

杏仁（炒去皮）　甘草（各七錢半）　加川芎　半夏麯（各一兩）

阿膠（蛤粉炒五錢）

右㕮咀每服一兩水二盞姜七片棗二枚烏梅一箇煎至一盞溫服

人參蛤蚧散　治三年肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生瘡遍身黃腫

蛤蚧（一對全者河水浸五宿日換水洗去腥酥炙黃）　杏仁（去皮尖）

人參　甘草（炙各五兩）　知母　桑白皮

茯苓（去皮）　貝母（各五兩）

右為細末瓷盒兒內盛每日用茶點服神效

○廣按治嗽方中多用人參以其肺虛故也然肺受火邪久嗽喘滿吐血與夫陰虛火動午後發熱熱嗽者切宜忌之然肺受寒邪喘嗽與夫陽虛火動晝夜發熱熱嗽者宜用亦須知母貝母天門冬麥門瓜蔞之類擇其一二味監制可也丹溪云予每治病以某藥為主治以某藥為引經以某藥為監制是也

○已上數方治勞嗽之劑

二母散　治嗽久不愈者常服除根累效

知母　貝母（等分）

右為細末老生姜切片蘸藥細嚼白湯下

人參紫菀湯（百一選方）治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者

五味子（二錢半）　杏仁（半兩）　人參　紫菀

甘草（各二錢）　縮砂（一兩）　桂枝（二錢半）　罌粟殼（去蒂姜炒）

制一兩　款冬花（半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片烏梅二枚煎服

人參理肺散（拔粹方）治喘嗽不止

麻黃（去節炒黃一兩）　粟殼（三兩炒）　人參（二兩去芦）　當歸

木香（各一兩）　杏仁（三兩麵炒）

右為粗末每服四錢水煎服

人參款花膏（和劑方）治肺受虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或勞虛冷嗽及遠年近日一切嗽病服諸藥不效者皆治

款冬花（去梗）　人參（去芦）　北五味（去梗炒）　紫苑（洗去芦）

桑白皮（各一兩）

右為末煉蜜丸雞頭實大每服一丸細嚼姜湯下臨臥食後服

人參款冬花散（拔粹方）治喘嗽久不已者

人參（去芦）　欵冬花（各五錢）　知母　　貝母

半夏（各三錢）　粟殼（一两炒黄）

右㕮咀每服八錢水一盞半烏梅一箇煎至八分食後

臨卧温服

補肺湯（直指方）治肺虛氣乏久嗽

阿膠（炒）　蘇子　　桔梗　　半夏（製）

甘草（炙各半两）　欵冬花　　砂仁　　紫菀

細辛　　杏仁（去皮炒）　陳皮（去白）　桑白皮（炒）

青皮（去白）　五味子　　石菖蒲　　草果（各二錢半）

右㕮咀每服一两水二盞生姜四片紫蘇三葉煎至八

分温服

治多年喘嗽

人參　　麻黄　　甘草（各二两）

右為末每服二錢杏子五箇擂碎無根水同煎和滓食

後服

治遠年近日一切咳嗽

人參　　五倍子　　杏仁（去皮尖各五錢）　半夏（七錢）

右用大蘿蔔去頂取空以草麻子去殼四十九粒明礬五

錢為末二味入蘿蔔內以頂盖紙裹煨研丸每服十丸

臨卧烏梅湯下

人參湯經驗方治遠年欬

麻黃（去節）一　杏仁（去皮尖炒各一兩）　甘草（炙四兩）

桑白皮　五味子　粟殼（制一）　陳皮（各五錢）

麥門冬（三錢）　紫菀（一兩）　人參（去芦四錢）　阿膠（七分炒）

右㕮咀每服一兩水二盞煎至八分去滓溫服食後

治多年欬（百一選方）

杏仁（去皮尖）　半夏（湯泡七次）　南星（生用）　甘草（生用各等分）

右㕮咀每服八錢生姜七片棗一枚水一盞半煎至八分食後溫服

諸欬嗽不已

粟殼（蜜炙）　烏梅（去核）　陳皮（去白）　人參（去芦）

木香　五味子　桔梗（炒）　杏仁（去皮尖炒）

石膏　甘草

右㕮咀每服八錢雍水二盞煎至八分去滓溫服食後

九仙散　治一切咳嗽

人參　欵冬花　桔梗　五味子

阿膠　烏梅（各一兩）　貝母　罌粟殼（各半兩）

桑花（一兩）

右為細末每服三錢白沸湯點服

人參清肺湯（和劑方）治肺胃虛熱咳嗽喘急坐卧不安并

治久年勞嗽唾血腥臭

阿膠（炒）　杏仁（去皮炒）　桑白皮　地骨皮

人參　知母　烏梅（去核）　甘草（炙）

罌粟殼（去蒂蓋蜜炙各等分）

右㕮咀每服三錢水一盞半生姜棗子各一枚煎至一盞食後溫服

○已上數方治咳嗽喘急久不愈之劑

○廣按肺主皮毛人之無病之時榮衛周流內氣自皮膚腠理普達於外一或風寒外束則內氣不得於外達便從中起所以氣升而痰上故咳嗽宜用辛溫辛涼之劑以發散風寒則邪退正復而嗽止也又按肺為華蓋凡飢飽勞役喜怒憂恐與夫飲醇醪食厚味則火升痰上而傷於肺亦作咳嗽宜用降火豁痰之劑則火降痰消而咳止也又按肺主氣運行血液周流一身金也肺受火邪氣從火化有升無降為欬為喘久而不治虛極至損則不能運行氣液發為煩熱驚悸咳唾粘涎膿血宜用補虛潤燥開鬱散火之劑則肺得清正而嗽止也故治咳嗽要知新久之異虛實之殊補瀉之宜也矣

欬嗽治例（出明醫雜著）

王節齋曰欬謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾湿動而生痰欬嗽者因傷肺氣而動脾湿也病本雖分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲出也須分新久虛實新病風寒則散之火熱則清之湿熱則瀉之久病便屬虛屬鬱氣虛則補氣血虛則補血兼鬱則開鬱滋之潤之斂之降之則治虛之法也

主方

杏仁（去皮尖）　白茯苓（各一錢）　橘紅（七分）　五味子

桔梗　甘草（各五分）

春作多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎　芍藥　半夏（各一錢）　麥門冬（炒）　黃芩　知母（各五分）

春若傷風致欬鼻流清涕宜辛凉解散加防風　薄荷　紫蘇　炒黃芩　麥門冬（各一錢）

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮　知母　炒黃芩　麥門冬　石膏（各一錢）

秋多湿熱傷肺宜清熱瀉湿加蒼朮　桑白皮（各一錢）　防風　黃芩　山梔（炒各五分）

冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃　桂枝　半夏　生乾姜　防風（各一錢）肺經素有熱者再加酒炒黃芩　知母（各五分）

若發熱頭疼鼻塞聲重再加藁本　川芎　前胡　柴胡

（各一錢）

若有痰加半夏枳殼風痰再加南星（姜汁炒）溫痰脾困少食加白朮蒼朮　有痰而口燥咽乾勿用半夏南星宜加知母（蜜水拌炒）貝母瓜蔞仁黃芩（炒）

若夏月熱痰或素熱有痰加黃芩黃連知母石膏

上半日嗽者胃中有火加貝母石膏黃連　五更嗽者同治

黃昏嗽者火浮於肺不宜正用寒涼藥宜加五味子訶子皮斂而降之

若嗽久肺虛滋氣補血加人參黃耆阿膠當歸生姜天門冬款冬花馬兜鈴酒芍藥之類肺熱咳喘去人參用沙參此兼補氣血也

若午後嗽者屬陰虛即勞嗽也宜補陰降火加川芎當歸芍藥熟地黃黃栢知母竹瀝姜汁天門冬瓜蔞仁貝母此專補陰血也

若火鬱嗽謂痰鬱火邪在中宜開鬱消痰用訶子皮便香附瓜蔞仁半夏麴海石青黛黃芩為末蜜調為丸噙化仍服前補陰降火湯藥失治則成勞

若痰積食積作咳嗽者用香附瓜蔞仁貝母海石青黛半夏麴軟石膏山楂子枳實姜炒黃連為末蜜調噙

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

化

若勞嗽見血加阿膠當歸芍藥天門冬知母貝母桑白皮亦於前肺虛陰虛二條擇用大抵咳嗽見血多是肺受熱邪氣得熱而變為火火盛而陰虛不得安宁從火上升故治宜瀉火滋陰忌用人參等甘温補氣之藥然亦有氣虛而咳血者則宜用人參黃耆款冬花之藥但此等證不多耳

因欬而有痰者欬為重主治在肺因痰而致欬者痰為重主治在脾但是食積成痰痰氣上升以致欬嗽只治其痰消其積而欬自止不必用肺藥以治嗽也

○肺痿

丹溪心法

肺痿治法在乎養血養肺養氣清金　曾治一婦人二十餘歲胸膺間一竅口中所咳膿血與竅相應而出以人參黃芪當歸補氣血之劑加退熱排膿等藥而愈

附脉理

脉訣舉要曰寸數虛濇肺痿之形

附諸方

人參養肺湯　治肺痿證咳嗽有痰午後熱并聲嘶者

人參（去芦）　甘草　阿膠珠（各一錢）　茯苓（一錢半）

柴胡（四錢）　五味子　貝母　杏仁（炒）

桔梗（炒各一錢半）　桑白皮（二錢）　枳實（一錢五分）

右㕮咀每服八錢生姜三片棗一枚水一盞半煎至八分食後溫服

知母茯苓湯（宣明方）治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

茯苓　甘草（炙各一兩）　知母　五味子

人參（去蘆）　薄荷　半夏（洗七次）　柴胡（去苗）

白朮　款冬花　桔梗　麥門冬（去心）

黃芩（各半兩）　川芎　阿膠（炒各三錢）

右㕮咀每服一兩水二盞生姜十片煎至一盞去渣通

口服食後

人參平肺散（拔粹方）治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利

桑白皮（炒一兩）　知母（七錢）　甘草（炙）　地骨皮（各半兩）

五味子（三百箇）　茯苓　青皮　人參（各四錢）

陳皮（去白半兩）　天門冬（去心四錢）　如熱加黃芩四錢紫蘇葉

半夏（各半兩）

右㕮咀每服五錢水二盞生姜三片煎至八分去滓溫服或為末姜汁丸葶子大噙化亦得食後

紫菀散（拔粹方）治咳嗽唾中有膿血虛勞證肺痿變癰

人參（一錢）　紫菀（半錢）　知母（一錢半）　貝母（一錢半）
桔梗（一錢）　甘草（半錢）　五味（十五粒）　茯苓（一錢）
阿膠（炒五分）

右㕮咀水煎服一云各等分水二盞生姜三片煎至一盞食後服

劫勞散（拔粹方）治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽唾中有紅線名曰肺痿若不治便成羸劣之疾

白芍藥（六兩）　黃芪　甘草　人參
半夏（洗）　白茯苓　熟黃　當歸
五味子　阿膠（蛤粉炒各二）

右㕮咀每服一兩水二盞生姜三片棗三枚煎至一盞服不拘時

○肺癰

丹溪心法

肺癰已破入風者不治　用（醫壘）元戎搜風湯吐之　或用太乙膏成丸食後服　收斂瘡口止有合歡樹皮白歛煎飲之合歡即槿樹皮也又名夜合

附論

蘭發書云咳嗽有濁唾涎沫或咳嗽唾中有紅線膿血名曰肺痿熱在上焦故也如口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛名曰肺癰欬傷肺葉成也

附脉理

脉訣舉要曰寸數而實肺癰已成寸數虛濇肺痿之形肺癰色白脉宜短濇死者浮大不白而赤

附諸方

桔梗湯（濟生方）治肺癰咳嗽膿血咽喉多渴大小便赤澁

桔梗（去芦）　貝母（去心膜）　當歸（去芦酒浸）　瓜蔞子

枳殼（去穰麩炒）　薏苡仁（炒）　桑白皮（蜜水炙）　防己（各二兩）

黄芪（去芦一兩半）　甘草節（生用）　杏仁（去皮尖麩炒）　百合（蒸各半兩）

右㕮咀每服五錢水盞半生姜五片煎八分不拘時服

如大便秘大黄小便赤少加木通

消膿飲（直指方）治肺癰膿腥氣上衝而嘔咳嗽

南星（生一兩）　知母　貝母　白芷

生地黄　阿膠（炒）　川芎　桑白皮（炒）

白芨（各半兩）　甘草（炙）　防風　射干

桔梗　紫蘇葉　天門冬（去心）　薄荷

杏仁（不去皮）　半夏（姜製各七錢半）

右㕮咀每服一兩水二盞生姜七片烏梅一箇煎至八

分食後溫服

黃芪散　治肺癰

用白紫蜜炙為細末每服一大匙食遠黃芪湯調服

一方　治肺癰吐膿

桔梗（炒一兩）　甘草（炙半兩）

右每服一兩水一鍾半煎八分空心服吐盡膿為効

霍亂　十七

丙集

○內有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳湯加減作吐以提其氣此非鬼神皆屬飲食前人確論乃陽不升陰不降乖隔而成切莫與穀食雖米飲一呷入口即死必待吐瀉過二三時直至飢甚方可與稀粥食之脉多伏欲絕見成吐瀉不徹還用吐提其氣起或用樟木煎湯吐之亦可　大法生姜理中湯最好不渴者可用如渴者用五苓散有吐者以二陳湯探吐亦有可下者　轉筋不住男子以手挽其陰女子以手牽乳近兩邊此千金妙法也　轉筋皆屬乎血熱四物湯加酒芩紅花蒼术南星煎服　乾霍亂者最難治死在須臾升降不通當以吐提其氣極是

良法世多用盐湯此條內有物所傷外有邪氣所遏有用吐者則兼發散之義有用溫藥解散者不可用凉藥宜二陳湯加解散藥

二陳湯加　川芎　蒼术　防風

白芷杈（云白）

右剉姜五片煎服

治霍亂方

蒼术　厚朴　陳皮　葛根（各一錢半）

滑石（三錢）　白术（二錢）　木通（一錢）　甘草（炙）

右剉入姜煎湯下保和丸四五十丸

戴云霍亂者吐也有聲有物凡有聲無物而躁亂者謂之乾霍亂也

二陳湯（見痰類）

理中湯（見中寒）

五苓散（見溫熱）

四物湯（見補損）

附論

廣按人於夏月多食生冷因脾虛不能運化加以外感風寒則揮霍亂上吐下瀉也人見倉卒躁擾痛悶似有神鬼然實非鬼神乃飲食痞隔上下不通将欲

吐瀉故如是也

附脉理

脉訣舉要曰滑數為嘔代者霍亂微滑者生濇数凶斷又曰滑而不勻必是吐瀉霍亂之候脉代勿訝

附諸方

姜附湯　治中寒霍亂轉筋手足厥冷

理中湯　治中寒霍亂吐瀉（並見中寒）

通脉四逆湯（济生方）治霍亂多寒內冷脉絶

吴茱萸（炒二兩）　附子（炮二）一兩　桂心（去皮不見火）　木通

細辛　白芍薬　甘草（炙各半兩）　當歸（去芦三錢）

右㕮咀每服四錢水一盞酒半盞姜七片棗一枚煎七分温服

七氣湯（三因方）治七氣鬱結五臟之間互相刑剋陰陽不和揮霍變亂吐利交作

半夏（湯洗五兩）　厚朴（姜制）　桂心（各三兩）　白芍薬

茯苓（去皮各四兩）　紫蘇葉　橘皮（各二兩）　人参（去芦各一兩）

每服四錢水一盞酒半盞生姜七片棗一枚煎七分温服

五苓散　治霍亂吐瀉煩渴引飲（見温熱）

香朴飲子　治伏熱吐瀉虛煩作亂（見中暑）

霍香正氣散　治中温霍亂吐瀉

不換金正氣散　治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼（並見胃案）

二香散　治暑温相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香（二兩）　半夏　陳皮　桔梗

白朮　大腹皮　茯苓　厚朴

紫蘇　白芷（各一兩）　甘草（二兩半）　黃連（二兩）

香薷（一斤）　扁豆（半斤）

每服用水一鍾半生姜三片葱白二根煎食後熱服此即藿香正氣散黄連香薷飲相合也

既濟湯（醫方集成）治霍亂後虛煩不得眠

人參（去芦）　甘草（炙）　淡竹葉（炙各半兩）　麥門冬（去心一兩）

附子（炮半兩）　半夏（湯洗五錢）

右㕮咀每服四錢水二盞姜五片粳米百餘粒煎空心温服

麥門冬湯（濟生方）治霍亂已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬（去心）　橘皮（去白）　半夏（湯泡七次）　白茯苓（去皮）

白朮（各一兩）　人參（去蘆）　甘草（炙各半兩）　小麥（半合）

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片烏梅少許煎八分温服

木瓜湯（直指方）治霍亂吐瀉轉筋擾悶

酸木瓜（二兩）　茴香（微炒二錢半）　甘草（炙二錢）　吳茱萸（洗炒七次）
（二兩）

右㕮咀每服四錢姜五片紫蘇十葉煎服空心

桂苓甘露散　治中暑霍亂吐瀉發渴引飲（見中暑）

加減理中湯

人參　白术　乾姜　甘草（炙各等分）

若為寒氣濕氣所干者加附子一兩名附子理中湯　若霍亂吐瀉加陳皮青皮各一兩名治中湯　若乾霍亂心腹作痛先以塩湯少許頻服候吐出令透即進此藥　若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏一兩每服生姜十片同煎　若泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中湯　若溏泄不已者於補中湯內加附子一兩　不喜飲米穀不化者再加縮砂仁一兩共成八味　若霍亂吐下心腹作痛手足逆冷於本方內去白术加熟附名四順湯　若傷寒結胷先以桔梗枳殼等分煎服不愈者及諸吐利後胷痞欲絕心膈高起急痛手不可近者加枳實茯苓各一兩名枳實理中湯　若渴者再加枳實理中湯內加栝蔞根一兩　若霍亂後轉筋者理中湯內加火煆石膏一兩　若臍上築者腎氣動也去术加官桂一兩半腎惡燥故去术恐作奔豚故加官桂若

悸多加茯苓一兩　若渴欲飲冰者添加朮半兩　若腹滿者去白朮加附子一兩　若飲酒過多及啖炙煿熱食發為鼻衄加川芎一兩　若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脉只用本方

三因白朮散　治中暑嘔吐暈眩及大病後調理失宜勞復如初及脾胃虛損面色萎黃飲食不美口吐酸水滑泄腹鳴飲食所傷霍亂吐瀉並宜服之

白芷　甘草　青皮（去白）　白茯苓

桔梗　山藥　香附子（各三兩）　乾姜（半兩）

白朮　陳皮

每服水一鍾生姜三片棗一枚木瓜一片紫蘇葉三[illegible]皮煎食前服　若吐瀉加白梅煎　喘加桑白皮杏仁

傷寒勞復加薄荷　膈氣加木通入射香少許

中暑嘔逆加香薷　霍亂加藿香　產後泄瀉加荊芥

氣厥入鹽煎服

調中白朮散　治大病後吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱及酒毒嘔噦

白朮　茯苓（去皮）　人參（各半兩）　甘草（一兩五錢炙）

木香（一錢）　藿香（半兩）　葛根（一兩）

右為末白湯調服二錢煩渴加滑石二兩甚者加姜汁

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

人參散（經驗方）止吐逆及治瀉後煩渴常服調中和氣

茯苓（去皮）　人參（各半两）　葛根（一两）　藿香（去土）

木香　甘草（炙各一錢半）

右㕮咀每用水二盞煎至一盞通口服瀉後渴甚者加

滑石一錢

止渴湯（經驗方）治霍亂煩渴

甘草（炙）　人參（去芦）　麥門冬（去心）　茯苓（去皮）

桔梗　瓜蔞根　澤瀉　葛根（各半两）

右為末蜜湯調二錢下

回生散（百一選方）治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生

陳皮（去白）　藿香（去土等分）

右㕮咀每服一两水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時候

姜塩飲（直指方）治霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉

塩（一两）　生姜（半两切）

右同炒令色變以水一椀煎熱溫服甚者加童子小便一盞

治絞腸沙證（經驗方）治手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸溫水於病者膝腕內拍打有紫黑點處以針刺去惡血

卽愈又一法　用麻弦小竹弓蘸香油或熱水括手足胸背額項卽愈

方見傷食

備急大黃丸　療心腹諸痛卒暴百病用此藥吐下卽愈

〇廣按乾霍亂者乃寒濕太甚脾被絆而不能動氣被欝而不能行所以卒痛而手足厥冷惡心嘔噦也俗名攪腸沙者蓋言痛之甚也除用藥不言外此方刺青筋以出氣血南方括胸背手足以行氣血俱能散病然出氣血不如行氣血之為愈也蓋霍亂乃氣病非血病也今刺青筋固能散氣而血因之以傷况人之一身氣常有餘血常不足今不足者又從而傷之是不足之中又不足也少壯之人庸或得免而衰老之人則不免於死也何以言之氣為血之先道血為氣之依附今陰血既乏則陽氣失其依附必然發越不死何待書曰陽虛必惡寒陰虛必發熱蓋氣有餘便生火火動則發熱熱久而陰血愈消經曰陰虛則病陰竭則死此之謂也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

丹溪心法附餘彙纂卷之五終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

丹溪心法附餘卷之六　　丁集

新安居士方廣　輯

暑門

瘧十八

丹溪心法

○瘧疾有風　暑　食　痰　老瘧　瘧母　大法風暑當發汗夏月多在風凉處歇遂閉其汗而不泄故也　惡飲食者必自飲食上得之　無汗者要有汗散邪爲主帶

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

補　有汗者要無汗正氣為主帶散　一日一發者受病一月　間日一發者受病半年　三日一發者受病一年　二日連發住一日者氣血俱病　瘧病感虛者須以人參白朮一二貼托住其氣不使下陷後使他藥內傷挾外邪同發內必主痰外以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山草果煎服　久瘧不得汗者二陳湯加檳榔倍蒼朮　一方加柴胡葛根川芎一補一發不可直截　老瘧病此係風暑於陰分用血藥引出陽分則散入方宜

川芎　撫芎　紅花　當歸　炒栢

白朮　蒼朮　甘草　白芷

右剉水煎露一宿次早服

○治瘧一日間一日發者補藥帶表藥後以截瘧丹截之

若在陰分者用藥掣起陽分方可截即前藥之屬

充按瘧在陰分須徹起陽分者即格致論中云臟傳出至腑亂而失期也又當因其汗之多寡而為補養升發之術下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗多用川芎蒼朮乾葛升麻柴胡之屬此丹溪治瘧之微旨學者所當知也

截藥常山飲

穿山甲炮　草果　知母　檳榔　烏梅

甘草（炙）　常山

右㕮咀水酒一大碗煎半碗露一宿臨發日早服得吐爲順　一云加半夏柴胡去穿山甲如吐加厚朴又或加青皮陳皮

又方

柴胡　草果　常山　知母　貝母

檳榔

右用酒水同煎露一宿臨發前二時服

又治瘧母此藥消導

青皮　桃仁　紅花　神麯　麥芽

鱉甲（醋炙）　三稜　莪术　海粉　香附（並用醋煮）

右爲末丸如梧子大每服五七十丸白湯下

又治瘧寒熱頭痛如破渴飲水水外多汗出

人參　白术　黄芪　黄芩　黄連

山梔（炒）　川芎　蒼术　半夏　天花粉

右㕮咀水二鍾姜三片煎服

又治瘧疾發渴

生芐　麥門冬　天花粉　牛膝　知母

葛根　炒栢　生甘草

右㕮咀水煎

截瘧青蒿丸

青蒿（半斤）　冬瓜葉　官桂　馬鞭草

右焙乾爲末水丸胡椒大每一兩分四服於當發之前一時服盡　又云青蒿了兩冬青葉二兩馬鞭草二兩桂二兩未知孰是姑兩存之以竢知者

截瘧

檳榔　陳皮　白朮　常山（各三錢）　茯苓

烏梅　厚朴（各一錢半）

右㕮咀作二服水酒各一鍾煎至一鍾當發前一日一服臨發日早一服服後少睡片時

又瘧疾後

白朮　半夏（一兩）　黃連（半兩）　白芍（三錢）　陳皮（半兩）

右爲末粥丸梧子大每服六十丸姜湯下

附諸賢論

心法附録曰世用砒霜等毒不可輕用俗謂之脾寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必全是寒况其他乎在其陽分者易治陰分者難治瘧毋必用毒藥消之行氣消堅爲主東垣謂寒瘧屬太陽熱瘧屬陽明風瘧屬少陽在三陰經則不分總曰温瘧此言是但三陰經說不明凡作於子午卯酉日者少陰瘧也寅申巳

亥日者厥陰瘧也辰戌丑未日者太陰瘧也

附脉理

脉訣舉要曰瘧脉自弦弦遲多寒弦數多熱隨時變遷

心法附録曰瘧脉多弦但熱則弦而帶數寒則弦而帶遲亦有病久而脉極虛微而無力似乎不弦然而必於虛數之中見弦但不搏手耳細察可見也

附諸方

黄連香薷飲　治伏暑發瘧煩渴者（見中暑）

桂枝羌活湯（抜粹方）　治瘧疾處暑前發頭痛項強脉浮惡寒有汗者

桂枝　羌活　防風　甘草（各半兩）

右爲粗末每服半兩水煎如吐加半夏麯等分

麻黄羌活湯（抜粹方）治瘧疾頭痛項強脉浮惡風無汗者

麻黄（去節）　羌活　防風　甘草（各半兩）

右爲粗末每服五錢水一盞半煎至如吐加半夏麯等分

麻黄桂枝湯（抜粹方）　治瘧疾如前病而夜發者或惡風或惡寒

麻黄（一兩去節）　炙甘草（三錢）　黄芩（五錢）　桂（二錢）　桃仁（二十箇去皮尖）

右爲末水煎服桃仁散血緩肝夜發乃陰經而有邪用

此湯散血中風寒也

桂枝黃芩湯（拔粹方）治瘧服藥寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也

甘草　人參　黃芩（各四兩半）半夏（四錢）柴胡（一兩二錢）

石膏　知母（各五錢）桂枝（二錢）

右爲粗末每服五錢水煎服

桂枝石膏湯（拔粹方）治瘧疾先寒後熱熱多寒少

桂枝（五錢）石膏　知母（各一兩半）黃芩（一兩）

右爲末三分服每水二盞煎服間日者邪氣所合故也

○已上數方發散之劑

人參養胃湯　治瘧疾寒多熱少者必須先用此藥發散然後用四獸飲之類截之因食倍加草果（見胃寒類）

萬安散（濟生方）治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此藥以取效氣虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼朮（泔浸去皮炒）厚朴（姜製炒）陳皮（去白）檳榔　常山（酒浸）

甘草（炙各一錢半）

右㕮咀水一盞半煎至一盞露一宿當發日作二服忌熱性物片時

定齋草果飲子（簡易方）　怯脾治瘧

草果　蒼朮（泔浸）厚朴　陳皮　半夏麯

甘草（炙）　烏梅（去核各等分）

右㕮咀每服半两水一盞半姜五片棗二箇同煎柒分不拘時服寒多者加乾姜附子熱多者只加柴胡瘴瘧加檳榔

柴胡桂姜湯（活人方）　治瘧疾寒多微熱或但寒而不熱者并治勞瘧

柴胡（四两）　桂枝（去皮一两半）　黄芩（一两半）　瓜蔞根（一两）　牡蠣（炮碎炒）

甘草（炙）　乾姜（各了炮）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分温服

柴胡加桂湯（活人方）　治瘧先寒後熱兼治支結

柴胡（八两去苗）　人參（去芦）　甘草（炙八）　半夏（炮七次）　黄芩

肉桂（去皮各二两）

右㕮咀每服五錢水一盞半姜七片棗二箇煎服若渴者去半夏加人參瓜蔞根同煎服之

○已上數方治瘧寒多熱少發散之劑（無汗可用）

小柴胡湯　治瘧疾熱多寒少但或單熱頭疼口乾胷滿者（方見温熱類）

柴胡栝蔞根湯　治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡（去苗一两七錢半）、　天花粉（一两）　黄芩（去黑心）　人參

甘草（炙七錢半）

右服一两姜五片棗一枚水二盞煎一盞去渣通口服

白虎加桂枝湯（活人方） 治瘧疾但熱不寒及有汗者

知母（六两） 甘草（炙三两） 桂枝（三两） 粳米（三两） 石膏（一斤）

右㕮咀每服五銭水一盞半煎至一盞去滓温服

清脾飲（濟生方） 治癉瘧脉來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽熱小便赤澁

青皮（去白） 厚朴（姜製） 白术 半夏（湯洗七次） 黄芩

草果仁 柴胡（去苗） 茯苓（去皮） 甘草（炙各等分）

右㕮咀每服四銭水一盞半姜五片煎七分温服不拘時

參蘇飲 治發瘧熱多寒少兼咳嗽者（見傷風類）

驅瘧飲 治發瘧熱多寒少者

前胡 柴胡（各四两） 桂心 桔梗 厚朴

半夏（各三两） 黄芪 乾姜（炮） 甘草（炙各二两）

右剉水二盞生姜三片棗四箇煎

○已上數方治瘧熱多寒少發散之劑（有汗可用）

大柴胡湯 治瘧熱多寒少目痛多汗脉大以此湯微利爲度餘邪未盡以白芷石膏三物湯以盡其邪（方見温熱）

白芷石膏三物湯

白芷（一两） 知母（一两七銭） 石膏（四两）

右爲粗末每半两水一盞温服清

○已上二方治瘧熱多寒少推逐調和之劑

四獸飲（簡易方） 治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發爲瘧疾

人參（去芦） 白朮 茯苓（去皮） 橘紅 草果仁

半夏（湯炮） 棗子 生姜 烏梅（去核各等分） 甘草（炙減半）

右㕮咀以塩少許淹食頃用厚皮紙裹了以水濕之慢火炮令香熟焙乾每服半两水二盞煎六分未發前併進數服

七寶飲（簡易方） 治一切瘧疾無問寒熱多少及山嵐瘴氣寒熱如瘧

厚朴（姜製） 陳皮 甘草（炙） 草果仁 常山（雞骨者）

檳榔 青皮（各等分）

右㕮咀每服五錢水一盞半酒半盞煎取一盞露一宿空心向東溫服睡少頃時須忌熱性物寒多加酒服

清肺湯（三因方） 治飲食傷脾停滯痰飲發爲寒熱

厚朴（四两姜炒） 烏梅（去核） 半夏（湯去滑） 青皮 良姜（各二两）

草果（去皮一两） 甘草（炙半两）

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分未發前併三服忌生冷油膩之物

○已上三方治瘧寒多熱少止截之劑

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

常山飲（和劑方）　治瘧疾發散不愈漸成勞瘵

知母　川常山　草果（各三兩二錢）　[illegible]　良薑（二兩）

甘草　烏梅（去核各一兩六錢）

右㕮咀每服五錢水一盞姜五片棗一枚煎七分温服

六和湯

人參　知母　[illegible]　草果　貝母　[illegible]　烏梅

白芷　檳榔　柴胡（各一錢用酒拌）　[illegible]　常山（二錢）

右剉姜三片棗一枚酒水同煎露一宿臨發前二時服

○已上二方治瘧熱多寒少止截之劑

鬼哭丹　治瘧二三日一發者

常山（一斤醋浸春五夏三日秋七冬十日）　[illegible]　檳榔（各四兩）　半夏

貝母（各二兩）

右為末用鷄子清麪糊爲丸如梧桐子大每服三十丸隔夜臨睡冷酒吞服次日早再進一服

秘方清脾丸　治瘧三日一發或十日一發

姜黃（三錢）　白术（一兩半）　人參　檳榔　草果　[illegible]

莪术（醋炒）　厚朴（各半兩）　黃芩　半夏　青皮（各一兩）

甘草（三錢）

右爲末飯丸如梧子大每六十丸食遠白湯下日二服

紅丸子（濟生方）　專治食瘧

青皮（炒三兩） 阿魏（醋化二錢五分） 蓬朮（醋煮）

京三稜（醋煮各二兩） 胡椒（一兩）

右爲末別用陳倉米同阿魏醋煮糊丸如梧子大每服五十丸至百丸淡姜湯下或因食生果成瘧用麝香湯吞下

老瘧飲（三因方） 治久瘧結成癥瘕癖在脅脇諸藥不愈者

蒼朮（泔浸） 草果（去皮） 桔梗 青皮 陳皮

良姜（各半兩） 白芷 茯苓 半夏（湯洗去滑） 甘草（炙）

枳殼（麩炒） 桂心 乾姜（炮各三錢） 紫蘇葉 川芎（各二錢）

右㕮咀每服四錢水一盞塩少許煎七分空心服

山甲湯 久瘧瘧母不治者宜服四獸飲間服此湯

川山甲 木鱉子（等分）

右為末每服二錢空心温酒調下

鼈甲飲子（濟生方） 治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘧母

草果仁 鼈甲（醋炙） 黄耆（去蘆） 白朮 白芍藥

厚朴（姜製炒） 檳榔 木紅 川芎 甘草（炙各等分）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜七片棗一枚烏梅少許煎温服

十将軍丸　久瘧不瘥腹痛有瘧母

三稜（一两去毛土炮）莪朮（生）　青皮（去白）　陳皮（去白各一两）　草果（去殼二两）

川常山（二两）砂仁　檳榔　烏梅　半夏（湯泡七次各一两）

右先将常山草果二味剉用好酒醋各一碗入瓦器内先浸一宿後入八味藥同浸至晚用瓦銚内炭火煑乾取出晒如無日色用火焙乾爲末半酒半醋打糊爲丸如梧桐子大每服三四十丸白湯吞下日進三服忌生冷魚腥鹹酸油膩并諸死毒物服四两至八两即除根

凡有積聚及行瘴温地土方宜服之

○已上諸方消導之劑

四将軍飲（良方）　治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此雖一時急救之方用之有驗

附子（一箇炮去皮）　訶子（四箇去核）　陳皮（四箇全洗净）　甘草（炙四錢）

右㕮咀爲四服每服水一鍾半生姜七片棗七枚煎取一半令熱灌病者立可甦省

○廣按瘧疾發作而僵仆不省人事者盖由頑痰老痰膠固於中榮衛不行故也所以中風中暑而卒倒不省人事者亦由痰之所致也附子性太熱走而不守本是治寒濕之藥今瘧疾發作僵仆而用之以其性大熱能開散頑痰使榮衛得行故耳乃是刼劑非正

治之藥也

露薑飲（澹寮方）

用生薑四兩和皮擣汁一碗夜露至曉空心冷服大治脾胃聚痰發為寒熱

○廣按生姜自然汁丸中風中暑中氣中毒乾霍亂一應卒暴之　與童便同用立可解散盖生姜能開痰童便能降火故也

一分利順元散（澹寮方）治体虚之人患瘧疾寒多不可用截藥者

川芎　附子（炮各）一　南星（二兩）　木香（五錢另剉臨時入）

右除木香不見火外三味各將一半去皮生用一半炮熟合和㕮咀每服四錢棗七枚生姜十片水一鍾煎七分當發前一日及當發日早晨連進二三服半生半熟能分解陰陽也

一方　治久瘧

用青蒿桂枝各爲末若寒多用桂多蒿少熱多用蒿多桂少三七分五用各以生姜二兩連皮擣汁和熱酒調服以衣被盖臥即愈

雄黄散（保命集）治久瘧不能食胷中兀兀欲吐而不吐此藥吐之必愈

雄黃　瓜蒂　赤小豆（各等分）

右爲細末每服半錢温水調下以吐爲度

辰砂丸（宣明方）治一切脾胃瘧瘴熱毒者

信砒　甘草（各一錢）　硃砂（二錢）　大豆（四十九粒）

右爲末滴水和丸勻分作四十九丸服發日日欲出煎桃心湯下一丸忌熱性物

尅效餅子（和劑方）治一切瘧疾發作有時先覺伸欠乃作寒慄股振頭頷中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已或內外皆熱頭痛如破渴飲冷水或痰聚胷中煩滿欲吐或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或但熱不寒但寒不熱或一日或隔日或發後六七日再發皆治之

龍腦　麝香　定粉（研各五錢）　荷葉　菉豆

甘草（煨各五兩）　硃砂（二兩二錢半研）　信（醋煑二兩半）　金箔（二十五箇爲衣）

右爲末煉蜜搜和勻每兩作二十九捏匾金箔爲衣每服一餅子以新汲水磨化日發者未發前服之間日發者頭夜服隔數日發者前一日夜服連日發夌晨服

不二散

人言（一兩爲末）　飛麪（四兩與人言水和軟餅鍋內焙乾爲末用）　白扁豆（末二兩）

細茶（末二兩）

右同和勻每服小半錢已前半日用溫茶調下再用茶

盪净忌食酒麵魚等物

椎硃丹

用椎黑豆四十九粒五月五日以冷水浸從早至巳時去皮眼乾研爲末入信末一錢再研勻細為丸雄黃爲衣晒乾收貯少壯人如梧桐子大衰老人如小黃豆大小兒如菉豆大臨發時五更面東井水下一丸不止并服黑豆圓者是

一方　治久瘧

大南星（二枚）　好信（三錢）

右先將南星開孔用信三錢研為末裝入孔内兩星相對用泥固濟炭火煅存性取出研爲細末用菉豆粉打糊為丸如豆大每服一二丸臨發日五更温茶清下白湯亦可

一方

人言（二錢）　雄黃　菉豆（各五錢）

右爲細末麵糊爲丸如筯頭大硃砂爲衣每服一丸用桃柳條各七寸煎湯露一宿臨發日空心服面向東忌食熱物魚腥油膩十日

瘧疾良方（百一選方）今人治瘧疾多用常山砒霜之類發吐取涎縱使得安脾胃不能不損不若此藥最爲穩當

辰砂（光明者） 阿魏（真者各一兩）

右研勻和稀糊爲丸如皂角子大每服一丸空心人參湯下

○已上數方刼奪之劑

灸法（濟生方）治瘧疾久不愈

不問男女於大椎中第一骨節盡處先針後灸三七壯立效或灸第三骨節亦可

對金飲子（和劑方）治寒熱瘧疾愈後理調脾胃

厚朴（去皮姜汁炒） 蒼朮（泔浸去粗皮） 甘草（炙各二兩） 陳皮（去白）

右㕮咀每服四錢水一鍾薑三片棗一箇煎服一方加草果倍用蒼朮名草果平胃散

正氣散（孫同知方）退寒瘧止胃寒進食

藿香（四兩） 草果（四兩） 半夏 陳皮 厚朴

砂仁 甘草（各一兩）

右剉爲散生姜棗子煎温服如瘧未至候發日早服

草果飲（和劑方）治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

紫蘇 草果仁 良姜（炒） 川芎 青皮

甘草（炙） 陳皮（去白） 白芷（各等分）

右㕮咀每服四錢水一鍾煎七分熱服

○已上數方治瘧初愈理脾進食之劑

○廣按瘧疾之源盖由暑月中表氣虗而致中氣虗則水穀停聚而為痰飲於胷脇矣表氣虗則風暑入內而使血液稽留於經絡矣久則痰飲血液拂鬱稠粘膠固痞塞不通人之榮衛晝行陽分二十五度脊與背也夜行陽分二十五度胷與腹也榮衛行到病所不通乃作寒戰股振頭頷中外皆寒腰脊俱痛此正氣入於內也寒戰俱已內外皆熱頭痛如破渴欲飲水煩滿欲吐自汗此邪火發於外也或獨寒而無熱或寒多而熱少或無汗者宜開鬱豁痰為主用人參養胃湯草果飲子之類以發散之或熱多而寒少或獨熱而無寒或有汗者宜清熱補虗為主用白虎加桂枝湯小柴胡湯之類以發散之用發散之藥三五服後則用四獸飲六和湯之類以截之或瘧久在陰分亦須用血藥徹起陽分然後截之可也

瘧疾治例（出明醫雜著）

王節齋曰瘧是風暑之邪有一日一發有二日一發有三日一發有間一日連二日發有日與夜各發有有汗有無汗有上半日發有下半日發有發於夜者治法邪從外入宜發散之然以扶持胃氣為本又須分別陽分陰分而用藥邪瘧及新發熱者可散可截虗瘧及久者

宜補氣血若過服截藥致傷脾胃則必延綿不休

主方

柴胡（去苗）白朮（各一錢）蒼朮（泔浸一錢）已上三味瘧疾必用之

陳皮（七分）甘草（炙五分）乾葛（一錢二分）

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯黃芩茯苓半夏（各一錢）熱甚頭痛再加川芎軟石膏（各一錢）口渴加石膏知母麥門冬（各一錢）

若間日或三日發午後或夜發者邪在陰分加川芎當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母（各一錢）酒洗紅花酒炒黃蘗（各四分）提起陽分可截之

若間一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人參黃芪白茯苓（各一錢）以補氣川芎當歸白芍藥熟地黃（各一錢）以補血

若陽瘧多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗柴胡蒼朮白朮黃芩乾葛以發之

若陰瘧多汗用當歸白芍藥熟地黃黃耆黃蘗以斂之無汗柴胡蒼朮大川芎紅花升麻以發之故曰有汗者要無汗正氣為主無汗者要有汗散邪為主

若病人胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃而少食者加人參（一錢半）酒炒芍藥大麥芽（各一錢）

若傷食痞悶或有食積者加神曲麥芽枳實（炒各二錢）

炒黃連五分

若痰盛加姜製半夏南星枳實（炒各一錢）黃芩黃連（各六分）

若欲截之加檳榔黃芩青皮常山（各一錢）烏梅淨肉（三箇肥者）

若日久虛瘧寒熱不多或無寒而但微熱者邪氣已無只用四君子合四物湯加柴胡黃芩黃耆陳皮以滋補氣血

○痢赤屬血　白屬氣　有身熱　後重　腹痛　下血

身熱挾外感小柴胡湯去人參　後重積與氣墜下之故兼升兼消宜木香檳榔丸之類不愈者用秦艽皁角子煨大黃當歸桃仁黃連枳殼若大腸風盛可作丸服　保和丸亦治因積作後重者五日後不可下盖脾胃虛故也

後重窘迫者當和氣木香檳榔　腹痛者肺金之氣鬱在大腸之間如實者以劉氏之法下之虛則以苦梗開支然後用治痢藥氣用氣藥血用血藥有熱用黃芩芍藥之類無熱腹痛或用溫藥姜桂之屬　下血四物為主　下血多主食積與熱或用朴硝者　青六丸治血痢效　痢

疾初得一二日間以利爲法切不可便用止澁之劑若實者調胃承氣大小承氣三一承氣下之有熱先退熱然後看其氣病血病加減用藥不可便用參术然氣虛者可用胃虛者亦用之　血痢久不愈者屬陰虛四物湯爲主凉血和血當歸桃仁之屬　下痢久不止發熱者屬陰虛用寒凉藥必兼升散藥倂熱藥　下痢大孔痛者因熱流於下也以檳榔木香黃連黃芩炒乾姜　噤口痢者胃口熱甚故也大虛大熱用香連丸蓮肉各一半共為末米湯調下又方人參二分姜炒黃連一分為末濃煎終日細細呷之如吐則再服但一呷下咽便開人不知此多用温熱藥甘味此以火濟火以滯益滯　封臍引熱下行用田螺肉搗碎入麝香少許盦臍內　下痢不治之証下如魚腦者半死半生下如塵腐色者死下純血者死下如屋漏水者死下如竹筒注者不治　赤痢乃自小腸來白痢乃自大腸來皆湿熱爲本赤白滯濁同法　下痢有風邪下陷宜升提之蓋風傷肝肝主木故也有湿傷血宜行湿清熱內經所謂身熱則死寒則生此是大槩言必兼証詳之方可今豈無身熱而生寒而死者　脉沉少留連或微者易治洪大數者難治也脉宜滑大不宜弦急　仲景治痢疾温者五法可下者十法或解表或利小便或待其自已還

分易治難治不治之証至爲詳密但與瀉同立論不分學者當辨之　大孔痛　曰温之一曰清之按久病身冷脉沉小者宜温宜補暴病身熱脉浮洪者宜清有可吐者亦有可汗可下者　初得之時元氣未虛必征蕩之此通因通用之法稍久氣虛則不可下壯實初病宜下虛弱衰老久病宜升之　先水瀉後膿血此脾傳腎賊邪難愈先膿血後水瀉此腎傳脾微邪易愈　下痢如豆汁者湿也盖脾胃為水穀之海無物不受常兼四臟故五色之相雜當先通利此迎而奪之之義如虛者亦宜審之因熱而作不可用巴豆如傷冷物者或可用宜謹　又有時疫作痢一方一家之内上下傳染相似却宜明運氣之勝後以治之

戴云痢雖有赤白二色終無寒熱之分通作湿熱治但分新舊更量元氣用藥與赤白帶同

入方

黄連　滑石　甘草　白芍

蒼术　白术　當歸　青皮

條芩

右剉水煎裏急後重炒黄連滑石加桃仁檳榔甚者大黄嘔者用姜汁半夏

又方

乾姜（一錢）　當歸（二錢半）　烏梅（三箇）　梔（一錢半）

黄連

右剉作一服水煎食前若水瀉可等分用或加枳殼

又方　治熱與血

大黄　黄連　黄芩　黄梔

枳殼　當歸　芍藥　滑石

桃仁　甘草　白朮（等分）

右爲末或湯調或作丸用麵糊或神麴糊丸服　一本云誤服熱藥澁藥毒犯胃者當明審以祛其毒

治白痢

蒼朮　白朮　神麴　茯苓

地榆　甘草

右剉水煎

治赤痢

地黄　芍藥　梔　地榆

白朮

右剉水煎　腹痛加枳殼厚朴後重加滑石木香檳榔有熱加黄芩山梔

又治痢方

滑石（一兩）　蒼朮（半兩）　川芎（三錢）　桃仁

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

芍藥（半两炒）甘草（一錢）

右為末姜一片擂細煎滚服

又方　孫郎中飲水過多腹脹瀉痢帶白

蒼朮　白朮　厚朴　茯苓

滑石

右㕮咀水煎下保和丸　又云加炒麴甘草

又方

蒼朮　酒杦　白芍（各二两半）　酒栢（炒半两）

右爲末粥丸以四物湯加陳皮甘草水煎湯下

又方　痢後腰痛兩脚無力

陳皮　半夏　白芍（各一錢）　茯苓

蒼朮　當歸　酒芩（各半錢）　白朮

甘草（各二錢）

右㕮咀作一服姜煎食前服

又方　治小兒八歲下痢純血作食積治

蒼朮　白朮　黃芩　滑石

白芍　茯苓　甘草　陳皮

神麴（炒）

右㕮咀水煎下保和丸

一老年七十面白脉弦數獨胃脉沉滑因飲白酒作痢下

血淡膿水腹痛小便不利裏急後重參朮為君甘草滑石檳榔木香蒼朮為佐下保和丸二十五丸第二日前証俱減獨小便不利以益元散與之安

治痢十法

其或惡寒發熱身首俱痛此為表証宜微汗和解用蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生姜三片煎　其或腹痛後重小水短下積此爲裏証宜和中踈氣用炒枳殼製厚朴芍藥陳皮滑石甘草煎　其或下墜異常積中有紫黑血而又痛甚此為死血証法當用擂末桃仁滑石行之或口渴及大便口燥辣是名挾熱加黄芩或口不渴身不熱喜熱手熨盪是名挾寒加乾姜　其或下墜在血活之後此氣滯証宜於前藥加檳榔一枚　其或在下則纏住在上則嘔食此為毒積未化胃氣未平証當認其寒則溫之熱則清之虛則用參朮補之毒解積下食自進　其或力倦自覺氣少惡食此爲挾虛証宜加白朮當歸身尾甚者加人參又十分重者止用此一條加陳皮補之虛回而利自正　其或氣行血和積少但虛坐努責此爲無血証倍用當歸身尾卻以生芍藥生苄生桃仁佐之復以陳皮和之血生自安　其或纏墜退減十之七八穢積已盡糟粕未實當炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒煞

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

固腸丸性燥恐尚有滯氣未盡行者但當单飲此湯固腸丸未宜遽用葢固腸丸有去濕實腸之功　其或利後糟粕未實或食粥稍多或饑甚方食腹中作痛切不可驚恐當以陳皮白术各半煎湯和之自安　其或久痢後体虛氣弱滑下不止又當以藥澁之可用訶子皮肉豆蔻白九半夏甚者添牡蠣可擇用之然須用陳皮為佐恐大澁亦能作痛又甚者灸天樞氣海　右前方用厚朴專瀉滯凝之氣然厚朴性大溫而散氣久服大能虛人滯氣稍行即去之餘滯未盡則用炒枳殼陳皮然枳殼亦能耗氣比之厚朴稍緩比陳皮稍重滯氣稍退當去之只用陳皮以和衆藥然陳皮去白有補瀉之兼若為參术之佐亦純作補藥用　凡痢疾腸痛必以白芍藥甘草為君當歸白术為佐惡寒者加桂惡熱痛者加黄栢達者更能參以歲氣時令用藥則萬舉萬全豈在乎執方而已哉

附脉理

脉訣舉要曰濇則無血厥寒為甚尺微無陰下痢逆冷又曰無積不痢脉宜滑大浮弦急死沉細無害

附諸方

五苓散　治伏熱下痢分利陰陽

黄連香薷飲　治感暑下痢鮮血

清暑益氣湯　治暑病內傷下痢不思飲食發熱

六合湯　治伏熱煩悶或成痢疾　（俱見中暑）

○已上數方治因暑者下痢之劑

敗毒散加石蓮肉　治下痢熱毒不進飲食

倉廩方（仁齋方）治下痢赤白或因先是寒邪中臟腑致發熱者敗毒散加陳米姜棗同煎　（俱見傷風）

防風芍藥湯（拔粹方）治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛微汗

防風　芍藥　黃芩（各一兩）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

○已上數方治痢疾身熱者之劑

香連丸（和劑方）治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連（去蘆二十兩用吳茱萸十兩同浸炒令赤色去茱萸不用）　木香（四兩八錢不見火）

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心米飲下

導氣湯（拔粹方）治下痢膿血裏急後重日夜無度

芍藥（一兩）　當歸（半兩）　大黃（二錢半）　黃連（一錢）

黃芩（二錢半）　木香　檳榔（各一錢）

右㕮咀每二兩水三鍾煎至七分溫服食前

木香枳殼丸（聖惠方）治痢疾裡急後重兼開胸膈進飲食破滯氣散內熱

木香　檳榔　陳皮（去白）　黃連（去鬚）

蓬朮（煨）　當歸（去芦）　枳殼（去穰炒）　青皮（各五錢）

香附子（去毛）　黃栢（各一兩半）　黑牽牛（頭末二兩）

右為末水丸如梧桐子大每服五十丸或七十丸姜湯下　如腫毒加服至二百丸利五七行立消

戴大木香檳榔丸　治證同前

木香　檳榔　青皮　陳皮

廣朮　枳殼　黃連　黃栢

大黃（各半兩）　丑末　香附（各二兩）

右為末水丸梧子大每五六十丸煎水下量虛實與之

紺珠多三稜黃芩當歸分兩不同（見鼓脹）

保和丸　治脾虛因積作後重者不可下用此消導（方見積聚）

和中丸　同前（方見調補脾胃）

○已上數方治痢疾後重者之劑

黃連阿膠丸（和劑方）治冷熱不調下痢赤白裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

阿膠（炒二兩）　黃連（去鬚三兩）　茯苓（去皮三兩）

右黃連茯苓為末水熬阿膠膏搜和丸如梧子大每三

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

十丸米飲下

當歸丸（濟生方）治冷留腸胃下痢純白腹痛不止

當歸　芍藥　附子　白朮

乾姜　厚朴　阿膠（蛤粉炒各一兩）烏梅肉（一兩）

右為末醋糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

蒼朮芍藥湯（拔粹方）治痢疾痛甚者

蒼朮（二兩）　芍藥（一兩）　黃芩　官桂（各五錢）

右㕮咀每一兩水二鍾煎至一鍾溫服

四味阿膠丸（仁存方）治挾熱下痢々巳黃煩燥多渴臍腹疼

痛小便不利

黃連（淨四兩）茯苓（去皮二兩）赤芍藥（三兩）阿膠（蛤粉炒一兩）

右為末醋糊丸梧子大每服五十丸米飲下

當歸導氣湯（拔粹方）治膿血痢無度腹中痛

當歸　芍藥（各一錢）甘草（一錢半）青皮（七錢）

槐花（七分）生地黃（酒洗陰乾二錢）

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服食前如後重加木

香檳榔末各三分澤瀉半錢如小便利去澤瀉

○巳上數方治痢疾腹痛者之劑

烏梅丸　治熱留腸胃臍腹疞痛下痢純血或服熱藥過

多毒蘊于內滲成血痢（濟生方）

烏梅肉（二两） 黄連（三两） 當歸 枳殼（去穰麸炒各二两）

右為末醋糊丸梧子大每服七十丸空心米飲下

茜根丸（濟生方） 治一切毒痢及蠱注下血如雞肝心煩腹痛

茜根（洗） 川升麻 犀角（鎊） 地榆（洗）

當歸（去芦洗） 黄連（去鬚） 枳殼（去穰麸炒） 白芍藥（各等分）

右為末醋煑米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲下

槐花散（拔粹方） 治血痢久不止腹中不痛不裏急後重

青皮 槐花 荆芥穗（各等分）

右為末水煎空心熱服

地榆散（百一選方） 治中暑昏迷不省人事欲死并治血痢暑痢

地榆 赤芍藥 黄連 青皮（去白）

右等分為末每服三錢漿水調如無只以新水亦得若血痢水煎

地榆散 治下血遠年不瘥及血痢

地榆 卷栢（等分）

右㕮咀用水沙瓶煑數十沸通口服

蘗皮湯（經驗方） 治傷寒下痢亦治久血熱痢

蘗皮（三兩） 黃芩（二兩） 黃連（一兩）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服腹痛加山梔子小便不利加赤茯苓阿膠煎服

椿皮丸（經驗方） 治下痢清血腹中刺痛

用椿根白皮不拘多少為末米醋糊丸如梧桐子大空心米飲下三四十丸

四物湯（保命集） 治下痢純血

川芎 當歸 白芍 生芐

槐花 黃連 御米殼（等分）

右剉水煎服

苦參丸 治血痢

用苦參不以多少炒焦為末滴水丸如梧子大每服五十丸米飲下

治痢血方

昔曹魯公痢血百餘日國醫無能療者陳應之取塩水梅除核研一枚合臈茶加醋湯沃服之一啜而瘥大丞相莊肅梁公亦痢血應之曰此挾水穀當用三物散亦數服而愈三物散用胡黃連烏梅肉竈心土等分為末臈茶清調下食前服

治下痢純血（經驗方）

黄栢（蜜炙令香黄色壹两）

右為末每服三錢空心温漿水調下

一方 治血痢

用地錦草不以多少晒乾碾為細末每服二錢空心米飲調下

一方 治腸風血痢

用鯽魚一箇破開去腸膽釀白礬二錢燒灰存性為末米飲調服

○已上數方治痢疾下血者之劑

地榆散（和劑方）治大人小兒脾胃氣虚冷熱不調下痢膿血赤多白少或下鮮血裏急後重小便不利

地榆（炒） 乾葛（各半斤） 乾姜（炮二两） 當歸（去苗三两）

茯苓（去皮） 赤芍藥（各六两） 甘草（炙四两） 罌粟（殼蜜炒二两）

右為末每服一錢用温熟水調下不拘時服若下痢純白及紫黑血并腸滑不禁者不可服之

地榆芍藥湯（拔粹方）治泄痢膿血乃至脫肛

蒼术（八两） 地榆（二两） 卷栢 芍藥（各三两）

右㕮咀每服一两水二鍾煎至一鍾食前通口服

阿膠湯（拔粹方）治傷寒熱毒入胃下痢膿血

黄連（炒二两） 梔子（五錢） 阿膠（蛤粉炒） 黄蘗（去皮炙各一两）

右㕮咀每服一两水二鍾煎至一鍾温服食前

大黃湯（拔粹）方治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈者用此徹和

大黃一两

右用好酒二鍾浸半日煎至一鍾去大黃將酒分二服如未止再服以利爲度復服芍藥湯和之痢止再服芍藥黃芩湯以徹其毒也

芍藥湯（拔粹）方下血調氣洩而便膿血知氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥一两　當歸　黃連　黃芩各半两

肉桂二錢半　檳榔　大黃各三錢　甘草炙

木香各二錢

右㕮咀每服半两水二鍾煎至一鍾去渣温服如痢不减漸加大黃如汗後臟毒加黃栢半两

芍藥黃芩湯（拔粹）方治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脉洪疾者及下痢膿血稠粘

黃芩　芍藥各一两　甘草炙半两

右㕮咀每服一两水二鍾煎至一鍾去渣通口服食前

芍藥蘗皮丸（拔粹）方治便膿血

芍藥　黃蘗皮等分

右爲末醋糊丸如梧桐子米飲送下

專治赤痢（秘方）

黃連（二兩）　木香　甘草（各二錢）

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓温服食前先一日服五苓散三貼次日早服此藥即止如神

又方

用連白青韭一大握多要取汁和煑酒一盞温飲之極驗又治婦人心痛有效散氣行血故也

解毒金花散（經驗方）治下痢膿血熱毒

黃芩　白朮　赤茯苓　赤芍藥（各半兩）

黃連　黃蘗（各一兩）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓温服食前如

腹痛加梔子仁二枚同煎

一方　治熱痢不止

用車前葉搗爛取汁一鍾入蜜一合煎服

黃連烏梅丸（聖惠方）治湿熱痢不瘥

烏梅（炒）　黃連（各四兩）

右爲末煉蜜丸梧子大每服二十丸米飲下食前

芍藥蘗皮丸（子和方）治一切湿熱惡痢頻併窘痛無問膿血

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

芍藥　黃蘗各一兩　當歸　黃連各半兩

右為末水丸小豆大温水下三四十丸等服忌油膩生冷一切熱物

○已上數方治湿熱傷血赤痢之劑

戊己丸（和劑方）治脾經受湿泄痢不止米穀不化臍腹刺痛

黃連（去鬚）　吳茱萸（去梗）　白芍藥（各三兩）

右為末麪糊丸梧子大每三十丸米飲空心下日三服

升陽除湿防風湯（撥粹方）如大便閉或裏急後重數至圊而不能便或少有白膿或少有血慎勿利之升舉其陽則陰氣自降矣

蒼朮（四兩米泔水治）　防風（三錢）　白朮（一錢）　茯苓（一錢）

白芍藥（一錢）

右㕮咀每服一兩除蒼朮另作片子水一碗半煮至二盞納諸藥同煎至一盞去滓稍熱空心食前服

升陽益胃湯　治脾虛湿勝陽氣下陷作痢（見內傷類）

胃風湯　治風入腸胃作痢或白或赤或豆汁（見胃風類）

錢氏白朮散　治氣血俱虛神弱之人或瀉或痢或吐

人參　白茯苓　白朮　木香

甘草　藿香（各一兩）　乾姜（半兩）

右為粗末每服五錢水一鍾煎七分食前温服

一方　治白痢

酸石榴皮（半箇）　草果（一箇）　陳皮（三片）　烏梅（一箇）

甘草（一寸）　乾姜（一塊）

右㕮咀都作一服水二鍾煎至一鍾去滓食前温服

一方　山藥剉如豆大一半瓦器内炒熟一半生用為細末米飲調下

○已上數方治温熱傷氣白痢之劑

噤口痢

石蓮肉（日乾）

右為末每服二錢陳倉米調下便覺思食仍以日照東方壁土炒真橘皮為末姜棗畧煎佐之

一方　治噤口痢

用黄連半斤㕮咀生姜四兩切作片與黄連同炒待姜焦黄色去姜只取黄連為細末同陳米飯一處搗爛丸如梧桐子大每服七八十丸赤者陳米飲下白者陳皮湯下赤白相參者陳米橘皮湯下

一方　用獨子肥皂一枚去核用塩實其内火燒存性為細末先煮白米粥用少許入在粥内食之立効

一方　梨一枚去心入好蜜一匙煨過食之

○已上數方治禁口痢之劑

麴藭丸　治食積作痢

川芎　神麴　白朮　附子（各等分）

右爲細末麪糊丸梧子大每服三五十丸温米飲下此藥亦治飧泄○廣按此治冷飲食作痢熱則開散之理

木香丸　治痢疾

木香（三錢）　豆豉（一兩洗淨）　巴豆（四十九粒去殼針穿灯上燒存性另研）

右為末豆豉爲丸菉豆大每服三丸紅痢甘草湯下白痢乾姜湯下

木香不二丸　治痢疾或赤或白或赤白交雜

木香（不見火）　肉豆蔻（麪裹煨）　訶子（煨過取肉各一錢）　巴豆（一兩去殼油另研）

淡豆豉末（一錢半一半入藥一半打糊）

右爲末淡豆豉末同麪打糊爲丸如黄豆大小兒如菉豆大量大小虛實每服只許一丸切忌服二丸食前或臨卧冷湯下赤痢地榆湯下白痢乾姜湯下赤白交雜甘草湯下服此藥後多行二三次即住

○廣按此二方用巴豆即通因通用之理然於傷冷飲食暴痢用之庶乎可也殊不知痢本因水穀停積湿而生熱溢熱爲病但有傷氣傷血爲白為赤之分終無寒冷之義經曰苦寒除湿熱用大黄以推蕩乃是

正治也

聖餅子　治積滯作痢

黃丹（二錢）　定粉（三錢）　密陀僧（二錢）　舶上硫黃（二錢）

輕粉（少許）

右為細末入白麵四錢滴水和為丸指尖大捻作餅子陰乾食前漿水磨化服之大便黑色為妙

蘇感丸　治冷積作痢

以蘇合香丸與感應丸二藥和勻如粟大每五丸淡姜湯空心下

蘇合香丸（見中風）　感應丸（見傷食）

○已上數方治積滯作痢之劑

治赤白痢

吳茱萸（揀凈）　黃連（去鬚各等分）

右為一處以好酒浸透取出各自揀焙或晒乾為末糊丸如梧桐子大赤痢用黃連丸三十粒甘草湯下白痢用茱萸丸三十粒乾姜湯下赤白痢各用十五粒相合併甘草乾姜湯下

駐車丸（和劑方）　治一切下痢無問冷熱

阿膠（搗碎蛤粉炒如珠子為末以醋四合熬成膏一兩半）　黃連（去鬚二兩）

當歸（去蘆一兩半）　乾姜（炮一兩）

右為末以阿膠膏丸如梧桐子每服三十丸食前米飲下

阿膠梅連丸（宣明方）治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證

金井阿膠（淨草灰炒透明白別研細） 赤茯苓 烏梅肉（去核炒）
赤芍藥 黃柏（剉炒） 黃連（去鬚） 乾姜（炮）
當歸（焙各等分）

右為細末入阿膠研勻水丸梧子大溫米飲下十丸食前連夜五六服小兒丸如菉豆大忌油膩脂肥諸物

三味黃丸子（經驗方）治諸痢

黃連（八兩） 枳殼（四兩） 黃柏（四兩）

右為細末麵糊為丸梧子大空心飯湯下二三十丸如裏急後重加枳殼湯下

香連丸 治一切痢

黃連（五兩剉） 粉草（二兩研碎） 木香（二兩不見火）

右先將黃連用蜜水略伴濕安在銚中重湯薰之良久取出晒乾再依工法薰之得九薰九爆九炒再晒十分乾與木香二兩為末水糊丸梧子大每服五十丸食前酒下或米飲下

又方 治一切痢

黃連（一兩）　枳殼　甘草（炙）　烏梅（各半兩）

右㕮咀每半兩水煎空心服忌魚猪肉油生冷菓子

遇仙立效散　治諸惡痢或赤或白或濃淡相雜裏急後重臍腹結痛或下五色或如魚腦日夜無度或口噤不食不問大人小兒虛弱老人產婦並宜服之

罌粟殼（去蒂蓋炒黃）　當歸（洗各二兩）　甘草

赤芍藥　酸石榴皮　地榆（各一兩）

右㕮咀每服水一鍾半煎空心溫服忌生冷油膩之物

神效參香散（和劑方）治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積而成痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜裏急後重日夜頻無問新久並能治之

白扁豆（炒）　人參（去芦）　木香（各一兩）　茯苓（去皮）

肉豆蔻（煨各四兩）　陳皮（去白）　罌粟殼（去帯各十二兩）

右爲末每服三大錢用溫米飲下不拘時服

水煮大香丸（和劑方）治一切下痢赤白膿血相雜裏急後重

罌粟殼（去穰一兩八錢）　青皮（去白二兩四錢）　甘草（炙三兩）

當歸（去芦）　訶子（灼去核）　木香（不見火各六兩）

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸水一鍾煎化至六

分空心或食前服

真人養臟湯（和剤方）治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦髓裏急後重臍腹疼痛如脫肛墜下酒毒便血並治之

罌粟殼（去蒂盖蜜炙三两六錢）　人參（去芦）　當歸（去芦酒洗各六錢）
肉桂（去皮八錢）　訶子（去核一两二錢）　木香（二两四錢不見火）　肉豆蔻（面裹煨半两）
白术（焙六錢）　白芍藥（一两六錢）　甘草（一两八錢不見火）

右㕮咀每服四錢水一鍾煎服臟寒者加附子

一方治一切痢

罌粟殼（蜜製）　黄蘗（炙）　乾姜　當歸
枳殼（去白）　甘草（炙各等八分）

右用韮菜十數根水二鍾煎不拘時服

固腸湯（三因方）治冷熱不調下痢赤白

罌粟殼（去蒂盖三两醋炙）　白芍藥（各一两）　當歸
甘草各一两　陳皮　訶子　白姜（炮各半两）
人參　木香各三錢

右㕮咀每服四錢水一鍾煎七分空心温服

豆蔻固腸丸（御藥方）治脾胃虛弱臟腑頻滑下痢赤白

木香　赤石脂　乾姜　縮沙
厚朴（姜製）　肉豆蔻（麪裹煨各三两）

右為末麪糊丸梧子大每服五十丸空心米飲下

勝金丹（秘方）

乾姜　黄蠟（等分）

右銀石器化蠟入姜末匀丸如芥子大每服七九或二七九白痢酒下赤井花水下

又方

烏梅　白梅（陳久者各七箇）

右件去梅核搗梅肉爛同乳香末少許丸梧子大以茶末為衣每服二十九茶湯下食前

石榴皮散（經驗方）治暴瀉不止及痢赤白

用酸石榴皮燒存性不以多少空心米飲調下貳錢

一方　治白膿痢

用白石脂為末醋糊九如小豆大每服十九空心米飲送下日三服

秘方痢疾方

罌粟殼（去蒂蜜炒伍錢）　陳皮（去白五錢）　甘草（炙五錢）　乳香

没藥（各貳錢）

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓入乳没食前服如白痢熱服紅痢冷服如痢不止加青皮肆錢煎

白术安胃散（拔粹方）治一切瀉痢無問膿血相雜裏急窘

痛日夜無度又治男子小腸氣痛婦人臍下虛冷并產後兒枕塊痛亦治產後虛弱寒熱不止

茯苓（去皮）　白朮　車前子（各一兩）　五味子
烏梅（各半兩）　罌粟殼（蜜製二兩）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓通口服食前

朴連湯（經驗方）治下痢久不瘥

厚朴（姜製）　黃連（等分）

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓食前溫服

神效丸（一名當歸丸）治休息痢膿血不止疼痛困弱

當歸　烏梅肉　黃連（等分）

右為細末以生蒜汁和衆手丸如梧子大焙乾每服三十丸空心煎厚朴湯下加至五十丸一方加阿膠一方煉蜜丸甚者鎔蠟丸

一方　止休息痢

縮砂（為末）空心米飲下一錢

木香散（本事方）治隔年痢不止并治血痢尤佳

木香　黃連（各半兩二味同炒）　甘草（炙一兩）　罌粟殼
生姜（各半兩同炒）

右為末入麝香少許每服二錢米飲下

固腸丸（見婦人帶下類　即椿皮丸）

白术黄芩湯（抜粹方）服前藥痢疾雖除更宜調和

白术（一兩）　黄芩（七錢）　甘草（三錢）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎一鍾去滓通口服食前

白术黄耆湯（抜粹方）服前藥痢疾雖除更宜服此補養

白术（一兩）　黄耆（七錢半）　甘草（三錢）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎一鍾去滓通口服食前

機要白术芍藥湯　服藥痢疾雖除宜用此補脾胃又治老人奉養太過飲食傷脾時或瀉痢

白术　白芍藥（各一兩其芍藥補脾炒用治後重生用腹痛炒用酒浸炒尤妙）

甘草（炙半兩）

右剉每一兩水煎服

〇已上數方治赤白諸痢虛痢久痢之劑

牛黄神金丸（宜明方）治大人小兒嘔吐瀉痢無問久新赤白諸色或渴否或小便澁否并小兒驚疳積熱痃癖堅積腹滿硬痛作發往來亦能寛膈消食

輕粉　粉霜　硇砂（以上另研）　雄黄（研）

朱砂　信砒　巴豆（去皮各一錢）　黄丹

蠟（三錢）

右先研粉霜次旋入硇砂研細下雄黄朱砂信砒再研下丹粉研勻別研巴豆爛為油與前藥研勻近火上炙

控熱別研蠟軟入藥勻搜作劑旋丸小豆大新水下一丸小兒黍米麻子大或止吐瀉痢疾調桂苓甘露散或益元散亦得　（俱見中暑類）

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯　（俱見傷寒）

三一承氣湯　（見温熱）

玄青丸（宣明方）治下痢勢惡頻併窘痛或久愈諸藥不能止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宣行者宜以此逐之兼宣利積熱酒食積黄瘦中滿水腫腹脹

療小兒驚癖積熱乳癖諸症泄瀉勿服

黄連　黄蘗　大黄　甘遂

芫花（醋拌炒）　大戟（各五錢）　牽牛（四兩取末二兩）　青黛（一兩）

輕粉（一錢）

右爲末水丸小豆大初服十丸每服加十丸空心日午臨臥各一服以利爲度後常服十五二十丸數日後得食以病未全除者再加取利利後却常服以意消息病除爲度隨証止之小兒丸如黍米大

○已上數方通因通用之劑

○廣按痢疾所因有二或因暑月煩渴縱食瓜果生冷

内傷腸胃成因夜臥失被早起入水寒濕外襲肚腹二者皆令水穀不化鬱而生熱則爲濕熱濕熱傷氣則成白痢濕熱傷血則成赤痢氣血俱傷則成赤白痢其証臍腹疠痛或下鮮血或下瘀血或下紫黑血或下白膿或下赤白相雜或如豆汁或如魚腦或如屋溜水裏急後重頻欲登厠日夜無度不可遽用罌粟殼龍骨肉豆蔻訶子赤石脂輩收澁病邪則淹纏而不已也其法痢疾初得一二日間元氣未虛以推逐爲先失之於初五日以後脾胃已虛以消導升散爲佳所用之藥不過辛苦寒涼之劑以開除濕熱鬱積行氣和血使氣血宣行而已病久挾虛又當以滋補氣血收澁滑脫丼溫辛熱之藥兼之則萬舉萬全而無一失也矣　又嘗論之濕熱傷氣成白痢者宜調氣理濕爲主而兼清熱濕熱傷血成赤痢者宜涼血清熱爲主而兼理濕至於氣血俱傷成赤白痢者則相兼而治觀丹溪節齋之用藥可見矣

痢疾治例

出明醫雜著

王節齋曰痢是濕熱食積二者別赤白青黃黑五色以屬五臟白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相雜氣血俱傷黃者食積治法瀉腸胃之濕熱開鬱結之氣

消化積滯通因通用其初只是下之下後未愈隨証調之痢稍久者不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下

主方

黃芩（炒二錢半） 黃連（炒一錢半） 白芍藥（炒二錢） ○（已上三味痢疾必用之藥）

木香 枳殼（炒各一錢半） 檳榔 炙甘草（三分）

若腹痛加當歸（一錢半） 縮砂（一錢） 再加木香芍藥（各五分）

若後重加滑石（炒一錢半） 再加枳殼檳榔（各五分） 芍藥生用再加（五分） 黃芩條實者亦加（五分）

若白痢加白朮白茯苓炒滑石陳皮（各一錢） 初欲下之再

加大黃（五錢） 無食積加山查子枳實（各一錢）

若紅痢加當歸川芎桃仁（各一錢半） 初欲下之再加大黃（五錢）

若紅白相雜加當歸川芎桃仁（各一錢半） 以理血滑石陳皮蒼朮（各一錢半） 以理氣有食積亦加山查枳實

若白痢久胃弱氣虛或下後未愈減芩連芍藥（各七分） 加白朮（一錢半） 黃耆茯苓陳皮（各一錢） 縮砂（五分） 去檳榔枳殼再加炙乾姜

若紅痢人胃弱血虛或下後未愈減芩連（各五分） 加當歸川芎熟地黃阿膠珠陳皮（各一錢） 白朮（一錢半）

若色赤黑相雜此濕勝也小便赤澁短少加木通澤瀉

茯苓（各一錢）山梔子（炒五分）以分利之

若血痢加當歸川芎生地黄桃仁（炒）槐花（各一錢）久不愈減芩連（各七分）去檳榔枳殼再加阿膠珠砂側栢葉（各一錢半）炒黑乾姜（一錢）白术（一錢半）陳皮（一錢）

若痢已久而後重不去此大腸墜下去檳榔枳殼用條實黄芩加升麻（一錢）以升提之

若嘔吐食不得下加軟石膏（一錢半）陳皮（一錢）山梔仁（炒五分）入生姜汁緩呷之以瀉胃口之熱

有一樣氣血虛而痢者用四物湯加人參白术陳皮黄連黄芩阿膠之類以補之而痢自止

一有一樣寒痢用黄連木香酒炒芍藥當歸炒乾姜縮砂厚朴肉桂之類

一若得痢而誤服溫熱止澁之藥則雖稍久亦宜用前法以下之下後方調之

若得痢便用前正法以下之而未愈又用前調理法治而久不愈此屬虛寒而滑脫可於前虛補寒溫二條擇用更加龍骨赤石脂罌粟殼烏梅肉等收澁之藥

丹溪心法附餘卷之六終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之七

濕門

痞（二十）

丹溪心法

○痞者有食積兼濕　東垣有法有方　心下痞須用枳實炒黃連　如禀受充實面蒼骨露氣實之人而心下痞

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

者宜枳實黃連青皮陳皮枳殼　如稟受素弱轉運不調飲食不化而心下痞者宜白朮山查麯糵陳皮　如肥人心下痞者乃是實痰宜蒼朮半夏砂仁茯苓滑石　如瘦人心下痞者乃是鬱熱在中焦宜枳實黃連葛根升麻　如食後感寒飲食不化心下痞宜藿香草豆蔻吳茱萸砂仁

痞挾血成窠囊用桃仁紅花香附大黃之類

入方

吳茱萸（三兩湯浸煮少時）　黃連（八兩）

粥糊為丸每服五七十丸白朮陳皮湯下

玉液丸

軟石膏（不拘多少又云火煅紅出火毒）

右為末醋糊丸如菉豆大服之專能瀉胃火併治食積

痰火

附脉理

脉訣舉要曰胸痞脉滑為有痰結弦伏亦痞濇則氣劣

附諸方

枳朮丸（脾胃論）治痞消食強胃

枳實（去穰麩炒黃色一兩）　白朮（去梗二兩）

右同為極細末荷葉裹燒飯為丸如梧桐子大每五十丸多用白湯下無時白朮者本意不取其食速化但令

人胃氣強不復傷也

橘皮枳朮丸（脾胃論）治老幼元氣虛弱飲食不消臟腑不調心下痞悶

枳實（麩炒去穰）　橘皮（已上各一兩）　白朮（二兩）

右件為細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十丸溫水送下食遠夫內傷用藥之大法所貴服之強人胃氣令胃氣益厚雖猛食多食重食而不傷此能用食藥者也此藥久久益胃氣令不復致傷也

○廣按上古用一藥治一病至漢張仲景先生用群藥治一病雖然用群藥治一病亦不過三五味而已其間君臣佐使分兩不同主治引經秩然有序非若後世之效驗者一方用至二三十味尤未已也丹溪云予每效仲景立方效東垣用藥庶乎品味少而藥力專精也此枳朮丸乃易老張先生之所作觀其用白朮二兩以補脾用枳實一兩以消痞至東垣李先生加陳皮一兩以和胃一補一消簡而又當真得立方之指趣也

橘連枳朮丸（古庵方）補脾和胃瀉火消痰

白朮（三兩去梗）　枳實（一兩去穰麩炒）　陳皮（一兩）　黃連（一兩酒浸炒）

右為末荷葉煮湯打米糊為丸如梧桐子大每服五十

丸食後服

○廣按易老張先生定枳术丸方用白术二兩以補脾枳實一兩以消痞取其補多而消少至東垣先生加橘皮一兩以和胃名橘皮枳术丸則補消相半也予今用白术二兩枳實一兩陳皮一兩黄連一兩名橘連枳术丸仍補多消少又兼清熱也丹溪云心下痞須用枳實炒黄連是矣

平補枳术丸（古庵方）　調中補氣血消痞清熱

白术（三兩）　白芍藥（一兩半酒浸炒）　陳皮　枳實（去穰麸炒）

黄連（酒浸炒各一兩）　人參　木香（各半兩）

右爲細末荷葉煑濃湯打米糊為丸如梧桐子大每五十丸漸加至六七十丸食遠米湯下

○廣按此方用白术三兩以補脾氣為君用白芍藥一兩伍錢以補脾血為臣用陳皮一兩以和胃枳實一兩以消痞炒黄連一兩以清熱為佐用人參半兩以補元氣木香半兩以調諸氣為使如此平補氣血均去痰火兼通氣道則病邪日消而脾胃日壯矣

枳實消痞丸　治右關脉浮弦心下虛痞惡食懶倦開胃進食

枳實　黄連（各五錢）　乾生姜（二錢）　半夏麴（三錢）

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

厚朴（四錢） 人參（三錢） 甘草（炙二錢） 白朮（三錢）

茯苓 麥芽（各二錢）

右為末水浸蒸餅丸如梧桐子大三十五丸溫水下

消痞丸（拔粹方） 治一切心下痞悶及積年久不愈

黃連（炒六錢） 神麯（炒五錢） 黃芩（刮黃色六錢） 姜黃

白朮（各一兩） 人參（四錢） 甘草（炙二錢） 縮砂仁（二錢）

橘皮（四錢） 乾生姜（二錢） 枳實（麩炒黃色五錢） 豬苓（二錢半）

一方加澤瀉厚朴（各三錢） 半夏（湯炮七次五錢）

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧子大每服五七十丸至百丸白湯下

黃連消痞丸（拔粹方） 同前

黃連（炒一兩半） 黃芩（炒三兩） 枳實（一兩一錢） 乾生姜（三錢）

茯苓（五錢） 白朮（焙五錢） 甘草（炙五錢） 片姜黃（一錢半）

陳皮（七錢半） 澤瀉（一錢） 半夏（洗一兩三錢半） 豬苓（五錢）

砂仁（三錢半） 厚朴（製五錢）

右爲末蒸餅丸如梧桐子大每服一百丸溫白湯送下

瓜蔞實丸（濟生方） 治胸痞痛徹背脇喘急妨悶

瓜蔞實（別研） 枳殼（去穰麩炒） 半夏（湯洗七次） 桔梗（各一兩炒）

右爲末姜汁打糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食後淡姜湯下

○廣按此方瓜蔞仁潤肺降痰枳殼破滯氣半夏豁痰燥濕桔梗開膈載藥可謂善治痞悶喘急矣然痰因火動加黃連尤妙丹溪云胸中痞須用枳實炒黃連是也

泄瀉二十一

丹溪心法

○泄瀉有濕　火　氣虛　痰積　食積　濕用四苓散加蒼术甚者蒼白二术同加炒用燥濕兼滲泄　火用四苓散加木通黃芩伐火利小水　痰積宜豁之用海粉青黛黃芩神麯糊丸服之　在上者用吐提　在下陷者宜升提之用升麻防風　氣虛用人參白术炒芍藥升麻　食積二陳湯加澤瀉蒼术白术山查神麯川芎或吞保和丸　瀉水多者仍用五苓散　久病大腸氣泄用熟地黃半兩炒白芍知母各三錢升麻乾姜各二錢炙甘草一錢爲末粥丸服之仍用艾炷如麥粒於百會穴灸三壯　脾瀉當補脾氣健運復常用炒白术四兩炒神麯三兩炒芍藥三兩半冬月及春初用肉荳蔻代之或散或湯作餅子尤佳　食積作瀉宜再下之神麯大黃作丸子服　脾泄已

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

久大腸不禁此脾已脫宜急濇之以赤石脂肉豆蔻（乾薑）之類

戴云凡瀉水腹不痛者是濕飲食入胃不住或完谷不化者是氣虛腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣是火或瀉時或不瀉時或多或少是痰積腹痛甚而瀉瀉後痛減者是食積

又方

一老人奉養太過飲食傷脾常常泄瀉亦是脾泄

黃芩（炒半兩） 白朮（炒二兩） 白芍（酒拌炒） 半夏（泡各半兩）

神麯（炒） 山查（炒各一兩半）

右爲末青荷葉包飯燒熟研丸如梧子大食前白湯下

治痛泄

炒白朮（三兩） 炒芍藥（二兩） 炒陳皮（一兩半） 防風（一兩）

久瀉加升麻（六錢）

右剉分八貼水煎或丸服

止瀉方薑麯丸

隔年陳麥麵作麯（二兩炒一云六兩） 茴香（五錢）

生薑（二兩又云一兩）

右為末或丸每服五七錢白湯下

又方

肉豆蔻（五兩） 滑石（夏二兩半秋二兩春冬一兩二錢半）

右為末飯丸或水調服

青六丸　去三焦濕熱泄瀉多與清化丸他丸同行幷不单用兼治産後腹痛幷自利者以補脾補血藥送之亦治血痢甚効

六一散（一料）　紅麯（炒半两）

右為末陳倉米飯丸梧子大每五七十丸白湯下　又加五靈脂一两名靈脂丸能行血

又方　治泄瀉或吐嘔

右以六一散生姜汁湯調服

五苓散　　六一散（俱見温熱）

附脉理

脉訣舉要曰夏月泄瀉脉應暑濕央而數溲脉必虛極治暑濕瀉分利小便虛脱固腸罔或不痊

附諸方

六和湯　治脾胃不調氣不升降嘔吐或致泄瀉寒熱交作小便赤澁

加味五苓散　治伏暑發熱及冒暑泄瀉或煩渴小便不利（並見中暑）

胃苓湯　治感暑夾食泄瀉煩渴即平胃散五苓散相合

蒼术　陳皮　厚朴（姜製）　甘草

白术　茯苓　猪苓　澤瀉

桂

右㕮水煎入盐少許　如作末藥湯服亦可

來復丹　治伏暑泄瀉（見中暑）

軟紅丸（聖惠方）治大人小兒冷熱不調吐逆不定霍乱煩燥吐瀉不止其効如神

明信　朱砂（各研半兩）　乾胭脂（二錢）　巴豆（七箇去油）

右研勻溶蠟二錢入油七點旋丸大人菉豆大小兒麻子大每服一丸濃煎槐花甘草湯冷下食前一服定

○已上數方治傷暑泄瀉之劑

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

藿香正氣散　治感濕泄瀉（見胃寒）

戊己丸　治脾胃不足濕熱泄瀉不止米穀不化（宜升陽除濕湯送下）

白术芍藥湯　治大陰脾經受濕水泄注下體重腹滿困弱無力不欲飲食暴泄無數水穀不化（俱見痢類）

升陽除濕湯（拔粹方）治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便黃色四肢困弱

升麻　柴胡　防風　神麯

澤瀉　猪苓（各半兩）　蒼术（一兩）　陳皮

甘草（炙）　大麥芽麪（各三錢）

右作十服水煎飯後熱服脾胃寒腸鳴加益智仁半夏

各半兩姜棗煎非腸鳴不用

○已上數方治感濕脾濕泄瀉之劑

升麻湯（扳粹方）治一日大便三四次溏而不多者有時瀉腹中鳴小便黃

黃芪（三錢）　甘草（二錢）　升麻（六分）　柴胡（三分）

橘皮（三分）　益智　當歸身（各三分）　紅花（少許）

右㕮咀分作二服每服水二盞煎至一盞去滓食前（溫服）

錢氏白朮散　治脾胃氣虛或吐或瀉（見痢類）

參苓白朮散　治脾胃氣虛飲食不進或致吐瀉

和平散　和脾胃止泄瀉（並見調補脾胃）

益胃湯（扳粹方）治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰燥熱短氣口不知味腸鳴大便微溏黃色身體昏悶口乾不喜飲冷

黃芪　甘草　半夏（各二分）　黃芩

柴胡　人參　白朮　益智（各三分）

當歸稍　升麻（各半錢）　陳皮（半分）　蒼朮（一錢半）

右作一服水盞半煎八分食前通口服

○已上數方治脾胃氣虛泄瀉之劑

理中湯　治臟腑停寒泄瀉不止（見中寒）

八味湯　治內寒泄瀉惡食

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

吴茱萸（去梗湯炮七次） 乾姜（炮各二两） 陳皮 木香

肉桂 丁香 人參 當歸（洗焙各一两）

右剉每肆錢水一盞煎七分温服

大藿香散（百一選方） 治一切脾胃虛寒嘔吐霍乱心腹撮痛如泄瀉不已最能取効

藿香葉（洗去土二两） 陳皮（去白） 厚朴（姜汁炒）

青皮（去白麸炒） 木香 人參（去芦） 肉豆蔻（麪煨）

良姜（炒） 大麥蘖（炒） 神麯（炒） 訶子（煨去核）

白茯苓（去皮） 甘草（炒各一两） 白乾姜（炮半两）

為末每服四錢吐逆泄瀉不下食或嘔酸苦水用水一大盞煨生姜半塊塩一捻煎服 水泄滑泄腸氣臟毒陳米飲入塩熱調下 赤白痢甘草黒豆湯下 脾胃虛冷宿滯酒食痰氣作革入塩少許嚼姜棗湯熱服 胃氣欬逆生姜自然汁一呷入塩點服此藥大能消食順氣利膈開胃

養胃湯 治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄瀉

見脾胃

調中散 治虛寒停食嘔吐腸鳴泄瀉

藿香葉 砂仁 蓬朮（炮） 乾姜（炮）

肉桂（去粗皮） 茴香（炒） 草菓 麥芽（炒）

益智仁　橘紅（各一分）　蒼朮（炒）　神麴（炒）

桔梗（各一錢半）　甘草（炙三分）

右用水二盞生姜三片棗一箇煎至一盞去滓入塩少許溫服

海藏神應丸　治因一切冷物冷水及童乳酪水所傷腹痛腸鳴泄瀉米穀不化（見宿食門）

〇已上數方治脾胃虛寒食積泄瀉之劑

香連丸　治熱瀉糞色赤黃肛門焦痛糞出穀道猶如湯澆煩渴小便不利宜五苓散吞此丸（見痢類）

酒蒸黃連丸　治傷於酒每晨起必瀉宜生姜理中湯加乾葛吞此丸

黃連（半斤淨酒二升浸以瓦器置甑上蒸至爛取出晒乾）

右為末滴水丸梧子大每五十丸食前白湯下

神聖香姜散（仁存方一名姜黃散）　治晨泄

宣黃連（四兩斷水浸片時）　生姜（四兩切骰子大）

右同一處淹一宿銀石器內同炒姜赤黃色為度去姜不用將黃連為末每服二錢茶清調下

〇已上數方治脾胃實熱酒積泄瀉之劑

五味子散　有每日五更初洞瀉服止瀉藥並無效此名脾腎泄宜服此藥或四苓散送下二神丸或椒附丸

五味子（二兩）　吳茱萸（半兩細粒綠色者）

右二味炒香熟爲細末每服二錢陳米飲下

○廣按腎司閉藏今縱欲致虛而腎失職故有此病也

四苓散（五苓散去桂是　方見溫熱）

二神丸

破故紙（炒四兩）　肉豆蔻（二兩生）

右爲末以大肥棗四十九箇生姜四兩切同煮棗爛去姜取棗肉研膏入藥和丸梧子大每五十丸盐湯下

椒附丸　泄瀉久重其人虛甚

椒紅（炒）　桑螵蛸（炙）　龍骨　山茱萸肉

附子（炒）　鹿茸（酒蒸焙）

右爲末酒糊丸每六十丸空心米飲下

當歸厚朴湯　治肝經受寒面色青慘厥而泄利

當歸（炒）　厚朴（製各二兩）　官桂（三兩）　良姜（五兩）

右剉每三錢水煎食前服

○廣按經曰腎司閉藏肝司疎泄肝腎氣虛為病泄瀉何也盖腎者所處在下大小二便之門戶而肝者又為門戶約束之具肝腎氣實則能閉能束故不泄瀉肝腎氣虛則閉束失職故泄瀉也又肝者脾之賊肝經正虛邪盛未能剋土亦作泄瀉此當歸厚朴湯所

以實肝而止瀉也

香茸丸　治日久冷瀉

鹿茸（五錢酒浸炙）　乳香（三錢）　肉豆蔻（一兩每箇作兩片入乳香在內麪煨）

右為細末陳米飯丸每服五十丸空心米飲下

一方　治泄瀉不止

用肉豆蔻一箇剜竅入乳香少許麪褁煨熟去麪研為末作一服空心陳米飲調下或单用豆蔻紙褁煨去油為末和麪作榾柮服亦妙

金鎖正元丹　治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精一切虛冷之證並治之（見夢遺類）

〇已上數方治脾腎肝虛泄瀉之劑

實腸散（直指方）　治泄瀉不止

肉豆蔻　訶子（煨）　宿砂　陳皮

蒼朮（炒）　茯苓（各一兩）　木香（半兩）　甘草（四錢）

川厚朴（製一兩半）

右㕮咀每服三錢姜棗煎服手足冷者加乾姜

止瀉方

人參（去芦）　白朮　乾姜（炮）　甘草（炙）

茯苓（去皮）　木香　藿香（去土）　訶子（煨）

肉豆蔻（麪褁煨）（各等分）

右㕮咀每服一两水二盞煎至一盞去滓通口服

補脾丸（百一選方）治滑泄不禁

白术　赤石脂　肉豆蔻（麵裹煨各一两）

蓽撥（炒）　川厚朴（姜製）　川白姜（炮各一两）　神麯（炒）

麥蘖（炒）　附子（炮去皮臍各半两）

右爲末醋糊丸如梧桐子每服五十丸空心米飲下

四柱散（和劑方）治元臟氣虛真陽耗散腹臍冷痛泄瀉不止

白茯苓（去皮）　附子（炮去皮臍）　人參　木香（濕紙裹火煨）

一方加肉豆蔻訶子名六柱散

右等分㕮咀每服四錢水一盞姜五片塩少許煎七分

空心温服

麯蘖丸　治臟腑受風濕泄瀉不止（見痢類）

肉豆蔻丸（和劑方）治脾胃虛弱腹脇脹滿水穀不消臟腑

滑泄

蒼术（米泔水浸切八两）　乾姜（炮）　肉豆蔻（麵裹煨）

厚朴（去皮姜製）　甘草（炙）　陳皮（去白各四两）　茴香（炒）

肉桂（去皮）　川烏（炮去皮臍）　訶子皮（各二两）

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎八分温服

厚腸丸（百一選方）治泄瀉不止

白龍骨　乾姜（炮）　附子（炮去皮臍）　厚朴（姜製）

訶子（炮去核）　肉豆蔻（麪煨）　陳皮（各等分）

右爲末酒糊丸如梧子大每服五十丸米飲下

豆附丸（和剤方）　治腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄瀉注下

肉豆蔻（麪煨四兩）　木香（不見火二兩）　白茯苓（去皮四兩）

乾姜（炮）　肉桂（各二兩）　附子（炮去皮臍四兩）　丁香（不見火一兩）

右爲末姜汁麪糊丸如梧子大每服五十丸米飲下

訶棃勒丸（济生方）　治大腸虛冷泄瀉不止脇腹引痛飲食不化

訶棃勒（麪裹煨）　附子（炮）　肉豆蔻（麪煨）　吳茱萸（去梗炒）

龍骨（生用）　華撥　白茯苓（去皮）　木香（不見火各半兩）

右為末姜汁煑糊丸如梧桐子每服十丸空心米飲下

禹餘糧丸（济生方）　治腸胃虛寒滑泄不禁

禹餘糧石（煆）　赤石脂（煆）　龍腦　華撥

訶子（麪裹煨）　乾姜（炮）　肉豆蔻（麪煨）　附子（炮去皮臍各等分）

右為細末醋糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲下

○愚按已上諸方皆是止澁之劑盖因久泄腸胃虛脫不得已而用之若夫新泄瀉不可便用止泄邪得補而愈盛惟當以分利小便導去濕氣為上又論治泄瀉用藥不可太苦太甘盖太苦則傷脾太甘則生濕

性當以淡劑利竅為最

〇已上數方治腸胃虛脫滑泄不禁之劑

〇廣按泄瀉之証雖分濕火寒虛痰食六者之殊必以滲濕燥脾為主而隨証加藥焉濕則導之火則清之寒則温之虛則補之痰則豁之食則消之是其治也雖然六証既明而三虛不可不察三虛者何脾虛腎虛肝虛也脾虛者飲食所傷也腎虛色慾所傷也肝虛者忿怒所傷也飲食傷脾不能運化色慾傷腎不能閉藏忿怒傷肝木邪尅土皆令泄瀉然腎泄肝泄間忽有之而脾泄恒多爾蓋人終日飲食一或有傷脾胃便致泄瀉也必矣又嘗論之泄瀉痢瘧同乎一源多由暑月脾胃氣虛飲食傷積所致飲食纔傷便作則爲泄瀉爲輕飲食（停積）既久則爲瘧痢爲重而瘧與痢又有分別飲食爲痰充乎胸脇則爲瘧痰飲食爲積膠乎腸胃則爲痢疾古人有言曰無痰不是瘧無積不是痢良有以也今之醫者不能究病之源而徒執古人之方以徧試之欲其病愈也胡可得哉

泄瀉治例（出明醫雜著）

王節齋曰泄本屬濕然多因飲食不節致傷脾胃而作須看時令分寒熱新久而施治治法補脾消食燥濕利

小便亦有升提下陷之氣用風藥以勝濕亦有久泄腸胃虛滑不禁者宜收澁之

主方

白朮二錢　白茯苓　白芍藥（炒各一錢半）（已上三味泄瀉必用之藥）陳皮一錢　炙甘草（去皮五分）

若傷食泄黃或食積加神曲大麥芽山查子（各一錢）炒黃連（七分）消之腹中窄狹飽悶再加厚朴枳實木香（各五分）

若小便赤澁短少加澤瀉豬苓木通（各一錢）以分利之夏月再茵陳（七分）炒山梔子（四分）

若口渴引飲加乾葛（一錢半）人參麥門冬（各一錢）升麻滑石（各四分）烏梅肉（二箇）

若夏秋之間濕熱大行暴注水泄加炒黃連蒼朮澤瀉（各一錢）升麻木通（各五分）發熱燥渴加乾葛石膏（各一錢）黃疸小便黃赤加茵陳（一錢）山梔木通（各五分）

若飲酒便泄此酒積熱瀉也加炒黃連茵陳乾葛（各一錢）木香（五分）神麯麥芽（各八分）

若寒月溏瀉清冷腹痛或傷生冷飲食加神麯麥芽炙乾姜（各一錢）宿砂益智木香（各七分）

若久泄胃氣下陷服利小便之藥而不效宜加人參黃耆（各一錢）以補中氣升麻柴胡（各四分）以升提之再加羗

活防風藁本白芷等風藥（各三四分）助風以平之更加炙乾姜（五分）以固之

若久泄脾胃虛弱食少難化加炙黃耆人參（各一錢）神麯麥芽（各一錢二分）木香（煨過）乾姜（炙各五分）

若久瀉腸胃虛滑不禁加肉豆蔻（一錢）訶子皮赤石脂（各一錢）煨木香炙乾姜（各五分）

丹溪心法附餘卷之七終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之八

休寧東山古菴方（廣約之）類集

濕熱門

廣按濕熱痰熱風熱所因不同爲病亦異濕熱者因濕而生熱也痰熱者因痰而生熱也風熱者因火而生風風則無乎熱也火性炎上九頭目腫痛眩暈眼昏目赤耳聾鼻塞口燥舌乾牙宣牙齒腫之類皆風熱之所爲也水性潤下九

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

泄瀉下痢水腫鼓脹遺精白濁疝痛腰痛脚氣之類皆濕熱之所爲也痰生於脾土居中央九咽痛喉閉膈噎胸痞痓癇顛狂驚悸怔忡健忘恍惚之類皆痰熱之所爲也經曰治病必求其本此風熱痰熱濕熱遍病之根本也

吞酸 二十二 附愛氣

丹溪心法

○吞酸者濕熱鬱積於肝而出伏於肺胃之間必用糲食蔬菜自養 宜用炒吳茱萸順其性而折之此反佐之法必以炒黄連爲君 二陳湯加茱萸黄連各炒隨時令迭其位使蒼朮茯苓爲輔佐冬月倍茱萸夏月倍黄連湯浸炊餅丸如小丸吞之仍教以糲食蔬菜自養并戒忿怒即安

戴云濕熱在胃口上飲食入胃被濕熱鬱遏其食不得傳化故作酸也如穀肉在器則易爲酸也

入方

茱萸（一兩去枝梗煮少時浸半日晒乾） 陳皮（一兩） 蒼朮（米泔浸一兩）

黄連（一兩陳壁土炒去土秤） 黄芩（一兩如上土炒）

或加桔梗一兩茯苓一兩

右為末神麯糊丸菉豆大每服二三十丸時時津液下食後服

黃連清化丸

黃連一兩　吳茱萸（浸炒一錢）　桃仁（二十四個研）　陳皮（半兩）

半夏一兩半

右為末神麯糊丸菉豆大每服百丸姜湯下

參萸丸　治濕而帶氣者濕熱甚者用之為向導上可治吞酸下可治自利

六一散一料　吳茱萸一兩製一

右爲末飯丸　六一散（見溫熱）

回令丸　瀉肝火行濕爲之反佐開痞結治肝邪可助補脾藥

黃連六兩　吳茱萸一兩

右爲末粥丸　一方名左金丸治肝火茱萸或半兩水丸白湯下

附諸賢論

或問丹溪曰吐酸素問明以爲熱東垣又言爲寒何也荅曰吐酸與吞酸不同吐酸是吐出酸水如醋平時津液隨上升之氣鬱積而成鬱積之久濕中生熱故從火化

遂作酸味非熱而何其有積之於久不能自涌而出伏於肺胃之間咯不得上嚥不得下肌表得風寒則內熱愈鬱而酸味刺心肌表溫暖腠理開發或得香熱湯丸津液得行亦得暫解非寒而何素問言熱者言其本也

東垣言寒者言其末也

附諸方

麯朮丸　治中脘宿食留飲酸蜇心痛或口吐清水

神麯（炒三兩）　蒼朮（泔浸炒一兩半）　陳皮（一兩）

右爲末生姜汁煑神麯爲丸每七十丸姜湯下

加味平胃散　治吞酸或宿食不化

蒼朮　陳皮　厚朴　甘草

神麯（炒）　麥芽（炒）

右㕮咀每服伍錢生姜三片水煎服

透膈湯　治脾胃不和中脘氣滯胸膈滿悶噎塞不通噫氣吞酸脇肋刺脹嘔逆痰涎飲食不下

木香　白豆蔻　縮砂仁　檳榔

枳殼　厚朴　半夏　青皮

陳皮　甘草　大黃　朴硝

右各等分每服一兩水二盞生姜三片棗子一枚煎至一盞去滓通口服食後

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法

○噯氣　胃中有火有痰

入方

南星　半夏　軟石膏　香附

一本有炒梔子

右作丸或作湯服之盖胃中有鬱火膈上有稠痰故也

○軟石膏丸亦可服　本方痰條下云噫氣吞酸此係食鬱有熱火氣衝上黃芩爲君南星半夏陳皮爲佐熱多加青黛

疸　二十三

丹溪心法

○疸不用分其五同是濕熱如盦麯相似　輕者小溫中丸　重者大溫中丸熱多加芩連　濕多者茵陳五苓散加食積藥　濕熱因倒胃氣服下藥大便下利者參芪加山梔茵陳甘草

戴云五疸者周身皮膚幷眼如梔子水染因食積黃者量人虛實下其食積其餘但利小便爲先小便利白其

黄則自退矣

入方

小温中丸　治疸又能去食積

蒼朮　川芎　香附　神麯

針砂（醋炒紅）

春加芎夏加苦參或黄連冬加吴茱萸或乾姜

大温中丸　治食積與黄腫又可借爲制肝燥脾之用脾虚者以參朮芍藥陳皮甘草作湯使

陳皮　蒼朮　厚朴　三稜

蓬朮　青皮（各五兩）　香附（一斤）　甘草（二兩）

針砂（二兩醋炒紅）

右爲末醋糊丸空心姜鹽湯下午後飯食可酒下忌犬肉菓菜

附脉理

脉訣舉要曰五疸實熱脉必洪數其或微濇證屬虚弱

附諸方

茵陳五苓散

右用五苓散五分茵陳蒿末十分和匀先食飯後服方寸匕日三服五苓散（見温熱）

當歸白朮湯（三因方）治酒疸發黄結聚飲癖心胷堅滿不

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

進飲食小便黃赤其脉弦濇

茯苓（三兩） 當歸（一兩） 白术（三兩） 黃芩（一兩）

半夏（二兩半湯泡七次） 茵陳（一兩） 甘草（炙） 枳實（去白麩炒）

杏仁（去皮尖麩炒） 前胡（各二兩）

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分食後溫服

加減五苓散（濟生方）治飲酒伏暑欝發爲疸煩渴引飲小便不利

茵陳 赤茯苓（去皮） 猪苓（去皮） 白术

澤瀉（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

黃耆散（濟生方）治黃汗

黃耆（去芦蜜炙） 赤芍藥 茵陳（各二兩） 石膏（四兩）

麥門冬（去心） 豆豉（各一兩） 甘草（炙半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎至八分溫服不拘時

茵陳散（濟生方）治黃疸

瓜蔞（一箇） 石膏（一兩） 甘草（炙半兩） 茵陳

木通 梔子仁（各一兩） 大黃（炒半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片葱白一莖煎服

葛根湯（濟生方）治酒疸

枳實（去白麩炒） 梔子仁 豆豉（各一兩） 甘草（炙半兩）

葛根（二两）

右㕮咀每服四钱水一盞煎七分温服不拘時

秦艽飲子（濟生方）治五疸涉虛口淡咽乾發熱微寒

秦艽（去芦）　當歸（去芦酒浸）　芍藥　白术

官桂（去皮不見火）　陳皮　茯苓（去皮）　熟地黄（酒蒸）

半夏（湯泡七次）　小草（係遠志苗）　川芎（各一两）　甘草（炙半两）

右㕮咀每服四钱水一盞姜五片煎七分温服

茵陳湯（濟生方）治時行瘀熱在裏鬱蒸不散通身發黄

茵陳（二两）　大黄（一两）　梔子仁（三錢）

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分温服不拘時

搐鼻瓜蒂散（拔粹方）治黄疸遍身如金色累効

瓜蒂（二錢）　母丁香（一錢）　黍米（四十九粒）　赤小豆（半錢）

右先将瓜蒂爲末次入三味再碾至夜令病人先含水一口次将藥半字搐入鼻内待下或吐去水便輕至半夜或次日取下黄水直候利水止即服黄連散或茵陳五苓散病輕者五日病重者半月見効

黄連散（拔粹方）治黄疸大小便秘澁臟腑壅熱

黄連（二两）　川大黄（二两好醋拌炒）　黄芩（去黒心）

炙甘草（各一两）

右爲細末每服二錢食後温水調下日三服

必效散（直指方）黄疸通用

葶藶（隔紙炒） 龍膽草 山梔子 茵陳

黄芩

右等分每服一兩水二盞煎至一盞溫服不拘時

一清飲（危氏方）治疸証發熱諸熱通用

柴胡（三兩） 赤茯苓（二兩） 桑白皮（炒） 川芎（各兩）

甘草（炙半兩）

每服一兩姜三片棗一枚水二盞煎至一盞食前服

山茵陳散（直指方）

梔子 茵陳（各一兩） 枳實（七箇） 茯苓

葶藶 甘草（各一錢半）

每服一兩水二盞姜三片煎至一盞食前通口服

茯苓滲濕湯 治黄疸寒熱嘔吐渴飲冷水身體面目俱黄小便不利

白茯苓（五分） 茵陳（六分） 猪苓 澤瀉（各三分）

黄連 黄芩 梔子 漢防巳

白朮 蒼朮 陳皮 青皮

枳實（麩炒各三分）

右每服水二鍾煎至一鍾去柤食前溫服

一方 治黄腫及積滯浮腫

皂礬（半斤醋煮乾）　膠棗（二斤煮去皮）　平胃散（四兩）

右用棗搗爛入礬丸如梧桐子大以平胃散爲衣每服三五十丸臨臥温酒送下

一方　治遍身黃不浮腫手足怠倦

針砂（水淘净醋煮）　陳皮（去白炒）　蒼术（米泔浸去粗皮焙乾）

青皮（去白炒各四兩）　百草霜（炒）　三稜（煨）　莪术（煨各二兩）

右爲末麵糊丸如梧桐子大每服三四十丸米湯温酒下

一方

用絲瓜全者燒灰爲末如病因麵傷麪湯下因酒傷酒調下數服

水腫

二十四　丁集

丹溪心法

○水腫因脾虚不能制水水漬妄行當以參术補脾使脾氣得實則自健運自能升降運動其樞機則水自行非五苓神佑之行水也宜補中行濕利小便切不可下用二陳湯加白术人參蒼术爲主佐以黃芩麥門冬炒梔子制肝木若腹脹少佐以厚朴　氣不運加木香木通　氣若陷下加升麻柴胡提之隨病加減必須補中行濕二陳治濕

加升提之藥能使大便潤而小便長　產後必須大補血氣為主少佐蒼朮茯苓使水自降用大劑白朮補脾若壅滿用半夏陳皮香附監之　有熱當清肺金麥門冬黃芩之屬　一方用山梔子去皮取仁炒搥碎米湯送下一抄若胃熱病在上者帶皮用　治熱水腫山梔子五錢木香一錢半白朮二錢半㕮咀取急流順水煎服　水腫用大戟香薷濃煎汁成膏丸去暑利小水　大戟為末棗肉丸十丸泄小水劫快實者

戴云水腫者通身皮膚光腫如泡者是也以健脾滲水利小便進飲食元氣實者可下

附脈理

脈訣舉要曰水腫之證有陰有陽察脈觀色問證須詳陰脈沉遲其色青白不渴而瀉小便清濇脈或沉數色赤而黃燥糞赤溺兼渴為陽

附諸方

麻黃甘草湯（濟生方）治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗

麻黃（去根節四兩）甘草（二兩）

右㕮咀每服三錢水一盞煮麻黃再滞後入甘草煎七分取汁溫愼風老人虛人不可輕用

五苓散（方見溫熱）加木香茵陳　治小腫從腰以下俱腫

以此湯利小便仲景曰腰以下腫宜利小便腰以上腫宜發汗也

五皮散（和濟方）治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急

五加皮　地骨皮　生姜皮　大腹皮

茯苓皮

右㕮咀每服二錢水一盞煎至八分熱服不拘時切忌生冷油膩堅硬等物澹寮去五加皮地骨皮用陳皮桑白皮

葶藶木香散（御藥院方）治暑濕傷脾水腫腹脹小便赤大便滑

葶藶（二錢半炒香）　木香（五分）　茯苓（去皮二錢半）　肉桂（二錢）

滑石（三兩）　豬苓（去皮二錢半）　澤瀉　木通

甘草（各半兩）　白朮（一兩）

右為末每服二錢白湯下不拘時候

三因當歸散　水腫之疾多由腎水不能攝心火心火不能養脾土脾土不能制水水氣盈溢氣脈閉塞滲透經絡發為浮腫之證心腹堅脹喘滿不安

木香（煨）　赤茯苓　當歸（洗）　桂心

木通　赤芍藥　牡丹皮　檳榔

陳皮　白朮（各等分）

右㕮咀每服三錢水一盞薑紫蘇五葉木瓜一片煎八分

温服

加味腎氣丸（濟生方）治脾腎虛損腰重脚重小便不利

白茯苓（去皮一兩）附子（炮二兩）澤瀉　官桂（不見火）

川牛膝（去芦酒浸）車前子（酒蒸）山藥（炒）山茱萸（取肉）

牡丹皮（去木各一兩）熟地黃（半兩）

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲下

實脾散（濟生方）治陰水發腫用此先實脾土

厚朴（去皮姜炒）白朮　木瓜（去穰）木香（不見火）

乾姜（炮各一兩）草菓仁　大腹子　白茯苓（去皮一兩）

甘草（炙半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎不拘時

白朮木香散（宣明方）治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧

不能食小便閉者

白朮　猪苓（去皮）甘草　澤瀉（各半兩）

官桂（二錢）赤茯苓（半兩）木香　檳榔（各三錢）

陳皮（去白一兩）滑石（三兩）

右㕮咀每服一兩半生姜三片水二盞煎至一盞去滓

通口服

聖靈丹（拔粹方）治脾肺有濕喘滿風盛小便赤澁

苦葶藶（炒四兩）　防己（條二兩）　赤茯苓（[illegible]一兩半）

木香　檳榔　木通　人參（各一錢半）

右爲末棗肉爲丸如梧桐子大每服五十丸桑皮湯下

導氣通經湯（拔粹方）治脾氣有餘及氣不宣通面目手足浮腫

陳皮（去白）　桑白皮　白朮　木香

茯苓（去皮各一兩）

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞通口服不拘時

（霖雨時加澤瀉去錢）

沉香海金砂丸（拔粹方）治一切積聚脾濕腫脹肚大青筋羸瘦惡証

沉香（一錢）　海金砂（一錢半）　輕粉（一錢）　黑丑（末一兩）

右用獨蒜泥丸每服三十丸煎灯心通草湯下空心量大小虛實

續隨子丸（拔粹方）治通身虛腫喘悶不快

人參　防己　赤茯苓（面炒）　木香

檳榔　續隨子　海金砂（另炒各五錢）

苦葶藶（四兩）

右爲末棗肉爲丸如梧桐子大每服五十丸桑皮湯下

退腫榻氣散（聖惠方）治積水驚水或飲水過多停積於脾故四肢而身熱宜用藥內消其腫自退

赤小豆　陳皮　蘿蔔子　甘草（炙各五錢）

木香（炮二錢半）

右㕮咀每服一兩生姜三片棗子一枚水二盞煎至一盞服食前

○已上數方治陰水浮腫之劑

十棗丸　治水氣浮腫上氣喘急大小便不通

甘遂　大戟　芫花（各等分）

右爲末棗煮熟去皮核杵爛爲丸如梧桐子大每服四十九清晨熱湯下以利去黃水爲度不利次日再服

順氣丸又名氣寶丸（聖惠方）治腰脇俱病如抱一甕肌膚堅硬按之如鼓脚腫不能伸屈自頭至膻中瘦脊露骨胸膈痞滿四肢無力

木香（不見火）　茴香（炒）　羌活　木瓜

川芎　當歸（酒浸各一兩）　黑牽牛（二兩）　地骨皮

檳榔　陳皮（炒各一兩）　大黃（一兩半）　皂角（四兩）

右爲細末熬皂角膏丸如梧桐子大每服五六十丸溫湯下食前一方無木瓜用生姜灯心煎湯下治一切氣血凝滯風毒熾盛脚氣走注作腫或大便秘脚氣入腹

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

滿悶寒熱往來狀如傷寒並宜服之

三花神佑丸（宣明方）治中滿腹脹喘嗽淋悶一切水熱脹滿濕熱腸垢沉積變生疾病久病不已黃瘦困倦氣血壅滯不得宣通或風熱燥鬱支體麻痺走注疼痛風痰涎嗽頭目旋運瘧疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔逆及婦人經病不快帶下淋瀝無問赤白幷男子婦人傷寒濕熱腹滿實痛久新瘦弱俗不能別辨或汎常只為轉動之藥兼瀉久新腰痛幷一切下痢及小兒驚風積熱乳癖腫滿並宜服之

甘遂　大戟　芫花（醋拌濕炒各半兩）

牽牛（二兩）　大黃（一兩為細末）　輕粉（一錢）

右為末滴水為丸如小豆大初服五丸每服加五丸溫水下每日三服加至快利利後卻常服病去為度設病愈後老弱虛人平人常服保養宣通氣血消進酒食及痞悶極甚者便多服則頓攻不開轉加痛悶則初服兩丸每服加兩丸至快利為度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法

一方　治水腫腹脹

大戟　甘遂　芫花（醋浸）　巴戟

桑白皮　續隨子（各等分）

右爲末每服一匙空心菉豆湯下忌生冷油膩酸鹹等物

一方 治水腫皷脹

苦葶藶 甘遂（麵裹煨熟水浸冷用） 商陸根 大戟（各二錢半）

大黄 芫花（各二錢） 輕粉（少許） 黒牽牛（頭末一兩）

右爲細末入輕粉再研每服二錢温蜜水調下忌生冷塩醬之物取下黒黄臭水爲驗

○已上數方治陽水浮腫之劑

回鶻五神散 治十腫水氣皷脹

芫花獨根（以水洗淨） 木香 青木香

商陸（白者洗凈） 烏桕根（取黄土内一寸深用皮）

右各等分晒乾爲末每服二錢如人弱服一錢半臨卧臘酒調下至寅卯時利下水氣後時以白粥補之若病淺日三服病深隔日一服限五六日後服金丹

金丹

蒼术（四錢半米泔水浸） 草烏（二錢去皮臍） 羌活（二兩）

山豆（一錢半去皮心膜油另研） 杏仁（二十一箇去皮尖麵炒另研）

右爲末麵糊丸如梧桐子大每服十一丸臨卧生姜湯送下忌塩醬房事發病之物一百日此藥極驗

一方 用赤小豆商陸白者根各等分以雄豬肚一箇裝

藥在內以篾籤封其口於瓦罐內煑爛取出去藥乘熱食猪肚宜食五七箇見效

一方　用黑雄猪肚一箇先以茶湯清洄洗淨用活蝦蟆三箇每箇口內放銅錢一枚銅錢上安胡黃連末少許将蝦蟆活裝入肚內兩頭俱紮住勿令走氣以文武火煑一日次　日五更取出蝦蟆去皮腸肝不用餘肉連猪肚一同槲碎食盡以好酒厭下忌塩醬鷄鵝魚麵羊肉滯氣之物宜食猪肉鴨肉

一方　於五月五日取螻蛄不拘多少不可見日焙乾凡一病以七箇爲度先用七箇頭研爲末治上次用腹研爲末治中再用足研爲末治下每服食前好酒調下

商陸散　治十腫水氣

商陸汁（一盞）　甘遂（一錢）　土狗（一箇自死者）

右爲末以商陸汁調空心服日午利下水忌塩一百日

一方　治水皷

用商陸根赤者杵爛貼臍心以絹帛縳定病自小便出

又方　以商陸白根同生薑二兩煑粥服之忌赤者殺人

分水散　治面水浮腫

土狗（一箇）　輕粉（二分半）

右爲細末每用少許搐鼻中其黃水從鼻中出

塗臍膏　治水腫小便澁小

豬苓　地龍（生研）　針砂（醋煑）　甘遂（各等分）

右爲末用葱擂爛取汁研成膏敷臍中約一寸高以帛縛之水從小便出爲度日二次易之

煨腎丸　治脾虛和水流注經絡腿膝攣急四肢腫痛

甘遂（生半兩）　木香（一兩）

右爲末每服一錢以豬腰一枚剜開去筋膜摻藥在內用薄荷裹定外用紙四五層再裹以水濕於火內煨熟臨卧細嚼温酒嚥下利去黄水爲度

一方　治水腫

黑牽牛（頭末）　檳榔（等分）

右爲末每服三錢好酒空心調下利去水三五次其腫自消忌鹽醬生冷一百日取虫積沙糖水下

牽牛湯　治腹中濕熱氣足脛微腫中滿氣急咳嗽痰喘小便不利

牽牛（頭末一兩）　厚朴（五錢薑製）

右爲末每服二錢薑棗湯調下或以水爲丸亦可

一方　治腫脹自去水

用真水銀粉二錢巴豆去油四兩生硫黄一錢同研成膏作餅子先以新綿一片鋪臍上次以藥餅當臍掩之

外用帛縛定約人行五里自然瀉下惡水待三五次除去藥温粥補之久患者隔日取水

一方　治鼓脹氣滿

用苦丁香為末棗肉為丸如梧桐子大每服三十丸空心棗湯下三服見效

一方用青木香為末水調一錢服後得吐則效

一方　治水腫

用白商陸細切一升羊肉六兩水十升煑至六升去滓將肉和葱豉作臛食之

○已上數方治腫脹刼奪之劑

○廣按水腫之證蓋由脾虛濕勝凝閉滲道不得通故邪水隨氣流注經絡之中則一身浮腫皮薄而光手按成窟舉手即滿也先當補中燥濕使脾得健運次當開其滲道以決邪水則體用兼該標本兩盡病之不愈者鮮矣今之醫者徒知決水而不知補脾故暫消而隨腫何益之有哉古人治病之挾虛有先攻而後補者有先補而後攻者有攻補兼施者何嘗一於攻也又嘗論之水腫鼓脹之病忌用甘温之藥蓋腫脹屬濕甘温之藥能生濕熱而反助病邪經曰甘能作中滿是也惟用苦　寒之藥以治之則愈蓋苦寒

瀉濕熱苦温除濕寒也又宜用風藥風能勝濕也

鼓脹　二十五

丁集

丹溪心法

○鼓脹又名單鼓　宜大補中氣行濕此乃脾虛之甚必須遠音樂斷厚味大劑人參白朮佐以陳皮茯苓蒼朮之類　有血虛者用四物湯行血藥　有脉實堅人壯盛者或可攻之便可收拾用參朮為主　凡補氣必帶厚朴寬滿　厚朴治腹脹因味辛以氣聚於下焦故也須用姜汁製之　如肥胖之人腹脹者宜平胃五苓共服之　如白人腹脹者是氣虛宜參朮厚朴陳皮　如瘦人腹脹者是熱宜黃連厚朴香附白芍　如因有故畜血而腹脹者宜抵當丸下死血　如因有食積而腹脹者有熱用木香檳榔丸有寒用木香厚朴丁香砂仁神麯香附　如因外寒鬱內熱而腹脹者用藿香麻黃升麻乾葛桂枝　因大怒而腹脹者宜青皮陳皮香附木香梔子仁蘆薈　實者按之不堅不痛治須實者下之消之次補之　虛者濕之升之補之為要　朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛終日急氣血皆虛　腹脹不覺滿者食肉多以黃連一兩阿魏半兩醋

浸蒸餅爲丸同温中丸白朮湯下　食肉多腹脹三補丸料內加香附半夏麯蒸餅丸服

心肺陽也居上腎肝陰也居下脾居中亦陰也屬土經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心肺之陽降腎肝之陰升而成天地交之泰是爲無病今也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉運之官失職胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否清濁相混隧道壅塞鬱而爲熱熱留爲濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓其病膠固難以治療又名曰蠱若虫侵蝕之義理宜補脾又須養肺金以制木使脾無賊邪之患滋腎水以制火使肺得清化卻厚味斷妄想遠音樂無有不安醫又不察虛實急於作效病者苦於脹急喜行利藥以求通快不知寬得一日半日其腫愈甚病邪甚矣真氣傷矣古方惟禹餘糧丸又名紫金丸制肝補脾殊爲切當

四物湯　見補損

平胃散　見中濕

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

五苓散（見濕熱）

温中丸（見積聚）

三補丸（見補損）

附脉理

脉訣舉要曰脹滿脉弦脾制於肝洪數熱脹遲弱陰寒浮為虛滿緊則中實浮則可治虛則危急

附諸方

平肝飲子（濟生方）專治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭暈嘔逆脉來浮弦

防風（去芦） 桂心（不見火） 枳殼 赤芍藥

桔梗（去芦炒各一兩） 甘草（炙） 木香（不見火） 人參

檳榔 當歸（去芦酒浸） 川芎 陳皮（半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時服

紫蘇子湯（濟生方）治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊而濇

見氣滯

調中順氣丸 治怒氣傷肝三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或時刺痛（見脇痛）

木香順氣湯（拔粹方）治濁氣在上則生䐜脹及七情所傷

陳皮 厚朴（各四分） 當歸（五分） 草豆蔻（面裹煨去皮）

蒼朮（米泔浸）　木香（各三分）　青皮　益智仁

白茯苓（去皮）　澤瀉　乾生姜　半夏（湯洗七次）

吳茱萸　升麻　柴胡（各二分）

橘皮湯（直指方）治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附米（炒）　半夏　橘皮（各二兩）　甘草（七錢半）

右㕮咀水二盞生姜五片棗二枚煎至一盞通口服

○已上數方治氣脹之劑

大半夏湯（三因方）治肝氣大盛勝尅於脾脾不能運化結聚涎沫閉塞臟腑胃冷中虛遂成脹滿之疾其脉多弦遲

半夏（湯洗七次）　桂心（各五兩）　附子（炮去皮臍）　枳實（麸炒）

茯苓　甘草（炙）　厚朴（姜炒）　當歸（各三兩）

人參（一兩）　川椒（炒去汗去合口者入百粒）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎空心服

強中湯（濟生方）治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成腹脹心下痞滿有妨飲食甚則腹痛

乾姜（炮）　白朮（各二兩）　青皮（去白）　人參

丁香（各三兩）　草果仁　附子（炮去皮臍）　厚朴（姜炒）

甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分温服不拘時嘔者加半夏或食麵脹滿加蘿蔔子各半兩

中滿分消湯（拔粹方）治中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥冷食入反出下虛中滿腹中寒心痞下焦躁寒沉厥奔豚不收

益智仁　半夏　木香　茯苓

升麻（各七錢半）　川烏　人參　青皮

當歸　生姜　柴胡　乾姜

蓽澄茄（方）　黃連（各半兩）　黃耆　吳茱萸

草豆蔻　厚朴（各半錢）　一方有麻黃澤瀉（各二錢半）

黃蘗（半錢）

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞溫服大忌房勞濕麵生冷硬物

木香分氣丸（拔粹方）善治脾胃不和心腹脹悶脇膨脹胸膈注滿痰嗽喘急刺心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之有效

木香　檳榔　青皮（去心）　蓬莪朮（炮）

乾生姜　當歸　姜黃　玄胡

白朮　枳殼（麩炒）　荊三稜（濕紙裹煨香）

赤茯苓　陳皮（去皮）　肉豆蔻（各等分）

秋冬加丁香（炒）

右爲末白麵糊丸小豆大每服三五十丸生姜湯下

忌生茄馬齒莧

禹餘糧丸　治水腫鼓脹上氣喘滿一切水氣脹氣脹

蛇含石（大者三兩以鉄銚盛入炭火中煅藥與銚子一般通紅用鉗出銚子以藥淬醋中候冷研極細）

真針砂（五兩洗以水淘淨控乾更以鉄銚子炒乾入禹餘糧一處用水醋二升就銚內煑令醋乾爲度却就用銚子同二藥入一秤炭火中煅令通赤鉗出銚子順藥於淨磚地上候令研極細）

禹餘糧（三兩同入針砂內製）

已上三物爲主其次量人虛實入下項藥

木香　牛膝（酒浸）　莪朮（炮）　白蒺藜

桂心　川芎　白豆蔻　土茴香（炒）

三稜（炮）　羌活　茯苓　乾姜（炮）

青皮（去白）　附子（炮）　陳皮　當歸（酒浸一夕）

右各半兩虛人老人全用半兩實壯之人隨意（減之）

右爲末拌勻以湯浸蒸餅攄去水和藥再搗極勻丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒下最忌食鹽否則發疾愈甚

○廣按此方劫劑也然腫脹乃寒濕痞閉積滯非此藥之熱燥而能開發流通之乎雖用此藥而能去腫脹然腫脹少退即當服補氣補血補脾藥以繼之可以免於後患也大抵腫脹之病多用十棗三花以攻決惟壯實者可用非虛老人所宜而此劑但取開散寒

濕痞滯故宜於虛老人也

○已上數方治寒脹之劑

中滿分消丸（拔粹方）治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹

不治寒脹

人參（去芦） 白朮 薑黄 黄芩（去腐剉碎各半兩）

甘草（炙） 猪苓（去黑皮各一錢） 黄連（去鬚剉碎半兩） 白茯苓（去皮）

縮砂仁 乾生薑（各二錢） 枳實（麸炒黄） 半夏（湯炮七次各半兩）

厚朴（薑製一兩） 知母（剉炒四錢） 澤瀉（三錢） 陳皮（三錢去白）

右細碾茯苓澤瀉生薑各爲末另秤外共爲末秤入上二味和白水浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服一百丸熱白湯送下寒因熱用故焙熱服之食遠量人虛實加減

沉香交泰丸（拔粹方）治濁氣在上而擾清陽之氣鬱而不伸爲䐜脹

沉香 白朮 陳皮（各三錢去皮） 枳實（去穰麸炒）

吳茱萸（湯洗） 大黄（酒浸一兩） 白茯苓（去皮） 澤瀉

當歸（酒浸） 木香 青皮（去白各二錢） 厚朴（薑製五錢）

右爲末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服七八十丸溫白湯送下食前微利即止

廣茂潰堅湯 治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐卧不安大小便澁滞上氣喘促遍身虛腫

厚朴 黄芩 益智 草豆蔻

當歸（各五錢） 黄連（六錢） 半夏（七錢） 廣茂

升麻 紅花（酒浸） 吳茱萸（各二錢） 甘草（生）

柴胡 澤瀉 神麯（炒） 青皮

陳皮（各三錢） 渴者加葛根（四錢）

右每服七錢生姜三片煎服

紺珠木香檳榔丸

木香 檳榔 當歸 黄連

枳殼 青皮 黄栢（各一兩） 黄芩

陳皮 三稜 香附 丑末（各二兩）

莪朮 大黄（各四兩）

右爲末麪糊丸梧桐子大每服五七十丸臨卧姜湯下尋常消導開胃只服三四十丸

○已上數方治熱脹之劑

抵當丸

水蛭（七箇石灰炒赤） 䖟虫（七箇糯米炒） 桃仁（七箇） 大黄（一兩）

右爲末分作四丸水一盞煎一丸取七分大温服當下血未下再服

人參芎歸湯 治血脹煩燥嗽水不嚥迷忘小便多大便異或虛厥逆婦人多有此証

當歸　半夏（七錢半）川芎（一兩）蓬朮

木香　砂仁　白芍　甘草（炙各半兩）

人參　桂　五靈脂（炒各二錢半）

右㕮咀生姜三片棗一箇紫蘇四葉水煎服

一方　治血鼓腹如盆脹

三稜（煨）　莪朮　乾漆（炒烟盡）牛膝（去芦酒浸）

虻虫（糯米炒）琥珀　肉桂　硇砂

水蛭（石灰炒赤）大黄（各等分）

右爲末用生地黄自然汁和米醋調勻爲丸如梧桐子大每服十丸空心温酒送下童便下亦可

鷄屎醴散（宣明方）治旦食不能暮食痞滿

大黄　桃仁（去皮尖）雞屎醴（乾者）

右等分爲末每服一錢生姜三片煎調食後臨卧服

○已上數方治血脹之劑

○廣按水腫鼓脹皆因脾虛所致然水腫輕而鼓脹重不可不知也何則水腫則飲食如常鼓脹則飲食不及常也治水腫則惟補脾導水而已治鼓脹則補脾導水兼以消穀庶乎可也雖然脹有氣血寒熱四者之殊多由怒氣傷肝木邪尅土所以脾病而不能運化水穀故爾又要養肺金以制肝木使脾土得其平則

運化行而水穀消矣以此觀之治鼓脹之法必以補脾制肝導水消穀爲主看其所挾而兼用藥爲挾氣則散氣挾血則破血挾寒則温寒挾熱則清熱其施治一一清切如此則藥無不投而病無不愈也又按鼓脹之病多不治者何哉此脾虛之極真臟病也如翻胃勞瘵亦然皆真臟病也凡人之病真臟不病則五行相生相制以適其平雖不服藥而自愈者如太極傷金則有水以制之有土以生之如木極尅土則有金以制之有火以生之所謂亢則害承迺制也雖然亦有惡藥忌醫而誤之者盖正氣與病邪不相兩立一勝則一負久則病劇正脫而不免於死矣夫藥所以助正去邪而使邪退正復也有病不服藥可乎不用醫可乎

赤白濁 二十六

丹溪心法

○濁主濕熱　有痰　有虛　赤屬血　白屬氣　痢帶同治　寒則堅凝熱則流通　大率皆是濕痰流注宜燥中宮之濕用二陳加蒼术白术燥去其濕　赤者乃是濕

傷血也加白芍藥仍用珎珠粉丸加臭椿根白皮滑石青黛作丸藥　虛勞用補陰藥大緊不宜熱（作宣）藥　肥白人必多痰以二陳湯去其濕熱　胃弱者兼用人參以柴胡升麻升其胃中之氣　丸藥用黃栢炒褐色乾姜炒微黑滑石蛤粉青黛糊丸服　胃中濁氣下流爲赤白濁用二陳加柴胡升麻蒼术白术　丸藥用樗皮末蛤粉炒乾姜炒黃栢　胃中濁氣下流滲入膀胱青黛蛤粉　肝脉弦者用青黛以瀉肝　又方炒黃栢一兩生栢一兩滑石三兩神麯半兩爲末滴水丸　燥濕痰南星半夏蛤粉青黛爲末神麯糊丸以青黛爲衣　有熱者青黛滑石黃栢之類水丸　張子元氣血兩虛有痰痛風時作陰火間起小便白濁方在痛風類　一人便濁經年或時夢遺形瘦作心虛主治用珎珠粉丸和定志丸服　一婦人年近六十形肥奉養膏粱飲食肥美中焦不清濁氣流入膀胱下注白濁白濁即濕痰也用二陳去痰加升麻柴胡升胃中清氣加蒼术去濕白术補胃全在活法服四貼後濁減大半却覺胷滿因柴胡升麻升動胃氣痰阻滿悶又用本湯加炒麯白术香附素無痰者雖升動不滿也

入方

青黛　蛤粉　椿根末　滑石

乾姜（炒）　黃栢（炒褐色）

右爲末神麯糊丸仍用前燥濕痰丸子亦治帶下

法曰黃栢治濕熱青黛解鬱熱蛤粉醎寒入腎滑石利竅乾姜味苦歛肺氣下降使陰血生乾姜監制

又方

黃栢（炒黑一兩）　生栢（二兩一云生芐）　蛤粉（三兩）　神麯（半兩）

右爲末水丸服

附脉理

脉訣舉要曰遺精白濁當驗於尺結芤動緊二證之的

附諸方

定志丸

遠志（去心）　石菖蒲（各二兩）　人參　白茯苓（各五兩）

右爲末蜜丸梧子大硃砂爲衣每服七丸加至二十丸空心米湯下

半夏丸　治白濁神效

半夏（燥濕）　猪苓（分水）　肝脉弦加青黛

○二陳湯治濁能使大便潤而小便長　濁氣只是濕痰　有白濁人服玄兔丹不愈服附子八味丸即愈著不可不知　有小便如常停久纔方漩濁

茯菟丸　治思慮太過心腎虛損便溺餘瀝小便白濁夢

寐頻泄

兎絲子（五两）　白茯苓（二两）　石蓮肉（二两）

右爲末酒糊爲丸如梧子大每服三十丸空心盬湯下

珍珠粉丸　治白滛夢泄遺精及滑出而不收

真蛤粉（一斤）　黄栢（一斤新瓦上炒赤）

右爲末滴水丸梧子大每服一百丸空心温酒下

法曰陽盛陰虚故精泄也黄栢降心火蛤粉醎而補腎陰

導赤散　治心虚藴熱小便赤澁遂成赤濁（見林類）

葉氏定心湯　理心氣不足榮血衰少遇事多驚心神不守夢中遺精白濁不已

葉氏鎮心爽神湯　理心氣不足夜夢多驚小便白濁遺精（並見補損）

清心蓮子飲　治心虚有熱小便赤濁有沙漠（見淋類）

瑞蓮丸（濟生方）　治思慮傷心小便赤濁

白茯苓（去皮）　石蓮肉（炒去心）　龍骨（生用）　天門冬（洗去心）

麥門冬（洗去心）　栢子仁（炒別研）　當歸（去芦酒浸）　酸棗仁（洗去殻）

紫石英（火煆七次）　遠志（甘草煮去心）　乳香　龍齒（各一两）

右爲末煉蜜丸梧子大硃砂爲衣每服七十丸空心温酒棗湯下

萆薢分清飲　治真元不足下焦虚寒小便白濁頻數無

度漩白如油光彩不定漩脚澄下凝如膏糊

益智仁　川萆薢　石菖蒲　烏藥（各等分）

右剉每服五錢水煎入鹽一捻食前服

一方加茯苓甘草

桑螵蛸散（經驗方）專治男子小便日數十次稠如米泔或赤或白心神恍惚瘦悴減食此說多因房勞過度耗傷真氣得之

桑螵蛸（鹽水煑）　遠志（甘草湯煑去苗心）　菖蒲（鹽炒）

龍骨（煆研）　人參（去芦）　茯神（去木）　當歸（酒洗去芦）

龜甲（醋炙各一兩）

右爲末每服二錢臨睡時人參湯下

猪苓丸（即前半夏丸）治年壯氣盛慾動所願不得意婬於外憂遺白濁右用半夏一兩破如豆大用猪苓末四兩先將一半炒半夏黃色不令焦地上空出火毒半日取半夏爲末糊丸如梧子候乾更用前猪苓末二兩炒藥微裂同於沙甁內藏之空心溫酒鹽湯下四五十丸

一方　治心經伏暑小便赤濁

人參　白朮　赤茯苓（去皮）　香薷

澤瀉　木猪苓（去皮）　蓮肉　麥門冬（去心各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞煎服

一方　治小便白濁出髓條

酸棗仁（炒）　白术　人參　白茯苓

（盐）破故紙　益智（洗淨）　大茴香

左顧牡蠣（童皮煅各等分）

右爲末加青塩酒爲丸如梧桐子大每服三千丸溫酒米飲任下

秘精丸（濟生方）專治下焦虛寒小便白濁或如米泔如凝脂

牡蠣（煅）　兎絲子（酒蒸焙別研）　龍骨（生用）

五味子　韭子（炒）　白茯苓（去皮）　白石脂（煅）

桑螵蛸（酒炙各等分）

右為末酒糊丸如梧桐每服七十丸空心塩酒下

韭子丸（濟生方）治膀胱腎冷小便白濁滑數無度

赤石脂（煅）　韭子（炒）　川牛膝（去芦酒浸）　牡蠣（煅）

覆盆子（酒浸）　附子（炮去皮臍）　桑螵蛸（酒炙）　鹿茸（酒蒸炒）

肉蓯蓉（酒浸）　龍骨（生各一兩）　雞膍胵（燒灰）　沉香（鎊不見火各半兩）

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十丸空心塩酒塩湯任下

附子八味丸　治腎氣虛乏下元冷憊臍腹疼痛脚膝緩弱夜多旋溺淋澁白濁（見補損類）

○廣按赤白濁雖多屬濕熱然亦有老人因虛寒而致

之者已上二方乃治虛寒濕寒之劑也

遠志丸（濟生方）治因事有驚心神不定夜夢驚墮小便白濁

遠志（去心薑汁淹炙）　石菖蒲（各二兩）　茯神（去木）　白茯苓（去皮）

人參　龍齒（各一兩）

右爲末煉蜜丸梧子大以辰砂爲衣每七十丸熟湯下

葉氏育神散（簡易方）理心氣不寧怔忡健忘夜夢驚恐小便白濁見驚悸類

妙應丸　治赤白濁

真龍骨　辰砂　石菖蒲（各二錢半）　川練子（取肉半兩）

白茯苓　益智仁　石蓮肉　縮砂仁（各一錢半）

桑螵蛸（瓦上焙）　兎絲子（酒浸一宿焙各半兩）

牡蠣（草鞋包火煅細研）

右以山藥碎炒爲糊丸如梧桐子大每服五十丸間日煎人參酸棗仁湯下臨卧粳米飲湯下

丹溪心法附餘卷之八終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之九　　丁集

休寧東山古庵方廣約之類集

痰門

痰　二十七　（附痰熱）

丹溪心法

○脉浮當吐　久得脉濇卒難開也必費調理　大凡治痰用利藥過多致脾氣虛則痰易生而多　濕痰用蒼朮

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

白术　熱痰用青黛黃連芩　食積痰用神麯麥芽山查　風痰用南星　老痰用海石半夏瓜蔞香附五倍子作丸服　痰在膈上必用吐法瀉亦不能去　風痰多見奇証　濕痰多見倦怠軟弱　氣實痰熱結在上者吐難得出　痰清者屬寒二陳湯之類膠固稠濁者必用吐　熱痰挾風外証爲多熱者清之　食積者必用攻之兼氣虛者用補氣藥送　痰因火盛逆上者以治火爲先白术黃芩軟石膏之類　內傷挾痰必用參芪白术之屬多用姜汁傳送或加半夏虛甚加竹瀝　中氣不足加參术　痰之爲物隨氣升降無處不到　脾虛者宜清中氣以運痰降下二陳湯加白术之類兼用升麻提起　中焦有痰則食積胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡則虛矣　痰成塊或吐咯不出兼氣鬱者難治　氣實痰熱者難治　痰在腸胃間者可下而愈在經絡中非吐不可吐法中就有發散之義焉假如癇病因驚而得驚則神出舍舍空則痰生也血氣入在舍而拒其神不能歸焉　血傷必用姜汁傳送　黃芩治熱痰假其下火也　竹瀝滑痰非姜汁不能行經絡　五倍子能治老痰佐他藥大治頑痰　二陳湯一身　痰都治管如要下行加引下藥在上加引上藥

凡用吐藥宜升提其氣便吐也如防風山梔川芎桔梗

芽茶生姜虀汁之類或用瓜蒂散　凡風痰病必用風痰藥如白附子天麻雄黃牛黃片芩姜蠶猪牙皂之類

諸吐法另具于後

○凡人身上中下有塊者多是痰問其平日好食何物吐下後方用藥　許學士用蒼术治痰成窠囊邊行極妙痰挾瘀血遂成窠囊　眩運嘈雜乃火動其痰用二陳湯加山梔子黃連黃芩之類　噫氣吞酸此食鬱有熱火氣上動以黃芩爲君南星半夏爲臣橘紅爲使熱多加青黛　痰在脇下非白芥子不能達　痰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不能導達　痰在四肢非竹瀝不開　痰結核在咽喉中燥不能出入用化痰藥加鹹藥軟堅之味瓜蔞仁杏仁海石桔梗連翹少佐朴硝以姜汁蜜和丸噙服之　海粉即海石熱痰能降濕痰能燥結痰能軟頑痰能消可入丸子末子不可入煎藥　枳實瀉痰能衝墻壁　小胃丹治膈上痰熱風痰濕痰肩膊諸痛能損胃氣食積痰實者用之不宜多

○喉中有物咯不出嚥不下此是老痰重者吐之輕者用瓜萎蜜氣實必用荊瀝　天花粉大能降膈上熱痰　痰在膈間使人顛狂或健忘或風痰皆用竹瀝亦能養血與荊瀝同功治熱重能食者用此二味効速穩當二瀝治痰

結在皮裏膜外及經絡中痰必佐以姜汁　韭汁治血滯不行中焦有飲自然汁冷喫兩三銀盞必胷中煩燥不寧而後愈　參萸丸能消痰（見吞酸類）

入方

青礞石丸　解食積去濕痰重在風化硝

南星（二兩切作片用白凡末五錢水浸一二日曬乾　又云一兩）

片黃芩（姜汁炒一兩）　半夏（一兩泡切作片以大皂角水浸一日曬乾）

茯苓　枳實（炒各一兩）

法製硝（用蘿蔔水煮化去蔔濾令細入臘月牛膽內風化硝秤五錢或只風化亦可又云一兩）

礞石（二兩搥碎焰硝二兩同入小砂罐內瓦片蓋之鉄綫縛定鹽泥固濟曬乾火煆紅候冷取出）

右爲末神麯糊丸梧子大每服三五十丸白湯下

一方加蒼术半兩滑石一兩看病冷熱虛實作湯使

一本礞石南星各一兩（無枳實）

又方

半夏（二兩）　白朮（一兩）　茯苓（七錢半）　黃芩

礞石（一兩）　風化硝（二錢）

右爲末同前

潤下丸　降痰甚妙

南星（一兩）　半夏（二兩各依橘紅製）　黃芩

黃連各一兩　橘紅（半斤以水化鹽五錢拌令得所煮乾烘燥）　甘草（炙一兩）

右爲末蒸餅丸如菉豆大每服五七十丸白湯下

一方單用陳皮半斤塩半兩水拌煑陳皮候乾焙燥爲末入甘草末一兩炊餅同上丸亦好去胸膈有痰兼嗽

上熱加青金有濕加蒼莎或加參萸看虛實作湯使

又方　治濕痰喘急止心痛

半夏（一味不拘多少香油炒）

右爲末粥丸梧子大每服三五十丸姜湯下

又方

黃芩　香附　半夏（姜制）　貝母

已上治濕痰加瓜蔞仁青黛作丸子治熱痰

又方　燥濕痰亦治白濁因痰者

南星　半夏（各一兩）　蛤粉（二兩）

右爲末神麴糊丸如梧子大青黛爲衣每服五十丸姜湯下

濕痰加蒼朮　食積痰加神麴麥芽山查　熱痰加青黛

中和丸　治濕痰氣熱

蒼朮　黃芩　半夏　香附（等分）

右爲末粥丸如梧子大每服五七十丸姜湯下

又方　治痰嗽

黃芩（酒洗一兩半）　貝母　南星（各一兩）　滑石

白芥子（各半兩）　風化硝（二錢半取其輕浮速降）

右爲末湯泡蒸餅丸服

導痰湯

南星（炮一兩）　橘紅（去白一兩）　赤茯苓（去皮一兩）　枳殼（去穰麩炒一兩）

甘草（炙半兩又云一兩）　半夏（四兩又云四錢）

水煎生姜五片食前服之

千緡湯　治喘

半夏（七箇泡制每箇作四片）　皂角（去皮炙一寸）　甘草（炙一寸）

右㕮咀作一服生姜如指大煎

小胃丹

芫花（好醋浸勻過一宿瓦器不住手攪炒令黑不要焦）

甘遂（濕麵裹長流水浸半日再水洗曬乾又云水浸冬七春秋五日或水煮亦可）

大戟（長流水煮一時再水洗曬乾各半兩）

大黃（濕紙裹煨勿焦切焙乾再酒潤炒熟焙乾一兩半）　黃栢（三兩焙炒）

右爲末粥丸麻子大每服二三十丸臨卧津液吞下或白湯一口送下取其膈上之濕痰熱積以意消息之欲利則空心服

又方甘遂大戟減三分之一硃砂爲衣名辰砂化痰丸（一方加木香檳榔各半兩蒸餅丸每服七八丸至十丸止）

治酒痰

青黛　瓜蔞

右爲末姜蜜丸噙化救肺

治鬱痰

白殭蚕　杏仁　瓜蔞仁　訶子

貝母　五倍子

右爲末糊丸梧子大每服五十丸白湯下

導痰丸

吳茱萸制（末）　茯苓（一两）　黄連（半两）　滑石（七錢半）

蒼术（泔浸一两）

右爲末糊丸梧子大每服八九十丸姜湯下

茯苓丸　（出千金方百一選方同）

半夏（四两）　茯苓（二两）　枳殼（一两）　風化硝（半两）

右為末蒸餅或神麴姜汁糊丸梧子大每服三十丸姜湯下　此方治中脘停痰臂痛難舉手足不得轉有効

又方　治食積痰火并瀉胃火

軟石膏不拘多少研細

右用醋糊丸如菉豆大每服二十丸白湯下

又方　治陰虛内多食積痰

川芎（七錢）　黄連　瓜蔞仁　白术

神麴　麥芽（各一两）　青黛（半两）　人中白（三錢）

右為末姜汁蒸餅丸服

又吐痰喘

杏仁（去皮尖生用）　來復丹（炒）

右等分為末粥丸麻子大每服十五丸白湯下

黃連化痰丸　即黃連清化丸

半夏（一两半）　黃連（一两）　吳茱萸（湯洗一錢半）

桃仁（二十四箇研）　陳皮（一两半）

右為末麯糊丸菉豆大每服一百丸姜湯送下

白玉丸

巴豆（三十箇去油）　南星　半夏　滑石

輕粉（各三錢）

右為末皂角仁浸濃汁丸梧子大每服五七丸姜湯下

黃瓜蔞丸　治食積痰壅滯喘急

瓜蔞仁　半夏　山查　神麯（炒各等分）

右為末瓜蔞水丸姜湯竹瀝送下二三十丸

又方

瓜蔞仁　半夏（一两）　蒼朮（二两）　香附（二两半）

黃芩　黃連（半两）

又方

瓜蔞仁　黃連（半两）　半夏（一两）

右為末糊丸梧子大每服五十丸

抑痰丸

瓜蔞仁（一两） 半夏（二錢） 貝母（三錢）

右為末蒸餅丸如麻子大每服一百丸姜湯下

清膈化痰丸

黃連（一两） 黃芩（一两） 黃柏 山梔（半两）

香附（一两半） 蒼术（二两）

右為末蒸餅丸白湯下

搜風化痰丸

人參 槐角子 殭蚕 白礬

陳皮（去白） 天麻 荆芥（各一两） 半夏（四两姜汁炒）

辰砂（半两另研）

右爲末姜汁浸蒸餅爲丸辰砂爲衣服四十丸姜湯下

墜痰丸 治痰飲

黑丑（頭末二两） 枳實（炒一两半） 白礬（三錢一半枯） 朴硝（二錢風化）

枳殼（一两半炒） 猪牙皂角（一錢酒炒）

右爲末用蘿蔔汁丸每服五十丸鷄鳴時服初則有糞

次則有痰

治濕痰

蒼术（三錢） 白术（六錢） 香附（一錢半） 白芍（酒浸炒二錢半）

右為末蒸餅丸服

治肥人濕痰

苦參　半夏（各一两半）　白术（三錢半）　陳皮（一錢）

右㕮咀作一服姜三片竹瀝半盞水煎食遠吞三補丸十五丸

祛風痰行濁氣

明礬（一两）　防風（二两）　川芎　猪牙皂角

鬱金（各一两）　蜈蚣（二條用赤脚黄脚各一條）

右為末蒸餅丸梧子大每三十丸食前茶湯下春（以芭蕉湯探吐）

上焦風痰

瓜蔞　黄連　半夏　牙皂

姜汁浸炊餅丸

痰氣方

片芩（炒）　半夏（半两）　白术　白芍（一两）

茯苓　陳皮（三錢）

右為末姜汁泡蒸餅丸服

利膈化痰丸

南星　蛤粉（研細一两）　半夏　瓜蔞仁

貝母（去心治胷膈痰氣妙）　香附（半两便浸）

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

右爲末用豬牙皂角十四挺敲碎水一碗半煮杏仁去皮尖一兩煮水將乾去皂角擂杏仁如泥入前藥搜和再入姜汁泡蒸餅丸如菉豆大青黛爲衣每服五十丸姜湯下

清膈丸

黄芩（半斤酒浸炒黄） 南星（四兩生用） 半夏（湯泡七次）

右爲末姜汁打糊丸

清痰丸 專清中脘熱痰積

烏梅 枯礬 黄芩 蒼术

陳皮 滑石（炒） 青皮 枳實（各半兩）

南星 半夏 神麯（炒） 山查

乾生姜 香附（各一兩）

右爲末湯浸蒸餅丸服

充按丹溪治病以痰爲重諸病多因痰而生故前諸方間有別出者亦其平日常用故不另開於附方觀者詳焉

附諸賢論

劉宗厚曰痰之爲病仲景論四飲六証無擇叙内外三因倶爲切當蓋四飲則叙因痰而顯諸證者三因則論其因有所傷而生痰者也惟王隱君論人之諸痰悉出於

痰此發前人所未論可謂深識痰之情狀而得其奧者矣製滚痰丸一方總治斯疾固爲簡便較之仲景三因有表裏内外而分汗下温利之法則疎濶矣況又有虚實寒熱之不同者哉夫痰病之原有因熱而生痰者亦有因痰而生熱者有因風寒暑濕而得者有因驚而得者有因氣而得者有因酒飲而得者有因食積而得者有脾虚不能運化而生者有腎虚不能降火而生者若熱痰則多煩熱風痰多成癱瘓奇證冷痰多成骨痺濕痰多倦怠軟弱驚痰多成心痛癲疾飲痰多成脇痛臂痛食積（痰多）成癖塊痞滿其爲病狀種種難名王隱君論中頗爲詳盡學者但察其病形脉證則知所挾之邪隨其表裏上下虚實以治也若夫子和謂飲無補法必當去水故用吐汗下之三法治人常愈又論熱藥治痰之誤固爲詳切亦有挾寒挾虚之証不可不論夫（久痰）凝結膠固不通狀若寒凝不用温藥引導必有拒格之患況有風寒外束痰氣内鬱者不用温散亦何以開鬱行滯又有血氣虧乏之人痰客中焦閉塞清道以致四肢百骸發爲諸病理宜導去痰滯必當補接兼行又難拘於子和之三法也大凡病久淹延卒不便死者多因食積痰飲所致何以然者盖胃氣亦賴痰積所養飲食雖

少胃氣卒不便虛故也亦有治痰用峻利過多則脾氣愈虛津液不運痰反生而愈盛法當補脾胃清中氣則痰自然運下此乃治本之法也謂醫中之（王道）者正此類也

附脉理

脉訣舉要曰偏弦爲飲或沉弦滑或結或伏痰飲中節

脉理提綱曰痰脉弦滑

附諸方

金沸草散（和濟方）治外感風寒痰氣內鬱咳唾稠粘

參蘇飲（和劑方）亦治外感風寒痰飲停積胸膈咳嗽氣促言語不能相續者（並見傷風類）

小青龍湯（和劑方）治外感風寒內生溢飲支飲倚息喘滿不得安臥者（見咳嗽類）

法製半夏（御藥院方）消飲化痰健脾順氣

右用大半夏以湯泡洗一遍去臍再泡洗如此七遍焙乾用濃米泔浸一日夜取出控乾每半夏一两用白礬一两半研細温水化浸半夏止留水两指許頻頻放浸冬月於煖處頓放浸五日夜取出焙乾再用鉛白霜一錢温水化又浸一日夜通前七日盡取出再用醬水放慢火內煑勿令滾候醬水極熱取出焙乾於銀石器或磁

器内收貯每服一二粒食後細嚼生姜湯下　又一法依前製成半夏每一兩用龍腦半錢研極細同飛過硃砂於半夏上再爲衣却鋪上灯草一層約厚一指单排半夏於上再用灯草盖約厚一指以炒豆焙之候乾取出於器内收貯每服一二粒細嚼食後温水下或冷水送下

橘皮半夏湯（宣明方）痰嗽久不已者

橘皮（去白半兩）　半夏（三錢半湯洗七次）

右爲末分作二服每服水一盞半入生姜十片同煎六分温服

茯苓半夏湯　治停痰留飲胸膈滿悶嘔逆悪心吐痰水

茯苓（去皮三兩）　半夏（湯炮七次伍兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎六分空心服

大半夏湯（御藥院方）治痰飲及脾胃不和

半夏　陳皮　茯苓（各二錢半）

右㕮咀水二盞生姜二錢半煎至八分去滓食後温服

二陳湯（和劑方）治痰飲爲患或嘔吐悪心或頭眩心悸或因食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之

半夏（湯洗七次去滑衣）　橘紅（陳皮去白者是各五兩）

白茯苓（去皮三兩）　甘草（炙一兩半）

右㕮咀每服四錢水一盞生姜七片烏梅一箇同煎至六分熱服

○廣按此方半夏豁痰燥濕橘紅消痰利氣茯苓降氣滲濕甘草補脾和中盖補脾則不生濕燥濕滲濕則不生痰利氣降氣則痰消觧可謂體用兼該標本兩盡之藥也今人但見半夏性燥便以他藥代之殊失立方之旨若果血虚燥症用姜汁製用何妨抑嘗論之二陳湯治痰之主藥也如寒痰加附子姜桂濕痰加蒼白二术食積痰加麯蘖山查熱痰加芩連梔子風痰加南星皂角燥痰加瓜蔞青黛鬱痰加枳殼香

附老痰加海石朴硝乃合其宜

丁香半夏丸（和劑方）治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噫氣心腹痞滿不思飲食

肉豆蔻　木香　丁香　人參

陳皮（去白各二錢半）　藿香葉（半兩）　半夏（湯泡七次姜製三兩）

右為末以生姜汁煮麵糊丸如小豆大每服二三十丸姜湯下

○已上數方治寒痰之劑

平胃散　治有濕痰倦怠軟弱嗜卧沉困無力（方見中濕）

五苓散　治臍下有悸停飲癲眩吐涎沫（方見温熱）

化痰丸（本事方）　治停痰宿食

半夏（湯泡）　人參（去芦）　桔梗（細切姜片製）　白朮　枳實

香附子　白茯苓（各一兩）　前胡（去芦）　甘草（各半兩）

右為末用半夏姜汁煮糊丸如梧桐子大每服四五十丸姜湯下

檳榔散（濟生方）　治胸膈停滯痰飲腹中虛鳴食不消化時或嘔逆

杏仁（去皮炒）　旋覆花（去梗枝）　半夏（湯洗七次）　檳榔（各一兩）

甘草（五錢）　桔梗（去芦炒）　白朮（各一兩）　人參（五分）

乾姜（炮）　橘紅（各一兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片煎至八分溫服

半夏湯（瑞竹堂方）　順陰陽消痞滿消酒化痰

半夏（姜製一兩）　橘紅（去白一兩）　桔梗（去芦一兩）　枳實（去穰炒半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至七分半餓半飽熱服

海藏五飲湯（拔粹方）　一留飲心下二癖飲脇下三痰飲胃中四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故有此疾

旋覆花　人參　陳皮　枳實

白朮　茯苓　厚朴　半夏

澤瀉　猪苓　前胡　桂心

芍藥　甘草（各等分）

右剉每兩分四服水二盞生姜十片同煎至六分取清温服不拘時候忌食肉生冷滋味等物因酒多飲加葛根葛花砂仁

蠲飲枳實丸（拔粹方）逐飲消痰導滯清膈

枳實（去穰炒）　半夏（湯泡七次）　陳皮（去白各二兩）

黑牽牛（半斤取頭末三兩）

右爲末水煑麵糊爲丸如梧桐子大每服五十丸生姜湯下食後

葛花觧醒湯（拔粹方）治酒飲太過嘔吐痰逆心神煩乱胸膈痞塞手足戰揺飲食减少小便不利　（見傷食類）

一方　治痰飲流注疼痛

用大半夏二兩湯浸爲末風化朴硝二兩生姜自然汁糊丸如梧桐子大每服五丸姜湯下痛在上臨卧服痛在下空心服

〇已上數方治濕痰食積痰之劑

清氣化痰丸（古庵方）清頭目凉膈化痰利氣

半夏（湯洗七次二兩）　陳皮（去白）　茯苓（去皮各一兩半）　薄荷葉

荊芥穗（各五錢）　黄芩（酒浸炒）　連翹　梔子仁（炒）

桔梗（去芦）　甘草（炙各一兩）

右爲末姜汁煎水打糊爲丸如梧子大每服五十丸食後臨卧各一服如腸胃燥實加酒炒大黄芒硝各一兩

○廣按此方即二陳湯與凉膈散相合是也蓋痰因火動故作胷膈痞滿頭目昏眩今因二陳以豁痰利氣凉膈以降火散風熱何病之不瘳哉

滌痰丸（御藥院方）治三焦氣澁痰飲不利胸膈痞滿咳唾稠粘面目熱赤肢體倦怠不思飲食常服升降滯氣清膈化痰

木香　檳榔　青皮（去白）　陳皮（去白）

京三稜（煨）　枳殼（去穰麩炒）　半夏（洗七次各一兩）　大黄（一兩煨）

黒牽牛（微炒二兩）

右爲末水糊丸梧桐子大每服四五十丸姜湯食後下

利膈丸（拔粹方）治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黒牽牛（炒四兩）　半夏（洗）　皁角（去皮弦酥炙各二兩）　青皮（去白）

槐角子（炒）　木香（各一兩）　檳榔　大黄（各半一兩）

右爲末生姜糊圓如梧桐子大每服七十丸生姜湯下食後

開結枳實丸（御藥院方）宣導滯氣消化痰飲升降陰陽通行三焦蕩滌脾胃流暢大小腸開導膀胱專主胷中痞

逆惡心嘔噦飲酒不消宿食停積兩脇膨悶咽嗌不利上氣喘嗽黃疸等症

枳實（炒）　白术　半夏（製）　南星（炮）
白礬（枯）　苦葶藶（炒）　大黃　青皮（去白各五錢）
木香（三錢）　黑牽牛（頭末二兩）　大皂角（酥炙去皮弦）
旋覆花（各一兩）

右爲末生姜汁糊爲丸梧子大每服五十丸姜湯下無特婦人乾血氣膈實腫滿或大便不通小便不利生姜葱白湯下

王隱君滾痰丸

括曰甑裹翻身甲掛金于今頭戴草堂深相逢二八求斤正硝煆青礞倍若沉十七兩中零半兩水丸桐子意常斟千般怪證如神效水瀉双身却不任

大黃（酒蒸）　黃片芩（酒洗淨各八兩）　沉香（半兩）
礞石（一兩槌碎焰硝一兩用入小砂罐內蓋之鐵線練定鹽泥固濟曬乾火煆紅候冷取出）
一方加硃砂二兩（研為細末為衣）

右為細末水丸梧子大每服四五十丸量虛實加減服茶清溫水任下臨臥食後服

按此以大黃黃芩爲君大瀉陽明濕熱之藥礞石以墜痰沉香則引諸氣上而至天下而至泉為使也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

大利膈（拔粹方）主胷中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香（七錢）　檳榔（七錢半）　厚朴（一兩姜製）　人參（去芦）

藿香葉　當歸　甘草（炙）　枳實（炒）

大黃（一兩酒浸焙）

右為末水浸蒸餅丸如梧子大每服五十丸温水下食後或臨卧服

○已上數方治熱痰之劑

辰砂化痰丸（和劑方）治風化痰安神定志利咽膈清頭目

白礬（枯過別研）　辰砂（飛研各半兩）　半夏（洗七次姜汁搗作麴三兩）

南星（一兩炮）

右以白礬半夏麴天南星為末和勻生姜汁煑麵糊丸如梧桐子別用辰砂為衣每服二十丸食後姜湯下

半夏利膈丸（御藥院方）治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不利涕唾稠粘并治過酒停飲嘔逆悪心胸脇引痛腹內有聲

半夏（湯洗三兩）　白朮　白茯苓（去皮）　白礬（生）

人參（去芦）　滑石　貝母（各一兩）　白附子（生用二兩）

天南星（生用兩半）

右為末麵糊丸如梧桐子大每服三十丸食後姜湯下

葉氏分涎方（簡易方）治風痰留滯膈悶喘滿悪心涎唾不

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

利

陳皮（去白） 楝參 枳實 苦梗

半夏（洗七次令軟每个切四片姜汁浸一夕）

天南星（去皮另蒸餅包灰火煨香熟取出各等分）

右㕮咀每服二錢水一盞姜十片同煎食後服

靈砂白丸子（濟察方）治元氣虛弱痰氣上攻風痰壅塞嘔吐不已

靈砂 青州白丸子末（各一兩各研）

右為末和匀以生姜自然汁打黍米糊丸如梧桐子大每服三十丸空心人參湯或棗湯下

大人參半夏丸（宣明方）化痰墜涎止嗽定喘治諸痰不可盡述

茯苓（去皮） 人參（去芦） 天南星 薄荷葉（各半兩）

乾生姜 半夏 白礬（生） 寒水石

蛤粉（二兩） 藿香葉（二兩半）

右為麵糊丸如小豆大生姜湯下二三十丸食後溫水亦得一方加黃連半兩黃蘗一兩水丸取效愈速治酒病調和臟腑尤宜服之

治風痰不下（聖惠方）

荊芥（四兩） 白礬（生一兩） 槐角（生二兩） 陳皮

半夏（各二兩半）

右爲末水糊爲丸如梧桐子大每服四十丸生姜湯下

辰砂祛痰丸（聖惠方）治酒食過多醶醎作成痰飲聚於胸中凝則嘔逆悪心流則臂痛頭目昏眩腰脚疼痛深則左癱右瘓淺則蹶然倒地此藥神效

硃砂（一兩水飛一半入藥一半爲衣）　半夏（四兩）　槐角（炒）

陳皮　白礬（生）　荆芥（各一兩）

生姜（四兩與半夏製作餅陰乾）

右爲末姜汁打糊丸如梧桐子每服五十丸生姜湯皂角子湯任下忌動風動氣物食後温服

化痰丸（瑞竹堂方）快脾順氣化痰消食

半夏（淨洗）　皂角（切碎）　天南星（去皮膜）　生薑

白礬

右件各四兩用砂鍋內同水煑天南星無白點爲度揀去皂角不用將半夏天南星生姜切細晒乾如無日色慢火焙乾加後藥

青皮（去穰）　陳皮　乾葛　紫蘇子

神麯　麥蘗（炒）　蘿蔔子（炒另研）　山查

香附子（去毛）　杏仁（去皮尖炒另研）

一方加枳實茯苓

右十味各一兩合前藥碾末姜汁蒸餅打糊丸如梧桐子大每服五七十丸食後服臥茶酒任下

利膈化痰丸

白术（四兩）　皂角（去皮弦子三兩）　生半夏　生白礬

右將皂角揉水半碗浸半夏白礬春五夏三秋七冬十日不用皂角晒乾為末姜汁糊爲丸如梧桐子大每服三十丸姜湯下

○已上數方治風痰之劑

四七湯（和濟方）治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

半夏（五兩）　茯苓（四兩）　紫蘇（三兩）　厚朴（三兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜七片棗子一枚煎至六分熱服婦人有孕惡阻亦宜服之但半夏用姜汁製過男子因氣而小便白濁用此湯下青州白丸子有效

三仙丸（百一選方）治中脘氣滯胸膈煩滿痰涎不利頭目不清

南星（生去皮）　半夏湯洗七次二味各五兩為末用生姜自然汁和不可太軟但手捏得（聚為度攤在篩中用楮葉蓋之令發黃色晒乾收之須是五六月內做曲如醬黃法）

香附子（罨炒於磚石上磨去毛伍兩）

右為末麵糊丸如梧桐子大每服四十丸食後姜湯下

機要去香附加橘紅名玉粉丸治氣痰

沉香和中丸（秘方）治証同前

陳皮（去白）　青皮　枳殼　檳榔

木香　黃芩　青礞石（焰硝煆各半兩）

大黃（一兩一分）　沉香（二錢）　滑石（二兩）

黑牽牛（頭末二兩二錢）

右為末滴水為丸如梧子大每服五十丸茶清下臨卧

節齋化痰丸

論曰痰者病名也人之一身氣血清順則津液流通何痰之有惟夫氣血濁逆則津液不清薰蒸成聚而變為痰焉痰之本水也原於腎痰之動濕也主於脾古人用二陳湯為治痰通用者所以實脾燥濕治其標也然以之而治濕痰寒痰痰飲痰涎則固是矣若夫痰因火上肺氣不清咳嗽時作及老痰鬱痰結成粘塊凝滯喉間吐咯難出此等之痰皆因火邪炎上薰於上焦肺氣被鬱故其津液之隨氣而升者爲火薰蒸凝濁鬱結而成歲月積久根深蔕固故名老名鬱而其源則火邪也病在上焦心肺之分咽喉之間非中焦脾胃濕痰冷痰痰飲痰涎之比也故湯藥難治亦非半夏茯苓蒼朮枳殼南

星等藥所能治也惟在開其欝降其火清潤肺金而消化凝結之痰緩以治之庶可取效今製一方于后

天門冬（去心一两）　黄芩（酒炒一两）　海粉（另研一两）　瓜蔞仁（另研一两）
橘紅（一两去白）　桔梗（去芦五錢）　香附子（槌碎淡盐水浸炒五錢）
連翹（五錢）　青黛（另研二錢）　芒硝（三錢另研）

右為極細末煉蜜入生姜汁少許和藥末杵極勻丸如小龍眼大噙化一丸或嚼爛清湯細嚥之或丸為細丸如黍米大淡姜湯送下五六十丸

此等老痰大率飲酒之人多有之酒氣上升為火肺與胃脘皆受火邪故欝滯而成此方用天門冬黄芩泄肺火也海粉芒硝醎以軟堅也瓜蔞仁潤肺降痰香附米開欝降氣連翹開結降火青黛解欝火故皆不用辛燥之藥

○已上數方治欝痰老痰之劑

蘇子降氣湯（和劑方）　治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛

川當歸（去芦）　甘草（炙）　前胡（去芦）　肉桂（去皮）
厚朴（去皮姜制各二两）　半夏麯　紫蘇子（各五两）
陳皮（去白三两半）

右㕮咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎服不拘時

俞山人降氣湯（和劑方）治上盛下虛痰氣壅盛或喘或滿咽乾不利并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡（去芦） 五加皮（姜制） 黃芪 肉桂
當歸（去芦） 半夏麯 紫蘇子 陳皮（去白）
厚朴（去皮姜制一两炒各一两） 桔梗 羌活（去芦各五錢）
甘草（一两） 乾姜（炮） 附子（炮去皮） 人參（去芦各五錢）

右㕮咀每服五錢水一盞半紫蘇三葉姜三片棗一枚

前服

黑錫丹（和劑方）治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯竭及婦人血海久冷無子或赤白帶下並皆服之

肉桂（去皮半两） 沉香 附子（炮去皮臍） 葫芦巴（酒浸炒）
破故紙 茴香（舶上者炒） 肉豆蔻（麵果煨） 陽起石（研細水飛）
金鈴子（蒸去皮） 木香（各一两） 硫黃 黑錫（去滓各二两）

右用黑盞或新鉄銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並杵羅為末一處和匀自朝至暮必研令黑光色為度酒糊為丸如梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩每服四十粒空心塩姜湯下女人艾棗湯下

靈砂丹（和劑方）治上盛下虛痰涎壅塞此藥最能鎮墜升降陰陽安和五臟扶助元氣

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

水銀（一兩）　硫黃（四兩）

右用新鉄銚炒成砂有烟即以醋洒候研細入水火鼎醋調赤石脂封口鉄線扎縛晒乾鹽泥固濟用炭二十斤煆（如鼎）裂筆蘸赤石脂頻抹火盡為度經宿取出研為末糯米糊為丸如麻子大每服二十粒空心棗湯米飲人參湯任下

○廣按已上四方並係類聚溫熱之藥而出證皆云治上盛下虛氣不升降蓋謂盛者即心火之炎虛者即腎水之弱火炎水弱則有升無降故津液湧而為痰稠粘膠固凝滯於胷膈之間非金石丹藥溫熱香燥之劑而能流通開散之乎書云重可以去怯正所謂刼劑也用此刼劑之後又當用兼補兼消之藥繼之如六味地黃丸之類是也

金匱腎氣丸（即六味地黃丸）　治腎氣有飲故用此藥補腎逐水（見補損）

○廣按腎水虛弱則心火上炎以致津液敗濁而為痰涎用此劑補腎逐水乃端本之藥也前黒錫丹等劑溫脾刼痰乃治標之藥也

六君子湯　治脾虛不進飲食嘔吐痰水（方見調補脾胃）

白朮湯（按撰方）　治胃中虛損及痰吐者

半夏麯（半兩）　白朮（一錢）　檳榔（二錢半）　木香
甘草（炙各二錢）　茯苓（二錢）

右為末每服二錢生姜湯調下食前服

八味丸　治脾腎兩虛嗽唾而不咳者（方見補損）

○已上數方治虛痰之劑

○廣按痰本津液因熱而成熱則津液薰蒸而稠濁故名為痰也痰之為物隨氣升降無處不到或在臟腑或在經絡所以為病之多也若天寒痰濕痰熱痰則易治至於風痰燥痰老痰則難治也分而治焉寒則溫之濕則燥之熱則清之風則散之燥則潤之老則軟之總而治焉用人參甘草以補脾半夏白朮以燥濕陳皮青皮以利氣茯苓澤瀉以滲水是舉其綱也如寒痰加以附子姜桂濕痰加以蒼朮厚朴食積痰加以麯糵山查熱痰加以芩連梔子風痰加以南星皂角燥痰加以瓜蔞杏仁鬱痰加以枳殼香附老痰加以海石芒硝是張其目也雖然痰證又有挾虛者不可不加補藥焉如挾氣虛加以四君血虛加以四物脾虛治以六君腎虛治以六味分其表裏上下審寒熱虛實而施治之未有不中其情者

痰飲治例

出明醫雜著

王節齋曰痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣逆液濁變為痰飲或吐咯上出或凝滯胷膈或留聚腸胃或流注經絡四肢隨氣升降遍身上下無處不到其為病也爲喘爲欬為惡心嘔吐為痞隔壅塞關格異病為泄為眩暈為嘈雜怔忡驚悸為癲狂爲寒熱為痛腫或胷間轆轆有聲或背心一點常如氷冷或四肢麻痺不仁皆痰所致百病中多有兼痰者世所不知也痰有新久輕重之殊新而輕者形色清白稀薄氣味亦淡久而重者黃濁稠粘凝結欬之難出漸成惡味酸辣腥臊鹹苦甚至帶血而出治法痰生於脾胃宜實脾燥濕又隨氣而升宜順氣為先分導次之又氣升屬火順氣在於降火熱痰則清之濕痰則燥之風痰則散之鬱痰則開之頑痰則軟之食積痰則消之在上者吐之在中者下之又中氣虛者宜固中氣以運痰若攻之太重則胃氣虛而痰愈盛矣

主方二陳湯

橘紅　半夏（湯泡）　白茯苓　甘草

生姜

右方摠治一身之痰如要下行加引下藥上行加引上藥

濕痰多軟如身體倦怠之類加蒼术白术

寒痰痞塞胷中倍加半夏甚者加麻黄細辛烏頭之
類痰厥頭痛亦加半夏

風痰加南星枳殼白附子天麻姜蚕猪牙皂角之類
氣虚者更加竹瀝氣實加荊瀝俱用姜汁

熱痰加黄芩黄連痰因火盛逆上降火為先加白术
黄芩軟石膏黄連之類眩運嘈雜者火動其痰也
亦加山梔黄連黄芩

血虚有痰者加天門冬知母瓜蔞仁香附米竹瀝姜
汁　滯血者更加黄芩白芍藥桑白皮　血滯不
中行焦有飲者取竹瀝加生姜韮菜自然汁吃三
五銀盞必胷中燥煩不寧後愈

氣虚有痰者加人參白术　脾虚者宜補中虚以運
痰降下加白术白芍藥神麯麥芽兼用升麻提起
　内傷挾痰加人參黄耆白术之類姜汁傳送或
加竹瀝尤妙

食積痰加神麯麥芽山楂炒黄連枳實以消之甚者
必用攻之宜丸藥兼血虚者用補血藥送下中焦
有痰者食積也胃氣亦賴所養卒不便虚若攻之
盡則虚矣

老痰用海石半夏瓜蔞仁香附米連翹之類五倍子佐他藥大治頑痰宜丸藥　喉中有物咯不出嚥不下此痰結也用藥化之加醎藥軟堅之類宜瓜蔞仁杏仁海石桔梗連翹香附少佐朴硝姜汁煉蜜和丸噙服之脉脉濇者卒難開必費調理氣實痰熱結者吐難得出或成塊吐咯不出氣滯者難

治

痰在膈上必用吐法瀉之不去　膠固稠濁者必用吐脉浮者宜吐痰在經絡間非吐不可吐中就有發散之義凡用吐藥宜升提其氣便吐　如防風川芎桔梗　茶生姜韭汁之類或瓜蒂散凡吐用布紮勒肚於不通風處行走

痰在腸胃間可下而愈枳實甘遂巴豆大黃芒硝之類凡痰用利藥過多脾氣易虛則痰易生而多

痰在脇下非白芥子不能達

痰在皮裏膜外非姜汁竹瀝不可及在四肢非竹瀝不開在經絡中亦用竹瀝必佐以生姜韭汁膈間有痰或顛狂或健忘或風痰俱用竹瀝與荊瀝同功氣虛少食用竹瀝氣實能食用荊瀝

凡人身上中下有塊是痰也問其平日好食何物吐

下後方用藥

凡人頭面頸頰身中有結核不痛不紅不作膿者皆痰注也宜隨處用藥消之

滾痰丸攻瀉腸胃痰積及小兒食積痰急驚風痰盛者最為要藥常宜合備但須量人虛實而用之

〇痰熱（新增）

附諸賢論

劉宗厚曰夫痰熱之原有因熱而生痰者有因痰而生熱者蓋因熱而生痰者熱則薰蒸津液而成痰因痰而生熱者痰則阻碍氣道而生熱夫熱生痰而痰生熱始終新久之謂也

附諸方

四神丸（經驗良方）治痰涎壅盛頭首昏眩肩背拘急手足頑麻

天麻（大者）　南星（各湯洗）　防風（去芦各一兩）　薄荷葉（半兩）

右為末酒糊為丸如菉豆大每服二十丸荊芥生姜湯下食後

龍星丹　治諸風熱壅痰盛

解毒雄黃丸　治上膈壅熱痰涎不利（並見中風）

鵬砂散（和劑方）治大人小兒風痰熱毒喉閉生蒼鼻衄出

血

山藥六斤生　腦子七兩（另研）　牙硝十四兩　甘草二十兩

射香四兩（研）　鵬砂二十兩（生另研）

右爲末每服半錢好茶點服

上清丸　治膈間痰熱口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽喘滿煩燥不寧（見風熱）　丁集

丹溪心法

哮喘二十八

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

○哮喘必用薄滋味專主於痰宜大吐藥中多用醋不用涼藥須常帶表散此寒包熱也亦有虛而不可吐者一法用二陳湯加蒼朮黃芩作湯下小胃丹看虛實用

入方　治寒包熱而喘

半夏　枳殼（炒）　桔梗　片芩（炒）

紫蘇　麻黃　杏仁　甘草

右水煎服　天寒加桂枝

治哮治積方

用雞子一箇略敲殼損膜不損浸尿缸內三四日夜取出煮熟喫之效盖雞子能去風痰

紫金丹　治哮須三年後可用

用精猪肉二十兩一酢（三十）切作骰子塊用信一兩明者研極細末拌在肉上令勻分作（六分）用紙筋黃泥包之用火烘令泥乾却用白炭火於無人處煅青烟出盡為度取放地上一宿出火毒研細以湯浸蒸餅丸如菉豆大食前茶湯下大人二十丸小兒七八丸量大小虛實與之

喘　二十九

丁集

丹溪心法

○喘病　氣虛　陰虛　有痰　凡久痰之証未發宜扶正氣為主已發用攻邪為主　氣虛短氣而喘甚不可用苦寒之藥火氣盛故也宜導痰湯加千緡湯有痰亦短氣而喘　陰虛自小腹下火起衝於上喘者宜降心火補陰

有火炎者宜降心火清肺金　有痰者用降痰下氣為主　上氣喘而躁者為肺脹欲作風水証宜發汗則愈

有喘急風痰上逆者大全方千緡湯佳或導痰湯加千緡湯　有陰虛挾痰喘者四物湯加枳殼半夏補陰降火

諸喘不止者用刼藥一二服則止刼之後因痰治痰因火

治火劫藥以椒目研極細末一二錢生姜湯調下止之氣虛不用　又法蘿蔔子蒸熟為君皂角燒灰等分為末生姜汁煉蜜丸如小豆大服五七十丸噙化止之　氣虛者用人參蜜炙黃柏麥門冬地骨皮之類　氣實人因服則氏過多而喘者用三拗湯以瀉氣　若喘者須用阿膠若久病氣虛而發喘宜阿膠人參五味子以補之　若新病氣實而發喘者宜桑白皮苦葶藶瀉之

戴云有痰喘有氣急喘有胃虛喘有火炎上喘痰喘者凡喘便有痰聲氣急喘者呼吸急促而無痰聲有胃氣虛喘者擡肩擷項喘而不休火炎上喘者乍進乍退得食則減食已則喘大槩胃中有實火膈上有稠痰得食入咽墜下稠痰喘即止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反大作俗不知此作胃虛治以燥熱之藥者以火濟火也葉都督患此諸醫作胃虛治之不愈後以導水丸利五六次而安

入方

痰喘方

南星　半夏　杏仁　瓜蔞仁
香附　陳皮（去白）　皂角炭　蘿蔔子

右為末神麯糊丸每服六七十丸姜湯下

又方

蘿蔔子（半兩蒸） 皂角（半兩） 海粉（一兩） 南星（一兩）

白礬（一錢半薑汁浸）

右用瓜蔞仁薑蜜丸噙化

劫喘藥

好銅青（研細） 虢丹（少許炒赤色）

右為末每服半錢醋調空心服

附諸賢論

王節齋曰喘與脹二症相因必皆小便不利喘則必生脹脹則必生喘但要識得標本先後先喘而後脹者主於肺先脹而後喘者主於脾何則肺金司降外主皮毛經曰肺朝百脉通調水道下輸膀胱又曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由於肺氣之降下而輸化也若肺受邪而上喘則失降下之令故小便漸短以致水溢皮膚而生腫滿焉此則喘為本而腫為標治當清金降氣為主而行水次之脾土惡濕外主肌肉土能剋水若脾土受傷不能制水則水濕妄行浸漬肌肉水既上溢則邪反浸肺氣不得降而生喘矣此則腫為本而喘為標治當實脾行水為主而清金次之苟肺症而用燥脾之藥則金得燥而喘愈加脾病而用清

金之藥則脾得寒而脹愈甚矣近世治喘脹者但知實脾行水而不知分別肺脾二症予故為發明之

附脉理

袖珍方論曰凡此證脉滑而手足温者生脉濇而四肢寒者死

附諸方

三拗湯（和劑方）治感胃風寒鼻塞聲重語音不出咳嗽喘急

生甘草　麻黃（不去節）　杏仁（不去皮尖）（各等分）

右㕮咀每服五錢水一盞姜五片煎服以得汗為度

華蓋散（和劑方）治風寒冷濕之氣傷於肺經上氣喘促不得睡臥或聲音不出者

小青龍湯（和劑方）治感寒咳嗽喘急不得睡臥

蘇沉九寶湯（簡易方）治老人小兒素有喘急遇寒暄不常發則連綿不已咳嗽哮吼夜不得睡（並見咳嗽）

分氣紫蘇散（和劑方）治脾胃不和氣逆喘促

五味子（去梗）　桑白皮　茯苓（去皮）　甘草（炙）

草菓仁　大腹皮　陳皮（去白）　桔梗（各二兩）

右㕮咀稱二兩入淨紫蘇一兩五錢搗碎同一處拌勻

每服四錢水一盞姜三片入鹽少許同煎空心服

紫蘇子湯（濟生方） 治因憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹及喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛數而濇（見氣滯）

杏仁半夏湯（宣明方） 治肺氣不足喘咳嗽不已并傷寒往來寒熱

杏仁（去皮） 桔梗 陳皮（去白） 茯苓（去皮）
漢防已 桑白皮 白礬（各二錢） 猪牙皂角
薄荷葉（各一錢） 甘草（二寸）

右為末作二服水一盞生姜三片煎至六分食後溫服

葶藶散（濟生方） 治過食煎煿或飲酒過度致肺壅喘不得安臥及肺癰咽燥不渴濁唾腥臭

甜葶藶（炒） 桔梗（去芦） 瓜蔞仁 川升麻
薏苡仁 桑白皮（炙） 葛根（各一兩） 甘草（炙五錢）

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓食後溫服

定肺湯（直指方） 治上氣喘嗽

紫菀 五味子 橘皮（去白） 甘草（炙）
紫蘇子（炒） 杏仁（去皮尖炒） 桑白皮（炒） 半夏（製）
枳殼（麩炒等分）

右㕮咀每服一兩生姜五片紫蘇五葉水二盞煎至一

盞食後溫服

○已上數方攻邪之劑

人參潤肺湯（宣明方）治肺氣不足喘急咳嗽不已往來寒熱自汗（見咳嗽）

蘇子降氣湯（和劑方）治虛陽上攻喘促咳嗽（見痰類）

杏蘇飲（直指方）治上氣喘嗽浮腫

紫蘇葉（二兩）　五味子　大腹皮　烏梅（去核）

杏仁（去皮尖炒各半兩）　陳皮（去白）　桔梗

麻黃（去節）　桑白皮（炒）　阿膠（炒各七錢半）　紫菀

甘草（各一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓食後溫服

玉華散（直指方）治咳嗽上喘調順肺金清利咽膈安和神氣

甜葶藶（焙）　桑白皮（炒）　天門冬（去心）　馬兜鈴

半夏（製）　紫菀　杏仁（去皮尖）　貝母（炮）

百合　人參（各五錢）　百部　甘草（炙各二錢半）

右㕮咀每服一兩水二盞生姜四片棗子三枚煎至一盞去滓食後溫服一方無生姜煎

杏參散（秘方）治胷膈脹滿上氣喘急咳嗽倚息睡臥不得

（見咳嗽）

○已上數方半攻半補之劑

神秘湯（三因方）治上氣喘急不得卧者

橘皮（去白）　桔梗　紫蘇　五味子

人參（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分食後服

知母茯苓湯（宣明方）治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

（見肺痿類）

五味子湯（活人方）治喘促脉伏而數者

五味子（半兩）　人參　麥門冬（去心）　杏仁（去皮尖）

生姜　陳皮（各一錢半）　棗子（三枚）

右㕮咀作二服每服水二盞煎至一盞食後温服

寧肺湯（楊氏家藏方）治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾稠黏（見咳嗽）

人參保肺湯　治五勞七傷喘氣不接（見發熱）

○已上數方補虛之劑

人參理肺散（拔粹方）治喘不止

麻黄（去節炒黄色）　木香（各一兩）　罌粟殼（炙三兩）　人參（二兩）

杏仁（三兩麩炒）　當歸（一兩）

右㕮咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣食後温服

紫參散（拔粹方）治形寒飲冷傷肺喘促痰涎不得安卧

麻黄　桔梗　五味子　甘草（炙）

紫參（各一两）　罌粟殼（二两蜜炒黄色）

右㕮咀每服一两水一盞半煎至八分温服食後

〇已上二方止澁之劑

悪心　三十

丁集

丹溪心法

〇悪心有痰　有熱　有虚　皆用生薑隨證佐藥

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

戴云悪心者無聲無物心中欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰悪心實非心經之病皆在胃口上宜用生姜盖能開胃豁痰也

附諸方

大半夏湯

半夏　陳皮　茯苓（各二錢半）

右㕮咀水二盞生姜二錢半煎八分食後服

小半夏茯苓湯

半夏（五两）　茯苓（三两）

右㕮咀每服八錢用水一盞半煎至一盞入生姜自然

汁投藥中再煎一二沸熱服無時　或用生姜半兩同煎

加味二陳湯

半夏　橘紅　茯苓　甘草（炙）

黃連（姜汁炒）　黃芩（姜汁炒各一錢半）

右作一服水二鍾姜五片煎八分溫服

加味生姜理中湯

人參　白朮　生姜　甘草（炙）

半夏　陳皮（各等分）

右水煎服

丹溪心法

○凡有聲有物謂之嘔吐　有聲無物謂之噦　胃中有熱膈上有痰者二陳湯加炒山梔黃連生姜　有久病嘔者胃虛不納穀也用人參生姜黃芪白朮香附之類　嘔吐朱奉議以半夏橘皮生姜爲主　劉河間謂嘔者火氣炎上此特一端耳　有痰膈中焦食不得下者　有氣逆者有寒氣鬱於胃口者　有食滯心肺之分而新食不得下

而反出者　有胃中有火與痰而嘔者　嘔吐藥忌瓜蔞

杏仁桃仁蘿蔔子山梔皆要吐丸藥帶香藥行散不妨注

船大吐渴飲水者即死童便飲之最妙

附脉理

脉訣舉要曰滑數爲嘔代者霍乱微滑者生濇数凶断

附諸方

香薷飲（和剂方）治伏暑而嘔（見中暑）

四君子湯（拔粹方）治久病胃虛而嘔

茯苓　白术　人參　黄芪（各二两）

右㕮咀每服一两水二盞姜伍片煎一盞去滓温服

錢氏白术散　治症同前（見痢類）

加味理中湯（和劑方）治胃感寒嘔吐不止

人參　白术　乾姜（炮）　甘草（炙各一錢）

丁香（十粒）

右㕮咀生姜十片水煎服

大藿香散（濟生方）治七情傷感氣鬱于中變成嘔吐或作寒熱眩暈痞滿不進飲食

藿香葉（洗去土）　半夏　白术　人參（去芦）

木香（不見火各一两）　茯苓（去皮）　桔梗（去芦剉細）　枇杷葉（制去毛）

橘皮　甘草（炙各半两）

右爲末每服五錢水一盞姜五片煎六分温服棗一枚

養胃湯（徐氏方）治脾胃虛冷不思飲食嘔吐翻胃

白豆蔻仁　人參　丁香　宿砂仁

内豆蔻　附子（炮）　甘草　沉香

橘紅　麥芽　神麯（各二錢半）

右爲細末每服二錢姜塩湯下

旋覆花湯（濟生方）治中脘伏痰吐逆眩暈

旋覆花（去梗）　半夏（湯泡七次）　橘紅　乾姜（炮各一兩）

梹榔　人參（去芦）　甘草（炙）　白术（各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎服不拘時

加味二陳湯　治停痰結氣而嘔

半夏　橘紅（各五兩）　白茯苓（三兩）　甘草（炙一兩半）

砂仁（一兩）　丁香（五錢）　生姜（二兩）

右水煎服

藿香養胃湯（御藥院方）治嘔吐不已

藿香葉（一兩）　半夏（二兩湯洗焙）　陳皮（一兩去白）　甘草（二兩）

厚朴（二兩姜製）　蒼术（三兩米泔浸）

右爲粗末每服五錢水一盞半生姜五片棗一枚同煎

去滓温服

生姜橘皮湯（活人方）治乾嘔噦或致手足厥冷

橘皮（四兩）　生姜（半斤）

右㕮咀水七盞煮至三盞去滓逐旋温服

濟生竹茹湯　治熱嘔或因飲酒過度而嘔者

葛根　半夏（湯泡七次二兩）　甘草（炙一兩）

右㕮咀每四錢水一盞入竹茹一小塊姜五片煎服

小柴胡加竹茹湯　治發熱而嘔

柴胡（二錢）　半夏（湯洗一錢）　黄芩　人參

甘草（炙各七分半）　竹茹（一塊）　橘皮（一錢）

右㕮咀水一盞生姜七片煎煞六分温服

三一承氣湯宣明方治嘔吐水漿不入食即吐大便秘或利而不鬆快時覺腹痛滿者或下利赤白而嘔吐食不下者或大小腸膀胱結而不通上爲嘔吐隔食前藥入硝細細啜服

○廣按三因方言嘔吐證忌用利藥此言其常然大小腸膀胱熱結而不通上作嘔吐隔食若不用利藥開通發泄則嘔吐何由而止或只嘔吐而大小便不秘澁者此利藥又當所忌也（三承氣湯見温熱類）

吐蟲而嘔方

黑鉛炒成灰檳榔末等分米飲調下

欬逆三十二

丁集

丹溪心法

○欬逆有痰　氣虛　陰火　視其有餘不足治之其詳在格致餘論不足者人參白朮湯下大補丸　有餘并有痰者吐之人參蘆之類痰碍氣而吃逆者用蜜少吐此乃燥痰不出　痰者陳皮半夏　氣虛人參白朮陰火黃連黃栢滑石　欬逆自痢者滑石甘草炒黃栢白芍人參白朮陳皮加竹瀝服

戴云吃逆者因痰與熱胃火者極多

附諸方

半夏生姜湯　治咳逆欲死

半夏一（兩二錢半）　生姜一（兩）

右以水二盞煎八分去滓分作二服

柿蔕湯（濟生方）治胃膈痞滿咳逆不止

柿蔕　丁香（各一兩）

右㕮咀每服三錢水一盞姜五片煎服

羌活附子散（濟生方）治吐利後胃寒咳逆

羌活　附子（炮去皮）　茴香（炒各五錢）　乾姜（炮）

木香（各一兩）　棗少許

右㕮咀每服二錢水一盞鹽少許煎至半盞溫服不拘時一方去木香用丁香三因方二香並用

橘皮湯（濟生方）治吐利後胃虛膈熱而咳逆者

橘皮（去白二兩） 人參 甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞竹茹一小塊生姜五片棗二枚煎七分溫服不拘時

○廣按欬逆之症乃胃火熬薰津液成痰凝滯於胷膈之間阻碍氣道所以咳逆也已上二方治吐利後胃寒胃熱咳逆然吐利後胃熱咳逆者常多而胃寒咳逆者千百中而一二也

人參白朮湯

人參 黃芩 柴胡 乾姜

梔子仁 甘草（炙各半兩） 白朮 防風

半夏（炮七次） 五味子

右㕮咀每服四錢姜三片煎

桂苓白朮散（宣明方）消痰止咳逆散痞塞開堅結痛悶進飲食調和臟腑

揀桂 乾生姜（各二錢半） 茯苓（去皮） 半夏（各一兩）

白朮 陳皮（去白） 澤瀉（各半兩）

右為末麵糊丸如小豆生姜湯下二三十丸日三服病

在上食後病在下食前在中不拘時一方加黄連半两黄栢二两水丸取效愈妙

灸法　見温熱

大補丸　見補損

丁集

翻胃（三十三）

丹溪心法

○翻胃大約有四　血虚　氣虚　有熱　有痰兼病必用童便韭汁竹瀝牛羊乳生姜汁・　氣虚入四君子湯右手脉無力　血虚入四物湯加童便左手脉無力　切不可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味　治反胃用黄連三錢生姜汁浸炒山查肉二錢保和丸二錢同為末糊丸如麻子大胭脂為衣人參湯入竹瀝再煎一沸下六十丸　有痰二陳湯為主寸關脉沉或伏而大　有氣結宜開滯導氣之藥寸關脉沉而濇　有内虚陰火上炎而反胃者作陰火治之　年少者四物湯清胃脘血燥不潤便故濇格致餘論甚詳　年老雖不治亦用參术關防氣虚胃虚　氣虚者四君子湯加蘆根童便或參苓白术散或韭汁牛羊乳或入駮駁尿　又有積血停於内而致當消息

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

逐之大便澁者難治常令食兎肉則便利　翻胃即膈噎膈噎乃翻胃之漸　發揮備言　年高者不治　糞如羊屎者斷不可治大腸無血故也

戴云翻胃血虛者脉必數而無力氣虛者脉必緩而無力氣血俱虛者則口中多出沫但見沫大出者必死有熱者脉數而有力有痰者脉滑數二者可治血虛者四物為主氣虛者四君子為主熱以解毒為主痰以二陳為主

入方

用馬剝兒燒灰存性一錢好棗肉平胃散二錢

右和勻温酒調服食即可下然後隨病源調理

又方

茱萸　黃連　貝母　瓜蔞

牛轉草

治翻胃

韮菜汁二兩牛乳一盞

右用生姜汁半兩和勻温服效

治翻胃積飲通用

益元散生姜自然汁澄白脚丸小丸子時時服

温清丸　治翻胃伐肝邪

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

乾姜（一兩） 滑石 甘草（各二兩）

右為末丸服

附諸方

撞氣阿魏丸（和劑方） 治五種噎疾九般心痛痃癖氣塊腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣並治之（見諸氣）

木香通氣飲子（御藥院方） 治一切氣噎塞痰飲不下

青皮（去穰） 木香 蓬莪朮 檳榔

陳皮（去白） 蘿蔔子（炒各五錢） 藿香葉（一兩） 甘草（炙）

人參（去蘆） 枳殼（各五錢） 香白芷（二錢半）

右爲末每服五錢水二盞煎八分溫服

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

瓜蔞實丸（濟生方） 治胸痞痛徹背脇喘急妨悶膈噎翻胃

方見痞類

人參利膈丸（拔粹方） 治胸中不利痰咳喘滿和脾胃壅滯推陳致新治膈氣聖藥

木香 檳榔（七錢半） 人參 當歸

藿香 甘草 枳實（各一兩） 大黃（酒浸）

厚朴（姜製一兩）

右為末滴水為丸梧桐子大每服五十丸溫水送下

棗肉平胃散 開胃進食

厚朴（姜制） 陳皮（去白各三斤二兩） 甘草（炙）

紅棗　生薑（各二斤）　蒼朮（泔浸一宿炒五斤）

一方加茯苓人參

右剉拌勻以水浸過面上半寸許煮乾焙燥為末每服二錢鹽湯空心點服

保和丸　消食開胃（見積聚）

寬中進食丸　滋形氣喜飲食

道宗純陽丹　治痰涎聚於中脘不能傳導（並見調補脾胃）

○已上數方消導之劑

白朮和胃丸　治脾胃虛弱不能運化

和中散　同前

八珍湯　同前

參苓白朮散　同前　俱見調補脾胃

○已上數方補虛之劑

燒針丸　此藥清鎮專主吐逆

黃丹（不以多少）

右研細用去皮小棗肉丸如雞頭子大每用一丸針簽於燈上燒灰為末乳汁下

神仙奪命丹　專治噎食

烏梅（十三箇水浸去核）　硇砂（二錢）　雄黃（二錢）

乳香（一錢）　百草霜（五錢）　菉豆　黑豆（各四十九粒）

右將烏梅杵爛前藥并豆為末入梅再擣和匀丸如彈子大以乳香少加硃砂為衣陰乾每服一丸空心噙化待藥盡烙熟餅一箇擘碎入熱茶泡食之無碍為驗過三五日依法再服一丸即愈極有神效

治膈氣經驗方

用大鯽魚自死者活者不效剖去腸留鱗用大蒜去皮薄切片填之魚腹内仍合魚用濕紙包定次用麻縛之又用熟黄泥厚厚固日微乾炭火慢慢煨熟取出去鱗刺骨用平胃散杵丸如梧桐子大日晒乾甁收勿令泄氣每服空心米飲下三十丸

槿花散　治翻胃

以千葉白槿花陰乾為末陳米湯調下三五口不轉再服

一方　治轉食

用翻翅雞一隻煮熟去骨入人參當歸鹽各五錢爲細末再煮取與食之勿令人共食

一方　治翻胃不問新久冷熱二症

用虎脂半斤切如豆大用清油一斤甁浸虎脂一月厚綿紙封口勿令氣泄每用清油一兩入無灰好酒一大鍾調匀不拘時温服服盡病減其虎脂再添油再浸

再可活二人若一時無𧆞脂只用硃子硫黃細研半兩水銀二錢半入硫黃末研至無水銀星再研如墨煤色每服三錢生姜四兩取自然汁入好濃酒一鍾盪熱調空心服厚衾蓋覆當自足趾間汗出遍身皆汗透吐當立止不止再服此藥輕浮難調須先滴酒少許以指緩緩研之旋添酒調

一方　治噎食

用碓觜上細糠蜜丸如弾子大每服一丸噙化津液嚥下

一方

用白麪二斤半蒸作大饅頭一箇頂上開口取空將皂礬裝滿用新瓦四圍遮護饅頭塩泥封固却空土窰安放以文武火燒一晝夜候紅色取出研爲細末棗肉丸如梧桐子大每服二十丸空心酒湯任下忌酒色

○已上数方專治之劑

四君子湯

四物湯　俱見補損

二陳湯　見痰類

○廣按膈噎翻胃之証因火而成其來有漸病源不一有因思慮過度而動脾火者有因忿怒過度而動肝

火者有因久食煎炒而生胃火者有因淫慾忘反而起腎火者蓋火氣炎上薰蒸津液成痰初則痰火未結咽膈乾燥飲食不得流利爲膈爲噎久則痰火已結胃之上脘不開飲食雖進停滯膈間須臾便出謂之嘔吐至於胃之下脘不開飲食雖進停滯胃中良久方出謂之翻胃丹溪云年高者不治蓋少年氣血未虛用藥刼去痰火病不復生老年氣血已虛用藥刼去痰火雖得暫愈其病復作所以然者氣虛則不能運化而生痰血虛則不能滋潤而生火故也丹溪又云此証切切不可用香燥之藥若服之必死宜薄滋味其局方尤用香燥之藥豈合宜乎夫証屬熱燥固不宜用香燥之藥又香散氣燥耗血而滋味助火而生痰也謬用霞天膏加於補虛藥中以治此証者一人則吐瀉以去積血一人則吐瀉以去積痰俱獲病安思食而彼二人俱不能節戒隨啖肥甘終不能免殊不知此証挾虛雖云病去而脾胃尚弱肥甘難化故病復也噫嘗得此証者不可知所謹哉知所懼哉若用霞天膏吐瀉後宜用人參煉膏補之

霞天膏（見倒倉法）　人參膏（見駐顏）

嘈雜 三十四

丹溪心法

○嘈雜是痰因火動治痰為先姜炒黃連入痰藥用炒山梔子黃芩為君南星半夏陳皮為佐熱多加青黛　嘈雜此乃食鬱有熱炒梔子姜[illegible]黃連不可無　肥人嘈雜二陳湯少加撫芎蒼朮白朮炒山梔子　嘈雜若濕痰氣鬱不喜食三補丸加蒼朮倍香附子　醫按蔣氏子條云心嘈索食白朮黃連陳皮作丸白湯下七八十丸數服而止

又云眩運嘈雜是火動其痰二陳湯加梔子芩連之類

戴云此則俗謂之心嘈也

二補丸　見補損

二陳湯　見痰類

關格 三十五

丁集

丹溪心法

○關格必用吐提其氣之橫格不必在出痰也　有痰宜吐者二陳湯吐之吐中便有降　有中氣虛不運者補氣藥中升降　寒在上熱在下脉兩手寸俱盛四倍以上

戴云關格者謂膈中覺有所得欲升不升欲降不降欲食不食此爲氣之橫格也

癭氣（三十六）

丹溪心法

○癭氣先須断厚味

入方

海藻（兩）　黃連（二兩一云黃栢又云黃藥）

右為末以少許置掌中時時舐之津嚥下如消三分之二止後服

附諸方

海帶丸　治癭氣久不消者

海帶　貝母　青皮　陳皮

右各等分為末煉蜜丸如弾子大每服一丸食後噙化

一方

海藻　海帶　昆布（各一兩）　廣茂

青鹽（各半兩）

右為末煉蜜丸如弾子大每服一丸食後噙化

破結散（濟生方）　治石癭氣癭筋癭血癭肉癭等證

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

海藻（洗）　龍膽草　海蛤　通草

昆布（洗）　礬石　松蘿（各七錢）　麥麴（一兩）

半夏（湯洗七次）　貝母（去心各三錢）

右為末每服二錢酒服忌甘草鯽魚鷄肉五辛生菓等物

丹溪心法

○結核或在項在胵在臂在身如腫毒者多是濕痰流注作核不散

入方　治耳後項各一塊

姜蚕（炒）　酒大黄　青黛　牛膽南星

右為末蜜丸噙化

又方　治項顆下生痰核

二陳湯　大黄　連翹　桔梗

柴胡

右以水煎食後服

又方　治臂核作痛

二陳湯加連翹　防風　川芎

皂角刺　蒼朮　酒黄芩

右以水煎服

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之九終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之十　　戊集

痰熱門

痓　三十七

丹溪心法

○痓切不可作風治兼用風藥　大率與癇病相似比癇爲甚爲虛宜帶補　多是氣虛有火兼痰宜用人參竹瀝

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之類

附論

○廣按痓症發作則通身而戰棹皆因氣虛挾痰火所致正猶火炎而旋轉也火能燥物而使氣液之不足世人不諳誤認為風而用風藥風能勝湿是不足之中而又見損也玉匱金鑰曰休治風休治燥治了火時風燥了未火為風燥之本能治其火則是散風而潤燥何風燥之有哉此痓症所以宜補氣液而兼散痰火也

癎　三十八

戈集

丹溪心法

○驚與痰宜吐　大率行痰為主用黃連南星瓜蔞半夏尋火尋痰分多分少治之無不愈者　分痰與熱　有熱者以凉藥清其心　有痰者必用吐藥吐後用東垣安神丸　大法宜吐吐後用平肝之劑青黛柴胡川芎之類龍會丸正宜服之　且如癎因驚而得驚則神不守舍舍空而痰聚也

戴云癇者俗曰猪癲風者是也

附脉理

脉訣舉要曰顛癇之脉浮洪大長滑大堅疾痰蓄心狂

附諸方

通泄散　治風涎暴作氣塞倒仆

苦丁香（為末三錢）

右加輕粉一字水半合調勻灌之良久涎自出如未出含砂糖一塊下咽涎出

墜痰丸　治風癇

天南星（九蒸九晒）

右為末姜汁糊為丸如梧桐子大每服二十丸人參湯菖蒲麥門冬湯任下

一方　治遠年近日風癇心恙風狂中風涎潮牙關不開破傷風搐者用皂角不蛀肥者一斤去皮弦切碎以酸漿水一碗浸春秋三四日夏一二日冬七日揉去滓將汁入銀器或砂鍋慢火熬以槐柳枝攪成膏取出攤厚紙上陰乾收頓用時取手掌大一片以温漿水化在盞內用竹筒灌入病人鼻孔內良久涎出為驗欲涎止服温塩湯一二口便止忌雞魚生硬温麪等物

五癇丸（楊氏方）　治顛癇發作不問新久並宜服之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

全蝎（去毒炒二錢）　皂角（四兩搥碎水半升將汁與白礬一同熬乾）　半夏（湯泡七次二兩）

南星（炮一兩）　烏蛇（一兩酒浸一夕去骨焙乾）　白附子（炮半兩）

雄黃（一錢半另研）　白礬（一兩）　蜈蚣（半條去頭足用）　朱砂（二錢半另研）

麝香（三錢另研）　白姜蚕（一兩半炒去系）

右為末姜汁麥麵糊丸如梧桐子大每三十丸姜湯下

控涎丹（濟生方）　治諸癎久不愈者頑涎結聚變生諸症並宜治之

全蝎（二錢去毒）　鉄粉（二錢）　甘遂（二錢半）　半夏

生川烏（去皮）　姜蚕（三味不炒剉碎生姜汁浸一夕各半兩）

右為末姜汁打糊丸如菉豆大硃砂為衣每服十五丸食後姜湯下忌甘草

遂心丹　治風疾癲癇婦人心風血邪

甘遂（一錢堅實不蛀者）

右為末用豬心取管血三條和甘遂末將心批作兩邊甘遂末入在內令線縛定外用皮紙裹慢火煨熟不可焦取末細研入辰砂末一錢和勻分作四丸每服一丸將煨豬心煎湯化下大便下惡物為効

鬱金丹　治癎疾

川芎（二兩）　防風　鬱金　豬牙皂角

明礬（各一兩）　蜈蚣（黄脚赤脚各一條）

右爲細末蒸餅丸如梧桐子大空心茶清下十五丸

追風丹　治風癇及破傷風瘖風

川芎（二两）　細辛（六錢）　半夏（湯泡七次）　桔梗

附子（炮去皮臍）　薄荷葉　川烏　白附子（各二两）

魚鰾　人參（去芦）　硃砂（另研各六錢）

白花蛇（酒浸去皮骨取淨肉焙乾）　射香（淨四錢另研）　南星（三錢）

蜈蚣（四條金頭赤足酒炙黄色）　大蝎尾（去鈎二錢生用）

右爲末生姜汁和劑爲錠每服一錠温酒化下以汗出為度

引神歸舍丹　百一選方　治心氣不足并治心風

附子（一箇重七錢以上者炮去皮臍）　朱砂（一两水飛）

大天南星（享去皮取二两生用）

右爲末用猪心血并麪糊爲丸如梧桐子大煎萱草根湯下子午之交各一服止五十丸

驚氣丸　和劑方　治心受風邪涎潮昏塞牙關緊閉醒則精神若癡及驚憂積氣並皆治之

紫蘇子（二两）　附子（去皮臍半两）　天麻（去苗半两）　橘紅（二两）一

白姜蚕（炒下两）　麻黄（去根節半两）　南木香（一两）　硃砂（研一錢半為末）

南星（浸洗薄切姜汁浸一夕半两）　白花蛇（酒浸炙熟去皮骨半两）

乾蝎（去針尾毒微炒一錢）

右為末入腦射少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每服一丸用金錢薄荷湯化下或溫酒化下亦可

○廣按癇症病本痰熱宜用辛寒之劑治之已上三方皆用附子何也蓋癇　痰結於心胷之間每遇大動則發非附子熱性走而不守而能流通結滯開散頑痰可乎此從治之法乃劫劑也不得已而用之亦猶中風之證本風火陽邪而用烏附類也丹溪前條云癇症尋火尋痰分多分少則此三方只宜施之於肥白多痰之人用諸藥而不效者若夫黑瘦多火之人不宜用也

追風祛痰丸　治諸風癇暗風

防風　天麻　殭蚕（炒去絲嘴）　白附子（煨各一兩）

全蝎（去毒炒）　木香（各半兩）　硃砂（另為衣七錢半）

猪牙皂角（炒一兩）　白礬（枯半兩）

半夏（湯泡七次焙為末秤六兩分作二分一分用生姜汁作麯一分用皂角漿作麯）

南星（三兩剉一半化白礬水浸一半皂角漿各一宿）

右為細末姜糊為丸如梧桐子大每服七八十丸食遠臨卧用淡姜湯或薄荷湯下

○廣按此方用藥之當製藥之精無過不及用之豈有不效者

○已上數方温脾化痰之劑

鎮心丹　治諸癇

好辰砂（不拘多少）

右爲細末豬心血和勻以蒸餅裹劑蒸熟取出丸如梧桐子大每服一丸食後臨卧人參湯下

參砂丸　治風癇

人參　蛤粉　硃砂（各等分）

右三味爲細末豬心血爲丸如梧桐子大每服三十丸食遠金銀薄荷湯下

歸神丹　治癲癇諸疾驚悸神不守舍

顆塊硃砂二兩（豬心內酒蒸）　金箔二十片　白茯苓

酸棗仁　羅參　當歸（各二兩）　銀箔二十片

琥珀　遠志（姜製）　龍齒（各一兩）

右為細末酒煑糊為丸如梧桐子大每服二三十丸麥門冬湯下炒酸棗仁湯亦可

寧神丹　清熱養氣血不時潮作者可服

天麻　人參　陳皮　白术

歸身　茯神　荊芥　殭蚕（炒）

獨活　遠志（去心）　犀角　麥門冬（去心）

酸棗仁（炒）　辰砂（各五錢另研）　半夏　南星

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

石膏（各一两） 甘草（炙） 白附子 川芎

鬱金 牛黄（各三錢） 珍珠（三錢） 生苄

黄連（各五錢） 金箔（三十片）

右為末酒糊丸每服五十丸白湯下

牛黄清心丸（和劑方）治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少睡常發狂癲言語錯乱（見中風）

六珍丹（三因方）治風癇卒然暈倒或作牛吼馬嘶雞鳴羊叫猪呼犬吠腑臓相引氣争掣縱吐沫流涎久而方醒

通明雄黄 葉子雄黄 未鑽真珠（各一两）

丹砂（半两） 水銀（一两半） 黒鉛（一两熬成屑）

右為末研令極細蜜和杵二三萬下如梧桐子大每服五丸姜棗湯下

龍腦安神丸（拔粹方）治男子婦人五種癲癇無問遠年近日發作無時

茯苓（三两） 人參 地骨皮 甘草（各四两）

麥門冬（去心二两） 龍腦（别研） 射香（各五錢） 牛黄（五錢）

硃砂 牙硝（各二錢） 桑白皮 明犀末（一两）

金箔（十五片）

右十三味為末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣冬月温水化下夏月凉水又治虛劳發熱咳嗽語澁舌強日進

三服

朱砂安神丸（拔粹方）治心煩懊憹心亂怔忡胸中氣亂心下痞悶食入反吐出

朱砂（四錢研） 黃連（五錢） 生甘草（二錢半）

右為末蒸餅丸如黃米大每服十丸嚥津送下

虎睛丸（楊氏藏方）治癇疾發作涎潮搐搦精神恍惚時作譫語

犀角屑（一兩） 虎睛（一對微炒） 大黃（一兩） 梔子仁（半兩）

遠志（去心一兩）

右為末煉蜜丸如菉豆大每服二十丸酒溫食後送下

滾痰丸 治膈熱太甚作癇（見痰類）

龍會丸 治肝火太甚作癇（見脇痛）

〇已上數方清心降火之劑

古方三癇丸 治小兒百二十種驚癇

荊芥穗（三兩） 白礬（一兩半生半枯）

右為末麪糊為丸黍米大硃砂為衣姜湯下二十丸如慢驚用來復丹急驚三癇丸食癇醒脾丸可也

本事人參散 治小兒慢脾風神昏痰盛

人參（半兩） 真白大南星（一兩切片以生姜汁幷漿水各半蔭滿煮帶性晒）

右為末每服一錢水一盞姜三片冬瓜仁擂細少許同

煎取半盞作两三次灌下

來復丹　見中暑

醒脾丸　見

戊集

顛狂三十九

丹溪心法

○癲屬陰狂屬陽癲多喜而狂多怒脉虛者可治實則死大率多因痰結於心胷間治當鎮心神開痰結亦有中邪而成此疾者則以治邪法治之原病式所論尤精盖為世所謂重陰者癲重陽者狂是也大槩是熱　癲者神不守舍狂言如有所見經年不愈心經有損是為真病如心經蓄熱當清心除熱如痰迷心竅當下痰寧志若癲哭呻吟為邪所憑非狂也燒蚕紙酒水下方寸匕　卒狂言鬼語針大拇指甲下即止　風癲引脇痛發則耳鳴用天門冬去心日乾作末酒服方寸匕　癲疾春治之入夏自安宜助心氣之藥　陽虛陰實則癲陰虛陽實則狂狂病宜大吐下則除之

入方　治癲風

一　麻仁四升

右以水六升猛火煑人牙生去滓煎取七合旦空心服或發或不發或多言語勿怪之但人擎手足須定丸進三劑愈

又方　治狂邪發無時披頭大叫欲殺人不避水火

苦參（不以多少）

右為末蜜丸如梧桐子大每服十五丸煎薄荷湯下

附脉理

脉訣舉要曰顛癎之脉浮洪大長滑大堅疾痰蓄心狂又曰乍大乍小乍長乍短此皆邪脉神志昏亂

附諸方

控涎丹　治痰迷心竅時作癲狂狂言如有所見

甘遂（去心）　紫大戟（去皮）　白芥子（真者各等分）

右爲末煑麪糊丸如梧桐子大晒乾臨卧淡姜湯或熟水下三十丸以下利去痰飲為愈

追風袪痰丸　治痰迷心竅顛狂妄語（見癎類）

葉氏清心圓（簡易方）　治心受邪熱精神恍惚狂言呼叫睡卧不寧

人參　蝎稍　鬱金　生地黄

天麻　天南星（為末入黄牛胆内令滿掛當風處吹乾臘月造要用旋取各等分）

右為末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三十丸人參

湯下

龍星丹　治脅膈停痰蓄熱顛狂號叫（見中風類）

滾痰丸　治痰熱攻心顛狂唱哭（方見痰類）

○已上數方下痰寧志之劑

牛黃清心丸　治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少睡常發狂癲言語錯亂（見中風）

牛黃瀉心湯　治心經邪熱狂語精神不爽

腦子（研）　牛黃（研）　朱砂（研各一錢）　大黃（生一兩）

右研為末每服三錢凉生姜蜜水調下

葉氏雄朱丸（簡易方）　治丈夫婦人因驚憂失心或思慮過多氣結不散積成痰涎留在心包穰塞心竅狂言妄語叫呼奔走

顆塊硃砂（一錢半）　白附子（一錢）　雄黃（明淨者一錢半）

右爲細末和勻以猪心血和丸如梧桐子大別用硃砂爲衣每服三粒用人參菖蒲煎湯下常服一粒能安魂定魄補心益氣

朱砂安神丸　治症同前

龍腦安神丸　治症同前（並見癇類）

牛黃膏（聖惠方）　治婦人熱入血室發狂不認人者

牛黃（二錢半）　硃砂　欝金（各三錢）　腦子

甘草（各一錢）　牡丹皮（三錢）

右爲細末煉蜜爲丸如皂子大每服一丸新水化下

寧志膏（大全良方）治婦人因失血過多心神不安言語不常不得睡卧

辰砂（研）　酸棗仁（炒）　人參　白茯神（去木）

琥珀（各七錢半）　滴乳香（研一錢）

右爲末和匀每服一錢濃煎灯心棗子湯空心調下

一方無茯神琥珀蜜丸如弹子大薄荷湯化下一丸

茯神散（大全良方）治婦人心虚與鬼交通妄有所見聞言語雜亂

茯神（一两半）　茯苓　人參　石菖蒲（各二两）

赤小豆（半两）

右㕮咀每服八錢水一盞半煎至八分通口食前服

○已上數方清心除熱之剤

驚悸怔忡（四十）　戊集

丹溪心法

○驚悸者血虚驚悸　時以朱砂安神丸　痰迷心膈者痰藥皆可定志丸加琥珀欝金　怔忡者血虚怔忡無時

血少者多　有思慮便動屬虛　時作時止者痰因火動

瘦人多是血少　肥人屬痰　尋常者多是痰　真覺心跳者是血少四物朱砂安神之類　假如病因驚而得驚則神出舍舍空則痰生也

戴云怔忡者心中不安惕惕然如人將捕者是也

附諸賢論

心法附録曰人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸怔忡之所肇端也曰驚悸曰怔忡豈可無辨乎心虛而鬱痰則耳聞大聲目擊異物過險臨危觸事喪志心為之忤使人有惕惕之狀是則為驚悸心虛而停水則胷中滲漉虛氣流動水既上乘心火惡之心不自安使人有怏怏之狀是則為怔忡治之之法驚悸者與之豁痰定驚之劑怔忡者與之逐水消飲之劑所謂扶虛不過調養心血和平心氣而已

附脉理

脉訣舉要曰心中驚悸脉必代結飲食之悸沉伏動滑

附諸方

茯苓飲子（濟生）方　治痰飲蓄于心胷怔忡不已

赤茯苓（去皮）半夏（湯洗七次）茯神（去木）麥門冬（去心）

橘皮（去白各一兩）沉香（不見火）甘草　檳榔（各五錢）

右吹咀每服八錢生姜五片煎至八分食後温服

加味四七湯　治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏（二兩半）　白茯苓　厚朴（各一兩半）　茯神

紫蘇（各一兩）　遠志（炒）　甘草（炙半兩）

右每服四銭生姜五片石菖蒲一寸棗一箇水煎服

葉氏育神散（簡易方）理心氣不寕怔忡徤忘夜夣驚恐小便白濁

赤石脂（別研細臨時入）　白茯苓　甘草

遠志（去心）　乾姜（炮）　當歸（酒洗）

龍骨（另研如粉臨時入）　紫苑茸　桂心（去皮）

白茯神（去木）　防風　人參（去芦）　赤芍藥

白术（各一兩）

右爲末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎七分食後温服

龍齒湯（簡易方）理心下怔忡常懷憂慮神思多驚如墮陰坳小便或赤或濁

官桂（一兩半）　半夏（湯泡二兩）　人參（去芦）　白茯苓（去皮）

枳殼（去穰麩炒）　甘草（炙）　當歸　龍齒（研）

桔梗　遠志（去心各一兩半）　茯神（去木）　黄芪（蜜炙各一兩）

右爲末每服二錢水一鍾姜三片棗一枚粳米百粒煎

六分温服

養心湯　治憂愁思慮傷心驚悸不寧

黃芪（蜜炙）　白茯苓　茯神　半夏麯

當歸　川芎（各半兩）　甘草（炙四錢）　遠志（去心薑汁炒）

辣桂　栢子仁　五味子　酸棗仁

人參（各二錢半）

右每服三錢水煎薑三片棗一箇食前服　治停水怔忡加檳榔赤茯苓

加味定志丸　治痰迷心膈驚悸怔忡

遠志（二兩）　人參（一兩）　菖蒲（二兩）　白茯苓（三兩）

琥珀　鬱金

右為末煉蜜為丸如梧子大朱砂為衣每服三十丸米湯下

○已上諸方消痰利氣之劑

四物湯　見補損

朱砂安神丸　治血虛心煩懊憹驚悸怔忡胸中氣亂

朱砂（五錢水飛過另研）　黃連（酒洗六錢）　甘草（炙二錢半）

生地黃（一錢半）　當歸（二錢半）

右四味為細末蒸餅丸如黍米大朱砂為衣服三五十丸津下

牛黃清心丸　治心氣不足神志不定驚恐悸怖虛煩少睡夢寐紛紜

歸神丹　治驚悸怔忡神不守舍　並見癲類

真珠丹　治肝經因虛內發風邪卧則魂散不守時或驚悸忡怔

栢子仁　人參　酸棗仁（各一兩）　熟地黃

當歸（各一兩半）　犀角　茯神　沉香

龍齒（各半兩）　真珠母（三錢研）

右為末煉蜜丸如梧子大辰砂為衣每服四五十丸金銀薄荷湯下

益榮湯（濟生方）治思慮過度耗傷心血天君不寧怔忡恍惚夜多夢寐小便赤白濁

當歸（去芦酒浸）　黃芪（去芦）　小草　酸棗仁（去殼炒）

栢子仁（炒）一　麥門冬（去心）　茯神（去木）　白芍藥

紫石英（各一兩研）　木香（不見火）　人參　甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚煎七分服

○已上數方補血安神之劑

健忘　四十一

丹溪心法

○健忘精神短少者多亦有痰者

戴云健忘者爲事有始無終言談不知首尾此以為病之名非此生成之愚頑不知人事者

附諸方

寧志膏（和劑方）治心神恍惚一時健忘（見補損）

定志丸　治心氣不定恍惚多忘

遠志　菖蒲（各二兩）　人參（一兩）　白茯苓（三兩）

右為末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣服二十丸米湯下

壽星丸（和劑方）治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍惚健忘妄言如有所見

天南星（一斤先用炭火三十斤燒地坑通紅去炭以酒五升傾坑內候滲酒盡下南星在坑內以盆覆坑周回用灰掩定勿令走氣次日取出為末）　朱砂（二兩另研）

琥珀（一兩另研）

右用生姜汁麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸加至五十丸煎石菖蒲人參湯下

歸脾湯（濟生方）治思慮過制勞傷心脾健忘怔忡

白术　茯神（去木）　黃耆（去芦）　龍眼肉

酸棗仁（去殼）　人參（各一兩）　木香（半兩）　甘草（炙二錢半）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚煎七分温服

朱雀丸（百一選方）治心神不定事多健忘

茯神（一兩去皮）　沉香（半兩）

右為細末煉蜜丸如小豆大每服三十丸人參湯下（食後）

一丹丸　治健忘養神定志和血內以安神外華腠理

方見中風

人參遠志丸（聖惠方）治氣不足驚悸健忘神思不寧

天門冬（去心）　白茯苓　菖蒲（各七錢半）　人參

遠志（去心）　酸棗仁　黃芪（各半兩）　桔梗

丹砂　官桂（去皮各二錢半）

右為末蜜丸如豆大每服二十丸至三十丸米湯下

纏喉風喉痺四十二　附咽痛咽瘡

[illegible]

丹溪心法

○喉痺大槩多是痰熱　重者用桐油探吐　一方射干逆流水吐之　又方李實根皮一片噙口內更用李實根研水敷項上一遭（用新采園中者）　纏喉風屬痰熱戴云謂其咽喉裏外皆腫者是也用桐油以鵝翎探吐　又法用灯油腳探吐　又用遠志去心為末水調傳項上一遭立効　亦可吐

咽喉生瘡痛是虛熱血虛多屬虛火游行無制

客於咽喉也用人參荊芥蜜炙黃栢　虛火用人參竹瀝血虛四物加竹瀝　實熱者黃連荊芥薄荷硝蜜姜汁調噙化　治喉痛用倒滴刺根淨洗入些少好酒同研滴入喉中痛立止　喉痺風熱痰先以千緡湯後以四物加黃栢知母養陰則火降　又方猪牙皂角為末和霜梅噙　又方木鱉子用塩苦水浸久噙一丸　又方茜草一兩作一服降血中之火　又方焰硝半錢枯礬半錢硼砂一錢為末杜朱膝擣汁調　喉閉或有中蛊一絲結成小血珠垂在咽喉中用杜牛膝根即鼓搥草直而獨條者擣碎用好米醋些小和研取汁三五滴滴在鼻中即破　喉痛必用荊芥陰虛火炎上必用玄參　又喉痺陳年白梅入蜒蚰令化噙梅於口中

入方

雄黃解毒丸　治纏喉急喉風双鵝腫痛湯藥不下

雄黃二兩　巴豆（去油十四箇）　鬱金一錢

右為末醋糊丸如菉豆大熱茶清下七丸吐出頑涎即甦大效如口噤以物斡開灌之下咽無有不活者

潤喉散　治氣鬱夜熱咽乾硬塞

桔梗（二錢半）　粉草一錢　紫河車（四錢）　香附（三錢）

百藥煎（一錢半）

右爲末傳口内

又方　喉痛

鵬砂　膽礬　白殭蚕　陳霜梅

右為末和噙

附諸方

奪命散（秘方）治急喉風

白礬（枯）　姜蚕（直者炒断系）　鵬砂　皂角末

右等分為末少許吹入喉中痰出瘥

如聖散（三因方）治風痰壅盛咽喉腫痛水穀不下牙関緊急不省人事或時氣纏喉風並用

雄黄（細研）　白礬（枯）　藜蘆（厚者去皮心不可用抜粹方言生用）

猪牙皂角（去皮炙黄等分）

右為末用一字搐入鼻内吐痰為愈

治咽喉牙関緊閉（經驗方）

右用巴豆去殼以紙包巴豆肉用竹管壓出巴豆油在紙上却以此紙作箇撚子點灯吹滅以煙薰入鼻中一霎時口鼻涎流牙関開矣

治走馬咽痺（張子和方）

右用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透如右左俱有者用二枚塞左右鼻中

一〇愚按已上二方皆用巴豆蓋巴豆乃斬關奪門之將熱則流通之理雖是以熱攻熱不妨碍也

吹喉散　治咽喉腫痛急慢喉閉懸癰乳鵝嚥物不下

訶子（一兩醋浸一宿去核晒乾）　黃芩（酒浸一宿晒乾）　膽礬（一錢）

明礬半（一錢）　牛蒡子　甘草（生）　薄荷（各五錢）

一方有百藥煎

右爲末先用好生姜擦舌上每用藥一錢芦管吹入喉中吐出涎痰便用熱茶嚥下再吹第二次便用熱粥三次再吹用熱茶或熱粥乘熱食之加朴硝末少許如口舌生瘡用藥吹之口中立去痰涎爲妙

奪命丹（秘方）治咽喉一切腫毒木舌雙乳鵝喉瘋等証

紫河車　蜜陀僧（各半兩）　砂仁　管竹

姜蚕（直者）　烏魚骨　茯苓（各一錢）　射香（少許）

右爲細末麪糊爲丸如彈子大陰乾用一丸無根水浸一宿頻食之一丸作二服神効

奪命筋頭散（聖惠方）治急喉痺咽喉腫痛堵塞氣不得通欲死之狀

膽礬（四錢）　草烏（四錢）　碌礬（六錢）　雄黃（一錢）

右爲末用一筋頭點上咽喉内急吐涎沫立應次以大黃甘草等分俱爲麄末每服三錢水一鍾半煎至一鍾

去滓化乳香一粒温服滌去熱毒恐為再發一方加白礬二錢

治咽喉腫痛秘方

山豆根　射干花根

右同陰乾為末吹入喉中如神

治喉痺秘方

喉痺為急病　須臾命不通　急研新艾水

入口便和同　臘内無新艾　蛇床瓶内燒

其烟繞入口　此病一時消

一方　治喉痺

青黛（五分）　猪牙皂角（去皮弦五錢）　膽礬（熟者一錢半）

右為細末醋薄糊為丸如櫻桃大每用一丸以乾絹裹在筯頭上用好醋潤透將藥點在口内喉瘡上咬着筯其涎如水即解後服防風通聖散

七寶散

殭蚕（十箇白直者）　猪牙皂角（一挺去皮弦）　全蝎（十箇頭角全者去毒）

硼砂　雄黄　明礬（各一錢）　膽礬

右為細末每用一字入喉中即愈

碧雪散　治咽喉閉塞一時不能言語痰涎壅盛

燈心灰（二錢）　硼砂（一錢）

右研為細末用鵝翎管吹入喉中立效

噙化三黃丸（秘方）治咽喉痛大効

山豆根（一两）　硼砂（二錢）　龍腦（少許）　射香（少許）

右為末用青魚膽為丸如菉豆大每服三五丸噙化津嚥下

碧玉丸（御藥院方）治心肺積熱上攻咽喉腫痛閉塞水漿不下或生瘡癤重舌木舌並宜服之

青黛　盆硝　蒲黃　甘草（末各一两）

右同研勻用沙糖為丸每两作五十丸每服一丸噙化或用乾藥末糝咽喉膈內亦好

龍腦散（御藥院方）治咽喉腫痛皆因風熱在於脾肺邪毒蘊滯胸膈不利故發疼痛急喉痺閉塞腫痛粥飲難嚥

鵬砂　腦子　朱砂（各一分）　滑石（細末三錢）

石膏（水飛二两）　甘草（生取末炒小半錢重一字）

右為細末每服半錢用新汲水調服或乾糝嚥津亦得

龍腦破毒散（御藥院方）治不測急慢喉痺咽喉腫塞不通

盆硝（研細四錢）　白殭蚕（微炒去嘴為末八錢）　甘草（生末六錢）

青黛（八錢）　馬勃（末三錢）　蒲黃（半两）　腦子（一錢）

射香（一錢）

右同研令勻細用甆合子收如有病證每服用藥一錢

用新汲水小半鍾調勻細細呷嚥如是喉痺即破出血便愈如不是喉痺自然消散也若是諸般舌脹用藥半錢以指蘸藥擦在舌上下嚥津如是小兒一錢作四五服亦如前法用並不計時候

甘桔湯（活人）方治少陰咽痛

桔梗　甘草（各等分）

右㕮咀每服五錢水一鍾半煎至八分通口服

桔梗湯（御藥院方）治咽喉疼痛如有物妨悶

桔梗（炒五錢）　半夏（湯浸七遍切焙乾二錢半）　人參（去蘆頭）

甘草（炙各一錢半）

右㕮咀每服一兩水一鍾煎至七分去滓溫服食後

利膈湯（本事方）治脾肺有熱虛煩上壅咽喉生瘡

鷄蘇葉　荊芥穗　防風　桔梗

人參　牛蒡子（隔紙炒）　甘草（各一兩）

右為末每服一錢沸湯點服如咽痛口瘡甚者加姜蚕一兩

通氣湯（應驗方）治喉痺疼痛閉塞不通氣水漿不下痰涎壅盛

牽牛（頭末一兩半生半熟）　鼠粘子（二錢半）　防風（一錢七分半）

枳殼（一錢二分半炒）　甘草（一錢二分半生用）

右為細末每服三錢沸湯點服

甘露内消丸 應驗方治咽喉腫痛不利咽乾痛上焦壅滯口舌生瘡

薄荷葉一兩　川芎（二錢）　桔梗（去芦頭三錢）　甘草一錢　人參　訶子（各半錢）

右為細末煉蜜為丸如皂角子大硃砂為衣每服一丸噙化下無時

上清連翹散 精義治諸瘡腫毒咽喉疼痛煩渴大便自利虛熱不寧

連翹　山梔子　甘草　防丰（各一錢）

右用水二鍾煎至八分去滓溫服食後

玉鑰匙 大成治風熱喉閉及纏喉風

焰硝（一錢半）　鵬砂（半錢）　腦子（少許）　白殭蚕（一重半）

右研勻以竹管吹半錢許入喉中立愈

鵬砂散 端效方治咽喉瘡腫閉塞不通

硼砂　白殭蚕　百藥煎（各三錢）　山豆根　盆硝　薄荷　紫荷車（各半兩）　青黛一錢　川芎（三錢）

右為細末大人每服半錢小兒一字吹摻咽中或水調服

三黃丸 大成治丈夫婦人三焦積熱咽喉腫悶心膈煩燥

小便赤澁大便秘結並宜服之（見火類）

加味三黃丸（秘方）

大黃　黃芩　黃連（各二兩半）　硼砂（二兩）

黃藥子　白藥子（各一兩半）　山豆根　黃栢

苦參（各一兩）　京墨（三錢）　射香（少許）　片腦（一錢半）

冬加知母

右為末猪膽調雞氈內蒸二次後入片麝硼為丸豆大噙化

荊黃湯（大成）治臟腑實熱咽喉腫痛大便秘結咽喉之證多是風熱上壅然後成之非實熱不可服（見風熱）

備手散（應驗）治咽喉腫痛生瘡風熱喉痺腫塞

薄荷（二兩）　盆硝（一兩）　甘草（七錢）　桔梗（五錢）

蒲黃（五錢）　青黛（三錢）

右為細末每用少許乾摻又用竹管吹咽喉內噙化下時時用之

絳雪散（大成）治咽喉腫痛嚥物悶及口舌生瘡

龍腦（半錢）　鵬砂（一錢）　朱砂（三錢）　馬牙硝（半錢）

寒水石（二錢煅熟）

右研勻每用一字摻於舌上津嚥之

人參清肺散（御藥院方）治脾肺不利風熱攻衝咽喉腫痛

嚥物妨悶宜服此藥

連翹（三錢） 黃芩（三錢） 川大黃 薄荷（各一錢半）

人參 甘草 梔子 盆硝（各一錢）

白附子（七分半） 黃連（半錢）

右用水一鍾半煎至一鍾去滓溫服食後

牛蒡子湯（大成） 治風熱上壅咽喉腫痛或生癰瘡有如（時腐）

牛蒡子（二錢） 玄參 升麻 桔梗（去芦）

犀角 黃芩 木通（去皮） 甘草（各一錢）

右用水二鍾生姜三片煎至一鍾去滓溫服食後

涼膈散（大成） 治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利

咽喉煩燥多渴腸胃秘澁小便不利一切風熱並皆治

之（方見溫熱）

大青湯（端效） 治咽喉唇腫口舌糜爛瘡惡口瘡

大青葉 升麻 大黃（各二錢） 生地黃（切焙二錢）

右用水二鍾煎至一鍾去滓溫服食後微利止

嗽口地黃散（御藥） 治脾肺風熱上攻咽喉腫痛生瘡閉塞

不進或生舌脹

黃芩（四錢） 甘草（一錢二分半） 荊芥穗（一錢） 薄荷葉（半錢）

右㕮咀用水一鍾半煎至一鍾去滓熱嗽冷吐不拘時

一方 治喉痺

用射干即扁竹根也旋取新者不拘多少擂爛取汁吞下或動大腑解或用釅醋同研取汁噙引出涎更妙又名野萱花

灸累年喉痺舉發秘方

男左女右以手大指甲第一節灸二三小壯

針喉閉

針少商出血立愈其穴在兩手大指內側去爪甲角韭葉許三稜針針之　針合谷二穴在虎口針五分

針尺澤二穴在臂中橫紋出血妙

四物湯　見補損

十緡湯　見痰類

○廣按經喉風喉痺之証其人膈間素有痰涎或因飲酒過度或因忿怒失常或因房室不節而發作也何則飲酒過度是胃火動也忿怒失常是肝火動也房室不節是腎火動也火動痰上而爲痰熱燔灼壅塞於咽嗌之間所以內外腫痛而水漿不入也其症可謂危且急矣治療之法急則治標緩則治本治標用丸散以吐痰散熱治本用湯藥以降火補虛已上方劑其於治標已詳悉矣其於治本尤欠畧也諸方出証但云治風熱而未云治痰熱但云治脾肺火而未

云降肝腎火乎雖不敏贅以管見如挾痰加以瓜蔞半夏或千緡湯之類如挾肝火加以柴胡黃連或小柴胡湯左金丸之類如挾腎火加以生地黃黃栢或四物湯加知母黃栢之類未知賢哲以爲何如　又常論之胃肝腎三經之火各有所因而生富貴之家醇酒厚味多生胃火婦人隱憂不發多生肝火男子房勞致虛多生腎火人之五臟六腑皆有火不如此二經之火常變見而爲病之多也

丹溪心法附餘卷之十終

丹溪心法附餘卷之十一　竹集

火門

戊集

火（四十三）（附風熱）

丹溪心法

○火陰虛火動難治　火鬱當發看何經　輕者可降重者則從其性而伸之　實火可瀉黃連解毒湯之類虛火可補　小便降火最速　凡氣有餘便是火不足者

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

是氣虛　火急甚重者必緩之以生甘草兼瀉兼緩參朮亦可　人壯氣實火盛顛狂者可用正治或硝黃冰水之類　人虛火盛狂者以生姜湯與之若投冰水正治立死有補陰即火自降炒黃柏生地黃之類　凡火盛者不可驟用凉藥必兼溫散　有可發者二風寒外來者可發鬱火可發　氣從左邊起者乃肝火也　氣從臍下起者乃陰火也　氣從脚下起入腹如火者乃虛之極也盖火起於九泉之下多死一法用附子末津調塞湧泉穴以四物湯加降火藥服之妙　陰虛証本難治用四物湯加炒黃柏降火補陰　龜板補陰乃陰中之至陰也　四物加白

焉脛胃降陰中火可代黃連黃芩　黃連黃芩梔子大黃黃柏降火非陰中之火不可用　生甘草緩火邪木通下行瀉小腸火　人中白瀉肝火須風露中二三年者　人中黃大凉治疫病須多年者佳中氣不足者味用甘寒山梔子仁大能降火從小便泄去其性能屈曲下降人所不知亦能治痞塊中火邪

入方

左金丸　治肝火　一名回令丸

黃連（六兩）　吳茱萸（一兩或半兩）

右爲末水丸或蒸餅丸白湯下五十丸

附諸賢論

劉宗厚曰火之爲病其害甚大其變甚速其勢甚彰其死甚暴何者盖能燔灼焚焰飛走狂越消鑠於物莫能禦之遊行乎三焦虛實之兩途曰君火也猶人火也曰相火也猶龍火也火性不妄動能不違於道常以禀位聽命運行造化生存之機矣夫人在氣交之中多動少靜欲不妄動其可得乎故凡動者皆屬火化火一妄行元氣受傷勢不兩立偏勝則病移害他經事非細故動之極也病則死矣經所謂一水不勝二火之火出於天造君相之外又有厥陽臟腑之火根於五志之內六欲七情激之其火隨起盖大怒則火起於肝醉飽則火起於胃房勞則火起於腎悲哀動中則火起於肺心爲君主自焚則死矣丹溪又啓火出五臟主病曰諸風掉眩屬肝火動之類經所謂一水不勝五火之火出自人爲又考內經病機一十九條內舉屬火者五諸熱瞀瘛皆屬於火之類而河間又廣其說火之致病者甚多深契內經之旨曰諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之有聲如鼓癰疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂瞀鬱腫脹鼻塞鼽衄血溢血泄淋閟身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄衄衊血汚此皆少陰君火之熱乃真心小腸

之氣所爲也若瞀瘈暴瘖昏昧躁擾狂越罵詈驚駭胕腫疼酸氣逆衝上禁慄如喪神守嚏嘔瘡瘍喉痺耳鳴及聾嘔滿溢食不下目昧不明暴　瞤瘈暴病暴死此皆少陽相火之熱乃心包絡三焦之氣所爲也是皆火之變見爲諸病也爲脉虛則浮大實則洪數藥之所主各因其屬君火者心火也可以濕伏可以水滅可以直折惟黃連之屬可以制之相火者龍火也不可以水溫折之從其性而伏之惟黃栢之屬可以降之噫瀉火之法豈止如此虛實多端不可不察以臟氣司之黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元氣火不兩立爲陽虛之病以甘溫之劑除之如黃芪人參甘草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位日漸煎熬爲血虛之病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實爲陽強之病以鹹冷之劑折之如大黃朴硝之屬若腎水受傷真陰失守無根之火爲陰虛之病以壯水之劑制之如生地黃玄參之屬若右腎命門火衰爲陽脫之病以溫熱之劑濟之如附子乾姜之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土爲火鬱之病以升散之劑發之如升麻葛根之屬不明諸此之類

而來火之爲病施治何所依據故於諸經集畧其詳備處方之用庶免實實虛虛之禍也

附脉理

脉理提綱曰火脉洪数虛則浮

附諸方

九味羗活湯　治春夏秋非時感冒風寒發熱惡寒頭疼項強或無汗或有汗以代桂枝麻黄青龍各半湯治太陽經表熱之神藥也此湯非獨治四時風寒春可治温夏可治熱秋可治濕治雜証亦有神也

六神通解散　治時行三月後謂之晚發頭痛身熱惡寒脉洪數先用九味羗活湯不愈後服此湯　（並見冒寒）

○已上二方發散風寒表熱之劑

東垣瀉陰火升陽湯　治肌熱煩熱面赤食少喘咳痰盛

羗活　甘草（炙）　黄芪　蒼朮（各一两）　升麻（八錢）　柴胡（一两半）

人參　黄芩（各七錢）　黄連（酒炒半两）　石膏（半两秋深不用）

右㕮咀每服一兩或半兩水煎　此藥發脾胃火邪又心膽肝肺膀胱藥也瀉陰火升發陽氣榮養血氣者也

升陽散火湯　治男子婦人四肢發熱肌熱筋痺熱骨髓中熱發困熱如燎捫之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之

升麻　葛根　獨活　羌活（各半兩）防風（二錢半）柴胡（八錢）

甘草（炙三錢）人參　白芍（各半兩）甘草（生二錢炙三錢）

右㕮咀每服半兩或一兩水煎稍熱服

地骨皮散　治渾身壯熱脉長而滑陽毒火熾發渴

地骨皮　茯苓（各半兩）柴胡　黄芩

生苄　知母（各一兩）石膏（二兩）羌活

麻黄（各七錢半有汗並去之）

右㕮咀每服一兩入姜煎

小柴胡湯（見傷寒）

○已上三方升麻鬱火表熱之劑

柴胡飲子　治解一切肌骨蒸積熱作發寒熱往来（表熱裏和則發寒裏熱表和則發熱和熱半在表半在裏出入進退無時即寒熱往來陰陽相勝也）蓄熱寒戰（表之陽和正氣與邪熱并畜於裏脉道不行故身冷脉絶寒戰而久煩渴也）及傷寒發汗不解或中外諸邪熱口乾煩渴或下後熱未愈汗後勞復或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾産後經病

柴胡　人參　黄芩　甘草

大黄　當歸　芍藥（各半兩）

右爲末每服抄三錢水一盞生姜三片煎至七分温服日三服病熱甚者加服之

防風當歸飲子（宣明方）治脾腎真陰損虚肝心風熱鬱甚

陽勝陰衰邪氣上逆上實下虛怯弱不耐或表熱而身熱惡寒或裏熱而躁熱煩渴或邪熱半在表半在裏進退出入不已而爲寒熱往來或表多則惡寒或裏多則發熱或表之陽分陽和正氣與邪相助并甚於裏熱極深而外無陽氣裏熱極甚陽極似陰而寒戰腹滿煩渴者或裏之陰分正氣反助邪氣并甚於表則躁熱煩渴而汗出也或邪熱壅塞者或煩熱而痛者或熱結極甚陽氣不通而反覺冷痛或中外熱鬱煩躁甚喜涼畏熱者或熱極閉塞不得宣通陽極似陰中外喜熱而反畏寒者或躁熱煩渴者或濕熱極甚而腹滿不渴者或

一切風熱壅滯頭目昏眩暗風眼黑偏正頭痛口乾鼻塞耳鳴及聾咽嗌不利或目赤腫痛口瘡舌痺或上氣痰嗽心脇鬱痞腸胃燥澁小便溺淋閟或是皮膚瘙痒手足麻痺又或筋脈拘急支躰倦怠或渾身肌肉跳動心忪驚悸或口眼喎斜語言謇澁或狂妄昏惑健忘失志及或腸胃燥熱怫鬱而肌不欲食或濕熱內餘而消穀善肌然能食而反瘦弱或誤服燥熱毒藥及妄食熱物過多而耗損脾腎則風熱鬱甚而多有如此不必全見也無問自病及中燥熱毒藥所使者並宜宣通氣血調順飲食久服之舊病除去新病不生設虛人常服補

益功驗自可知矣

防風　當歸　白芍　柴胡　黃芩

人參　甘草　大黃（各一兩）　滑石（六兩）

右㕮咀每服三錢至五錢水一大盞生姜三片同煎至七分去渣温服

○廣按此方用大黃瀉陽明之濕熱從大便出用滑石降三焦之妄火從小便出用黃芩以凉膈柴胡以解肌防風以清頭目人參甘草以補氣當歸芍藥以補血瀉心肝之陽補脾腎之陰而無半味辛香燥熱之藥真治風熱燥熱濕熱挾虛之良劑非聖於醫者其能如是也耶

一温熱病汗下後餘熱未退用此尤妙

○已上二方和觧半表半裏熱之劑

大柴胡湯（方見傷寒）

防風通聖散（方見中風）

○已上二方發攻表裏之劑

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯並見傷寒

三一承氣湯（見温熱）

○已上四方攻下裏熱之劑

清心湯即凉膈散料內加黃連五錢用蜜與竹葉同煎

連翹　山梔子　大黃　薄荷葉

黃芩（各五錢）　甘草（一兩半）　朴硝（二錢五分）　加黃連（半兩）

右爲細末每服五錢水一盞蜜少許竹葉十片同煎七分溫服

洗心散（和劑方）治風壅痰滯心經積熱口苦脣燥眼澁多淚大便秘結小便赤澁

白朮（一兩半）　麻黃（和節）　當歸（去芦洗）　荆芥穗

芍藥　甘草　大黃（麪裹煨去麪切焙各六兩）

右爲末每服二錢水一盞生薑薄荷各少許同煎溫服

人參瀉肺湯（秘方）治肺經積熱上喘咳嗽胸膈脹滿痰多大便澁滯

黃芩　梔子　枳殼　甘草（炙）

薄荷　連翹　杏仁（炒去皮）　桑白皮（炒）

大黃　桔梗（炒各等分）

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓食後通口服

三黃湯（和劑）治積熱結滯臟腑大便秘結心膈煩燥

黃連（去芦）　黃芩（去腐）　大黃（煨各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分空心服

三黃丸（和劑方）治男子婦人三焦積熱咽喉腫閉心膈煩

燥小便赤澁大便秘結並宜服之

黃連（去芦須） 黃芩（去土） 大黃（煨各半兩）

右爲末煉蜜丸如梧子大每服四十丸熱水吞下

一方用腦麝爲衣丸如大豆大夜間噙化一二丸亦好

含化三黃丸 治症同前（見喉痺）

大金花丸（宣明方） 治中外諸熱寢汗咬牙時語驚悸溺血淋閉咳衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘嗽去大黃加梔子名曰梔子金花丸又曰既濟解毒丸

黃連 黃栢 黃芩 大黃（各等分）

自利去大黃加梔子

右爲末滴水丸如小豆大每服二三十丸新汲水下

四生丸（宣明方） 治一切熱痰常服潤肌膚諸熱証皆可服

大黃 牽牛 皂角（各二兩） 朴硝（半兩）

右爲末滴水丸如梧子大每服三十丸食後白湯下

黃連解毒湯（宣明方） 治傷寒雜病熱毒煩燥乾嘔口渴喘滿陽厥極深畜熱內甚（方見溫熱）

黃連湯（聖惠方） 治一切積熱血熱腹熱酒熱並用

黃連埒不拘多少并水浸之良久碗盛於鍋內煑取清汁服之

○廣按書云寒因熱用熱因寒用何也盖積熱用寒藥

熱以治之痼冷用熱藥以治之恐相違逆如黃連用薑汁制酒制如附子用蜜制童便制是也此方既用一味黃連又用井水浸之不無太過乎以酒代之庶乎妙矣

神芎丸（宣明方）治三焦積熱風痰壅滯頭目赤腫或生瘡瘍咽膈不利或腸胃結燥小便赤澁大便閉塞一切熱證並宜服之

大黃（生） 黃芩（各二兩） 牽牛（生） 滑石（各四兩）

黃連 薄荷 川芎（各半兩）

右爲末滴水丸如梧桐子大每服五十丸溫水食後下

解毒丸（通玄方）治中外諸邪熱毒癰腫瘡疽觔脉拘攣咬牙驚悸一切熱毒並宜治之

大黃 黃連 黃芩 山梔子 牽牛 滑石（各半兩）

右為末滴水丸如梧子大每服二四十丸溫水送下此即黃連解毒湯神芎丸合方也

全真丹（聖惠方）治臟腑積熱洗滌腸垢潤利燥澁解風毒攻疰手足浮腫或頑痺不仁痰涎不利涕唾稠粘胸膈痞塞脅腹脹滿飲食減退少困倦無力

川大黃（二兩用米泔水浸過三日每日換取出切片焙乾為細末用）

黑牽牛（八兩淨慢火炒四兩生用四兩同取頭末四兩）

右以皂角一兩輕炒去皮子水一大碗浸一宿入蘿蔔

一兩切作片子同皂角一處熬至半碗去滓再熬至二鍾擺和上件藥末乾濕調匀丸如梧子大每服二三十丸至五六十丸諸飲下隨証加減以利爲度

平胃散（三因方）　治胃經實熱口乾舌裂大小便秘澁及熱病後餘熱不除畜於胃中四肢發熱口渴無汗

厚朴（去皮乾炒）　射干（米泔浸）　升麻　茯苓（各一兩半）

芍藥（二兩）　枳殼（去穰麩炒）　大黃（蒸）　甘草（炙各一兩）

右㕮咀每服四錢水一盞煎至七分去滓空心熱服

八正散　治大人小兒心經蘊熱咽乾口燥目赤睛痛臟腑秘結小便赤澁（方見淋閉）

○已上諸方治三焦鬱火實熱之劑

黃芩湯　治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋濁不利

澤瀉　梔子仁　黃芩　麥門冬（去心）

木通　生地黃　黃連　甘草（各等分）

右㕮咀每服一兩水二盞生姜五片煎至一盞食前温服

清心丸　治經絡中火邪夢漏心忪恍惚口瘡咽燥

黃栢（生二兩）　龍腦（三錢）

右爲末蜜丸梧子大每服十丸（臨卧）煎麥門冬湯下

碧雪和劑方　治一切積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝　青黛　石膏（各研末水飛）　寒水石

朴硝　滑石　甘草（二升煎湯）　馬牙硝（各等分）

右將甘草湯入諸藥末再煎用柳木篦不住手攪令消溶入青黛和勻傾沙盆內候冷凝結成霜研爲末每用少許含化津嚥如喉閉不能嚥用竹筒吹藥入喉中

玄明粉（御藥院方）此藥大治邪熱所干膈上氣滯臟腑秘澁並宜服之以朴硝煎過澄濾五七遍至夜於星月下露至天明自然結作青白塊子用磁罐子按實於炭火內從慢至緊自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煆便取出於淨地上倒下用盆合蓋了以去火毒然後研

爲細末每二斤入甘草生熟二兩爲末一處攪勻臨睡斟量用之或一錢二錢以桃花煎湯或葱白湯下

白虎湯　治氣熱（見溫熱）

四順清涼飲　治血熱　（見風熱）

薄荷煎（御藥院方）治口舌生瘡痰涎壅塞咽喉腫痛

薄荷（一兩取頭末三錢半）　川芎（半兩取末二錢）　腦子（半錢別研）　砂仁（一兩半取末二錢）

右爲末入腦子和勻煉蜜成劑任意噙嚥和劑方無腦子有桔梗

天竺散（經驗方）治臟腑積熱煩燥多渴口舌生瘡咽喉腫痛

山梔子（去殼）　連翹（各三錢）　甘草（三兩二錢）　鷄冠雄黃（半錢）

瓜蔞（一兩六錢）　鬱金（用皂角水煑切片焙乾三錢）

右爲末每服一錢食後臨睡新汲水調下

清氣散（本事方）治氣壅痰涎上膈煩熱

枳殼　川芎　柴胡　前胡　茯苓

甘草　獨活　羌活　青皮　白术

人參（各等分）

右爲末每服二錢水一鍾荆芥一穗煎七分服

龍腦飲（和劑方）治蘊積邪熱咽喉腫痛心煩鼻衄及痰熱咳嗽中暑煩躁傷寒餘毒發熱並宜用之

縮砂仁　瓜蔞根（各三兩）　石膏（四兩）　藿香葉（二兩四錢）

甘草（六兩）　梔子仁（十二兩）

右爲末每服二錢用新汲水入蜜調下

傷寒餘毒潮熱虛汗除蜜入竹青煎服

龍腦雞蘇丸（和劑方）治煩渴凉上膈解酒毒除邪熱并治咳嗽嗽血吐血衄血諸淋下血胃熱口臭肺熱喉腥脾熱口甜膽熱口苦並宜服之

黃耆（去蘆一兩）　麥門冬（去心四兩）　阿膠（炒）　蒲黃（炒各二兩）　人參（去蘆一兩）

生乾地黃（六兩另研細末）　甘草（炙一兩半）　木通（二兩同柴胡浸）

柴胡（銀州者二兩和木通以湯半升浸一二宿取汁爲膏）　雞蘇淨葉（一斤即薄荷）

右除別研藥外並擣爲末將好蜜二斤先煉一二沸然

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

後下生乾地黃末不住手攪令勻取木通柴胡汁慢火熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和爲丸如黃豆大每服二十丸嚼破熱水下虛煩消渴驚悸人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血麥門冬煎湯下惟淋用車前子煎湯下

甘露飲（和劑方）治胃中客熱牙宣齦腫咽膈乾燥吐氣腥臭或胃經受濕伏熱在裏身黃如疸亦能治之

枳殼（去白麩炒）　石斛（去芦）　枇杷葉（刷去毛）　甘草　乾熟地黃

黃芩　天門冬（去心焙）　麥門冬（去心焙）　山茵陳　生乾地黃

右㕮咀每服三錢水一鍾煎至七分食後溫服

滋腎丸（拔粹方）治不渴小便閉和熱在血分也

知母（二兩酒浸陰乾）　肉桂一（錢半）　黃蘗（一兩細剉酒拌炒陰乾）

右知母黃柏氣味俱陰以同腎氣故能補而瀉下焦火也桂與火邪同體故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也熱水爲丸百沸湯下

〇已上諸方治三焦實火虛熱之劑

〇風熱（新增）

附諸方

定風餅子（簡易方）治風客陽經邪傷腠理背膂强直言語蹇澁體熱惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵及飲酒

過多嘔吐涎沫頭目眩暈常服消風去和（見傷風）

追風散（和劑方）治諸風上攻頭疼目眩鼻塞聲重皮膚瘙癢痒眉角牽引婦人血風一切頭風並治之

白殭蠶（去絲嘴炒）荊芥（二兩）石膏（四兩）川烏（炮去皮臍四兩）

防風（去芦叉四兩）全蝎（炒一兩）川芎（三兩）麝香（一兩研）甘草（炙二兩）

右為末每服半錢食後臨臥茶調下

荊芥丸（楊氏方）治一切風邪上攻頭目咽膈不利或傷風發熱頭疼鼻塞聲重並皆治之（見傷風）

養氣丹（和劑方）治諸虛百損真陽不固上實下虛氣不升降或咳嗽或喘促一切躰虛氣弱之人婦人血海冷憊諸證並宜服之

禹餘粮（火煅醋淬各七次）紫石英（火煅七次）磁石（火煅醋淬七次各半斤）

赤石脂（如煎去）代赭石（火煅醋淬七次一斤）

已上五石各以水再研挹其清者置之紙上用竹篩盛之滴盡水候乾各用瓦瓶（盛）貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十斤分作五處煅此五藥以紙灰蓋之火盡再煅如此三次埋地穴內兩日出火毒再研細入後藥

肉蓯蓉（酒洗浸一宿焙乾一兩半）破故紙（炒）附子（炮一兩）茴香（炒）

丁香 木香（不見火）肉桂（去皮）山藥 巴戟（去心鹽湯浸）

肉豆蔻（麫裹煨）　鍾乳粉（另研）　鹿茸（酥炙）　當歸（酒浸一宿焙乾）　沉香

白茯苓（去皮）　遠志（去心）　沒藥（去砂別研）　陽起石（煆別研）　五靈脂（別研）

乳香（別研）　朱砂（別研各一兩）

右入前藥同研極勻用糯米糊為丸每兩作五十丸陰乾入布袋內擦令光瑩每服二十丸空心温酒姜盐湯任下婦人用艾醋湯下

養正丹（和劑方）治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗唇青婦人血海久冷並治之

水銀　黑錫（去滓淨秤與水銀結砂子）　硫黃（研）　朱砂（研細各一兩）

右用黑盞一隻火上溶黑鉛成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成砂和勻如有燄以醋灑之候冷取出研極細煮糯米糊為丸如菉豆大每服三十粒盐湯棗湯任下

○廣寿年初見養氣丹養正丹出證曰治諸虛百損真陽不足上實下虛氣不升降一切躰弱氣虛之人並宜服之云者予以為補虛益損之劑無出於此後觀本草集要曰熱中消中不得服芳草石藥夫芳草之味美石藥之氣悍云云予則於此二丹所用石藥不能不致疑焉及觀七方十劑之目石藥乃為重劑重

可以去怯其疑方繞釋也何以言之夫躰弱氣虛之人稠痰鬱火膠固於膏肓之間非石藥之氣悍而能開散之乎蓋石藥所以去病邪病邪退而正氣自復正猶石灰所以殺稂莠稂莠死而禾苗自茂也石藥非補人之藥亦猶石灰非肥田之物養氣丹內有蓯蓉鹿茸當歸等藥庶乎有補而養正丹全是金石之藥何補之有哉觀者詳焉

○已上諸方辛温發散之劑

清風散（和劑方）治諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻嚏声重耳作蟬鳴及皮膚頑麻𤺋痒瘾疹婦人血氣風頭皮腫痒並治之（見傷風）

八風散（和劑方）治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急皮膚𤺋痒瘾疹成瘡及治寒熱不調鼻塞声重

藿香（去土半斤）　白芷　前胡（去芦各一斤）　黃耆（去芦）　甘草（爁）

人參（去芦各二斤）　羌活（去芦）　防風（去芦各三斤）

右為末每服二錢水一盞入薄荷少許煎湯調下食後服清茶亦可

清神散（和劑方）消風化痰治頭目眩暈耳聾鼻塞咽嗌不利

檀香（剉十兩）　人參（去芦十兩）　羌活（去苗十兩）　石膏（研五兩）　薄荷（去土二十兩）

荊芥（二十兩）　甘草（炙二十兩）　防風（去蘆十兩）　細辛（去苗洗焙五兩）

右爲細末每服二錢食後沸湯點服或入茶末尤妙

四生散（和劑方）治男子婦人肝腎風毒上攻赤眼痒痛羞明多淚及下注脚膝生瘡遍身風癬兩耳內痒服之尤效

黃耆　川獨活　蒺藜（沙苑者）　白附子

右等分爲細末每服二錢薄荷酒調下如腎臟風下疰生瘡以豬腰子批開入藥末二錢在內合定裹煨熟空心細嚼用鹽酒下

川芎茶調散（和劑方）治諸風上攻頭目昏眩偏正頭疼腦疼鼻塞声重

大辰砂丸（御藥院方）清頭目化痰涎及感冒風寒鼻塞声重頭目昏眩項背拘急皮膚瘙痒並皆治之（見傷風）

防風散（楊氏方）治頭目不清去風明目

防風　川芎　白芷　甘菊花　甘草

右等分爲末每服二錢食後荊芥湯調下

追風散（瑞竹堂方）治白癜風

何首烏　荊芥穗　苦參　蒼朮（米泔水浸一宿焙乾各等分）

右件爲細末好肥皂角三斤去皮弦入磁器內熬爲膏和爲丸如梧桐子大每服三五十丸空心酒茶任下忌

一切動風之物

胡麻散（和劑方）治脾肺風毒攻衝遍身皮膚瘙痒或生瘡疥或生癮疹用手搔時浸淫成瘡久而不差愈而復作面上游風或如虫行紫白癜頑麻或腎臟風攻生瘡並宜服之（見癮疹）

四神丸（經驗方）治手足頑麻痰涎壅盛頭目昏眩肩背拘急（見痰熱）

芎朮湯（御藥院方）清神爽志祛風消蘊治頭目昏痛鼻塞声重

川芎（二兩半）　白朮（一兩七錢五分）

右㕮咀每服八錢水一盞半姜五片煎至八分去滓溫服食後或爲細末白湯點服亦得

天麻散二（宣明方）治頭項痛頭面腫拘急風傷衛發躁熱

川芎　苦參　地骨皮　細辛　威靈仙
何首烏　薄荷葉　蔓荊子　菖蒲　杜蒺藜
牛蒡子　蚵蚾草　荊芥穗　防風（已上各半兩）
天麻（一兩）　甘草（炙二兩）

右爲末每服三錢用蜜水調下茶酒任下不拘時

防風天麻散（宣明方）治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯或暴瘖不語內外風熱壅滯并解昏眩（見中風）

消毒犀角飲　治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅滯或腮項結核遍身瘡癤並宜治之（見斑疹）

一方　治風熱結滯或生瘡癤及金石發熱小腸等熱用桑椹不拘多少微研以布絞去柤以瓦器熬稀膏量多少入蜜再熬成稀膏盛于磁器中每服一二匙食後臨臥以沸湯點服

已上諸方辛平發散之劑

上清散　治上焦熱耳鼻壅塞頭目不清

川芎　荊芥穗　薄荷葉（各五錢）　朴硝

石膏　桔梗（各一兩）

右為細末每服一字口噙水鼻內搐之加龍腦三分妙

上清丸　治口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽煩熱能清聲潤肺寬膈化痰爽氣寧神

百藥煎　薄荷（淨末各四兩）　縮砂（一兩）　片腦（一錢）　玄明粉

甘松　桔梗　訶子　硼砂（各五錢）　寒水石

右為細末甘草熬膏為丸如梧桐子大每服一丸噙化或嚼三五丸茶湯下

龍腦丸（宣明方）　治大人小兒一切蘊熱毒氣不散口舌生瘡咽喉腫痛及失音癮疹

龍腦　朱砂　硼砂　牛黃（各等分）

右爲末黃蠟爲丸如米粒大每服三五丸浸甘草人參湯送下

龍腦川芎丸（御藥院方）消風化滯除熱消痰通利七竅爽氣清神

桔梗（一兩半）片腦（六錢）縮砂仁（二錢）白豆蔻（五錢）

薄荷（去土五兩三錢）川芎　防風（去芦）　甘草（各一兩）

右爲末煉蜜爲丸每兩作二十九丸每服二丸細嚼茶清送下

當歸龍腦丸（宣明方）治腎水陰虛風熱蘊積特發驚悸筋惕搐搦神志不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉瞤瘛胸膈痞塞咽嗌不利腸胃燥澁小便溺閟筋脉拘急肢體痿弱暗風癇疾小兒急慢驚風常服宣通血氣調順陰陽病無再作

當歸（焙）　草龍膽　山梔子　黃連　黃蘗

黃芩（各一兩）　大黃　蘆薈　青黛（各五錢）　木香（二錢半）

麝香（半錢別研）

右爲末煉蜜和丸如小豆大（小兒如麻子大）每服二十丸生姜湯送下忌發熱諸物（兼服防風通聖散）

羌活散（和劑方）治風氣不調頭目昏眩痰涎壅滯遍身拘急及風邪塞壅頭痛項強鼻塞声重肢節煩痛天陰風

兩預覺不安（見傷）

羌活丸　治症同前

旋覆花湯（御藥院方）治風熱則面生赤癍子腦昏目疼鼻塞声重面上遊風狀如虫行忌豬肉麪

旋覆花（去土）人參（去芦）柴胡（去芦）赤茯苓（去皮）赤芍藥（去皮）

黃芩（去皮）枳實（麩炒）甘草（各二兩）

右㕮咀每服一兩水一盞半生姜五片煎至八分去滓食後溫服

通關散（御藥院方）治風熱上攻頭目筋脉拘急疼涎壅戲肢節煩疼

羌活（去芦）獨活（去芦）防風（去芦）天麻（去芦）山梔子

大黃（各一兩）滑石（二兩）甘草（一兩）

右㕮咀每服八錢水一盞半生姜五片煎至八分食後溫服

仙朮芎散（宣明方）治風熱壅塞頭目昏眩及明耳目消痰飲清神

川芎　連翹　黃芩　山梔子　菊花

防風　大黃　當歸　芍藥　桔梗

藿香葉（各五錢）蒼朮　石膏（各一兩）甘草

荊芥穗　滑石　薄荷葉　縮砂仁（各二錢五分）

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分食後通口服

川芎石膏湯　治風熱上攻頭目眩痛咽乾煩渴

防風通聖散　治風熱諸證總剤

○廣按此方治熱風燥三者之總剤也凡熱風燥之為病必於此而取則焉何以言之風本於熱熱極則風生燥生於風風動則燥至是熱風燥三者其實一源流也故此一方而能無治之覘其用防風麻黄薄荷荊芥使熱邪從玄府出也用梔子滑石使熱邪從小便出也用大黄朴硝使熱邪從大便出也其餘黄芩散肺火連翹散心火石膏散胃火芍藥散脾火川芎當歸和血潤燥白朮甘草補脾和中桔梗開肺並無一味辛香燥熱之藥可謂善於處方矣故於熱風燥三者之證百發百中無施而不可非聖於醫者其能是歟

愈風丹（瑞竹堂方）治諸般風證偏正頭痛

防風通聖散　四物湯　黄連解毒湯（各二料）

加羌活　何首烏　細辛　菊花　天麻

獨活　薄荷（各一兩）

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶清下不拘時

荊黃湯（和利方）治風熱結滯或生瘡癤

荊芥（四兩）大黃（二兩）

右㕮咀每服五錢水一鍾煎至六分空心服

凉膈散（和劑方）治大人小兒臟腑積熱口舌生瘡痰實不利煩燥多渴腸胃秘澁便溺不利（見溫熱）

連翹（四錢四分）甘草　川大黃　朴硝（各二錢）薄荷

黃芩　山梔子各一錢

右水二鍾竹葉七片蜜少許同煎一鍾食後服

既濟解毒湯　治上熱頭目赤腫而痛腹中積滯胸滿困卧大便微秘

大黃（酒煨）黃連（酒炒）黃芩（酒炒）甘草（炙）桔梗（各一錢）

柴胡　升麻　連翹　當歸身各一錢

右每服水二鍾煎一鍾食後溫服

洗心散　治風壅痰澁心經積熱口苦脣燥眼澁多淚大便秘結小便赤澁（見火類）

犀角地黃湯　治風熱尖具眼赤目痛喉閉口瘡丹毒

（見血）

四順清凉飲　治一切積熱丹毒介喉嚨熱痛

當歸（去芦）甘草（炙）赤芍藥　大黃（各等分）

右每水一鍾煎食後溫服每服五錢

牛黃清心丸（和劑方）治諸風緩縱不隨語言蹇澁心怔健忘恍惚去來頭目眩暈胷中煩鬱痰涎壅塞精神昏憒又治心氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘慼虛煩少睡喜怒無時或發狂顛神思昏亂（見中風）

○已上諸方辛凉外散内消之劑

○廣按宣明論云夫熱風之體也曲直動搖風之用也風生於熱以熱爲本而風爲標凡言風者即風熱病也又按錢氏小兒論云肝有風目連劄不搐得心熱則搐以此論之凡病掉眩強直之謂風風則不離乎熱也觀火燄之上揺則熾風之象矣　又按古方不分風之從外入由内起一槩曰風今予分之外入則曰中風傷風冒風内起則曰風熱外入治以辛温外散内起則治之以辛凉内消庶得其病機治法也

吐血

四十四

丹溪心法

〇吐血陽盛陰虛故血不得下行因火炎上之勢而上出脉必大而芤大者發熱芤者血滯與失血也　大法補陰抑火使復其位用交趾桂五錢為末冷水調服　山梔子最清胃脘之血　吐血覺胸中氣塞上吐紫血者桃仁承氣湯下之　先吐紅後見痰嗽多是陰虛火動痰不下降四物湯為主加痰藥火藥　先痰嗽後見紅多是痰積熱降痰火為急　痰嗽涎帶血出此是胃口清血熱蒸而出重者梔子輕者藍實或暴吐紫血一碗者無事吐出為好此熱傷血死於中用四物湯解毒湯之類　吐血挾痰積吐一二碗者亦只補陰降火四物湯加火劑之類　挾痰若用血藥則泥而不行只治火則止　吐血火病也　大吐紅不止以乾姜炮末童便調從治　喉脘痰血荊芥散妙　舌上無故出血如線不止以槐花炒末乾摻之　若吐血一方童便一分酒半分擂栢葉溫飲非酒不行　嘔吐血出於胃也實者犀角地黃湯主之虛者小建中湯加黃連主之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

入方

三黃補血湯　治初見血及血多宜服

熟苄一錢　生苄半錢　當歸七分半　柴胡五分　升麻

芍藥二錢　牡丹皮五分　川芎七分半　黃芪五分

右以水煎服　血不止可加桃仁半錢酒大黃斟酌虛實用之內却去柴胡升麻

又方　治見血後脾胃弱精神少血不止者

人參一錢　黃耆二錢　五味十三粒　芍藥　甘草五分

當歸五分　麥門冬五分

右㕮咀水煎服　加鬱金研入亦可

又方

人參　白术　茯苓　陳皮各一錢　甘草

半夏麴　川芎各五分　青皮　神麴各三分

右㕮咀水煎服　如胃不和加藿香　如渴者加葛根半錢　若痰結塊者加貝母一錢黃芩半錢去白陳皮半錢　若小便赤色加炒黃栢五分　若大便結燥加當歸七分　心煩加黃連酒拌炒乾五分　若小便滑加煅牡蠣　若見血多去半夏恐燥加生苄一錢牡丹五分桃仁三分　若胃中不足飲食少進加炒山梔仁八分　若血溢入濁道留聚膈間滿則吐血蘇子降氣

湯加人參阿膠各五分　上膈壅熱吐血者以四物湯加荊芥阿膠各五分更不止於本方中加大黃滑石各五分　胃傷吐血宜理中湯加川芎乾葛各五分此是飲酒傷胃也吐血不止用生茜根爲末二錢水煎放冷食後服良　白芨末調服治吐血

已上諸方雖非丹溪所出以其藥同故　錄於前

附諸賢論

劉宗厚曰經云榮者水穀之精也和調五臟洒陳於六腑乃能入於脉也源源而來生化於脾總統於心藏受於肝宣布於肺施泄於腎灌溉一身目得之而能視耳得之而能聽手得之而能攝掌得之而能握足得之而能步臟得之而能液腑得之而能氣是以出入升降濡潤宣通者由此使然也注之於脉少則濇充則實常以飲食日滋故能陽生陰長取汁變化而赤爲血也生化旺則諸經恃此而長養衰耗竭則百脉由此而空虛可不知謹養哉故曰血者神氣也持之則存失之則亡是知血盛則形盛血弱則形衰神靜則陰生形役則陽亢陽盛則陰必衰又何言陽旺而生陰血也蓋謂血氣之常陰從乎陽隨氣運行於內苟無陰以羈束則氣何以樹立故其致病也易調治也難以其比陽常虧而又損之

則陽易亢陰易乏之論可以見矣諸經有云陽道實陰道虛陰道常乏陽常有餘陰常不足以人之生也年至十四而經行至四十九而經斷可見陰血之難成易虧如此陰氣一傷所變之證妄行於上則吐衂衰涸於外則虛勞忘返於下則便紅稍熱膀胱則癃閉溺血滲透腸間則爲腸風陰虛陽搏則爲崩中濕蒸熱瘀則爲滯下熱極腐化則爲膿血火極似水血色紫黑熱勝於陰發爲瘡瘍濕滯於血則爲痛癢癮疹皮膚則爲冷痺蓄之在上則人喜忘蓄之於下則人喜狂墮跌仆則瘀惡內凝若分部位身半已上同天之陽身半已下同地之陰此特舉其所顯之証者治血必血屬之藥欲求血藥其四物之謂乎河間謂隨證輔佐謂之六合湯者詳言之矣余故陳其氣味專司之要不可不察夫川芎血中氣藥也通肝經性味辛散能行血滯於氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能生真陰之虛也當歸分三治血中主藥也通肝經性味辛溫全用能活血各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經性味酸寒能涼血治血虛腹痛也若求陰藥之屬必於此而取則焉脾胃論有云若善治者隨經損益摘其一二味之所宜爲主治可也此特論血病而求血藥之屬者也若氣虛血弱又當

從長沙血虛以人參補之陽旺則生陰血也若四物者獨能主血分受傷為氣不虛也輔佐之屬若桃仁紅花蘇木血竭牡丹皮者血滯所宜蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰者血崩所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者血痛所宜蓯蓉瑣陽牛膝枸杞子益母草夏枯草敗龜板者血虛所宜乳酪血液之物血燥所宜乾姜桂者血寒所宜生地黃苦參血熱所宜特取其正治大畧耳若能觸類而長可謂應無窮之變矣

附脉理

脉訣舉要曰諸證失血皆見芤脉隨其上下以驗所出大凡失血脉貴沉細設見浮大後必難治

附諸方

犀角地黃湯　治傷寒汗下不解鬱于經絡隨氣湧泄為衄血或清道閉塞流入胃腹吐出清血如鼻衄吐血不盡餘血停留致面色痿黃大便黑者更宜服之

犀角（鎊）　生芐　白芍　牡丹皮（各等分）

右㕮咀每服五錢水煎溫服實者可服

桃仁承氣湯

芒硝　桂（各三錢）　甘草（二錢五分）　大黃（一兩）

桃仁（五錢去皮尖）

一右㕮咀每服一兩入姜同煎

黃連解毒湯（見溫熱）

三黃丸　治積熱吐血咽膈不利（見火類）

犀角地黃湯（拔粹方）主脉浮客脉芤浮芤相合血積胸中熱之甚也血在上焦此藥主之

生地黃（二兩）　黃連　黃芩（各一兩）　大黃（半兩）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食後通口服

四生丸（良方）治吐血衄血陽盛於陰血熱妄行

生荷葉　生艾葉　生栢葉　生地黃（各等分）

右研爛丸如雞子大每服一丸水三鍾煎至一鍾濾過溫服

藕汁散（濟生方）治吐血衄血不止

生藕汁　生地黃汁　大薊汁（各三合）　生蜜（半匙）

右件藥汁調和令勻每服一小鍾不拘時服

雙荷散（聖惠方）治卒暴吐血

藕節（七箇）　荷葉頂（七箇）

右同蜜擂細水二鍾煎八分去滓溫服或研末蜜調下

枇杷葉散　治暑毒攻心嘔吐鮮血（方見中暑）

〇已上數方治內實吐血之劑

小建中湯

桂枝　甘草（炙三錢）　大棗（三箇）　白芍（六錢）　生姜（一錢）

阿膠（炒一合）

右㕮咀水煎

荊芥散

荊芥穗（半兩）　甘草（一兩）　桔梗（二兩）

右㕮咀姜煎食後服

大阿膠丸（和劑方）治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有鮮血勞傷肺胃吐血嘔血並皆治之

麥門冬（去心半兩）　茯神　栢子仁　百部根　杜仲（炒）

丹參　貝母　防風（各五錢）　遠志　人參（各二錢五分）

茯苓　乾山藥　熟地黃　阿膠　五味子（各二兩）

右爲末煉蜜丸如彈子大每服一丸水煎六分和查服

必勝散（和劑方）治男子婦人血妄流溢或吐或咳衄血

小薊（并根用）　人參　蒲黃　當歸（去芦）　熟地黃

川芎　烏梅（去核各一兩）

右㕮咀每服四錢水一鍾煎七分溫服不拘時

龍腦鷄蘇丸　治膈熱咳嗽或吐血衄血（見火類）

茯苓補心湯　治心虛爲邪氣所傷吐血（見咳血）

是齋白术散（簡易方）治積熱吐血咳血若因飲食過度負重有傷脾胃而吐血者最宜服之惟忌食熱麪煎煿一

切發風之物

白术（二兩） 人參（去芦） 白茯苓（去皮） 黃芪（蜜浸各一兩） 山藥 百合（去心各七錢半） 甘草（炙半兩） 柴胡 前胡（各三錢半）

右㕮咀每服三錢水一鍾姜三片棗一枚煎六分溫服

歸脾湯 治思慮傷脾不能統攝心血以致妄行或吐血下血 見健忘

天門冬湯（濟生方） 治思慮傷心吐血衄血

遠志（去心甘草水煮） 白芍藥 天門冬（去心） 麥門冬（去心） 黃芪（去芦） 藕節 阿膠（蛤粉炒） 沒藥 當歸 生地黃（各一兩） 人參 甘草（炙各五錢）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜五片煎六分不拘時溫服

加味理中湯

乾姜（炮） 人參 白术（略各二兩） 甘草 葛根（各半兩）

右㕮咀每服三錢水一鍾煎七分溫服不拘時

麥門冬飲子（發粹方） 治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

人參（五錢） 五味子（五錢） 紫菀（一錢半） 黃芪 芍藥 甘草（各一錢） 當歸身 麥門冬（各五分）

右㕮咀作二服水煎食後服之

團參丸 治吐血咳嗽服凉藥不得者

人參　黃耆　飛羅麪（各一兩）　百合（五錢）

右為末滴水為丸如梧子大每服三十丸茅根湯下

辰膠散（經驗方）治大人小兒吐血

阿膠（炒）　蛤粉（各一兩）　辰砂（少許）

右為末藕節擣汁和蜜調下食後服

側栢散　治內損吐血下血因酒太過勞傷於內血氣妄行其出如湧泉口鼻皆流須臾不救服此即安又治男子婦人九竅出血

側栢葉（一兩五錢蒸乾）　人參（一兩去芦）　荊芥穗（一兩燒灰）

右為末每服三錢入飛羅麪三錢拌和汲水調粘稠似啜服

一方　治吐血

用生地黃五斤搗汁生蜜二斤半以瓷錫器盛貯於鍋內重湯桑柴火煑三日三夜取出入人參末四兩茯苓末六兩拌勻不拘時候以熱湯點服一名瓊玉膏

一方

用栢葉一握乾姜三片阿膠二挺炙水二鍾煎至一鍾去柤頓服

芎窮湯（濟生方）治一切失血過多眩暈不甦

芎窮　當歸（去芦酒浸各等分）

右㕮咀每服四錢水二鍾半煎至七分温服不拘時

四物湯（見補損）治失血過多加栢葉煎服

理中湯　見中寒

蘇子降氣湯　見痰類

○已上諸方治內虛吐血之劑

一方　治酒色傷心肺口鼻俱出血

用荊芥燒灰置地上出火毒為末每服三錢陳米湯下

一方　治大人吐血及傷酒食醉飽低頭掬重損傷吐血至多汗血妄行口鼻血出但声未失者投之無不効

百草霜（即鍋底上黑灰外人家者妙）

右為末每服三錢米飲調下或井花水調下三服即愈

若鼻衄用一捻吹入鼻中立効

○皮肉破處及炙瘡出血百般用藥不止摻半錢或一字立止

一方　治吐血

用好墨為末每服二錢以白湯化阿膠清調服

一方

用血餘燒灰為末每服三錢冷水調下

○如鼻衄以竹管吹入鼻中即止

一方　治吐血咯血

用藕節搗汁飲之

一方

用栢葉瓦上焙乾為末每服三錢食後米飲調下

一方

用大黃末每服一錢以生地黃汁一合水半鍾煎四五沸溫服即愈

一方　治飲酒過多蘊熱胸膈以致吐血衂血

葛花（二两）　黃連（四两）

右為末以大黃末熬膏子丸如梧桐大每服一百丸溫湯下或煎服亦可

吐衂証若脉滑數难治

○已上諸方止血涼血之劑

○虞搏氣血屬陰喜靜者也若夫動静有常則氣血（調均）陰陽和順何病之有哉今也六淫侵于外七情戕于中動過於靜陽勝乎陰則氣有餘而血不足也丹溪曰氣有餘便是火火性急暴爍灼經絡則血沸騰而錯經妄行為咳血嘔血咯血衂血溺血下血之所由也況血為氣之依附若是血敗散枯涸則氣失依附而發越矣不死何待可不畏哉治療大法以苦寒藥散火涼血為君以辛味藥開鬱利氣為臣以升提藥俾復其位為佐使或以酸澁藥止塞其源或以苦

劑藥收補其後如此病之不愈者未之有也　又按丹溪正法出血條已兼咳嘔咯衄四者附方嘔血衄血通用

咳血　四十五　戊集

丹溪心法

○咳血　火升　痰盛　身熱多是血虛四物湯加減用

戴云欬血者嗽出痰內有血者是嘔血者嘔全血者是咯血者每欬出皆是血疙瘩衄血者鼻中出血也溺血者小便出血也下血者大便出血也雖有名色分六俱是熱證但有虛實新舊之不同或妄言爲寒者誤也

入方

青黛　瓜蔞仁　訶子　海粉　山梔

右爲末以蜜同姜汁丸噙化欬甚者加杏仁去皮尖後以八物湯加減調理

附諸方

黄芪散　治欬成劳

甘草（四錢）　黄芪　麥門冬　熟苄　桔梗

白芍（各五錢）

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

右㕮咀每服五錢水煎

茯苓補心湯（三因湯）治心氣虛耗不能藏血以致面色黃瘁五心煩熱咳嗽唾血　及婦人懷妊惡阻嘔吐亦宜治之

半夏（湯泡七次）　前胡　白茯苓　人參（各七錢五分）　紫蘇
枳殼（麩炒）　桔梗　甘草（炙）　乾葛　陳皮（各五錢）
當歸（一兩二錢）　熟地黃（一兩五錢）　白芍藥（二兩）　川芎（七錢五分）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜三片棗一枚煎七分食後溫服

雞蘇丸（拔粹方）治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉（八兩即金錢薄荷）　黃耆　防風　荊芥（各一兩）
桔梗　川芎　甘草　菊花　生芐（各半兩）
片腦（五分）

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸用麥門冬去心煎湯送下　又治肺損吐血日漸乏力衰弱行步不得促嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澁加車前子三錢用桑皮剉炒香煎湯嚼下

經効阿膠丸（濟生方）治嗽血唾血

當歸地黃湯（宣明方）治嗽血衄血大小便血或婦人經候不調月水過多喘嗽（並見癆瘵）

人參芎歸湯（直指方）治虛勞少血津液內耗心火炎燥熱乘肺金咳嗽咯血及血不榮肌肉動輒毛寒咳嗽

當歸　川芎　白芍藥（各一錢）　人參　半夏（製）

橘紅　阿膠（炒）　赤茯苓　細辛　五味

甘草（炙各二錢五分）

右㕮咀每服八錢水二鍾姜三片煎一鍾食後溫服

一方　治咳嗽

用新綿燒灰半錢食後好酒調服

一方

用栢葉瓦上焙乾爲末每服三錢食後米飲調下

嘔血　四十六

丹溪心法

○嘔血火載血上錯經妄行　脉大發熱喉中痛者是氣虛用參芪蜜炙黃栢荊芥當歸生地黃用之　嘔血用韭汁童便姜汁磨鬱金同飲之其血自清　火載血上錯經妄行用四物湯加炒山梔童便姜汁服　又方山茶花童便姜汁酒服　又鬱金末治吐血入姜汁童便良　又一方用韭汁童便二物合用鬱金細研和服　又方治吐血或

衄血上行用鬱金如無用山茶花代薑汁童便和好酒調服即止後以犀角地黃湯加鬱金　怒氣逆甚則嘔血暴癉內逆肝肺相搏血溢鼻口但怒氣致血證者則暴甚故經曰抑怒以全陰者是也否則五志之火動甚火載血上錯經妄行也用柴胡黃連黃芩黃芪地骨生熟芐白芍以水煎服虛者以保命生地黃散再加天門冬枸杞甘草等分水煎服

附諸方

一方　治嘔血

黃栢（蜜炙）

右擣為末煎麥門冬湯調二錢匕立瘥

聖惠方　治嘔血

側栢葉（或晒乾或陰乾或瓦焙乾）

右為末不計時以米飲調下一錢匕

保命生地黃散　治諸見血無寒吐血衄血下血溺血

生地黃　熟地黃　枸杞子　地骨皮　天門冬（去心）

黃芪　白芍藥　甘草（炙）　黃芩（各等分）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食前通口服

一脉微身凉加減每一兩加官桂伍分

大薊散　濟生方　治飲啖辛熱傷於肺經嘔血出血名曰肺

疸

大薊根（洗）犀角（鎊）升麻　桑白皮（炙）蒲黃（炒一）

杏仁（去皮尖各一兩）　甘草（炙五錢）　桔梗（炒一兩）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜五片煎至八分溫服不拘時

咯血　四十七

附痰涎血

戊集

○咯血痰帶血絲出者用姜汁青黛童便竹瀝入血藥中用如四物湯加地黃膏牛膝膏之類　咯唾血出於腎以天門冬麥門冬貝母知母桔梗百部黃柏遠志熟苄牡蠣姜桂之類　痰涎血出於脾以葛根黃芪黃連芍藥當歸甘草沉香之類主之

又方　治痰中見血

白朮（一錢五分）當歸（一錢）芍藥（一錢）牡丹皮（一錢五分）桃仁（研一錢）

山梔（炒黑八分）桔梗（七分）貝母（一錢）黃芩（八分）甘草（三分）

青皮（五分）

右以水煎服

又方　治痰中血

白朮（一錢五分）牡丹皮（一錢五分）貝母一錢　芍藥一錢

桑白皮（一錢）山梔（炒黑一錢一分）桃仁（研一錢）甘草三分

右以水煎服

又方　治痰中血

橘紅二錢　半夏一錢　茯苓一錢　甘草三分　白朮一錢

枳殼一錢　人參五分　五味（十五箇）　桑白皮一錢　黃芩一錢

右以水一鍾姜三片煎服　或加青黛半錢

又方

橘紅（一錢五分）半夏　茯苓　牡丹皮　貝母

桃仁（各一錢）黃連（七分）甘草　大青（各五分）

右以水煎生姜三片

附諸方

治咯血

荷葉（不拘多少焙乾）

右為末米湯調二錢七

又方　治咯血及衄血

白芍藥（一兩）　犀角末（二錢半）

右為末新汲水服一錢七血止為限

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

又方　治咯血

桑白皮（一錢五分）　半夏（炒一錢）　知母　貝母　茯苓（各一錢）

阿膠（炒五分）　桔梗（七分）　陳皮（一錢）　甘草　杏仁（炒各五分）

生芐（一錢）　山梔（七分）　柳桂（二分即桂之嫩小枝條也宜入治上焦）

右以水煎生姜三片

天門冬丸（本事方）治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬（一兩）　甘草　白茯苓　阿膠　杏仁（炒）

貝母（各五錢）

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服一丸噙津含化日夜可十九

雞蘇散（济生方）治劳傷肺經唾內有血咽喉不利

雞蘇葉　黃耆　生地黃（洗淨）　阿膠　貝母

白茅根（各一兩）　桔梗（去蘆）　麥門冬（去心）　甘草（炙各五錢）

右㕮咀每服四錢水一鍾薑三片煎七分温服

槐花散（朱氏集驗方）治咯血失血

用槐花炒為末每服二錢糯米飲下仰卧

黃連阿膠丸（济生方）治劳嗽并嗽血唾血　見痢類

恩袍散　治咯血吐血唾血及煩燥欬嗽

生蒲黃　乾荷葉　茅根（各等分）

右為末每服三錢濃煎桑白皮湯食後温服

衄血 四十八

丹溪心法

○衄血凉血行血為主大抵與吐血同　用山茶花為末童便姜汁酒調下　犀角生地黃湯入鬱金同用加黃芩升麻犀角能解毒　又以鬱金末童便姜汁并酒調服　治經血逆行或血腥或吐血或嘔血用韭汁服之立効　治血汗血衄以人中白新瓦上火逼乾入射香少許研細酒調下經驗人中白即溺盆白垽秋石也　衄血出於肺以犀角升麻梔子黃芩芍藥生地黃紫菀丹參阿膠之類主之　原病式曰衄者陽熱怫鬱干於足陽明而上熱則血妄行故病衄也

附諸方

河間生地黃散　治鬱熱衄血或咯吐血皆治之

枸杞　柴胡　黃連　地骨　天門冬

白芍　甘草　黃芩　黃芪　生芐

熟芐（各等分）

右㕮咀水煎服　若下血加地榆

又方　治衄血

伏龍肝（半升即鍋心竈土）

右以新汲水一大碗淘取汁和蜜頓服

茜根散　治鼻衄不止

茜根　阿膠（蛤粉炒）　黃芩（各一兩）　側栢葉　生苄（各一兩）

茸草（各半兩）

右以水煎服加姜三片

黃芩芍藥湯　治鼻衄不止

黃芩　芍藥　茸草

右以水煎服　或犀角地黃湯如無犀角以升麻代之

○鼻通於腦血上溢於腦所以從鼻而出凡鼻衄並以茅花調止衄散時進折二泔仍令以麻油滴於鼻或以蘿蔔汁滴入亦可又茅花白芍藥對半尤好　外迎法以井花水濕紙頂上貼之　左鼻衄以線扎左手中指右出扎右手中指俱出兩手俱扎　或炒黑蒲黃吹鼻中或龍骨末亦可

止衄散

黃芪（六錢）　赤茯苓　白芍藥　當歸　生苄

阿膠（各三錢）

右為末每服二錢食後黃芪湯調下

芎附飲

川芎（二两）　香附（四两）

右爲末每服二錢茶湯調下

〇震按血証須要凉血散火此藥既非凉血又非散火何也盖血病用血藥而不効者以其血之所藏無以養也夫心主血肝藏血此方用川芎所以和血通肝而使血歸於肝臟也用香附所以開鬱行氣而使火散經絡也血歸火散何病之不止哉

黃芩芍藥散（拔粹方）治虛家不能飲食衂血吐血

黃芩　芍藥　甘草（各等分）

一法加生姜黃者

右水煎服　此藥治傷寒衂血吐血嘔血

茜梅丸（本事方）治衂血無時

茜根草　艾葉（各一两）　烏梅肉（炒乾半两）

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸烏梅湯下

生地黃湯（直指方）治上熱衂血

生地黃（酒一两）　阿膠（炒一两）　川芎　桔梗　蒲黃　甘草（炙各五錢）

右㕮咀每服八錢水一鍾半入生姜汁二匙煎至八分去滓温服

麥門冬飲（直指方）治鼻衂

白芍藥　蒲黃（各二錢）　生姜（一錢）　生地黃（三錢）　麥門冬（去心二錢）

右㕮咀，蜜一合，水一鍾半，煎至八分，分作二服

川芎三黃散（直指方）治實熱衄血

大黃（濕紙煨）　川芎　黃連　黃芩（各等分）

右為末，每服二錢，井水調下，食後

生地黃湯（經驗方）治崇中有熱，及肺壅鼻衄生瘡，一切丹毒等疾

生地黃　赤芍藥　當歸　川芎（各等分）

右㕮咀，水二鍾，煎至一鍾，去滓，食後溫服。若鼻衄加蒲黃，生瘡加黃芩，丹毒加防風

清肺飲（試效方）治衄血吐血久不愈者

五味子（十箇）　麥門冬　當歸身　人參　生地黃（各五分）

黃耆（二錢）

右㕮咀，作一服，水二鍾，煎至一鍾，去滓，食後溫服。用三稜針氣街出血立愈

地黃飲（拔粹方）治衄血往來久不愈甚效

生地黃　熟地黃　枸杞子　地骨皮（各等分）

右為末，每服二錢，蜜湯調下，日三服

麥門冬飲（濟生方）治衄血不止

麥門冬　生地黃（各等分）

右剉每服一两水煎

黃連散（經驗方）治大人小兒感熱乘於血血隨熱氣散溢於鼻者謂之鼻衄凡血得寒則凝澁結聚得熱則流散妄行

黃連　黃芩　栢葉　甘草（各等分）　豆豉（三十粒）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓食後通口服

生地黃湯　治鼻衄昏迷不省

用生地黃三五斤取汁服之以渣塞鼻中須臾即止

白芨散　治鼻衄不止

用白芨不以多少爲末冷水調貼鼻竅下

千金散　治鼻衄不止

土馬騌（即牆上舊草）　甘草（各二錢）　黃藥子（半兩）

右爲末每服二錢新汲水調下不止再服

射香散（御藥院方）治鼻衄不止

白礬（枯過另研）　白龍骨（粘舌者另研各五錢）　射香（五分）

右三味拌和勻每用一字先將冷水洗淨鼻內血涕然後吹藥於鼻中或以濕紙撚蘸藥鼻內尤妙

龍骨散（三因方）治鼻衄過多

用白龍骨不拘多少研爲末用少許吹入鼻中凡九竅出血皆可用此藥吹之

山梔散（朱氏集驗方）治鼻衄不止

用山梔子不以多少燒爲末少許吹入鼻中

黑神散

用百草霜爲末用少許吹入鼻中立効

一方　治鼻血不止

用頭髮燒灰以竹管吹入鼻中即止或以酒調亦可

一方

用新採百葉擂水服之即止

一方　治鼻衄及酒疸黃沙淋

用萱草根搗汁一鍾生姜汁半鍾相和時時細呷

一方

用生姜汁磨好墨滴鼻中

一方

用茆花塞鼻中外用茆花濃煎湯服

溺血 四十九

戊集

丹溪心法

○溺血屬熱　用炒山梔子水煎服或用小薊琥珀　有血虛四物加牛膝膏　實者用當歸承氣湯下之後以四

物加山梔

入方

小薊飲子　治下焦結熱血淋

生芐　小薊　滑石　通草　淡竹葉

蒲黃（炒）　藕節（[illegible]）　當歸（酒浸）　梔子（炒）　甘草（搽酪）

右用水煎空心服

附諸方

許令公方　治尿血

生地黃汁（一合）　生薑汁（一合）

右以二物相合頓服瘥

當歸承氣湯

當歸　厚朴　枳實　大黃　芒硝

右剉水煎

當歸散（大全良方）治婦人小便出血或時尿血

當歸　羚羊角屑　赤芍藥（各半兩）

生地黃（一兩）　刺薊葉（七錢半）

右㕮咀每服八錢水一鍾半煎至八分去滓通口服食前

一方　治小便出血

用當歸四兩酒三升煮一升頓服

一方

用琥珀為末每服二錢灯心薄荷湯調下

鹿角膠丸（濟生方） 治房室勞傷小便尿血

鹿角膠（五錢） 沒藥（另研） 油頭髮灰（各三錢）

右為末用茅根汁打糊丸如梧子大每服五十丸塩湯送下

六味地黃丸 治老人尿血 見補損

瑞竹堂蒲黃散

故紙（炒） 蒲黃（炒） 千年石灰（炒）

右等分為細末每服三錢空心熱酒調下 此劫剤也

下血（五十）

丹溪心法

○下血其法不可純用寒凉藥必於寒凉藥中加辛味為佐久不愈者後用濕剤必兼升挙藥中加酒浸炒凉藥如酒煑黄連丸之類寒因熱用故也 有熱四物加炒山梔子升麻秦艽阿膠珠去大腸濕熱 屬虛者當温散四物加炮乾姜升麻 凡用血藥不可单行单止也

入方

白芷　五倍子

右為末粥丸如梧子大每服五十丸米湯下

附脉理

脉訣舉要曰便血則芤數則赤黄實脉癃閉熱在膀胱

附諸方

黄連香薷飲　治伏暑純下鮮血（見中暑）

敗毒散　治風熱流入大腸經下血不止（見傷風）

胃風湯　治風濕乘虛入於腸胃或下瘀血（見痢類）

槐花散　治腸胃有濕脹滿下血

蒼朮　厚朴　陳皮　當歸　枳殼（各一兩）

槐花（二兩）　甘草　烏梅（各半兩）

右以水煎空心服

當歸和血散（拔粹方）治腸澼下血濕毒下血

槐花　青皮（各六錢）　當歸身　升麻（各二錢）　荊芥穗

熟地黄　白朮（各六分）　川芎（四分）

右為末每服二三錢清米飲調下食前

升麻去濕和血散（拔粹方）治腸澼下血作派其血唧出有力而遠射四散如篩春二月中下二行腹中大作痛乃陽明氣衝熱毒所作也當去濕和血而愈

生地黄　牡丹皮　生甘草（各五錢）　熟甘草　黄耆（各一錢）

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

當歸身　熟地黃　蒼朮　秦艽　肉桂（各三分）

橘皮　升麻（各七分）　白芍藥（一錢五分）

右㕮咀作一服水四鍾煎至一鍾稍熱空心服

黃連湯（拔粹方）治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血

黃連　當歸（各五錢）　甘草（炙一錢五分）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食前通口服

○已上諸方治濕毒下血之劑

香連丸　冷熱不調下血如痢（見痢類）

聚金丸（楊氏方）治腸胃積熱或酒毒大便下血腹中熱痛煩渴脉弦數

黃連（四兩酒炒一兩姜汁炒一兩灰火炮一兩生用一兩）　黃芩　防風（各一兩）

右為末麪糊丸如梧子大每服五十丸米泔浸枳殼水下不拘時

芍藥黃連湯（保命集）治大便後下血腹中痛謂之熱毒下血

芍藥　黃連　當歸（各五錢）　淡桂（五分）　甘草（炙二錢）

大黃

右每服一兩水二鍾煎至一鍾服（如）痛甚調木香檳榔末一錢服

阿膠湯（拔粹方） 治傷寒熱毒入胃下痢膿血

黃連丸 治飲酒過多下血不止

黃連（二兩） 赤茯苓 阿膠（炒各一兩）

右用黃連茯苓為末調阿膠衆手丸每三十丸食後米飲下

芍藥湯（拔粹方） 行血調氣漫而便膿血知氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除（見痢類）

涼血地黃湯（拔粹方） 如飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五臟則䐜滿閉塞下為飧泄久為腸澼者水穀與血另作一泒唧出也時令值夏濕熱大盛正當客氣勝而主氣弱也故腸澼之證甚以此藥主之

熟地黃 當歸 青皮 槐花（炒各五分） 知母（炒）

黃栢（去皮炒各一錢）

右㕮咀作一服水一鍾煎至七分溫服如小便澁臍下悶或大便後重調木香檳榔末各五分稍熱空心服或食前服如裹急後重又不去者當下之如有傳變隨證加減

○已上諸方熱毒下血之劑

伏龍肝散（三因方） 治先糞後血謂之遠血兼止吐衄

伏龍肝（半斤） 甘草（炙） 白朮 阿膠 黃芩

乾地黃（各三兩千金方作乾姜）

右㕮咀每服四錢水一鍾煎空心服虛者加附子

竹茹湯（大全良方）治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹　熟地黃（各三兩）人參　白芍藥　桔梗

川芎　當歸　甘草（炙）　桂心（各一兩）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾食後通口服

剪紅丸（濟生方）治臟腑虛寒下血不止面色痿黃日久羸瘦

測栢葉（炒黃）鹿茸（火去毛醋煮）附子（炮去皮臍）川續斷（酒浸）黃耆

阿膠（蛤粉炒）白礬（枯各半兩）當歸（去芦酒浸各一兩）

右為末醋煮米糊丸如梧子大每服七十丸空心米飲下

○廣按本方出証云治臟腑虛寒下血不止夫血証乃火使之然言虛則可言寒則不可也丹溪云下血久不愈者後用溫剤此方正合其義東垣云勞者溫之損而溫之損而溫之損而不溫何能愈哉此方乃溫補之義非溫寒之說也

○已上諸方治久虛下血之剤

醫師固榮散　治吐血便血

白芷（半兩）真蒲黃（一兩）甘草（一錢半）地榆（去芦一兩）

右㕮咀每服二錢温酒調服如氣壯人加石膏一兩

一方

槐花　荆芥穗（各等分）

右爲末酒調下一錢匕仍空心食猪血妙

一方　治卒下血

用赤小豆一升搗碎水二升絞汁飲之

烏梅丸　治便血下血

烏梅（三兩）燒灰存性

右爲末醋糊丸梧子大每服七十丸空心米湯下

一方　治中毒下血

用蝟皮燒存性研細每服二錢水調下日進三服

一方　治下血刼劑

百藥煎（一兩取一半燒為灰）

右為末糊丸如梧子大服六十丸空心米湯下

一方

血餘灰　鞋底灰　豬牙皂角灰（各等分）

右為末酒調三錢七

一方　治下鮮血

山梔子仁（燒灰）

右為末水和一錢七服

一方　治糞前有血面色黃

石榴皮

右為末煎茄子湯調一錢匕

一方　治糞後下血不止

艾葉（不以多少）

右以生姜汁三合和服

一方　治臟毒下血

苦楝（炒令黃）

右為末蜜丸米飲下二十丸尤妙

一方

百草霜（研細）

右用酒調下

○已上諸方凉血止血之劑

酒煮黃連丸（見泄瀉）

四物湯（見補損）

腸風臟毒　戊集

丹溪心法

○腸風獨在胃與大腸出　若兼風者蒼朮秦艽芍藥香

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

附

又方

黃芩　秦艽　槐角　升麻　青黛

右以水煎服

治腸風下血

滑石　當歸　生芐　黃芩　蒼朮（各等分）

右以水煎服　或以蒼朮生芐不犯鐵器為末丸服

又方

茄蔕（燒存性）　梔子（炒）

右為末蒸飯丸如梧子大每服一百丸空心米湯下

又方　便血久遠傷血致虛并麻風癬瘡見面者

龜板（二兩酥炙）　升麻　香附（各五錢）　芍藥（一兩半）　側栢葉（一兩）

椿根皮（七錢半）

右為末粥丸以四物湯加白朮黃連甘草陳皮作末湯下丸藥

又方　脉緩大口渴月經紫色勞傷挾濕

白朮（半兩）　黃栢（炒）　生芐　白芍（各三錢）　地榆（二錢）

黃芩　香附（各一錢）

右為末蒸餅丸服

又方　治積熱便血

蒼朮　陳皮（一兩半）　黃連　黃栢　條芩（各七錢五分）

連翹（半兩）

右爲末生苄膏六兩丸如梧子大每服五七十丸白湯

下

又方

腸風脫露以車荷鳴五七箇焙乾燒灰醋調搽仍忌爲

燚酒辛熱物

附諸方

腸風黑散（和劑方）治腸風下血或在糞前後並皆治之

荊芥（二兩）　亂髮　槐花　槐角（各一兩燒）　甘草（炙）

蝟皮（炒各一兩）　枳殼（去白二兩炒一兩）

右將所燒藥同入甆瓶內鹽泥固濟燒存三分性出火

毒同甘草枳殼擣羅爲末每服三錢水一鍾煎七分空

心服

香梅丸（濟生方）治腸風臓毒下血

烏梅（同核燒存性）　香白芷（不見火）　百藥煎（燒存性各等分）

右爲末米糊丸如梧子大每服七十丸空心米飲下

黑玉丹（和劑方）治腸風積熱下血不止

刺蝟皮（剉一斤）　猪懸蹄（一百箇）　敗棕（剉八兩）　苦楝根（五兩）

雷丸（四兩）　牛角腮（剉十一兩）　槐角（六兩）　芝麻（四兩）

亂髮（皂角水洗淨焙八兩）

右剉碎用甆罐內燒存性研爲細末入乳香二兩射香一八錢研和令勻用酒打麪糊爲丸如梧子大每服二十丸先細嚼胡桃一枚空心以温酒吞下多進得効

槐角丸（和劑方）治五種腸風下血痔瘻脫肛下血並服

槐角（炒一兩）　地榆　黃芩　防風（去芦）

當歸（酒浸一宿焙乾去芦）　枳殼（去白麩炒各八兩）

右爲末酒糊丸如梧子大每服三十丸空心米飲下

槐花散（本事方）治腸風臟毒下血

槐花（炒）　栢葉（杵爛焙）　荊芥穗　枳殼（各等分）

右爲末每服二錢空心米飲調下

香附散（本事方）治腸風

香附（一兩炒）　枳殼（七錢半炒）　當歸（半兩）　川芎（五錢）　槐花（炒）

甘草（炙各二錢五分）

右爲末每服三錢水一鍾薑三片棗一枚煎七分温服

蒜連丸（濟生方）治臟毒下血

鷹爪黃連（去鬚一兩）

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

右爲末用獨頭蒜一箇煨香熟研和入臼杵搗爛丸如梧子大每服四十丸空心陳米下

加減四物湯　治腸風下血不止

側栢葉　生地黄　當歸（酒浸去芦）　川芎（各一兩）　枳殼（去白炒）

荆芥穗　槐花（炒）　甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜三片烏梅少許同煎空心温服

黄連散（宣明方）　治腸風下血疼痛不止

黄連　雞冠花　貫衆　川大黄　烏梅（各一兩）

甘草（炙五錢）

右爲末每服二錢用温米飲調下日三服不拘時

黄連貫衆散（張子和方）　治腸風下血

黄連　雞冠花　貫衆　大黄　烏梅肉（各一兩）

甘草（炙七錢五分）　枳殼　荆芥（各一兩）

右爲末每服二錢温米飲下食前

結陰丹（拔粹方）　治腸風下血臟毒下血諸大便血疾

枳殼（去穰麩炒）　威灵仙　黄芪　陳皮（去白）　椿根白皮

何首烏　荆芥穗（各半兩）

右爲末酒糊丸如梧子大每服五七十丸陳米飲入醋少許煎過要放温水送下

地骨皮散（經驗方）治腸風痔瘻下血不止

地骨皮　鳳眼根皮（並用懸崖中者好去土不用）

右二味各等分同炒微黃色搗爲細末每服三錢空心溫酒調服忌食油膩等物

止血散（御藥院方）治腸風下血或在糞前或在便後在便前者其血近腎肝血也在便後者其血遠心肺血也此藥並主之

皁角刺（燒灰二兩）　胡桃仁（去皮）　故紙（炒）　槐花（三兩半）　一

右爲末每服二錢米飲調酒亦可

方　治腸風臟毒

用茄蒂燒灰存性為末米飲調下二錢小兒服半錢

一方　治腸風下血

乾樗根白皮　人參（去芦）

右件等分為末每服二錢空心用酒或米飲調下

一方

槐花　枳殼

右等分炒存性為末新井水為丸米飲下

一方　治臟毒下血

用黃連四兩酒浸春秋五日夏三日冬七日曬乾為末以烏梅肉六兩同搗為膏丸如梧子大每服二三十丸

空心白湯下

一方　治腸風下血

用椿根白皮北引者去粗皮酒浸晒乾為末研膠棗肉丸如梧子大每服三五十丸酒送下

〇廣按腸風者邪氣外入隨感隨見所以其色清也臟毒者蘊積毒久而始見所以其色濁也治腸風以散風行濕藥治臟毒以清熱涼血藥又要看其虛實新久之不同新者實者宜降之瀉之虛者久者宜升之補之故治法有所異也

痔瘻

丹溪心法

〇痔瘻專以涼血為主

入方

人參　黃芪　生地（涼血）　川芎　當歸（和血）
升麻　條芩（涼大腸）　枳殼（寬腸）　槐角（涼血生血）　黃連等分

一方無黃連

右以水煎服　或丸服亦可

重洗

五倍子　朴硝　桑寄生　蓮房　加荊芥

煎湯先熏後洗又冬瓜藤亦好　又大腸熱腫者用木

鱉子五倍子研細末調傅　痔頭向上是大腸熱甚收

縮而上用四物湯解毒湯加枳殼白朮槐角秦艽

附諸方

清心丸　素問云諸痛痒瘡瘍皆屬心火此藥主之

黃連（一兩）　茯神　赤茯苓（各半兩）

右為末煉蜜為丸如梧子大每服一百丸食前米湯下

清涼飲　治諸痔熱甚大便秘結

當歸　赤芍藥　甘草（炙）　大黃（飯上蒸晒乾）

右等分為末每服二錢新水調下

黃耆葛花丸　宣明方治腸中久積熱毒痔瘻下血疼痛

黃耆　葛花　生地黃（焙）　黃芩　赤小豆花（各一兩）

大黃　赤芍藥　黃芩　當歸（各三錢）　蝟皮（一錢）

檳榔　白蒺藜　皂角子仁（炒各五錢）

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十丸至三十丸煎桑

白皮湯及茴香槐子煎湯下亦可

槐角丸　治痔瘻有效

槐角　當歸　地骨皮　蝟皮（炙各等分）

右為末滴水丸如梧子每服五十丸空心服

蝟皮丸　治諸痔瘡出血裏急疼痛

槐花（炒）　艾葉（炒）　枳殼　地榆　當歸

川芎　黃芪　白芍　白礬（枯）　貫衆

蝟皮（炙各一兩）　頭髮（燒三錢）　猪後蹄重甲（十枚炙）　皂角（一錠炙黃去皮）

右為末煉蜜丸如梧子大每五十丸食前米湯下

猪甲散　治諸痔

猪懸蹄甲（不以多少）

右為末陳米湯調二錢空心服

芎歸丸　治痔下血不止

川芎　當歸　黃芪　神麯　地榆

右為末作十服空心服

五灰散（三因方）　治五種痔瘡不問內外並宜服之

鱉甲（治牡痔）　蝟皮（治牝痔）　蜂房（治脉痔）　蛇蛻（治氣痔）

猪左足懸蹄甲（治腸痔各等分）

右燒存性隨証倍用一分為末井花水調二錢空心臨

卧時服

香殼丸（宣明方）　治濕熱內甚因而飽食腸澼發為諸痔久

而成瘻

木香　黃蘗（各三錢）　枳殼（去穰炒）　厚朴（各半兩）　黃連（一兩）

蝟皮（一箇燒灰）　當歸（四錢）　荊芥穗（二錢）

右為末麪糊丸如梧子大每服二三十丸温水下食前日三服

一方　治諸痔瘡

槐花（四兩）　皂角刺（一兩槌碎）　胡椒（十粒）　川椒（一兩）

右用豮豬肚一箇入藥在內扎定口煑熟去藥空心食肚子

○已上諸方內治之劑

薰洗方

槐花　荊芥　枳殼　艾葉

右以水煎熟入白礬先薰後洗

槐花（炒各半兩）　阿膠（炒）　頭髮（燒灰）　荊芥　木賊（各一錢五分）

右為末煉蜜丸如梧子大每五十丸食前米湯服

乾葛湯　治每遇飲酒發動痔瘡腫痛而流血

乾葛　枳殼（炒）　半夏　茯苓　生苄　杏仁（各半兩）　黃芩　甘草（炙各二錢半）

右剉每服三錢黑豆一百粒姜三片白梅一箇水煎服

橘皮丸　治因憂思恐怒適臨于前痔瘡發作腫痛大便難強努則肛出亦皆治之

橘皮　枳殼（炒）　川芎　槐花（炒各半兩）　檳榔　木香　桃仁（炒去皮）　紫蘇莖葉　香附　甘草（炙各二錢半）

右剉每服三錢姜棗煎服

一方　治腸痔每大便常有血

蒲黃末方寸匕米飲調下日三頓瘥

地黃丸　治五痔滋陰必用之

地黃（酒蒸熟一兩六錢）　槐花（炒）　黃栢（炒）　杜仲（炒）

白芷（各一兩）　山藥　山茱萸（取肉）　獨活（各八錢）　澤瀉

牡丹皮　茯苓（各六錢）　黃芪（一兩半）　白附子（二錢）

右為末煉蜜丸如梧子大每五十丸空心米湯服下

一方

大黃（煨二錢）　牡蠣（煅一兩）

又方

用五倍子如燒香法置桶中薰妙

又方

木鱉子（七箇取仁研）　土礬末（二錢）

右以水煎薰洗二三次　如肛門腫熱以朴硝末水調淋之良

又方

搗桃葉一斛蒸之內小口器中以下布榻上坐蟲自出

又方

用無花菓葉煮水薰少時再洗

又方

用好醋沃燒新磚如法坐薰良

又方　翻花痔

用荆芥防風朴硝煎湯洗之次用木鱉子鬱金研末入龍腦些少水調傅之或用熊膽片腦和勻貼之尤妙

又方

用全蝎不以多少或二三箇初發痔痒用此燒薰

又方

用韭菜不以多少燒熱湯以盆盛湯在內盆上用器具蓋之留一竅却以韭菜於湯內泡之以穀道坐竅上令氣蒸薰候溫用韭菜湯輕輕洗瘡數次自然脫体

又秘方

先用乾馬齒莧煎湯洗次用螺螄活搗敷瘡紙封口空心食前鹽湯調下枳殼末一二錢

又方

用枳殼不拘多少每用末二錢水一大碗沙瓶內煎百沸先薰蒸而後洗之

外敷蝸牛膏

用蝸牛一枚射香少許用小砂合子盛蝸牛以射香糝之次早取汁塗痔瘡有效

槐白皮膏（和濟方）治内外諸痔年久不愈者

槐白皮　枳實（各五錢）　赤小豆（二合）　桃仁（六十枚）　當歸（各三兩）

甘草　白芷（各二兩）

右㕮咀以前成猪膏一斤微火煎至黃色藥可成膏以貼瘡

五灰膏（危氏方）治臓腑一切蘊毒發為痔瘡不問遠年近日形似雞冠蓮花核桃牛乳或内或外並皆治之此方親傳之瘍科刘叔茂累試皆驗不敢自秘

蕎麥（秆灰半斗許）　荊柴　老杉枝　葪柴　山白竹

右以上四般柴竹截作二尺許長以斧劈破成片各取一束晒乾放火上燒過置坛内為灰防為風所化候蓋燒却以水於鍋内煮用炭汁又用酒瀝以布帛實其竅置蕎麥灰於酒瀝内以所煮四般炭汁淋之然後取汁於鍋内慢火熬汁約取一小碗候冷入石灰同再調和成膏以瓷罐貯之止用石灰傳之面上不令走氣臨用時却去若灰以冷水調開冷病石以水洗洗淨痔瘡仰卧擡起一足先以濕紙於瘡四圍貼護却用竹篦挑藥塗痔上須臾痛息用紙揩去藥再塗如此三四遍要痔瘡如墨褾黑方止以水洗凈每日常置冷水一盆以葱湯和之日洗三五遍六七日後膿穢出盡其瘡自消

寬腸丸（醫方大成）五灰塗痔瘡之後或臟腑秘結不通者

用此藥寬腸

黃連（各等分）

右為末麵糊丸如梧子大每服五十丸空心米湯下

一方　治久痔

用熊膽塗神效

一方　治痔瘡有頭

用芫花入土根洗淨木臼搗以少水絞汁於銀銅器內慢火煎成膏將絲線於膏內度過繫痔瘡頭繫時微痛候心躁痔落時以紙撚蘸膏於竅內永除其根

一方

治用藥枯痔後大便堅硬難下以大黃濕紙裹煨枳殼去穰當歸酒洗各等分為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸白湯下

灸法

用大蒜一片頭垢捻成餅子先安頭垢餅於痔上外安蒜艾灸之

○已上數方外治之法

四物湯（見補損）

解毒湯（見濕熱）

漏瘡（五十三）

丹溪心法

〇漏瘡先須服補藥生氣血用參朮芪芎歸為主大劑服之外以附子末津唾和作餅子如錢厚以艾灸之漏大炷大漏小炷小但灸令微熱不可使痛乾則易之則再研如末作餅再灸如困則止來日又灸直至肉平為效亦有用附片灸仍用前補劑作膏貼之尤妙 一痔漏涼大腸寬大腸 用枳殼去穰入巴豆鈌線纏煮透去巴豆入藥用尤藥則爛鵝用前藥乾用寬腸 澁竅用赤石脂白石脂枯礬黃丹腦子漏竅外塞用童便煅爐甘石牡蠣粉

入方

黃連散　亦有痔漏又於肛門邊生一塊皮厚腫痛作膿就在痔孔出作食積注下治

黃連　阿魏　神麯　山查　桃仁
連翹　槐角　犀角（等分）

右為末以少許置掌心時時舐之津液嚥下如消三分之二止後服

附諸方

加味槐角丸（古庵方）治痔漏通用及治腸風下血

槐角（二兩）　生芐（二兩）　當歸身　黃芪（各一兩）　川芎

阿膠（各半兩）　黃連　條芩　枳殼　秦艽

防風　連翹　地榆　升麻（各一兩）　白芷（半兩）

右為末煉蜜丸或酒糊丸如梧子大每服五十丸漸加至七八十丸百丸空心温酒或米湯送下

法曰以槐角生芐生血涼血為君當歸川芎黃芪阿膠補虛為臣以諸藥為佐使蓋黃連瀉心火條芩涼大腸枳殼寬大腸秦艽去大腸風防風為血證上使連翹為血證中使地榆為血證下使而連翹又能散經絡中火邪地榆又能涼血升麻升散火邪又與白芷引諸藥入大腸經絡夫痔漏經絡之病也

榼藤子丸（御藥院方）治腸澼下血痔漏結核疼痛

榼藤子（一箇重七錢者酥炙和皮用）　皂角刺（燒存性）　茴香（炒）　枯白礬

枳殼（去白麩炒）　樗白（焙乾）　白附子（炮）　蝟皮（炒存性各半兩）　乳香（二錢半）

右為末醋麪糊丸如梧子大每服五十丸空心温酒下

如痔瘡痛醋研五七丸塗患處

蝟皮丸（濟生方）治五種痔漏

猪左懸蹄甲　黃牛角腮　蝟皮（一箇同上二藥燒灰存性）

防風（去芦）　貫衆　槐角子（炒）　鱉甲（醋煑）　枳殼（去白皮用）

鷄冠花　槐花　黄耆（去芦）　雷丸　黄連（去頭）

當歸　香白芷　油髮灰　玄參（各半兩）　射香（另研五分）

右為末米糊丸如梧子大每服一百丸空心米飲送下

年高并虛弱者不宜服也

枳殼散（御藥院方）治腸風痔漏便血無數行痛不可忍

枳殼（去穰麩炒）　槐子（微炒黄色）　荆芥穗（各半兩）

右為末每服三錢薄粟米粥調下如人行一二里地再以粥壓下日進二三服

一方　治痔漏下血痒痛

用槐花炒枳殼去穰各一兩為末醋糊丸如梧子大每服二十丸空心食米飲湯下十服見効

一方

用枳殼水浸去穰每二片用巴豆一粒在內線縛於銀石器內以醋浸一宿高煮乾去豆為末醋糊為丸如梧子大每服十五丸空心茶清送下

猪腎丸　通行漏瘡中惡水自大腸中出

用黒牽牛碾細末三錢半入猪腎中一線扎青竹葉包慢火煨熟空心溫酒嚼下

○已上諸方治初發痔漏凉解之劑

乳香丸　治冷漏

乳香（二錢半）　牡蠣粉（一錢二分半）

右為末雪糕糊丸麻子大每服三十丸姜湯空心下

鈎腸丸（和劑方）治久漏虛漏肛門腫痛或生瘡時有膿血及腸風下血虛寒久不愈者

栝蔞（二枚燒存性）　蝟皮（二箇燒存性）　鷄冠花（微炒五兩）　綠礬（枯）

白礬（枯二兩）　胡桃仁（取仁十五兩不去油罐內燒存性）　白附子

天南星（生用）　枳殼（去穰麩炒）　半夏　訶子（煨各二兩）

附子（去皮臍生用一兩）

右為末醋糊丸如梧子大每服二十丸空心臨臥溫酒送下

黑丸子（危氏方）專治年久痔漏下血用之累驗

乾姜　百草霜（一兩）　木饅頭（二兩）　烏梅

敗棕　栢葉　油髮（各半兩　已上七味各燒灰存性却入後藥）

桂心（三錢）　白芷（五錢俱不見火）

右九味為末醋糊丸如梧子大空心米飲下三十丸

烏玉丸（秘方）治男子婦人下血腸風痔漏者疼痒不可忍服此三四次是效初得此病或痒或疼穀道周迴多生硬核是痔破者是漏下血是風皆因酒色過度即成此疾人多以外醫敷洗不知病在腸中有蟲若不去根其病難除

槐角（六两）　雷丸（四两）　敗棕（八两）　苦練根（五两）
芝蔴（四两）　牛角鰓（十一两剉）　亂髮（皂角水洗八两）

右件剉碎用磁器內燒存性碾末入乳香二两射香八錢研勻酒糊丸如梧子大每服五十丸細嚼胡桃一箇溫酒送下空心臨晚二服甚者三服忌別藥房室醋魚雞諸般發風動氣毒物并坐濕地

○已上諸方治年久痔漏濕澁之劑

薰男婦翻花漏瘡

草麻子（去殼）　防風　天南星（各半两）

右件為粗末盆內燒烟上用器具蓋之留一孔坐孔上薰之

又方　薰漏瘡

艾葉　五倍子　白膠香　苦練根（各等分）

右剉碎如燒香法置長桶內坐薰瘡處

薰洗痔瘻疼痛

枳殼（半两）　朴硝（二錢半）　薄荷（半两）　荆芥
乾蓮蓬（各两）

右件為粗末用水三碗煎至二碗半乘熱薰洗

洗漏瘡方　治漏瘡孔中多有惡穢常須避風洗淨

漏蜂房白芷煎湯洗　或大腹皮苦參煎湯洗

右洗畢拭乾先用東向石榴皮晒為末乾摻以殺淫虫

少頃傳藥

又方

用冬瓜湯洗即愈

又方

用朴硝井水調洗　或用蜜和硝調搽

又方　治痔漏

用河邊水漂出柳根赤鬚煎湯洗極效

傳久漏方

用九孔螺房炙黃以臘月猪脂研傳候收汁以龍骨

香餅末入些乳香硬瘡

又方　傳痔漏

用田螺一箇桃開靨入片腦一分過一宿取螺內水搽

瘡先用冬瓜瓤煎湯洗淨搽

蒲黃散　治下部痔漏

蒲黃（一兩）　血竭（半兩）

右為末每用少許掂患處

又方

用蟯蜖不以多少焙乾為末先用礬水洗淨貼之

辰砂挺子（秘方）　治痔漏等瘡

人言（一錢） 白礬（二錢） 蜜陀僧 辰砂（各五錢）

右件先研人言細鋪鍋底次用礬鋪人言上枯烟盡為度次將陀僧辰砂研細白糕和作尖挺子如小麥大每用一粒頻濡納瘡口上去敗肉盡後貼生肌散

生肌散（秘方）

寒水石（煆一錢） 龍骨（煆五錢） 乾胭脂（三分） 輕粉（一錢）

右件研末乾貼瘡嫩寒水石乾胭脂加龍腦瘡老止依方

辰砂膏（秘方）

瓜蒂（末三錢） 蜜陀僧（研二錢） 硃砂（半錢） 片腦（少許）

右件為末如瘡乾津調貼瘡濕乾貼

玉紅散（秘方）

碙砂（二兩先燒碙砂在鍋內次用白礬末放上枯烟盡為度） 白礬（二兩） 硃砂（四錢）

右件為末敷痔乾用津唾調貼

代針膏（秘方）

巴豆（五錢去皮） 枳殼（大者二箇去穰）

右件將豆裝在枳殼內綿縛罐內盛醋煮乾枳豆晒乾研細用絲綿蘸濕裹藥敷痔根上去痔不用止用生肌散如頻濡日久不可用津調代針膏敷瘡頭尖敗肉自去

四效散（聖惠方）治鼠妳痔漏

蜜陀僧（二錢） 射香 片腦（各半錢） 銅綠（一字）

右件為末先用溫水洗拭乾敷

生地黃膏 治漏瘡通用

露蜂房（炙） 五倍子 木香（三錢） 乳香（一錢）

輕粉（一字）

右為末用生地黃一握搗細和為膏攤生絹貼之

鮀皴散 治漏瘡血水不止

鮀皮（焙焦） 五倍子 龍骨（各二錢五分） 續斷（五錢）

右為末入射香少許津唾調傅

○已上諸方外治之法

○廣按痔漏之源由乎酒色過度濕而生熱充于臟腑溢于經絡墜乎穀道之左右衝突為痔久而成漏者也痔輕而漏重痔實而漏虛治痔之法不過涼血清熱而已至於治漏初則宜涼血清熱燥濕久則宜澁竅殺蟲而兼乎溫散也或曰痔漏火是根源何故而用溫澁殊不知痔止出血始終是熱漏流膿水始是濕熱終是濕寒不用溫藥何以去濕而散寒乎非止痔漏百病中多有始熱而終寒者如瀉痢如嘔吐初作則腸胃氣實為熱久作則腸胃氣虛而為寒矣丹

溪下血條云下血久不愈者後用溫劑正此義也

戊集

脫肛五十四

丹溪心法

○脫肛屬氣熱　氣虛　血虛　血熱　氣虛者補氣參芪芎歸升麻　血虛四物湯　血熱者凉血四物湯加炒栢　氣熱者條芩六兩升麻一兩麵糊丸　外用五倍子為末托而上之一次未收至五七次待收乃止　又東北方壁土泡湯先薰後洗

附諸方

香荊散（三因方）治肛門脫出大人小兒悉皆治之

香附子　荊芥穗（各等分）　一方加砂仁

右為末每服三匙水一大碗煎至十數沸熱淋洗

一方

用五倍子為末每用三錢入白礬一塊水二碗煎洗

一方

用木賊燒灰存性為末搽肛門上按入即愈

一方

用浮萍為末乾貼患處

一方

用蔓陀羅花子連殼一對橡斗十六箇搗碎水煎三五沸入朴硝熱洗其肛自收

二靈散　治久痢腸胃俱虛肛門自下

龍骨（煅五錢）　木賊（燒存性二錢伍分）

右為末摻托之

又方

用槐花槐角等分炒黃色為末用羊血蘸藥炙熱食之以酒送下或以豬腰去皮蘸藥炙食亦可

淋五十五

丹溪心法

○淋有五皆屬乎熱解熱利小便山梔子之類山梔子去皮一合白湯下

戴云淋者小便淋瀝欲去不去不去又來皆屬於熱也

入方　治老人氣虛而淋者

人參　白朮　木通　山梔子

右水煎服

地髓湯　治死血作淋痛不可忍此證亦能損胃不食

杜牛膝（一合一名苦杖根即鼓槌草）

右以水五鍾煎耗其四而留其一去滓入射香少許空心服之又单以酒煎亦可又名苦杖散　老人虛寒者八味丸或六味地黄丸為要藥

又方　治氣虛而淋者

八物湯加黄芪虎杖甘草煎湯服諸藥中可加牛膝

附諸方

五苓散　治伏暑小便赤澁如淋（見中暑）

一方　治諸淋

四苓散（二錢）　益元散（一錢）　燈草（三十莖）　山梔子（一錢）

右水煎空心服　或益元散加車前末一錢　或益元散加阿膠末一錢

八正散（和剂方）　治大人小兒心經蘊熱臟腑閉結小便赤澁癃閉不通熱淋血淋膏淋沙淋石淋並皆治之

車前子　瞿麥　萹蓄　滑石

甘草　山梔　大黄（麪裹煨）　木通（各一斤）

右㕮咀每服三錢水一鍾入灯心十莖煎至六分食前溫服

五淋散（和剂方）　治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或如膏如沙如石或如豆汁並皆治之

赤茯苓（六两）　赤芍藥　山梔子仁（各十两）　當歸（去芦）

甘草（生用各五两）　條芩（三两）

右㕮咀每服四錢水一鍾煎八分空心服

石韋散（和劑方）治膀胱有熱淋瀝不去臍腹急痛蓄作有時勞役即發或尿如豆汁或出沙石並皆治之

芍藥　白术　滑石　葵子

木通　瞿麥　石韋（去毛各二两）　當歸

甘草（各一两）　王不留行（一两）

右為末每服二錢空心小麥湯調下

通草湯（濟生方）治諸淋

王不留行　葵子　通草　茆根

蒲黃　當歸（去芦）　桃膠　瞿麥

滑石（各一两）　甘草（半两）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜五片煎服

地膚子湯（濟生方）治諸病後體虛觸熱熱結下焦遂成淋疾小便赤澁數起少出莖痛如刺或尿出血

地膚子（一两）　豬苓　知母　黃芩

海藻（洗）　通草　瞿麥（去根葉）　枳實（麸炒）

升麻　葵子（各半两）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜五片煎六分温服

車前子散　治諸淋小便痛不可忍

車前子（生半兩）　淡竹葉　赤茯苓　灯草（各二錢）

荊芥穗（能通竅二錢）

右作二服水煎

立效散（和劑方）　治下焦結熱小便淋閉作痛有時尿血

甘草（炙三兩）　瞿麥穗（一兩）　山梔子（去皮炒半兩）

右㕮咀每服五錢水一鍾姜三片葱白三箇灯心三十莖煎至六分去滓食後溫服

〇已上八方清熱之劑

導赤散（和劑方）　治心虛蘊小便赤澁或成淋痛

生乾地黃　甘草　木通

右㕮咀每服三錢水一鍾竹葉十片煎六分溫服

火府丹（本事方）　治心經蘊熱小便赤少及五淋澁痛

木通　黃芩（各一兩）　生熟地黃（二兩）

右為末煉蜜杵為丸如梧子大每服五十丸木通湯送下

〇已上二方寧心之劑

六味地黃丸　治血虛腎虛消渴淋濁（見補損）

鹿角霜丸（三因方）　治膏淋多因憂思失志濁氣干清小便淋閉黯如膏脂疲劇筋力或傷寒濕多有此証

鹿角霜　秋石　白茯苓（各等分）

右為末麵糊丸如梧子大每服五十丸空心米湯下

○巳上二方滋腎之劑

一方　治氣虛脾虛消渴淋濁

人參　滑石（各一錢）　白朮（一錢半）　赤茯苓

澤瀉（各七分）　麥門冬　甘草（各五分）　竹葉（三十片）

右剉作一服水一鍾灯心二十莖煎六分溫服食前

清心蓮子飲（和劑方）治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤澁或欲成淋並皆治之

黃芪（蜜炙）　石蓮肉（去心）　赤茯苓　人參（各七錢半）

車前子　麥門冬（去心）　甘草（炙）　地骨皮

黃芩（各半兩）

右㕮咀每服五錢水一鍾煎六分溫服發熱加柴胡薄荷

○巳上二方扶脾之劑

髮灰散　治血淋若單小便出血為莖衂皆主之

亂髮不拘多少燒灰入麝香少許每服用米醋泡湯調下

治淋以葵子末等分米飲空心調下最治婦人胞轉不尿

葉氏治血淋方（簡易方）

阿膠（一兩麵炒） 木猪苓 赤茯苓 滑石
澤瀉（各一兩） 車前子（半兩）
右㕮咀每服三錢水一鍾煎六分五更時服

一方 治小腸有熱血淋急痛
車前草連根帶穗洗淨臼內搗井花水調濾清汁空心凉服一碗若是淋沙石則以煅寒水石為末調服

一方 治血淋熱淋效
赤小豆（不以多少炒微熟）
右為末每服二錢煨葱一根温酒調服

通秘散 治血淋痛不可忍
陳皮 香附 赤茯苓（各等分）
右剉每服二錢水煎空心服

白薇散 治熱淋血淋
白薇 赤芍藥（各等分）
右為末每服二錢温酒調下立效或加檳榔

一方 治熱淋血淋
麻根（十個）
右以水四碗煎至一碗空心服甚效

一方 治血淋諸熱淋
山茵陳 淡竹葉 木通 山梔子

滑石　甘草　豬苓　瞿麥

右剉每服五錢水一鍾半灯心少許煎至八分空心溫服如大便秘澁加大黃同煎

○巳上八方理血之劑

沉香散　治氣淋痛此多因五內鬱結氣不舒行陰滯於陽而致壅滯小腹脹滿便溺不通

沉香　石韋　滑石　王不留行

當歸（各半兩）　葵子　芍藥（各七錢五分）　甘草

陳皮　木香　青皮（各二錢五分）

右為末每服三錢煎大麥湯下

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

博濟方　治五淋

赤芍藥（一兩）　檳榔（二箇麪裹煨）

右為末每服二錢水煎空心服

一方　治卒淋急痛

益元散（二錢）　茴香（一錢微炒黃）　木香　檳榔（各二分半）

右為末水調服

○巳上三方理氣之劑

一方　治小便淋痛赤澁下沙石

萱草根一握擣取汁服　或嫩苗煮食之亦可

一方　治沙石淋

琥珀二錢研為末空心葱白湯調下

琥珀散（宣明方）治五淋沙石淋

滑石　琥珀（各一兩）　木通　當歸

木香　鬱金　萹竹（各半兩）

右為末每服五錢以蘆葦葉煎湯空心調服如無蘆葦葉以竹葉煎湯送下

○已上三方開鬱之劑

二神散　治諸淋急痛

海金沙（七錢半）　滑石（半兩）

右為末每服二錢煎木通麥門冬車前草湯入蜜少送下

一方

石燕子（七箇搗如黍米大）　新桑白皮（三兩剉同拌勻）

右將二物分作七帖用水一鍾煎七分去渣空心午前至夜各一服

琥珀散（聖惠方）治五淋澁痛小便有膿出血

琥珀　海金砂　沒藥　蒲黄（各一兩）

右為末每服三錢濃煎通草湯送下日二服

一方

用螻蛄七枚塩二两同與新瓦上焙乾研細温酒調服

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一錢即愈

一方

用苧根二莖剉碎水一碗煎至半碗頓服即通

一方

用車前子一兩以絹囊盛水二鍾煎溫服立瘥

一方

用地膚子或莖葉一兩水一鍾煎溫服（即比方掃箒苗上子是也）

○已上數方專攻之劑

一方　治淋莖中痛此是肝經氣滯有熱

甘草稍子（半兩）　青皮　黃栢　澤瀉各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心溫服

一方　治苦病淋而莖中痛不可忍者

六君子湯加黃栢知母滑石石膏琥珀煎服（見調胃類）

參苓琥珀湯　治淋莖中痛不可忍相引脇下痛

人參（五分）　茯苓（四分）　川練子（炒一錢）　琥珀（三分）

生甘草（一錢）　玄胡索（七分）　澤瀉　柴胡

當歸稍　加青皮　黃栢（各三分）

右作一服水一鍾半煎至七分空心溫服

○已上諸方治莖中痛之劑

治婦人諸淋方

用苦杖根俗乎名杜牛膝洗淨搥碎一握水五碗煎至一碗去渣入射香乳香末各少許調服小便內當下沙一石剥剥有声是其効也

石韋散　治婦人小便卒淋澁

石韋　黄芩　木通　榆栢皮

葵子　瞿麥穗　甘草（各等分）

右㕮咀每服八錢水一鍾半姜三片煎至八分去渣食前溫服

已上治婦人淋証之劑

八味丸

八物湯　（並見補損）

○廣按淋証其感不一或因房勞或因忿怒或因醇酒或因厚味所致夫房勞者陰虛火動也忿怒者氣動生火也醇酒厚味者釀成濕熱也積熱既久熱結下焦所以小便淋瀝欲去不去不去又來而痛不可忍者初則熱淋血淋久生煎熬水液稠濁如膏如沙如石也諸方中類多散熱利小便而於開鬱行氣破血滋陰盖少焉若夫散熱利小便只能治熱淋血淋而已其膏淋沙淋石淋三者必須開鬱行氣破血滋陰方可也古方用鬱金琥珀開鬱藥也用青皮木香行氣

藥也用蒲黃牛膝破血藥也用黄栢生地黄滋陰藥也東垣用藥凡例小腹痛用青皮黄栢夫青皮疎肝黄栢滋腎蓋小腹小便乃肝腎之部位也學者不可不知

小便不通五十六

戊集

丹溪心法

○小便不通有氣虛　血虛　有痰　風閉　實熱　氣虛用參芪升麻等先服後吐或參芪藥中探吐之　血虛

葵子湯（濟生方）治膀胱實熱腹脹小便不通

赤茯苓（去皮）　木猪苓（去皮）　葵子　枳實（麩炒）
瞿麥　滑石　木通（去節）　黄芩
車前子　甘草（炙各等分）

右㕮咀每服四錢水一鍾半姜五片煎八分去滓溫服

海金沙散（拔萃方）治小便淋澀及下焦濕熱氣不施化或五種淋疾癃閉不通

海金沙（研）　木通　瞿麥穗　滑石
通草（各半兩）　杏仁（去皮尖麩炒一兩）

右㕮咀每服一兩燈心二十莖水二鍾煎至一鍾溫服

鬱金黃連丸（秘方）治心火炎上腎水不升致使水火不得相濟膀胱小腸積熱或癃閉不通或遺溺不禁或白濁如泔或膏淋如膿或如梔子水或如沙石米粒或如粉糊相似者俱熱證也此藥悉皆治之

鬱金　黃連（各一兩）　黃芩　琥珀（研）

大黃（酒浸各二兩）　滑石（四兩）　黑牽牛（炒取頭末三兩）　白茯苓（四兩）

右為末水丸如梧子大每服五十丸沸湯下空心服如用消導飲食降心火可加沉香五錢

宣氣散（濟生方）治小便不通臍腹急痛

甘草　木通（各三錢）　梔子（二錢）　葵子

四物湯先服後吐或芎歸湯中探吐亦可　痰多二陳湯先服後吐已上皆用探吐　若痰氣閉塞二陳湯加木通（一作木香）香附探吐之以提其氣氣升則水自降下蓋氣承載其水也　有實熱者當利之硝糖湯調牽牛末二三分或山梔之類　有熱有濕有氣結於下宜清宜燥宜升　有孕之婦多患小便不通胞被胎壓下故也轉胞論用四物湯加參朮半夏陳皮甘草姜棗煎湯空心服　一婦人脾疼後患大小便不通此是痰隔中焦氣滯於下焦以二陳湯加木通初喫後煎柤吐之

附脉理

脉訣舉要曰鼻頭色黃小便必難脉浮弦濇為不小便

附諸方

蒲黃湯（聖惠方）治心腎有熱小便不通

赤茯苓　木通　車前子　桑白皮（炒）

荊芥　灯草　赤芍藥　甘草（微炒）

蒲黃（生）　滑石

右各等分為末每服二錢葱白紫蘇煎湯調下食前服

葵子散（宣明方）治小便不通

葵子　茯苓（去皮各等分）

右㕮咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓食前服

滑石（各一錢）

右為末每服半錢灯心湯下食前

木通散（濟生方）治小便不通小腹痛不可忍

木通　滑石（各一兩）　黑牽牛（頭末半兩）

右㕮咀每服一錢水半鍾灯心十莖葱白一莖煎三分食前服

入珎散（聖惠方）治大人小兒小便不利或不通

大黃　木通（去皮）　滑石　粉草

瞿麥　山梔子　黃芩　荊芥（各等分）

右為末每服一錢薄荷湯調下小兒減服食前

草蜜湯　治心腎有熱小便不通

生車前草搗取自然汁半鍾入蜜一匙調下

一方　治膀胱不利為癃〻著小便閉而不通

八正散加木香　方見淋類

一方　治小便不通臍下滿悶

海金沙（一兩）臘茶（半兩）

右為末每服三錢生姜甘草湯調下

一方　治膀胱有熱小便不通

用朴硝不拘多少研為末每服二錢空心以茴香湯調下妙

琥珀散　治老人虛人小便不通

用琥珀為末每服一錢以人參茯苓煎湯調空心服或煉蜜丸如梧子大每服十丸赤茯苓湯下

一方　治小便不通

鷄子中黃一枚服之不過三

一方

用炒盐熱熨小腹冷復易之（或以食盐炒熱放温填臍中却以艾灸七炷即時通尤妙）

一方　治忍小便人致胞轉

自取爪甲燒灰米飲服之

一方

取陳久筆頭一枚燒為灰和水服之

一方

用酸漿草擣汁入蜜同服

一方

用竹鷄草一兩洗淨車前草一兩同於砂盆擂爛加蜜少許無蜜加鹽少許取汁空心服小便自通竹鷄草其葉如竹葉花翠藍色

四物湯（見補損）

二陳湯（見痰類）

小便不禁 五十七

戊集

丹溪心法

○小便不禁者屬熱屬虛　熱者五苓散加解毒　虛者五苓加四物　戴云小便不禁出而不覺赤者有熱白者氣虛也

附諸賢論

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

王節齋曰小便不禁或頻數古方多以為寒而用溫澁之藥殊不知屬熱者多蓋膀胱火邪妄動水不得寧故不

能禁而頻數來也故年老人多頻數是膀胱血少陽火偏旺也治法當補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以收澁之劑如牡蠣山茱萸五味子之類不可用温藥也病本屬熱故宜瀉火因水不足故火動而致小便多小便既多水益虛矣故宜補血補血瀉火治其本也收之澁之治其標也

附諸方

茯苓丸（三因方） 治心腎不足精神恍惚小便淋瀝不禁

赤茯苓 白茯苓（各等分）

右為末以新汲水挼洗澄去新沫控乾別取地黃汁與好酒同於銀石器內熬成膏搜和丸如彈子大空心鹽酒嚼下一丸

桑螵蛸散（澹寮方） 治男子小便頻數如稠米泔色此由勞心焦思得之有服此藥不終劑而愈（方見赤白濁）

治小便遺失（澹寮方）

阿膠（炒成珠） 牡蠣 鹿茸（酒炙） 桑螵蛸（酒炙各等分）

右為末糯米糊丸如梧子大每五十丸空心鹽酒下

六味地黃丸 治內虛熱者小便頻數不禁

本方加牡蠣五味子（見補損）

家韭子丸（三因方） 治大人小兒下元虛寒小便不禁或成

白濁

家韭子（炒六两）　鹿茸（酥炙四两）　蓯蓉（酒浸）　牛膝（酒浸一）

熟地黃（六两）　當歸（各二两）　杜仲（去皮炒）　石斛（去芦）

乾姜（炮）　桂心（各一两）　兎絲子（酒浸）　巴戟（去心各一两半）

右為末酒糊丸如梧子大每服一百丸空心盐湯温酒任下小兒須作小丸服之

五苓散　（見中暑）

解毒散　（見温熱）

四物湯　（見補損）

丹溪心法

○專主乎熱　帶下與脫精同治法青黛海石黃栢　內傷氣血虛不能固守常服八物湯加減呑樗樹根丸　思想成病其病在心安神丸帶補藥　熱則流通知母黃栢蛤粉青黛為丸　精滑專主乎濕熱黃栢知母降火牡蠣粉蛤粉燥濕

戴云因夢交而出精者謂之夢遺不因夢而自泄精者謂之精滑皆相火所動久則有虛而無寒也

入方

良姜（三錢燒灰）　黃柏（二錢燒灰存性）　芍藥（二錢燒灰存性）　樗樹根皮（一兩半）

右為末麵糊丸梧子大每服三十丸空心茶湯下

附諸賢論

王節齋曰夢遺精滑世人多作腎虛治而用補腎澁精之藥不效殊不知此證多屬脾胃飲酒厚味痰火濕熱之人多有之蓋腎藏精精之所生由脾胃飲食化生而輸歸於腎今脾胃傷於濃厚濕熱內鬱中氣濁而不清則其所化生之精亦得濁氣腎主必藏陰靜則寧今所輸之精既有濁則氣則邪火動于腎中而水不得寧靜故遺而滑也此證與白濁同丹溪論白濁為胃中濁氣下流滲入膀胱而云無人知此也其有色心太重妄想過用而致遺滑者自從心腎治但兼脾胃者多要當審察

附脈理

脈訣舉要曰遺精白濁當驗於尺結芤動緊二證之的

附諸方

固精丸　治心神不安腎虛自泄精

知母（炒）　黃柏（酒炒各一兩）　牡蠣（三錢煅）　龍骨（二錢）

芡實　蓮蕊　茯苓　遠志（去心各三錢）

一方有茱萸肉三錢

右為末煑山藥糊丸梧子大硃砂為衣服五十丸

小兎絲子丸（和劑方） 治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺精

石蓮肉（二兩） 兎絲子（酒焙五兩） 白茯苓（焙一兩） 山藥（一兩內將分半打糊）

右為末用山藥糊搜和丸如梧子大每服五十丸空心溫酒鹽湯任下如脚膝無力木瓜湯下

威喜丸（和劑方） 治丈夫元陽虛憊精氣不固小便白濁餘淋常流夢寐多驚頻頻遺泄婦人白濁白帶並皆治之

黃蠟（四兩） 白茯苓（去皮切塊用猪苓一分於器用同煑二十餘沸取出日晒不用猪苓四兩）

右以茯苓末鎔黃蠟丸如彈子大每一丸空心細嚼津液嚥下以小便清為度忌米醋只喫糯醋

金鎖正元丹（和劑方） 治真氣不足呼吸短氣四肢倦怠脚膝痠疼目暗耳鳴遺精盗汗一切虛損之證並皆服之

五倍子（八錢） 紫巴戟（一兩六錢） 補骨脂（酒浸一兩） 硃砂（二錢另研）
龍骨（二錢另研） 肉蓯蓉（洗焙兩六錢） 葫蘆巴（炒一兩六錢） 茯苓（去皮八錢）

右為末入研藥勻酒糊丸如梧子每服二十丸空心溫酒鹽湯任下

玉鎖丹（御藥院方） 治精氣虛滑遺泄不禁

龍骨　蓮花蘂　鷄頭實　烏梅肉（各等分）

右為末用熟山藥去皮為膏和丸小豆大每服三十丸

右為末酒麵糊丸如皂角子大每服二丸空心温酒下

忌房室

葉氏定心湯 簡易方 理心氣不足榮血衰少精神恍惚夢中失精

人參（去芦三两） 白茯苓（去皮） 黃芪（蜜炙炒） 茯神（去木各三两）

厚朴（姜制） 川芎 赤石脂（研） 白术（各二两）

紫菀茸 防風 甘草（炙各一两） 麥門冬（去心两半）

官桂（半两）

右㕮咀每服三錢水一鍾赤小豆七十粒煎六分食後服

金櫻丸 治精滑夢遺及小便後遺瀝

金櫻子 雞頭實（各一两） 白蓮花蕊 龍骨（煅各半两）

右為末糊丸梧子大每服七八十丸空心鹽酒下

白羊肝丸 治遺精

用大半夏八两剉片猪苓四两為末拌炒黃色去猪苓却將半夏為末用白羊腎两對去筋膜無灰好酒煑爛搗為泥和半夏末為丸如梧子大曬乾將猪苓末炒熱拌和藥丸安於磁器內密封養藥每服三十丸猪苓煎湯送下

秘元丹 治精不禁危急者

龍骨（酒煮焙乾為末）靈砂（水飛各一兩）砂仁（半兩）訶子（小者煨去核取肉半兩）

右為末糯米糊丸如菉豆大每服十五丸加至三十丸空心溫酒下臨臥熟水下亦可

一方

靈砂（二兩）　陽起石（火煆通紅）　砂仁　訶子肉（各一兩）

白茯苓　牡蠣（雌雄各半兩火煆飛）　麥門冬（去心二錢半）

右為末糯米飯丸空心酒下一十丸要通飲蔥茶半鍾即行如無陽起石以龍骨代之亦妙

鍊鹽散　治漏精白濁

白鹽（不以多少入磁石器內按實黃泥封固火煆一日取出鋪陰地一宿）　白茯苓　山藥（炒各一兩）

右為末入鹽一兩研勻棗肉和蜜丸如梧子大每服三十丸空心棗湯送下

桑螵蛸散　治小便白濁夢遺失精　見赤白濁

八物湯　見補損

樗樹根丸　即固腸丸　見婦人

○竇按精猶水也靜則位安動則妄行何以言之左腎所藏者精也真水也右腎所藏者氣也相火也夫夢遺精滑之症蓋由人之思想過度以動心火心火君火也君火動則相火翕然而動所以激搏真水而疎

泄也其為熱証明矣古方往往以為寒而用熱燥之藥積薪救火難矣哉今俱録其稍可者以為收澁滑脫之用亦所謂刼劑也中病則已不可過服況龍骨最能涸津液右過服之晚年發燥熱之所由也慎之慎之或曰精泄已久則為寒矣古方用熱藥豈以是乎予曰不然夫精屬陰也火屬陽也陰精虗而陽火愈熾矣經云陰虗生內熱未云陰虗生內寒也

丹溪心法附餘卷之十一終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

丹溪心法附餘卷之十二

巳集

風熱門

斑疹　五十九

丹溪心法

○斑屬風熱挾痰而作自裏而發於外通聖散中消息當以微汗散之切不可下　内傷斑者胃氣極虛一身火遊

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

行於外所致宜補以降於陰証略例中求之　發斑似傷寒者痰熱之病發於外微汗以散之若下之非理　疹屬熱與痰在肺清肺六降痰或解散出汗亦有可下者　疹即瘡疹汗之即愈通聖散中消息之　癮疹多屬脾隱隱然在皮膚之間故言癮疹也發則多痒或不仁者是兼風兼濕之殊色紅者兼火化也　黄瓜水調伏龍肝去紅點斑

戴云斑有色點而無頭粒者隨出即收收則又出是也非若斑之無頭粒者當明辨之

附諸方

玄參升麻湯（三因方）治傷寒失下熱毒在胃發癍或汗下吐後餘毒不散表虛裏實發於外甚則煩躁譫妄

玄參　升麻　甘草（炙各等分）

右㕮咀每服四錢水一鍾煎七分温服濕毒發斑亦宜服之

陽毒升麻湯（活人方）治陽毒赤斑狂言咽喉痛出膿血

升麻（三分）　犀角　射干　黄芩　人參

甘草（炙各二分）

右㕮咀水二鍾煎至一鍾去滓温服不拘時

梔子仁湯（活人方）治發斑煩燥面赤咽痛潮熱

梔子仁　赤芍藥　大青　知母（各一兩）

升麻　黃芩　石膏（各二兩）　甘草（炙半兩）

杏仁（去皮尖二兩）　柴胡（一兩五錢）

右㕮咀每服四錢姜三片豉百粒水煎溫服

化斑湯　治傷寒汗吐下後斑發脈虛

人參　石膏　知母　甘草

守真加白朮一方加玄參

右㕮咀時時煎服

黃連橘皮湯　治溫毒發斑

黃連（去毛四兩）　陳橘皮　杏仁（去皮尖）　枳實

麻黃湯（去節湯炮）　葛根（各二兩）　厚朴（姜製）　甘草（炙各一兩）

右㕮咀水煎服

調中湯　治內傷外感而發陰斑

蒼朮（一錢半）　陳皮（一錢）　砂仁　藿香　芍藥（炒）

甘草（炙）　桔梗　半夏　白芷　羌活

枳殼（各一錢）　川芎（五分）　麻黃　桂枝（各五分）

右㕮咀姜三片水煎服

消毒犀角飲子

牛蒡子（六錢）　荆芥　防風（各三錢）　甘草（一錢）

右㕮咀水煎服

通聖散（出丹溪經驗方）

川芎　當歸　麻黃　薄荷　連翹

白芍（各半兩）　黃芩　石膏　桔梗（各一兩）　滑石（三兩）

荊芥　梔子　白朮（各二錢半）　甘草（二兩）

右剉水煎服　如身疼加蒼朮羌活　痰嗽加半夏

每服細末三錢生姜三片擂細盪起煎沸服之

已集

頭眩（六十）

丹溪心法

○頭眩○痰挾氣虛併火○治痰為主挾補氣藥及降火藥○無痰則○作眩痰因火動又有湿痰者○湿痰者多宜二陳湯火者加酒芩挾氣虛者相火也治痰為先挾氣藥降火藥如東垣半夏白朮天麻湯之類○眩暈不可當者以大黃酒炒為末茶湯調下○火動其痰用二陳加黃芩蒼朮羌活散風行湿○左手脉數熱多脉濇有死血○

○右手脉實有痰積脉大是久病（久一作虛）久病之人氣血俱虛而脉大痰濁不降也○昔有一老婦患赤白帶一年半頭眩坐立不得睡之則安專治赤白帶帶愈其眩亦安○

附脉理

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

脉訣舉要曰風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑虛脉則無治眩暈法尤當審諦先理痰氣次隨證治

附諸方

獨活散（楊氏家藏方）消風化痰治頭目眩暈

細辛（去葉一兩）　石膏（研）　甘草（炙各半兩）　防風（去芦）　藁本（去土）

旋覆花　蔓荊子　川芎　獨活（去芦各一兩）

右為末每服二錢水一鍾姜三片煎至六分食後熱服

川芎散（本事方）治風眩頭暈

山藥　甘菊花　人參　茯神　小川芎（各五錢）

山茱萸肉（一兩）

右為末每服二錢酒調不拘時日三服不可悞用野菊花

芎朮湯（濟生方）治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不食

川芎　半夏　白朮（各一兩）　甘草（炙半兩）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜七片煎七分溫服不拘時

芎朮除眩湯（直指方）治感寒濕頭目眩暈

甘草（炙）　川芎　附子　白朮　官桂（等分）

右㕮咀每服三錢姜七片水煎溫服食前

荊黃湯（張子和方）治頭眩

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

大黃　荊芥穗　防風（各等分）

右為粗末大作劑料水煎去滓服以利為度

芎辛湯（濟生方）治風寒在腦或感邪温頭重痛眩暈欲倒嘔吐不定並皆治之

川芎（一兩）　細辛（洗去土）　白朮　甘草（各半兩）

右㕮咀每服一兩姜五片茶芽少許水一鍾半煎八分臨卧温服或食後服亦可

頭運方　利痰清氣降火

南星（製五分）　半夏（一錢）　桔梗（七分）　枳殼（一錢）　陳皮（一錢）

甘草（三分）　茯苓（二錢）　黄芩（一分）

右作一服姜七片水煎服食後

香橘飲　治氣虛眩運

木香　白朮　半夏（麯）　橘皮　茯苓

砂仁（各半兩）　丁香　甘草（炙二錢五分）

右剉散水二鍾姜五片煎服　加當歸川芎官桂治血虛眩運

白附子丸　治風痰上厥眩運頭疼

全蝎（炒半兩）　白附子（炮）　南星（炮）　半夏

旋覆花　甘菊　天麻　川芎

橘紅　殭蚕（炒）　乾薑（生各一兩）

右為末生姜半斤取汁打糊丸梧子大煎荊芥湯下五十丸

人參前胡湯　治風痰頭運目眩

半夏麯　木香　枳殼（炒）　紫蘇

赤茯苓　南星（炮）　甘草（炙各五錢）　人參（三錢）

前胡　橘紅（各五錢）

右剉散每服五錢姜五片水煎服

川芎茶調散　治風眩頭痛（見傷風）

半夏白朮天麻湯　見頭痛

喝起散（大全良方）治婦人血風攻腦頭旋悶倒不知人事

喝起草即蒼耳草也

右取嫩心不以多少陰乾為末每服二錢酒調下

黑錫丹　治早起眩暈須臾自定以為常此因老痰鬱痰所作必須此藥劫之（見痰類）

○廣按頭眩之症多主於痰無痰則不作眩有因寒痰濕痰者有因熱痰風痰者有因氣虛挾痰者有因血虛挾痰者其証不一也夫寒痰濕痰作眩或因外感寒濕或因內傷生冷熱痰風痰作眩或因外感風暑或因內動七情氣虛眩暈或因脾虛不進飲食或因胃弱嘔吐泄瀉血虛眩暈男子每因吐血下血女人

每因崩中產後而作也已上數方雖各有所主未能盡其變在智者擴充之也又嘗論之夫咳嗽頭痛頭眩三者乃病之標必治其病之本而病方已如產後眩暈只補其血如脾虛眩暈只補其氣是治其病之本也

頭痛六十一　附眉眶痛

丹溪心法

○頭痛多主於痰痛甚者火多又可有吐者可下者　清空

嘗治諸頭痛除血虛頭痛不可治（出東垣試效方）血虛頭痛自魚尾上攻頭痛用芎歸湯古方有追涎藥

附諸賢論

王節齋曰久頭痛病畧感風寒便發寒月須重綿厚帕包果者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛溫解散之藥暫時得効誤認為寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常踈故風寒易入外寒束其內熱閉逆而為痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣惟當瀉火凉血為主而佐以辛溫散表之劑以從治法治之則病可愈而根可除也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

附脉理

脉訣舉要曰頭痛陽弦浮風緊寒風熱洪數溼細而堅氣虛頭痛雖弦必濇痰厥則滑腎厥堅實

頭痛治例

心法附録曰頭痛須用川芎如不愈各加引經藥

太陽川芎　陽明白芷　少陽柴胡　太陰蒼朮

少陰細辛　厥陰吳茱萸

如肥人頭痛是溼痰宜半夏蒼朮

如瘦人頭痛是熱宜酒製黄芩防風

如感冒頭痛宜防風羗活藁本白芷

如風熱在上頭痛宜天麻蔓荆子台芎酒製黄芩

如白人頭痛是氣虛宜黄芪酒洗生地黄南星秘藏安神湯

如形瘦蒼黑之人頭痛乃是血虛宜當歸川芎酒黄芩之類

如苦頭痛用細辛

如頂巔痛宜藁本防風柴胡東垣云頂巔痛須用藁本去川芎

且如太陽頭痛惡風脉浮緊川芎羗活獨活麻黄之類爲主

少陽頭痛脉弦細往來寒熱柴胡為主

陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實升麻葛根石膏白芷爲主

太陰頭痛必有痰躰重或腹痛脉沉緩以蒼术半夏南星為主

少陰頭痛是寒氣逆為寒厥其脉沉細麻黄附子細辛為主

厥陰頭痛或吐痰沫厥冷其脉浮緩以吴茱萸湯主之

血虛頭痛當歸川芎為主

氣虛頭痛人參黄芪為主

氣血俱虛頭痛調中益氣湯內加川芎三分蔓荆子三分細辛二分其効如神

又有痰厥頭痛所感不一是知方者體也法者用也徒知躰而不知用者弊躰用不失可謂上工矣

附諸方

加減三五七散（和劑方）治八風五痺肢躰不仁大治風寒入腦陽虛頭痛畏聞人聲目旋運轉耳內蟬鳴應有濕痺脚氣緩弱並皆治之

山茱萸（去核三兩）　細辛（一兩半）　乾姜（泡三兩）　防風（去芦四兩）

茯苓（去皮三兩）　附子（三箇半炮去皮臍）

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

右為細末每服溫酒食前調服

川芎茶調散　治諸風上攻頭目偏正頭痛　（見傷風）

都梁丸（和劑方）治風吹項背頭目昏眩以及腦痛婦人產前產後傷風頭痛

香白芷（揀大者沸湯洗五次剉晒乾）

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼用荊芥湯下

小芎辛湯（濟生方）治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不已

川芎（一兩）　細辛（洗去土）　白朮　甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片茶芽少許煎服

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一方　治傷風感風一切頭痛

甘菊（一兩）　細辛（半兩）　甘草（七錢半）　白芷　羌活

香附子　薄荷（各三兩）　荊芥（二十枝）　茵陳（半兩）

蒼朮（泔浸）　川芎（各一兩）

右為末每服二錢茶清調下婦人產後當歸石膏末調下

定風餅子（秘方）治偏正頭痛

草烏頭（半兩微炮）　香白芷（一兩）　川芎（二兩）　防風

天麻　甘草（炒各一兩）　細辛（半兩）

右為末姜汁丸如龍眼大捏作餅子每服一餅食後茶

湯下

川芎丸（聖惠方）消風壅化痰涎利咽膈清頭目旋暈心忪煩熱頸項緊急肩背拘踡肢躰煩疼皮膚瘙痒腦昏目疼鼻塞聲重面上遊風

川芎　薄荷（各七兩五錢）　甘草　細辛

防風（各二兩五錢）　桔梗（十兩）

右為末煉蜜丸每兩半作五十丸每服一丸細嚼茶清食後臨卧時下

二芎餅子（濟生方）

川芎　撫芎　乾姜（炮）　甘草　藁本（去蘆）

天南星（炮去皮）　防風（去芦）　白朮（各等分）

一方有蒼耳無白朮

右為末姜汁蒸餅為劑如雞頭大捏作餅每服五錢餅細嚼茶清下

徹清膏

蔓荊子　細辛（各一分）　薄荷葉　川芎（各三分）

生甘草　炙甘草（各五分）　藁本（一錢）

右為末茶清調下二錢

神靈散　治偏正頭疼不止　止及破傷風等疾

焰硝（一兩）　黃丹　雄黃（各三錢）　沒藥　乳香（各一錢）

右為細末令患人用略温水用竹筒吹藥入鼻中少許

一方　治偏頭疼以雄黃細辛等分研末每服一字左邊疼吹右鼻內右邊疼吹左鼻內

○已上諸方辛温外散風寒之劑

天麻散　治頭項痛頭面腫拘急風傷衛發躁熱（方見風熱）

生朱丹（御藥院方）治諸風痰盛頭痛目眩氣鬱積滯胸膈不利

朱砂（一兩二錢半）　龍腦（一錢）　白附子（炮去皮臍半斤）

石膏（燒通紅令冷半斤）

右為末燒粟米飯為丸如小豆大硃砂為衣每服三十丸食後茶酒任下

大川芎丸　治首風暈眩外合陽氣風寒相搏胸膈痰飲偏正頭疼

川芎（一斤）　天麻（四兩鄆州者）

右爲末煉蜜爲丸每兩作十丸每服一丸細嚼茶酒下食後

上清散（集成）治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者

川芎　鬱金　芍藥　荊芥穗　薄荷葉

芒硝（各二錢半）　乳香　沒藥（各半錢）　腦子（一分半）

右爲末每服一字鼻內搐之

菊花散（和劑方）治風熱上攻頭痛不止

石膏　甘菊花　防風　旋覆花　枳殼

蔓荊子　甘草　羌活（各一錢半）

石用水二盞生姜五葉煎至一盞去渣温服

芎芷散（直指方）治風壅頭痛

川芎　白芷　荊芥穗　軟石膏

右為末每服一錢食後沸湯調下

川芎散（拔粹方）治偏頭痛神効

甘菊花　石膏　川芎（各三錢）

右為細末每服一錢茶清調下一方有白姜蚕六錢生用

石膏散（拔粹方）治頭痛不可忍

麻黄（去根節）　石膏（各二兩）　何首烏（半兩）　乾姜（七錢半）

右為細末每服三錢臘茶清調服

點頭散（聖惠方）治偏正頭痛

川芎（生二兩）　香附子（去毛四兩）

右為末每服一錢好茶調下常服除根

一方　治頭痛去風痰

南星（一箇大者七片）　皂角（十四箇七箇生七箇煨）　白梅（一箇）　姜（三片）

牙茶（一撮）　葱頭（一寸四分）

右將前藥俱在石器內搗碎水一盞半煎至一盞去滓
温服不可輕犯鐵器搗

一方　治頭痛連眼痛　此風痰上攻須用白芷開之

雨前茶　川芎　白芷　防風　藁本
細辛　當歸

右用水煎服

川芎散（聖惠方）治頭風偏正頭痛

羌活　細辛　川芎　香附子　槐花
甘草（炙）　石膏　荊芥穗　薄荷　菊花
茵陳　防風（各一兩）

右為末每服二錢茶清調食後服忌動風物

○已上諸方辛平外散風寒內消風熱之劑

清空膏　治偏正頭痛年深不愈者又治風濕熱頭上壅
及腦痛除血虛頭痛不治餘皆治之

川芎（五錢）　柴胡（七錢）　黃連（酒炒）　防風　羌活（各一兩）
炙甘草（一兩五錢）　細挺子黃芩（三兩去皮一半酒製一半炒）

右為末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口
內少用白湯送下臨卧　如苦頭痛每服加細辛二分
痰厥頭痛脉緩減羌活防風川芎甘草加半夏一兩
五錢　如偏正頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半

加柴胡一倍　如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加吳白芷（白虎湯方見濕熱類）

靈砂丹（御藥院方）治風熱欝結氣血蘊滯頭目昏眩鼻塞聲重鼻流清涕口苦舌乾咽嗌不利胸膈痞悶咳嗽痰實腸胃燥澁小便赤黃或腎水陰虛心火熾甚及偏正頭疼髮落牙痛遍身麻木疥癬瘡瘍一切風熱並皆治之

天麻　獨活　羗活　細辛　石膏
防風　連翹　薄荷（各一两）　川芎　梔子
芍藥　荊芥穗　當歸　黃芩　大黃（生）
全蝎（去毒微炒）　菊花　人參　白术（各半两）　硃砂（二两為衣）
寒水石（生）　桔梗（各一两）　宿砂仁（二錢半）　生甘草（二两）
滑石（四两）

右為末煉蜜丸每两作十丸硃砂為衣每服一丸細嚼茶清送下

真珠散（聖惠方）治偏正頭痛頭風

盆硝（七錢半）　白滑石（半两）　乳香（一錢半）　片腦（少許）

右研細用一字口噙水搐鼻內

豆粉丸（聖惠方）治風熱頭疼

川芎　細辛　甘草　白芷　豆粉（各二錢半）

薄荷　石膏（各半兩）　朴硝（二錢）

右為細末煉蜜和丸如彈子大石膏末為衣每服一丸細嚼茶清下

川芎散（聖惠）方治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣攻眼下淚多眵齒間緊急作偏頭痛

川芎　柴胡（各一兩）　半夏麴　甘草（炙）　甘菊花

細辛　人參　前胡　防風（各半兩）

右㕮咀每服八錢水一盞半生姜三片薄荷少許煎至八分溫服

安神湯（聖惠）方治頭痛頭旋眼黑

羌活　黃蘗（各一兩酒浸）　防風（二錢半）　柴胡　升麻

知母（酒浸）　生地黃（各半兩酒浸）　黃芪（二兩）

生甘草（二錢）　加蔓荊子（半錢）　川芎（三分）

炙甘草（三錢）

右㕮咀每服八錢水一盞半煎至八分去渣溫服食後

治頭痛

片芩酒浸透晒乾為末茶清調下　治諸般頭痛亦治血虛頭痛

治頭痛如破

酒炒大黃半兩一半茶煎

○已上諸方辛凉內消風熱之劑

定風餅子　治風寒客於陽經邪傷腠理背膂強直言語蹇澁躰熱惡寒痰厥頭痛肉瞤筋惕手顫鼻淵

方見傷風

如聖餅子　和劑方　治風寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛

防風　天麻（各半兩）　南星（洗）　乾姜　川芎

甘草　川烏（各一兩）　半夏（生半兩）

右為末水丸作餅子每五餅同荊芥細嚼茶酒下澹寮方加細辛

三生丸　濟生方　治痰厥頭痛

半夏　白附子　天南星（各等分）

右爲末生姜自然汁浸蒸餅為丸如菉豆大每服四十丸食前姜湯米飲任下

天香散　簡易方　治年久頭風頭痛不得愈者

天南星　半夏（湯洗去滑盡）　川烏（去皮）　白芷（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞煎一半入姜汁半盞煎八分溫服

九龍丸　聖惠方　治男女八般頭風一切頭痛

川芎　石膏　白芷　川烏頭　半夏

南星（各半兩）　加細辛　全蝎（各二錢半）

右爲末薑汁爲丸如梧桐子大每服五十丸茶清送下

不卧散　治頭痛不可忍者

玄胡索（七枚）　青黛（二錢）　猪牙皂角（肥實者刮去皮及子二兩）

右爲末用水調丸成小餅子如杏仁大用時令病者仰卧以水化開用竹管送入男左女右鼻中覺藥味至喉少酸令病者坐却令咬定銅錢一箇於當門齒上當見涎出成盆即愈

玉真丸（濟生方）　治腎厥頭痛不可忍其脉舉之則弦按之則堅

生硫黃（二兩另研）　石膏（硬者不煆）　半夏（湯洗七次）　硝石（別研各一兩）

右爲末研勻用生姜汁煑糊丸如梧子大每服四十丸食前姜湯米飲任下虚寒甚者去石膏用鍾乳粉一两

芎烏散　治氣厥頭痛因氣所觸心腹脹滿嘔吐酸水頭目昏弦

川芎　天台烏藥（各等分）

右爲細末每服二錢臘茶清調服

芎朮湯（三因方）　治署濕頭痛身重眩暈痛極

附子（生去皮臍半兩）　白朮　川芎　桂心（各二錢半）

甘草（一錢半）

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片棗子一箇煎食前服

○已上諸方治痰厥腎厥著溫之劑

順氣和中湯　治氣虛頭痛此藥升陽補氣頭痛自愈

黃芪（一錢半）　人參（一錢）　甘草（炙七分）　白朮　陳皮

當歸　芍藥（各五分）　升麻　柴胡（各三分）　細辛

蔓荊子　川芎（各二分）

右作一服水煎食後服　亦治氣血俱虛頭痛

半夏白朮天麻湯　治脾胃証已經服疎風丸下二三次元證不瘳增以吐逆痰唾稠粘眼黑頭旋目不敢開頭苦痛如裂四肢厥冷不得安臥此氣虛頭痛也

黃栢（二分酒洗）　乾姜（三分）　澤瀉　白茯苓　天麻（一

黃芪　人參　蒼朮（各五分）　炒神麯　白朮（各一錢）

麥芽　半夏（湯洗）　陳皮（各一錢半）

右每服五錢水煎熱服

芎歸湯　治血虛頭痛

川芎　當歸（等分）

右每服五錢水煎服

四神散（大全良方）治婦人血風眩暈頭痛

菊花　當歸　旋覆花　荊芥穗

右等分為細末每服二錢葱白三寸茶末二錢水一盞半煎至八分去滓食後溫服

調中益氣湯　治氣血俱虛頭痛

內加川芎三分蔓荊子三分細辛二分　方見脾胃

○已上諸方治氣虛血虛之劑

丹溪心法

○眉眶痛屬風熱與痰　作風痰治類痛風

入方

黃芩（酒浸燒）　白芷

右爲末茶清調二錢

又方

川烏　草烏（二味爲君童便浸炒去毒）　細辛　羌活

黃芩　甘草（等分爲佐）

右爲細末茶清調服　一本加南星

附諸方

選奇方　治眉骨痛不可忍大有効

羌活　防風（各二錢）　甘草（二錢夏月生冬炒）

酒黃芩（一錢冬月不用有熱者用）

右每服三銭水一鍾煎七分食後温服

上清散　治因風頭痛眉骨眼眶俱痛不可忍者

一方　治頭痛連眼痛　俱見頭痛

頭風（六十二）

丹溪心法

○屬痰者多　有熱有風有血虛　在左屬風薄荷荊芥屬血虛川芎當歸　在右屬痰蒼朮半夏屬熱酒芩爲主又屬溫痰川芎南星蒼朮　偏頭風在左而屬風者用荊芥薄荷此二味即是治之主藥有君臣佐使之分凡主病者爲君而多臣次之佐又次之須要察其兼見何症而佐使之如有痰即以二陳湯治痰而佐之他症皆倣此又須察識病情全在活法出入加減不可執方

入方

酒片芩（一兩）　蒼朮　羌活　防風（各五錢）

細辛（二錢）　蒼耳（三錢）

右爲末每服三錢生姜一大片同擂勻茶湯盪起服之

又方

酒片芩（五錢）　蒼朮（二錢半）　羌活　蒼耳　川芎

生甘草　酒黃連（各一錢半）　半夏麴（炒三錢半）

右爲末服法同前

瘦人搐藥

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

軟石膏　朴硝（各五錢）　腦子　荊芥　檀香皮

薄荷（各一錢）　白芷　細辛（各二錢）

右爲末搐鼻內

頭痒風屑髮黃

用大黃酒浸炒爲末茶調服

一粒金搐鼻方　治偏頭風

藁本　玄胡索　白芷　川芎

青黛（各一兩）　蓽撥（不以多少研細用豶猪膽汁拌匀再入膽內懸陰乾與前等分）

右爲末入製蓽撥末一兩半用無根水丸每服一粒長流水化開搐鼻以銅錢二三文口咬定出涎

治頭風

烏頭尖（七箇）　荊芥　防風　甘草　蔓荊子

台芎　桔梗　麻黃

右爲末茶調

一人頭風鼻塞

南星　蒼朮　酒芩　辛荑

川芎（各等分）

右爲末茶調

附諸方

川芎散（拔粹方）　治偏頭痛頭風神効

甘菊花　石膏　川芎（各三錢）

右爲末每服一錢茶清調下一方有白姜蚕六錢生用

消風散（和劑方）治諸風上攻頭目昏眩偏正頭風及婦人頭皮腫痒並皆治之

川芎茶調散（和劑方）治諸風上攻頭目昏重偏正頭痛頭風（並見傷風）

菊花茶調散　治諸風頭目昏重偏正頭痛頭風鼻塞

菊花　川芎　荊芥穗　羗活　甘草

白芷（各二兩）　細辛（一兩洗淨）　防風（去芦一兩半）　蝉蜕　殭蚕

薄荷（各五錢）

右爲末每服二錢食後用茶清調下

芎辛湯　治膈痰風厥頭目昏疼鼻塞聲重肩背拘急

川芎（五錢）　細辛（三錢）　甘草（炙一錢半）

右用水煎食後服

一方　治一切頭風

用猪牙皂角炮玄胡索各一錢青黛半錢爲末滴水爲丸如梧子大捏作餅子（晒乾）每用一餅新水化開男左女右仰面以蘆筒鼻內灌之口咬銅錢一十五文其涎便出更不再發亦治痰厥妙

一方

天麻　防風　川芎等分

一右爲末每服三錢溫酒食後調下以豆豉湯洗頭避風即愈

一方　治偏頭風

用蓽撥為末令患者口中含水如左邊痛左鼻吸一字右邊痛右鼻吸一字甚効

金花一聖散　治頭風

川芎　川烏　白芷各等分

右爲末每服二錢生葱三寸薄荷葉三四皮同煎食後服

灸法

宜灸顖會百會前頂上星等穴瘥

眼目　六十三

巳集

丹溪心法

〇眼黑睛有翳皆用知母黃栢　眼睛疼知母黃栢瀉腎火當歸養陰水　眼中風淚出食後吞龍會丸數粒日三次　冬月眼暴發痛亦當解散不宜用凉藥

入方

神効七寶膏　治暴發眼熱壅有翳膜者

蕤仁（去油心膜）　白硼砂　片腦　硃砂

右用蜜調成膏點眼

爛眶眼

薄荷　荊芥　細辛

右為粗末如燒香狀燒之以青碗塗蜜少許於內覆香烟上取烟盡之後以小青罐收烟藏之凡眼有風熱多淚者皆可點此是陽明經有風熱所致

生熟地黄丸　治血虛眼（見後）

龍膽丸（見協痛）

一人病眼至春夏便當作鬱治

黄芩（酒浸）　南星（姜製）　香附（童便浸）　蒼术（童便浸各二兩）

道芎（酒浸一兩半）　山梔（炒一兩）　龍膽草（酒浸）

陳皮　連翹　蘿蔔子（蒸）　青黛（各半兩）　柴胡（三錢）

右爲末神麯糊丸

附諸賢論

王節齋曰眼赤腫痛古方用藥內外不同在內湯散用苦寒辛涼之藥以瀉其火在外點洗則用辛熱辛涼之藥以散其邪故點藥莫要於冰片而冰片大辛熱以其辛性甚故借以拔出火邪而散其熱氣古方用燒酒洗眼

或用乾姜末生姜汁點眼者皆此意也盖赤眼是火邪内炎上攻於目故内治用苦寒之藥是治其本如鍋底之去薪也然火邪既客於目從内出外若外用寒凉以阻逆之則欝火内攻不得散矣故點藥用辛熱而洗眼用熱湯是火欝則發因而散之從治法也世人不知氷片為刼藥而誤認爲寒常用點眼遂致積熱入目而昏暗瘴翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒凉而妄将冷水冷物冷藥挹洗甞致昏瞎者有之

附諸方

明目流氣飲（和剤方）治肝經不足内生風熱上攻眼目視物不明常見黒花當風多淚癮澁難開或生障翳婦人血風特行暴赤一切眼疾並皆治之

大黄（煨）　牛蒡子（炒）　川芎　菊花（去皮）

白蒺藜（炒去刺）　細辛（去苗）　防風（去苗）

玄參（去芦）　山梔子（去皮）　黄芩（去芦）　甘草（炙）

蔓荊子（去白）　荊芥（去梗）　木賊（去根節各一兩）

草决明（一兩半）　蒼术（米泔浸炒二兩）

右為末每服二錢臨卧用冷酒調下

洗心散（和剤方）治風痰壅滿心經積熱邪氣上衝眼澁睛痛或腫或赤迎風多淚怕日羞明並皆治之（方見火類）

洗肝散（和劑方）治風毒攻上暴作赤目腫痛癮澁多淚

薄荷（去梗）當歸　羌活　防風（各去芦）川芎

甘草　大黄（各一兩）

右為末每服三錢食後熱水調下

蜜蒙花散（和劑方）治風氣攻注兩眼昏暗多淚羞明并暴赤腫

蜜蒙花（揀淨）杜蒺藜（炒去尖）羌活（去芦）木賊　菊花

石决明（用塩同東流水煑沸時取研粉等分）

右為末每服一錢臘茶清食後調下

撥雲散（和劑方）治男子婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜睛怕日羞明一切風毒眼疾並皆治之

羌活　防風　柴胡　甘草（炒各一斤）

右爲末每服二錢水一鍾煎服食後薄荷湯調茶并菊花苗煎湯皆可服忌諸毒物

蟬花散（和劑方）治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚羞明一切風毒并宜服之

穀精草（去土）菊花（去梗）蟬蛻（洗去土淨）羌活　甘草

白蒺藜（炒去剌）草决明　防風（去芦）山梔子（去皮）

川芎（不見火）蜜蒙花（去校）荊芥穗（去梗）

黄芩（去土）蔓荊子（去皮）木賊（洗淨各等分）

右爲末每服二錢食後茶清調服或荊芥湯調亦可

菊花散（和劑方）治肝生風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚澁痛

菊花（去梗六錢）羌活（去芦）白蒺藜（炒去尖）木賊（去節各三兩）

蟬脫（去頭足翅三兩）

右爲末每服二錢食後茶清調下

四生散 治肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明（方見風熱）

芎藭丸（御藥院方）治遠視不明常見黑花久服明目

芎藭 菊花 荊芥 薄荷 甘草（各一兩）

蒼朮（二兩米泔浸）

右爲末煉蜜丸如梧子大每服五十丸食後茶清下

荊芥散（三因方）治肝經蘊熱眼目赤腫

荊芥穗 當歸 赤芍藥（各一兩半）黃連（一兩）

右㕮咀每服三錢水一鍾煎三沸濾去滓溫服或洗

十全神麴丸（三因方）明眼目百歲可讀細書常服有効

神麴（四兩）光明硃砂（一兩）磁石（二兩煅醋淬）

右爲末煉蜜丸如梧子大每服二十丸食後茶飲下

黃連丸（本事方）治肝經風熱上攻眼目澁痛不可用藥補者

乾熟地黃（一兩半）黃連 決明子（各一兩）沒藥

光明硃砂　甘菊花　防風　羌活

桂心（各半兩）

右爲末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食後熟水下

决明子散（濟生方）治風毒上攻眼目腫痛或卒生翳膜或赤澁胬肉或痒或痛羞明多淚

黄芩　甘菊花（去枝梗）　木賊　决明子　石膏

赤芍藥　川芎　川羌活（去芦）　甘草

蔓荆子　石决明（各一兩）

右爲末每服三錢水一鍾姜五片煎至六分食後服

龍膽散（聖惠方）治風毒熱氣攻衝眼目暴赤瘮澁羞明及腫痛多眵迎風有淚翳膜攀睛胬肉癮痛

龍膽草（洗去芦）　菊花（去梗）　木賊（洗净去節）　草决明（微炒）

甘草（炙各二兩）　香附子（炒去毛）　川芎（不見火各四兩）

右爲末每服三錢用麥門冬湯入沙糖少許調服食後或米泔調下亦得

又方（和劑方）治眼目暴赤腫痛風毒熱氣上衝睛疼連眶臉皆赤爛瘀肉侵睛時多熱淚及因忿怒逆損肝氣久勞瞻視風沙塵土入眼澁痛致成内外障翳等疾

龍膽草　蒺藜（炒去刺各六兩）　茯苓（去皮四兩）　菊花（去枝五錢）

赤芍藥（八兩）　防風（去皮核）　甘草（炙）　羌活（各三兩）

右用爲末温酒調二錢食後服

散熱飲子（拔粹方）治眼暴赤暴腫

防風　羗活　黄芩　黄連

右等分水一鍾半煎八分去滓温服食後如大便秘加大黄一两痛甚加當歸地黄各一两如煩燥不眠加梔子一两

○已上諸方散風熱之劑

石膏羗活散（宣明方）治久患雙目不覩光明遠年近日内外氣障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羗活（治腦熱頭風）　密蒙花（治羞明怕日）　木賊（退翳障）　香白芷（清利頭目）　乾萊子　細辛（二味起倒睫）　蔴子（起拳毛）

川芎（治頭風）　蒼木（開鬱行氣）　甘菊花（明目去風）

荊芥穗（治目中生瘡）　石膏　黄芩（二味洗心退熱）　藁本（治偏頭痛）

甘草（和諸藥）各等分

右爲末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一盞調下或茶清亦可日進三服至十日漸明至二十日大驗此方醫數十餘人矣　後人加當歸枸杞子梔子仁連翹柴胡薄荷葉防風天麻桔梗各等分爲小丸服

蟬花無比散（和劑方）治大人小兒風毒傷肝或爲氣攻一切眼目昏暗漸生翳膜及久患頭風牽搐兩眼漸漸細

小連眶赤爛小兒瘡疹入眼白膜遮睛赤澁癮痛並治

茯苓　甘草（炙）　防風（去芦各四两）　川芎　羌活

當歸（洗焙各三两）　赤芍藥（十三两）　蛇蛻（炙一两）

蒺藜（炒去皮尖半斤）　蟬蛻（去頭足翅二两）　石决明（用塩水煑研細為粉）

蒼术（去皮炒十二两）

右為末每服三錢食後米泔調服茶清亦可忌毒食

明眼地黄丸　和劑方　治男子婦人肝虛熱積上攻眼目翳膜遮睛羞澁多淚此藥多治肝腎兩經俱虛風邪所乘並治暴赤熱眼

牛膝（去芦酒浸三两）　石斛去苗　生地黄一两　熟地黄（洗焙一两）

防風（去芦四两）　杏仁（去皮尖炒去油研細）　枳殼（去白麸炒各四两）

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食前塩湯温酒任下

羊肝丸　濟生方　治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

羊肝（一具生用）　黄連（去鬚另研為末）

右先將羊肝去筋膜於沙盆內擣爛入黄連末杵和丸如梧子大每服五十丸熟水送下　利濟方用白羊子肝

上清丸　秘方　治風熱上壅眼目昏花迎風冷淚羞明赤爛

羚羊角　犀角　黄連　厚朴（各一两）

牛黄　黄芩　川芎　羌活　蟬退

白芷　菊花　大黃　防風　草決明

地膚子　滑石（各五錢）　生地黃　熟地黃（各七錢）　牽牛（八錢半）

右爲末煉蜜丸如梧子大每服三五十丸茶清下食後

杞苓丸（曾氏家傳）專治男子腎臟虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內障

白茯苓（去皮八兩）　真枸杞（四兩酒浸）　當歸（二兩酒洗）　青鹽（一兩別研）

兎絲子（二兩酒浸蒸）

右爲末煉蜜丸如梧子大每服七十丸食前熱湯下

導赤散（曾氏家傳）治心臟積熱上攻眼目兩眥浮腫血侵白睛羞明洒淚一切治之

牛旁子（炒）　楡子　槐子（炒）　生乾地黃

黃芩（各等分）

右爲末每服二錢食後麥門冬湯調下

車前散（曾氏家傳）肝經積熱上攻眼目逆順生翳血灌瞳人羞明多淚

密蒙花（去枝）　甘菊花（去枝梗）　白蒺藜（炒去刺）　羌活

粉草　草決明　車前子（各炒）　黃芩

龍膽草（洗各等分）

右爲末每服二錢食後飯湯調下

五味子丸（曾氏家傳）治心肝二經蘊積風邪并腎臟虛耗

眼目昏暗或生翳膜

阿膠（蛤粉炒） 熟地黃（各一兩） 白茯苓 麥門冬（各半兩）

芍藥 五味子 杜仲（去皮姜汁炒斷絲各二兩）

貝母（炒） 栢子仁 茯苓（去木） 遠志（去心）

人參 百部 防風（去芦各一兩）

右為末煉蜜丸如彈子食前姜湯嚼下一丸

蔓荊湯（聖惠方）治勞役飲食不節內障眼疾此方立効

黃芪 人參（各一兩） 蔓荊子（二錢半） 甘草（炙八錢）

白芍藥（二錢） 黃栢（三錢酒浸晒四次）

右㕮咀每服五錢水二盞食後臨臥溫服

助陽和血補氣湯（衛生寶鑑）治眼目發後熱白睛紅多眵淚無疼痛而癮澁難開此服苦寒藥太過而真氣不能通九竅故眼昏花不明宜助陽和血補氣

防風（七分） 黃芪（二錢） 甘草（炙一錢） 蔓荊子（一錢）

當歸身（半錢） 白芷（五分） 升麻 柴胡（各五分）

右㕮咀作一服水一鍾半煎一鍾臨臥迴口服忌風寒及食冷物

地黃湯（拔粹方）治眼久病昏澁因發而久不愈者

防風 羌活 黃芩 黃連（一）

地黃 當歸 人參 茯苓

右等分爲粗末水一鍾半煎八分食後臨卧通口服

四物龍膽湯（拔粹方）治目赤暴發作雲翳疼痛不可忍者

當歸　川芎　芍藥　地黄（各伍錢）

羗活（三錢）　草龍膽（二錢）　防風（三錢）　防巳（二錢）

右㕮咀每服八錢水一鍾半煎八分食後通口服

○已上諸方散風熱兼補虛之劑

菊睛丸（和劑方）治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多有冷淚

枸杞子（三兩）　蓯蓉（酒浸炒二兩）　甘菊花（四兩）　巴戟天（去心一兩）

楊氏家藏方加五味子（三兩）

右爲末煉蜜丸如梧子大每服五七十丸食後温酒塩湯下

加减駐景丸（簡易方）治肝腎氣虛兩眼昏暗視物不見

車前子（炒一兩）　熟地黄（洗）　當歸身（各五錢）　五味子

枸杞子（各一兩）　兎絲子（酒製半斤）　楮實子（無翳膜則勿用）

川椒（炒出火毒各一兩）

右爲末蜜糊丸如梧子大每三十丸温酒塩湯下食前

養肝丸（濟生方）治肝氣不足眼目昏花或生眵淚

當歸（去芦酒浸）　車前子（酒蒸焙）　防風（去芦）　白芍藥

蕤仁（去皮另研）　熟地黄（酒蒸焙）　川芎　楮實（各等分）

右爲末煉蜜丸如梧子大每服七十丸熟水下不拘時

生熟地黄丸　治血虛陰虛眼目昏花

生芐　熟芐　玄參　金釵石斛（全兩）

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心服

東垣熟乾地黃丸　治血少神勞腎虛眼目昏黑

熟地黃（一兩）　生地黃（一兩五錢）　柴胡（八錢）　天門冬

甘草（炙）　枳殼　地骨皮　黃連

五味子（各三錢）　人參（二錢）　當歸身（酒浸焙乾）　黃芩（各五錢）

右為末煉蜜丸如菉豆大每服百丸茶清下

〇已上諸方補虛之劑

白龍散（御藥院方）　去翳膜明眼目

用芒硝五兩取真白如雪者置銷金銀鍋子內以新瓦蓋又用熟炭火用一小磚火內放先燒磚熱然後下藥在鍋磚上四面有火慢慢熬溶良久鍋內有聲先去頂上火并瓦鍋中覷不沸顯清明汁以鉄鉗鉗出鍋傾藥汁在別器中凝潔如玉色者方好研如極細入龍腦各等分用點退下翳或吹入鼻中立有神効

黃連膏（宣明方）　治一切眼目瘀肉攀睛風痒淚落不止

黃連（半斤）　白丁香（五升水一瓶淘淨去土攪細用）　朴硝（一斗以水半瓶淘淨去土陰乾）

右取水入硝香釜內熬至七分淘出令經宿水面浮牙者取出控乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連細末熬清汁曬乾硝用豬羊膽和加蜜點之効矣

撥雲散（秘方）點眼中有翳雲膜遮障近日瘀痛眼不可點

硇砂（去挾石研細末） 鵬砂 黃丹（水飛） 青塩

盆硝（各五錢） 爐甘石（半斤煆七次入童子小便淬如雞黃為度研細末）

輕粉（一錢） 蕤仁（六十箇去皮用白仁黃色者不用）

右為極細末研無聲為度忌鷄魚一切辛熱之物

碧霞丹（宣明方）點一切惡眼風赤者

龍腦 射香 硇砂（各二錢） 没藥

血竭 乳香 銅青（各一錢） 鵬砂（二錢）

右為末滴水和丸如梧子大每服一丸新汲水化開點之立効

撥雲膏（秘方）

爐甘石 黃丹（一两） 川烏（七錢半） 犀角

乳香 没藥 硇砂 輕粉（各一錢）

青塩 血竭 片腦（半錢） 射香

蕤仁（各七分半） 當歸（二錢半） 黃連（一两五錢） 蜜（一斤）

銅綠 鷹條（各一錢二分半）

右件脩合各如法研細用白沙蜜十五两慢火初沸下黃丹二沸下爐甘石三沸下諸藥不粘手為度用磁盞內熱水泡開熱點不拘時

捲簾散（楊氏家藏方）治久新痛眼昏澁難開翳膜遮睛或

成翳肉或暴發赤腫疼痛並皆治之

爐甘石（四兩碎）黃連（六錢搥碎用水一碗煮數沸除去前滓）朴硝（五錢細研）

已上先將爐甘石末入沙鍋内開口煅令外有霞色為度次將入黃連朴硝水中浸飛過候乾又入黃連半錢

水飛過再候乾次入

白礬（二錢一半生用一半飛过）膩粉（另研一字）黃連末（半兩）

青塩 膽礬（各七錢）丁香（另研）乳香（另研）

鉛白霜（各一字）銅錢（七錢）碙砂（另研一字）

右為末同前件藥和合令勻每用少許點眼

〇已上諸方點攀睛瘀肉之劑

黃連散（楊氏家藏方）治肝受風熱眼眩赤爛

乳香（一錢半另研）黃連（去鬚半兩）荊芥（六百穗）燈心（一百莖）

右㕮咀每服二錢水二鍾煎一鍾濾去渣熱洗

光明湯（秘方）治一切暴眼

白礬（一字）銅緑（一錢）杏仁 甘草（各一錢）

乾姜（三分俱各搥末）

右件用生絹袋盛貯頓放於磁器内以沸湯浸用紙封

蓋定待冷臨卧洗之

洗眼湯 治暴赤眼

當歸尾 黃連（各一錢）赤芍藥 防風（各半錢）

杏仁（四箇去皮尖）

右用水半鍾將小孩乳汁少許蒸過澄清點洗不拘時

消毒散（御藥院方）治眼赤腫疼痛不定兼治瘡腫不消

大黃（生五錢）　黃芩　黃栢（各一兩）

右為末每用生蜜水調藥如糊攤在緋絹花子上隨目赤左右貼於太陽穴如乾用溫水頻潤

五黃膏（御藥院方）治目赤

黃栢（一兩）　黃連　黃芩　黃丹

大黃（各半兩）

右為細末每一錢蜜水調成膏攤緋絹上隨左右眼赤貼於太陽穴

赤眼方（秘方）

雞爪黃連　銅綠（半餅）　大艾葉

右將黃連銅綠研末用淨水調膏攤於磁器盞內却將艾揉軟為丸燒艾炮黑盞內藥乾用沸湯炮澄清以銀簪蘸藥點之

爐甘石散（海上方）治一切目疾不問得病之因悉治之

爐甘石（真者半斤黃連四兩剉如豆大於銀石器中用水二碗煮二次揀去黃連取出甘石細研）

片腦（二錢半別研）

右二味同研勻每用半字白湯泡時時洗之點亦可一

又方（海上方）

礦甘石（半兩飛三次去沙石）　硇砂　鵬砂（各一兩）

白礬　腦子（各半錢）　射香（少許）

右爲極細末用沸湯泡點洗俱可

乳香散　治眼赤腫疼痛不可忍

鬱金（二錢半）　盆硝　黄連（各一錢）　雄黄

乳香　沒藥　片腦（各半錢）

右為末鼻内搐少許點亦可

復明膏（秘方）點遠年近日雜患眼目昏花

黄連（一斤洗淨去鬚剉）　當歸（半斤洗淨擘開脥晛）

柯子（三兩洗淨搥碎）　黄栢（三兩去粗皮）

右四味用臘水一大桶磁器内浸十五日入銅鍋内熬至數十沸濾去滓礦甘石一斤桑柴火煅七次用前藥四味汁蘸七次如鷄子黄色爲用研極細末水飛過鵝翎二十五箇搗爛用生絹袋濾去滓黄丹半斤水飛過去爲用蜜二斤半水二斤半葱一把煮水盡去滓猪胰子十五箇擇淨脂油用擇草穚一大把同搗爛泥生絹袋濾去滓再過一次同前藥汁下入銅鍋内煎熬欲成稀膏下後六味

青鹽　盆硝（各一兩）　銅綠（研極細末）　硇砂

鵬砂　熊膽（各五錢）

右為極細末入鍋再熬一時欲成稠膏子下後四味

射香（三錢研細）　木龍腦　輕粉　粉霜（各一錢研細）

再熬從緊至慢漸漸微火熬成膏出鍋入磁器內盛放土中埋一箇月去火毒可用巳後若乾時却用乳汁化開點每日可點三五十筯若腫時歇一二日再點以効為度二月九月脩合為妙

珊瑚膏（秘方）治遠年近日不覩光明一切雜患病眼五輪不損者並皆治之新患眼粒日見効每用皂角子一大塊冷水半鍾鷄子殼少許於小盞內浸化研開點眼或洗眼亦得臨卧點用奇効不可具陳除內障氣眼不治

紫金膏（秘方）同珊瑚膏治証每遇病眼用藥如菉豆許點眼大角內點五七遍看病大小用此膏與珊瑚膏（方並見上）

（膽膏）

龍膽膏（秘方）治暴赤眼腫痛癮澁難開怕日羞明迎風淚出視物昏花每用豆許點眼大角內少時連點數節大有功効今具藥品于后

玄精石（一斤）　桂府滑石（一斤共為細末）　黃連

秦皮（切細）　龍膽草　苦楝根　五味子（各用十兩）

當歸　赤芍藥　大梔子　蕤仁（搗碎）

杏仁（各五兩） 槐枝（二斤切三寸許） 柳枝（二斤切三寸許）

玄精石至五味子七味用大鍋盛水二大桶煎至一半去滓將細生絹濾過磁器盛放又當歸至柳枝七味亦要用水二桶煎至一半去滓再將細生絹濾過亦用磁器盛放白沙蜜五斤先用少油搽鍋內慢火煉蜜紫色一為度將前二次煎成藥水同煎數沸再用生絹濾過再熬至一半入銅鍋內下鵬砂五兩猪膽大者五箇慢火煎用鉄鏟不住手攪熬成稀膏除二斤於磁器內盛放一宿將上等片腦六錢研細入藥內攪勻用油紙封固一宿名為片腦膏○下礶甘石六兩黃丹六兩用水飛過硇砂九錢攪塩九錢盆硝九錢銅綠九錢輕粉三錢粉霜二錢俱研細用水一碗用細生絹濾過盡入前熬成三斤藥內將鉄鏟不住手攪慢火再熬成稀膏又除二斤半用磁器內盛放經一宿再用上等片腦一錢射香二錢研細入藥內攪勻將油紙封固一宿名為紫金膏○又以珊瑚半兩為粗末用水一大碗煎數沸去滓不用入前熬成稀膏半斤於內又下礶甘石二兩黃丹二兩用水飛過將鉄鏟不住手攪煎成稠膏再下上等片腦一錢研細入藥內攪勻於磁器內盛放名為珊瑚膏

脩煉爐甘石黃丹之法

爐甘石不拘多少砂器盛頓木炭火煉通赤用黃連水蘸七次水飛淘澄爲泥用之

黃丹不拘多少以砂銚炒候紫色用水飛過淘澄爲塵用之

光明撥雲錠子　治遠年近日一切眼疾

爐甘石（一斤煅過用黃連半斤水二碗煎五七沸淬七次止取淨末二兩）

硼砂（一兩）　片腦（一錢）　海螵蛸（二錢）　射香（二分）

珍珠（一錢）　血竭（三錢）　乳香　沒藥（各一錢）

右研極細以後黃連膏子和劑捥成錠子淨水磨化點

劑藥黃連膏子

黃連（半斤）　龍膽草　當歸　芍藥

大黃　黃柏　黃芩　川芎

生地黃　白芷　防風　木賊

薄荷葉　羌活　紅花　菊花（各等分）

右用水七八碗浸藥三日煎成膏子和劑前藥成錠子

開光錠子

爐甘石（煅黃連水淬淨末二兩）　硼砂（五錢）　珍珠

片腦（各三分）　午黃　雄黃（各一錢）

右爲細末熬黃連膏爲錠子磨點

春雪膏

於春天雪冷凍之時取明凈朴硝三四斤為末或不拘多少用黄連防風赤芍藥當歸尾各五錢牙皂三箇各剉片與硝拌和入雪與硝一般多同拌匀為水過一宿濾去黄連等藥却將硝雪水用瓦盆或銅盆盛之於露天凈處受霜露之氣其盆弦上自然結成砂却用烏盆一箇以紙觔墊盆底內用厚皮紙盛砂於盆內紙觔上使砂中水氣盡滲於紙內候砂乾爽以磁器收貯封固如用每硝砂一錢加鵬砂半錢片腦三分研細點眼

○已上諸方點洗之劑

○廣按眼疾所因不過虛實二者而已虛者眼目昏花腎經真水之微也實者眼目腫痛肝經風熱之甚也苟實焉則散其風熱苟虛焉則滋其真陰苟虛實相仍則散風熱滋真陰兼之夫何眼疾之不瘳哉此內治之法也至於久而失調熱壅血凝而為攀睛瘀肉翳膜赤爛之類不假點洗外治之法則何由而全愈乎盖病情有標本治法有內外故也又嘗論之氣有餘便是火而散火在於破氣血不足則陰虛而滋陰在於補血也常便血能配氣水能制火則眼疾胡為

而作也歟

丹溪心法

○耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多當用開痰散風熱　通聖散滾痰丸之類　大病後耳聾者須用四物湯降火陰虛火動耳聾者（亦用）四物湯因鬱而聾者通聖散（内大）黄酒煨再用酒炒三次後入諸藥通用酒炒　耳鳴因酒過者大劑通聖散加枳殼柴胡大黄甘草南星桔梗青皮荊芥不愈用四物湯妙　耳鳴必用龍會丸食後服　氣實入檳榔丸或神芎丸下之　聾病必用龍會丸四物湯養

陰　濕痰者神芎丸梹榔丸　耳濕腫痛凉膈散加酒炒大黃黃芩酒浸防風荊芥羌活服腦多射少温加枯礬吹

耳内閧閧然亦是陰虛

戴云亦有氣閉者盖亦是熱氣閉者耳不鳴也

入方

萆麻子（四十九粒）[illegible]　棗肉（十箇）

右入人乳汁搗成膏石上曝晒乾便丸如指大綿裹塞於耳中

又方

鼠膽汁滴入耳中尤妙

又方

將龜放在漆桌上尿出用綿漬之捻入青葱管中滴入耳中

附諸賢論

王節齋曰耳鳴證或鳴甚如蟬或左或右或時閉塞世人多作腎虛治不効殊不知此是痰火上升鬱於耳中而為鳴鬱甚則壅閉矣遇此疾但審其平昔飲酒厚味上焦素有痰火只作清痰降火治之大抵此症多因先有痰火在上又感惱怒而得怒氣上少陽之火客於耳也若是腎虛而鳴者亦是膀胱相火上升故也其鳴不甚

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

其人必多慾當見勞怯之證

附諸方

犀角飲子（濟生方）治風熱上壅兩耳聾閉内外腫痛膿水流出

犀角鎊　菖蒲　木通　玄參　赤芍藥

赤小豆（炒）　甘菊花（去枝梗各一兩）　甘草（炙半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜五片煎七分温服

清神散　治風氣壅上頭目不清耳常重聽

殭蚕（炒去絲嘴）　乾菊花（各一兩）　荆芥穗　羌活

木通　川芎　香付　防風

石菖蒲　甘草（各三錢）

右爲末每服三錢食後臨卧茶清調下

復聰湯（姚方伯傳）治痰火上攻耳聾耳鳴

半夏（製）　陳皮（去白）　白茯苓（去皮）　甘草（炙）

萹蓄　木通　瞿麥　黄栢（去粗皮炒褐色各一錢）

右用水二茶鍾生姜三片煎至一茶鍾空心臨卧各一服

凉膈散　治風熱上攻耳聾　見温熱

通聖散　治風熱上攻耳聾　見班疹

滚痰丸　治熱痰温痰耳聾　見痰類

神芎散　治溼熱溼痰耳聾　見火類

梹榔丸　治溼熱溼痰耳聾　見病類

龍會丸　治肝火上升耳聾　見脇痛

和劑流氣飲　治氣閉耳聾　見氣滯

內加菖蒲生姜葱白同煎服　凡治聾須開鬱行氣

六味地黄丸　治陰虛火動耳聾　見補損

內加知母黄栢菖蒲遠志

地黄丸　治勞損耳聾

熟地黄　當歸　川芎　辣桂（[illegible]）　兎絲子

川椒（炒）　故紙（炒）　白蒺藜（炒）　胡芦巴（炒）　杜仲（炒）

白芷　石菖蒲（各二錢半）　磁石（火燒醋淬七次研水飛一錢二分半）

右爲末煉蜜丸如梧子大每五十丸葱白溫酒下

磁石羊腎丸　治諸般耳聾補虛開鬱行氣散風去溼

磁石（三兩火煆醋淬七次用葱子一合木通三兩用水同煎一晝夜去葱子木通不用取凈二兩）

川芎　白朮　川椒（去目）　肉棗（去核）

防風　茯苓　北細辛　山藥

遠志（去心）　大川烏（炮）　木香　當歸

鹿茸（酒浸一宿炒）　兎絲子（酒浸炒）　黄芪（各一兩）　肉桂（六錢半）

熟地黄（二兩）　石菖蒲（一兩半）

右爲末用羊腎兩對去皮膜以酒煑爛研細好酒糊丸

如梧子大每五十丸空心温酒下塩湯亦可

○廣按丹溪云耳聾皆屬扵熱而已上二方又用辛熱之藥不無使人疑議殊不知耳聾多屬痰火鬱結非磁石之鎮墜川烏之流通與夫川椒細辛肉桂菖蒲之辛散則老痰鬱火何由而開耳聾何由而愈哉雖然耳聾由此而愈亦爲切劑後當以通聖散和之可也

○巳上諸方内治之劑

一方　治耳聾久不開者

紫磁石（一塊如豆大）　山川甲（燒存性）　爲末一字

右用新綿子裹塞扵患耳内口中含些生鉄覺耳内如風聲即愈

一方　用甘遂末吹入左耳甘草末吹入右耳立効

一方　治耳痛及聾

用巴豆十四粒研爛以鵝脂半兩鎔化和巴豆末為丸如小豆大以綿裹塞耳中

耳鳴方

草烏（燒）　石菖蒲

右等分為末用綿裹塞耳中一日三度

耳鳴暴聾方

川椒　石菖蒲　松脂（各二錢半）　山豆肉（半錢）

右為末溶蠟丸如棗核大塞入耳

耵耳方　治風熱搏之津液結鞕成核塞耳

生猪脂　地龍　釜下墨（等分）

右件細研以葱汁和捏如棗核薄綿　裹入耳令潤即挑出

紅綿散　治聤耳有膿及黄水

海螵蛸　枯礬（各一錢）　射香（一字）　乾胭脂（五分）

右為末用管吹入耳中

一方

用五倍子焙乾一兩全蝎三錢燒存性為細末吹入耳中

一方

用枯白礬一錢胭脂一字射香少許研細以綿杖子先輾去耳中膿水即用別纏杖子送藥入耳中　一方加龍骨亦佳

一方　治耳内膿出或黄汁

石膏（新瓦上煅）　明礬（枯）　黄丹（炒）　真蛤粉

龍骨（各等分）　射香（少許）

右為末綿纏竹篾拭耳換綿蘸藥入耳

一方　治耳作膿者

用甘遂一塊如棗核大以綿褁塞耳中以甘草口中徐徐嚼下

耳爛　用貝母研末乾摻

治百虫入耳

一方用香油灌入耳即出

一方用雞冠血滴入耳即出

一方驢牛乳最良灌入耳即出

治一切虫物入耳

用竹管入耳門　口吮盡力吸出最妙

一方　治凍耳

用橄欖核燒灰清油調敷坐腦亦可

○已上諸方外治之法

○廣按丹溪（云）耳聾皆屬於熱誠哉斯言然有左耳聾者有右耳聾者有左右耳俱聾者不可不分經而治也夫左耳聾者少陽火也龍會丸主之右耳聾者太陽之火也六味地黃丸主之左右耳俱聾者陽明之火也通聖散滚痰丸主之何以言之有所忿怒過度則動少陽膽火從左起故使左耳聾也有所色慾過度則動太陽膀胱相火從右起故使右耳聾也有所

醇酒厚味過度則動陽明胃火從中起故使左右耳俱聾也盖左耳聾者婦人多有之以其多忿怒故也右耳聾者男子多有之以其多色慾故也左右耳俱聾者膏粱之家多有之以其多肥甘故也總三者而論之忿怒致耳聾者爲多丹溪云厥陰少陽火多當用開痰散風熱其此之謂乎

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法

〇酒齄鼻是血熱入肺 治法用四物湯加陳皮（又云栢皮）紅花酒炒黃芩煎入好酒數滴就調炒五靈脂末同服格致論中於上藥有茯苓生姜氣弱者加黃芪

又方

用桐油入黃連末以天吊藤燒灰熱傅之 一云用桐油入天吊藤燒油熟調黃連末拌傅之

又

用山梔末蜜蠟丸彈子大空心嚼一丸白湯下

治鼻中瘜肉　胃中有食積熱痰流注治本當消食積

蝴蝶礬二錢　細辛一錢　白芷半錢

右為末內鼻中

治鼻淵

南星　半夏　蒼朮　白芷

神麯　酒芩　辛夷　荊芥（各等分）

右末水調食後服

附諸賢論

王節齋曰鼻塞不聞香臭或但遇寒月多塞或畧感風寒便塞不時舉發者世俗皆以為肺寒而用解表通利辛温之藥不効殊不知此是肺經素有火邪火鬱甚則喜得熱而惡見寒故遇寒便塞遇感便發也治法清肺降火為主而佐以通氣之劑若如常鼻塞不聞香臭者再審其平素只作肺熱治之清金瀉火消痰或丸藥噙化或末藥輕調緩服久服無不效矣此予所親見而治驗者其平素原無鼻塞舊證一時偶感風寒而致窒塞声重或流清涕者自作風寒治

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

附諸方

菖蒲散（御藥院方）治鼻內窒塞不通不得喘息

菖蒲　皂角（等分）

右為末每用一錢綿裹塞鼻中仰卧片時

增損防風通聖散　治鼻塞不利肺氣不清

鼠粘子　桔梗　桑白皮　紫菀

荊芥穗（三两）　甘草（生二两）

右㕮咀每服八錢水一鍾半姜五片煎八分食後温服

羌活散　治腦有鬱熱遇寒鼻塞（見傷風）

仙术芎散　治腦有鬱熱遇寒鼻塞（見風熱）

川芎石膏湯　治腦有鬱熱遇寒鼻塞（見中風）

○已上数方治鼻塞之劑

倉耳散（三日方）治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛荑仁（半两）　蒼耳子（炒二錢半）　香白芷（一两）　薄荷葉（半錢）

右為末每服二錢葱茶清食後調下

辛荑散（濟生方）治肺虛為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞香臭

川芎　木通（去節）　防風（去芦）　甘草

辛荑仁　細辛（洗去土）　藁本　升麻

香白芷（各等分）

右為末每服三錢茶清調下

防風湯　治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必衄血

防風（二兩半） 黃芩 人參 甘草（炙）

川芎 麥門冬（去心各一兩）

右為末每服二錢沸湯調食後服

○已上数方治鼻淵之剤

鉛紅散 治風熱上攻面鼻生紫赤刺癮疹俗乎肺風

舶上硫黃 白礬（枯各半兩）

右為末黃丹少許染與病人面色同每上半錢津夜塗之臨卧再塗兼服升麻湯下瀉青丸以除病根也

局方升麻湯

熟半夏 茯苓 白芷 當歸（各二錢）

蒼朮 乾葛 桔梗 升麻（各一兩）

熟枳殼 乾姜（各半錢） 大黃（蒸半） 芍藥（七錢半）

陳皮 甘草（各一兩半）

右㕮咀每服五錢生姜燈心水煎食前服

瀉青丸（見中風）

白龍丸 治酒齇鼻并滿面紫赤酒刺

川芎 藁本 細辛 白芷

甘草（等分）

右為末每四兩入煆石膏末一斤水丸逐日用此丸末洗面如澡豆法更罨少時方用湯洗去

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

又方

用黃栢苦參檳榔等分爲末傅以猪脂調尤妙

又方

用青黛槐花杏仁研傅之

又方

用杏仁研乳汁傅之

〇已上數方治酒齄鼻之劑

白黃散（簡易方）治鼻齆瘜肉鼻痔等症

雄黃　白礬　細辛　瓜子（各等分）

右為末搐入鼻中

辛荑膏（御藥院方）治鼻生瘜肉窒塞不通有時疼痛

辛荑葉（二兩）　細辛　木香　木通

白芷　杏仁（湯泡去皮尖研各五錢用）

右將羊髓猪脂二兩和藥於石器內慢火熬成膏取赤黃色放冷入龍腦麝香一錢為丸綿裹塞鼻中數日肉脫即愈

鬱金散　治鼻中生瘜肉

用鬱金猪牙皂角各一兩二味水浸一宿火煮透鬱金為度去皂角不用以鬱金焙乾再用北細辛半兩射香硇砂各一錢同為末煉蜜丸如茶子大每服一丸食後

細嚼茶湯嚥下

輕黃散 治鼻中瘜肉

雌黃（半兩） 射香（少許） 輕粉 杏仁（湯泡去皮尖雙者仁各一錢）

右於乳鉢內先研杏仁如泥餘藥同研細勻磁盒盒定每有患者不問深淺夜卧用筯頭點粳米大絍鼻中隔夜一次半月効

又方

用狗骨燒灰加硇砂少許每用搐鼻中瘜肉自化

又方

以胡荽揉爛塞鼻中一夕自然落出

又方

用白礬燒為末面脂和綿裹塞鼻中數日瘜肉隨藥落

又方

用雄黃一塊如棗塞鼻中過十餘日瘜肉自落

○已上數方治瘜肉之劑

丹溪心法附餘卷第二十二卷　畢

丹溪心法

○口瘡服凉藥不愈者因中焦土虚且不能食相火衝上無制用理中湯人參白术甘草補土之虚乾姜散火之標甚則加附子或噙官桂亦妙　一方生白礬為末貼之極効或噙良久以水漱之再噙　一方治口瘡甚者用西瓜漿水徐徐飲之冬月無此用西瓜皮燒灰傅之　又方黄連好酒煮呷下立愈　又方遠志醋研鵝毛掃患處出涎

入方

丹溪心法附餘卷之二十二

細辛　黃栢（炒等分一云黃連）

右爲末貼之或糝舌上吐涎水如再傳須旋合之若合下既久無效

治滿口白爛

華撥（為末一兩）　厚黃栢一兩

右用栢火炙為末醋煎數沸後調上藥漱涎再用白湯漱口則愈

附諸方

立効散（端効方）治唇緊瘡疼痛

訶子肉　五倍子

右爲末乾貼唇上立効

赴筵散（端効方）治赤白口瘡

黃柏　青黛　密陀僧

右為末乾貼瘡

檳榔散（懸驗方）治口瘡疼痛大有神効

五倍子（三錢）　寒水石（煅半兩）　蒲黃　黃丹（三錢半）

右為末每服少許乾貼瘡上

龍石散（和劑方）治大人小兒上膈壅毒口舌生瘡咽嗌腫塞疼病妨悶每用少許糝貼患處嚥津小兒瘡疹毒氣攻口齒先用五福化毒丹掃後仍再用此藥糝貼立効

硃砂（一錢半研用） 寒水石（煅通赤三錢二分半） 生腦子（二錢半研）

右為末每日三五次用夜卧摻貼妙

清金散（蝎效方） 治大人小兒白口瘡急惡狀似木耳

五倍子（去土四錢） 青黛（四錢）

右為末好油調貼瘡上咽喉中瘡爛用竹管吹入喉中有津吐出

蕪金散（三因方） 治熱毒生瘡於舌

細辛 黃連（各等分）

右為末先以布帛蘸熱水揩淨患處摻藥於上涎出即愈

赴筵散（澹寮方） 治口瘡疼痛

五味子（嫩者一兩） 滑石（半兩研） 黃栢（半兩蜜炒）

右為末每服半錢乾摻瘡上良久便可飲食

治口瘡（張子和方）

白礬（一兩枯至半兩） 黃丹（一兩煅火紅放下再炒紫色為度）

右為末摻於瘡上即愈

一方 治[illegible]蚤

用黃栢一兩去粗皮以五倍子二錢蜜陀僧甘草各少許三味為末水調敷在黃栢上炙三五次藥末盡為度後將黃栢切作片子臨卧時貼於患處天明則愈

二方 治爛斑瘡

一用橄欖燒灰存性為末先用米泔水洗淨後摻上藥

一方　治舌腫

用百草霜為末以好醋調敷立効

柳花散　治口舌生瘡

玄胡索（一兩）　黄栢　黄連（各半兩）　蜜陀僧（三錢）

青黛（二錢）

右為末傳貼口內有津即吐

○已上諸方治標之劑

升麻散（濟生方）治上膈壅毒口舌生瘡咽喉腫痛

甘草（生用伍錢）　升麻　赤芍藥　人參

桔梗　乾葛（各一兩）

右㕮咀每服四錢水一鍾半姜五片煎八分温服

瀉黃飲子（濟生方）治風熱蘊於脾經脣燥折裂口舌生瘡

白芷　升麻　枳殼（去白炒）　黄芩

防風　半夏（湯洗）　石斛（各一兩）　甘草（炙半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分温服

黑參丸　治口舌生瘡久不愈

黑參　天門冬　麥門冬（去心各炒一兩）

右為末煉蜜丸如彈子大每用一丸綿裹噙化嚥津

增損如聖散　治上焦熱壅口舌生瘡

桔梗（二兩）　甘草（炙一兩半）　防風（半兩）　枳殼（製二錢半）　黃芩（一兩）

右爲末每服三錢水煎食後服

○已上諸方治本之劑

○廣按口舌証中治標之劑毛靜而治本之劑稍畧宜於火類風熱類之中選而用之

丹溪心法

○牙痛梧桐淚為末少加射香擦之　牙大痛必用胡椒蓽撥能散其中浮熱間以升麻寒水石佐以辛涼荊芥薄荷細辛之類　又方用清涼藥便便痛不開必須從治蓽撥川芎薄荷荊芥細辛（樟腦）青盐

治牙痛甚者

防風　羌活　青盐（合同）　細辛

蓽撥　川椒

右為末擦噙

又方

南星為末霜梅五箇取其引涎以荆芥薄荷散風熱青鹽入腎入骨擦噙

又方

蒲公英燒灰　香附末　白芷　青塩

右為末擦噙

治陰虛牙出鮮血氣鬱

用四物湯加牛膝香附生甘草側栢

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

蛀牙

蘆薈白膠香塞蛀孔中

陽明熱而牙痛

大黄香附各燒灰存性為末入青塩少許不時擦牙上

固齒

用羊脛骨燒存性二錢當歸白芷猪牙皂角青塩各一錢為末擦牙上

刷牙藥

燒白羊骨灰一兩升麻一兩黄連半錢擦用

附諸賢論

王節齋曰牙床腫痛齒痛動搖或黑爛脫落世人皆作腎虛治殊不知此屬陽明濕熱蓋齒雖屬腎而生於牙床上下床屬陽明大腸與胃猶木生於土也腸胃傷於美酒厚味膏粱甘滑之物以致濕熱上攻則牙床不清而爲腫爲痛或出血或生蟲由是齒不得安而動搖黑爛脫落也治宜瀉陽明之濕熱則牙床清寧而齒自然安固矣

附諸方

血竭散（應驗）牢牙定痛治齒根注後迸髓骨疼痛久而不愈者

血竭　石膽　乳香　五靈脂

蜜陀僧（各等分）

右研令勻每用一字以指蘸貼牙病處候少時荊芥湯漱

立効散（御藥）治牙疼不可忍

百草霜（細研）　滄鹽（研各一錢）　射香（淨研）　乳香（研細各半錢）

右件一處再研勻每用少許口噙溫水嗽牙疼一邊鼻內搐之用無時尤妙

一方

用蒼耳草細辛芫花小麥川椒各等分剉碎水煎時時噙漱吐去藥不可嚥下　又細辛芫花二味擦漱尤妙

青龍散（御藥院方）治陽經風熱齒斷腫痛

香白芷　川芎　盆硝　細辛（各半兩）

青黛（三錢）　薄荷葉（二錢）

右為末以指蘸藥擦牙腫處吐津誤嚥不妨

宣牙膏（御藥院方）治齗牙動搖不牢疼痛不止斷肉出血

射香（一字）　龍骨　定粉（另研各二錢半）

右二味為細末後入射香匀用黃蠟一兩磁盞內鎔開入藥於內攪匀放冷取出熨斗燒鋪紙內藥攤之匀薄每夜剪作紙條兒臨卧於齒患處齒斷間封貼一宿至次日早晨取出藥每夜用之此半月消牙齒腫怒生斷肉治齊蝕去風邪牢牙齒大有神效

梧桐淚散（御藥院方）治牙齒斷腫悶宣露血出

梧桐淚　川芎　細辛　白芷（各半錢）

生地黃（一錢）　青鹽（二分）　寒水石（燒熟二錢）

右件同為細末每用塗貼患處吐涎悞嚥不妨無時日五七次

露蜂房散（御藥院方）治牙齒疼痛經驗神效

露蜂房（炒黃）　細辛（各二錢半）　大戟（七錢半）　防風（一錢半）

右吹咀每五錢水一鍾煎七分去滓熱嗽冷吐無時

消毒散（御藥院方）治齒齗并口唇生瘡腫痛

晚蚕蛾　五倍子　蜜陀僧（各一錢）

右為細末每用少許乾傅瘡上有津吐出

開關散（應驗方）治牙關緊急不開因風熱攻注牙齒

川芎　薄荷　盆硝　白芷

全蝎（各一錢）　殭蚕　天麻（各半錢）　細辛（一錢）

右為末每用少許以指蘸藥滿口擦牙齗齗噙半時用

温水漱吐

太和散（御藥）治牙齒動揺齗肉浮腫虫蚛發痛

梧桐淚　白茯苓　生地黄（各半錢）　川芎

香白芷　升麻（各三分）　華陰細辛（三分）　青塩（一分）

射香（半分）　牙皂（燒存性二分）

右為末青塩射香另研拌勻每用藥少許指蘸藥擦牙

痛處常用去痒牢牙定疼止痛

消風定痛散（應驗）治牙齒疼痛風熱攻注齗肉腫悶

荆芥（四錢）　白芷　防風　細辛　全蝎

升麻　川芎（各二錢）　膽礬（二分）　朴硝　青黛（各八分）

右為末每用一指蘸藥擦於牙上噙半時有津吐出

赴筵散（和劑方）治風牙虫牙攻痒疼痛不可忍者

良姜（去芦） 草烏（去皮） 細辛（去土葉） 荊芥（去梗各等分）

右為末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得吞嚥良久用塩湯灌嗽其痛即止用腐炭末一半根常使擦牙

細辛散（和劑方） 治風蛀牙疼或牙齦宣爛腮頷浮腫皆治

荊芥（一两去梗） 縮砂（半两） 細辛（二两） 川椒（去目炒） 白芷（二两）

鶴虱 牙皂 華撥（各半两） 草烏（一两）

右為末每用少許於痛處頻頻擦之有涎吐出仍用漱塩湯

丁香散（御藥） 治牙齒疼痛

丁香 華撥 蝎稍 大椒（各等分為末） 擦法同前

定痛散（御藥院方） 治牙風疼痛立効

細辛（生半两） 草烏（生一两） 全蝎（半两） 乳香（二錢）

右為末每用少許擦牙痛處引涎吐之須臾以塩湯灌漱即止

雄黃定痛膏（楊氏家藏方） 治牙齒疼痛

盆硝（三錢） 雄黃（一錢別研） 細辛（二錢） 大蒜（二枚） 牙皂（四錠二錢）

右為末同大蒜一處搗為膏丸如梧子每用一丸將綿子裹藥左邊牙痛放在左耳右邊牙疼放在右耳內良久痛止取出藥丸可治數人亦皆治之

一方　治一切牙痛

川升麻　當歸　川鬱金　細辛

蓽撥　白芷　荆芥（各等分）

右爲末用瓦合子貯之緊閉合口勿令泄氣每用少許揩在牙痛處以温荆芥湯灌漱立效

一方　治牙疼

鶴虱　細辛　白芷　甘松（各等分）

右爲末搽牙上或煎湯噙漱立刻

一方　治風牙疼

防風　麻黄　生地黄（各兩）一　芫花

蜂窩（各五錢）　花椒（三錢）　浮麥（一把）

右爲粗末入葱白三根同水煎熱漱不可嚥下

一方　治虫牙疼不可忍者

用漢椒為末以巴豆一粒研成膏飯丸如蛀孔大綿裹安於蛀孔内立効

蓽撥散　治風蛀牙疼

蓽撥（二錢）　蝎梢　良姜（各一錢）　草烏（去皮尖五分）

右為末以指蘸藥擦於患處

一方　取疼牙落不犯手

草烏　蓽撥（各半兩）　川椒　細辛（各一兩）

右為末每用少許擦於患牙處其牙自落

○已上諸方外散治標之劑

獨活散（御藥院方）清頭目發散風熱治陽明經不利和毒攻注牙齒斷肉虛浮宣露根下動搖發痛又治偏頭痛漸漸攻注眼目或發寒痛視物不明其爲藥功效不可具述

川芎　獨活　羌活　防風（各一錢六分半）
細辛（七分）　薄荷　生地黄　荊芥（各一錢）

右粗末作一服水二鍾煎一鍾去滓溫服食後日進三兩服愈

上清防風散（御藥院方）治上焦不利風熱攻衝氣血鬱滞牙齒悶痛斷肉虛腫自鼻塞聾重頭目昏眩並皆治之

防風　細辛（去苗葉）　薄荷葉（各二錢半）　川芎（一錢七分）
獨活（去頭芦）　天麻　荊芥穗　甘草（炙）
白檀　白芷（各一錢二分半）　片腦（一分五釐）

右同爲細末入腦子再研勻細每服二錢淡茶清調勻稍熱漱冷吐不拘時如覺頭昏目痛牙齒腫悶用熱茶清調二錢食後服

甘露飲子（御藥院方）治男子婦人胃中客熱口氣齒齗腫悶宣露心中多煩飢不欲食嗜卧及咽喉中有瘡並皆

治之

黃芩　天門冬　枇杷葉　甘草

枳殼　麥門冬　生乾地黃　山茵陳

石斛　熟地黃（各等分）

右為粗末每服五錢水一大鍾煎至七分去滓溫服食後治齒斷宣露腫悶煎藥熱漱之極驗

敗毒散（御藥院方）治風熱攻注牙齒疼痛久而不愈

細辛（五分）　薄荷葉（一錢半）　地骨皮（五錢）　荊芥穗（三錢半）

右為粗末每服七錢水二鍾煎至一鍾去滓溫漱令吐煎服尤妙

地骨皮散（應驗）治牙齒虛熱氣毒攻衝斷肉腫痛口舌生瘡此藥如神

柴胡（四錢）　地骨皮（三錢）　薄荷（二錢）

右㕮咀作一服水一鍾半煎至一鍾去滓熱漱冷吐煎服愈好

升麻散（御藥院方）治牙齒疼痛生斷肉去熱毒解外風寒

防風（去苗）　當歸　升麻（各二錢）　藁本（去苗土）

甘草（炙）　白芷　細辛　芎藭（各一錢）

木香（半分）

右件搗羅為散於乳鉢中研細塗貼齒斷粗者以水二

鍾藥五錢煎至七沸去滓熱漱冷吐秋冬牙痛用此煎服辯散最妙

地黃散（御藥院方）治風熱攻注陽明牙痛斷腫或血出宣露

生地黃（一錢半）　防風　細辛　薄荷葉　地骨皮

藁本（各一錢）　茵草葉　當歸　荊芥穗（各半錢）

右同爲粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓微熱漱口冷吐之煎服尤妙

玉池散（御藥院方）治牙痛或動搖不牢

地骨皮　白芷　升麻　防風　細辛

川芎　槐花　當歸（去芦頭）　藁本（去上）　甘草（生各一錢）

右為粗末作一服水一鍾半煎至一鍾去滓溫熱漱口冷則吐之煎服尤妙　張龍圖去地骨皮加獨活治牙流膿血變骨糟風者及骨已出者俱效

○已上諸方內消治本之劑（宜於火類風熱類選用）

血竭散（應驗）治牙齦并惡瘡不差如神

寒水石（燒熱四兩細研）　龍骨（一兩）　蒲黃（二兩）　血竭（五錢）

枯白礬（一兩）

右為末每用少許貼在瘡口上紙封貼

槓連散（應驗）治牙齒齦口生瘡立效

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

寒水石（燒熟一兩細研） 蒲黃（五錢） 黃丹（五錢）

右為末每用少許乾貼瘡上噙多時吐出

一方 治走馬牙疳

黃栢 藜芦 石膏 銅青 膽礬

射香（少許） 龍骨（病急多用病輕少用）

右以火焙存性為末每用五分擦於患處

一方 治牙疳

青黛（三錢） 銅綠 晉礬 黃栢 藜芦

枯礬 人言（用紅棗十枚去核各分入內以火煅作灰用） 芒硝（各二錢）

射香（半錢） 輕粉（四十九貼） 黃連（二錢）

右為末後入輕粉射香研勻少許擦患處

一方

五倍子（一兩炒焦） 銅青 明礬（各一兩） 射香（少許）

右研末先以塩醋湯洗患處茸乾摻藥於上

〇已上諸方治疳之劑

固齒茯苓散（應驗） 牢牙固齒固家不生疳疾

龍骨 寒水石（燒熟） 升麻 香白芷

茯苓（各一兩） 細辛 青塩（各三錢） 石膏（四兩）

射香（半錢） 石燕子（六者半對火燒醋淬七次）

右為末每日早晨以指蘸藥擦牙後用温水漱口吐出

白牙散（御藥院方）治牙齒黄黑不瑩淨

零陵香　白芷　青鹽　升麻（各二錢半）

石膏（細末一兩）　細辛（一錢）　射香（半錢另研）　砂鍋（細末一兩）

右除砂鍋膏香三味外五味同為細末加上前三味共八味調匀再研每日早晨以指蘸藥擦牙後用温水漱口吐出

土蒺藜散（御藥院方）治牙齒疼痛齗腫摇動常用擦漱固齒

土蒺藜（去角生用不以多少）

右為麤末每服五錢淡漿水半碗煎至七八沸去滓入鹽末一捻帶熱時時漱之别無所忌然雖藥味不衆蓋單方之藥取效急速兼神仙秘旨云若人服蒺藜一年已後冬不寒夏不熱服之二年老者復少髮白復黑齒落重生服之三年輕身長生今雖不作湯散服餌久而漱之其驗亦同

沉香白牙散（御藥院方）揩齒瑩淨令白及治口臭

沉香　射香（各五分）　細辛　升麻

藁本　藿香葉　甘松　白芷（各一錢二分半）

石膏（一兩）　寒水石（一兩）

右為末每日早晚揩牙

齒藥方（二因）西嶽蓮花峯神傳

猪牙皂角及生姜　西國升麻熟地黄
木律旱連槐角子　細辛荷蔕要相當
青鹽等分同燒毀　研細將来使最良
揩齒牢牙髭鬢黑　誰知世上有仙方

右用新瓦罐盛藥合口以麻縛定鹽泥固濟日乾穿一地穴先放新磚後放藥以罐口向下用炭火燒令青烟出稍存性去火經宿取為末每用擦牙温水漱去（一方旱連作黄連）

一方　固齒烏髭髮

母丁香　沉香（各半兩）　石燕子（一雙火煆醋淬七次）
龍骨（一錢）　海馬（一雙酥炒）　茴香（一兩）　生地黄（三兩）
射香（二錢）　青鹽（半兩）

右為末每用一撮空心擦牙縫噙片時温水漱去

羌活散　應驗漱牙藥去風止痛

薄荷　羌活（二錢）　大黄（一錢）

右用水二鍾煎至一鍾去滓温漱冷吐之嚥亦無妨

○以上諸方固齒之劑

○廣按牙痛之証其人腸胃素有湿熱上出於牙齦之間適被風寒或冷飲所鬱則湿熱不得外達故作痛

也其病情有標本之分所用藥有温凉之異何則牙痛之証寒是標故外擦漱之藥宜辛温以散寒開鬱熱是本故内服餌之藥宜辛凉以散熱清中如此則内外交攻標本兩治其病豈有不愈者乎

丹溪心法附餘卷之十二終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之十三　匏集　巳集

燥門

消渴　六十八

丹溪心法

○消渴養肺降火生血為主　分上中下治　三消皆禁用半夏血虛亦忌用口乾咽痛腸燥大便難者亦不宜用

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

汗多者不可用不已必用姜盐製　消渴若泄瀉先用白朮白芍藥炒為末調服後却服前藥（即諸汁膏）　內傷病退後燥渴不解此有餘熱在肺經可用參芩甘草少許生姜汁調冷服或以茶匙挑姜汁與之虗者可用人參湯　天花粉消渴神藥也　上消者肺也多飲水而少食大小便如常　中消者胃也多飲水而小便赤黃　下消者腎也小便濁淋如膏之狀面黑而瘦

入方

黃連末　天花粉末　人乳汁（又云牛乳）　藕汁　生苄汁

右後二味汁為膏入前三味搜和佐以姜汁和蜜為膏徐徐留舌上以白湯少許送下　能食者加軟石膏瓜蔞根

附諸賢論

劉河間宣明論曰燥乾者金肺之本燥金受熱化而成燥澁也兼火熱致金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝濕熱能耗液故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於風熱火也又加大便乾澁乃大腸受熱化成燥澁經云諸澁枯涸又如癱瘓中風皆因火熱耗損血液玄府閉塞不能浸潤金受火鬱不能發聲（經云肺主声）　肺肢痛緛

炅者風熱溼相致而遂以偏枯語音澁手足不隨也然中寒吐瀉亡液而成燥亦以鮮矣亦有寒溼相欝榮衛不能開發貫注多成偏枯經曰諸澁枯涸乾勁皴揭屬於燥也　又如胃膈癉熱煩滿饑不欲食或癉或消中善食而瘦或燥熱欝甚而成消渴多飲而數小便狂陽心火燥其三焦腸胃燥澁拂欝而水液不能宣行則周身不得潤澤故瘦悴黄黒也而燥熱消渴然雖多飲亦其水液不能浸潤於腸胃之外渴不能止而便注為小便多出俗未明妄為下焦虗冷誤人多矣　又夫周身熱燥欝故変為雀目或內障癰疽瘡瘍上為咳嗽喘下為痔痢或停積而溼熱內甚不能傳化者変為水腫腹脹也世傳消渴病及消瘦弱或小便有脂液者為消腎也此為三消病也　消渴　消中　消腎　經意皆云熱之所致也

附諸方

東垣曰膈消者以白虎加人參湯治之　中消者以調胃承氣湯三黄丸治之　下消以六味地黄丸治之

人參石膏湯（即白虎加人參湯）　治膈消上焦燥渴不欲飲食

人參（半兩）　石膏（一兩二錢）　甘草（四錢）　知母（禾）

東垣加黄芩杏仁

右㕮咀每服一两水二盞粳米一撮煎至一盞去滓通口服無時

清心蓮子飲 治心經蘊熱作渴小便或赤澁或濁

黄芩 麥門冬 地骨皮 車前子 甘草（各三錢）

蓮子 茯苓 黄芪 柴胡 人參（各三錢半）

右㕮咀水煎服

六神湯（三因方）治三消渴疾

枇杷葉 瓜蔞根 乾葛 蓮房 甘草

黄耆（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞（空心）煎服小便不利加茯苓

地黄飲子（簡易方）治消渴咽乾而亦煩燥

人參（去芦） 生乾地黄（洗） 熟乾地黄 黄芪（蜜炙）

天門冬（去心） 麥門冬（去心） 澤瀉 石斛（去根炒）

枇杷葉（去毛炒） 枳殼（去穰麩炒） 甘草（炙各等分）

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分食後溫服

硃砂黄連丸（秘方）治心虚蘊熱或因飲酒過多發為消渴

硃砂（二两別研） 宣連（三两） 生地黄（二两）

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸灯心棗子湯送下

烏梅五味子湯（大成）專治消渴生津液

五味子　巴戟（酒浸去心）　百藥煎　烏梅　甘草（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞空心煎服

補腎地黃丸（秘方）降心火益腎水治消渴除骨蒸壯筋骨明眼目

生地黃（半斤酒浸二日蒸爛研膏與栢丼晒乾）　鼠芩（酒炒一兩）　白茯苓（四兩）

黃栢（一斤剉同地黃晒乾）　當歸（酒洗）　枳殼（去穰）　麥門冬（去心一兩）

熟地黃（酒浸）　天門冬（去心）　揀參　甘菊花（各一兩）　生芩（兩）

右為末滴水丸如梧子大每服七十丸空心鹽酒下

麥門冬飲子（宣明方）治膈消胸滿煩心津液短少消渴

五味子　知母　甘草（炙）　瓜蔞仁　人參

乾葛　生地黃　茯神（各一兩）　麥門冬（二兩去心）

右㕮咀每服一兩水二盞竹葉十四片煎一盞溫服

川黃連丸　治消渴

川黃連（五兩）　天花粉　麥門冬（去心各二錢半）

右為末生地黃汁并牛乳夾和擣丸梧子大服三十丸粳米湯送下

玉泉丸　治煩渴口乾

麥門冬（去心）　人參　茯苓　黃芪（半生蜜炙）半　烏梅（焙）

甘草（各一兩）　瓜蔞根　乾葛（各一兩半）

右為末蜜丸彈子大每一丸溫湯嚼下

甘露湯（經驗方）治煩渴口乾

百藥煎　白乾葛（各三錢）　烏梅　五味子

天花粉（各二錢）　甘草（半錢）

右㕮咀水煎服

又方（經驗方）經驗止渴及除濕後煩渴常服調中和氣

茯苓　人參（各五錢）　乾葛（一兩）　藿香　木香

甘草（各一錢半）

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣通口服加滑石亦可

栝蔞湯（經驗方）治消渴小便多

用栝蔞根薄切炙五兩水五升煮取四升隨意飲

栝蔞丸

用栝蔞根薄切用人乳汁拌蒸竹瀝拌晒為末煉蜜為丸如彈子大噙化或丸如菉豆大每服一百丸米飲下

忍冬丸　治消渴既愈之後須預防發癰疽之患

用忍冬草不以多少根莖花葉皆可用置瓶罐內用無灰好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許碾為細末以所浸酒打麵糊為丸如梧子大每服一百丸不拘時溫酒米飲任下

一方用忍冬草水浸煎服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

黄耆六一湯　治諸虛不足胸中煩悸常消渴或先渴而欲發癰疽或病癰疽而作渴並宜服之　見盗汗

大黄甘草飲子　宣明方　治男子婦人一切消渴不能止者

甘草（大麄者四兩長四指打碎）　大黄（一兩半錦紋者）　大豆（五升煑三沸另淘苦水再煑）

右三味用井水一桶將前藥同煑三五時如稠糊水少更添豆軟於盆中放冷令病人食豆渴飲湯汁無時候食盡如渴燥止罷不止再煑前藥不三次病即去矣

○已上諸方治上消之劑

調胃承氣湯

三黄丸　俱見火類

順氣散　拔萃方　消中者熱在胃而能飲食小便黄赤以此下之不可多利微微利至不欲食而愈

厚朴（姜製一兩）　大黄（四錢）　枳實（一錢）

右㕮咀水二盞煎至一盞去滓通口服無時

人參白术湯　宣明方　治胃膈痺熱煩滿飢不欲食痺成為消中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩中風偏枯酒過積毒一切腸胃燥澁倦悶壅塞瘡疥　痺并傷寒雜病產後煩渴氣液不得宣通

人參　白术　當歸　芍藥　大黄（[illegible]）

山梔子　荊芥穗　薄荷　桔梗　知母
澤瀉（各半兩）　茯苓（去皮）　連翹　瓜蔞根　乾葛（各一兩）
甘草（三兩）　藿香葉　青木香　官桂（各一分即二錢半是也）
石膏（四兩）　寒水石（二兩）　滑石（半斤）

右為細末每服抄五錢水一茶盞入盆硝半兩生姜三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至十餘錢得臟腑流利取効如常服以意加減兼服消痞丸散以散腸胃結滯濕熱內甚自利者去大黃芒硝

消痞丸（宣明方）治積濕熱毒甚者身体面目黃心脇脹滿嘔吐不能飲食瘈瘲難以運動咽嗌不利肢躰焦枯眩悸膈熱坐臥不寧心火有餘而妄行上為咳血衄血下為大小便血腸風痔瘺三焦壅滯悶痺熱中消渴傳化失常小兒疳積熱

黃連　乾葛（各一兩）　黃芩　大黃　黃柏
梔子　薄荷　藿香　厚朴　茴香（炒各半兩）
木香　辣桂（各二錢半）　青黛（一兩研）　牽牛（二兩）

右為細末滴水丸如小豆大每服十丸新水下溫水亦得小兒丸如麻子大病本濕熱內甚本自利者去大黃牽牛只發熱諸物

黃連豬肚丸（三因方）治強中消渴

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

黃連（去鬚） 粱米 瓜蔞根 茯神（各四兩）

知母 麥門冬（去心各二兩）

右為末用大猪肚一箇洗凈入藥末於內以麻線縫合口置甑中炊極爛取出藥別研以猪肚為膏再入蜜搜和前藥杵數千下丸如梧桐子大每服五十丸人參湯下 一方加人參熟苄濟生除知母粱米用小麥

加味錢氏白朮湯（直指方）治消中消穀善飢

人參 白朮 白茯苓 甘草（炙） 藿香葉（一兩）

枳殼（去穰麩炒半兩） 乾葛（二兩） 木香 北五味

柴胡（各半兩）

右㕮咀每服三錢水一盞煎服

五豆湯（端竹） 能觧酒毒止消渴能發小兒豆疹不出并觧發渴之證後成瘡瘍者

黑豆 黃豆 菉豆 青豆 赤小豆（各一升）

乾葛（一斤） 甘草（一斤） 貫衆（半斤）

右前藥俱不剉用水五斗五升臈八日用大鍋熬至熟濾出豆汁令以磁罋盛之箬葉紙重封春夏月開用酒後渴隨意飲大人渴後或成瘡瘍小兒豆瘡不出皆可飲最妙

灸法（秘方） 近世醫者不審病証從何而得不明虛實每以

補藥投之遂致不救可惜也殊不知癉者乃積熱也復以熱藥與之是乃失之若服補藥即寸口脉乳其人下熱即不可治也甚者吐血而死有灸法甚妙令病人竪其兩手剪去中指甲於兩手中指頭上各灸一炷如大豆令兩人發火仍令兩人吹去各指尖上艾焙其火必爆再用艾焙兩箇兩脚二處太衝脉上亦依前法兩人發火吹之亦爆高五六寸四箇艾焙有四箇小孔處此其驗也其人立飲食黃色遂退更先灸百會穴一焙如前法吹之萬不失一也

〇已上諸方治消中之劑

六味地黃丸（見補損）

八味丸加減　治心腎不交消渴引飲

本方減附子加五味子　方見補損

玄兎丹（和劑方）治腎水枯竭津液不生消渴諸証

兎絲子（酒浸研焙乾末十兩）　白茯苓（二兩去皮淨）　乾蓮肉（酒浸三兩）

五味子（酒浸焙半兩）

右為末別研山藥末六兩將浸藥餘酒更添煑糊搜和擣數千杵丸如梧桐子大每服五十丸米湯空心下

夢遺白濁服之亦好

鹿茸丸（三因方）治失志傷腎腎虛消渴小便無度

鹿茸（去毛炙七錢半）　麥門冬（去心二兩）　熟地黃　黃耆

五味子　雞膍胵（麩炒）　肉蓯蓉（酒浸）　山茱萸

破故紙（炒）　牛膝（酒浸）　人參（各七錢半）　白茯苓

地骨皮　玄參（各五錢）

右為末蜜丸如梧桐子大每服三十丸米湯下

加減腎氣丸（濟生方）治腎氣不足心火上炎口舌乾燥多渴引飲肌躰損瘦並宜服之

山茱萸肉　白茯苓（去皮）　牡丹皮（去心）　熟地黃（酒蒸）

五味子　澤瀉　鹿角（鎊）　山藥（炒各一兩）

官桂（不見火）　沉香（不見火各半兩）

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七十丸鹽湯米飲任下　弱甚者加附子半兩兼進黃芪湯

人參散（宣明方）治消腎善飲而食後數小便弱者

人參　砂仁（各三錢）　白朮　澤瀉　瓜蔞

桔梗　梔子　連翹（各半兩）　葛根　黃芩

大黃　薄荷　茯苓（各一兩）　甘草（一兩半）　石膏（一兩半）

滑石　寒水石（各三兩）

右為末每服五錢水一盞煎至七分入蜜少許再煎三二沸去滓食前服食後服消痞丸

○已上諸方治下消之劑

燥結　六十九

巳集

丹溪心法

○燥結血少不能潤澤理宜養陰

入方　治大腸虛秘而熱

白芍（一兩半）　陳皮　生苄　歸身（一兩）　條芩

甘草（二錢）

右為末粥丸白湯下七八十丸

附脈理

脈訣舉要曰熱厥脈伏時或而數便秘必難治不可錯

附諸方

潤麻丸（丹溪秘方）能潤血燥大便不通

麻子仁　當歸　桃仁　生苄　枳殼（各一兩）

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心白湯下

導滯通幽湯　治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸身　升麻　桃仁泥（各一錢）　生苄　熟苄（各半錢）

甘草（炙）　紅花（各三錢）

右作一服水煎食前調梹榔末五錢或加麻仁泥一錢

加大黃名當歸潤燥湯

潤燥湯

升麻　生苄（各二錢）　歸稍　生甘草　大黃（煨）

熟苄　桃仁泥　麻仁（各三錢）　紅花（半錢）

右除桃仁麻仁另研作一服水煎次下桃仁麻仁煎空心熱服

活血潤燥丸　治大便風秘血秘常常燥結

當歸稍（一錢）　防風（三錢）　大黃（紙裹煨）　羌活（各一兩）　桃仁（二兩研如泥）

麻仁（二兩五錢研）　皂角（燒存性一兩三錢其性得濕則滑滑則燥溪自開）

右除二仁另研外餘為末後和勻蜜丸梧子大空心服五十丸白湯送下三兩服後以蘇子麻仁粥每日早晚食之大便不致結燥以磁器盛之紙封毋令見風

脾約麻仁丸（和劑方）治腸胃熱燥大便秘結

厚朴（去皮薑製）　芍藥　枳實（麩炒各八分）　杏仁（去皮尖炒）　麻仁（另研各五錢）

大黃（蒸焙一兩六錢）

右為末蜜和丸如梧子大每二十丸臨臥溫水下大便通利即止

滋腸五仁丸（楊氏方）治津液枯竭大腸秘澁傳道艱難

栢子仁（半兩）　桃仁　杏仁（炒去皮尖各一兩）　陳皮（四兩另為末）

松子仁（一錢二分）　郁李仁（炒二錢）

右將五仁別研為膏入陳皮末研勻煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心米飲下

潤腸湯（楊氏方）治大便秘澁連日不通

麻子仁（一盞半細研用水浸濾去皮取濃汁） 芝麻（半盞微炒研用水浸取濃汁）

桃仁（湯泡去皮尖炒黃研去泥） 荊芥穗（搗末各一兩）

右前藥入鹽少許同煎可以代茶飲之以利為度

橘杏丸（濟生方）治老人氣秘大腑不便

橘紅（取末） 杏仁（湯浸去皮尖各等分）

右為末煉蜜丸如梧子大每服七丸空心米飲下此治脉浮晝便難者如脉沉夜便難用桃仁橘紅

紫蘇麻仁粥 老人服之能順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁

右二味不拘多少研爛水濾取汁煮粥食之

潤腸丸（濟生方）治發汗過多耗散津液大腑秘結

肉蓯蓉（酒浸焙二兩） 沉香（另研一兩）

右為末用麻子仁汁打糊為圓如梧桐子大每服七十丸空心米飲下

搜風順氣丸 治虛老之人大便結燥方見中風

潤腸丸（直指方）治大便澁閉

陳皮（半兩） 阿膠（炒） 防風（各二錢半） 杏仁（炒去皮尖） 枳殼（去穰炒）

麻仁（各半兩）

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸蘇子湯荊芥湯

任下

大黃飲子（聖惠方）治身熱大便不通

川大黃（濕紙裹煨） 杏仁（去皮尖炒） 升麻（一） 梔子仁

枳殼（去穰麩炒各五錢） 生地黃（一兩） 人參 黃芩

甘草（二錢半）

右㕮咀每服一兩生薑五片豉二十一粒烏梅一箇水

二盞煎至一盞去滓食前溫服一方用枳實

通神散（良方）治婦人大便不通

大黃 芒硝 桃花 郁李仁（湯泡去皮微炒各一兩）

木香（半兩）

右為末每服二錢米飲調下空心加四物湯二錢尤妙

火麻仁丸（良方）治婦人腸胃風結大便常秘

火麻子（去殼研膏） 大黃（炒二錢） 檳榔 木香

枳殼（各一兩）

右為末與麻仁研勻煉蜜為丸如梧子大每服三十丸

食前白湯下

已上諸方治血液枯涸燥結之劑

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯　已上三方治風寒傳裏熱厥極深大便燥結以此下之（方見大類）

三和散（和劑方）治七情之氣結于五臟不能流通以致脾胃不和心腹痞悶大便秘澁

羌活（去芦）紫蘇（去梗）宣木瓜（薄切焙）沉香（各一兩）木香　白术　檳榔（各七錢半）芎藭（三兩）甘草（炙）陳皮（去白）大腹皮（一錢）

右㕮咀每服五錢水一盞煎六分不拘時服

枳殼丸（濟生方）治腸胃風氣壅盛大便秘實

枳殼（去穰炒）川大黃　羌活（去芦）木香（不見火）橘紅　桑白皮（蜜炒）香白芷（各一兩）皂角（一挺去黑皮炒）

右為末煉蜜丸如梧子大服七十丸空心米飲姜湯任下

檳榔丸（濟生方）治大腸溫熱怫鬱不通心腹脹滿大便秘結

黃芩（一兩）大黃（蒸）檳榔　白芷一　枳殼（麸炒）羌活（去芦）牽牛（炒各一兩）人参（五錢）麻仁（炒去殼另研）杏仁（去皮尖各兩）

右為末煉蜜丸如梧子大每服四十丸空心熱水下

木香三稜散（瑞竹堂方）治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑牽牛（半生半炒多用）　大腹子（多用）　檳榔　木香

雷丸　錫灰（醋炒）　三稜（煨）　莪朮（煨）　大黃（已上各二兩）

右為細末每服二錢空心蜜水調下或砂糖水亦可須先將燒肉一片口中嚼之吐出口中肉汁後服藥

牛黃丸（拔碎方）　治上焦熱臟腑秘結

大黃（一兩）　白牽牛（頭末半兩）

右為細末有厥冷用酒調下三錢無厥冷而手足煩者蜜調下

皂角丸（濟生方）　治大腸有風大便秘結年高人宜服

皂角（炙去子）　枳殼（去穰麩炒各等分）

右為細末蜜丸梧子大每服七十丸空心米飲下

南木香丸（聖惠方）　治大便秘結

南木香（不見火）　檳榔　麻仁　枳殼

右等分先將枳殼去穰每箇切作四片用不蛀皂角三寸生薑五片巴豆三粒略搥碎不去殼用水一盞將枳殼同煮和滾濾去生薑巴豆皂角不用只將枳殼剉細焙乾為末入前木香檳榔麻仁同為末煉蜜丸如梧子大蜜湯下不拘時

搜風潤腸丸（聖惠方）　治三焦不和胸中痞悶氣不升降飲食遲化腸胃煩澁大便秘結

沉香　梹榔　木香　青皮　蘿蔔子（炒）

槐角（炒）　陳皮（去穰）　枳殼（去穰炒）　三稜（煨）　枳實（麩炒去穰）

木通（各五錢）　郁李仁（去皮一兩）

右為末煉蜜丸如梧子大每服五六十丸木瓜湯下常服溫潤腸胃導化風氣　一方有大黃無木通米飲下

消毒麻仁丸和劑方

杏仁（二兩去皮）　大黃（生五兩）　山梔子（十兩）

右為末蜜丸梧子大每服五十丸食前白湯送下

○已上諸方治溫熱怫鬱燥結之劑

治大便不通

用皂角燒烟馬桶內坐薰即通

治大小便不通（秘方）

用火燒塩於臍內切蒜一片蓋塩上艾灸二三炷即通

治大小便不通

用明礬末一匙安臍守冷水滴之冷透腹內自然通如是曾灸無臍孔即於灸盤上用紙撚作圈子籠灸盤着礬末任內仍作前法用水滴之

治大小便不通（直指方）

用連根葱一二莖帶土生姜一塊淡豆豉二十一粒塩二匙同研爛揑作餅子烘熱掩臍中以帛札定良久氣

透自通不然再換一餅

提盆散（援碎方）即霹靂箭

用草烏一味為末用葱頭帶涎醮烏頭末納肛門中

蜜導法

凡諸秘結不通或兼他証又或老弱虛極不可用藥者

用蜜熬入皂角末少許乘熱撚作兊候冷以導之冷秘

生薑兊佳

猪膽汁導法

用大猪膽一枚瀉汁和醋少許灌穀道中一飯頃當大便

○已上諸方外導之法

○愚按燥結之症有虛實二者之分何則或因風寒邪從外入或因七氣火自內起此是濕熱怫鬱燥結有時乃為實也實則宜蕩滌腸胃開結軟堅如大黃芒硝枳實厚朴承氣湯之類是也或因病久飲食少進或因年高將息失宜此是血液枯涸燥結無時乃為虛也虛則宜滋養陰血潤燥散熱如當歸地黃桃仁條芩潤燥湯之類是也凡燥結之症苟不審虛實而輕用藥死生如反掌之易也邪

丹溪心法附餘卷之十三　終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之十四　　巳集

鬱門

六鬱　七十

丹溪心法

○氣血沖和萬病不生一有怫鬱諸病生焉故人身諸病多生於鬱　蒼朮撫芎總解諸鬱隨証加入諸藥　凡鬱

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

皆在中焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假如食在氣上提其氣則食自降矣餘皆倣此

戴云鬱者結聚而不得發越也當升者不得升當降者不得降當變化者不得變化也此為傳化失常六鬱之病見矣氣鬱者胸脇痛脉沉澁濕鬱者周身走痛或關節痛遇陰寒則發脉沉細痰鬱者動則喘寸口脉沉滑熱鬱者瞀悶小便赤脉沉數血鬱者四肢無力能食便紅脉沉食鬱者噯酸腹飽不能食人迎脉平和氣口脉緊盛者是也

入方

氣鬱　香附（童便浸）　蒼朮（米泔浸）　撫芎

濕鬱　白芷　蒼朮　川芎　茯苓

痰鬱　海石　香附　南星（姜製）
瓜蔞（一本無南星瓜蔞有蒼朮川芎梔子）

熱鬱　山梔（炒）　青黛　香附　蒼朮
撫芎

血鬱　桃仁（去皮）　紅花　青黛　川芎（撫芎亦可）
香附

食鬱　蒼朮　香附　山查　神麴（炒）
針砂（醋炒七次研極細）

春加芎　夏加苦參　秋冬加吳茱萸

越鞠丸　解諸鬱　又名芎朮丸

蒼朮　香附　撫芎　神麯　梔子（炒各等分）

右為末水丸如菉豆大

附論

王節齋曰丹溪先生治病不出乎氣血痰三者故用藥之要有三氣用四君子湯血用四物湯痰用二陳湯又云久病屬鬱立治鬱之方曰越鞠丸盖氣血痰三病多有兼鬱者或鬱久而生病或病久而生鬱或悞藥雜亂而成鬱故予每用此三方治病時以鬱法參之氣病兼鬱則用四君子加開鬱藥血痰病皆然故四法者治病用藥之大要也

巳集

氣滞 七十一　附氣刺痛　諸氣

丹溪心法

○破滞氣須用枳殼高者用之夫枳殼者損胸中至高之氣二三服而已又云滞氣用青皮勿多用多則瀉真氣

如實熱在內相火上衝者如氣滞宜知母黄栢黄連黄芩

如陰虗氣滞者宜四物加玄參黄栢以補血

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

○氣刺痛用枳殻看何部分以引經藥導使之行則可若禀受素壯而氣刺痛宜枳殻烏藥　若肥白氣虛之人氣刺痛者宜參朮加木香　若因事氣鬱不舒暢而氣刺痛當用木香

○諸氣新增

附諸賢論

張子和云夫天地之氣常則安變則病而况人禀天地之氣五運迭侵於外七情交戰於中是以聖人嗇氣如持至寶庸人投物而反傷太和此軒岐所以論諸痛皆因於氣諸病皆生於氣遂有九氣不同之說氣本一也因所觸而為九怒喜悲恐寒炅驚思勞也其言曰怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣逆上矣王太僕曰怒則陽氣逆上而肝木乘脾故甚則嘔血及飧泄也喜則氣和志達榮衛通利故氣緩矣悲則心系急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故氣消矣恐則精却却則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣不行矣太僕云恐則傷精却上而不下流下焦亦廻還而不散故聚而脹也然上焦固禁下焦氣還故氣不行也寒則腠理閉氣不行故氣收矣太僕云身凉則衛氣沉故皮膚文理及滲泄之處皆閉密而氣不流行衛氣收歛于中而不散也

炅則腠理開榮衛通汗大出故氣泄矣太僕云人在陽則舒在陰則慘故熱則膚腠開發榮衛大通津液而汗大出也驚則心無所依神無所歸慮無所定故氣亂矣勞則喘息汗出内外皆越故氣耗矣太僕云疲勞役則氣奔遽故喘息氣奔速則陽外發故汗出内外皆踰越於常紀故氣耗損也思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣太僕云繫心不散故氣亦停留而結也此素問之論九氣其變甚詳其理甚明矣

原病式曰氣為陽而主輕微諸所動亂勞傷乃為陽火之化神狂氣亂而為病熱者多矣子和云河間治五志獨得言外之意凡見喜怒悲思恐之證皆以平心火為主至於勞者傷於動動便屬陽驚者駭於心心便屬火二者亦以平心火為主今之醫者不達此旨遂有寒凉之謗

劉宗厚曰捍衛冲和不息之謂氣擾乱妄動變常之謂火當其和平之時外護其表復行於裏周流一身循環無端出入升降繼而有常源出中焦總統於肺氣曷嘗病於人也及其七情之交攻五志之間發乖戾失常清者

行者抑遏而反止表失衛護而不和裏失

健悍而少降營運漸遠肺失主持妄動不已五志厥陽

一之火起焉上燔於肺氣乃病焉何者氣本屬陽反勝則為火矣河間有曰五志過極皆為火也何後世不本此議而一槩類聚香辛燥熱之劑氣作寒治所據何理且言指迷七氣湯製作者其八皆用青皮陳皮三稜蓬术益智官桂甘草遂為平和可以常用通治七情所傷混同一意未喻其藥以治其氣已下諸方尤有甚焉者茲不復叙況所起之情各各不同且夫經言九氣之變未嘗略而不詳如怒則氣上等證其言治法高者抑之下者舉之寒者熱之熱者寒之驚者平之勞者温之結者散之喜者以恐勝之悲者以喜勝之九氣之治各有分别何嘗混作寒論而類以香熱之藥通言而治諸氣豈理之謂歟若香辛燥熱之劑但可劫滯氣衝快於一時以其氣久抑鬱借此暫行開發之意藥中不佐制伏所起之氣服甚則增熾鬱火蒸熏氣液而自成積積滋長而成痰痰飲下膈氣乃氤氳清虚之象若霧露之著物雖滯易散內挾痰積開而復結服之日久安有氣實而不動氣動而不散者乎此皆人所受悮之由習俗已久相沿而化卒莫能救升發太過香辛散氣燥熱傷氣真氣耗散濁氣上騰猶由腎虚不能攝氣歸原遂與蘇子降氣湯四磨湯下黑錫丹養氣丹鎮墜上升之氣且硫黄

黑錫佐以香熱又無補養之性藉此果能生氣而補腎乎請孰詳之夫温痰甚者亦或當之初服未顯增變由喜墜而愈進形質弱者何以收救不悟肺受火邪子氣亦弱降令不行火無以制相翕而動本勢空虛命絶如縷積而至深丹毒濟火一旦火氣狂散喘息奔急而死吁以有形丹石丸藥重墜無形之氣其氣將何抵受隨而降之乎譬以石投水水故未嘗沉也豈不死歟丹溪有曰上升之氣自肝而出中挾相火其熱為甚自覺其冷非真冷也火極似水積熱之甚陽亢陰微故有此證認假作真似是之禍可勝言哉內經雖云百病皆生於氣以正氣受邪之不一也今七情傷氣鬱結不舒痞悶壅塞發為諸病當詳所起之因滯於何經上下部分臟氣之不同隨經用藥有寒熱温凉之同異若枳殼利肺氣多服損胷中至高之氣青皮瀉肝氣多服損真氣與夫木香之行中下焦氣香附之快滯氣陳皮之泄逆氣紫蘇之散表氣厚朴之瀉衛氣檳榔之瀉至高之氣藿香之馨香上行胃氣沉香之升降真氣腦麝之散真氣若此之類氣實所宜其中有行散者有損泄者其過劑乎用之能却氣之標而不能制氣之本豈可又佐以燥熱之藥以火濟火混同謂治諸氣使之常服多服可乎

一氣之與火一理而已動靜之變反化為二氣作火論治與病情相得丹溪發揮論之冷生氣者出於高陽生之謬言也自非身受寒氣口食寒物而遽論寒者吾恐十之無一二也

附脈理

脈訣舉要曰下手脈沉便知是氣沉極則伏濇弱難治其或沉滑氣兼痰飲

又曰沉弦細動皆氣痛證心痛在寸腹痛在關下部在尺脈象顯然

附諸方

蘇合香丸和劑方專服順氣化痰并治傳尸骨蒸諸項勞瘵卒暴心痛鬼魅瘴瘧赤白下痢小兒驚癇等證

沉香　射香（研）　訶子（煨用皮）　丁香　青木香

安息香（別為末用無灰酒一升熬膏）　香附（炒去毛）　蓽撥　白朮

白檀香（各二錢）　薰陸香（別研）　蘇合香油（入安息香膏內）　龍腦（研各一錢）

硃砂（研飛）　烏犀角（各二錢）

右為末入研藥極勻用安息膏并煉蜜和劑丸如櫻桃大空心用溫水化下四丸酒服亦可

三和散和劑方治五臟不調風氣壅滯面目虛浮腸胃燥澁見燥結類

流氣飲子　治男子婦人五臟不和三焦氣壅心胸痞咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食及上氣喘急咳嗽痰盛面目浮四肢腫大便秘澁小便不通及治憂思太過陰陽之氣鬱結不散壅滯成痰又治脚氣腫痛喘急腹脹大便不通及氣攻肩背脇肋走注疼痛

紫蘇葉　青皮（去白）　當歸（洗焙）　芍藥　烏藥
茯苓（去皮）　桔梗　半夏（湯洗）　川芎　黃芪
枳實（麩炒）　防風（各五錢）　甘草（炙）　陳皮（去白各七錢半）　木香（二錢半）
連皮大腹子（一兩薑製一宿焙）

右㕮咀每服半兩水二盞薑三片棗一枚煎至一盞去滓不拘時溫服　孩粹方有枳殼檳榔各半兩

分氣紫蘇飲　治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛氣促喘急心下脹悶飲食不思嘔逆不止（見喘類）

蘇子降氣湯　治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛（見痰類）

秘傳降氣湯（和劑方）　治上盛下虛氣不升降上盛則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽乾喉燥下虛則腰脚無力小便頻數或大便秘結

骨碎補（去毛炒）　訶子（炮去核）　草果仁（去皮煨）
半夏曲　桔梗（各半兩）　桑白皮（炒二兩）　地骨皮（炒黃）

枳殼（去瓤炒）　五加皮（酒浸半斤炒黄）　陳皮（去白）　柴胡（去蘆）

甘草（各两）

右爲麄散和匀再就蒸一伏許晒乾每服二钱紫蘇三葉姜三片水一盞同煎六分食後温服又能調順榮衛通利三焦如痰嗽加半夏曲心肺虛滿加人參茯苓上膈熱加黄芩下虛加熟附子婦人氣血虛加當歸

沉香降氣湯（和劑方）治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞喘促短氣又治脾胃留飲噫醋吐酸脇下支結常覺妨悶

砂仁（四两八钱）　甘草（炙十二两）　香附（去毛四十两）　沉香（一两八钱半）

右爲末每服二钱入塩少許沸湯點服

沉香升氣湯（御藥院方）治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞見脇肩

紫沉通氣湯（御藥院方）治三焦氣澁不能宣通腹脇脹大便秘

紫蘇葉　枳殼（麸炒）　陳皮（去白）　赤茯苓（去皮）　甘草（炙）

檳榔（各一两）　沉香　木香　麥門冬（去心）　五味子

桑白皮　黄芪　乾生姜　薄荷葉　荆芥穗

枳實（各五钱）

右㕮咀每服半两水一盞半煎八分空心温服

香橘湯（聖惠方）治一切氣不快久病服藥不下者

香附子（大者去鬚） 陳皮（去白） 枳實（生） 白术
甘草（炙各三两）

右為末每服二錢盐湯調或姜棗煎尤妙如傷風用葱白姜棗煎

分心氣飲和劑方 治男子婦人一切氣不和多因憂愁思慮忿怒傷神或臨食憂慼或事不隨意使抑欝之氣留滞不散停於胸膈之間不能流暢致心胸痞悶脇肋虛張噎塞不通噫氣吞酸嘔噦惡心頭目昏眩四肢倦怠面色痿黄口苦舌乾飲食减少日漸羸瘦或大腸虛秘或因病之後胸中虛痞不思飲食皆可服之

木通（去節） 赤芍藥 赤茯苓 官桂 半夏（湯洗七次）
桑白皮 大腹皮 陳皮（去白） 青皮（去穰） 甘草（炙）
羌活（各一两） 紫蘇（四两）

右㕮咀每服一两生姜三片棗二枚灯心十五莖水二盞煎至一盞去渣通口服之

分心氣飲（秋方） 治症同前

木香（半錢） 丁皮（一錢） 人參（半錢） 香附子（一錢半） 白术（半錢）
大腹子（半錢） 藿香（一錢半） 大腹皮（半錢） 桑白皮（半錢） 草菓（半錢）
桔梗（半錢） 麥門冬（半錢） 厚朴（半錢） 陳皮（一錢） 紫蘇（一錢半）
甘草（一錢） 加枳實（一錢半） 半夏（一錢）

右用水二盞生姜三葉棗子一箇灯心十莖煎至一盞

溫服不拘時

大藿香散（濟生方）治七情傷感氣欝于中變成嘔吐或作寒熱眩暈痞滿不進飲食

木香（一两不見火）　藿香葉　半夏麯　白术（各一两）　白茯苓（去皮）

桔梗（去芦炒）　人參　枇杷葉（拭去毛）　官桂（不見火）　甘草（炙各五錢）

右㕮咀每服三錢水二盞生姜五片棗子一枚煎至一盞溫服

紫蘇子湯（濟生方）治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促胸滿腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊而滿

紫蘇子（一两）　大腹皮　草菓仁　半夏（湯洗七次）　厚朴（去皮姜制）

木香（不見火）　橘紅　木通　白术　枳實（炒）

人參　甘草（炙各半两）

右㕮咀每服四錢水二盞生姜五片棗二枚煎至一盞溫服

橘皮一物湯（直指方）治諸氣攻刺及感風寒暑濕初證通用及酒食所傷中脘痞塞妨悶嘔吐吞酸

橘皮（洗淨用新汲水煎服）

木香流氣飲（和劑方）調順榮衛流通血脉快利三焦安和五藏治諸氣痞滯不通胸膈膨脹口苦咽乾嘔吐少食

有背腹脇走注刺痛及喘急痰嗽面目虛浮四肢腫滿大便秘結水道赤澁又治憂思太過怔忪鬱積脚氣風濕聚結腫痛喘滿脹急

半夏（一分半）　厚朴（一錢二分）　陳皮（二錢四分）　青皮　甘草

香附子　紫蘇（各一錢二分）　人參　赤茯苓（二

木瓜　白朮　麥門冬　大黃（各一錢半）　白芷　一

枳殼（各三分）　草菓　官桂　蓬朮　大腹皮

丁皮　檳榔　木香　沉香（各四分半）　木通（六分）

右用水二盞生姜三片棗子二箇煎至一盞熱服不拘時候

蟠葱散（和劑方）治男子婦人脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇膀胱小腸疝氣及婦人血氣刺痛

延胡索　肉桂　乾姜（炮各二兩）　甘草（炙）　縮砂（去皮）

蒼朮（米泔水浸一宿切焙各半兩）　丁皮　檳榔（各四兩）　蓬朮

三棱（煨）　茯苓　青皮（去白各大兩）

右爲末每服二錢水一盞葱白一莖煎七分空心熱服

撞氣阿魏丸（和劑方）治五種噎疾九種心痛痃癖氣塊冷氣攻刺腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫疝氣婦人血氣

茴香（炒）　青皮（去白）　甘草（炒）　陳皮（去白）　蓬莪朮

川芎（各一兩）　生姜（四兩切片盐半兩淹一宿）　胡椒　白芷

（香）肉桂（去皮）宿砂　小茴香（炒各半两）阿魏（酒浸一宿同麪為糊各一錢半）

右為末阿魏和麪糊丸如鷄頭大每藥一斤用朱砂七錢為衣每服三五粒丈夫氣痛炒姜塩湯下婦人血氣痛醋湯下

神保丸（和劑方）治諸積氣為痛宣通臟腑

乾蝎（十箇全者）木香　胡椒（各二錢半）巴豆（十箇去皮心膜別研取霜用）

右為末入巴豆霜令匀湯化蒸餅丸如麻子大朱砂為丸每服五七丸（心膈痛柿蒂灯心湯下　腹痛柿蒂煨姜湯下）血痛炒姜醋湯下肺氣甚者以白礬蛤粉各三錢黄丹一錢同研煎桑白皮糯米飲下　氣小喘只用桑白皮糯米飲下　脇下痛炒茴香酒下　大便不通蜜湯調檳榔末一錢下　氣噎木香湯下　宿食不消茶酒漿任下

○廣按已上三方消積之藥也蓋五志之火動素常無積則流注四體而病輕有積則阻滯一處而痛重故此三方乃消積之藥也前諸方乃調氣之藥學者須審輕重而用之可也

○已上諸方辛温消散之劑

三因七氣湯　治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所為也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之

半夏（五兩）　茯苓（四兩）　厚朴（三兩）　紫蘇（二兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半生姜七片棗子一枚煎至八分去柤熱服　若因思慮過度小便白濁此藥下青州白丸子最妙　婦人惡阻尤宜服之但半夏用姜汁製過　一方治七情所傷中脘不快氣不升降腹脇脹滿用香附子炒半斤橘紅六兩甘草一兩尤快或者謂其耗氣則不然有是病服是藥也

桔梗枳殼湯（直指方）治諸氣痞結滿悶

枳殼　桔梗略（各二兩）　甘草（五錢）

右㕮咀每服四錢水二盞生姜五片煎至一盞溫服

烏附湯（和劑方）調中快氣治心腹刺痛

香附子（一兩）　烏藥（半兩）　甘草（三錢）

右為細末每服三錢入鹽少許沸湯調服不拘時候

快氣湯（和劑方）治一切氣疾心腹脹滿胸膈噎塞噫氣吞酸胃中痰逆嘔吐及宿酒不解可思飲食

砂仁　甘草　香附子（各三錢二分）　加桔梗一錢

陳皮一錢

右用水二盞入生姜三葉煎至一盞去滓溫服不拘時

木香枳朮丸（拔粹方）破滯氣消飲食開胃進食

木香（一兩） 枳實（一兩炒） 白术（二兩）

右為細末荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服五十丸温水送下

木香化滯湯（拔粹方） 治因憂氣食湿麪結於中脘腹皮底微痛心下痞滿不思飲食食之不散常常痞氣

枳實（二錢） 柴胡（四錢） 木香 橘皮（各三錢） 甘草（炙）

紅花（各半錢） 半夏（一兩） 草豆蔻（半兩） 當歸（一錢）

右㕮咀每服三錢水二盞生姜三片煎至一盞通口服

枳殼煮散 治悲哀傷肝氣痛引兩脇

防風 川芎 枳殼 細辛 桔梗

甘草 葛根

右用水煎服

木香檳榔丸（御藥院方） 疏導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣消食

木香 枳殼（麸炒） 青皮（去白） 杏仁（去皮尖麸炒）

檳榔（各一兩） 郁李仁（去皮） 皂角（去皮酥炙） 半夏麹（各二兩）

右為末別以皂角四兩用漿水一碗搓揉熬膏更入熟蜜少許和圓如梧桐子每服五十丸食後温生姜湯下

復元通氣散（聖惠方） 治諸氣閉澁耳聾耳疼腹癰便癰瘡疽無頭一切氣刺活血止痛内消瘡腫

甘草（半炒半生三兩半）　川山甲（炮二兩）　栝樓根（二兩）　青皮

陳皮（各四兩）

右為末每服一錢熟酒下瘡無頭者津液調塗

東垣木香順氣散　治濁氣在上則生䐜脹

木香（三分）　厚朴（四分）　青皮　陳皮　益智、

茯苓　澤瀉　生姜　半夏　吳茱萸（各五分）

當歸（五分）　升麻　柴胡（一分）　草豆蔻（三分煨）

蒼术（三分）

右作一服水煎温服

木香導氣丸（秘方）　治憂思傷脾停積飲食常服消食化氣

神麴　麥蘗（炒各四兩）　蘿蔔子　牽牛末　杏仁（麸炒各四兩）

木香　陳皮　青皮（各二兩）

右爲末将蘿蔔子杏仁研泥同麵糊丸如梧桐子大每服三五十丸盐湯下

木香破氣散（又名不老湯）

木香　甘草（各半兩）　香附子（四兩）　烏藥　片姜黄（各二兩）

右為末每服二錢盐湯空心調下

木香順氣丸

木香（半兩）　枳殻（麸炒）　陳皮　補骨脂　香附子（各二兩）

牽牛（炒大兩）　大腹皮　蘿蔔子（各半兩）

右為末水丸如梧子大每服五十丸溫水下不拘時

青木香丸（和劑方）治胸膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔吐痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛（二十四兩炒香取頭末十二兩）　木香（三兩）　補骨脂（炒）　華澄茄（各四兩）

檳榔（酸粟米飯裹濕紙包火中煨令紙焦去飯四兩）

右為末入牽牛末令勻以清水和為丸菉豆大每服三十丸茶湯熟水任下

○賡按氣病用氣藥而不効者氣之所藏無以收也蓋肺主氣腎藏氣已上二方用補骨脂所以使氣升降而歸於腎臟也

東垣升陽順氣湯　治忿怒傷肝思想傷脾悲哀傷肺以致各經火動有傷元氣發熱不思飲食

升麻　柴胡　陳皮（各一兩）　半夏　人參（各三錢）

黃芪（四錢）　甘草　栢皮（各半錢）　當歸（一錢）　草豆蔻（一錢）

神麯（炒一錢半）

右㕮咀每服半兩入姜煎

○賡按此方補氣消氣之藥也

治氣六合湯　治亡血後七情所傷或婦人產後月信後着氣

當歸　川芎　芍藥　地黃　木香

檳榔

右以水煎服

○廣按此方補血消氣之藥也

○已上諸方辛平消散之劑

是齋推氣丸（百一選方）治三焦痞塞氣不升降胸脇脹滿大便秘澁小便赤少宜服

大黄　陳皮　檳榔　枳實　牽牛（各等分）

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸溫水下量虛實加減

木香順氣丸（秘方）

木香（半两）　檳榔　青皮（去白各一两）　大黄（三两微炮）

黑牽牛末（生一两熟一两）

右為末每藥末四两麪一两三錢家丸梧子大每服四十丸溫水下

木香枳殼丸　寬胸膈進飲食消食快氣（且痢頻）

木香檳榔丸（瑞竹堂方）治因氣胸膈痞塞腹脇脹滿

木香　檳榔　黄連（去須）　當歸　枳殼（去穰大煨）

青皮（去穰）　陳皮（去白）　香附子　黄栢（去粗皮）　蓬朮（各一两）

黄芩（二两）　牽牛（頭末二两）　大黄（酒浸四两）

右為末水丸如梧子大每服五七十丸姜湯送下

○已上諸方辛寒消散之劑

○廣按張子和云諸痛皆因於氣諸病皆生於氣誠哉斯言是氣也常則為氣導引血液升降三焦周流四體變則為火有升無降燔灼中外以致血液稽留為痰為積充乎臟腑溢乎經絡滲乎咽膈為嘔欬為痞塞為脹滿為疼痛之所由也昔方不分新久類用香辛燥熱之藥以治之宜乎丹溪先生之所謂也今予所集不然分而為三曰辛溫曰辛平曰辛寒使後之人凡遇氣動痛作之時即以辛溫以散之稍久即以辛平以和之辛寒以折之如此則邪易退正易復而病安痊乎不為以火濟火病根愈深真氣愈耗而死期逼矣然於風動痛作之初非辛溫消散不可必須詳其所起之因觸動何臟之今於辛溫藥中加以苦寒之藥尤佳如喜動心火加黃連怒動肝火加柴胡悲動肺火加黃芩恐動腎火加黃栢思動脾火加芍藥之類是也夫病源屬火而辛溫之藥止能開鬱行氣豁痰消積而已加以苦寒之藥方能降火而去其病根矣或曰諸痛皆因於氣治例固宜如此而諸病皆生於氣治法當何如哉予曰於上三類方中觀其所由之證審其所用之藥分火分痰分積而施治之

（[illegible]）是其法也

丹溪心法附餘卷之十四　終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之十五　巳集

寒鬱門

心脾痛　七十二

丹溪心法

〇心痛即胃脘痛雖日數多不喫食不死若痛方止便喫物還痛必須三五服藥後方喫物〇痛甚者脉必伏用溫

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

藥附子之類不可用參术　諸痛不可補氣　大凡心膈之痛須分新久若明知身受寒氣口喫寒物而得病者於初得之時當與温散或温利之藥若曰病得之稍久則成鬱久鬱則蒸熱熱久必生火原病式中備言之矣若欲行温散温利寧無助火添病耶古方中多以山梔子為熱藥之向導則邪易伏病易退正易復而病安然病安之後若縱恣口味不改前非病復作時反咎醫之失良可嘆哉

方用山梔子炒去皮每服十五枚濃煎湯一呷入生姜汁令辣再煎小沸又入川芎一錢尤妙山梔子大者或七枚或九枚須炒用　大槩胃中有熱而作痛者非山梔子不可須佐以姜汁多用台芎開之　痛發者或用二陳湯加川芎蒼术倍加炒梔痛甚者加炒乾姜從之反治之法也

輕者川芎一兩蒼术一兩山梔炒去皮二兩姜汁蒸餅糊丸如梧子大服七八十丸熱辣姜湯下　重者桂枝麻黄石鹼各等分姜汁和蒸餅丸梧子大服五十丸熱辣姜湯下　一本輕者散之麻黄桂枝之類重者加石鹼川芎蒼术炒山梔子去皮作丸服　凡治此證必要先問平日起居何如假如心痛有因平日喜食熱物以致死血留於胃口作痛用桃仁承氣湯下之切記輕者用韮汁桔梗能開提其氣血藥中兼用之以物柱按痛處則止者挾虛以

二陳湯加炒乾姜和之　有虫痛者面上白班脣紅能食屬虫治以苦練根錫灰之類　痛定便能食時作時止者是虫上半月虫頭向上易治下半月虫頭向下難治先以肉汁及糖蜜食下則引虫頭向上然後用藥打出練樹根皮檳榔鶴虱夏取汁飲冬濃煎湯下萬應丸最好、脉堅實不大便者下之　心痛用山梔子并劫藥止之若又復發前藥必不效可用玄明粉一服立止　左手脉數熱多脉濇者有死血　右手脉緊實痰積弦大必是久病胃脘有溼而痛者宜小胃丹下之

又方

黃連炒　山梔炒　吳茱萸（湯洗各五錢）　荔枝核（[illegible]三錢）

滑石五錢

右為末姜汁糊丸服

又方

山梔子仁（炒黃色）

右爲末姜汁調粥丸亦得冷痛者加草豆冦仁炒末姜汁炊餅丸服

又方

白术五錢　白芍藥　砂仁　半夏

當歸（各三錢）　桃仁　黃連　神麴炒

陳皮（各二錢）　吴茱萸（一錢半）　人參　甘草（各一錢）

右為末蒸餅丸服

又方

白术（三錢半）　白芍（炒）　陳皮　歸尾（各二錢半）

人參　黄連（炒一錢半）　吴茱萸（半錢）

一右爲末蒸餅丸

又方　治氣實心痛者

山梔子（炒焦六錢）　香附（一錢）　吴茱萸（一錢）

右爲末蒸餅丸如花椒大以生地黄酒洗同生姜湯煎送下二十丸

又方

胡椒　蓽撥（各半兩）

右為末以醋調捏作團子吞之

又方　治心疼亦治哮喘又治痰涎

半夏（切碎香油炒）

右為末姜汁炊餅丸姜湯下二三十丸

又

黄荆子炒焦為末米湯調下亦治白帶

一人脉濇心脾常痛

白术　半夏（各一兩）　蒼术　枳实

神麯　香附[illegible]　茯苓　台芎（各半兩）一

右為末神麯為丸

治死血留胃脘作痛者

玄胡（一兩半）　桂　滑石　紅花

紅麯（各五錢）　桃仁（三十箇）

右爲末湯浸蒸餅為丸

治痰飲積胃脘痛

螺螄殼（牆上年久者燒）　滑石（炒）　蒼朮　山梔

香附　南星（各二兩）　枳殼　青皮

木香　半夏　砂仁（各半兩）

右為末生姜汁浸蒸爲丸菉豆大每服三四十丸姜湯下　春加芎夏加黄連冬加吴茱萸各半两　有痰用明礬溶開就丸如鷄頭大熱姜湯吞下一丸　青黛亦

治心痛　藍葉搥碎取汁姜汁和服亦可如無葉處用水一小瓶用藍安在刀頭火中燒紅焠水服

○治脾痛用海粉佐以香附末用川芎山梔生姜汁煎辣湯調服為佳又方治脾痛氣實者可用牡蠣煆爲粉用酒調一二錢服　有脾痛大小便不通者此是痰隔中焦氣聚下焦

附諸賢論

王節齋曰凡治心腹疼痛但是新病須問曾服何飲食因何傷感有無積滯便與和中消導之藥若日數已多曾多服過辛温燥熱之藥嘔吐不納胷膈飽悶口舌乾燥大小便澁難則内有欝熱矣或原有舊病因感而發綿延日久見證如前者俱用開欝行氣降火潤燥之藥如川芎香附炒山梔黄連姜汁之類甚者再加芒硝但治心腹久痛須於温散藥内加苦寒醎寒之藥温治其標寒治其本也

附脉理

脉訣舉要曰沉弦細動皆是痛證心痛在寸腹痛在關下部在尺脉象顯然

附諸方

落盞湯　治急心痛

陳皮　香附子　良姜　吳茱萸

石菖蒲（各等分）

右水煎先用碗一箇用香油三五點在内小盞盖之將藥淋下熱服

丁香止痛散　治心氣痛不可忍

良姜（五兩）　茴香（炒）　甘草（各一兩半）　丁香（半兩）

右為末每服二錢沸湯點服

一方　治卒心痛

用乾姜爲末每服一錢匕米飲調服

二姜丸（和劑方）治心脾冷痛温胃消痰

乾姜（炮）　良姜（去皮各等分）

右爲末麪糊丸如梧子大每服三十丸食後橘皮湯下

桂靈散　治心腹大痛危急者

良姜（麸炒）　厚朴　五靈脂（明淨者各等分）

右爲細末熱醋湯調一錢立止世不可闕此

失痛散　治心胃痛

五靈脂（去石沙）　玄胡索（炒去皮）　蒼术（煨）　良姜（炒）

當歸（去芦洗各等分）

右爲末每服二錢不拘時熱酒醋湯調下

順氣木香散（和劑方）治氣不升降胸膈痞悶時或引痛及酒食過傷噫氣吞酸心脾刺痛女人一切血氣刺痛

蒼术（米泔浸）　桔梗（去芦）　茴香（炒各三兩）　乾姜（炮）

陳皮（去芦）　厚朴（去皮姜製）　砂仁　丁皮（不見火）

良姜　肉桂（去皮）　甘草（炙各三兩）

右爲末每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分熱服或塩少許點沸湯下亦可

燒脾散（濟生方）治飲啖生冷果菜停留中焦心脾冷痛

乾姜（炮） 厚朴（姜炒） 草菓仁 宿砂仁
甘草（炙） 神麯（炒） 麥蘖（炒） 陳皮
高良姜（炙各等分）

右為末每服三錢熱塩湯點服不拘時

温胃湯（拔粹方） 治服寒藥多致脾胃虚弱胃脘痛

益智（五錢） 砂仁 甘草（各二分） 姜黄（三分）
白豆蔲（三分） 陳皮（一分） 澤瀉（三分） 乾生姜（三分）
黄芪（七分） 厚朴（二分） 人參（二分）

右㕮咀每服八錢用水二盞煎至八分食前服之

一方

用延胡索胡椒等分為末每服二錢酒調下

抽刀散 治急心疼

用斑猫七箇胡椒四十九粒同炒令斑猫焦碎去斑猫不用取凈胡椒為末作一服熱酒調下不拘時

一方

用胡椒四十九粒乳香一錢為末男用姜湯下女用當帰湯下

扶陽助胃湯 治寒氣客於腸胃胃脘當心而痛得熱則已

乾姜（炮一錢半） 揀參 草豆蔲 甘草（炙）

官桂　白芍（各一錢）　陳皮　白朮

吳茱萸（各五分）　附子（炮二錢）　益智（五分）

右剉作一服水二盞生姜三片棗二箇煎至一盞溫服不拘時

有積聚備急丹良（見傷食類）

神保丸　治心膈痛腹脇痛腎氣痛血積痛　（方見諸氣）

〇已上數方治寒痛之劑　（初則為寒）

草豆蔻丸（良禁方）治客寒犯胃痛者宜此丸熱痛亦可服只可一二服

草豆蔻（一錢四分裹燒去皮）　吳茱萸（湯炮去苦）　益智　橘皮　殭蚕

人參　黃芪（各八分）　生甘草（三分）　炙甘草（三分）　歸身　青皮（各分）

神麯（炒）　姜黃（各四分）　半夏（湯洗一錢）　澤瀉（一錢小便數者減半）

桃仁（七箇去皮尖另研）　麥芽（一錢五分炒）　柴胡（四分許脇下加減用）

右除桃仁另研餘為末和勻湯浸蒸餅丸如梧子大服三十丸白湯下食遠旋斟酌多少用之

應痛丸（瑞竹堂方）治心氣痛不可忍者

好茶末（四兩）　陳乳香（二兩）

右為細末用臘月兎血和丸如雞頭大每服一丸溫醋下不拘

金鈴子散（聖惠方）治熱厥心痛或發或止久不愈

金鈴子　玄胡索（各一兩）

右為末每服二三錢酒調下溫湯亦可

治心氣疼不可忍

用真蛤粉炒轉色白湯淬隨意服之

一方　治熱心氣疼

生蛤粉（多用）　百草霜（少許）

右為細末冷水茶清皆可調下

一方

取鍋底墨以童子熱小便調服三錢即愈

一方

用枯礬為末煉蜜丸如芡實大每服一丸空心細嚼淡姜湯下如食後白湯下有蟲苦參煎湯下　又方用醋半酒盞白礬三分銚杓內化開溫服痛即止盖白礬有去熱涎之功

沒藥散（宣明方）　治一切心肚疼痛不可忍者

沒藥　乳香（各三錢）　川山甲（炙五錢）　木鱉子（四錢）

右為細末每服半錢至一錢酒大半盞同煎溫服

（○已上數方治熱痛之劑久則為熱）

失笑散　治心氣痛不可忍及小腸氣痛

蒲黃　五靈脂（酒研淘去砂土各等分）

右先以醋調二錢煎成膏入水一盞煎食前熱服

手拈散　治心脾氣痛

草菓　玄胡索　五靈脂　沒藥
乳香（各等分）

右為細末每服三錢空心溫酒調服

愈痛散　治急心疼胃疼

五靈脂（去沙石）　玄胡索（炒去皮）　蓬莪朮（煨）　當歸（去芦洗）
良姜（炒各等分）

右為末每服二錢熱醋湯調服不拘時

一方　治九種心痛惡心吐水腹脇積聚滯氣

用乾漆二兩炒烟出為末醋糊丸如梧桐子大每服五七丸熱酒或醋湯下

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

○已上數方治血痛之劑（婦人宜此）

万應丸　治蟲齧心痛

八仙丹　治蟲咬心痛俱見積聚

烏梅丸　治胃冷蚘蟲攻心痛嘔吐四肢冷

烏梅（三百箇）　黃栢（炙）　細辛　肉桂
附子（炮各六兩）　黃連（十六兩）　人參（六兩）　蜀椒（炒去閉口者及目）
當歸（各四兩）　乾姜（炮十兩）

右為末取烏梅肉和蜜丸梧子大每服五十丸空心鹽湯下

一方

不拘新久用生地黃搗汁隨人所食多少溲麪作餺飥或冷淘食良久下虫長一尺頭似守宮不復患矣

檳榔散（秘方）治男婦心脾痛

五靈脂　檳榔

右爲末煎菖蒲湯調三錢服隔夜先將猪肉盐醬煮熟令患人細嚼休吞了吐出却服前藥空心食前服

○廣按用肉味所以引虫頭向上用藥所以殺虫也

○已上數方治虫痛之劑

桃仁承氣湯（見吐血）

小胃丹（見痰類）

○廣按痛則不通通則不痛夫胃脘痛者或因身受寒氣口得冷物欝遏陽氣而不得上升也或因胃脘素有積痰死血阻滯怒氣而不得條達也然寒冷自外而入初則是寒欝久變熱怒氣自內而起始終俱是熱也遇此証者若不分寒熱而治之若之何而能愈乎今予將古方分寒熱血虫四條是寒則溫之是熱則清之是血則散之是虫則殺之庶乎臨証而不眩惑也矣

腹痛

七十三

丹溪心法

○腹痛有寒　積熱　死血　食積　濕痰　脉弦食脉滑蒼（作滄）　清痰多作腹痛台芎蒼朮香附白芷為末以生姜汁入東子服大法之方若此　腹痛者氣用氣藥如木香檳榔香附眼沒之類　血用血藥如當歸川芎桃仁紅花之類　初得時元氣未虛必推蕩之此通因通用之法久必難壯實與初病宜下虛弱衰與久病宜升之消之

腹中水鳴石火擊動其水也用二陳湯加黃芩黃連梔子亦有臟寒而鳴者　凡心腹痛者必用温散此是鬱結不行阻氣不運故痛　在上者多屬食食能作痛宜温散之如乾姜炒蒼朮川芎白芷香附姜汁之類不可用峻利藥攻下之盖食得寒則凝熱則化更兼行氣快氣藥助之無不可者　一老人腹痛年高不禁下者用川芎蒼朮香附白芷乾姜茯苓滑石之類

戴云寒痛者綿綿痛而無增減者是　時痛時止者是熱也　死血痛者每痛有處不行移者是也　食積者甚欲大便利後痛減者是　濕痰凡痛必小便不利

入方

檳榔　三稜　莪朮　香附

官桂　蒼朮　厚朴　陳皮

甘草　茯苓　木香

右為末神麯糊丸每服五十丸白湯下

腹痛治例

心法附錄曰凡腹痛以手不可按者屬實宜大黃芒硝下之實痛不可用參芪白朮益補其氣氣旺不通而痛愈甚也

凡腹痛以手重按者屬虛宜參朮姜桂之類

東垣云腹痛須用芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃栢或云白芍藥只治血虛腹痛諸腹痛不可用蓋諸痛宜辛散芍藥酸收故也

如感寒而腹痛宜姜桂嘔者加丁香

如傷暑而腹痛宜玉龍丸

如攧撲損傷而腹痛者乃是瘀血宜桃仁承氣湯加當歸蘇木紅花入童子小便并酒煎服下之

凡肥人腹痛者屬氣虛兼濕痰宜人參蒼朮白朮半夏或曰痰豈能作痛殊不知氣鬱則痰聚痰聚則碍氣道不得運故作痛也

如飲食過傷而痛者氣實宜木香梹榔丸下之

如稟受素弱飲食過傷而腹痛者當補脾胃以消導宜參朮山查麥蘖枳實木香

有全不思食其人體素弱而腹冷痛者以養胃湯仍加桂茱萸各半錢木香三分又或理中湯建中湯皆可用內加吳茱萸良

絞腸沙作痛以樟木煎湯大吐或白礬調湯吐之鹽湯亦可探吐宜刺委中出血

臍下忽大痛人中黑色者多死

附諸方

玉龍丸　又名黃龍丸　見中暑

養胃湯　見瘧類

理中湯　見中寒

小建中湯

芍藥（三兩）　甘草（一兩）　生姜（一兩半）　大棗（六箇）

桂枝（去皮一兩半）　膠飴（半斤舊有微溏或嘔者不用）

右剉每服五錢水一盞半姜三片大棗一箇煎八分去滓下飴膠兩匙許再煎化溫服

七氣湯（和劑方）　治七情之氣鬱結于中心腹絞痛不可忍

人參（去芦一兩）　甘草（炙一兩）　半夏（湯泡七次焙乾五兩）　肉桂（一兩去皮）

右㕮咀每服三錢水一盞姜三片煎七分空心熱服

撞氣阿魏丸　治五般噎疾九種心痛痃癖氣塊冷氣攻

刺腹痛　見諸氣

異香散（和劑方）治心脅不和腹脇膨脹飲食難化噫氣吞酸一切冷氣結聚腹中刺痛此藥最能治之

石蓮肉（去皮一兩） 甘草（炙） 蓬莪术 益智仁（炒去殼）
三稜（炮各一兩） 青皮（去白） 陳皮（去白各三兩） 厚朴（姜製二兩）

右為末每服三錢水一盞姜三片棗一枚鹽一捻同煎七分熱服

蟠葱散 治脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇膀胱疝氣及婦人血氣刺痛（見諸氣）

沉香降氣湯（御藥院方）治三焦痞滯氣不宣暢心腹痛滿嘔吐痰沫五噎五膈並皆治之

沉香 木香 丁香 藿香
人參（去芦） 甘草（炙） 白术（各一兩） 肉豆蔻
桂花 檳榔 陳皮（去白） 砂仁
川姜（炮） 枳實（炒） 白檀（各一兩） 白茯苓（去
青皮（去白） 白豆蔻（各半兩）

右㕮咀每服三錢水一盞入鹽少許同煎七分溫服不拘時

桂靈散 治心腹大痛甚危急者

手拈散 治腹痛心痛不止（俱見心脾痛）

木香調氣散（和劑方）治氣滯胸膈虛痞惡心宿冷不消心

腹刺痛

白豆蔻仁　丁香　檀香　木香（各二兩）

藿香葉　甘草（炙各八兩）　砂仁（四兩）

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服　又名均氣散

燒脾散　治飲啖生冷菜果停留中脘心腹冷痛

方見心　脾痛

丁香脾積丸　和劑方治諸般食積氣滯胃膈脹滿心腹刺痛

丁香　木香（不見火）　巴豆（去皮心膜）　高良姜（米醋煑各半兩）

蓬术（一兩）　京三稜（二兩）　青皮（洗一兩）　皂角（三大挺燒存性）

右入百草霜三匙同碾為末麪糊丸如麻仁大每服十丸至二十丸止脾積氣陳皮湯下口吐酸水淡姜湯下嘔吐藿香甘草湯下小腸氣炒茴香酒下婦人血氣刺痛淡醋湯下嘔吐菖蒲湯下小兒疳氣史君子湯下此藥以五更初服利三五行後用白粥補

○已上諸方辛溫消散踈利之劑

調胃承氣湯

小承氣湯

大承氣湯　已上三方治心腹痛初得時元氣未虛用此

推蕩湯　俱見傷寒

桃仁承氣湯　治因跌撲損傷瘀血作腹痛者

內加當歸蘇木紅花入酒童便煎服下之方見吐血一

木香檳榔丸　治因飲食一切積聚作腹痛者用此藥消

導漸去為桂　方見鼓脹

神妙列仙散　治因酒所傷以致心腹痛此藥消導最妙

見傷食

備急大黃丸　治心腹諸痛卒暴百病用此藥推逐即念

見傷食

○已上數方辛寒消導推蕩之劑

○腹中窄狹須用蒼朮　若肥人自覺腹中窄狹乃是濕

痰流灌臟腑氣不升降燥飲用蒼朮行氣香附　如瘦人

自覺腹中窄狹乃是熱氣熏蒸臟腑宜黃連蒼朮

十五終

丹溪心法附餘卷之十六　庚集

國立中央圖書館藏

火鬱門

脇痛　七十四

丹溪心法

○脇痛肝火盛　木氣實　有死血　有痰流注　肝急

木氣實用蒼朮川芎青皮當歸之類　痛甚者肝火盛以當歸龍會丸姜汁下是瀉火之要藥　死血用桃仁紅

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

花川芎　痰流注以二陳湯加南星蒼木川芎　肝苦急急食辛以散之用抚芎川芎蒼木血病入血藥中行血治咳嗽脇痛以二陳湯加南星香附青皮青黛入姜汁脇痛有瘀血行氣藥中加桃仁不去尖并香附之類　有火盛者當伐肝木　左金丸治肝火　有氣欝而胷脇痛者看其脉沉澁當作欝治　痛而不得伸舒者蜜丸龍會丸最快　脇下有食積一條扛起用呉茱萸炒黄連　控涎丹一身氣痛及脇痛痰挾死血加桃仁泥丸服　右脇痛用推氣散出嚴氏方　左脇痛用前藥爲君加柴胡或小柴胡湯亦可治

入方

小龍會丸

當歸　草龍膽（酒洗）　山梔（炒）　黄連（炒）

川芎（各半兩）　大黄（煨半兩）　蘆會（三錢）　木香（二錢）

一方有黄芩柴胡各半兩无大黄木香

一方有甘草柴胡青皮无當歸梔子

右為末入麝香少許粥糊丸如菉豆大每服五十丸姜湯下仍以琥珀膏貼痛處　龍會丸亦治有積因飲食大飽勞力行房脇痛

當歸龍會丸　治內有濕熱兩脇痛先以琥珀膏貼痛處却以生姜汁吞此丸　痛甚者須炒令熱服

草龍膽　當歸　大梔子　黃連

黃芩（各一兩）　大黃　蘆薈（半兩）　木香（一半）

黃栢（一兩）　麝香（半錢）

右十味為末麵糊丸　一方加柴胡川芎各半兩　又

方加青黛半兩　蜜丸治脇痛　麵丸降肝火

抑青丸　瀉肝火

黃連（半斤）

右為末蒸餅糊丸服

附諸方

推氣散　治右脇疼痛脹滿不食

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

枳殼　桂心　片子姜黃（各半兩一本作殭蠶）　甘草（炙一錢半）

右為末每服二錢姜棗湯調下酒亦可

枳芎散　治左脇痛刺不可忍者

枳實（炒）　川芎（各半兩）　粉草（炙一錢半）

右為末每服二錢姜棗湯下酒亦可

塩煎散（和劑方）治男婦人一切冷氣攻上胸脇刺痛不能

已及脾胃虛冷嘔吐泄瀉膀胱小腸氣婦人血氣

縮砂仁（去殼）　甘草（炙）　茯苓（去皮）　草果仁（去皮煨）

肉豆蔻　川芎（洗）　茴香（炒）　蓽澄茄

大麥芽　檳榔　良姜　枳殼

蒼朮　陳皮（去白）　羌活　厚朴

右㕮咀每服三錢水一盞入塩少許煎至七分去滓空心溫服

沉香升氣丸（御藥院方）治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞

沉香　檳榔（各二錢半）　人參　訶子（煨去核）

大腹皮（炒各半兩）　白朮　紫蘇葉　香附子（炒）

神麯（炒）　麥蘖　烏藥（各一兩）　陳皮（去白）

甘草（炒）　姜黃（各四兩）　京三稜（煨）　蓬莪朮（煨）

益智（去殼炒）　厚朴（去皮姜製各二兩）

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分不拘時去滓溫服

分氣紫蘇飲　治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛氣促喘急　見喘類

調中順氣丸（拔粹方）治三焦痞滯水飲停積脇下虛滿或脇刺痛

木香　白豆蔻仁　青皮（去白）　陳皮（去白）

三稜（炮各一兩）　大腹子　半夏（湯泡七次各二兩）　縮砂仁

檳榔　沉香（各半兩）

右為末水糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸陳皮湯送下

復元通氣散（和劑方）治氣不宣通或成瘡癤并閃挫腰脇氣滯不散　方見腰痛

枳殻煑散　治悲哀傷肝氣痛引兩脇　方見氣滞

一方　治脇下疼痛如神効

小茴香（炒一兩）　枳殻（麩炒五錢）

右為末每服二錢塩湯調下

十棗湯　治脇痛甚効病人氣實可用虛人不可用

甘遂　芫花（慢火炒紫色）　大戟（各等分）

右為末水一大盞棗十枚切開煑取汁半盞調半錢人實更加一錢量虛實加減

控涎丹　見痛風

二陳湯　見痰類

左金丸　見火類

小柴胡湯　見温熱

琥珀膏　見積聚

○或謂予曰脇痛之症多是肝火上升不得條達之故而局方塩煎散沉香升氣散分氣紫蘇飲調中順氣丸俱是辛温之剤但能行氣開鬱豁痰消積而已其扵降火未之有也病源是火而用辛温之薬治之則是以火済火而痛愈甚矣予曰不然古人之方必經有驗而筆之扵書豈肯妄作而誣後人哉但後人不善扵用也丹溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰

流注乎每處之凡左脇痛甚者即是肝火盛木氣實也宜用龍會丸左金丸辛凉之劑以治之凡右脇痛微者即是痰流注并食積宜用塩煎散順氣丸等藥辛温之劑以治之是也又嘗論夫左脇痛胃脘痛二証婦人多有之以其憂思忿怒之氣素蓄于中發則上衝被温痰死血阻滯其氣而不得條達故作痛也故治婦人諸痛諸疾必以行氣開欝為主而破血散火兼之庶乎得法矣諺云香附縮砂婦人之至寶山藥茯苓男子之佳珍此之謂也

跌撲損傷 五十五

丹溪心法

○跌撲損傷須用蘇木和血黃連降火白术和中童便煎妙 在下者可先須補接後下瘀血 在上者宜飲韭汁或和粥喫 切不可飲冷水血一見寒則凝但一絲血入心即死

入方 治跌撲損傷

跌撲出血者姜汁香油各四兩酒調服之

治攧傷骨折及血出者

用滑石甘草為末人參湯調服次用生姜自然汁一盞米醋一盞獨核肥皂四箇敲破挼於姜汁米醋中紗片濾過去渣入牛皮膠煎成膏藥貼之遍身者皆可

接骨散

沒藥　乳香（各五錢）　自然銅（一兩煆淬）　滑石（一兩）

龍骨（三錢）　赤石脂（三錢）　麝香（一字另研）

右為末好醋浸沒煑久多為上乾就炒燥為度臨睡服時入麝香抄以茶匙留舌上溫酒下分上下食前後服若骨已接尚痛去龍骨赤石脂而服多儘好極效

○世以自然銅接骨藥然此等方儘多大抵在補氣補血補土俗工在速效以罔利迎合病人之意而銅非煆不可服若新出火者其火毒金毒相扇挾香挾藥毒雖有接傷之功而燥散之禍甚於刀劍戒之

又方

冬瓜皮　阿膠（各等分）

右炒乾為末以酒調飲醉為度

附諸方

加味芎藭湯（三因方）治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆汁

當歸　白芍藥　芎藭　荊芥穗

百合（水浸半日）等分

右㕮咀每服四錢水一盞酒半盞同煎七分不拘時服

紫金散（楊氏家藏）治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或有瘀血停積於內心腹脹悶

紫金藤皮（二兩）　降真香　續斷　補骨脂

無名異（煅紅酒淬七次）　琥珀（別研）　蒲黃　牛膝（酒浸）

當歸（洗焙）　桃仁（去皮尖各一兩）　大黃（紙裹煨）　朴硝（別研各一兩半）

右為末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調下并進三服利即安

復元活血湯（拔粹方）治從高墜下惡血留於脇下及疼痛不可忍

柴胡（五錢）　花粉　當歸（各三錢）　紅花

甘草（各二錢）　大黃（酒浸一兩）　川山甲（炮三錢）　桃仁（五十個酒浸研如泥）

右㕮咀每服一兩水一盞酒半盞加桃仁泥煎至八分服以利為度

當歸導滯散（聖惠方）治落馬墜車打撲傷瘀血大便不通浮腫痛昏悶畜血內壅欲死

大黃（一兩）　當歸（二錢半）　射香（少許）

右為末每服三錢熱酒下和劑方只大黃當歸二味等

分酒調下或以酒煎服亦可

雞鳴散　治從高墜下及木石壓傷瘀血凝積痛不可忍

並以此藥推陳致新

大黃（酒蒸一兩）　桃仁（七粒去皮尖）　當歸尾（五錢）

右為末酒一碗煎去滓五更雞鳴時服取下惡血即愈

若氣絕不能言急以熱小便灌之即甦

奪命散（濟生方）　治刀刃所傷及從高墜下木石壓損瘀血

凝積心腹疼痛大小便不通

大黃　黑牽牛（各二兩）　紅蛭（用石灰慢火炒令乾黃色半兩）

右為末每服二錢用煎酒調下約行四五里再用熱酒

調牽牛末二錢崔之須下惡血成塊以盡為愈

○已上諸方辛凉踈導瘀血之劑

花蘂石散（和劑方）　治一切金刃所傷打撲傷損身躰出血

者急於傷處摻藥其血自化為黃水如有內損血入臟

腑熱煎童子小便入酒少許調一錢服之立効若牛觝

腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖茸為線縫合肚

皮縫上摻藥血止立活如無桑白皮用生麻縷亦得並

不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後摻

藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎衣不下

並用童子小便調下

硫黃（上色明淨者四兩擣為粗末）　花藥石（一兩擣為粗末）

右二味相拌和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子一箇候泥乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚石上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自巳午時從下着火令漸漸上徹直至經宿火冷炭消又放經宿罐冷取出細研以細絹羅了羅極細磁盒內盛依前法服

沒藥降聖丹（和劑方）治打撲閃肭筋斷骨折攣急疼痛不能屈伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩縱皮內刺痛肩背拘急身躰倦怠四肢少力並皆治之

自然銅（火煅醋淬十二次研為末水飛過焙）　川烏頭（生去皮臍）　骨碎補（爁去毛）

白芍藥　沒藥（別研）　乳香（別研）　當歸（洗焙各一錢）

生乾地黃　川芎（各一錢半）

右並生用為細末以生姜自然汁與蜜等分煉熟和丸每一兩作四丸每服一丸搥碎水酒各半盞入蘇木少許同煎至八分去蘇木熱服空心食前

治打撲內損筋骨疼痛（本事方）

沒藥　乳香　芍藥　川芎

川椒（去目及閉口者）　當歸（各半兩）　自然銅（三錢半炭火燒）

右為末黃蠟二兩溶開入藥末不住手攪勻丸如彈子大每服一丸用好酒煎開乘熱服之隨痛處卧霎時連

進有効

乳香定痛散　治打撲傷損落馬墜車一切疼痛

乳香　沒藥　川芎　白芷

芍藥　甘草　牡丹皮　生地黄

右為細末每服二錢温酒并童子小便調不拘時服

沒藥乳香散（御藥院方）治打撲損傷痛不可忍者

白朮（炒五兩）　當歸（焙）　白芷　沒藥（別研）

肉桂去皮　乳香（別研）　甘草（炒各一兩）

右為末入研藥并研令勻每服二錢温酒調下不拘時

乳香黄耆散（應驗方）治打撲損傷筋骨及瘡腫焮作疼痛

乳香（五錢另研）　沒藥（五錢另研）　黄耆　當歸（酒浸）

赤芍藥　川芎　甘草　麻黄

陳皮（各一兩）　粟殼（去頂蔕客炒一兩）　人參（去芦一兩）

右為散每料分作十服每服用水二盞煎至一盞去滓温服

接骨散（和劑方）治從高墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可忍者此藥能接骨續筋止痛活血

定粉（二錢）　當歸（二錢）　鵬砂（二錢半）

右為末每服二錢煎蘇木湯調下服後時時進蘇木湯

補損當歸散（和劑方）療墜馬落車傷腕折臂呼吸疼痛連

進此藥其痛即止筋骨接續

澤蘭（炒）　附子（炮去皮臍各一兩）　當歸（炒）　蜀椒（炒出汗）

甘草（炙）　桂心（各三分）　川芎（炒大分）

右為末每服二錢溫酒調下日三服忌生葱豬肉冷水

菘菜

治打損接骨方（本事方）

接骨木（半兩）　乳香（半錢）　赤芍藥　川當歸

川芎　自然銅（各一兩煅醋淬十二次研為末水飛過焙用）

右為末用黃蠟四兩溶藥末攪勻候溫衆手丸如龍眼大如只打傷筋骨及閃肭疼痛者用藥一丸好舊酒一盞浸化藥蒸熱服之若碎折筋骨先用此藥貼之然後服食

治打撲損傷骨折（百一選方）此藥專能接骨

夜合樹俗謂之萌葛即合歡花越人謂之烏顆樹（去粗皮炒黑色四兩）　芥菜子（炒一兩）

右為末酒調二錢澄清臨卧服又以粗滓罨瘡上扎縛之

治打撲折骨損斷（經驗方）服此藥自頂心尋病至下兩手遍身遇受病處則颯颯有聲覺藥力習習往來則愈矣

乳香　沒藥　蘇木　降真香

松明節　川烏（去皮尖）　自然銅（火煅醋淬七次各一兩）

龍骨（半兩生用）　地龍（半兩去土油炒）　水蛭（油炒半兩）　血竭（三錢）

土狗（十箇油浸焙乾為末本草名螻蛄）

右為末每服五錢無灰酒調下病在上食後服病在下食前服

治打撲傷損　經驗方

用胡孫姜研爛取汁以酒煎服渣傅傷處

接骨散　張子和方　并治惡瘡

金頭蜈蚣（一箇）　金色自然銅（半兩燒紅醋淬研為細末用）　乳香（一錢研為細末）

銅錢（重半兩者或二文或五文燒紅醋淬研細）　金絲水蛭（一錢半每箇作三截瓦上煿去氣道為度）

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見出膿用粗藥末少許小油少半匙同打勻再入少半匙再攪勻又入前藥接骨散半錢再都用銀釵子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛天明一宿自破便效如打破骨頭并損傷可用前項接骨散半錢加馬兜鈴末半錢同好酒一盞熱調連渣溫服如骨折損以接定不疼如不折了喫了若立便止住疼痛此方累經效驗不可具述

神聖接骨丹　治打撲傷損跌折肢躰

水蛭（用糯米於砂不內炒黃去米三錢）　兔絲子　髮灰

好綿灰　沒藥　乳香　血竭（各一錢）

半兩錢（一文燒七次醋淬七次另研）　射香（一錢另研）

右研令勻每服三錢熱酒調下損在上食後服損在下空心服約車行六七里聞骨作声忌聽鍾鼓砧杵之声震動恐生蘆節忌食驢肉一服見効

續股散　治折傷筋骨

用半兩錢七箇以桑柴火燒紅好醋內淬之取錢上碎末再入珍珠末一分乳香沒藥少許同研極細好酒調服

接骨散　治跌僕閃肭骨折疼痛

黄麻（燒灰二兩）　頭髮（燒灰一兩）　乳香（五錢）

右為末每服三錢温酒調服立効

茴香酒（直指方）治打墜肢躰凝滯瘀血腰脇疼痛

破故紙（炒）　茴香（炒）　辣桂（各一錢）

右為末每服二錢食前熱酒調服

木香調氣散　治從高墜下或打撲傷損腰脇心痛

白豆蔻仁　丁香　檀香　木香（各二錢）

藿香　甘草（炙各八錢）　砂仁（四錢）

右為末每服二錢加紅曲末少許童子小便同酒調空心熱服如無紅曲紅酒亦好

應痛丸（經驗方）治折傷後為四氣所侵手足疼痛

生蒼朮（一斤） 破故紙（一斤半炒半生） 舶上茴香（十二兩炒）

骨碎補（一斤去毛） 穿山甲（去膜去皮炒脹為度柴灰煨亦可） 生草烏（一斤剉如麥大）

右除草烏一斤用生葱二斤連皮生姜二斤擂爛將草烏一處淹兩宿焙乾連前藥一處焙為細末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服五十丸酒湯任下忌熱物

○已上諸方辛溫散痛接骨之劑

乳香消毒散（御藥院方）治一切傷折蹉跌焮腫疼痛不可忍者

乳香（另研） 沒藥（另研） 白歛 白芍藥（各一兩）

白芥子 當歸（各半兩） 黃栢（另研細末二兩） 滑石（二兩）

黃丹（三錢） 加血竭（半兩另研）

右為細末入另研者一處再另研勻每用新水調如稠膏攤在紙花上貼患處

烏金散（應驗方）治打撲損傷敷藥

用小黃米粉四兩葱白細切一兩同於砂鍋炒至黑色杵為細末用好醋調成膏子攤在紙上貼於損傷病處後用杉木皮或板以紙包褁四面四片用絹袋扎縛不可動搖三日一換內服前接骨藥

一方

用葱白砂糖二味相等爛研傅之痛立止且無瘢痕

治打撲傷折手足

用菉豆粉新鐵銚内炒令紫色用新汲井水調稀厚傅損處以紙將杉木片縛定立効

走馬散（經驗方）治折傷接骨

栢葉（生用少）　皂角（生用多）　骨碎補（去毛）　荷葉（生各等分）

右爲末扵折傷揣定入原位以姜汁調藥（加糊）攤在紙上貼骨斷處用杉木片子夾定以繩縛之莫令摇動三五日後開看以温葱湯洗之後再貼藥復夾七日如痛甚（加）没藥

治打傷損（醫方大成）

南星　白芷　半夏　白芨

黄栢皮　赤小豆（各等分）

右為細末姜汁調傅患處以蜜糖亦好

没藥散（拔粹方）專治箭傷止血定痛

定粉（一兩）　枯白礬（二錢另研）　没藥（另研）　乳香（另研各一兩）

風化石灰（一兩）

右各研為末和勻掺上

治諸般打撲傷損皮破血出痛不可忍者

右用赤石脂研末傅之效

金絲膏藥（應驗方）治打撲傷損閃肭疼痛風溫氣痛

當歸　川芎　蒼术　香白芷

赤芍藥　木鱉子　大黄　草烏頭（各半两）

香油（四两）　瀝青（半斤）　松香（半斤）　乳香（二錢半另研）

沒藥（二錢半另研）

右前八味同香油四两熬去渣瀝青松香看熬軟硬冬軟些夏硬些乳香沒藥攤膏藥時用之

立應金絲膏（經驗方）

當歸尾　香白芷　杏仁　草烏（生剉用）

猪牙皂角（不蛀者去皮各二錢）　葱連鬚葉肥者十莖

白膠香（三錢）　瀝青（明者八两）　黄蠟（一两）　乳香（另研為末）

沒藥（另研為末各半两）　清油（七两）

右將前項六味入清油內依法熬濾去渣入白膠香瀝青鎔化攪勻入黄蠟又攪勻待冷入沒乳末攪勻

至聖黑龍膏（御藥院方）治一切筋骨損傷疼痛

米粉（四两於銀器內炒成現子褐色放冷研為細末後入二味）　乳香

沒藥（研細各半两）

右研極細末每用一好酒或醋調如膏攤在紙花上貼患處

一方　治跌撲損傷及金刃所傷　此藥止血散痛消腫

風化石灰（重羅過半兩五月五日以韭汁和陰乾）　海螵蛸（半兩）

老松香　血竭　輕粉　乳香

没藥　黄丹（飛過）　無名異（去土）　松白脂（去皮各半兩）

右為極細末溼者乾糝乾則水調蜜調傅患處

淋渫頑荊散　治從高失墜及一切傷折筋骨瘀血結痛

頑荊葉（一兩半）　蔓荊子　白芷　細辛（去苗）

防風（去芦）　川芎　桂心　丁皮

羗活（各兩）

右為末每用一兩塩半匙葱白連根五莖漿水五升煎七沸去渣通手淋渫痛處冷即再換宜避風

○已上諸方外治傅貼之剂

疥瘡七十六（附天疱瘡　楊梅瘡　瘰瘡　脚上爛瘡　頭面瘡）

丹溪心法

○諸瘡痛不可忍者用苦寒藥加黄連黄芩詳上下根梢用及引經藥則可　又云諸瘡以當歸黄連為君連翹甘草黄芩為佐　諸痛痒瘡瘍屬火若禀受壯盛宜四物加大承氣湯下之　若性急面黑瘦血熱之人因瘡而痛宜四物加黄連黄芩大力子甘草在下焦者加黄栢　若肥胖之人生瘡而痛乃是濕熱宜防風羗活荊芥白芷蒼朮

連翹取其氣能勝濕

○諸瘡藥　膿窠治熱燥濕為主用無名異　乾疥開鬱為主用吳茱萸　虫瘡如癬狀退熱殺虫為主用蕪荑黑狗脊白礬雄黃硫黃水銀殺虫樟腦松香退熱　頭上多加黃連方解石蛇床定痒殺虫松皮炭主膿　腫多者加白芷開鬱　痛多加白芷方解石　虫多加藜蘆斑猫痒多加枯礬　陰囊加茱萸　濕多香油調　乾痒出血多加大黃黃連猪脂調　紅色加黃丹　青色加青黛虫多加錫灰蕪荑檳榔　在上多服通聖散在下多須用下腳腫出血分溫熱用藥

入方　瘡有三種

膿泡瘡治熱為主

黃芩　黃連　大黃（各三錢）　蛇床

寒水石（三兩）　黃丹（半錢）　白礬（一錢）　輕粉

白芷　無名異（炒少許）　木香（少許痛者用）

右為末油調傳

沙瘡

蕪荑（二錢）　剪草（一錢）　蛇床（三錢）　白礬

吳茱萸　黃栢（各一錢）　蒼术　厚朴

雄黃（各半兩）　寒水石（二錢）　輕粉（十貼）

右為末油調傅

疥瘡藥　春天發瘡疥開鬱為主　不宜抓破傅

白礬（二錢）　吳茱萸（二錢）　樟腦（半錢）　輕粉（十盝）

寒水石（二錢半）　蛇床（三錢）　黃柏　大黃

硫黃（各一錢）　檳榔（一箇）

右爲末香油調傅

又方

蕪荑　白礬（枯）　軟石膏　大黃

樟腦（各半兩另入）　管仲　蛇床（各一兩）　硫黃

雄黃（各二錢半）

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

右為末香油調須先洗瘡去痂傅之

一上散

雄黃（三錢半）　寒水石（一兩）　蛇床　白膠香

黑狗脊（各一兩）　黃連（半兩）　硫黃（三錢半）　吳茱萸

白礬（枯五錢）　斑猫（十四箇去翅足）

右硫黃雄黃寒水石另研如粉次入斑猫和勻蛇床狗脊等爲極細末同研勻洗瘡令湯透去痂用臘猪油調手心中擦熱鼻中嗅二三次却擦上一上即愈如痛甚腫滿高起加寒水石一倍如不苦痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡中有虫加雄黃如喜火炙湯洗加硫

黄只嗅不止亦可愈也

附諸方

四物湯　見補損

大承氣湯　見傷寒

升麻牛旁子散　治時毒瘡疹脉浮洪在表者瘡發於頭面胷膈之際

升麻　牛蒡子　甘草　桔梗

葛根　玄參　麻黄　連翹（各一錢）

右㕮咀姜二片水二盞煎一盞服

升麻和氣飲　治瘡腫癧疥痒痛增寒發熱

甘草　陳皮（各一兩半）　芍藥（七錢半）　大黄（半兩煨）

乾葛　蒼朮　桔梗　升麻（各兩）

當歸　半夏　茯苓　白芷（各二錢）

乾姜　枳殼（各半錢）

右㕮咀每服一兩水煎服

加味羌活飲　三因方　專治四氣外搏肌膚發為癮疹增寒發熱痒

羌活　前胡（各一兩）　人參　桔梗

茯苓　甘草（炙）　枳殼（麩炒）　川芎

天麻（各半兩）　蟬蛻（去須）　薄荷（各三錢）

右㕮咀每服五錢水一盞姜三片煎七分温服

當歸飲子　治內蘊風熱發為瘡疥風癬濕毒燥痒瘡

當歸　白芍　川芎　生芐

白蒺藜　防風　荆芥（各一兩）　何首烏

黄芪　甘草（各半兩）

右㕮咀每服一兩水煎或為末每服一二錢亦得

苦參丸（御藥院方）治肺受熱毒遍身生瘡

用苦參為末粟米飯和丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲下

○已上諸方內消之劑

輕粉散

寒水石（一斤）　硫黄　朴硝（各二兩）　松香（五兩）

枯礬（二兩）　輕粉（五錢）

右為細末香油調搽

硫黄散

硫黄　川椒　石膏　白礬（等分）

右為細末香油調搽

立効散

全蝎（三十枚）　巴豆（三十粒）　皂角（七箇炒焦）

右為粗末以清油四兩熬至焦黄色去渣次入大楓子

蛇床子白礬末各一兩黃蠟二兩同熬成膏以甕器收貯任意搽瘡

一方

白芷白礬各等分為細末入硫黃少許以香油調搽

治諸般疥癩瘡藥

蛇床子（一斤為末）　大楓子（取肉四兩）　白礬（五兩為末疼則少用）　檳榔（一兩末）

右糖油半斤調搽小兒頭瘡少加松香輕粉

水銀膏　此藥會稽徐彥釗傳大效

楓子（取肉四兩）　輕粉（一錢）　水銀（末要茶研不見星一錢）

樟腦（二錢半）　礬（生熟二錢半）

右先將楓肉研膏次入餘藥勻臘月豬脂和稀用絹布裹任意搽

又秘方

黑狗脊　藺茹　藁本　蛇床子　硫黃

井泉石　剪草　百部　藜蘆（各等分）

右碾為細末用香油搽手心內搽鼻聞之

一方　治疥癬諸瘡

雄黃（五錢）　樟腦（五分）　大楓子一（取肉）　斑猫（去足翅炒各十双）

狗脊　蛇床子　寒水石　硫黃（各五錢）

右為極細末疥瘡用桕油調搽癬瘡用栢油調搽

治疥瘡

大楓子　杏仁（各十粒）

右同羊脂搗均以褁火烘油出搽之

胡粉散（濟生方）治一切瘡癬瘙痒甚者

胡粉（一分）　砒霜（半分）　大草烏（一箇生用）　蝎稍（七枚）

雄黃　硫黃（各一分另研）　斑猫（一枚）　射香（少許）

右為末先用羊蹄菜根蘸醋搽動次用少許藥搽患處

如意散（宣明方）治疥癬無時痛痒愈發有時不問久新者

吳茱萸　牛李子　荊芥穗（各一兩半）　輕粉（半錢）

信砒（二分）　牡蠣（半兩）

右爲細末研勻每臨時訖炒一錢油調遍身搓摩上一半如後痒不止更少旋塗之股髀之間聞香烈愈

又治疥藥方

蜜陀僧　蛇床子　硫黃　枯礬

胡椒

右爲末香油調傅

○已上諸方外敷之劑

丹溪心法

○天疱瘡　用防風通聖散末及蚯蚓泥略炒蜜調傅極妙　從肚皮上起者是裏熱發於外也還服通聖散（見

斑疹類

○楊梅瘡　新增

附諸方

治楊梅瘡方

硃砂（二錢）　雄黃（一錢半）　苦參　荆芥穗

天麻　麻黃　牛蒡子　面粉

槐角子（各三錢）

右為細末用糖心雞弾為丸梧子大每服三十丸用雞湯或羊肉湯送下日一服表出毒氣再不服忌一月房室神効

又方

土茯苓（四兩）　牙皂　地骨皮　五加皮

白蘚皮（各一兩）

右作二十服用灯草車前子為引子煎服

又方

冷飯團（一名土茯苓一斤）　五加皮　白蘚皮

防風　白芍藥　木瓜（各一兩半）　皂角子

白丑（各三十粒）　生地黃（酒洗）　地骨皮　牛膝（去芦）

黃連（去鬚）　槐花　川芎　尋風藤

威靈仙　白茯苓　杜仲（炒斷絲）　白芷

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

當歸（酒浸洗各一兩）　甘草（炙半兩）　荊芥穗（一兩半）

右㕮咀二十服每服水一鍾半酒半鍾共煎至一鍾飯後溫服服動此藥可用後又開薰楊梅瘡藥並治

又方

當歸　連翹　羌活　荊芥穗
薄荷葉　枳殼　黃栢　茯苓
車前子　防風　木通　芍藥
川芎（頭上用）　山梔　桔梗　天花粉
姜蚕　白芷　甘草　金銀花
獨活（各一兩）　柴胡　前胡（各半兩）

右㕮咀作二十服每服用水一鍾煎至捌分溫服上多食後服下多食前服服此仍用薰藥並治

薰楊梅瘡方

雄黃　沉香（各三分）　乳香　沒藥
硃砂（各五分）　血竭（三分）　黑鉛　水銀（各一錢）

右為末均作紙撚七條用香油點灯放床上令病人兩腿抱住上用單被通身蓋之口噙冷水頻頻換之則不損口頭一日用三條後每日用一條薰之有効

又方

水銀　板硃　黑鉛（各三錢）　白花蛇（一錢）

共研爲末作紙撚七條頭一日用三條後每日用一條

用香油點灯放兩腿单被連頭盖了口噙冷水頻換

治楊梅瘡後腫塊方

冷飯團（十五兩） 防風 木通 薏苡仁

防己 茯苓 金銀花 木瓜

白鮮皮 皂角刺（各五錢） 白芥子（四錢） 當歸身七錢

右作三十服每服用水鍾半煎至八分空心午飯前晚飯前各一服忌魚雞生冷房事及煎炒茶酒十餘日立效虛弱人加人参五錢其妙不可盡述

一方 專治年久楊梅頑瘡

水花硃（一錢） 枯礬 朱砂（各一錢二分）

三味共研細末用全蝎酒煎膏爲丸作六丸分作三日服用羊肉鮮魚等湯送下九日全好

一方 治楊梅癰

桕油（二兩） 全蝎（三箇） 蜈蚣（一條） 鉛粉（一兩）

右先將香油二兩煎全蝎蜈蚣待焦去渣次入桕油鉛粉柳條攪勻捏成餅子照瘡大小攤貼三日一換九次全好

一方 治楊梅癬漏瘡

用大鱉甲一箇去肉湯洗净加刺蝟皮一箇象牙末三

錢共為細末棗肉為丸如櫻桃大每服一丸空心童子小便送下服七日後仍用三味末猪膽汁調傅

丹溪心法

○凍瘡　用煎熟桐油調蜜陀僧末傅

丹溪心法

○脚上爛瘡久不愈　先以豆腐漿水洗二三次縣芻渣葉地慕渣葉搗細入塩妛少盦之

附諸方

治凍瘡（百一選方）

用茄子根濃煎湯洗并以雀兒腦髓塗之

治手足皸裂（百一選方）

瀝青二兩黃蠟一兩共熬攪勻瓦罐盛貯先以熱湯洗令皮軟拭乾將藥於慢火上略炙擦傅

治手足皸裂春夏不愈者（澹寮方）

生姜汁　紅糟　塩　猪膏（臘月者佳）

右研爛炒熱擦入皸內一時雖痛少頃便皮軟皸合再擦即安

治脚跟皸

用頭髮一大握桐油一碗於瓦器內熬候油沸頭髮溶爛出火攤冷以瓦器收貯勿令灰入每用百沸湯泡洗

皸裂令軟拭乾傅其上即安一方加米粉

又方（醫方大成）

用五倍子為末同牛骨髓填縫内即安

治手足裂（張子和方）

用白芨不拘多少為末水調塗裂處

治脚指縫爛瘡

揀鵝時取鵝掌黄皮焙乾燒灰存性為末濕則糝之

治脚指縫爛瘡及因暑手抓兩脚爛瘡

用細茶口嚼碎爛塗之解熱燥濕其瘡立愈

神應散　治脚指丫濕爛

枯礬（六錢）　黄丹（半錢）

右為細末乾糝患處經夕立瘥

○頭面瘡（新增）

附諸方

摩風膏（聖惠方）摩風止痒消腫定疼治頭面唇鼻諸瘡及肌肉裂痛者悉治之

沉香　白附子　木香　獨活

白斂　白芨　天麻（各一銭半）　當歸（去芦）

白芷　檀香　零陵香　藿香

杏仁（去皮）　桃仁（去皮各三銭）　茅香　甘草

防風　白芍藥（各一錢半）　川芎　木通（各一錢）

黃芪（一兩二錢）　龍腦（研四錢）　半夏（十二兩半）　清油（二斤二兩）

黃蠟（冬月用九兩）　大茂蔓（連鬚一箇剉干）

右剉用油浸七日於石器內慢火煎候白芷微黃色以白綿濾去滓放淨鑵內密封浸一宿再濾過於上等磁碗中慢火再輕温動次下黃蠟攪勻放温次下研細龍腦糝面於磁盒內盛定每用少許摩患處

治頭面生瘡燥痒黃水出

蜜陀僧　硫黃（各二錢）　輕粉（少許）

右為末酥油調搽

一方　治白禿瘡

用金頭蜈蚣一條皂角不蛀一斤劈開去皮弦以蜈蚣納入夾定以麻紮緊沉於糞缸底七日取出焙乾碾為細末先以温湯將瘡浸洗温潤然後敷之如乾以清油調搽數次除根

一方

用熟皮烟膠一兩輕粉一錢研勻調搽又法用枯白礬同烟膠調搽亦佳

禿瘡藥

輕粉（五錢）　黃蠟（二兩）

右用鵝油一二兩調搽

治小兒白禿瘡　聖惠方

用淡豆豉一合炒令煙出色燋為末用飯飲調屋塵一團於炭火內煆令灰燼並細研入輕粉少許油調剃頭了搽之一方治頭瘡無屋塵一方有射香無輕粉

治面上耳邊浸淫瘡　聖惠方　有黃水出久不愈名香瓣瘡

羖羊鬚　荊芥　乾棗（去核各二錢）

右燒存性入膩粉半錢同研末先用溫水洗香油調塗

玉粉散　治熱汗浸漬頭面及遍身成瘡種痒焮痛

定粉（一兩）　蛤粉（九兩半）　石膏　白石脂（各半兩）

滑石（半兩）　粟米粉　寒水石（燒出火毒各二兩）

白龍骨（半兩）

右為末研令極細每用少許乾擦患處

癰疽　七十七

附腸癰　乳癰

庚集

丹溪心法

○癰疽只是熱勝血　六陽經六陰經有多氣少血者有少氣多血者有多氣多血者不可一槩論也若夫要害處

近虛怯薄處前哲已曾論及惟分經之言未聞諸經惟少陽厥陰經生癰疽理宜預防以其多氣少血肌肉難長瘡久未合必成死症遽用驅毒利藥以伐其陰分之血禍不旋踵　陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細弱濇陽滯以寒治之陰滯以熱治之　人中年以後不可生癰縱有痛腫參之脉症但見虛弱便與滋補氣血可保終吉若用尋常驅熱拔毒紓氣之藥虛虛之過如指諸掌　內托之法河間治腫焮于外根盤不深形証在表其脉多浮病在皮肉非氣盛則必侵于內急須內托以救其裏宜復煎散除濕散鬱使胃氣和平如或未已再煎半料飲之如大便秘及煩熱少服黃連湯如微利及煩熱已退却與復煎散半兩如此使榮衛俱行邪氣不能內傷也然世俗多用排膿內補十宣散若用之於妝小瘡與冬月時令即可若潰瘍於夏月用之其桂朴之溫散佐以防風白芷吾恐雖有參芪難為倚仗　一婦年七十形實性急而好酒腦生疽纔五日脉緊急且濇急用大黃酒煨細切酒拌炒為末又酒拌人參炒入姜煎調一錢重又兩時再與得睡而上半身汗睡覺病已失此內托之意　又一男子年五十形實色黑背生紅腫及胛骨下痛其脉浮數而洪緊食亦正冬月與麻黃桂枝湯加酒黃栢生附瓜蔞子甘草節羌

活青皮人參黄芩半夏生姜六貼而消此正内托之法精要内托散乳香菉豆等藥想此方專為服丹石而發者設不因丹石而發恐非必用之劑　瘡先發為腫蓄積蒸肉為膿故其痛多少瘡之始作時也膿潰之退飢寛痛必漸減而反痛者此為虚宜補亦有穢氣所宜和鮮風寒逼者宜温散

入方

附骨癰

熱在血分之極細初覺先以青皮甘草節後破

初腿腫以人參黄連茯苓各二錢瓜蔞子四十八二貼入竹瀝熱飲之

治環跳穴痛不已防生附骨疽

以蒼术作黄柏之辛行以青皮冬月加桂枝夏月加條子芩躰虚者加牛膝以生甘草為使大料煎入姜汁帶辣食前飲之病深者恐术栢桂枝十數貼發不動加少麻黄二三貼又不動恐癰將成矣急掘地坑以火煅紅沃以小便赤体坐其上以被席圍抱下截使熱氣燻蒸腠理開氣血暢而愈

鐵圍散　治癰疽腫毒

乳香　沒藥（半兩）　大黄　黄栢

黃連　南星　[illegible]　半夏　防風

皂角刺　[illegible]　木鱉子　瓜蔞　甘草節

草烏　阿膠

右為末醋調成膏砂石器內火熬黑色鵝翎傳之

圍藥　諸般癰疽傳上消散

乳香　沒藥　大黃　連翹

黃芩　黃連　黃栢　南星

半夏　防風　羌活　瓜蔞

阿膠　皂角刺

右為研細末好醋煎黑色成膏寒者熱用熱者寒用

圍藥鐵井欄

貝母　南星（各七錢）　連翹　五倍子

經霜芙蓉葉（各二兩）

右為細末用水調傳四向腫處止留中間一竅出毒氣

隔皮取膿法

驢蹄（細切一兩）　蕎麥麵（一兩）　白塩（半兩）　草烏（四錢去皮）

右為末水調作餅子慢火炙微黃色出火毒研末醋調成膏用白紙攤貼患處水自毛孔而出其腫自退

騎馬癰

大粉草帶節四兩長流水一碗以甘草淬焙水盡為

末入皂角炭少許作四服湯調頻服効

又方

甘草節白芷黃連破者龍骨枯礬赤石脂併用

敷痘瘡方

草烏　黃連　紫金皮　白芷

大黃　芙蓉皮　朴硝　糯米各等分

右為末蜜水調敷如瘡盛以蜜調雄黃末圍定瘡穴大小前後敷前藥末

取朽骨　久疽及痔漏者有之

取烏骨雞脛骨以上等雌黃實之鹽泥固濟火煅通紅取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟大一粒撚送入孔中竅內更用膏藥貼之

便毒

山梔子　大黃　乳香　沒藥

當歸半錢　瓜蔞仁二錢　代赭石一錢

右作一服煎

又方

木鱉子　大黃　瓜蔞仁　桃仁

草龍膽

右㕮咀濃煎露星月一宿清早溫服立愈

又方

白殭蚕槐花為末酒調服一方加酒大黄（三錢）

附諸賢論

劉河間宣明論曰人之瘡腫因内熱外虛所生也為風溼之所乘則生瘡腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開為風溼所乘脾氣溼而内熱即生瘡也腫者皆由寒熱毒氣客於經絡使血澁而不通壅結成腫風邪内作即無頭無根氣血相搏作者即有頭有根結壅盛則為膿赤核腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則為實痒則為虛非謂虛為寒也正謂熱之微甚也痒者表疾故火旺於夏而萬物蕃鮮榮美也炙之以火漬之以湯而其痒轉甚者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其痒不去謂寒收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越怫熱内作故也瘡痒皆為火熱而反腐出膿水者猶穀肉菓菜熱極則腐爛而潰為污水也潰而腐爛水之化也癰淺而大疽深而惡熱勝血則為癰膿也瘍有頭小瘡也疹浮而小癮疹也瘤氣赤瘤丹熛熱勝氣火之色也

附脉理

脉訣舉要曰癰疽浮數惡寒發熱若有痛處癰疽所發脉數發熱而疼者陽不數不熱不疼陰瘡發癰之脉弦洪相搏細沉而直肺肝俱數

附諸方

狗寶丸（濟生方）專治癰疽發背附骨疽諸般惡腫將發時先覺口中煩渴四肢沉重遍身壯熱乃其候也此藥功効不可具述

蟾酥（一錢）　金頭蜈蚣（七條全者酥炙黃色）　輕粉

雄黃　滴乳香　沒藥　烏金石（即石灰各一錢）

狗寶（癩狗腹中得之一錢又云一兩）　狗膽（一箇乾者用之去皮黑狗臘月者佳）

鯉魚膽（一箇乾者用之臘月者佳）　粉霜　黃蠟（各三錢）

硇砂（半兩）　麝香（一分）　孩兒乳（一合頭首者）

鉛白霜（一錢一本無此）

右先將乳汁黃蠟放在罐內文武火化開次將各藥末和成劑用時大人丸菉豆大小兒丸如芥子大每服三丸病重者加至五丸用白丁香七箇研爛新汲水調送下腰以下食前服腰已上食後服如人行五里用熱葱白粥投之即以衣被蓋定汗出為度已後只與白粥常服十宣散留頭其四邊以烏龍膏貼

烏龍膏（濟生方）治一切腫毒癰疽收赤暈

木鱉子（去殼） 半夏（各一兩） 水粉（四兩） 草烏（半兩）

右於鐵銚內慢火炒令轉焦為末出火毒再研以水調傅瘡四邊留頭出毒氣

追毒丹（濟生方） 治癰疽疔癤諸惡瘡黑陷者先服狗寶丸次貼烏龍膏收腫解毒去赤暈然後用針刀開瘡納追毒丹覆以乳香膏使之潰去敗肉排膿然後用生肌藥

白丁香（一錢） 雄黃（二錢） 巴豆（七粒去殼皮心不去油皮如泥）

黃丹（二錢） 輕粉（一錢）

右研和加白麪三錢滴水為丸如麥狀針破瘡納之上覆以乳香膏追出膿血毒物痛瘡巴璧死肌不去不可治者亦以此法追毒去死肌生新肉瘡小者一粒大者加用之

乳香膏（濟生方） 追膿血消惡毒

木鱉子（去殼細剉） 當歸尾（各一兩） 柳枝（七八寸剉之）

此已上用清油四兩慢火煎令黑色次用

白膠香（明淨者四兩共研細入油煎化以綿濾之） 乳香

沒藥（各半兩）

右再治淨鐵銚又傾前藥油蠟在內候溫入黃丹一兩半以兩柳枝攪極勻再上火煎不住手攪候油沸起手下直待注在水中成珠不散為度秋冬欲軟春夏欲堅

傾在水盆中出火毒掇成劑收之遇用以絹帛攤貼

桃花散（宣明方）　一切瘡生肌藥

白芨　白歛　黃栢　黃連

乳香（另研）　射香（另研）　黃丹（各等分）

右為極細末糝在瘡上二三日生肌平滿

○已上諸方治癰疽次第之劑（如無狗寶丸以瀟[illegible]真人奪命丹代之）

內踈黃連湯　治瘡皮色腫硬發熱而嘔大便燥結脉洪實者

黃連　芍藥　當歸　檳榔

木香　黃芩　梔子　薄荷

桔梗　甘草（各一兩）　連翹（二兩）　大黃（二兩半）

右㕮咀每服一兩入姜煎

秘方奪命散　治一切癰疽無名惡瘡皆可治之其效不可盡述

當歸尾　乳香（各一錢）　川山甲（用蛤粉炒黃色去粉六錢）

皂角針（燒）　陳皮　金銀花（各三錢）　貝母（一錢）

赤芍藥　甘草節（各六分）　沒藥（二錢）　花粉（八分）

防風　白芷（各五分）

右㕮咀每服一兩用無灰酒一大碗煎至半碗紙糊口勿令走氣病在上食後病在下食前服

當歸消毒散（應効方）治癰腫初發

荆芥　牛旁子　甘草　防風

當歸　赤芍藥（各一錢半）

右用水二盞煎至八分去滓温服食後

神仙活命飲　治癰疽發背發腦發髭發脇癤毒騎毒腫扵癰腿癰附骨癰疽惡瘡惡漏瘡血塊氣塊面目手足浮腫隨病加減並皆治之

金銀花（一兩五錢）皂角針（一兩）貝母（去心）天花粉（各四錢）

當歸尾　滴乳香　大黄（各五錢）沒藥

木鱉子（去殼）甘草　穿山甲（用蛤粉炒黄去粉淨）

赤芍藥（各三錢）防風（去芦）香白芷（各二錢半）橘皮（去白一錢半）

右每服五錢水煎服若老人及躰虛者加生黄芪半兩若臓腑閉澁者服九寶飲量病上下服之

九寶飲

當歸　白芷　甘草　瓜蔞

黄芪　生地黄　赤芍藥　熟地黄

川芎（各等分）

右每服五錢水酒共一鍾半煎病上下食前服食後服

九珍散簡易方　治一切癰疽瘡癤腫毒因氣壅血熱而生者

赤芍藥　白芷　當歸　川芎

大黃　甘草　生乾地黃　瓜蔞

北黃芩（各等分）

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓熱服兼治乳癰及丁瘡

赤芍藥散　治一切惡瘡癰疽丁腫初覺不消憎寒疼痛

金銀花　赤芍藥（各半兩）　大黃（七錢半）　當歸

枳實　甘草（各三錢）　大瓜蔞（一箇）

右每服五錢水酒各一鍾煎至一鍾不拘時溫服

玄參散　治癰疽腫痛不進飲食

玄參（一兩）　升麻　射干　大黃（各五錢）

甘草（二錢半）

右每服五錢水一鍾半煎至八分不拘時溫服

懸蔞散（張子和方）治發背惡瘡

懸蔞（一箇）　大黃　金銀花　皂角刺（各一兩）

當歸（半兩）

右剉碎每服五錢酒一碗煎七分去滓溫服如有頭者服黍粘子

消毒湯（德生堂方）一名紫花地丁散治惡瘡膿未成已成者腫大等証

紫花地丁（去芦）　金銀花　當歸　大黄（酒浸焙）

赤芍藥　黄耆（各半两）　甘草（一錢）　加升麻

右剉為末作二服每服酒一碗銀石器煎五分服

當歸連翹散　通玄論治一切風熱癰腫瘡疽咽膈不利舌腫喉閉鼻衄出血咳嗽痰實腸胃燥澁大小便結滯消癰腫解風毒活血脉保真元宣通遍身結滯

連翹　當歸　大黄　梔子

芍藥　金銀花

右各等分水二盞生姜三片煎至一盞去滓熱服甚者加大黄

一方　治發背惡瘡

瓜蔞（一箇）　金銀花　皂角刺（各一两）　沒藥（一錢）

甘草節　當歸（各半两）

右每服五錢以酒一碗煎溫服加鼠黏子更佳

治七十二等無頭惡瘡

荊芥　梔子（各二錢半）　茯苓　白朮

人參（各三錢）　川芎　芒硝　大黄

當歸　芍藥　升麻　薄荷

蒼朮　連翹　石膏　桔梗

滑石　黄芩（各半两）　黄芪　甘草（各二錢）

右㕮咀病重者一兩病輕者五七錢葱白一根并金銀花同煎去渣熱服汗出為度如疼加乳香咽喉痛加竹葉灯心同煎

藤黃飲子（秘方）

治一切丁腫惡瘡癰疽疼痛

大黃（四兩）　甘草　茯苓　牡蛎（生用各一兩）

人參　川芎　梔子　赤芍藥

金銀花（各半兩）　木香　白芷（各六錢）　當歸（七兩）

右㕮咀每服八錢水二盞煎至一盞温服

加減藤黃飲子（應驗方）

治一切癰疽瘡腫

金銀花　黃芪　防風　川芎

羌活　大黃　赤芍藥　薄荷

連翹　麻黃　當歸　石膏

黃芩　桔梗　白术　白茯苓（各八分）

荊芥（三分）　甘草（三分）　山梔子（一分二釐半）

人參（二分）　滑石（一分七釐半）　芒硝（二釐半）

右用水二盞生姜三片煎至一盞去滓温服食後

漏蘆湯（精義）

治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧疔腫魚睛五發瘭疽初覺三日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱大便秘濇小便赤黃並宜服之惟姙娠忌服

漏蘆　白歛　黃芩（去黑心）　麻黃（去節）

枳實（去穰麩炒）　升麻　芍藥　甘草（炙各一錢）

大黃（二錢）　朴硝（一錢）

千金漏蘆湯（精要）治證同前

漏蘆　連翹　黃芩　白歛

枳殼（去穰麩炒）　升麻　粉草（炙）　麻黃（去根節各一錢）

大黃（一錢半濕紙煨）　朴硝（一錢別研）

右作一服用水一盞半煎至八分去滓空心熱服

解毒丸（通玄論）治中外諸邪熱毒癰腫瘡疽筋脉拘攣咬牙驚悸一切熱毒並宜治之（方見火類）

○已上諸方辛凉內疎之劑

內托復煎散（機要）癰疽托裏健胃

地骨皮　黃芩　茯苓　白芍

人參　黃芪　白朮　桂

甘草　防已　當歸（各一兩）　防風（三兩）

右㕮咀先以蒼朮一斤水五升煎至三升去朮入前十二味再煎至三四盞取清汁分三四次終日飲之又煎蒼朮滓為湯去滓依前又煎十二味滓分飲之

神效奪命丹（秘方）治一切發背疔瘡及破傷風陰証傷寒

枯礬（一錢）　蝸牛（二十箇焙乾）　血竭（二錢）　銅綠（一字）

蟾酥一錢　輕粉二錢　硃砂為衣（三錢）

右用小兒母乳汁和丸如梧桐子大硃砂為衣遇此病令患人自嚼生葱一二根爛吐出裹藥一丸在內吞下前藥恐藥未蘇逆之狀却以熱酒二三盃送如重車行十里路遍身汗出天氣斟酌衣被蓋易汗出毒氣腫自消如病人昏沉人代嚼葱白如前服

淵然真人奪命丹　專治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成者服之立愈此乃惡証藥中至寶病危者服之亦可矣萬無一失不可輕易

蟾酥（二錢乾者老酒化）　血竭一錢　乳香

沒藥　銅綠　硃砂（為衣各二錢）　輕粉半錢

膽礬　寒水石（叁錢）　雄黃三錢　射香半錢

腦子（半錢無亦可）　蝸牛（二十一箇連殼用）　蜈蚣（一條酒浸炙黃去頭足）

右為細末將蝸牛研作泥和前藥為丸如菉豆大若丸不就以好酒煮麪糊為丸每服只二丸先用葱白三寸令病人嚼爛吐於手心男左女右將丸子裹在葱白內用無灰熱酒三四盞送下於避風處以衣被蓋覆約人行五里之久再用熱酒數盃以助藥力發熱大汗出為度如汗不出重者再服二丸汗出即効初覺者二丸即

消三五日病重者再進二丸如疔瘡走黃過心者難治汗出冷者亦死如病人不能嚼葱擂爛裹藥仍以熱酒吞下瘡在上食後服瘡在下食前服後忌冷水黃瓜茄子油麪猪羊雞肉魚一切發風瘡毒等物及婦人洗換狐臭犯之難治

蟬酥丸（李俞南方）治一切諸惡瘡已發未發服之微汗即愈

雄黃　乳香（各一錢）　蟬酥（一重）

右三味用黃酒熱熔化糊為丸如菉豆大每服三丸葱白湯下不退再一服

托裏當歸散（精義）治腦疽發背穿潰疼痛

當歸　黃芪　人參　官桂

芍藥　甘草（炙）　生地黃（各二錢半）

右用水一盞半煎至一盞去滓溫服日進三服

內托散治一切惡瘡疼不可忍神効

甘草（半兩）　御米殼（半兩去頂蒂蜜炙）　乳香

沒藥（各二錢）

右為細末用雌雄黑豆十粒生姜半兩棗五枚水一大盞半同煎五七沸隨病上下食前後服

乳香散（本事方）治發背肉潰及諸惡毒衝心痛不可忍多

令人嘔吐

菉豆（四两）　乳香（好者一两）

右同研極細為末每服三錢新汲水濃調食後服

乳香護心散　治癰疽發背丁瘡預防毒氣攻心

菉豆粉（四两）　乳香（一两）　硃砂（一錢）

右為細末每服二錢濃煎甘草湯調下

一方　治癰疽無頭者

用蜀葵花子一粒新汲水呑下須臾即破如要多破服三四粒有驗

透膿散（端竹堂方）治諸癰瘡及貼骨癰不破者不用針刀一服不移時而自透累有効驗

蛾口蠒（川出了蛾兒蠒兒）

右将蠒兒一箇燒灰用酒調服即透切不可兩箇三箇蠒兒燒服若服一箇只一箇瘡口服兩箇三箇即兩箇三箇瘡口切莫輕忽

竹葉黃芪湯（精義）治諸癰疽發背煩渴及一切惡瘡發大渴者

淡竹葉（二分半）　生地黃（一两）　黃芪　黃芩（去腐）

當歸　川芎　甘草　芍藥

人參　麥門冬（去心）　半夏（湯洗）　石膏（各四分）

右用水一盞半竹葉五片生姜五片煎至一盞温服

內托千金散（瑞竹）治腦背癰疽乳便等惡瘡

人參　當歸　黃芪　芍藥

川芎　甘草　瓜蔞　白芷

官桂　桔梗　金銀花　防風（各七分半）

右用水二盞煎至七分入酒半盞去滓温服如痛甚者倍加當歸芍藥或乳香二錢日進三服一服之後瘡口內有黑血出者或遍身汗出皆藥之功効如病勢猛惡須秤藥一两水一大碗煎服未成膿者自散已成膿者不用針砭自透此藥累經功効

黃芪茯苓湯（精義）治諸瘡潰後托裏除虛熱

黃芪　白茯苓　官桂（去皮）　麥門冬

五味子　川芎（各一錢半）

右用水一盞半姜三片棗子三枚煎至一盞去滓温服食前日三服

內補十宣散（精要）治一切癰疽瘡癤未成者自消之已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不用針刀服藥後疼痛頓減其効如神

黃芪（鹽湯潤焙）　人參　當歸（各四錢）　厚朴

桔梗　桂心　川芎　防風

甘草　白芷（各七錢）

右為細末每服五錢熱酒調服不飲酒木香湯調下

內托散

綿黃芪　甘草　金銀花　牡蠣（煅淬二次各三錢半）

右為末作一服水一盞煎至七分入酒一盞再煎七分隨瘡上下食前後服

參蘇內托散（李俞甫方）

川芎　當歸　薄荷　甘草（各一錢）

紫蘇（二錢）　苦參（三錢）

右㕮咀用水二鍾棗二枚煎七分服不拘特

神效托裏散（和劑方）治癰疽發背腸癰妳癰無名腫毒焮作疼痛憎寒壯熱若傷寒不問老幼虛人並皆治之

忍冬草（五两去梗）　黃芪（五两去芦）　當歸（八两三錢）　甘草（炙八錢）

右爲細末每服五錢酒一盞煎至一盞病上食後病下食前少頃再進留滓外傅未成內消已成即潰也

○已上諸方辛溫內托之劑

一方　治癰疽發背初起

用獨蒜一片厚二指置患處以熱艾灸二七壯如無獨蒜大蒜亦可

南星膏（濟生方）治皮肌頭面上生瘡瘤大者如拳小者如

栗或軟或硬不疼不痛宜用此藥不可輙用針灸

天南星大者一枚細研稠黏滴好醋五七滴和膏如無生者則以乾者為末醋調如膏先將小針刺腫處令氣透却以膏攤紙上象瘤大小貼之覺痒則頻貼取効

消腫毒方（簡易方）專用塗諸瘡疽

川芎　蚌粉　草烏　海金沙

赤小豆　天南星

右為末用生地黄汁調塗患處

蜀葵膏（直指方）治癰疽腫毒

以黄蜀葵花用塩摻服入磁器密封經年不壞每用患處傅之如無花根葉皆可用

治發背未潰已潰最有神効（醫方大成）

厚朴（二錢薑汁製）　陳皮（二錢去白）　蒼术（五錢米泔浸）　甘草（二錢）

右入桑黄菰五錢同為末瘡已潰則乾摻之未潰則油調塗之

拔毒散　消腫定痛

蒲黄　白芷　半夏　黄丹（各一兩）

赤小豆（半兩為末）

右將半夏白芷為末入蒲黄黄丹豆末和勻金銀藤搗自然汁調傅四圍頻頻水潤腫退

拔毒膏李俞甫方治腫毒諸惡瘡神効

南皂角　五倍子（各五錢）　乳香　沒藥

雄黃（各二錢）

右五味各生用為細末用好醋熬貼瘡上留頂

乳香散　止痛消腫

乳香　沒藥　粉霜　輕粉（各一錢）

黃米粉（四两）　赤皮葱（一两）　蝸牛（十四箇三味一處砂鍋內炒黑）

右為末津調紅絹留孔貼周圍

敷腫毒未破者

右用蝦蟇一箇先炒石灰後用剝開炒研泥用絹攤上貼患處自破

拔毒散　治癰腫丹毒肉色變異或著四肢或在胷背遊走不定焮熱疼痛拔毒消腫散熱定疼

石膏（生一两）　寒水石（生三两）　甘草　黃蘗（各生两）

右為細末水調時復以雞翎刷掃以芭蕉自然汁調妙

水澄膏　治熱毒腫痛大効

黃連　黃柏　白芨　白斂（各四錢）

雄黃（一錢）　乳香　沒藥（各五分）

右為細末水調雞翎掃在瘡腫處

治一切惡腫及發背高起未破膏藥方

草麻子（一百粒）　男髮（一塊）

右以熬膏入黄丹成膏貼之只一箇便消加黄蠟少許

鐵箍散　治諸般發背瘡癤腫毒杖瘡

用芙蓉花及葉晒乾為細末以好醋調敷貼患處如杖瘡赤腫用雞弹清調貼冷水亦可加皂角少許尤妙

一方　治癰疽發背及悪腫毒

斂姜石（一斤出雄安清河縣）　野西瓜藤　茨菰葥（各四兩）

右為細末用雞清調敷患處如乾汲井花水勤掃妙

一方

用五葉藤即五爪龍搗爛敷患處立瘥

一方　治癰疽未潰

用瓜蔞根赤小豆等分為末以醋調敷之

一方　治發背癰疽丁瘡腫毒吸出膿血悪水此法甚佳

用苦竹筒三五七箇長一寸一頭留節薄削去青皮大小用之以蒼朮白斂烏桕皮厚朴艾葉茶芽白芨白蒺藜等分為粗末將竹筒并前藥水煑十數沸藥乾為度乘竹筒熱以手按上緊吸於瘡口上候膿血水滿自然脫落不然用手拔脫易換竹筒如此三五次其毒盡消即敷生肌藥肉滿後用膏藥即愈

一方

用蜂蜜同葱研為膏先將瘡口撥動或見血或不見血將藥塗在瘡上中留一孔以帛縛定如人行約五里其瘡覺疼更待多時其下自出然後敷生肌藥忌一切毒物

一方　治癰疽腫毒

用蒼耳根及葉燒灰存性同乾靛以醋和勻塗上乾易之不過十餘次拔出其根

一方

用景天草一名慎火草不拘多少擣爛取汁塗之

水澄膏　治熱腫毒疼痛

大黃　黃柏　鬱金　白芨

天南星　朴硝　黃蜀葵花（晒乾各一兩）

右為細末每服二錢以新水一鍾半攪勻候藥澄底去面上浮水取藥攤紙上貼於腫處如覺燥津唾潤之若皮膚白色者勿用　一方只用白芨末半錢水碗內沉下澄去水脚於皮紙上攤貼瘡上亦名水澄膏

圍藥　治諸般腫毒傅上消散

用黃柏白芨草烏南星白芷天花粉石膏鬱金甘草貝母大黃木鱉子皂角刺各等分為細末用雞清調傅神効加石灰尤妙

針頭散　治瘡疽臖腫如木硬者

蟾酥　射香各一錢

右同研極細以人乳汁調和如泥入甆合內盛乾不妨每用少許以唾津調敷於腫處更以膏藥貼之主毒氣自出不能為瘡雖成瘡亦輕

針頭散（通玄論）治惡瘡追毒去死肉

人言一錢　雄黃半錢　乳香一錢　射香少許

右為細末每用少許以唾塗瘡上用膏藥貼之

桃花散（通玄散）治一切惡瘡去死血生肌肉去風活血

龍骨　虎骨各二錢　白芨　白斂

烏魚骨　赤石脂　白石脂各一錢　黃丹少許

寒水石（用炭火燒赤放冷）一两六錢

右為細末量大小貼之立効

生肌散　治癰疽瘡毒斂口生肉

赤石脂　海螵蛸　龍骨各一两　乳香

沒藥　血竭各二錢　輕粉一錢　朱砂

鬱金　黃丹（飛過）　黃連　白芷各五錢

右為細末糝瘡口上用燈心數莖却用膏藥貼之

木香散　治瘡口久不斂者

木香　檳榔各一錢　黃連二錢

右為細末摻瘡上如痛加當歸一錢

紅玉散　一切腫毒癰疽生肌肉

用寒水石不拘多少以鹽泥包裹火煅黃丹少許水飛過用皮紙攤於火上烘乾為度研細末糝瘡上

洗毒散（通玄論）　治諸般惡瘡風濕陰蝕瘡並宜此洗之

用蛇床子地骨皮地丁麻黃荊芥防風枯礬各三錢

右用水三碗葱白三根煎至二碗無風處洗

軟青膏　治一切風熱瘡及小兒頭瘡

巴豆十箇　瀝青　黃蠟　香油各五兩

膩粉一錢

右先將瀝青香油黃蠟熬次入巴豆不住手攪候巴豆焦黑色去巴豆却入膩粉令勻放冷敷瘡上

神仙太乙膏　治八發癰疽及一切惡瘡軟癤不問年月深遠已成膿未成膿並宜貼之如蛇虎傷蝎螫犬咬并湯火刀斧所傷打撲跌損者無不可治如發背先以溫水洗瘡淨用無漿軟帛拭乾却用緋絹帛子攤膏藥貼之其膏藥可收十年不壞愈久愈烈可用磁罐盛之

玄參　白芷　川當歸（去芦）　肉桂（去麄皮）

大黃　赤芍藥　生乾地黃（各半兩俱剉）

右用麻油一斤浸春五日夏三日秋七日冬十日濾滓

油熬得所下黃丹半斤滴油在水聚為度

善應膏（應驗方）治一切癰疽腫毒發背腦疽漏瘰癧子金瘡便毒臁瘡及小兒頭瘡丹毒寒濕冷痺肢節疼痛手足頑麻打撲傷損　內胜瘀血蜈蚣蛟蝎螫婦人乳癰月閉敗血臍腹疼痛並用此拔散毒氣立効先須洗净瘡腫然後貼藥

黃丹（半斤水飛）　沒藥　乳香（各二錢半）　白歛

木鱉子（去皮）　白芨　當歸　官桂

杏仁　白芷（各二錢）　血竭（一錢二分半）　槐枝（一兩二錢半）

柳枝（一兩二錢半條三十）　真麻油（一斤四兩）

右件十味內除丹乳沒竭外七味剉碎入油浸三日文武炭火鍋內熬黃色濾出麄藥方下黃丹以新柳枝長五六寸如小錢大攪勻令熬丹褐色搬下鍋子在地却用柳枝攪藥出盡烟方入乳香沒藥血竭入鍋內仍用柳枝攪勻三五十遍候藥冷傾在甕器內盛春三月間合如常貼用

千槌膏　治一切無名惡瘡

萆麻仁（四十九粒）　杏仁　山豆仁　胡桃仁（各四十九箇）

楓香脂（四兩）　加乳香沒藥各二錢半

右為一處槌一千下成絲者新水拔之為度

乳香善應膏　治癰疽發背諸般惡瘡打撲傷損筋骨疼痛並皆治之

乳香　沒藥　血竭（各五一錢）　阿魏二錢

射香（一錢另研）　大黃　黃連　黃栢

防風　荊芥　芍藥　白芷

玄參　當歸　連翹　巴豆

蘇木　大楓子（各一兩）　木鱉子（八箇）　川山甲（八片）

黃丹（一斤水飛過）　槐桃柳嫩枝（各二十寸）　清油（二斤）

右除乳香等五味另為末將其餘藥剉碎入清油內煎令黑色濾去渣入黃丹不住手攪成膏（却入）前五味藥末再攪令匀攤貼患處

青金九龍膏　治癰疽瘡毒

香白芷（如棗大者）　巴豆（去殼）　萆麻子（去殼）

木鱉子（去殼各一百二十箇）　槐條　柳條（各一百二十寸）

乳香　沒藥（各三錢）　白礬（五錢）　黃丹（二十兩）

香油（三斤）

右將前藥同香油煎以槐柳條不住手攪滴水中成珠方濾去渣再煎却下黃丹攪匀將白礬逐時入內後下乳香沒藥攪匀務要（煎熬）得法然後收貯攤貼忌婦人雞犬見之

千捶膏

瀝青（一斤六兩）　杏仁（四十九箇）　乳香　没藥（各一兩）

輕粉（二錢）　香油（五兩）　黄蠟（四兩）

右將瀝青香油黄蠟同鎔化攪勻却入前四味取出於石上捶千餘下用紅絹攤貼之

緑膏藥　治諸般惡瘡腫毒軟癤

銅青　草麻子（去殼各一兩）　松香（四兩）

木鱉子（去殼五十箇）　杏仁（五錢）　巴豆（五箇）

乳香（二錢）　輕粉（五十貼）

右各為末搗令勻於淨石上用斧搥千餘下成膏收貯水浸旋用

紅膏藥　治臁瘡及諸瘡毒湯火金瘡等傷

黄蠟（一兩）　香油（三錢）　黄丹（半兩）

右先以黄蠟鎔化次下香油黄丹攪勻再熬以甆罐收貯臨用攤貼

妙應膏　治瘰癧一切惡瘡腫毒及杖瘡

桃柳槐枝（各半斤）　當歸（一兩）　木鱉子（去殼半兩）

黄丹（一斤）　乳香　没藥（各半兩另研）

右先將香油三斤慢熬次下桃柳槐枝木鱉子當歸候焦濾去渣待冷方下黄丹乳香没藥以槐條攪勻再以

慢火麥不住手攪滴水成珠不散為度以磁瓶收貯旋攤用

○已上諸方外消之劑

忍冬酒　癰疽發背初發不問何處或眉或顋或頭或項或腰或脇或手足及婦人乳癰當服此藥神效

忍冬藤（五兩搥碎不可犯鐵器）　大甘草節（一兩生用）

右同入砂罐內以水二碗文武火慢煎至一碗入好酒一大碗再煎數沸去滓分作三次溫服一日一夜喫盡如病重一日一夜要服兩劑候大小腸通利則藥力到若無生藤乾者亦好若取忍冬葉研爛入白酒少許調和敷疽瘀四圍中留一口洩其毒氣亦妙

遠志酒（三因方）治一切癰疽發背癤毒

用遠志一味洗淨去心焙乾為末酒調二錢澄清服之以渣傅患處

一醉膏（楊氏家藏方）治發背發腦一切惡瘡

甘草（半兩為粗末）　沒藥（研二錢半）　大瓜蔞（一枚去皮）

右用無灰酒二升煮至一升放溫頓服如一服不盡作三次

一方　治癰疽發背疔瘡

野紅花（即小薊草）　五葉草（即五爪龍）　豨薟草　大蒜（一箇）

右擂爛用好熱酒一椀調汁服之立効

一方　治發背癰疽惡瘡丁腫疥癬及遍身生瘡如蛇頭用生白礬一兩為末黃蠟七錢鎔開和勻為九如梧桐子大每服十九至二三十九不拘時米飲送下溫熟水亦可如瘡未破則內消如巳破則便合若服金石藥中毒宜服此藥最妙欲治咳嗽化痰用人參五味子湯臨臥呑下

一方　治癰疽疔腫惡瘡及黃疸

用茨菇蓮根同蒼耳草等分搗爛以好酒一鍾濾汁溫服若以乾末每服三四錢溫酒調服

一方　治癰疽瘡毒一切惡瘡

豨薟草一兩　蚕繭七箇（燒）　乳香一錢

右為末每服二錢熱酒調服如毒重連進三服得汗妙

○已上諸方專治之劑

救苦散（和劑方）治便癰疽冷物

大黃　桔梗　金銀花　黃耆

甘草　梔子　紫花地丁（各等分）

右㕮咀每服一兩酒半碗煎隨瘡上下服

五聖散（聖惠方）治症同前

瓜蔞一箇　生姜一兩　大黃一兩　皂角刺二兩

甘草　金銀花（各一兩）

右㕮咀每服一兩水酒各一盞煎至一盞去滓露一宿空心服

又方　治症同前

猪牙皂角（七箇燒存性）　梔子（七箇燒）　川山甲（七箇燒）

油胡桃（七箇燒）

右為末作一服空心調下用酒

又方　治症同前

木鱉子（七箇去殼）　甘草　荊芥　當歸尾（各一兩）

右㕮咀水酒煎露空心服併進三服成膿亦散　一方鼠黏子二錢炒細末入蜜一匙净朴硝一匙温酒空心服亦効　一方蜈蚣三條搗碎好酒調服有膿即散

一方牙皂為末南星生姜搗乘温貼上

又方　治症同前

大黄　梔子　貝母　川芎

白芷　牡蠣　大瓜蔞　當歸

右煎法如前

又方皂角膏

皂角（炒焦）　韶粉

右等分和匀以熱炒醋調仍以紙攤患處貼頻頻以水

潤之即効

治便毒　不問日久有膿者其効如神

大黃　梔子　木鱉子（去殼）　皂角

牡蠣　地丁　連翹　甘草（各一兩）

右㕮咀酒水煎露一宿空心服之以利為度

治毒散（聖惠方）治便毒

當歸　甘草　大黃（各五錢）　金銀花（少許）

右㕮咀水酒各一盞煎至一盞去滓露一宿溫服之

消毒飲　治便毒初發三四日可消

皂角刺　金銀花　防風　當歸

大黃　甘草　瓜蔞仁（等分）

右㕮咀水酒各半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮立効

〇已上諸方治便毒之劑

丹溪心法

〇腸癰　大腸有痰積死血流注　桃仁承氣湯加連翹秦艽　近肛門破入風者難治防風之類

附脉理

脉訣舉要曰腸癰難知脉滑可推數而不熱腸癰何疑遲緊未膿下以平之洪數膿成不下為宜

附諸方

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

桃仁承氣湯（見吐血）

復元通氣散（拔粹方）治諸氣澁耳聾腹癰便癰瘡疽無頭

止痛消腫

青皮　陳皮（各四兩）　川山甲（炮）　瓜蔞根（各二兩）

加金銀花（一兩）　連翹（一兩）　甘草（三兩生熟各半）

右為細末每服二錢熱酒調下

治腹内癰腫

大黄（一兩取末四錢半）　破故紙（一兩取末二錢）

牛旁子（一兩取末一錢）　牽牛（一兩取末二錢半）

右和作一服蜜水調空心服以利為度

丹溪心法

○乳癰　乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養忿怒所逆鬱悶所遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅不得通而汁不得出陽明之血沸騰故熱甚而化膿亦有所乳之子膈有滯痰口氣焮熱含乳而睡熱氣所吹遂生結核於初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可消散失此不治必成癰癤治法疎厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行汙濁之血以生甘草之節消腫導毒以瓜蔞子或加沒藥青橘葉皂角刺金銀花當歸或湯或散或加減隨意消息然須以少酒佐之若加以艾火兩三

壯於腫處其効尤捷不可輙用針刀必至危困若不得於夫不得於舅姑憂怒鬱悶昕夕積累脾氣消阻肝氣橫逆遂成隱核如大棊子不痛不痒數十年後方爲瘡陷名曰妳岩以其瘡形嵌凹似岩穴也不可治矣若於始生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治法亦有可安之理

入方

乳癰方

青皮　瓜蔞　橘葉　連翹

桃仁　皂角刺　甘草節　如破多加（參芪）

右以水煎入酒服

乳癰妳勞焮腫

石膏（煅）　樺皮（燒）　瓜蔞子　甘草節

青皮

右以水煎服

治乳有核

南星　貝母　甘草節　瓜蔞（各一兩）

連翹（半兩）

右以水煎入酒服

又方

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C

人參　黃芪　川芎　當歸

青皮　連翹　瓜蔞　白芍

甘草節　（乳岩小破加柴胡川芎）

右以水煎入酒服

乳硬痛

沒藥一錢　甘草　當歸各三錢

右作一服水煎入酒少許熱飲

吹妳

金銀花　天蕎麥　紫葛藤等分

右以醋煎洗患處立消如無下二物只金銀花亦可

乳栗破　少有生必大補

人參　黃芪　白朮　當歸

川芎　連翹　白芍　甘草節

右以水煎服

附諸方

秘傳湧泉散（應驗方）治乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡凝滯妳乳脹痛或作癰腫

王不留行　白丁香　漏蘆　天花粉

白殭蚕　川山甲（火煆黃色各七錢）

右為細末每服四錢用豬蹄湯調下

秘傳金銀花散（應驗方）治乳脉不行結成癰腫疼痛不可忍者

金銀花　當歸　黃耆（蜜炙）　甘草（各二錢半）

右作一服水二鍾煎至一鍾入酒半鍾去滓溫服食後

橘香散（聖惠方）治乳癰未結即散已結即潰極痛不可忍者藥下即不痛神効葢因小兒吹乳變成

陳皮（不拘多少湯浸去白晒乾麫炒黃）

右為末射香研酒調下二錢

治婦人吹乳竒效

用大車頭邊油垢圓如梧桐子大每服五十丸溫酒下

勝金丹　治吹乳

用百齒霜即梳上髮垢是也丸如梧子大黃丹為衣每服三丸倒流水送下服後如患左乳左卧右乳右卧溫覆出汗倒流水者取水傾屋上流下是

瓜蔞散　治乳癰妳勞

瓜蔞（一箇去皮焙）　甘草（生三錢）　乳香（一錢另研）　當歸（酒浸焙半兩）

沒藥（二錢另研）

右用無灰好酒三升銀石器內慢火熬取一升清汁分作二服飲之

通和湯　治乳癰疼痛不可忍者

穿山甲（炮）黄川木通（各一兩）自然銅半兩醋淬七次

右為細末每服二錢熱酒調食遠服之

一方　治乳癰無名腫毒初起

用五葉藤（即五爪龍）不拘多少生姜一塊好酒一椀擂爛去滓熱服汗出為度仍以渣敷患處

一方

用新栢葉去枝梗一握洗凈以朴硝一勺同入臼内杵之旋加清水細取自然汁半碗先令病人飲三兩口仍用雞翎蘸汁掃於患處中間留一眼四邊頻頻掃之其腫自消

一方　用生地黄擂汁塗之一日三五次立效

○廣毅丹溪云癰疽之証陽滯於陰脉浮洪弦數陰滯於陽脉沉細弱濇陽滯以寒治之陰滯以熱治之此乃治癰疽之大法也請陳其旨夫所謂陽者氣也鬱而爲火無形之物也陰者血也鬱而爲痰有質之物也陽無形故浮而在表浅而大所謂癰也陰有質故沉而在裏深而惡所謂疽也癰脉浮洪弦數陽之象也疽脉沉細弱濇陰之象也癰屬氣滞於血疽屬血滞於氣總而言之皆是熱勝血也治癰以寒藥是正治之法也治疽以熱藥是從治之法也夫藥性熱則

開行性寒則踈泄瘡乃有形之陰非熱藥從治豈能開行之乎此古人用藥內踈內托乃正治從治之義也

疔癧　七十八

丹溪心法

〇疔癧用針刀鏃破頭上以蟾酥敷之後用菉豆野菊末酒調飲醉睡覺即痛定熱除不必去疔自愈也　治一切疔瘡用紫梗菊花根莖葉皆可研碎取汁滴口中飲之

〇瘰癧　血氣痰熱　以牡蠣煅過為末玄參搗膏為丸

桑椹黑熟者搗汁熬膏湯調服紅者晒乾為末湯調服

師云大田螺連肉燒灰存性為末入射香少許濕則乾敷乾則油調敷　夏枯草大能散結氣而有補養血脉之功能退寒熱虛者儘可倚仗若實者以行散之藥佐之外施艾灸亦漸取効

入方　治瘰癧

海藻（洗去沙土曬乾）昆布（洗去土同上二味先研為末）何首烏（木臼搗為末）

皂角刺（炒令紫色）公蛇退一條（掛上或墻上是雄用平地上者是雌）

右五味為細末和勻一處看項下刀口肉燒熟蘸前藥末吃食後倒患處眠一伏時每核灸七壯口中覺烟起

為度膿盡即安初生起時灸曲池男左女右

附諸方

寶鑑保生挺子　治疔瘡背疽瘰癧一切惡瘡

金脚信　雄黃　硇砂（各二錢）　麝香（一錢）

輕粉（半大匣半大匙）　巴豆（四十九粒文武火炒研）

右為極細末用黃蠟五錢溶開將藥合成挺子冷水浸少時取出旋丸捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥開安一餅子次用神聖膏貼後服托裏散若瘡氣入腹危者服破棺丹

神聖膏　治一切惡瘡

當歸　藁本（各半兩）　沒藥（二錢）　黃丹

黃蠟（各二兩）　乳香（一錢）　琥珀（二錢半）　膽礬

粉霜（各一錢）　白膠香（三兩）　清油（二斤）　木鱉子（五十箇去皮）

巴豆（十五箇去殼）　槐枝　柳枝（各一百二十條）

右件一處先將槐枝柳枝下油內熬焦取出不用後下餘藥熬至焦黑亦漉出不用將油澄清下黃丹再熬成膏用緋帛攤之立效

千金托裏散　治疔瘡發背一切惡腫

官桂　人參　甘草　川芎

白芷　芍藥（各一兩）　木香　沒藥（各三錢）

乳香（二錢）　當歸（半兩）　連翹（一兩二錢）　黃芪（一兩半）

防風　桔梗　厚朴（各二兩）

右十五味爲細末每服三錢酒一盞煎三二沸和渣溫服無時

破棺丹　治瘡腫一切風熱

大黃（二兩半生半熟）　芒硝　甘草（各一兩）

右爲末煉蜜丸如彈子大每服半丸食後茶清溫酒任化下童便半盞研化服亦得忌冷水

○已上數方治疔瘡次第之劑

蟾酥丹（危氏方）　治疔瘡

蟾酥（不拘多少）

右以黃丹白麪等分搜和為丸如麥粒大針破疔瘡以一粒納之　又方單用蟾酥每用粳米大重針瘡口納入輕者不須針用水澄膏用白芨末半錢水盞內澄去水脚於皮紙上攤開貼瘡上　聖惠方取蟾酥油調封瘡口立效

蟬蛻散（聖惠方）　治疔瘡最有功效

蟬退殼　白殭蚕（各等分）

右爲末酸醋調塗四圍留瘡口候根出稍長然後拔根出再用藥塗瘡一方不用醋只用油調塗　一方用蟬

蛻為末蜜水調半碗服之及以津唾調搽瘡上即愈

一方　治疔腫初發

用蒼耳根莖苗子一色者燒灰為末用醋泔調塗瘡上毒根即出或藍靛（汁調）好　一方用蒼耳草一大握生姜四兩同研爛入生頭酒一碗去渣熱服大汗即愈仍用渣傅瘡

回生錠子（精義方）治疔瘡

草烏（去皮尖十二兩）　射香（一字用當門子）　蟾酥（七粒粳米大）　巴豆（七粒去皮）

右為末麪糊丸作錠子如有疔瘡先針刺至痛見血用此錠子紝入用膏藥貼之重者於疔瘡四面紝之三二箇引根自拔下藥最宜豎用

立馬回丁丹　治疔瘡走黃不止

金脚信　蟾酥　血竭　硃砂

沒藥（各五分）　輕粉　片腦　射香（各等）

右為細末生草烏頭汁為錠如麥子長大用時將瘡頭刺破納入一錠第二日瘡腫為效以膏藥貼之

雷楔　一名紫金錠子　治疔瘡諸惡腫毒

續隨子（五兩）　川烏頭　芉草（各二兩）　蟾酥

雄黃　白礬（各一兩）　射香（二錢半）　辰砂（一兩五錢）

片腦（二錢）　人言　輕粉（各五錢）　桔梗（一兩五錢）

黃連（一兩三錢） 白丁香（三錢） 巴豆（四十九粒去殼去油心膜）

右爲細末再入乳鉢內投蟾酥巴豆同研勻麪糊丸成錠子如指彈大陰乾如遇諸瘡以井花水磨塗瘡上如乾再搽

飛龍奪命丹（秘惠方）治一切惡疔瘡

人言（二錢半） 斑猫（十二箇去足翅） 巴豆（十二箇去殼油） 硃砂（三錢）

硇砂 硼砂 乳香 沒藥

黃丹（各二錢） 南星（米泔浸） 半夏（水洗各一錢） 血竭（二錢）

射香（一錢二分半）

右爲末蟾酥汁爲丸如紅豆大五分內分一分加入斑猫四箇然後捻成錠子如小麥大每一瘡針破下一錠子用飯粘白紙封口用前四分內一丸噙在舌上覺麻涼水吞下忌熱物片時如蟾酥乾用人乳汁化開一方加雄黃二錢

○已上數方疔瘡外治之劑

一方 治疔瘡

用白芷二錢生姜一兩同擂爛熱酒一碗調服出汗立効

鐵桂杖 治疔瘡發背頭風

用草烏頭不拘多少去皮淨為末用葱白去鬚葉搗爛

為丸如豌豆大以雄黄為衣每服一丸先將葱細嚼熱酒送下或有惡心吐三四口用冷水一口止之即卧以被厚葢汗出為度

返魂丹（瑞竹）治十三種疔瘡

硃砂　膽礬（各一錢半）　血竭　銅緑
蝸牛　雄黄　白礬（枯各二錢）　輕粉
沒藥　蟾酥（各五分）　射香（少許）

右將七味為末和搏將蝸牛蟾酥極爛和藥時旋入藥内為丸如雞頭大每服一丸令病人先嚼葱白三寸吐在手心將藥丸裹在葱白内用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出即瘥如不能嚼葱研爛裹藥下曾有一僧貨此藥極有効予旨合救人累獲效驗真妙方也

守金丹　治疔瘡　又名返魂丹再生丹延命丹延壽丹來甦丸得道丸此藥嚥下即活

辰砂（二分半）　蟾酥　輕粉（各五分）　枯礬
寒水石　銅青（各一錢）　海羊（二十箇即蝸牛）　射香（一字）

右為末研蝸牛一處搗爛丸如菉豆大難丸添酒成之病輕者二丸重者三丸未效再服服法先嚼葱白一大口極爛置手心中放藥在内裹熱酒下煖處卧汗出即愈忌冷水

〇已上數方疔瘡辛温內托之劑

治魚臍疔瘡（醫方大成）

蔙刺葉（即絲瓜葉） 連鬚葱 韭葉

右入石鉢內研末如泥以酒和服以滓貼腋下如病在左手貼左腋下在右手貼右腋下在左脚貼左胯在右脚貼右胯如在身中則貼心臍並用帛縛住候肉下紅線處皆白則可爲安如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其顛倒倒則難救矣

一方　治疔瘡

用菊葉一握搗爛取汁灌入口即活用根亦妙

一方　治疔瘡

土蜂房（一窠全） 蛇蛻（一條全）

右作一處納瓦器中以黃泥封固火煆存性研為細末空心酒調服一錢少頃腹中大痛痛止其瘡化爲黃水仍服五聖散

五聖散

大黃 生薑 金銀花 甘草（各一兩）

瓜蔞（一箇） 皂角刺（二兩）

右㕮咀每服一兩用好酒二盞煎至一盞温服

破棺丹（瑞竹） 治疔黃走畢不止

甘草　京三稜（各二錢）　山梔子　牽牛（各一錢半）
地丁　連翹　金銀花　牡蠣（各一錢半）
瑞竹堂加大黃（三錢半）　赤芍藥　當歸（各二錢）

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸用童子小便化開服之食前忌酒并生冷硬物

治疔瘡（醫方大成）

黃連　羌活　白姜蚕　青皮
獨脚茅　防風　赤芍藥　獨活
蟬蛻　細辛　甘草節（各等分）

右㕮咀每服五錢先將一服入澤蘭葉少許姜一兩同研爛熱酒和服然後用酒水各半盞姜三片煎服熱不減後再加大黃少許煎服畧下一兩湯瀉去餘毒更用白梅蒼耳子研末貼瘡上拔去根脚此方以藥味觀之甚若不切然效驗神速累試之驗

〇已上數方疔瘡平涼内踈之劑

連翹丸（濟生方）治瘰癧結核已破或未破者

薄荷（新者二升搗取汁）　皂角（一挺水浸去皮搗取汁）

以上二味一處於銀石器内熬成膏次入

青皮（一兩不去白）　皂角子（慢火炮去皮取皂子仁搗羅為末半兩）
陳皮（一兩不去白）　連翹（半兩）　黑牽牛（一兩半半生半炒）

右五味為末用前膏子爲丸如梧桐子大每服二十丸煎蓮翹湯食前送下

治瘰癧（楊氏家藏方）

斑猫（二十八箇去頭翅足用糯米炒）　荊芥穗　僵蚕

黒牽牛（各二錢）

右為末臨睡時先將滑石末一錢用米飲調服半夜時再一服五更初却以温酒調藥一錢服訖如小便無惡物行次日早再進一服又不行第三日五更初先進白糯米稀粥湯却再進前藥一服更以燈心湯調琥珀末一錢服之以小便内利去惡毒乃爲愈矣

一方　治瘰癧（張子和方）

白殭蚕（去絲直者）　白丁香（直佳）　斑猫（去翅足）　磨刀泥

苦丁香　赤小豆（各等分）

右爲末十歲以上每服一錢二十歲已上服二錢病人不要吃晚飯五更時用新汲水一盞調服至辰時見効男子大便中女人小便中利下赤白色二三次或膿血如鼠狀爲効當日食粥不得吃別物忌油膩患三四年者只一服七八年者再一服

冠効散　治癧子瘡

官桂　硇砂（各半錢）　赤小豆　粳米（各四十九粒）

斑猫（四十九箇不去翅足）

右五味研為末初服一字次服二字次服三字次服四字煎商陸根湯送下空心服小便淋瀝為效如惡心嘔吐黃水無妨瘰癧日日自消矣

無比丸　治瘰癧

白朮　梹榔　防風　牽牛（半生半熟）

蜜宅僧　郁李仁（炮去皮）　斑猫（糯米炒各等分）

右為末麪糊丸如梧桐子大每服二十丸空心臨卧甘草梹榔湯送下至一月後覺腹中微痛於小便中取下癧子毒如魚眼大已破者自合未破者自消有驗

一方　治瘰癧

用斑猫一兩去翅足以粟米一升炒黃色去米細研入薄荷末四兩以雞彈清丸如菉豆大空心臘茶湯下一丸每日加一丸加至五丸每日減一丸減至一丸又每加一丸加至五丸後每日仍服五丸

一方　治瘰癧

用烏雞彈一箇頂上開一竅攪清黃令勻以斑猫一箇去頭翅足入（雞）彈中以細糊封之飯上蒸熟剝去殼去斑猫空心喫雞彈一日一箇以瘥為度

一方　治瘰癧

雄黃　欝金（各五錢）　巴豆（去油皮半錢）　斑猫（去頭翅足糯米炒七箇）

右為末麪糊為丸如菉豆大每服五七丸臨卧以冷茶清送下

五香連翹湯（精要）治一切惡核瘰癧癰疽惡腫等病

舶上青木香　沉香　乳香

丁香　射香　升麻　獨活

桑寄生　連翹　射干　木通（去節各七分）

大黃（蒸一錢）

右用水二盞煑取一盞以上去滓取八分清汁空心熱服半日以上未利再喫一服以利下惡物為度未生肉前服不妨以折去毒熱之氣本方有竹瀝芒硝恐泥者不能斟酌故缺之知者自當量入一方有黃耆藿香無獨活射香一名五香大黃湯

玉燭散　治瘰癧和血通經服之自消日進一服七八日助效（方見婦人門）

東垣升陽調經湯　治瘰癧遶頸或至頰車此皆出足陽明胃經中來若瘡深遠隱曲肉底是足少陰腎經中來乃戊脾傳於癸腎是夫傳與妻俱作塊子堅硬大小不等並皆治之或作丸亦可

升麻（八錢）　葛根　龍膽草（酒製）　酒芩

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

莪朮（酒洗炒） 三稜（酒炒） 甘草（炙） 黃連（酒洗）
連翹 桔梗（各三錢） 生黃芩（四錢） 歸稍
芍藥（各三錢） 黃栢（酒炒二錢） 知母（酒洗炒一兩）

右另秤一半作末煉蜜為丸菉豆大每服百餘丸一半作㕮咀每服五錢若能食大便硬可旋加至七八錢水二盞先浸半日煎至一盞去滓臨卧熱服足高去枕仰卧噙一口作十次嚥下留一口在後送下丸藥服畢其卧如常

○已上數方療瘰癧內消之劑

太乙膏 治瀝子瘡神効

腦子（研一錢） 輕粉 乳香（各二錢研） 射香（三錢研）
沒藥（研四錢） 黃丹（五兩）

右用清油一斤先下黃丹熬用柳枝攪又用憼兒葱七枝先下一枝熬焦再下一枝葱盡為度下火不住手攪覷冷熱得所入腦子等藥攪勻磁器盛之用時旋攤

一方

用瀝青萆麻子去殼同研成膏先用葱椒湯洗瘡凈以紅絹攤膏貼患處

一方

用石灰一塊自辰時晒至午時將瀝青搥細杏仁四十

粒萆麻子十四粒同搗成膏依前攤貼

一方

用白膠香一兩磁器內鎔開去滓再鎔以萆麻子六十四粒研爛入膠內更入油半匙攪勻滴水中試軟硬得所量瘡大小以緋帛攤貼先以葱椒湯洗瘡淨後貼一膏可治三五瘡并治惡瘡軟癤皆効

一方

用荆芥煎湯待冷洗瘡淨揀黑紫處以針刺破却用雄黃樟腦為末清油調搽三四次候黃水出處仍取木蜆蚯蚓糞如雞彈大一塊火內燒紅川山甲九片或十一一片微炙為末入乳香沒藥少許香油調搽妙

一方

梧桐淚（一錢半）巴豆（去皮油）皂角刺（各一錢）

右為末於淨室中勿令人見以不語唾調和捻成錠子如黃虫糞大陰乾每用先刺開瘡入藥一錠已潰者就內入藥用紙封之勿令透氣待膿水出或有硬塊在內擠出惡物瘡口自歛即愈忌生冷油膩葷腥麪食

又方

以羊骴䯓燒灰末摻未破香油調傅已破乾摻

又方

用夏枯草不拘多少於鍋內煑爛除草將汁熬膏貼之

治項上生瘰癧瘡未破灸法

以男左女右中指屈過用草量中節橫紋名爲同身寸量三寸半為則於手板盡處量三寸半臂中立穴灸兩三壯半月瘡處木如泥惡物盡膿流出後以膏貼之妙

○巳上數方瘰癧外散之劑

諸瘡七十九

丹溪心法

○金瘡　五倍子紫蘇等分

又方　白膠香三錢龍骨一錢

金瘡狗咬

五月五日午時用陳石灰一斤搗為末韮一斤搗汁和成餅陰乾為細末敷之

治陽證腫毒幷金瘡

大粉草剉碎用竹筒一段割去青兩頭留節節上開一竅入粉草在內滿後用油灰塞孔竅從立冬日放糞缸內待立春先一日取起竪立在有風無日陰乾二十一日多最好卻破竹取草爲細末用傅金瘡乾者水調

附諸方

花蕊石散（和劑方）治一切金刃所傷打撲傷損身體出血者急於傷處摻藥其血自化為黃水（方見損傷類）

一方　治金刃所傷一切臁瘡長馬斷梁等瘡

用冬月黑牛膽一箇裝新石灰四兩白礬一兩陰二十七日待乾取出再用黃丹一兩另炒紫色研細同一處再研勻敷瘡即差

刀箭藥　治金刃跌撲狗咬湯火所傷

端午日採一去草花蘆擇嫩者搗爛量入舊石灰搗極勻或丸或餅陰乾研爲末濕則摻之乾則油調搽

一方　用初生小鼠同石灰搗勻陰乾傅金刃跌撲出血甚妙

如聖散（秘方）治一切金刃所傷血不止牙關緊急皆治大有效驗

香白芷　川芎　防風（去芦各五錢）　細辛（五錢）

雄黃（一錢半）　蒼朮（米泔浸一宿去皮二兩）　草烏（去皮臍四兩）

兩頭尖（去皮臍四兩）

右爲極細末血不止乾貼破傷風牙關緊急用熱酒一盞調服一錢又貼破處風牙疼乾擦之流涎即愈狗咬蛇傷煎鹽湯洗淨乾貼用熱酒調半錢服如重車行五

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

里並服三服如重服一錢小兒量力裁服多年不效惡瘡煎葱白塩湯漿水口漱洗去膿血一二次拭乾貼一切蜂蝎小虫所傷唾調於痛處貼之婦人產後敗血上衝下注熱酒調服一錢忌腥葷麪食油膩之物

丹溪心法

○湯火瘡　臘月猪胆塗黃栢炙乾爲末付之

湯澆　以淋了第二次灰柤付患處

火澆

桐油二錢　水二錢

右二件以挑柳枝不住手攪成膏再入少水潔外用猫兒肚底毛細剪摻上

附諸方

治湯火傷未成瘡者

用小麥炒黑為度研為末膩粉减半油調塗之

赤石脂散（經驗方）　治湯火所傷赤爛熱痛

赤石脂　寒水石　大黃（各等分）

右爲末以新汲水調塗傷處

治湯火所傷

用大黃當歸各等分為末以清油調傳之温則乾摻之

氷霜散　治火燒損傷熱油澆傷皮爛肉大痛

寒水石（生）　牡蛎（煅）　明朴硝　青黛（各一兩）

輕粉（一錢）

右爲末新水調或油調濕貼乾則痛處即止如神

治火傷

凡被火傷急向火炙雖極痛強忍一時即不痛慎勿以冷物激之熱不出爛人筋肉

一方　治火傷

以杉木皮燒灰存性爲末温用乾摻乾用雞清調塗

治湯盪火燒瘡立効

用擣猪毛燒灰香油搽患處

四黃散（瘡寮）治湯盪火燒熱瘡連痛

大黃　黃連　黃蘗　黃芩

白芨（各等分）

右爲末水調成膏以雞翎時塗瘡上

治湯火瘡（瘡寮方）

用螺螄殼多年乾白者火煅爲末如瘡破用乾摻之如不破輕粉清油調傅之

丹溪心法

○下疳瘡

蛤粉　蠟茶　苦參　蜜陀僧

右為末河水洗浄臘猪油調傅　兼治臁瘡

又方

米泔水洗瘡浄用頭髮以盐水洗浄去油再用清湯洗晒乾燒灰傅瘡上即時生靨

附諸方

治下疳

用黄栢以磁礶割下細末同蛤粉末等分掺上即愈（盖）黄栢去熱蛤粉燥濕故也

又方

用米泔水洗瘡浄以雞肶胵内黄皮焙乾為細末傅之

又秘方

用透明白膠香為末入輕粉射香少許乾掺乾則用油調傅之

立効方（瑞竹堂方）治下疳

燈草灰入輕粉射香少許乾貼

治下疳（秘方）

旱田螺燒灰　腦子　射香　輕粉少許

右爲末香油調傳患處即愈

下疳藥（聖惠方）

用五倍子爲細末先以漿水洗浄瘡乾貼

治下疳妬精瘡（秘方）

七月七日採鳳眼草燒灰淋水洗之

聖粉散　治下注疳瘡蝕臭腐爛疼痛不可忍者

黄栢（蜜炙）　蜜陀僧　黄丹　高末茶

乳香（各三錢）　輕粉（一錢半）　射香（少許）

右為末用葱湯洗瘡後次貼此藥兼治小兒疳瘡

下疳瘡洗藥

黄連　黄栢　當歸　白芷

獨活　防風　朴硝　荆芥

右等分水煎入銅錢五十文烏梅五箇塩一匙同前煎温洗五日五七次用下藥敷

木香　檳榔　黄連　銅青

輕粉　枯礬　螵蛸（各等分）　射（少許）

右爲極細末洗後至夜敷上

黄連散　治下疳

黄連　黄栢（各二錢）　蜜陀僧　輕粉

黄丹　沒藥（各五分）

右爲細末瘡温乾搽瘡乾香油調搽

射香杏仁散（宣明方）　治婦人陰瘡

杏仁（不拘多少燒存性）　射香（少許）

右爲細末如瘡口深用小絹袋子一箇盛藥滿繫口臨上藥灸熱安在陰內

丹溪心法

○癬瘡

一 防風通聖散去硝黃加浮萍皂角刺　又紫蘇樟腦

蒼耳浮萍煎湯洗

又方

浮萍一兩　蒼耳一兩　蒼朮一兩　苦參一兩半

黃芩半兩　香附二錢半

右用酒糊爲丸

又方

蘆薈　大黃　輕粉　雄黃

蛇床子　槿樹皮　檳榔

右爲末先刮癬後用米醋調藥末塗之

又方

蘆薈（研）三錢　江子（去殼十四粒）　草麻子（去殼十四粒）

斑猫七箇（去翅足）　白蠟

右以香油二兩熬江子草麻斑猫三藥以黑爲度去藥入蠟并蘆薈末在內用磁罐盛貯微微刮癬令破以油塗上過夜畧腫即愈

附諸方

碧玉散　治癬

銅綠　硼砂　白礬（各等分）

右為細末香油調搽

桎皮散　治頭面荷葉癬

用川桎樹皮為末醋調湯頓如膠敷上候癬瘡抓破再搽數日即愈

連粉散　風癬温瘡癤皆治之

黃連（一錢）　輕粉（五分）　膩粉　黃栢

黃丹　枯白礬（各一錢）　龍骨　芦甘石（各五分）

右為細末每用少許温則乾搽乾則香油調搽

如聖散　治疥風癬瘡

蛇床子（一兩）　黃栢　苦參　蔄茹（各五錢）

白礬　狗脊　藜芦　剪草（各二錢半）

輕粉（一錢二分半）　胡粉（三錢）

右為細末清油調搽

白礬散（聖惠方）治遍身生癬日久不愈上至頭面

用獨莖羊蹄根別搗白礬為末一處以極酸米醋調抓破搽藥候痒極至通即止隔日治出不過兩上即愈

又治癜風以布麻刮熱以此藥摻之三四度愈

黃藥子散（經驗方）治妳癬瘡經年不瘥

黃連　玄參　赤芍藥（各五錢）

右件爲細末隨以多少入輕粉少許嚼芝麻取汁調先煎韮菜湯洗令淨以藥傅之愈

何首烏散（和劑方）治脾肺風毒遍身癬疥瘙痒或致肌肉木麻并紫癜白癜風並皆治之

荊芥穗　威靈仙（洗淨）　蔓荊子（去皮）　蚵蚾草（去土）

何首烏　防風（去芦）　甘草（炙各等分）

右爲細末每服二錢食後溫酒調下

丹溪心法

〇臁瘡

乳香　沒藥　水銀　當歸

川芎　貝母（各二錢半）　黃丹（二錢半一云三兩半）

真麻油（五兩）

右除黃丹水銀外先將餘藥用香油熬黑色去渣下黃丹水銀又煎黑色用柳桃枝攪成膏油紙攤貼

又方

龍骨（生用）　血竭　赤石脂（共一兩）　頭髮（如指入）

黃蠟（一兩）　白膠香　香油（不拘多少）

右件以香油煎頭髮三五沸去髮入黃蠟白膠香却入

龍骨血竭赤石脂攪勻安在水盤內候冷取起以磁器盛之每遇一瘡捻作薄片貼瘡口以竹箬貼在外三日後番過再貼仍服活血藥

又方

用沙糖水煎冬青葉三五沸撈起石壓平將藥貼瘡上日換三次

又方

以頭垢燒灰和豬肉搗作膏先以葱椒葉煎湯洗淨用輕粉摻上却以前膏雨傘紙攤貼之

又方

地骨皮一兩　白斂半兩　甘草節半兩

右以香油入地骨皮入甘草節文武火熬熟去渣入黃丹一兩半緊火熬黑色起白紙攤貼之次用冬青葉醋煎過以藥貼之

附諸方

夾紙膏　治臁瘡久不愈者

乳香三錢　血竭二錢半　沒藥四錢　鬱金五錢

射香一錢半　牡蠣半兩　黃連　黃栢各二兩

大黃　黃丹各一兩　輕粉三十貼

右爲細末清油調勻攤油紙上貼瘡每一箇貼三日每

目以冷水洗三次膏藥亦翻轉三次兩層夾紙以線縫四邊針刺眼透藥氣其藥末同和一處收要用旋調

至聖隔紙膏

水龍骨（另研） 輕粉（研） 黃丹（飛各二錢） 樟腦

黃連（各四錢）

右爲細末桐油調勻以油紙隨瘡眼大小糊袋以藥內袋內貼在瘡上用軟綿緊束之

臁瘡膏藥

輕粉 赤石脂 黃丹 甘草

黃栢（去粗皮炒為末） 火龍丹（即爐口上燒紅土或用伏龍肝即竈心紅土亦可）

右各等分先將五味研爲極細末後下輕粉用真香油調勻再用油單紙夾住勿令藥侵瘡上貼絹帶繫系住一日三番拭去瘡上血沫

治外臁脚瘡（秘方）

用累經燒過窑竈黃土研極爛入黃栢赤石脂黃丹輕粉拌勻以清油調稀用油紙盛藥傅瘡上却以布絹縛定縱痒不可以手開動直候十數日後瘡愈却去之

○廣按此方與前方相類其用竈心黃土以燥濕清熱用黃栢之辛以散火邪真諸方所不及但再加沒藥與乳香以散瘀血可謂十全矣

又方

白膠香末以蠟酒瓶上箬葉夾藥在内貼之

治遠年近日臁瘡（聖恵方）

黄丹（飛）　輕粉　蜜陀僧　龍骨（各等分）

射香（少許）

右爲細末𢱢洗净瘡口乾貼之

又秘方

輕粉（二錢）　黄蠟（一兩）　猪膽（一箇）

右溶化攤油紙上貼

〇漏瘡（新增）

附諸賢論

劉宗厚曰諸瘡患久成漏者常有膿水不絶其膿不臭内無互肉宜用附子浸透切作大片厚二三分於瘡上着艾灸之仍服内托之藥隔二三日再灸之不五七次自然肌肉長滿矣至有膿水惡物漸潰根深者郭氏治用白麪硫黄大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約三分於瘡上用艾注灸二十一壯一灸一易復隔四五日方用翠霞錠子并信效鋭子互相用之絍入瘡内歹肉盡去好肉長平然後貼收斂之藥内服應病之劑調理即瘥矣

附諸方

灸法　冷漏多在腿足之間先是積熱所注久則為寒附子破作兩半用人唾浸透切成片安漏孔上用艾灸之

內托散

川芎（半兩）　細辛　白芷稍（各二錢半）

右爲末每日作湯服之病在下食前服在上食後服看瘡大小討隔年黃麻根刮去皮撚成繩子入孔中至入不去則止瘡外膏藥貼之

內補十宣散　治冷漏在遍身用此內托補虛方見癰疽

當歸拈痛湯　治冷漏在腰腿之間用此以補虛散邪（方見脚氣類）

紫霞錠子　治年深冷漏日久惡瘡有歹肉用之

銅綠　寒水石（煅）　滑石（各三錢）　明礬

膩粉　砒霜　雲母石（研如粉各一錢二分半）

右研細末糊為錠子如麻黃粗細長短不拘量瘡內深淺紝之如脩合此候天色晴明則可

信效錠子　治一切惡瘡

紅娘子　黃丹　砒霜　鷹屎

土硝　白芨（各一錢半）　銅綠（二錢半）　腦子

射香（各少許）

右研細末厮兒乳汁和為錠子用中病即止

生肌散　斂口生肉

太乙膏　護瘡散邪（並見癰疽類）

丹溪心法

○杖瘡疼

黃栢生地黃紫金皮皆要藥熱血作痛　凉血去瘀血為先須下雞鳴散之類　生地黃黃栢為末童便調傅或加韮汁　不破者以韮菜葱頭舂碎炒熱貼冷則易　膏藥用紫金皮乳香沒藥生地黃黃栢大黃之類

又方

用大黃黃栢為末生地黃汁調傅乾則再付

又方

野生苧麻根嫩者不拘多少洗净同鹽擂傅瘡上効傷重多用鹽

附諸方

雞鳴散（見跌撲損傷）

乳香散　治杖瘡腫痛

乳香（另研）　沒藥（另研各一錢）　大黃　黃連

黃栢　黃芩（各三錢）　腦子（少許）

右為細末冷水調勻攤於緋絹上貼之

當歸散

乳香　沒藥（各三錢）　茴香（四錢）　當歸（一兩）

自然銅（火燒醋淬七次）

右為細末每服五錢温酒調服

五黃散

黃丹　黃芩　黃連　黃柏

大黃　乳香（各等分）

右爲細末冷水調成膏攤緋絹上貼之

陳巡檢方　治杖瘡

大黃　當歸　芍藥　川芎

木鱉子　巴豆　白芷　白芨

乳香　沒藥　射干　槐枝

柳枝（已上十三味各一兩）　黃丹（飛過十三兩）　香油（二十六兩）

右除乳香沒藥外十一味用香油浸三日熬白燋黃色濾去滓入飛丹再熬滴水中不散為度候油温下乳香沒藥去火毒

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之十六

丹溪心法附餘卷之十六

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

丹溪心法附餘卷之十七

庚集

濕鬱門

腰痛八十[illegible]　附腎著

丹溪心法

○腰痛主濕熱　腎虛　瘀血　挫閃　痰積　脉大者

腎虛杜仲龜板黃柏知母枸杞五味之類為末猪脊髓和

丸服　脉濇者瘀血用補陰丸加桃仁紅花　脉緩者溼熱蒼朮杜仲黃栢川芎之類　痰積作痛者二陳加南星半夏　腰曲不能伸者鍼委中　凡諸痛皆屬大寒涼藥不可峻用必用溫散之藥　諸痛不可用參補氣則痛愈甚人有痛面上忽見紅點者多死

一戴云溼熱腰疼者遇天陰或久坐而發者是也腎虛者疼之不已者是也瘀血者日輕夜重者是也

入方　治溼痰腰痛大便泄

龜板（一兩炙）　蒼朮　椿皮　滑石（半兩）

白芍（酒炒）　香附（四錢）

右為末糊丸如內傷白朮山查湯下

入方　治腰腿溼痛

龜板（二兩酒炙）　蒼朮　黃栢（酒炒）　蒼耳

威靈仙（一兩酒浸）　扁栢（半兩）

右為末酒糊丸每服黑豆汁煎四物湯加陳皮甘草生姜煎湯下

○久腰痛必用官桂以開之方止其腹脇痛亦可

又方

龜板（酒炙一兩半）　炒栢　白芍一兩　陳皮

威靈仙　知母　蒼朮　蒼耳（半兩）

右為末調服

又方

龜板（酒炒半兩） 酒炒栢（四錢） 青皮（三錢） 生甘草（一錢半）

右為末姜一大片同前藥末一錢研匀以蒼耳汁盪起煎令沸服之

摩腰膏 治老人虛人腰痛幷婦人白帶

附子尖 烏頭尖 南星（各二錢半） 雄黃（一錢）

樟腦 丁香 乾姜 吳茱萸（各一錢半）

朱砂（一錢） 射香（五粒大者）

右為末蜜丸如龍眼大每用一丸姜汁化開如粥厚火上頓熱置掌中摩腰上候藥盡粘腰上烘綿衣包縛定隨即覺熱如火日易一次

附脉理

脉訣舉要曰腰痛之脉皆沉而弦兼浮者風兼緊者寒濡細皆濕實則閃肭指下既明治斯不忒

附諸方

五積散（和劑方） 治寒濕傷子腎經腰痛不可俛仰無氣加茱萸婦人血氣加桃仁（見中寒）

术附湯（濟生方） 治温傷腎經腰重冷痛小便自利

附子（炮去皮臍） 白术（各一兩） 杜仲（去皮半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎七分空心温服

牽牛丸 楊氏家藏方　治冷氣流注腰痛不可俛仰

延胡索　黑牽牛　破故紙（各二兩）

右爲末研煨蒜爲丸梧桐子大每服三十丸葱酒盐湯任下

一方

用黑丑四兩半生半炒研細取頭末水丸梧子大硫黃爲衣每服三十丸空心盐酒送下四服即止

速効散　治腰疼不可忍

川練子（用肉以巴豆去殻五箇同炒赤去巴豆）　茴香（盐炒去盐）

破故紙（炒各一兩）

右同爲末每服一錢食前熱酒調服

獨活湯　治因勞役得腰痛沉重如水似折

羌活　防風　獨活　肉桂

大黄（煨）　澤瀉（三錢）　桃仁（五十個）　當歸

連翹（半兩）　甘草（二錢）　防己　酒連（一兩）

右㕮咀水一盞酒一盞煎至一盞去滓通口食前服

一方　治積年久患腰疼

用地膚子爲末酒調一錢日三五服即愈

威靈仙散　治腰脚痛

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

威靈仙（生不以多少）

右為末每服二三錢食前酒調下

立安散

杜仲（去皮炒斷絲）　橘核（炒取仁）

右各等分為末每服二錢入塩少許食前温酒調下

青娥丸（三因方）治腎經虛冷腰腿重痛常服壯筋補虛

破故紙（四兩炒）　杜仲（四兩炒斷絲）　生姜（二兩半炒乾）

右為末用桃胡仁三十箇研膏入蜜丸梧子大每服五十丸塩酒下

杜仲酒（三因方）治風冷傷腎腰痛不能屈伸

杜仲（一兩去粗皮用姜汁製炒）

右用無灰酒三升浸十日每服二三合四五服

一方為末温酒調一錢空心服

立安丸（三因方）治五種腰痛常服補腰腎經壯健腰脚

破故紙　續斷　乾木瓜（各一兩）　萆薢（二兩）

杜仲（去皮姜炒斷絲）　牛膝（酒浸各一兩）

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸温酒塩湯空心任下

○已上諸方散邪理氣之劑

獨活寄生湯　治腎氣虛弱為風温所乘流注腰膝或攣

𤸇掣痛不可屈伸或緩弱冷痺行步無力

獨活三兩　桑寄生（如無以續斷代之）　細辛

牛膝　秦艽　茯苓　白芍

桂心　川芎　防風　人參

熟芐　當歸　杜仲（炒）　甘草（炙二兩）

右剉每服三錢水煎空心服　下利者去地黄　血滯於下委中穴刺出血妙仍灸腎俞崑崙尤佳

牛膝酒（三因方）治腎傷於風毒攻刺腰痛不可忍者

地骨皮　五加皮　薏苡仁　川芎

牛膝（各一兩）　甘草（一兩）　生地黄（十兩）　海桐皮（二兩）

羌活（一兩）

右㕮咀用絹帛裹藥入無灰酒內冬浸七日夏三五宿每服一盃日用三四服長令酒氣不絕法加炒杜仲（一兩）

虎骨木瓜丸　治飲食過度寒溫停駐經絡不和傷取風血走注筋骨疼痛晝靜夜甚殘冒露所傷筋骨走注并婦人血風疼痛

虎骨（醋炙）　乳香　沒藥（各一兩研）　木瓜

天麻　蓯蓉　牛膝（上四味各二兩好酒浸十日取焙乾存酒）

右為末將浸藥酒打糊丸如梧子大每服三十丸至五十丸空心食前溫酒送下

如神湯 治男子婦人腰痛

玄胡索 當歸 桂（等分） 一方有杜仲一

右為末每服二三錢食前酒調下

治腰痛聖惠方

青木香 乳香（各二錢）

右件酒浸藥飯上蒸乳香化以酒調服

菴藺丸（濟生方） 治墜墮閃肭氣血凝滯腰痛

菴藺子（半兩） 沒藥（二錢半） 乳香（一錢半） 補骨脂（炒）

威靈仙（洗去芦） 杜仲（炒斷絲） 官桂（不見火） 川當歸（酒浸）

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸空心塩酒塩湯俱可下

復元通氣散（和劑方） 治氣不宣流或成瘡癤并閃挫腰脇氣滯疼痛

舶上茴香（炒） 穿山甲（蛤粉炒去粉各二兩） 玄胡索

白牽牛（炒） 甘草（炒） 陳皮（去白各一兩） 南木香（不見火一兩半）

右為末每服一錢熱酒調下病在上食後服病在下食前服不飲酒者煎南木香湯調下

補陰丸 見補損

〇已上諸方散邪理熱之劑

安腎丸（三因方） 治腎虛腰痛目眩耳聾面色慘黑肢體羸

瘦

葫蘆巴　補骨脂　川練子　茴香

續斷（各三兩）　桃仁　杏仁（各去皮尖麸炒別研）

山藥　茯苓（各二兩）

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心塩湯服五十丸

温腎散（三因方）　腎經虛寒腰脊重痛四肢乏力面少顏色

並皆治之

熟乾地黄（一斤洗焙）　牛膝　蓯蓉

五味子（各八兩）　杜仲（三兩）　甘草（炙）　巴戟（各八兩）

茯神　乾姜（各五兩）　麥門冬（八兩）

右為末每服二錢空心温酒調下

萆薢丸　治腎損骨痿不能起床腰背腿皆痛

萆薢　杜仲（炒去絲）　蓯蓉（酒浸）　兎絲子（酒浸）

右等分為細末酒煑猪腰子擣爛為丸如梧桐子大每服五十丸至七十丸空心温酒下

無敵丸　治腰疼腎虛

川萆薢　虎骨（酥炙）　續斷（酒浸一宿各一兩）

川山甲（半兩酥炙）　乳香（五錢）　没藥（二錢半）　茴香（炒）

狗脊　當歸（酒浸）　砂仁（炒）　鹿茸（各一兩酥炙）

杜仲（二兩去絲炒）　地龍（去土七錢半）　青塩（去土七錢半）

兎絲子（四兩酒浸一宿為末）

右為末酒糊丸如梧子大每五十丸空心鹽酒下

補髓丹（百一選方）升降水火補益心腎強筋壯骨治腎虛

腰痛

沒藥（一兩別研）杜仲（去皮炒十兩）鹿茸（二兩煉去皮酒炙）

補骨脂（十兩用芝麻五兩同炒以芝麻黑色無声為度篩去芝麻不用）

右將杜仲補骨脂鹿茸一處為末入沒藥和勻却用胡桃肉三十箇湯泡去皮杵為膏入麪少許酒煑糊丸如梧桐子大每服一百丸温酒鹽湯任下

二至丸（濟生方）治老人虛弱腎氣傷損腰痛不可屈伸。

鹿角（麄角鎊各二兩）附子（泡去皮臍一兩）桂心（不見火）

補骨脂（炒）杜仲（去皮炒斷絲）鹿茸（酒蒸焙各一兩）青鹽（別研五錢）

右為末酒糊丸如梧子大每服七十丸空心嚼胡桃肉鹽酒湯任下惡熱藥者去附子加肉蓯蓉一兩

○廣按腰痛之証多因腎臟真陰衰虛或外風寒之鬱過或內温熱之流注以致榮衛不通故作痛也然腎臟不虛則外邪不能襲內邪不能占榮衛周流何痛之有哉已上六方治腰痛乃散邪兼補虛之藥也

○已上諸方散邪補虛之劑

丹溪心法

○腎著為病其體重腰冷如水飲食如故腰重如物在腰治宜流湿兼用温煖之藥以散之

附諸方

腎著湯 治腎虚傷湿身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜（炮） 茯苓（各四兩） 甘草（炙二） 白术（各二兩）

右㕮咀每服五錢水煎空心服

滲湿湯（济生方） 治寒湿所傷身體重著如水中小便澁大便溏

蒼术 白术 甘草（炙各一兩） 茯苓 乾姜（炮各一兩半） 橘紅 丁香（各二錢半）

右㕮咀每服四錢水二盞棗二枚姜三片煎食前温服

勝濕湯（济生方） 治坐卧湿地或雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒或多汗惡風小便不利大便泄瀉

白术（二兩） 人參 乾姜（炮） 白芍藥 附子（炮去皮臍） 白茯苓 桂枝（不見火） 甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎八分温服

疝痛

八十一　陰水　腎偏墜　腎囊溼瘡

丹溪心法

○疝痛溼熱痰積流下作病大槩因寒鬱而作即是痰飲食積并死血　專主肝經與腎經絕無相干大不宜下　痛甚者不宜參朮　㿗溼多　疝氣宜灸大敦穴在足大指爪甲後一韭葉聚毛間是穴　食積與死血成痛者梔子桃仁山查枳子（一作枳實）吳茱萸並炒以生姜汁順流水煎湯調服一方加茴香附子　却有水氣而腫痛者　又有挾虛者當用參朮為君佐以疏導之藥其脉沉緊豁大者是　桉之不定者屬虛必用桂枝山梔炒烏頭細切炒右為末姜汁糊丸每服三四十丸姜湯下大能劫痛

戴云疝本屬厥陰肝之一經余常見俗說小腸膀胱下部氣者皆妄言也

入方　治諸疝定痛速効

枳實（十五片　一作橘核）　山枝（炒）　山查（炒）

吳茱萸（炒　或等分）　濕勝加荔枝核（炮）

右為末酒糊丸服　或為末生姜水煎服或長流水調下二錢空心

守效丸　治㿗之要藥不痛者

蒼朮　南星　白芷（散水）　山查（各一兩）

川芎　枳核（又云枳実炒）　半夏（各半兩）

秋冬加吳茱萸衣鉢有山梔

右為末神麴糊丸服　又云有熱加山梔一兩　堅硬加朴硝半兩　又或加青皮荔枝核

又方　治諸疝發時服

海石　香附

右為末生姜汁調下亦治心痛

又方　治陽明受濕熱傳入太陽惡寒發熱小腹連毛際閒悶痛不可忍者

山梔　桃仁　枳子（俱炒）　山查

右各等分研入姜汁用順流水湯盪起同煎沸熱服　一方加吳茱萸

橘核散

橘核　桃仁　梔子　川芎（細切炒）

吳茱萸

右研煎服　橘核散單止痛此盖溫熱因寒鬱而發用梔子仁以除溫熱用烏頭以散寒鬱况二藥皆下焦之藥而烏頭又為枝子所引其性急速不容胃中留也

又方　治疝刼藥

用烏頭細切炒梔子仁炒等分為末或加或減白湯丸服

又方 治疝

枇杷葉 野紫蘇葉 椒葉 蒼耳葉

水晶葡萄葉

右以水煎熏洗

腎氣方

茴香 破故紙 吳茱萸（鹽炒各五錢）

胡蘆巴（七錢半） 木香（三錢半）

右為末蘿蔔搗汁丸鹽湯下

積疝方

山查（炒一兩） 茴香（炒） 柴胡（炒二錢） 牡丹皮（一錢）

右為末酒糊丸如梧子大服五六十丸鹽湯下

疝病黃病久者皆好倒倉

又方 治疝痛

山查（炒四兩） 枳核（炒） 茴香（炒） 山梔（炒各二兩）

柴胡 牡丹皮 桃仁（炒各一兩） 八角茴香（炒一兩）

吳茱萸（炒半兩）

右為末酒糊丸梧子大服五十丸空心鹽湯下

又方 治疝作痛

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

蒼朮 香附（俱塩炒） 黃栢（酒炒已上為君） 青皮

玄胡索 益智 桃仁（已上為臣） 茴香（炒）

附子（塩製炒） 甘草（已上為使）

右為末作湯服後一痛過更不再作矣

又方 治癩疝

南星 山查 蒼朮（各二兩） 白芷

半夏（製） 枳核 神麯（炒各一兩） 海藻（半兩）

昆布（半兩） 玄明粉 吳茱萸（各二錢）

右為末酒糊丸

一人疝痛作腹內塊痛止疝痛止塊痛作

三稜 莪朮（醋煮） 炒麯 姜黃

南星（各一兩） 山查（二兩） 木香 沉香

香附（各三兩） 黃連（用茱萸炒去茱萸用五錢淨） 蘿蔔子

桃仁 山梔 枳核（炒各半兩）

右為末姜汁浸蒸餅為丸

○予常治一人病後飲水患左丸痛甚灸大敦穴適有摩腰膏內用烏附丁香麝香將與摩其囊上橫骨端火溫帛以覆之痛即止一宿腫亦消 予舊有柑橘積後因山行飢甚遇橘芋食之橘動舊積芋復滯氣即時右丸種大寒熱先服調胃劑一二貼次早注神思氣至下焦嘔逆齎積

動吐後吐後和胃氣疎通經絡而愈（摩腰膏見腰痛）

附脉理

脉訣舉要曰疝脉弦急積聚在裏牢急者生弱急者死沉遲浮濇疝瘕寒痛痛甚則伏或細或動

附諸方

立效散（本事方）治疝氣

川芎　川練子　青皮（去白）　舶上茴香

黑牽牛（炒）　桃仁（各一兩）

右為末每服二錢無灰酒一盞煎七分温服

失笑散　治小腸氣痛及婦人血氣痛欲死者

五靈脂　蒲黃（炒各等分）

右為末每服二錢先用醋一合熬藥成膏水一盞煎服

茴香練實丸（拔粹方）治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任脉所主陰經也乃肝腎受病治法同歸於一

川練子（炒）　茴香　山茱萸　食茱萸

吴茱萸（湯洗）　青橘皮（去白）　馬蘭花（醋炒）　芫花

陳橘皮（各一兩）

右為末用醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸温酒送下食前量人虛實加減丸數以利為度

金鈴丸（本事方）治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水

出

茴香（炒）　馬藺花（炒）　海蛤　破故紙

海帶　兎絲子（各三兩）　金鈴子肉（五兩）

木香　丁香（各一兩）

右為末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸温酒塩湯下

烏藥散　治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥　木香　茴香　良姜（炒）

青皮（去白）　檳榔（各五錢）　川練子（十箇）

（巴豆七十箇打破同麩炒川練子黑色去麩巴豆只用川練）

右為末每服一錢温酒調下痛者炒生姜熱酒服

一方　治小腸氣痛不可忍者

烏藥（搥碎姜酒浸一宿）　高良姜

茴香（舶上者各一兩）　青皮（去白二兩）

右為末每服二錢遇發時熱酒調下

青木香丸　治腎冷疝氣脹疼

用吴茱萸一兩分作二分酒醋浸一宿焙乾香附子一兩蓽澄茄青木香各半兩為末米糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心塩湯下或乳香葱白湯亦可

一方　治疝氣發作痛不可忍者

真料五苓散一貼連根葱白一寸燈心七莖煎湯吞下

青木香丸五十粒即効（五　李叡見中著）

玄胡索散　治小腸氣痛

用玄胡索塩炒乾姜等分為細末空心塩酒調下

川練子散　治小腸氣痛

木香（不見火）　茴香（塩炒黄去塩）　川練子（用巴豆十粒搥碎同練炒黄色去巴豆各一两）

右為末每服二錢温酒空心食前調服

一方　治遠年近日疝氣

呉茱萸　八角茴香　小茴香　川練子

花椒（各一两）　青塩（半两）

右為細末以連根葱頭入酒同藥搗成餅晒乾糯米半升同藥餅用文武火炒黄色研為末酒糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心温酒塩湯任下忌發氣之物

一方　治小腸氣臍腹攪疼陰中痛悶不省人事

用茴香塩炒枳殻各一两沒藥半两為末每服二錢熱酒調下日三服

四神丸（直指方）　治腎冷疝氣脹不已

呉茱萸（揀淨一半好酒浸一半用米醋浸各浸一宿焙乾）　蓽澄茄

青木香（各半两）　大香附子（杵炒一两）

右為末米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心塩湯呑下或乳香葱白煎湯下

一方

公猪腰子一箇（去筋膜）　玄胡索　黑牽牛（各半兩為末）

右將猪腰切作二片入藥末在內濕紙裹煨熟不要焦空心鹽酒送藥嚼下必瀉下惡物忌食生冷

一方　治疝氣腫墜疼痛

用猪脬一箇去尿以小茴香大茴香破故紙川練子各等分填半滿入青鹽一塊縛定好酒煮熟先食猪脬以酒下之將內藥晒乾或焙乾碾為末酒糊為丸如梧子大每服五六十丸空心溫酒或鹽湯下

○已上諸方辛溫散氣之劑

大烏頭桂枝湯　三因方　治風寒疝氣腹中刺痛手足不仁身体拘急不得轉側或致陰縮悉皆治之

大烏頭（五箇實者去皮尖蜜一大盞煎減半出湯洗切）　芍藥

桂心（各三錢）　甘草（炙二錢半）

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗三枚入前煎烏頭蜜半呷同煎七分食前服一方去烏頭用附子一箇名蜜附湯

葱白散　三因方　治一切冷氣及膀胱氣發攻刺疼痛及婦人産後血氣刺痛皆宜服之

川芎　當歸　枳殼（去白麩炒）　厚朴（姜製）

木香　官桂（去皮）　青皮　乾姜（炮）

茴香（炒）　人參　川練（炒）　茯苓

麥芽（炒）　三稜（炮）　蓬朮（醋浸一宿焙）　乾地黄

神麯　芍藥（各一兩）

右㕮咀每服三錢水一盞葱白二寸煎七分去柤入鹽少許空心熱服大便秘澁加大黄溏利加訶子

聚香飲子濟生方治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俛仰

檀香　木香　乳香　沉香

丁香（並不見火）　藿香（各一兩）　玄胡索　片子姜黄（洗）

川烏（炮去皮尖）　桔梗（去蘆炒）　桂心（不見火）　甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎七分去柤溫服

益智仁湯濟生方治疝氣痛連小腹呼叫不已診其脉沉緊是腎氣積冷所致

益智仁　乾姜（炮）　甘草（炙）　茴香（炒各二錢）

烏頭（炮去皮）　生姜（各半兩）　青皮（去白二錢）

右㕮咀每服四錢水一盞鹽少許煎七分空心熱服

玄附湯濟生方治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑溏泄

木香（不見火半兩）　玄胡索（炒）　附子（炮去皮臍各一兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎七分去渣温服

狼毒丸（濟生方）　治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬刺痛不已

芫花（醋炒）　狼毒（炒）　川烏（炮去皮臍各一兩）

全蝎（去毒九枚）　三棱　乾姜（炮）　椒紅（炒）

沒藥　鱉甲（醋煮）　乾漆（炮烟盡各半兩）

右爲末醋糊丸如梧桐子大每服四十丸空心姜湯温酒任下甚者以塩半斤炒極熱以故帛包熨痛處

茱萸內消丸（和劑方）　治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成寒疝陰囊偏墜痛引臍腹或生瘡瘍時出黄水

山茱萸（去核炒）　桔梗（小浸一時焙乾）　川烏（炮去皮尖）　茴香（舶上者去炒焙炒用）

白蒺藜（炒去剌）　青皮（去白）　吴茱萸（湯泡七次焙乾）

肉桂（去皮各二兩）　大腹皮（酒洗焙）　五味子（揀凈）　海藻（洗焙）

玄胡索（各一兩半）　木香（一兩半）　川練子（炒二兩）　桃仁（去皮尖麸炒）

枳實（去穰麸炒）　陳皮（去白各一兩）　食茱萸（二兩）

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒下

葫蘆巴丸（和劑方）　治大人小兒小腸蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墜陰腫小腹痛形如卵上下走痛不可忍

葫蘆巴（炒一斤）　茴香（去土炒十二兩）　吴茱萸（湯洗七次炒十兩）

川楝子（炒一斤二两）　大巴戟（去心炒用）

川烏（炮去皮尖各六两）

右為末酒煑麪糊丸如梧桐子大每服十五丸空心温酒下小兒五丸茴香湯吞下一方加黑牽牛

丁香楝實丸（孩粹方）治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任脉所主陰經也乃腎肝受病治法同歸于一

當歸（去蘆剉碎）　附子（炮製去皮剤）　川楝子　茴香（炒）

右四味各一两剉碎以好酒三升同煑酒盡為度焙作細末每服藥末一两再入下項藥

丁香　木香（各二錢）　全蝎（十三箇）　玄胡索（二两）

右四味同為細末入前項藥末内拌和酒糊為丸如梧桐子大每服二十丸至百丸空心温酒送下

神砂一粒丹（宣明方）治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子（炮一两）　鬱金　橘紅（並等分子倖用）

右為末醋麪糊丸如酸棗大以朱砂為衣每服一丸男子酒下婦人醋湯下不能只服神聖代鍼散

神聖代鍼散

乳香　沒藥　當歸　香白芷

川芎（各半两）　芫青（[illegible]）

右為細末更研每服一錢熱酒半盞先點好茶一盞次後藥末在茶上不要攪動細細呷之心驚欲死者小腸氣撮痛及膀胱腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血瘕血氣血刺血搶心胎衣不下難產但一切痛疾服之大有神效更要詳疾証用藥

十補丸[illegible]治小腸寒疝膀胱伏梁奔豚痃氣等症

附子（一兩用防風一兩剉如黑豆大鹽四兩黑豆一合炒附子裂去諸藥用附子去皮尖）

葫蘆巴　木香　巴戟（去心）　川練子（炮取肉）

官桂（去皮）　延胡索　華澄茄（去帶）　舶上茴香（炒）

破故紙（炒各一兩）

右為末用糯粉酒打糊丸如梧桐子辰砂為衣每服五十丸空心酒下婦人醋湯下若加益智子亦可

○已上諸方辛熱消積之劑

○廣按疝氣之証其人平素外因風濕鬱入經絡或是內因怒氣衝上小腹以致榮衛失順血液稽留日新月盛積聚作塊每遇風寒之氣外鬱或是五志之火內起則小腹結痛下墜膀胱或是小腸作痛上連脇肋甚則攪痛[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]汗如流須臾不救古方以為小腸氣膀胱氣腎經虛氣用辛溫之藥以散氣則是治其標也丹溪以為痰飲食積死血流注歸

於厥陰肝之一經用辛平之藥破血則是治其元也夫疝證痛有定處是以形之積也非痰飲與食積與氣血相聚而何哉若是無形之氣作痛則走注於滿腹而流散於徧身矣

○木腎偏墜　新增

附諸方

入方　治木腎

楮樹葉（又云楊樹）雄者晒乾為末酒糊丸如梧桐子大空心鹽湯下五十丸

又方　治木腎不痛

枸杞子　南星　半夏　黄栢酒炒
蒼术鹽炒　山查　白芷　神麯炒
滑石炒　昆布　吳茱萸

右為末酒糊丸梧子大空心鹽湯下七十丸

治小腸氣及木腎偏墜

黑牽牛一斤用猪尿胞裝滿以線縛定口子好酒米醋各一碗於砂鍋内煑乾為度取去黑牽牛用青紅娘子十九箇於鈌鍋内（炒燥）去青紅娘子將牽牛碾取頭末四兩另入猪苓澤瀉細末各二兩醋糊丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽酒送下不可多服如多

服令人頭眩可服黑錫丹

奪命丹和劑方遠年近日小腸疝氣臍下撮痛外腎偏墜腫硬陰間濕痒抓成瘡癬

吳茱萸（一斤酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童便浸四兩各浸一宿用火焙乾）

澤瀉（去皮土二兩）

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子每服五十丸温酒鹽湯任下

金鈴子丸澹寮方治鈎腎氣膀胱偏墜痛不可忍

川練子（五兩剉作五分製一分用班猫一箇去足翅同炒去班猫一分用茴香三錢鹽半錢炒熟去鹽留茴香入藥一分用黑牽牛三錢同炒去牽牛一分用破故紙三錢同炒留故紙入藥一分用蘿蔔子一錢同炒去蘿蔔子）

右將練子去核同破故紙炒香焙乾為末酒糊丸如梧桐子每服三十丸温酒空心下

金鈴丸本事方治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出（方見前）

三茱丸（百一選）方治小腸氣外腎腫疼

山茱萸　吳茱萸　食茱萸（各二兩）　黑牽牛（炒一兩）

破故紙（炒一兩七錢）　青鹽　青皮

茴香（炒各三錢）　川練子（一兩用班猫十四箇去翅皆同炒赤色去班猫不用）

右為末醋煮麪糊丸如梧桐子每服三五十丸用先喫

炒桃仁十五箇以溫酒或鹽湯下藥或炒茴香酒亦可

空心食前服

一方　治外腎大如升斗

茴香　青皮　荔枝核（搥碎）

右各等分炒出火毒為末每服二錢宿心酒調下

一方　治陰疝或偏墜大小子痛欲死者

木鱉子（一斤取肉炙醋磨）　芙蓉葉末　黃栢皮末

右將木鱉子同醋調二藥末敷核上痛即止

腎囊濕瘡

蜜陀僧　乾姜　滑石

右為末搽上

又方　先用茱萸煎湯洗

吳茱萸（半兩）　寒水石（三錢）　黃栢（二錢）　樟腦

蛇床子（半兩）　輕粉（十盞）　硫黃（二錢）　白礬

檳榔　白芷（各二錢）

右為末麻油調搽

又方　治腎上風濕瘡及兩腿

全蝎　檳榔　蛇床子　硫黃（各一錢）

右四味研如細末用麻油調入手心搽熱或三口用手

一抱囊一頃以搽藥兩腿上

脚氣　八十二　附足跟痛　脚轉筋

丹溪心法

○脚氣須用升提之藥提起其濕隨氣血用藥　有脚氣衝心者宜四物湯加炒黄栢再宜湧泉穴用附子末津唾調傅上以艾灸泄引熱下

又方

防巳飲

白术　木通　防巳　檳榔

川芎　甘草稍　犀角　蒼术（塩炒）

黄栢　生苄（各酒炒）

大便實加桃仁小便澁加杜牛膝有熱加黄芩黄連大熱及時令熱加石膏有痰加竹瀝姜汁如常腫者專主乎濕熱先生别有方

又方　治濕熱食積痰流注

蒼术　黄栢　防巳　南星

川芎　白芷　犀角　檳榔

血虚加牛膝龟板

右為末酒糊丸服肥人加痰藥

健步丸

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

生苄（半兩）　歸尾　芍藥　陳皮
蒼朮（各一兩）　吳茱萸　條芩（各半兩）　牛膝（一兩）
桂枝（二錢）　大腹子（二箇）

右為末蒸餅丸如梧子大每服一百丸空心煎白朮木通湯下

又方　一婦人足脛腫

紅花　牛膝（俱酒洗）　生苄　黃栢
蒼朮　南星　草龍胆　川芎

右筋動於足大指上至大腿近腰結了因奉養厚遇風寒宜四物湯加酒芩紅花蒼朮南星姜煎服

濕痰脚氣大便滑泄

蒼朮（二兩）　防風（一兩）　檳榔（六錢）　香附（八錢）
川芎（六錢）　條芩（四錢）　滑石（一兩二錢）　甘草（三錢）

右為末或丸或散皆可服

脚軟筋痛

牛膝（二兩）　白芍（一兩半）　龜板（酒炙）　栢枚（酒炒一兩）
知母（炒）　甘草（半兩）

右為末酒糊為丸

應痛丸　治脚氣痛不可忍此藥為劫剤

赤芍藥（半兩煨去皮）　草烏（半兩煨去皮尖）

右為末酒糊丸梧子大空心服十丸白湯下

又方　治脚氣腫痛

芥子　白芷（等分）

右為末姜汁和敷貼或用仙朮羌活獨活白芷細辛為末入帛内作襪用

又方　煠洗脚氣

威靈仙　防風　荆芥　地骨皮

當歸　升麻　蒴藋

右煎湯煠洗

附脉理

脉訣舉要曰脚氣之脉其狀有四浮弦為風濡弱濕氣遲濇因寒洪數熱鬱風汗濕溫熱下寒熨

脚氣治例

心法附録曰脚氣有濕熱有食積流注有風濕有寒濕勝濕以仙朮白朮防巳川芎為主或六物附子湯或當歸拈痛湯

脚氣氣鬱甚者舟車丸除濕丹有飲者東垣開結導飲丸

脚氣觧表用麻黄左經湯等藥隨經選用有兼痰氣寒濕者五積散加木瓜

若双解以大黃左經湯東垣羌活導滯湯

若理血以八味丸或四物加羌活天麻又或四物加黃栢南星或健歩丸

若踈風養血用獨活寄生湯最效

春夏氣溢腫而痛者用香蘇散加五加皮木瓜檳榔川練子　熱而紅腫者敗毒散加木瓜蒼术

秋冬以後用五積散加木瓜牛膝檳榔吳茱萸

附諸方

麻黃左經湯（三因方）治風寒暑濕流注足太陽經腰足攣痺關節重痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛眩暈

麻黃（去節）　乾葛　細辛　白术（米泔浸）
茯苓　防己　桂心（不見火）　羌活
甘草（炙）　防風（各等分）

右為末每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎空心服自汗去麻黃加肉桂芍藥重者加白术陳皮無汗減桂加杏仁澤瀉並加等分

半夏左經湯（三因方）治足小腸經為風寒暑溫流注發熱腰脇疼痛頭目眩暈嘔吐不食

半夏（湯洗七次）　乾葛　細辛　白术

麥門冬（去心）　柴胡　茯苓　桂心（不見火）

防風　乾姜（炮）　黄芩　小草

甘草（炙各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心服熱悶加竹瀝喘急加杏仁桑白皮

大黄左經湯（三因方）治風寒暑温流注足陽明經使腰脚赤腫痛不可行大小便秘或惡聞食氣喘滿自汗

細辛（去苗）　茯苓　羌活　大黄（蒸）

甘草（炙）　前胡　枳殻（去穰炒）　厚朴（去皮炒）

黄芩　杏仁（去皮尖別研各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心熱服腹痛加芍藥秘結加阿膠喘急加桑白皮紫蘇小便澁少加澤瀉四肢瘡瘍浸淫加升麻並等分

大料神秘左經湯（三因方）治風寒暑温流注三陽經腰足拘攣大小便秘澁喘滿煩悶並皆治之

半夏（湯洗七次）　乾葛　細辛　麻黄（去節）

麥門冬（去心）　小草（即遠志苗）　白姜　厚朴（姜製炒）

茯苓　防己　枳殻（去穰炒）　甘草

桂心　羌活　防風　柴胡

黄芩（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎服自汗加牡蠣白术去麻黄黄腫加澤瀉木通熱甚無汗減桂加橘皮前胡升麻腹痛或利去黄芩加芍藥附子大便秘加大黄竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘇並等分對証加減尤宜審之

六物附子湯（三因方）治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫

附子（炮去皮臍）　桂心　防己（各四兩）　甘草（炙二兩）

白术（三兩）　茯苓（三兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎六分食前温服

換腿丸（和濟方）治足三陰經為風寒暑温之氣所乘發為攣痺緩弱上攻胷脇肩背下注脚膝疼痛足心發熱行步艱辛

薏苡仁　南星（炮）　石楠葉　石斛（去根）

檳榔　萆薢（炙）　川牛膝（去苗酒浸）　羗活（去蘆）

防風（去蘆各一兩）　木瓜（四兩）　黄芪（去蘆蜜炙）　當歸（去蘆酒浸）

天麻（去苗）　續斷（各一兩）

右為末酒麪糊丸如梧桐子每服五十丸温酒塩湯任下

一方加大附子肉桂蒼术各一兩

○已上諸方治各經邪氣之劑

香蘇散（和劑方）治風濕脚痛踈通氣道

加檳榔木瓜名檳蘇散（方見傷寒）

右㕮咀每服四錢水一盞姜葱煎服

活血應痛丸（和劑方）治風溫客於腎經血脉凝滯脚重疼痛項背拘攣不得轉側常服活血脉壯筋骨

狗脊（去毛四兩）　蒼木（泔浸一宿去皮六斤）　沒藥（十兩另研）

草烏頭（一斤半）　香附子（去毛炒七斤半）　陳皮（去白五斤）

右為末酒糊丸如梧桐子大每服二十丸溫酒熟水任下

活絡丹（和劑方）治諸般風邪毒之氣停滯經絡流注脚間筋脉攣拳腰腿沉重或發赤腫以及脚筋吊痛上衝心腹一切痛風走注

川烏（炮去皮臍六兩）　沒藥（研）　乳香（研各二兩二錢）　草烏（炮去皮臍）

地龍（去土）　南星（炮各六兩）

右為末入研藥和勻酒糊丸如梧桐子大每服二十丸空心酒下荊芥湯下亦可

經進地仙丹（和劑方）治腎氣虛憊風濕流注脚膝酸疼行步無力

川椒（去目及閉口者微炒出汗四兩）　菟絲子（酒浸）　覆盆子（各二兩）

白术（一兩）　白附子　羌活　防風（去蘆各二兩）

人參（一兩半） 烏藥（二兩） 川烏（炮一兩） 附子（炮四兩）
茯苓（一兩） 地龍（去土三兩） 赤小豆 骨碎補（去毛各二兩）
甘草（一兩） 木鱉子（去殻三兩） 萆薢（二兩） 狗脊（去毛一兩）
蓯蓉（酒浸焙四兩） 牛膝（去蘆酒浸） 南星（湯洗姜製各二兩）
黄芪（二兩半） 何首烏（二兩）

右為末酒糊丸如梧子大每服四十丸空心温酒下

加減地仙丹（劑生方）治風冷邪濕留滯下焦足膝拘攣
滿疼痛

地龍（炒去土） 五靈脂（去石） 烏藥 白膠香（別研）
五加皮 椒紅（出汗） 威靈仙 木瓜（去穰）

赤小豆（炒） 川烏（炮） 黑豆（炒去皮） 天仙藤
蒼木（米泔浸去皮炒） 木鱉子（去殻油各等分）

右為末酒糊丸如梧子大每服七十丸空心盐湯盐酒
任下

不老地仙丹（直積方）治腎臟風毒輕脚壯筋

蓯蓉（用酒浸炮） 當歸（酒浸焙） 虎骨（酒炙） 牛膝（酒浸焙各一兩）
赤小豆（半兩） 蒺藜（炒搗去刺） 川椒（去目出汗） 川芎（各一兩）
萆薢（鹽水煮乾一兩） 血竭（半兩） 白南星（炮） 白附子（炮）
何首烏 黄芪（蜜炙各七錢半） 防風（半兩） 杜仲（姜製）
羌活 沒藥（別研） 獨活（各七錢半） 木鱉子（去油）

地龍（去土）　茴香（炒）　乳香（別研各半兩）

右為末酒糊丸如梧子大每服四十九木瓜陳皮湯下

神翁地仙丹（醫方集成）專治風痺脚氣

天仙子一兩　川椒一兩（去目并閉口者）　木鱉子四兩

赤土九兩（即土硃）　白膠香五兩（煑過別研）　黑豆六兩

黑牽牛六兩　五靈脂三兩（陳黑色好者用好醋浸後水淘去絹濾過曬乾）

草烏（七兩小而堅实者淨洗用鹽在油中并炒令色焦黃折裂候冷以紙布頻揩令淨）

右為末同入白膠香木鱉子末隔年好醋打麪糊杵千百下丸如梧桐子大每服三十丸茶清下病甚頻服

加減至寶丹（盧陵歐陽康叔家傳方）專治脚氣止疼痛除

風濕

石膏（火煑三十沸三兩）　當歸（酒浸二兩）

骨碎補（四兩去皮毛炒淨三五次）　柍柳二兩

月寶砂（五兩醋煑火乾）　白蒺藜（炒赤去皮尖刺三兩）

木瓜（生用二兩）　紫金皮（去骨生用二兩）　淮烏頭（三箇起一兩豆者炒赤一兩）

白膠香（三兩淨水煑數十沸冷水中乾）

右為末蜜丸如彈子大每服一丸嚼生姜一塊空心以好酒一盞送下多以酒助藥力服後一時久用外應散薰蒸淋洗　一方除紫金皮木瓜加防風小黑豆一方加赤芍藥一方除紫金皮石膏加白朮木香川烏

透骨丹（康叔家傳方）專治脚色

川烏煨（一兩）　羌活（二兩）　白茯苓（二兩）　乳香（別研）

檳榔　木瓜　川芎（各一兩）　木香（一兩半）

沉香（一兩）

右為末麪糊丸如梧桐子大每服六十丸姜湯下

黑虎丹（康叔家傳方）治脚氣筋骨軟弱步履不隨

白朮　五加皮　肉桂（各半兩）　檳榔（一兩）

黑豆（半升）　附子　川烏　黃芪

白茯苓　赤芍藥（各一兩）　熟地黃　烏藥（各一兩）

生蒼朮　杜仲　當歸　川牛膝

虎脛骨　白蒺藜（各一兩半）　[illegible]　羌活（半兩）

右為末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸空心塩酒下

○已上數方治風濕之劑

搯風散（康叔家傳方）專治寒濕脚氣先以此發散

麻黃（不去節）　甘草（不去皮）　浩烏　川萆薢

杏仁（各等分）

右吹咀每服四錢水一盞煎服不可多進

五積散（和劑）治寒濕流注兩脚酸疼有痰氣者用之尤

宜内加木瓜（方見中寒）

搜風散（康叔家傳方）治寒濕脚氣愈後可常服之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

白芷　川芎　茯苓　甘草
芍藥（[illegible]）　當歸（各一两半）　陳皮　厚朴[illegible]
枳殼　白朮　乾姜（炮）　麻黄（去根節各二两）
桔梗（一两半）　蒼朮（十二两酒浸去皮）　肉桂（一两）

右㕮咀每服五钱水一盞姜四片煎服　此方即五積散去半夏加白术是也

導氣湯（仁存方）　治寒濕脚氣赤腫疼痛心腹膨脹頭目手足浮腫身體腰背疼痛並皆治之

羌活　獨活　木瓜　薏苡仁
青皮　陳皮　桑白皮　大腹皮
枳殼　檳榔　青木香　紫蘇
甘草　大腹子　木通　赤茯苓（各等分）

右㕮咀每一两水二盞煎至一盞通口服　熱加大黄寒加蒼术

沉香大腹皮散（御藥院）　治濕氣欝滯經絡以成脚氣腫滿疼痛筋脉不利

大腹子（連皮二两）　沉香　桑白皮（炒）　檳榔
茴香（炒）　白茯苓（去皮）　木通　荊芥穗
紫蘇子（炒）　蘇葉（各一两）　乾木瓜（去穰麸炒一两半）
枳殼（去穰麸炒一两半）　甘草（炒）　陳皮（去白焙）

烏藥（各一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞姜五片乾蘿蔔五大片同煎七分溫服如無蘿蔔用蘿蔔子一錢微炒搗碎同煎如覺大腸乾燥即服加減神功丸

茱萸丸（三因方）治脚氣入腹腹中不仁喘急欲死

吴茱萸（湯洗七次）　木瓜（去穰切片日乾各等分）

右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸至百丸酒飲任下或以木瓜另蒸爛研膏為丸妙

勝駿丸（一因方）治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足攣拳脚面連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣

壯筋骨

附子（一箇炮去皮臍）　當歸（酒浸一宿）　天麻　牛膝（並酒浸各二兩）

木香一兩　酸棗仁（炒）　熟地黃（酒浸）　防風（去人各三兩）

木瓜四兩　羌活一兩　乳香（半兩另研）　麝香（二錢半另研）

全蝎（去毒）　沒藥（另研）　甘草（炙各一兩）

右為末用生地黃二斤研爛如泥入無灰酒四升煮爛如膏以前藥和勻杵令堅每兩作十丸每服一丸細嚼臨睡酒下如冬月無地黃煉蜜丸如梧桐子每服二十丸鹽湯溫酒任下　一方加檳榔萆薢茯苓破故紙巴戟各一兩當歸地黃各減一兩

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

葫蘆巴丸（楊氏家藏方）治一切寒濕脚氣脚膝疼痛行步無力

葫蘆巴（酒浸一宿焙乾）　破故紙（炒香各四兩）

右為末用大木瓜一枚切頂去穰置藥在内以滿為度復用頂蓋之以竹簽簽定蒸熟爛研同前餘藥末和為丸如梧桐子每服五十丸空心温酒下

趂痛散（楊氏家藏方）治濕氣攻注腰脚疼痛行步少力

杜仲（炒斷絲一兩半）　肉桂（去皮）　延胡索　萆薢

沒藥　當歸（酒洗焙各二兩）

右為末每服三錢空心温酒送下

一方　治濕脚氣（温隱君歌括）

濕氣同流髀膝疼　香蘇散煮忍冬藤

木香芍藥仍增入　攻効如神喚得應

東垣開鬱導飲丸　治食積痰流注

白术　陳皮　澤瀉　茯苓

神麯（炒）　麥蘖　半夏（各一兩）　枳實（炒）

巴豆霜（各一錢半）　青皮　乾生姜（各半兩）

右為末湯浸蒸餅丸如梧子大每服五十丸或六七十丸温水下

○已上諸方治寒濕之劑

當歸拈痛湯（拔粹方）治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸

不利及遍身疼痛下注于足脛痛不可忍

羌活　甘草　黄芩（酒浸）　茵陳（酒炒各五錢）

人參（去蘆）　升麻　苦參（酒洗）　葛根

蒼朮（各二錢）　防風（去蘆）　當歸身　知母（酒洗）

茯苓（炒）　澤瀉　猪苓（各三錢）　白朮（一錢半）

右㕮咀每服一两水二盞煎至一盞去滓空心温服

舟車丸　治濕熱勝氣鬱甚者（方見中濕）

除濕丹　治濕熱勝氣鬱甚者（方見濕熱）

趂痛丸（御藥院方）治脚氣毒攻两脚痛不可忍

白甘遂　白芥萊子（各炒）　大戟　白麵（各二两）

右滴水捏作餅子丸上熔令黄赤碎碾作末醋煑糊丸如菉豆大冷酒下十丸利則止

又方　治下痒瘡脚腫痛行履艱難者

甘遂（半两）　木鱉子（四两去皮）

右為末猪腰子一箇去皮膜片切用藥四錢在心濕紙包定煨熟空心米飲送下量虛實加减服後便伸直两脚如行下便利者只吃白粥二三日為妙

夢中神授方（醫方集成）治脚氣神効

右用木鱉子每箇作两邊麩炒炒畢切碎再炒用皮紙滲盡油為度每一两用厚桂一两同為末熱酒調服以

得醉爲度盖覆得汗即愈

治脚氣百一選方治脚氣上攻流注四肢結成腫核不散赤熱掀痛及療一切腫毒

右用甘遂爲末以水調傳腫處却濃煎甘草湯服之其腫即散二物本相反須兩人置各處安頓不可相和則不驗清流中子輸詠苦此只一服病者十去七八再服而愈

○巳上諸方治濕熱之劑

檳榔湯濟生方治一切脚氣順氣防壅

檳榔　香附子（去毛）　陳皮（去白）　紫蘇葉

木瓜（去穰）　五加皮　甘草（炙各一兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分温服婦人脚氣加當歸半兩室女脚痛加赤芍藥兩半如大便閉秘加枳殼熱着加大黄

烏藥平氣湯三因方治脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行步艱苦諸氣不和喘滿迫促並皆治之

茯神（去木）　甘草（炙）　白芷　當歸

白术　川芎　五味子　紫蘇子

乾木瓜　人參　烏藥（去木各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎七分温服

大腹皮散　濟生方　治諸証脚氣腫痛小便不利

檳榔　荊芥穗　烏藥　陳皮

紫蘇子（各一兩）　蘿蔔子（炒半兩）　沉香（不見火）　桑白皮（炙）

枳殼（去穰各一兩半）　大腹皮（三兩）　乾宣木瓜（去穰二兩半）

紫蘇子（炒一兩）

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服不拘時

○已上諸方理氣之劑

獨活寄生湯　治腎氣虛弱爲風濕所乘流注腰膝或攣拳掣痛不得屈伸或緩弱冷痺行步無力見腰痛類

金匱八味丸　治足少陰經脚氣入腹腹脹疼痛上氣喘急腎經虛寒所致也此証最急以腎乘心水尅火死不旋踵見補損

三因神應養真丹　治足厥陰經爲四氣進襲左癱右瘓痰涎壅盛半身不遂手足頑麻語言蹇澁脚膝無力榮氣凝滯偏身疼痛

四物湯內加羌活天麻

右爲末蜜丸雞子大每丸木瓜兎絲子浸酒下

○已上諸方理血之劑

加味敗毒散　治足三陽經受熱毒氣流注脚踝上焮赤腫痛寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒

羌活　獨活　前胡　柴胡

枳殼　桔梗　甘草　人參

茯苓　川芎　大黄　蒼朮（等分）

右㕮咀每半兩入姜煎

東垣羌活導滯湯　治脚氣初發一身盡痛或股節腫痛便弱阻隔先以此藥導之後用當歸拈痛湯

羌活　獨活（各半兩）　防己　當歸（各三錢）

大黄（酒浸煨一兩）　枳實（炒二錢）

右㕮咀每五錢或七錢水煎服

加減神功丸（御藥院方）治三焦氣澁心腹痞悶六腑風熱大便不通腰腿疼痛肩背重悶頭昏面熱口苦咽乾心胷煩燥睡不安及治脚氣并素有風人大便結燥

訶梨勒　牽牛（微炒）　火麻仁（另搗如膏各四兩）

人參（二兩去蘆）

右爲細末入麻仁搗研勻煉蜜丸如梧桐子每服四十丸温水下温酒米飲食後臨臥服如大便不通可倍丸數以利為度

牛膝散（大全良方）治脚氣浮腫心神煩悶及婦人月經不通

川牛膝　羚羊角　檳榔　大黄（炒）

芒硝（略各一）　防巳　官桂　牡丹皮

赤芍藥　甘草（各五錢半）　桃仁（製五十粒）

右㕮咀每服一两水二盞煎至一盞去滓通口食前服

以下恶物量強弱用

枳實大黃湯（拔粹方）治脚氣腫痛

羗活（一錢半）　當歸身（一錢）　枳實　大黃（各五錢）

右剉都作一服水一盞半煎至八分去滓空心服下利

一两行痛立

搜風丸（仁存方）治脚氣腫痛

大黃　枳殼　枳實（各半两）　黒牽牛（生二两）

右爲末米糊丸如梧桐子大每服五十丸食前飲湯下

〇已上諸方治風熱之劑

四斤丸（和劑方）治腎經虛寒下攻腰脚筋脉拘攣掣痛不

已履地艱辛脚心隱痛一應風寒濕痺脚氣緩弱並宜

服之

宣州木瓜（去穰）　天麻

蓯蓉（洗淨各一斤各焙）　附子（炮去皮臍二两）

虎骨（塗酥炙二两）　牛膝（去蘆一斤焙同木瓜天麻蓯蓉四味如前法治了用無灰酒五斤浸春秋各五日夏三日冬十日取出焙乾再入附子虎骨）

右爲細末用浸藥酒打麪糊丸如梧桐子每服五十丸

空心煎木瓜酒鹽湯任下常服補虛除濕大壯筋骨

加味四斤丸濟生方治肝腎俱虛精血不足足膝酸疼步履不隨如受風寒濕氣以致脚痛者最宜服之

虎脛骨（酥炙一兩）　天麻（一兩）　宣木瓜（一箇去穰蒸）

肉蓯蓉（一兩酒浸焙）　沒藥（別研）　乳香（別研各半兩）

川烏（炮去皮一兩）　川牛膝（去蘆酒浸一兩半）

右爲末入木瓜膏和酒糊杵搗爲丸如梧桐子每服七十丸空心溫酒鹽湯任下

木瓜丸和劑方治腎經虛弱下攻腰膝筋脉拘攣腫滿疼痛行履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澁

熟地黃（燒焙）　陳皮（去白）　烏藥（各四兩）　黒牽牛（炒三兩）

杏仁（去皮尖）　牛膝（酒浸）　石楠藤葉　當歸（酒浸）

蓯蓉（酒浸）　續斷　乾木瓜（各二兩）　赤芍藥（二兩）

右爲末酒煮麪糊丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒下

木瓜牛膝丸（三因方）治寒濕四氣下注腰脚緩弱無力腫急疼痛

木瓜（大者三四箇切開蓋去穰先用糯米漿過鹽焙乾為末却將鹽末入瓜內令滿仍用蓋釘定蒸三次爛研為膏）

川烏（大者去皮尖用无灰酒一升浸薄切以酒煮乾細研為膏三兩）　青皮

青鹽（別研）　羗活　萆薢（一方无）　茴香（焙）

牛膝（酒浸）　狗脊（炒去皮）　巴戟　海桐皮（各一兩）

右爲末入青塩拌匀将前二膏搜和如硬再入酒杵数千下丸如梧桐子每服五十丸空心塩酒塩湯任下

神烏丸（濟生方）治遠年近日乾濕脚氣

川烏（炮去皮臍切片炒令変色）　虎脛骨（酥炙）　海桐皮

川萆薢（各二兩）　川牛膝（去苗酒浸）　肉蓯蓉（酒浸各一兩半）

金毛狗脊（燎去皮毛半兩）

右為末用木瓜膏為丸如梧桐子每服七十丸空心温酒下

思仙續斷丸（本事方）治肝腎風虚下注脚膝痛引腰脊一切風毒流注並皆治之

萆薢（四兩）　防風（去芦）　薏苡仁（各三兩）　五加皮（三兩）

生地黄（五兩）　思仙术（即杜仲剉炒絲斷五兩）　牛膝（酒浸）

川續斷　羌活（各三兩）

右爲末酒三升化青塩三兩木瓜半斤去皮子以塩酒煑木瓜成膏杵丸如梧子大每服七十丸空心塩酒塩湯任下

十金丹（三因方）治脚氣上攻心腹足心隱痛小腹不仁関節攣痺疼痛無時煩渇引飲大小便或秘或利

石斛（酒浸）　狗脊（燎去毛）　萆薢（各一兩）　蓯蓉（酒浸一兩）

熟地黃（二两）　牛膝（酒浸一两）　地仙子一两　茯苓一两

遠志（去心炒一两）　杜仲（去皮炒二两）

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸溫酒塩湯任下

〇已上諸方治虚寒之劑

外應散（康叔家傳方）治脚氣用此薰蒸淋洗

石楠葉　矮樟葉　杉片　藿香

紫金皮　藁本　獨活　大蓼

白芷　紫蘇　羌活

右剉碎加大蒜五六十粒葱一握用水二斗煎七分置盆內令病者以足加其上用厚衣盖覆薰蒸痛處候溫可下手時却令使人淋洗

五枝湯（聖惠方）洗脚氣

右用桃柳楮桑槐五件枝條煎湯洗脚消腫住痛先喫酒三五盃

一方

用無名異末化牛皮膠調匀貼痛處

一方

用萆麻子七粒去殼研爛同蘇合香丸和匀貼脚心其痛即止

一方

用草烏末以麴酒糟搗爛貼患處即止若無麴糟用生姜汁亦可

一方　治脚氣衝心

用白礬二两水一斗五升畧煎三五沸浸洗

一方　治寒濕脚氣不可忍者

用團魚一两箇水二斗煑至一斗去團魚止用汁加蒼耳尋風藤蒼术各半斤煎至七升去柤以盆盛之乘熱薰蒸待温浸洗神効

○已上諸方外治之法

丹溪心法

○足跟痛　有痰有血熱　血熱四物加黄栢知母牛膝之類　有痰唾者五積散加木瓜

四物湯見補損

五積散見中寒

○脚轉筋（新增）

附諸方

一方　治脚轉筋疼痛攣急

用松節二两剉細乳香一錢以銀石器内慢火畧炒焦存性研細每服一錢至二錢木瓜酒調下

一方　治脚轉筋

取赤蓼莖細切用水四合酒二合煎至四合分二服

一方（[illegible]）

急将大蒜磨脚心令遍熱即瘥

一方　治脚氣筋骨疼痛

用金銀花為末每服二錢熱酒調下或剉碎同木瓜白芍藥官桂當歸甘草酒水各半鍾煎去柤空心熱服

丹溪心法附餘卷之十七終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之十八　庚集

積門

積聚痞塊六十三

丹溪心法

○痞塊在中為痰飲　在右為食一云痰積　在左為血塊　氣不能作塊成（聚塊）乃有形之物也痰與食積死血而

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

成也用醋煮海石醋煮三稜蓬术桃仁紅花五靈脂香附之類為丸石醎白术湯吞下　瓦壠子能消血塊次消痰　石醎一物有痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積

治塊當降火消食積食積即痰也　行死血塊去須大補○凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不去當用消積藥使之融化則除根矣　凡婦人有塊多是血塊

戴云積聚癥瘕有積聚成塊不能移動者是癥或有或無或上或下或左或右者是瘕

○積聚癥瘕朱先生醫台州潭補家用蜀葵根煎湯去滓再入人參白术青皮陳皮甘草稍牛膝煎成湯入細研桃仁玄明粉各少許熱飲之二服當見塊下如病重者須補接之後加減再行

入方

消塊丸　即千金方硝石大黃丸止可磨塊不令人困須量度虛實

硝石（六两）　人參（三两）　甘草（三两）　大黃（八两）

右為末以三年苦酒三升（又云三斗）置甆器中以竹片作準每入一升作一刻桂竪器中先納大黃不住手攪使微沸盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬使可丸則取丸如鷄子中黃大每一丸米飲下如不能大丸作小丸如

梧子大每三十丸服後當下如鷄肝如米泔赤黑等色下後避風冷啖軟粥将息之（苦酒即米醋也）

三聖膏

未化石灰半斤為末瓦器中炒令淡紅色提出火候熱稍减次下大黄末一两就炉外炒候熱减下桂心末半两畧炒入米醋熬攪成黑膏厚紙攤貼患處

○痞塊在皮裏膜外須用補氣藥香附開之兼二陳湯加補氣藥先須斷厚味

又方琥珀膏

大黄　朴硝各一两

右為末大蒜搗膏和貼

又方　治茶癖

石膏　黄芩　升麻

右為末沙糖水調服

又方　一人愛喫茶

白术　軟石膏　片芩　牛膽星

薄荷（圓葉大者）　白芍

右為末沙糖調作膏食後津液化下

又方　治脇下有塊

龍會丸二錢半起料　姜黄五錢　桃仁五錢

右爲末蜜丸服

又方

龍會丸和鶉鴿糞尤能消食積或入保和丸治塊看在何部分

治血塊丸　瓦壟子能消血塊

海粉（醋煮）　三稜　莪朮（醋煮）　紅花

五靈脂　香附　石鹼

右為丸白朮湯吞下

又方　治婦人血塊如盤有孕難服峻利

香附（醋煮四兩）　桃仁（去皮尖）　白朮（各一兩）　海粉（醋煮二兩）

右爲末神麯糊丸

又方　治婦人食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜眩暈身熱時作時止男子亦可服

黃連（一兩半一半用吳茱萸炒去茱萸一半用益智炒去益智不用）　山梔（炒）

川芎　三稜　神麯　桃仁（去皮尖各一兩）

香附（童便浸一兩）　蘿蔔子（炒一兩半）　山查（一兩）　莪朮（醋煮一兩）

右為末蒸餅丸服　又方有青皮半兩白芥子一兩半炒

保和丸　治一切食積

山查（六兩）　神麯（二兩）　半夏　茯苓（各三兩）

陳皮　連麴　蘿蔔子（各一兩）

右為末炊餅子如梧子大每服七八十丸食遠白湯下

又方

山查（四兩）　白朮（四兩）　神麯（二兩）

右爲末蒸餅丸如梧子大每服七十丸白湯下

又方

山查（三兩）　白朮（二兩）　陳皮　茯苓

半夏（各一兩）　連麴　黄芩　神麯

蘿蔔子（各半兩）

右爲末蒸餅丸如梧子大每服五十丸食後姜湯下

阿魏丸　治肉積　諸阿魏丸脾虛者須以補脾藥作湯使下之切不可獨用虛虛之禍疾如反掌

連麴（一兩）　山查（二兩）　黄連（一兩三錢）　阿魏（二兩醋煮作糊）

右為末醋煮阿魏作糊丸服二十丸白湯下

小阿魏丸

山查（三兩）　石醶（三錢）　半夏（一兩皂角水浸透晒乾）

右為末粥糊丸每服三十丸白湯下

又方　治飽食停滯胃壯者宜此脾虛勿服

山查　蘿蔔子　神麯　麥芽

陳皮　青皮　香附（各二兩）　阿魏（一兩醋浸軟另研）

右為末炊餅丸

又阿魏丸　去諸積聚

山查　南星（皂角水浸）　半夏（皂角水浸）　麥芽（炒）

神麯（炒）　黃連（各一兩）　連翹　阿魏（醋浸）

瓜蔞　貝母（各半）　風化硝　石醲

蘿蔔子（蒸）　胡黃連（一兩半如無以宣連代）

右為末姜汁浸蒸餅丸

佐脾丸

山查（三兩）　半夏　茯苓（各一兩）　連翹

陳皮　蘿蔔子（各半兩）

右為末粥丸服

小溫中丸

青皮（一兩）　香附（四兩便浸）　蒼朮（二兩）　半夏（二兩）

白朮（半兩）　陳皮（一兩）　苦參（半兩）　黃連（一兩姜汁炒）

針砂（醋炒二兩）

右為末麯糊為丸

又方

針砂（醋煑三兩）　香附（童便浸四兩）　山查　神麯（炒二兩）

黃連（姜汁炒一兩半）　山梔　厚朴（姜汁炒）　半夏（一兩）

台芎（半兩）　蒼朮（一兩）

一方加人參炒白朮一兩半有苦參用白朮苦參不用黄連

枳實丸

白朮二兩　枳實　半夏　神麯

麥芽各一兩　姜黄　陳皮各五錢　木香一錢半

山查一兩

右為末荷葉蒸飯為丸梧子大每服一百丸食後生姜湯下

大温中丸　又名大消痞丸

黄連炒　黄芩六錢　姜黄　白朮一兩

人參　陳皮　澤瀉二錢　炙甘草

砂仁　乾生姜　炒麯二錢　枳實炒半兩

半夏四錢　川朴三錢（姜制）　猪苓一錢半

右爲末炊餅丸

附諸賢論

或問人有積塊痞氣心腹痛鋒鏠者雖多服久服附子姜桂等熱藥而不發藥毒不生他病然本病日深者何也

王節齋曰諸積諸痛畜温而恶寒熱藥與病情相合積久成鬱而火邪深矣鬱時熱既深則見寒愈逆見熱愈畜兩熱相從故不生他病所謂亢則害承迺制火極而似

水者也然真氣被食陰血乾枯病日深痼而不可為矣世人不識但見㧞熱不熱悞認為沉寒痼冷而益投之至死不悟悲夫然則治之當如何曰當用從治法內經曰熱因寒用寒因熱用伏其所主先其所因者是也

附脉理

脉訣舉要曰脅痞脉滑為有痰結弦伏亦痞濇則氣劣肝積肥氣弦細青色心為伏梁沉芤色赤脾積（痞氣浮大）而長其色脾土中央之黄肺積息賁浮毛色白奔豚屬急而懸五臟為積六腑為聚積在本位聚無定處浮牢小而沉實或結或伏為聚為積實強者生沉小者死生死之別病同脉異

脉經提綱曰欝脉沉濇積脉弦堅

附諸方

肥氣丸（三因方）治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜鼈狀久不愈發咳逆嘔其脉弦而細

當歸頭 蒼朮（各一两半） 青皮（炒一两） 莪朮

三稜 鐵孕粉（各三两與三稜莪朮同入醋煮一伏時久）

蛇含石（煅醋淬五錢）

右為末醋煮米糊丸如菉豆大每服四十丸當歸浸酒下

伏梁丸（三因方）治心積起於臍上至心大如臂久不已病煩心身体脛股皆腫環臍而痛其脉沉而芤

枳殻（去穰麩炒）　茯苓　厚朴　人參

白术　半夏　三稜（煨各等分）

右為末麪糊丸如梧子大米飲下二十丸作散酒調亦可

痞氣丸（三因方）治脾積在胃脘覆大如盤久不愈病四肢不收黄疸飲食不為肌膚心痛徹背背痛徹心其脉浮大而長

附子（半兩炮）　赤石脂（煨醋淬）　川椒（炒出汗）　乾姜

桂心（半兩）　大烏頭（二錢半炮去皮臍）

右為末蜜丸如梧子大朱砂為衣每服十丸米飲下

息賁湯（三因方）治肺積在右脇下大如覆杯久不愈病洒洒寒熱湯逆喘咳發肺壅其脉浮而毛

半夏（湯洗七次）　吳茱萸（湯洗）　桂心　人參

甘草（炙）　桑白皮（炙）　葶藶（各一兩半）

右剉每服四錢水一鍾生姜七片棗二枚煎食前服

奔豚湯（三因方）治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下無時久不愈病喘逆骨痿少氣其脉沉而滑

甘李根皮（焙乾）　乾葛（各一兩二錢半）　川芎

當歸　半夏（湯洗泡七次四兩）　白芍藥　甘草（炙）

黄芩（各二兩）

右㕮咀每服四錢水一鍾半煎七分服

○已上數方治五積之劑

勝紅丸（簡易方）治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水大人酒積（婦人脾血）積氣小兒食積並皆治之

陳皮　莪术（二味同醋煮）　青皮　三稜

乾姜（炮）　良姜（各一兩）　香附子（炒去皮二兩）

右為末醋糊丸如梧子大每服二十丸姜湯下

木香通氣丸（聖惠方）治痰癖氣滯心腹痞滿嘔逆咳嗽順氣消痰進飲食消痞

人參　木香（各一兩半）　玄胡索（一兩）　陳皮

黑牽牛（各六兩）　檳榔　丁香（各半兩）　三稜（炮）

蓬茂（炮各三兩）　半夏（製）　茴香（炒）　木通

神麯　麥蘗（各二兩）　青皮（一兩）

右為末水糊丸如小豆大每服三四十丸生姜湯下食後日二服

導氣枳殼丸（宣明方）治氣結不散心胸痞痛氣逆上攻喘急咳嗽

枳殼（去穰麩炒）　木通　青皮（去白）　陳皮（去白）

桑白皮（炒）　蘿蔔子　白牽牛（炒）　黑牽牛（炒）

莪术（煨）　茴香（炒）　荊三稜（煨各半兩）

右為細末生姜汁打麪糊為丸如梧子大每服五十丸

橘皮湯送下

消滯丸　治酒食所傷心腹痞悶刺痛積滯不消

黑牽牛二兩　香附子（炒一兩）　五靈脂一兩

右為細末醋糊為丸如梧子大每服五十丸食後生姜

湯送下

荊蓬煎丸拔粹方　破痰癖消癥塊積聚胷膈痞悶通利三

焦升降陰陽

蓬术（二兩醋浸冬三夏一）　三稜（二兩酒浸冬三夏一）

二味用巴豆三十八箇銀器內炒乾黃色不用

巴豆

木香　枳殼　青皮　茴香

檳榔（各一兩）

右為細末麪糊為丸如桐子大每服三五十丸食遠生

姜湯下

烏梅丸　治酒積消食化痰

烏梅（一斤）　半夏（半斤）　生姜（一斤）

右件石臼擣細末新瓦兩片夾定火上焙三日三夜為

度次下

神麯　麥芽　陳皮　青皮

莪朮　丁皮　大腹子　枳殼（各四兩）

右共爲細末酒糊爲丸每服四五十丸姜湯下

木香三稜丸（宣明方）治一切氣閉胷膈痞滯榮衛不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛無問新久

青木香　破故紙　茴香（炒）　黒牽牛

甘遂　芫花　大戟　荆三稜

蓬莪朮　川練子　胡蘆巴　巴戟（去心各六錢）

巴豆（去皮心不出油各七分半）　陳米（三合將巴豆同陳米一處炒黒）

砂仁（二兩）

右一十五味用好醋半升除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿入鍋煑盡爲度碾爲細末醋糊丸如菉豆大每服五七丸食後湯水送下

寳鑑破積導飲丸　治内有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

檳榔　陳皮（去白）　廣木香　青皮（去白）

枳殼（去穰麩炒）　枳實（去穰麩炒）　蓬莪茂（炮）　荆三稜（炮）

半夏（湯泡七次）　神麯（炒）　大麥芽（炒）　乾生姜

茯苓（去皮）　甘草（炙）　澤瀉（各五錢）　牽牛（頭末二錢一分）

一方六錢　巴豆（三十箇去心膜油取霜）

右爲細末入巴豆霜勻生姜汁打糊爲丸梧子大每服三十丸溫生姜湯送下食前

○已上數方辛溫消導之劑

開結枳實丸（御藥）宣導凝滯消化痰飲升降滯氣通行三焦滋潤脾胃去結潤燥流暢大小腸專主中痞痰涎惡心嘔噦醉飽膈實宿物停積兩脇膨悶咽嗌不利上氣喘欬等疾

枳實（去穰麩炒）　白朮　半夏（湯泡）　天南星

白礬（枯）　苦葶藶（隔紙炒）　大黃　青皮（去白各半兩）

木香（三錢）　黑牽牛（頭末一兩）　皂角（去皮子各一兩）

右爲細末生姜汁煑面糊為丸如梧子大每服四十丸溫生姜湯送下　如单腹脹上喘涎多四肢腫滿食後生姜湯下　如婦人乾血氣膈實腫滿或產後有傷面目浮腫小便不利生姜葱白湯下　酒疸溫酒下

沉香降氣丸（瑞竹）治胷膈痞滿升降水火調順陰陽和中益氣推陳致新美進飲食

沉香　木香　蓽澄茄　枳殼（去穰麩炒）

砂仁　白豆蔻仁　青皮　陳皮

廣朮　枳實（麩炒）　黄連　半夏（姜製）

白茯苓（去皮一兩）蘿蔔子（另研半兩）香附子（炒去毛二兩）

右為細末生姜自然汁浸蒸餅為丸如梧子大每服七十丸臨卧煎橘皮湯下姜湯亦可忌生冷

香稜丸　治五積六聚氣塊

三稜（六兩醋炒）　青皮　陳皮　莪朮（炮或醋炒）

枳殼（炒）　枳實（炒）　蘿蔔子（炒）　香附子（各一兩）

黃連　神麯（炒）　麥芽（炒）　鱉甲（醋炙）

乾漆（烟盡為度）　桃仁　砂仁　硇砂

歸尾　木香　甘草（炙各一兩）　檳榔（六兩）

山查（四兩）

右為末醋糊丸每服三五十丸白湯下

一方　治腹中癖塊及諸般積塊脾胃怯弱飲食不消腹脹面黃四肢酸疼無力

麩麯（四斤炒黃色）　蒼朮（米泔水浸去粗皮）　皂礬（一斤以好醋一碗煮乾盆地上一宿取出）

右同為末酒糊丸梧子大每服三十丸加至五十丸空心米湯或酒任下一日三服

積氣丹（聖惠方）治新久一切沉積氣塊癥瘕積聚面黃肌瘦沉困無力口吐酸水

檳榔（二箇）　芫花　三稜　黃連

牛膝　商陸根　廣茂（各一兩）　硇砂（一錢）

〻〻肉豆蔻　青皮　陳皮　石菖蒲

巴豆（生）　木香（各二錢半）　一大戟　大黄

甘遂　白牽牛　乾姜　青磁石

乾漆（各五錢）

右爲末醋糊丸如梧桐子大每服十丸臨卧燒棗子湯下若是有積者肚内作声病退為度不退每夜十丸一

○廣茷此方用陳皮青皮木香梹榔之類所以治無形之氣積用牛膝乾漆三稜莪术之類所以治有形之血積用大戟芫花甘遂牽牛商陸磁石硇砂之類所以治水穀魚肉之積也餘用乾姜巴豆以治新積之

寒用大黄黄連以治久積之熱可謂周而且備矣然此軀脉之劑中病當已而不可服之太過也歟

○已上數方辛平消導之劑

宣壽丸

大黄（炮二錢）　青皮　陳皮　蒼术（各一兩）

當歸（去頭一兩）　黑牽牛（四兩）

右為末煮蘿蔔丸如梧子大每服五十丸温水臨卧下米粥補之

妙功丸　治飲食不節起居失常七情所感動勞不一以致氣凝血滯於榮衛之中或冒風寒溫氣凝結於經絡

之間臟腑之內或為癥瘕或為積聚癖塊此藥功効不可具述

大黃（四兩）　黃連　鬱金（各一兩）　輕粉（二禾）

硇石（煅二禾）　粉霜（半禾或一禾）　川芎（二兩）　黑牽牛末（八兩）

滑石（四兩）　白豆蔻　沉香　木香（各半兩）

蓬朮　檳榔　黃芩（各一兩）

右件除粉霜輕粉硇砂另研白豆蔻另研和勻水丸或稀糊丸如梧子大量虛實加減

木香和中丸（聖惠方）　消腸胃中積聚癥瘕癖塊宣暢三焦開利胸膈　治氣逆上攻心胸脇肋脹滿痞痛四肢六脈拘急身体困倦潤大便利小便和脾氣進飲食

木香（去腐）　沉香　檳榔　枳殼（去穰）

蓬莪朮（去皮）　青皮（去穰）　陳皮（去白）　當歸（酒浸）

黃芩（去腐）　木通（去皮）　黃連（去須）　白豆蔻

三稜（去皮）　牙皂（連子醋炙）　郁李仁（去皮各二兩）

大黃（煨四兩）　縮砂（二兩半）　黃栢（去粗皮三兩）　香附（去毛三兩）

牽牛（末二兩或四兩）

右為末水丸如梧子大每服一錢半加至三錢生姜湯下或茶酒亦得不拘時候

木香枳殼丸（御藥）　治一切酒食所傷胸膈痞悶脇肋脹滿

心腹疼痛飲食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼（去穰麩炒）　茯苓（去皮）　白朮（[illegible]）　厚朴（去粗皮生姜製）
半夏（湯洗七次）　人參（去芦頭）　木香　青橘皮
陳橘皮（二味各湯浸去穰焙乾）　荊三稜（炮）　莪朮（二味煨香）
檳榔　神麯（炒）　麥芽（炒各一兩）　乾生姜（半兩）
枳實（用炒半兩）　牽牛（微炒）　大黃（各二兩）

右為細末生姜汁為丸加麪糊如梧子大每服七十丸食後姜湯下

廣茂丸人有積病則氣滯而饑此方用藥攻補無施真

真得古人養正積自除之理有疾病而涉虛者用此最當

木香檳榔丸（瑞竹）治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨脹大小便結滯不快

木香　商枳殼（去穰麩炒）　青皮（去白）　陳皮（去白）
檳榔　廣茂　黃連（各二兩）　黃栢（去粗皮）
香附子（略炒）　大黃（各三兩）　黑牽牛（半斤取頭末四兩）

右為細末滴糊丸梧子大每服五十丸食後溫生姜湯下

全真丸（瑞竹）方治三焦氣壅結痞心胸大便不通傷寒下

一證已服承氣不利服此有立安穩而通

川大黃　商枳殼（麸炒）　檳榔　黑牽牛（半生半熟）

各半兩

右爲細末滴水爲丸如梧子大每服五十丸或七十丸米飲下

解毒檳榔丸　治男子婦人嘔逆酸水痰涎不利大便膿血口苦煩燥涕唾稠粘嗽血血崩腹脹氣喘手足痿弱四肢無力酒疸食黃口舌生瘡寒熱往來癱瘓腸風痔瘻癥瘕血積諸惡瘡疔疽皆治之

檳榔　黃連　青皮　陳皮

木香　沉香　巴戟（去心酒浸）　當歸

廣朮　枳殼　香附子（炒）　甘草（炙）

大黃（各二錢半）　黃柏（七錢半）　牽牛末（一两）

右為細末滴水為丸如梧子大每服七十丸溫生姜湯下

取積丹　聖惠方

用好大黃不以多少為末用好釅醋熬膏子為丸如梧子大每服一百丸量虛實入小休吃晚飯用好墨研濃好酒送下次日見膿

○已上數方辛凉消導之剤

七轉靈應丹　治一切山嵐瘴氣蠱毒不問新舊諸積諸氣及婦人血瘕血閉小兒肚大面黃疳積及一切心痛諸般蟲積凡人面上白班唇紅能食心嘈顏色不常臉上有蟹爪路者便有虫也此丹四時宜服不損真氣無病之人春秋各服一服打下虫積終歲無病惟孕娠不宜服之

蕪荑（五錢取末四錢）牽牛（五兩取頭末三兩）檳榔（五兩取淨末三兩）

大黃（五兩取淨末三兩）木香（五錢取淨末四錢）雷丸（四兩取淨末三兩）

錫灰（一兩煅取淨末三錢）

右各取淨藥末一處拌勻葱白湯露一宿為丸如黍米大每服四錢病深年遠者加至五分用葱白湯露一宿早晨空心冷下取出病根日晚用溫粥補之忌生冷硬物葷腥等物三十日若失聲音加沉香琥珀各五錢又方以茵陳皂角各四兩煎膏為丸或入史君子鶴虱各五錢為末更好

八仙妙應丹　治男子婦人小兒外感內傷以致水穀停留腸胃生蟲成積惡心嘔吐吞酸糟雜癥痢黃疸水腫鼓脹膈噎翻胃及婦人癥瘕積聚心腹疼痛小兒疳症面黃肌瘦肚大脚細一切蟲積並治

雷丸（一兩）　錫灰（一兩半）　白蕪荑（一兩）　木香（一兩不見火）

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

錦文大黄（一两）　檳榔（十二两雞心者）　史君子（一两取淨）　黑丑（三两頭末不見火）

右八味為細末葱白一斤煮沸露一宿為丸如粟米大每服四錢病重年深体實者加至五錢葱白湯送下或木香湯下十五歲以上者可服三歲七歲者每一服作三服早辰空心冷下務在旁内坐桶不要見風出外通泄或見積如絮觔不斷或如爛魚腸肚或如雞旦黄色或如米泔水色稠粘不斷或如馬尾虫或血鱉虫或胡蚕虫或蝦蟆樣子一切等物一服即出有虫即取下虫有積即取下積有氣即消了氣必効之藥加以硇砂甘遂尤妙如虚老之人用此推蕩後服四君子湯數帖尤好

木香三稜散（瑞竹）　治腹中有虫面色痿黄一切積滯

黑牽牛（半生半炒取末五錢）　大腹子（二錢）　檳榔　雷丸　錫灰（醋炒）　三稜（煨）　蓬木（煨）　木香（二錢）　大黄（三錢）

右爲末每服五錢用沙糖水調服先将燒肉一片口中細嚼吐出然後服藥　一方加阿魏一錢蕪荑仁三錢

萬應丸　下諸虫

檳榔（五錢末）　大黄（八两末）　黑牽牛（四两末）　苦練根皮（一斤）　皂角（十定把不蛀者）

右先将皂角苦練根皮二味用水一大碗熬成膏子一

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

處搜和前藥三味碾細末爲衣先用沉香衣後用雷丸木香衣每服三丸四更時分用沙糖水送下

取寸白虫

紫梹榔十箇　向陽石榴皮七十片

右水煎露一宿以下虫為度

治吐虫有積

用黑錫灰梹榔末米飲調下

一方　治茶積

用花椒為末麪糊丸如梧子大每服十丸茶湯送下

一方　治酒積面黃黑色腹脹不消

用甘遂一錢為末以猪槽頭肉一兩細切搗爛和末作一丸紙褁火煨令香熟取出臨卧細嚼酒嚥取出病根

○已上數方追虫取積之剤

龍會丸　見脇痛

癥瘕積聚痞塊之症諸書所載皆以内爲喜怒憂思悲恐驚七情所致此言良有以也但云五臟傳尅成積不無求之太過乎盖人之氣血榮衛一身上下周流無時少息一旦七情感動五志之火性炎上有升無降以致氣液水穀不能順序稽留而爲積也必矣丹溪曰氣不能成塊成聚塊乃有形之物痰與食

積死血而成也在中為痰飲在右為食積在左爲血塊誠然言也何以明之夫左關肝膽之位肝膽藏血液右關脾胃之位藏飲食所以左邊有積則為血塊右邊有積則為食積而其中間則為水穀出入之道路五志之火熏蒸水穀而為痰飲所以中間有積則為痰飲也其理昭矣治法調其氣而破其血消其食而豁其痰是已如木香檳榔去氣積三稜莪朮去血積麥芽神麯去酒積香附子枳實去食積牽牛甘遂去水積山查阿魏去肉積海粉礞石去痰積雄黃白礬去涎積乾姜巴豆去寒積黃連大黃去熱積各從其類也大抵積之初固為寒而積之久則為熱矣予今分辛温辛平辛凉三例正欲人知新久之義爾

抑嘗論之醫為病所困者惟陰虚之難補久積之難除玉山自倒陰虚之謂也養虎遺患久積之謂也嗚呼人之罹此二者須節慾以養性内觀以養神澹泊自如從容自得然後委之於醫不然雖張劉李諸子復生亦不能為我保也

丹溪心法附餘卷之十八　終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丹溪心法附餘卷之十九

辛集

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

虛損門

發熱（八十四 虛煩不眠）　附胸中煩熱　虛熱

丹溪心法

○陰虛發熱証難治　戴云凡脉数而無力者便是陰虛也　四物湯加炒黃栢黃芩龜板兼氣虛加人參黃芪黃

芩白木　四物湯加炒栢是降火補陰之妙劑甚者必加龟板　嗜酒人發熱難治　不飲酒人因酒發熱者亦難治　一男子年二十三歲因酒發熱用青黛瓜蔞仁入姜汁每日數匙入口中三日而愈　陽虛發熱補中益氣湯

手足心熱屬熱鬱用火鬱湯　傷寒寒熱當用表散

發熱柴胡惡寒蒼木虛人用蒼木恐燥　發熱惡風人壯氣實者宜先解表　發熱惡寒亦宜解表

入方

蒼木（半兩）　片芩（三錢）　甘草（一錢半）

右為末湯浸炊餅丸服

治手心發熱　山梔　香附　或加蒼木　白芷

半夏（生用）　川芎

右為末神麯糊丸服

治大病後陰虛氣鬱夜熱

酒芍藥（一兩二錢五分）　香附（一兩）　蒼木（半兩）

炒片芩（二錢）　甘草（一錢半）

右為末炊餅丸

濕痰發熱

炒片芩　炒黃連（半兩）　香附（二兩半）　蒼木（二兩）

右為末用瓜蔞穰丸

退勞熱食積痰

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, R.O.C.

上甲　下甲　側栢　瓜蔞子　半夏

黃連　黃芩　炒栢

右爲末炊餅爲丸

○胸中煩熱須用梔子仁　有實熱而煩燥者亦用梔子仁　有虛熱而煩燥者宜參芪麥門冬白茯苓竹茹白芍藥　若脉實數有實熱者

神芎丸

○虛熱用黃芪止虛汗亦然又云肌熱及去痰者須用黃芩肌熱亦用黃芪　如肥白人發熱宜人參黃芪當歸芍藥浮小麥炒止虛汗同

補中益氣湯治虛中有熱或肌表之熱

○治虛煩不得眠

六一散加牛黃

補中益氣湯

火鬱湯

升麻　葛根　柴胡　白芍藥（各一兩）

防風　甘草（各五錢）

右剉每五錢入連鬚葱白三寸煎稍熱服不拘時

神芎丸（見火類）

附諸賢論

王節齋曰世間發熱證類傷寒者數種治各不同外感内傷乃大関鍵張仲景論傷寒傷風此外感也因風寒感於外自表入裏故宜發表以解散之此麻黄桂枝之義也以其感於冬春之時寒冷之日即時發病故謂之傷寒而藥用辛熱以勝寒若時非寒冷則藥當以變矣如春温之月則當變以辛凉之藥如夏暑之月即當變以甘苦寒之藥故云冬傷寒不即病至春變温至夏變熱而其治法必因時而有異也又有一種冬温之病謂之非其時而有其氣蓋冬寒時也而反病温焉此天時不正陽氣反泄用藥不可温熱又有一種時行寒疫却在温煖之時時本温煖而寒反為病此亦天時不正陰氣反逆用藥不可寒凉又有一種天行温疫熱病多發於春夏之間沿門闔境相同者此天地之癘氣當隨時令參運氣而施治宜用劉河間辛凉甘苦寒之藥以清熱解毒已上諸證皆外感天地之邪者也若夫飲食勞倦内傷元氣此則真陽下陷内生虛熱故東垣發補中益氣之論用人參黄芪等甘温之藥大補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足者也又若勞心好色内傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而變為火矣是為陰虛火旺勞瘵之證故丹溪發陽有餘陰不足之論用四物湯

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

加黃栢知毋補其陰而火自降此用血藥以補血之不足者也益氣補陰皆內傷證也一則因陽氣之下陷而補其氣以升提之一則因陽火之上升而滋其陰以降下之一升一降迥然不同矣又有夏月傷暑之病雖屬外感却類內傷與傷寒大異蓋寒傷形寒邪客表有餘之證故宜汗之暑傷氣元氣為熱所傷而耗散不足之證故宜補之東垣所謂清暑益氣者是也又有因時暑熱而過食冷物以傷其內或過取凉風以傷其外此則非暑傷人乃因暑而自致之之病治宜辛熱解表或辛溫理中之藥却與傷寒治法相類者也凡此數證外形相似而實有不同治法多端而不可或謬故必審其果為傷寒傷風及寒疫也則用仲景法果為溫病熱病及溫疫也則用河間法果為氣虛也則用東垣法果為陰虛也則用丹溪法如是則庶無差誤以害人性命矣今人但見發熱之證一皆認作傷寒外感率用汗藥以發其表汗後不解又用表藥以凉其肌設是虛證豈不死哉間有頗知發熱為虛而用補藥則又不知氣血之分或氣病而補血或血病而補氣誤人多矣故外感之與內傷寒病之與熱病氣虛之與血虛如氷炭相反治之若差則輕病必重重病必死矣可不畏哉可不謹哉予

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

欲會此數証合為一書使界限判然而治法昭若以惠斯人而未遑也故略發其槩以為後日張本云

附諸方

補中益氣湯（拔萃方）治陽虛發熱久患虛勞

黃芪　甘草（各半錢）當歸身（二錢）人參（三錢）

白朮（七錢半）柴胡（五錢）升麻（五錢）陳皮（七錢半）

又方加白芍藥　紅花　黃栢

右剉每服一两水二鍾煎至一鍾食前溫服

地仙散（經驗方）治骨蒸肌熱一切虛煩

地骨皮　防風（去芦各一兩）人參（半[illegible]）鷄蘇

甘草（各二錢半）

右剉每服一两生薑三片淡竹葉五片水二鍾煎至一盞去滓通口服不拘時候

四白散（局方）治子婦人諸虛發熱夜多盜汗羸瘦脚痛不能動行

黃芪　厚朴　益智仁　藿香

白朮　白扁豆　陳皮（各一錢半）半夏

白茯苓　人參　烏藥　甘草

白豆蔲仁（各五錢）芍藥（一兩半）檀香

沉香（各二錢半）

右剉每服一两生姜三片棗一枚水一鍾半煎至七分食後溫服

黃芪飲子（濟生方）治諸虛勞瘵四肢倦怠潮熱之力日漸羸瘦胸膈痞塞咳嗽痰多甚則唾血

黃芪（蜜炙一两半） 當歸（去芦酒浸） 紫苑茸（去土） 石斛（去根）

地骨皮（去梗） 人參 桑白皮 鹿茸（酒蒸）

款冬花（各一两） 附子（炮去皮） 半夏（湯泡七次） 甘草（炙各半两）

右剉每服四錢水一鍾姜七片棗一枚煎服此藥氣溫補榮衛枯燥者不宜進唾血加阿膠蒲黃各半两

○已上數方治陽虛氣虛發熱之劑

當歸黃芪湯 治虛火上攻頭目渾身胸背發熱

當歸（酒浸）一錢 黃芪（五錢）

右剉水一鍾煎至七分去渣食後溫服

子芩散（拔萃方）涼心肺解勞熱

黃芩（一两） 白芍藥 子芩 人參

白茯苓 麥門冬 桔梗 生地黃（各半两）

右剉每服一两水二鍾竹葉一握小麥二十粒姜三片煎至一鍾去滓通口食後服

人參柴胡散（拔萃方）治邪熱客於經絡肌熱痰嗽五心煩躁頭目昏痛夜有盜汗婦人虛勞骨蒸並宜服

白茯苓（去皮） 赤芍藥 人參（去芦） 白术
柴胡（去芦） 當歸（去芦） 半夏麯 葛根
甘草（炙各一两）

右㕮咀每服一两水二鍾姜三片棗一枚煎至一盞去滓食後服

人參地骨皮散（拔萃方）治臟中積冷榮中熱按之不足舉之有餘此乃陰不足陽有餘也

茯苓（去皮五錢） 知母 石膏（各一两） 地骨皮
人參 柴胡（去芦） 生地黄 黄芪（各一两半）

右剉每服一两姜三片水二鍾煎至一鍾去滓（[illegible]）拘時服

人參黄芪散（和劑方）治諸虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忪日晡潮熱夜有盜汗胸脇不利減食多渴咳嗽痰壅稠粘時有膿血

天門冬（去心三十两） 半夏（制） 知母
桑白皮（炒） 赤芍藥 黄芪（去芦） 紫苑
甘草（炙各十五两） 白茯苓（去皮） 柴胡（去芦） 秦艽（去土）
生乾地黄 地骨皮（各二十两） 人參 桔梗（各十两）
鱉甲（去裙醋炙一两） 一方有生姜

右㕮咀每服一两水二鍾煎至一鍾温服不拘時

鱉甲地黄湯（濟生方）治虛勞手足煩熱心下怔悸及婦人血室枯乾身躰羸瘦飲食不為肌肉

柴胡（去芦）　當歸（酒浸）　麥門冬（去心）　鱉甲（醋炙）

石斛（去根）　白木　茯苓（去皮）　熟地黄（酒贈）

秦艽（去土）（各一两）　官桂（不見火）　人参　甘草（炙）（各半两）

右㕮咀每服一两生姜五片烏梅一箇水二鍾煎至一鍾温服

人参散（醫方集成）治邪熱客於經絡痰嗽煩熱頭目昏痛夜多盜汗四肢倦怠一切熱血虛勞宜服

黄芩（五錢）　人参　白木　茯苓

赤芍藥　柴胡　甘草　當歸

半夏麯　葛根（各一两）

右㕮咀每服八錢生姜四片棗二枚水二鍾煎至八分去滓溫服

知母散（楊氏方）治虛勞心肺有熱咳嗽唾膿血大躰解勞除熱調順榮衛

黄芪（蜜炙）（一两）　白芍藥　生地黄　黄芩

麥門冬（去心）　人参（去芦）　白茯苓（去皮）　桔梗（去芦）

知母（各七錢半）　甘草（五錢）

右㕮咀每服八錢水一鍾生姜三片小麥一撮竹葉一

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

片煎至八分食後溫服

柴胡梔子飲（聖惠方）治勞熱等証

柴胡　梔子　桔梗（各一兩）　生地黃

地骨皮　人參　茯苓　白朮

甘草　當歸（各一兩半）　薄荷（五錢）　滑石（一兩半）

苦參（二錢半）

右㕮咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至八分去渣食後溫服

柴胡散（拔萃方）治寒熱體虛羸瘦肢節疼痛口乾煩躁

柴胡　黃芪　赤茯苓　白朮（各一兩）

人參　地骨皮　枳殼（製）　桑白皮

赤芍藥　生熟地黃（各七錢半）　麥門冬（三兩）

甘草（炙五錢）　桔梗（七錢半）

石㕮咀每服一兩生姜三片水二鍾煎至一鍾溫服

樂令建中湯　治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將成勞瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡（一兩去芦）　細辛　黃芪（蜜炙）　人參（去芦）

桂心　橘皮（去白）　當歸（去土）　白芍藥

茯苓（去皮）　麥門冬（去心）　甘草（炙各一兩）　半夏（湯泡七次）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚煎服不拘時

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

人參保肺湯（宣明方）治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸潮熱

人參（去芦） 柴胡（去芦） 當歸（去芦） 芍藥
桑白皮 知母 白术 川芎
黄芪（去芦） 紫菀 荊芥 地骨皮（各二錢半）
茯苓（去皮） 黄芩 連翹 大黄
薄荷 山梔子（各五錢） 甘草 桔梗（各一两）
石膏 滑石 寒水石（各五錢）

右㕮咀每服一两水二鍾生姜三片煎至七分去滓温服（泄者去大黄）

防風當歸飲子（宣明方）治煩渴發熱虛煩蒸病

柴胡 人參 茯苓 甘草（各一两）
滑石（三两） 大黄 當歸 芍藥
防風（各半两）

右㕮咀每服一两水二鍾生姜三片煎至一鍾去柤通口服不拘時如有痰嗽加半夏 泄者去大黄

○已上諸方治陰陽氣血两虛發熱之劑

青蒿散（楊氏方）治虛勞骨蒸咳嗽聲嗄皮毛乾枯四肢倦怠夜多盜汗將作潮熱飲食減少日漸瘦弱

天仙藤 鱉甲（醋炙） 香附子（炒去毛） 桔梗（去芦）

前胡（去苗） 秦艽 青蒿（各一兩） 烏藥（五錢）

甘草（炙一兩半） 川芎（二錢半）

右㕮咀每服一兩生姜三片棗一枚水二鍾煎至一鍾

食前溫服

秦艽鱉甲湯（拔萃方）治骨蒸壯熱肌肉消瘦唇紅頰赤困

倦盗汗

地骨皮 柴胡 鱉甲（各一兩） 秦艽

知母 當歸（各五錢）

右剉每服一兩水一鍾烏梅一箇青蒿數莖煎至一鍾

去滓通口服

地骨皮枳殼散（拔萃方）治骨蒸壯熱肌肉消瘦少力多困

夜多盗汗

地骨皮 秦艽 柴胡 枳殼

知母 當歸 鱉甲（醋炙黃 等分）

右㕮咀每服一兩水一鍾半柳桃各七枚生姜三片烏

梅一箇煎至八分通口食後服

秦艽鱉甲散（和劑方）治氣血勞傷四肢倦怠面黄肌瘦骨

節煩疼潮熱盗汗咳嗽痰壅山嵐瘴氣並皆治之

荊芥（去梗） 貝母（去心） 天仙藤 前胡（去芦）

秦艽（去芦洗） 青皮（去白） 柴胡（去芦） 甘草（炙）

陳皮　白芷　鱉甲（去裙醋浸炙各一兩）

乾葛（二兩）　肉桂（去皮）　羌活（各半兩）

右爲末每服二錢水一鍾姜三片煎八分熱服酒調亦可

已上數方治陰虛血虛發熱之劑

廣按發熱之證實非一端王節齋先生論之詳矣尚有痰飲脚氣食積虛煩四證未之及也其治各證發熱之方已隨本證不復重舉外今於發熱下只具治陽虛陰虛二者之方古人於陽虛陰虛二證論之未詳而方之未辯至丹溪出而後明矣何則晝夜發熱晝重夜輕口中無味陽虛之證也午後發熱夜半則止口中有味陰虛之證也陽全陰半陽得以兼陰陰不得以兼陽自然之理也陽虛之證責在胃陰虛之證責在腎蓋饑飽傷胃則陽氣虛矣房勞傷腎則陰血虛矣古人以飲食男女為切要厥有旨哉以藥而論之甘溫則能補陽氣苦寒則能補陰血如用四君以補氣四物以補血是也若氣血兩虛但以甘溫之劑以補其氣氣旺則能生血也若只血虛而氣不虛忌用甘溫之劑以補其氣氣旺而陰血愈消矣故陽虛之與陰虛甘藥之與苦藥不可不詳審而明辨也歟

小草湯　治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

小草　黄芪（去芦）　當歸（酒浸）　麥門冬（去心）
酸棗仁（炒去殻）　石斛（各一两）　人參　甘草（炙各半两）

右剉每服四錢水一鍾姜五片煎八分温服不拘時

人參竹茹湯（三因方）治胃口有熱嘔吐欬逆虚煩不安

人參（半两）　半夏（一两）　竹茹（一團）

右作大服用水一鍾半姜十片竹茹一團煎温服

一方加橘皮一两去白

地仙散　治骨蒸肌熱一切虚煩（見發熱）

辰砂妙香散（和劑方）治男子婦人心氣不足精神恍惚虚煩少睡夜多盗汗常服補益氣血安鎮心神

射香（一錢另研）　山藥（一两姜汁炙）　人參（半两）　木香（煨二錢半）
茯苓（去皮）　茯神（去皮木）　黄芪（各一两）　桔梗（半两）
甘草（炙半两）　遠志（去心炒一两）　辰砂（三錢別研）

右為末每服二錢温酒調服不拘時

人參竹葉湯（三因方）治汗下後表裏虚煩不可攻者

竹葉（二把）　人參　甘草（各一两）　半夏（二两半）
石膏　麥門冬（各五两）

濟生方除石膏加茯苓小麥

右剉每服四錢水鍾半姜五片粳米一撮煎去滓空心服

橘皮湯（三因方）治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大煩骨節疼痛目眩惡寒食反嘔逆穀不得入

橘皮（一兩半）　甘草（炙半兩）　人參（二錢半）　竹茹（半兩）

右剉細每服四錢水一鍾姜三片棗一枚煎空心服活人書加生姜一兩棗八枚作六味

竹葉石膏湯　治大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛不可汗下者

溫膽湯　治大病後虛煩不得眠卧及心胆虛怯觸事易驚短氣悸乏或腹自汗（並見傷寒類）

〇已上數方治虛煩之劑

惡寒八十五（附面熱面寒）

丹溪心法

〇陽虛則惡寒用參芪之類甚者加附子少許以行參芪之氣　一婦人惡寒用苦參赤小豆各一錢為末虀水調服探吐之後用川芎南星蒼术酒炒黃芩為末麪糊丸服五六十丸白湯下冬月芩減半加姜汁調麪煮糊丸　虛勞冬月惡寒之甚氣實者可利亦宜解表柴胡乾葛　惡

寒久病亦用解鬱

戴云凡背惡寒甚者脉浮大而無力者是陽虛也

○面熱火起　寒鬱熱

○面寒　退胃熱

自汗

辛集

丹溪心法

○自汗屬氣虛　血虛　濕　陽虛　痰　東垣有法有方　人參黃芪少佐桂枝　陽虛附子亦可少用須小便煑　火氣上蒸胃中之濕亦能作汗涼膈散主之　痰症亦有汗　自汗大忌生薑以其開腠理故也

附脉理

脉訣舉要曰汗脉浮虛或濇或濡軟散洪大渴飲無餘

附諸方

黃芪建中湯　治男子婦人血氣不足体常自汗（方見補損）

芪附湯（濟生方）　治氣虛陽弱虛汗不止肢体倦怠

黃芪（去蘆蜜炙）　附子（炮去皮臍）（各等分）

右㕮咀每服四錢水二鍾煎至一鍾去滓臨卧通口服

玉屏風散　治自汗

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

防風　黃芪（各一兩）　白朮（二兩）

右每服三錢水一鍾半煎服

大補黃芪湯　治自汗虛弱之人可服

黃芪（蜜炙）　防風　川芎　山茱萸肉

當歸　白朮（炒）　肉桂　甘草（炙）

五味　人參（各一兩）　白茯苓（一兩半）　熟芐（二兩）

肉蓯蓉（一兩）

右每服五錢棗二枚水煎服

一方　治諸虛不足津液枯竭身常自汗晝夜不止日漸羸瘦

防風　黃芪　白朮　麻黃根

牡蠣（洗淨煆過各一兩）

右用水一鍾小麥一撮煎溫服

防風黃芪湯　治風濕相搏時自汗出（方見中濕）

撫芎湯（濟衆方）治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎　白朮（去油略炒）　橘紅（各一兩）　甘草（各半兩）

右㕮咀每服四錢水一鍾姜二片煎八分溫服

涼膈散（見火類）

溫粉

牡蠣　麥皮　麻黃根　藁本

糯米　防風　白芷

一右為末周身撲之

又方

何首烏末津調封臍妙

辛集

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

盜汗　八十七

丹溪心法

○盜汗屬血虛　陰虛　小兒不須治　忌用生薑　東垣有方　用當歸六黄湯甚効但藥性寒人虛者只有黄芪六一湯　盜汗發熱因陰虛用四物加黄栢兼氣虛加人參黄芪白术

戴云盜汗者謂睡而汗出也不睡則不能汗出方其睡熟也溱溱然出焉覺則止而不復出矣非若自汗而自出也雜病盜汗責其陽虛與傷寒盜汗非比之亦是心虛所致宜歛心氣益腎水使陰陽調和水火升降其汗自止

附諸方

麥煎散　（和劑方）治榮衛不調夜多盜汗四肢煩熱肌肉清一瘦

知母　石膏　甘草（炙）　滑石

白茯苓　人參　地骨皮（淨洗）　赤芍藥

葶藶　麻黃根（兩半）　杏仁（去皮尖麩炒各半兩）

右為末每服一錢浮麥煎湯調服

當歸六黃湯（聖惠方）治盜汗之聖藥也

當歸　生地黃　熟地黃　黃柏

黃芩　黃連（各一分）　黃芪（加一倍）

右剉每服一兩水二鍾煎至一鍾去滓臨卧通口服

黃芪六一湯　治虛人盜汗

黃芪（六兩）　甘草（一兩）

右各用蜜炙十數次出火毒每服一兩水煎

治盜汗（百一選方）心液為汗此藥收斂心經

人參　當歸（各等分）

右二味等分每服五錢先用豬心一枚破作數片并心內血煎湯澄清汁煎藥服

參芪湯（秘方）治虛人盜汗

人參　甘草（炙）　白扁豆（炒）　乾葛

茯苓　陳皮　白朮　黃芪

山藥　半夏麯（各等分）

右㕮咀每服一兩水二鍾煎至一鍾去查溫服不拘時

降心丹和劑方治心腎不交盜汗遺精

方見補損　○按此寧心神之藥也

又方

白朮四两分作四分　一分用黃芪同炒

一分用石斛同炒　一分用麩皮同炒

一分用牡蠣同炒

右各微炒黃色去餘藥只用白朮研細每服三錢粟米湯調下盡四两炒　○按此燥脾溫藥也

正氣散　治盜汗

黃柏炒　知母炒各一錢半　甘草炙五分

右作一服水煎食前熱服　○按此去相火之藥也

又方　治別處無汗獨心孔一片有汗思慮多則汗亦多病在用心宜養心血

以艾煎湯調茯苓末一錢服之

又方

青桑第二葉焙乾為末空心米飲調服最止盜汗

又方

五倍子為細末以唾調填臍內絹帛縛定立効

一方　治陰囊汗

用蜜陀僧研令極細加蛤粉撲患處

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

○廣按自汗盜汗之證為病雖一其源不同自汗者乃陽虛氣虛有濕也陽氣虛則不能衛護肌表故醒時津津然而汗出矣盜汗者乃陰虛血虛有火也陰血虛則不能榮養於中故睡時溱溱然而汗出矣何以知之如古方用玉屏風散治自汗効者其間防風黃芪所以實表氣白朮所以躁內濕也用當歸六黃湯治盜汗効者當歸黃芪生熟地黃所以補陰血黃芩黃連黃栢所以去內火也其藥性與病情相對豈有不愈者乎

丹溪心法

○瘵證斷不可作風治而用風藥　有濕熱　濕痰　氣虛　血虛　瘀血　濕熱東垣健步丸加燥濕降陰火蒼朮黃芩黃栢牛膝之類　濕痰二陳湯加蒼朮白朮黃芩黃栢竹瀝姜汁　氣虛四君子湯加黃芩黃栢蒼朮之類　血虛四物湯加黃栢蒼朮煎送補陰丸　亦有死積死血妨碍不得不降者　大率屬熱用參朮四物湯黃栢之類

附諸賢論

或曰手陽明大腸經肺之腑也足陽明胃經脾之腑也治痿之法取陽明一經何也頤明以告我丹溪先生曰內經云諸痿生於肺熱只此一句便見治法大意經曰東方實西方虛瀉南方補北方此固是就生尅言補瀉而大經大法不外於此東方木肝也西方金肺也南方火心也北方水腎也五行之中惟火有二腎雖有二水居其一陽常有餘陰常不足故經曰一水不勝二火理之必然肺金體燥而居上主氣畏火者也脾土性濕而居中主四肢畏木者也火性炎上若嗜慾無節則水失所養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用而諸痿之病作矣瀉南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此駱隆吉亦曰風火既熾當滋腎水東垣先生取黃柏為君黃芪等補藥之輔佐以治諸痿而無一定之方有兼痰積者有濕多者有熱多者有濕熱相半者有挾氣者臨病製方其善於治痿者乎雖然藥中肯綮矣若將理失

宜聖毉不治也天產作陽厚味發熱先哲格言但是患

痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安全也

附脉理

脉訣舉要曰尺脉虛弱緩濇而緊病為足痛或是痿病

附諸方

二陳湯（見痿類）

四君子湯

四物湯

補陰丸（並見補損）

東垣健步丸

防己（一兩酒洗）　羌活　柴胡　滑石

甘草（炙）　瓜蔞根（洗酒洗各半兩）　澤瀉

防風（各三錢）　苦參（酒洗）　川烏（各一錢）　肉桂（五分）

右為末酒糊為丸梧子大每服七十丸葱白煎愈風湯

下

愈風湯（見中風）

清燥湯　治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒水生

化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓

不能動

黃蓍（一錢五分）　蒼朮（一錢）　白朮　橘皮

澤瀉（各半錢） 人參 白茯苓 升麻（各三分）

麥門冬 歸身 生芐 麯末

猪苓（各二分） 酒栢 柴胡 黄連（各一分）

五味（九箇） 甘草（炙二分）

右每服半两水煎空心服

五獸三匱丹（滲寮方） 治因氣血耗損肝腎不足兩脚痿弱

鹿茸（酥炙） 麒麟竭 虎脛骨（鮮片酥炙） 牛膝（去苗酒浸）

狗脊（燎去毛 各等分）

右修事為末即五獸丹料也

辰砂（一两為末） 附子（大者一箇去皮臍宛旋木心空入辰砂於内）

宣木瓜（一箇剜去心仍薰去皮入上附子於内以旋附子末盖附子口王坐於銀煖罐中垂昜蒸十分爛附子斷白為度即三匱丹也）

右為三匱丹研膏調五獸末子為丸如鷄頭大木瓜酒或降氣湯下

加味四斤丸（見脚氣） 治肝腎俱虚精血不足足膝酸疼步履不隨

五斤丸（楊氏方） 治筋血不足腰脚緩弱行步艱辛一切寒溼脚氣並治

沒藥（另研） 川烏頭（炮去皮） 山藥（各四两） 天麻（透明者切焙）

大木瓜 牛膝（去芦用無灰酒浸一宿控乾切焙）

肉蓯蓉（酒浸一宿切焙各一斤） 虎骨（塗酥炙金黄色四兩）

右將木瓜蒸爛研作糊和藥末如不就更加元浸牛膝酒打糊搜匀杵一二千下丸如梧桐子每服五十丸溫酒鹽湯任下

黑虎丹 治脚氣筋骨軟弱步履不隨 （方見脚氣）

一方 治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒

用大何首烏牛膝各一斤酒一升浸七宿晒乾於木臼內搗為末煉蜜丸如梧桐子大每服三五十丸空心溫酒飯湯任下

芫花散 治背腿間忽一二點痛入骨不可忍者

右用芫花根為末米醋調敷痛處以絹帛扎之婦人產後有此疾貼之妙

愚按風痿之別痛則為風不痛則為痿經曰痛則為實不痛則為虛曰風曰痿虛實二者而已矣東垣曰氣盛病盛氣衰病衰何則人之氣血充實而風寒客於經絡之間則邪正交攻而疼痛作矣人之氣血弱虛而痰火起于手足之內則正不能勝邪而痿痺作矣故丹溪先生曰痿症切不可作風治而用風藥蓋以風為實而痿為虛也曰散邪曰補虛豈可紊乱矣乎

厥　八十九　附手足十指麻木

丹溪心法

○厥逆也手足因氣血逆而冷也　因氣虛為主　有因氣虛　氣虛脉細　血虛脉大　熱厥脉數　外感脉沉實　有痰脉弦　因痰者用白朮竹瀝　氣虛四君子　血虛四物　熱厥用承氣　外感用双解散加姜汁酒　有陰厥陽厥陰衰於下則熱陽衰於下則寒

○手足麻者屬氣虛　手足木者屬湿痰死血　十指麻木是胃中有湿痰死血

附諸賢論

心法附録曰厥者甚也短也逆也手足逆冷也其証不一散之方書者甚多今姑撮其大槩且如寒熱厥逆者則爲陰陽二厥也陽厥者是熱深則厥蓋陽極則發厥也不可作陰証而用熱藥治之精魄絶而死矣急宜大小承氣湯隨其輕重治之所謂陰厥者始得之身冷脉沉四肢逆足踡卧脣口青或自利不渴小便色白此其候也治之以四逆理中之輩仍速灸関元百壯　尸厥飛尸卒厥此即中惡之候因冒犯不正之氣忽然手足逆

冷肌膚粟起頭面有黒精神不守或錯言妄語牙緊口噤或昏不知人頭旋暈倒此是卒厥客忤飛尸鬼繋凡弔死問喪入廟登塚多有此病以蘇合香丸灌之候稍甦以調氣散和平胃散服名調氣和胃散痰厥者乃寒痰迷悶四肢逆冷宜姜附湯以生附代熟附　蚘厥者乃胃寒所生經曰蚘者長虫也胃中冷即吐蚘宜理中湯加炒川椒五粒檳榔半錢吞烏梅丸效蚘見椒則頭伏故也　氣厥者與中風相似何以別之風中身溫氣中身冷以八味順氣散或調氣散如有痰以四七湯導痰湯服之

附諸方

大小承氣湯（見痢疾）

双解散（見傷寒）

四逆湯

理中湯

姜附湯（並見中寒）

蘇合香丸

八味順氣散（並見中風）

調氣散

白豆蔻　丁香　檀香　木香（各二錢）

藿香　甘草（炙各八錢）　砂仁（四錢）

右為末每服二錢入塩少許沸湯點服

平胃散　（見中溫）

烏梅丸　（見心痛）

四七湯

導痰湯　（並見痰類）

補氣湯（拔萃方）治皮膚間有麻木此肝氣不行也

黃芪　甘草（一兩）　白芍藥（一兩半）　澤瀉（五錢）

橘皮（一兩半）

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞通口服不拘時

勞瘵　九十

辛集

丹溪心法

○勞瘵主乎陰虛痰與血病　虛勞漸瘦屬火陰火銷爍即是積熱做成始健可用子和法後若羸瘦四物湯加減送消積丸不做陽虛　蒸蒸發熱積病最多　勞病四物湯加炒柏竹瀝人尿薑汁大補為上　肉脫熱甚者難治

入方

青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減至二斗

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

去蒿再熬至一斗入猪膽汁七枚再熬數沸甘草末收之每用一匙白湯調服

附脉理

脉訣舉要曰骨蒸勞熱脉數而虛熱而濇小必殞其軀加汗加咳非藥可除

附諸方

黄芪鱉甲散（和劑方）治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減食多渴咳嗽有血

鱉甲（醋浸去裙炙） 天門冬（去心各五兩） 知母（焙）
黄芪 赤芍藥（各三兩半） 地骨皮 白茯苓
秦艽 柴胡（去芦各三兩三錢） 生乾地黄（酒二兩）
桑白皮 半夏（者六） 紫菀 甘草（炙各二兩半）
人參 肉桂 苦梗（各一兩六錢半）

右㕮咀每服五錢水一盞煎至七分食後溫服

秦艽鱉甲散（和劑方）治氣血勞傷四肢倦怠面黄肌瘦骨節煩疼潮熱盜汗咳嗽痰唾（見發熱）

秦艽扶羸湯（和劑方）治肺痿骨蒸已成勞嗽或熱或寒声嗄不出躰虛自汗四肢怠惰

柴胡（去苗二兩） 地骨皮（一兩半） 鱉甲（米醋炙） 秦艽
當歸（酒焙） 半夏（湯洗七次） 紫菀茸 甘草（各一兩）

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片烏梅大棗各一枚煎至七分去滓食後溫服

青蒿散（楊氏方）治虛勞骨蒸咳嗽聲嗄皮毛乾枯四肢倦怠夜多盜汗時作潮熱飲食減少日漸瘦弱（方見發熱）

經効阿膠丸（濟生方）治勞嗽并嗽血唾血

卷栢葉　山藥（炒）　阿膠（蛤粉炒）　生地黃（酒洗）

防風（去芦）　雞蘇（各一兩）　栢子仁（炒另研）　大薊根

五味子　百部（洗去心）　遠志（去心甘草水煑）　人參

茯苓（去皮）　麥門冬（去心各五錢）

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼濃煎小麥湯送下

寧肺湯　治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰唾

蠟煎散（楊氏方）治虛勞久嗽痰多氣喘或咯膿血

杏仁（去皮尖以炒黃別研）　人參（去芦）　麥門冬（去心）

乾山藥　貝母（去心）　白茯苓（去皮）　百合（去心）

黃明鹿角膠（炙如無以阿膠代）　甘草（炙各等分）

右為末將杏仁別研拌匀每服二錢水一盞入黃蠟皂角子大同煎七分食後服

參芪散（直指方）治勞瘵咳嗽喘咯血聲焦潮熱盜汗

柴胡　阿膠（炒）　黃芪（蜜炙）　白茯苓

紫菀茸　當歸　川芎　半夏（製）

貝母（去心）　枳殼（製）　桔梗　秦艽（洗）

甘草（焙各五錢）　人參　五味子　羌活

防風　杏仁（去皮）　款冬花　鱉甲（醋炙）

桑白皮（炒各五錢半）

右㕮咀每服八錢水一盞半生姜三片棗子一枚煎至八分食後服

○已上諸方止欬嗽寧肺之劑

味十全大補湯　治發熱漸成勞瘵者

十全大補湯加柴胡黃連煎服如熱在骨髓更加青蒿

鱉甲煎服　（方見補損）

一方　治男子婦人骨蒸勞瘵增寒壯熱

青蒿（春夏用葉秋冬用子用子不用葉用根不用莖四者混用而反以為痼疾必用童便浸過便有功驗無毒）

大鱉甲（醋炙）　白朮（煨）　地骨皮　白茯苓

桑白皮（炙）　粉草（炙）　揀人參（去芦頭）　北柴胡（去芦）

瓜蔞實（各半兩）

右為末每服二錢姜三片煎服

鱉甲地黃湯　治虛勞手足煩熱心下怔悸及婦人血室枯乾身躰羸瘦飲食不為肌肉　（方見發熱）

青骨散（經驗方）治男子婦人五心發熱欲成勞瘵

生地黄（二兩）　人參（一兩）　防風（去芦一兩）　北柴胡（二兩）

薄荷葉（七錢半）　秦艽　赤茯苓　胡黄連（半兩）

熟地黄（一兩）

右㕮咀每服五錢水一盞煎七分温服患骨熱先服荆蓬煎丸一服使臟腑微利然後服此（荆蓬煎丸見積聚類）

○廣按丹溪云蒸熱發熱積病最多此云前服荆蓬煎丸後服青骨散暗合其妙

白朮黄耆散（宣明方）治五心煩熱自汗四肢痿弱飲食減少肌瘦昏昧並皆治之

白朮　黄芪　當歸　黄芩（去皮）

芍藥（各半兩）　人參　川芎（各七錢半）　石膏

甘草（炙各二兩）　寒水石　茯苓（各一兩）　官桂（一兩半）

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓温服食前一日三服

地骨皮枳殼散（方見發熱）治骨蒸壯熱肌肉瘦痿勞多困夜多盜汗

柴胡梅連散（瑞竹堂方）治骨蒸勞熱久而不痊三服除根其効如神及五勞七傷虛弱皆治

胡黄連　柴胡　前胡　烏梅（各二錢）

右㕮咀作一服取童子小便二盞猪膽一箇猪骨髓一條韭白半錢煎至一盞去渣服無時

○廣按此刼劑也胃虛者斟酌用之

太上混元丹（醫方集成）治勞損五臟補真氣

紫河車（一具用少婦首生男子者良帶子全者於東流水洗斷血脉入麝香一錢在內以線縫定用生絹包裹懸胎於沙瓮內入無灰酒五升慢火熬成膏）

沉香（別研）　硃砂（別研水飛過各一兩）　人參

肉蓯蓉（酒浸）　乳香（別研）　安息香（酒煮去沙）　白茯苓（去皮各二兩）

右為末入河車膏子和藥末杵千百下丸如梧桐子每服七十丸空心溫酒下沉香湯下尤佳服之可以輕身延年

○巳上諸方補虛除熱之劑

當歸地黃湯（宣明方）治咳血衂血大小便血或婦人經候不調月水過多喘嗽者

當歸　芍藥　川芎　白朮

槐子　黃藥子（各半兩）　生地黃　甘草

茯苓（去皮）　黃芩　白龍骨（各一兩）

右為末每服五錢水一盞煎至七分去渣溫服食前

一方　治陰虛内多食積痰

川芎（七錢）　黃連　瓜蔞仁　白朮

神麯　麥芽各一兩　青黛半兩　人中白三錢

右為末姜汁蒸餅丸服（外册溪退勞熱食積痰有方具在發熱類）

遇仙灸（和劑方）治瘵捷法取癸亥日二更後六神皆聚時解去下衣直身平立以墨點記腰上兩傍陷處謂之腰眼穴然後上床合面卧每穴灸七壯勞蟲或吐或瀉而出取後用火焚之弃於江河中恐害人故也或依崔氏穴法灸之宜服後將軍丸

將軍丸（秘方）治傳瘵勞瘵前灸法并此藥乃異人傳授累經效驗

錦文大黃（九蒸曬）[illegible]兩　射香一錢研　管仲

牙皂（去皮醋炙）　桃仁（去皮炒）　檳榔　雷丸各一兩

蕪荑半兩　鱉甲（一兩醋炙黃）

右為末先將蒿葉二兩東邊桃柳李桑葉各七片水一碗煎七分去渣入蜜一大盞再熬至成膏入前藥末及射香安息香搗丸如梧桐子每服三十丸食前棗湯下

○廣按此方追蟲取積之藥也

神授散（三因方）治諸傳尸勞氣殺蟲去毒

川椒（二斤揀去子并合口者炒去汗）

右為末每服一錢空心米湯調下必麻痺暈悶少頃如不能禁即以酒糊丸如梧桐子空心服五十丸

已上諸方治血痰虛積之劑

○廣按人之五臟各一惟腎有二左腎以藏真水右腎以藏相火少年之人嗜慾無節以致真陰衰弱相火獨旺火寡于畏自下衝上自裏達表故名為骨蒸勞瘵病也夫証有二其火衝乎上焦者發熱之中則兼咳嗽喘急吐痰吐血肺痿肺癰等証其火結於下焦者發熱之中則兼淋濁結燥遺精盜汗腹痛驚悸等証葛可久先生保和湯保真湯中已具其端倪矣東垣先生曰火與元氣不相兩立一勝則一負經曰少火生氣壯火食氣可見火為元氣之賊火既熾而氣傷矣氣傷則不能運化水穀水穀停留而為濕熱生痰生積之所由也治之之法滋陰降火是澄其源也消痰和血取積追蟲是潔其流也醫者可不以補虛為主而兼去邪矣乎

勞瘵治例（出明醫雜著）

王節齋曰男子二十前後色慾過度損傷精血必生陰虛火動之病睡中盜汗午後發熱哈哈咳嗽倦怠無力飲食少進甚則痰涎帶血咯唾出血或咳血吐血衄血身熱脉沉數肌肉消瘦此名勞瘵最重難治輕者用藥數十服重者期以歲年然必須病人惜命堅心定志絕房

室息忘想戒惱怒節飲食以自培其根否則雖服良藥無用也此病治之於蚤則易若到肌肉消爍沉困着床尺脉沉取細數則難為矣又此病大忌服人參若曾服過多者亦難治今製一方于后治色慾証先見潮熱盗汗咳嗽倦怠趂早服之

主方

川芎（一錢）　熟地黄（一錢）　白芍藥（炒一錢三分）

當歸（一錢三分）　黄蘗（七分蜜水拌炒）　知母（一錢蜜水拌炒）　生地黄（五分酒浸）

甘草（五分炙）　白朮（一錢三分）　天門冬（一錢去心及皮）

陳皮（七分）　乾姜（三分炒紫色）

生姜三片水煎空心溫服

若咳嗽盛加桑白皮馬兜鈴瓜蔞仁（各七分）五味子（十粒）

若痰盛加姜製半夏貝母瓜蔞仁（各一錢）

若盗汗多加牡蠣酸棗仁（各七分）浮小麥（一撮）

若潮熱盛加桑白皮沙參地骨皮（各七分）

若夢遺精滑加牡蠣龍骨山茱萸（各七分）

若赤白濁加白茯苓（一錢）黄連（三分炒）

若熱衄血咳血出於肺也加桑白皮（一錢）黄芩山梔仁（各五分炒）

若熱嗽血痰血出於脾也加桑白皮貝母黄連瓜蔞仁

各七分

若兼嘔血吐血出於胃也加山梔黄連乾姜蒲黄（炒各一錢）

韮汁（半銀盞）姜汁（少許）

若兼咯唾血出於腎也加桔梗玄參側栢葉（炒各一錢）

若先見血証或吐衂盛大者宜先治血治法輕少者凉血止血盛大者先消瘀血次止血凉血蓋血來多必有瘀於胷膈者不先消化之則止之凉之不應也葛可久十藥神書方可次第檢用方内惟獨參湯止可用於大吐血後昏瞶脉微細氣虛者氣雖虛而復有火可加天門冬（五錢）若如薺煎所云陰虛火動潮熱盗汗咳嗽脉數不可用也說見本草集要人參條下（明白）

此病偏火大便多燥然須節調飲食勿令泄瀉若胃氣復壞泄瀉稀溏則前項寒凉之藥難用矣急宜服藥理脾胃用白术伏苓陳皮半夏神麴麥芽甘草等藥候胃氣復然後用前本病藥收功保後可合補陰丸常服之及用葛可久方

又治勞証方法（出十藥神書）

心法附録曰夫人之生也稟天地氤氲之氣在乎保養真元固守根本則萬病不生四躰康健若曰不養真元不固根本疾病由是生焉且真元根本則氣血精液也余

嘗聞葛先師有言曰萬病莫若勞証最為难治蓋勞之起因人之壯年氣血完聚精液充滿之際不能保養性命酒色是貪日夜躭嗜無有休息以致耗散真元虛敗精液則嘔血吐痰以致骨蒸躰熱腎虛精竭面白顴紅口乾咽燥白濁遺精盜汗飲食艱難氣力全無謂之火盛金衰重則半年而斃輕則一載而亡况醫者不究其源不窮其本或投之以大寒之劑或療之以太熱之藥妄為施治絕不取效殊不知大寒則愈虛其中大熱則愈竭其內所以世之醫勞者萬無一人焉先師用藥治勞如羿之射無不中的今開用藥次第于後用藥之法如嘔吐咯嗽血者先以十灰散遏住如甚者須以花蕊石散止之　大抵血見熱則行見寒則凝見灰則止理之必然　止血之後其人必倦其躰次用獨參湯一補令其熟睡一覺不要驚動睡起病去五分後服諸藥

保和湯止嗽寧肺　保真湯補虛除熱

太平丸潤肺除痿　消化丸下痰消氣

保和湯內分血盛痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六事加味和之　保真湯內分驚悸淋濁便澁遺精燥熱盜汗六事加味用之餘無加用　服藥之法每日仍濃煎薄荷湯灌嗽喉中用太平丸先嚼一丸徐徐嚥下次噙一丸緩

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.