

臨川陳自明良甫編集

妊娘疾病門

鰲峯熊宗立道軒補遺
松軒葉玄昊類校

妊胎類

胎教已明須知妊娘疾病故以次之

凡妊娘諸病但忌毒藥餘當對證依法治之

妊娘隨月數服藥及將息法第一九二十方

千金妊娘一月名始胎飲食精熟酸美受御宜食大麥母食醒辛是謂

總正○又妊娘一月足厥陰脉養不可針灸其經足厥陰內屬於肝七

主筋及血一月之內血行否澁不為力事寢心安靜毋令恐懼

又妊娘一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚卒重腰痛腹痛胞急

卒有所下當預安之宜服烏雞湯方

烏雞一隻治法

吳茱萸并茯苓

阿膠各二升生薑

甘草各一 人参 为藥 白术各三 麥門冬五合 去心

右十味細切以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煮取三升内酒三升并膠烱盡取三升去滓温服一升日三服

若曾傷一月胎者當預服補胎方

北細辛一升 防風二升 烏梅一升 吳茱萸五合 乾地黄

白术各一 大麥五合 生姜四升

右咬咀以水七升煮取二升半去滓分温三服若寒多者倍細辛茱萸更熱多渴者去細辛茱萸加桔樓根二兩若有所思去大麥加栝子仁三合一方有人参一两忌生葱蒜菜桃李雀肉等物

妊娠二月名始膏母食辛臊居必靜處男子勿勞百節皆痛是謂胎始結○又妊娠二月足少陽脉養不可針灸其經足少陽内属於膽上主精二月之時見精成於胞裏當謹護驚動

○又妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即姜辛中風寒有所

動搖心滿膝下懸急腰背強痛卒有所下乍寒乍熱艾湯主之方

丹参三升 當歸 人参 麻黄去節 艾葉 阿膠各二升

甘草一升 大棗十二枚 擘 生薑六升

右九味切以酒三升水一斗内藥煮減半去滓内膠煎取三升分温三服忌海藻菘菜

又若曾傷二月胎者當預服黃連湯方

黃連 人参各一 吳茱萸五合 生地黄五升 生姜三升

右五味切以醋漿七升煮取三升四服日三夜一每十日一作若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直用水耳忌猪肉冷水茱萸一方當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子資良端坐清虛是謂外象而外感者也○又妊娠三月手心主脉養不可鍼灸其經手心主内属於

心無悲哀无思慮驚動

○又妊娘三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚恐憂愁瞋恚喜煩仆動於經脉腹痛繞脐苦痛腰背痛孕有所下

雄雞湯

雄雞一隻治如食法

甘草炙

茯苓

人參

阿膠各二

黃苓

白朮各一

芍藥四

麥門冬去心

大棗十二枚擘

生薑一

膠

右咬咀以水一斗五升煮雞減半內藥煮取一半入清酒三升并膠再煎至三升分三服一日盡之當温卧忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等○一方有當歸川芎二兩无黃苓生薑

又若曾傷三月胎者當預服**茯神湯**方

茯神

丹參

龍骨各一

阿膠

當歸

甘草炙

人參各二

赤小豆二十一粒

大棗十二枚擘

右咬咀酢漿一斗煮取三升分四服七日後服一剂腰痛者加桑寄生二深師方有薤白二又麻子一升忌同前

玉作陽

妊娘四月始受水精以成血脉其食稍瘦其羨魚鴈是謂成血氣以通

耳目而行經絡○又妊娘四月手少王脉養不可鍼灸其經手少王内

翰三膳四月之時兒六胎順成當靜形体和心志節飲食

○又妊娘四月為離至有寒心下温七欲嘔胃膈痛不欲食有熱小便

澀數如淋狀膝下苦急卒中風寒頸項強痛寒熱或驚動身軀腰背

腹痛往來有時治上迫胸煩不得安卒有所下**芎藭湯**方

芎藭

如雞子大一枚

麥門冬去心一升

麻黃去節

阿膠炙各

膠

生姜五丙

甘草炙

當歸

半夏洗各

人參一兩半

大棗十

擘

右細剉以水八升煮棗一半內清酒三升并阿膠煎取三升分三服温卧當汗以粉撲之護風寒四五日忌羊肉海藻菘菜鴿等

又若曾傷四月胎者當預服**調經湯**方

芍藥四丙

甘草炙

芎藭

續斷各一

柴胡

白朮各三

烏梅一升

生李根白皮二丙

當歸一丙半

生薑四丙

厚朴炙

枳實炙各

枳實二丙

枳實

右細切以水一斗蒸取三升分四服日三夜一八日再服一劑一方
有半夏二兩忌海藻松菜桃李雀肉

妊娠五月始受火精以成其氣晏起沐浴浣衣居處必厚其衣裳朝吸
天光以避寒殃其食稻麥其養牛羊和菜黃調以五味是謂養氣以調
五臟。又妊娠五月足太陰脉養不可針灸其至足太陰內輸於脾五
月之時兒四肢成無大飢無甚飽無食乾燥無自炙熱無太勞倦
。又妊娠五月毛髮初生有熱若頭眩心亂嘔吐有寒若腹滿痛小便
數者有寒者而四肢疼寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有所下

阿膠湯

方 又名游膠花湯

阿膠炙四兩 人參炙二兩 麥門冬去心一升 生薑六兩 吳茱萸七合

旋覆花當歸 為藥 甘草炙 黃芩各二兩

右細切以水九升煮取一半內清酒三升并膠微火煎取三升半分
為四服日三夜一先食再服使愈不差更忌海藻松菜

又若曾傷五月胎者當預服安中湯方

甘草炙 芍藥各三兩 當歸 人參 乾地黄 芫花各兩

五味子合 生薑六兩 麥門冬去心 大麻仁五合 大棗五枚 黃芩一兩

右細切水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七日再服
一劑忘如前

安胎胎動不安下在小腹痛引腰膝

小便疼下血小品方

當歸 阿膠 芍藥 人參各一兩 棗十二个 艾一虎口

右細切以酒水各三升合煮至三升去滓內膠令烊分三服腹中當
安小便緩也古今錄驗救急同一方有其草無參棗

妊娠六月始受金精以成筋身微勞無得靜處出遊於野數觀走犬
馬食宜鷲鳥猛獸之肉是謂交腠理紐筋以養其力以堅骨節

。又妊娠六月足陽明脉養不可鍼灸其經足陽明內屬於胃主其口

目六月之時兒口目皆成謂五味食耳美無大飽

○又妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫驚怖忽有

所下腹痛如欲產手足煩疼交命方

麥門冬 去心一升 甘草炙 人參 醋一 乾地黄 二兩 蒼朮 二兩

阿膠 四兩 生姜 六兩 大棗 十五枚 擘

右八味切以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分三服每

如人行三四里中間進糜粥忌海藻菘菜蕪菜

又若曾傷六月胎者當服交命方

柴胡 四兩 芍藥 一方一作紫葳 白朮

茯苓 一兩 芎藭 二兩 乾地黄 五兩 甘草 二兩 麥門冬 三兩 去心

右十味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一中間進糜粥勿食

生冷及堅強之物七日更服一劑忌海藻菘菜蕪菜桃李雀肉等

一方有黃芩二兩

集驗療妊娠六七月胎不安常處亦各阻病

旋覆花 一兩 厚朴 白朮 枳殼 黃芩 茯苓 各三

半夏 沙一方無 芍藥 生姜 各二兩

右細切以水一斗煮取二升半先食分五服日三夜二忌羊肉錫醋

桃李雀肉千金同

妊娠七月始受木精以成骨勞身挫肢無使定止動作屈伸以運血氣

自此後居處必燥飲食避寒常食粳稻以密腠理是謂養骨以堅齒

○又妊娠七月手太陰脉養不可針灸其經手太陰內屬於肺主皮

毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

○又妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉若傷寒煩熱

腹痛短氣常若頸項腰背強交命方

葱白 長三四寸 半夏 洗切 麥門冬 去心 各 生姜 八兩 甘草 炙

當歸 黃耆 各三 阿膠 四兩 人參 半 黃芩 一兩 旋覆花 一

右十一味切以水八升煮減半內清酒三升并膠煎取四升溫服一
升日三夜一溫卧當汗出若不出者加麻黃二兩煮服如前法若秋
後勿強責汗忌羊肉錫海藻菘菜等

又若曾傷七月胎者當預服**杏仁湯**

杏仁 去双仁皮尖碎 甘草 炙 鍾乳 研 乾姜 各二兩 麥門冬 去

吳茱萸 各一升 五味子 粳米 各五合 紫苑 一兩

右九味切以水八升煮取三升半分四服日三夜一中間進食七日
服一劑忌海藻菘菜

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理光澤
顏色○又妊娠八月手陽明脉養不可鍼灸其經手陽明力傷於大腸
大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無極失食無忍大起
○又妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常蓋
頭眩痛繞臍下寒時上小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷

痛而目視赤

芍藥 四分 人參 當歸

甘草 炙 各三兩 白朮 一兩 厚朴 二兩 薤白 切 一 生薑 切 四兩

右八味切以水五升酒四升合煮取三升分三服日再夜一忌海藻

菘菜桃李雀肉等

若曾傷八月胎者當預服**葵子湯**

耳草 炙 柴胡 白朮 各三兩 厚朴 芍藥 各二兩 葵子 二升

生薑 六兩 大棗 二十枚 擘

右八味切以水九升煮取三升分三服日三夜一劑忌海藻菘菜

桃李雀肉等

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食并緩帶自
時而待之是謂養毛髮多才力

○又妊娠九月足少陰脉養不可針灸其經足少陰內屬於腎心主續
絡九月之時兒脉續絡皆成無憂溫冷母着炙衣

○又妊娠九月若卒下刺腹滿懸急胎上衝腰背痛不可轉側短氣

半夏湯

半夏洗

麥門冬去心各五合

乾姜一兩

當歸

吳茱萸

阿膠炙各三兩

大棗十二枚擘

右七味切以水九升煮取三升去滓內白密八合微火上溫分四服
刺即止忌生血物

又若曾傷九月胎者當預服**猪腎湯**方

猪腎一具

茯苓

桑寄生

乾姜

乾地黄

芍藥各二

白木四兩

麥門冬一升去心

附子中者一枚逆

大豆三合

右十味切以水一斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取三升半分四服日
三夜一十日更一劑忌猪肉冷水蕪荑桃李雀肉酢物等

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節人神皆備
但疾時而生集驗延年同

補遺

治懷孕血氣虛弱不能榮以致數日而墜者名曰半

子嘗見一婦人每妊皆不能至滿十月而損墜得服此藥而遂安全

乾姜煨

阿膠炒

芍藥

五味子各一兩

黃耆

當歸

白木

白芍藥各一兩

木香不見火

人參

杜仲炒

甘草炙各半兩

右咬咀每服四錢水煎溫服

治証

同上胎動不安

方在十四卷服腹及背痛下用米飲吞

○妊娠惡阻方論第二凡十二方

夫妊娠阻病者按各殷產室方謂之子病巢氏病源謂之惡阻若婦人
稟受怯弱或有風氣或有痰飲既妊娠便有是病其狀顏色如故脉息
和順但覺肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食酸醎甚者或作寒
熱心中憤悶嘔吐痰水胸膈煩滿恍惚不能支持不拘初娠但疾苦有
輕重耳輕者不服藥亦不妨重者須以藥療之千金方有半夏茯苓湯
茯苓丸二方專治阻病然此二藥比來少有服者以半夏有動胎之性
蓋胎初結慮其易散此不可不謹也張仲景傷寒論云婦人傷風續得

寒熱發作有時此為熱入血室有用黃龍湯者小柴胡湯去半夏此
蓋為妊婦而設焉王子亨則有白朮散局方則有人參丁香散用之良
驗然三方皆大同而小異楊振則有人參橘皮湯齊士明則有醒脾散
予試之亦效皆不用半夏動胎等藥服者知之

白朮散

治惡阻吐清水甚害十餘日粥漿不入者

白朮 一兩 人參 半兩 丁香 半錢 甘草 一錢

右為細末每服二錢水一盞姜五片煎至七分溫服

人參橘皮湯

治阻病嘔吐痰水

白朮 麥門冬 去心各一兩 甘草 三錢 厚朴 陳橘紅

右為粗末每服四錢水一盞半淡竹茹一塊如彈子大生姜三片煎
至七分去滓澄清溫服空心食前○集驗無效冬麥門冬甘草

人參丁香散

治妊婦惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及心腹刺痛

人參 半兩 丁香 藿香葉 各一分

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服無時

人參 丁香 柿蒂 各二 甘草 良姜 各半

右為細末每服二錢熱湯點下無時

出王氏博濟方

治妊婦阻病嘔逆不食甚者中滿口中無味或作寒熱此

草豆蔻 以溫紙裹灰火中烘 厚朴 製各 乾姜 四分 甘草 一兩

右為細末每服二大錢水一大錢棗二箇生姜三片煎至八分去滓
呷服病輕者只一二服便能食舊有橘紅二兩治寒熱瘧痢不食後

人去橘皮以乾生姜代乾姜治老人氣虛大便秘少津液引飲有奇
効產科醫官齊士明依舊用乾姜去橘皮亦名醒脾飲子治阻病極

神驗宣和初在京師校勘

保生湯

治婦人經候不行身無病而似病脉滑大而六脉俱勻乃是

孕婦之脉也精神如故惡聞食臭或但嗜一物或大吐或時吐清水此

各惡阻切勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香生薑煎服
溫惡居方

右吹咀每服三大錢水一盞半姜五片煎至七分去滓溫服無時或
作末子調

○古今錄驗療惡食

人參四兩厚朴 生薑 枳殼 甘草各二兩

右切以水六升煮取三升分三服

○治妊娠阻病心中憤悶見食嘔吐惡聞食氣肢節煩疼身體沉重多
思嗜卧面黃肌瘦

白茯苓 麥門冬 甘草 生薑各十二分 大棗二十枚

右吹咀以水五升煎取二升溫分三服忌菘菜醋等○凡妊娠惡食
者以所思食任意食之必愈○一方無棗子有半夏竹茹如陳皮分兩

○系日散療妊娠胎氣不安氣不升降飲食不美嘔吐酸水起坐覺重

宜服之 香附子一兩 藿香葉 甘草各二錢

右為細末每服二錢入鹽少許百沸湯點下

○一方療妊娠惡食心中煩憤熱悶嘔吐

青竹茹 麥門冬各三兩 前胡二兩 橘皮一兩 芦根一握

右細切以水一大升煮取半升去滓分兩服食前一服○一方無麥
門冬用小麥三合如躡熱四肢煩熱者加地骨皮醫人夏候五錄方

李幾翁先生云若左脉弱而嘔服諸藥不止者當服理血歸原藥則愈
經云無陰則嘔是

○治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無効者用此藥理血

歸原則愈 人參 甘草 川芎 當歸

京芍藥 丁香各半兩 白茯苓 白木 陳皮各半

苦梗炒 枳殼去穢炒各一分 半夏泡洗七次切炒黃一兩

右吹咀每服三錢重生姜五片棗一枚煎

婦人良方... 安胎飲... 治懷胎三月四月至九箇月日惡阻病者心中憤悶頭重目眩四肢沉重懈怠不欲執作惡閉食氣欲啖鹹酸多睡少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動腰腹疼痛或時下血及妊娠一切疾病並皆治之

安胎飲 治懷胎三月四月至九箇月日惡阻病者心中憤悶頭重目眩四肢沉重懈怠不欲執作惡閉食氣欲啖鹹酸多睡少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動腰腹疼痛或時下血及妊娠一切疾病並皆治之

甘草 茯苓 當歸 熟地黄 川芎 白朮

黃耆 白芍藥 半夏 炮洗七次切破 阿膠 切粉炒 地榆 各半

右咬咀每服三錢水盞半生姜四片煎至八分去滓溫服無時候。一方無半夏地榆有人參桑寄生。一方無白朮黃耆半夏地榆有艾葉只是膠艾湯加白茯苓

補遺 予嘗治妊婦惡阻嘔吐不食頭暈不敢行步以苦柚皮濃煎湯飲數盞而愈吐甚者加姜汁

又方 縮砂仁末每二錢姜湯調下或米飲調亦可

。妊娠痰逆不思食方論第三 凡八方

夫水飲停積結聚為痰人背有之少者不能為害多則成病妨害飲食

乃至嘔逆妊娠之病若嘔逆甚者傷胎也原疾之由皆胃氣不調或風

冷乘之冷搏於胃故成斯病也亦惡阻之一端

半夏茯苓湯 治妊娠惡阻心中憤悶虛煩吐逆頭目昏眩四肢怠

墮百餘煩疼痰逆嘔吐燥聞食氣好啗鹹酸惡寒汗出羸極黃瘦多卧少起不進飲食妊婦有痰必生阻病千金以半夏茯苓湯以對之此思馳處方之妙也若孕婦羸弱胎孕不牢則動必成咎全在醫者相人強弱以投之又何慮焉

半夏 炮洗 乾薑 兩 茯苓 熟地黄 各 三 橘紅 北細辛

人參 芍藥 紫蘇 川芎 各 一 兩 苦梗 甘草 各 半

右咬咀每服四大錢水二盞姜七片煎至七分去滓空心溫服蒸服

茯苓圓。局方與崔氏無紫蘇細辛有旋覆花一兩有零熟煩渴口

瘡去橘皮細辛加前胡知母各三兩腹冷下痢者去地黄加炒桂心

二兩胃中虛熱大便秘小便赤澁加大黃三兩去地黃加黃芩一兩

婦人良方十卷
然半夏雖能動胎若炒過則無妨
張氏方 **半夏茯苓湯**
半夏 泡洗七次炒黃 陳皮各半 白茯苓 二兩 縮砂仁 兩 甘草 四兩
右咬咀每服四錢水二盞姜三片棗不為梅半人煎至七分食前溫服

張氏方

治妊娠阻病心中煩悶頭目暈重憎聞食氣吐逆吐痰煩悶

顛倒四肢重弱不自勝特服之即効要先行服半夏茯苓湯兩劑後服此藥
赤茯苓 人參 桂心 乾姜 半夏 泡洗七次炒黃

橘紅各一 白朮 葛根 甘草 枳殼 各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大米飲吞下五十九日三服。一方有麥門冬已海藻菘菜羊肉錫糖桃李 肉酢等。肘後只五味云

○瘵妊娠心膈支滿痰逆不思飲食
赤茯苓 前胡 白朮 紫蘇葉 各一 半夏 麥門冬

人參 大腹皮 各半斤

右為粗末每服四錢水一盞姜五片煎至七分去滓溫服。一方無大腹皮人參有大腹子檳榔
瘵妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生薑根 分 橘紅 四分 生薑 六分 檳榔 二分

右切以水二盞煮取七合空心熱服

瘵妊娠心膈氣滯嘔吐不下飲水心神虛煩四肢少力

枇杷葉 半夏 麥門冬 人參 甘草 半兩 呵子肉 藿香 各一 赤茯苓 枳殼 陳皮 各三分

右咬咀每服三錢水一盞姜三片棗一個煎至七分去滓溫服。一方無大棗呵子

集驗瘵婦人妊娠惡阻嘔吐不下食

青竹茹 橘皮 各三 生薑 茯苓 各四 半夏 五兩

婦人良方卷之五
婦人良方卷之五
右細切以水六升煮取二升半去滓分三服不差煩服忌羊肉鴿酥等物

古今錄驗療妊娠不欲食或吐春月所宜服
柴胡兩各二 麻黃一兩 食茱萸半切 大棗十二枚

右細切以水六升煮取三升適寒溫服一升日三服食噫醋除熱下氣所宜多與上同但秋夏去茱萸加枸杞一升六月加小麥一升石膏三兩秋去石膏加甘草一兩九月去麻黃加乾姜一兩十月加川芎三分忌海藻菘菜

補遺 旋復花 川芎 半夏 乾生薑 細辛 人參 陳皮 當歸
治妊娠惡阻痰逆嘔酸水惡食多卧

右吹咀每服四錢姜五片煎服
人參半夏丸治証同上

半夏 湯泡 乾生薑 等分
為末姜汁糊丸梧子大每服四十丸米飲或薑湯下

四物湯 治証並同上 方並在大卷風痰類

胎動不安方論第四 凡二十方

凡婦人妊娠胎動不以日月多少而常墮胎者有雖有胎而月信雖不多常來而胎不損者產寶方云婦人妊娠常胎動不安者由衝任經虛胞門子戶受胎不實故也并有飲酒房室過度有所損動不安者巢氏云婦人衝任二經挾風寒而有胎故不以日月多寡因畏有繫觸而胎動者有喜怒不常氣宇不舒傷於心肝觸動血脉衝任經虛乃致胞門不固或因登高上廁風攻陰戶入於子宮如此皆令胎動不安也曾有以妊娠月信不絕而胎不損問產科能宗古答曰婦人血盛氣衰其人必肥既娠之後月信當來而胎不動若據晚進觀之便以為漏胎若作

婦人良方... 婦人良方... 婦人良方...

漏胎治之則胎必墮若不作漏胎治則其胎未必墮今推宗古之言誠
有旨也巢氏云婦人經閉不利別有所若者是謂有子以其經血畜之
以養胎擁之為乳汁也有子之後畜以養胎矣豈可復能散動邪所以
然者有娠而月信每至是亦未必因血盛也若謂婦人榮經有風則經
血喜動以其風勝則可也既榮經為風所勝則所來者非養胎之血以
此辨之若作漏胎治之必服保養補胎之藥且胎不損強以藥滋之乃
所謂實虛也其胎終墮宜矣若醫者知榮經有風之理專以一藥
治風經信可止或不服藥胎亦无恙然而有胎本不固而因房室不節
先漏而後墮者須作漏胎治之此又不可不審也亦有婦人年方壯歲
聽醫官言其藥可服致補煖而反使胞門子戶為藥所操搏巢氏病原
并產寶方
並謂之胞門子戶使新血不滋舊血不下設或有子不以遲晚則必墮
中年之後氣字漸衰必有崩中帶下之疾或月信愆期漸覺黃瘦腰背
不伸五心煩熱五勞七傷之疾從此而生不獨胞門子戶風寒而生也

故千金聖藥有朴硝鹽胞湯正為此疾今之醫者未見有用亦未見有
知之者又論姙娠胎動其由有二一因母病而胎動但療母疾其胎自
安若胎不堅固自動其母疾唯當安胎其母自愈一因勞役氣力或觸
胃冷熱或飲食不適或居處失宜輕者轉動不安重者便致傷墮當以
母形色察之母面赤舌青者兒死母活唇口青兩邊沫出者子母俱死
面青舌赤口中沫出者母死子活也

○集驗方療姙娠二三月上至八九月胎動不安腹痛已有所見方

艾葉 阿膠 當歸 川芎 芍藥 三耳草 一兩

右細切以水八升煮取三升去滓內膠令烊分三服日三服千金文

仲備急同

刪繁療婦人懷妊胎動不安葱豉安胎一

香豉 一升 葱白 一升 阿膠 二兩 炙

先以水三升煮葱豉取一升去滓入膠再煎令烊服一日一夜可服

婦人良方... 婦人良方... 婦人良方...

三四劑經心錄同

新法 治妊娠八九月胎動不安心腹疼痛面目青冷汗出氣欲絕此由勞動用力傷胎宮宜急治之

鈎藤 當歸 茯神 人參 酪一 苦梗 一兩半 桑寄生 半

右為粗末每服五大錢水一盞煎至一盞去滓溫服無時候忌豬肉

○治妊娠胎動不安護胎法

鯉魚二斤 梗米一升 葱一握 豉 姜

右作臠食之每月一度

○治妊娠無故胎動不安腹內絞痛煩悶產室方同

當歸 桑寄生 各四兩 川芎三分 豉八合 阿膠二分 葱十四莖

一右以水二升煮取八合下膠空腹溫分二服一方無豉用銀器煎集

○治胎動不安腹痛下黃汁

糯米一合 黃耆 川芎 各二兩

右細剉水一大盞煎至一盞三分溫服

○產室方治胎動

熟艾 阿膠 各二 葱白一升

右以水四升煮取一升半分為三服

安胎藏草散

白藥子一兩 白芷半兩

右為細末每服二錢煎紫蘇湯調下或胎熱心煩悶入砂糖少許煎

銀芎酒 治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍方

芎根二兩 剉 銀五兩 清酒一盞

右以水一大盞煎至一大盞去滓分溫二服

○治胎動方 養生必用方救急療胎動去血腰痛

阿膠 川芎 當歸 青竹茹 各二錢

右以水十盞內銀一斤煮至五錢去銀入上件藥三味煮至二錢半去滓入膠再煎膠烱分溫三服空心自早至暮盡未効再作

○治妊娠冷熱腹內不調致胎不安產室方

艾葉二兩 當歸 乾姜略三川芎四兩

右以水四升煮取二升分溫四服不過兩劑

寄生湯 治胎氣常不安及五箇月已后胎不安

桑寄生 洗 秦朮 阿膠 糯米 半兩作粉

右以新汲水三升先下寄生秦朮二味煮至二升去滓次入阿膠糯米再煮約有一升止分作三服空心食前日午服之忌酒醋三五日妊娠胎氣至五月已后常不安者服之必効頃見妊娠好飲酒食鹹酸五辛胎必動可不知之

○治胎動不安

好銀煮取水 右着葱白作羹食之佳

方 川芎二兩 葱白一升

右以水七升煮取二升半分溫三服

順氣飲子 產前服之安胎

草豆蔻 茯苓 甘草 大腹子 紫蘇葉 木香 人參

右以咀每服三錢水一盞葶根三寸糯米少許煎至七分去滓溫服

○療妊娠後不轉動方

阿膠 桑寄生 各一兩 半兩

右為末以酒一升煮五沸下生鷄卵一枚投酒中分溫二服空心食前一服小品方無寄生有艾葉只用水煎

文仲 **安胎寄生湯** 療血流下方

桑寄生 白朮 茯苓 甘草 十分

右切以水五升煮取二升半分三服若人壯者可加芍藥八分足水二升若胎不安腹痛端然有所見加乾姜四分即安忌海藻菘菜酢

物桃李雀肉等

秦芫湯 治胎動不安 出王氏指迷方

秦芫 阿膠炒 艾葉

右等分為粗末每服五錢水二盞糯米百粒煎至一盞去滓溫服

小品療妊娠重下痛引腰背安胎止痛湯方

當歸 阿膠炙 乾地黄 黃連 芍藥各一兩雞子一枚

粳米一升

右七味以水七升掩雞子令相得煮粳米令如蟹目沸去滓內諸藥煮取三升分四服忌蕪荑經心錄同

又**膠艾湯** 療損動母去血腹痛方 膠一斤炙 艾葉一莖

右二味以水五升煮取二升半分三服經心錄同

補遺四物湯 加熟艾阿膠茯苓治一切胎動不安

高麗補中湯 杜仲丸皆妙方並見前

○妊娠漏胎下血方論第五

夫妊娠漏胎者謂妊娠數月而經水時下也此由衝任脈虛不能約制手太陽少陰之經血故也衝任之脈為經絡之海起於胞內手太陽小腸脈也手少陰心脈也是二經為表裏上為乳汁下為月水有娠之人經水所以斷者壅之養胎穡之以為乳汁也衝任氣虛則胞內泄不能制其經血故月水時下亦名胞漏血盡則人斃矣又有因勞役喜怒哀樂不節飲食生冷觸冒風寒遂致胎動若母有宿疾子藏為風冷所乘氣血失度使胎不安故令下血也

○妊娠卒然下血方論第六 凡十一方

夫妊娠卒然有損動或冷熱不調和致傷於胎故卒痛而下血若不止之則墮胎也

○療妊娠三四月腹痛時下血

當歸 乾地黄 六兩 竹茹 阿膠 續斷 八分 艾葉 雞蘇各四

婦人良方十二卷 胎前諸方 胎前諸方 胎前諸方

右以水一升煎取六合去滓空心再服隔日更服
○療姙娠六七箇月忽胎動下血腹痛不可忍

川芎 八分 桑寄生 四分 當歸 十二分

右以水一升煎取八合下清酒半升再煎取八合分三服如人行五六里再服

○廣濟主安胎胎病漏血腹痛

當歸 川芎 阿膠 人參 酪 一 大棗 二十个

右切以水三升酒四升煮取二升半分三服五日一劑頻服三四劑無所忌

○又療姙娠胎動腰痛及下血安胎

當歸 川芎 芋根 鹿角膠 艾葉 各二兩 葱白 一升

右細切以水斗煮取五升空心熱服二升用銀煮水煎藥又見腰痛門
○療姙娠忽下血胎上衝心手足逆冷

用生艾汁二錢入阿膠生蜜各二錢煎至麥稈稍熟服如無生艾汁而藥
治姙娠忽然下血腰痛不可忍男六德續添

鹿角 剉細 當歸 剉各半兩

只作一服以水三盞煎至一半空心食前頓服不過一服即安

又方 阿膠 一兩 艾葉 灰 半兩

右為細末空心糯米飲調下二錢

○漏胎下血不止胞乾即死宜急治之

生地黃汁 一升 酒 五合

右同煎三五沸分溫三服以止為度

○崔氏療姙娠下血不止血盡子死

生乾地黃 為末酒服方寸七日三夜一即愈不過三服良

○又療姙娠漏胞方一云方寸 乾姜 二兩半

生乾地黃 五兩

右為未酒服方寸七日再集驗文仲經心同
○療妊娠無故卒然下血不絕方

阿膠三兩用清酒一升半煎取一升頓服

又方 治妊娠卒然下血兼治胎衣不下

右以鉄銚燒令通赤內酒中如此者三次候溫飲一盞

補遺 **桑寄生散** 治妊婦胎漏經血妄行應月而來淋瀝不止

當歸 酒浸桑寄生 酒浸川芎 白朮各一兩香附子

阿膠炒 伏神去木人參 半兩卜草一錢

本草作草 李杲無一字 右咬咀每四錢姜五片煎服

安胎散 治卒然腰痛下血不已 熟地黃 艾葉 白芍藥

川芎 黃耆 阿膠炒 當歸 甘草 地榆等分

右咬咀每四錢姜五片棗一枚煎溫服

○妊娠驚胎及漏下方論第七凡七方

夫妊娠驚胎者是懷妊且將滿其胎神識已具或將產之時從其陰素
傷損胞絡致血下胎動遂上搶心胸氣絕不醒其母面赤舌青口無沫
出者兒死母活唇口俱青沫出者子母俱死面青舌赤法出母死子活
若下血不止胞燥胎枯令子死矣

催生神妙佛手散 治婦人妊娠五七月因事築蓋着胎或子死腹中

露露下夜痛不七口噤欲絕用此藥探之若不損則痛止子母俱安若

胎損立便逐下本出文仲徐王効神驗胎動方云治血上衝心腹痛悶

者如湯沃雪救急經心同 一外臺又治產前產後熱熱敗血腹痛又名

弓窮湯 當歸六兩川芎四兩 張氏方等分

右為粗末每服三錢水一大盞煎令泣七欲乾投酒一大盞止煎一

沸去滓溫服口噤灌之如人行五里再服不過三五服便生一方云

此藥治傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙去血多昏暈欲倒

者以水煎服或先以漏血腹內皮痛加芍藥官桂減半隨手效詳規扁

○治妊娠因墜倒損胎不轉動腹四疼痛腰重及子死腹中不出須臾
三服立下 川芎一兩

右為細末以熟酒調服方寸七日三四服

○治妊娠因失所動困絕千金方亦治子煩

右取竹瀝飲一升立愈

○治妊娠從高墜下腹痛下血煩悶

生地黄 益母草 各一兩 當歸 黃耆 各半兩

石叟咀每服四錢水一盞姜四片煎至六分去滓無時候

集驗療妊娠二三月上至七八月頓仆失跌胎動不安傷損腰腹痛欲

死若有所見及胎奔上捨心短氣下血不止方

乾地黄 當歸 艾葉 各二兩 川芎 各三兩

右以水七升煮取二升半分作三服腹痛甚加杜中五加皮各三兩

一方無地黃有甘草○一方無地黃却用生薑自然汁一匙地黃汁

半合馬遠半合煎成藥去滓入此再煎三沸溫服○一方有人參白

茯苓永煎

治妊娠 治妊娠誤有失墜損血胎損疼痛

青竹茹 好酒 一升 煮三五沸分作三服即安

○療妊娠或因僵仆胎動不安臍腹疼痛 產科 方見前

○療妊娠偶有所傷胎動不安疼痛不可忍並治崩血又兼治子胃又

名子痛

縮砂 不以多火 和皮炒令黑色 一方用仁燻斗內畧炒為細末熟

酒調下二錢不飲酒者以米飲調下皆可覺腹中熱則胎已安矣此

方極效溫隱君云神效不可盡述僕用有效

安胎散 治妊婦因頓仆胎動不安腰腹痛 方見前下血補遺

○妊娠胎上逼心方論第八 七七方

夫妊娠將養得所則血氣調和故兒在胎則安當產亦易若節適失宜

則血氣非理兒在胎則動至產育亦難而子上逼於心者由產難用氣力胎動氣逆胎上衝逼於心者凡胎上逼於心則悶絕胎下乃懸其者至死也

驚恐氣結連日不下名七寶散無考
當歸三分 甘草一分

大腹皮 人參 川芎 陳橘皮 白芍藥 各半 紫蘇 一兩

右吹咀每服半兩水一盞半姜四片葱白七寸煎至七分去滓空心
濕服曾有一婦人累日產不下服催生藥不驗許季士曰此必坐草下蓋恐則精却上則上焦閉則氣不下行然非順也素問云恐則氣下藥一服便產及婦人六七月子懸者予用此散七言驗不十服得便近下方出本事故○丁未六月間羅新恩儒人黃氏有孕七月遠矣已用草麻子去皮研末加麝香調貼臍中以下之命在重上召僕診視兩尺脈沉絕他脈不和僕問二醫者曰藥死此何証治之答曰死胎也何以知之答云兩尺脈絕以此知之僕問之曰此說出何經二醫无答遂問僕曰閣下作何証治之僕答曰此子懸也生胎死却却有辨處夫面赤舌青者子死母活面青舌赤此沫者母死子活唇口俱青者母子俱死是其驗也今面色不赤舌色不青其子懸

死其証不安衝心而痛是胎上逼心謂之子懸宜紫蘇散子治藥十服而胎近下矣

當歸湯 治妊娠胎動過心悶絕煩燥口乾橫生倒產上衝下築迷悶唇口青黑手足厥冷產科名保安散一方無草有川芎厚朴產寶方有川

當歸 各一斤 人參 各一斤 阿膠 一兩 甘草 一兩 連根葱白 一盞

右細剉水二升煎四味至升半去滓下葱再煎三合溫服一剂分為二三服

○治胎上逼心熱痛下血

麴半斤搗碎和熱水絞取汁三中盞死時分溫五服○一方治胎動腹痛連腰用麥麴新汲水調下○一方用神麴大同小異

○治胎上逼心煩悶方又治妊娠六七月已後胎動困篤

葱白二七莖濃煮汁飲之即安若胎已死服之即出未死即安未效再服

○治胎不順胎上逼心方 以烏犬血少七仰之當下

○治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白木 五兩 黃芩 二兩 芍藥 四兩

右水六升煮取二升半分為三服緣胎有水致痛兼易產

文仲葛氏療妊娠卒胎上迫心痛方 取弩弦急帶之立愈

補遺 大聖散

治妊娠松悸睡驚多驚心腹脹滿連臍急

白茯苓 川芎 麥門冬 黃耆 當歸 各一兩人參

甘草 木香 各五錢 咬咀每四錢薑五片煎溫服

○妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛方第九 凡一方

療妊娠忽然下黃汁如膠或如豆汁胎動腹痛

粳米 五升 黃耆 大兩

右以水七升煎取二升分為四服

補遺 治胎無故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如小豆汁者

用野苧根 二兩 金銀首飾 燒去油 半酒半水煎服

用生艾汁二錢問膠白蜜略一煎至七分溫服如無生艾煎

艾濃汁亦可○一方加竹茹○一方用酒不用蜜

○妊娠誤服毒藥傷動胎氣方第十 凡三方

奪命丹 專治婦人小產下血至多子死腹中其人喘急寒乎指唇口爪

甲青白面色黃黑或胎上搶心則悶絕欲死冷汗自出喘滿不食或食毒物或誤服毒藥傷動胎氣下血不止胎尚未損服之可安已死服之可下此方的係異人傳授至妙

牡丹皮 白茯苓 桂心 桃仁 製 赤芍藥

右等分為細末以蜜丸如彈子大每服一九細嚼淡醋湯送下速進兩丸至胎腐爛腹中危甚者立可取出

○治婦人服草藥墮孕腹痛方 男六德補遺

白扁豆生去皮為細末米飲調服方寸匕若修製不及濃煎服亦可亦理男子女人誤中此毒亦治婦人赤白帶下要炒黃為末米飲調下

阿膠治治妊娠不問月數深淺或因頓仆或因毒藥胎動不安腰痛
腹滿或有所下或胎上搶心短氣力方
熟地黃二兩白芍藥

艾葉 當歸 甘草 阿膠 黃耆各一兩一方有川

右咬咀每服半兩水一大盞姜三片棗一個煎至七分去滓溫服无時
補治妊娠誤服諸藥毒致胎動不安

甘草 烏豆 淡竹葉等分濃煎汁服之

○妊娠心痛方論第十一 凡七方

夫妊娠心痛者多是凡邪從飲漿於心之經絡邪氣搏於正氣交結而
痛也若傷心正經而痛者為真心痛心為帝王之官統領諸藏不可受
邪也若傷之朝發夕外及發朝死若傷心支別絡而痛者則乍安乍甚
休作有時也妊娠之人或有病而痛不已者氣乘胞絡傷損子藏也則
令胎動凡胎轉移則多不安也而動於血者則血下也

○治妊娠卒心痛氣欲絕方 出產方

川芎 當歸 茯苓 厚朴制各等分

右水六升煎取二升分為二服忌如前

雷公炮炙論云 心痛欲死急食延胡

白木湯 治妊娠卒心痛欲死不可忍者 世古今錄驗

白木 三兩 赤芍藥 二兩 牡丹 兩半

右切以水六升煮取二升半分三服半日令盡微下水令易生忌桃

李雀肉等

千金療妊娠心痛

青竹茹 一升 羊脂 八兩 白蜜 三兩

右三味合煎每服棗核大三枚食前頓服日三服

又方 青竹茹 一升 酒 二升 煮取 一升 半 去滓 分溫頓服

又方 雞子 一枚 調酒服之

又方 大麻子 三升 研水 八升 煮取 五升 分為 五服

又方

摘皮 三兩 豆豉 五兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大溫水下二七丸牙時侯四方並出外

補遺

沉香降氣湯

茯苓補心湯 四七湯 紫蘇飲皆可選用

○妊娠心腹痛方論第十二 凡十一方

夫妊娠心腹痛者或由宿有冷疾或新觸風寒由臟虛而致發動也邪正相擊而并於氣隨氣上下衝於心則心痛下攻於腹則腹痛故令心腹痛也妊娠而痛者邪正二氣交攻於內若不時差者其痛衝擊胞絡必致動胎甚則傷胎也又云妊娠心腹疼痛多是風寒溫冷痰飲與藏氣相擊故令腹痛攻傷不已則致胎動也

當歸芍藥散

治妊娠腹中絞痛心下急痛及產後血暈目虛氣受

崩中久痢常服通腸血脈不生離癖消痰養資明目益津

白芍藥 半斤

當歸

茯苓

白朮 各二兩 澤瀉

川芎 各四兩 一方

右為細末每服二錢食前溫酒調服。元和紀用經云本六氣經絡無能怯風補勞養真陽退邪熱緩中安和神志潤澤容色散邪寒瘧瘴時氣安期先生勸李少君父餌之藥後神景增減為婦人懷妊腹痛方本方用芍藥四兩澤瀉茯苓川芎各一兩當歸白朮各二兩亦可以蜜丸服 出二三方

○治妊娠心腹痛不可忍方

鹽一斤燒令赤以兩指取一撮酒調服

○療妊娠先患冷氣忽中心腹痛如刀

川芎

人參

茯苓

吳茱萸

苦梗

當歸 各三兩

厚朴 製

芍藥 各二兩

右咬咀以水九升煎取三升分三服氣下即安

○療妊娠患腰痛并胎動不安

葱白

切一人參

厚朴

阿膠

川芎 各二兩

當歸 三兩

右咬咀以水七升煎取三升分作三服。一方有甘草無厚朴川芎

香米散 治妊娠五个月已後常胸腹間氣刺滿痛或腸鳴以至嘔逆
減食此由喜怒憂慮過度飲食失節之所致也。蔡元度寵人有子夫
人怒欲逐之遂病醫官王師復慶世方三服而愈後用果驗

賈中莪朮 一两炒 丁香 半两 粉草 一分
右為細末空心鹽湯點服一大錢覺胸中如物按下之狀

草豆蔻散 治妊娠心腹常痛喫食減少四肢不和全不入食

草菓仁 一两 陳橘皮 乾地黄 白朮 各一两 川芎 三分
當歸 炒 桂心 乾姜 木香 各半两

右為細末每服四錢水一錢棗二枚煎至六分熱服

阿膠散 治妊娠胎動腹中疔痛不思飲食

白茯苓 白朮 川芎 阿膠 各三分 當歸 炒 陳皮 各三分

右咬咀每服三錢水一盞棗三片棗一个煎至七分服

○治妊娠四五月忽心腹絞痛

大紅棗 十四枚 燒存性為末以童子小便調下

○治妊娠胎動欲落腹痛不可忍

上等銀 一片 茅根 二升去黑皮 以水九升煮銀取二升入清酒

一升同煎煮取三升分為三服立安

古今錄驗察妊娠腹內冷痛忽胎動

薤白 一升 當歸 切四

右以水五升者取二升作三服亦將小便服將去一次頃去

千金療妊娠腹中痛方

生地黄 二斤 用取汁酒一升合愈減半頓服愈

手拈散 **四心湯** 加當歸白芍 **四磨湯** **小烏沉湯** 並見和

安胎散 然下血類補遺 已上諸方皆可選用

○妊娠中惡方論第十三 凡三方

夫妊娠人忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡言邪惡之氣中胎傷
於人也所以然者血氣自養而為精神之主若氣血不和則精神衰弱

故邪毒之氣得以中之妊娠之病亦致損胎也

當歸散 治妊娠中惡心腹痛

當歸 丁香 川芎 各三 青橘皮 二 吳茱萸 半兩 去梗湯 煎三次 炒黑

右為細末無時溫酒調一錢

又方 生乾地黄 枳殼 木香 各三分

右為細末每服一錢酒調下

又方 苦梗 二兩 細姜 半兩 煎服之

補遺 治妊娠中惡心腹絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或吐血或衄

血者用熟艾如拳大煮汁頻服

又方 用鹽一盞水二盞調和服以冷水噀之吐出即安

又方 竈心土為末每二錢并水調服白湯調亦可

又法 取汗衣用男子近躰久遭汗者佳燒灰百沸湯調下

○ 妊娠腰腹及背痛方論第十四 凡十方

論曰腎主腰足因勞傷損動其經虛則風冷乘之則腰痛冷氣乘盡入

腹則腰痛故令腰腹相引而痛其痛不止多動胎氣婦人腎以繫胞

娠而腰痛甚者則胎墮也

○ 療妊娠氣壅攻腰痛不可忍煎治腰痛

當歸 三兩 阿膠 甘草 各二 葱白 一升

右細剉以水七升煮取三升去滓分溫伍服

紫酒治妊娠腰痛如折

大黑豆二合炒令香熟以酒一大盞煮取七分去豆空心頻服

通氣散 治妊娠腰痛狀不可忍此藥神妙

破故紙不以多少瓦上炒令香熟為末嚼核桃肉半個空心溫酒

調下二錢

○ 療妊娠腰背痛反覆不得

鹿角 長六寸 燒令赤酒中淬兩度 鹿角為末服亦可

○療妊娠腰痛不可忍或連膝痛 先服此散

杜仲四兩 五加皮 阿膠各 防風 金毛狗脊 川芎

北細辛 白茯苓 草薢各 杏仁八十枚去皮尖炒

右咬咀以水九升煮取二升去滓下膠作三服

○療妊娠三二月腰痛不可忍者 次服此丸

續斷 杜仲各十 芍藥 獨活各三 狗脊 五加皮

草薢 芍藥 阿子肉各八兩

石為末煉蜜丸如梧桐子大空心酒下四十九日三服

○療觸動胎以致腰痛脊痛

杜仲 五加皮 當歸 芍藥 川芎 草薢各

右細剉以水七升煮取一升半分溫三服

○療妊娠三二月及七八月胎動不安或腰肚痛及血下

川芎 當歸各四 艾葉 阿膠各二 甘草一兩

右細坐以水五升煮取二升去滓分溫三服

○大黃丸 治產前後腰腹疼一切血疼信效方治血氣虛四肢不舉

骨髓熱疼 熟地黃二兩 烏梅肉 當歸各一兩

右為細末煉蜜丸如彈子大每服一九白湯實下空心

○廣濟療妊娠胎動腰痛及下血安胎 方見前胎動不安類中

小品 治胎動胎腰腹痛去血胎動向下方

生乾地黃 苧根各二 當歸 芍藥 阿膠 甘草各一

右細切以水六升煮取二升去滓內膠煎烱分溫三服忌海藻蘘蕪

○救急療胎動去血腰腹痛 方見前胎動不安類

補遺 杜仲丸 治妊娠腰背痛不可忍

杜仲炒 川續斷酒浸等分為末

右棗肉煮爛丸梧子大每七十九丸酒吞米飲亦可

膠艾湯 治腰腹疼痛胎動欲落 即前妊娠下血補遺內安胎散

婦人良方十二卷
○妊娠小腹痛方論第十五 凡一方
論曰妊娠小腹痛者由胞絡宿有風冷而妊娠血不通冷血相搏故痛
其亦令胎動也

○療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸 川芎各八分 阿膠各四分 人參各四分 艾葉四分 大棗二十
茯苓十分

右細切以水四升煮取二升溫分三服

補遺 治妊婦小腹痛胎動不安

川芎為細末酒調下 又方川芎當歸等分水煎溫服

○妊娠心腹脹滿方論第十六 凡三方
夫妊娠心腹脹滿者由腹內風有寒氣致令停飲妊娠重因觸冷飲發
動與氣相平故令心腹脹滿也
倉公**下氣湯** 治妊娠心腹脹滿兩脇妨悶不下飲食四肢無力

羌活 赤芍藥 甘草 枳殼 青皮 大腹皮

陳皮 赤茯苓 半夏 桑白皮 桂心各半 紫蘇葉二

右咬咀每服三錢仲水一盞姜五片棗一個煎至七分去滓溫服無
時候○與局方分心氣飲大同小異加灯心煎

阿利木勒散 療妊娠心腹脹滿氣衝胸膈煩悶四肢少力不思飲食

阿梨勒 赤茯苓 前胡各一分 陳皮 大腹皮 桑白皮各三分
枳殼 川芎 白木各半

右為粗末每服四錢水一盞半姜三片棗子一不煎至七分去滓溫
服無時候

○治妊娠心下急氣滿切痛

赤茯苓 桑白皮五分 前胡四分 郁李仁 檳榔各三分
右為細末以水一升煮取一半去滓夜臥服

局方**保氣散**及**保氣散**亦妙 **紫蘇飲**亦妙 方見前胎上過類

補遺局方霍香正氣散亦良

新刊婦人良方補遺大全卷之十二畢

新刊婦人良方補遺大全卷之十三

○ 妊娠數墮胎類

○ 妊娠數墮胎方論第一 凡五方

夫陽施陰化故得有胎榮衛調和則經養周足故胎得安則能成長若血氣虛損者子臟為風寒所苦則血氣不足故不能養胎所以數墮胎也其妊娠腰疼者喜墮胎也

○ 千金療妊娠三個月數墮胎法 灸膝下一寸七壯

又方 赤小豆為末酒調方寸七日二服亦治妊娠數月水尚來

刪繁方 療妊娠懷胎數落而不結實或冷或熱百病之源

甘草 黃耆 人參 川芎 白朮 地黃

吳茱萸 各等分。一方有當歸干姜

右為末空心溫酒調二錢忌菘菜桃李雀肉醋物 經心錄同

廣濟療婦人懷妊數傷胎方

婦人良方十三
鯉魚二斤 粳米一升

右二味如法作臛少着鹽勿着葱豉醋食之甚良一月中須三遍作效安穩無忌集驗文中備急崔氏延年方同

經心錄**紫石英丸**主風冷在子宮有子常落或始為婦便患心痛乃

成心疾月水都未曾服之肥悅令人有子方

紫石英 天門冬法五味子 各三兩 烏頭炮 卷栢

烏賊骨 雲母燒研 禹餘糧 當歸 川椒如常製 桑寄生

石楠葉各一兩 澤瀉 杜仲 遠志去心 茯苓

桂心 甘草 石斛 人參 蕪荑 栢子仁各二

右為末煉蜜為丸如梧桐子大溫酒下二十九至三十九千金方

紫石英丸療妊娠數墮胎皆因氣血虛損子臟風冷致胎不堅固類有

所傷宜此藥

卷栢 鍾乳粉 鹿角膠妙 紫石英飛陽起石 桑椹妙

禹餘糧研 熟地黄各一兩 桂心 川牛膝 桑寄生

北五味 蛇床子 牡丹皮 杜仲 川芎 當歸各三分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三四十九空心溫酒吞下

補遺 **紫石英丸** 治婦人氣血虛弱不能榮以致懷妊

胎不堅固數月而墜方見十二卷第一類補遺

○ 妊娠胎不長養方論第二凡五方

天妊娘之人有宿病挾疾而後有娠或有娠時節適乖理致生疾病並令臟腑衰損氣力虛羸令胎不長故須服藥去其疾病益其氣血以扶養胎也

○ 集驗治婦人懷胎不長方

鯉魚長一尺者去腸肚鱗 以水漬沒內鹽及棗煮令熟取汁稍匕

飲之當胎所腹上當汗出如牛鼻狀雖有所見胎雖不安者十餘日輒一作此令胎長大甚平安

白木散 療妊娠養胎 古今錄驗

白木

川芎

川椒

炒出汗三分

牡蠣煨二分

右四味為細末酒調一錢七日三夜一但苦痛加芍藥心下毒痛倍加川芎吐唾不能飲食加細辛一两半下大者二十枚服之後更以漿水服之若嘔亦以醋漿水服之後不解者小麥汁服之已後其人若渴者大麥粥服之病雖愈盡服之勿置裴伏仲景方忌雀肉桃李

黃耆散 療妊娠胎不長宜服安胎和氣思食利四肢

黃耆

白木

陳皮

麥門冬

白茯苓

前胡

人參

川芎

甘草

各半兩

右以咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎至七分去滓溫服

人參丸 療妊娠胎不長宜服養胎

人參

白茯苓

當歸

柴胡

刺薊

厚朴

桑寄生

各一两

枳殼

三分

甘草

半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九食前溫水吞下

白木散 調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風冷胎瘦不長或失於將

理傷動胎氣多致損墮妊娠常服益血保護胎臟

白木

川芎

阿膠

地黃

炒六分令焦

當歸去尾各一两

牡蠣

煨為粉二分

川椒

三分加常製

右為末煉蜜為丸如梧子大空心米飲吞三四十九酒醋湯亦可

補遺 川芎白芍藥等分為末米飲調下或艾鹽湯下常服安胎和氣

脾進食

白木散 常服養胎氣美飲食

白木

紫蘇

白芷

訶子

煨去核

陳皮

川芎

各三

甘草

一錢

以咀每服三錢薑三片煎溫服

又方 縮砂為末米飲下

○ 妊娠胎動安不得却須下方論第三 凡七方

附 妊娠得病欲去子方

夫妊娠羸瘦或挾疾疢臟腑虛損氣血枯竭既不能養胎致胎動而不堅固終不能安者則可下之免害妊婦也

牛膝湯

療胎動安不得尚在腹母欲死須以此下之

牛膝去苗到半兩 水銀二兩 朱砂二兩 研

右以水五大盞煮牛膝可得一半去滓即以蜜和朱砂及水銀研如膏每服以牛膝汁一小盞調下半匙頓服

桂心散

治妊娠母因疾病胎不能安可下

桂心 瓜蒌 牛膝 瞿麥三 當歸一兩

右絞咀每服四錢水一盞煎至七分空心云滓服

又方

右為細末空心溫酒調一錢服

又方

牛膝一兩 右細搗以無灰酒一大盞煎取七分溫二服

又方

取七月七日法麩四兩水二大盞煎取一盞三分綿濾去滓分

溫三服立下

小品療妊娠得病須去胎方

麥蘗一升 為末和煮二升服之即下神効

文仲療妊娠得病欲去胎方

取雞子一枚以三指撮鹽於雞子中服之立出與阮河南療產雞同

千金經心錄同

補遺

佛手散 服之子母即安若胎已損即便逐下方見十二卷卒

○妊娠墮胎後血下不止方論第四九方

夫墮胎後復損於經脉七 既虛故下血不止也下血多者便效煩悶乃至死矣

○治妊娠損動下血不止腹痛宜服此方

右以水一大盞煎至六分去滓溫服空心

阿膠一兩 艾葉半兩

○治妊娠損動下血不止

甘草一兩 阿膠二兩 雞子一个

右細剉以水二大盞煮甘草一盞三分去滓下雞子及阿膠候膠消攪冷停無時分溫三服

○廣濟療因損娠下惡血不止 **龍骨散**

龍骨

當歸

地黄各八分

艾葉四分 地榆

阿膠

芍藥

乾薑各六分

蒲黃五分

干角一分

鱧炙焦

右為細末食前粥飲調下二錢

○治妊娠墮胎下血不盡若煩滿欲極時發寒熱狂悶方

鹿角屑兩 熬

右以水一大盞煎鼓一合取汁六分之為三服調

鹿角屑二錢服日三服須臾血下古今錄驗同

千金療落胎下血不止方

右以生地黄汁一小盞調代赭末一錢日三服

○治妊娠下血疼痛不止方亦治小便不禁

右以家雞翎燒灰細研以溫酒調下二錢如人行五里再服以効為度

○千金療妊娠胎墮下血不止方

丹參一味 二兩

右細切以酒五升煮取三升分三服

救急療損娠方

右取朱砂末一錢七生雞子三顆取白和朱砂頗服胎若死即出如

未死即安

補遺

催生如神散

妙

又方香附子末米飲調下

○妊娠日月未足欲產方第五 九四方

集驗

知母丸

治日月未足而痛如欲產者兼治產難及子煩

知母一味

為細末煉蜜丸如雞頭大溫酒嚼下日三服千金崔氏

小品同。一方丸如梧桐子大粥飲下二十九

槐子丸

治妊娠月數未足而似欲產腹痛者

槐子

蒲黃 等分

右為末蜜丸如梧子大溫酒下二十九丸以痛止為度

又方

取蒲黃如棗核大篩過以井花水調服

又方

梁上塵竈突煤同為末空心酒服方寸七

補遺

與本卷第一論第二論數墮胎及胎不長養下補遺內同者可通用

○斷產方論第六 凡七方

論曰欲斷產者不易之事雖曰天地大德曰主然亦有臨產艱難或生育不已或不正之屬為厄為媾不欲受孕而欲斷之者故錄驗方以便所用然其方頗衆然多有用水銀毒虫水蛭之類孕不復懷難免受病此方平和而有異驗列具于后

○小品方療婦人斷產驗方

千金翼外臺秘要同

故蚕紙方圓一尺燒為灰酒飲調服終身不復懷孕也

○療姙娠欲去之并斷產方

括樓

桂心各二升 豉一升

右三味切以水四升煮取一升半分服之

又方

附子二枚為末以淳苦酒和塗右足去之大良

○千金斷產方

油煎水銀

一日方息空心服如棗大一丸永斷不損人

廣濟落胎方

括樓根 四兩

肉桂 五兩

牛膝 三兩

瞿麥 一兩

右切以水七升煎二升三合去滓溫分三服七後如人行五里又進

一服無忌

小品療羸人欲去胎方

川芎

生薑

肉桂

蟹爪

黃芩 各等分

人參

右八味細切以水七升煮取二升分三服忌海藻松菜生葱

千金欲去胎

大麩五升漬酒一斗煮二沸去滓分五服隔宿勿食旦再服其子如

藥令母肥盛無疾若 千金不傳

補遺 太上好生而惡殺夫斷產并遂下生胎之事吾不忍為之只存獲方故不載補遺間有產育累次艱難或經危險又若每歲一產恐慮產母有傷性命特設後方與服之以稀於受胎亦不斷其產矣

四物湯 每服三錢加云薑子一撮於經行後空心溫服

又方 用升麻膏根湯二兩入瞿麥土牛膝括樓根豆豉炒各半分作

八服亦於經行後便服日二服更加云薑子一撮尤妙則孕育頗踈矣

○姪娠咳嗽方論第七 凡八方

夫肺感於寒七傷於肺則成咳嗽也所以然者肺主氣而外合皮毛七竅不密則寒邪乘虛而入故肺受之也五臟六腑俱受氣於肺以其時感於寒而為嗽也秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其諸藏嗽不已則傳於肺姪娠病久不已者則傷胎也

欬久花散 治姪娠心膈痰毒壅滯肺氣不順咳嗽頭疼

款冬花 麻黃 貝母 前胡 桑白皮 紫苑各半

旋復花 白木 甘草各一石膏一及

右欬咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去滓溫服

苦梗散 治姪娠肺壅咳嗽喘急不食

天門冬去心一及 桑白皮 苦梗 紫蘇各 赤茯苓各

麻黃土一分三分 貝母 人參 甘草各半及

右欬咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去滓不拘時候服

馬兜鈴散 治姪娠胎氣壅滯咳嗽喘急

馬兜鈴 苦梗 人參 甘草 貝母各半及 陳皮去白

大腹皮 紫蘇 桑白皮各一及 五味子七文重

右欬咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分去滓無時溫服

麻黃散 治姪娠外傷風冷痰逆咳嗽不食

麻黃 陳皮 前胡各二 半夏 人參 白木

枳殼 貝母 甘草各半及

右吹咀每服四錢葱白五寸姜半分棗三個水三盞煎至五分去滓溫服

百合散 治妊娠咳嗽心腹不利煩悶不食
川百合 紫苑 麥門冬 苦梗 桑白皮 各一分 甘草 半及

右吹咀每服四錢水一盞竹茹一分煎至六分去滓入蜜半匙更煎
三二沸不拘時溫服

紫苑湯 治妊娠咳嗽不止胎不

甘草 杏仁 各一分 紫苑 一分 白皮 一分 苦梗 三分 天門冬 一分

右吹咀每服三錢水一盞竹茹一分煎至七分去滓入蜜半匙又煎
二沸溫服六方出產科

○療妊娠咳嗽方 以車軋等分投酒中候冷飲之良

○療妊娠傷寒涎多咳嗽

知母 杏仁 天門冬 桑白皮 各半及

右吹咀每服三錢水一盞煎至七分去滓服

薑散 治妊娠喘嗽不止宜服之穩重而有効 方

杏蘇湯

治妊娠傷風身熱有汗惡風病證挾熱服杏蘇湯不得者
橘紅 紫蘇葉 杏仁 五味子 半夏 桑白皮

具母 白木 各一 甘草 各五分

右判每四錢薑五片煎溫服治咳嗽甚効

旋覆花湯

治妊娠傷風感冒寒暑濕氣咳嗽喘滿痰涎壅盛 方見二
上二卷產後第四論

治妊婦肺感寒邪咳嗽上氣胸膈痛項背拘急舌重鼻塞

頭日眩暈痰氣不利時發寒熱 見方

參蘇散

加杏仁五味子證治同上 方見第一卷中風門

○妊娠吐血衄血方論第八 凡二方

論曰夫妊娠吐血者皆由臟腑所傷為憂急驚怒皆傷臟腑氣逆吐血
吐血而心悶胸滿未欲止心悶甚者死妊娠病此多胎也

局方必勝散有效

○治吐血不止

馬勃用生布擦為末濃米飲調下昌黎先生云平此馬勃助鼓之皮俱收並畜時用无遺者署師之良也

○治鼻衄以白茅花濃煎汁服亦可就第一卷吐血類中選用

補遺方前七卷第五論衄鼻下補遺諸方通用

論曰妊娠苦煩悶者以四月受火陰君火氣以養精六月受以陽相火氣以養氣若母心驚膽寒多有煩悶名曰子煩也產室云夫妊娠而子煩者是肺臟虛而熱乘於心則令心煩也停痰積飲在心胸之間或衝於心亦令煩也若熱而煩者但熱而已若有痰涎而煩者嘔吐涎沫思聞食氣煩躁不安也大或妊娠之人既停痰積飲又寒熱相搏氣鬱不舒或煩躁或嘔吐涎沫或胎動不安均謂子煩也

治子煩

防風

黃苓

麥門冬各三石

白朮各

右以水一大升煮取四合徐已服盡為度

右以水一大升煮取四合徐已服盡為度

無黃苓有知母

如湯療妊娠煩躁或胎不安

淡青竹刮茹一兩

右以水一大升煮取四合徐已服盡為度

麥門冬散治妊娠心煩憤悶虛燥吐逆惡食氣頭眩四肢沉重百節疼痛多即少起

麥門冬 子苓 赤茯苓 茯神 赤芍藥 陳皮

人參 苦梗 桑寄生 甘草 旋復花各半 生地黃

右為粗末每服四錢水一盞麥半分煎至七分不拘時溫服

又麥門冬 苧根略三 黃苓 茯神 甘草炙一分 犀角屑

右以水一大升煮取四合徐已服盡為度

婦人良方上三

温眼効

柴胡散 治妊娠心煩頭目昏暈心胸煩悶不思飲食

柴胡半斤 赤茯苓 麥門冬 各一兩 批柏葉 人參

橘紅 甘草各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片煎至七分

人參散 治妊娠熱氣來於心脾津液枯少煩躁壅熱乾渴

人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮 家乾薑 黃芩

犀角屑 各三分 甘草半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓温服

○治妊娠子煩口乾不得卧 黃連 去心

右為細末每服一錢粥飲調下酒蒸黃連丸亦妙

○治妊娠心煩熱不止 葱白 一握 豉 二合

右以水二大盞煎至一椀半去滓温分三服

一母丸 治妊娠因服藥致胎氣不安有似壅煩不得卧巢氏謂之子

煩也 知母 一兩 洗焙

右為細末以棗肉為丸如彈子大每服一丸用煎人參湯送下○醫

者不識此證作壅煩治之損動胎氣宜夫有識者亦見有藥也產科

鄭宗文得於陳藏器本草拾遺中也用之良驗方出產乳

補遺 **天麻散** 治胎氣本怯心驚膽虛煩悶名曰子煩

麥門冬 去心 防風 白茯苓 各一兩 人參 半兩

咬咀每四錢水一盞姜五片淡竹葉十片煎八分温服

○妊娠煩躁口乾方論第十 九四方

夫是太陰脾之經也其氣通於口手少陰心之經其氣通於舌若妊娠

之人臟腑氣虛榮衛不理陰陽隔絕熱乘於心脾津液枯少故令心煩

而口乾也余考此證與子煩大同小異其方亦可就子煩中通相一母

丸亦可用

元麻散 治妊娠瘧熱心神煩躁口乾渴逆

川升麻 黃芩 人參 麥門冬 梔子仁 柴胡

茯苓 瓜蒌根 犀角屑 各一兩 知母 甘草 各半

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服

知母散 治妊娠煩躁悶亂口乾及胎臟熱

知母 麥門冬 甘草 各半 黃芩 子苓 赤茯苓 各三

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓入竹瀝一合更煎一二沸

溫服効

黃根散 治婦人妊娠數月胎膈煩躁唇乾渴身熱少食

黃根 不用野葛 黃芩 人參 姜 黃耆

麥門冬 甘草 等分咬咀

右每服四錢水一盞煎至七分溫服無時候

黃耆湯 治妊娠身熱煩躁口乾食少

人參 黃耆 家葛根 秦艽 麥門冬 知母 各三

甘草 半兩 赤茯苓 一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片淡竹葉二七片煎至六分去滓溫

服効

補遺 **人參白朮散** **黃耆白朮湯** 皆良

新刊婦人良方補遺大全卷之十三畢

婦人良方補遺大全卷之十四

。妊娠中風類

。妊娠中風方論第一 九四方

論曰夫四時八方之氣為風也常以冬至之日候之若從其鄉來者長養萬物若不從其鄉來者名為虛邪賊害萬物人躰虛則中之若風邪則於皮膚入於經絡即頑痺不仁若入於筋脉挾寒則痲急喎僻挾溫客弛縱若入臟腑則恍惚驚悸凡五臟俞皆在背臟腑虛寒邪皆從俞而入隨所傷臟腑經絡而為諸病也妊娠中風若不早治則令墮胎也

防風散

治妊娠中風卒到心神悶亂口噤不能言四肢強急

防風

桑寄生

葛根各一菊花

防已

北細辛

秦朮

當歸

桂心

茯神

甘草

羚羊角酪半

右為粗末每服四錢水盪薑三片煎至六分去滓入竹瀝半合溫服

白朮酒

治妊娠中風口噤語言不得

白朮一兩 獨活一兩 黑豆一合 炒

右細剉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服口噤者搗口灌之得汗即愈

○治姪娘中風口眼不正手足頑痺

防風 羌活 防已各一兩 麻黃去節 黃松木節一兩 桂心

荆芥穗 羚羊角屑 桑寄生 甘草 薏苡仁各半

右咬咀每服三錢水一盞生姜半分煎至六分去滓服

○治姪娘因感外風如中風狀不省人事 熟艾三兩

右以米醋炒令極熱乘熱以絹帛裹懸臍下良久即省

○陳總領華云余女夫趙汝盤君天台親見王清叔舍人療其嫂氏

補遺 治姪婦中風 排風湯 續命湯 參蘇飲加羌活 引風湯

防風湯 皆可選用方並見第三卷中風篇

○姪娘風症方論第二 凡三方

論曰夫姪娘躄虛受風而傷太陽之經絡後復遇風寒相搏發則口噤

背強名之曰瘖又云瘖其候胃悶不識人須臾自醒良久復作謂之風

瘖亦名子癰亦名子胃甚則反張

○治姪娘中風角弓反張口噤語澁

麻黃去節 防風 獨活各一兩 羚羊角屑 桂心 升麻

酸棗仁炒 甘草 秦艽各半 川芎 當歸 杏仁製

右咬咀每服四錢水一盞姜四片煎至六分去滓入竹瀝半合溫服

○治姪娘中風腰背強直時復反張

防風 葛根 川芎 生乾地黄各二兩 杏仁製

麻黃去節 各兩半 桂心 獨活 甘草 防已各一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服

小品瘖姪娘忽悶眼不識人須臾醒上復發亦有不醒者名為瘖病亦

名子癰亦名子胃**葛根湯**若有竹近可速辨者當先作瀝汁次辨湯也

婦人良方十四卷

其竹遠不可即辨者當先辨湯此二療會得其一種其竹濇偏癩諸瘰
絕起死也非但偏癩癩癩產婦絕死者有幼小兒或癩瘰癩癩發瘰
之亦驗

竹瀝湯 療癩癩臨月因發風瘰忽悶憤不識人吐逆眩倒小醒復發

名為子癩 葛根 具母 去心 牡丹皮 去心

木防已 防風 當歸 川芎 白茯苓 桂心 熟

澤瀉 甘草 各二錢 獨活 石膏 碎 人參 各二兩

右細切以水九升煮取三升分二服具母令人易產若未臨月者升

麻代之忌海藻菘菜酢物

補遺 羚羊散 治婦人有娠忽然胃悶不識人角弓反張狀如中風

名曰子癩亦謂之風瘰又名子胃宜此散

羚羊角 川獨活 去酸棗仁 各半 五加皮 半 薏苡仁 炒 防風 去芦

當歸 酒浸 川芎 茯神 去木 杏仁 去皮尖各四錢 木香 不見

甘草 炙各二錢半 吹咀每四錢姜五片煎溫服

○治癩癩傷寒風瘰亦各瘰證通用 **小續命湯** 身熱甚無汗各陽瘰

去附無熱或熱少而汗出者各陰瘰 去麻黃

○凡癩婦風瘰與前第三卷第二論下瘰方詳證用之

○癩癩腹內有鬼胎方論第三 凡三方

夫人臟腑調和則血氣充實風邪鬼魅不能干之若榮衛虛損則精神

衰弱妖魅鬼精得入於臟狀如懷胎故曰鬼胎也

癩癩 療癩癩是鬼胎致腹中黑血散下腹痛

雄黃 細研 鬼臼 去毛 莽草 丹砂 細研 巴豆 去皮心油

獺肝 炙令黃各半兩 蜥蜴 炙黃 蜈蚣 一條炙令黃

右為細末蜜丸如梧桐子大空心溫酒下二九日兩服後當利如不

利加至三九初下清水吹下虫如馬尾狀無數病極者下蛇蟲或加

段郊鷄子或如白膏或如豆汁其病即除

婦人良方十四卷

婦人鬼胎及血氣不可忍方

班捕去頭足真製

延胡索炒各三錢

右為細末再研如麩以温酒調下半錢以胎下為度

○治婦人虛羸有鬼胎墜塊經候不通

芫花根三兩

右剉炒令黃色為細末每服一錢桃仁煎湯調下當下惡物

治婦人鬼胎如抱一甕

吳茱萸一川芎

秦元

柴胡

蠶蚕

巴戟

巴豆

不去油芫花醋釀

右為末煉蜜丸梧子大每服七丸蜜酒下即出惡物而愈

○妊娠傷寒方論第四 凡二十一

論曰夫冬時嚴寒人體虛為寒所傷即成病為傷寒輕者漸上惡寒愈上發熱微咳鼻塞數日乃止重者頭疼身痛先寒後熱久而不愈則傷胎凡妊娠傷寒仲景無治法用藥宜有禁忌不可與尋常婦人藥治之也○妊娠產前腹痛及治月事或多或少或前或後胎氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡露不下宜

當歸

川芎

白芍藥

熟乾地黄一方用生者各一兩

右以咀每服四錢水一盞半煎至八分取六分清汁熱服日四服以

知為度○妊娠下血即入艾六七葉阿膠末一錢同煎疾勢甚大散

藥不及以四味各半兩細剉以水四錢煎至二盞半去滓分四服食

前熱服一日之中令盡以知為度平常產乳服至三膈止如虛弱血

臟不調至一月止○因虛致熱上與血搏口舌乾渴欲飲水者加括

樓根一兩麥門冬三分○腹中刺痛惡物不下加當歸芍藥各一分

血崩加地黃蒲黃各一兩○因熱生風加川芎一分柴胡半兩○身

熱眩躁頭昏項強加桑胡黃芩各半兩○大便秘結加大黃半兩桃

仁一分炒○如大便滑洩加桂心熟附子各一分發寒熱加乾姜半

兩皮芍藥各一分○嘔者加白朮人參各半兩○腹脹加厚朴枳實

各一分○虛煩不得眠加竹葉人參各一分○煩躁大渴加知母石

膏各半兩。○水停心下微吐逐加猪苓茯苓防己各一分。○虛寒狀類傷寒加入參柴胡防風各三分。

○妊婦傷寒臨產時氣先服此以安胎宜。**白朮** 桑寄生 人參 白茯苓 阿膠 炙 右等分為細末煮糯米飲調服方寸七日三服。

葱白湯 妊婦傷寒增寒發熱當發其汗 葱白 十莖 生姜 二兩 細切以水二盞煮取一盞連服取汗愈。

前胡湯 妊婦傷寒頭痛壯熱肢節煩疼宜之 出廣濟方 石膏 十二分 前胡 六分 甜竹茹 二分 別薑 無 黃芩 大青 五分 知母 梔子仁 各四分。

右以咀每服五錢水一盞半葱白三十前至八分去滓溫服集驗文仲備急救急同。

○妊婦傷寒或中時行洒淅作寒振慄而悸或加噦者。

黃芩湯 赤芍藥 橘紅 黃芩 黃連 甘草 蘇水 等分 右以咀每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服汗出瘥若胎不安服服阿膠湯方見前。

○妊婦寒熱頭疼嘔吐不欲食脇下痛嘔逆夜氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不解宜服。

黃龍湯 柴胡 去 兩 黃芩 人參 甘草 各一分半 右以咀每服五錢水一盞半煎至一中盞去滓溫服。

○妊婦傷暑頭痛惡寒身熱燥悶四肢疼痛項背拘急口乾燥宜服。

此水胡石膏湯 柴胡 四兩 甘草 二兩 石膏 八兩 右以咀每服二錢水一盞姜五片煎至六分去滓溫服。○若氣虛體冷加人參四兩。

枳實湯 妊婦傷寒四日以來加心腹脹上氣湯不止飲食不

多腰疼解重 枳實 一兩 陳皮 二分 麥門冬 半兩

右為細末每服三錢水中棧生薑半分煎至七分煎至六分去滓溫服

旋覆花 赤芍藥 甘草各半 前胡 石膏各一 白朮 人參 麻黃去根 黃芩各三分

右咬咀每服四錢水一盞半姜半分煎至六分去滓溫服

交門之湯 治妊婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎氣不安

人參 石膏各一 前胡 黃芩各三分 家葛根 麥門冬各半 右咬咀每服五錢水一盞半生薑四片棗二個淡竹茹一分煎至六分去滓溫服

○ 妊婦發斑變為黑色尿血宜**梔子大青湯**

外臺云出救急方

升麻 梔子仁各二兩 大青 杏仁 黃芩各半 右咬咀每服五錢水一盞半葱白三寸煎至一盞去滓溫服

芍藥湯 治妊婦傷寒五六月已前常用此方 出傷寒活人書

黃芩 當歸 芍藥各四 川芎各一 白朮各一

右為細末溫酒調服方寸匕日二服產後百病悉皆主之常服則易產無疾苦 王子身為產後常服之藥

治婦人傷寒腹中隱痛

當歸 茯苓 白朮各二 白芍藥半斤 澤瀉 川芎各四 右為細末酒服方寸匕日三

治妊婦傷寒煩熱頭痛胎氣不安或時吐逆不下食

白朮 橘紅 麥門冬 人參 前胡 赤芍藥 川芎各一 甘草 半夏各半兩

右咬咀每服四錢水一中盞姜四片淡竹茹一分煎至六分去滓無時溫服

柴胡散 治妊婦熱病骨節煩痛頭疼吐熱若不治熱不止則損胎

柴胡 家葛根 知母 梔子仁 甘草各半兩 石膏一兩

大青 黃苓 升麻 各三分

右吹咀每服四錢水一盞葱白三寸煎至六分去滓無時熱服

升麻散 治妊娠五六月傷寒頭疼壯熱四肢煩疼

麻黃 桂心 柴胡 赤芍藥 各一兩 甘草 半兩

右吹咀每服三錢水一盞姜三片煎至六分去滓

升麻散 治妊娠傷寒頭疼身體壯熱

麥門冬 麻黃 各一兩 黃苓 大青 各半兩 石膏 二兩

右吹咀每服四錢水一盞姜半分淡竹葉二七片煎至六分去滓無時溫服

新校 柴胡散 治孕婦傷寒

當歸 人參 芍藥 粉草 生地黃 各半兩 前胡 川芎

右為細末每服二錢姜三片棗四片煎至七分去滓溫服要出汗加葱

白朮散 治妊娠傷寒

白朮 黃苓 各等分新瓦上炒

右為散每服三錢水一中姜姜三片棗一枚煎至七分溫服但竟頭痛發熱便可喫二三服即瘥唯四肢厥逆陰証者未可服此方本常州一士人賣此藥醫皆論斤售去行醫用之如神無人得此方予自得此治疾無有不効者仍安胎益母子

○ 治妊娠傷寒頭疼腹痛

升麻 黃苓 各六分 家乾葛

大青 石膏 甘草 各二分 苦竹葉 一握並細剉

右用水一升半先煮苦竹葉乾葛減一半入諸藥再煮至六合去滓分溫服

補遺 芍藥散 治妊娠外感風寒渾身壯熱眼暈頭疼心胸煩悶此藥

發散表邪即安 紫蘇葉 川芎 白芍藥

白朮 麥門冬 去心 陳皮 乾葛 各一兩 甘草 炙半

吹咀每五錢姜五片葱白三寸煎溫服

婦人百方 治証同上 方見第三卷中風類

○ 妊娠時氣方論第五 凡三方

論曰夫四時之間忽有非節之氣如春應暖而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反暖非其節而有其氣而一氣之至無人不傷長少雖殊病皆相似者多挾於表毒也言其時普行此氣故云此時氣也妊娠遇之重者致傷胎也

秦元散

治妊娠時氣五六日不得汗口乾多喫冷水狂語嘔逆

秦元 柴胡略一石高月一兩 赤茯苓 前胡 甘草

犀角屑 家葛根 川升麻 黃芩 各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜半分淡竹茹一分煎至六分去滓無時候溫服

育根飲子

治妊娠時氣煩熱口乾頭痛

家乾葛 麻黃 去節根各半兩 石膏 一兩 豉 一合 白米 半合

槐子仁 二七枚 葱白 二莖

右細切以水二大盞煮取一盞三分去滓無時分溫三服汗出為効

育根飲子

治妊娠時氣六七日熱甚大小便不利最宜服此

川芒硝 一兩 細研 葵子 二兩

右如前煎服以利為効

取毒散

升麻葛根湯 皆可用 升麻葛根宜用家葛根乾用野葛 能動胎氣養生必用方言之甚詳

升麻葛根湯

內用白芍藥 凡五方

論曰夫冬時嚴寒觸冒傷之藏於肌骨夏至乃發壯熱又為暑病即熱病也此寒氣蘊積發即為病若妊娠遇之多致墮胎也經云熱病與中暑相似但熱病者脈盛中暑者脈虛

○ 治妊娠熱病吐熱頭痛嘔吐不止不食心胸煩悶

人參 一方 竹茹 家葛根 各一兩 蘆根 二兩

麥門冬 去心一兩半 知母三分

右吹咀每服四錢水一盞連根葱白三寸煎至七分去滓溫服

梅子仁散 治妊婦熱病班出黑色小便如血氣急欲絕胎欲落

梅子仁 升麻 石膏 生乾地黄 各二兩 黃芩 大青 各一兩

右吹咀每服半兩葱白七寸豉四十九粒水一盞煎至五分去滓無時溫服救急有杏仁無地黃石膏

大黃散 治妊婦熱病六七日熱入腹中大小便秘澀苦熱

川大黃 微炒 石膏 各一兩 知母 前胡 赤茯苓 各三分 梅子仁 甘草 各半兩

右吹咀每服半兩水一大盞生地黃一分煎至六分云滓無時溫服

又方 以伏龍肝細研無時水調下一錢亦可調為泥塗臍下

又方 以家鳶根煮汁無時服一小盞

薑根湯 治妊婦熱病頭眩心煩嘔吐不食

知母 四兩 青竹茹 三兩

右剉每五錢生薑根一握粳米一撮煎溫服

梅子仁湯 治妊婦傷寒壯熱頭痛

梅子仁 前胡 知母 各二兩 黃芩 一兩 石膏 四兩

右剉散每五錢水煎溫服

升麻湯 治妊婦六七月傷寒熱病赤班變黑瀉血

升麻 梅子仁 各二兩 大青 杏仁 黃芩 各一兩

右剉散每五錢葱白三莖水煎溫服

○ 妊婦傷寒熱病防損胎方論第七 凡七方

論曰非邪之氣傷於妊婦熱毒之氣侵損胞胎遂有墮胎漏血俱害子

母之命也

○ 治妊婦傷寒骨節疼痛壯熱不急冷則胎落

前胡 家鳶根 石膏 各十兩 青黛 六分 升麻 八分 梅子仁 一分

葱白 切一

婦人胎前產後諸症
右咬咀以水七升煮取二升半去滓分溫三服

○治妊娠時氣頭痛腰脊強壯熱
升麻 青黛

前胡 梔子仁 黃苓 石膏 二分 家薑 根 三兩

右咬咀以水五升煎取二升半去滓分為三服

○治妊娠六七月傷寒熱入腹大小便秘結不通蒸熱

前胡 十分 大黃 石膏 二分 梔子仁 杼 知母 黃苓

茯苓 生薑 各八分

右水八升煎取二升半後下大黃更煎三五沸分作三服

治妊娠傷寒苦熱不止身上斑出忽赤忽黑小便如血氣欲絕胎欲落

梔子仁 升麻 各四兩 青黛 二兩 石膏 八兩 葱白 切 一升

黃苓 三兩 生地黃 二十分

右咬咀以水九升煎取三升去滓作三服忌熱物

○治妊娠時氣身大熱令子不遂護胎方

代龍肝 研令極細 右水調塗臍下二寸乾則易差即止淋清亦可

又方 井中泥塗心下乾則易 二方出本事再錄有効

浮萍 川朴消 蛤粉 藍根 等分 大黃 微炒

右為末水調付臍上安胎解煩熱極妙

補遺 白朮散 治妊娠熱病先以此藥安胎 與前良方白朮散 同但分兩別

白朮 二分 黃苓 三分 新瓦上同炒令香

右為末每三錢姜三片棗一枚煎七分溫服但覺頭疼發熱便服二

三服即差如四肢厥冷見陰證者不可服

○妊娠熱病胎死腹中論第八 郭稽方 〇凡四方

論曰熱病胎死腹中者何答曰因母患熱病至六七日以後臟腑極熱

熏其胎是以致死緣死自冷不能自出但服黑神散暖其胎須臾

胎即自出何以知其胎之已死但看產母舌青者是其候也

黑神散 又名烏金散 靈苑方名肉桂散

合聖方 〇凡四方

桂心 當歸 芍藥 甘草 乾姜 生乾地黄

黑豆 炒去皮二兩 附子 炮去皮臍半兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下。一方无附子有補黃

○陳無擇評曰夫妊娠謂之重身二命係焉將理失宜皆能損胎不

特病熏蒸所致或因頓仆驚恐出入觸胃及素有癥瘕積聚壞胎最

多其候舌青即知子死養胎論曰面青舌赤母死子生唇青吐沫子

母俱斃又有雙懷二胎或一死一活其候尤難知自非臨岐觀象未

易預述不可不備孝也然以**黑神散**溫胎未若補助產母使其氣正

免致虛乏困頓胎自下矣**催生湯**殊勝黑神散

催生湯 治胎死腹中或產母氣之委頓產道乾澀

蒼朮 泔浸洗炮二兩 苦梗 一兩 陳皮 六錢 白芷 桂心

甘草 三錢 川芎 錢半 川烏 當歸 乾姜 炮 厚朴 製

芍藥 茯苓 半夏 湯泡 附子 炮去 南星 炮各二 枳殼 製

木香 一錢 杏仁 去皮阿膠 炮各一分

右為細末每服一大錢溫酒調下煮熱悶加白蜜新汲水調服只服

五積散無麻黃有川烏府子南星阿膠木香杏仁六味 鹿角屑 一兩

治 治妊娠熱病服死腹中下之

右以水一盞葱白五莖豉半合煎至六分去滓溫服良効

又方 取死胎 烏雞一隻 去毛

右細剉以水三升煮取二升去雞通手用衣帛蘸摩臍下胎自出

補遺 治妊婦熱病胎死腹中

紅花酒煮汁飲二三盞。又方伏龍肝末溫酒下二錢白湯調亦可

又方朴硝末童子小便調下二錢立出

○妊娠瘧疾方論第九凡四方

論曰夫妊娠病瘧者由夏傷於暑客於皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而風邪乘之動前暑熱陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽相離寒熱

俱欲若邪動氣至交爭則發故癰休作有時其發寒時節漸安者此由風邪客於風府循脊而下衛氣至一日一夜常大會於風府故發日晏其發日早者衛氣之行風府日下一節二十一日下至尾能二十二日入脊內上注於伏衛之脉其行九日出缺盆之內其氣既止故發更早其間日發者由風邪內搏五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能日作故間日發積乃發也姪娘帶發則寒熱之氣相迫傷於胎故多損動也

○治姪婦瘡疾不差 出集驗方千金救急古今錄驗同

常山 石膏各一兩 甘草炙 黃芩各半 烏枚十四个炒

○千金療姪娘患瘡方

右細切以酒水各一大盞相和浸一宿平旦前至一盞去滓分二服

○恒山 竹葉各三兩 石膏八兩 糯米百粒

右切以水六升煮取二升半去滓分三服第一服未發前一食又服之第二服臨欲發時服餘一服用塗頭額及胸前五心藥滓置頭

寔當發一日勿進水及飲食發過後乃進粥飲忌生葱菜集驗文并備急同

○治姪婦患瘡寒熱頭痛心煩

黃芩 麥門冬去心各一兩 石膏二兩 甘草半兩 烏梅十四个

右以咀每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服

○治男婦人一切瘡疾或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或一日一發或一日兩三發或連日或間日發或三四

日一發不問鬼瘡食瘡不伏水土山嵐瘴氣似瘡者並皆治之

常山 厚朴姜製 青皮 陳皮並不去白 甘草

檳榔 草菓去皮

右等分以咀每服半兩於未發隔夜用水一碗酒一盞煎至水大盞

瀝出露一宿却將滓再用酒水更依前煎一次去滓別以椀盛貯亦

露一宿來日當發之早溫溫面東先服頭藥少歇再服藥滓大有神

効。出楊氏家藏。六淋淨聚衆醫用柴胡。七個月而治瘡疾先寒後熱

無効。僕言此疾非常

山不愈衆醫不肯因循數日疾甚無計... 治之遂用七室散... 一服愈黃帝問曰婦人通身毒之奈何岐伯曰有故无殫帝曰愿聞... 其效何謂也岐伯曰九種大聚其可死也聚其大半而止豈不以審... 察之性味明治療之方必以中庸與疾適好於半而止之勿過而餘... 則何疑於... 文治也

補遺 **養胃湯** 治妊婦瘧疾寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心身軀痛

標上振寒面色青白不能飲食脉弦遲者方見和劑○又有驅邪散

證治同亦可服

驅邪散

高良姜

白朮

草菓仁

陳皮

藿香

白茯苓

各一兩

甘草

炙半

縮砂仁

七錢

咬咀每四錢姜五片棗一枚煎溫服

清脾湯

治妊婦瘧疾寒少熱多或但熱不寒口苦舌乾心家煩渴大

小便赤澀不進食脉弦數者

草菓

茯苓

半夏

黃苓

柴胡

甘草

咬咀每四錢姜三片煎溫服

○ 雜症霍亂方論第十九方

論曰夫陰陽清濁相干謂之氣亂於腸胃則為霍亂也但飲食過度腸
胃風冷使陰陽不和致清濁相干腸胃虛者受之故霍亂也熱亂者先
吐或心腹痛則吐瀉並發有頭痛體疼發熱而吐瀉者亦為霍亂所以
然者挾風而有實故也風折於氣皮膚絞密故血氣不得宣通故令壯
熱風邪乘其經脉氣上衝頭則頭痛風氣入於腸胃則洩瀉胃逆則嘔
逆故為吐瀉也吐瀉甚者則多煩燥肝虛故也又手逆冷陽氣暴竭謂
之四逆也吐瀉之病吐瀉甚者則傷胎也

人參 治妊婦霍亂吐瀉心煩腹痛

人參

去芦

厚朴

姜製

橘紅

各一

當歸

炒

乾姜

炮

右為散每服四錢水一盞棗三個煎至六分無時溫服

白朮散

治妊婦霍亂腹痛吐逆不止

白朮

益智仁

枳殼

橘紅

各三

草豆蔻

皮

良姜

右為散每服三錢水一盞姜半分煎至六分去滓溫服無時

木瓜煎 治妊娘霍亂吐瀉轉筋入腹則悶絕

吳茱萸湯泡七次生薑一分各木瓜兩半。壹方有茴香一分片薑一分錢

右細剉水二盞煎一盞二分去滓分三服無時熱服

一方 治妊婦霍亂吐瀉心煩悶亂作渴

右用糯米一合泡令淨細研以水一大盞研濾取汁入蜜一合生薑汁半合相和渴即頓服立止。縮脾飲亦妙

局方 **五苓散**

調中散

香薷散

夏月預宜合此以

以此藥療之其效神速但要已上五方專治妊婦霍亂然亦可就第

七卷第二論霍亂嘔吐類中選方通用

縮脾飲方 解伏熱除煩渴消暑毒止吐痢霍亂之後服熱藥太多致

顛躁者宜沉冷水冷頰服

草果仁兩烏梅內三兩

甘草二兩半

右以咀每服半兩水一椀生薑十片煎至八分侵以熟水溫冷任意

補遺 **白木散**

治妊婦霍亂發熱煩渴脈數陽證者方見七卷嘔吐類

白木

茯苓

人參

甘草

木香

藿香

各半兩

乾葛一兩

為末白沸湯調二錢吐甚者加生薑汁頰上飲之

○ 妊婦霍亂腹痛四肢冷逆汗出脈虛弱者 **連理湯** 治之因傷食者

湯中加陳皮青皮寒甚脈欲絕而陰證悉具可湯中加附子煨去皮

亦見局方

木瓜湯 治妊婦霍亂吐瀉稍定但轉筋攪悶抽痛不可忍宜之

木瓜二兩

吳茱萸一兩

茴香半兩

甘草炙二兩

以咀每四錢姜五片蘇葉十葉鹽小撮煎溫服

新刊婦人良方補遺大全卷之十五

姪娘泄瀉類

○姪娘泄瀉方論第一凡三方

論曰凡姪娘泄瀉冷熱不同水瀉青白或黃白或水穀不化腹痛腸鳴其脉弱而緊此內傷冷也謂之洞泄寒中若泄注如水深黃色及有完穀小便赤腹脇脹滿煩躁喜飲時嘔逆或下利清水或小便不利得熱則極脉虛大而數由乘虛熱入於胃溲滲下焦津液不分併於大腸謂之協熱利先以五苓散利小便次以黃連阿膠丸或三黃熱艾湯凡泄瀉色黃而有沫腸鳴腹脹滿微痛其脉沉緊而小數謂之冷熱不調宜戊己丸和之凡暴下或青或白水穀或化或不化腹脇或脹或不脹或痛或不痛但餒生熱氣全不思食其脉內虛外實右關脉沉緊者謂之飧泄先去沉積宜感應丸後調和之○凡治瀉先須理中焦如理中湯丸是也次即分利水穀如五苓散是也治中不效然後漸下即用禹

禮集

餘糧赤石脂是也

亦可第卷第八論

厚朴丸 治妊娠洞泄寒中

乾薑

厚朴

去粗皮細剉

右等分先杵令爛水拌同炒令乾再為末水煮麩糊為丸如梧桐子大每服五十九食前米飲下

厚朴散

治妊娠臍氣本虛宿挾風冷脾胃久弱藏腑虛滑臍腹疼痛

日夜無度

厚朴

去粗皮姜汁浸炒黃二兩

肉豆蔻

一個

草豆蔻

一個

右以咀每服三錢水一盞姜三片煎至七分去滓熱服

黃熟艾湯

方見八卷第十論

理中丸

理中湯

五苓散

黃連阿膠丸

戊己丸

感應丸

已上並見和劑局方

補遺

論治妊娠腸胃不足風冷乘之水穀不化泄瀉注下日夜無度

或脾胃受濕下如豆羹汁或下瘀血宜服胃風湯若腹內痛身躄怯

理中丸

臍下冷洞泄腸鳴以理中湯加肉豆蔻縮砂仁或治中湯因伏

五苓散

煩渴引飲所下如水宜胃苓湯五苓散去桂傷濕瀉利腰脚

冷痺小便自痢身躄重所下黃黑宜不換金正氣散胃苓湯戊己丸

此言妊娠泄瀉分風寒暑濕四證之大畧

方並見局方

○妊娠下痢赤白及黃水方論第二

九十五方

論曰夫妊娠之人胞血既閉臍氣不理脾胃易傷或恣食腥肥生冷脾

胃停滯不能剋化冷熱相搏致令心腹攪刺疼痛膿血赤白雜下古書

所謂滯下是也原痰之由皆因冷熱不調大腸虛冷熱氣客於腸間熱

氣乘之則赤冷氣乘之則白冷熱相交則赤白相雜而運滯水止各為

滯痢也其狀白膿如涕而有血雜亦有血少者如白膿涕而有赤脉如

魚腦此各魚腦痢又有血痢者熱乘血入於大腸為血痢也血之隨氣

外行經絡內通臟腑常無滯積若觸胃勞動生熱乘血散滲入大腸

腸虛相化故成血痢也

婦人良方卷五
婦人良方卷五
婦人良方卷五

○療姙娠患痢膿血狀如魚腦髓小腹絞痛難忍
阿膠灸二兩 地榆 酸石榴皮三兩 薤白物一 黃連一方是黃蘗皮各三兩

右並細切用水七升煎取二升溫分三服忌生冷肥膩

○療姙娠白膿痢腹中冷

乾姜四兩 赤石脂六兩 粳米一升炒黃

右用水七升煎取二升溫分三服忌如前

○療姙娠腹痛下痢赤白不可忍

黃連一方是白木 石榴皮 當歸各三兩 阿膠灸二兩 熟艾半一兩

右用水六升煮取二升溫分三服忌如前

新校 **黃連湯** 療姙娠腹痛下痢膿血不止

黃連八分 厚朴製 阿膠灸 當歸各六分 艾葉 黃蘗各四分 乾姜五分

右為細末空心米飲調下方寸七日三服。一方每服二錢

○療姙娠臍下刺痛大便白晝夜三五十行

根黃厚者 蜜黃炙令焦 大蒜煨令熟 臍去皮

右以根黃為末研蒜作膏如丸如梧子大空心粥飲下三十丸日三服妙。一方不用根黃用當歸以芍藥煎湯吞下

新校 **厚朴散** 療姙娠痢黃水不絕

厚朴姜汁炙三兩 黃連二兩 肉豆蔻五个連皮

右用水二升煮取一升頓服忌如前已上六方並出產室

文仲療姙娠下痢不止方

黃蘗 乾姜 赤石脂各二兩 酸石榴皮一枚

右細切以水八升煮取二升分三服

古今錄驗療姙娠下痢方

酸榴皮 黃芩 人參 檉皮各四兩 粳米三合

右細切以水七升煮取二升分三服

○療姙娠挾熱下痢冷熱不調千金翼同

黃連 一升 黃蘗 一升 梔子仁 二十枚

右為末每服五錢水二盞浸三時又煮十沸頓服隨者加橘皮一兩 生薑二兩亦治丈夫常痢

方 治中暑挾熱下痢 無梔子仁用姜錢羊脂煎服

後方 療姪娘下痢赤白如魚腦腹中絞痛

阿膠 炒 黃蘗 地榆 當歸 各三 川芎 酸榴皮 各三

右為細末葱白粥飲調二錢

○療姪娘下痢腹痛不食

雞白 切 一 當歸 炒 北榆 各一 甘草 半兩 糯米 一合

右為散以水七升煮取二升去滓溫分三服

○療姪娘下痢腹痛小便澀

糯米 一合 當歸 炒 黃耆 各一

右細切和停以水二盞煮取一棧二分去滓溫分四服

○治姪娘臨產下痢

右梔子不以多少燒存性為細末每服一大錢空 然水調服甚者 連進四五服即止

○治姪娘藏府氣素弱頻併下利時上腹痛漸至羸瘦面色痿黃不美

飲食

厚朴 白朮 川芎 白芍藥 當歸 炒

熟地黃 各一兩 乾姜 人參 各半 呵子 二分 甘草 一分

右咬咀每服四錢水一盞棗三枚煎至六分溫服

○療姪娘下痢赤白絞刺疼痛 出三因方

烏雞子 一枚 雞頭上開二 黃丹 一錢 雞子殼內打令勻以厚

右每服二錢水飲調下一服愈者是男兩服愈者是女

補遺 治姪娘挾熱下痢純血 黃連 鮮薑 湯 膿血不止腹痛 黃連 湯

實 純白下如魚腦者 不換金正氣散 加烏梅陳皮赤白相雜更

加黃連或 阿膠 禁口者 散毒散 加陳米縮砂 可與八卷第十

論帶下類中通者以意通治

○如娠大小便不通方論第三十九方

論曰夫妊娠大小便不通者由臟腑氣實而生於熱也者隨停之處則成病也若熱結於大腸則大便不通結於小腸則小便不通若大小腸俱為熱所結故煩滿而大小便皆不通也

○小品療妊娠子淋大小便並不利氣急已服猪苓散不差宜服

車前散 下之 大山赤皮 甘草 二兩

右一味為末以白蜜二合和服如大豆粒多竟心下煩得微下者日一服下之後還將猪苓散不得下日兩服漸加至半錢以微利為度

經心錄同

猪苓散 療妊娠小便澀痛煎藥胎水 猪苓 五兩去皮

右為末白湯調方寸匕加至二七日三夜二不差宜轉下之服前藥
○古今錄驗療妊娠得病六七日以上身熱入臟大小便不利安胎除

葵子 二升 滑石 四兩

右以水五升煮取一升去滓盡服須臾當下便愈

又方 葵子 一合 川朴消 二兩 每服三錢水煎溫服

○治妊娠大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲食手足煩熱

檳榔 赤茯苓 大腹皮 木通 郁李仁 去皮尖

北五味 各一兩 桑寄生 甘草 苦梗 各半兩

右為粗末每服三錢水一盞煎至六分溫服

○治妊娠大小便不通熱閉心膈腹脇妨悶妨害飲食

大黃 木通 檳榔 各一 枳殼 三分 大腹子 三枚

訶梨勒 四个 去核半生半煨

右為末以童便一盞葱白二寸同煎至六分調下二錢

當歸散 治胎前諸疾或因怒中氣克子臟或克脾脈腹急肚脹腰腹

時或可思飲食四肢浮腫氣急時喘大便忽難小便忽澀產門忽腫

當歸 一兩 赤茯苓 枳殼 白芍藥 川芎 各二兩 川白姜 炮

水香晨 粉草各半兩

右吹咀每服三大錢水一錢半姜三片煎至八分去渣然時溫服如稟受氣弱及南人枳殼減半如氣實及北人於內加一分兩服之或連日大便秘澀加蜜同煎

○初虞世治姪娘大便秘澀方 枳殼三兩 防風二兩 甘草一兩

右為細末沸湯點服一二錢空心日三

○又治虛羸大便秘方 枳殼製 阿膠沙半分

右為細末煉蜜和劑并二三寸下丸如梧子大別研得石末為衣溫水下二十九半日來未通再服二十九止於五十九

又方 車前子一兩 大黃半兩

右為細末每服三錢空心蜜湯調下

補遺局方八正散治姪婦心經蘊熱臟腑秘結大腸不通小便赤澀閉

枳殼 大腹皮 赤茯苓各一兩 甘草二錢

右為末葱白湯下二錢

○姪娘小便不通方論第四凡八方

論曰夫姪娘小便不通者由小腸有熱也入於脾內熱結甚者故令小便不通也若小便不通則心脇小腹氣澀而喘急也陳無擇云凡姪娘胎滿過厚多致小便不利者或心腎氣不足不能使脾冷清濁相干為諸淋病或胞系子戾小便不通名曰轉胞又胎滿尿出不知時名曰遺尿治之各有方

○古今錄驗療姪娘卒不得小便 杏仁二十個去皮尖炒令變色

右一味搗丸如大豆燈心煎湯吞七粒立得利

又方 以滑石末水和泥臍下

又方 用車前草汁調滑石末塗臍四畔方四寸熱即去之

○治姪娘卒然小便不利方 滑石末 杏仁等分

右先搗杏仁令爛以入滑石末以軟飯搗和為丸如小豆大每服二十丸白湯送下

○治妊娠小便不通臍下妨悶心神煩亂
葵子研 榆白皮切各一兩 葱白七莖

右以水二大盞煎

又方 用紫葳去苗為末并花水調下二錢一方用紫葳

苦參丸 治妊娠小便難飲食如故

當歸 具母去心炒 苦參各三兩 滑石半兩

右為末蜜丸如小豆大以飲下二十九不拘時

治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水腫者王子亨云

妊娠小便不通特避寒藥又名茯苓湯千金翼要同

葵子五兩 茯苓三兩

右二味為末每服二錢米飲調下小水利則愈方無茯苓有榆白皮

治婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息以膠系子不

得溺故致此病名轉胎但利小便則愈以此藥有茯苓故也此藥中

非自合方有効 熟地黄兩 山藥 山茱萸去核各四兩 附子炮

桂心略二 牡丹皮去心 茯苓去皮澤瀉各三兩

右為末蜜丸如梧子大每服三十九空心温酒下

補遺 治妊婦小便不通阿膠一片炙軟和葱搗爛封臍下仍以滑石末

濃煎車前子湯調下

○妊娠子淋方論第五凡五方

論曰夫淋者由腎虛膀胱熱也腎虛不能制水則小便數也膀胱熱則

小便行澀而數不宣妊娠之久胞繫於腎上間虛熱而成淋疾甚者心

煩悶亂故謂之子淋也

小品療妊娠患子淋宜下 地膚大黃湯

川大黃 地膚草各三兩 知母 黃苓 滑石

赤芍藥 通草 川升麻 枳實 甘草各二兩

右吹咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服

○經心錄療妊娠患子淋小便數出少或熱疼痛及足煩

地膚草三兩

右細切水四升煮取二升半去滓分三服日三服文仲小品同

○療妊娠患淋小便澀不利小腹水道熱痛

冬葵子升芍藥各二兩 黃芩 赤茯苓 車前子各三兩

右吹咀以水七升煎至二升溫分三服

○療妊娠數月小便淋澀夜痛心煩悶亂不思食

瞿麥穗 赤茯苓 桑白皮 木通 葵子各一兩 黃芩

芍藥 枳殼 車前子 各半兩

右為粗末每服四錢水一盞煎至六分溫服

○療妊娠子淋小便澀痛

冬葵子 滑石 木通 各等分

右為末每服四錢水一盞煎至七分去滓服

○補遺 治胎前諸般淋瀝小便不通

積柳 赤芍藥 等分 判每五錢水煎溫服甚效

安胎散 子淋甚妙 麥門冬 通草 滑石 當歸

燈心 甘草 人參 細辛 各等分

細末每三錢煎麥門冬湯調下

○妊娠遺尿方第六 凡三方

○療妊娠不知出時胎滿故也宜服

白薇散

白薇 芍藥 各一兩 右為細末酒調下

又方 白礬 牡蠣 等分 為細末溫酒調二錢亦可治男子

又方 用雞毛灰為末酒調方寸匕 亦見第八卷

補遺

桑螵蛸散

治妊娠小便不禁

桑螵蛸十二个炙為末米飲下之

又方

益智子仁為末米飲下亦效

○妊娠尿血方論第七 凡五方

論妊娠尿血者由勞傷經絡有熱在內熱乘於血上得熱則流溢滲入
膀胱故令尿血也

○千金療妊娠卒下血及子淋方 三方並出外臺

葵子一升研

右以水五升煮取二升分溫三服

又方

生艾葉

一斤研冬用
至乾者亦得

右以酒五升煮取二升分三服

又方

生地黃一升切

右以酒四升煮取二升分溫三服亦療落身後血

治妊娠下血及尿血

當歸

生地黃各一兩

續斷半兩 赤芍藥一

右為末空心煮白煎湯調下二錢

○療妊娠尿血

阿膠

熟地黃

右各等分為細末空心粥飲調二錢

補遺

白茅根湯

治妊娠小便尿血

生薑七片

蜜半盞

白茅根一握

濃煎服

五寶散

法詳加阿膠
砂同為粗末

每四錢用車前子白茅根煎溫服

又方

白茅根濃煎湯吞酒蒸黃連丸

○妊娠胎水腫滿方論第八 凡十一方

產寶論曰夫妊娠腫滿由臟氣本弱因產重虛土不尅水血散入四肢

遂致腹脹手足面目皆浮腫小便秘澀陳無擇云凡婦人宿有風寒冷

濕妊娠喜脚腫俗呼為皺脚亦有通身腫痛心腹急脹名曰胎水

論曰凡妊娠之人無使氣極若心靜氣和則胎氣安穩若中風寒邪氣

及有所觸犯則隨邪而生病也凡妊娠經血壅閉以養胎若忽然壅腫

乃胎中挾水也血相搏脾胃惡濕主身之肌肉濕漬氣弱則肌肉虛水氣流溢故令身腫滿也然其由有自或因泄瀉下痢藏腑虛滯耗損脾胃或因寒熱瘧疾煩渴引飲太過濕漬脾胃皆能使頭面或手足浮腫也然水漬於胞兒未成形則胎多損壞及其臨產日脚微腫乃胞藏水少血多水出於外故現微腫則易生也宿有寒氣因寒冷所觸故能令腹脹腫滿也

○產乳集養子論

妊娠自三月成胎之後兩足自脚而漸腫腿膝以來行步艱辛以至喘悶飲食不美似水氣狀至於脚指間有黃水出者謂之子氣直入分挽方消此由婦人素有風氣或衝任經有血風未可妄投湯藥亦恐大段甚者慮將產之際費力有不測之憂故不可不治於未產之前也古方論中少有言者按名醫錄云宋少主元徽與徐文伯微行李鍼法文伯見一妊娠足腫不能行少主脉之此女形也文伯診之曰此男胎也

左則胎黑色少主怒欲破之文伯測然曰臣請針之胎遂墮男形而色黑此妊娠足腫之說見於古者今某氏病源中但有子煩之論千金并產寶方亦畧言之劉禹錫續傳廣信方以謂妊娠有水氣而成胎太平聖惠亦言之皆非也元豐中淮南陳景初名醫也獨有方論治此病方名初謂之香附散李伯時易名曰天仙藤散也

天仙藤散方

甘草

烏藥

天仙藤

香附子

陳皮

不須要天台者但得軟白香而辛者良

右等分淨秤為細末每服三錢水一大盞姜三片木瓜三片紫蘇三葉同煎至七分放溫澄清空心食前服日三服小便利氣脉通体輕腫漸消更不須多服元豐末王荆公居金陵奉家病以詩贈景初曰征鴻因此見方得於李伯時家傳方錄于臨川張右丞宅

○產寶察妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

赤芍四兩

杏仁

檳榔各三旋覆花

郁李仁

各一兩

婦人經水不通
右方粗末以水六升煮取二升去滓分三服小便通即差

○崔氏療 妊體腫有水氣心腹急痛
茯苓 白木各四兩 旋覆花二兩 杏仁各三兩

右細切以水七升煮取二升半分溫三服忌桃李等酢物。千金
救急古今錄驗集驗同

○療妊娘遍身洪腫
葶藶子分 白木二十分 茯苓二兩 桑白皮二兩 郁李仁八分

右為粗末以水六升煮取二升分溫三服小便利即差
新增 葶藶 茯苓 桑白皮 郁李仁 各一錢半 白木 四錢

右作一服水二盞前六分不拘時服
又方 澤瀉 葶藶各三兩 茯苓 枳殼 白木各六兩

澤瀉散 治妊娘氣壅身體腹脇浮腫喘急大便不通小便赤澀
右細切以水六升煮取二升分溫兩服小便利即差

澤瀉 桑白皮 木通 枳殼 檳榔 赤茯苓各一分

右咬咀每服四錢水一錢姜四片煎至六分去滓食前溫服
方已湯 治妊娘脾虛通身浮腫心腹脹滿喘促小便不利

防已三分 桑白皮 紫蘇葉 赤茯苓各一兩 木香一分
右為粗末每服四錢水一盞姜四片煎至七分去滓食前溫服

千金 鯉魚湯 治妊娘腹大胎間有水氣
白木五兩 茯苓四兩 當歸 芍藥各三兩

右細剉以鯉魚一頭修事如食法煮取汁去魚不用每服四錢入魚
汁一盞半姜七片橘皮少許煎至七分去滓空心服集驗同

商陸赤小豆湯 治妊娘手足腫滿壅急
赤小豆 商陸各一分
右咬咀每服一兩用水一碗煎至七分澄清汁服集驗同方有罌

漆。產。方。无。澤。漆。有。桑。白。皮。
賢書 治妊娘腰脚腫

白木各四 乾姜 其草 杏仁 三兩

右咬咀 服四錢水一盞半煎至七分食前服

指迷方治胎水 **五加散** 尋常脾虛腫滿亦治

大腹皮 桑白皮 生姜皮 茯苓皮 橘皮

右咬咀每服半兩水二盞濃磨木香水一呷同煎至八分去滓空心
溫服亦治男子脾虛腫滿

補遺 **川芎散** 治胎水

羌活 蘿蔔子 炒等分為末酒調下

○治妊婦兩脚浮腫名曰脆脚因脾衰不能制水血化成水所致生料

平胃散 薑棗煎服或為末紫蘇葉湯調下

○妊婦腹內鍾鳴方第九 凡一方

○妊婦腹內鍾鳴用鼠窠前後土為細末研麝香酒調下錢其並立愈

補遺 治孕婦腹中兒哭用川黃連濃煎汁母常呷之

○龍彥德孕癰方第十一 凡一方

治孕癰方立効

烏藥 研出共州軟白香辣者良

右用水一盞牛皮膠一片同煎至七分溫服

補遺 治孕中有癰 薏苡仁煮汁飲之

○妊婦不語論第十一 无方

孕婦不語非病也間有如此者不須服藥臨產月但服保生丸四物湯
之類產下便語得亦自然之理非藥之功也醫家不說與人臨月則与

尋常之藥產後能語則以為醫之功豈其功也哉 黃帝問曰人有重身

岐伯對曰胞之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰
之脉貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰无治也當十月後

○妊婦傷食方論第十二 凡二方

經云飲食自倍腸胃乃傷又云陰之所生本在五味陰之干 易

味若姪子 食不節生冷毒物恣性食噉致傷脾胃故妊婦傷食最難

得藥性 此二方最穩捷

木香 治婦人有孕傷食

木香 錢三稜 人參 白茯苓 各三錢

右為細末麩糊丸如綠豆大熟水吞三四十九

白木 治妊娠氣不調和飲食易傷

白木 乾紫蘇 各一兩 人參 白芷 各三分 川芎

呵子皮 青皮 各半 甘草 一分

右為末每服二錢水一盞姜三片煎至七分溫服

愚詳小七香丸見局保氣散胎例類中豈無良効

補遺局方 治中湯 平胃散 良薑散 皆治妊娠脾胃不和飲食

易傷者有効

○妊娠臟燥悲傷方論第十三 凡一方

許孝士云鄉里有一婦人數欠無故悲泣不止或謂之有崇祈禳請禳備至終不應予忽憶有一證云婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈數欠者

大棗湯予急令治藥盡劑而愈古人識病製方種上妙絕如此試而後知

大棗湯 治婦人臟燥悲傷欲哭象若神靈數欠者皆主之

甘草 三兩 小麥 一升 大棗 十枚

右咬咀以水六升煮取三升去滓分溫三服亦補脾氣專治婦人方

名甘草湯 鄉先生程虎 鄉內人黃氏 姓娘 四五個月 遇蓋則添悲

正在齋中習業見說此証而程省元皇 元計僕遂告之管先生伯 同說記憶先人曾說此証而程省元皇 元計僕遂告之管先生伯 方者之甚喜對証笑 而治藥一投而愈矣

補遺 治妊娠驚悸臟燥悲傷不止又治虛煩甚効

麥門冬 去心 小麥 半夏 湯泡各二兩半 人參

白茯苓 各兩半 甘草

右剉散每四錢姜五片棗一枚淡竹茹一塊如指大同煎服

又方 治心臍燥自悲自哭自笑

紅棗燒存性米飲調下

新刊婦人良方補遺大全卷之十五 畢



新刊婦人良方補遺大全

卷之十五

畢