

丹

溪

摘

玄

五

丹溪摘玄卷之九

傷寒門

丹溪云傷寒必自太陽始太陽寒水其位君唇爲六氣  
化厚故丙辛遁起戊子至辰爲土辰水而太陽正化君  
馬在天爲寒在地爲水寒喜歸水故寒必首傷太陽  
以此例推寒既自太陽入風當自少陽入濕當自陽  
明入經日陰爲之主陽與之正別於陽者知病從來  
別於陰者知死生之期此之謂也夫傷寒循經絡流  
注以日傳變與傷風頗類夫傷寒傷風則有血氣之  
分虛實之異二證皆始自太陽一經但寒位血無汗惡

寒風散氣有汗惡風或問傳變次序當何如耶然  
陰陽汗出入次序固有定說及其中病或喜入或成  
虛或成內感或守三經其可拘也但當以脉証分別  
陰陽表裏盛衰之爲治在不可以日數期也

又曰傷寒傷風何以判寒脉緊風浮緩傷寒惡寒  
傷風惡風

傷寒自汗寒無汗

又曰凡傷寒中風外傷之病自霜降以後至春  
分之前其有發寒宜發汗依張仲景法春分  
以後夏至以前爲溫病宜辛涼解散用劉守真法

表証門

芎朮香蘇散治頭疼發熱鼻塞聲重四特俱用之

川芎 香附 紫蘇各兩 甘草四兩 蒼朮 陳皮各二錢

右剉每五錢水煎加白芷二兩姜三片葱白五莖同煎

三拗湯治傷風傷冷鼻塞聲重頭痛目眩四肢拘急咳

嗽多痰腦滿氣短証重三拗湯治之輕者金沸草散送

麻黃不去根節杏仁不去皮心甘草不炙各等錢

右剉每五錢姜五片水煎被覆取汗

金沸草散右治特行寒疫壯惡熱風

旋覆花 麻黃 前胡各三兩 荆芥穗四兩 炙甘草

半夏 各兩 赤芍 一兩 右剉每五錢姜三片棗一枚水煎

消風百解散

治疼頭項強發熱惡寒肢休拘急骨節煩疼腰  
脊強痛腦鬪煩滿四時用此方春初秋末用葛  
根湯治之並後方

荆芥 白芷 陳皮 蒼木 麻黃 各四兩 炙甘草 二兩

右剉姜煎烏梅一個連葱須三寸煎加薄荷川芎祛風  
葛根解肌湯

葛根 四兩 麻黃 三兩 芍藥 炙甘草 黃芩 各三兩

冬寒去芩如病人鬱蒸熱量用

天氣熱特可去冬寒量用

右對每五錢姜棗水煎取

### 敗毒散

治頭痛項強壯熱惡寒身體煩疼目特疾多寒墜  
咳嗽鼻塞声重春夏秋用敗毒散冬用十神湯春  
秋共寒亦用

人參

茯苓

甘草

前胡

川芎

羌活

獨活

桔梗

柴胡

枳殼

右對毒五錢姜五片薄荷少許水煎

### 十神湯

陳皮 麻黃 川芎 炙甘草 香附 紫蘇

白芷 升麻 白芍藥各四兩 干薑四兩

右剉每五錢姜五片煎熟服發熱頭疼加連須葱

白三莖中蒲氣實加枳殼數片

十味芎蘇散治傷寒發熱頭痛

川芎 紫蘇 干薑各錢五分 羌活 茯苓各錢

甘草兩 半夏六錢 枳殼 陳皮各三錢五分 桔梗二錢五分

姜三片葱白二莖煎

### 黃連解毒湯

治傷寒熱毒煩悶口燥或乾嘔春暖夏暑熱秋

皆可用之雖冬寒不用若病人舊有鬱熱亦可也  
黃連 黃柏 黃芩 大梔子各五錢

右剉每五錢水煎腹滿嘔吐欬作刺加半夏三錢厚朴  
貳錢茯苓四錢生片二片

### 紫古涼膈散

治表証不解下証未全或燥熱滯結心煩不眠噴瀉  
頭昏唇焦咽燥日赤或便弱秘結輕者用涼膈散  
已上末即益九散

右剉各七錢攪勻葱白五寸鹽豉五十粒生姜三片煎  
谷源白虎湯



治傷寒七八日邪毒不解表裏俱熱必脆大煩頭痛  
自汗大渴飲水燥乾脉滑數而實或長而實夏熱  
特用如土部脉洪大加人參如鼻中氣短促上喘脉  
洪大而虛無力或微遲則內傷治之

知母一兩五錢

炙甘草兩粳米一合石膏四兩

亂交者另爲末

右剉每五錢水煎溫服

如煩渴口乾脉洪夫加人參五錢名人參白虎湯此藥  
立夏後立秋前天氣熱特可服立夏前立秋後天氣  
寒涼不可服內傷氣虛血虛脉虛之人並不可服

小芩胡湯

治傷寒四五日蒸熱發作身熱惡風筋脉拘急身  
体疼痛又無寒熱往來或腦滿脇痛或自汗

柴胡八兩 黃芩 人參 炙甘草各二兩 半夏三兩

姜五片棗棗一枚煎

麻黃湯治傷寒頭痛發熱惡風骨節疼痛喘滿

無汗

麻黃三兩 甘草炙二兩 肉桂二兩 杏仁去皮炙炒研成膏

右剉入杏仁膏水煎取

小青龍湯

治傷寒表不解心下有水氣干嘔發熱咳嗽微喘

嘔吐涎沫又治溢飲身體疼痛或形寒飲冷內傷肺經噎喘嘔吐涎沫

干姜

炮

細辛

麻黃

肉桂

芍藥

炙甘草

五味

兩

半夏

三兩半

姜水煎

五積散方見前中寒門下

治冷氣奔豚心脇臍腹脹滿刺痛及嘔吐泄清谷

痞癖癥瘕小腸氣痛加茴香吳茱萸煨生姜炒

鹽少許煎特疫頭痛身疼項強發熱加葱白

三寸豆豉七粒煎身寒手足厥冷加炒茱萸炒鹽

少許煎婦人經候不調去麻黃加醋香附玄胡蓬

木催生加醋香附桃仁蘇木紅花名透經湯

神木散治瘟疫頭疼項強發熱及傷寒鼻塞聲重

蒼朮各二兩 藁本 白芷 細辛 羌活 川芎

炙甘草各二兩 右剉每五錢水煎五片葱白三寸煎或為

末葱茶湯調下

神仙百解散治遍身骨節疼痛目昏眩肢休勞倦

茵陳二兩 柴胡 前胡姜炒 人參 羌活 獨活

甘草 蒼朮制 白芍 干葛 升麻 防風

各二兩 藁本 藿香 白朮 半夏各二兩

立春無加減立冬無加減

立夏以後加柴胡壹錢赤茯苓當歸各五錢

立秋不用當歸茯苓加干姜炮肉桂各壹錢麻黃錢

一方無當歸有黃苓伍錢

右剉每兩水二鍾豆豉三十粒煎取汗

桂枝湯治傷寒太陽經受病頭疼身痛翕翕發熱

洒惡風

桂枝 芍藥各兩 甘草 兩

右剉每五錢姜三片棗一枚水煎

春秋依本方春末夏至前加黃苓一錢

夏至後加知母壹錢石膏二兩升麻二錢病人表虛者不用

升麻葛根湯治大人小兒痘疫頭疼發熱及瘡疹  
已發未發疑似之間宜服之

升麻 白芍藥

甘草 炙各兩

葛根 十五兩

右對每五錢

香葛散即香葛湯

方見前雷頭風門下

升麻湯治發散表邪治遍身壯熱膏即疼痛

升麻一錢 柴胡七錢 當歸一錢 羌活 蒼朮一錢

防風一分 陳皮 甘草七錢 藁本五錢

作一服水煎熱服以葱鹽湯發之春冬加麻黃

治三陽頭痛

羌活 防風

荆芥

升麻

干葛

白芷

白芍

芫胡

川芎

細辛

右剉每錢連須葱白生姜煎

九味羌活湯

經云有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若差則其變不可勝言故禁此法使不犯三陽禁忌易老云解表神方也

羌活 兩半

防風 兩半

蒼朮 兩半

細辛 五錢

川芎 兩

白芷 兩

生地黄 兩

黃芩 兩

甘草 兩

每伍錢水煎無汗則用蒼朮有汗則用白朮  
大神朮湯

潔古治解利四特傷寒清解六經不犯禁忌

蒼朮四兩製度

羌活

防風

川芎各二兩

黃芩

枳實

甘草

白芷

石膏各兩

細辛三錢

知母七錢

右剉惟石膏為

細末每服五錢水煎取

汗之熱服春倍防風羌活夏倍黃芩知母季夏

淫雨加白朮倍白芷秋加桂五錢冬加

亦可以

意消息隨証增損非發熱而渴不可用石膏知

母非裏實心下痞不可用枳實



大青龍湯

治傷寒頭疼發熱惡寒無汗煩燥六脉浮緊

麻黃兩 桂枝兩 杏仁四十箇 炙甘草兩 石膏如鷄子大

每劑五錢姜五片棗三枚水煎汗出為度不可過

汗恐七陽以溫粉撲之

裏証門

仲景大柴胡湯

治傷風三四日或十余日邪結在裏 秘澁腹滿或

脹痛或繞臍刺痛或譫語或心下痞硬脉長脉

沉實或下利心下堅硬或以經汗下其脉浮沉尚有方

柴胡二兩 黃芩 赤芍各二兩 大黃二兩 半夏二兩半

枳實三錢 右剉每五錢水二鍾姜五片棗一枚煎

仲景調胃承氣湯

治惡熱不惡寒手心腋下微汗出胃中乾澀燥

糞結聚潮熱大便硬小便如常或腹滿而喘或

譫語脈沉而滑

芒硝二兩 炙甘草二兩 大黃四兩 去皮酒洗

右剉每服臨期斟酌多少先煮二味熱去粗下火煮

二三沸頓如初發惡寒冷汗後不惡但大熱發而躁

結切脈浮大今脈洪實或沉細數始初往今狂

語用調承氣湯治之

付景小承氣湯治心腦連臍大悶腹中疼坐卧不安  
胃悶喘急腹中痛不大便

大黃四兩 厚朴二兩 枳實大者五錢炒

右剉碎二味大黃切如棊子大臨証斟酌多少同之  
腦腹脹滿按之痛日久不大便小便赤澀表裏俱熱

或煩渴譫語或狂妄不餓人或潮熱懊懣又加瘡  
狀或大渴反不能飲或喘急胃悶或微喘直視脉  
實數而沉用大承氣湯或三一承氣湯治之

仲景大承氣湯

大黃四兩切作棊子大酒洗厚朴向姜炒枳殼五個炒芒硝二合

右四味每服看証斟酌多用水參錢先煮二物取一盞半去粗內大黃煮取八分去粗內芒硝微煎一兩沸溫服得下余勿服

啓源三一承氣湯

大黃酒洗芒硝 炙甘草二兩厚朴姜炒枳實炒各五錢

右對每服斟酌多少姜三片煎熟服得利則止未利再服

仲景桃仁承氣湯

治太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外不解者尚未可攻當先解外解已但少獲

結者乃可攻之

桃仁五十個

桂皮二兩

大黃

四兩

芒硝

二兩

炙甘草

二兩

右五味水七升煮取二升半去粗內芒硝更上大  
微沸下大先食溫服在食前三服當微利

三因治中湯

治傷寒手心溫自利不渴服滿肚痛嘔乾脉沉

細活人書同

人參

干姜

炮

白朮

炙甘草

陳皮

青皮

炒

右剉每五錢水煎

半表半裏証門

柴胡湯

治往來寒熱或腦滿脇痛或心煩或嘔或噦或口苦舌干或渴小便不利或心悸脈弦急有方見前

芫胡湯

治寒熱大便秘澀腹滿脹痛或發煩燥或已經汗後如瘡牒發熱有方見前

外感有內傷証

人參養胃湯

治外感風寒內傷生冷增寒壯熱頭目昏倦疼痛肢休拘急或中脘虛寒嘔逆惡心

厚朴 蒼朮 半夏各兩 藿香 草果 伏苓

人參 壹錢 橘紅 七錢 甘草 二錢

外感發熱頭疼內因痰飲凝滯為熱中脫痞

蒲嘔吐惡心用參蘇飲或用藿香正氣散服之

參蘇飲

陳皮 枳殼 桔梗 甘草 木香 各錢 半夏

乾葛 紫蘇 前胡 人參 茯苓 各錢

右剉每五錢姜七片棗二枚煎服

藿香正氣散

茯苓 白芷 大腹皮 紫蘇 各兩 陳皮 桔梗

白木 厚朴 半夏 甘草 各兩 藿香 三兩

右剉姜三片棗二枚前取汗

如上証候未見愈用芫胡湯治之

若如上証候又未見愈腹或滿數日不大使用活人書小

柴胡加芒硝

柴胡 二兩 錢 黃芩 人參 炙甘草 各兩 芒硝 三兩 半夏 錢

右剉每五錢姜五片棗二枚水二鍾去粗下芒硝再

煎一兩沸熱服

不換金正氣散方見前雷頭風下

半藿 紅蒼朴 草姜 東煎



外感傷寒極証

下陽証

身動而輕言語有声目睛了了鼻中呼吸出入能

往來口中鼻中俱氣熱熱出此事難知用調胃

承氣湯治之

陰証

身靜而重語言無声氣少難以布息目睛不了

鼻中呼吸不能出入往來口重鼻中氣俱冷水

漿不入大小便不禁面白惡寒有如刀刮出此事

送湯及葱熨法治之

仲景四逆湯

炙甘草

兩

炮乾姜

兩半

附子

一枝生用去皮破八片今宜炮用約錢

右剉每服斟酌多少水二錢煮八分溫服

活人書葱熨法

葱一束小繩纏如餅大切去根葉惟好葱白長寸

先少火熨一面令熱勿至灼火乃以熱處着痛劑

連臍下其上沙熨斗盛火熨之令葱餅熱氣透

入腹中更作三四餅如壞不可熨助陽一餅俱病

人漸醒牙足溫有汗乃瘥更作四逆湯以溫服

陽証似陰門

手足逆冷大便秘結小便赤色或大便黑硬脉沉而滑出活人書按此手足逆冷名熱厥與陰厥不同詳見後厥証条下証輕者白虎湯重者小承氣湯白虎湯

小承湯二方並見前

陰証似陽門

身微熱煩躁面赤脉沉而微出活人書

按此身微熱足裏寒煩躁是陰盛發踪面赤是

下元虛陽泛上猶日落而霞光上天也與陽証而

赤不同仲景少陰証面赤用四逆湯加葱自治

四逆湯方見前更加葱白煎服  
陰盛格陽門

身冷脉細沉數煩躁不飲水此名陰盛格陽虛用  
仲景乾姜附子湯人參治之

乾姜兩 附子一個炮切八片 加入人參

右剉每服酌量多少錢半或溫或涼服

傷寒自赤而煩渴脉七八至東桓曰此陽盛於外  
非熱也診脉以數為熱遲為寒今脉七八至是  
熱極也至然按之至骨則無脉是無根蒂之脉  
雖七八至其下無根故之非熱也出試効方法治

用乾姜附子方見前又用白通加猪膽汁湯

仲景白通加猪膽汁湯

葱白四莖 乾姜二兩 附子二兩炮切片人尿 各猪膽汁各

右剉每服酌量多少水一觔煎五分去粗內尿膽汁  
和勻右或涼或熱任服無膽亦可

表裏揅証門

煩為煩擾躁皆為熱証然煩有虛煩躁古人  
所謂陰極發躁

陽証

五六日不大便或心下硬而煩躁者用大柴胡調胃

右劉姜煎

三因無憂散

以南星為末入臈月黃牛膽中縛令懸於營風  
避日處晒乾為末用人參五錢煎湯七分釵  
調二錢乘熱服之遲少時更熱人參湯投之  
或入辰砂為細末亦可

舌胎門

陽証

寒邪在半表半裏舌胎白滑或黃胎用小

柴胡湯

熱結在裏表裏俱熱舌上或白或黑不滑而澁

治用白虎湯加人參

經曰歲結舌上白胎滑者難治

又曰歲結無陽証不往來寒熱其人反靜舌上

胎滑者不可攻之

陰証

手足冷舌胎黑用四逆湯

諱語門

此是語言諱妄錯亂也

陽証

承氣湯方並見前

大熱乾嘔呻吟錯語不得眠治用黃連解毒湯

方並見前

煩躁發熱腦中煩悶或已經汗解內耗腦煩滿其

証不虛不實治用三黃瀉心湯或竹葉石膏湯

治人書三黃瀉心湯

大黃 黃連各兩 黃芩二兩

右剉每一兩百沸湯二大觔熱清之一特久絞去粗

煖動分貳服

仲景竹葉石膏湯



石膏一兩 半夏二兩半 炙甘草二兩 人參三兩 麥門東五兩  
右剉每五錢水二鍾入淡竹葉生姜各五片入粳米一  
百二十粒服

陰証

此是陰極發熱手足冷或身微熱脉皆沉細微  
弱而煩躁者用四逆湯加葱白  
或白通加猪膽汁湯或用人參三白湯加竹茹  
或無憂散右四方選而用

人參三白湯

白朮 白芍 白茯苓各兩 人參二兩 加竹茹一握

胃實不大便譫語治用大柴胡湯

或調胃承氣湯

婦人傷寒經水適斷發熱惡寒至夜譫語此為  
熱如血室者素問所謂女子胞即產腸治用小  
柴胡湯

陰証

手足冷脉細微而譫語者治用四逆湯

凡譫語發熱煩躁無下証者及冬月時候難下者

小柴胡

加黃連

姜炒

山梔子

姜炒

麥門冬或涼膈散去梢黃加姜炒黃連

鄭声門

此是語言鄭重如此語一句言語之復再說声氣無力句不連續也

陽証

身微熱脉微弱而鄭声者治用人參白虎湯

陰証

手足或冷身凉而鄭声者治用四逆湯

吃逆門

仲景所謂噦盖下氣逆衝者出口作声素問

所謂諸逆衝上皆屬於火

陽証

不虛不實而吃逆者治用小柴胡湯

或用橘皮竹茹湯或用丁香柿蒂湯加入參

活人書橘皮竹茹湯

橘皮 斤半 青竹茹 斤半 炙甘草 二兩 加入參 五錢

右剉每五錢姜五片棗二枚水煎

丁香柿蒂湯

丁香 柿蒂 青皮 陳皮 加入參 各等分 水煎

身熱脉雖數而虛而吃逆者治用人參三白湯

加竹茹

或用八物湯加竹茹或用丁香柿蒂湯加人參  
右剉每五錢水二鍾姜三片煎

陰証

身冷手足或冷而吃逆者治用四逆湯加人參

如病後無室証独見吃逆者治用人參三白湯

加當歸

人參三白湯

人參 白朮

白茯苓

白芍藥

加當歸各等分

姜三片煎

發黃門

陽証

身熱不大便而發黃者治因茵陳湯

仲景茵陳湯

大黃二兩 山梔子十四個 茵陳六兩

右剉每服酌量多少水二升先煮茵陳二升內二味再煮至一升服之

茵陳五苓散治身熱大便如常小便不利而發黃者

澤瀉 白朮 猪苓 赤苓各兩半 官桂二兩

茵陳三兩 水煎服

仲景梔子柏皮湯加茵陳治身熱大小便如常而發黃者

枳子 二十四個  
甘草 一兩  
栝皮 二兩  
茵陳 六兩

右剉水煎溫服

陰証

治皮膚涼又煩熱欲臥水中喘嘔脈沉細遲無力  
發黃用茵陳四逆湯

茵陳四逆湯

乾姜 二兩半  
炙甘草 二兩  
附子 炮二枚切八片  
茵陳 六兩

水煎涼服

皮膚冷心下硬按之痛身體重背惡寒目不欲  
開懶言語自汗小便利大便秘了而不了脈緊細

而發黃者治用茵陳四逆湯遍身冷面如桃柳枝  
色腹滿小便澀閉尺脉沉細遲而發黃者治法  
先用茵陳伏苓湯以利其小便次用茵陳四逆  
湯加當歸木通

茵陳茯苓湯

茯苓

官桂

各兩

猪苓

七錢半

滑石

一兩半

加當歸

二兩

茵陳四逆湯

方見前更加當歸木通

發癰門

陽証



斑出如綿紋或頭面或胸背四肢紅赤者胃熱也紫黑者胃爛也赤者五死一生黑者十死一生治用玄參升麻湯重者加白虎人參湯

三因玄參升麻湯

玄參

升麻

甘草炙各五錢

水一觔半煎

白虎人參湯

陰証

斑如蚊蚤痕稀少而微紅此下元陰火失守聚於中上熏於肺今主皮毛故胸背皮膚發此斑也治用大建中湯

大建中湯

桂心 芍藥 黃芪 各三錢 人參 當歸

甘草 各錢 附子 炮五錢 生姜 五錢 半夏 二錢半

右剉水二盞棗二枚煎

發狂類

陽証

發狂煩躁面赤脉實治用調胃承氣湯方見前

陰証

發狂而肌表雖或熱以手按之則令透手或背

腦膈有斑數點脉極沉細治用乾姜附子湯加人

厥逆門

此陰陽不和及不相順按故手足逆冷至臂腿各四  
肢厥者逆也

陽証

手足雖冷有時或溫手足必暖脉雖沉伏按之  
則滑其証或胃熱或渴欲飲水或揚手擲手  
煩躁不得眠大便澁小便赤此名熱厥古人所胃  
陽極發厥也治用白虎湯大承氣湯雙解散涼  
隔散以上四方詳証輕重四方選而用之

陰証

四肢冷身不熱惡心倦怠卧或引衣被自覆不渴  
或不利或大便如常脉沉微不數或雖沉實按之  
則遲弱此名冷厥治用通脉四逆湯或當歸湯  
或自通加猪膽汁湯

若病人寒熱而厥面色不澤胃脉兩手忽無脉  
或一手無脉此時將有好汗宜用麻廣附子草湯  
以助其汗汗出則愈不用藥助亦好汗必自出治用  
麻廣附子甘草湯

麻廣<sub>二兩</sub> 炙甘草<sub>二兩</sub> 附子<sub>一兩炮</sub> 石剉每伍錢水煎

多汗門

陽証

身熱表虛汗出不已或因醫者發汗又治表虛

脈不熱治用

玉海藏黃芪湯

人參 白茯苓 白朮 白芍 黃芪各兩 甘草七錢

陳皮五錢 右剉每服酌量多少水二鍾姜三片煎

陰証

身涼額上手背有冷汗治用四逆湯加入參

結胸門

邪氣承虛結於心中硬滿而痛手不可按其痛連

臍腫堅硬名結胸若按之心中痛此名小結胸

心腦高超大痛手不可按治用

公輕則枳實理中丸重則大陷胸丸治之

活人書枳實理中丸

人參

茯苓

各二兩

枳實

炒十六個

白朮

甘草

乾姜各兩右末之蜜丸每兩作四丸每壹丸熟湯化下

仲景大陷胸湯

大黃二兩

葶歷炒

杏仁

炒去皮尖

芒硝

各錢半

右前二味為末研杏仁芒硝如泥和藥丸如彈大

每丸別杵甘遂末壹錢白蜜一大是水二錢煎至

柴分頓服之壹宿乃下不下更服以下為度但其  
逐性猛宜詳虛實斟酌用之

### 小陷胸湯

按之心中痛脉浮滑者治之

黃連二錢半 半夏六錢 栝萎實大者一個月分之一

右水三觔先煎栝萎實至一觔去粗入煎藥二味  
煎至一觔分作二服利下黃涎沫即安

心下痞 邪氣乘虛滯於心下滿而不痛曰痞

心下滿而不痛者治用半夏瀉心湯或生薑瀉

心湯或枳實理中丸治

仲景半夏瀉心湯

半夏二兩半 黃芩二兩 人參四兩 甘草二兩 乾姜各二兩

黃連各兩 棗十二個

右剉用一斗煮取六升去粗再煎取三升溫服一升日三服

仲景生姜瀉心湯

生姜四兩 炙甘草二兩 人參四兩 黃芩各兩 乾姜二兩

黃連各兩 半夏半升 棗十二個

右八味以水一斗煮取六升去粗再煎取三升溫服一升日三服

枳實理中丸

心下痞滿心煩腹鳴不利治用生姜瀉心湯



嘔類

吐嘔有物有聲名曰嘔乾嘔則無物

陽証

嘔而發熱或寒熱或潮者治用小芫胡湯

陰証

嘔而身微熱或厥或煩小便利脉弱者治用四逆

湯出此事難知

吐類嘔吐有物無聲名曰吐

陽証

吐而身熱或不熱者治用小半夏加茯苓湯或

半夏加橘皮湯或乾姜黃芩黃連人參湯治之

活人書小半夏加茯苓湯

半夏五兩 生姜八兩 茯苓二兩 更加白朮 陳皮 甘草各兩

右剉水煎服

活人書小半夏加橘皮湯

半夏二兩 陳皮五錢 更加白朮 茯苓 甘草各錢

仲景乾姜黃芩黃連人參湯

右四味各參兩剉每伍錢水煎

陰証

吐而手足寒或煩燥治用四逆湯

下利或下膿血類

陽証

協熱下利 臍下熱 大便赤黃 或有腸加者 治用

仲景黃芩湯

黃芩<sub>三兩</sub> 芍藥<sub>二兩</sub> 甘草<sub>二兩</sub>

右剉每五錢水二觔棗三枚前如嘔加半夏生姜

仲景黃連河膠湯 治溫毒入胃下利膿血

黃連<sub>四兩</sub> 黃芩<sub>二兩</sub> 芍藥<sub>二兩</sub> 阿膠<sub>三兩</sub> 鷄子黃<sub>二個</sub>

水五升煮三物取二升去粗入膠化盡方入雞黃粗

得溫服七合日三服

一方無芍藥雞子黃有山梔伍錢

陰証

寒毒下利臍下寒腹脹滿大便或白或青黑或有青穀治用理中湯

仲景理中湯

人參 乾姜 炙甘草 白朮 各二二分

右剉每五錢水一觔半煎熟服

病重者加附子四逆湯白通湯

衄血應汗不汗內有瘀血故鼻衄治用

若人書犀角地黄湯

白芍藥三錢 生地黃五錢 牡丹皮二兩 犀角二兩無以升麻代之

右剉每五錢水煎有熟狂加黃芩二兩大黃

吐蛇

臟寒蛇上入膈吐蛇比胃寒乃胃虛寒非實寒也

治用仲景理中丸

人參三兩 乾姜三兩 白朮三兩 炙甘草二兩

右末之蜜丸每兩作九九以沸湯研一九濕服日三服夜

二服

仲景烏梅丸

烏梅

細辛

附子炮

官桂

人參

黃栢各兩 當歸

蜀椒各四兩

乾姜十兩

黃連一斤

以苦酒浸烏梅一宿去核蒸搗如泥餘藥為末勻  
入丸密杵二千下丸如梧桐子大米飲十九日三服漸

加至二十九

煩滿囊縮

此厥陰經証其筋脉循陰器終舌本厥陰經受  
病其筋勁急故舌捲囊縮者難治治用當歸四  
逆湯矣茱萸生薑湯治之

當歸四逆湯

方見前與吳茱萸生薑湯同與一方

吳茱萸生姜湯

可加當歸名當歸四逆湯加茱萸生姜湯

吳茱萸二兩 生姜半斤切 人參 右剉水煎不拘時服

代灸塗臍齊治元氣虛冷

附子一個炮 馬蘭子花二兩 蛇床子伍錢 木香五錢 肉桂五錢

吳茱萸五錢

右末之用麵一七藥一七各半七亦得生姜汁和搜

成膏推紙上圓三寸許貼臍下關元氣海自曉

至晚其火力可代灸百壯腰痛亦可貼之

頭大類此是邪熱客心肺上攻頭目為腫盛俗云大

頭之行病面頭腫成目不能開上喘咽喉不利舌  
乾口燥治用試効方普濟消毒飲

方見前雷頭風條下

瘥後勞便皆是病瘥已好或因飲食或因動作而  
再病者日勞復瘥後又頭重目弦治用小柴胡湯  
瘥後又身熱無汗心下大煩骨節疼痛目弦惡寒  
食則嘔治用

### 三因橘皮湯

橘皮兩半炙甘草伍錢

人參一錢半

竹茹五錢

右剉每伍錢姜三片棗二枚水煎食前服



癩後又身熱無汗神氣不清治用小茈胡湯  
索短三和湯

治瘥後面腫或腰下腫者

橘皮 厚朴 枳實 白朮各二兩 炙甘草 紫蘇各二兩

木通 海金沙各兩 右剉每伍錢姜三片水煎服

如鼻上有汗出必氣血和而自愈

大病瘥後虛煩不待眠此膽寒也治用三因溫膽湯湯危

加入參二兩 半夏 枳實 竹茹各二兩 橘皮三兩 甘草一兩

白茯苓一兩半

右剉每服酌量多少姜五片棗一枚水煎酸棗仁

竹葉湯

竹葉 麥門冬 人參 茯苓 小麥炒 半夏洗各兩

炙甘草 右剉每伍錢姜五片水煎加黃連

活人書梔子豆豉湯

治汗吐下後虛煩不得眠支復顛例心中懊懷以

此主之若少氣絕者梔子甘草豆豉湯主之

肥梔子四個 香豉伍錢 右剉水二鍾先煮梔子至一

鍾入鼓再煎七分溫服得快吐止後服

酸棗湯治傷寒吐下後心煩之氣晝夜不眠

酸棗四升 麥門冬一升 炙甘草二兩 知母二兩 茯苓

川芎 乾姜 各二兩 水煎

陰陽易傷寒新愈因行房得病男如此者陽易女  
如此者陰易如陰陽易病見舌吐出者死

男子陽易病頭重不欲舉眼中花眼腰踝內連  
臍腹痛身重少氣陰腫入裏腹內緩痛治用燒  
棍散通脉四逆湯當歸四逆湯

仲景燒棍散

取婦人棍當近陰處者燒灰末之服方寸七日三服小  
便即利陰頭微腫則愈如婦人病則燒男子棍當  
通脉四逆湯

炙甘草 三兩

乾姜 炮三兩

附子 壹個

炮切八片

右剉每服酌量多少水煎調燒裨散服之

### 當歸四逆湯

當歸

桂枝

芍藥

細辛 各三兩

炙甘草

木通

各二兩 莖二十五个

右剉每服酌量多少調燒裨散服之

婦人陰易病熱氣上衝胃手足拘急搐搦如重風壯治用

### 活人書青竹茹湯

瓜蒌根 二兩

青竹茹 半斤

右剉以水二升半煎至一升二分作三服

婦人陰易病小腹急痛腰膝四肢舉動不已身無熱用

活人書當歸白朮湯

白朮

當歸

桂枝

附子炮

炙甘草

白芍藥

黃芪

人參

各三錢半

生姜

五錢

右剉水三升煎一升分作二服通口食頃再服溫覆微汗

猥鼠糞湯

專治男子傷寒後病瘥與婦人交接病名易易

菘根

去青捏約干經

猥鼠糞

十四五粒如兩頭尖者是方用

右剉水煎頌服以汗出為効

內傷似外感証

始為熱中病似外感陽証

頭痛大作四肢痠悶氣高而喘身面煩鼻息不調四  
肢困倦不收無氣言或煩燥悶亂心煩不安或渴不  
止病久者邪氣在血脈中有濕故不渴如病渴是心  
大炎上尅肺金故渴或表虛不狂風寒目不欲開惡  
食口不知味右手氣口脈大於左手人迎三倍其  
氣口脈急大而數時一代而澁是脈之本脈代是  
無氣不相接乃脾胃不足之脈大是洪大之脈而數  
乃心脈刑肺急是弦急乃肝木挾心大尅肺金也  
其右關脾脈此五脈獨大而數箇中賴緩時一代此  
不勞役是飲食不節寒濕失所則無右關胃脈類

弱隱而不見惟內顯脈如此也治用

補中益氣湯

黃芪<sup>五錢</sup> 密汁<sup>一錢</sup> 人參 陳皮 當歸身 白朮<sup>一錢</sup>

炙草<sup>五錢</sup> 升麻 芫胡<sup>各一錢</sup>

都作一服水煎病輕重加減

未傳寒中病似外感陰証

腹腹胃脘當心痛四肢兩脇膈咽不通或涎唾或

清涕或多溺足下痛不能任身履地骨乏無力喜

兩目多冷陰戶作痛或妄見兇狀夢寐腰背腰

眼與脊背痛不渴不瀉脈盛大以墻名曰寒中

治用神聖復氣湯白朮附子湯草豆寇丸  
神聖復氣湯

柴胡一錢 藁本八分 防風五分 羌活壹錢 人參五分

乾姜炮分 甘草分 升麻七分 半夏洗七分 白葵花五葉去心細剪

當歸 郁李仁研如泥 黑附子炮分

右判用水五觔煎至二觔入

黃芪壹錢 橘皮伍錢 草豆寇煨壹錢 入在內再煎至

一觔再入別項藥

酒黃芩二錢 酒黃連二兩 枳壳三兩 生地黃酒燒二兩

已上四味預一日另用新水浸又以細辛二錢 川芎



細末參分薑荊子參分

頭日用新水浸半大觥分作貳處浸此三味并黃  
栢等正藥作一大觥不去粗入此浸者藥在上伏煎  
至一大觥去粗稍熱服空心又能治噉煩唇噉舌  
根強硬等証如神忌肉湯宜食肉以助經絡中大  
邪也大抵腎與膀胱經中有寒元氣不足者皆  
宜服之於月生月滿時隔三五日一服如病急不拘  
時分服之

白朮附子湯

白朮 附子 蒼朮 陳皮 厚朴 半夏

茯苓 澤瀉各壹兩 猪苓伍錢 肉桂四錢

草豆蔻丸治胃脘當心而痛

草豆蔻 煨大壹錢 半夏壹錢 大麥蘖壹錢 益和仁

陳皮 吳茱萸洗 僵蚕各八分 黃芪八錢

桃仁赤分 青皮 當歸各六分 麩末壹分

姜黃四分 人參分 炙甘草叁分 澤瀉壹分

柴胡分詳腹下痛多加之 生甘草

右除桃仁另研外余為細末湯浸蒸研為丸每  
十九執熱湯下劫兩多小服之

似外感陽明中熱証

有天氣大熱時勞役得病或路途勞役田野中勞  
或身体怯弱食勞役或長有久素胃氣久虛勞  
役其病脫體壯熱躁熱悶乱大惡熱渴飲水比與  
陽明傷寒熱白虎湯証相似鼻口中氣短促上喘  
此乃脾胃久虛元氣不足之証遍身亦痛至日西  
作譫語蒸湯不止脉洪大空虚或微弱白虎湯証  
其脉洪火有力與此內傷中熱不同治用

清暑益氣湯

人參

白朮

橘紅炒

神麴炒

澤瀉各伍分

黃芪

一錢羊無汗加羊夏

炙甘草

黃柏

葛根

青皮

當歸

麥門冬

各三分

蒼朮

升麻

五味子

秋分

右剉作一服水煎

似外感惡風寒

有因勞役坐卧陰涼處病後表虛不任風寒氣短  
促懶言語声困無力此因勞役辛苦腎中陰火沸  
騰後因脫衣或沐浴歇息於陰涼處其陰火不  
行還歸皮膚腠理極虛無陽被風與陰涼所遇  
以此表虛不任風寒與外感惡風相似不可同外

感治宜用

補中益氣湯

內傷似外感雜証

發黃

勞役形體飲食失節脾胃中州變寒走痛而發黃  
或理中湯或大建中湯選而用之

芍藥 六兩

桂枝

甘草 各兩

棗 七個

生姜 三兩

膠飴 一升

右對以水一升煎至參升去粗入飴更上微火消解

溫服一升日三服

長夏濕熱胃困

有長夏五六月濕熱之時人困倦四肢不收精神

短少膏滿氣短服節疼痛氣高而喘身熱而

煩或大便泄痢而黃或白泔色或渴或不食或不  
飲食或小便頻數而黃治用

清暑益氣湯五苓散縮脾飲

解伏熱陰煩渴消暑毒止吐利霍亂之後服熱藥  
大多致煩噪者並宜

縮砂仁 乾葛 烏梅肉 白匾豆各二兩

草菓 炙甘草各四兩

右對每伍錢水煎不以時任意代熱水飲之至妙

十味香薷飲

厚朴姜砂 白朮 香薷 木瓜

白扁豆 黃芪 陳皮 白茯苓 耳草各等錢

每伍錢水貳鍾姜叁片煎

六和湯大煩散益元散三方並見別集

活人書大陷胸湯

治傷寒表証未解而誤之下則熱畜于裏小便不利身體發黃為結胸之証脉沉而緊心下痛按之如石

大黃

芒硝一兩八錢半

耳遂一錢為末

右剉每五錢水煎去粗再下硝煎二版入耳遂末温服得利為効

活人書小陷膏湯

治傷寒結胸心下滿而痛按之如石脉浮滑者是本方

加枳實 黃芩一錢 桔梗六錢 生姜

大陷胃湯丸治結胸

巴豆十四粒 黃連七寸

右末之以津調填臍中用艾炷其上腹中有嘔其病

去不拘壯數病去為度纔灸之便以溫湯浸水怕減之恐瘡

桔梗枳亮湯治傷寒氣痞胸欬死

桔梗 枳壳 甘草各等分 右每五錢水煎

痰多加半夏生姜熱加黃芩

治傷寒發熱面熱譫語咬牙煩噪急氣



小柴胡湯

加姜炒黃連

姜炒山梔

麥門冬

五味子

枳殼

桔梗

竹茹

心下硬滿疼痛加瓜姜仁右剉水二鍾姜煎

小柴胡湯治傷寒發熱煩燥及傷寒後於熱不退

加姜炒黃連

姜炒山梔

麥門冬

竹葉

腦滿氣粗加桔梗痰加茯苓陳皮咳逆去竹葉

如竹茹柿蒂夏月頭痛加石膏

小柴胡湯治傷寒汗下後胃隔不寬名柴胡四青湯

加青皮

陳皮

枳壳

枳實

黃連

桔梗

右劉水姜煎

小柴胡湯治傷寒腦隔滿悶疼痛

加姜炒黃連

瓜蒌根

桔梗

枳殼

橘紅

茯苓

竹茹

右劉水姜煎有死血加桃仁紅花

治傷寒內傷并雜証六脉絕無腹下微疼

人參六錢

芍藥五錢

署錢

茯苓二錢

甘草二錢

右劉水姜煎

小柴胡湯治傷寒後餘熱不退膏滿有痰微喘

加枳實 白朮

陳皮

茯苓

瓜蒌

炒黃連

一方無瓜蒌有具母嗽加五味子麥門冬渴加

天花粉

柴胡飲子解利大人小兒傷寒餘熱不已

柴胡

黃芩

人參

甘草

升麻

地骨

青皮

赤芍藥

龍膽草各等分

右剉每五錢水二鍾入薄荷沙糖各少許同煎

小柴胡二陳湯治傷寒耳聾痰嗽

加瓜蒌

枳實

桑皮

杏仁

白朮

治傷寒後身無熱咳嗽吐臭痰脉息微細

人參

白朮

茯苓

甘草

陳皮

半夏

薏苡仁

茯苓

麥門冬

五味子

有熱加黃芩黃連嗽甚加百合

黃芩芍藥湯治傷寒熱極自利

柴苓湯加白芍藥治傷寒發熱自利泄瀉太甚如

瀉不止加神麴咳嗽加五味子

治傷寒後發熱面黃如疸水水泄少

小柴胡加天花粉 茵陳 木通 山梔子

黃連 滑石 龍膽 麥門冬

右劉水二鍾姜伍片煎脇疼加青皮炒

治傷寒後失音不語

蘿蔔自然汗入生姜汁和勻飲一觔如無蘿蔔以

羅蔔子水研汁代之

杏仁煎治傷寒声重暴嗽語音不出

桑皮 木通

貝母

各二兩參錢紫苑

五味子

各一錢

杏仁

三兩另研

右剉五味水參升燉火熬取一升用

生姜汁一兩半同杏仁密熬煎膏旋丸噲化

治内弱体劳若得傷寒寒汗下腹大虚脉細数熱

如火大氣短促

人參

黃芪

當歸

白朮

甘草

五味子

知母

竹葉

右剉水煎童子便一小盞服

人參 黃芪 當歸 白朮 甘草 五味子  
知母 黃芩 黃連 麥門冬 竹葉 水煎服  
如飲食少加本方

茯苓 半夏 橘紅 甘草 生姜

治因勞碌元氣虛脫身體拘倦兩手蹇拳不開兩  
足酸麻不起似傷寒相似

補中益氣湯加羌活白芍藥

治傷寒一月餘鼻中常出臭涕

防風 荆芥 薄荷 白芷 升麻  
黃芩酒 炙甘草 川芎 陳皮 細辛

炒黃連

治因氣傷膏滿頭枕骨痛

二陳湯加

羌活

柴胡

酒黃芩

白朮

白芷

天麻

香附子

砂仁

治傷風頭腦疼痛連手背滿身痛

升麻一錢

柴胡一錢

當歸五錢

羌活二錢 蒼朮一錢

防風八錢

甘草七錢

藁本八錢 陳皮伍錢

右剉水二鍾煎

治傷風傷寒二証之間難辨中和湯主之

羌活

防風

芍藥

細辛

白芷

茯苓 蒼朮 甘草 白朮 地黃

右剉水煎 傷寒只依本方傷寒欲汗加生姜葱白豆豉  
治虛人傷寒自利

四君子湯加 陳皮 半夏 阿膠 神麩

芍藥 訶子 右剉水二鍾煎

如嗽加貝母五味桑皮

治傷寒熱入血室婦經脈適來通斷得之謂經

血方來方住之時熱氣乘而入則腦滿發熱譫

語寒如瘧治不可汗以小柴胡湯主之并灸期門

治傷寒熱入血室小腹痛入刀刺乃熱極之証也



可用溫之劑世人見之腹痛便以乾姜良姜官桂  
附子之類此速死之犯慎也

小柴胡湯本方加桃仁牡丹皮炒黑青皮

治傷寒熱入血室熱甚而無方者

小柴胡湯加生地黃當歸川芎芍藥

治傷寒熱入血室謔言妄語發狂不証人罵四言不避親疎

牛黃<sub>二錢</sub>辰砂<sub>三錢</sub>水片<sub>二錢</sub>鬱金<sub>三錢</sub>甘草<sub>一錢</sub>牡丹皮

右末之密丸彈大新汲水化下一方無牛黃水片有

香附二錢滑石三錢

丹溪摘玄卷之九終

丹溪摘玄卷之十

痞門

丹溪云心不滿而不痛謂之痞乃食積兼濕痰也大陰者濕土也三焦塞乃土乘心下為痞滿傷寒下之太早亦成痞益傷寒則傷榮榮者血也心主血邪入於本故為心下痞仲景以瀉心湯主之用黃連瀉心湯下之本也効如桴鼓應響音酒積雜病下之太過亦作痞滿者蓋下多則亡陰亡陰者謂水穀之陰亡也故胸中氣因虛而下陷於心之分野故致心下痞且升胃氣以血藥助之若全用氣藥道平之則痞益甚甚而復下氣愈

下降必變中滿鼓脹皆非其治也然又有虛實之味焉實則大便秘厚朴枳實主之虛痞則大便利芍藥陳皮主之飲食倍傷而為痞者當用內消其胸中窒塞上逆凡凡欲吐者因而越之凡治痞者宜詳審之

治痞塊

雷九淨兩

錫灰

淨兩五錢

蕪荑仁

淨兩

木香

兩

大黃

煨四兩

枳榔末四兩

右各棟淨為末用葱白一斤煮湯露一宿和藥丸如

粟大米每服四錢白煎湯送下小兒服二錢量人虛實

磨積破痞紫金丹

治男子婦人面色痿黃胸膈痞滿由如覆盆傾磨

積推陳滯氣進飲食通賜胃宣通胸膈

木香 三稜 醋炒 枳實 香附 黑牽牛 炒各兩

蓮朮 四兩 麥蘖 半夏 蘿蔔子 各兩 黃連

神曲 人參 枳壳 炒 砂仁 白芷 冠

大黃 青皮 各兩 川芎 大戟 各兩 針沙 四兩 醋製

右各研碎細末用陳撞餅醋糊丸桐子大每服三

十九空心姜酒下

大消痞丸治一切心下痞悶久不愈者

黃連 黃芩 各錢 姜黃 白朮 各兩 人參

炙草 各二錢 砂仁 乾生姜 陳皮 炒麩 各兩

厚朴 二錢 枳實 蠶炒半 夏 巽炮 加澤瀉 二錢 猪苓 二錢 苓

右末之蒸餅丸每六七十丸白湯下

枳實消痞丸心下虛痞惡心懶倦開胃進食

枳實主 黃連 各五錢 乾生姜 壹錢 半夏 人參 各三錢

厚朴 四錢制 炙草 白朮 白茯苓 炙蘗 二錢

右末之蒸餅丸每三十九丸白湯下

黃連消痞丸心下痞滿壅滯不散煩熱喘促下

黃連 一兩炒 枳實 七錢炒 陳皮 五錢 乾生姜 黃芩 炒各錢

半夏 九錢 茯苓 炙甘草 各三錢 姜黃 澤瀉 各錢

猪苓 右末之蒸餅丸每五十九食遠白湯送下

黃連消痞丸心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不

黃連 一錢炒 枳實 七錢炒 陳皮 錢 乾生姜 黃芩 炒錢

半夏 九錢 茯苓 炙甘草 各錢 姜黃 澤瀉 各錢

猪苓 右末之蒸餅丸每五十九食遠白湯下

木香化氣湯憂思氣結中脘腹皮底微疼心下痞滿

不思飲食食之不散常常痞氣

柴胡 四錢 陳皮 生姜 木香 各錢 炙甘草

草豆蔻 各錢 半夏 個 紅花 錢 枳實 錢炒

右剉水煎服已心口

黃芩利膈丸除胞中熱利上膈痰

生黃芩 炒黃芩各兩 南星 枳殼 摘紅各三兩

半夏 黃連 澤瀉各錢 白木亦 白礬五分

右末之蒸餅丸每三五十九白湯下忌

通氣除風湯清利頭目寬快胸膈夫中不利者悉於初表

黃芪三兩 炙甘草一兩 人參五錢 葛根五兩 防風一錢

蔓荊子 右剉分作二服水煎卧溫服以覆面月勿

語須臾汁出為効此至服藥先一日少語如服藥

畢亦少語一日極効

積聚門

丹溪云積者生於五藏之陰也其發有根其痛有處  
脈必結伏聚者成於六府之陽也其發有根其痛無  
常處脈必浮結由陰陽不和臟府虛弱四氣七情常  
失所以為積聚也久則為癥瘕成塊不能移動者是癥  
或有或無或上或下或左或右者是瘕氣不能作塊或  
聚大塊乃有形之物痰與食積死血此理恍然在中為  
痰飲右為食積左為血積大法鹹以變之消以消之行  
氣開痰為要脈快而緊者積聚也浮而勞者積聚  
也脈洪者脇下有積聚也脈來小沉安者胃中有積  
聚也其脈勞強急者虛弱急者死又諸脈實強



者生成小者死可不察也夫諸塊虛中燒攻服無慮何者不可便攻醫與四君子加半夏陳皮若作大劑服之候元氣平後却用攻藥

大法

海石 醋煮  
乾用

三稜 醋煮

桃仁

紅花

蓮房

醋煮

五寸方脂

醋者

香附

石鹼

紺殼

醋煨

甚加鱉甲青皮

右末之醋煮神麴

丸每五十七丸白朮陳皮湯送下

一方加鱉甲青皮

丸龍子即紺殼大能消血塊次又消痰積

石鹼一物去痰積食積消血塊錢洗將賜胃垢膩  
又大消食積塊之痰直常食紫米沙乃鹹突  
食積癥瘕

蜀葵根 人參 白朮 陳皮 甘草梢 牛膝

成湯入研細桃仁玄明粉各少許熟飲之二服塊豆  
稍可病重者補接之後加減再行

一婦人患食積痰飲成塊在內助動則腹鳴嚼雜脘

運身熱時作時止

黃連 五錢用半棗更妙去棗更

益智炒去益智 山梔炒

台芎

蓬朮 醋煮

青皮

桃仁 去尖

神麩 各錢

香附

三兩童便津

蘿蔔子炒

白行子各二兩

龍子

兩醋燉

山茶

三稜各三兩

石木之醋煮麩糊丸

千金硝石大黃丸又名消塊丸

磨塊服之大效量虛實用之

硝石齋

人參

甘草齋

大黃

右末之用三年苦酒三斗置器內以行片作准每  
入一斗刻柱器中先納大黃不住手攪使微沸盡  
一刻廼下餘藥微大煮便可丸則取方如鷄子黃  
大每一丸米飲不怒不能大丸則作小丸如桐子大  
每服三十丸後下如鷄子肝或如米泔赤黑色等

効後忌風冷宜淡菜軟粥調理

### 三聖膏

未化石灰半斤米之尾器炒令淡紅色提出火外  
候熟減大黃米二兩就爐炒伺候熟又減入柱心末  
伍錢畧炒入醋熬或黑膏藥厚紙攤貼患處

又方貼積聚塊

大黃<sub>二兩</sub> 朴硝<sub>一兩</sub>

右末以大蒜搗和成膏

朴黃<sub>二兩</sub> 雄黃<sub>一兩</sub> 明礬<sub>六錢</sub> 飛麩<sub>一合</sub>

右末之醋調敷塊上不嘔吐下即瀉之

又方

猪胰子

朴硝

搗勻敷塊上以青布隔熨之用針灸斗

癰疾

黃丹

大黃各五錢

獨蒜二個

搗成膏子用胭脂盒兒男用蓋女用底裝漏在  
內放臍上以絹剗定須臾覺腹中微熱三時辰  
葳麻即下如魚腸真穢乃其效也

通仙散取積下敗血

菽音蕎

麥麩二錢

大黃二錢五分

右末之調酒臨卧服之

腹中積塊

木鱉子

五兩手去壳切薄片

黃連末

各五錢酒拌為末

右用積猪腰子二副去脂膜切薄入木鱉肉在內  
竹篦簽定數重濕紙裹煨香去紙焙乾末之  
二味和勻蒸餅丸梧子大每六十九食前白湯下  
服二服大効一方木鱉二十一箇

腹中氣塊

華撥

大黃等分

少許射香

右末之丸每三十九煎七氣湯下有血加血藥

消痞丸

白朮 四兩

枳實 三兩半炒

海石

三稜 煨各兩半

蓬朮 煨

黃連 二兩半各

石鹼 七錢

蒼朮 三錢

香附

唐朮肉 兩

鮫魚甲 三兩錯黃

右末之神麩糊入姜汁打糊丸每服二錢半飢半飽時以白湯下

痞塊

野茅草五握以烏盆一個將茅草一握擔於盆底

裝雞子十個在茅草上再以茅草一握蓋了以

米醋浸沒雞子經二宿其雞子殼皆軟於飢甌

上蒸熟將雞子一頓食之塊漸無經驗

夫痞塊在皮裏膜外者須用補氣香附開之蒸三

陳補氣藥須斷厚味

### 癖塊

在臍下裏滯左不動

鱉甲

六兩 醋炙

石礮

三兩

青皮

玉稜

煨各五兩

香附

四兩以上 四味 醋炙乾

海藻

二兩 水洗

當歸

五兩 水洗

紺殼

四兩 醋煨

冬加桂秋減春夏用山桅仁

五兩 炒

右末之醋煮麩糊丸每五十丸煎湯下



如小便數加益元散下一方無海藻有昆皮

在右加海石五兩唐棣三兩

在左加海石桃仁紅花各三兩五靈五兩

在中加海石三兩白芥子三兩

猜藥

海藻一錢醋青皮 桃仁 大黃 枳殼各五錢

桂枝二錢半三稜二錢醋

右末之神麴糊丸每四十九白湯下

治癥瘕

丁香 木香 甘草各錢牡礪二兩 白朮香二兩

朴硝<sup>五兩</sup> 滑石<sup>三兩</sup> 沉香<sup>三錢半</sup>

右末之每一錢酒調下甚者加三稜蓬朮麥芽

脇下有塊帶左

香附<sup>三兩半醋炙</sup> 柴胡 芍藥 礬石<sup>兩錢</sup> 紅花<sup>各三兩</sup>

陳皮 半夏<sup>各三兩</sup> 三稜<sup>兩錢</sup> 蓬朮 麥芽<sup>炒各三兩</sup>

青皮 桃仁 川芎 吳茱萸 黃連<sup>各兩</sup>

蚌殼<sup>二兩淬</sup> 麩糊<sup>二兩半炒</sup> 砂仁<sup>半兩半</sup>

右末煮神麩糊丸每七十九半飢時白湯下

腹中癖塊

史均子<sup>三兩</sup> 烏梅肉 木香 梅柳<sup>各兩</sup> 黑亭牛<sup>二兩</sup>

右末之酒糊丸每五十九糖水下

氣腹成塊

大山羊角一隻用好醋塗殺大炙令黃色刮下黃屑  
再塗再炙再刮至盡爲末入

蓬朮

官桂各兩

三稜

三兩

阿魏

五錢

草薺寇

二兩五錢

右末之和勻醋煮麵糊丸每六十九

治痞塊

俗為脾膀又治男子又治婦人久近氣痛

土威靈仙

五兩

生韭根

一兩五分

烏藥

些少

右剉作一服好酒一盞雞子壹個入藥內煎以糖同

煨護一宿早五更視雞子殼軟為度瀝出相溫  
服以乾物壓之側睡向塊邊相再如法煎覺塊  
如物刺痛是應驗也

又方

姜蚕為末白馬尿調服再以姜蚕末以白馬尿  
調塗塊上心疼服之尤妙

又方

以青錠搗汁服之

血分肝經塊痛子宮藥

當歸

玄糊索

赤芍藥

沒藥

乾漆

烟妙及五錢

紅花二錢 桃仁三個制或丸或末服之大便燥加熟大黃  
婦人脇有塊大如拳脉澁時有熱此虛中有氣積先  
補虛後積藥

陳皮 白朮各五錢 當歸頭 芍藥各錢 青皮

川芎 朮通 甘草各錢 右剉水煎

婦腹中有積塊

柴胡五錢 厚朴 澤瀉 當歸 枳實各錢

黃連分 青皮二錢半 紅花七分 右剉姜五片煎

治應丸

人參 白朮 橘紅 半夏各錢 香附

柴胡 芍藥各錢 砂仁各兩 木香三分 甘草五分

右剉之麵糊丸桐子大每服五十九丸如煎服亦效

### 阿魏丸

傷食肉致胸膈胞滿噎塞不快有防飲食或聚成塊

阿魏 蘿蔔子 黃連姜炒 連翹各五錢 蓬朮一兩半

麥蘖 砂仁 黑枳實 山查各二兩

右末之醋煮神麩糊丸每六七十丸淡鹽湯下

右塊加沉香石鹼各伍錢氣盛加木香伍錢換柳

壹錢 左邊塊加蚌殼一兩右邊塊加石鹼一兩

### 癖塊

三稜

明砂

蜀椒 各兩

硃砂

右末之作七八次用鴿子一隻時前藥擦勻香油燻熱服之至七八隻其塊消盡

愛吃茶

白朮

軟石膏

酒黃苓

白芍藥

薄荷

膽浸南星 右末之砂糖調作膏食津唾化之

茶痺

軟石膏

黃苓

升麻 各二錢

右末之砂糖調服

茶積用麻積丸

茶積飲食減少面黃腹痛

陳倉米半升 豈豆粒同炒去頭 青皮炒 陳皮各三兩

黃連二兩 土炒 右末之醋糊丸每三十丸食後姜湯下

### 小阿魏丸

查山三兩 石齡三錢 半夏一兩 皂角末津 阿魏伍錢 醋化如糊

右末之以阿魏醋煮如糊丸菜豆大

### 阿魏丸治肉積

阿魏三兩 醋煮黃連六錢 山茶肉一兩半

一方加半夏二兩 皂角煮透晒乾石齡三錢

右三味醋煮神麵糊丸每五十丸白朮叁錢

陳皮茯苓各壹錢作一服煎湯下



脾胃虛者須補脾胃藥作湯使切不可單服  
追風阿魏丸

脾胃怯弱食肉食麵二生冷菓物停滯中焦不  
能尅化致脹滿腹疼嘔惡不食或利或稔

阿魏水浸化官桂 蓬朮 麥蘖炒 神麵炒

青皮 蘿蔔子蒸白朮各錢百草霜三錢 姜三錢炒

加山查五錢 巴豆霜三個

右末之糊丸菜豈大每二十九姜湯下麵傷麵湯下

菓傷鬱薑湯下

阿魏丸

阿魏醋浸研如泥 山查肉 百連蕎 五錢 黃連 六錢半

右末之人小米粥丸

起租三稜丸

大治積傷脾胃虛肉食停傷不散作腹滿脹彭痛

瀉方見諸氣下

血積低當湯

瘀血凝滯腹內刺痛或膀胱痛身面黃

水蛭判碎 蛭三五個去翅足炒 桃仁三十七箇制 大黃三錢三字蒸

右判每四錢水煎

血未利再服

氣積木香流氣飲熱者分心氣飲

水積重十棗湯泛飲之漿多感冷濕胸脹滿瘕洛  
有聲喘急氣促面色痿黃

芫花熬即乾炒也并遂等分 大戟

芫氏加黑牽片炒

右末之每半錢壯實人一錢以水一大盞棗十枚去核  
切開煮取汁半瓊調服三因以上三味末之以棗子

煮熟去皮核將肉搗爛如糊丸每四十九侵晨熱  
湯送以利去黃水為度否則以早再服名十棗丸

水積軟痰木香丸

膀胱疝氣腫痛胸膈噎塞滯不行腸中水聲嘔穢

痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛

頭末炒

補骨脂炒

葶澄茄

青木香兩

扶榔

醋粟米飯裹以溫紙包大中煨紙焦去飯

右末之入牛末和勻水丸每五十九熟水下

延積用炒粉丸

積聚延塊結於心腹致令心腹刺痛日久不愈乾嘔減食

蚌粉一兩 巴豎肉七位

三味同炒令赤色去巴豎不用只以醋丸其梧桐子  
大丈夫臍腹痛炒茴香酒二十丸婦人血氣下敗血

衝心童便和當歸酒下常服姜酒雄黃膩粉治涎積

控涎丸

風濕常攻或中脘停留水飯喘急四肢浮腫脚氣  
人腹平常腹中痰熱諸氣結聚服之得利則効  
及至痰積臂疼

大戟

荒花

甘遂

蚶葶蘆

各兩

白芥子百炒

黑牽牛頭末元炒

巴豆去皮末五錢

右末之糊丸粟大每三七粒茶清下濕水亦得不可服

甘草藥及熱湯水

魚蟹積用香蘇散多加生姜陳皮煎

菓萸積用平胃散加丁香麝香為末熱鹽湯調服或用起祖阿魏丸

傷生冷菓物理中湯主之

傷西瓜冷水五苓散主之

酒積冷者

平胃散加丁香砂仁神麴麥芽尖

或加入香蘇亦可並以姜棗鹽煎空心服

醉鄉寶屑

丁香 砂仁 香附 甘草 白茯苓

法制青皮陳皮等分 加白豆蔻

右剉乾嚼之

酒積熱者麵蘖丸

神麵炒

麥蘖各兩炒

黃連

半兩巴豆錢同去豈不用

右末之湯搜丸食後姜湯下

傷淡酒宜四苓散主之

傷釀酒宜二陳湯加

枳實

研仁 乾芎

黃連

雞距子

麝香

大能敗酒

芎粉片搗粉積紫蘇煎濃汁入杏仁佐服之即散

麵積

起祖阿魏丸以濃羅蔔子湯下

糍糕傷損脾胃噫酸不食心疼痛

青木香丸三百粒加白木香十粒小酒麵二錢同  
末之入巴豎三粒研另勻蒸餅丸棗豎大每二三十  
丸生姜橘皮湯下宿滯既消其痰自安只用小酒  
麵木香二件末之鹽湯服口內清香自然効

傷糍糕米食以白酒藥末之神麵糊丸砂糖湯  
下或二陳湯加 枳實 白朮 麵蘖 黃連

一小兒吃粽子及糯米食或腹痛以白藥丸末之入  
黃連末砂糖湯調服或丸亦可大丰則爛或漿



枳實丸

白朮四兩 枳實炒 唐棣肉各三兩 麥蘖炒 橘紅各兩

右末之神麵糊丸每五十九熱湯下加半夏麵或木香

阿魏勝紅丸降氣化食治塊

青木香 陳皮各炒 蜀椒各炒 京墨 蓬木各醋炒 枳殼炒

良姜炒 乾姜炒 各三錢 半夏燒 羅卜子蒸 各兩 阿魏二錢醋炒

山查炒 香附炒 各錢 石齡一錢醋化

右末之醋煮麵糊丸一百丸白湯下

宿食門

丹溪云難經曰脾氣通於口口和則知穀味心氣通於

舌舌和則知五味是知穀味五味莫不經由口舌而入胃也夫人之身籍五穀以生故胃以容納脾以尅化脾胃喜曉不宜生冷傷之体虛者不善調養飢飽失時或過飡飯食及生冷硬物脾胃怯弱不能尅化停畜胃脘遂成宿滯輕則吞酸嘔惡脹滿噎噫或泄或痢其臭如抱壞雞子或未穀不化甚則積聚結爲癥瘕面黃羸瘦此皆宿滯不消而生病焉大害總竟停滯須究其原量人虛實連宜尅化不尔則養或沉疴大底淺則消之尅之甚則推之利之而後調補脾胃亦有寒暑之氣而滯者當以脉証治之

又云惡食者胸中有物宜導痰補之脾也

傷食惡寒傷食明矣

二陳湯加 白朮 山查 蒼朮 川芎

姜煎服不可服導氣藥宜用保和丸

因傷魚肉者調胃承氣湯下之

枳實 厚朴各錢 大黃五錢 甘草一錢 水煎服

傷油膩等物於膈上煎糖密物

二陳湯加 黃連 枳實

大便秘加綿大黃疏行之

麩粗阿魏丸方見積聚門

効感應丸方見諸氣門

丁香爛飯丸方見脾胃門

虛人沉積

蘆氏感應丸

虛弱人久積不可宜取宜此藥多用蠟匱庶使久

留腸胃又不傷氣能消磨至盡又有脾虛偏傷

飲食遲化宜助脾養胃不須尅藥自然平復

又治宿食不能尅化有傷脾胃或瀉臭如抱壤雞

子或下利膿血

黃蠟

十兩

巴豆霜

百粒

杏仁泥

七十粒

丁香

乾姜

炮

木香 肉豆蔻 檳榔 萹澄茄 甘草霜

青皮

片子黃連

各兩

乳香 三錢

有芭豆霜百草霜杏仁乳香外余末之却同煎四味  
拌勻先將黃蠟十兩於銀器內溶化作汁重綿濾  
過去渣以魚灰酒一升再於銀石器內煮蠟鎔滾  
取起候老候冷其蠟自浮於酒上去酒不用春夏  
脩合用青油一兩秋冬用一兩半大銀器內熬令香  
熟次下酒煮糊同蠟作化汁乘熱拌和煎藥末  
十分均勻了候稍凝分作劑子用確盛之半月  
後方可丸服如服旋丸如蘿蔔子大任意服之

二三十丸至五十九丸無凝此藥以蟠多雖難丸子愈  
細其功愈博卧常常服之若飲治病不拘時候

木香枳實丸破滯氣消飲食開胃進飲食

木香 枳實炒各兩 白木二兩

右米之荷葉燒飯丸五十九丸熟水下

三稜消積丸傷生冷硬物不能消化心腹滿悶不快

王稜炮 蓬木炮各七錢半 青皮 陳皮 茴香各五錢

丁皮 益知仁各三錢 炒麴七錢已豆為皮末炒黑色去未叁錢

右末之醋糊凡每十五丸至二十九丸姜湯下

木香換榔丸消食碗滯氣

木香 檳榔 各三錢 青皮肉汁煮 陳皮 白朮

厚朴 各五錢 麥蘩子 枳實 各七錢

右末之蒸餅丸每五十九濕水下

勝紅丸 錢氏沉香化氣丸 木香 檳榔丸 治諸氣食

傷方並見諸氣門內

傷食痞滿胸膈不寬微疼宜黃枳丸內傷內食

神麴辛辣味厚之物填塞滿悶不快

黃芩 黃連 大黃 溫紙煨 神麴 炒 白朮

陳皮 各一兩 枳實 五錢 炒

右末之蒸餅丸菜豈大每五十九白湯下

量所傷服之 加羅蔔子五錢炒麥蘩炒山查各五錢  
傷食發熱

小柴胡湯加 陳皮 茯苓 白朮 山查 神麵

麥蘩 右水姜煎胸膈不寬加香附砂仁

### 自汗門

丹溪云心之所藏在內者爲血發於外者爲汗難經曰  
蓋汗乃心之液凡自汗者未有不由心腎俱虛而得之  
故陰虛陽必凌故發熱自汗陽虛陰必承故發厥自  
汗此陰陽偏勝所至又有傷風中濕中暑驚悸房事  
勞極歷節脹癢痰飲產蓐亦令人自汗如睡中不



覺汗者名盜汗心不知所弱汗其脉多微而澁濡而  
虛治宜欽心氣益腎水陰陽使調和水火升降其汗自  
止  
痰証亦有汗

大法參芪爲主佐以桂枝

陽虛者用附子自汗者陽虛証也黃芪建中湯  
補氣盜汗者陰虛証也當歸六黃養血

撲法牡礪粉

麩皮 麻黃根 藁本 大米 防風 白芷

右末之於周身撲之

又有火氣上蒸胃中之濕亦能作汗

涼膈散主之

黃芪建中湯治氣虛自汗

黃芪 桂枝 炙甘草 白芍 六錢

氣虛甚加黃芪熟者用防風不熟者用桂枝虛

甚加附子熟用

右剉每六錢姜三片棗一枚浮麥煎飭糖少許服

黃芪湯

喜怒驚恐房勞陰陽偏虛發瘕自汗及盜汗不止

黃芪 一兩半炙 白茯苓 熟地 酒蒸 天冬 菖根

龍骨 各兩 小麥 炒 防風 當歸 炙甘草 各五錢

肉桂 五味子 各五錢 右剉姜五片水煎

發厥自汗加熟附發熱自汗加石斛

調胃湯

陽明病濕勝自汗補氣虛弱表不狂外寒者

黃芪 二錢 葛根 一錢 甘草 伍分 猪苓 二分 羌活 七分

麥冬 三分 歸消 生黃苓 半夏 各五錢 生地 三分

五味 蘇木 紅花 各錢半

右剉一服水煎

中風証必汗汗多不得重發故禁麻黃用根也

桂枝湯治傷寒脈浮自汗惡風

發汗汗不止謂之漏風加熱附

大承氣湯

胃實兩足兩腋多汗大便澁結

大柴胡湯

痰實膈滯寒熱自汗能食而大便澁結脈實

補中益氣湯

每血寒熱自汗倦怠勞乏少食脈弱

補中益氣湯

勞後大虛脈沉細汗大出舌上潤不煩躁俱驚動亦  
汗自傷寒虛脫者本方內去柴胡升麻加五味葛

根

盜汗

丹溪云盜汗有血虛小兒不須治夫盜汗者陰虛也  
睡則汗自出覺則無汗矣非若自汗之時自出也

大法

用血藥以當歸黃芪為主少助黃連白朮盜汗堅藥也

黃芪 倍加

黃連

黃柏

黃芩

熟地黃

生地黃

當歸

右剉每壹兩水煎小兒減半

又方本方內加

知母

人參

白朮

甘草

地骨

浮麥

桑皮

汗不止加葛根牡蠣問以硃砂安仁丸

### 白朮散

白朮

四兩分作四處

一分黃芪同炒 一分石斛同炒 一分牡蠣同炒

一分麩皮同炒 又各炒微黃色去餘藥不用只以

白朮爲末每叁錢糯米百粒白朮二錢煎湯

調下盡四兩即効

### 又方

經霜黃桑葉炒末之每一匙空心米飲下

黃芪散治汗出如浴

黃芪生 白朮炒各一兩 浮麥四兩炒 葛根三錢

牡礪粉六分 甘草二錢炙

右作三服水煎加黃柏壹兩知母六錢

又方 麻黃根 黃芪 白朮 茅蟹兒槿樹子也

牡礪 防風 右剉右約一錢水煎

盜汗

何首烏末之津填臍中

又方治盜汗以天仙子五倍子末之喬麥麵作餅煨

令熟臨卧令患人喫茶湯少飲只用此藥餅

乾喫三個汗止

又方以五倍子末之入麝香少許津調內臍中紙花

貼之男用女唾女用男唾

補陰丸與前劑同煎方見諸虛門

一人憂鬱出盜汗胞膈不寬

當歸六黃湯加防風青皮枳殼

香附砂仁

### 治盜汗

人參 白朮 川芎各錢半 黃芪 當歸酒浸各錢

黃芩 熟地黃 防風各錢 香附 黃連八分

甘草五分炒 右剉姜三片水煎



又方用六黃湯加

綿黃芪

人參

白朮

虛煩門

丹溪云虛煩者心虛煩問也且人之血氣分爲榮衛  
別乎陰陽榮衛通適然後陰平湯和精精神乃治  
或因體虛攝養葦方榮衛不調使陰陽二氣有偏勝之  
素問云陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛  
則內寒此不易之論今虛煩之病多是陰虛生內熱  
所致也如虛勞之人腎有所虧心大內蒸亦致煩躁傷  
寒大病之後亦有虛煩霍亂吐瀉之後津液枯竭煩

而躁渴婦人產去血過多虛煩發熱此疾非止一端當  
數求之失煩屬肺躁屬腎大率血少不能潤澤理當  
養陰爲最

治煩不能眠六一散加牛黃服之

內傷病似真傷寒至五七日汗後發熱日夜煩躁吃  
水者補中益氣湯加附子

內傷病以傷寒三戰後勞乏躁昏倦

四君子湯加 當歸 黃芪 知母 麥門冬 五味

如虛煩甚者脉細數無序三更吃水直至天明此  
元氣虛以大躋加竹葉煎服

內傷似傷寒煩躁不絕聲汗後復熱脈細數五七日  
不睡補中益氣湯加人參一兩用竹葉煎甚者加  
麥門冬五味子知母煎

小草湯治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草 黃芪 當歸 酒浸 石斛 麥門冬

酸棗仁 各兩炒 人參 炙甘草 各五錢

右剉每一兩姜五片水煎

辰砂炒香散治心氣不足精神恍惚虛煩少睡方見心恙下

竹葉湯

傷寒大病後及霍亂吐瀉後心虛內悶內熱不解

產後心虛煩悶欲絕

竹葉 麥門冬 人參 茯苓 小麥炒

半夏 各兩洗 甘草 五錢炙

右剉每一兩姜五片煎危氏不用竹葉用淡竹茹

人參竹葉湯治汗後後裏虛不可攻者

竹葉 二把 人參 炙甘草 各兩半 石膏 二兩半

麥門冬 各五錢 右剉每一兩姜五片糯米一撮水煎

竹葉石膏湯

大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁及諸虛煩熱

與傷寒相似但不惡寒身無疼痛不可汗者此

溫膽湯

大病後虛煩不得卧及心膽虛怯觸事易驚悸之  
或復自汗

橘皮湯

氣動在下不可發汗之及無汗心中大煩躁悶首  
節疼痛自眩惡寒食及嘔逆穀不得入

橘皮二兩半

炙甘草五錢

人參一分

竹茹五錢

右剉姜三片棗一枚水煎

人參竹茹湯治胃口有熱吐咳逆虛煩不安

人參五錢

半夏

橘紅各兩

竹茹

右劉姜七片竹茹一團水煎

煩躁發熱而渴

山梔

黃芩

甘草 各一錢

柴胡 二錢

淡豆豉

平粒

烏梅 三個

竹葉 十四片

右作一服姜三片水煎

虛損人虛煩

補中益氣湯加

黃柏

知母

黃連

胸滿加枳殼煩極甚加山梔豆豉

虛損人煩兼瀉

補中益氣湯加

炒連

炒芩

神麩

白芍

交門冬

竹葉

十四片

煩甚去麩加山揸豆豉

五點天賦無點

補脚脚吹好效好甚以山封且知

蘇勤益在云云故發廣遊及幾掛心貴更要保固首

重難入室數自林居寒食及唯逆殺不待入

請再請許美善善哉一服委二氣竹葉

山到去貴全東社華飲烈染附

既殺發善為而醫口有熱吐痰逆虛煩不安

丹溪摘玄卷之十

設一圖本寫

竹起