


會通



漢書門			
一	九	九	〇
二	〇	七	一
冊	架	函	號類

內閣文庫			
一	九	九	〇
二	〇	七	一
冊	架	函	號類

內閣文庫			
番號	漢	11990	
冊數	20 (14)		
函號	301	19	



類經三十一卷



張介賓類



會通類

疾病

上十二

會通十二類。惟疾病一類。浩繁難悉。今所採者。或摘其要。或總其題。觀者仍當於各類細求之。

陰陽病

類經三十一卷

會通類 陰陽病

○陽者天氣也。主外。陰者地氣也。主內。故陽道實。陰道虛。故犯賊風虛邪者。陽受之。飲食不節。起居不時者。陰受之。陽受之則入六府。陰受之則入五藏。○陽受風氣。陰受濕氣。○陽病者上行極而下。陰病者下行極而上。見疾病類

三十

○天不足西北。故西北方陰也。而人右耳目不如左明也。地不滿東南。故東南方陽也。而人

左手足不如右強也。○故俱感於邪。其在上則右甚。在下則左甚。此天地陰陽所不能全也。故邪居之。陰陽

○帝曰。法陰陽奈何。岐伯曰。陽勝則身熱。腠理閉。喘。麤。為之俛仰。汗不出而熱。齒乾。以煩冤。腹滿死。能冬不能夏。陰勝則身寒。汗出身常清。數慄而寒。寒則厥。厥則腹滿死。能夏不能冬。此陰陽更勝之變。病之形能也。○帝曰。調

此二者奈何。岐伯曰：能知七損八益，則二者可調。不知用此，則蚤衰之節也。年四十而陰氣自半也。起居衰矣。五十體重，耳目不聰明矣。年六十，陰痿氣大衰，九竅不利，下虛上實，涕泣俱出矣。陰陽

○病在陽者，命曰風。病在陰者，命曰痺。陰陽俱病，命曰風痺。病有形而不痛者，陽之類也。無形而痛者，陰之類也。無形而痛者，其陽完而

陰傷之也。急治其陰，無攻其陽。有形而不痛者，其陰完而陽傷之也。急治其陽，無攻其陰。陰陽俱動，乍有形，乍無形，加以煩心，命曰陰勝其陽。此為不表不裏，其形不久。鍼刺三十一

○陰病發於骨，陽病發於血。陰病發於肉，陽病發於冬。陰病發於夏，是謂五發。○邪入於陽，則狂。邪入於陰，則痺。搏陽則為巔疾，搏陰則為瘖。陽人之陰，則靜。陰出之陽，則怒。是謂五

亂疾病二
十五

○陽虛則外寒。陰虛則內熱。陽盛則外熱。陰盛

則內寒。疾病二十

○陽并於陰則陰實而陽虛。○陽盛則外熱。陰

虛則內熱。疾病四十八

○清陽出上竅。濁陰出下竅。清陽發腠理。濁陰

走五藏。清陽實四肢。濁陰歸六府。陰陽一

○邪之生於陽者得之風雨寒暑。生於陰者得

之飲食居處。陰陽喜怒。疾病十九

○陽氣者煩勞則張。○陽氣者精則養神。柔則

養筋。開闔不得寒氣從之。乃生大僂。疾病五

○陰氣者靜則神藏。躁則消亡。飲食自倍。腸胃

乃傷。疾病六十七

○陰勝則陽病。陽勝則陰病。陽勝則熱。陰勝則

寒。陰陽一

○重陰必陽。重陽必陰。陰陽一〇脉色三十三

○別於陽者。知病從來。別於陰者。知死生之期。

藏象二十四○
脉色二十六

○陰氣太盛。則陽氣不能榮也。故曰關。陽氣太

盛。則陰氣弗能榮也。故曰格。陰陽俱盛。不得

相榮。故曰關格。經絡二
十二

○陰陽不相應。病名曰關格。脉色二
十二

○龐大者。陰不足。陽有餘。為熱中也。○諸浮不
燥者。皆在陽。則為熱。其有躁者。在手。諸細而

沉者。皆在陰。則為骨痛。其有靜者。在足。○陽

氣有餘。為身熱無汗。陰氣有餘。為多汗身寒。

陰陽有餘。則無汗而寒。脉色二
十一

○陰氣少。而陽氣勝。故熱而煩滿也。○陽氣少

陰氣多。故身寒如從水中出。○四支者。陽也。

○兩陽相得。而陰氣虛少。少水不能滅盛火。而

陽獨治。獨治者。不能生長也。疾病四
十五

○陰陽如一者。病難治。鍼刺二
十三

○陰氣在下。陽氣在上。諸陽氣浮。無所依從。故

嘔欬上氣喘也。疾病十一

○陰虛者。陽必奏之。故少氣時熱而汗出也。疾病

三十

○陰陽虛。腸辟死。陽加於陰。謂之汗。陰虛陽搏

謂之崩。脉色二十九

○陽急則反折。陰急則俛不伸。疾病六十九

○病痛者陰也。痛而以手按之不得者陰也。深

刺之。病在上者陽也。病在下者陰也。癢者陽

也。淺刺之。鍼刺五十三

○剛與剛。陽氣破散。陰氣乃消亡。○死陰之屬

不過三日而死。生陽之屬。不過四日而已。○

結陽者。腫四支。結陰者。便血一升。疾病六

○陰虛則無氣。無氣則死矣。藏象九

○陽重脫者。易狂。陰陽皆脫者。暴死不知人也。

藏象

三十

○陽氣有餘陰氣不足則熱中善饑陽氣不足

陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛

鍼刺二十五

經絡藏府病 二二

○天之邪氣感則害人五藏水穀之寒熱感則

害人六府地之濕氣感則害人皮肉筋脉

見論

治類八

○百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理

開開則入客於絡脉留而不去傳入於經留

而不去傳入於府廩於腸胃邪之始入於皮

也泝然起毫毛開腠理其入於絡也則絡脉

盛色變其入客於經也。則感虛乃陷下。其留於筋骨之間。寒多則筋攣骨痛。熱多則筋弛骨消。肉爍。腠破。毛直而敗。○邪客於皮則腠理開。開則邪入客於絡脉。絡脉滿則注於經脉。經脉滿則入舍於府藏也。經絡三十一

○邪之客於形也。必先舍於皮毛。留而不去。入舍於孫脉。留而不去。入舍於絡脉。留而不去。入舍於經脉。內連五藏。散於腸胃。陰陽俱感。

五藏乃傷。此邪之從皮毛而入。極於五藏之

次也。鍼刺三十

○風雨之傷人也。先客於皮膚。傳入於孫脉。孫脉滿則傳入於絡脉。絡脉滿則輸於大經脉。

○寒濕之中人也。皮膚不收。肌肉堅緊。疾病十九

○天地溫和則經水安靜。天寒地凍則經水凝泣。天暑地熱則經水沸溢。卒風暴起則經水波涌而隴起。夫邪之入於脉也。寒則血凝泣。

暑則氣淖澤。虛邪因而入客。亦如經水之得

風也。經之動脈。其至也。亦時隴起。

鍼刺十四

○邪客於足少陰之絡。令人卒心痛。暴脹胃脇

支滿。○邪客於手少陽之絡。令人喉痺舌卷

口乾心煩。臂外廉手痛不及頭。○邪客於足

厥陰之絡。令人卒疝暴痛。○邪客於足太陽

之絡。令人頭項肩痛。○邪客於手陽明之絡

令人氣滿胃中。喘息而支脘胃中熱。○邪客

於掌臂之間。不可得屈。○邪客於足陽蹻之

脈。令人目痛從內眥始。○邪客於手陽明之

絡。令人耳聾。時不聞音。○邪客於足陽明之

絡。令人顛倒。上齒寒。○邪客於足少陽之絡

令人脇痛不得息。欬而汗出。○邪客於足少

陰之絡。令人嗑痛不可內食。無故善怒。氣上

走贛上。○邪客於足太陰之絡。令人腰痛引

少腹。控眇不可以仰息。○邪客於足太陽之

絡令人拘攣背急引脇而痛。○邪客於足少陽之絡令人留於樞中痛髀不可舉。○邪客於五藏之間其病也脉引而痛時來時止。○邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脉皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥。鍼刺三十


○邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背。○邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內

行善掣節時脚腫。○邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有寒有熱。○邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩。○邪在心則病心痛善悲時眩仆。鍼刺二十五

○六府之病面熱者足陽明病魚絡血者手陽

明病。兩跗之上脉。堅陷者。足陽明病。此胃脉也。○大腸病者。腸中切痛。而鳴濯濯。冬月重感於寒。卽泄。當臍而痛。不能久立。與胃同候。○胃病者。腹臘脹。胃脘當心而痛。上支兩脇。膈咽不通。食飲不下。○小腸病者。小腹痛。腰脊控掣而痛。時窘之後。當耳前熱。若寒甚。若獨肩上熱甚。及手小指次指之間熱。○三焦病者。腹氣滿。小腹尤堅。不得小便。窘急。溢則

水留卽爲脹。○膀胱病者。小便偏腫而痛。以手按之。卽欲小便而不得。肩上熱。若脉陷及足小指外廉及脛踝後皆熱。○膽病者。善太息。口苦。嘔宿汁。心下澹澹。恐人將捕之。噎中。哕。哕然數唾。鍼刺二
十四
○喜樂不節則傷藏。藏傷則病起於陰也。清濕襲虛則病起於下。風雨襲虛則病起於上。○憂思傷心。重寒傷肺。忿怒傷肝。醉以入房。汗



出當風傷脾。用力過度。若入房汗出。浴則傷

腎。二 疾病

○五藏受氣於其所生。傳之於其所勝。氣舍於其所生。死於其所不勝。○五藏有病。則各傳其所勝。不治。法三月。若六月。若三日。若六日。傳五藏而當死。是順傳所勝之次。故曰別於陽者。知病從來。別於陰者。知死生之期。藏象 廿四

○風寒傷形。憂恐忿怒傷氣。氣傷藏。乃病藏。寒

傷形。乃應形。風傷筋脉。筋脉乃應。

鍼刺三十一

○風傷肝。燥勝風。○熱傷氣。寒勝熱。○濕傷肉。

風勝濕。○熱傷皮毛。寒勝熱。○寒傷血。燥勝

寒。藏象 六

○心為噫。肺為欬。肝為語。脾為吞。腎為欠。為噦。

胃為氣逆。為噦。為恐。大腸小腸為泄。下焦溢

為水。膀胱不利為癃。不約為遺溺。膽為怒。疾病

二十 五

○憂愁思慮即傷心。○飲食勞倦即傷脾。○又遇飲食飽甚。汗出於胃。醉飽行房。汗出於脾。

○久坐濕地。強力入水。即傷腎。○恚怒氣逆。上而不下。即傷肝。○又遇疾走。恐懼。汗出於

肝。運氣四十四。○又疾病三略同。

○情傷五藏者。病死有時。○五藏主藏精者也。不可傷。傷則失守。而陰虛。陰虛則無氣。無氣

則死矣。藏象九

○五藏六府之津液。盡上滲於目。心悲氣并。則

心系急。心系急。則肺舉。肺舉。則液上溢。故欬

而泣出矣。疾病五十八

○肺病者。喘息鼻張。肝病者。皆青。脾病者。唇黃。

心病者。舌卷短。顙赤。腎病者。顙與顏黑。脉色類三

十一

○腹中常鳴。氣上衝胃。喘不能久立。邪在大腸

也。○小腹控掣。引腰脊。上衝心。邪在小腸者。

連臑系。屬於脊。貫肝肺。絡心系。氣盛則厥逆。上衝腸胃。燻肝散於育。結於臍。○善嘔。嘔有苦。長太息。心中憺憺。恐人將捕之。邪在膽。逆在胃。○飲食不下。膈塞不通。邪在胃脘。○小腹痛腫。不得小便。邪在三焦。約。鍼刺四十七

○色起兩眉。薄澤者。病在皮。唇色青黃赤白黑者。病在肌肉。營氣濡然者。病在血氣。目色青黃赤白黑者。病在筋。耳焦枯受塵垢。病在骨。

鍼刺二十六

○脉口浮滑者。病日進。人迎沉而滑者。病日損。其脉口滑以沉者。病日進在內。其人迎脉滑盛以浮者。其病日進在外。○脉之浮沉及人迎與寸口氣。小大等者。病難已。病之在藏。沉而大者。易已。小為逆。病在府。浮而大者。其病易已。○人迎盛堅者。傷於寒。氣口盛堅者。傷於食。脉色三十二

○數則煩心。○濇則心痛。脉色二

○營之生病也。寒熱少氣。血上下行。衛之生病

也。氣痛時來時去。怫愾賁響。風寒客於腸胃

之中。寒痺之為病也。留而不去。時痛而皮不

仁。鍼刺三十二

○衛氣之留於腹中。積積不行。死蘊不得常所。

使人肢脇胃中滿。喘呼逆息。鍼刺二十六

○審察衛氣為百病母。鍼刺二十九

○任脉為病。男子內結。七疝。女子帶下。瘦聚。○

衝脉為病。逆氣裏急。○督脉為病。脊強反折。

此生病從少腹上衝心而痛。不得前後為衝

疝。其女子不孕。癥痔遺溺。嗑乾。經絡二十七

○足陽明。五藏六府之海也。其脉大。血多氣盛

熱壯。經絡十三

○五藏不和。則七竅不通。六府不和。則留結為

癰。經絡十二

○心肺有病而鼻為之不利也。藏象十一

○皮膚薄而不澤肉不堅而淖澤則腸胃惡邪

氣留止大聚乃起。疾病七十六

○穀入少而氣多者邪在胃及與肺也。疾病二十一

○經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收

陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸。疾病類六

九十

○氣上走貴上。鍼刺三十

○五藏所惡○五藏化液○五藏所藏○五藏

所主。疾病二十五

○肺布葉舉。疾病二十六

○女子右為逆左為從男子左為逆右為從。論治

四十

○男子發左女子發右。脉色二十四

○四時藏脉病有太過不及。脉色十

○診尺論疾。脉色十八

○五味之走各有所病。氣味三

○諸經根結病刺。經絡三十

○本藏二十五變之病。藏象二十八

○五藏異藏虛實異病。藏象十

○藏脉六變病刺不同。脉色十九

○十五別絡虛實病刺。經絡五

時氣病 三

○春傷於風邪氣留連乃為洞泄夏傷於暑秋

為痲瘧秋傷於濕上逆而欬發為痿厥冬傷

於寒春必溫病四時之氣更傷五藏。見疾病類五

○冬傷於寒春必溫病春傷於風夏生飧泄夏

傷於暑秋必痲瘧秋傷於濕冬生欬嗽。陰陽一

脉色三十 三略同

○春氣者病在頭夏氣者病在藏秋氣者病在

肩背。冬氣者病在四支。故春善病飢飢。仲夏善病胃腸。長夏善病洞泄。寒中秋善病風瘧。冬善病痺厥。故冬不按蹻。春不飢飢。春不病頸項。仲夏不病胃腸。長夏不病洞泄。寒中秋不病風瘧。冬不病痺厥。殮泄而汗出也。夫精者身之本也。故藏於精者。春不病溫。夏暑汗不出者。秋成風瘧。此平人脈法也。疾病二

○春青風。夏陽風。秋涼風。冬寒風。黃色薄皮弱

肉者。不勝春之虛風。白色薄皮弱肉者。不勝夏之虛風。青色薄皮弱肉者。不勝秋之虛風。赤色薄皮弱肉者。不勝冬之虛風。黑色皮薄而肉不堅。色不一者。長夏至而有虛風者。病矣。藏象二

○清氣大來。燥之勝也。風木受邪。肝病生焉。熱氣大來。火之勝也。金燥受邪。肺病生焉。寒氣大來。水之勝也。火熱受邪。心病生焉。濕氣大


來。土之勝也。寒水受邪。腎病生焉。風氣大來。木之勝也。土濕受邪。脾病生焉。所謂感邪而生病也。乘年之虛。則邪甚也。失時之和。亦邪甚也。遇月之空。亦邪甚也。重感於邪。則病危矣。有勝之氣。其必來復也。運氣三十一

○是故邪氣者。常隨四時之氣血而入客也。至其變化。不可為度。鍼刺十九

○五藏各以其時受病。非其時各傳以與之人。

與天地相參。故五藏各以治時。感於寒則受病。微則為欬。甚則為泄。為痛。乘秋則肺先受邪。乘春則肝先受之。乘夏則心先受之。乘至陰則脾先受之。乘冬則腎先受之。疾病五十二

○逆春氣則傷肝。夏為寒變。奉長者少。逆夏氣則傷心。秋為痃瘕。奉收者少。逆秋氣則傷肺。冬為飧泄。奉藏者少。逆冬氣則傷腎。春為痿厥。奉生者少。攝生四



○逆春氣則少陽不生。肝氣內變。逆夏氣則太陽不長。心氣內洞。逆秋氣則太陰不收。肺氣焦滿。逆冬氣則少陰不藏。腎氣獨沉。攝生

○東方色青。入通於肝。其病發驚駭。南方色赤。

入通於心。故病在五藏。中央黃色。入通於脾。

故病在舌本。西方白色。入通於肺。故病在背。

北方黑色。入通於腎。故病在谿。藏象

○厥陰所至為裏急。為支痛。為痙戾。為脇痛。嘔

泄。○少陰所至為瘍疹。身熱。為驚。或惡寒。戰

慄。譫妄。為悲。妄。衄。蟻。為語笑。○太陰所至為

積飲。否。隔。為積滿。為中滿。霍亂吐下。為重肘

腫。○少陽所至為噎。嘔。為瘡。瘍。為驚。躁。瞖。昧

暴病。為喉痺。耳鳴。嘔。涌。為暴注。暈。瘳。暴死。○

陽明所至為浮虛。為尻陰。股膝。髀。膕。筋。足。病。

為脇痛。皴。揭。為歔。噓。○太陽所至為屈伸不

利。為腰痛。為寢汗。瘕。為流泄。禁止。○故風勝

則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡泄甚則水閉附腫隨氣所在以言其變耳

運氣二
十一

○氣之不襲是謂非常非常則變矣變至則病所勝則微所不勝則甚因而重感於邪則死

矣。運氣
二

○氣相得則和不相得則病帝曰氣相得而病者何也岐伯曰以下臨上不當位也

運氣
四

○中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死君位臣則順臣位君則逆逆則其病近其害速順則其病遠其害微所謂二火也○太過不及皆曰天符而變行有多少病形有微甚生死有蚤晏耳

類
七

運
氣

○太過者暴不及者徐暴者為病甚徐者為病

持。運氣二
十三

○月滿則海水西盛。人血氣積。雖遇賊風。其入淺不深。至其月郭空。則海水東盛。人氣血虛。遇賊風。則其入深。○三虛者。乘年之衰。逢月之空。失時之和。因為賊風所傷。是謂三虛。三實者。逢年之盛。遇月之滿。得時之和。雖有賊風。邪氣不能危之也。運氣三。十六

虛實病 四

○邪之所湊。其氣必虛。陰虛者。陽必湊之。見疾病類

三十

○氣之所并為血。血之所并為氣。虛。○故氣并則無血。血并則無氣。疾病十九

○肝氣虛則恐。實則怒。脾氣虛則四支不用。五藏不安。實則腹脹。經澀不利。心氣虛則悲。實則笑不休。肺氣虛則鼻塞不利。少氣實則喘。

喝曾盈仰息。腎氣虛則厥。實則脹。藏象

○手太陰實則手銳掌熱。虛則欠欬。小便遺數。

○手少陰實則支膈。虛則不能言。○手心主

實則心痛。虛則為頭強。○手太陽實則節弛

肘廢。虛則生肱。小者如指痲疥。○手陽明實

則齟齬。虛則齒寒痺隔。○手少陽實則肘攣

虛則不收。○足太陽實則欬窒頭臂痛。虛則

欬衄。○足少陽實則厥。虛則痿躄。坐不能起。

○足陽明實則狂顛。虛則足不收。脛枯。○足

太陰實則腸中切痛。虛則鼓脹。○足少陰實

則閉癢。虛則腰痛。○足厥陰實則挺長。虛則

暴癢。○任脉實則腹皮痛。虛則癢搔。○督脉

實則脊強。虛則頭重高搖之。○脾之大絡。實

則身盡痛。虛則百節盡皆縱。經絡

○五藏主藏精者也。不可傷。傷則失守而陰虛。

陰虛則無氣。無氣則死矣。藏象

○勇者氣行則已。怯者則著而為病。疾病五十三

○實者氣入也。虛者氣出也。疾病二十一

○邪之所在皆為不足。故上氣不足。腦為之不

滿。耳為之苦鳴。頭為之苦傾。目為之苦眩。中

氣不足。溲便為之變。腸為之苦鳴。下氣不足。

則乃為痿厥心惋。疾病七十九

○營氣虛則不仁。衛氣虛則不用。營衛俱虛。則

不仁且不用。肉如故也。人身與志不相有曰

死。疾病四十五

○氣海有餘者。氣滿胃中。惋息面赤。氣海不足。

則氣少不足以言。○血海有餘則常想其身

大。怫然不知其所病。血海不足亦常想其身

小。狹然不知其所病。○水穀之海有餘則腹

滿。水穀之海不足則饑不受穀食。○髓海有

餘則輕勁多力。自過其度。髓海不足則腦轉

耳鳴。脛痠眩暈。目無所見。懈怠安臥。經絡三十二

○下虛則厥下盛則熱。上虛則眩。上盛則熱痛。

經絡
十二

○三焦者。太陽之別也。並太陽之正。入絡膀胱。

約下焦實則閉癢。虛則遺溺。經絡
十六

○寒則真氣去。去則虛。虛則寒搏於皮膚之間。

疾病
四

○陰氣盛。陽氣虛。故為振寒。○胃不實則諸脉

虛。諸脉虛則筋脉懈惰。則行陰用力。氣不能

復。故為躄。疾病七
十九

○肝虛腎虛脾虛。皆令人體重煩冤。○怯然少

氣者。是水道不行。形氣消索也。疾病
九

○髓液皆減而下。下過度則虛。虛故腰背痛而

脛痠。疾病五
十八

○內奪而厥。則為瘖俳。此腎虛也。疾病
十一

○八正之虛。邪而避之。勿犯也。以身之虛而逢

天之虛。兩虛相感。其氣至骨。入則傷五藏。工

候救之弗能傷也。故曰天忌不可不知也。○
 虛邪者。八正之虛邪氣也。正邪者。身形若用
 力。汗出腠理開。逢虛風。其中人也。微鍼刺十三
 ○三虛者。其死暴疾也。得三實者。邪不能傷人
 也。○乘年之衰。逢月之空。失時之和。因為賊
 風所傷。是謂三虛。○帝曰。願聞三實。少師曰。
 逢年之盛。遇月之滿。得時之和。雖有賊風。邪
 氣不能危之也。運氣三十一

○精氣津液血脉脫者之病。藏象二

○五有餘。二不足者。死不治。疾病三十一

○人神失守。邪鬼外干。運氣四十三

○形肉已奪。是一奪也。大奪血之後。是二奪也。

大汗出之後。是三奪也。大泄之後。是四奪也。

新產及大血之後。是五奪也。此皆不可寫。鍼刺

五十
八

○清氣在陰濁氣在陽管氣順脉衛氣逆行清濁相干亂於胃中是為大悞故氣亂於心則煩心密嘿俛首靜伏亂於肺則俛仰喘喝接手以呼亂於腸胃則為霍亂亂於臂脛則為四厥亂於頭則為厥逆頭重眩仆
見鍼刺類二十七

○寒氣生濁熱氣生清清氣在下則生殮泄濁氣在上則生臃脹○壯火之氣衰少火之氣

氣血津液病

五

○清氣在陰濁氣在陽管氣順脉衛氣逆行清濁相干亂於胃中是為大悞故氣亂於心則煩心密嘿俛首靜伏亂於肺則俛仰喘喝接手以呼亂於腸胃則為霍亂亂於臂脛則為四厥亂於頭則為厥逆頭重眩仆
見鍼刺類二十七

○寒氣生濁熱氣生清清氣在下則生殮泄濁氣在上則生臃脹○壯火之氣衰少火之氣

壯壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣

陰陽

○足陽明其病氣逆則喉痺痺瘖瘖○足太陰厥

氣上逆則霍亂○足少陰其病氣逆則煩悶

○足厥陰其病氣逆則羸腫卒疝經絡

○長則氣治短則氣病上盛則氣高下盛則氣

脹代則氣衰細則氣少○數動一代者病在

陽之脉也洩及便膿血脉色二

○大驚卒恐則血氣分離疾病七

○五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻為之不

利也藏象

○乳之下其動應衣宗氣泄也脉色

○一呼脉一動一吸脉一動曰少氣脉色

○脉小者尺之皮膚亦減而少氣脉色

○因於氣為腫四維相代陽氣乃竭疾病

○一陽發病少氣疾病

○言而微終日乃復言者此奪氣也。疾病九十一

○精脫者耳聾氣脫者目不明津脫者腠理開

汗大泄液脫者骨屬屈伸不利色夭腦髓消

脛痠耳數鳴血脫者色白天然不澤。藏象二十五

○衝脉為病逆氣裏急。經絡二十七

○怒則氣逆甚則嘔血。疾病二十六

○穀人多而氣少者得之有所脫血。○脉小血

多者飲中熱也脉大血少者脉有風氣水漿

不入也。疾病二十一

○少陰所謂欬則有血者陽脉傷也陽氣未盛

於上而脉滿滿則欬故血見於鼻也。疾病十一

○脾移熱於肝則為驚衄。疾病四十六

○肺脉搏堅而長當病唾血。○肝脉若搏因血

在脇下令人喘逆。○脾脉搏堅而長其色黃

當病少氣。○腎脉奕而散者當病少血。脉色二十

○臂多青脉曰脫血。○安臥脉盛謂之脫血。脉色

六十

○結陰者便血一升。再結二升。三結三升。疾病六

○悲哀太甚則胞絡絕。胞絡絕則陽氣內動發

則心下崩。數溲血也。疾病七十一

○陽絡傷則血外溢。血外溢則衄血。陰絡傷則

血內溢。血內溢則後血。疾病二十二

○血泄者脉急。血無所行也。疾病九

○孫絡外溢則經有留血。疾病十八

○心脉微瀼為血溢。○肺脉微急為肺寒熱。怠

惰。欬唾血。○肺脉微滑為上下出血。瀼甚為

嘔血。○腎脉微瀼為不月。脉色十九

○血氣者喜溫而惡寒。寒則泣不能流。溫則消

而去之。疾病十九

○陰虛陽搏謂之崩。脉色二十九

○白血出者死。運氣三十陽明司天下

○月事不來者。胞脉閉也。胞脉者屬心而絡於

胞中。今氣上迫肺。心氣不得下通。故月事不

來也。疾病三十一

○婦人之生。有餘於氣。不足於血。以其數脫血

也。藏象十七

情志病 六

○志意者。所以御精神。收魂魄。適寒溫。和喜怒

者也。○志意和則精神專直。魂魄不散。悔怒

不起。五藏不受邪矣。見藏象類二十八

○天有四時五行。以生長收藏。以生寒暑燥濕

風。人有五藏。化五氣。以生喜怒悲憂恐。故喜

怒傷氣。寒暑傷形。暴怒傷陰。暴喜傷陽。厥氣

上行。脉滿去形。喜怒不節。寒暑過度。生乃不

固。陰陽一。○天元紀大論作喜怒思憂恐。見
運氣三。○暴怒傷陰以下四句。又見論治

十
八。

○東方生風。在聲為呼。在變動為握。在志為怒。
怒傷肝。悲勝怒。○南方生熱。在聲為笑。在變
動為憂。在志為喜。喜傷心。恐勝喜。○中央生
濕。在聲為歌。在變動為噦。在志為思。思傷脾。
怒勝思。○西方生燥。在聲為哭。在變動為欬。
在志為憂。憂傷肺。喜勝憂。○北方生寒。在聲

為呻。在變動為慄。在志為恐。恐傷腎。思勝恐。

藏象
五

○東方色青。入通於肝。其病發驚駭。藏象
四

○夫百病之始生也。皆生於風。雨寒暑。陰陽喜
怒。飲食居處。大驚卒恐。則血氣分離。陰陽破
散。經絡厥絕。脉道不通。陰陽相逆。衛氣稽留。
經脉虛空。血氣不次。乃失其常。疾病七
十九
○憂恐悲喜怒。令不得以其次。故令人有大病

矣。因而喜大虛。則腎氣乘矣。怒則肝氣乘矣。悲則肺氣乘矣。恐則脾氣乘矣。憂則心氣乘矣。
疾病二十九

○怵惕思慮者則傷神。神傷則恐懼流淫而不止。○悲哀動中者。竭絕而失生。○喜樂者。神憚散而不藏。○愁憂者。氣閉塞而不行。○盛怒者。迷惑而不治。○恐懼者。神蕩憚而不收。○心怵惕思慮則傷神。神傷則恐懼自失。破

腠脫肉。○脾憂愁而不解則傷意。意傷則恍惚。四肢不舉。○肝悲哀動中則傷魂。魂傷則狂妄。忘不精。當人陰縮而舉筋。兩脇骨不舉。○肺喜樂無極則傷魄。魄傷則狂。皮革焦。○腎盛怒而不止則傷志。志傷則喜忘其前言。腰脊不可以俛仰屈伸。恐懼而不解則傷精。精傷則骨痠痿厥。精時自下。
藏象九

○血并於上。氣并於下。心煩惋善怒。○血并於

下。氣并於上。亂而喜忘。○喜怒不節。則陰氣
 上逆。上逆則下虛。下虛則陽氣走之。故曰實
 矣。○喜則氣下。悲則氣消。消則脉虛空。因寒
 飲食。寒氣熏滿。則血泣氣去。故曰虛矣。疾病十九
 ○胃為氣逆。為噦為恐。○膽為怒。○精氣并於
 心。則喜。并於肺。則悲。并於肝。則憂。并於脾。則
 畏。并於腎。則恐。○陽入之陰。則靜。陰出之陽
 則怒。疾病二十五

○悲哀太甚。則胞絡絕。胞絡絕。則陽氣內動。發
 則心下崩。數溲血也。○思想無窮。所願不得。
 意淫於外。入房太甚。宗筋弛縱。發為筋痿。及
 為白淫。疾病七十一
 ○憂愁思慮。即傷心。○恚怒氣逆。上而不下。即
 傷肝。運氣四十四
 ○神有餘。則笑不休。神不足。則悲。○血有餘。則
 怒不足。則恐。疾病十八

○多陽者多喜。多陰者多怒。鍼刺十二

○水之精為志。火之精為神。水火相感。神志俱

悲。是以目之水生也。故諺言曰。心悲名曰志。

悲。疾病八十

○肝藏血。血舍魂。肝氣虛則恐。實則怒。○脾藏

營。營舍意。○心藏脉。脉舍神。心氣虛則悲。實

則笑不休。○肺藏氣。氣舍魄。○腎藏精。精舍

志。藏象十

○愁憂恐懼則傷心。形寒寒飲則傷肺。疾病三

○悲哀愁憂則心動。心動則五藏六府皆搖。疾病九

七十

○憂恐忿怒傷氣。氣傷藏。乃病藏。鍼刺三十一

○春脉太過則令人善怒。脉色十

○陽明所謂甚則厥。惡人與火。聞木音則惕然

而驚者。陽氣與陰氣相薄。水火相惡。故惕然

而驚也。○所謂欲獨閉戶而處者。陰陽相薄

也。陽盡而陰盛，故欲獨閉戶牖而居。○所謂病至則欲乘高而歌，棄衣而走者，陰陽復爭而外并於陽，故使之棄衣而走也。○少陰所謂恐，如人將捕之者，秋氣萬物未有畢去，陰氣少，陽氣入，陰陽相薄，故恐也。○肝氣當治而未得，故善怒。善怒者，名曰煎厥。○所謂惡聞食臭者，胃無氣，故惡聞食臭也。疾病十一

○厥陰為闔，闔折則氣絕而喜悲。經絡三十

○邪客於足少陰之絡，令人無故善怒，氣上走

賁上。鍼刺三十

○形樂志苦，病生於脉。形樂志樂，病生於肉。形苦志樂，病生於筋。形苦志苦，病生於咽嗑。形數驚恐，經絡不通，病生於不仁。論治十

○嘗貴後賤，雖不中邪，病從內生，名曰脫營。嘗富後貧，名曰失精。五氣留連，病有所并。○暴樂暴苦，始樂後苦，皆傷精氣，精氣竭絕，形體

毀沮暴怒傷陰。暴喜傷陽。厥逆上行。滿脉去形。愚醫治之。不知補寫。不知病情。精華日脫。邪氣乃并。故貴脫勢。雖不中邪。精神內傷。身必敗亡。始富後貧。雖不傷邪。皮焦筋屈。痿

臂為癱。論治十八

○陽氣者。大怒則形氣絕。而血菀於上。使人薄厥。○俞氣化薄。傳為善畏。及為驚駭。疾病五○目堅固以深者。長衝直揚。其心剛。剛則多怒。

怒則氣上逆。疾病七十六

○心痺者。脉不通。厥氣上則恐。疾病六十七

○隔則閉絕。上下不通。則暴憂之病也。疾病七十八

○飲食不節。喜怒不時。津液內溢。乃下留於臑。

鍼刺三十三

○於食不嗜喜怒不制皆於內盛不可留飲也
 ○則似因於上不可飲則易憂之類也
 ○心取亦無不飲則病主與於其類
 ○欲飲則上氣短下

頭項病 七

○頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽。見疾病類

四十

○來疾去徐上實下虛為厥巔疾。○推而下之。

下而不上頭項痛也。脉色二

○上氣不足腦為之不滿頭為之苦傾。疾病七十九

○陽明并於上。上者則其孫絡太陰也。故頭痛

鼻軌腹腫也。疾病十一

○寸口之脉中手短者曰頭痛。脉色十六

○厥成爲巔疾。疾病七十七

○春脉太過則令人善怒忽忽眩冒而巔疾。脉色

類十

○浮而散者爲胸仆。脉色二十一

○厥頭痛○真頭痛。鍼刺四十三

七竅病

○五藏不和則七竅不通。見經絡類二十二

○陽不勝其陰則五藏氣爭九竅不通。疾病五

○失之則內閉九竅外壅肌肉。疾病五

○脾不及則令人九竅不通名曰重強。脉色十

○二陽一陰陽明主病不勝一陰脉粟而動九

竅皆沉。疾病七

○躄脉氣不榮則目不合。經絡二十八

○太陽之脉其終也戴眼。疾病九十七

○診目痛赤脉從上下者太陽病從下上者陽

明病從外走內者少陽病。脉色三十三

○泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目

無所見矣故命曰奪精。○上氣不足耳為之

苦鳴目為之眩。疾病七十九

○精脫者耳聾。○液脫者耳數鳴。○氣脫者目

不明。藏象二十五

○膀胱移熱於小腸上為口糜。○膽移熱於腦

則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄

衄。○目。疾病四十六

○太陽所謂耳鳴者陽氣萬物盛上而躍故耳

鳴也。○所謂浮為聾者皆在氣也。○所謂入

中為瘖者陽盛已衰故為瘖也。內奪而厥則

為瘖。○所謂不能久立久

坐起則目眩無所見也。○厥陰所謂甚則

嗑乾熱中者陰陽相薄而熱故嗑乾也。疾病十一

○歲太陰在泉民病耳聾渾渾焯焯。運氣二十五

○足陽明之筋引缺盆及頰卒口僻急者目不

合熱則筋縱目不開頰筋有寒則急引頰移

口有熱則筋弛縱緩不勝收故僻。疾病六十九

○督脉為病嗑乾。經絡二十七

○一陰一陽結謂之喉痺。疾病六

○手陽明少陽厥逆發喉痺嗑腫。疾病三十五

○手少陰虛則不能言○手陽明實則齟齬

足太陽實則聾窒虛則聾衄○足陽明氣逆

則喉痺瘁瘖。經絡五

○人有重身九月而瘖此為何也岐伯曰胞之

絡脉絕也胞絡者繫於腎少陰之脉貫腎繫

舌本故不能言。疾病六十二

○男子發左女子發右不瘖舌轉可治三十日

起其從者瘖三歲起年不滿二十者三歲死

脉色二
十四

○人之鼻涕出不收者。頰頰不開。分氣失也。

○人卒然無音者。寒氣客於厭。則厭不能發。

發不能下。至其開闔不致。故無音。鍼刺四十五

○不得臥而息有音者。是陽明之逆也。疾病八十二

○心脉搏堅而長。當病舌卷不能言。脉色二十

○肝脉驚暴。有所驚駭。脉不至若瘖。不治自已。

脉色二
十四

○狗蒙招尤。目冥耳聾。下實上虛。過在足少陽。

厥陰。疾病十四

○搏陰則為瘖。疾病二十五

○灸之則陽氣入。陰入則瘖。疾病三十八

○五氣入鼻。藏於心肺。心肺有病。而鼻為之不

利也。藏象十一

者腎也。十月萬物陽氣皆傷。故腰痛也。○厥

陰所謂腰脊痛。不可以俛仰者。三月一振榮

華萬物。一俛而不仰也。疾病十一

○督脉為病。脊強反折。經絡二十七

○春脉不及。則令人胷痛引背。下則兩脇脹滿。

○秋脉太過。則令人逆氣而背痛。○冬脉不

及。則令人眇中清。脊脉痛。脉色十

○腎脉搏堅而長。其色黃而赤者。當病折腰。脉色

十二

○髓液皆減而下。下過度則虛。虛故腰背痛。而

脛痠。疾病五十八

○腹滿臄脹。支兩脇脇。下厥上冒。過在足太陰

陽明。○心煩頭痛。病在鬲中。過在手巨陽少

陰。疾病十四

○腎志傷。則腰脊不可俛仰屈伸。藏象九

○腎脉緩甚。為折脊。脉色十九

○寸口脉中手促。上擊者。曰肩背痛。脉色十六

○顴後為臑痛。疾病四十四

皮毛筋骨病十

○虛邪之中人也。洒淅動形。起毫毛而發腠理。其入深。內搏於骨。則為骨痺。搏於筋。則為筋

痺。○虛邪之入於身也。深寒勝其熱。則骨疼。肉枯。熱勝其寒。則爛肉腐肌。為膿。內傷骨。為骨蝕。○有所疾。前筋發。為筋溜。○以手按之。堅。骨與氣并。日以益大。則為骨疽。○有所結。中於肉。無熱。則為肉疽。見疾病類四

類經卷之二十一
會通類
四十一

○心脉急甚為瘈瘲○肝脉微瀋為瘈瘲筋痺。

○脾脉急甚為瘈瘲。脉色十九

○手屈而不伸者其病在筋伸而不屈者其病

在骨。鍼刺五十一

○少陽司天客勝內為瘈瘲○厥陰在泉客勝

則大關節不利內為瘈強拘瘈主勝則筋骨

繇併。運氣三十

○液脫者骨屬屈伸不利色夭腦髓消脛瘦。藏象

二十
五

○少陽為樞樞折即骨繇而不安於地骨繇者

節緩而不收也。經絡三十

○腎傳之心病筋脉相引而急病名曰瘈。疾病類二

十
九

○三陽為病其傳為索澤。疾病六

○因而強力腎氣乃傷高骨乃壞。疾病五

○皮膚肉苛。運氣十四

類經卷之二十一
會通類
皮骨病
四十一

○嬰兒病其頭毛皆逆上者必死

脉色三十三

○地之温氣感則害人皮肉筋脉

論治

四支病 十一

○三陽三陰發病為偏枯痿易四支不舉○陰

爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起○結

陽者腫四支見疾病類六

○虛邪偏容於身半其入深內居榮衛榮衛稍

衰則真氣去邪氣獨留發為偏枯其邪氣淺

者脉偏痛疾病四

○有傷於筋縱其若不容汗出偏沮使人偏枯

疾病
五

○胃脉沉鼓濇。胃外鼓大。心脉小堅急。皆鬲偏枯。男子發左。女子發右。不瘖舌轉可治。三十日起。其從者瘖。三歲起。年不滿二十者。三歲

死。脉色二
十四

○胃脉搏堅而長。其色赤。當病折髀。○脾脉粟而散。色不澤者。當病足脢腫。若水狀也。脉色
二十

○太陽所謂偏虛者。冬寒頗有不足者。故偏虛

為跛也。○內奪而厥。則為瘖俳。此腎虛也。○

陽明所謂脛腫而股不收者。是五月盛陽之

陰也。陽者衰於五月。而一陰氣上。與陽始爭。

故脛腫而股不收也。疾病
十一

○脾脉太過。則令人四支不舉。脉色
十

○四支解墮。此脾精之不行也。疾病
九

○意傷則惋亂。四支不舉。藏象
九

○寸口脉中手長者。曰足脛痛。脉色
十六

○推而上之上而不下腰足清也。脉色二

○蹠跛風寒濕之病也。疾病七十八

○脈初大數脈令人則是不舉也。

始以脈而測不效也。十一

創也則者或或正其而一創也。其也或或

創也則者或或正其而一創也。其也或或

創也則者或或正其而一創也。其也或或

二陰病 十二

○倉廩不藏是門戶不要也。水泉不止是膀胱

不藏也得守者生。失守者死。見疾病類九十一

○手太陰虛則小便遺數。○足少陰實則閉癢。

○足厥陰結於莖。氣逆則辜腫卒疝實則挺

長。虛則暴癢。經絡五

○厥陰之厥腹脹涇洩不利。陰縮腫。○厥陰厥

逆。虛滿前閉。疾病三十五

○脾傳之腎。病名疝瘕。少腹寬熱而痛。出白。一

名曰蠱。疾病二十九

○肝悲哀動中則傷魂。當人陰縮而舉筋兩脇

骨不舉。○恐懼而不解則傷精。精傷則骨痠

痿厥。精時自下。藏象九

○思想無窮。所願不得。意淫於外。人房太甚。宗

筋弛縱。發為筋痿。及為白淫。○陽明虛則宗

筋縱。疾病七十一

○中氣不足。溲便為之變。疾病七十九

○陰陽不和。則使液溢而下流於陰。髓液皆減

而下。下過度則虛。虛故腰背痛而脛痠。疾病類五

八十

○膀胱不利為癃。不約為遺溺。疾病二十五

○胞移熱於膀胱則癃。溺血。○膀胱移熱於小

腸。腸澀不便。疾病四十六

○肺消者。飲一溲二。死不治。疾病四十六

○肝脉搏堅而長。色不青。當病墜。脉色二十

○腎脉微急為不得前後。○腎脉大甚為陰痿。

○微瀼為不月。沉痔。脉色十九

○有癢者。一日數十溲。此不足也。疾病三十一十六

○足太陰之筋病。陰器紐痛。下引臍。○足厥陰

之筋病。陰器不用。傷於內則不起。傷於寒則

縮入。傷於熱則縱挺不收。疾病六十九十九

○任脉為病。女子帶下。○督脉為病。癢痔遺溺。

經絡二
十七

○肝所生病者。遺溺閉癢。疾病十

○小腸病者。小腹痛。腰脊控舉而痛。時窘之後。

鍼刺二
十四

○太陽之勝。陰中廼瘍。隱曲不利。互引陰股。運氣

二十
七

○小便黃者。少腹中有熱也。疾病三十一

○冬脉不及。則令人少腹滿。小便變。脉色十

○淫氣遺溺痺聚在腎

疾病六十七

○小便黃赤心熱中脘痛

○

○大便之類

○

○小便頻數

○

○

類經三十二卷

張介賓類

會通類

○疾病 十二下

○風證 十三

○風者百病之始也 見脉色類三十二

○風者百病之始也。風從外入。令人振寒汗出。

○頭痛身重惡寒。○從風憎風。○病大風骨節

重鬢眉墮名曰大風。○癘風。○偏枯。○痺之為病。○智亂不甚。其言微知可治。甚則不能言。不可治也。○風瘳身反折。鍼刺三

○賊風邪氣乘虛傷人。運氣三 十六

○陽受風氣。陰受濕氣。○傷於風者上先受之。

傷於濕者下先受之。疾病 十三

○邪風之至。疾如風雨。論治 八

○風成爲寒熱。久風爲殮泄。脉風成爲癘。疾病 類七

七十

○病在陽者命曰風。病在陰者命曰痺。陰陽俱

病。命曰風痺。○風寒傷形。鍼刺三 十一

○人一呼脉三動。一吸脉三動而躁。尺不熱。脉

滑曰病風。脉色 三

○脉大血少者。脉有風氣。疾病二 十一

○脉滑曰風。脉色 十六

○來徐去疾。上虛下實。爲惡風也。故中惡風者

陽受氣也。脉色二

○二陽之病發心脾其傳為風消。疾病六

○面腫曰風。疾病五

○正邪者身形若用力汗出腠理開逢虛風其

中人也微故莫知其情莫見其形。鍼刺十三

○入風傷人為病。運氣三十五

○

○

寒熱病 十四

○陰主寒陽主熱寒甚則熱熱甚則寒故曰寒生熱熱生寒此陰陽之變也。見脉色類三十三

○寒極生熱熱極生寒寒氣生濁熱氣生清清

氣在下則生飧泄濁氣在上則生臃脹○重

寒則熱重熱則寒寒傷形熱傷氣。陰陽一

○故犯賊風虛邪者陽受之陽受之則入六府

入六府則身熱不時臥上為喘呼。疾病十三

○陽勝者則為熱。陰勝者則為寒。寒則真氣去。

去則虛。虛則寒搏於皮膚之間。○寒勝其熱。

則骨疼肉枯。熱勝其寒。則爛肉腐肌為膿。內

傷骨。內傷骨為骨蝕。疾病四

○寒則腠理閉。氣不行。故氣收矣。炅則腠理開。

營衛通。汗大泄。故氣泄矣。疾病二 十六

○寒多則筋攣。骨痛。熱多則筋弛。骨消。肉爍。腠

破。毛直而敗。經絡三一 十一

○寒多則凝泣。凝泣則青黑。熱多則淖澤。淖澤

則黃赤。脈色三 十五

○寒則反折。筋急。熱則筋弛。縱不收。陰痿不用。

陽急則反折。陰急則俛不伸。疾病六 十九

○陰氣不足則內熱。陽氣有餘則外熱。內熱相

搏。熱於懷炭。外畏綿帛。近不可近。身又不可

近。席。鍼刺類 三十三

○三陽為病。發寒熱。疾病六

類經卷之三十一 會通類 寒熱病 四

○陽明所謂洒洒振寒者。陽明者午也。五月盛陽之陰也。陽盛而陰氣加之。故洒洒振寒也。

疾病十一

○肺脉微急。為肺寒熱。○脾脉小甚。為寒熱。脉色

九十

○寸口脉沉而弱。沉而喘曰寒熱。○緩而滑曰

熱中。○脉尺麤常熱者。謂之熱中。

脉色十六

○夏脉太過。則令人身熱而膚痛。為浸淫。脉色十

○沉細數散者。寒熱也。○推而內之。外而不內

身有熱也。

脉色二十一

○其寒飲食入胃。從肺脉上。至於脉。則肺寒。肺

寒則外內合邪。

疾病五十二

○榮衛稽留。衛散營溢。氣竭血著。外為發熱。內

為少氣。

經絡八

○血并於陽。氣并於陰。乃為炅中。

疾病十九

○喜怒不適。食飲不節。寒溫不時。則寒汁流於

腸中流於腸中則蟲寒。蟲寒則積聚守於下管。則腸胃充郭。衛氣不營。邪氣居之。鍼刺四十八

○形寒寒飲則傷肺。疾病三

○中熱則胃中消穀。消穀則蟲上下作。腸胃充郭。故胃緩胃緩則氣逆故唾出。疾病五十八

○氣虛身熱。此謂反也。○氣實者熱也。氣虛者寒也。疾病二十一

○皮寒熱者不可附膚。毛髮焦。鼻槁。○肌寒

熱者。肌痛。毛髮焦而脣槁。○骨寒熱者。病無所安。汗注不休。齒未槁。取其少陰於陰股之絡。齒已槁。死不治。骨厥亦然。鍼刺四十一

○掌中熱者。腹中熱。掌中寒者。腹中寒。○魚上白肉有青血脉者。胃中有寒。脉色十八

○中熱消瘴則便寒。寒中之屬則便熱。胃中熱則消穀。令人懸心善饑。臍以上皮熱。腸中熱則出黃如糜。臍以下皮寒。胃中寒則腹脹。腸

中寒則腸鳴飧泄胃中寒腸中熱則脹而且

泄胃中熱腸中寒則疾饑小腹痛脹論治二

○血氣者喜溫而惡寒寒則泣而不流溫則消

而去之疾病十九

○小骨弱肉者善病寒熱疾病七十六

○不遠熱則熱至不遠寒則寒至寒至則堅否

腹滿痛急下利之病生矣熱至則身熱吐下

霍亂癰疽瘡瘍疥癬注下。疇瘕腫脹嘔。飢飢

頭痛骨節變肉痛血溢血泄淋瀝之病生矣

運氣二十

○診寒熱赤脉上下至瞳子見一脉一歲死見

一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半

二歲半死見三脉三歲死脉色三十三

○人之病同時而傷其身多熱者易已多寒者

難已藏象二十二

○人傷於寒而得為熱何也岐伯曰夫寒盛則

生熱也見鍼刺類三十九

○氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑疾

○人一呼脉三動一吸脉三動而躁尺熱曰病

溫脉色

○尺膚熱甚脉盛躁者病溫也脉色

傷寒 十五

○人傷於寒而得為熱何也岐伯曰夫寒盛則

生熱也見鍼刺類三十九

○氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑疾

二十

○人一呼脉三動一吸脉三動而躁尺熱曰病

溫脉色

○尺膚熱甚脉盛躁者病溫也脉色

○疫癘有五

論治二十〇 運氣

○諸熱病死生之刺

鍼刺四十

○人一身之氣，一曰氣，二曰血，三曰精，四曰神，五曰魂，六曰魄，七曰心，八曰志，九曰意，十曰思，十一曰慮，十二曰智，十三曰德，十四曰壽，十五曰福，十六曰祿，十七曰名，十八曰利，十九曰害，二十曰災。

○人一身之氣，一曰氣，二曰血，三曰精，四曰神，五曰魂，六曰魄，七曰心，八曰志，九曰意，十曰思，十一曰慮，十二曰智，十三曰德，十四曰壽，十五曰福，十六曰祿，十七曰名，十八曰利，十九曰害，二十曰災。

○人一身之氣，一曰氣，二曰血，三曰精，四曰神，五曰魂，六曰魄，七曰心，八曰志，九曰意，十曰思，十一曰慮，十二曰智，十三曰德，十四曰壽，十五曰福，十六曰祿，十七曰名，十八曰利，十九曰害，二十曰災。

○人一身之氣，一曰氣，二曰血，三曰精，四曰神，五曰魂，六曰魄，七曰心，八曰志，九曰意，十曰思，十一曰慮，十二曰智，十三曰德，十四曰壽，十五曰福，十六曰祿，十七曰名，十八曰利，十九曰害，二十曰災。

○人一身之氣，一曰氣，二曰血，三曰精，四曰神，五曰魂，六曰魄，七曰心，八曰志，九曰意，十曰思，十一曰慮，十二曰智，十三曰德，十四曰壽，十五曰福，十六曰祿，十七曰名，十八曰利，十九曰害，二十曰災。

喘欬嘔噦

喘欬嘔噦 十六

○犯賊風虛邪者陽受之。陽受之則入六府。入

六府則身熱不時臥。上為喘呼。

見疾病類十三

○太陽藏獨至。厥喘虛氣逆是陰不足。陽有餘

也。脉色十五

○太陰所謂上走心為噫者。陰盛而上走於陽

明。陽明絡屬心。故曰上走心為噫也。○所謂

食則嘔者。物盛滿而上溢。故嘔也。○少陰所

謂嘔欬上氣喘者。陰氣在下。陽氣在上。諸陽氣浮。無所依從。故嘔欬上氣喘也。疾病十一

○二陽之病發心脾。其傳為息賁。疾病六

○一陽發病。少氣善欬。○二陽一陰發病。主驚

駭背痛善噫。疾病六

○足太陰病。舌本強。食則嘔。胃脘痛。腹脹善噫。

○足厥陰肝所生病者。胸滿嘔逆。疾病十

○足太陰厥氣上逆則霍亂。經絡五

○陽明厥則喘而惋。惋則惡人。帝曰。或喘而死。者。或喘而生者。何也。岐伯曰。厥逆連臍則死。

連經則生。疾病十二

○胃為氣逆為噦為恐。疾病十五

○今有故寒氣與新穀氣俱還入於胃。新故相

亂。真邪相攻。氣并相逆。復出於胃。故為噦。○

寒氣客於胃。厥逆從下上散復出於胃。故為

噫。○肺主為噦。疾病七十九

○寒氣客於腸胃。厥逆上出。故痛而嘔也。疾病類六

六十

○心脉小甚為善噦。○肺脉滑甚為息賁。上氣

○肝脉緩甚為善嘔。○腎脉微緩為洞。洞者

食不化。下嗝還出。脉色十九

○肝脉若搏。因血在脇下。令人喘逆。脉色二十

○腎者水藏。主津液。主臥與喘也。疾病八十二

○欬嗽煩寃者。是腎氣之逆也。○喘欬者。是水

氣并陽明也。疾病九

○心痺者。脉不通。煩則心下鼓。暴上氣而喘。噎

乾善噫。疾病六十七

○膽液泄則口苦。胃氣逆則嘔苦。故曰嘔膽。鍼刺

四十

○欬嗽上氣。厥在胃中。過在手陽明太陰。疾病十四

○秋脉不及。則令人喘。呼吸少氣而欬。上氣見

血。下聞病音。脉色十

○勞則喘息汗出外內皆越故氣耗矣。疾病二

○噦以草刺鼻噦噦而已無息而疾迎引之立

已。大驚之亦可已。鍼刺五

○病深者其聲噦。鍼刺九

○刺中心一日死其動為噦。○刺中膽一日半死其動為嘔。○

其動為欬。○刺中膈一日半死其動為嘔。○

○刺缺盆中內陷氣泄令人喘欬逆。鍼刺六

○若有七診之病其脈候亦敗者死矣必發噦

噦。脈色二

十五

○太陰終者善噦善嘔。疾病九

十七

○諸有水氣者。微腫先見於目下也。水者陰也。目下亦陰也。腹者至陰之所居。故水在腹者。必使目下腫也。○諸水病者。故不得臥。臥則驚驚。則效甚也。疾病三十一

○天寒則腠理閉。氣濕不行。水下留於膀胱。則為溺與氣。○陰陽氣道不通。四海閉塞。三焦不寫。津液不化。留於下焦。不得滲膀胱。則下焦脹。水溢則為水脹。疾病五十八

○陽明所謂上喘而為水者。陰氣下而復上。上則邪客於藏府間。故為水也。所謂胃痛少氣者。水氣在藏府也。水者陰氣也。陰氣在中。故胃痛少氣也。○太陰所謂病脹者。太陰子也。十一月萬物氣皆藏於甲。故曰病脹。疾病十一

○目窠上微癰。如新臥起狀。其頸脉動。時效。按其手足上。窅而不起者。風水膚脹也。脉色十八○疾

病五十七略同

○本之於腎名曰風水。鍼刺三十八

○腎肝并沉為石水并浮為風水。脉色二十四

○肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅水氣

客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病

也。疾病四十六

○肝滿腎滿肺滿皆實即為腫肺之雍喘而兩

胠滿肝雍兩胠滿臥則驚不得小便腎雍胠

下至少腹滿脛有大小髀膂大跛易偏枯。脉色

二十
四

○腎氣實則脹。藏象十

○志有餘則腹脹。疾病十八

○足太陰虛則鼓脹。經絡五

○胃病則大腹水腫膝臏腫痛○胃中寒則脹

滿。疾病十

○肝脉爽而散色澤者當病溢飲溢飲者渴暴

多飲而易入肌皮腸胃之外也○胃脉實則

脹。脉色二十

○中滿者寫之於內。論治八

○水俞五十七穴。鍼刺三十八

○三焦病者腹氣滿。小腹尤堅。不得小便。窘急。

溢則水流。即為脹。候在足太陽之外大絡。鍼刺

○二十
四

○下焦溢為水。疾病二
十五

○濁氣在上。則生臃脹。陰陽一

○不得臥。臥則喘者。是水氣之客也。夫水者。循

津液而流也。腎者水藏。主津液。主臥與喘也。

疾病八
十二

○陰陽結斜。多陰少陽曰石水。少腹腫。○三陰

結謂之水。疾病六

○腎脉微大為石水。起臍已下。至小腹腫。腫然

上至胃脘。死不治。脉色十九

○因於氣為腫。四維相代。陽氣乃竭。疾病五

○飲食不節。起居不時者。陰受之。陰受之則入

五藏。入五藏則臏滿閉塞。疾病十三

○其有不從毫毛生。而五藏陽已竭也。津液充

郭。其魄獨居。孤精於內。氣耗於外。形不可與

衣相保。此四極急而動中。是氣拒於內。而形

施於外。論治十五

○盛而緊曰脹。脉色十六

○北方者。其民樂野處。而乳食藏寒。生滿病。論治

九類

○適寒涼者脹。運氣十六

○下牙車為腹滿。疾病十四

○男子如蠱。女子如蛆。鍼刺十三

諸痛 十八

○病痛者陰也。痛而以手按之不得者陰也。

癢者陽也。見鍼刺類五十三

○痛者寒氣多也。有寒故痛也。疾病六十七

○實者外堅充滿不可按之。按之則痛。○虛者聶辟氣不足。按之則氣足以溫之。故快然而

不痛。疾病十九

○病熱而有所痛者何也。疾病四十五

○氣傷痛形傷腫故先痛而後腫者氣傷形也。
先腫而後痛者形傷氣也。陰陽

○天暑衣厚則腠理開故汗出寒留於分肉之間聚沫則為痛。疾病五十八

○寸口脉中手短者曰頭痛○中手長者曰足脛痛○中手促上擊者曰肩背痛○寸口脉

沉而弱曰寒熱及疝瘕少腹痛○沉而橫曰腹中有積積痛○脉急者曰疝瘕少腹痛。脉色

六十

○心脉微急為心痛引背食不下。脉色十九

○諸細而沉者皆在陰則為骨痛○按之至骨脉氣少者腰脊痛而身有痺也。脉色二十一

○新積痛可移者易已也積不痛難已也。經絡十二

○腎心痛胃心痛脾心痛肝心痛肺心痛真心痛。鍼刺四十六

○諸經腰痛。鍼刺四十九

○諸痛痒瘡皆屬於心一疾病

○木鬱之發民病胃脘當心而痛○土鬱之發

則心痛○金鬱之發心脇滿引小腹暴痛不

可反側○水鬱之發民病寒客心痛○火鬱

發民病骨痛腹中暴痛運氣二十一

十三

積聚癥瘕十九

○積之始生得寒乃生厥乃成積也○寒氣上

入於腸胃則臆脹臆脹則腸外之汁沫迫聚

不得散日以成積見疾病類二

○推而外之內而不外有心腹積也脉色二十一

○心脉微緩為伏梁在心下○肝脉微急為肥

氣在脇下若覆杯○腎脉微急為奔豚脉色十九

○赤脉之至也喘而堅診曰有積氣在中時害

於食。名曰心痺。○白脉之至也。喘而浮。上虛下實。驚有積氣在胃中。喘而虛。名曰肺痺。○青脉之至也。長而左右彈。有積氣在心下。支胠。名曰肝痺。得之寒濕。與疝同法。○黃脉之至也。大而虛。有積氣在腹中。有厥氣。名曰厥疝。○黑脉之至也。上堅而大。有積氣在小腹。與陰。名曰腎痺。脉色三十四

○腎脉微急。為沉厥奔脉。脉色十九

○寸口脉沉而橫。曰腸下有積。腹中有橫積痛。

脉色十六

○腎脉小急。肝脉小急。心脉小急。不鼓皆為瘕。

○三陽急為瘕。脉色二十四

○盛喘數絕者。則病在中。結而橫。有積矣。脉色十一

○手少陰之筋病。內急。心承伏梁。疾病六十九

○頰下逆額為大瘕。疾病四十四

○小腸移熱於大腸。為虛瘕。疾病四十六

○心脉緩甚為狂笑。○肺脉急甚為癲疾。○腎

脉急甚為骨癲疾。脉色十九

○肝悲哀動中則傷魂。魂傷則狂。志不精。○肺

喜樂無極則傷魄。魄傷則狂。狂者意不存人。

○藏象九

○太陽所謂甚則狂。巔疾者。陽盡在上而陰氣從下。下虛上實。故狂巔疾也。○病至則欲乘

高而歌。棄衣而走者。陰陽復爭而外并於陽。

故使之棄衣而走也。疾病十一

○刺灸癲狂。○癲疾者。疾發如狂者。死不治。○

病在諸陽脉。且寒且熱。諸分且寒且熱。名曰

狂。○病初發。歲一發不治。月一發不治。月四

五發。名曰癲病。鍼刺三十七

○石藥發癲。芳草發狂。疾病六十

○石之則陽氣虛。虛則狂。疾病三十八

消隔 二十

○二陽之病發心脾。其傳為風消。○一陽發病。其傳為隔。○二陽結謂之消。○三陽結謂之

隔。見疾病類六

○心移寒於肺。肺消。肺消者。飲一溲二。死不治。

○心移熱於肺。傳為鬲消。○大腸移熱於胃。

善食而瘦。又謂之食亦。○胃移熱於膽。亦曰

食亦。疾病四十六

○心脉微小為消痺。○肺脉微小為消痺。○肝脉微小為消痺。○脾脉微急為膈中。食飲入而還出。○脾脉微小為消痺。○腎脉微小為

消痺。脉色十九

○五藏皆柔弱者。善病消痺。疾病七十六

○五藏脆者。皆善病消痺。易傷。藏象二十八

○中熱消痺則便寒。○胃中熱則消穀。令人懸

心善饑。論治二

○痺成爲消中。疾病七十七

○肝傳之脾。病名曰脾風發痺。腹中熱煩心出

黃。疾病二十九

○身痛而色微黃。如黃瓜。爪甲上黃黃疸也。安

臥小便黃赤。脉小而寒者不嗜食。○冬傷於

寒。春生痺熱。脉色三十三

○腎所生病為黃疸。疾病十

○凡治消痺。肥貴人則高粱之疾也。○隔則閉

○絕。上下不通。則暴憂之病也。疾病七十八

○胃脉沉鼓濇。胃外鼓大。心脉小堅急。皆胃隔。脉色

二十

○胃風之狀。頸多汗惡風。食飲不下。膈塞不通。

疾病二十八

○氣為上膈者。食飲入而還出。○蟲為下膈。下

○膈者。食晬時乃出。鍼刺四十八

○

胎孕 二十

○陰搏陽別。謂之有子。見脉色類二十三

○婦人手少陰脉動甚者。在子也。脉色二十三

○有子無子。男盡七七。女盡八八。藏象十三

○督脉生病。女子不孕。經絡二十七

○帝曰。婦人重身。毒之何如。岐伯曰。有故無殞。

亦無殞也。論治十三

厥痺痿證 二十

○厥逆者。寒濕之起也。見脉色類三十二

○厥則目無所見。夫人厥則陽氣并於上。陰氣并於下。陽并於上。則火獨光也。陰并於下。則

足寒。足寒則脹也。疾疢八十九

○血之與氣。并走於上。則為大厥。厥則暴死。氣復反則生。不反則死。疾病十九

○脉至如喘。名曰暴厥。暴厥者。不知與人言。脉色

二十
四

○內奪而厥則為瘖俳。此腎虛也。少陰不至者

厥也。○肝氣當治而未得。故善怒。善怒者。名

曰煎厥。疾病十一

○陽氣者。煩勞則張。精絕辟積於夏。使人煎厥。

○陽氣者。大怒則形氣絕而血菀於上。使人

薄厥。疾病五

○三陽為病發寒熱。及為痿厥。臈瘡。○二陽一

陰發病。主驚駭背痛。善噫善欠。右曰風厥。疾病

類六

○脈俱沉細數者。少陰厥也。脈色二

○腎氣虛則厥。藏象十

○志不足則厥。疾病十八

○衝脈並少陰之經。故別絡結則跗上不動。不

動則厥。厥則寒矣。鍼刺二十

○氣逆者。足寒也。疾病十六

○下氣不足。則乃為痿厥。心悅。疾病七十九

○五絡俱竭。令人身脉皆動。而形無知也。其狀

若尸。或曰尸厥。鍼刺三十

○風逆。暴四肢腫。身漂漂。唏然時寒。饑則煩。飽

則善變。○厥逆為病也。足暴清。胃若將裂。腸

若將以刀切之。煩而不能食。脉大小皆濇。○

厥逆。腹脹滿。腸鳴。胃滿不得息。○諸厥之刺。

鍼刺五十

○一上不下。寒厥到膝。少者秋冬死。老者秋冬

生。疾病八十四

○厥在於足。宗氣不下。脉中之血。凝而留止。弗

之火調。弗能取之。鍼刺三十五

○陽明在泉。主勝則腰重。腹痛。少腹生寒。下為

鶩溇。則寒厥於腸。運氣三十

○陽明厥則喘而惋。惋則惡人。○厥逆連臑。則

死。連經則生。疾病十二

○臥出而風吹之。血凝於膚者為痺。凝於脉者為泣。凝於足者為厥。此三者血行而不得反其空。故為痺厥也。經絡二

○邪入於陰則痺。疾病二

○八風傷人。內舍於骨解。腰脊節腠理之間。為

深痺。鍼刺

○病在陽者命曰風。病在陰者命曰痺。陰陽俱

病。命曰風痺。鍼刺三

○陰痺者。按之不得。腰脊頭項痛。時眩。大便難。

陰氣不用。饑不欲食。欬唾則有血。心如懸。病

本於腎。運氣二十五太陰司天

○麤理而肉不堅者。善病痺。疾病七

○寒痺之為病也。留而不去。時痛而皮不仁。鍼刺

三十

○是人多痺氣也。陽氣少。陰氣多。故身寒如從

水中出。疾病四

○積寒留舍。榮衛不居。卷肉縮筋。肋肘不得伸。

內為骨痺。外為不仁。經絡八

○一呼脉三動。一吸脉三動。脉濇曰痺。脉色三

○病在筋。筋孿節痛。不可以行。名曰筋痺。○病

在肌膚。肌膚盡痛。名曰肌痺。傷於寒濕。○病

在骨。骨重不可舉。骨髓酸痛。寒氣至。名曰骨

痺。鍼刺五十

○風寒入舍於肺。名曰肺痺。發欬上氣。○肺即

傳而行之肝。病名曰肝痺。一名曰厥。脇痛出

食。疾病二十九

○按之至骨。脉氣少者。腰脊痛而身有痺也。脉色

二十

○厥陰之復。甚則入脾。食痺而吐。運氣二十八

○胃脉奕而散者。當病食痺。脉色二十

○心痺。肺痺。肝痺。腎痺。脾曰厥疝。脉色三十四

○南方者。其民嗜酸而食胙。其病攣痺。○中央

者其民食雜而不勞。故其病多痿厥寒熱。論治

類九

○心脉微大為心痺引背。○肺脉微緩為痿痺

偏風。○肺脉微大為肺痺引胃背。○肝脉微

大為肝痺陰縮欬引小腹。○脾脉緩甚為痿

厥微緩為風痿四肢不用。心慧然若無病。○

腎脉微急為沉厥微滑為骨痿坐不能起起

則目無所見。脉色十九

○精傷則骨痠痿厥精時自下。藏象九

○濕熱不攘大筋縵短小筋弛長縵短為拘弛

長為痿。疾病五

○陽明為闔闔折則氣無所止息而痿疾起矣。

經絡三十

○因於汗證二十四

○陽之汗以天地之雨名之見陰陽類四

○陽氣有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身

寒陰陽有餘則無汗而寒脉色二

○陽加於陰謂之汗脉色二

○陽勝則身熱腠理閉喘麤汗不出陰勝則身

寒汗出陰陽

○陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出也疾

類經三十一卷

會通類 汗證

三十一

三十

○津脫者腠理開汗大泄。藏象二十五

○血之與氣異名同類焉。故奪血者無汗。奪汗

者無血。故人有兩死。而無兩生。經絡二十三

○風從外入。令人振寒汗出。鍼刺三十六

○暑當與汗皆出。勿止。疾病四十一

○夏暑汗不出者。秋成風瘧。疾病二十七

○因於暑汗。煩則喘滿。靜則多言。體若燔炭。汗

出而散。○汗出偏沮。使人偏枯。○汗出見濕。

乃生痲痺。○勞汗當風。寒薄為皴。鬱乃痲。○

魄汗未盡。形弱而氣燥。穴俞以閉。發為風瘧。

疾病五

○魄汗未藏。疾病六

○驚而奪精。汗出於心。持重遠行。汗出於腎。疾

走恐懼。汗出於肝。搖體勞苦。汗出於脾。○飲

食飽甚。汗出於胃。醉飽行房。汗出於脾。運氣四十

四〇疾病
五十三

○勇而勞甚則腎汗出。○所謂玄府者汗空也。

鍼刺三
十八

○肉不堅腠理踈則善病風厥漉汗。疾病七

○炅則腠理開榮衛通汗大泄故氣泄矣。○勞

則喘息汗出外內皆越故氣耗矣。疾病二

○人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣

交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也。○

復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復

熱者是邪勝也。○汗出而脉尚躁盛者死。疾病

四十
三

○其多汗而濡者此其逢濕甚也陽氣少陰氣

盛兩氣相感故汗出而濡也。疾病六

○肺脉奕而散者當病灌汗。脉色

○尺瀼脉滑謂之多汗。脉色

○肺脉緩甚為多汗。脉色

○熱病而汗且出。及脉順可汗者。取之魚際。太淵大都太白。寫之則熱去。補之則汗出。汗出太甚。取內踝上橫脉以止之。鍼刺四十四

○臂太陰可汗出。足陽明可汗出。故取陰而汗出甚者。止之於陽。取陽而汗出甚者。止之於陰。鍼刺五十四

○肺病者背痛汗出。○腎病者汗出憎風。疾病十七

臥證五二十

○平旦陰盡陽氣出於目。目張則氣上行於頭。夜行於陰。而復合於目。見經絡類二十五

○陽氣盡陰氣盛則目瞑。陰氣盡而陽氣盛則寤矣。疾病七十九

○陰踦陽踦。陰陽相交。交於目。銳眦陽氣盛則瞑目。陰氣盛則瞑目。鍼刺四十四

○老人之不夜瞑。少壯之人不晝瞑。經絡二十三

○不能正偃者。胃中不和也。○諸水病者。故不得臥。臥則驚。驚則效甚也。疾病十一

○水病下為跗腫大腹。上為喘呼不得臥者。標

本俱病。鍼刺三十八

疝證 二十

○任脉為病。男子內結七疝。○督脉生病。從少

腹上衝心而痛。不得前後為衝疝。見經絡類二十七

○邪客於足厥陰之絡。令人卒疝暴痛。鍼刺三十一

○肝所生病為狐疝。疾病十

○足厥陰病。丈夫癘疝。婦人少腹腫。疾病十

○厥陰所謂癘疝。婦人少腹腫也。○陰亦盛而

脉脹不通。故曰癘瘰疝也。疾病十一

○足厥陰氣逆。則臑腫卒疝。經絡五

○三陽為病發寒熱。其傳為頽疝。疾病六

○足陽明之筋病。癢疝腹筋急。疾病六十九

○脾傳之腎病名曰疝瘕。少腹寬熱而痛。出白。

○一名曰蠱。疾病二十九

○腎下則腰尻痛。不可以俛仰。為狐疝。藏象二十八

○病在少腹。腹痛不得大小便。病名曰疝。得之

寒。鍼刺四十六

○寸口脉沉而弱。疝瘕少腹痛。○脉急者。疝瘕

少腹痛。脉色十六

○診得心脉而急。病名心疝。少腹當有形也。脉色十二

十二

○心脉微滑為心疝。引臍小腹鳴。○肝脉滑甚

為癘疝。○脾脉微大為疝氣。滑甚為癘瘕。瀼

甚為腸癘。微瀼為內癘。多下膿血。○腎脉滑

甚為癘癘。脉色十九

○青脉之至也。長而左右彈。有積氣在心下。支

胛。名曰肝痺。得之寒濕。與疝同法。○黃脉之

至也。大而虛。有積氣在腹中。有厥氣。名曰厥

疝。女子同法。脉色三十四

○腎脉大急沉。肝脉大急沉。皆為疝。心脉搏滑

急為心疝。肺脉沉搏為肺疝。三陰急為疝。脉色

二十

○陽明司天。丈夫癩疝。婦人少腹痛。運氣二

○陽明之勝。外發癩疝。運氣二

○太陰在泉。主勝甚則為疝。運氣三十

○歲太陽在泉。民病少腹控辜引腰脊。上衝心

痛。運氣二 ○太陽之復。少腹控辜引腰脊。上

衝心。運氣二

○小腹控辜引腰脊。上衝心。邪在小腸者。連辜

系屬於脊。鍼刺四

○小腸病者。小腹痛。腰脊控辜而痛。時窘之後

鍼刺二

十四

小腸

小腸

小腸

小腸

小腸

小腸

小腸

腸澼泄瀉 二十

○ 飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入

五藏入五藏則腹滿閉塞下為飧泄久為腸

澼。見疾病類十三

○ 腎所生病為腸澼。疾病十

○ 風客淫氣精乃亡邪傷肝也因而飽食筋脉

橫解腸澼為痔。疾病五

○ 脾脉外鼓沉為腸澼久自已 ○ 肝脉小緩為

腸澼易治。○腎脉小搏沉為腸澼下血。血温身熱者死。○心肝澼亦下血。二藏同病者可

治。其脉小沉澼為腸澼。其身熱者死。熱見七

日死。脉色二

○大便赤辦。飧泄。脉小者。手足寒。難已。飧泄。脉

小。手足温。泄易已。○春傷於風。夏生後泄。腸

澼。脉色三

○腎移熱於脾。傳為虛。腸澼死。疾病四

○陰陽虛。腸辟死。脉色二

○虛邪之中人也。留而不去。傳舍於腸胃。在腸

胃之時。責嚮腹脹。多寒則腹鳴。飧泄。食不化。

多熱則澹出糜。疾病十八

○脾虛則腹滿。腸鳴。飧泄。食不化。疾病十七

○清氣在下。則生飧泄。○春傷於風。夏生飧泄。

陰陽

○數動一代者。病在陽之脉也。洩及便膿。血脉色

二十

○肺脉小甚為泄。○腎脉小甚為洞泄。脉色十九

○尺寒脉細謂之後泄。脉色十六

○胃脉虛則泄。脉色二十

○志有餘則腹脹飧泄。疾病十八

○怒則氣逆甚則嘔血及飧泄。疾病二十六

○肝所生病者胃滿嘔逆飧泄。疾病十

○久風為飧泄。疾病十七

○飧泄取三陰。鍼刺四十七

○寒入下焦傳為濡泄。運氣二十七 太陽之勝

○腸溜。疾病四

○泄而脉大脫血而脉實皆難治。脉色十二

○濕勝則濡泄。運氣二十一

○諸病水液澄澈清冷皆屬於寒。○暴注下迫

皆屬於熱。疾病一

○并於陰則上下無常薄為腸澼。疾病八

○寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣。運氣

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

癰腫 二十

○汗出見濕乃生痲痺。○高粱之變足生大疔。

○勞汗當風寒薄為皴皸乃瘰。○營氣不從

逆於肉理乃生癰腫。見疾病類五

○陰與陽別寒與熱爭兩氣相搏合為癰膿。鍼刺

二類

○三陽為病發寒熱下為癰腫。疾病六

○虛邪之中人也搏於脉中則為血閉不通則

為癰。○熱勝其寒。則爛肉腐肌為膿。內傷骨。內傷骨為骨蝕。○邪氣中之。凝結日以易甚。連以聚居為昔瘤。○骨與氣并。日以益大。則為骨疽。○有熱則化為膿。無熱則為肉疽。疾

類四

○六府不和。則留結為癰。

經絡二十二

○五藏身有五部。伏兔一。腓二。背三。五藏之膈四。項五。此五部有癰疽者死。○凡刺之害。不

中而去。則致氣。致氣則生為癰疽也。

鍼刺五十四

○東方之域。其民食魚而嗜鹹。其病皆為癰瘍。

論治九

○肺脉微瀦為鼠瘻。在頸支腋之間。○肝脉大

甚為內癰。善嘔衄。○腎脉瀦甚為大癰。脉色十九

○少陽厥逆。發腸癰不可治。驚者死。疾病三十五

○歲水不及。民病寒瘍流水。運氣十

○邪溢氣壅。脉熱肉敗。榮衛不行。必將為膿。內

銷骨髓外破大腠留於節湊必將為敗經絡八

○之溫熱者瘡運氣十六

○所謂少鍼石者非癰疽之謂也癰疽不得頃

時回○癰不知所○按癰○暴癰鍼刺十五

雜病二十九

○風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕

勝則濡寫見陰陽類一○運氣類二十一

○搏脈痺歷寒熱之交脈孤為消氣虛泄為奪

血孤為逆虛為從論治十四

○大則病進脈色二十一

○中外病一春脈如弦其氣來實而弦此謂太

過病在外其氣來不實而微此謂不及病在

中。○夏脉如鈞。其氣來盛去亦盛。此謂太過。病在外。其氣來不盛去反盛。此謂不及。病在中。○秋脉如浮。其氣來毛而中央堅。兩傍虛。此謂太過。病在外。其氣來毛而微。此謂不及。病在中。○冬脉如營。其氣來如彈石者。此謂太過。病在外。其去如數者。此謂不及。病在中。○四時脾脉。其來如水之流者。此謂太過。病在外。如鳥之喙者。此謂不及。病在中。俱脉色十

寸口脉沉而堅者。曰病在中。寸口脉浮而盛者。曰病在外。○脉盛滑堅者。曰病在外。脉小實而堅者。病在內。俱脉色十六○病在中。脉虛。病在外。脉濇。堅者皆難治。○病在中。脉實。堅。病在外。脉不實。堅者皆難治。俱脉色十二○盛喘數絕者。則病在中。脉色十一○病在中。而不實不堅。且聚且散。論治六

○新久病。脉小弱以濇。謂之久病。脉滑浮而

而疾者謂之新病。脉色十六○新病久病毀傷脉

色。脉色三十六○其久病者病去而瘠必養必和

待其來復。論治十二

○暴病太陽為開開折則肉節瀆而暴病起

矣。經絡三十

○解休冬脉太過則令人解休脊脉痛而少

氣不欲言。脉色十○尺脉緩濇謂之解休。脉色十六

○足少陽之瘡令人身體解休寒不甚熱不

甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚。疾病五十

○刺骨無傷髓髓傷則銷鑠筋酸體解休然

不去矣。鍼刺六十三

○食亦大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食

亦胃移熱於膽亦曰食亦。疾病四十六

○毀傷肝與腎脉並至其色蒼赤當病毀傷

不見血已見血濕若中水也。脉色三十六○人有

所墮墜惡血留內腹中滿脹不得前後先飲

利藥。此上傷厥陰之脉。下傷少陰之絡。鍼刺三十

○痺 痺之為病也。身無痛者。四肢不收。智亂

不甚。其言微知可治。甚則不能言。不可治也。

鍼刺三十六

○大僕 陽氣者。精則養神。柔則養筋。開闔不

得。寒氣從之。乃生大僕。陷脉為癘。疾病五

○體重 肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩寃。疾病

九 ○少陽所謂不可反側者。陰氣藏物也。物

藏則不動。故不可反側也。疾病十一

○柔痊 肺移熱於腎。傳為柔痊。疾病十六

○譫妄 厥陰厥逆。前閉譫言。疾病十五 ○陽盛

則使人妄言。罵詈不避親疎。疾病十二

○膈洞 太陰為開。開折則倉廩無所輸。膈洞。

在開折者。氣不足而生病也。經絡三十 ○腎脉微。

緩為洞。洞者食不化。下嗝還出。脉色十九

○重強 脾脉不及。則令人九竅不通。名曰重

強脉色

○蛟螭 心腸痛懷作痛腫聚往來上下行痛

有休止腹熱喜渴涎出者是蛟螭也鍼刺四十六

○脾脉微滑為蟲毒蝮蝎腹熱脉色十九

○齩齒 診齩齒痛按其陽之來有過者獨熱

在左左熱在右右熱在上上熱在下下熱脉色

三十 ○手陽明實則齩齒經絡五

○五運太過不及下應民病運氣十

○五運三氣之病運氣十三

○天氣地氣制有所從之病運氣十四

○六十年運氣政令之病運氣十七

○五鬱之發為病運氣十三

○天地淫勝病治運氣十五

○六氣相勝病治運氣十七

○六氣之復病治運氣十八

○客主勝而無復病治運氣三十

○升降不前。氣變民病之異。運氣三十八

○不遷正退位。氣變民病之異。運氣四十

○刺治諸病。鍼刺五十三

死證十三

○得神者昌。失神者亡。見論治類十七

○人以水穀為本。故人絕水穀則死。脉無胃氣

亦死。脉色十二

○人無胃氣曰逆逆者死。脉色十一

○所謂陰者真藏也。見則為敗。敗必死也。○別

於陽者知病處也。別於陰者知死生之期。脉色

二十
六

○五藏主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛

陰虛則無氣無氣則死矣藏象九

○心傷則神去神去則死矣鍼刺二

○五藏已敗其色必夭夭必死矣脈色五

○平人而氣勝形者壽病而形肉脫氣勝形者

死形勝氣者危矣藏象十五

○大骨枯槁大肉陷下胃中氣滿喘息不便其氣動形期六月死真藏脉見乃予之期日

二十七通章宜察

○形弱氣虛死形氣有餘脉氣不足死脉氣有

餘形氣不足生脈色七

○形盛脉細少氣不足以息者危○形瘦脉大

胃中多氣者死○目內陷者死○脫肉身不

去者死○足太陽氣絕者其足不可屈伸死

必戴眼○寒熱病者以平旦死○熱中及熱

病者以日中死○病風者以日夕死○病寒

者以夜半死。○形肉已脫。九候雖調猶死。○
皮膚著者死。○瞳子高者太陽不足。戴眼者
太陽已絕。此決死生之要。不可不察也。脉色類二

五十

○陰陽皆脫者暴死。藏象三十

○陰陽如一者病難治。鍼刺二十三

○人生有兩死而無兩生。經絡二

○心怵惕思慮則傷神。毛悴色夭死於冬。○脾

愁憂不解則傷意。毛悴色夭死於春。○肝悲

哀動中則傷魂。毛悴色夭死於秋。○肺喜樂

無極則傷魄。毛悴色夭死於夏。○腎盛怒不

止則傷志。毛悴色夭死於季夏。藏象九

○陰陽俱動。乍有形。乍無形。加以煩心。命曰陰

勝其陽。此謂不表不裏。其形不久。鍼刺三十一

○熱病七日八日。脉微小。病者。溲血。口中乾。一

日半而死。脉代者。一日死。○熱病已得汗出。

而脉尚躁喘且復熱勿刺膚喘甚者死○熱病七日八日脉不躁躁不散數後三日中有汗三日不汗四日死○熱病不知所痛耳聾不能自收口乾陽熱甚陰虛有寒者熱在髓死不可治○熱病已得汗而脉尚躁盛此陰脉之極也死其得汗而脉靜者生○熱病者脉尚盛躁而不得汗者此陽脉之極也死脉盛躁得汗靜者生○熱病不可刺者有九一

曰汗不出大額發赤噦者死○二曰泄而腹滿甚者死○三曰目不明熱不已者死○四曰老人嬰兒熱而腹滿者死○五曰汗不出而下血者死○六曰舌本爛熱不已者死○七曰熱而衄汗不出出不至足者死○八曰驚熱者死○九曰熱而瘕者死腰折癭癢齒噤齟也熱刺四十

○熱病脉靜汗已出脉盛躁是一逆也病泄脉

洪大是二逆也。著痺不移，腠肉破，身熱，脈偏絕，是三逆也。淫而奪形，身熱，色夭然白，及後下血，衄血，衄篤重，是謂四逆也。寒熱奪形，脈堅搏，是謂五逆也。鍼刺五十八

○風熱而脈靜，泄而脫血，脈實，病在中，脈虛，病在外，脈濇，堅者皆難治。○形氣相失，謂之難治。脈逆四時為不可治。○病在中，脈實，堅，病在外，脈不實，堅者皆難治。脈色十二

○色夭，面脫，不治，百日盡已。○脈短，氣絕，死，病

溫虛甚死。○易，重陰死，重陽死。論治十四

○死陰之屬，不過三日而死。生陽之屬，不過四日而已。所謂生陽，死陰者，肝之心，謂之生陽。心之肺，謂之死陰。肺之腎，謂之重陰。腎之脾，謂之辟陰。死不治。疾病六

○不治。法三月若六月。若三日若六日，傳五藏而當死，是順傳所勝之次。故曰別於陽者，知

病從來別於陰者。知死生之期。藏象二一十四

○中執法者其病速而危。中行令者其病徐而

持。中貴人者其病暴而死。運氣七

○真頭痛頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治

鍼刺四十三

○嬰兒病其頭毛皆逆上者必死。脈色三十三

○壞府無治。鍼刺九

○諸經脈證死期。脈色二十四

○真藏脈死期。脈色一十八

○陰陽虛搏病候死期。脈色二十九

○骨寒熱者齒已槁死不治。鍼刺四十一

○曾美慈者曾甘高致不宗
 ○劉國盡餘餘孫
 ○真蘇州子膜

