

136  
7  
492

醫學士 孫利 聯訂正  
千日 亮編纂

實用新治療書 全

編者 藏梓

特65  
275


醫學士保利 聯訂正

千日 亮編纂

實用新治療書 全

編者 藏梓

No 23556/22



千日吾編スル所ノ實用新治療書成ル。

十八百八十七年刊行獨逸

カロモン氏ノ治療書 (Handbuch

der speziellen Therapie. von Dr. Max Salomon.)

近歐米新誌ノ類ヨリ斬新ノ處

我醫科大學内科教師ドクトル

ヘルツ氏ノ處方及第一醫院ニ於テ常用スル

處方ヲ併記シ壹ラ實地醫家ノ便益ヲ圖リタ



ルモノナリ。余ハ讀者諸彦ニ告ク、編者カ  
此書ヲ編スルヤ實地醫家ノタメニ心ヲ用ヒ  
タル一殊ニ深シ、而ノ尚保利醫學士ノ檢閱  
校訂ヲ經テ始メテ之ヲ世ニ公ニス、故ニ實  
地醫家診病投藥ニ苦シムノ際此書ヲ顧ミル  
キハ實ニ其良師タリ好友タルニ背カサル一  
ヲ了知スルナルヘシ。若夫レ此書ノ價值ト  
裨益トニ至リテハ余之ヲ言ハス自ラ讀者諸

彦ノ公評アラシ。余ハ千日君ト同郷ノ因ア  
ルニヨリ、需ニ應シテ、此書ノ卷首ニ一言ヲ  
叙スル一斯ノ如シ。

明治廿二年十一月廿五日

富士川 游。

中外醫事新報編輯局ニ於テ

凡例

- 一 此書病名ヲ排列スルニ其頭音ノ伊呂波順ニ從フ但シ繁雜ヲ憂ヘテ「井」「イ」「オ」「ナ」「エ」「ニ」ニ混ゼリ
- 一 藥量ハ總テ瓦蘭謨系統ニ依ル其氏字等トノ比較ハ別表ニ掲ケテ之ヲ示ス
- 一 書中往々——ヲ記スモノアリ是レ乃至ノ略符ナリ
- 一 處方ノ下括弧ノ間ニ人名ヲ記スルモノハ該法常用者ト知ルベシ
- 一 此書別ニ中毒篇、日本藥局方極量表、新藥極量表ヲ附録ス

編者識

實用新治療書目次

以之部  
呂之部  
波之部  
仁之部  
邊之部  
登之部  
知之部  
利之部  
留之部  
遠之部

一  
二十二  
二十六  
五  
五十二  
五十五  
五十八  
七十六  
七十八  
八十八

○目次

一

加  
之  
部  
與  
之  
部  
多  
之  
部  
禮  
之  
部  
會  
之  
部  
津  
之  
部  
奈  
之  
部  
羅  
之  
部  
宇  
之  
部  
乃  
之  
部  
久  
之  
部  
麻  
之  
部

八十四丁  
九十二丁  
全丁  
九十四丁  
九十七丁  
全丁  
百丁  
百一丁  
百三丁  
百四丁  
百九丁  
百十二丁

計  
之  
部  
不  
之  
部  
古  
之  
部  
江  
之  
部  
天  
之  
部  
安  
之  
部  
佐  
之  
部  
幾  
之  
部  
美  
之  
部  
志  
之  
部  
比  
之  
部  
毛  
之  
部

百十四丁  
百十七丁  
百二十三丁  
百三十丁  
百三十一丁  
百三十四丁  
全丁  
百三十五丁  
百四十五丁  
百四十六丁  
百六十三丁  
百六十九丁

世之部  
壽之部



全丁  
百七十七丁

附錄


中毒篇

百七十九丁

實用新治療書目次終



實用新治療書



醫學士

保利  
千日

聯訂正



○以

頸部ニ捲キ其上ヲ油紙ニテ被ヒ以テ蒸氣ヲ起サシメ通常六時間毎ニ交換  
スルモノトス)ヲ行ヒ格魯兒酸加里水(五十倍)明礬水(百倍)石炭酸水(百  
倍)撒里矢爾酸水(三百倍)硼酸水(百倍)等ノ含嗽藥ヲ適宜撰用シ嗅入藥

大單純温護法ニテ治癒スルモノナリ然レモ往  
ニ際ソ一般稱揚スル所ノモノハ左ノ如シ  
ノリスニツツ氏ノ羅法(布帶ヲ冷水ニ浸シ之ヲ  
外治法トシテ身體ヲ温護シ)



○以

ニハ石炭酸水(三百倍)重炭酸那篤留母水(百倍)等ヲ試用スト雖凡是レ唯劇症ニ於テノミ行フヘキモノニ多クハ單純格魯兒酸加里水ノ含嗽ノミニテ足レリトス

内治法ニハ發汗劑殊ニ撒里矢爾酸那篤留母、規尼涅、安質必林、安質歌貌林等ヲ賞用シ時トシハ甘汞下劑ヲ要スルヲアリ以上多クハ感冒性ノモノヲ揭クト雖モ其原因ニ由リ療法モ亦小異ナカル可ラス宜ク注意ス可シ

○撒里矢爾酸那篤留母三・〇 苦味丁幾二・〇 餹水一・〇・〇

右一日三回分服

○鹽酸規尼涅一・〇 覆盆子舍利別一五・〇 餹水一・〇・〇

右一日三回分服(サロモン氏)

○安質必林〇・五白糖〇・五 右頓服(臨臥或ハ每四時)

○安質歌貌林〇・三乳糖〇・五 右頓服(臨臥或ハ每三時)

二

○結晶石炭酸三・〇 佩里設林一・〇・〇 水三〇〇・〇 右含嗽料

○鹽酸「ピロカルペン」〇・〇 一 餹水一・〇 (一回量)皮下注入料

○硫酸依的兒ヲ噴霧器ニ入レ口蓋ニ撒布ス(ブフハリニ氏)

(慢性症)飲酒喫烟及辛辣性ノ香料ヲ禁シ可及的攝生法ヲ守ラシメ藥劑ニハ單純含嗽藥、硝酸銀塗布法等ニテ別ニ煩ハシキ療法ヲ要セサルヲアリト雖モ其原因ニ隨ヒ頑固症ニハ本病急性症ニ舉クル所ノ含嗽藥ノ他尙ホ鞣酸水(二百倍)食鹽水(百倍)臭素加里水(二百倍)皓礬水(二百倍)等ノ含嗽藥ヲ與ヘ或ハ前陳ノ嗅入法ヲ試用シ或ハ硝酸銀水、皓礬水、沃度加里劑等ヲ塗布シ内用藥ニハ格魯兒酸加里ヲ用ヒ其他冷水浴若クハ硫黃泉ノ屢々効ヲ奏スルヲアリ

○格魯兒酸加里一・〇 橙皮舍利別適宜餹水一・〇・〇 右一日三次分服

○枯礬一・〇 臭素加里五・〇 鞣酸一・五 亞刺昆亞護膜漿、精蜜各二五・〇

○以

三

玫瑰水二〇〇〇 温水二〇〇〇 右含嗽料(ツエルツエル氏)

○皓礬二・五 薄荷水五〇〇〇 右含嗽料(エンドレル氏)

○硝酸銀一・〇 韶水一〇〇〇乃至一五〇〇 右塗布料(サロモン氏)

○皓礬〇・五 韶水一〇〇〇乃至一五〇〇 右塗布料(サロモン氏)

○沃度加里三・〇 沃度〇・五 偏里設林二〇〇〇 右塗布料

### ◎咽後膿腫

早ノ既ニ該症タルヲ認知スルキハ直ニ切開ノ患者ヲ前方ニ屈曲セシム可  
シ若シ事急ニ出ルキハ指爪ヲ以テ膿腫ヲ爬破スルヲアリ爾後ノ療法ハ石  
炭酸水(百倍)ノ含嗽藥ヲ與フ可シ

### ◎胃管炎

加答兒性ト中毒性トヲ問ハス凡テ粘液漿ヲ與ヘ強劇ノ下劑ヲ投シ氷片ヲ  
嚥下セシムル等ノ療法ヲ施ス異物性ノモノハ宜シク異物ノ除去法ニ汲々

ス可シ

### ◎胃管擴張症

唯外科術ノ一法アルノミ

### ◎胃管狹窄症

須ク英國製消息子ヲ挿入ノ異物狹窄(手術ニ由テ除去シ得ヘキ新生物ノ  
外)及癒痕狹窄ノ擴張ヲ勤ム可シ癌腫ノ如キハ通常「コンツランゴ」皮ヲ  
用フレニ奏効ナシ滋養灌腸法(殊ニ雞卵ノ如キ)ハ往々用フヘキ者ナリ

### ◎胃管痙攣症

多クハ歇私的里ノ療法ヲ行フテ足ルモノトス

### ◎胃加答兒

(急性症)少シク緩解スル迄ハ務テ節食法ヲ命シ(絶食或ハ少量ノ稀粥ニ  
雞卵ヲ混セル者ヲ與フル等)食物猶ホ停滯スルノ感アルキハ之ヲ排除法

(催吐及瀉下ノ兩法)ハ甚タ必要ナリ

甲 催吐ニハ

○「アポモルヒチ」〇・〇一 餾水一・〇(一回量) 右皮下注入料

○吐根三・〇 沸湯九〇・〇ニ浸シ濾過ノ用ヲ

右毎十分時少量宛チ内服セシメ吐ヲ得テ止ム

○指頭ヲ以テ咽部ヲ癢スルノ法

乙 瀉下ニハ

○掘里設林四・〇一五・〇(ベルツ氏)二・五一四・〇(ノフォトニー氏)

右何レモ「スポイト」ニテ直腸ニ輸入ス

○綠石鹼水 右灌腸料

○蓖麻子油一五・〇乃至二〇・〇 右糖水ニ浮ヘ頓服(一回量)

○加爾々私泉鹽一五・〇 温水ニ溶シ頓服(一回量)

○甘汞〇・五 蒺刺巴末〇・五 右調和頓服(一回量)

然ル後重炭酸那篤留母水、里母那埜及冷水等ヲ與ヘ時トノハ苦味丁幾、番

木鼈丁幾龍膽丁幾等ノ苦味劑ヲ投スルコアリ

劇痛ニハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入若クハ抱水格魯刺兒ノ灌腸法單純誘導

灌腸等ヲ施シ或ハ心窩ニ芥子泥ヲ貼スルコアリ

嘔吐ニハ大抵莫爾比涅ノ皮下注入或ハ以上ノ灌腸法ニテ鎮靜スト雖モ頑

固ナル者ニハ宜シク嘔吐ノ欄ヲ參照ス可シ

○重炭酸那篤留母二・〇 苦味丁幾二・〇 餾水一〇〇・〇

右一日三回分服

○稀鹽酸〇・五 單舍利別一五・〇 餾水一〇〇・〇 右一日三回分服

以上二劑ハ催吐若クハ瀉下法ノ後治藥トス

○鹽酸莫爾比涅〇・〇一 餾水一・〇(一回量) 右皮下注入料

〇抱水格魯刺兒一〇乃至二〇 亞刺昆亞護膜漿五〇〇 温水五〇〇

右灌腸料(サロモン氏)

〇重炭酸那篤留母一〇 鹽酸莫爾比涅〇〇一 次硝酸蒼鉛〇〇三

右調和一回頓服

〇煨製麻偏涅矢亞五〇 餾水一〇〇〇 右一日三回分服(制酸)

〇稀鹽酸〇〇五 番木鱈丁幾〇〇七 單舍利別五〇〇 餾水一〇〇〇

右一日三回分服(調胃)(サロモン氏)

(慢性症)原因療法ヲ第一トシ對症療法ハ第二ニ位ス

第一 原因療法

(甲)攝生法 稀粥、雞卵、牛乳、肉羹汁、人工的肉「ペプトーネ」等ヲ少量ニ用ヒ漸々快方ノ摸樣ヲ見テ始テ固形ノ食物(少量)ニ移ル可シ決ノ過量ナル可ラス(飲料ニハ「セルテル」水ヲ良トス)又禁忌タルモノハ酒類、蔬菜、

菓實諸般ノ苛烈物、強酸味或ハ鹽漬物、味噌及凡テノ醗酵ヲ催スヘキ者等ナリ

(乙)消化不良 貧血ニ起因スル者ハ稀鹽酸、鐵劑等ヲ少量ニ與ヘ神經性ノ者ニハ轉地療養、冷水灌漑法及番木鱈丁幾ノ内服等ヲ試ム可シ其他肝臟病ニハ加爾々私泉鹽、心臟病アル者ニハ實斐答里斯ヲ配伍ス可シ

(丙)胃洗滌法 胃唧筒ヲ以テ器械的療法ヲ行フニアリ之ニ適スルモノハ異常ノ醗酵及分解產物ノ過多等ナリ而シテ其醗酵ノ成ル所ノ物質酸性ナルキハ亞爾加里劑ヲ用ヒ亞爾加里性ナルキハ酸類ヲ用フ可シ

〇稀鹽酸〇〇五 「ペプシチ」(上等品)三〇〇 橙皮舍利別三〇〇 葡萄酒一〇〇〇 餾水一〇〇〇

右一日三次分服(消化不良)

〇「ペプシチ」〇〇五 乳酸〇〇五 澱粉〇〇六

右爲一包每食後服用(消化不良)(コルピザール氏)

- 加爾々私泉鹽四・○苦味丁幾二・○温水一〇〇〇
- 右一日三次分服(消化不良)
- 水製大黃丁幾三・○重炭酸那篤留母二・○橙皮舍利別三・○餾水一〇〇〇
- 右一日三回分服(消化不良)
- 稀鹽酸〇・五番木甞丁幾一・○單舍利別三・○餾水一〇〇〇
- 右一日三回分服(消化不良)
- 結麗阿曹篤三滴 綿多油半滴單舍利別三・○水一〇〇〇
- 右一日三回分服(消化不良)
- 加爾々私泉鹽一〇〇〇 餾水五〇〇〇
- 右胃洗滌料(醫科大學方府)
- 重炭酸那篤留母四・○餾水四〇〇〇
- 右胃洗滌料
- 撒里矢爾酸那篤留母一・三 餾水四〇〇〇
- 右胃洗滌料
- 智母兒一・○餾水一〇〇〇
- 右胃洗滌料(醫科大學方府)

第二 對症療法

(甲)異常醱酵抑制劑及制酸劑

- 撒里矢爾酸〇・五乃至一・○ 温湯一〇〇〇
- 右一日三次分服(醱酵)(ストリユムヘル氏)
- 撒里矢爾酸那篤留母一・○ 右爲一包一日三服用
- (醱酵)(醫科大學方府)
- 石炭酸一・○ 大黃末五・○ 亞刺毘亞護謨末適宜
- 右丸爲五十粒膠ヲ衣トシテ每食後一丸ヲ服ス(醱酵)
- (ハ、エ、リヒテル氏)
- 結麗阿曹篤一・○ 亞刺毘亞護謨末適宜
- 右丸爲四十粒着衣每食後一丸ヲ服セシム(醱酵)(ブット氏)
- 重炭酸那篤留母、木炭末各一・五 白糖適宜薄荷油半滴

右調和爲三包每食後服用 (制酸) (ボスチル氏)

○重炭酸那篤留母三・〇 苦味丁幾二・〇 餾水一〇〇・〇

右一日三次分服(制酸)

○煨製麻俯涅矢亞四・〇 餾水一〇〇・〇

右一日三回分服(制酸) (サロモン氏)

○重炭酸那篤留母一・〇 次硝酸蒼鉛〇・二五

右調勻爲一包一日量三包乃至五包ヲ服セシム (醫科大學方府)

(乙) 疼痛ヲ兼ル者

○重炭酸那篤留母二・〇 鹽酸莫爾比涅〇・〇 二次硝酸蒼鉛一・〇

右調和爲三包疼痛時頓服

○重炭酸那篤留母三・〇 老利兒水三・〇 非沃斯越幾斯〇・三 餾水一〇

右一日三次分服

○亞硝酸「アミール」二三滴布片ニ浸シ嗅入セシム

(丙) 常習便秘ヲ兼ル者

○加爾々私泉鹽一五・〇 苦味丁幾二・〇 溫水一〇〇・〇

右一日三次分服

○重炭酸那篤留母二・〇 別刺敦那越幾斯〇・一

右調和一日三次分服

(丁) 強壯健胃劑

○「コンツランゴ」皮一五・〇 (煎二〇〇・〇) 「スヒナセルヒナ」舍利別

(リーゲル氏)

三〇・〇 右調和每食後三〇・〇宛服用

○良姜一五・〇 赤葡萄酒二〇〇・〇 右浸漬二時間ヲ經テ濾過シ尙ホ甘

硝石精三・〇 橙皮舍利別三〇・〇ヲ加ヘ毎回一五・〇一日四回服用

(サロモン氏)

○龍膽、橙皮各四・〇 枸橼皮八・〇 右沸湯三〇〇・〇ニ蘸シ後濾過ノ每  
 回三〇・〇乃至六〇・〇ヲ服用セシム一日數回(フ、ブリット氏)

○番木鱉丁幾一・〇 水製大黃丁幾三・〇 餾水一〇〇・〇

右一日三次分服(醫科大學方府)

○ライプ氏肉腓灌腸法 肉ヲ細挫ノ(大約百五十瓦)之ヲ腓ノ細挫セル  
 脂肪無キ者(凡五十瓦)ト混和シ微温水(大約百瓦)ヲ注キ以テ稀粥狀  
 ト爲ス(一回量) 但シ此法ヲ施ス一時間程前微温水ヲ以テ直腸ヲ洗  
 滌シ置クヲ良トス

其他症ニ應ノ種々ノ藥品ヲ用フ宜シク內科書ヲ參照ス可シ

○胃瘰

急性胃加答兒ノ條ヲ參照ス可シ

○胃擴張症

食物攝生法ヲ第一トシ次ニ器械的療法(胃唧筒、吸液裝置)ヲ行フ其他ハ  
 只姑息法アルノミ

○「レゾルチン」一〇・〇 餾水五〇〇・〇 右胃洗滌料(ストリニムベル氏)

○重碳酸那篤留母一〇・〇 餾水五〇〇・〇 右胃洗滌料

○加爾々私泉鹽一〇・〇 餾水五〇〇・〇 右胃洗滌料(醫科大學方府)

○鞣酸〇・九 白糖適宜右爲五包一日數次服用(ポイランド氏)

○加爾々私泉鹽一二・〇 苦味丁幾二・〇 餾水一〇〇・〇 右一日三次分服

○番木鱉丁幾一・五 水製大黃丁幾四・〇 餾水一〇〇・〇

右一日三次分服(醫科大學方府)

○胃痛

原因ヲ考察シ亞硫酸加留母液、番木鱉丁幾、硝酸銀等ヲ撰用ス可シ其他ハ  
 急慢胃加答兒ノ條ヲ參看セヨ

### ◎胃痛

未タ治法ノ完全ナルモノヲ聞カス只對症療法ト滋養物投與ノ二法アルノ  
ミ「コンツランゴ」皮ハ往々用フルモ多クハ無効ニ屬ス

◎「コンツランゴ」越幾斯二〇〇 抱水格魯刺兒〇・五乃至二・〇 留水一八

〇〇〇 橙皮舍利別三〇〇〇 右調勻毎回一五〇〇 一日四回乃至六回服用

### ◎胃潰瘍

(ウシナ氏)

嚴重ノ攝生法ヲ行ヒ(ロイベ氏肉溶液或ハ人工肉「ペプトーチ」等ヲ與フ)  
内科書ニ見ユ少クモ三四週實施セサル可ラス藥劑ニハ加爾々私泉鹽ノ頓服(一  
五〇〇温湯ニ溶シ毎朝用フ)ヲ最良トス然レモ通常賞用スルモノハ次ノ  
如シ

◎鉛糖〇・〇五 阿片〇・〇二 白糖〇・五 右調和爲一包一日三包服用

(サロモン氏)

◎一半格魯兒鐵丁幾四滴乃至五滴 右留水ニ和シ服用一日四回

(ゲルハルド氏)

◎硝酸銀〇・〇一 白礬土適宜 偏里設林適宜 右九一粒トナシ白礬土ヲ  
衣ス同量十粒ヲ作リ一日三丸宛服用

◎次硝酸蒼鉛一・二 鹽酸莫爾比涅〇・〇一 重炭酸那篤留母二・〇  
右調勻爲三包一日三次服用

◎醋酸莫爾比涅〇・〇六 老里兒水二〇〇〇 右混和毎回十五滴乃至二十  
滴宛留水ニ和シ一日四回服用(サロモン氏)

其他劇痛ニハ鹽酸莫爾比涅(一回〇・〇一)ノ皮下注入ヲ行ヒ胃部ニ芥子  
泥ヲ貼シ劇出血ニハ可成安靜ヲ旨トシ氷片ヲ含マシメ麥角越幾斯(一回  
〇・一五留水一〇〇)ノ皮下注入ヲ行フコトアリ



〇遺尿

注意ヲ旨トシ小兒ノ如キハ決メ叱責ス可ラス藥劑ニハ強壯劑及麻醉藥ヲ要ス時トシ冷水坐浴ノ奏効スルコトアリ或ハ電氣ヲ通スルコトアルモ多クハ大人ニ限ルハルキン氏ハ項部ニ吸角、發泡等ヲ行ヒ効ヲ得タリト云フ

〇複方機那丁幾 毎回五滴乃至十滴若クハ十五滴(小兒年齡ニ應ジ糖  
水ニ和シ一日三回服用(サロモン氏))

〇番木鱉丁幾二・〇 林擒酸鎂丁幾四・〇 餹水六・〇

右調勻毎服十二滴乃至二十四滴糖水ニ和シ一日三次(レベルト氏)

〇羯答利斯丁幾一滴乃至二滴 右清水ニ滴シ一日三回服用

〇硫酸亞篤魯比涅〇・〇一 老利兒水一〇・〇

右調和毎臨臥五滴乃至十滴ヲ冷水ニ和シ服用(サロモン氏)

〇沃度鎂舍利別一・〇一三・〇 單舍利別適宜 餹水二〇・〇一六〇・〇

右一日量三四回服用

〇番木鱉越幾斯〇・二四 酸化亞酸化鎂三・〇 括矢亞末三・〇(アビシナ  
舍利別適宜 右丸二十粒トナシ一日一九一三丸ヲ與フ(グリソン氏))

〇遺精

冷水浴、冷水洗滌法等ハ有効ノモノナリ而シテ最モ注意ス可キハ夜間ノ飲食及仰臥ヲ戒メサル可ラス藥劑ニハ強壯藥ヲ處シ時トシハ轉地療養ノ奏効スルコトアリ

〇龍腦〇・〇一 乳糖適宜 散爲三包一日量

〇臭素龍腦〇・三 膠囊ニ包ミ三箇トナシ一日三次服用(ガタウルト氏)

〇臭素加里二・〇 茴香油一滴 餹水一〇〇・〇 右一日三次服用

(サロモン氏)

〇番木鱉越幾斯二・五 甘草膏四・〇 右丸五十粒トナシ毎日一九宛ヲ與

フ(充分注意セサル可ラズ)(ドクross氏)

○「ストリヒチ」〇・〇〇二 右一丸ノ量、同量數包ヲ作り毎食後ニ一丸ヲ與フ(醫科大學方府)

其他消息子ヲ挿入シ或ハ電氣流通等ノ治法アリ

○陰萎

先ツ手淫、房事等ヲ嚴禁シ次テ強壯療法ヲ行フ(遺精ノ療法ト大差ナシ)

○陰門搔痒

原因療法ヲ主トシ兼テ炭酸加里ヲ加ヘタル温坐浴ヲ命ス可シ

○石炭酸水(六十倍乃至二十倍)患部塗布(シコロエデル氏)

○昇汞〇・五乃至一・〇 龍腦精五〇・〇 韶水三〇〇・〇 洗滌料

(レベルト氏)

○硼酸那篤留母四・〇 沸湯五〇〇・〇 餘ニ溶解シ 綿多油五滴 洗滌料

(アマレド、ロート氏)

○萎黃病

勉メテ散步ヲ命シ滋養品ヲ與ヘ或ハ時トノ結婚ノ偉効ヲ奏スルコトアリ藥劑ニハ鐵ヲ以テ特效藥トス其他冷水浴、海水浴、微温浴悉ク効アリ

○還元鐵四・〇 甘草末適宜 蒲公英越幾斯ヲ以テ丸五十粒トナシ毎回

三丸乃至四丸ヲ服用(食後)セシム

但シ乳酸鐵、枸橼酸鐵、及枸橼酸鐵規尼涅等皆以上ノ方法ニ由テ製

造シ用フ

○林檎酸鐵丁幾三・〇 韶水一〇〇・〇 右一日三次分服

○硫酸鐵、炭酸加里、各一五・〇 蜀葵根末「タラカント」護謨各適宜

右丸百二十粒トナシ毎服三粒乃至五粒一日三回(ニーマイエル氏)

○酒石酸鐵加留母六・〇 甘草羔三・〇 亞刺比亞護謨末適宜丸五十粒ト

爲シ毎回六丸乃至四丸一日三回服用(レベルト氏)  
 凡テ鐵劑ハ每食後ニ服用ス可シ若シ加苔兒ヲ起スキハ暫時休止セサル可  
 ラス

呂之部

◎肋膜炎

必ス其病狀時期ニ注意ス可シ即チ初期ニハ患部ニ乾角、水囊、芥子泥等ヲ  
 貼シ次テ解熱利尿ノ目的ヲ立テ終リニ肋膜ノ癒着ヲ防キ又滲出物減退ノ  
 模様ナシ呼吸窘迫等ノ症ヲ現ハスキハ宜シク穿胸術ヲ行フ可シ此間時期  
 ナ伺ヒ沃度叻軟膏、水銀軟膏、沃度丁幾、底列並油、錫答里斯膏、格魯兒叻  
 等ノ藥劑ヲ患部ニ塗擦ス可シ内服藥中通常用ユル者ハ左ノ如シ  
 ◎實斐答里斯末、甘汞各〇・〇六右散爲一包同量數包ヲ作り毎二時一

包ヲ服用セシム(フレンツェル氏)

- ◎實斐答里斯葉(〇・五)浸二〇〇〇 撒里矢爾酸那篤留母三・〇 醋酸  
 加里五・〇 單舍利別三・〇 右一日量三次分服
- ◎實斐答里斯葉(一・〇)浸二〇〇〇 醋酸加里四・〇 單舍利別一五・〇  
 右毎日六回服用(一回量一五・〇)二日量(醫科大學方府)
- ◎安質必林〇・五 乳糖適宜 右爲一包每三時一包ヲ頓服セシム
- ◎安質歌貌林〇・九 乳糖適宜 右爲三包一日三次服用
- ◎鹽酸規尼涅〇・七「オプラート」ニ包ミ頓服一回量(朝夕用フ可シ)
- ◎撒里矢爾酸那篤留母一・〇「オプラート」ニ包ミ頓服(每三時)
- ◎鹽酸「ピロカルピン」〇・〇一 乳糖適宜 右爲一包一日一回頓服(炎症  
 後)
- ◎機那丁幾三・〇 醋酸加里八・〇 單舍利別五・〇 餽水一〇〇・〇  
 右一日三次分服

○杜松子(八・〇)浸二〇〇・〇 海葱越幾斯〇・二 滿那舍利別一五・〇

右每一時三〇・〇宛ヲ服用ス(スコダ氏)

○沃度加里〇・五 醋酸加里五・〇 機那丁幾四・〇 攝涅瓦舍利別三・〇  
餾水一〇〇・〇 右一日三次分服(末期)

○機那皮(八・〇)煎二〇〇・〇 醋酸加里四・〇 橙皮舍利別三〇・〇

右調和毎二時一五・〇宛ヲ内服セシム (フレンツェル氏)

○重酒石酸加留母五〇・〇 枸橼油糖一〇・〇 右調勻毎回四・〇宛一日  
三回糖水ニ和シ服ス(サロモン氏)

○沃度鐵舍利別一・〇乃至五・〇 餾水適宜(年齢ニ應ス)

○機那皮(三・〇)煎一〇〇・〇 沃度加里〇・五 赤葡萄酒二〇・〇

右一日三次分服(末期)

○機那皮(五・〇)煎一〇〇・〇 沃度加里一・〇 赤葡萄酒一〇〇・〇

右一日三回分服二日分(醫科大學方府)

○沃度丁幾、沒食子丁幾、各等分 右塗布料 (シグムンド氏)

○格魯胃母三〇・〇 底列並油一・五 蓖麻子油〇・五 右塗布料

(ラトール氏)

○羅斯 丹毒

率子對症療法ニ過キスト雖モ石炭酸溶液(五十倍)ノ患部皮下注入ハ特效  
藥トナス其他硝酸銀水、沃陣丁幾等ノ塗擦ヲ試ムルコアリ

○馬疫

局所病毒ノ附着スル部ヲ硝酸、或ハ石炭酸等ニテ焦灼シ腫瘍ハ切開シ石  
炭酸水ノ罨法ヲ行フ

○沃度加里一・〇 苦味丁幾二・〇 餾水一〇〇・〇 右一日三次分服

◎亞砒酸加留母液三滴、餾水一〇〇〇〇右一日三次分服

波之部

◎發疹窒扶斯

腸窒扶斯ノ療法ト大差ナシ

◎破傷風

先ツ初メニ創傷ノ有無ヲ檢シ之カ處置ヲ爲サ、ル可ラス其際神經ヲ刺戟スル物質ヲ除去スルヲ緊要トス次テ鹽酸莫爾比涅(〇〇一)ヲ皮下ニ注入シ或ハ抱水格魯刺兒(三〇〇)ノ頓服ヲ試ミ熱ノ高度ナルキハ水浴法ヲ行ヒ撒里矢爾酸那篤留母(四〇〇)ノ頓服或ハ「ピロカルピン」(一回〇〇〇一)ノ皮下注入等ヲ行ヒ時トシハ患部ノ神經截斷法ヲ施スコアリ  
通常用フル所ノ藥品ハ次ノ如シ

◎臭素加里四〇〇 苦味丁幾二〇〇 餾水一〇〇〇〇 右一日三次分服

◎別刺敦那丁幾一〇〇 宛每三時服用(注意) (フハイトレー氏)

◎鹽酸規尼涅一〇〇 偏里斯林、餾水各二・五 右混和皮下注入料 (キユブナル氏)

但シ一回一筒(温ヲ加ヘタルモノ)

◎抱水格魯刺兒二〇〇 餾水五〇〇〇 亞刺昆亞護膜漿五〇〇〇

右灌腸料(サロモン氏)

◎臭素加里五〇〇 餾水一〇〇〇〇 右灌腸料(サロモン氏)

◎黴毒

局所療法ト全身療法ノニアリ

(甲) 結節及潰瘍ニハ石炭酸水(五十倍)ヲ以テ洗滌シ或ハ硝酸銀棍ヲ以テ腐蝕シ沃度叻ヲ撒布シ或ハ發烟硝酸、硫酸銅水(四倍)昇汞水(三百倍)「クレオリン」溶液(百倍)「コカイン」水ヲ混セル者)等ヲ用ヒテ腐蝕洗滌

等ヲ爲ス其他鉛糖合劑(鉛糖〇・五、阿片丁幾一・五、水五〇・〇) 過滿俺酸加里水(百五十倍)等ノ外用ヲ爲シ或ハ赤色沃度化汞軟膏、石炭酸「ソゼリン」軟膏、結麗阿曹篤「ワゼリン」軟膏等ノ塗擦ヲ爲シ尙種々ノ療法アリト雖凡之ヲ畧ス而ノ如此キ藥品ヲ用ヒシ後ハ必ス綳帶ヲ爲シ且ツ可成陰部ヲ清潔ニスベシ

(乙) 内用藥ニハ甘汞、沃度加里、チットマン氏煎等ヲ實用ス

◎強チットマン氏煎 剉切撒爾沙根一五・〇 温湯四〇〇・〇ニ浸シ廿四時間ヲ經テ白糖、明礬各一・〇ヲ投シ重湯煎上ニテ時々攪拌シツ、煮沸スル三時間次ニ大茴香、小茴香各一・〇旃那葉五・〇甘草根二・〇ヲ加ヘテ煮沸シ后ヲ濾過シ三六〇・〇ノ液ヲ収ム(一回量)

右朝間温服

◎弱チットマン氏煎 剉切撒爾沙根八・〇 水四〇〇・〇ヲ取リ重湯煎

上ニテ攪拌シツ、三時間煮沸シ枸櫞皮、桂皮、小益智、甘草各一・〇ヲ加ヘ更ニ三時間温浸シ濾過シテ三六〇・〇ノ液ヲ取ル(一回量)

右夕刻冷服

但シ此藥劑ヲ用フルニ臨テハ室内ノ温度ヲ攝氏二十五度ト爲シ且ツ此療法中(大約四週間)ハ可成淡白ノ食物ヲ與フ可シ

◎昇汞〇・〇一食鹽二・〇 餾水一〇〇・〇 右三時間毎ニ一五・〇宛ヲ服用セシム(ステルン氏)

◎黃色沃度化汞〇・二五阿片丁幾〇・二五蒲公英越幾斯甘草末各適宜 右丸十六粒トナシ朝夕一丸宛ヲ服ス(ビエット氏)

◎沃度叻一・五 括矢亞越幾斯適宜 右丸二十粒トナシ朝夕一丸宛ヲ服用セシム(ザイツスル氏)

◎沃度〇・六 肝油三〇・〇 右溶解後四・〇乃至八・〇宛一日二回服用

○甘汞〇・〇五 澱粉〇・五 白糖適宜 右散三包トナシ一日三回服用 (シグムンド氏)

○沃度加里一・〇乃至二・〇 苦味丁幾二・〇 單舍利別八・〇 餾水一〇〇 (ウエント氏)

○撒里矢爾酸化汞〇・〇一 右一丸トナシ每食後一丸宛服用 (醫科大學方府)

外用ニハ塗擦法、皮下注入法、汞劑浴法、汞劑薰法等アリ (醫科大學方府)

○水銀軟膏塗擦法 兩上膊及兩内股ニ毎日交換ノ大約一時間宛塗擦シ

廿四時間ヲ經テ洗淨ス可シ

○昇汞「ペプトン」合劑ノ皮下注入(バンベルゲル氏)

○青酸汞溶液(餾水ニテ二百倍)ノ皮下注入(サロモン氏)

○撒里矢爾酸汞溶液(百倍)ノ皮下注入(ヤダソン氏)

○智母兒汞溶液(百倍)ノ皮下注入(ツァイシング氏)

○沃度那篤僧母ノ中和溶液三・〇 餾水一〇〇ト混シ皮下注入料トス (シヤデク氏)

○ザイナル氏汞劑浴 昇汞二・〇 礫砂一・〇 餾水一〇〇〇 右一回ノ

浴湯中ニ之ヲ混ス(浴湯時間半時トス)小兒微毒ニ効アリ

○ハルケル氏汞劑薰法 患者ノ身體ヲ「フラチル」ニテ被ヒ椅子ニ倚ラ

シメ椅子下ニ燈ヲ置キ甘汞〇・五ヲ薰スルヲ大約十五分時間

○バセドー氏病

精神ヲ勞セス轉地療養ヲ行ヒ滋養物ヲ與ヘ内服藥ニハ鐵劑、規尼涅ヲ處  
シ心悸亢進甚シキ者ニハ實斐答里斯ヲ配伍ス

○白血病

大量ノ規尼涅ヲ投シ(一日一〇以上)中毒ヲ起スルハ休止ノ二三日ノ後  
又始ム可シ或ハ石炭酸(一・五%)ノ脾臟注入法ヲ試ミ或ハ脾臟部灌水法  
ヲ施シ時トシハ鐵劑、砒石劑等ノ効ヲ奏スルコトアリ

◎肺炎

甲 格魯布性肺炎

初起ニハ患部ニ氷嚢ヲ貼シ疼痛甚シキ者ニハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入  
(〇・〇一)ヲナシ解熱藥ニハ規尼涅、安質必林、安質歌貌林、撒里矢爾酸那  
篤留母等ヲ與ヘ(肋膜炎ノ條ヲ參照セヨ)又此目的ニ水治法(全身灌水法  
ヲ行ヒ注意ノ拭ヒ去リ褥ニ就カシム可シ)ノ甚ク偉効ヲ奏スルコトアリ而  
ノ脈百至以上ナルルハ宜シク實菱答里斯ヲ内服セシム可シ若シモ心力沈  
衰スルルハ「カンフォル」ノ皮下注入ヲ行ヒ末期ニ至リテハ凡テ強壯滋養法  
ヲ行フニ宜シ

◎實菱答里斯葉(一〇)浸一〇〇〇 鹽酸莫爾比涅〇〇一五單舍利別

六〇 右調和一日三次分服(注意)

◎撒里矢爾酸那篤留母四〇 鹽酸莫爾比涅〇〇二苦味丁幾二〇〇單

舍利別四〇 餽水一〇〇〇 右一日三次分服

◎硫酸規尼涅二〇 稀鹽酸二三滴 餽水一〇〇〇

右隔日黃昏ニ際シ頓服セシム(サロモン氏)

◎機那丁幾三〇 赤葡萄酒二〇〇 攝涅瓦舍利別五〇 老里兒水三〇

〇 餽水一〇〇〇 右一日三次分服

◎別刺敦那葉末〇・一五 甘草末、甘草膏各一・五 右丸三十粒ト爲シ一

日三回一丸宛ヲ服用セシム(ウンデルリヒ氏)

乙 加答兒性肺炎 小葉性肺炎

務メテ流動性滋養物ヲ與ヘ間食ヲ禁シ安靜ニ温臥セシムルヲ法トス而シ



解熱ニハ少量ノ規尼涅ヲ持重シ血痰ヲ咯出スルキハ少量ノ麥角越幾斯或ハ鹽酸莫爾比涅ヲ與ヘ盜汗アル者ニハ別刺敦那ノ少量ヲ頓服セシメ氣管支加答兒甚シキキハ凡テ其療法ヲ行フ姑息療法トシテ種々ノ鎮咳藥ヲ與ヘ肺癆ニ陷ルコトニ注意ノ之ヲ措カサル可ラス其際ニ於テハ肺癆ノ條下ニ見ユル所ノ處方ヲ選擇シテ用ヒ普ク強壯療法ヲ施ス可シ

○硫酸銅〇・四 餾水五〇・〇 單舍利別適宜 右每十五分時間少量宛ヲ與ヘ吐ヲ得テ止ム(童兒量)(注意)

○攝涅瓦(五・〇)煎一〇〇・〇 安母尼亞茴香精一・〇 蜀葵根舍利別二〇・〇 右混和每一二時四・〇 宛ヲ服用(兒童量)(サロモン)

○稀鹽酸里母那逐五〇・〇 吐根舍利別一・〇 右一日數回分服(兒童量)

○老利兒水一・〇 別刺敦那丁幾五滴 攝涅瓦舍利別二・〇 餾水五〇・〇 右一日三次分服(兒童量)

○機那皮(二・〇)煎六〇・〇 赤葡萄酒一五・〇 攝涅瓦舍利別三・〇

右一日三次分服(兒童量)

### ○肺炎加兒答兒

肺癆ノ條ヲ參照シ務テ攝生法ニ注意ス可シ

○機那皮煎二〇〇・〇 老利兒水五・〇 鹽酸莫爾比涅〇・〇 二單舍利別一五・〇 右二日量一日六回分服(醫科大學方府)

### ○肺充血

芥子泥ノ誘導法、刺絡、塞罨法、壓縮大氣ノ吸入法等ヲ試用ス可シ時トシテハ清涼瀉下劑ヲ投シ時トシテハ興奮劑ヲ要スルコトアリ

○實斐答里斯葉(〇・五)浸一〇〇・〇 橙皮舍利別五・〇 右一日三次服用

### ○肺出血

身體安靜ヲ旨トシ室内ノ大氣ヲ清涼ト爲シ流動食物ヲ與ヘ熱湯嚙下ヲ禁

シ胸部ニハ氷嚢若クハ乾角ヲ貼ス其他凡テ輕微ノ出血ハ敢テ苦慮スルニ足ラスト唯ハ劇出血ニ於テハ宜シク注意周到ナルヲ要ス通常賞用スル所ノ藥劑ハ左ノ如シ

○鹽酸莫爾比涅〇〇二 麥角越幾斯〇・六 實斐答里斯葉(一・〇) 浸一〇〇〇 單舍利別五〇〇 右一日三次分服

○流動麥角越幾斯一〇 偏里設林、餽水各五〇〇 右皮下注入料

(一二二筒)(サロモン氏)

○鹽酸莫爾比涅〇〇一 鉛糖〇〇一 乳糖適宜 右調和一日三回分服

○明礬一〇〇 白糖一〇〇 右散爲五包每二時一包服用(スコダー氏)

○鞣酸二〇〇 蘆根越幾斯適宜 右丸二十粒ト爲シ每一時一丸宛服用

(コツテロー氏)

○水製麥角越幾斯、餽水各一〇〇〇 鹽酸莫爾比涅〇〇五 右調和每二

時十滴乃至十五滴宛服用(ヘルツ氏)

○麥角丸(一粒中麥角x〇〇五) 右每回四九宛一日三回五回服用

(醫科大學方府)

○麥角末一〇 實斐答里斯末〇・二五 亞刺昆亞護護適宜 右丸八粒ト爲シ一日四九乃至八丸服用(カリニール氏)

○飽和食鹽水五〇〇乃至一〇〇〇 右頓服(一時止血)(ベルツ氏)

○硫酸、亞爾備保兒各一〇〇〇 右調和十滴乃至十五滴宛一日三四回服用(醫科大學方府)

○機那皮煎二〇〇〇〇「ハマメリス」丁幾八〇 老利兒水六〇〇 單舍利別一五〇〇 右二日量一日三回分服(醫科大學方府)

○肺水腫

原因療法ヲ勉メサレハ往々治療ノ畫餅ニ屬スルヲアリ注意セサル可ラス

時トノハ麻酔劑ノ吸入、芥子泥ノ赤引法、乾角及水蛭等ヲ要スルコトアリ  
内服藥ニハ下劑、吐劑等ノ頓挫法ヲ行ヒ次テ一般賞用スル所ノ者ハ左ノ  
如シ

○實斐答里斯葉(○・五)浸一〇〇〇 醋酸加里六〇〇 安母尼亞化茴香  
精三〇〇 單舍利別六〇〇 右調和一日三回分服

○安息香酸〇・二 龍腦〇・一 白糖適宜 右散一包トナシ同量數包ヲ作  
リ每一時一包ヲ服用セシム(但シ澱粉紙ニ包ミ)(サロモン氏)

○依的兒八〇〇 阿片丁幾四〇〇(三回量) 右一回量ヲ吸入器ノ湯中ニ混  
シ吸入セシム(エーベルス氏)

○肺氣腫

ワルデンブルグ氏ノ空氣療法内科書ヲ見ヨハ甚タ偉効アリ藥劑ニハ興奮、祛痰、  
麻酔、利尿等ノ諸劑ヲ撰用シ喘息様發作ニハ須ク其療法ヲ行フ可シ中ニ

就テ賞用スル者ハ沃度加里劑トス

○沃度加里一〇 燈皮舍利別五〇 餾水一〇〇〇 右一日三回分服

○沃度加里水(四百倍)四〇〇〇 右吸入料

○肺壞疽

病室ヲ清潔ニシ石炭酸水ヲ撒布スルハ注意ノ一端ナリ底列並油、石炭酸  
水(二百倍)過滿俺酸加里水(千倍)等ノ吸入法ヲ行ヒ通常賞用セル療法ハ  
即チ

○撒里矢爾酸〇・五 甘草膏末適宜 右爲丸一日四回分服

○石炭酸一〇 綿多水、餾水各七五〇 右調和每回一五〇 宛一日四  
回分服(フィデン氏)

○鉛糖〇・〇三乃至〇・〇六 白糖〇・五 右調勻爲一包同量數包ヲ作リ

每二時一包宛服用(トラウベ氏)

○結麗阿曹篤三滴 薄荷油〇〇五 龍膽末適宜 右爲丸一日三回服用  
 ○石炭酸二〇〇 偏里設林、酒精各二〇〇 右嗅入料（パンベルゲル氏）

○肺癆

該症ノ療法ハ古來其種ノ多キニ驚クト雖凡未タ非常ノ價值ヲ有シ根治法  
 トモ成ル可キモノハ在ラサルナリ然凡今左ニ新舊治法ノ數例ヲ掲載スレ  
 ハ宜シク撰用ス可シ 肺癆ノ條ヲ參照セヨ

○寶菱答里斯葉（一〇〇）浸一〇〇〇 重炭酸那篤留母二・五 罌粟舍利  
 別一五〇〇 右一日三回分服（注意）（サロモン氏）

○安質必林二〇〇 鉛糖〇〇二 安息香酸那篤留母〇・三 乳糖適宜

右五包ト爲シ毎二時頓服

○結麗阿曹篤四乃至十四滴 依的兒精六乃至一二〇 白糖一〇〇 餛水  
 五〇〇 右毎二時四〇宛服用シ二日量トス（ソルトマン氏）

○結麗阿曹篤四〇 蜀葵根末、甘草末各六〇 亞刺毘亞護謨適宜 右  
 百二十粒ト爲シ一日三回即チ每食後二粒宛服用（ケーヘル氏）  
 但ツオルフ氏ハ此丸劑ヲ朝夕二丸宛チ與ヘ增量八丸ニ至ルト云フ  
 ○結麗阿曹篤一・三 酒精二五〇 桂皮水一〇〇〇 桂皮舍利別二五〇  
 ○ 右混和毎回一〇〇一日三回 一日三回一週間毎ニ一回一〇〇ヲ増ス（フレンチエル氏）  
 ○結麗阿曹篤七・五 酒精一〇〇〇 橙皮舍利別二〇〇〇 「マラツセ  
 ン」酒適宜全量一〇〇〇ト爲シ一日三回毎回三〇〇宛服用  
 （ブラフエート氏）

○結麗阿曹篤、薄荷油各〇〇二五 龍膽末、白蠟各適宜右丸一粒トナシ  
 每食後二丸宛服用（漸次增量シ一回十九ニ至ル）（醫科大學方府）  
 ○亞硫酸石灰〇〇三 右一九トナシ毎二時一丸宛服用（ウイザール氏）  
 ○機那丁幾三〇〇 沃度加里〇・五 別刺敦那丁幾〇・七 單舍利別（三〇〇）

- 餽水一〇〇〇 右一日三次分服
- 沃度叻〇・一右毎回「オブラート」ニ包ミ一日二三回服用(レンナー氏)
- 吐根(〇・五)浸一〇〇〇 安母尼亞加苗香精三〇 鹽酸莫爾比涅〇・〇一五 單舍利別五〇〇 右一日三次分服
- 沃度加里〇・七 臭素加里一〇 鹽酸規尼涅〇・三 格倫僕根末適宜 右丸三包ト爲シ一日三回服用
- 硫酸亞篤魯比涅〇・〇一 龍膽末適宜 右丸二十五粒ト爲シ臨臥一丸宛ヲ頓服セシム(盜汗)
- 石炭酸〇・二五 鞣酸二・五 阿片末〇・一〇 三酒精二三滴 甘草末五〇 亞刺毘亞護適宜 右丸五十粒ト爲シ一日三次二三丸宛服用セシム(溶崩下利)(ワルデンブルグ氏)
- 撒里矢爾酸蒼鉛、乳糖各二五〇 右調勻四十包ト爲シ朝夕一包宛服

用(溶崩下利)(ワルゲル氏)

- 乳酸二〇 餽水一〇〇〇 右一日量漸次増量且持重(ポリヤク氏)
- 「ペプシチ」三〇 稀鹽酸〇・七 吐根舍利別三〇 赤葡萄酒一五〇 餽水八〇〇 右一日三次分服
- 沃度鉄舍利別四〇 單舍利別三〇 餽水一〇〇〇 右一日三次分服
- 鹽酸規尼涅〇・二 還元鐵〇・一 右丸ト爲シ一日三次服用
- 肝油(精品)一二〇 薄荷油半滴 右一回量一日一二回服用(冬間)
- 肝油夏期代用藥 沃度加里二・五 臭素加里五〇 食鹽一〇〇 餽水一〇〇〇 右毎朝三〇〇 宛牛乳ニ和シ服用
- 機那煎一〇〇〇 老利兒水六〇〇 「マルツ」越幾斯一〇〇〇 右二日量一日三分服(醫科大學方府)
- 武蘭垓酒三〇〇 一四〇〇 卵黃三個 單舍利別一五〇 微温湯二〇

○右調和二日量一日三回服用(醫科大學方府)

○白帶下

知ノ部ニ在リ

○膀胱加答兒

(急性症)ニハ身体ノ安靜ヲ旨トシ辛辣物及酒類ノ飲食ヲ絶テ其他ノ液類ヲ多飲スルハ尿ヲ稀薄ニスルノ効アリ内服藥ニハ格魯兒酸加里、撒里矢爾酸、別刺敦那、烏華烏兒矢葉等ヲ用テ下腹部困難ヲ呈スルキハ温捲法ヲ行ヒ或ハ會陰ニ熾鍼ヲ貼シ(強壯者)麻醉ニハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入ヲ施シ利尿困難ニハ「カテーテル」ヲ插入シ末期ニ至リテハ鞣酸ノ内服ヲ試ムルコトアリ

○格魯兒酸加里一・〇乃至一・五 餽水一〇〇・〇 右一日三次分服

○撒里矢爾酸一・〇乃至二・〇 温湯一〇〇・〇 右一日三次服用

(ストリユムベル氏)

○烏華烏爾矢葉(一〇・〇)浸一五〇・〇 蜀葵根舍利別二〇・〇

右一日三四次分服

○撒里矢爾酸那篤留母五・〇 右十包ト爲シ毎二時一包服用

(ブーゲルホルド氏)

○鹽酸莫爾比涅〇・〇一「カ、オ」脂一・〇 右調和爲坐藥一日二三個

(サロモン氏)

(慢性症)ニモ亦攝生法ヲ旨トシ原因療法ヲ行ヒ務テ麻痺症ヲ治スルヲ緊要トス藥劑ニハ亞爾加里劑ノ屢々奏効スルコトアリ(尿ノ強酸性ナルキ)其他烏華烏爾矢葉、骨拜華拔爾撒謨若クハ明礬等ノ藥劑ヲ與ヘ時トシハ膀胱筋ノ弛緩症ニ麥角越幾斯ノ皮下注入ヲ爲スコトアリ洗滌藥ニハ格魯兒酸加里水、硝酸銀水、撒里矢爾酸水、醋礬水、明礬水等ヲ用フルモ多クハ無効

ナリ之ニ反ノ獨リ牛乳ノ洗滌科(稀薄)ハ偉効ヲ奏ス

○重炭酸那篤留母四・○非沃斯越幾斯○・五 臭素加里二・○老利兒水  
四・○ 餾水一〇〇・○ 右一日三回分服

○烏華烏爾矢葉(一五・○)煎二〇〇・○ 阿片丁幾一・○ 百露拔爾撒謨  
舍利別一五・○ 右調和每二時一五・○ 宛服用(ア、コーペル氏)

○鹽酸規尼涅二・○ 印度大麻越幾斯○・ニ甘草膏適宜 右丸三十粒ト  
爲シ毎回三丸宛一日三次服用(レベルト氏)

○撒里矢爾酸○・五 右爲一包同量數包ヲ作り每二時一包宛澱粉紙ニ包  
ミ服用(フニールプリンゲル氏)

○骨拜華拔爾撒謨、底列並油各一〇・○ 炭酸麻偏涅矢亞適宜右丸百粒  
ト爲シ着衣毎回三丸宛一日三次服用(ガール氏)

○格魯兒酸加里五・○ 單舍利別二二・○ 餾水一〇〇・○

右一日三次分服(エドレフセン氏)

○「レヅルナン」水(大約二十倍)五〇・○ 右膀胱内注入料

(アンデール氏)

○石灰水六〇・○ 右膀胱内注入料(キユイレル氏)

○撒里矢爾酸那篤留母水(百倍)五〇・○ 右膀胱内注入料(サロモン氏)

### ○膀胱結石

攝生法ヲ旨トシ酒類ノ飲用ヲ禁シ凡テノ刺衝物ヲ避ケ可成注意セシムル  
ナ長トス藥劑ニハ磷酸那篤留母(一日量四・○)若クハ加爾々私泉鹽(一日  
量八・○)等ヲ内服セシメ無効ナルキハ稀鹽酸、酒石酸、重酒石酸加里等ヲ  
與フ可シ其他往々外科ニ嚙托スルコアリ

### ○膀胱痙攣

溫浴法、冷濯法ハ宜シク行フ可シ時トシハ「カテーテル」ヲ要スルコアリ

内服薬ニハ

○印度大麻丁幾ニ〇〇〇〇〇〇〇 右一日三次服用(レベルト氏)

○重炭酸那篤留母ニ〇〇 鹽酸莫爾比涅〇〇〇二 纈草末〇〇六

右爲三包一日三次分服

○別刺敦那越幾斯〇〇一、纈草酸亞鉛〇〇三、龍膽末適宜

右爲丸一日三次分服

○別刺敦那越幾斯〇〇一 柯々阿脂三〇五 右爲坐藥或ハ腔中ニ挿入ス

(サロモン氏)

其他時トシハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入、格魯刺兒護謨漿合劑ノ灌腸(破傷風ノ條ニアリ)等ヲ爲スヲアリ

○膀胱麻痺 尿閉

初期ニハ冷所或ハ自己ノ手ヲ冷水中ニ入レ以テ放尿ヲ促シ奏効スルヲア

リ「カテーテル」ハ主法トス注意シ挿入ス可シ

○酒製番木龍越幾斯〇〇一 羯答里斯丁幾一〇〇 餽水三〇〇 右一日三回 每服十滴乃至十五滴トス

○羯答里斯末〇〇一 龍腦研末〇〇三 藥用石鹼二〇〇 右調勻丸十二粒ト 爲シ一日三回每次一九―三九ヲ服用ス

(シーボルト、デ、フ、ハウ氏)

○骨拜華拔爾撒謨〇〇六 膠囊ニ包ミ每服二箇乃至三箇宛一日三回

(サロモン氏)

○「ストリヒネ」〇〇〇〇二 右丸ト爲シ(一粒)一日三丸服用

(醫科大學方府)

其他麥角劑、安母尼亞劑等ヲ處シ我醫科大學ニ於テハ電氣ヲ膀胱部ニ用フト云フ



### 仁之部

#### ◎日射病

清涼ノ陰所ニ臥サシメ興奮劑ヲ與ヘ或ハ甘汞下劑ヲ要スルコアリ

#### ◎尿管症

務テ飲水ヲ節減シ強壯療法ヲ行フ可シ内服藥ニハ纈草根(一日量五・〇)乃至一〇・〇)ヲ投シ或ハ麥角越幾斯(一日量〇・五)ヲ處シ次テ阿片劑ヲ與ヘテ口渴及尿量ヲ減少ス或ハ時トメ驅微法ノ適中スルコアリ

◎阿片末〇・〇二乳糖適宜 右散爲六包一日三次二日量

◎稀硝酸四・〇糖水四〇〇・〇 右一日量漸次増進五倍ニ至ル(注意)

(ケンチン氏)

#### ◎尿毒症

寒暄法、刺絡(強壯者ニ限り)等ヲ行ヒ多量ノ水ヲ飲マシメ或ハ麻醉藥ヲ與ヘ或ハ下劑ヲ要シ嘔吐ニハ結麗阿曹篤若クハ「レツルチン」ヲ良トス

◎抱水格魯刺兒二・〇單舍利別三・〇韶水三〇・〇 右發作時頓服

◎結麗阿曹篤一・〇「メリツサ」水一〇〇・〇 右毎回四・〇宛一日三次服用(シリスタン氏)

◎妊婦急痢

其療法大抵尿毒症ト大差ナシツエプロイス氏ハ劇烈ノ發汗法(攝氏三十八度ヨリ四十二度ニ至ルノ温浴)ヲ入ラシメ半時間ノ後出浴ノ綿布ヲ以テ身体ヲ被覆ス)ヲ賞揚セリ其他麻醉藥ノ内服及嗅入法ヲ行フ

◎妊婦嘔吐

近來背椎ノ第四五ノ部ニ錫答里斯膏ヲ貼スト雖凡テノ嘔吐療法ハ宜シク施行ス可シ(嘔吐ノ條參照)時トノハ人工早産ヲ要スルコアリ

### ◎乳房炎

多クハ外科ニ屬ス化膿ノ徵アルキハ速ニ切開ス可シ

### ◎乳頭創傷

石炭酸水(三十三倍)ノ洗滌法或ハ阿列布油石炭酸合劑(三十三倍)ヲ塗布シ或ハ草麻子油ヲ塗布スルヲアリ此如キ療法ヲ爲スノ後乳帽ヲ被覆ス

### ◎乳房神經痛

胸部ノ溫暖法、乳房結縛、電氣療法等ヲ行フ

### 邊之部

### ◎扁桃腺炎

咽頭加答兒ト殆ト療法ヲ同フス宜シク參照ス可シ通常行フモノハ水蛭、氷冷法、亂刺法等ナリ撒布藥トシハ龍腦研末ト硝酸加里細末合劑ヲ用ヒ

偉効ヲ奏スルヲアリ

◎重炭酸那篤留母細末ノ撒布法(ギニーパルテীগス氏)

### ◎扁桃腺肥大

其肥大部ヲ截除スルヲ佳トス姑息法トシハ硝酸銀水(二十五倍)ヲ塗布スルヲアリ

### ◎偏頭痛

凡テ原因療法ヲ要ス下劑ハ時トシ奏効アリ誘導法トシハ感傳電氣若シハ平流電氣ヲ流通シ或ハ芥子浴ヲ行フヲアリ(フエウエル氏)對症療法ニハ種々ノ内服藥嗅入藥或ハ按摩法等ヲ行フ

◎括矢亞丁幾三・〇 橙皮丁幾三・〇 餾水一〇〇・〇 右一日三次服用

◎麥角越幾斯五・〇 甘草膏適宜 右爲五十九丸每回二三丸一日三回服用 (サロモン氏)

〇硝酸「アミール」五〇〇 茴香油一〇〇〇 右混和一回四五滴宛手巾ニ滴シ吸入セシメ一日二三回（ベチシクト氏）

〇臭素加里二〇〇 「コヒーチ」〇五 甘草膏適宜右丸トナシ一日間服用

〇安質必林一〇〇 「オアラート」ニ包ミ頓服（オイレンブルグ氏）

〇匍行疹

陰部ノ者ニハ稀薄硝酸銀水ヲ塗布シ其他亞鉛花軟膏ヲモ塗布ス、帶狀ノ者ニハ疼痛ヲ防ク爲ニ鹽酸莫爾比涅、阿片末、別刺敦那越幾斯等ヲ亞鉛花軟膏ニ伍シ用フ、禿髮匍行疹ニハ石炭酸偈里設林合劑（八倍）ヲ塗布スルヲ一日二三回（スミット氏）其他吳亞軟膏（「ゴア」粉適宜ヲ醋ニテ泥狀ト爲シ患部ニ塗布ス）ハ屢々奏効ヲ見ル

〇便毒

初メハ消燉法ヲ行ヒ即チ下劑ヲ與ヘ沃度丁幾ヲ塗布スト雖モ若シ化膿ノ

徴アルキハ溫韃布ヲ貼シ十分ノ化膿ヲ得テ之ヲ切開シ石炭酸水（一％）ヲ以テ洗滌スル等凡テ外科ノ通規ニ從フ

登之部

〇痘瘡 附假痘

對症療法ニ過キス發疹ノ初期ニハ石炭酸四〇乃至一〇〇〇 阿列布油四〇〇〇 最精細剉石灰六〇〇〇ヲ混シ糊劑トナシ麻布ノ一片ニ貼シ以テ患部ヲ被覆シ偉効ヲ得ヘシ（ストリユムベル氏）其他寒捲法、濕浴法等ヲ行ヒ種々ノ含嗽劑ヲ與ヘ内服ニハ里母那埜或ハ鹽酸規尼涅ノ頓服近來ニ至テハ安質必林ヲ賞用ス

〇偈里設林五〇〇 水銀軟膏二〇〇〇 藥用石鹼一〇〇〇 右軟膏トナシ發疹部ニ塗布ス（ハルレ氏）

○「キシロール」五滴乃至二十滴宛毎三時赤葡萄酒ニ和シ服用 此法ハ痘痕ヲ可成殘遺セザラシムルノ効アリ(ツエルツエル氏)

○沃度丁幾、酒精各等分 右塗擦料(末期結節)(クルシユマン氏)

○旋毛蟲病

腸中ノ者ニハ草麻子油、旃那、甘汞等ノ下劑ヲ與ヘ大量ノ偏里設林(毎時一五〇)内服ハ偉効アリ(フィドレル氏)筋中ノ者ニハ麥角越幾斯、鹽酸莫爾比涅等ノ皮下注入法等ニ宜シ

○盜汗

○硫酸亞篤魯比涅〇〇〇五 右一九ノ量臨臥頓服(醫科大學方府)

○「ズルホナール」〇〇五 右一九ノ量臨臥頓服(醫科大學方府)

○吐乳症

必ス時間ヲ期ノ哺乳セシメサル可ラス嬰兒泣叫ニ堪ヘサルモ可成他事ヲ

以テ之ヲ慰ムルヲ佳トス、牛乳ヲ與フル者ナレハ其性質ヲ正ス可シ

○甘汞〇〇五 稀酸設留母〇〇一 乳糖適宜 右散三包一日量

○吐糞症

姑息法トシ阿片劑(腹膜炎ノ條ニアリ)ヲ處シ或ハ柔軟ナル胃消息子ヲ過半腸内ニ挿入シ輕壓ヲ以テ多量ノ水ヲ灌腸シ或ハ瓦斯ヲ送入シテ偉効ヲ見又晚近ニ至テハクスマウル氏ノ法ニ從ヒ冷水ヲ以テ胃ノ洗滌ヲ爲ス片ハ大ニ輕快シ或ハ治癒スルヲアリ而シテ愈々百方盡クルルハ大量ノ純水銀(一〇〇〇)ヲ頓服セシムルヲアリ(注意)其他ハ外科ニ屬ス

○動脈瘤

多シハ外科ニ屬ス時トシ麥角越幾斯ノ皮下注入、沃度加里ノ内服等ヲ試ムルヲアリ

○糖尿病

蜜尿病トアリ就テ見ル可シ

知之部

◎腸窒扶斯

病室ヲ清潔ニスルハ缺ク可ラサル攝生法ナリ飲料ニハ里母那垓ヲ投シ務  
メテ流動物ノ食物ヲ與ヘ殊ニ肉羹汁、卵黃、赤白葡萄酒等ヲ適宜ニ投ス而  
シ此病ハ可及的熱ノ經過ニ隨ヒ自然良能ヲ扶助スルヲ緊要トス解熱藥ニ  
ハ助膜炎ノ條下ニ掲載スル所ノ者ハ悉ク應用ス其他ブランド氏ハ此目的  
ニ對シ水治法(水浴法、冷水灌漑法等)ヲ甚タ賞用ス

◎撒里矢爾酸那篤留母三・〇 實菱答里斯葉(〇・五)浸一〇〇・〇 苦味  
丁幾二・〇 右一日三次服用

◎石炭酸〇・三 餽水一〇〇・〇 右一日三次分服(ストリユムベル氏)

◎甘汞〇・五 右一回頓服量毎二時同量一包ヲ與ヘ三回連用スレハ草

綠色ノ軟便ヲ下シ熱度輕減スト云フ(チームセン氏)

腦症合併ニハ臭素加里、抱水格魯刺兒ノ頓服或ハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注  
入、心力微弱ニハ「カンフォル」ノ皮下注入、「ポルト」酒ノ内服等ヲ賞用ス、褥  
瘡ニハ亞鉛花軟膏、撒里矢爾酸軟羔、沃度防軟膏等ヲ貼シ或ハ石炭酸水ヲ  
以テ洗滌ス、肺患合併症ニハ安母尼亞加茴香精、攝涅瓦或ハ安息酸加阿片  
丁幾、實菱答里斯等ヲ賞用ス 宜シク肺患ノ條  
ヲ参照ス可シ

◎攝涅瓦根(八・〇)煎一〇〇・〇 安母尼亞加茴香精三・〇 單舍利別三・

〇 右調和一日三次分服

◎實菱答里斯末一・〇 白糖五・〇 右散十包ト爲シ毎三時一包内服

(ウンデルリヒ氏)

峻下利ニハ吐根浸ニ亞刺毘亞護謨漿ヲ混セルモノ或ハ鞣酸、次硝酸蒼

鉛、阿片等ヲ用フ可シ中ニ就テ阿片ハ最モ偉効アリ、腸出血ニハ直ニ絶食  
セシメ藥劑ノ内服ヲモ止テ安臥セシメ腹部ニ氷嚢ヲ貼シ冷水灌腸ヲ行フ  
可シ(サームセン氏)其他時トメハ内服藥ノ効ヲ奏スルヲアリ(腸出血)

〇鞣酸〇・一五阿片〇・〇六白糖適宜 右散三包ト爲シ一日間服盡

〇鉛糖〇・一鹽酸莫爾比涅〇・〇一白糖適宜 右調勻一日三次分服

〇次硝酸蒼鉛一〇阿片〇・〇五麥角越幾斯〇・二 右散一包ト爲シ一

日三四包服用(醫科大學方府)

鼓腸ニハ寒罨法、冷水灌腸等ヲ最佳トス、恢復期ニ至リテハ務メテ強壯劑  
ヲ與ヘ飲食ヲ攝生スルヲ緊要トス

〇機那皮煎一五〇・〇 稀鹽酸二・〇 赤葡萄酒五〇・〇 右二日量一

日三回服用(醫科大學方府)

〇武蘭垚一〇・〇 卵黃二個乃至三個 單舍利別三〇・〇 餾水二〇〇

〇武蘭垚一〇・〇 卵黃二個乃至三個 單舍利別三〇・〇 餾水二〇〇

〇 右一日三回二日分服(醫科大學方府)

### 〇質布的里

鼻竅ヲ洗滌シ水嚢法ヲ施シ示指(「リンテル」布ヲ捲キ)ニテ義膜ヲ拭ヒ去  
リ務テ吸入藥ヲ爲サシム可シ

〇「クレオリン」水(三百倍)右吸入料(醫科大學方府)

〇食鹽水(百倍) 右吸入料

〇百倍ノ「レグルサン」水一〇〇・〇 石灰水二〇〇・〇 右吸入料  
(醫科大學方府)

〇精製石灰水 右吸入料(マイステル氏)

〇硼酸三・〇 餾水三〇〇・〇 右吸入料(醫科大學方府)

〇腐蝕那篤倫四・〇 石灰水五〇・〇 餾水四〇〇・〇 右吸入料  
(マイステル氏)

- 格魯兒酸加里水(百倍) 右吸入料
- 石炭酸二・〇 韶水五〇〇・〇 偏里設林適宜 右吸入料

(サロモン氏)

塗抹藥ニハ

- 硝酸一・〇 韶水三〇〇・〇 右塗布料
  - 石炭酸四・〇 偏里設林三〇〇・〇 右塗布料(ラードウスキ氏)
  - 沃度叻〇・五 依的兒一二・〇 「コロヂエウム」三・〇 百露拔爾撒謨 二・五 右混和一日四五回塗布(マッケンギー氏)
  - 硫黃花「ヨドール」各等分 右塗布料一日二三回用フ(醫科大學方府)
- 撒布藥ニハ沃度叻研末ヲ可トス
- 含嗽劑ニハ格魯兒酸加里(五十倍)過滿俺酸加里水(五百倍)撒里矢爾酸水(三百倍)石炭酸水(百倍)硼酸水(百倍)等ヲ用フ

内服藥ニハ肋膜炎ノ條ニ掲載スル所ノ解熱藥ヲ選擇シ用フ可シ中ニ就テ鹽酸「ピロカルピン」(一回量〇・〇一)ノ内服及皮下注入ハ偉効ヲ奏ス其他常用スル所ノ者ハ次ノ如シ

- 格魯兒酸加里五・〇 格魯兒鐵丁幾七・五 覆盆子舍利別三〇・〇 韶水 一五〇・〇 右混同每一時四・〇宛ヲ與フ(ワルデンブルク氏)

但シ日本人ニハ減量ス可シ

- 安息香酸五・〇 橙皮舍利別五・〇 韶水一〇〇・〇 右一日三次服用
- 稀鹽酸里母那垓一五〇・〇 格魯兒酸加里二・〇一三・〇 右調和二日 量一日三回服用(醫科大學方府)

又義膜ヲ除カンカ爲メ吐劑ヲ要スルコトアリ此目的コクナゴス氏ハ硫黃ヲ 賞用セリ

- 硫酸銅〇・一五 澱粉、白糖各〇・四 右一包ト爲シ同量五包ヲ作り每

十分時一包ヲ投シ吐ヲ得テ止ム

◎硫酸銅三〇〇 橙皮舍利別七〇〇 餽水六〇〇〇 右每十分時四〇宛ヲ

與ヘ吐ヲ得ルニ至ル

猶時トノハ氣管切開術ヲ行ヒ又恢復期ニ轉スルキハ強壯療法ヲ行フモノトス

◎衄血

綿撒糸若シハ綿花等ヲ以テ鼻孔ヲ栓塞シ或ハヘロソ氏管ヲ用ヒ次テ鼻梁部ニ冷水灌漑法ヲ行ヒ或ハ冷水坐浴、頭部及心部ノ冷水灌漑法ヲ試ミ或ハ後鼻孔ニ栓塞法ヲ行フアリ内服藥ニハ鉛糖、麥角越幾斯等ヲ用フト雖凡原因療法ノ必要ナルニ如カス

◎腸加答兒

(急性症)ニハ直ニ止瀉劑ヲ用フルト甚タ不可ナリ宜シク蓖麻子油(一回

一五〇〇—二〇〇〇)ノ頓服ヲ命シ宿便ヲ拂フ可シ次テ種々ノ原因ニ隨ヒ種々ノ療法ヲ爲ス(下痢症ノ條ヲ參照ス可シ)

◎吐根(〇〇三)浸一五〇〇〇 亞刺昆亞護膜漿五〇〇〇 稀鹽酸〇〇五

右調勻一日三次分服

◎吐根末、阿片末各〇〇三「カヌカリラ」末〇〇三 右散三包ト爲シ一

日三次服用(ブレラ氏)

◎次硝酸蒼鉛〇〇五 阿片末〇〇三 白糖適宜 右爲散一日三次服用

◎沙列布(二〇〇)煎一〇〇〇〇 阿片丁幾〇〇六 右一日三次分服

◎鞣酸〇〇一八 阿片末〇〇九 乳糖適宜 右散三包ニ分チ一日間服用 (ウンデルリヒ氏)

◎次硝酸蒼鉛〇〇五 鉛糖〇〇五 阿片末〇〇五 右一包ト爲シ同量一日三包服用(醫科大學方府)



〇流動ベール越幾斯三〇〇 阿片丁幾三〇〇 單舍利別一五〇 餽水  
二〇〇〇 右二日量一日三回分服(醫科大學方府)

(慢性症)ニハ食物攝生法ヲ旨トシ水布被覆法ヲ肚腹ニ施シ其他ノ冷水療  
法及轉地療養モ亦有効ナリ、門脈系ニ鬱血スル者ニハ下劑ヲ與ヘ、下利ス  
ル者ニハ急性症ノ中ヨリ適當ノ藥劑ヲ撰擇シ用ヒ猶下痢ノ項ヲモ參照ノ  
宜シク經過ヲ短縮ス可シ、通常用フル藥劑ハ次ノ如シ

〇加爾々私泉鹽四〇 番木鱉丁幾一〇 單舍利別五〇 餽水一〇〇  
〇 右一日三次分服

〇乳酸二〇一四〇 單舍利別七〇 餽水一〇〇〇 右一日三次分服

(醫科大學方府)

〇阿仙藥越幾斯二五〇 格魯兒安母尼亞一二〇 餽水二〇〇〇 亞刺  
昆亞護謨二五〇 右調勻二時間毎ニ一五〇宛服用

(フリーデマツヘル氏)

〇「ラタニー」根(一五〇)煎二〇〇〇 阿片丁幾一〇 亞刺昆亞護謨  
漿、橙皮舍利別各一五〇 右調和二時間毎ニ一五〇宛服用

(サロモン氏)

〇格倫僕根越幾斯二〇 阿片越幾斯、番木鱉越幾斯各〇 二右調勻丸  
二十粒ト爲シ朝夕一丸宛服用 (リツペルト氏)

〇沙列布(二〇)漿一〇〇〇 稀鹽酸〇 五 番木鱉丁幾一〇 芳香阿  
片酒一 五 右調和一日三次服用

〇腸潰瘍

食物攝生法ヲ嚴守セシメ務メテ液樣食物ヲ與ヘ草麻子油二〇〇 ナ頓服  
セシメ冷水灌腸ヲ行フ等ハ腸窒扶斯ノ條ヲ參照シ内服藥等ニ至テハ宜ク  
腸加苔兒ノ條ヲ參觀ス可シ

〇硝酸銀〇・二或ハ鉛糖〇・五 留水一〇〇〇 右灌腸料(サロモン氏)

〇次硝酸蒼鉛一・五 重炭酸那篤留母三・〇 右調勻一日三回分服

〇石灰水一〇〇〇 牛乳三〇〇〇 右一回量一日三回服用

(シラルス氏)

〇腸出血

腸室扶斯及赤痢ノ條ヲ参照ス可シ

〇腸癌

療法無効ナリ只一時ノ姑息法ヲ行フニ過キス

〇腸間膜癆

攝生法ヲ行ヒ葡萄酒ヲ與ヘ務テ滋養物ヲ投スルノ外尙ホ肺癆ノ條下ヲモ参照ス可シ

小兒腸膿胞炎即チ小兒瘦削病ニハ母乳ヲ検査ノ與ヘ雞卵ヲ投シ水飴ヲ與

ヘ藥劑ニハ格魯兒石灰若クハ炭酸石灰ヲ(牛乳ニ混シ)與ヘ或ハ少量ノ甘汞ヲ處ス

〇甘汞〇・〇〇一 乳糖〇・二 右散ト爲シ一日三回分服

〇腸炎

甲盲腸炎

未タ腹膜ニ炎症ノ波及セサル初期ナレハ草麻子油(一五・〇)或ハ甘汞(〇・五)ノ下劑若クハ冷水灌腸等ヲ行ヒ強壯者ニハ水蛭ヲ貼シ内服藥ニハ阿片劑ヲ處ス(腹膜炎ノ條参照)ト雖モ多クハ解熱劑ヲ兼用スル者トス

乙腸フレグモ一子

療法腸潰瘍ト大差ナシ宜ク参照セヨ

〇腸疝痛

每常緩下劑ヲ與フルヲ通規トス其他驅風劑、鎮痙劑等ヲ要ス

〇大黃末三〇 別刺敦那根末〇・二 蒲公英越幾斯適宜 右九五十粒ト  
爲シ茴香末着衣朝夕二粒宛服用(サロモン氏)

〇阿片〇・二五 乳糖適宜 右散三包ト爲シ疼痛時頓服

〇鹽酸莫爾比涅〇〇・一 重炭酸那篤留母一〇 右一包ト爲シ頓服

〇依的兒一〇 麝香〇・一 右温水ニ混シ頓服(ヤン氏)

〇繙草丁幾五〇〇「カヤフーテ」油五〇〇 右一〇宛毎二時温水ニ和シ  
服用(キユイレル氏)

其他鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入或ハ腹部温罨布ヲ貼スルヲアリロイベ氏ハ  
電氣ヲ腹部ニ流通スト云フ

但シ緩性下劑ヲ缺ク可ラス宜シク常習便秘ノ條ヲ參照ス可シ

〇腸脫 腸ヘルニア

ペロ氏ノ法(骨盤ヲ高クシ大腿ヲ屈シ兩股ヲ隔離セシメ左手ニ脱腸部ヲ

撮ミ前腹壁ニ向テ徐々ニ廻轉シツ、壓スルナリ)ニ隨ヒ腹腔内ニ還納セ  
シメテ後小兒ニハ可及的強壯療法ヲ行ヒ「ブリユックバンド」ヲ用フ可シ  
其他坐浴ヲ行ヒ微温湯灌腸法、麻醉性坐浴等ヲ施ス可シ

〇直腸炎

藥劑ニハ初メ甘草麻子油等ノ下劑ヲ投シ次テ收斂包攝劑ヲ與フ(腸炎  
ノ條ヲ參照セヨ)

〇鞣酸〇・二 次硝酸蒼鉛一・五 白糖適宜 右散三包ト爲シ一日服用

〇別刺敦那越幾斯〇〇・二五 柯々阿脂二〇〇 右坐藥トス

〇「シレオリン」水(二百倍) 右灌腸料(醫科大學方府)

〇智母兒水(千倍乃至五百倍) 右灌腸料(醫科大學方府)

〇直腸脫

虛弱者ニハ務テ強壯療法ヲ行ヒ飲食物ニ注意シ不消化物ヲ與フ可ラス又

概テ緩下劑ヲ與フルヲ通規トス時トシテハ硝酸銀水ヲ塗布スルヲアリ又之ヲ復歸スルニハ脂肪或ハ阿列布油ヲ塗布シタル布片ヲ示指ニ捲キ肛門ニ挿入シ初メ示指ノミヲ抜キ出シ漸次ニ布片ノ一端ヲ取り之ヲ出スヲ佳トス

〇機那丁幾三〇〇番木藍丁幾一〇〇單舍利別適宜 餹水一〇〇〇〇

右一日三次分服

〇痔疾

多クハ攝生法ニ由テ効ヲ奏ス其大略先ツ坐業ヲ廢スルト飲酒ヲ禁スルニアリ次テ辛辣物ヲ禁シ冷水灌腸ヲ行ヒ劇痛アル者ニハ別刺致那軟膏(十倍)ヲ塗布ス可シ其他ハ概テ外科的療法ニ屬スト雖凡内服藥トノ賞用スルモノハ次ノ如シ

〇重酒石酸加里八〇〇 硫黃花四〇〇 右散三包ト爲シ一日三回服用

〇痔瘻

外科書ニ就テ見ル可シ通常外用トシテ與フルモノハ鉛醋水(五十倍)ノ罨法トス

〇陸加答兒 白帶下

(急性症)ニハ緩下劑ヲ投シ温坐浴ヲ行ヒ炎勢減退スル時ハ稀薄硝酸銀水ヲ以テ腐蝕スルヲアリ輕酸水皸礬水(各百倍)撒里矢爾酸水(三百倍)等ヲ以テ洗淨ス可シ

(慢性症)ニハ前段洗淨藥ヲ爲スノ外強壯劑ヲ内服セシメ撒里矢爾酸綿ノ腔栓塞法或ハ子宮鏡ヲ腔ニ挿入シ置キ藥液ヲ塗布ノ徐々ニ鏡ヲ抜キ去ル等ノ法ヲ行ヒ或ハ諸多ノ收斂藥ヲ綿花ニ蘸シ腔ニ挿入シ時トシテハ鑛泉療法及海水浴等ノ効ヲ奏スルヲアリ

〇機那丁幾三〇〇 臭素加里二〇〇 單舍利別三〇〇 餹水一〇〇〇〇

右一日三次分服  
 ◎硫酸規尼涅一〇〇 還元鉄〇・五 甘草末適宜 右丸四十五粒ト爲シ每  
 回三粒宛一日三回服用

◎明礬三〇〇 微温湯三〇〇〇〇 右洗滌料

◎撒里矢爾酸一〇〇 微温湯三〇〇〇〇 右洗滌料

◎腔痙攣

房事ヲ禁シ玻璃製子宮鏡ヲ以テ一時間乃至半時間腔内ニ挿入シ置キ交換  
 ノ漸々擴張法ヲ行フ麻醉藥ニハ別刺敦那越幾斯坐藥(十倍)阿片越幾斯坐  
 藥(五十倍)ヲ與ヘ或ハ之ヲ腔内ニ挿入シ又輓近ニ至リテハ鹽酸「コカイ  
 ソ」水(十倍)ヲ腔内ニ注入ノ奏効セリト云フ

◎陣痛

劇甚ナル者ニハ其時期ヲ伺ヒ麻醉藥及興奮劑ヲ處ス即チ子宮口未タ開大

セサル片ハ抱水格魯刺兒(一回一・五)及少量ノ鹽酸莫爾比涅(〇・〇〇六)  
 ヲ頓服セシム、又子宮口已ニ開大ナル片ハ忽布滿氏鎮痛液二〇〇龍腦丁幾  
 二〇〇 餽水二〇〇〇ノ合劑ヲ頓服セシム可シ此目的ニラゲト氏ハ安質比  
 林水(十五倍ノ者三〇〇〇)ノ瀉腸法ヲ費用スト云フ

◎注射病

療法甚タ多シト雖モ奏効スル者ハ極テ尠シ獨リ次硝酸亞密兒ノ嗅入法ハ  
 有効ナルカ如シ然レモ左ニ列スル者ハ悉ク偉効ヲ奏スト云フ

◎硫酸亞篤魯比涅〇・〇〇三 餽水一〇〇〇 右皮下注入料(十回分)  
 (レバール氏)

◎安質必林一・五 乳糖適宜 右一回頓服(ボンテット氏)

◎呀啡涅四〇〇 撒里矢爾酸那篤魯母三〇〇 温湯一〇〇〇 右皮下注入料  
 (十回分)(スキントル氏)

### 利之部

#### ○淋疾

殊ニ食養法ヲ務メ酒類、辛辣物ヲ與フルコトヲ禁シ且運動ヲ節ス可シ便秘  
 スル者ニハ甘汞下劑ヲ與ヘ(決メ鹽類下劑ヲ與フ可ラス)或ハ灌腸法(蜂  
 蜜旃那浸合劑)ヲ施シ若クハ坐浴ヲ行フテ偉効ヲ奏ス而シテ炎症消散スル  
 ノ後收斂藥ノ注入ヲ爲ス可シ(微温ト爲シ用フ) 決メ初期ヨリ注入  
 藥ヲ爲ス可ラス

- 硫酸亞鉛水(六百倍) 鉛糖水(百五十倍) 硫酸銅水(九百倍) 鞣酸水(二  
 百五十倍) 沃度叻偈里設林合劑(二十倍) 右各尿道注入料
- 硫酸亞篤魯比涅 〇・〇〇一乃至〇・〇〇三 餾水四乃至八・〇

- 右尿道注入料(ボーチ氏)
- 硫酸亞鉛 〇・三 芳香阿片酒 二・五 餾水 二〇〇・〇 右尿道洗滌料

○「タルリン」水(四十倍乃至百倍) 右尿道注入料(醫科大學方府)

内服藥トノ通常與フル者ハ次ノ如シ

- 重碳酸那篤偈母 四・〇 臭素加里 二・〇 非沃斯越幾斯 〇・四 老利兒水  
 三・〇 餾水 一〇〇・〇 右一日三次分服
- 百露拔爾撒謨 一・五 華澄茄末適宜 右爲丸着衣 一日三次分服
- 烏華烏爾矢葉煎 一〇〇・〇 醋酸加里 四・〇 苦味丁幾 二・〇  
 右一日三回分服(醫科大學方府)

其他骨拜華拔爾撒謨、帝列並油、沒藥、鞣酸等ヲ用ユルモ稍偉効ヲ奏ス

#### ○淋毒性眼炎

直ニ入院セシメテ看病婦ヲ附ケ可成傳染ヲ防キ膿ノ排除ニ汲々セシム可  
 シ(但シ輕症ニ於テハ如此嚴重ノ處置ヲ要セサルコトアリ) 初期ニハ寒襪法  
 ヲ行ヒ炎症極度ニ達スルキハ温罨法ヲ行ヒ洗滌劑ニハ左ニ掲クルモノヲ

用ヒ内服藥ニハ下劑ヲ與ヘ消炎後硝酸銀水(十倍)ノ點眼ヲ爲シ食鹽水ヲ以テ洗滌スル等充分ニ注意ス可シ

〇沃度加里〇・四 赤色沃度汞〇・五 韶水一〇〇〇 右洗滌料

〇淋毒性關節炎

消炎法ヲ行ヒ内服ニハ下劑ヲ投シ患部ニ氷嚢ヲ置キ或ハ水蛭ヲ貼スルヲアリ其他沃度丁幾ヲ塗布シテ吸収ヲ促シ併テ治淋法ヲ務ム可シ

〇流行性腦脊髄膜炎

腦膜炎ノ療法ト大差ナシ宜シシ參照ス可シ

留之部

〇瘰癧

務テ強壯劑及變質藥ヲ與フ可シ其他患部ニ沃度丁幾ヲ塗布シ或ハ沃度防

軟膏、底列並油等ノ塗擦ヲ爲シ滋養物ヲ與ヘ轉地溫泉療養、旅行海水浴等皆有効ナリ

〇肝油二〇乃至一五〇 右一回量一日二三回臨時糖水ニ浮ヘ服用

〇肝油夏期代用藥ハ其用量ヲ斟酌ノ投ス可シ(肺癆ノ條下ニアリ)

〇沃度鉄舍利別一〇乃至六〇 單舍利別適宜 韶水三〇〇乃至一〇〇〇

〇〇〇 右一日三次分服(年齢ニ應シ藥量斟酌)

〇沃度加里〇・一乃至一〇 韶水二〇〇乃至一〇〇〇 單舍利別適宜

右一日三次分服(年齢ニ應シ藥量斟酌)

〇乳酸鐵〇・〇五乃至〇・一 磷酸石灰〇・一白糖〇・五 右散一包ト爲シ

每食後一包宛服用(シラルス氏)

〇沃度鐵二・五 機那皮大黃各四〇 蘆薈一〇 單舍利別適宜 右丸五十粒ト爲シ一日一箇乃至三四箇ヲ投ス(コデクヌ、フランソク氏)

○沃度○○六沃度加里一○家猪脂一五○ 右軟膏ト爲シ腺腫ニ塗擦ス可シ(サロモン氏)

○底列並油、肝油 右何レモ瘰癧性骨病ニ罨法料ト爲ス

○ルードウイー氏咽喉炎

初ニハ水濯法水蛭等ノ消炎法ヲ行ヒ或ハ下泄瀉腸法ヲ施スト雖凡多ク外科的ニ屬ス

### 遠之部

○黃疸 加答兒性

初診ノ急性胃加答兒ノ症狀ヲ呈スルキハ吐瀉ヲ與フ可シ(胃加答兒ノ條參照)次テ下瀉ヲ與フルヲ通規トス鼓腸ニハ驅風劑ヲ用ヒロイベ氏ハ此目的ニ電氣流通ヲ賞揚ス下痢甚シキ者ニハ獨布兒散ヲ投シ或ハ時トノ利

尿瀉ヲ要スルコアリ感冒ヨリ來ル者ニハ解熱藥兼發汗劑等ヲ處ス可シ其他冷水灌腸、曹達浴等ヲ行フコアリ

○加爾々私泉鹽一五○ 微温湯一○○○ 苦味丁幾二○ 右一日三次分服

○加爾々私泉鹽一○○○ 右每朝頓服(一週間持續)(醫科大學方府)

○硫酸麻偏涅矢亞一五○ 稀鹽酸二三滴 餽水一○○○ 右一日三次

○硫酸那篤留母二○○○ 重炭酸那篤留母五○ 餽水一○○○

一日三次服用(フレリヒス氏)

○稀鹽酸一○ 稀硝酸○ 五單舍利別適宜 餽水一○○○

右一日三次分服(フレリヒス氏)

○複方大黃越幾斯一○ 蘆薈越幾斯二○ 龍膽末適宜 右丸三十粒ト爲シ朝夕三丸宛服用(バンベルゲル氏)



- ◎大黃(二・五)浸一〇〇〇 重碳酸那篤留母二〇 橙皮舍利別一五〇
- 右一五〇宛每一二時服用(サロモン氏)
- ◎冷水三〇〇〇 右每日一回灌腸(醫科大學方府)

◎嘔吐

其原因ヲ探ルハ最モ必用ナリ例之食物停滯等ニハ却テ之ヲ可トシ腸ノ痙攣等ニハ外科治法ヲ要シ妊婦嘔吐症ナルキハ嗜好物ヲ與ヘ或ハ人工早産術ヲ行ヒ脚氣ニ因スルハ興奮劑ヲ投スル等ノ如シ然レモ一般賞用スル處ノ者ハ左ノ如シ即チ沃度丁幾、別刺敦那丁幾、臭素加里、樟酸設留母、結麗阿曹篤、鹽酸箇加因、炭酸水、氷片等ヲ與ヘ時トシハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入ニテ鎮靜スルコアリ

- ◎樟酸設留母〇・五 臭素加里二〇 別刺敦那丁幾一〇 餹水六〇〇
- 右一日數回分服

- ◎沃度丁幾八滴 餹水三〇〇 右一日數回分服
- ◎鹽酸箇加因〇・一 〇・五 餹水二〇〇 〇・一 三〇〇 右半時每少量頓服
- ◎抱水格魯刺兒二〇 亞刺昆亞護謨漿五〇〇 餹水五〇〇
- 右灌腸料(サロモン氏)
- ◎樟酸設留母〇・四 乳糖適宜 右散爲四包一日四次服用
- ◎重碳酸那篤留母二〇 酒石酸一〇〇 右沸騰飲料

◎オツエナ 惡臭鼻瘍

肥厚症及瘦削症共ニ焦灼法或ハ腐蝕法ヲ行ヒ時トシハ截除法ヲ施スコアリ通常收斂腐蝕ノ目的ニハ硝酸銀ヲ用フビルロート氏ハ結麗阿曹篤留母里設林合劑ヲ用フト云フ其他注入藥ニハ安息香酸那篤留母水、石炭酸水、撒里矢爾酸水、鞣酸水、過酸化滿俺水、沃度加里水等ヲ撰用ス猶微毒性ノ者ニハ撒布藥トシ甘汞白糖合劑若クハ沃度防細末等ヲ用フルコアリ

### 加之部

#### ◎感冒熱

病室ヲ暖メ新鮮ノ空氣ヲ導キ身体ヲ温護シ加密列浸ノ如キ長ク温ヲ保有スルモノヲ與ヘ次テ種々ノ發汗劑ヲ投ス然レ藥劑ニノミ放任ス可ラス

◎撒里矢爾酸那篤留母一〇 右濃粉紙ニ包ミ同量一包毎二時頓服

◎安賢獸貌林一〇 乳糖適宜 右爲三包一日三回頓服

◎撒里矢爾酸那篤留母三〇 苦味丁幾二〇 餾水一〇〇〇 右一日量

◎鹽酸規尼涅〇・五 右「オプラー」ニ包ミ頓服

#### ◎間歇熱

其時期ヲ伺ヒ規尼涅ノ内服ヲ特法トス其服用時期ニ種々ノ說アレ概テ發熱時二三時間前ニ用フルヲ可トス(水溶ノモノ)然レ丸散劑等ハ五六時

間前ニ用フルヲ要ス若シ之ニテ奏効ナキハ砒石水、撒里矢爾酸那篤留母等ヲ用フ其他惡液性トナルキハ鉄劑ヲ用ヒ凡テ強壯藥ニ宜シ

◎鹽酸規尼涅〇・七 橙皮含利別一〇〇 餾水一〇〇 右頓服

◎鹽酸規尼涅〇・八 右「オプラー」ニ包ミ頓服

◎硫酸規尼涅〇・七 右偏里設林ニテ丸ト爲シ頓服

以上頓服藥ハ發作前時間ヲ伺ヒ二三回連用スルモノトス

◎亞砒酸加留母液三滴 餾水一〇〇〇 右一日三次服用(每食後)

◎亞砒酸加留母液五〇 桂皮水一〇〇 右每回四滴(漸次増量ノ三十

滴ニ至ル)宛一日二回清水ニ和シ服用(注意)(シリウケンベルグ氏)

◎撒里矢爾酸那篤留母二〇 右一回量濃粉紙ニ包ミ頓服一日二回

#### ◎脚氣

飲食攝生ヲ第一トシ可成腸胃ノ消化力ヲ助クルコトニ注意ス可シ而シテ常習

便秘アル者ニハ緩下劑ヲ與ヘテ傍ヲ滋養物ヲ給シ又病症初期ニ下肢ノ  
 麻痺ノミニ止マル者ハ宜ク轉地療養(但シ遠隔山間ノ無脚氣地)ヲ爲サシ  
 メ症狀已ニ増進ノ心悸亢進及ヒ下肢、眼瞼等ノ浮腫アル者ニハ可及的安  
 靜ヲ守ラシメ重酒石酸加里劑ヲ與ヘテ輕ク便通ヲ促シ腸胃症甚シキ者ニ  
 ハ加兒々私泉ヲ與ヘ水腫甚キ者ニハ醋酸加里、心音不整混濁セル者ニハ  
 双蘭菊丁幾、實斐答里斯、規尼涅等ヲ與ヘ嘔吐ヲ發スル者ニハ實斐答里斯  
 ヲ用フ可ラス若シ用ヒ來レルキハ速ニ之ヲ廢シ氷片ヲ含マシメ穆酸設留  
 母、臭素加里、沃度丁幾、鹽酸箇加因等ヲ與ヘ胸廓苦悶、呼吸窘迫等ニハ心  
 臟部ニ氷囊ヲ措キ或ハ芥子泥、乾角等ヲ貼シ虛脫ノ恐レアル者ニハ「カン  
 フル」ノ皮下注入、雞卵ノ灌腸法、恢復期ニ於テハ強壯滋養物ヲ與ヘ「ボル  
 ト」酒ヲ與ヘ或ハ食鹽浴ヲ行ヒ藥劑ニハ規尼涅、鐵劑等ヲ用ヒ或ハ電氣流  
 通ヲ行フコトアリ其他時トノ慢性脚氣ノ水腫ニ葡萄酒若クハ麥酒等ノ偉効

ヲ奏スルコトアリ

- 重酒石酸加里六・〇 苦味丁幾二・〇 餽水一〇〇・〇 右一日三次分服
- 重酒石酸加里六・〇 双蘭菊丁幾二・五 番木鱉丁幾一・〇 餽水一〇〇  
 ・〇 右一日三次分服
- 加爾々私泉鹽六・〇 別刺敦那越幾斯〇・〇 六 苦味丁幾二・〇 餽水一  
 〇〇・〇 右一日三次分服
- 稀鹽酸一・〇 硫酸麻屈涅矢亞六・〇 番木鱉丁幾一・〇 餽水一〇〇・  
 〇 右一日三次分服(醫科大學方府)
- 麥角越幾斯三・〇 龍膽末適宜 右丸四十粒ト爲シ一日三四回每回  
 二丸宛服用
- 實斐答里斯葉(一・〇)浸一〇〇・〇 醋酸加里六・〇 單含一〇・〇  
 右一日三次分服

○樟腦一〇〇 阿列布油一〇〇〇 右溶解後皮下注入料

○機那丁幾三〇〇 番木鱈丁幾一〇〇 稀鹽酸一〇〇 單舍利別五〇〇  
餾水一〇〇〇〇 右一日三次分服

○林檎酸鐵丁幾一〇〇〇 亞砒酸加留母液二〇〇 右混和二十滴宛餾水  
ニ和シ每食後服用

○鹽酸規尼涅〇・二 乳酸鉄〇・三 龍膽末〇・三 右爲丸每食後服用

○鷲口瘡

重碳酸那篤留母水(廿五倍)硼酸那篤留母水(三十倍)格魯兒酸加里水(五十倍)等ヲ以テ口内ヲ洗滌シ或ハ硼酸那篤留母偏里設林合劑(十倍)ヲ塗布ス可シ

○肛門裂創

清潔ヲ旨トシ時々冷水ニテ洗滌シ爾後直ニ左ノ塗擦藥ヲ爲ス其他時トノ

硝酸銀水(廿五倍)ヲ塗布スルコアリ

○別刺敦那越幾斯一〇〇 家猪脂一〇〇〇 右軟膏ト爲シ塗擦料トス

○沃度叻一〇〇 「ワゼリン」二五〇〇乃至二〇〇〇 右軟膏塗擦料トス

○肝臟充血

原因療法ヲ要ス誘導法ニハ脚湯、坐浴或ハ肛圍、腔等ニ水蛭ヲ貼シ内服藥ニハ凡テ加爾々私泉鹽、(心臓病合併ニハ用フ可ラス)大黃、蘆薈、格魯瑾篤等ノ下劑ヲ與ヘ時トノハ轉地療養ヲ命スルコアリ

○肝包炎

外傷性ニシテ疼痛甚シキ者ニハ局所ノ瀉血法、鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入法等ヲ行ヒ通常内服藥ニハ甘汞、蒔刺巴(各〇・五)ノ下劑ヲ頓服セシメテ足ルモノトス

○肝臟炎

甲 化膿性肝臟炎

肝包炎ノ治法ト畧ホ一般ナリ熱アルモノニハ規尼涅ヲ與ヘ局部ニ破損ノ  
模様アルキハ外科術ヲ行フ可シ

乙 微毒性肝臟炎

沃度加里ノ内服ニ宜シ

丙 肝臟纖維組織炎

肝臟キルローゼ

初期ニハ酒類ヲ嚴禁シ淡白ノ食物ヲ與ヘ疼痛ヲ訴フル者ニハ温罨法ヲ施  
シ水銀軟膏ヲ塗擦シ肛圍ニ蟻鍼ヲ貼シ内服藥ニハ加爾々私泉鹽、大黃、甘  
汞等ノ下劑ヲ處シ微毒アル者ニハ沃度加里ヲ與ヘ熱アル者ニハ規尼涅、  
安質必林、安質歌貌林、撒里矢爾酸那篤留母等ヲ投シ腹水ヲ生スルキハ宜  
シシ腹水ノ條ヲ參照ス可シ時トノ腹水増進スルキハ穿腹術ヲ施スヲアリ  
○重酒石酸加里一六・〇 沃度加里二・〇 單舍利別一五・〇 餽水二〇〇

○ 右一日六回二日分服(醫科大學方府)

○肝臟黃色萎縮

單ニ現症療法ノ一アルノミ

○羣丸炎

患者ノ安靜ヲ保持シ阿列布油、格魯胃母ノ合劑或ハ水銀軟膏ヲ塗擦ス

○疥癬

主藥ニハ百露拔爾撒謨、蘇合香トス次テ硫黃、「ナフタリン」、綠石鹼及昇  
汞等ヲ賞用ス

○百露拔爾撒謨一〇・〇 亞爾簡保兒一〇・〇 右塗擦料

○蘇合香一〇・〇 阿列布油一〇・〇 右塗擦料

○「ナフタリン」五・〇 綠石鹼二五・〇 「ヲノリン」二五・〇 右塗擦料

○牙關緊急

破傷風ノ項ヲ參照ス可シ

與之部

〇痒疹

微温浴ヲ行ヒ身体ヲ清淨ニシ「ナフタリン」軟膏(二十倍)ヲ塗擦シ(カボ  
シー氏)大人コハ「ピロカルピン」ノ皮下注入(一回量〇、〇〇六)ヲ施ス  
アリ(ジモン氏)

多之部

〇胆道加答兒

加答兒性黃疸ノ療法ト大差ナシ

〇胆石症

鎮痙ノタメ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入若クハ頓服ヲ爲シ或ハ阿片、抱水格  
魯刺兒等ノ内服若クハ抱水格魯刺兒ノ灌腸ヲ施シ猶患者ノ體質ニ由リ水  
啞、水瀉、温浴法等ヲ施シ虚脱ノ恐レアル者ニハ「カンフル」ノ皮下注入ヲ  
要スルコトアリ

〇抱水格魯刺兒二〇〇 餾水三〇〇 右頓服

〇「パラアルデヒド」二〇〇 餾水三〇〇 右頓服

〇格魯兒叻ヲ綿花ニ蘸シ嗅入セシム

〇抱水格魯刺兒二〇〇 亞刺里亞護膜漿五〇〇 餾水五〇〇

右灌腸料(サロモン氏)

〇加爾々私泉鹽一五〇 單舍利別適宜 餾水一〇〇〇 右一日三次分  
服

〇依的兒精二〇〇 底列並油八〇 右調和毎回十五滴宛一日三次餾水

ニ和シ服用(醫科大學方府)

◎丹毒

呂之部ニ羅斯ト在リ

禮之部

◎僂麻質私

(急性症)ニハ褥中ニ靜息セシメ綿花ヲ以テ患部ヲ被包シ其上ヲ綁帶シテ關節ヲ固定ス可シ内服藥ニハ撒里矢爾酸那篤留母ヲ與ヘ尤モ間歇症狀ヲ呈スルルハ規尼涅ヲ試用シ又劇痛アル者ニハ沃度加里ヲ與ヘ時トノハ温泉浴法、按摩法等ヲ行フコトアリ

◎撒里矢爾酸那篤留母四・〇 苦味丁幾二・〇 餽水一〇〇・〇

右一日三次分服

◎撒里矢爾酸那篤留母一〇・〇 右爲十包毎二時一包頓服計熱ニ忌ル可カラズ

◎安息香酸那篤留母一・〇 白糖〇・五 右散爲一包同量十包ヲ作り毎二時一包頓服(サロモン氏)

「ザリチン」一・五 右「チアラート」ニ包ミ毎一時頓服セシメ翌日ヨリ一日三回トス(マクシラガン氏)

◎「イヒチチール」一・〇 「ワゼリン」九・〇 右軟膏トナシ外用 (ウンナ氏)

◎格魯兒叻、阿片丁幾、龍腦丁幾、別刺敦那越幾斯各一・〇 菲沃斯油五

〇・〇 右混和塗擦料(リコルド氏)

◎安質必林〇・五 餽水一・〇 右溶解後皮下注入料(醫科大學方府)

(慢性症)ニハ種々ノ内外治法ヲ施スト雖モ偉効ヲ奏セサルモノ多シ通常用フルモノハ左ノ如シ 前段急性症ノ項ニ掲クル關節固定法ハ必ス行フモノトス其他急性症ヲ參照ス可シ

○格爾矢偏護丁幾三・〇 沃度加里・〇・七 餾水一〇〇・〇

右一日三次分服(サロモン氏)

○撒里矢爾酸那篤留母三・〇 格爾矢偏護丁幾三・〇 双蘭菊丁幾二・〇

餾水一〇〇・〇 右一日三次分服

○沃度加里二・〇 撒里矢爾酸那篤留母二・〇 獨布兒斯氏散二・〇 甘

草末適宜 蒲公英越幾斯適宜 右丸六十粒ト爲シ毎回四粒一日三次

服用

○「イヒサチール」酒精各一〇・〇 右塗擦料(醫科大學方府)

○「プロヒラミン」〇・六 薄荷油糖四・〇 餾水一〇〇・〇 右每服一五・

〇一日六回(アウエナリウス氏)

○別刺敦那越幾斯・〇・五 格魯兒叻一五・〇 拔爾撒謨油適宜

右調和塗擦料(ニーマイエル氏)

○別刺敦那越幾斯・〇・二 沃度加里一・〇 單蠟膏二二・〇

右調和塗擦料(サロモン氏)

其他塗擦藥ニハ沃度丁幾、龍腦丁幾、礪砂精、底列並油、「カヤフーテ」油、石腦油等宜シテ試用ス可シ

會之部

○鼠蹊歇兒尼亞

腸脱トノ知之部ニアリ

津之部

○頭痛

原因療法ヲ最モ緊要トス即チ麻刺利亞ニ因スル者ニハ規尼涅、有熱者ニ



ハ解熱藥、鎮痛トシテ安質必林、臭素加里、胃腸ノ反射的刺戟症ニハ消化  
 機官ノ療法ヲ行ヒ眼病ニ因スル者ハ其處置ヲ爲シ其他諸種ノ病患ヨリ此  
 症ヲ誘起スル者ナレハ決メ症候ノミヲ治療ノ満足ス可ラス時トシテハ轉地  
 療養(山間或ハ海水浴場)ノ意外ニ奏効スルコトアリ

- 鹽酸規尼涅一〇〇 右三包ト爲シ每服「オプラート」ニ包ミ一日三回
- 臭素加里二〇〇 橙皮舍利別五〇〇 餽水一〇〇〇 右一日三次分服
- 安質必林〇〇五 右頓服一回量一日二三回
- 纈草酸亞鉛〇〇一 非沃斯越幾斯〇〇四 甘草膏適宜 右爲丸一日三回
- 亞爾簡保兒二五〇〇 丁子油五滴 偏里設林五〇〇〇 常用醋二五〇〇

右調和塗擦料(醫科大學方府)

其他外用ニハ格魯兒防、礪砂精、依的兒等ヲ塗擦シ或ハ頭部ノ濯水法若ク  
 ハ電氣ヲ流通スルコトアリ

### ◎痛風

攝生法ヲ旨トシテ飲酒ヲ禁シ坐業ヲ戒メ運動ヲ命シ冷水ニテ身体ヲ洗ヒ  
 礦泉水ヲ飲用スル等悉ク有効ナリトス

(急性症)發作時ニハ患部ニ別刺敦那越幾斯或ハ雙蘭菊越幾斯ノ軟膏ヲ塗  
 擦シ以テ患部ヲ綑絡シ次テ内服藥ヲ處ス

- 硝酸加里七・五 餽水二五〇〇〇 ニ溶解セシメ後、次醋酸鉛水、底列並  
 油各七・五ヲ加ヘ用フ 右關節部洗滌料一日二三回(フェール氏)
- 炭酸麻偏涅矢亞五〇〇 硫酸麻偏涅矢亞一〇〇〇 格爾矢偏謨酒二〇〇
- 餽水一二〇〇〇 右一晝夜間服盡(注意)(ガルロット氏)
- 雙蘭菊越幾斯〇〇五 癒瘡木越幾斯一〇〇〇 龍膽末適宜 右丸五十粒  
 ト爲シ着衣一回一丸宛一日三次服用(ブーシヤルダー氏)
- 炭酸利胃母〇〇六 白糖適宜 右散爲三包每服「セルテル水」ニ和シ一

日量(ウナルフ氏)

○鹽酸規尼涅一・○鹽酸十滴 韶水二〇・〇 覆盆子舍利別二〇・〇

右三回頓服(サロモン氏)

其他鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入或ハ抱水格魯刺兒ノ内服等ヲ命スルヲアリ  
(慢性症)ニモ亦急性症ノ處方ヲ應用シ或ハ種々ノ塗擦藥ヲ爲ス又僂麻質  
斯ノ條ヲモ參照ノ適當ノ處方ヲ撰用ス可シ其他時トノハ按摩法、局部卷  
法若クハ硫黃泉ノ入浴ヲ命スルヲアリ

○「ナフタリン」、甘草末各八・〇 右九百二十粒ト爲シ着衣毎回一二粒  
宛一日四五回服用(グスターフ、シーモン氏)

○炭酸利胃母二・〇 韶水二〇〇・〇 右卷法料(サロモン氏)

### 奈之部

### ○軟性下疳

黴毒(硬性下疳)ノ療法ヲ參照ス可シ

### 羅之部

### ○癩病

多クハ姑息法ニ止ルト雖厄ベルツ氏ハ烙鐵ヲ以テ結節浸潤部ヲ燒灼シテ  
奏効ヲ見タリト云ヒ其他輒今賞用スルモノハウンナ氏ノ治癩法ナリ其法  
ハ「イヒチチアル」「グリザロビン」「レツルチン」「ピロガロス」酸等ノ  
使用ニアリ詳言スレハ四肢ノ結節部ニハ「ピロガロス」軟膏(十倍)頭首  
軀幹等ニハ「グリザロビン」軟膏(十倍)ヲ塗擦シ漸々増量(濃厚ナル軟膏  
ヲ用フルニアリ)ノ中毒症ヲ起スルハ暫時休止シ(面部ニハ撒里矢爾酸「ケレナ  
ト云」結節稍々去ルルハ「イヒチチアル」軟膏(十倍)ヲ塗擦セリ以上膏劑ハ

「ワゼリン」ニテ製スルヲ佳トス猶ホ此療法ヲ行フ始メヨリ「イヒチチー  
 ル」ノ内服(一日量〇・四ヨリ三・〇迄漸次増量ス)ヲ命スルコアリ、而ノ從  
 來賞用セシモノハ大楓子油(一日量二・〇一六・〇)「オイカリプト」油(一  
 日量二・〇一六・〇)等ナリヘブラ氏ハ沃度丁幾、沃度叻、格魯胃母合劑ヲ  
 塗擦スト云フ

○大楓子油二・〇 右九ト爲シ一日三回ニ分服漸次増量ノ八・〇ニ至  
 ル迄持長シ再ヒ減量ス(醫科大學方府)

○卵巢炎

患部ノ腹壁或ハ鼠蹊部ニ水蛭ヲ貼シ或ハ氷嚢ヲ置キ或ハ坐浴ヲ行ヒ疼痛  
 甚シキ者ニハ別刺敦那越幾斯(十倍)柯々阿脂合劑ノ坐藥ヲ與ヘ或ハ之ヲ  
 腔ニ挿入シ其他百露拔爾撒謨、偈里設林合劑チ「タンボン」ニ塗リ腔ニ挿  
 入スル等ノ法ヲ行ヒ内服ニハ下劑ヲ投ス

○沃度叻〇・二五 柯々阿脂適宜 右棒ト爲シ腔ニ挿入ス(シルツ氏)

○卵巢囊腫

外科治法ノ一アルノミ

○狼瘡

硝酸銀、苛性加里、格魯兒亞鉛等ヲ以テ腐蝕シ或ハ烙鐵若シハ烙白金ヲ貼  
 シ時トシハ亂刺法ヲ行フコアリ内服藥ニハ沃度加里、肝油等ヲ與フ可シ

字之部

○ウエルホーフ氏血斑病

ウエルホーフ氏稱揚スル處ノ鐵酸類及機那劑ヲ與ヘ緩下藥ヲ投シ衄血及  
 其他ノ出血症ニハ直達療法ヲ行ヒ時トシハ電氣ヲ通スルコアリ猶ホ衄血  
 、恭實病及矢荷兒陪苦ノ項ヲ參照ス可シ

◎硫酸規尼涅〇・三 稀硫酸十滴 覆盆子水一五〇・〇 覆盆子舍利別三〇・〇 右調和每三時一五・〇宛服用(ラジウス氏)

乃之部

◎腦膜炎 (單純性)

病室ヲ暗クシ患者ノ後ニ小燈ヲ懸ケ新鮮ノ空氣ヲ引キ衣衾ヲ輕クスル等ハ攝生法中緊要ノモノトス次テ清涼ノ飲料ヲ與ヘ可成患者ヲ安靜ニ保持セシム可シ而シテ外治法ニハ顛顛部ニ熨針ヲ貼シ或ハ局部ノ刺絡(強壯者)ヲ施シ頭部ノ氷罨法(大ナル氷嚢ヲ枕トシ顛顛部、前額部ニハ猶ホ別ノ氷嚢ヲ天井ヨリ釣リ以テ患部ニ貼ス)或ハ灌水法ヲ行ヒ(可成頭髮ヲ剃除シ)頭部ニ沃度丁幾ヲ塗布シ耳後ニ發泡膏ヲ貼シ頸部ニ乾角ヲ用ヒ或ハ水銀軟膏ヲ四肢ニ塗擦シ或ハ腸中ニ鹽類劑ノ灌注ヲ試ムル等時宜ヲ認メ

撰用ス可シ、内治法ニハ先ツ甘汞蒺刺巴(各〇・五)ノ下劑ヲ投シ高熱ニハ鹽酸規尼涅(〇・五)撒里矢爾酸那篤留母(二・〇)安質必林(〇・五)安質歇貌林(〇・三)等ノ頓服或ハ隔時連用ヲ命シ、疼痛甚シキ者ニハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入若クハ臭素加里(一日量三・〇)ノ内服或ハ抱水格魯刺兒(二・〇)ノ頓服ヲ命シ、虛脫ノ恐レアル者ニハ葡萄酒ヲ内服セシメ「カンフル」ノ皮下注入ヲ行フ可シ、恢復期ニ至レハ務テ安靜ヲ旨トシ強壯劑ヲ與フル等宜シク注意周密ナルヲ要ス

◎機那皮(六・〇)煎一〇〇・〇 臭素加里三・〇 單舍利別五・〇

右調和每回一五・〇宛服用一日六回

◎沃度加里一・五 苦味丁幾二・〇 餽水一〇〇・〇 右一日三次分服

◎機那皮(六・〇)煎一〇〇・〇 葡萄酒一〇〇・〇 單舍利別五・〇

右一日量

〇抱水格魯刺兒一〇 亞刺昆亞護膜漿、餾水各五〇〇 右灌腸料

(サロモン氏)

〇腦水腫

甲 急性症

單純小兒腦膜炎  
結核性小兒腦膜炎

療法無効ニシテ概ニ對症姑息法ニ歸ス可シト雖モ通常用フル者ハ次ノ如シ  
外治法トシテハ顯顯ニ水蛭ヲ貼シ絶ヘス頭上ニ水囊ヲ措キ芥子泥ヲ身体ノ  
局部ニ貼シ温浴ヲ行ヒ或ハ下泄灌腸ヲ施シ或ハ沃度丁幾及沃度防軟膏ヲ  
頭部ニ塗擦シ或ハ水銀軟膏ヲ頸背ニ塗擦スル等ナリ、内治法トシテハ年  
ニ應ニ甘汞(〇〇一乃至〇〇二)ヲ頓服セシメ或ハ沃度加里(〇〇六乃至  
〇〇二)ヲ内服セシメ嘔吐アル者ニハ鹽酸箇加因、樟酸設留母、鎮痙劑ニハ  
臭素加里、抱水格魯刺兒、興奮劑ニハ龍腦、麝香、「ボルト」酒等ヲ與フ

〇沃度防一〇一〇 格魯刺兒一〇〇 右頭部塗擦料(サロモン氏)

〇鹽酸箇加因〇〇一 餾水一〇〇 右少量宛内服(鎮吐)

乙 慢性症

後天慢性腦水腫  
先天慢性腦水腫

(後天症)ハ佝僂病ヨリ來ルヲ多キカ故ニ稍々治療ノ奏効ヲ見ルト雖モ  
(先天症)ニ在テハ概テ療法ノ無益ナルモノトス  
外治法トシテハ壓縮綁帶ハ病家ニ對スル務ノ如シト雖モ聊カ壽命ヲ伸長スル  
モノナリ穿刺法ハ寧ロ施ササルヲ佳トス其他急性症ノ項ニ揭示セル治法  
ノ中ヲ撰擇シ一時ノ免法ト爲ス可シ

〇腦充血

食物攝生法ヲ主要トシ原因療法ヲ行フ可シ外治法ニハ頭髮ヲ剃除ノ頭部  
ノ水囊及灌水法ヲ行ヒ耳後ニ發泡膏ヲ貼シ肛圍ニ水蛭ヲ附ケ下劑ヲ與ヘ  
或ハ芥子脚浴ヲ施シ内服藥ハ當時ノ原因症候ニ由リ投ス可シ

〇麥角越幾斯〇〇五 右丸一粒ト爲シ毎回四粒宛一日三回服用

### ◎腦貧血

(醫科大學方府)

先ツ平臥セシメ腰部ヲ高クシ枕ヲ低クシ以テ血液ノ腦ニ流通スルノ便ヲ計リ同時ニ人工呼吸法ヲ行ヒ安母尼亞精或ハ醋酸ヲ嗅入セシメ「カンフル」若クハ依的兒ノ皮下注入ヲ頻々行ヒ、皮膚刺戟藥トシテ冷水灌漑法、芥子泥ノ赤引法、鹽類ノ刺戟灌腸等ヲ行ヒ次テ葡萄酒、鉄劑、規尼涅等ノ強壯藥ヲ與フ可シ

### ◎腦出血 卒中

顔面潮紅スルトキハ頭部ヲ高クシ凡テ腦充血ノ療法ヲ行ヒ(瀉血法ハ行ハサルヲ佳トス)顔色蒼白憔悴シ脈搏微弱結代スル等ノ者ハ直ニ安母尼亞ノ嗅入法ヲ施シ凡テ腦貧血ノ療法ヲ行フ可シ而シテ其發作ノ恢復シ精神醒覺スルトキハ可成安靜ヲ命シ食物ハ流動性無刺戟ノモノヲ少量ツ、與ヘ

頭部ノ冷湯、緩下劑(蓖麻子油ノ如キ)等ヲ投シ常ニ患者ノ舉動ニ注意シ第二回ノ發作ヲ防クニ汲々ス可シ而シテ殘遺疾患即チ麻痺症等ハ各部ニ就テ見ル可シ

### ◎腦炎

概テ腦膜炎及腦出血ノ療法ニ同シ其他ハ外科ニ屬ス

### 久之部

### ◎霍亂 歐洲虎列刺

率テ亞細亞虎列刺ノ療法ト同シ其他ハ急性胃加答兒及急性腸加答兒ノ條ヲ參照ス可シ劇疹アル者ニハ鹽酸莫爾比涅ノ(一回〇〇一)皮下注入ヲ施ス可シ

### ◎蛔蟲

攝綿支那及之レヨリ採リタル珊瑚尼涅ヲ主藥トス

○珊瑚尼涅〇〇三白糖適宜 右散爲三包一日量

○珊瑚尼涅〇〇五甘汞〇〇六白糖適宜 右散爲二包頓服二回分

○攝綿支那末、纈草末各一〇〇甘汞〇〇六白糖二〇〇 右散爲四包

一日四回分服(ブーシユ一氏)

○佝僂病 英吉利病

消食機ヲ強壯ナラシメ務テ母乳ヲ與ヘ肉羹汁ヲ投シ鑛泉浴ヲ命シ頭部或ハ其他ノ軀軀ヲ其形ニ隨テ半片ノ摸形ヲ作り之ニ安架セシメ患者ノ形体ヲ矯正スルヲ要ス藥劑ニハ磷酸石灰、肝油鐵劑、沃度鐵舍利別等ヲ與フ(痲癩病ノ條ヲ參觀セヨ)

○磷酸石灰末二〇〇 右毎回小兒食物ニ混シ與フ(サロモン氏)

○磷酸石灰、炭酸石灰各〇〇二 乳酸鐵〇〇三芳香散〇〇三 右散爲一包

同量數包ヲ作り每食後一包宛服用(クラルス氏)

○林檎酸鐵丁幾、酒精大黃丁幾各一五〇 右一回五滴乃至十五滴宛一日三次服用(ハレツ氏)

○火傷

療法甚ク多シト雖モ今其衷ヲ取り左ニ示ス

第一期症ニハ硝酸銀水或ハ阿列布油、偏里設林等ヲ塗布ス

第二期症ニハ阿麻仁油或ハ阿列布油ト重炭酸那篤留母ノ合劑ヲ塗布シテ綿帶ヲ爲シ置ク可シ(一日數回塗布)或ハ三十倍ノ石炭酸、阿列布油合劑ヲ塗布シ若クハ石灰水ト阿列布油等分ノモノヲ「リンナル」布ニ蘸シテ用ヒ何レモ塗布ノ後撒里矢爾酸綿ヲ被フテ綁帶ス

第三期症ニ於テハ率テ第二期ノ如ク處置シ時トノハ眞ノ防腐綁帶ヲ要スルヲアリ

麻之部

◎麻疹

流行時ニ際シ其性ノ善惡ニ依リ治法モ亦異ナリトス則チ善性ノモノハ大抵自然良能ニ任シテ佳ナリ惡性ノモノハ充分ノ解熱法ヲ施シ便秘スレハ下劑ヲ與ヘ咳嗽甚シキ者ニハ粘滑劑ヲ與ヘ眼疾甚シキ者ニハ硼酸水ノ罨法料ヲ投シ肺患ヲ合併スルキハ胸部ノ氷罨法、皮疹ノ澀滯スルキハ鹽酸「ピロカルピン」(大人ノ量〇・〇一)ノ皮下注入ヲ行ヒ奎扶斯狀ナルキハ奎扶斯ノ療法ヲ行ヒ氣管支加荅兒ノ殘遺セザル様注意ス可シ

◎甘汞〇・〇一—〇・一 乳糖適宜 右散爲一包(小兒下劑量)

◎麝香丁幾一〇〇 橙皮舍利別五〇〇 餽水二〇〇〇 右一日數次分服小兒量

◎麻刺利亞諸病

此病ノ特效藥ハ諸種ノ規尼涅ニ就中鹽酸規尼涅ヲ佳トス次テ用フルモノハ鹽酸「ピロカルピン」ノ内服或ハ皮下注入(〇・〇一)トス若シ惡液質ノ恐レアルキハ鐵劑ヲ投ス可シ凡テ間歇性ノ疼痛及間歇性潮熱ハ宜シク規尼涅ヲ試用ス可シ

◎痲痺症

其病原ヲ探リ各病下ニ就テ見ルベシト雖モ通常用フルモノハ電氣流通、「ストリヒネ」ノ皮下注入、番木鱉、沃度加里ノ内服等ナリ

知覺麻痺 龍腦丁幾、安母尼亞精、芥子泥、別刺敦那越幾斯軟膏、錫答里斯丁幾等ノ外用ヲ爲ス又電氣流通ハ其規則ニ隨フ可シ

運動麻痺 知覺麻痺ニ用フル所ノ藥劑ノ外按摩法等ヲ行フ  
◎「ストリヒネ」〇・〇五 餽水一〇〇〇 右皮下注入料(一回半筒)



### 計之部

#### ◎下痢

其病症ニ隨ヒ感冒ヨリ來ル者ニハ發汗療法ヲ行ヒ不消化物ヨリ來ル者ニハ先ツ草麻子油ヲ投シ宿便ヲ攘ヒ食物ヲ攝生セシメ次テ徐々ニ収斂劑ヲ用テ完穀下痢ニハ先緩下劑ヲ與ヘ、反射性下痢ニハ宜シク阿片、乳酸等ヲ與ヘ、溶崩下痢ニモ亦乳酸ヲ用ヒ或ハ鞣酸ヲ投ス、胆汁性下痢ニハ輕量ノ甘汞、鞣酸或ハ阿片ヲ處ス、其他諸般ノ下痢ニ於テ通常用フル者ハ腸加答兒、赤痢、肺癆等ノ部ニアリ宜シク參照ス可シ

◎吐根(細剉〇・五) 浸五〇〇 亞刺昆亞護漿五〇〇

右一日三次分服(大人量)

◎格倫僕根(細剉三〇〇) 煎五〇〇 沙列布(一〇〇) 煎五〇〇 阿片丁幾一〇〇 右調和一日四次分服(大人量)

◎甘汞〇〇〇三 亞刺昆亞護漿末二〇〇 右散爲四包小兒一日量トス (サロモン氏)

◎撒里矢爾酸那篤留母 一・八 炭酸石灰〇・六 單舍利別七・五 餹水六〇〇 右調勻每回八〇宛一日三四次二日ニ分服(兒童量) (フツチンス氏)

◎次硝酸蒼鉛〇・三 乳糖〇・二 右散爲三包一日三次服用(小兒量)

◎蜀葵根(六〇〇) 煎一〇〇〇 稀鹽酸〇・六 橙皮舍利別五〇〇 右一日三次分服(大人量)

◎乳酸〇・一 橙皮舍利別三〇〇 餹水四〇〇 右一日數次分服(小兒量)

◎鞣酸〇・一 白糖〇・五 右散爲三包一日三次服用(小兒量)

#### ◎眩暈

原因ヲ探リテ療法ヲ施ス可シ通常用フルモノハ臭素加里、忽布滿氏鎮痛

液及次硝酸亞密兒ノ嗅入等ナリ

○瘧

其原病ヲ尋ネ各病ノ部ニ就キ見ル可シ急救用フルモノハ格魯兒叻、抱水格魯刺兒、臭素加里、依的兒、阿片、別刺敦那、亞鉛花、麝香、鹽酸莫爾比涅、緜草、阿魏等ナリ

○鹽酸莫爾比涅〇・一 餾水一〇・〇 右皮下注入料(一回一筒)

○抱水格魯刺兒二〇〇 亞刺昆亞護護漿、餾水各五〇・〇 右灌腸料

(サロモン氏)

○月經ニ關スル諸病

月經閉止スルキハ麥角越幾斯、蘆薈等ノ藥劑ヲ與ヘ脚湯或ハ芥子性坐浴等ヲ行フ可シ若シ月經痛即チ子宮痙痛ヲ起スキハ諸多ノ鎮痙藥(別刺敦那、阿片、抱水格魯刺兒等)若シハ麥角越幾斯ヲ投シ同シ脚浴ヲ行フ可

シ月經過多症ニモ亦麥角越幾斯ヲ用ヒ冷水灌腸或ハ冷水灌陰法等ヲ施シ鉛糖、實斐答里斯等ノ内服ヲ處ス可シ

○麥角越幾斯〇・四 龍膽末適宜 右丸ト爲シ一日分服

○阿片〇・〇二 柯々脂一・五 右陸球ト爲シ或ハ坐藥ト爲ス

不之部

○風疹

麻疹ノ療法ト畧ホ同一ナリ

○腹水

原因療法ハ各病下ニ就テ見ル可シ對症療法ハ飲液ヲ減シ發汗劑、利尿劑、下劑等ヲ與ヘ胸廓ヲ窘迫セシムルノ徵候アルキハ宜シク穿腹術ヲ行フ可シ櫻村氏ハ商陸煎ヲ賞用スト云フ

〇鹽酸「ピロカルピン」〇〇一 餾水一〇〇 右皮下注入一回量(注意)

(虛弱者ニハ用フ可ラス)

〇實斐答里斯葉(一〇〇)浸一〇〇〇 醋酸加里六〇〇 單舍利別五〇〇

右一日三次分服

〇重酒石酸加里一五〇一〇〇 醋酸加里四〇〇 單舍利別七〇〇

餾水一〇〇〇 右一日三次分服(醫科大學方府)

〇海葱根末、實斐答里斯葉末各二〇〇 龍膽末一〇〇 杜松子油四滴 右

調和シテ亞刺昆亞護謨適宜ヲ加ヘ九三十粒ト爲シ每次一九宛一日三

回服用(ピールソン氏)

〇醋酸加里六〇〇 水製大黃丁幾六〇〇 餾水一〇〇〇 右一日三次分服

〇甘硝石精四〇〇 單舍利別三〇〇 餾水一〇〇〇 右一日三次分服

(ブーシャルダ氏)

〇藤黃末〇〇四 蘆薈越幾斯二〇〇 蒲公英越幾斯適宜 右丸爲廿粒每回

一二丸宛服用ソ一日二回(ハイム氏)

其他海葱醋、硝酸加里、硫酸那篤留母、硫酸麻偏涅矢亞、格碌望篤、赤白葡  
萄酒、麥酒等ヲ採用ス可シ

### 〇腹膜炎

#### 甲 單性腹膜炎

(急性症)ニハ患者ヲ可及的安靜ニ仰臥セシメ床上ニ架ヲ設ケ直ニ衣食ヲ  
腹部ニ觸接セサラシメ食物、滋養性肉汁ヲ與ヘ嚴シク攝生法ヲ命シ決メ  
間食ヲ爲サシム可ラス而シテ外治法ニハ水捲法ヲ行ヒ水蛭ヲ用ヒ(多數ヲ  
禁ス)或ハ水銀軟膏ヲ腹部ニ塗擦シ若シハ温捲法ヲ施ス等注意周到ナル  
ヲ要ス、灌腸法ハ輒モスレハ炎症ヲ増シ穿孔ヲ來スノ恐レアレハ能ク々  
々注意ス可シ、鼓腸甚シキ者ニハ穿腹術ヲ行フコアリト雖モ是亦恢復期

ナラサレハ危險ノ恐レアリ内治法ニハ先ツ阿片ヲ投メ疼痛ヲ緩解シ腸ノ蠕動ヲ休止セシム其他對症療法トノ嘔吐アル者ニハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入、虛脫ニハ龍腦及依的兒ノ皮下注入、吃逆ニハ抱水格魯刺兒ヲ與ヘ便秘甚シク十日以上ナルキハ時期ヲ伺ヒ甘汞、葶麻子油等ヲ與ヘ猶ホ甘汞、沃度加里、醋酸加里等ハ適着ヲ防キ或ハ水腫アル者ニ用フ

○阿片〇・〇三〇・一 乳糖適宜 右散爲四包一日四次服用

○甘汞〇・三 乳糖適宜 右散爲四包一日四次服用(サロモン氏)

(慢性症)ニハ務テ強壯療法ヲ行ヒ且ツ攝生法ヲ嚴守セシメ熱アル者ニハ規尼涅、撒里矢爾酸那篤留母ヲ與ヘ、水腫ニハ實荖答里斯、醋酸加里等ヲ投メ或ハ時トメ下劑ヲ要スルコトアリ必ズ注意ノ穿孔ヲ起サシム可ラス

○沃度鉄舍利別六・〇 單舍利別五・〇 餉水一〇〇・〇 右一日三次分服

○沃度加里〇・五 醋酸加里六・〇 單舍利別五・〇 餉水一〇〇・〇

右一日三次分服

○肝油適宜 右腹部塗擦料

乙 結核性腹膜炎

宜シク他部ノ結核症ニ注意シ強壯劑ヲ與フルノ外策ナシ

○底列並油ニ薄荷油ヲ滴シ患部外用(醫科大學方府)

○「クレオリン」「ラノリン」合劑(五倍)患部塗擦料(醫科大學方府)

丙 穿孔性腹膜炎

丁 產褥性腹膜炎

戊 全腹膜炎

右三症ハ共ニ危險ニシテ豫後不良ナレハ一層注意ヲ加ヘ阿片、甘汞等ヲ内服セシメ有熱者ニハ規尼涅、安質必林、撒里矢爾酸那篤留母等ヲ與フ可シ

○舞蹈病

砒石劑、大量ノ亞鉛劑、臭素加里、抱水格魯刺兒、別刺敦那、撒里矢爾酸那、篤留母等ヲ用ヒ間々麻刺利亞ヨリ來ル者ハ規尼涅ノ適中スルヲアリ

○亞砒酸加留母液八滴 餾水一〇〇〇 右一日三次分服

○酸化亞鉛、纈草末、阿魏末各六〇 右九百粒ト爲シ毎回二粒乃至六粒一日二回服用(レベルト氏)

○冷水一盞ヲ俄然患者ノ顔面ニ注ギテ頓挫法ト爲ス(チームセン氏)

○不眠症

無害ノ麻醉藥ヲ用フ可シ

○臭素加里一〇 單舍利別二〇 餾水一〇〇〇 右一日三次服用

○抱水格魯刺兒一〇 單舍利別二〇 餾水三〇〇 右臨臥頓服

其他時トシテハ獨布兒斯氏散、鹽酸莫爾比涅、印度大麻等少量ヲ臨臥ニ用フ

○副墨炎

淋疾ノ注射藥ニ由リ發症スル者ハ宜シク注射藥ヲ休止ス可シ而シテ陰囊ニ水銀軟膏ヲ塗擦シ衣袋ノ觸レサル様輕ク提舉シ可成身体ノ安靜ヲ守ラシムルヲ緊要トス時トシテハ沃度加里軟膏ヲ塗擦シ或ハ沃度加里ノ内服ヲ命シ鼠蹊部ニ水蛭ヲ貼スルヲアリ

古之部

○虎列刺 亞細亞虎列刺

療法甚タ多ク却テ煩雜ニ亘ルノ恐アルカ故ニ只左ニ一班ヲ示ス

第一期ニハ患者ヲ温護シ少量ノ「ポルト」酒及肉羹汁ヲ與ヘ止瀉劑トシ阿片、鞣酸、硝酸銀、吐根、獨布兒斯氏散等ヲ處シ或ハ他ノ收斂藥若シハ粘滑劑ヲ灌腸ス可シ

○ローレン氏虎列刺液 芳香阿片酒三〇 吐根酒二〇 依的兒製纈草

丁幾六・〇 綿多油〇・五 右調和每回十滴乃至十五滴宛一日五六回  
清水ニ和シ服用

◎鞣酸〇・二一〇・三 阿片〇・〇三 白糖〇・五 右散爲一包同量數包ヲ  
作り每二時一包宛服用(サロモン氏)

◎硝酸銀〇・四 餛水適宜ヲ加ヘ溶解セシメ而シテ後、阿片越幾斯〇・二  
蜀葵根末一・〇 龍膽末適宜 右凡二十粒ト爲シ每回二粒宛一日三四  
回服用セシム(レベルト氏)

◎安息香酸加阿片丁幾五・〇 芳香阿片酒二・五 餛水八・〇 右調和每  
次二十滴乃至三十滴宛一日四五回服用(レベルト氏)

第二期ニ於テハ患者ノ身体ヲ毛布ヲ以テ被覆シ腹部ニハ温弱ヲ措キ可成  
患者ヲ安靜ナラシム可シ消渴ノ目的ニハ氷片ヲ含マシメ虚脱ヲ防クニハ  
「カンフル」及依的兒ノ皮下注入ヲ連用シ次テ「ポルト」酒ヲ内服セシメ腓

腸部ニハ格魯兒叻ノ塗擦ヲ爲シ胸部ニハ乾角ヲ貼スル等ナリ  
第三期ニ於テハ幸ニノ恢復ノ望ミアル者ニハ第二期療法ヲ持續シ兼テ強  
壯療法ヲ行フ可シ(腸窒扶斯及腸加答兒ノ條ヲ參照セヨ)

◎喉頭加答兒

(急性症)ニハ可成喫烟談話ヲ禁シ絨布ヲ以テ頸部ヲ纏絡シ或ハプリスニ  
ツツ氏ノ罨法(咽頭加答兒ノ條ヲ見ヨ)ヲ行ヒ若クハ頸圍ニ芥子泥及水蛭  
ヲ貼シ併テ諸般ノ吸氣法ヲ施シ内服藥ニハ通常發汗劑ヲ與ヘ解熱劑ヲ處  
シ咳嗽劇甚ナル者ニハ鹽酸莫爾比涅ヲ伍用スルコトアリ

◎吐根(〇・五)浸一〇〇・〇 撒里矢爾酸那篤留母三・〇 右調和一日三  
次服用

◎「ヤボランヤ」葉(一・〇)浸五〇〇・〇 右頓服一回量

◎鹽酸莫爾比涅〇・〇一 老利兒水三・〇 蜀葵根(六・〇)煎一〇〇・〇

單舍利別適宜 右一日數次分服

其他吸入藥ハ咽頭加答兒ノ條ヲ參照ス可シ

(慢性症)ニハ硝酸銀水(二十倍)ノ塗布法ヲ行ヒ兼テ沃度加里ヲ内服セシメ時トシハ吸入藥ヲ試用スルコアリ

◎格魯布

頸圍ニ氷嚢ヲ貼スルハ隨分緊要ナリ次テ吐劑ヲ與ヘ蒸氣吸入法ヲ施シ含嗽藥ヲ與ヘ患部ニ硝酸銀溶液(十倍)若シハ乳酸水ヲ塗布シ或ハ注意ノ鹽酸「ピロカルピン」ノ皮下注入(○・○)法ヲ試ミ虛脱セントスル者ニハ興奮劑ヲ與ヘ時トシ氣管切開術ヲ行フ

◎石灰水

石灰ヲ純水ニ溶解シ其一分ヲ水百分ニ加ヘ猶ホ之ニ水二百分ヲ加フ者トス

右吸入料

◎臭素加里一

水四〇〇〇

右吸入料

◎乳酸二

水四〇〇〇

右吸入料

◎吐酒石〇〇四 吐根一〇 右蜂蜜ニ伍シ頓服セシメ吐ヲ得テ止ム

◎「アポモルヒチ」〇〇一 餛水一〇 右皮下注入一回量吐ヲ得テ止ム

◎臭素加里二〇 橙皮舍利別適宜 餛水六〇〇 右數次分服

◎格魯兒酸加里一〇 橙皮舍利別適宜 餛水六〇〇 右一日數次分服

◎沃度加里、甘汞各〇〇六 乳糖〇・三 右散爲一包同量ノモノ每一時

服用(オツボルツェル氏)

◎喉頭焮腫

◎喉頭軟骨膜炎

此二症共ニ療法大差ナシ即チ頸部ニ水蛭ヲ貼シ氷罨法ヲ行ヒ呼吸困難ノ狀アルキハ直ニ亂刺法ヲ行ヒ或ハ下泄誘導ノ灌腸ヲ行フ可シ時トシハ喉頭或ハ氣管切開術ヲ行フコアリ

◎喉頭結核

對症療法ヲ行フニ過キスト雖凡撒布法トノ乳酸ヲ用フルキハ聊カ奏効ス  
ルモノ、如シ

◎喉頭黴毒

宜シク驅微法ヲ行ヒ格魯兒酸加里水、過滿俺酸加里水等ノ含嗽劑ヲ試用  
ス可シ

◎口腔加答兒

格魯兒酸加里水(五十倍)明礬水(百倍)等ノ含嗽劑ヲ與ヘ硫酸麻偏涅矢亞  
水、草麻子油等ノ下劑ヲ投シ一層甚シキ者ニハ撒里矢爾酸水(三百倍)過  
滿俺酸加里水(五百倍)石炭酸水(二百倍)等ノ含嗽劑ヲ處ス又時トノハ格  
魯兒亞鉛水(百倍)ノ塗擦ヲ爲ス可アリ

◎汞毒性口內炎

格魯兒酸加里ノ含嗽及內服ヲ適法トス猶ホ時トノハ沃度加里ノ內服ヲ處

スルコアリ

◎格魯兒酸加里二〇〇 水製大黃丁幾五〇 餹水一〇〇〇

右一日三次分服

◎鼓腸

凡テノ驅風下劑ヲ灌腸若クハ內服セシメ甚シキニ至テハ穿腹術ヲ行フ  
アリ

但シ食物ニ注意シ瓦斯ヲ發生シ易キモノハ與フ可ラス

◎大黃(二〇)浸一〇〇〇 橙皮舍利別五〇 右一日三次分服

◎硫酸麻偏涅矢亞二〇〇 稀鹽酸二三滴 餹水一〇〇〇

右一日三次分服

◎骨軟化病

磷酸鹽類、加爾幾鹽類、肝油、鐵劑等ヲ用フト雖凡只一時ノ姑息法ニ止ル



### 江之部

#### ◎疫咳

百日咳トアリ就テ見ル可シ

#### ◎鉛毒疔

先ツ緩下劑ヲ投シ時トノハ温湯ノ灌腸ヲ行ヒ鎮痛ニハ鹽酸莫爾比涅、抱水格魯刺兒、阿片、忽布滿氏鎮痛液等ヲ處ス

◎硫酸麻偏涅矢亞一五〇〇 稀鹽酸二三滴 餽水一〇〇〇

右一日三次服用

◎蓖麻子油一五〇—三〇〇 右頓服

#### ◎濕疹

患部ヲ清潔ニシ亞鉛花、次硝酸蒼鉛、麵粉等ヲ撒布シ時々稀薄昇汞水或ハ綠石鹼水ヲ以テ洗滌シ或ハ亞鉛花軟膏ヲ貼シ浸潤甚シキ者ニハヘブラ氏ノ軟膏ヲ賞用ス  
◎ヘブラ氏軟膏 單鉛硬膏、黃色「ワセリン」各等分 右調練セシ者ナリ  
其他石炭酸軟膏、撒里矢爾酸軟膏、百露拔爾撒謨軟膏等何レモ有効ナリ而  
ノ右軟膏ヲ塗布セシ後ハ繃帶ヲ爲シ置ク可シ  
但シ乾性ノモノヨハ「テール」「ナフタリン」等最モ効アリ

### 天之部

#### ◎癩癩

原因療法ヲ主要ト爲スト雖凡其發作ノ際ニ至テハ對症療法ノ甚タ必用ヲ感ス通常主藥トシテ用フルモノハ臭素鹽類ナリ而シテ次硝酸亞密兒ノ吸入法

(手巾ニ滴シ)ハ大ニ奏効スルヲアリフエレナル氏ハ該病ノ將ニ發作セシトスルニ際シ「アボモルヒチ」〇〇〇ニテ皮下ニ注入シ以テ頓挫法ト爲セリト其他別刺敦邦、酸化亞鉛、纈草酸亞鉛、艾根等ヲ用フト雖モ偉効ナシ又發作ノ前後ハ可成精神ヲ安靜ニ保チ滋養物ヲ少量宛與ヘ刺戟性ノモノハ一切之ヲ廢シ且ツ原因ニ隨ヒ驅黷法ヲ始トノ種々ノ療法ヲ行フトニ注意ス可シ

◎臭素加里七・〇 沃度加里一・〇 苦味丁幾二・〇 餽水一〇〇・〇

右一日三次分服

◎臭素加里五・〇 餽水三〇〇・〇

右頓服一回量

◎臭素那篤留母、臭素安母尼亞各一・〇 薄荷水三〇〇・〇

右朝夕二回頓服量(アロイス、ブラウン氏)

◎臭素加里三・〇 餽水一〇〇・〇 右一日三次分服(但シ臭素加里ハ漸々増量ノ一〇〇・〇一・二・〇ハ休止スレニ至リ再ヒ減量ノ一日三・〇ニ至ル)(醫科大學方府)

◎酸化亞鉛一・〇 龍腦、別刺敦那越幾斯各〇・六 右九二十粒ト爲シ朝夕一粒宛服用(レカミエー氏)

◎硫酸亞篤魯比涅〇・〇三 餽水二五・〇 右每回十滴宛一日二回清水

ニ和シ用フ(サロモン氏)

◎的答尼

鎮痙藥及麻醉劑ヲ與フルノ外策アルヲナシ發作時ニハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入、抱水格魯刺兒ノ灌腸ヲ施シ内服ニハ臭素加里ノ大量ヲ用フ

◎抱水格魯刺兒二・〇 亞刺昆亞護謨漿五〇・〇 餽水五〇・〇 右灌腸料(サロモン氏)

安之部

◎亞布答

格魯兒酸加里水(五十倍)昇汞水(五百倍)ノ含嗽洗滌法ヲ行ヒ時トノハ硝酸銀水(三十三倍)ノ塗布法ヲ行ヒ格魯兒酸加里ノ内服(一日量〇、五)ヲ處スルヲアリ

◎アザソン氏病

凡テ鉄劑ヲ輕量ニ與フ可シ

佐之部

◎產褥熱

危險ノ症ナレハ注意ノ療法ヲ行ヒ炎症期ナルキハ鼠蹊部ニ水蛭ヲ貼シ腹

部ニ氷菴法ヲ行ヒ或ハ緩下劑ノ灌腸ヲナス又ルゲン氏ハ多量ノ酒精類ヲ投シ麻酔期ニ際シ微温浴ヲ爲サシムト云フ凡テ該病ニ對シ微温坐浴法ハ有効ナリ(解熱ノ後)熱高度ナルキハ凡テノ解熱藥ヲ與ヘ子宮灌水法(「イ」ルリガートル」ニテ)ヲ行フヲ緊要トス其他陰部ノ清潔法(例之ハ稀薄石炭酸水、撒里矢爾酸水等ヲ以テ不絶洗滌シ爾後撒里矢爾酸綿ヲ腔内ニ挿入スル等)ヲ行フ可シ

幾之部

◎氣管支加答兒

原因ヲ探テ療法ヲ行ヒ凡テ病室内ノ空氣ヲ濕潤ナラシメ且ツ新鮮ノ空氣ヲ交換シ、身体ヲ温護シ喫烟ヲ禁シ滋養物ヲ與フ可シ、外治法ニハ蒸氣吸入法、藥劑蒸氣ノ吸入法等ヲ施シ咳嗽甚シキ者ニハ芥子泥ヲ貼シ温罨法

ヲ行ヒ内服薬ニハ緩和包攝劑、祛痰劑、麻醉劑、催吐劑等ヲ處ス

◎老利兒水二〇〇 水二〇〇〇 右吸入料(サロモン氏)

◎食鹽三〇〇 重炭酸那篤留母三〇〇 老利兒水六〇〇 水三〇〇〇  
右吸入料(醫科大學方府)

◎安息香酸那篤留母二〇一三〇 水二〇〇〇〇  
右吸入料(サロモン氏)

◎格魯兒安母尼亞二〇一三〇 水二〇〇〇〇  
右吸入料(サロモン氏)

◎重炭酸那篤留母四〇〇 食鹽二〇〇 老利兒水五〇〇 鹽酸莫爾比涅  
〇〇三 水二〇〇〇 右吸入料

◎臭素加里一〇〇 水二〇〇〇 右吸入料(サロモン氏)

◎臭素加里二〇〇 重炭酸那篤留母四〇〇 安母尼亞加茴香精三〇〇

單舍利別四〇〇 餾水一〇〇〇 右一日三次分服

◎攝涅瓦根(一〇〇)浸二〇〇〇 老利兒水六〇〇 安母尼亞加茴香  
精三〇〇 生姜舍利別一五〇

右調和一日三回分服二日量(醫科大學方府)

◎吐根(〇・五)浸二〇〇〇 安母尼亞加茴香精二〇〇 攝涅瓦舍利別  
三〇〇 右每二時三〇〇宛服用セシム (サロモン氏)

◎蜀葵根(七・五)煎一五〇〇 格魯兒安母尼亞一・二 阿片丁幾〇・五  
攝涅瓦舍利別一五〇 右調和每二時三〇〇宛服用  
(オツポルツエル氏)

◎安息香酸那篤留母、重炭酸那篤留母各三〇〇 鹽酸莫爾比涅〇・〇二  
單舍利別五〇〇 餾水一〇〇〇 右一日三次分服

◎吐根舍利別一〇〇〇 蜀葵根舍利別二〇〇〇 右調和每回四〇宛清

水ニ混シ服用(ウンアルリヒ氏)

〇吐根越幾斯〇・四白糖三〇〇「タラカント」護謨漿適宜 右錠劑七十二個ト爲シ毎回一二個一日三四回服用(マーケンデー氏)

〇氣管支膿漏

底列並油ヲ嗅入セシメ或ハ鞣酸水、石炭酸水(各二百倍)等ノ蒸氣吸入法ヲ行ヒ内服藥ニハ収斂劑及強壯劑ヲ處ス

〇鉛糖〇・二 餾水一〇〇〇 右一日三次分服

〇機那皮(六・〇)煎一〇〇〇 稀鹽酸一・五單舍利別五・〇

右一日三次分服

〇氣管支炎

甲 小兒毛細氣管支炎

乙 格魯布性氣管支炎

右甲症ハ加答兒性肺炎、乙症ハ格魯布性肺炎ノ項ヲ參照シ治療ヲ施ス可シ而シテ猶ホ吸入藥ニハ石灰水、乳酸水(二百倍)等ヲ用ヒ内服藥ニハ沃度加里、重炭酸那篤留母若シハ安息香酸那篤留母等ヲ處ス可シ

〇氣管支喘息

發作ノ際ハ窓戶ヲ開キテ室内ニ新鮮ノ空氣ヲ通シ狹迫ノ衣服ヲ緩解シ胸部ニ乾角、芥子泥等ヲ貼シ次テ依的兒、格魯兒叻等ノ吸入或ハ硝石紙ノ薰法ヲ行ヒ内服ニハ麻醉劑ヲ投ス中ニ就テ鹽酸莫爾比涅ヲ最モ佳トス(一回〇・〇一内服或ハ皮下注入量)

〇抱水格魯刺兒二・〇乃至三・〇 餾水三〇〇 右一回頓服(ベルツ氏)

〇臭素加里二・〇 抱水格魯刺兒二・〇 餾水三〇〇 右一回頓服(ベルツ氏)

〇安質必林水(二倍) 右皮下注入料(半筒乃至一筒)(ベルツ氏)

○安質歇貌林〇・三 右一回頓服(醫科大學方府)

又發作ノ際鹽酸莫爾比涅ノ無効ナルキハ宜シク次ノ處方ヲ爲ス可シ

○硫酸亞篤魯比涅〇・〇〇一 餾水一〇〇 右皮下注入一回量(ベルツ氏)

又發作ノ初頭ニ頓挫藥ト用アルモノハ次ノ如シ

○鹽酸「ピロカルピン」〇・〇二 餾水一〇〇 右皮下注入一回量

(ベルツ氏)

○次硝酸亞密兒二滴乃至四滴 右餾水ニ和シ内服或ハ單ニ嗅入料トス

(ベルツ氏)

○魯別利亞丁幾五〇〇 硫酸依的兒五〇〇 右調和毎回十五滴乃至廿滴宛  
十五分時間毎ニ清水ニ和シ服用(ミツヒア氏)

○「パラアルデヒート」一〇〇乃至二〇〇 白糖一〇〇〇 餾水三〇〇〇

右一回頓服(サロモン氏)

○別刺敦那越幾斯〇・三 安母尼亞加苗香精二・五 餾水一五〇〇 右調和  
毎三時十滴乃至廿滴服用(フレリヒス氏)

○琥珀加露香丁幾一〇〇〇 實菱答里斯丁幾五〇〇 右調和發作間歇時一

〇乃至一・五ヲ清水ニ和シ用フ(メルリソン氏)

○亞砒酸加留母液〇・七 餾水一〇〇〇 右一日三次分服(發作間歇時)

(サロモン氏)

○沃度加里七・五「アマラ」根一〇〇 佛國製亞爾箇保兒三〇〇〇 阿片舍

利別六〇〇〇「ヨゼニール」丁幾三〇〇〇 右浸漬ノ稍染色セルモノ

ヲ濾過シ毎回一五〇宛一日三次服用(チーブレール氏秘方)(間歇時)

○臭素安母尼四亞〇〇 番木鱉丁幾〇・七 臭素加里四〇〇 橙皮舍利別二

〇〇〇 餾水一〇〇〇〇 右一日六回服盡(セクハルド氏)(間歇時)

○氣胸及胸膿症

原因療法ヲ行ヒ時トノハ穿胸術ヲ施スヲアリ疼痛甚シキモノニハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入法ヲ行フ

◎胸痛

沃度丁幾、底列並油、龍腦丁幾等ヲ塗布シ或ハ芥子泥ヲ貼シ時トノハ硫酸麻僞涅失亞ノ内服ヲ處スルヲアリ

◎吃逆

種々ノ治法アリト雖凡通常電氣ヲ通シ横隔膜部ニ芥子泥ヲ貼シ不意ニ頭部ヨリ灌水法ヲ行ヒ或ハ格魯兒防ノ嗅入ヲ試ミドレツシユ氏ハ患者自己ノ指ヲ以テ外聽道ヲ塞キ同時ニ冷水ヲ嚙下スルノ法ヲ賞揚セリ

◎蟻蟲

硫酸麻僞涅失亞ノ下劑ヲ與ヘ或ハ冷水ニ酢ヲ混シタルモノヲ灌腸シ若クハ石鹼灌腸ヲ行ヒ時トノハ珊瑚篤尼涅ヲ適量ニ與ヘ置キ暫時ヲ經テ草麻子

油ノ頓服ヲ命スル等悉ク有効ナリ

◎急癩

甲 小兒急癩

原因療法ヲ要ス詳言スレハ生齒期ニ於ケル刺戟、腸胃諸病ノ刺戟、蛔蟲ノ刺戟、恐怖若クハ創傷腫物等ノ刺戟ニ由テ來ル搔癢ノ如キハ其原因ヲ撲滅ノ根治法ヲ施スヲ緊要トス直達療法ニ於テハ凡テノ麻醉劑ヲ試用スト雖凡中ニ就テ抱水格魯刺兒ノ灌腸、麝香ノ内服最モ効ヲ奏ス其他冷水灌腸ヲ行ヒ芥子泥ノ赤引法ヲ施シ時トノハ格魯兒防ノ嗅入法ヲ行フヲアリ何レモ年齢ニ付テ藥量ヲ斟酌注意セザル可ラス(小兒腦膜炎ノ條參照)

◎抱水格魯刺兒(〇・一乃至一・〇)亞刺毘亞護謨漿適宜 餽水適宜 右

微温ト爲シ灌腸料(サロモン氏)

◎麝香、龍腦各〇・一 白糖適宜 右散爲二包頓服二回量

〇硫酸銅〇・四 韶水四〇・〇 單舍利別一五・〇 右每十分時二・〇宛  
順服セシメ吐ヲ得テ止ム

〇臭素加里〇・二乃至一・〇 單舍利別五〇・〇 右每一時少量宛服用

〇酸化亞鉛〇・一 甘汞〇・〇五 白糖適宜 右散爲四包一日四次服用  
(サロモン氏)

乙 妊婦急痛

仁之部ニアリ

〇畸形關節炎

〇筋肉痠麻質斯

以上二症共ニ痠麻質斯ノ條ヲ參照ノ治療ヲ施ス可シ

〇恐水病 狂犬咬傷

速ニ咬傷毒ヲ吸引シ去リ(吸角ニテ)次テ石炭酸、腐蝕加里、或ハ烙鐵ヲ以

テ腐蝕若クハ燒灼ス時トシテハ其部ヲ切除スルコトアリ而シテ痠帶ヲ行ヒ(時々痠帶ヲ交換スルハ不良ナリ)内服ニハ鹽酸莫爾比涅ノ如キ麻醉劑ヲ處ス可シ

美ノ部

〇蜜尿病

此病ニ對シテ食物攝生法(砂糖類、米穀、芋類、菓子、菓實、豆類、蜂蜜等ヲ與ヘサルコトアリ)ヲ第一トシ飲水ノ量ヲ減少シ消渴ニハ氷片ヲ含マシメ決シテ里母那等ヲ處ス可ラス而シテ適宜ノ運動ヲ命ジ時宜ニ由テハ轉地療養ヲ行ヒ或ハ礦泉ニ浴セシメ若クハ皮膚ノ冷水拭擦ヲ施ス等大ニ主療ヲ助ケル者トス、藥劑ニハ主トシテ阿片ヲ用ヒ次テ加爾々私泉鹽、安母尼亞諸劑若クハ乳酸等ヲ處スフヒルレミン氏ハ阿片ト別刺敦那ノ合劑ヲ投ノ曰ク



「此二藥決ニ離ル可ラス」トスターデルマン氏ハ重炭酸那篤留母水ヲ靜脈内ニ注入スルノ法ヲ施シモレシヨット氏ハ沃度防(一日量〇・二―〇・四)ノ内服ヲ賞揚スル等療法甚々多シト雖モ阿片ノ右ニ出ルモノナシ其他強壯劑ヲ與ヘ殊ニ肝油ヲ賞用ス

○阿片〇・一白糖〇・五 右散爲三包一日三次服用

○別刺敦那越幾斯〇・一阿片〇・〇五 龍膽末適宜 右散爲三包一日三次服用(但阿片ノ量ハ注意ノ増量シ〇・二ニ至ル)(フヒルレミン氏)

○乳酸五〇乃至二〇〇 香竈水二〇〇乃至三〇〇 井水一〇〇〇

○ 右毎二時一〇〇〇宛泉水ニ和シ服用(カンタニー氏)

○撒里矢爾酸那篤留母一〇 右爲一包一日三四包頓服(醫科大學方府)

志之部

○齒痛

齶齒痛ニハ鹽酸箇加因溶液、格魯兒叻、結麗阿曹篤、石炭酸、鹽酸莫爾比涅水及重炭酸那篤留母等ヲ綿球ニ蘸シテ用ヒ或ハ直達ニ之ヲ塗布シ若シ之レニテ無効ナルキハ硝酸銀水(十倍)ノ塗布法ヲ行フ可シ而シ其他ノ齒痛ニモ亦能シ右ノ法ヲ用フ可シ時トノハ齒齦ノ亂刺法ヲ施シ格魯兒酸加里水ノ含嗽ヲ命スルコアリ

○耳下腺炎

特發性ノモノハ先ツ水蛭ヲ貼シ下劑ヲ投シ有熱ノモノハ規尼涅、撒里矢爾酸那篤留母若シハ安質歌貌林等ヲ頓服セシメ、移轉性ノモノハ罨布ヲ貼シ早ク之ヲ刺開ス可シ

○消化不良

胃加答兒ノ項ヲ參照ス可シ

◎常習便秘

多クハ攝生法ニ由テ効チ奏ス其大略運動ヲ務メ冷水ヲ以テ身体皮膚ヲ拭ヒ冷水ヲ空腹ノ際ニ喫シ度々上圍ヲ試ムル等ナリ就中散步、乘馬、肚腹ノ按摩法等ハ甚タ効チ奏スキヨルネル氏ハ電氣療法ヲ行フト云フ藥劑ニハ凡テ下泄藥ヲ悉ク用ヒ猶ホ左ノ藥劑ハ有効ノモノトス

◎別刺敦那越幾斯〇・八 浦公英越幾斯適宜 龍膽末適宜 右九百粒ト爲シ一日三回每次二三粒宛服用

◎綠蟲

攝生法ニハ凡テ鮮肉、未熟肉等ヲ食用ス可ラス此症ノ特效藥ハ屈蘇、石榴根皮ノ二トス次テ綿馬、底列並油、「カマラ」等ヲ用フ

◎新鮮石榴根皮煎(石榴根皮細挫五〇〇 餾水三〇〇〇ニ冷浸スルヲ二十四時間後更ニ煎ノ二〇〇〇ト爲ス)二〇〇〇薄荷油一滴 單

舍利別三〇〇 右三回量ニ時間内ニ服盡セシム但シ空腹ノ際用フルヲ通規トス

◎屈蘇花八〇 綿馬越幾斯五〇 蜂蜜適宜 右練劑ト爲シ二三回ニ分服セシム但シ嘔吐ヲ起シ易シ注意セサル可ラス

◎綿馬根末一二〇 續草根末四〇 蜂蜜六〇〇 右練劑ト爲シ一日三回分服毎回一〇〇宛トス(キユイレル氏)

◎心内膜炎

心部或ハ背部ニ氷嚢ヲ措キ時トノハ背部ニ發泡膏ヲ貼シ内服藥ニハ實斐答里斯、撒里矢爾酸那篤留母等ヲ處ス(雙麻質斯ノ條參照)

◎實斐答里斯葉(一〇〇)浸一〇〇〇 鹽酸規尼涅〇・二單舍利別五〇 右一日三次分服(ローゼンメタイン氏)

◎實斐答里斯葉(〇・五)浸一〇〇〇 撒里矢爾酸那篤留母三〇 右一日三次分服

### ◎心臟瓣膜病及心臟肥大

豫防法トノ飲酒、喫烟及過度ノ運動ヲ禁シ可成精神ヲ安靜ニ保持セシメ  
 將ニ對症機能ヲ失セントスル場合ニ於テハ宜シク實斐答里斯ヲ處ス可シ  
 而ノ水腫ヲ來ス者ニハ醋酸加里、海葱、杜松子等ヲ配伍シ便秘ニハ大黃下  
 劑ヲ與ヘ強度ノ發作ニハ芥子泥及乾角等ヲ貼ノ誘導法ト爲シ次テ「カン  
 フル」鹽酸莫爾比涅等ノ皮下注入ヲ爲スアリ

◎實斐答里斯葉(一〇〇)浸一〇〇〇 醋酸加里六〇〇 橙皮舍利別五〇〇  
 餾水一〇〇〇 右一日三次分服

◎實斐答里斯丁幾五〇〇 林檎酸鐵丁幾一〇〇〇 右調和每回四十五滴  
 乃至二十滴 餾水ニ和シ一日三回服用(レベルト氏)

◎水製大黃丁幾五〇〇 番木鱉丁幾一〇〇 餾水一〇〇〇

右一日三次分服

◎次硝酸亞密兒加依的兒四五滴 右一回嗅入料(クルツ氏)

◎實斐答里斯葉(〇・六)浸一八〇〇 鹽酸規尼涅〇・八 單舍利別二〇  
 〇 右調和每二時三〇〇宛服用(ローゼンスタイン氏)

◎魯別利亞丁幾、實斐答里斯丁幾各五〇〇 老利兒水一〇〇〇 右調和每  
 一時一・七 宛清水ニ和シ服用(ハンベルゲル氏)

### ◎心悸亢進

原因療法ニアラサレハ満足ス可ラス即チ通常身体ヲ安靜ニ保チ常習便秘  
 ナ治シ強壯劑ヲ與ヘ對症療法ニハ心部ニ氷嚢ヲ措キ實斐答里斯、砒石劑、  
 臭素加里、抱水格魯刺兒等ヲ與フ

### ◎心臟神經痛

外治法トシテ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入或ハ格魯兒叻及「アミール」ニトリツ  
 トノ嗅入法ヲ行ヒ心臟部ニ芥子泥ヲ貼シ龍腦丁幾ヲ塗擦シ時トノ電氣

ヲ流通スルヲアリ内治法トシハ臭素加里、酸化亞鉛、砒石劑等ヲ處ス

○臭素加里二・〇 橙皮舍利別五・〇 餽水一〇〇・〇 右一日三次分服

○心囊炎

心臟部ニ水蠶ヲ貼シ實斐答里斯ヲ與ヘ解熱ニハ規尼涅、撒里矢爾酸那篤  
留母、安質必林等ヲ投シ熱去ルキハ沃度加里ヲ處ス其他利尿劑、發汗劑、  
緩下劑等ヲ要ス

○實斐答里斯葉(一・〇)浸一〇〇・〇 醋酸加里六・〇 單舍利別五・〇

右一日三回分服

○實斐答里斯葉(〇・五)浸一〇〇・〇 撒里矢爾酸那篤留母三・〇

右一日三次分服

○鹽酸(ピロカルピン)一〇〇・〇 餽水一・〇 右皮下注入料(炎症後ニ用フ)

○沃度加里一・〇 機那丁幾三・〇 橙皮舍利別三・〇 餽水一〇〇・〇

右一日三次分服

○靜脉腫

多クハ外科ニ屬ス

○進行性舌唇咽頭麻痺

乾角、發泡膏、冷水療法、溫浴法等ノ誘導法ヲ行ヒ或ハ平流電氣、若クハ感  
傳電氣ヲ流通シ流涎盛ナル者ニハ硫酸亞篤魯比涅丸(盜汗ノ條ニアリ)ヲ  
投ス可シ

○神經痛 諸種ノ神經痛一般療法

原因療法ヲ主要トス宜シク注意ス可シ即チ大抵ハ感傳電氣ヲ流通シ若シ  
中樞性ナルキハ平流電氣ヲ通シ或ハ浴湯法、寒冷法、神經ノ截斷法若クハ  
牽引法等ヲ行フ可シ對症療法トシハ先ツ麻醉劑ヲ内服セシメ或ハ皮下注  
入ヲ爲ス例之ハ鹽酸莫爾比涅及鹽酸箇加因等ノ皮下注入ヲ施シ或ハ臭素

加里、抱水格魯刺兒、「パラアルデヒート」、鹽酸莫爾比涅、安質必林、雙蘭菊、依的兒、格魯兒坊、別刺敦那、印度大麻等ノ内服ノ如シ其他砒石劑、沃度加里、底列並油、酸化亞鉛、規尼涅等ヲ用フ宜シク神經系諸病ノ條ヲ參照ス可シ

○神經炎

患所ノ他部ニ水滲法ヲ行ヒ下劑ヲ與ヘ疼痛劇甚ナル者ハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入ヲ施シ或ハ患部ヲ纏絡シ若クハ電氣ヲ流通ス

○進行性筋肉萎縮

電氣療法ノ規則ニ隨ヒ感傳電氣ヲ皮膚ニ通シ或ハ按摩法ヲ施スノ外藥劑ハ凡テ無効ナリ

○震顫癱瘓症及震顫麻痺症

瀝水法ヲ行ヒ或ハ電氣ヲ通シ藥劑ニハ鹽酸莫爾比涅、臭素加里、砒石劑及

別刺敦那等ヲ用フ

○書瘧

電氣療法殊ニ平流電氣ヲ佳トス間々諸般ノ藥劑ヲ用フト雖モ大抵無効ナリ故ニ筆柄ヲ大ニ用フルヲ長トス此法ニハ筆柄ニ「キユル」ヲ纏ヒ用フルナリ又ウオルフ氏ハ按摩法及習練法ヲ行ハシムト云フ

○酒客譫妄

冷水灌漑法ヲ行ヒ藥劑ニハ阿片實麥答里斯等ヲ處ス時トメハ吐劑若クハ麻酔劑等ヲ投スルヲアリ

○阿片○ニ實麥答里斯末○ニ 右散爲三包一日三次分服

○腎臟實質炎

(急性症)即チ第一期症ニハ患者ヲ靜臥セシメ滋養物ヲ與ヘ身体ヲ「アラチル」ニテ纏絡シ鹽酸「ピロカルピン」ノ皮下注射(一回量〇・〇一後)ヲ

施ノ充分ニ發汗セシム其他規尼涅、實麥答里斯等ヲ處シ或ハ峻下劑ヲ投  
スルコアリ

○「ヤボランヤ」葉(二〇)浸六〇〇 右一回頓服量

○實麥答里斯葉(一〇)浸一〇〇〇 醋酸加里六〇 單舍利別五〇

右一日三次分服

○鹽酸規尼涅一〇 右「オプナート」ニ包ミ頓服二回量

○吐酒石〇・二 龍腦研末〇・六 亞刺昆亞護膜末、白糖各三〇 右調勻  
散爲十包每二時一包宛服用(マイエル氏)

○吐根(〇・四)浸一〇〇〇 民埜列利精一〇〇 單舍利別一〇〇

右一日四回分服(サロモン氏)

○甘汞、蒺刺巴各〇・五 右調勻頓服一回量

(慢性症)即チ第二期症(腫脹腎)ニハ發汗法ヲ行フコト急性症ノ如クシ猶ホ

實麥答里斯、重酒石酸加里、醋酸加里等、利尿藥ヲ與ヘ終リニ臨テハ沃度  
加里、蜀葵根及鞣酸等ヲ處シ強壯劑ニハ鐵、砒石、規尼涅等ノ諸劑ヲ用フ  
此際消化機ヲ損害セザル様注意ス可シ

○烏華鳥爾矢葉(一〇)浸一五〇〇 右一日五回分服

(ストリユムベル氏)

○鞣酸二〇 水製蘆薈越幾斯六〇 蘆根越幾斯適宜 右丸六十粒ト爲  
シ毎回四丸宛一日三次服用(フレリヒス氏)

### ○腎臟組織間炎 萎縮腎

急性腎臟炎第二期症ノ療法ト大差ナシト雖モ多クハ療法ノ無効ナルモノ  
トス然モ諸般ノ續發症ヲ來スモノナレハ宜シク之ガ對症治療ヲ施ス可シ  
(腹水ノ條ヲ參照セヨ)

### ○腎臟化膿症

劇痛ニハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入ヲ施シ解熱劑ニハ規尼涅ヲ與ヘ時トノハ旃那下劑ヲ投シ或ハ麻醉性ノ罈布ヲ貼スルヲアリ而シテ腎臟部腫起スルキハ宜シク外科治法ヲ施スベシ

○蜀葵根(八・〇)煎一〇〇・〇 橙皮舍利別五・〇 右一日三次分服

○腎盂炎及腎盂兼腎炎

無刺戟ナル緩和滋養物ヲ與ヘ葷中ニ安臥セシメ蜀葵根煎等ノ内服ヲ處シ或ハ多量ニ飲水ヲ命シ或ハ微温坐浴ヲ行ヒ或ハ時トノハ阿片、拔爾撒謨、鞣酸、明礬、烏華烏爾矢葉、及機那皮等ヲ用フルヲアリ

○腎臟外膜炎

腹膜炎ノ條ヲ參照シ治療ス可シ

○腎水腫

外科書ニ就キ穿刺法若クハ沃度注入法等ヲ行フ

○腎石

其石ヲ試驗シ性質ニ由リ治法ヲ異ニス即チ尿酸鹽類ナルキハ重炭酸那篤留母、硫酸那篤留母等ヲ與ヘ、磷酸鹽類ナルキハ炭酸水、乳酸、酒石酸等ヲ處ス、磷酸石灰ヨリ成ル者ハ酸性磷酸那篤留母ヲ用フ可シ

○腎疝

宜シク通常ノ鎮痙藥ヲ處ス可シ

○腎出血

腎臟部ニ水囊ヲ置キ冷水灌腸ヲ施シ或ハ冷水坐浴ヲ行ヒ藥劑ニハ鞣酸、鉛糖及麥角越幾斯等ヲ處ス中ニ就テ麥角越幾斯ヲ最モ優レリトス

○子宮痛

忽布滿氏鎮痛液ヲ與ヘ或ハ別刺致那越幾斯(〇・一)柯々阿脂(四・〇)合劑ヲ腔ニ挿入スル等ナリ

### ◎子宮實質炎

(急性症)ニハ臍内ニ水蛭ヲ貼シ或ハ臍ノ亂刺法ヲ行ヒ子宮部ニハ水囊ヲ置キ或ハ冷水ノ臍内灌漑法ヲ行フ其他草麻子油ノ下劑ヲ投シ、患者ヲ安靜ナラシメ、腰部ヲ高クスルヲ務メ、若クハ腹部ニプリスニツツ氏ノ電氣療法(咽頭加答兒ノ條ニ見ユ)ヲ行フ等悉ク奏効スル者トス

(慢性症)ニ於テハ急性症療法ヲ行フノ外臍部粘膜炎ノ一片ヲ切除シ冷水灌漑法ヲ施シ猶ホ鑛泉療法(浴湯或ハ内服)ヲ試用スルヲアリ又ステリン氏ハ電氣療法ヲ賞揚スト云フ

### ◎子宮内膜炎

(急性症)ニ於テハ腹部ノ温罨法、水蛭療法及坐浴ヲ行フ等大約子宮實質炎ノ急性症ト一般ナリ

(慢性症)ニ在テハ主トノ原因療法ヲ行フニ宜シ例之ハ萎黃病、腺病、頻回

ノ妊娠、子宮内新生物等悉ク之カ療法ヲ施ス可シ故ニ内服ニハ強壯劑ヲ與ヘ出血アル者ニハ麥角鹼幾斯ヲ用フルニアリ其他此目的ニ對シ凡テノ浴湯ハ偉効ヲ奏ス、直達療法トシテハ先ツ硝酸銀ヲ以テ子宮粘膜炎ヲ腐蝕シ後撒里矢爾酸綿ヲ臍ニ挿入シ置キ或ハ臍内ヲ絶ヘス洗淨スル等注意ノ療法ヲ施ス可シ時トシテハ緩性下劑ノ内服ヲ命スルヲアリ

◎鞣酸水(百倍)明礬水(百倍)石炭酸水(百倍)鉛糖水(百倍)  
(以上臍内洗滌料)

◎硝酸銀(十五倍) 右塗布料

◎機那丁幾三〇〇 臭素加里二〇〇 纈草丁幾三〇〇 餽水一〇〇〇〇  
(右一日三次分服)

◎重酒石酸加里一五〇〇「アマリンド」三〇〇〇 覆盆子舍利別三〇〇〇  
覆盆子水一五〇〇〇 右調和毎二時一五〇〇宛服用(サロモン氏)



○鹽酸規尼涅○・二 乳酸鐵○・二 龍膽末適宜 右九六粒ト爲シ每食後  
二粒宛服用

○機那丁幾三○・〇 麥角越幾斯○・四 沃度加里○・五 桂皮丁幾三○・〇

右一日三次分服

○沃度防一○・〇 偲里設林一○・〇 薄荷油六滴 右綿花ニ蘸シ腔栓塞料

トス(キツシユ氏)

○一半格魯兒鐵液、獨葵根末各○・一 偲里設林適宜 右小梃子ト爲シ

外用(マルチン氏)

○石炭酸、偲里設林各等分 右綿花ニ蘸シ腔栓塞ト爲シ插入

(ブライフェル氏)

### ○子宮出血

宜シツ子宮内膜炎ノ條ヲ參照ノ治療ス可シ然レ通常用フルモノハ麥角越

幾斯ノ皮下注入若クハ冷水ノ腔内注入法等ヲ行ヒ次テ外科治法ヲ施シ其

原因ヲ驅除セサル可ラス時トノハ烙鐵ノ偉効ヲ奏スルコアリ

○麥角越幾斯、餽水各等分 右皮下注入料(一回量三分ノ一筒―半筒)

### ○子宮外膜炎

産褥熱、腹膜炎、急性子宮實質炎等ノ條ヲ參照ス可シ

### ○子宮痙攣

歇斯的里ノ療法ヲ行フ可シ

### ○矢荷兒陪苦

凡テ野菜類、菓物等ヲ與ヘ、枸橼酸、酒石酸等ノ里母那埜ヲ投シ若クハ機  
那劑ヲ處シ或ハ苦味劑ヲ用ヒ對症療法ニハ格魯兒酸加里水ノ含嗽ヲ要ス  
ルコアリ或ハ齒齦ニ「ラタニア」丁幾ヲ塗布スルコアリ其他強壯劑ヲ與ヘ  
滋養物ヲ給シ以テ其素質ヲ恢復セシムルコトニ汲々ス可シ

〇蕁麻疹

多クハ原因療法ニ由テ治ス例之ハ消化機刺戟ニ由ル者ハ重炭酸那篤留母  
或ハ下劑等ニ由テ治シ藥劑ノ爲ナルキハ中和藥ヲ與フ通常外用ニハ炭酸  
加里水、石炭酸水、昇汞水等ヲ用フ

〇酒齶鼻

飲酒ヲ禁シ硫黃軟膏ヲ塗擦シ沃度丁幾、炭酸加里水等ヲ外用スト雖厄時  
トシハ亂刺法、焦灼法等ヲ行フニアリ又ウンナ氏ハ「イヒチオール」軟膏  
(儂麻質斯ノ條ニアリ)ヲ用フト云フ

比之部

〇百日咳

其療法多シト雖厄著効ヲ奏スルモノ甚タ少シ通常用アルモノハ規尼涅、

臭素加里、老利兒水、別刺敦那等ナリ中ニ就テ規尼涅、別刺敦那ハ主藥ノ  
如シ蒸氣吸入料ニハ臭素加里水(二百倍)重炭酸那篤留母水、食鹽水(各百  
倍)鹽酸規尼涅水(五百倍)石炭酸水(四百倍)等ヲ用フ(猶ホ氣管支加答兒  
ノ條ヲ參照ス可シ)

〇鹽酸規尼涅 〇・一〇・五 攝涅瓦舍利別 一〇・〇 餽水 五〇・〇

右一日四次分服(ピンツ氏)

〇臭素加里 一〇・〇 橙皮舍利別 七〇・〇 餽水 五〇・〇

右一日三次分服(サロモン氏)

〇別刺敦那越幾斯 〇・〇・一五 鹽酸規尼涅 〇・三 白糖適宜 右散爲三包  
一日三次服用(ホイブネル氏)

〇樟酸攝留母 〇・〇・五 一〇・二 餽水 二〇・〇・一六 〇・〇 單舍利別適宜  
右一日三次分服(モルイー氏)

○明礬〇・七 矢鳩答越幾斯〇・三 單舍利別五〇・〇 茴香水五〇・〇 右  
調勻每六時四〇・〇乃至一五〇・〇宛服用(ゴルヂングビルト氏)

○格魯兒叻七・五 底列並油二・五 依的兒一五〇・〇 右調和每回二〇・〇宛  
手巾ニ滴シ嗅入セシム發作ノ際(ウヰルデ氏)

○鼻加答兒

身体ヲ温護シ發汗劑ヲ與ヘテ足ル者トス然レ時トノハ撒里矢爾酸ノ吹入  
若クハ鞣酸水、明礬水等ノ灌注ヲ試ルヲアリ(其他感冒熱ノ條ヲ參照ス可  
シ)

○歇私的里

發作ノ際ニ於テハ大量ノ臭素加里ヲ内服セシメ或ハ依的兒、格魯兒叻等  
ノ内服若クハ嗅入法ヲ施シ次テ子宮痙攣ノ甚シキ者或ハ全身痙攣ニ於テ  
モ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入ハ一時緩解セシムルノ効アリ廢ス可ラス、而

ノ痙攣稍々鎮靜スルキハ可成原因療法ヲ行ヒ就中精神療法ノ大ニ奏効ス  
ルヲアリ注意セサル可ラス、不斷投ス可キ藥劑ハ阿魏、緬草ナリトス時  
トノハ麻痺ヲ療センガタメ電氣ヲ流通スルヲアリ其他冷水浴、海水浴、轉  
地療養等ハ甚々有効ノモノナリ

○臭素加里六〇・〇 緬草丁幾三〇・〇 餾水一〇〇・〇 右一日三次分服

○格魯兒叻一〇・〇 緬草丁幾九〇・〇 右調和每回十滴乃至十五滴清水ニ  
和シ一日數回服用

○忽布滿鎮痛液三〇・〇 老利兒水三〇・〇 餾水一〇〇・〇 右一日三次分服

○抱水格魯兒叻二〇・〇 亞刺昆亞護護漿、餾水各五〇・〇 右灌腸料  
(サロモン氏)

○阿魏五〇・〇 一八〇・〇 阿列布油八〇・〇 蜀葵根煎九〇・〇 右灌腸料  
(ミルラル氏)

○阿魏五〇・〇 一八〇・〇 阿列布油八〇・〇 蜀葵根煎九〇・〇 右灌腸料  
(ミルラル氏)

◎依卜昆垓里

原因療法ヲ主務トシ常習便秘、痔疾、慢性腸胃加答兒等ノ有無ニ注意ノ療法ヲ施ス可シ次テ精神療法ハ意外ニ奏効スル者ナレバ宜シク醫士ハ自己ノ經驗法ノ如クナシ以テ思慮ノ變換法及衛生ノ何物タルヲ説諭ス可シ猶ホ惡習アルモノニハ之ヲ禁シ轉地療養ニ殊ニ旅行ヲ爲サシメ且ツ海水浴若クハ冷水浴ヲ命スル等甚タ有効ナリ對症療法ニハ疼痛、不眠、若クハ心悸亢進等ヲ醫スルヲ必用トス其他時トシハ電氣ヲ流通スルヲナキニアラス

◎脾脫疽 ミルツブランド

苛性加里、硝酸、石炭酸等ノ腐蝕劑ヲ以テ感染ノ部ヲ焦灼シ或ハ患部ヲ截除スルヲアリ内服ニハ甘汞、規尼涅等ヲ處ス

◎脾臟諸病

間歇熱及腸窒扶斯ノ療法ヲ參照シテ規尼涅、砒石劑等ノ處方ヲ爲ス可シ

毛之部

◎盲腸炎

腸炎ノ部ニアリ就テ見ル可シ

世之部

◎猩紅熱

病室ニ新鮮ノ空氣ヲ導キ解熱劑ヲ與ヘ緩下劑ヲ投シ消渴ノタメニハ鹽酸里母那垓ヲ給シ其他ノ療法ニ至テハ麻疹及腸窒扶斯ノ條ヲ參照ス可シ

◎赤痢

病室内ニ新氣ヲ通シ石炭酸水ヲ撒布シ患者ニハ滋養強壯物(例之ハ雞卵、

肉羹汁、牛乳等)ヲ與ヘ決ノ刺戟物ヲ給ス可ラス而ノ外治法ニハ腹部ノ氷  
 罨法若クハ溫罨法(時期ヲ伺ヒ)ヲ行ヒ強壯者ニハ肛圍ニ水蛭ヲ貼シ或ハ  
 別刺敦那坐藥(百倍)及阿片坐藥(百倍)等ヲ與ヘ或ハ格魯兒酸加里水(百  
 倍)鉛糖水(三百倍)鞣酸水(百倍)等ノ灌腸ヲ施シ虛脫ノ恐アル者ニハ「カ  
 シナル」ノ皮下注入ヲ施ス等ナリ内治法ニハ初メニ草麻子油或ハ甘汞、蒺  
 刺巴ノ下劑等ヲ與ヘ次テ緩和包攝劑ヲ投ス而シテ此病ニ對シ吐根、甘汞ハ  
 特效藥トス次テ阿片、次硝酸蒼鉛、鉛糖、硝酸銀、亞刺昆亞護謨、沙列布等  
 ナ處ス、退期ニ至テハ強壯劑殊ニ規尼涅、葡萄酒、鐵劑等ヲ與フ可シ  
 但シドワル氏ノ法ニ據レハ吐根(一、五)ヲ臨臥ニ限リ頓服セシメ且ツ  
 阿片ト調勻セズ阿片ハ吐根内服ノ一時間前ニ用フト云フ  
 ○甘汞、蒺刺巴末各〇・五 右頓服  
 ○草麻子油一五・〇 右頓服

- 吐根一・〇 稀酸蘇僧母〇・二 右爲一包臨臥頓服
- 吐根(一・〇)浸五〇〇〇 亞刺昆亞護謨漿五〇〇〇 右頓服二回量  
 但シ嘔吐セントメルモ可成身体ヲ安靜ニ保持セシム可シ
- 吐根二・〇 大黃根六・〇 沸湯一五〇〇〇 右浸漬ノ後、蜀葵根舍利別  
 三〇〇〇、亞刺昆亞護謨四・〇ヲ加ヘ每一時一五・〇宛與フ(ヤン氏)  
 ○智母兒水(千倍乃至五百倍)三〇〇〇〇 右灌腸料一日二回乃至四回  
 (醫科大學方府)
- 「クレオリン」水(二百倍)三〇〇〇〇 右灌腸料一日二回乃至四回  
 (醫科大學方府)

○聲門水腫

喉頭焮腫ノ條ヲ參照ス可シ

○聲門痙攣

發作ノ際ニハ頸部ニ芥子泥ヲ貼シ顔面ニ冷水灌注法ヲ行ヒ格魯兒防或次  
硝酸亞密兒等ノ嗅入法ヲ行ヒ内服ニハ麝香、臭素加里、抱水格魯利兒等ヲ  
與ヘ間歇時ニハ肝油、沃度鉄舍利別等ヲ投ス可シ

○喘息

氣管支喘息トアリ就テ見ル可シ

○舌炎

多シハ外科法ヲ要ス例之ハ舌上面ヲ縱割スルガ如シ

○疝痛

各部ニアリ例之ハ腸疝ハ知ノ部ニアルカ如シ

○小兒瘦削症

腸間膜勞ノ項下ニアリ

○小兒腦膜炎

乃ノ部ニアリ

○脊髓炎

(急性症)ニハ發汗法ヲ施シ脊椎患部ニ氷罨法ヲ行ヒ或ハ水蛭ヲ貼シ或ハ  
刺絡ヲ施シ若シハ水銀軟膏及沃度丁幾等ノ塗擦ヲ命シ内服ニハ甘汞蒟刺  
巴ノ下劑(各〇・五)ヲ投シ規尼涅、撒里矢爾酸那篤留母等ノ解熱劑ヲ與  
ヘ次テ沃度加里ノ内服ヲ處ス

(慢性症)ニハ電氣ヲ通シ種々ノ浴湯法若シハ冷水浴ヲ行ヒ藥劑ニハ沃度  
加里、番木甞丁幾、砒石劑、別刺敦那、硝酸銀、麥角越幾斯等ヲ與ヘ或ハ「ス  
トリヒ子」ノ皮下注入法ヲ爲ス「ア」又「概」今ニ至リシヤル「コー」氏ハ「一」ノ  
懸壘法ヲ案出セリ(此法茲ニ略ス)其他脊髓病一般療法ノ項ヲ參照ス可シ

○「ストリヒ子」〇・〇五 鹽水一〇・〇 右皮下注入料(一回半筒)

鑽泉浴、冷水浴等ヲ行ヒ瓦爾華尼電氣ヲ強ク流通シ或ハ神經展伸法ヲ試  
 ミ藥劑ニハ沃度加里、硝酸銀、「ストリヒチ」、麥角越幾斯等ヲ與ヘ猶兼テ  
 驅微療法ヲ行フヲ緊要トス對症療法ニハ鹽酸莫爾比涅、臭素加里、抱水格  
 魯刺兒、鹽酸規尼涅、撒里矢爾酸那篤留母、砒石等ヲ撰用ス其他病ノ終リ  
 ニ臨テハ強壯劑ヲ缺ク可ラス。

○硝酸銀〇・五 蒲公英越幾斯適宜 龍膽末適宜 右九五十粒ト爲シ硃

酸礬土ヲ衣シ毎回二粒宛一日三回服用

○沃度加里一〇 番木鱧丁幾一〇〇 鹽水一〇〇〇 右一日三次分服

○麥角、茴香油糖各一・五 右散三包ト爲シ一日三次服用

(ワルドマン氏)

○「ストリヒチ」〇・一 鹽水一〇〇〇 右皮下注入料(一回半筒)

○小兒脊髓麻痺

宜シテ電氣療法ヲ行フ可シ

○脊髓病一般療法

外治法トシテ按摩法、芥子泥ノ赤引法、沃度丁幾、龍腦丁幾、安母尼亞精ノ  
 塗擦法等ヲ施シ又凡テノ浴湯法(例之ハ種々ノ鑽泉浴)ハ一般ニ低温ナル  
 チ佳トス然レ時宜ニ由リテハ高度ヲ要スルコトアリ是レ興奮ノ目的ト鎮靜  
 ノ目的トノ二法アレハナリ宜シク注意ス可シ但シ脊髓膜諸病ノ滲出物ヲ  
 吸収セシムルニハ低温ナルチ佳トス海水浴及冷水浴ハ脊髓衰弱症ニ誘導  
 法トナリテ奏効スルコトアリ患部ノ氷罨法及水蛭療法ハ只急性ノ初期ニ用  
 フルノミ而シテ電氣療法ニハ多クハ瓦爾華尼電氣ヲ脊椎部ノ隔位或ハ脊椎  
 部ト胸部ト或ハ項部ト下顎部トニ通シ其消積極チ定ムルニハ宜シク病症  
 ニ隨フ可シ(電氣療法ノ部ヲ參照セヨ)其他末梢神經障礙ニハ感傳電氣ヲ  
 用フ

内治法トノ急性炎症ニハ甘汞蒞刺巴ノ下劑ヲ與ヘ諸般ノ清涼劑ヲ投ス解熱ニハ規尼温、安質必林、安質歌貌林、撒里矢爾酸那篤留母等ヲ投シ、充血症ニハ麥角越幾斯、別刺敦那等ヲ處シ硝酸銀ハ脊髓勞ニ用テ効アリ沃度加里ハ驅蠱法ヲ兼テ慢性症ノ浸潤ヲ療スルモノナリ其他臭素加里、抱水格魯刺兒、「パラアルデヒート」等種々ノ麻醉劑ヲ要スルコトアリ

○精神錯亂

對症療法ヲ行フノ他精神療法ヲ要ス

○攝護腺炎

會陰部ニ水腫ヲ貼シ別刺郭那坐藥(十五倍)鹽酸箇加因坐藥(三十倍)等ヲ施シ疼痛甚シキモノニハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入ヲ爲シ消炎ノ目的ニハ水銀軟膏ヲ會陰部ニ塗擦シ内服ニハ通常下劑ヲ投ス可シ

○攝護腺肥大

緩下劑例之ハ草麻子油、加爾々私泉鹽等ヲ投シ或ハ沃度加里ノ持長内服ヲ處スルコトアリ

○腺病  
瘰癧ノ條ヲ參照ス可シ

壽之部

○水瘰  
石炭酸水(二百倍)ノ口内洗滌法或ハ格魯兒酸加里水(七十倍)ノ含嗽法等ヲ行ヒ内服ニハ「カンフル」、葡萄酒等ヲ處ス

○水腫  
腹水ノ條ヲ參照ス可シ

○水疱疹



特效藥アルヲ聞カス通常用フルモノハ亞鉛花、沃度防等ノ撒布法或ハ之  
 カ軟膏ヲ塗り以テ被包シ置キ或ハ種々ノ油類ヲ塗布シ時トシハ硝酸銀水  
 、次醋酸鉛水、偏里設林等ノ外用ヲ試ルコトアリ内服ニハ少量ノ甘汞、沃度  
 加里、規尼涅等ナリ

實用新治療書 完

實用新治療書附錄

中毒篇

◎双蘭菊中毒

咽頭灼熱、瞳孔散大、脈搏緩徐等ノ症狀ヲ呈ス宜シク速ニ吐劑ヲ與フ可シ  
 然レ時トシテ下劑ヲ要スルコトアリ生力沈衰、呼吸困難等ノ症狀ヲ現ハス片  
 ハ「カンナル」ノ皮下注入及乾角ヲ用フ可シ

◎硫酸銅○・二白糖、澱粉各適宜 右散一包ト爲シ毎十分時一包ヲ與  
 へ吐ヲ得テ止ム

◎苛性加里及苛性那篤倫ノ中毒

咽頭灼熱、口内粘膜腐蝕、吐血等ノ症狀ヲ發シ強劇ナル格魯布性炎症ノ  
 如クナルモノナレハ注意ノ虚脱ヲ防シ可シ解毒劑トシ與フルモノハ醋酸  
 里母那埜及枸橼酸里母那埜トス次テ用フルモノハ脂肪油ニシテ毒物ヲ鹼化

特效藥アルヲ聞カス通常用フルモノハ亞鉛花、沃度昉等ノ撒布法或ハ之  
 カ軟膏ヲ塗り以テ被包シ置キ或ハ種々ノ油類ヲ塗布シ時トシハ硝酸銀水  
 、次醋酸鉛水、偏里設林等ノ外用ヲ試ルコアリ内服コハ少量ノ甘汞、沃度  
 加里、規尼涅等ナリ

實用新治療書 完

實用新治療書附錄

中毒篇

◎双蘭菊中毒

咽頭灼熱、瞳孔散大、脈搏緩徐等ノ症狀ヲ呈ス宜シク速ニ吐劑ヲ與フ可シ  
 然ル時トシテ下劑ヲ要スルコアリ生力沈衰、呼吸困難等ノ症狀ヲ現ハス片  
 ハ「カンフル」ノ皮下注入及乾角ヲ用フ可シ

◎硫酸銅○・二白糖、澱粉各適宜 右散一包ト爲シ每十分時一包ヲ與  
 へ吐ヲ得テ止ム

◎苛性加里及苛性那篤倫ノ中毒

咽頭灼熱、口内粘膜炎腐蝕、吐血等ノ症狀ヲ發シ恰強劇ナル格魯布性炎症ノ  
 如クナルモノナレハ注意ノ虚脱ヲ防シ可シ解毒劑トシ與フルモノハ醋酸  
 里母那埜及枸橼酸里母那埜トス次テ用フルモノハ脂肪油ニ毒物ヲ鹼化

セシムルニアリ其他流涎、嘔下困難、咳嗽、嘔吐、下利、下血、知覺異常、頭痛、眩暈、卒倒、脈搏頻數等ノ症狀ヲ續發スルカ故ニ宜シク對症的療法ヲ行フ可シ

○醋酸○五單舍利別二〇〇〇 餽水一〇〇〇 右一日六回分服

○安母尼亞中毒

苛性加里ノ中毒ニ同シ

○拔留母鹽中毒

其症狀率チ苛性加里中毒ノ如クナレハ注意シテ先ツ蛋白水ヲ投ジ次テ吐瀉ヲ用ヒ或ハ硫酸麻屈涅矢亞、硫酸那篤留母等ヲ多量ノ水ニ溶解シ直ニ頓服セシムルヲ佳トス但シ對症的療法ヲ怠ル可ラス

○硝酸加里中毒

其症狀大抵嘔吐及下利ヲ發シ腹部ニ劇痛ヲ訴ヘ漸々虛脱スルモノナリ宜

シシ飲料ヲ多服セシメ對症療法ヲ行フ可シ時トノ消炎法ノ甚タ必要ナル  
フアリビニーム氏ハ心臟麻痺ヲ治センカ爲ニ心臟部ヲ壓迫ノ人工呼吸法  
ヲ行フト云フ

○格魯兒中毒

劇烈ノ嘔吐、劇烈ノ痙攣狀咳嗽、鼻粘膜加答兒等ヲ發シ次テ猶ホ胸部刺痛  
呼吸短息時々血痰ヲ咯出シテ率ネ氣管支加答兒時トノハ肺炎ヲ起ス者ナ  
レハ可成速ニ安母尼亞水若クハ硫化水素ヲ吸入セシメ或ハ持長的ニ蒸氣  
吸入法ニ兼テ安母尼亞、硫化水素及依的兒等ノ吸入ヲ施ス可シ内服ニハ  
乳汁、蛋白ヲ用フ又オイレンプルグ氏ハ預防トシテ左法ヲ賞揚ス

○亞爾簡保兒少許 右海綿ニ蘸シ前鼻竇ニ接付ス

○安質母尼中毒

亞細亞虎刺ノ如キ症狀ヲ發スルモノナレハ宜シク鎮吐及ヒ止瀉ノ法ヲ

務ム可シ通常用フルモノハ阿片、鞣酸、機那劑等ナリ其他氷片ヲ含マシメ粘滑飲料ヲ與ヘ鞣酸ノ灌腸ヲ施ス等對症療法ヲ施ス可シ

○沒食子一〇〇水四〇〇〇 右五分時間煎煮ノ濾過シ毎回一〇〇。

○宛温服セシム(フイブス氏)

◎亞尼林中毒

石炭酸中毒ノ療法ト大差ナシ

◎砒石中毒

(急性症)ハ殆ト亞細亞虎刺刺ノ如キ症狀ヲ發シ兼テ腹部ノ劇痛ヲ起シ尿中ニ蛋白或ハ血液ヲ混シ或ハ全身ニ發疹スル等甚タ危險ノモノナレハ宜シク注意シテ虛脫ヲ防シ可シ先ツ初メニ用フルモノハ吐劑ニシテ(吐酒石ハ用テ可ラス)次テ用フルモノハ乳汁及脂肪ナリ(必ス中和鹽及蛋白ヲ用テ可ラス)又消毒劑トシテ用アルハ含水酸化鐵及燻性麻偏濕矢亞等ナリ其

他劇痛ニハ鹽酸莫爾比涅ノ皮下注入ヲ施ス等對症療法ニ怠ル可ラス

○鹽酸「アポモルヒチ」一〇〇一 餽水一〇〇 右皮下注入一回量 (サロモン氏)

○燻製麻偏濕矢亞三四〇 餽水二〇〇〇 右調和四分時間毎ニ三〇。

○宛服用(サロモン氏)

○次炭酸鐵ヲ多量ノ水ニ和シ服用セシメ三四時間ノ後草麻子油ヲ頓服セシム(レアール氏)

(慢性症)ハ全身貧血ノ毛髮脱落シ大抵結膜炎及腸胃加答兒ヲ發ス其他時トシテハ黃疸ヲ合併シ濕疹ヲ發スルヲアリ猶麻痺ヲ遺スモノナレハ宜シク對症療法ヲ行フ外鐵劑ヲ兼用ス可シ

○磷酸亞鉛〇・四 甘草末適宜 右丸五十粒ト爲シ毎回一粒宛一日三回服用(麻痺症)(ムスシ氏)