

大阪府病院長
後六位高橋正純著

對症方選

明治九年
十二月刻成
日新亭藏



對症方選卷之四目錄

婦人生殖器病

陰囊陰痛

一丁

膈疝瘰

三丁

腔厥衝及潰瘍

四丁

月經早至

七丁

月經晚至

八丁

經閉

九丁

月經痛及月經困難

十六丁

月經過滿

十九丁

子宮出血 崩漏

二十丁

子宮加答流

二十五丁

子宮嫩衝

三十丁

子宮水腫

三十三丁

大阪府病院長
後英位高橋正純書

對症方選



婦人生殖器病

明治十五年圖書局交

- 一丁 陰瘰陰痛
- 三丁 腔痙攣
- 四丁 腔焮衝及潰瘍
- 七丁 月經早至
- 八丁 月經晚至
- 九丁 經閉
- 十六丁 月經痛及月經困難
- 十九丁 月經過漏
- 二十丁 子宮出血 崩漏
- 二十五丁 子宮加答流
- 三十丁 子宮焮衝
- 三十三丁 子宮水腫

子宮氣腫

三十四丁

子宮瘦瘠及肥厚

三十五丁

子宮癌及潰瘍

三十六丁

子宮脫及腫脫

四十丁

卵巢病 水腫 焮衝 硬結

四十一丁

花風

四十二丁

乳房焮衝

四十三丁

乳汁缺乏及過溢

四十五丁

乳癌

四十六丁

乳頭症 刺脫 披裂 疼痛 發疹

四十七丁

小產

四十九丁

產前症

五十丁

產後症

五十二丁

毒熱

五十三丁

產婦白腫

五十五丁

皮膚病

丹疹及蕁麻疹

五十七丁

頑癬 環癬

五十八丁

皮癬 附胞瘡

六十丁

天泡瘡

六十五丁

苔癬

六十五丁

癢癬

六十六丁

鱗屑癬 癩風及魚皮癬

六十八丁

粉刺面瘡及額瘡

七十二丁

頭瘡

七十四丁

疥癬

七十六丁

疣贅

七十九丁

皮斑 肝斑 雀斑 夏日斑

八十丁

母斑 血痣

八十一丁

眠瘡

八十二丁

湯潑火傷 八十四丁

凍瘡 八十六丁

創傷 八十七丁

皮膚剝脫及披裂 八十八丁

挫傷及皮下出血 九十丁

毒傷 九十二丁

毛髮病 毛髮脫落 毛髮過生 九十三丁

爪末炊衝 即癩疽 九十五丁

眼病

眼瞼病

眼瞼腫脹症 九十六丁

眼瞼炊衝及潰瘍 九十七丁

眼瞼癢攣 九十八丁

眼瞼麻痺 九十九丁

眼瞼外反 百丁

眼瞼內反 百一丁

淚器病

淚腺症 百一丁

淚囊症 百二丁

結膜病

結膜炊衝 百二丁

結膜醜膿 百五丁

角膜病

角膜炊衝曇暗及斑點 百七丁

角膜上血管荒蕪 百十一丁

角膜翅翳 百十一丁

虹彩病

虹彩炊衝 百十二丁

瞳孔散大 百十四丁

網膜病

疔毒

網膜嫩衝 百十五丁

晝盲夜盲 百十六丁

視力乏弱黑內障 百十六丁

水晶體病

白內障 百十八丁

眼室病

膿眼 百十九丁

血眼 百二十丁

水腫眼 百二十一丁

耳病


耳嫩衝及歐私答幾管炎 百二十二丁

耳聾 百二十五丁

耳痛 百二十六丁

耳聾 百二十七丁

作方家符號追加



之四

從六位 高橋正純 著

婦人生殖器病

陰癢陰痛

○芒硝硫黃劑 劇性陰癢 方出于 關節病

○硫黃麻屈涅失散 主治同前 方出于 關節病

○拔爾撒骨洋霍 外陰搔癢

右每服二十滴、日三次

○大黃水銀菲阿斯丸 劇性陰癢 方出于 頭痛

○硫酸鐵芒硝塩水 主治同前 方出于 貧血

○擬製勃質氏鏽水 主治同前 方出于 癩風

○擬製哈爾斯鏽水 主治同前 方出于 痛風

○拘椽酸鐵安沒尼劑 陰癢、兼滋養不給者 方出于 貧血

○硝塩酸合劑 〔丹〕 主治同前 方出于急 性風濕

○規尼丸 〔丹〕 神經性陰癢 方出于 頭痛

○方 〔丹〕 主治同前

硫酸規尼 六八至 十二八 稀硫酸 一 水 四

右調和、每服一匙、日三次、至六次

○規尼莨若阿片丸 〔丹〕 主治同前 方出于 神經痛

○參兒丸 〔丹〕 劇性陰癢 方出于 肛門癢

○昇汞飲 〔丹〕 主治同前 方出于 汎 發癩毒

○砒石劑 〔丹〕 頑固陰癢 方出于 尿毒証

○青酸洗劑 〔丹〕 主治陰癢、痒瘡

稀青酸 三 鈔 六十八

亞爾箇兒 一 接骨木花水 八

右調勻、為洗劑

○亞爾加里鎮靖洗劑 〔丹〕 陰癢

鹽酸莫非水 一 剝亞斯水 二 甘油 一

老利兒水 一 接骨木花水 十二

右調勻

○又方

硫酸剥答斯 六 剝亞斯水 三十

雙鸞菊丁幾 四 蒸餾水 十二

右調勻

○鎮靖洗劑 〔丹〕 方出于 痛風 陰癢陰痛

○方 〔丹〕 主治陰癢

哥囉吩 半 一 扁桃油 一

右調勻、塗擦腔內、及外陰

○青酸洗劑 〔丹〕 方出于 肛門痒

○方 〔丹〕 主治陰癢

昇汞 一 蒸餾水 一

右溶和、為洗劑

○猛頌洗藥 〔丹〕 主治陰部、或肛門癢痒

猛頰 十八
稀青酸 百密
鹽酸莫非水 二号

右調勻、取一茶匕、和水一盞、為洗藥
○方 〔壓〕 主治陰癢

昇汞 十人至十五人
龍腦精 号
蒸餾水 十号
右溶解、洗患部、日二次、或取此液一茶匕、至一食匕、和水一泔、為注射劑

○迷屈氏治痒方 〔第〕 主治同前
蓬砂 半号
蓄薇水 六号或八号
硫酸莫非 六号
右調勻、洗患部、日數次

○硼砂甘油洗劑 〔丹〕 主治頑固腔內癢痒
硼砂 二百人
鹽酸莫非 十人
甘油 一号
玫瑰水 八号
右調勻、塗于患部、日二三次

○沃度銘腔柿藥 〔丹〕

沃度鉛 八十人
莫若越幾 二十四人至四十人
失鳩答越幾 百人
椰子油 一号至一号半
橄欖油 二号

右調勻、上文火、熔解、注紙管、為小指大長、掉分八個、每夜、或隔夜、取一個、挿入于腔內
○方 〔給〕 主治陰癢

莫爾非涅 六人至十人
越波里膏 二号
右研和、取豆大、搽腔內
○方 〔給〕 主治同前

莫若越幾斯 十人
越波里膏 二号
右研和、用法同前
○方 〔給〕 主治外陰搔痒

炭酸曹達 一刃至四刃
淨水 三十二号
右溶和、微温、而洗、滌患部
○方 〔送〕 主治同前

格羅兒曹達 或格羅兒石灰 二錢 泉水 四錢

右溶和為洗劑

○方 湯 陰部搔癢

硝酸汞液 十五滴 蒸餾水 一匙

右調勻為洗劑

○護烏刺兒度水 八錢 主治同前

右為洗劑

○方 方 主治同前

沃實謨 十五錢 沃度加里 二刀

蒸餾水 五錢 亞爾箇兒 一錢

右溶和加水四倍、蘸海綿、搽于腔內

腔痙攣

○方

甘扁桃 去皮 白罌粟 各三錢 水 四錢

舍電阿芙蓉液 半刀 蜀葵舍利別 半錢

右搗和為乳劑、每一時服一匕

○方

高菅越幾 一尺至二尺 甘草末 半刀

右為散、製劑、四個、每三時服一劑

○方

非阿斯越幾 半刀 老利兒水 三匙

右溶和、每二時服六滴、至十滴

○方

失禮答葉 非阿斯葉 各半錢

右注沸湯、浸出取液一匙、為射注、及罨法

○方

阿芙蓉越幾 半刀、至一尺 家猪脂 半錢

右為軟膏、塗擦于會陰

腔焮衝及潰瘍

○方 主治諸焮衝

燐酸曹達 一 櫻實水 四 櫻實舍利別 一

右調勻、先取其半頓服、後每一時服一匕

○方 丹毒性陰門焮衝

吐酒石 一 至 蒸餾水 一 半

吐根末 一 刀 海葱醋蜜 半 分

右調勻、振盪、每四分時服一匕、至得吐

○方 主治腔焮衝

硝石 一 罌粟乳劑 四 扁桃舍利別 半

右調勻、每二時服一食匕

○甘汞藥刺巴散 一 急性腔焮衝 方出于

○藥刺巴旃那劑 一 主治同前 方出于

○阿片菲阿斯丸 一 急性腔焮衝 方出于

○阿片胡椒丸 一 方治同前

阿片越幾 一 至 胡椒末 二 分

菲阿斯越幾 四 分

右為二丸、每夜臨卧、用

○砒石劑 一 頑固陰唇焮衝 方出于

○硝塩酸合劑 一 主治同前 方出于

○規尼合劑 一 主治同前 方出于

○昇頰飲 一 主治同前 方出于

○沃度加里合劑 一 侵蝕性陰門潰瘍 方出于

○綠沃頰丸 一 主治同前 方出于

○赤沃頰丸 一 主治同前 方出于

○度諾漢氏三重水 一 主治同前 方出于

○幾那安沒尼劑 一 腔焮衝 方出于

○方 痛性焮衝及膿膿

菲阿斯葉 接骨木花

野菊花 亞麻仁末 各半号

右加乳汁煮為毳布

○方 劇性腔焮衝

菲阿斯越幾 一刃或篔簹 水銀軟膏 半号

右混和塗擦大陰唇日二三次

○方 劇性結締織焮衝

水銀軟膏 過爾托亞軟膏 各半号

右混和朝夕取胡桃子大塗擦于內股

○亞爾加里鎮靖洗劑 每 主治同前 方出于陰囊

○鎮靖洗劑 每 主治同前 方出于肛門痔

○甘油石灰水 每 主治同前

甘油 一号 複方達刺侃篤散 百二

精製蜂蜜 百二 加糖石灰水 一号

甘扁桃合劑 八号

右調和為塗藥

○沃度鉛軟膏 每 主治同前

沃度鉛 九十八 鯨腦油軟膏 一号

葦岩軟膏 或雙鸞菊軟膏 一匙

右調和、外敷

○亞格尼知涅軟膏 每 主治同前

亞格尼知涅膏 二匙 含亞格尼知涅二匙

甘頤軟膏 一号至二号

右研和、外用

○複方鯨腦油膏 每 主治同前

稀青酸 一匙 亞篤魯比軟膏 百二

鯨腦油膏 一号

右調和

○方 每 主治同前

鉛糖 二 醋酸莫非 一 蒸餾水 一

右調勻為洗劑

○鉛糖搽藥 每 急性腔喉衝、慢性帶下

鉛糖 二十分 阿片越幾 二十分

椰子油 一分 牛油 二分

右調勻，分八個，每夜取一個，為搽藥

○亞鉛莨菪搽藥 每 主治同前

亞鉛莨菪 或炭酸莨菪 莨菪越幾 四十分

椰子油 一分 橄欖油 二分

右調勻，分八箇，外用

○收斂注射劑 每 腔加答流

蘓木越幾 一分 明礬 百二分 水 二分

右調勻，加冷水一巴，先以唧筒注射清水一

巴于腔內，後注入此劑

○病院赤洗劑 每 腔潰瘍 方出于潰瘍

○方 每 小陰唇惡性潰瘍

赤降汞 拔爾撒亭露 各一分 家猪脂 半

右研和，外用

○方 每 主治同前

昇汞 三分 芸香水 三分 阿芙蓉丁幾 一分

右溶和，為射注劑

○方 每 主治同前

亞鉛華 一分 鉛軟膏 半

右混和，外用

○方 每 陰門壞疽

水楊皮 或檫皮 二分

右以水二匕，煮為一匕半，注射于腔內

○方 腔腫瘍破潰，後治癒愈慢者

沒藥丁幾 一分 撒爾非亞水 四分 或

右調勻，注射于腔內

月經早至

○方 月經早至起因下腹閉塞者

蒲公英越幾 二錢 酒石英

橙皮舍利別 各半 迷栗薩水 四錢

右調勻每服一食匕日四次

○旃那紙劑 一錢 主治同前

右每服一茶匕日二三次

○方 月經間時充血

酸味越栗失爾 半錢 覆盆子舍利別 一錢半

右調勻取一二食匕冷水和服

○方 逐 月經早至患者感動過敏者

吐根 八錢 浸出 液六錢 甘扁桃油 三錢

亞刺比亞末 一錢 罌粟舍利別 六錢

右調勻每二時服一匕

○方 月經早至

珊篤里越幾 二錢 橙皮水 四錢
橙皮舍利別 半錢
右調勻每二時服一食匕

月經晚至

○方 月經晚至兼消化機衰弊者

菖蒲根 一錢 薄荷葉 二錢 葛縷子 一錢

右調勻取一匕沸湯三四碗浸出

○方 福 主治同前

葛斯加栗刺皮 半錢 加沸湯適宜浸漬

葛斯加栗越幾 二錢 橙皮舍利別 一錢

右調勻振盪每二時服一匕

○方 福 多血家月經晚至

答麻林度 二錢 以水 十一錢 芒硝 一錢
煮濾過取液 八錢

滿那訖劑 一弓

右調勻、每一時、服半碗

○方 兼頭胸充血、眩暈、耳鳴、心悸、眼火等者

硝石 半匙至一匙 扁桃乳 蜀葵舍利別 各半

右調勻、每二時、服一匕

○方 兼多血、充血、及神經刺衝者

蓬砂 二匙至四匙 白糖 一弓

右為散、每服一卵匕、日四次

○方 〔蘊〕

阿魏 二匙 石鹼 大黃末 各一

薄荷油 五滴 牛膽 適宜

右為百二十九丸、每服五丸、至八九、日二三次

○麥奴散 〔豆〕 月經晚至

麥奴末 白糖 各一匙

右為散、分六包、每服一包、日二次

○方 患女虛弱、脈細、面色萎黃者

亞爾尼加根 一匙半、以水五弓、加密列越幾

芸香越幾 各二刃 酒石酸加里鐵 半匙

薄荷水 一弓 橙皮舍利別 半弓

右調勻、每服一匕、日三四次

經閉

○硝酸梅那蒲公英飲 〔丹〕 經閉、兼多血者 方出

○蘆薈梅那瀉利塩劑 〔丹〕 主治同前 方出于

○藤黃蘆薈水銀丸 〔丹〕 主治同前 方出于

○鐵蘆薈丸 〔丹〕 貧血性月信不順

粒狀硫酸鐵 二八 蘆薈沒藥丸 三八

右為丸、食後用、日三次

○鐵實芟荅利劑 〔丹〕 主治同前 方出于

○鐵蓋膏飲 主治同前

加糖炭酸鐵 四十 加密列浸 八号

右調勻、每服六分劑一、日二次、或隔朝、取次劑、食前用

燐酸曹達 百二十 大黃越幾 十号

複方蘆薈煎 四号 葛縷子水 一号

右調勻、頓服

○沃度鐵合劑 主治同前 方出于關節病

○鐵私的列幾尼劑 主治同前 方出依卜昆埕兒

○鐵通經劑 月經閉止、兼血行遲慢者

沃度加里 十八号至 番木鱉丁幾 一号

枸橼酸鐵安沒尼 四十 枯失亞浸 八号

右調勻、每服六分劑一、日三次

○又方 主治同前

沃度鐵舍利別 甘油 各一 枸橼油 十

右調勻、取一茶匙、水一盞和服、日三次

○又方 經閉、兼乏血症、及瘁性便秘者

炭酸鈣丸 三十号 複方藤黃丸 十五号

薩毘那油 十二密

右為十二丸、每服二丸、日二次

○又方 一身衰弱、月經乏少、兼口內粘膜、或

胃粘膜刺衝者

塩酸鐵丁幾 一匙半 塩酸加里 六十号

亞屈的刺設母斯丁幾 四号 攝爾扁答里浸 八号

右調勻、每服六分劑一、日三次

○刺衝通經劑 月經閉止、係子宮衰弱者

麥奴流動越幾 三号 攝爾扁答里丁幾 六号

番木鱉丁幾 一匙 複方蘆薈煎 八号

右調勻、每且服六分之一

○又方 月經閉止、兼癩癩症者

澳素如里 六十八 羌青丁幾 一匙半

桂丁幾 六匙 水 八勺

右調勻、每服六分劑、一日三次

○又方 丹

芸香油 十五密 麥奴流動越幾 二匙

達刺侃篤漿 八勺

右調勻、每服六分劑、一日三次

○又方 丹

蓬砂 六十 麥奴丁幾 四匙 桂水 八勺

右調勻、每服六分劑、一日三次

○又方 丹

藜蘆丁幾 三匙 薑舍利別 六匙 旃那浸 八勺

右調勻、每服六分劑、一日三次

○又方 丹

私的列幾尼水 密 三十 塩酸鐵丁幾 一匙半

主治弛弱性經閉

亞屈的刺設毋斯丁幾 四匙 枯失亞浸 八勺

右調勻、每服六分劑、一日三次

○又方 丹

剥篤比里脂 六匙 非阿斯越幾 二十四匙

番木鱉越幾 四匙 蘆蒼汶藥丸 三十匙

右為十二丸、每夜臨卧、服一丸

○方 補

醋酸莫非 適宜溶解 吐根末 二匙

非阿斯越幾 四匙 蜀葵末 一匙 蜂蜜 適宜

○方 斷

蓬砂 硝石 各一匙

炭酸麻屈涅夫 一匙 白糖 二匙

右為散、每二時、服一茶匕

○方 歌

虛性經閉

蓬砂 十五分 沒藥 十二分

薩弗蘭 三分 丁香油 一滴

右為散每服一劑日二三次

○方 月經閉止

睡菜越幾 孕蓬酒石 各二分 蓬砂 一分

薄荷水 六分 薩弗蘭舍利別 一分

右調勻振盪每二三時服一匕

○方 主治同前

亞爾尼加華末 半匙 硝砂 二分

龍腦 六分 白糖 六分

右為散每服一茶匕日三四次

○麥奴散 主治經閉因子宮神經機衰弊者

方出于月

○方 瘕性經閉兼秘結者

阿魏 續草越幾 石鹼

牛膽 大黃末 各一匙

右二分為一九朝夕各服五丸

○方 月經閉止因番代出血者

蘆薈 麥奴 各半匙

格魯董篤越幾 五分 薩昆那油 十滴

右為三十九丸每服二丸日三次

○方 月經閉止

泊夫蘭 二匙 蓬砂 半匙 乳糖 半分

右為散每服一茶匕日三四次

○方 經閉及白帶下

沒藥 鍊粉 大黃 各一分 薯草越幾 適宜

右二分為一九衣桂末每服五丸日三次

○方 經閉兼衰弱者

蘆薈末 半匙 沒藥 一匙

泊夫藍 一匙 橙皮越幾 適宜

右為百二十九丸每服四丸日三次

○律比丸 一名沒藥 蘆薈丸 經閉水腫發狂鬱症

蘆薈 二錢 沒藥

泊夫藍 各半錢 茴香舍利別 適宜

右二丸為一丸衣桂末每服二三丸日二次

○方 勿 經閉衰弱者

蘆薈 一錢 鐵粉 二錢 金硫黃 半錢 甘草 一錢

薩昆那油 二十滴 蜀葵舍利別 適宜

右三丸為一丸每夜臨卧服二丸

○方 援 主治經閉衰虛脫者

麝香 一錢 龍腦 半錢 蘆薈越幾 半錢

沒藥越幾 一錢 拔爾撒字露 適宜

右二丸為一丸每服八九日三次

○方 經閉

薩昆那葉 二錢至三錢加沸湯適宜浸漬四時濾過取液六錢

硅皮水 橙皮舍利別 各半錢

右調勻每二三時服一二匕

○方 經閉

薩昆那末 二錢 薩昆那越幾 適宜

右為六十九丸每服四丸至五丸日二三次

○方 經閉因稀血症者

薑末 薩昆那末 各一錢 蓬砂 一錢半

右為散分六包每服一包日二次

○方 經閉及白帶下

沃實謨 二錢 亞爾個兒 一錢 刺賢埏兒精 二錢

右溶和朝夕十滴二十滴漸加至四十滴

○方 補 主治同前

沃度加里 三十錢 蒸餾水 一斗

右溶和每服五滴十滴至二十滴

○方 經閉

先青末 二錢 薩昆那末 二錢

右為散分四服、每夜一服

○方 主治同前

先青末 一兩 酸化鍊

蘆薈 各半錢 野菊花越幾 適宜

右為六十九丸、每服二三丸、日三次

○方 主治同前

鐵粉 二錢 硫黃花 沒藥

蘆薈 各一 牛膽 適宜

右二錢為一九、衣桂末、朝夕服十二丸

○必爾鳩尼沃鍊丁幾 經閉、帶下、黃胖

沃度鍊 銳烈燒酒 蒸餾水 各一

右溶和、每服一匕、日二次

○必爾鳩尼沃鍊錠 主治同前

沃度鐵末 半錢 泊夫藍末 二錢

白糖 四錢 達刺侃篤漿 適宜

右為百二十錠、每日服八錠至十錠

○方 經閉止、心臟肥大

蒲魯謨鍊 十二 玫瑰昆設爾弗 十八

亞刺比亞末 十二

右為二十九丸、衣桂末、每服二丸、日二次

○方 經不調、因稀血症者

抱水酸化鍊 或炭酸 府利油糖 或桂油糖 各半錢

右為散、製劑十二個、每服一劑、日四次

○方 主治同前

乳酸鍊 甘草膏 各一錢

右為六十九丸、每服二丸、至五丸、日三次

○方 主治同前

乳酸鍊 菖蒲油糖 各一錢

右為散、分十二包、每服一包、日三次

○方_寫 主治萎黃病家經閉

硫酸鐵 一刃、或鍊 粉一匙 沒藥

蘆薈 各一匙 膏胆越幾 或續草越幾 適宜

右為三十六丸、每服二丸、日二次

○方_寫 主治月經不調、因多血症者

蘆薈末 一匙 律比丸料 半匙

薩昆那油 十滴 甘草膏 適宜

右為六十丸、衣桂末、朝夕服二丸、至四丸

○方_寫 主治同前

煨製麻屈涅失 一刃 炭酸加里 卜六瓜

薩昆那末 白糖 各一刃

右為散、分三服、一日用

○方_寫 主治同前

薩昆那油 十滴 薩弗蘭 珊篤里越幾 各一

右為六十丸、每服三丸、至六丸、日三次

○方 月經閉止、因瘧性所患者

醋酸私的列幾尼 一瓜、蒸餾水 少許溶解 甘草末

甘草越幾 各適宜

右為三十二丸、每服二丸、日二次

○硝砂精_寫 二多 虛性經閉

右取一大匕、注浴湯

○芥子泥_寫 主治同前

芥子末 二多 温湯 適宜

右為泥貼兩股之內面

○方_寫 主治同前

薩昆那油 半匙 的列並油 一多

右調勻、塗擦兩股內面

○腔挿藥_寫 通經及下泄劑

蘆薈越幾 六十 薩昆那油 一匙

椰子油 一多 橄欖油 二多

右調勻分八個每夜取一個插于腔內

○方 經閉

硝砂精 四錢 牛乳 四錢

右調勻取二匕注射于腔內日二三次

○方 主治同前

沃實謨 一錢 亞爾箇兒 二十五度 水 四錢

右溶和取一錢注射于腔內

○方 主治同前

硝酸銀 一錢至二錢 蒸餾水 一錢

右溶和射注于腔內

○必爾爐尼沃鏡軟膏 經閉及帶下

沃度鏡 半錢 家猪脂 半錢至一錢

右為軟膏取胡桃大塗擦于兩股內面

月經痛及月經困難

○方 月經難通因神經刺衝者

甘扁桃油 一錢 並刺比亞漿 三錢

沙列布根煎 五錢 阿芙蓉丁幾 十五滴至十五滴

右調勻每一時服二匕

○方 月經困難

阿魏 續草末 各二錢 續草越幾 適宜

右二錢為一丸每服五丸日二次

○方 月經痛兼胃痛者

硝酸蒼鈴 六錢至十二錢 葛斯多傳謨 六錢

白糖 一錢 加密列油 十二滴

右為散分六包每服一包日三次

○方 月經痛

蓬砂 一錢 迷栗薩水 四錢 苦扁桃水 一錢

右調勻每一時服一匕

○方氏 月經抑遏

河狸香丁幾 續草丁幾 各一 桂水半

薄荷水 四勺 罌粟舍利別 三匙

右調勻、每一時服一匕

○方 月經困難

甘汞 一 河狸香 八三 泊夫藍 二 白糖 一

右為散、製劑三個、每夜臨卧取一劑、以加密

列泡劑一碗、送下

○方 月經妨礙

麥奴 一匙、水煎 蓬砂 一匙半

非阿斯越幾 半 橙皮舍利別 一匙

右調勻、每二時服一匕

○方 月經痛甚症

蘆薈越幾 一匙、至 苦扁桃水 一匙

薄荷水 四勺 舍利別 半匙

右調勻、每一時服一匕

○方 月經痛

龍腦 八四 阿芙蓉 八 亞刺比亞漿 五適

右二八為一丸、每服一丸、日二次

○方 月經抑遏、因子宮虛弱者

蓬砂 一匙 白糖 六匙 薩昆那浸 六

右調勻、每服一匕、日三次、月經期每二

○方 民垵列里精 一匙

右每二時服二十滴、三十滴、至五十滴

○方 神經性月經抑遏

鐵粉 一刃 桂油糖 半刃

右為散、製劑六個、每服一劑、日三次

○方 野菊花油 一刃 主治同前

右每服取二滴、至六滴、白糖和服

○方 主治同前

孕蓬酒石 一

蒸餾水 五

老利兒水 二

單舍利別 一

右調勻、每二時服一匕

○方 歷 主治同前

續草根

野菊花 各等

右調勻、取一匕、沸湯二碗、浸出

○方 歷 主治同前

野菊花

迷栗薩

薄荷 各二

薩毘那葉 一

右調勻、以沸湯二碗、浸出、服其半

○方 歷 主治同前

蓬砂

苦烏桃水 各一

迷栗薩水 四

右調勻、每一時服一匕

○方 歷 主治月經痛

老利兒水 二

醋酸莫非 一

右調勻、每服十滴至三十滴

○方 歷 主治同前

老利兒水 一

舍電阿芙蓉液 一

右調勻、每服二十滴、日三次

○方 歷 主治子宮神經痛及月經痛

硫酸鐵 半

沃度加里 二

醋酸莫非 一

桂露水 一

橙花舍利別 六

右調勻、每服一食匕、日二三次

○方 歷 主治同前

甘硝石精 一

水 三

橙皮舍利別 一

右調勻、每服一食匕、日三四次

○大麻越的兒飲 神經性月經抑遏

印度大麻丁幾 二十

杜松子精 三十

忽氏鎮痛液 四十五

雙鸞菊丁幾 十

亞刺比亞漿 十二

右調勻、臨臥頓服

○阿片菲阿斯丸 丹 主治同前 方出于癲狂

○規尼合劑 丹 主治同前 方出于熱斑病

○撒里失涅劑 丹 主治同前 方出于開歇熱

○次重燐酸普達劑 丹 主治同前 方出于癩癩

○肝油 丹 主治同前 方出于失聲

○沃度鈴腔椰樂 丹 主治同前 方出于陰饑

○莫非注入法 丹 主治同前 方出于神經痛

○方 丹 月經痛 菲阿斯油 一 哥囉叻 二 戈

右調勻、塗擦于腹部

○方 丹 月經抑遏 龍腦 四 阿芙蓉 八 卵黃 一 水 四

右調勻、為灌腸劑

○方 主治同前

阿魏 一 莖 至 卵黃 一 加密列浸 六

右為乳劑、分二個、灌腸

○方 丹 經閉

硝酸 鹽酸 各一 戈

右調勻、為脚腸

月經過漏

○方 丹 月經過多、初起有腰痛及發熱者

芒硝 一 戈 水 四 酸味越栗失爾 半

右調勻

○方 實性月經過漏

炭酸加里 一 戈 枸櫞汁 適宜、飽

迷栗薩水 五 戈 枸櫞舍利別 一 戈

右調勻、振盪、每二時、服一 戈

○方 治同前

吐根末 三錢 酒石酸 半兩

硝石 二錢 或孕礬酒石 乳糖 六錢

右為散每服一茶匕日二三次冷水和服

○方 經性月經過漏

吐根 五錢 十錢 至十五錢 沸湯 適宜浸出 濾過取液 三錢

菲阿斯越幾 六錢 至 八錢 至 罌粟舍利別 一錢

右調勻振盪每二時服一匕

○華氏酸味越栗失爾 半兩

右每服十五滴大麥水和服日四次

○方 月經過漏

收斂越的兒 一錢 舍電阿芙蓉液 一兩

桂丁幾 二錢

右調勻每服二十滴大麥水和服日四次

○方 月經過漏 發痙攣症者

香竈酸丁幾 半兩 葛私多儂丁幾 二錢

舍電阿芙蓉液 一錢

右調勻每服二十滴日四次

○方 月經過漏

醇磷酸 一錢 櫻實舍利別 二錢

右調勻和冷水酸味適口為度

○方 月經過漏 兼子宮衰弱者

桂丁幾 半兩 阿芙蓉丁幾 一錢

右調勻每一時服二十滴

○方 治同前

永爾秩斯鎮痛液 一兩 酒製桂水 六錢

右調勻每服一匕日二次

○方 治月經過多及子宮翻覆

硝酸銀 十八至 蒸餾水 一兩

右溶和取十五滴至二十滴裝小唧筒用細

小導尿管注入于子宮內

子宮出血 崩漏

○方 多血家實性出血

硝石一匙至二匙 蘆根煎六 舍利別一

右調勻、每一時、或二時、服一匕

○方 崩漏諸症

瀉利塩三 水三 稀硫酸一

右調勻、取一匕、和水一碗、早朝用

○方 主治崩漏

收飲聖的兒半匙至一匙 沙列布根煎六

覆盆子舍利別一 苦扁桃水半匙至一匙

右調勻、每一時、服一匕

○方 逐 妊婦子宮出血

稀磷酸 半匙

桂皮丁幾 二匙

右調勻、每一時、取廿五滴、大麥水和服

○方 逐 痙攣性子宮出血

吐根末六、至十二 白糖二匙

右為散、分十二服、每一時、或半時、一服

○方 逐 崩漏、兼刺衝亢盛、脉細、肌膚乾冷者

阿芙蓉 一二 吐根末 二二

葛私多樓讓 四二 桂皮油糖 二二

右為散、分十二服、每四分時、半時、一時、一服

○方 逐

寶菱荅利一 酒石英 白糖各半

右為散、製劑十二個、每一二時、服一劑

○方 逐 痙性崩漏

香竈酸丁幾 一一 舍電阿芙蓉液 一一

右調勻、每服四十滴、至五十滴

○方 崩漏因子宮弛弱者

幾那皮一號水煎 收斂越的兒二號
橙皮舍利別一號

右調勻每二時服一白

○方 行虛性子宮出血

明礬二號 吉納廿四號 阿芙蓉三號 乳糖一號

右為散分六服每三時取一服冷水送下

○明礬乳清 常習子宮出血

牛乳煎沸者 明礬末一號 白糖一號

右先和前二味令凝固取上清加後味每日

服三號大碗

○方 虛性子宮出血

明礬十五號 薄荷水四號

桂皮丁幾二號 桂舍利別一號

右調勻每四分時或半時服一白

○方 主治同前或產婦出血

明礬六號 阿仙藥一號 阿芙蓉一號

右為六丸衣桂末一日用

○方 慢性子宮出血兼弛弱者

阿仙藥六號 阿芙蓉半號 丁香油糖一號

右為散製劑六個每三時服一劑

○收斂散 虛性子宮出血

吉納二號 寶菱舍利葉末一號

右為散分十服每半時一服

○方 出血劇甚瀕死者

桂皮油十滴 硫酸越的兒一號

右調勻每四時或半時服十滴至十五滴

○方 寫 主治子宮出血

刺荅尼越幾一號 桂皮水四號

酸味越栗失兒半號 桂皮舍利別一號

右調勻每服一茶匕

○方 劇性子宮出血

單寧^八 阿片越幾^二 玫瑰昆設爾弗^道

右為四丸衣石松子末每一時服一丸

○方 虛性子宮出血

薩昆那末^三 薩昆那越幾^二

薩昆那蒸餾油^一

右二丸為一丸衣桂末每服四丸五丸至十

丸日三次

○方 主治同前

薩昆那葉^半 桂皮^二

右浸出取液六分每一時服一匕

○方 麻痺性子宮出血

結列阿曹篤^半 過爾托根末^一

右加護膜漿適宜為六十九丸衣桂末每服二

丸至四丸日二三次

○方 虛性子宮出血

鉛糖^五 燕窩水^半 阿芙蓉末^半

著草越幾^一 蜀葵根末^{適宜}

右為六十丸每四時服三丸

○方 主治同前

硝酸銀^二 燕窩水^半 甘草末^二

右為六十丸每二時服一丸

○鹽酸鐵丁幾^半

右每一時取五滴十滴至十五滴冷水和服

○方 主治同前

硫酸鍊^二 至^半 桂油糖^半

右為散製劑十二個每服一劑日三次

○沒食酸水^每 子宮出血諸症

沒食酸甘油^六 至^十 稀硫酸^二

麥奴流動越幾 三錢 桂水 八分

右調勻、每一時、或六時服、八分劑一

○又方 丹 月經過多、咯血、吐血 方出于

○桂密斯扶爾 丹 虛性子宮出血 方出于

○又方 丹 主治崩漏、及虛性出血 尿血

桂皮丁幾 二錢 桂皮水 一錢

右調勻、日服三劑

○方 丹 主治產婦子宮出血

麥奴末 一刃 桂皮末 白糖 各半

右為散分四服

○方 丹 主治子宮出血

麥奴 一錢 桂皮 半錢

阿片越幾 五分 甘草膏 適宜

右為十球、每服一球、日二次

○李列斯骨篤氏治崩和劑 丹

麥奴 一錢 至 二錢 水 桂舍利別 或橙皮舍

右調勻、每一二時服 二食匕

○方 丹 主治子宮出血

越爾吳知涅 一錢 蒸餾水 四錢

橙皮舍利別 一錢

右調勻、每四時服 一食匕

○麥奴越幾水 丹 子宮出血、咯血、吐血 方出于

○方 丹 主治崩漏

鹽酸鈣液 半錢 蒸餾水 二錢 桂舍利別 二錢

右調勻、每服一匙布匕

○方 丹 妊婦子宮出血

阿片丁幾 半錢 續草丁幾 二錢 桂丁幾 一錢

右調勻、每半時服 二十滴

○方 產後、子宮出血、陷大虛脫者

麝香 六分 至 八分 白糖 半刃

右為散製劑八個、每四分時、或半時、服一劑
○方寫 主治崩漏

鉛醋^二 舍電阿片液^一 熱湯^六

右調勻、為射注劑、二回、分用
○方寫

阿仙藥 一匙 泉水 一匙

右調勻、為射注劑

○方寫

鹽酸銹液 二匙 蒸餾水 六分、或四分

右調勻、為注射劑

○方寫 子宮出血諸症

鹽酸銹丁幾 五滴 蒸餾水 十滴

右調勻、裝小唧筒、用細小導尿管、注入于子宮內、或取純鹽酸銹丁幾十五滴、代之

○方寫

單寧酸 一匙 泉水 八分

右調勻、為注射劑

○方寫 主治子宮及腔內出血

單寧酸^四 達刺侃篤漿^一 蒸餅心^適

右為塊、入腔內

○方寫 主治崩漏、及粘液漏

硫酸銅 一匙 蒸餾水 六分

右溶和、為射注劑

○子宮抽藥^丹 子宮出血、兼宮口弛開者

單寧酸 椰子油 各半分

右調勻、分八個、為棹狀、插入

○又方^丹 主治同前

明礬^八 皓礬^四 椰子油 半分

右調和、分八個、用法同前

○收斂抽藥^丹 主治同前 方出于腔脫

○方 哥 虛性出血及帶下

檳皮 一匁半、水煎 明礬 半匁

右調勻、為射注劑

○方 愈 主治同前

硫酸鎂 半匁至一匁半 水 四匁 護謨漿 半匁

右溶和、為射注劑

○方 愈 瘕性子宮出血

阿芙蓉 一匁至二匁 鷄子黃 二個 桂水 四匁

右調勻、為灌腸劑

子宮加答流 即白帶下

○甘汞藥刺巴散 加答流初起 方出于腹水

○方 初期、兼子宮知覺敏捷者

甘扁桃油 二匁 護謨末 適 櫻實水 四匁

老利兔水 一匁 過爾托舍利別 半匁

右調勻、為乳劑、每二時服一匕

○拔爾撒骨泮舍利別 陰門粘液漏

亞刺比亞末 三匁 水 適宜、為粘

拔爾撒骨泮霍 一匁 單舍利別 十八

右調勻、每服一茶匕、日四次

○方 愈 主治白帶下

拔爾撒骨泮霍 半匁 的列並油 一匁

香窠丁幾 二匁 斯巴尼酒 二匁

右調勻、每服一茶匕、日三次

○方 白帶下

的列並油 一匁 葛斯加栗越幾 二匁

大黃末 適宜

右二匁為一丸、木桂末、每服五丸、至十九、一

日三次

○方 劑 虛性白帶下
華澄茄末 半斤至 一斗 蜂蜜 適宜

右為 抵劑、每服一卵匕、一日三四次
○方 選 主治同前

阿仙藥末 明礬 各二 竜胆越幾 宜 適

右二八為一丸、衣桂末、每三時服四丸
○方 宜 主治同前

葛斯加栗刺末 二 大黃末
沒藥末 各一 蒲公英越幾 適宜

右二八為一丸、每服五丸、至八丸、日三四次
○方 選 虛性粘液漏 即白帶下

遠志根末 刺答尼亞末 各一
炭酸麻屈涅失亞 二 酒石英 三 匙

右為散、每服一卵匕、日三四次
○方 勿 惡液家白帶下

鐵粉 半 健質亞那末 或格倫僕末 四 刃

大黃末 桂末 各一 亞爾鮮越幾 適 宜

○方 宜 白帶下、自他虛性婦人病
硫酸鐵 半 匙 沒藥 一 匙

睡菜越幾 二 匙 薄荷油 四 滴

右二八為一丸、每服五丸至八丸、日三次
○方 宜 主治同前

硫酸鐵 吉納 各一 匙半
的列並底那 健質亞那越幾 各三 匙

右二八為一丸、衣桂末、每服十九丸、日四次
○方 宜 主治同前

龍腦 硫酸鐵 硫酸規尼 各一 匙
亞爾鮮越幾 二 刃 拔爾撒亭露 適 宜

右為三十丸、衣桂末、每服二三丸、日二三次

○方 遷延虛性白帶下

沃度鐵 二八三八 桂末 或府利油糖 六八

右為散製劑六個每服一劑日二三次

○沃實丁幾 二匙 頑固白帶下

右每服八滴至十五滴日二次

○方 主治同前

沃實謨 一八 沃度加里 三 薄荷水 四

右溶和每服一匕日二三次

○沃度加里合劑 每 慢性白帶下 方出痛風 風濕狼瘡

○光普丁幾 半了 主治同前

右每服三十滴糖水和服日三次

○綠沃頰劑 每 慢性子宮加答流 方出狼瘡 及微毒

○赤沃頰劑 每 主治同前 方出狼瘡 及慢性風濕

○度諾漢氏三重水 每 主治同前 方出于 狼瘡

○昇頰飲 每 主治同前及子宮淤衝 方出于 梅毒

○酸性幾那合劑 每 帶下膠多者 方出于 紫斑病

○方 主治白帶下及腔粘漏

鉛糖 一匙至二匙 水 十六号

右調勻注射于腔內

○方 主治白帶下

鉛糖 二刀 蒸餾水 四号

阿芙蓉丁幾 二匙

右調和為注射劑

○方 主治粘液漏

明礬 一匙 水 十二号

右溶和為注射劑或蘸撒系入腔內

○明礬末 一匙 頑固腔漏

右取撒系球塗脂油撒此末納腔內

○方 主治腔及膀胱粘液漏

過滿俺酸加里 二 蒸餾水 一号

右調勻注射

○石炭酸水（務） 白帶下方出于

○方 頑固白帶下

結列阿曹篤十二 蒸餾水六

右調勻射注于子宮日二次

○方（宋） 慢性白帶下

皓禁半 泉水二

右溶和為射注射劑

○方 虛性白帶下

腐蝕加里半 阿芙蓉四 水十至

右溶和為射注射劑

○收斂注射方（丹） 婦人麻疾

格羅免亞鉛十六 水三

右調勻取一茶匕和微溫水一巴為射注射劑

○方（捷）

硝酸銀晶一至二 蒸餾水三

右調勻為射注射劑

○方（德） 主治白帶下

硫酸鐵一 蒸餾水四或

阿芙蓉丁幾半

右調勻為注射劑

○方（法）

鹽酸鏡液一至二 蒸餾水四

右調勻為射注射劑

○方（荷）

單寧酸一至二 泉水三

右調勻為射注射劑

○方（獨） 主治粘液漏及肛門瘻

單寧一 甘油一

右為擦劑

○雙礬注入劑 帶下、淋疾

皓礬 枯礬 各一 單寧酸 二

右研和取一茶匕和水一已為射注劑

○腔注入劑 帶下、養子宮口、或腔刺銜者

五醋酸鉛水 六 嬰粟殼越幾 二

右調勻取一大匕和微溫水一已為射注劑

○石灰水 八 白帶下

右為射注劑

○方 白帶下

鹽酸加爾基 半 至 蒸餾水 六

右溶和為射注劑日二三次

○搨皮 一 主治白帶下或痔疾

右水煎取液八或一匕射注日數次

○方 虛性白帶下

水揚皮 一 野菊花 一 沒藥水 一

右先取前一味以水十六 煮減半加次味

浸出令終味為射注劑

○方 婦人粘液漏後期

硝酸 一 至 泉水 一 匕

右調勻為射注劑

○方 虛性白帶下

蓬砂 一 至 蒸餾水 六

右溶和為射注劑

○方 白帶下

椰子酪 一 拔爾撒骨洋霍

華澄茄末 各半 阿片越幾 四分 一

右調和製劑四個取一劑插入日二次

○子宮抽藥 子宮加答流

水銀軟膏 椰子油 各二 葭苈越幾 二十

右調和分八個為抽藥

○鉛糖柿藥 慢性帶下 方出于陰門 焮衝

○麻藥灌腸方 子宮焮衝 方出于直腸 瘰

○阿片坐藥 主治同前 方出于直腸 瘰

○沃度鉛柿藥 子宮加答流 方出于陰瘰

子宮焮衝

○方 急性子宮焮衝

白罌粟子 半錢加櫻實水適 硝石

老利兒水 各一錢 白糖 半錢

右調勻、每一時、或每二時、服一匕

○方 同症無神經系敏銳者

炭酸加里 二錢加枸櫞 櫻實水 四錢

老利兒水 一錢至 覆盆子舍利別 一錢

右調勻、每二時服一食匕

○沸騰散 同症無惡心及嘔吐者

酒石酸 三分 炭酸曹達 四分 白糖 七分

右為散、每一時、取一茶匕、投冷水、乘沸騰服

○方 子宮焮衝、兼便秘者

答麻林度 二錢水煎取 孕蓬酒石 一錢

右調勻、每二時、服一食匕

○甘汞下劑 主治同前 方出于腦 焮衝

甘汞 二錢 阿芙蓉 一分 白糖 一錢

右為散、製劑六個、每服一劑、日三四次

○方 子宮焮衝、因蒸氣閉塞者

吐酒石 一錢 接骨木花水 四錢 蜂蜜 半錢

右調勻、每一時、或每二時、服一食匕

○方 主治同前

吐酒石 一錢 阿芙蓉 一錢 接骨木花水 四錢

右調勻、每一時、或每二時、服一食匕

民埤列里精字二 蜀葵舍利別一
右調勻用法如前

○方 儂麻質性子宮焮衝

阿芙蓉末 吐根末各二 白糖四

右為散分八服每日四回一服

○方 產後子宮焮衝煩渴者

鹽酸半 水四

右調勻每半時服一食匕

○方 主治釀膿焮衝

格羅兒水三 舍利別六

右調勻每二時服一匕

○方 主治慢性子宮焮衝

甘汞八 失鳩答越幾四 甘草膏適

右為九十六丸每服三丸至四丸日三次

○方 主治同前

甘汞六 莨菪越幾三 乳糖一

右為散分六服朝夕各一服

○方 慢性子宮炎及子宮硬結

硝砂 石鹼各二 失鳩答越幾一

大黃末二 金硫黃一

右二丸為一丸衣挂末每服五丸日三次

○方 子宮硬結及釀膿焮衝

沃度加里一 水二 嬰粟舍利別二

右調勻每服一食匕一日四次

○方 子宮軟緩者

末爾秩私鎮痛液一 桂皮水六

右調勻每三時或四時服一匕

○番木鱉丸 慢性子宮炎無便秘者方出于便秘

○方 子宮焮衝無腹痛及瘵瘵者

野菊花半 失鳩答葉二 熱湯八

右調和為菴法

○方 主治同前

菲阿斯葉 蜀葵葉 罌粟殼 各一

右加泉水四升、煮取三升、為溫蒸湯劑

方 主治子宮硬結

沃度加里 一刃至 蠟軟膏 一刃

右調和朝夕塗擦

○方 主治同前

葶藶越幾 一刃至 水銀軟膏 半刃

右混和攤軟革貼于患部

○方 主治同前

失鳩答硬膏 七匙 葶藶葉末 一匙

右煉和為硬膏

○方 慢性子宮炎

葶藶葉 一匙、沸湯適宜 老利兒水 三匙至半刃

浸出、取液二升

右調勻為射注劑

○方 子宮焮衝、疼痛劇甚者

亞麻仁 半刃、加水十刃、亞麻仁油 一刃

煮取液五刃、含電阿芙蓉液 二十滴至

右調勻為灌腸劑

子宮水腫

○方 子宮水腫、不夾妊娠者

麥奴 白糖 各半刃

右為散、製劑六個、每一時服一劑

○方 主治同前

蓬砂 五刃至 白糖 半刃

十五刃 右為散、製劑八個、每一時服一劑

○方 主治同前

實芟答利葉 甘草 各四刃 白糖 四刃

至八刃

右為散分八包每三四時服一包

○方 主治同前

實芙蓉利葉 一分 菖蒲根 三分

右注沸湯適宜浸出取液五勺加後味

孕蓬酒石 半勺 杜松實舍利別 一分

右調勻每二時服一食匕

○方 緩性利尿劑

炭酸加里 一匙加海葱 杜松子水 六勺

孕蓬酒石 三匙 甘硝石精 一匙 海葱醋蜜 一匙

右調勻振盪每二時服一匕

○方 補

杜松實 半勺至一勺注沸湯 適宜浸出取液八勺

甘硝石精 一匙或越的 海葱醋蜜 半勺

右調勻每二時服一二食匕

○方 須

醋酸加里 二匙 杜松實精 半勺

右溶和每服四十滴至八十滴日四次

○方 痰

杜松實油 半匙 甘硝石精

實芙蓉利丁幾 各三匙

右調勻每二三時服二十滴至三十滴

○方 痰

遠志末 二匙 礞砂 半匙 金硫黃 半匙

海葱末 十五匙 蒲公英越幾 適宜

右二公為一九每服五丸至八九日三次

○方 痰

消石英 一匙 蓬砂 一匙

洋芹水 六勺 海葱醋蜜 二勺

右調勻每一時服一匕

○方

甘汞 蘆薈越幾 各四 白糖 二錢

右為散分十二服每日三四一服

○露其爾氏沃實溶劑 遷延水腫

沃實謨 四分八三、一 沃度加里 一八半、二八、
至一八半 蒸餾水 三錢

右溶和一日服三分之二後服全量

○的列並油 一錢

右朝夕塗擦于足蹠

○方劑

石腦油 一錢半

鎮痙軟膏 一錢

右混和塗擦于腰部

子宮氣腫

○方劑 子宮口痙性閉鎖者

黃岩越幾 十二八

玫瑰軟膏 半錢

右調和為擦入劑

○方 子宮氣腫因全身及局處虛衰者

拔爾撒骨泮霍 一錢 野菊花越幾 二錢

幾那末 適宜

右為百二十九丸每服八九日三次

○方劑 主治同前

沒藥紙劑 三錢

硫酸鐵 一錢

水製阿片越幾 半錢

幾那末 適宜

右二八為一丸衣桂末每服五丸日四次

○麥奴散

子宮氣腫

方出于子宮水腫

○蓬砂散

主治同前

方出于子宮水腫

子宮瘦瘤及肥厚

○昇汞丸 丹 子宮肉瘤 方出于慢性風濕

○沒食酸水 丹 主治同 方出于紫斑病

○酸化銀丸 丹 主治同前 方出于肺勞

○鐵礬水 丹 主治同前 方出于咯血

○溴素加里散 丹 子宮肉瘤、有疼痛者 瘡瘡木末 四十五 溴素加里 三十五

炭酸麻偏涅失 六十

右為散、分六包、每服一包、護謨漿、乳酥或蜂蜜和服、一日三次

○方 物 子宮肥厚

沃度鐵 一 韋 蒲魯謨曹達 半 甘草膏 適

右二人為一丸、衣桂末、朝夕服一丸、至三丸

○方 物 主治同前

溴素鐵 一 韋 甘草膏 適宜 右為六十九丸、衣桂末、朝夕服一丸、至二九

○彫爾列兒神効丸 子宮肥厚、月經閉止

蘆薈 半 遠志末 二 瓦爾拔扭謨

阿魏 各一 沒藥 各一 硫酸鐵 六 韋

洎夫藍 乳香 各半 琥珀油 四十 滴

亞爾鮮糖煉 適宜 右二人為一丸、每夜或隔服一丸

○方 匱 主治子宮肥厚

格羅兒沃實汞 六 家猪脂 一 韋 右為軟膏、塗撒糸、挿入

子宮痛及潰瘍

○方 匱 子宮及乳房硬癭

甘汞 六 失樞答越幾 半 韋

非阿斯越幾 一 韋 大黃末 半 韋

右二八為一丸、衣石松末、每三時服一丸

○沃實丁幾二匙

右朝夕取二十滴、薄荷水、或橙皮舍利別和服

○方迷子宮硬瘕

沃度加里半匙 橙皮水六分

右溶和每服一食匕、日三四次

○方 主治同前

沃度鐵一匙 甘草膏適宜

右為六十九、朝夕服二丸、至四丸

○方不硬痛性硬結

沃鐵舍利別二匙至半 水六分 舍利別半

右調勻、每服一食匕、日四次

○幾那安汝尼劑丹子宮癌方出于

○酸性幾那合劑丹主治同前方出于

○規尼莨菪劑丹主治同前方出于

○規尼大黃丸丹子宮潰瘍、兼胃弱者方出于

○規尼合劑丹子宮潰瘍、或子宮癌、兼全身衰

弱者方出于

○撒里失涅劑丹主治同前方出于

○規尼砒石劑丹子宮潰瘍方出于

○砒石劑丹主治同前方出于

○皓礬丸丹子宮癌方出于

○肝油丹主治同前方出于

○磷酸安汝尼飲丹主治同前方出于

○莫非呀囉叻大麻合劑丹劇痛者方出于

○吐根大黃酸化銀丸丹主治同前方出于

○硝塩酸合劑丹子宮潰瘍方出于

○方補子宮癌、疼痛劇甚者

遇爾托根煎六分 青酸三十滴

右調勻、為射注劑

右二丸為一丸、衣石松末、每三時服一丸

○沃實丁幾二錢

右朝夕取二十滴、薄荷水、或橙皮舍利別、和服

○方逐子宮硬瘕

沃度加里半錢 橙皮水六分

右溶和、每服一食匕、日三四次

○方 主治同前

沃度鐵一錢 甘草膏適宜

右為六十九、朝夕服二丸、至四丸

○方逐硬瘕性硬結

沃鐵舍利別二錢至半錢 水六分 舍利別半錢

右調勻、每服一食匕、日四次

○幾那安沒尼劑丹 子宮瘕方出于癰疽

○酸性幾那合劑丹 主治同前方出于腫瘍

○規尼莨菪劑丹 主治同前方出于慢性風濕

○規尼大黃丸丹 子宮潰瘍、兼胃弱者方出于脾病

○規尼合劑丹 子宮潰瘍、或子宮癌、兼全身衰弱者方出于紫斑病

○撒里失涅劑丹 主治同前方出于間歇熱

○規尼砒石劑丹 子宮潰瘍方出于神經痛

○砒石劑丹 主治同前方出于癩病

○皓礬丸丹 子宮瘕方出于慢性氣管支炎

○肝油丹 主治同前方出于失聲

○磷酸安沒尼飲丹 主治同前方出于依上昆塔兒

○莫非呀囉方大蘇合劑丹 劇痛者方出于癩症

○吐根大黃酸化銀丸丹 主治同前方出于神經痛

○硝塩酸合劑丹 子宮潰瘍方出于消化不良

○方補 子宮癌、疼痛劇甚者

過爾托根煎六分 青酸三十滴

右調勻、為射注劑

○方 主治同前

醋酸莫非 水銀軟膏 單軟膏 各二

右研和取豌豆大塗擦于陰部日二次

○莫非注入法 主治同前 方出于神經痛

○方 子宮癌有出血者

皓礬 半号 水 十五号 吉納丁幾 一号

右溶和為射注劑

○方 主治同前

硫酸鐵 半号 幾那末 十六号

右調勻為射注劑

○方 子宮癌疼痛甚者

阿片越幾 半号 或舍電阿 亞麻仁煎 六

右調勻為灌腸劑

○方 主治同前

莨菪越幾 四八至 家猪脂 三号

右揀和塗撒系插入于腔內

○方 子宮癌

醋酸鐵 半号 泉水 八号

右溶和為蒸溺劑

○普欽幾氏溶水 主治子宮癌

昇汞 一号 龍腦 半号 亞爾箇兒 一号

右調勻

○腺麻兒潔氏滿掩水 主治子宮癌

過滿掩酸加里 五分乃至 蒸餾水 百分

右調勻外用

○方 子宮潰瘍

鈴糖 半号 蒸餾水 八 老利兒水 三

右調勻為射注劑

○方 主治同前

甘汞 半号 家猪脂 一号

右混和外用

○方冊 主治子宮癌腫

沃實謨五 沃度加里十五 蒸餾水二

右溶和和亞麻仁温煎八倍注射于腔內

○方匱 主治子宮癌腫

明礬二 蜀葵根煎一

舍電阿芙蓉液六滴

右調勻為射注劑

○方匱 主治子宮癌腫惡臭甚者

鹽酸加爾基二 常水二 老利兒水二

右調勻為射注劑

○方匱

硝酸銀半 至 蒸餾水二 或

右溶和以毛筆貼于患部

○方匱 子宮頸惡性潰瘍

結列阿曹篤一 水一

右調勻為射注劑

○方匱 子宮癌無出血者

鹽酸鐵液半 水一

右調勻為射注劑

○方匱 主治子宮癌

阿芙蓉越幾一 護謨漿一 水五

右為射注劑

○腔抽藥冊 子宮潰瘍兼疼痛者

水銀軟膏八十 至 椰子油一

葇苔越幾三十 或夫旭 橄欖油二

右混和分八箇

○又方 子宮癌或子宮病兼疼痛者

沃度叻八十 椰子油一 甘油二

右調和分八個

○腔注入劑再 子宮癌、有出血者

響粟殼越幾半 黃岩丁幾四

右調勻、取二茶匕、加重麻仁煎一已、注入

○沃度鉛棟藥再 子宮癌方出于陰

○鉛糖棟藥再 主治同前方出于陰

○亞鉛莖若棟藥再 子宮潰瘍及癌方出于陰

○阿片坐藥再 子宮癌方出于直腸

○雙礬注入劑再 子宮癌及潰瘍方出于子宮

○腔注入劑再 子宮潰瘍方出于子宮

○滿掩棟藥再 子宮潰瘍、兼疼痛、漏液惡臭者

過酸滿掩加里四 雙鸞菊越幾十二

阿片越幾十六 椰子油一

右調勻、分八個、每夜用一個

○沃度加里棟藥再 子宮潰瘍、子宮唇硬腫

沃度加里四十 失樞答越幾百二

椰子油一 橄欖油二

右調勻、分八個、每夜施一個

○方再 劇惡性子宮癌

銀朱 血竭各十六

砒酸 鹽酸重鉛各三

右調和、為腐蝕藥

子宮脫及腔脫

○酸性幾那合劑再 子宮脫方出于關節病

○規尼鐵劑再 主治同前方出于心

○規尼鐵劑再 腔脫方出于紫斑病

○鐵油質劑再 子宮脫方出于實

○燐酸亞鉛劑再 腔脫方出于頭痛

○硝塩酸合劑再 子宮轉位方出于依

○番木鱉丸 再 腫脫 方出于便秘

○方 再 內陰弛緩、因分娩多數者

薩昆那葉 二錢至四錢、浸出液六錢 橙皮舍利別 一

右調勻、朝夕各服一食匕

○方 子宮翻轉、復入後、進收縮、防再發

蓬砂 四錢至六錢 白糖 半刀

右為散製劑八個、每半時、或每一時、服一劑

○方 主治同前

麥奴 一匙 阿芙蓉 二錢

右為散、分六包、每二時服一包

○收斂、抽藥 腫脫、子宮脫

單寧酸 百二十 阿仙藥 六十八

椰子油 二錢 橄欖油 二匙

右調和、分八個、取一個、挿入、日二次

○收斂注射劑 再 腫脫、子宮脫 方出于陰門、收斂

○雙礬注入劑 再 主治同前 方出于子宮、加答泥

○蓖麻的列並灌腸方 再 腫脫 方出于尿毒症

○方 腫脫

槲皮 一錢、水煎取液九錢 明礬 一錢、至二錢

右調勻、注射于腔內、又蘸海綿、送入

○方 再 腔弛緩、腫脫、及白帶下

刺答尼根 十錢、以泉水三升、煮減為一升、刺答尼越幾 半

阿仙藥丁幾 各一匙、半 吉納丁幾 各一匙、半

右調勻、外用

卵巢病

○方 再 卵巢收斂

甘朮 六錢 阿芙蓉 三錢、至四錢 白糖 一匙

右為散、分六服、每日三服、至四服

○方 瘰癧候減退、癰癧尚存者

亞鉛華

河狸香

各六

白糖 一錢

右為散、分六包、每服一包、日三四次

○方 卵巢炎、釀膿者

葛刺賢苔

一錢半、以水一

北煎取液五錢

白糖 一錢

老利兒水 一刃

右調勻、每服一卵已、一日盡之

○方 卵巢硬結

硃砂 一錢

吐酒石 一錢

甘草膏 三錢

蒲公英煎 一錢

右調勻、每半時服一

○方 主治同前

炭酸曹達 一錢、至

二錢

蒸餾水 四錢

右溶和、取一食匕、芳香水和服、日三四次

○方 沃度加里合劑

慢性卵巢炎、方出于痛風

○方 卵巢水腫

沃度加里 一錢

蒸餾水 一錢

右溶和、每服十五滴、漸加至四十五滴、日三次

○方 主治同前

沃度加里 一錢

水 四錢

橙皮舍利別 一錢

右調勻、每服一匕、日三四次

○方 主治同前

酒石塩 一錢

海葱醋 二錢

枸橼汁 適宜、飽和為度

枸橼舍利別

橙花水 各一錢

右調勻、每一二時服一食匕

○方 沃度鉛搽藥

慢性卵巢炎、方出于陰

○方 鉛糖搽藥

急性卵巢炎、方出于陰

○方 慢性卵巢炎

水銀軟膏

硃砂揮發膏 各一錢

右調勻、擦入、日二次

○方 卵巢硬結

水銀軟膏 二錢

沃實謨 三錢

右混和取一茶匙擦入日三四次

○方 卵巢水腫

水銀軟膏 二錢

阿芙蓉 十錢

右調勻塗擦腹部日二次至四次

○方 主治同前

沃度加里

純沃實謨 各一錢

甘油 二錢

右調勻以毛筆塗擦腹部

花風

○方 狂亂甚者

吐酒石 二錢至三錢

蒸餾水 六錢

白罌粟舍利別 半錢

右調勻每二時服一匕

○方 龍腦

龍腦 半錢

白糖

護謨漿 各一錢

醋 一錢

接骨木花水 六錢

聚春花舍利別 一錢

右調勻每二時服一匕

○方 羌普丁幾 浮半錢

右每服十滴大麥水和服日三次

○方 鍊屑 四錢

鍊屑 四錢

健質亞那末

大黃末 各四錢

亞爾鮮越幾 適宜

右二錢為一丸每服五丸至十五丸日三次

○方 主治陰慾妄動遺精花風

澳素加里 半錢至一錢

淨水 三錢

右調勻一日三次分服

○方 選

老利兒水

羅獨窠篤兒

醋 各二勺

玫瑰水 四勺

右調勻、洗滌陰部、或罨貼

○方

接骨木花

野菊花 各二勺

龍腦 二刀、至

右裝布袋、令帶膝邊

○方

硝酸銀 四勺

蒸餾水 一勺

右溶和、外用

乳房焮衝

○方 冒寒後丹毒狀焮衝

民理列里精

橙花舍利別 各半

菩提樹花水 四勺

右調勻、每二時、服一食匕

○方 乳房焮衝、兼腸胃症者

硝砂

甘草膏 各一

吐酒石 一入

加密列水 六勺

右調勻、每二時、服一匕

○方 乳房炎、自情意感動、來者

吐酒石 一入

加密列水 二勺

吐根末 半

海葱醋蜜 屋施茂兒 各半

右調勻、每十分、服一匕、至得吐

○方 丹毒性乳房焮衝

接骨木花

野菊花 各一

捲埕兒 半勺

右調和、為乾屨法

○方 乳房腫脹、因乳汁鬱積者

硝砂 一匙

迷迭香精 一匙

右溶和、蘸布片、置于患部

○方 乳房腫痛

荈若越幾一 老利免水一 越的兒一

右溶和塗擦于乳房日二次

○方 鯨腦膏一 乳汁鬱積腫

鯨腦 白蠟 甘扁桃油 各二分

右煉和為白膏

○方 乳房淤衝後貽硬結者

失鳩答膏 菲阿斯膏

水銀膏各二 密陀膏一

右煉和攤軟革貼于乳房

○方 訶烟列兒氏安汶尼琴布 乳房腫方出 腺出 衝

○方 乳房硬腫

鯨腦膏一 龍腦半 刀

右揀和貼于乳房

○方 乳房腫痛

失鳩答越幾半 非阿斯越幾二 荈若葉末半 民埕列里精適 宜

右為硬膏攤軟革貼于患部

乳汁缺乏及過溢

○羅仙斯的印氏湧乳散 乳汁分泌減乏

炭酸麻佛涅失亞 橙皮末 茴香末 白糖 各半分

右為散每服一茶匕日三四次

○方 主治同前

睡菜越幾二 大黃丁幾二 薄荷水三

右調勻每服一食匕日四次

○方 乳汁過溢

孕礬酒石半 水六 覆盆子舍利別一

右調勻、每服二食匕、日四次

○方 補 減却乳汁分泌

酒石葉晶 五錢

龍腦

硝石 各二

接骨木花侏列乙 適宜

右為百二十九丸、朝夕各服二丸

○方 乳汁過溢

失鳩答越幾 一八

乳糖 一刃

右為散、製劑十二個、每三時服一劑

○方 主治同前

甘汞 六分

非阿斯越幾 一刃

失鳩答越幾 一刃

大黃末 半錢

右為三十丸、每服二丸、日二次

○方 主治同前

龍腦 一八

河狸香 四八

白糖 一刃

右為散、製劑十二個、每服一劑、日三四次

○方 乳汁過溢、兼黃胖症者

沒藥 一錢

硫酸銹 二刃

括夫亞末 四刃

幾那越幾 適宜

右二八為一丸、每服四丸、至八丸、日三次

○方 乳汁過溢

莨菪越幾 百二十分、至

二百四十分

甘油 一刃

右調勻、塗擦于乳房

○方 主治同前

菲阿斯羔 一

失鳩答羔

加密列油 各半

右煉和貼于乳房

乳癌 可參考
癌腫條

○方 乳癌硬結

沃度加里 半錢

家猪脂 一兩半

右為軟膏、外用

○方、乳癰、翻花

單寧 二錢

蒸餾水 二錢

右溶和、外用

○方 瘰癧潰爛

青酸鐵 一錢

鯨腦 一錢

右調勻、外用

○方 翻花瘰癧、分泌酷厲、有惡臭者

鹽酸加爾基 一錢至二錢 泉水 八錢

右溶和、瀝過、外用

○方 瘰癧、乾燥者

鹽酸加爾基 二錢 家猪脂 半錢

右為軟膏、外用

○方 乳癰

白砒石 八錢 野菊花水 十錢 老利兒水 二錢

右溶和、外用

○方 乳房癰腫

白砒石 硫黃華 各一錢

蒸餾醋 單軟膏 各一錢

右為軟膏、外用、不宜久日連用

○虞刺弗氏昇汞軟膏 海綿狀瘰癧

昇汞 二錢 護謨末 蒸餾水 各一錢

右為軟膏、外用

乳頭症

○方 乳頭剝脫

羊脂 鯨腦 白蠟 各二錢 扁桃油 六錢

右調和、塗擦

○方 乳頭痛

哥羅叻 一匙 家猪脂 或單軟膏 一匙

右調和塗擦

○方 匱 主治同前

蓬砂 一匙 蒸餾水 三 銳烈燒酒 半匙 或 去之

右調勻為外用劑

○方 匱 主治同前

蓬砂 一匙 拔爾撒字露 一匙 扁桃油 一

鷄子黃 鷄子白 各二匙 至三匙

右調勻塗撒系貼于乳頭

○方 匱 主治同前

石灰水 扁桃油 各三 阿片越幾 一

右調和塗擦于乳頭

○方 匱 主治同前

鉛糖 二八 鷄卵油 一刃

拔爾撒字露 十五 蠟軟膏 一匙

右為搽劑 蘸布片貼之 日數次

○方 匱 主治同前

石松子 亞鉛華 各一 蠟軟膏 六

右為軟膏外用

○方 匱 主治同前

皓礬 六八 玫瑰水 半匙

右溶和蘸布片貼于乳頭

○方 匱 乳頭剝脫

明礬 一刃 至 亞刺比亞末 半匙

右為撒布藥

○方 匱 乳頭痛

拔爾撒字露 半匙 椰子酪 二匙

右調和塗軟布片貼于乳頭

○方 匱 乳頭痛

拔爾撒字露 一匙 甘扁桃油 一匙

亞刺比亞末 二錢 玫瑰水 一斗

右為乳劑、振盞塗乳頭、日六次

○方 乳頭痛

拔爾撒字露 一匙 銳烈燒酒 一斗

右調勻、外用

○方 主治乳頭破裂

刺答尼越幾 一匙 鷄子白 適宜

右攪和、貼患部

○方 主治同前

昇汞 二錢、至 三錢 蒸餾水 一斗

右溶和、蘸撒系、貼于患部

○方 乳頭發疹、無搔痒者

白降汞 半錢、至 一錢 家猪脂 一斗

右為軟膏、外用

○方 乳頭痛

硝酸銀晶 一錢、至 二錢 蒸餾水 一斗

右溶和、蘸布片、或撒系、附貼

○方 乳頭疹

沈澱硫黃 一匙 玫瑰水 四斗 安息香丁幾 一

右調勻、為洗劑

小產

○方 預防小產、因血管系動機亢盛者

酸味越栗失爾 一斗、至 半斗 覆盆子水 六

覆盆子舍利別 一斗

右調勻、每二時、服一匕

○方 預防痙性天資之半產

吐根 半斗、至 二斗 白糖 二斗

右為散分、四服、每一時、一服

○方 治實性子宮充血、預防半產

河裡香十八 硝石半匙至一匙 白糖一匙
右為散分六服每三時一服

○方勿預防小產

阿芙蓉一 硝石十二 白糖二

右為散分四服每四分時或半時一服

○方迷小產預防劑

末爾扶斯鎮痛液一 酒製桂水六

右調勻每夜服一匕

○方劑神經虛衰而欲發崩漏者

硫酸規尼十五至 磷酸

珊篤里越幾各二 蜀葵根末四

右為六十九丸每服三四丸至六丸日二三次

○方瀉小產原于子宮系虛衰者

薩昆那葉一匙二匙至四匙 橙皮舍利別一

右調勻朝夕五時服一匕

○方瀉小產因子宮衰弱及其刺衝過敏者

薩昆那葉半 麥奴二

右注沸湯六字浸出取液加橙皮舍利別一

字每二時服一匕

○方瀉小產因子宮虛脫者

薩昆那葉三注沸湯六三 光菁丁幾六

橙皮舍利別一

右調勻每二時服一匕

○方 死胎慣癖

葭苈葉 大黃 各五

右為散隔夜臨卧服一劑

○實斐谷利葉半預防墮胎

右浸出取液八字為一日之量

○莫非注射法丹預防墮胎

產前症

○方 陣痛過強

阿芙蓉 半斤

硝石 五斤至八斤

右為散、製劑四個、每半時、或一時、服一劑

○方 主治假陣痛

吐根末 二斤至四斤

白糖 二斤

右為散、分四服、每一時、一服

○方 劇甚痙性陣痛

阿芙蓉 二斤

吐根 一斤

白糖 八斤

右為散、分八服、每半時一服、加密列浸、送下

○方 陣痛不及

蓬砂 十五斤至二十斤

硝石 四斤至五斤

茴香油糖 十八斤

右為散、製劑八個、每一時半、服一劑

○方 主治虛性子宮痛、及陣痛不全

麥奴末 一斗至四斗

薄荷油糖 半斗或白糖 二斗

右為散、分四服、每四分時、或每半時一服

○方 主治同前

麥奴末 十斤

蓬砂 八斤

桂皮末 四斤

野菊花油糖 六斤

右為散、製劑六個、每四分時、服一劑

○方 主治同前

麥奴 一斗、水煎取液六斗

覆盆子舍利別 半斗

右調勻、半時間、服盡

○催生方

麥奴 三斗

桂皮 一斗

硫酸越的兒 一斗

薄荷油糖 半斗

右先取前二味、注熱湯適宜浸出、瀝過取液

四斗、加後二味、每半時、服一食匕

○方 主治催生

麥奴 二錢 浸出 取液五錢 麥奴末 二錢

桂皮水 醋酸越的兒 各一錢

右調勻、振盪每四分時服二食匕

○方 寫

越爾吳知涅 即麥奴越幾 半錢 亞刺比亞漿

單舍利別 各半 櫻實水 五錢

右調勻、每一時、或二時、服一食匕

○方 越 主治同前

流動麥奴越幾 十滴至二十滴 水 一錢

右調勻、每四分時、服一劑

○方 越 主治同前

麥奴丁幾 二十滴至三十滴 水 一錢

右調勻、每四分時、服一劑

○方 越 子宮弛弱、而分娩遲慢者

赤幾那皮 纈草根 各二錢

右以泉水適宜、煮取液六錢、加後味

硫酸越的兒 二錢 桂丁幾 一錢

右調勻、每一時、或二時、服一匕、至一匕半

○方 寫 分娩遲滯、因子宮口痙性收縮者

菘若越幾 十二錢 玫瑰軟膏 半錢

右調和、每半時、取豆大塗擦于子宮口

產後症

○方 寫 主治兜枕痛

河狸香 三錢 纈草末 白糖 各一錢

右為散、製劑四個、每服一劑、日二次

○方 主治同前

河狸香丁幾 一錢 阿芙蓉丁幾 半錢

右調勻、每半時、或每二時、服十五滴

○方 主治同前

阿芙蓉丁幾二十
甘硝石精一匙
橙花水 六分

右調勻、每二時、服一匕

○方 劇性免枕痛

甘扁桃油 新推者 泉水 三分
護謨漿 宜適

非阿斯越幾 八分 扁桃舍利別 半分

右調勻、每一時、服二食匕

○扁桃劑 產後內藏痙攣 方出于 痢疾

○方 惡露過滿

硝酸銀 一分、蒸餾水 少許、溶解 甘草末 半分

右為十二丸、每一時、服一丸

○方 惡露閉止

加密列 六分 睡菜

桂枝 各二分 迷栗薩 半分

右調合取一匕、以水一瓶、浸出半時、後瀝過、取液、每一時、服一碗

毒熱

○方 預防毒熱

疏肝 半分 水 六分 覆盆子舍利別 一分

右調勻、每服二食匕、日四次

○方 毒內感冒

民埜列里精 六分 接骨木花水 五分

吐根舍利別 一分

右調勻、每一時、服一匕

○方 毒熱初起

炭酸加里 半分 蒸餾水 四分

枸橼絞汁 適宜、飽和為度 橙花舍利別 半分

右調勻、每一時、或半時、服一匕

○方 護 主治同前

酸味越栗失爾一匙 舍電阿芙蓉液半匙

右調勻、每三時、服十五滴、至二十五滴

○方 迷 葶熱、夾內藏炎証者

甘扁桃油三匙 護謨末一匙 櫻實水四匙

老利兜水一匙 扁桃舍利別半匙

右調勻、為乳劑、每二時、服一匕

○方 悉 葶熱初期

磷酸曹達半字 嬰粟乳劑或扁桃乳劑六字

梅那舍利別一字

右調勻、每一時、服一匕

○方 宜 主治葶熱

甘汞十八 白糖一匙

右為散、分五服、每二時、一服

○方 驗 葶熱

甘汞四八 阿芙蓉二八 白糖一匙

右為散、分八服、每二時、一服

○方 悉 多血家葶熱

甘汞二八至三八 大黃末八八、或葶刺末十八

右為散、製劑六個、每三時、服一劑

○方 葶熱

甘汞 菲阿斯越幾 阿芙蓉各十

右為十二丸、每四時、服四丸

○方 神經性葶熱

甘汞四八至六八 龍腦一八至三八、或麝香六八、至十二八

白糖或護謨末一匙

右為散、分六服、每二時、一服

○方 驗 葶熱、夾腦炎症者

硝石二匙 吐酒石二八

附定方選 卷之四

五十四 1115

萬世越幾或菲阿斯越幾 嬰粟乳劑 六分

右調勻，每二時服一匕。

○方 葶熱有滲出之候者

遠志 一匙半，至二匙

實艾答利葉 一刃，至半匙

右先取遠志，以水十勺煮為六勺，加後味浸出，加蜀葵舍利別六匙，每二時服一匕。

○方 腹痛劇甚，他藥無效者

阿芙蓉 二尺至四尺 白糖 二刃

右為散，分四包，每服一包，日二次。

○方 翹 主治同前

莫爾非 一尺 白糖 一匙

右為散，分六服，每三時一服。

○老利兒水 一勺 葶熱夾腦症者

右每服四十滴，至五十滴，日四次。

○方 刺衝性葶熱

葶熱越幾 八尺至四尺 白糖 四刃

右為散，分八服，每二時一服。

○方 飛 葶熱

雙鸞菊丁幾 一匙 水 四勺 白糖 半勺

右調勻，取一匕，飲液和服，二十四時間盡。

○方 神經性葶熱

龍腦 三尺 炭酸安汶尼 十八尺 白糖 一匙

右為散，分六服，每二三時一服。

○方 葶熱

的列並油 半勺 鷄子黃 一個，或護膜末半勺

薄荷舍利別 橙花水 或薄荷水，各二勺

右調勻，振盪，每二三時服一卵匕。

○方 馮 主治同前

的列並油 半勺，至一勺 鷄子黃 一個 嬰粟煎 八勺

右調勻，為灌腸劑。

○方 腹中生滲出液，肚腹緊滿者
水銀軟膏 二錢

右塗擦于全腹

○方 腹滿而有劇痛者
龍腦 一錢半

銳烈燒酒 三錢

右溶和塗擦于下腹

產婦白腫

○硝砂合劑 產婦白腫，血管填塞症
民埕列里精 二錢至四錢

硝砂 十五錢

蜀羊線浸劑 二錢

右調勻，每四時服一劑，每朝兼用純精酒石百二十錢至二百錢，水十錢溶解者

○方 主治瘀衝性白腫

硝石 二錢 菩提樹花水 六錢

蜀葵舍利別 一錢

右調勻，每二時服一劑

○方 主治同前

吐酒石 一錢 護謨末 一錢 水 四錢

橙花水 罌粟舍利別 各半錢

右調勻，每二時服一劑

○方 產婦白腫

甘草末 二錢 阿芙蓉 各六錢

右為散，分十二服，每三時或四時一服

○方 癆性白腫

白糖 二錢 實芟答利葉末 六錢

右為散，分十二服，每日四回，一服

○方 主治同前

實芟答利葉 半斤至二斤，浸出液六錢，蜀葵糖煉 半

右調勻、每二三時、服一匕

○方 痛性膝關白腫

沃質護一 沃度加里一 蒸餾水六

右溶和、每服四分劑一、日三四次

○方

水銀軟膏

菲阿斯油各半

實斐答利軟膏

右混和塗擦于患部

皮膚病

丹疹及蕁麻疹

○梅那敵劑 蕁麻疹

梅那葉末一匙半 純精酒石一匙

梅肉一匙半 單舍利別半匙

右攪和、每一時、服一茶匕、至二茶匕

○方 主治同前

硫酸曹達半匙 答麻林度或梅肉一匙

枸橼舍利別適量

右為紙劑、每一時、服二茶匕、至得下

○方 主治同前

磷酸曹達一匙 水四 櫻實舍利別一匙

右調勻、先服其半、後每一時、服一匕

○方 主治同前

梅那葉二匙 硫酸苦土六匙

右以沸湯二碗浸出每一時服半碗

○昆斯繆篤散 主治同前

○鍊安沒尼劑 主治同前 方出于貧血

○拘椽酸鍊安沒尼劑 主治同前 方出于貧血

○砒石劑 頑固尋麻丹毒

○鍊砒石劑 主治同前

○方 小兒剝脫丹毒

石灰水 二号 亞麻仁油 一号

右攪和塗布片或撒絲貼于患部

○方 主治諸般之皮病有癢者

炭酸曹達 二号 接骨木花水 七号

甘油 一号

右調勻為洗劑

○硫肝 小兒風疹

右為一浴之量五歲乃至十歲者用量

○方 凍冷丹毒

硝酸銀 十号 蒸餾水 一号

右溶和貼患部

○方 創傷性及流行性丹毒狀皮嫩衝

硝酸銀 一匙二匙 家猪脂 一号

右調和塗擦于患部日二三次

○方 主治同前

硝酸 半号 蒸餾水 三号

右調勻為卷法

○方 主治同前

阿芙蓉丁幾 忽氏鎮痛液 各二匙

拔爾撒字露 半匙

右調勻振盪塗擦

○猛頑塗劑 刺衝性尋麻丹毒

猛頑 八号至十六号 接骨木花水 八号

右溶和為塗藥

○水銀擦藥丹 主治同前方出于 微毒

○方醫 毒麻丹疹

枸櫞汁 二勺 泉水 十勺

右調勻為洗劑

○方醫 主治同前

稀硝酸 一勺

刺賢堙兒水 一匙

右調勻為洗劑

頑癬

○扶氏清血散 頑癬及自他惡液病

瘰癧木脂 一刃至半匙 金硫黃 甘汞 各二

炭酸麻屈涅失亞 茴香油 糖 各一刃

右為散製劑六個朝夕各服半劑

○方 頑癬及自他慢性皮病

金硫黃 瘰癧木脂 白糖 各半刃

右為散製劑十二個每日服二三劑

○方 主治同前

薩爾撒根 四 山牛蒡 甘草

瘰癧木 各一 過泥子 一匙

右調勻為煎劑

○規尼砒石劑丹 環癬方出于 神經痛

○方醫 主治頑癬

硫黃華 瘰癧木脂 各半勺

右為散每服一茶匕日二次至四次

○方醫

甘扁桃油 石灰水 各一勺

右攪和塗擦于患部一日三四次

○方醫 膿膿性頑癬

亞鉛華 石松子 各一
右調和為塗擦劑
玫瑰軟膏 半

○方 手足皮膚癬、頑癬

昇汞 八分至二刀
蒸餾水 八分

右調勻為手浴

○方 頑癬

朱砂 一匙
硫黃華 二匙

家猪脂 一匙
枸橛油 十滴

右混和為軟膏

○方 主治頑癬、疥癬、頭瘡

安質汶尼 四刀
家猪脂 六匙

右為軟膏

○方 主治同前

鹽酸 一匙
橄欖油 一匙

右為擦劑

○方 主治皮膚癬、苔癬、痒癬、頑癬、癩風

腐蝕加里 三刀
鯨腦油 六刀

右為軟膏、朝夕塗擦患部、二日至四日

○方 主治諸般皮膚病、疥瘡、頑癬

稀青酸 三匙
剝篤亞斯水 二匙
水 八

右調勻為洗劑、或卷法

○方 主治環癬

沃實謨 百二十分
石腦油 一匙

右溶和以刷子塗于患處

○方 主治頑癬

沃實謨 一分
沃度加里 一分
甘油 二分

右溶和以毛筆塗擦于患部

○方 頑癬性潰瘍

鉛糖 一刀
玫瑰水 八刀
硫黃華 一匙至三匙

右調勻、振盪朝夕貼于患部

○方 鱗屑狀濕性頑癬，無炎証及搔痒者
青酸乘 六
家猪脂 半
右混和外用 枸橛油 六

○方 主治頑癬
塩酸石灰 十五
木炭 半
右混和為泥，以毛筆塗于患部，日二次
水適宜

皮癬

○方 剥脫皮癬
過羅順 百分

右調勻，塗于患部

○吸收洗劑 主治胞疹皮癬

亞鉛華 百六十八
玫瑰水 八
右調勻為洗劑

○方 主治皮癬輕症

亞鉛華 一
漿粉 一

右研和為撒布藥

○方 主治皮癬

亞鉛華 半
亞爾箇兒 蒸餾水 各半
右調勻為擦劑

○亞鉛華軟膏 主治皮癬癢風

亞鉛華 一
單軟膏 或家猪脂 一
右調勻為擦劑，或攤布片貼患部

○方 主治面部越屈設麻

亞鉛華 半
炭酸麻低濕失 一
家猪脂 半
拔爾撒亭露 一
右揀和為軟膏塗擦

○方 主治同前

白降汞 亞鉛華 各一
家猪脂 一

右調勻、為塗擦劑

○此藥 勿爾忽第氏軟膏膏 主治慢性皮膚疹諸症

白降汞 一匙 家猪脂 一匙

右混和、為軟膏

○方留 皮癬潰爛者

甘汞 一匙至二匙 家猪脂 一匙

右調和、外用

○方馬 主治慢性皮膚病

炭酸加里 一匙 家猪脂 一匙半

右為軟膏、塗擦

○方空 主治皮膚癬

家猪脂 一匙 赤降汞 二八至三八 密陀醋 十二

右調勻、為擦劑

○方錫 主治面部皮膚癬、分泌過多者、

皓礬 一匙 蒸餾水 二匙

右察和、為卷法

○方錫 主治皮膚癬

皓礬 一匙 蒸餾水 一匙

右調勻、為擦劑

○方錫 主治同前

硫酸銅 一匙 蒸餾水 一匙

右溶和、為卷法

○方錫 主治皮膚癬、疥癬

腐蝕加里 一匙 蒸餾水 一匙

右溶和、為卷法

○方錫 主治皮膚癬、經久頑固者

腐蝕加里 一匙 蒸餾水 二匙

右以毛筆塗之、七日間、一二次

○方錫 主治皮膚癬

昇汞 八八至六八 接骨木花水 八号

○膠浴五 皮癬及自他刺傷性皮膚病
膠一七 熱湯
少許溶解
右調勻為浴湯
○糖浴丹 主治同前
糖一二七

右盛于布囊緊紮投浴中
○方類 頑固皮疹

招羅兒加爾基一 玫瑰水八

右溶和為浴藥
○方類 主治頑固皮膚病
參兒一 淨水十五

右丁香攪和每服一碗日四次
○參兒丸丹 皮癬
參兒一 香竈散半 或護謨末適宜

右煉和五丸為一丸每服二三丸日三次或

為二百丸衣石松子末每服十丸日三次
○普雷茂兒氏清血散經 主治慢性皮疹
甘汞 金硫黃

尖鴉答越幾各三 白糖二

右為散分十二服
○方 虛性皮癬

稀硫酸或硝酸 蜀葵根末半
右為百八十九丸每三時服十五丸

○方 慢性皮癬或鱗屑疹
硝酸銀晶半 蒸餾水 蜀葵根末
少許溶解

白糖各一 蒸餾水適宜
右為九十丸衣蜀葵末朝夕各服三丸

○方類 主治諸般皮膚病
硫黃華半 硫酸麻偏一

大黃末一 砂糖二

右為散每二時服一茶匕

○規尼鐵砒石劑每皮癬頑固者方出于癰疽及關節病

○方箋小兒皮癬、貧血者

鎮酒 拔爾撒篤露舍利別各半

忽氏砒石丁幾三十 茴香水一

右調勻每服一匙布匕日三次

○昇頌飲每頑固皮癬方出于

○格爾失屈劑每皮癬、兼痛風症者方出于

○沃度加里幾那劑每皮癬、兼癩麻質症者出

于慢性

○沃實鐵合劑每主治同前方出于甲

○次亞燐酸曹達劑每皮癬、兼神經系抑過者

肺勞

○赤沃頌劑每皮癬、兼疥毒者方出于

天泡瘡

○方里慢性天泡瘡

實芟答利越幾二八、四八、甘汞一八

阿芙蓉半八 白糖十五八

右為散製劑十二個每服一劑日三次

○方里主治同前

甘汞 金硫黃各一八

蜀羊線末 白糖各十五八

右為散製劑十二個朝夕各服一劑

○方里

越質屋布斯密涅刺列 炭酸麻偈涅夫亞

各五 白糖半

右為散製劑十個每服一劑日二三次

○幾那安沒尼劑每天泡瘡方出于

○硝塩酸合劑 丹 主治同前 方出于急 性風濕

○規尼鍊劑 丹 主治同前 方出于疥瘡

○規尼鍊砒石劑 丹 頑固天泡瘡 方出于癬症 及關節病

○方 厘 頑固天泡瘡 搔痒甚者 或癢癬

苦扁桃 去皮者 泉水 八号

右搗和為乳劑 洗患部

苔癬

○方 厘

昇汞 一入

甘油 一号

複方幾那丁幾 多 薄荷油 二十五容

右調勻 取一茶匕 水一盞 和服 日三次

○方 厘

砒酸 二入 甘草膏 一考 甘草末 適宜

右為六十九丸 每服一九五丸 至十九日 三次

○砒石劑 丹 方出于尿毒病

○規尼合劑 丹 方出于紫斑病

○甘汞軟膏 厘

家猪脂 一号

甘汞 一考

右調和為軟膏

○沃度硫黃膏 一刃至半刃 家猪脂 一了

沃度硫黃 半考

右為軟膏 塗擦于患部

○硫黃浴 丹 苔癬及癢癬 方出于關節病

○又方 丹 苔癬 方出于慢 性風濕

○鐵浴 丹 方出于佝僂病

癢癬

丹 方出于

丹 方出于

丹 方出于

丹 方出于

○芒硝硫黃劑 丹方出于關節病

○硫黃麻屈濕失散 丹方出于關節病

○大黃麻屈濕失劑 丹方出于刺衝熱

○沃度鐵合劑 丹方出于慢性風濕

○多兒丸 丹方出于皮膚

○硝塩酸合劑 丹方出于消化不良

○砒石劑 丹方出于尿毒病

○砒石劑 丹方用于苔癬、鱗屑癬、慢性皮膚

○複方達刺侃篤散 丹方用于玫瑰昆設爾弗

○鏡砒石劑 丹方用于癢癬、尿毒病

○莫非飲 丹方用于癢癬、刺衝太甚者、不眠

○鏡格羅兒加里劑 丹方用于皮膚、貧血者、疥瘡

○昇頰丸 丹方用于癢癬、慢性風濕

○方

蓬砂 一匙至二匙 蒸餾水 一卮

右溶和為洗劑

○方

炭酸曹達 一月至三月 熱湯 三十二号

右溶和、洗患部、日三四次

○複方鯨腦軟膏 丹方用于皮膚、癢、疼痛或搔痒者、出

于陰門 煎膏

○青酸洗劑 丹方用于癢癬、胞癬、陰痒

○鎮靖洗劑 丹方用于疥痒、肛門痒

○結列阿曹篤浴 丹方用于主治癢癬

結列阿曹篤 三匙 甘油 四匙 熱湯 世瓦

右調勻、為浴湯

○失鳩答澱粉浴 丹方用于主治癢癬

失鳩答越幾 一匙 澱粉 一匙 熱湯 世瓦

右調勻為浴湯

○亞爾加里浴方出于關節病

○亞利敬兒治癩膏

舍電阿芙蓉液各半 硫黃華各半 亞鉛華一

甘扁桃油一 家猪脂二

右調和外用

○毘多氏治癩膏

朱砂 舍電阿芙蓉液各二

硫黃華半 家猪脂五

右調和外用

○方

硫化加里二 重炭酸加里一 水一

右溶和為洗劑

○方

沃實謨十五 沃度加里二

蒸餾水五 銳烈燒酒一

右溶和每二時蘸海綿摩擦患皮

○綠石鹼一 痒癬疥癬鱗屑癬

右塗擦患部二時或五時後入浴

○方

肝油一 肉豆蔻油一

右調勻為塗擦劑

○方

肝油 參兒各等分

右調勻為擦劑

○硫灰水一 方出于疥癬

○方

參兒油二 哥羅叻半

右調勻每日塗擦

○方

主治同前

墨五ノ一 道一ノ者之ロ

二ノ下 糸 片 鹿

白降汞 一匙

龍腦 一匙

家猪脂 一匙

右研和為軟膏、塗擦于患部

○青酸洗劑 每 主治痒癬

昇頌 三々

稀青酸 二匙

甘扁桃合劑 八

右調勻為洗劑

○方 主治頑固皮膚病

黃色硫酸々化汞 一匙

家猪脂 一匙

右為軟膏

○方 主

硝酸汞液 十五々

蒸餾水 一匙

右溶和為洗劑

鱗屑癬、癩風及魚皮癬

○亞細亞丸 鱗屑癬、癩疾

砒酸 六十六々

黑椒末 九々

亞刺比亞末 二匙

護謨漿 適宜

右研和為八百丸、初一週間、每日服一丸、次

一週間、每日服二丸、後每日服三丸、又日持

長 此丸一粒中含砒酸十二分

○砒石丸 鱗屑癬

砒酸 一 亞刺比亞末 蒸餾水 各適宜

右研和為十二丸、每日服一丸

○砒石劑 主治同前、癩病及苔癬

○方 慢性皮膚病、鱗屑癬

砒酸安沒尼 一々 蒸餾水 一々

右溶和、每日取廿滴、至卅滴、粘滑飲、和服

○度諾漢氏三重水 鱗屑癬 疥瘡

○方 主治鱗屑癬、癩疾

度諾漢氏液 一匙至 二匙 蒸餾水 三々半

六十九

薑舍利別 半号

右調勻分四個朝夕各服一個

○必兒宋氏液（鱗屑癬）

砒酸曹達 一丸 蒸餾水 一号

右溶和每服十五滴日二次至三次

○方（鱗） 主治鱗屑癬、苔癬、癩疾

忽氏砒酸溶液 一号

右初一週間每日取五滴食前用第二週間每日服六滴第三週間服七滴漸加至十滴

○小兒一月乃至一歲者每服一滴日二次

○赤沃汞砒石劑（再） 鱗屑癬、侵蝕性結核瘡

赤沃頃 一丸 沃度加里 二十丸

砒石液 一匙半 複方刺賢堍丁幾 二号

哥羅吩精 四匙 水 十二号

右調勻朝午晚食後各服一食已

○複方硫黃軟膏（再） 鱗屑癬、自他慢性皮膚病

結列阿曹篤軟膏 硫黃軟膏 各半号

右調勻

○方（歪） 主治癩風

炭酸加里 一匙 水 一七

右溶和為洗劑

○肝油 二号 主治鱗屑癬、皮癬、頑癬

右塗擦患部日二次

○綠石鹼 一号

右為塗擦劑

○方（登） 主治鱗屑癬

綠石鹼 加堍油 各一 銳烈燒酒 二号

右調勻為塗擦劑

○參兒（登） 一号

右每夜塗擦患部

○方 鱗屑狀皮疹

參兒 一號或四號 家猪脂 四號

右為軟膏

○青酸洗劑 主治同前

刺鴛亞斯水 二號 稀青酸 一號半

甘油 一號 玫瑰水 八號

右調勻為洗劑

○蓬砂合劑 鱗屑癬 方出于舌病

○方 癩風

蓬砂 半號 家猪脂 一號

右為軟膏外用

○蓬砂浴 主治鱗屑狀皮病、兼刺衝增進者

蓬砂 四號 甘油 三號 溫湯 三十瓦

右調勻

○砒石浴 主治皮病 方出于急 性風濕

○又方 主治皮病
硫化剥答斯 四號 砒酸曹達 三十八至四十瓦
溫湯 三十瓦

右調勻

○方 鱗屑癬、癩病、狼瘡、痒癬等

白蠟 一號 硫黃華 家猪脂

瀝青 各半 硫化安汶尼 半號

右煉和、每夜塗擦于患部、翌朝洗去

○方 癩病、鱗屑癬、狼瘡等

單沃頰 一號至半號 家猪脂 一號

右調和、為塗擦劑

○方 主治鱗屑癬

昇汞 一號 銳烈燒酒 或亞爾箇 兒一號

右溶和、塗擦于患部

○甘汞軟膏 主治苔癬、癩風 方出于苔癬

○魯加室軟膏鱗屑癬

甘汞 一兩 純沃實謨 七八至 十九

家猪脂 或單軟膏

右調勻、朝夕塗擦患部

○方鱗屑癬

複沃頰 一兩 家猪脂 一兩

右調勻、貼患部

○方天主治鵝掌風

白降汞 一匙至 家猪脂 或單軟膏 一兩

右調勻、塗擦牛掌、及足蹠、日三次

○方 鱗屑癬

沃度安沒尼 一兩至 家猪脂 一兩

右調和、為軟膏、外用

粉刺面瘡及頰瘡

○方 瘡 粉刺及酒皰鼻

安息香末 二匙 苦扁桃 去皮者 六匙

玫瑰水 八兩 蓬砂 二匙

右先取前三味、搗碎為乳劑、加後味、為洗劑

○扶氏哥斯幾知水 主治同前

扁桃擦滓 玫瑰水 橙花水 各三 兩半

安息香丁幾 蓬砂 各一 匙

右先搗和前三味、加後二味、卧前、洗面部

○方馬 主治粉刺及皮膚破裂

甘扁桃 二兩 橙花水 一匙

炭酸曹達 一匙 安息香丁幾 半匙

右為乳劑、洗滌

○方天 主治粉刺、銅色疹

硫黃乳 五匙 龍腦 二匙 蒸餾水 一匙

右調勻，每夜潤患部。

○方 匱 面瘡粉刺

蓬砂 三匙

玫瑰水 六号

右溶和塗于患部

○方 匱 主治顏面及口唇破裂

蓬砂 十五号

甘油 半号

右溶和塗擦于患部

○方 匱 主治粉刺及面瘡

腐蝕加里 一匙

蒸餾水 一匙

右溶和為卷貼劑或洗劑

○方 匱 主治面瘡散在者

腐蝕加里 一匙

蒸餾水 二匙

右溶和以毛筆貼于瘡

○方 匱 主治粉刺

硫黃乳 一匙

亞爾箇兒 一号至二号

右調勻，夜間以海綿塗擦之，翌朝洗去。

○方 匱 主治粉刺

鼻頰 一 蒸餾水 六

安息香丁幾 二匙

右調勻，以海綿塗擦之，一日二三次。

○方 匱 主治面瘡

硫黃乳 一匙

硫化越的兒 二匙

銳烈燒酒 半号

右調勻

○猛 頰塗劑 匱 主治斑點、面皰等

鼻頰 四号

稀硝酸 三十密

亞爾箇兒 四号

接骨木花水 八号

右溶和朝夕塗于患部

○羅 失亞膏 主治皮病粉刺

甘汞 二分

次實謨 一分

家猪脂 二十分

右研和為軟膏外用

○方 搗 主治癩風頭瘡粉刺

沃度硫黃 一匙 家猪脂 一匙

右調勻為軟膏

○方 搗 主治粉刺

沃度硫黃 一刃 沃度加里 十二八

家猪脂 半匙

右為軟膏塗擦

○方 搗 主治領瘡

硫黃花 二匙 龍腦 十八 護謨 一刃

石灰水 玫瑰水 各二

右調勻每夜洗滌患部

○方 搗 主治同前

昇汞 硃砂 各二 苦扁桃乳 六号

右調勻為洗劑

○方 搗 主治同前

赤降汞 二匙 家猪脂 一匙
右為軟膏

頭瘡

○肝油 搗 主治小兒頭瘡及皮癬

右以刷毛塗頭部日數次

○亞鉛華軟膏 搗 主治頭瘡皮癬

右先剝去頭髮除瘡痂後攤布片貼之

○方 搗 主治頭瘡 微溫湯 一匙

炭酸加里 二匙 或炭酸曹達

右溶和為膏法

○方 搗 主治頭瘡

木炭末 炭酸曹達 各二 玫瑰軟膏 一

右混和每夜塗擦于患部後用布片被之

○方 鑿 主治頭瘡

溴素加里 一匙

家猪脂 半匙

右混和、擦入于患部、日二次

○麻奉氏散 主治頭瘡

家猪脂 二匙

炭酸曹達 一匙 石灰 半匙

右丁寧混和

○拔兒羅氏洗劑 主治腺病性頭瘡

硫化加里 二匙

石鹼 一匙

石灰水 八分

燒酒 二匙

右溶解、洗頭部、日三次

○方 鑿 主治頭瘡

純沃實謨 二匙

沃度加里 十匙 甘油 二匙

右調勻、朝夕、以毛筆塗擦患部

○方 鑿 主治頭瘡

歌刺多里涅 十二匙

銳烈燒酒 一匙

右溶和、先去痂、後貼之于患皮

○複方硫黃軟膏 主治粉刺、頭瘡

沃度硫黃 十二匙

單蠟膏 一匙

右調勻、塗于面部、日三次

○又方 鑿

沃度硫黃 十二匙

硫黃華 二十匙

苦扁桃油 五匙

家猪脂 一匙

右調勻

○治寄生洗劑 鑿

薩昆那末 二匙

亞爾箇兒 十六匙

右浸漬八日、瀝過洗滌、日三次

○猛汞塗劑 鑿 主治頭瘡 方出于毒 麻丹毒

○猛頑軟膏 鑿 主治頭瘡

昇汞 五匙

單軟膏 一匙

右研和、塗于患部

○方 主治同前

安波尼頰軟膏 百二
硫黃軟膏 三百六

右研和

○方 主治同前

昇汞 一匙
的列並底那 二
家豬脂 二

右研和 外用

○方 主治頭瘡、侵毛胞者

生石灰 一
木灰 一
炭酸剥答斯 二

右研末、為撒布藥

○亞硫酸洗劑 皮病、因植性寄生者

亞硫酸 二
蒸餾水 六

右調勻

○又方 環癬、頭瘡、苔癬等

亞硫酸 各一
甘油 各一

右調勻、塗擦于患部

○方 主治頭瘡、鱗屑癬

結列阿曹篤 三十
甘油 十二
水 八

右調勻、為塗藥

○方 主治頭瘡

結列阿曹篤 水 十六
燒酒 二
水 四

右調勻、為黏貼劑

○方 主治皮膚寄生病、或水胞腫、潰爛等

結列阿曹篤 十
赤頰膏 百二十

單軟膏 三百六十

右研和 外敷

○方 主治疥癬、頭瘡、痒癬

石炭酸 百
甘油 一
水 八

右調勻、為塗藥

○別仁氏治癬水

別仁氏治癬水

石炭酸 一分 醋酸 四分 蒸餾水 百分
右調和、外用

疥癬

○硫灰水（選） 主治疥癬、鱗屑癬

生石灰 一斗 硫黃華 二斗

右以泉水二十斗、煮減為十二斗、漚過取液、患者先浴溫湯半時、而取此液塗擦于全身、四分時後、更入浴湯洗去

○方歌 粉刺、痒癬、疥癬、鱗屑癬、癩風、頑癬、狼瘡

硫黃乳 一斗 銳烈燒酒 一斗

右調和塗擦于患部、日三次

○復方 硫黃軟膏 龍動局方

硝石 十五斗 藜蘆根末 半斗 硫黃華

石鹼 各一斗 家猪脂 四斗

右調和、為軟膏。○患者先浴、而取此膏三四斗、塗擦于全身、着毛巾、入卧床、溫覆三十六時、虛弱家、十八時、乃至二十四時、後塗擦綠石鹼於全身、更入浴洗去

○硫黃治癬軟膏

硫砂 明礬 各世斗 硫黃華 一斗 家猪脂 二斗

右調和為塗擦劑

○留斯篤氏治癬液

沈澱硫黃 十斗 龍腦 二斗 蒸餾水 一斗

右調勻振蕩、每夜臨卧、取此液、濕患部

○方 經久頑固疥癬

硫黃華 一斗 硫砂 三斗

石灰水 五斗 昇汞 半斗

右溶和、洗患部

○勃兒厄那氏芳香軟膏（選）

刺賢埵兒油

薄荷油

桂皮油

丁香油 各一刃

達刺侃篤護謨

炭酸加里 各一刃

硫黃華 三刃

甘油 六刃

右調勻

○微爾京宋氏軟膏

硫黃華

華厄油 各六刃

綠石鹼

家猪脂 各半

白蠟 六刃

右為軟膏

○方

硫黃華

華厄油

白蠟 各三刃

綠石鹼

亞爾箇兒 各六刃

右為軟膏朝夕塗擦

○空里別兒篤治癬膏

硫黃華 半

炭酸加里 二

家猪脂 一刃或四刃

右為軟膏擦入日三次

○耶斯設里氏軟膏 主治疥癬

硫黃華

皓礬 各半刃

家猪脂 三刃

老利兒油 半刃

右混和為軟膏

○方 主治慢性皮膚癬風

硫黃華 二

嬰粟油 半

拔爾撒字露 二

右混和為擦劑

○協亭刺氏疥癬丁幾

硫黃華 六刃

推實油

石灰 各四刃

綠石鹼 一刃

燒酒 二刃

右溶和朝夕塗擦患部後用布片裹其部四

十八時之後洗去

○耶埵球篤軟膏 主治疥癬

硫化加里 一

石鹼 三

嬰粟油 一

若混和為擦劑

○雙屈刺母里氏擦方 主治疥癬

硫化加里三匙以溫湯溶解 加里製石鹼五匙

家猪脂五匙或三匙

右混合

○方 主治疥瘡、鱗屑癬

參兒四匙 綠石鹼 家猪脂各三匙

右混和為擦劑、塗擦皮上、日二次

○方 主治疥癬、鱗屑癬

參兒二匙 家猪脂三匙至六匙 硫黃華六匙

右為軟膏、塗擦

○方 主治疥癬

昇汞半匙至一匙 阿芙蓉八分 家猪脂一匙

右調勻、取豌豆大、塗擦于患部、日二次

○方 主治疥癬

昇汞一刀半、二刀至一匙 蒸餾水一升

右調和、外用

○方 主治疥癬、癩風

白藜蘆根末一匙 參兒或家猪脂六匙

右調勻、塗擦于患部、日二次

○方 主治疥癬

格羅兒加爾基一匙至二匙 泉水十六匙

右調勻、振蕩為洗劑

○方 主治同前

腐蝕加里一匙 蒸餾水一升

右溶和為洗劑

○方 頑固疥癬

煙草一匙 泉水十六匙

右煮為洗劑

○硫黃浴 疥癬方出于關節病及慢性風濕

疔瘡

○方

溴素加里 二八

家猪脂 半斤

右為軟膏朝夕塗擦

○方

木醋 一斗

炭酸安汶尼 適宜飽和為度

右調勻外用

○方

格羅謨酸 六十斤

蒸餾水 四斗

右溶和外用

○龍骨水丁幾 二斗

右以毛筆點貼日一二次

○方

硝砂 八斗

蒸餾水 一斗

右溶和以毛筆塗擦日三四次

○何傑兒氏腐蝕擦劑

石鹼

生石灰 各二斗

右混和外用

○塩酸

右以木箸貼于疣上

○方 疣贅及海綿狀贅肉

硫酸 一斗

洎夫藍末 八斗

右為泥以木片貼疣上

○方 疣贅及肉贅

昇汞 一斗至半斗

銳烈燒酒 一斗

右溶和塗于患部日一二次

○方

明礬

龍腦

鉛粉 各十五斤

昇汞 半斗

銳烈燒酒

醇醋 各二斗

右調勻點貼

○結列阿曹篤 一匙
右外用

皮斑 肝斑 雀斑
夏日斑

○方 協

昇汞 五八至
十五

蒸餾水 一斗

右溶和為腐蝕擦劑

○方 協

苦扁桃乳 六

安息香丁幾 二

昇汞 三

右調勻朝夕貼斑上

○方 瑤

蓬砂 半錢至
一匙

橙花水 一斗至
二斗

右溶和蘸布片潤患部日三次

○方 盛 夏日斑

安息香丁幾 一匙

光青丁幾 半錢至
一匙

蓬砂 二匙

橙花水 八斗

右調勻為洗劑

○方 平 眼臉頑癬及夏日斑

沈澱硫黃 一

玫瑰水 四

安息香丁幾 一

右調勻為洗劑

○方 夏 夏日斑

炭酸加里 三匙

塩酸曹達 二匙

玫瑰水 八斗

菩提樹花水 二斗

右調勻為洗劑

○方 覆 主治肝斑夏日斑等

龍腦丁幾 半斗

扁桃乳 三斗

右調勻取一食匕和洗劑

母斑 即血痣

○方 卷

腐蝕加里 生石灰各等分 亞爾箇兒適宜

右為泥貼患部五分乃至八分至生薄痂以醋水洗去後取鬆疏乾革而貼之

○方 卷

單寧酸 一匙 蒸餾水 二匙

右調勻為膏法

○方 卷

結列阿曹篤 二匙 亞爾箇兒 六匙

右調勻塗擦患部

○鹽酸鐵液

右蘸撒於貼患部日三次

○方 把

吐酒石 一匙 蠟軟膏 一匙 或橄欖油

右混和每膏取少許塗擦斑上至發疹

○方 薑

昇秉 一匙 過羅順 八匙

右調勻以毛筆塗擦患部

○方

石鹼 生石灰 各二匙

右調和外用

○薩昆那越幾 半匙

右貼于患部

眠瘡 可參考第 扶斯奈

○底電瘡創水 主治創傷裂創挫傷打撲青

紫斑 銚創骨斷等又預防眠瘡

醇醋 三比 銳烈燒酒 一比半

稀硫酸 六比 蜂蜜 一比

右調勻、加水半分、洗患部、日數次

○結列阿曹篤水 荒蕪性惡臭潰瘍、及眠瘡

結列阿曹篤一匙 蒸餾水十六分

右調勻、洗患部、日數次

○沃實丁幾匳 預防眠瘡、且治之

右以毛筆塗于患部、日二次

○方 預防眠瘡

木醋酸一分

野菊花浸四分或六分

右調勻、洗痛處

○明礬泥 主治眠瘡

明礬一匙

鷄子白二個

右混和、貼患部

○方 眠瘡初起

鷄子白二個

燒酒六分

右混和、為洗劑

○方勿 主治同前

鷄子白一個

龍腦精一分

鉛糖半匙

右調和、洗患部

○護烏刺爾度水 皮炎丹毒剝脫、眠瘡、凍瘡

鉛糖半分 泉水十二分 亞爾筒兒一分

右調勻、為洗劑

○龍腦醋 主治眠瘡方出于挫傷

○白明軟膏匳 主治同前

家猪脂三分 鉛粉二分

右揀和、貼患部

○方匳 主治同前

檳皮一分、水煎取液共三分

密陀醋一分半

家猪脂一分

龍腦半分

右調和、為軟膏、攤軟莖、貼于患部

○單寧酸鉛軟膏

單寧酸鉛 一匙至四匙 蜂蜜 或家猪脂一匙

右調和、外用

○亞鉛華軟膏 眠瘡、潰爛者、方出于皮癬

○方罨 主治壞疽性眠瘡

木炭末 幾那皮末 各一匙

龍腦 一匙半 的列並底那 適宜

右調勻、為泥、貼于患部

○方罨 主治眠瘡

阿魏 一匙半 亞刺比亞漿 六匙

亞麻仁末 半匙 鉛糖 一匙

右調和為泥、攤布毛、貼于患部

○方罨 眠瘡潰亂後、肉芽發萌者、

蓖麻子油 拔爾撒骨洋霍 各等分

右混和、貼于患部

湯潑火傷

○亞麻仁油 四匙

右蘸軟布、貼于患部

○墨因悉篤火傷軟膏

亞麻仁油 四匙 鷄子白 二個

右調勻、每一時、或二時、塗于患部

○方罨

橄欖油 或亞麻仁油 石灰水 各二匙

右攪和、以毛筆塗患部、且塗綿絮、貼患部

○方罨

石灰水 二 橄欖油 一 阿芙蓉丁 幾一

右調勻、蘸布片、貼于患部

○方罨

鹽酸加爾基 半 水 半 亞刺比亞漿 二

右調勻、微溫、蘸布片、貼于患部

○結列阿曹篤水

結列阿曹篤一匙半 蒸餾水十六分

右調勻、為浴法

○方罇 主治湯潑火傷

石炭酸一分 橄欖油六分

右攪和、蘸布片、貼傷處

○方罇 主治火傷

石炭酸六十分至八十分 石灰水 橄欖油各四分

右調勻、為塗藥

○方罇 主治火傷、疼痛甚者

石炭酸一匙三分余 火酒

甘油各二分余 水二十六分余

右調勻、蘸撒、貼傷處

○方罇 輕性火傷、表皮未壞亂者

的列並油二分 亞麻仁油一分

右調勻、塗于患部

○方罇

硝酸銀晶二分四至八分 蒸餾水一分

右溶和、以毛筆塗患部

○方罇 主治火傷

蜜蠟二分 橄欖油適宜

右為軟膏

○方罇

炭酸鉛 亞麻仁油各適宜

右攪和、為泥、塗于患部

○方罇

硝酸蒼鉛 甘油各適宜

右攪和、為泥、塗于患部

○方罇 火傷因火藥、生多數黑點者

昇汞 五錢

蒸餾水 一斗

右溶和貼于患部促化膿

○過羅順 一斗

右以毛筆塗于患部

○方 丹 火傷及凍瘡

過羅順 一斗

蓖麻子油 二十密
或半斗

右調勻以毛筆塗擦患部

○方 蛤

過羅順 一斗

密陀醋 四斗

右調勻用法如前

○方 越 主治湯火傷

密陀醋 半斗至一斗

橄欖油 一斗或鷄子黃

右調勻外用

○方 盆 主治火傷

密陀醋 半斗

罌粟油 或非阿斯油 二斗

右調勻外用

○方 詞

密陀醋 半斗 鷄子黃 二個 亞麻仁油 四斗

右調勻塗布布片貼患部

○方 越 湯火傷

生石灰 二斗 甘油 五斗 格羅兒越的兒 一斗

右攪和以刷子塗于患部

凍瘡

○方

鉛糖 一斗 阿芙蓉 一斗 玫瑰水 六斗

右調勻蘸布片罨貼

○方 凍瘡疼痛甚者

塩酸石灰 三斗 水 一斗 舍電阿芙蓉液 一斗

右調勻為洗劑

○方

鉛粉 五錢

鉛糖 一錢

龍腦 六錢

阿芙蓉丁幾 二錢

亞麻仁油 一錢

家猪脂 二錢

右煉和為軟膏

○方

燒酒 六錢

確砂精 一錢

阿芙蓉丁幾 一錢

右調勻為擦劑

○方

確砂 半錢

泉水 四錢

龍腦精 一錢

右調勻為洗劑

○方

蓬砂 二錢

玫瑰軟膏 一錢

右揀和每夜塗擦于患部

○方

明礬 一錢

鷄子白 一個

右攪和貼患部

○方

沃實謨 十二錢

沃度加里 二錢

牛脂 二錢

右調勻為擦劑

○方

鈍性凍瘡

確砂精 二錢

石炭油 一錢

○方

龍腦 半錢

石炭油 半錢

蠟軟膏 六錢

右揀和為軟膏

○方

的列並油 二錢

確砂精 一錢

阿片丁幾 各一錢

右調勻為擦劑

○方

亞爾尼加丁幾 一錢至三錢 龍腦精 三錢

右調勻為洗劑

○ 埤歇兒及氏治凍瘡軟膏

家猪脂 七錢半 結列阿曹篤 九滴

密陀醋 十滴 阿芙蓉越幾 一錢

右揀和攤撒系貼于患部

○ 普欽幾氏軟膏 主治凍瘡

蜜蠟 家猪脂 牛脂 各一錢

老刺兒油 一錢 龍腦精 二錢

右先取前三味煉和而加後二味

創傷

○ 方 匱 主治創傷熱

格羅兒加里 半錢 蒸餾水 四錢

右調勻每二時服一食匕

○ 止血液 創傷出血

膽礬 明礬 各一錢 水 八錢 硫酸 五錢

右溶和外用

○ 牛刺弗氏止血散 創傷毛脉出血

亞刺比亞末 半錢 硫酸鐵 二錢

吉納 一錢 血石 半錢

右為散摻于患部

○ 方 聯 蟻吮創出血不止者

吉納末 半錢 亞刺比亞末 一錢

右為散摻于患部

○ 方 創傷後毛脉出血

明礬 二錢 泉水 四錢

右溶和外用

○ 方 主治同前

對症方選 卷之四

八十二日新亭

亞爾尼加丁幾 一三至

龍腦精 三

右調勻為洗劑

○ 怪歇兒及氏治凍瘡軟膏

家猪脂 七

結列阿曹篤 九滴

密陀醋 十滴

阿芙蓉越幾 一

右揀和攤撒系貼于患部

○ 普欽幾氏軟膏 主治凍瘡

蜜蠟 家猪脂

牛脂 各一

老利兒油 一

龍腦精 二

右先取前三味煉和而加後二味

創傷

○ 方 主治創傷熱

格羅兒加里 半

蒸餾水 四

右調勻每二時服一食匕

○ 止血液 創傷出血

膽礬 明礬 各一 水 八 硫酸 五

右溶和外用

○ 牛刺弗氏止血散 創傷毛脉出血

亞刺比亞末 半 硫酸鐵 二

吉納 一 血石 半

右為散摻于患部

○ 方 蟻吮創出血不止者

吉納末 半 亞刺比亞末 一

右為散摻于患部

○ 方 創傷後毛脉出血

明礬 二 泉水 四

右溶和外用

○ 方 主治同前

結列阿曹篤十六滴至二十四滴 銳烈燒酒半字

右調勻加水四字、稀釋外用

○方 劇甚出血

鹽酸鍊液二字 泉水四字

右溶和、外用

○絆創膏 主治金創

單密陀硬羔二比 的列並底那一比

右煉和

○密陀加滿硬羔 滿製絆創羔

單密陀硬羔十二分 松脂六分

的列並底那一分

右煉和

○方

松脂滿各六分 白蠟四分 猪脂二分

右煉和、為絆創羔

○絆創羔

密陀僧 瀝青 松脂各一比

的列並底那四比 安汶尼護謨一比

乳香 屋里板奴謨各三字 鉛丹二

右先取前四味、溶和、加後四味、煉和

○蠟軟膏 單純創、剝脫、火傷、及潰瘍

甘扁桃油或橄欖油半字 白蠟或黃蠟二比

右煉和、為軟膏

○方 主治同前

鷄子黃一個 阿列機油二比

右攪和、為軟膏

○方 創傷、兼水樣、及惡性分泌者、

硝酸銀二比至十二比 蒸餾水二比

右溶和、蘸撒、貼于創處

○單寧酸鉛軟膏 瘰癧狀創傷方出于眠瘡

○方 破裂創、發軟、衝、疼痛甚者、
阿芙蓉 二十四分 泉水 三勺

右調勻、蘸撒、貼于創傷

○瘡瘡、拔爾撒謨、主治神經創

的列並底那 六分 銳烈燒酒 三勺

右溶和、外用

皮膚剝脫及披裂

○鉛軟膏、痛性剝脫及火傷

單軟膏 一匙 鉛糖 一勺

右揀和

○單方白明軟膏 主治同前

家猪脂 五勺 白蠟 一勺 鉛粉 三勺

右先煉和前二味、放冷、而攪和後味

○方 剝脫及濕疹

亞鉛華 半勺 石松子末 半勺

右為散、搽于患部

○亞鉛華軟膏、越方出于
皮膚

○方

亞鉛華 半勺 椰子酪

甘扁桃油 各一 香橙油 六滴

右調和、為擦劑

○方

單寧酸鉛 過爾托軟膏 各等分

右揀和、外用

○方 剝脫夾壞、痘性者

檳皮煎 羅獨底篤兒 各三勺

鷄子白 一個 沒藥丁 幾 一勺

右調勻、外用

○方 鑿 主治小兒剝脫性皮炎

石灰水 二勺 亞麻仁油 一勺

右調勻、塗布片、貼患部

○方 鑿 主治面皮披裂

甘扁桃油 半勺 鯨腦油 白蠟 各三

拔爾撒亭露 半勺 薔薇油 六

右調勻、外用

○方 皮膚披裂、唇披裂及鵝口瘡

蓬砂 十五八 甘油 半勺

右溶和、塗擦于患部

挫傷及皮下出血

○方 挫傷及皮下出血

蒸餅心 四勺 醇醋 適量

右煮為芭布

○方 鑿 挫傷及青紫斑

硝石 一匙 硝砂 二匙 水 二匙 嚴醋 二

右調勻、為洗劑

○何 屈列兒氏實斯鳩私水 挫傷腫脹

硝砂 半勺 葡萄酒 二勺 泉水 二十勺

右調勻、蘸布片、卷患部

○方 鑿 挫傷及挫創有滲出之候者

硝砂 一匙至二匙 芸香水 九勺

芸香醋 四勺 亞爾尼加丁幾 一匙至二匙

右調勻、蘸布片、貼于患部

○石 鹼精 主治挫傷、滲血、擦傷

白石鹼 北 銳烈燒酒 北 玫瑰水 四勺

右溶和、濾過、外用

○方 鑿 挫傷及皮下滲血

酒醋 十号 刺賢埕兒精 四号

硝砂 一号 稀硫酸 二号

右調勻、為洗劑

○硝砂精 二号 挫傷、及滲血

右取一茶匕、塗擦于患部、日數次

○方母 主治打撲、挫傷、火傷等

亞爾尼加丁幾 一匙至六匙 蒸餾水 八号

右調勻、為洗劑

○龍腦醋 挫傷、疔瘡

龍腦 半号 亞刺比亞 一匙 醋 六号

右溶和、為洗劑、或奄貼劑

○龍腦揮發膏 挫傷、寒腫、傷麻質、麻痺

龍腦 二号 罌粟油 三号 硝砂精 一号

右調勻

○拔爾撒非答 一名的 挫傷、及皮下出血

石鹼 的列並油 各六 炭酸加里 一

右調勻

○紛瓦里水 一名複方 挫傷及麻痺

迷迭香精 三分 刺賢埕兒精 一分

右調勻、為洗劑、或奄貼劑

○複方乳香精 挫傷、麻痺、寒腫、浮腫

乳香 沒藥

屋里拔奴謨 各三 燒酒 六号

右浸漬廿四時、後蒸餾、取精四匕半

○加奈烏布收瀉劑 挫傷、青紫、及骨斷

鐵礬 明礬 各五 硝砂

酸化銅 皓礬 各三

右合上火、令溶、取此藥二匙、乃至半号、微

温湯溶解、蘸撒、貼于患部

毒傷

○方 蝮蛇咬傷

硫磺越的兒 各二匙
薄荷水 四勺
桂舍利別 一勺

右調勻 每一時服 一食匕

○方 主治同前

遠志根 半勺 以水九勺
龍腦 一勺
亞刺比亞末 二匙
鹿琥精 二匙

右調勻 為乳劑 每二時服 一食匕

○方 主治同前

攝爾扁答里 六匙 注沸湯八
多浸出取液 桂舍利別 半
右調勻 每二時服 一食匕 兼用左方

龍腦 一丸 護謨末 一丸 薄荷油 一滴

右為散 製劑八個 每二時服 一劑

○方 獺咬傷

硝石 半匙 酒石英 一匙 半
芒硝 半勺 水 四勺

舍電阿芙蓉液 半匙 舍利別 一勺

右調勻 每二時服 一食匕

○方 狂獸咬傷

腐蝕加里 一匙 蒸餾水 一勺

右溶和 洗患部

○方 留 主治同前

腐蝕加里 半匙 蒸餾水 一匙

右溶和 洗患部 或蘸撒 附貼 日三四次

○方 際 咬傷

赤降汞 八勺 龍腦 十二
光菁末 四勺

的列並油 二勺 拔實里軟膏 二勺

右揀和 外用

○方 摸 屍毒

過爾托膏 水銀軟膏 非阿斯油 各半
右調和塗擦

毛髮病 毛髮脫落
毛髮過生

○斯スア的ゲル傑兒ル氏香髮油結進頭髮增長

單寧八八至規尼六氏六香竄精二

椰子酪五五至橄欖油五五或

右調勻為軟膏朝夕塗擦

○方寫主治毛髮脫落

椰子油一甘扁挑油半單寧水適宜溶

規尼酒精適宜溶香橙油半

右揀和為軟膏

○方寫主治禿髮

幾那越幾二家猪脂半枸櫞油十滴

右調勻塗擦頭部

○方寫主治脫髮

幾那越幾二拔爾撒字露

芫菁軟羔各一軟石鹼二

右調和為擦劑

○方寫主治脫髮

甘油半芫菁丁幾一

龍腦精一迷迭香水六

右調勻塗擦日一二次

○方寫主治重病後毛髮脫落

硝砂香竄精 迷迭香精

甘油各一芫菁丁幾三至

玫瑰水八

右調勻朝夕塗于頭上

○方寫主治毛髮脫落