

5294

1278

1部15

傷寒論淺註

中

張仲景傷寒論原文淺註卷三

問長樂陳念祖修園集註

辨太陽病脈證篇

○太陽病當惡寒發熱今

吐傷中氣津液外泄而

自汗出

汗出而外證亦微

不惡寒發熱

脾胃之氣不足而

關上

之脈見微細

虛數者

此非本病

以醫

者吐之

之過也

一二日吐之者

以二日為陽明主氣之期吐之則胃傷而脾未傷故

脾能

腹中

餓

胃不能納而口不能食三四日吐之者

以四日為

之期吐之則脾傷而胃未傷脾傷則不勝穀故

不喜糜粥

喜柔潤故

欲食冷食

為朝

陽胃為陽土胃

陽未傷故能

朝食

暮為陰脾為陰土

暮吐

所以

以醫

誤

陽未傷故能

陽未傷故能

傷寒論卷三

卷三

辨太陽病脈證篇

辨太陽病脈證篇

辨太陽病脈證篇

辨太陽病脈證篇

辨太陽病脈證篇

辨太陽病脈證篇

辨太陽病脈證篇



吐之所致也。前傷胃而不傷脾，後傷脾而不傷胃，非脾胃兩傷之劇證。此為小逆。

此一節言病由誤吐一時氣逆使然，後人擬用大小半

夏湯然却不知仲師無方之妙，述此章凡四節皆言吐

之失宜而變證有不同也。

太陽病。不當吐而吐之，但太陽病原當惡寒，今吐後反不惡寒不

欲近衣者，此為吐之。傷上焦心主之氣，陽無所附而內煩也。

此一節言吐之不特傷中焦脾胃之氣，亦能傷上焦心主

之氣也。

病人脈。一息六七數，較為熱證，與虛數果為熱，熱當消穀

至其名曰數，冷之證不同如數。

而引食而反見吐者此非熱也以過發其汗合陽氣外微陽受

氣於胸膈中亦虛脈乃數也數為之外來客熱非胃中之

不能消穀以胃中虛冷故吐也

上二節之吐言以吐致吐此節之吐言不以吐而致吐

也

病證在疑似不可定之際必求諸病人之情太陽病既過經不解當辨其病留

必泥於所值十有餘日或留於陽心下温温欲吐而胸中

之氣約計痛以心下與胸中為陽明之所太便反澹而腹微滿以大

痛主也或留於太陰之分則太便反澹而腹微滿便與

暖為大陰之所主也胃絡上通於鬱鬱微煩或虛或實不

心脾脹又上膈注心脾胃不和故鬱鬱微煩或虛或實不

心脾脹又上膈注心脾胃不和故鬱鬱微煩或虛或實不

身長論卷之三 太陽篇

無疑議必須審病人之情先此十日餘時自若料其病極吐極下而後適者其意

此胃實也可與調胃承氣湯微和若不爾者證則不可與若但

欲嘔而無心下胸中痛而無鬱鬱微瀉而無腹此且非柴

胡證况敢遽認為承氣證乎然則承以其嘔即欲吐之狀故

知先此時極吐下也自欲

此一節言病證在疑似之間而得其欲吐之情為主兼

參欲下以定治法甚矣問證之不可不講也

○太陽六日已過七日正當太陽表證仍在則宜脈微

而沉是邪不在表而在裏矣反不結胸是病不在上其

陽之病內傳多在胸膈今

八發狂者邪熱內盛逼亂以熱在下焦小腹當鞭滿然小

血皆居小腹蓄而不行皆作鞭滿若小便有利者知不關膀胱之氣分而在

下其血乃愈所以然者以太陽於衝任之血分必用藥以隨經而瘀熱在少腹

裏故也以抵當湯主之

此與桃核承氣湯證不同彼輕而此重彼為熱結膀胱

乃太陽肌腠之邪從背脊而下結於膀胱此為瘀熱在

裏乃太陽膚表之邪從胸中而下結於少腹也

### 抵當湯方

水蛭三十箇熬 蠪蟲三十箇熬 桃仁二十箇去皮尖 大黃三兩酒浸

易集論卷之三 抵當湯方

右四味剉如麻豆以水五升煮取三升去滓溫服一升

不下再服

血之與水以小便之利與不利分之請再申其說 太陽病從胸而陷於中上故身黃脈沉結

少腹鞭小便不利者力脾氣不用能為無血也而小便自

利其人如狂者非水聚輸水聚於少腹為無血也而抵當湯

主之否則不可姑試也

此一節申明上文小便自利之義也喻嘉言云此條乃

法中之法也見血證為重病抵當為重藥後人辨證不

清不當用而誤用與夫當用而不用成敗在於反掌故



重申其義也

內經云今夫熱病者皆傷寒之類也傷寒有熱歸於少腹故少腹滿應小

便不利今反利者熱歸血海為有血也但血結陰位立難蕩深

當緩下之然又恐藥力太微病根深固難不可更餘藥宜

抵當丸

此一節變湯為丸分兩極輕連滓而服又法外之法也

抵當丸方

水蛭二十箇 蟅蟲二十五箇 桃仁二十箇 大黃三兩

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服之晷

身集論卷三 卷三太陽篇

時當下血若不下者更服時時周

雖然辨蓄血者既以小便利為斷矣然不詳審其主證而

并辨其兼證恐專執小便利之一說大談為血證亦非辨

證之法內經云飲入於胃遊溢精氣上輪於脾

脫氣散精上歸於肺通調水道下輪膀胱故

便利者以其人飲水之多夫飲水多而小便利則水氣下洩而

上必心下悸心惡水制小便少者氣不必苦裏急也豈獨

哉然凌也是以

張錢塘云上節以小便利不利而辨其血之有無此又

以小便之多少而驗其水之有無并以結前三節之意

以見不可概認為血證其章法之精密如此

○問曰吾聞太陽主開病竟有不能出入內外結胸少陰主樞竟

人固結藏結其病狀何如答曰結有正有邪太陽之正

於藏為藏結其病狀何如答曰氣與邪氣其結於胸膈

有形之接之則痛寸以候外太陽主皮毛故寸脈浮關

脈沉此名曰結胸也

張錢塘云此章論結胸藏結痞氣之證直至病脇素有

痞方止其中有經氣之分陰陽之異生死之殊學者所

當細心體會也

何謂藏結答曰胸雖不結陰邪逆於心下其外如結胸之狀而內則發於

胸之發於太陽也飲食如故時時下利寸脈浮為

陰之神氣關脈小結為少陰之藏氣虛於內也沉繫為少陰之藏氣結浮於外也若此者

名曰藏結舌為心之外候其舌上白胎滑者陰寒甚於下而病為難治

藏結之狀既明而藏結之證不可不講藏結發於少陰少

陰上火下水本熱標寒必得君火陽熱之花則無病今不

得其熱

孔則為藏結無陽證少陰主不見往來寒熱是少陰之陽

以出也陽動其人反靜舌上胎滑者為君火衰微而陰寒

而陰靜故

曰不可攻也

此承上文而言藏結之證也

少陰上火而下水其氣交會於陽明中土故脈現於關

沉與結胸無異而小細繫為臟陰虛寒結證所獨也○

按程郊倩云浮為寒傷表脈沉為邪入於裏脈上節單  
言沉沉而有力也此節兼沉小細緊而言脈之分別如

此

今誠言結胸之因并病發於太陽太陽主外而反下之則

詳其狀而其治熱邪乘入結於胸膈因作結胸病發於少陰少陰主裏而

反下之邪若結於下則為藏結矣因而作痞痞症發於陰

以下之遲早論也其症所以成結胸者以下之太早故也

治另詳於後而陽證之試再申其因而更詳其狀結胸者氣結於內遂不外行於

太陽之脈上循頭項今項亦拘緊強有如柔痙反張狀下之氣一過則外之經

易寒論淺主 卷三 太陽篇



和宜大陷胸丸方

張錢塘云此言結胸蕪結之所因而於蕪結之中復又推言痞結以見痞之同發於陰而不與蕪結同者蕪結結於下而痞結結於上也結於下者感下焦陰寒之氣結於上者感上焦君火之化也

大陷胸丸方

大黃半升 葶藶半升 芒硝半升 杏仁半升  
尖熬黑 去皮

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢七白蜜二合水二升煮取一

升溫頓服之壹宿乃下如不下更服取下為效禁如藥

法

然亦有不可下者結胸證寸脈當浮關脈當沉今診其脈竟浮而大者浮

在外大為正虛邪結於中不可下若下之裏氣一泄正氣

而正氣反虛浮於外定不可下誤下之無所依歸外離

而內則死而

此言結胸證乃太陽之正氣合邪氣而結於內若脈見

浮大是邪實固結於內正虛反格於外也○張錢塘云

正者王也客者邪也正邪並結者客留而主人仍在故

可下之邪結於中而正反格於外者主人去而客留故

不可下也

然又有不誤結胸證外則項強如柔痙狀悉具而且病發於太

下而定其有煩躁者陽病入陰亦死

此一節從上節危脈之外而補言危證也

太陽中風病診脈浮而動數風性浮浮則為風風為陽數

則為熱陰陽相搏動則為痛邪盛則數則為虛病入陽之頭

痛得標陽之熱化則發熱凡傷風必自汗汗少則惡風汗出多亦

之證微盜汗出而反惡寒者乃中風積久之證盜汗亦無惡寒

未嘗解也醫反下之內入故動數之重而要其變遲邪氣內

相拒高痛胃中而被下空虛客氣無所顧動膈膈上為心肺

膈下為肝腎主吸氣之人今為客短氣上下水火之出煩躁

氣動膈則呼吸之氣不相接續故短氣氣不交故煩躁

煩燥之極則心中懊懷此皆陽之氣隨邪內陷心下因鞅則為

結胸以大陷胃湯主之若不結胸而陷於太陰濕土之分

但頭汗出津液不能旁達餘處無汗劑頸而還若小便不利因無

出路鬱於內而熏於外身必發黃也

此一節言中風誤下而成結胃也

大陷胃湯方

大黃六兩芒硝一升甘遂二錢七

傷寒論卷三 太陽篇

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一

兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

結胸亦有不因下而成者傷寒六日為一經七日又當來復於太結於

留則傷寒之邪鬱而為熱實其證重矣脈沉而且緊沉為在裏緊則

心下痛按之如石之鞭者其他專以攻必以大陷胃湯主之

此一節言傷寒不下而亦成結胸也

太陽傷寒十餘日熱結在裏蓋胸中為太陽之裏復作往來

寒熱者乃太陽藉樞轉之機仍欲外出可與大柴胡湯逆其機以導之但

結留而無大熱者此為太陽水之氣不行於結在胃脇也



身上俱無汗。但頭上微汗出者。水逆於胸而不大陷留湯主之。

令水氣洩於下而正氣運於上則樞轉亦利矣蓋大柴胡湯為樞轉之捷劑而大陷留湯為洩邪之峻藥雖不能轉

樞然邪去而樞轉亦何難之有

張錢塘云此言太陽不能從樞以外出以致水逆於胸

而成結胃也太陽寒水之氣內出於胃膈外達於皮膚

從樞以外出則有往來寒熱之象不能從樞以出而結

於胸膈有形之間則無形寒水之氣遂結而為有形之

水矣

太陽病重發汗而復下之。亡其津液津液亡於下故不大便。自不大便起計有

五六日。又值陽明主氣之期津液亡於上故舌上燥而渴。陽明肝於中西日晡所小

有潮熱。是兼見陽明之燥證然從心下至少腹鞭滿而痛不可近者

則知陽明又不如此危惡承氣湯恐不能四面周到以大陷胷湯主之。

此一節言汗下亡其津液而成燥結胷之證也張錢塘

云內經謂二陽為維謂陽明統維於胸腹之前也夫太

陽由胸膈而出入是胸膈為太陽出入之門戶心下至

少腹又陽明之所綱維兩經交相貫通故病太陽兼有

陽明潮熱之證也。

然結胸證又有大小之分也小結胸病。止從胸而結於胃絡止在心下。不比大結胸之高在

心間且下在少腹也邪在胃絡按之則痛不比大陷胸之痛不可按也脈浮而滑者為

在外滑則為熱裏雖結熱而經氣仍欲外達之象以

小陷胸湯主之

此從結胸證中而又分出小結胸證也

小陷胸湯方

黃連二兩半夏半升

栝蘆實大者一箇

右三味以水六升先煮栝蘆取三升去滓內諸藥煮取

二升去滓分溫三服

小結胸之病雖曰止在於胸而經氣則上下而相通

太陽病過二日而三日正當少無以自達遂覺臥二安而起不但欲起病氣不心

下必內結其脈微弱者此之太陽本有寒分也何以言之太陽本寒而標

熱病反其本治亦反其本今病反下之若利止邪不下必

作小結胸利未止者當四日復下之氣隨下陷變

熱則太陰脾家此發作而協太陰主熱而利也本寒而為標

此一節言小結胸而復推上下之經氣相通也

經氣不獨上下相通而內太陽病外證未罷必下之其邪

變證不其脈促為陽邪甚於內不作結胸者胸中必有邪

易於此為欲解也若脈浮者太陽病下之太早故

必結胸也脈緊者傷寒脈緊此因下而必咽痛脈弦者邪

陷木中結必兩脇拘急脈細數者細屬陰數主熱是陽邪

故頭痛未止脈沉緊者沉屬裏緊主寒太陽必欲嘔脈沉

滑者沉屬裏滑為水太陽之邪協熱利脈浮滑者浮主風

動風陰故必下血

上節言上下經氣之相通此節言內外經氣之相通也

內因之水結而不散則為結胸之證而病在太陽表應以

汗解之者反以冷水澀之若於病人澆灌之其在表熱被冷

止却不得去較未用彌更熱益煩熱因水阻則肉上結治

粟起熱却於意欲飲水外寒制反不作渴者宜服文蛤散



滲散其水氣。若不差者，與五苓散。助脾土以轉輸，仍從皮膚而散之。如果寒實於外，陽熱却

於丙而為寒實結胸無之。肌表熱證者，與三物小陷胷易。若寒泄熱為反

治之法。至用白散。辛溫散結為從治之法。亦可服。

此一節於小結胸外，又補出寒實結胸證也。

### 文蛤散方。

文蛤五兩

右一味為散，以湯沸和一錢，七服。湯用五合。

### 白散方。

桔梗一分

巴豆一分，去皮心，熬黑，研如脂。

貝母三分。

右二味為散內巴豆更於白中杵之以白飲和服強人

半錢七羸者減之病在膈上必吐在膈下必利不利進

熱粥一杯利過不止進冷粥一杯身冷皮粟不解欲引

衣自覆者若水以澀之洗之益令熱却不得出當汗而

不汗則煩假合汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法冷

既有結胸之證亦太陽與少陽併病二陽之經脈文會頭

項強痛二陽之經脈皆起於目或施暈眩頭如覆冒夫病

陽則結胸病在少陽則脇下痞鞭時如結胸不為目下心

今兩陽併病原非結胸之證而以泄太少并病肺俞以通肺

下痞鞭者當刺大椎第一間之邪不已更刺肺俞氣斯勝

肺之氣化行而邪蓋以慎不可發汗肝俞以蕩少陽之邪蓋以

其經脈之血津倘若誤發其汗經脈燥譫語相火熾脈弦若五六日

譫語不止六日值厥陰主氣之期恐少陽之火當刺之期

門以迎其氣

此一節言太陽少陽併病涉於經脈而如結胸宜刺以

瀉其氣也○并者猶秦并六國其勢大也

按圖經云大椎一穴在第一椎上陷中手足三陽督脈

之會可刺入五分留三呼瀉五吸肺俞二穴在第三椎

分中間春骨一寸連春骨算足太陽脈氣所發可刺入實兩旁相去各二寸下倣此

三分留七呼得氣即瀉肥人可刺入五分○肝俞三穴

在第九椎下兩傍相去名一寸五分宜照上實折可刺入三

分留六呼○期門二穴見上章

病在經脈而如結者不獨男子也婦人中風發熱惡寒當表邪方盛之際而經水道

來蓋經水乃衝任厥陰之所主而衝得病之期七日而八

日正值陽明主氣之期病邪乘隙而入邪人於裏則外熱除而脈遲身涼已離表證唯衝任厥

陰俱循胸脇之間故胸脇下滿如結胸之狀而且熱與血搏神明內亂而發譫語者

此為熱入血室也治者握要而圖只取肝募當刺期門隨其實而瀉之

何以謂之實邪盛則實也

此節合下一節皆言婦人熱入血室病在經脈狀如結

胸者正可以互證而明也

經水未來因病而適來者既明其義婦人中風七八日業

矣而經水已來因病而適斷者何如果何故熱除身涼而復續得寒熱發作有時其經水已來適斷者哉蓋以

雖與經水適來者不同而此亦為熱入血室其血為邪

則必結結於衝任厥陰之經脈內未入臧外故使如瘧之

狀發作有時以小柴胡湯主之達經脈之結仍藉少陽之

不結矣

此一節承上文而言也風熱入血室其經水已來而適



斷當知異中之同同中之異各施其鍼藥之妙也

熱入血室不獨中風有之而傷寒亦然婦人傷寒寒鬱而發熱時經水適來

遇多不止則血室空虛而熱邪遂乘虛而入之也晝晝日

為陽而主氣暮為陰而主血今主氣之陽無病故醫者當於其經水明主血之陰暮則譫語如見鬼狀者適來而定其說日

此為熱入血室非陽明胃實所致也無以下犯其胃氣及

上二焦一曰胃腕之陽不可以吐傷之一曰胃中之汁不

胃府水必自愈慎不可妄治

此一節言婦人傷寒之入於血室也郭白雲云前證設

不差服小柴胡湯柯韻伯云仍刺期門

再由此而推傷寒六日已過七日又值太陽發熱病在太陽

言乎諸結病在太陽之本氣病氣不能從胸而支節疼痛

微惡寒出入結於經脈之支骨節之交故

經氣鬱而微嘔不結於經脈之正心下支節外證未去者

欲踈故以其寒熱猶在也以柴胡桂枝湯主之取其解外又達太陽

此一節言太陽之氣化而結於經脈之支節也

柴胡桂枝湯方

柴胡四兩 桂枝 黃芩 人參各一兩半 甘草一兩

半夏二合 芍藥一兩 大棗六枚 生薑一兩

右九味以水七升煮取三升去滓溫服

支結之外又有微結傷寒過五日而六日為厥陰主氣之期經云已

發汗而復下之則逆其少陽之胸脇滿不似結胸證微結

氣不得下行故小便不利經云少陽之上渴無樞轉外出而不嘔

熱結在上而不在下故別處無汗而但頭汗出少陽欲樞轉往來寒熱

心煩者少陽與厥陰為表裏厥陰內屬心包而主脈絡故

陽之樞以外若此此為未解也以柴胡桂枝乾薑湯主之此湯達

解結止渴埋中各絲絲入扣

此一節言太陽病值厥陰主氣之期而為微結也

柴胡桂枝乾薑湯方

柴胡半筋 桂枝三兩 乾薑二兩 括蘆根四兩

黃芩三兩 牡蠣二兩 甘草二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温

服一升日三服初服微煩復服汗出便愈

微結中又有陽微結之不傷寒太陽五日為少陰主六日

同於陰結者不可不知為厥陰王氣之期氣傳而病不傳頭汗出太陽之木微惡

仍在太陽之經太陽之氣上蒸故太陽標陽之氣不手足冷此皆太陽有心下滿口不欲

食大便鞭此皆太陽傳裏之證也太脈細者何也細為少

陽而見陰此為陽微結故見必有表之頭汗出微復有裏

則陽微惡寒手足合

之心下滿不也由此言之隨證以審脈則可若舍證以言

德食大便艱脈則同類之可疑者不少不獨脈細為在

裏脈沉小為在裏也雖然隨證審脈既不可以板拘而病

即脈沉小為在裏也證互見又何以自決唯於切實處決

之今汗出證既可為陽微假令為少純陰結不得復有

於頭汗出定其所結為陽微假令為少純陰結不得復有

外證悉入在裏而見痛引少腹此證猶為半在裏半在外

也脈雖沉緊究不得為少陰藏結所以然者三陰之經絡

陰證不得有與汗今頭汗出故知之樞滯非少陰之藏也

可與小柴胡湯以助樞轉而裏及外解不了了者胃氣不

得屎而解此陽微結之似陰而要不同於陰結者如此

此一節言陽微結之似陰雖見裏脈而究與少陰之純



### 陰結有辨也。

小柴胡證大陷胸證既各不同而痞證更須分別太陽傷寒至五日為少陰六日為

陰主氣之期大抵五六日之間是嘔而發熱者欲從暍外

少厥太三經之交也太陽主開而下之猶幸其

餘皆柴胡湯證悉具用柴胡而以他藥下之不陷所具

之柴胡證仍在者可復與柴胡湯此雖已下之却不為逆

服藥之後正氣與邪氣相必蒸蒸而振之象振者雷出地

奮之却發熱汗出而解少陽樞轉氣若下之心下滿而鞭痛

者此為結胸也宜大陷胸湯主之但滿而不痛者乃病發於陰證

下之後而成此為痞

痞證感少陰之動柴胡不中與之宜半夏

瀉心湯

此一節復以小柴胡證大陷胸證夾起痞證言大陷胸不可與即柴胡亦不可與也特出半夏瀉心湯一方以引起下文諸瀉心湯之義

半夏瀉心湯方

半夏半升

黃芩

乾薑

甘草

人參

已上各三兩

黃連一兩

太棗十二枚

擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日三服

結胸痞證由於誤下所致  
可知下之不可不慎也  
太陽少陽併病  
宜從少陽之樞

轉之  
而反下之  
逆其樞於內則  
成小結胸心下鞭  
樞逆於下則下

利不止  
樞逆於上則  
水漿不下  
樞逆於中則中焦  
其人心

煩  
此併病談下之劇證也

此一節言太陽少陽併病誤下之劇證也○受業薛步

雲云誤下後太少標本水火之氣不能交會於中土火

氣不歸於中土獨亢於上則水漿不下其人心煩水氣

不交於中土獨盛於下則利不止此不可用陷胸湯

即小柴胡亦未甚受半夏瀉心湯庶幾通之

知并病之不可以誤下也亦知陰證  
更不可以誤下乎傷寒病在表則  
者可以定其為少陰之表證矣何以言之少陰篇云少陰  
病得之二三日麻黃附子甘草湯微發其汗以一二日無  
裏證故微發汗是也  
醫者不知微發其汗而復下之其緊初見於浮反入於裏  
變為沉緊病發於陰而誤下之則作痞胸異後以按之自  
濡彼為有形但無形氣痞耳

### 此一節申言痞證之因

痞證問有風激水氣而太陽申風動其寒水之氣下利水  
成者自當分別而觀

淫於上則嘔逆然風邪在表解者乃可裏攻之若其人海則水滲  
上則嘔逆表須待

熱熱汗出則汗出亦發作有時水溲則過額水頭痛填塞  
熱熱汗出則汗出亦發作有時

於胸則心下痞而引脇下而痛水邪在中阻其升降

乾嘔下不能上則短氣證之未和惟此汗出不惡寒之另為者

師於不惡寒中知表證之未和惟此汗出不惡寒一證者

此一節於痞證外論及太陽中風激動其寒水之氣而

為痞也 漿音整汗出如小兩不較貌

十棗湯方

芫花蒸 甘遂 大戟 大棗十枚

右上一味等分各別搗為散以水一升半先煮大棗肥者拾枚取八合去滓日藥末強人服一錢七羸人服半



錢溫服之平旦服若下少病不除者明日更服加半錢

得快下利後糜粥自養

痞證間有汗下虛其陰陽

太陽病

在肌腠者宜桂枝湯以解肌 醫者誤

黃發汗

徒傷太陽之經而虛其表

遂致

發熱惡寒

比前較甚苦再用桂枝湯發熱稀粥法則

愈矣醫者不知

因復下之

更傷太陽之心下

痞

青之

表裏俱虛陰

與陽氣並竭

並竭則不交而為痞矣且夫陰陽之為義大矣黃自其淺言之則氣陽也血陰也自其深

言之陽有陽氣而陰亦有陰氣陰氣為無形之氣隨陽氣

循行於內外不同於有形之陰血獨行於經脈之中也陰

血止謂之陰陰氣謂之為

無陽則陰獨

其理雖奧醫者復

加燒鍼

以強助其陽此證

因攻

胸

而為煩賊之色其

面色青黃

脾傷

而失貞靜之體其肌膚潤動而者難治令面色微黃是土不失其本色也

手足温者為見土氣灌溉於四旁也病尚易愈

此一節言汗下傷陰陽之氣而成痞者不可更用燒鍼

也○今閩粵江浙醫輩不敢用麻黃湯而代以九味羌

活湯香蘇飲加荆防芎芷炮薑之類視麻黃湯更烈

痞發於陰實感少陰君心下不通痞以手按之却不濡此病

火之氣而成故其病形之氣其脈却不同誤下關所上浮者以關上為寸浮為

也診亢盛之象大黃黃連瀉心湯主之瀉少陰亢盛之火而交於下則痞結解矣

此一節言痞感少陰君火之氣而成出其正治之方也

此外各瀉心法皆因其兼證而為加減也。

### 大黃黃連瀉心湯方

大黃 二兩

黃連 一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

病為少陰本熱火呈而有復呈  
太陽本寒為病者亦須分別 心下痞為少陰君火而復

惡寒乃得太陽本寒之氣而且汗出者為太陽本寒之甚而標陽附子

瀉心湯主之蓋以太陽少陰標本相合水火相濟本氣中  
自有陰陽水火非深明陰陽互換之理者不

可以  
語此

### 附子瀉心湯方

大黃二兩 黃連 黃芩各一兩 附子一枚炮去皮

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內附

子汁分溫再服

水火不交其作痞固也而土氣不本寒也傷寒中風但見

能轉運者亦因而作痞太陽之本惡寒之本病不見發

熱之標病汗之宜慎而下更非所以承氣下之故心下痞

宜醫者不知其病止在本汗後復以之類

與瀉心湯欲泄其痞竟不解所以然者汗傷中焦之汗下

不能上升而其人渴而口中燥煩脾氣不能下行而小便

布津液則不利者以五苓散主之

或短亦或

瘳閉而

上節言水火不交而成痞此言土不灌溉而亦成痞也

脾不和者既因以成痞矣而胃不和者亦然傷寒汗出外邪已解之後唯胃中不

和不和則氣滯而內結故為心下痞鞭不和則氣逆而上衝故為乾噫蓋胃之所司

氣和則穀消而水化矣則穀不消而作腐故為食臭水不化而橫流故為脇下有水氣腹

中雷鳴下利者水穀不消謂物不得其平則鳴者是也以生

薑瀉心湯主之

上節言脾不轉輸而成痞此節合下節皆言胃不和而

亦成痞也

生薑瀉心湯方

生薑四兩甘草三兩人參三兩乾薑二兩黃芩三兩

易乘論卷主 卷三太陽篇 三



半夏牛升黃連二兩大棗十二枚

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取二升溫服一

升日三服

然而胃不和中又有誤傷寒或中風不應下者醫反下之虛其腸胃

則水寒在下而其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴火熱

不得上交故在上而不得下濟故其人心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安此上下水

理本來醫者不見其心下痞謂和熱病不盡復誤下之則

者益上其痞益甚此非熱結但誤以致胃中虛客氣乘

土逆故使下鞭也以甘草瀉心湯主之此交上下者謂

此一節承上節胃不和而言胃中虛之證也

甘草瀉心湯方

甘草 四兩 黃芩 三兩 乾薑 三兩

半夏 半升 大棗 十二枚 黃連 一兩

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一

升日三服

然不特上中二焦之為病傷寒服之攻下湯藥下後則下焦

也即下焦不和亦能致痞心下痞鞭伊聖瀉心湯所以導

也服瀉心湯已則心下之痞滿既除復以他藥下之則下

身寒命衰主 卷三 太陽篇 三

氣益下而利不止醫又認為中以理中湯與之利益甚蓋

不能上故利不止溫補脾胃理中者其效專理中焦此利不在中在下焦當赤石脂

禹餘糧湯主之復利不止者法在分當利其小便

此一節言下焦不和以致痞發千古所未發

赤石脂禹餘糧湯方

赤石脂一觔禹餘糧二觔

已上二味以水六升煮取二升去滓分三服

下後致痞言之詳矣而發汗傷寒吐下後又發其汗則奮

脈之血液而為虛煩心主脈故脈甚微八九日

值少陽主氣之期，心下痞鞭，而腸下亦痛，甚至陰虛，氣上

衝於咽喉，血不上榮頭，眩冒經脈動惕者，汗之則經脈之

血告竭而筋久而不愈，恐厥本成痿，遂無所養也，久而不為我用而

此一節雖吐下與汗並言，却重在誤汗一邊

汗吐下後病已解而尚有痞噎，傷寒發汗若吐若下解後

心下痞鞭噎氣不除者，此中氣傷而虛，旋覆代赭石湯主

之

此節言治病後之餘邪，宜於補養中寓散滿鎮逆之法

旋覆代赭石湯方

旋覆花 三兩 人參 二兩 生薑 五兩切 代赭石 二兩

大棗 十二枚擘 甘草 三兩炙 半夏 半升洗

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一

### 升日三服

下之太早為結胸為痞此症之常也而症之變者又當別論太陽溫病風溫症熱自內發宜用涼散而托解之不宜下之太下後雖不作結痞等證而下之太早其內熱尚未早也歸於胃腑徒下其屎不下其熱愈久而愈甚矣欲解不可更行桂枝湯以熱增熱須知溫病風溫其熱必火通於外汗出則射鞫而作喘外反見其無大熱者則蒸蒸而汗出則射鞫而作喘外反見其無大熱者可與麻黃杏子甘草石膏湯順其勢而涼解之此下後不于結痞而另有一證也



此一節因上下文皆言下後之證亦姑備此證以參觀也  
諸本皆疑其錯簡或謂其傳寫之誤然漢季及晉為時  
未久不可與秦以前之書並論余讀書凡遇有不能曉  
悟之處皆自咎識見不到不敢輒以錯簡等說自文。

下後表證未解而作痞不無裏寒內熱之分試言其裏寒

**太陽病**

不用桂枝湯解肌

**外證未除**

醫者

**而數下之**

致虛胃氣虛極則寒中氣無權既不能推并邪熱以解肌

**遂協和熱而**

下。

**利利下不止**

胃陽愈虛而陰羅之氣愈逆於上瀦漫不開故

**心下痞鞅**此為表裏

**不解者**

以

**桂枝人參湯主之**

此一節合下節皆言太陽表裏不解而成痞也

弟資有按

此協熱二字與別處不同蓋以肌熱不從外解故其方不離桂枝

桂枝人參湯方

桂枝 四兩

甘草 四兩

白木 三兩

人參 三兩

乾薑 三兩

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三升溫服一升日再服夜一服

試言其

傷寒大下之

後復發

其汗則大陽之氣逆於心胸故

心下痞而

惡寒 之証仍在

者為

表未解也

夫從外而內者先表其外後治其內故

不可攻痞

當先解表

必俟不惡寒之

表盡解乃可

以

攻其痞解表宜桂枝湯

攻痞宜大黃黃連瀉心湯

此一節汪苓友謂其重出而不知仲師繼上節而覆言之以見表之邪熱雖同而裏之變證各異且表裏同治有一方而為雙解之法雙解中又有緩急之分或用兩方而審先後之宜兩方又有合一之妙一重複處開出一新境不可與讀書死於句下若說也

中而試即痞證而總論之可以從傷寒發熱汗出不解

中而心痞鞭然邪雖已結聚而嘔吐不得上出而復又

下利者當因其勢而達大柴胡湯從中下而達夫主之

者不可謂瀉心湯之外無方也

此一節所以結痞證之義也

按此證宜用大柴胡湯之無大黃者

又即結胸之證而總論之以見大小陷  
胸湯外又有吐法以禱其所末乃也  
病如桂枝證但頭

不痛項不强知其病不在太陽之經脈矣  
寸脈主上微浮設是風邪當從胸以及於

頭而俱痛今留中痞鞭何也膈中乃太陽出入之地  
頭項如故唯留中痞鞭本寒之氣塞其道路故也氣上

衝咽喉而喘促不得其鼻息者此為胸有寒也  
傷寒氣結於胸則太陽陽當吐以從之宜瓜蒂散  
此可見結胸

之氣不能從胸以出當吐高趙之宜瓜蒂散  
此可見結胸

下而成者固多因汗而成者新復不少才因汗吐下而成  
者亦有之因其欲吐不得吐而成者亦有之其治法亦不

專上於大小陷胃等方也

此一節找足結胸證言無剩義矣

### 瓜蒂散方

瓜蒂一分  
熬黃

赤小豆一分

右二味各別搗篩為散已合治之取一錢七以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與瓜蒂散

又即藏結之證而總論之在少陰止為難治止為不可攻在厥陰則為不治病人脇下平素有

痞其連在臍傍為天樞之位此脾氣大虛而肝氣自旺總

之榮失養三陰剖分皆虛矣又值寒邪內入則藏真之氣結而不通其痛從臍引及少腹以



人陰筋者以少腹陰筋皆厥陰之部厥陰此名藏結必死

可知結在少陰無君火之化者正曰難治曰不可攻以少

陰上有君火猶司冀其生也結在厥陰兩陰交盡絕不見

無疑矣陽必死此一節所以結藏結之義也

○病在絡與在經者不金匱既有熱極傷絡之論傷寒病

若吐若下後中氣受七八日又當陽明主不

解則大陽之標陽與陽明熱結在裏表裏俱熱熱傷表時

時惡風熱傷裏大渴感燥熱舌上乾燥而煩推其燥而與

欲飲水數升而後者以白虎加人參湯清陽明之主之

張錢塘云邪之中人必先於皮毛次入於肌次入於絡  
肺主皮毛脾主肌陽明主絡太陽病氣在於皮毛即內  
合於肺故麻黃湯所以利肺氣在於肌即內合於脾故  
桂枝湯越脾湯所以助脾氣在於絡即內合於陽明故  
白虎湯所以清陽明之氣然均謂之太陽病者以太陽  
爲諸陽主氣皮毛肌絡皆統屬於太陽也合下共三節  
言太陽病在於絡合於陽明而爲白虎之熱證也○此  
章三節論燥熱火之氣下章風濕相搏兩節論風寒濕  
之氣所謂傷寒論一書六氣爲病之全書也

傷寒病太陽之標熱谷陽明之燥氣熱盛於內而外反無大熱陽明絡於口口燥

渴而心煩太陽循身之背陽明循身之面熱俱并於背之

微惡寒者以知為陽明之燥熱益盛焉白虎加人參湯以所主之

傷寒脈浮發熱無汗其表不雖然解絡熱者白虎為其所長而表熱則不可以概用

解者與絡無與也不可與白虎湯若渴欲飲水為熱極傷絡可以直斷其無

表證者以白虎加人參湯主之

此申明白虎湯能解絡熱而不能解表熱也。○受業俚

道著按白虎證其脈必洪大若浮而不大或浮而兼數

是脾氣不濡水津不布則為五苓散證。

○魏子平曰入於肌絡者宜桂枝湯肌氣之在裏者宜越脾湯絡氣之入裏者宜白虎湯

太陽少陽并病心下鞭項強而眩者是太陽之病歸并於少陽少陽

證汗不俱禁今在經而不在氣經則當刺大椎肺俞肝俞以洩在經之邪慎勿下之

此小結胸篇戒勿汗者恐其謔語也戒勿下者恐其成真結胸也

此三節言太陽合并於少陽而為病也

同學周鏡園曰此言太少并病證在經脈不在氣化病

經脈者當刺少陽經脈下頸合缺盆太陽經脈還出別

下項故頸項強太陽起於目內皆少陽起於目銳皆故

目眩、太陽之經隧在膀胱、其都會在胸肺、肺脈還循胃、  
上口、上通心膈之間、膽脈由胸貫於膈、脈絡不和、則心  
下鞭、故刺大椎以通經隧、之太陽、刺肺俞以通都會之  
太陽、又刺肝俞以通少陽之脈絡、諄諄戒以勿下者、以  
病在經脈、宜刺不宜下也、

合病又與并病不同、并病者、  
并於此、合病者、合同為病也、  
主樞、今太陽不能從樞、以  
外、出而反從樞、而內陷其白  
熱而太陽之、  
氣達於外矣、若嘔者、乃少陽  
加半夏生薑湯、  
助其開、以

彼、  
太陽與少陽合病、  
不利者、  
與黃芩湯、  
主之、  
黃芩



黃琴湯方

黃琴 三兩

甘草 二兩

芍藥 二兩

大棗 十二枚

棗 十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓温服一升日再夜一服若嘔者加半夏半升生薑三兩

太陽之病既歸并於少陽則以少陽為主矣然亦知少陽三焦之氣遊行於上中下者乎上焦主胸中焦主胃下焦主腹傷寒胸中有熱逆於上胃中有寒邪之氣逆於中腹中痛逆於下欲嘔者少陽三焦之氣逆於上中下之間欲從外上下絲絲入扣則愈以黃連湯主之

黃連湯方

黃連 甘草

乾薑

桂枝

人參 半夏 大棗

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日一服夜

二服

風濕相搏有從傷寒 傷寒八日當陽明 九日氣之期宜

從少陽之樞而外出 風濕而相搏 身體疼 風邪煽

煩濕邪沉 不能自轉側 裏未入 不嘔不渴脈浮虛而瀉者

以浮虛為風牆則為濕也此 桂枝附子湯主之若 患前其

人脾受濕傷不能為 大便鞭愈鞭 小便愈覺 自利者 脾受

胃行其津液故 大便秘而愈鞭 其傷而

津液不能還入胃中故也此爲濕  
多於風而相搏於內卽於前方  
濕若去則風無  
所意而自解矣

去桂枝加白朮湯主之

此節合下節皆言風濕相搏之病也但此節宜分兩截  
看風濕相搏至桂枝附子湯主之作一截言風濕相搏  
於外也若其人至去桂加白朮湯主之又作一截言風  
濕相搏於內也要知此節桂枝附子湯是從外驅邪之  
表劑去桂加白朮湯是從內撤邪之裏劑下節甘草附  
子湯是通行內外之表裏劑也

桂枝附子湯

桂枝 四兩

附子

三枚，去皮，炮破八片 生薑 二兩，切

甘草 二兩

大棗

十二枚，擘

右五味以水六升，煮取二升，去滓分溫三服。

桂枝去桂加白朮湯方

白朮 四兩

甘草

二兩 附子 二枚，炮

大棗

十二枚

生薑

三兩

右五味以水七升，煮取三升，去滓分溫三服。初服其人身如痺，半日許復服之，三服盡其人如冒狀，勿怪，此以附子朮并走皮肉，逐水氣未得除，故使之爾。當加桂枝四兩，此木一方二法也。

風濕相搏之病見證較劇者用藥又宜較緩業已深風濕相搏入其骨節煩疼掣痛

不得屈伸近之則痛劇此風寒濕三氣之邪阻遏汗出氣

短小便不利惡風不欲云衣或身微腫者衛氣營氣三焦

於坎中元陽之氣失職也務使陽回氣暖甘草附子湯主

之而經脈柔和陰氣得暖河水泉流動矣以

此一節承上節言風濕相搏病尙淺者利在速去深入

者妙在緩攻恐前方附子三枚過多其性猛急筋節未

必驟開風濕未必遽走徒使大汗出而邪不盡耳故減

去一枚並去薑棗而以甘草為君者欲其緩也口此方



甘草止用二兩而命方冠名藥之上大有深義余嘗與  
門人言仲師不獨審病有法處方有法即方名中藥品  
之先後亦寓以法所以讀書當於無字處着神也○受  
業門人答曰此方中桂枝視他藥而倍用之取其入心  
也蓋此證原因心陽不振以致外邪不撤是以甘草為  
運籌之元帥以桂枝為應敵之先鋒也彼時不禁有起  
予之嘆故附及之

甘湯附子湯方

甘草

二兩

附子

二枚炮  
去皮破

白木

一

附

桂枝

四兩

石四味以水六升煮取三升去滓温服一升日三服初

服得微汗則解能食汗止復煩者服五合恐一升多者

宜服六七合為始此言服之始

○是故不知證者不可以言醫不知脈者亦不可以言醫

舉也亦不必贅舉也然太陽總諸經之氣而諸脈之同者

異者似同而實異者似異而實同者有同中之異異中之

同者雖曰不可言傳而亦無不可以意傷寒言之太陽本

會矣今欲舉一以為隅反即以太陽傷寒而標熱若

診脈象浮滑浮為熱在表此為表有標熱其知裏有本寒

其脈所謂凡傷於寒則為熱病是也宜以白虎湯主之此而比例之思過半矣

張錢塘云上八節以風寒濕熱燥火之氣結通篇太陽

之病以見傷寒一論六淫之邪兼備非止風寒也此三節以浮滑結代之脈象結通篇太陽之脈以見太陽總統諸經之氣而諸脈之死生亦俱備於太陽中也

### 白虎湯方

知母

六兩

石膏

一觔

甘草

二兩

粳米

六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

浮滑恒脈之外又有劇脈曰傷寒之脈何結代非洞悉乎結危脈日代不可不知夫傷寒之脈以結代造化陰陽

之本者不可與言蓋脈始於足少陰賢生於足陽明胃主於手少陰心少陰之氣不與陽門相合陽明之氣不與少

陰相合上下不交血液心氣虛動悸以炙甘草湯上之補  
不生經脈不通是以

陽明從中宮  
以分布上下

陳師亮曰代為難治之脈而有治法者何凡病氣血驟  
脫者可以驟復若積久而虛脫者不可復蓋久病漸損  
於內藏氣日虧其脈代者乃五藏無氣之候傷寒為暴  
病死生之機在於反掌亦有垂絕而亦可救者此其代  
脈乃一時氣乏然亦救於萬死一生之途而未可必其生也

炙甘草湯方

甘草

四兩

生薑

三兩

桂枝

三兩

人參

二兩

生地黃

一觔

阿膠

一兩

麥門冬

半升

麻子仁

半升

大棗

十二枚

擘

右凡味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內

膠烱清盡温服一升日三服一名復脈湯

其結代之脈狀何如結脈按之來緩不及而時一止復來

者不能相待此名曰結中止為結而脈來動而中止更

來小數中有還者反動是陰氣回結已甚而陽氣名曰結

此陰盛也結脈之止時或一脈來動而中止既有常數

不能自還陽不能自還因而復動者儼如更代名曰代此

陰陽也得此脈者必難治此言權之分學者於此判之指

此一節復申明結代之脈狀毫釐千里務分彷彿中也



張仲景傷寒論原文淺註卷四

閩長樂陳念祖修園集註

辨陽明病脈證

○問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也

答曰太陽陽明者

蓋以陽明之上燥氣主之本太陽不解太陰之標熱合陽明之燥熱併於太陰脾

土之中脾之津液為其所燥而窮約所謂

脾約是也正陽陽明者

蓋以燥氣者陽明之本也

天有此燥氣人亦有此燥氣燥氣大過無中見太陰濕土之化所謂

胃家實是也少陽陽明

者蓋以少陽之上相火發其汗

利其

小便

則水穀之津液耗竭而少

陽之相火熾盛津竭則

胃中燥

火熾

煩而實

則大便難是也

此一節言陽明有太少正之分也。

何謂正陽陽明之為病。燥氣為陽明之本氣燥氣盛於上胃家實也。則胃家實於內一言以蔽之日

實也。

此復申明正陽陽明之為病也按沈堯封云此是陽明

證之提綱後稱陽明證三字俱有胃家實在內胃家實

言以手按胃中實鞭也如大陷胸證按之石鞭即名實

熱梔子豉證按之心下濡即名虛煩夫心下俱以濡鞭

分虛實何獨胃中不以濡鞭分虛實乎此說與柯韻伯

之論相表裏雖非正解亦可存參

○問曰何緣得陽陽明病答曰太陽之津液從胃太陽病

若發汗若下若利小便此皆胃中津液胃中無津液而乾燥

其太陽未解之邪熱因轉屬於陽明其不更衣為腸內既大

便難通而者此名太陽轉陽明也

此一節承上章太陽陽明病而言也然重申胃家實之

旨是陽明病總綱

問曰有諸中者陽明病外證云何答曰胃熱之外見者肌

達於外形於外身熱與太陽之表熱不同也汗自出與太陽

不同也表不惡寒裏熱已反惡熱也只因有胃家實之病

易學論卷之六 陽明篇

病證不惡寒反惡熱之病情  
內外俱備方是陽明之證

此一節補出陽明外證合上節為一內一外之總綱

問曰身熱不惡寒既得病有始得之一日不發熱而惡寒

者何也答曰陽明主金氣金氣微寒也邪初入故惡寒雖得

之一日不待解散而惡寒將自罷內出即自汗出而惡熱也此

明之的候也

此承上文不惡寒反惡熱而言也但上文言陽明白內

達外之表證此言風寒外入之表證

問曰陽明病未惡寒何故自罷答曰陽明與他經下居中

經表散其

土也中土萬物所歸故凡表寒裏熱之邪無所不歸無無

所復傳一日表氣通始雖頗惡寒而二日為陽明主氣

邪亦傳正再傳而邪有胃家實為陽明病之根

此復設問答以明惡寒自罷之故並指出胃家實之根

也

過汗亡津液而轉屬陽明者固多而汗本太陽病初得病

時發其汗汗先出不徹其太陽標熱之氣不能隨汗因而

轉屬陽明也此外傷寒發熱無汗其時即伏胃嘔不能食

發汗而反汗出漉漉然者水液外泄則是轉屬之外轉屬

易長命發主 卷之四 陽明篇 三



陽明之證也

上文歷言陽明本經之自為病此復申明太陽轉屬陽明之義除過汗亡津液外又有此汗出不徹而轉屬不  
因發汗而轉屬合常變而並言之也

三日為少陽主氣之期病固宜乘其氣而樞轉外出矣今傷寒三日現陽明而脈大為歸申土無所復傳是不能從少陽之樞而解也

述自此以上六節論陽明之氣主表而外合太陽主裏而內關津液之義也按此即高士宗所謂讀論者因證而識正氣之出入因治而知經脈之循行則取之有本

用之無窮矣

○陽明與太陰正氣相為傷寒陽脈大浮而緩陽明身表裏邪氣亦交相為繫傷寒明脈今大熱今止手

足自溫是為陽明病不在而繫在太陰太陰者濕土也濕熱相并身當發

黃若小便自利者濕熱得以下泄故不能發黃至七日已八日陽

明主氣之期遂移其所繫而繫陽明胃燥則陽乾其大便無有鞅者此為陽明也

此節合下節明陽明與太陰相表裏之義也

傷寒由太陰而轉繫陽明者其人不特大便澀而且澀然微汗出也

此承上節而補言陽明之汗出即上章所云外證俱在

其中矣

陽明不特與大陰表裏而且與太陽少陽相合陽明中風不涉於本氣之燥化而涉於少陽之熱化故

口苦咽乾復涉於大復滿微喘又涉於太陽發熱惡寒

陽明脈本浮大以故脈象浮中不而見緊浮緊之脈宜若

陽明協於太陽故脈象浮中不而見緊從汗以解之若

下之於陽邪內陷則運而腹增滿少陽之三焦不小便難

證之新也

述此言陽明之氣不特與太陰為表裏抑且中合於少

陽外合於太陽也

○陽明木經自病未曾久雷太陽經而化熱者風若龍食

名中風以風能鼓動不能食名中寒以寒能閉拒陽明之

陽明之氣也然此特初病則

然久則為實滿等證雖能食者亦歸於不能食矣

此一節以食而辨風寒之氣即以食而驗陽明之胃氣因正而辨邪因邪而識正善讀者能會心於文字之外則得矣

試論陽明病若中寒陰寒過甚不得水氣燥不能食水不

小便不利四肢為諸陽之本胃手足濇然汗出此欲作大便

固而固欲作大便燥氣必大便初鞭寒氣用後瀉所

以然者以胃中冷水穀不能別故也

此言陽明中寒也

試論中風陽明之病胃為陽土風為陽邪飲食即此可以定

然病在陽明小便其為申風矣大便反不利反白調是津液尚還

當利大便當鞭今不利大便反白調人於胃申但

不得少陽之癸水以相合也少陰其人骨節疼且骨節合

主骨節而不能上合於陽明故發狂濺然汗

翕翕如有熱狀病難自解乃奄然而發煩躁

出而解者此少陰水之陰不勝明穀神之氣雨不相敵者

遂與汗而共并即戰燥汗脈若轉遲緊則愈蓋以緊則

間而陽氣乎  
戊矣合矣

此言陽明中風也

陽明病欲解時從申至戌上蓋陽明旺於申酉病氣得天  
時之助也然此言湯明之表



證從微汗而解若胃家實之  
證值旺時更見發狂譫語矣

此言陽明欲解之時作一。小結也

○陽明病雖以胃家實為大綱而陽明病胃氣實則不能

食之虛矣醫者反攻其熱則虛不受攻寒必噦所以然者

胃中虛冷故也此胃氣存亡之關頭以其人胃本虛故攻

其熱必噦

此一節言陽明中氣虛寒之為病也

胃氣虛則不能宜大遲是經脈不能稟氣於胃

淫精於經脈而反遲也內經云食氣入胃濁  
氣歸心淫精於脈脈氣流經可知食氣散於各經  
之中自不厭其能若不能散達止留滯於胃故食難用

飽則濁氣歸心不淫於脈流於經所以微煩不但此也且循經上行而頭眩循經

下必見小便難上下不行則胃滿此欲作穀疸病也雖已下

之而腹滿如故所以然者以胃虛不能淫精於經脈脈遲故也

此一節言食氣入胃胃虛不能淫精於經脈也

胃氣虛則不能輸精於皮毛常陽明病法多汗今反無汗其身痒如蟲

行皮中狀者此以氣久虛不能輸精於皮毛故也內經云輸精皮

氣於府可知內而經脈外而皮毛皆稟氣於胃胃虛皮毛經脈俱無所稟矣

此一節言胃氣虛不能輸精於皮毛也

○陽明居中土主灌溉於上下內外汗而陽明病汗而反覺

無汗而小便利

寒氣中於裏而水液下行也

至二

日主氣之以及

三日

不拘日數但覺

嘔而欬

即內經所謂邪中於膈則下陽明是也

手足厥者

胃陽虛寒其氣不能敷布於四肢也

內經云陽明之賦循髮際至頭顱陽明寒氣牽連正氣而上逆故

必苦頭痛若不欬不嘔

手足不厥者

為寒氣已除而陽明正氣既四布即不上逆故

頭不痛

此節言陽明之氣合寒氣而上逆於頭不能灌漑於四

旁也凡言邪即以言正言正即以言邪為讀仲師書第

一要法余於數節必重申之不厭於複也述此章凡四

節論陽明居中土主灌於上下內外四旁也

再言中風氣逆於上

陽明病

其證不一然他證無論

但頭眩

此證不在陽明提綱之內且有

陽有陰有寒有熱從何處辨起惟不惡寒知病屬陽明而不屬陰經矣故

吾即能食知為陽明胃熱而非陽明胃寒而發欬欬極其人

於其能食矣由是熱氣上衝肺受火燥必咽痛若熱不上于不欬者咽亦不痛

此一即言陽明之氣合風熱而上逆於咽不得流通於

下也○程扶生云陰邪下利故無汗而小便利風邪上

行故不惡寒而頭眩寒則嘔不能食風則能食寒則頭痛

風則咽痛是風寒入胃之辨也按雖本章之意不重在

此而亦不可不知○欬出於肺當云喉嚨痛今胃熱甚

則咽痛二者相連氣必相侵

更有鬱於中土之證。陽明病，其氣不能外，無汗，膀胱則小便不利。

心中懊憹者，中土鬱而成熱，熱氣為身必發黃。

此節合下節皆言陽明之氣鬱於中土，不得外達而下

輸也。

鬱於中土，若誤火更益其熱，陽明病，醫者不知，所以無汗之被火，周身

燥極而熱不外，額上而微汗出，又不得下，小便不利者，濕

越但上攻於額上而微汗出，又不得下，小便不利者，熱

相蒸必發黃。

亦相蒸必發黃。

此節即上節所言發黃之證，借被火以言其更甚也。凡

誤服羌獨荆防及薑桂烏附之類，皆以被火概之。○陽



明之脈起於鼻行髮際至額顙

○陽明原主病今診脈浮而緊者仍見太陽表實無汗之

外束則陽氣不能乘其所旺潮熱如潮發作有定時若

宜發而為熱故必由酉時而潮熱水之

但浮而不者是見太陽表虛自汗之脈陽明被太陽之風

之煩兩必為浮盜汗出

述此三節言陽明主裏復外合於表氣內通於經脈復還於胃中也

陽明之脈起於鼻交陽明燥熱病其口無不燥若熱止在

額中還出俠口今但欲以漱水畢吐去而不欲嚥下者熱不在胃故也陽

熱甚則適  
血妄行因此必發衄

此言陽明之津液通於經脈而為衄也

陽明病本自汗出醫更重發汗外熱病已差內尚微煩不

了了者此大便必鞭故也汗液為胃所主以發汗亡其津液胃中乾

燥故令大便鞭今姑不問其大便當問其小便日幾行若汗本

小便日三四行今於微煩之日止再行故知大便不久自出蓋

大小便皆胃府汗液之所施也今為小便數少以津液當復還久胃中故

知不久必大便也此胃府實大便鞭亦有不

此言湯明之津液復還於胃中也

○陽明證既知有不必下者傷寒嘔多為陽明胃氣之虛雖有

陽明燥熱登切不可攻之

此一節言胃氣虛者不可下也

述陽明有胃氣有燥氣有悍氣者柔和之氣也悍氣者慄悍滑利別走陽明者也燥氣者燥金之氣也病在悍氣者可攻病在燥氣者可攻病在胃氣者不可攻病在燥氣而胃氣虛者亦不可攻故此三節俱言不可攻也○按師言其不可非坐視而不救也必有所以可者在正面旁面對面皆可以悟其治法若常器之補亡

論必處處補出方治無論其搔不着癢也卽有偶合之處反令鳶飛魚躍水流花放活潑文章俱成糟粕長洲

汪荅友多宗其說何其陋歟

陽明病外有身熱自汗出不惡寒反惡熱之證便知其內

活春亦知其實心下鞭滿者止在心上未及腹止是鞭

虛胃無所仰不可攻之若攻之則穀氣盡利遂不止者死其

利能自止者是其人胃氣尚在穢愈

此一節言虛而假實者不可下也○受業薛步雲按心

下為陽明之膈膈實者腹必虛氣從虛閉是陽明假實

證攻之是為重虛

內經云中於面則下陽明以陽明病通面合見赤色為陽

陽明之脈上循於面故也鬱於不可攻之若攻之胃氣徒虛津液大必復發熱面色

表亦色黃內經云三焦膀胱者腠理毫毛其應以三焦主變為腠理膀胱應皮毛今鬱熱在表三焦失其決瀆

之官膀胱失其氣化之職為發黃小便不利之根也

此一節言外實內虛者不可下也

○不可攻者既明而可陽明病不吐不下可知其胃心煩

者以胃絡上通於心陽明之燥火與少陰之氣不虛也可與調胃承

氣湯以和

君火相合故也胃氣雖下不虛是和不和



此一節言陽明胃府不利宜與調胃承氣也述此三節皆

言可攻之證而又以則三承氣之各有所主也

陽明病脈遲為陽邪人於裏陰然止言脈猶不足憑也必

也雖汗出為陽熱之內蒸而表未罷不惡寒者定其表證

表證已罷尤當再驗其裏證陽明主肌肉邪其身必重

於中必礙短氣腹滿難以下通而為喘此已屬大承氣證

為潮熱知其熱邪盡入於有潮熱者此外欲解可攻裏也

胃乃可以指其實在日又必通身熱蒸之汗變為手足濇然之汗熱俱斂止

露出胃所主之四肢為本證黃面目乃可指其實在口手足濇然而汗出者此大便已鞭也以大承氣湯主之若

其人汗出雖多微發熱惡寒者外未解也不可改裏即其熱不

潮為胃未未可與大承氣湯若其腹大滿人便不通者凡不

證之熱止可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

大承氣湯方

大黃四兩酒洗厚樸半斤去皮

枳實五枚炙芒硝三合

有四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更下火微一兩沸分溫再服得下餘

勿服

武陵陳氏云方名承氣始卽亢則害承乃制之義乎亢極  
反兼勝已之化承者以下承上也夫天地一理萬物一  
氣故寒極生熱熱極生寒物窮則變未有亢極而不變  
者傷寒邪熱入胃汗液耗真陰虛陽勝陰病所謂陽盛  
陰虛汗之則死下之則愈急以苦寒勝熱之劑救將絕  
之陰瀉亢甚之陽承氣所以輓回造化之功也然不言  
承亢而言承氣何哉夫寒熱流轉不過一氣之變遷而  
已用藥制方彼氣機之不可變者力難矯之亦第就氣  
機之變者而一承之耳設其氣有陽無陰一亢而不可

復則爲脈澀直視喘滿者死何則以其氣機已絕更無  
可承之氣也由是言之聖人雖盡人工之妙止合乎天  
運之常耳不云承氣而云何

按陳氏此註必須熟讀

### 小承氣湯方

大黃 四兩

厚樸 二兩炙  
去皮

枳實 三兩枚大  
者炙

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服  
湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

胃合海水無病之人亦日日有潮但不  
覺耳病則氣隨潮而發現於外故凡  
陽明病必有潮熱

又大便微鞮者，方可與大承氣湯。若大便不鞮者，即不可與之。

切勿概以潮熱為可攻也。若其人不大便已六七日，未敢必

然而大便又不可盡信也。燥屎，恐有燥屎，欲知之法，少與小承氣湯，湯入腹中，即轉

而失氣者，此有燥屎，乃可以大承氣攻之。若不轉失者，為胃氣

此但初頭鞮後必溏，不可攻之。則胃氣愈虛必脹滿不能

食也。試觀胃虛之人渴欲飲水者，與水則噦。水且不宜於胃而况

得攻而潮熱已退其後發潮熱者，必大便復鞮。但溏者既去，則

而甚少也。止須以小承氣湯和之。然亦必須轉失氣不轉

失氣者，并小承氣慎不可攻。逕用大承氣

易集論卷之三十一 陽明篇



此言大承氣行便、小承氣行燥屎，各有所主，而胃氣虛者，慎不可攻也。

陽明諸語，其中虛實之不一，夫陽明實則語皆狂譫語，同生死之各異者，不可不知。

虛則聆其所語如鄭國之聲，鄭聲鄭聲，即重語也。蓋譫語原非死

證而邪氣入藏以致直視而譫語則危矣，喘滿者脾肺不

精氣不榮於目至，脫於死及下利者脾腎不固而亦死。氣脫於下

此章統論譫語各證之治法也。譫語之時，聆其聲有不

正之聲，輕微重複之語，即是鄭聲。汪家分而為兩，皆相

沿之誤也。故止首節提出鄭聲，而後無鄭聲之證。

有亡陽而譫語者，汗為心液，心為陽中之太陽，發汗多則心液虛矣。若重發汗者，心液為陰

虛於內則心主之陽無所附而遂亡於外矣亡其陽則神氣譫語脈乃脈短者

心液亡也死若脈不短而且自利者劇亦不死

此言亡陽譫語也

有亡陰而傷寒若吐若下後不解其陰液亡矣不大便五

六日上至於十餘日陽明旺於申酉日晡所和氣隨發潮

熱且全顯出本來不惡寒且熱甚神昏無獨語無所如見

鬼狀若劇者為我用發則不識人而躁擾故循衣摸牀陰

於內而無惕而不上故微喘於日故直視而陰液亡

其生死只在。一瞬之間須脈弦者為陰氣生瀉則无瀉者

為陰血死而苟病微者先以上但見發熱譫語者以

已竭必死勢尚一服利此後服以養陰不當亦所以亡

陰也可不慎歟

此言亡陰譫語也。○按柯氏云吐下後不解病有微劇之於微者是邪氣實當以下解劇者邪正交爭當以脈斷其死生。弦者是氣實不失為下證。故生澁者是正氣虛不可更下。故死生二字從治病者看出。又是一解却是正解。

自亡津液易明燥熱之病其人多汗以津液外出以胃中

乾燥大便必鞅鞅則胃氣不和而謔語以小承氣湯主之若

服謔語止更莫復服

此言亡津液而謔語也

然其中虛實之辨此陽明裏陽明病其謔語有虛有實若發潮熱脈滑而疾

者實也小承氣湯主之然服之因進退先與承氣湯

一升後服腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與

之設變滑明日不大便脈反微澁者則血少此裏

虛也邪盛正衰法為難治熱邪雖盛亦不可更與承氣湯

也

此以脈而辨謔語之虛實前欲與大承氣以小承氣為  
 法今欲與小承氣即以小承氣先與為試法可見古人  
 之謹慎如此。○按柯氏云勢若不得不通者可用蜜導  
 虛甚者與四逆湯陰得陽則解矣愚以救逆當臨時審其  
 所急不可預有成見

且有在胃在腸亦須分別內經云胃疾則腸虛腸滿則胃虛陽明病若謔語有潮熱反

不能食者胃滿也胃滿則胃中必有燥屎五六枚也若謔語潮熱而能

食者腸滿也腸滿則但大鞞爾俱宜大承氣湯下之

逃此以能食不能食以驗謔語有燥屎便鞞之不同而



又以明腸胃更虛更滿之義也

胃主納穀胃滿則不能容穀故不能食腸主變化腸滿

則難化變化故但鞭然腸雖滿而胃則虛故又能食

間有熱入血室而譫語者以衝在二陽明病熱通於下血

脈為血室皆起於胞中與陽明合故此為熱入血室何以為血室男女

下血而即譫語昏也此為熱入血室皆有之在男絡唇

口而為髭鬚在女但頭汗出而別處者血下奪則無汗熱

出則愈

此言下血譫語也

易與命家主下血陽明篇

聞有因風致燥而譫語者奈何夫汗多亡液以致胃燥譫語固也今汗出不見其譫語者以

有燥屎在胃中此為風也謂風木之邪于於中土風燥而非熱燥也燥實必須議

下之然亦過經俾有餘不盡之風邪併於燥屎乃可下之若早

風性煥動善行數變內傷神氣其語言必齟以風邪盡入於裏邪盛則實也為表虛裏實

故也蓋風燥症候過經宜下下早以致裏實證亦宜下統其法曰下之則愈統其方曰宜大

承氣湯

此言風木之邪燥其津液而為譫語也

攻裏太早致裏實而譫語者言之詳矣而攻傷寒四日為表失法致裏實而譫語者亦可並舉而相參傷寒四日為

土氣五日為少陰主氣之期病脈沉太陰少陰之而為喘之期邪隨經氣而內天則用氣不相生

滿沉為在裏而反發其表汗則胃津液越出大便遂燥為

難誤發汗致其表虛大便難裏實其虛靈不味之天君因邪久

則謔語

此承上節表虛裏實而補出尋常裏實之因以備互證

也

謔語亦有三陽合病者太陽陽明少陽三陽合為痾腹滿陽明經熱身重太陽

經熱合難於後也以轉側少陽經熱合於側也口不仁三證見而一

而面垢熱合少陽謔語熱合陽明遺尿熱合太陽之府也

上申下俱熱氣充塞矣大抵三陽主外三陰主內陽實於外陰虛於內故不可發汗以耗欲渴之陰若發汗

則譫語陽浮於外則陰孤於內故不可下之則額上生汗

手足逆冷治太陽少陽不如專顧陽明若自汗出證者陽

明而得太陽少陽之總歸白虎湯主之苟非自汗出惡表邪抑塞

此言三陽合病而為譫語也

譫語亦有二陽併病者太陽陽明二陽併病太陽病氣俱已歸併於陽明無復有頭痛惡寒之表證則

為太陽證罷但有發潮熱手足濇濇汗出大便難而譫語

者皆陽明結邪之裏證也下之則愈宜大承氣湯

此言二陽併病而為譫語也

陽明表證小之而裏證多下法之外發汗尚宜詳慎陽明病而溫鍼更無論矣然而病兼表裏又另有其法

在表脈則浮而涉於裏咽連胃脫脾開嚴於口陽明

燥口苦地地氣不升天氣不降腹滿而喘此病陽明

發熱汗出不惡寒反惡熱已詳本篇之首此病陽明身重

此陽明之表裏俱病也可轉其機為兩解之法若誤發其汗則傷腎燥傷心液

憤陰液既傷則陽邪益熾故病反增謔語若誤加燒鍼受傷必見怵

惕水火不交則為煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣乘虛動

膈又從膈而上心中懊憹舌為心苗舌上有胎者熱甚而為邪

也宜梔子散陰火熱以上心以下降引主之

此言陽明病兼表裏非汗下溫鍼所能治也

傷寒論卷之八 陽明篇 八



然梔子豉湯止為熱邪乘心之劑前證外也。恐不能兼清陽明經氣之燥熱。若更加渴欲飲水口

乾舌燥者為陽明經氣之燥熱也。又宜白虎加人湯主之。

此承梔子豉湯而進一步言也。

白虎加人參湯止清若脈深發熱渴欲飲水如前證外更加小便

不利者為陽明果及太陰脾氣不能散精歸肺。遲調水道下輸膀胱所發也。弟連脾調肺以導水。又必

以清熱。陰為本。失為陽明之治法。以猪苓湯主之。

此承白虎加人參湯又進一步言也。

猪苓湯方

猪苓去皮 茯苓 阿膠

滑石

碎  
澤瀉各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿膠烱

消溫服七合日三服

猪苓湯助脾氣之轉輸肺氣之通調利小便甚為得法矣若陽明病汗出過多而渴者

為津液外越以致中乾作渴非不可與猪苓湯以汗多胃

中燥恐猪苓湯復利其小便更走其津液故也

白陽明病脈浮而緊至此看似四節實是一節細玩其

段段相承上下聯絡以見傷寒不可執定一法用藥當

如轉環也

且陽明中有寒冷燥熱之分不可脈浮而寒則遲明今陽  
 不辨試先言下焦之虛寒夫虛則脈浮而脈則裏寒  
 上不能下合少陰癸陰癸水不能上合陽  
 水而獨主乎外則表熱少陰癸水不能上內則裏寒  
 不合而下焦生下利清穀能止者以四逆湯主之  
 陽之氣不升故下利清穀能止者以四逆湯主之  
 述此節言陽明下焦虛寒也本章凡三節以上中下三  
 焦論陽明有寒冷燥熱之病也

再言中焦若胃中虛冷視下焦之生陽不啓者彼為火虛  
 之虛冷此為土虛其土虛亦本於火虛虛  
 極則寒寒則失其消穀之用每由食少而至於不能食者若復飲水則兩寒相噦  
 此論陽明中焦虛冷也

再言上焦經脈之脈浮發熱循經脈而口乾鼻燥其能  
 燥熱熱在經脈故脈浮發乘於上焦故

食者熱在經脈不傷中焦則發血

此言陽明上焦經脈燥熱也

○陽明主闔若終闔而無開機則死矣所以言之不厭陽

明病外證未下之其外有熱而手足温熱在於不結胸胃

不能上通心中懊憹下後胃饑不能食陽明之津液主灌

於心故氣虛其津液不能周流但頭汗出而餘處者宜交通其梘

子豉湯主之能開陽明之闔須記之

此言陽明之氣不得交通上下而為扼子豉湯證也述

合下五節論陽明主闔貴得樞轉以出若闔於心胸腹

胃之間無開轉之機則死矣

其或闔於胸陽明病發潮熱則大便應鞭小大便溏而小

便自可止逆於胸脇之間也至胸脇滿而不能去者宜

樞脇而達之於外以小柴胡湯主之

此言陽明之氣闔於胸脇之間宜樞轉而出也

然而小柴胡之用不止此也夫陽明之氣由下而上出陽

明病脇下鞭滿不得由樞以出也不得由樞以出遂致三

而不大便中焦不治而為嘔上焦不通火舌上有必現白胎

者可與小柴胡湯調和三焦上焦得通而白津液得下而



利便胃氣因利而嘔止三焦通身澹然而汗出解也

此言小柴胡湯不特達陽明之氣於外更能調和上下

之氣流通內外之津液也

今從主闔之理藉樞開之陽明中氣少陽脈太陽浮陽明大

陽明兼見三脈宜可以相藉而樞開而短氣夫不能樞開而

開矣乃其氣主闔又不能得樞開而短氣出闔於腹則

腹都滿闔於脇下及心作痛久按其心腹之病處氣不

通以久按之則開而復闔也陽明之脈起於鼻鼻乾不得

汗陽明隨衛氣嗜臥土內鬱而一身及面目悉黃脾不能

其津液故小便難陽明之氣旺於申酉有潮熱陽明氣逆時時

易長倫卷主 卷四 陽明篇

噦三陽之脈循繞耳之前後邪盛於經故耳前後腫醫者取足陽明之經隨其實而刺之雖刺

之少差然樞外病轉而不解病過十日又當三陰受邪若脈續浮者

知其不涉於陰仍欲從少陽之樞而出也故與小柴胡湯以轉其樞若脈但浮別無

餘證者是病機欲從大陽之開而故與麻黃湯以助其開若不尿腹滿加

噦者是不從大陽之開而少陽之樞逆於三陰也夫不尿則甚於十日之前之小便難矣腹滿加噦則甚於十日之前

之腹卻滿時時噦矣樞轉不出逆於三陰謂非不治而何

述此節言陽明主闔必藉少陽之樞太陽之開若闔而

不能開轉則一息不運鍼機窮矣故經曰太陽為開陽

明為闔少陽為樞三經者不得相失也

以上各法無非使氣機之旋轉也陽明病自汗出不可再發其汗至於下法之穹又有導法以濟之津液既竭則大便艱不待若再發其汗兼見小便自利者此為津液內竭大便艱不待言矣然雖艱不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之大便若土瓜根及與大猪膽汁皆可為導

述此言陽明氣機總要其旋轉津液內竭者不宜內攻而宜外取也蓋以外無潮熱內無譫語與可攻之證不同須待也

蜜煎導方

蜜七合一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪之勿

令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許  
當熱時急作冷則鞭以內穀道中以手急抱欲大便時  
乃去之

猪膽汁方

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃當  
大便出

○陽明可汗之症亦有在肌在表之分茲先言其  
在肌蓋太陽以皮毛為表陽明以肌腠為表  
表氣脈遲邪干肌腠則肌腠  
虛則脈遲實而膚表虛故  
汗出多微惡寒者表未解也

可發汗宜桂枝湯也

此節合下節言陽明病在肌表而可以汗解也蓋陽明以肌腠爲表在太陽則謂之解肌在陽明則謂之發汗也

陽明病

邪在脈浮邪在表則表氣排

無汗而喘者發汗則

愈宜麻黃湯

述此陽明之表證表脈也二證俱是太陽而屬之陽明者不頭痛項強故也要知二方全爲表邪而設不爲太陽而設見麻黃證卽用麻黃湯見桂枝證卽用桂枝湯不必問其爲太陽陽明也若惡寒已罷則二方所必禁



矣

熱有鬱於氣分者陽明病昔發熱汗出此為熱從越

不能發黃也若熱氣上但頭汗出而身無汗其刺頸而還

津液不能下行而小便不利不能上行而渴引水漿者此為瘀熱在裏

土鬱色現身必發黃以茵陳蒿湯主之

述此言熱鬱氣分而為茵陳蒿湯證也合下節言陽明為燥熱之經總統氣血故可病於氣而亦可病於血也

茵陳蒿湯方

茵陳蒿六兩 梔子十四枚

大黃二兩  
未皮

有三味以水一斗先煮栝陳減六升內二味煮取三升  
去滓分溫三服小便當利尿如皂角汗狀色正赤一宿  
腹減黃從小便去也

熱有林於血分者內經云上氣不足陽明證其人喜忘者

下氣有餘久之不以時上則善忘今乃血隨氣行必有蓄血所以然者本有久瘀之血停積於

俱併於下故不得上則心氣虛故令喜忘陽明主燥其屎雖鞭血又主大

便反易血久則黑火極其色必黑宜抵當湯下之

述此言熱鬱血分而為抵當湯證也○師辨太陽蓄血

症必驗其小便利辨陽明蓄血症必驗其大便秘亦各

從其府而言之

○大承氣為陽明之攻樂然陽明病既下之而熱邪乘心胃實可攻胃虛不可攻

中懊憹而煩純似虛煩之梳子胃中有燥屎者為邪不陷於心而陷

於胃如徒用梳子不可攻若腹微滿為中土初頭鞭後

必右燥屎無不可攻之是則可攻不可攻全若有燥屎者宜

大承氣湯

述此章凡六節五節俱論大承氣湯可以攻胃實不可

以攻胃虛末節又提虛寒一條以結之○第竇有按少

腹按之爽而不拒按者無燥屎也小腹硬而拒按者有

燥屎也此辨症之捷訣

句以知胃中有燥屎也然病人不大便五六日邪入下院

所之有法陽明病下之後繞於臍作痛煩至於躁日發作有時者此有燥屎故

使不大便也

此承上文胃中有燥屎者可攻而言也

然胃實之證必以脈實病人陽氣盛而煩熱陽若汗出則解若

為憑否則又須分別解又如瘧狀日晡所發熱者屬陽明也然又有表裏之分

脈實者為病在裏宜下之若脈浮虛者為病在裏宜發汗下之與大

承氣湯發汗宜桂枝湯蓋以脈為憑不必以日晡

迹此言憑脈之虛實以辨表裏以施汗下不可概與承

氣也

脈實固宜下矣然有大下後六七日不大便煩仍不解腹仍滿痛者

此有未盡燥屎也所以然者以胃為水穀之海能容水穀三斗五升本有宿

食未盡故也宜大承氣湯以推陳致新是知大承氣湯不獨能下胃熱而亦能下宿食

述此承上文下之而言也此證着眼在六七日以六七

日不大便則六七日所食之物又為宿食所以用得大

承氣

下後有燥屎既詳其驗法矣而未病人小便不利若津液下有燥屎者又有驗之之變法



中則大便下而愈矣今大便不得其灌漑則乍結者是

邪熱耗灼清道涸竭結聚不下而喘胃胃氣不和

其未結者又於日時有微熱氣滿不喘胃胃氣不和

力流而乍易時有微熱氣滿不喘胃胃氣不和

能臥者皆有燥屎徵也宜大承氣湯

此又識燥屎之變法醫人不可以不知也

雖然陽明實熱之證固多而虛食穀欲嘔者屬陽明

寒者亦復不少胃主容穀今食穀欲嘔者屬陽明虛寒

也以吳茱萸湯主之若得此湯而反劇者人必疑此湯之

與太陰相表裏其食穀欲嘔者是陽明虛甚中見陽明為上焦之胃口轉熱也此為從陰出陽寒去

甚中見陽明為上焦之胃口轉熱也此為從陰出陽寒去

熱生之吉兆可以析其疑曰大陰屬上焦愈也書日若

濕上喜得陽明之燥氣其病機

眩厥疾不瘳其斯之謂歟

易與命爻注

卷四 陽明篇

三六

述此五節論陽明實熱之證此節又提虛寒一條以結

上文五節之意

吳茱萸湯方

吳茱萸洗一升 人參二兩 生薑六兩切

大棗十二枚

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三服

○前言大陽陽明今試重由其轉屬之義 太陽病寸緩為陽氣虛 關浮為中氣虛 尺弱

為陰氣虛 其人發熱汗出復惡寒皆為桂枝證 不嘔知其裏氣

既和緣何心但心下痞若本有者此以醫下之所致也

其不燥下者邪熱人裏則罷太陽之病人不惡寒而但渴

者此太陽轉屬陽明也小便數者津液大便必鞭是便為津

非胃家之不更衣十日亦無所為痞滿苦也若津液渴欲

飲水者少少與之燥然此但因其以通權法救之審其實

而布渴者又宜五苓散助脾氣之轉輸而使水津之散布

用飲水不至欬拜白虎知人參湯又非所宜唯助脾氣以

轉輸多飲煖水以出汗則內外俱熱須知病從太陽而入

者仍從太陽而出也此散不能養液但以陽明病與轉

屬陽明者或異或同可分可合亦視治者之活法耳  
述此章凡七節皆論太陽陽明也首節統論轉屬之意  
次節甚言津液之不可亡三節四節中言亡津液遂成

胃熱脾弱之證五節言發汗後轉屬陽明六節言吐後轉屬陽明七節總言發汗吐下皆能轉屬陽明皆所以亡

### 津液也

津液根於身脈寸熾日之真陰一脈為陽微而汗出少者陰陽同等為自和也汗

否多者陰液亡而陽反獨盛故為太過此皆自出若陽脈而不微實醫因

發其汗而何也以其出多者亦為太過為陽亢與絕而不於裏

發汗致亡津液而大便因鞅也

上節亡津液是本旨而五苓散特為轉屬證之變治非

亡津液之主方此節復足上文亡津液之意而治法自

在言外汪荅友云卽用下麻仁丸愚以爲麻仁丸未盡

其量

陽絕於裏其脈奈何蓋胃土為脈浮而芤浮為亢陽芤為

陽士貴得陰氣以和之若病人脈浮而芤無以維其陽

張陰浮芤相搏則胃氣而盛無以維其陽其陽亢

則與陰色所謂陽絕於相與真者如此

此又承上文而申言陽絕之脈

愚按浮為陽之陽言陽邪也其陽之陽言人身之陽氣

也

也

陰虛不能以和陽診之於手之氣口則芤診之於跌陽脈足之跌陽則澁跌陰者胃脈也胃為陽脾為陰今



浮而澁浮則胃陽之氣強澁則脾之津液泄而小便數浮澁相擦其

液不能返大便則難夫脾土為胃行其津液者也津液則少則其脈無可為窮

約麻仁丸主之瀉胃之陽即扶脾之陰也

此從上文陽絕之脈而補出陰虛之脈出其方治也

麻仁丸方

麻子仁二升 芍藥半斤 枳實半斤

大黃一斤 去皮 厚樸二片 炙 去皮 杏仁一斤 去皮 尖別作脂

右六味為末煉蜜桐子大飲服十九丸日三服漸加以知

為度

有汗後而陽屬者、太陽病三日發汗不解、熱從內出、蒸蒸發熱者、乃熱邪內陷與陽明水穀之氣合併而為熱、屬於胃也、必也釜底抽薪、調胃承

### 氣湯主之

述此言熱邪由汗後而八於胃府也、陽明者無形之

氣化也胃者有形之胃府也、

有吐後而轉屬者夫有形之邪在於胃之上脘宜吐而越之今傷寒吐後則上脘之腹仍

脹滿者、乃中下之實邪未解也宜與調胃承氣湯

此言吐後而熱邪仍留而未解也、

總而言之大凡太陽病若吐若下若發汗、則津液亡矣津液亡於外則燥熱甚於內故

微煩又走其津液而小便數大便因小便之數而致鞭者與小承氣湯和

之愈

此總論發汗吐下後皆可以轉屬於陽明也

○非關轉屬其病為陽明白得之病得病二日柴始滿二日值陽明主氣之期陽明為

氣血之主邪傷脈弱口得之病不關轉屬故無太陽柴胡證胃熱上

則不能自振故煩燥胃居於心下邪實於胃故心下鞭胃氣未虛則能食今病至四

五日雖能食亦不可遽以為能食而大下之宜以小承氣湯不及一升而少少

與微和之令煩躁小安至六日仍不大與小承氣湯加一升

便得大便而止甚矣小承氣湯之不可多用也如此若煩躁心不大便於六七日可

以下無疑  
矣而疑因其小便少者津液向還雖不能食而典證語

尿之不能但初頭鞭後必溏未定成鞭攻之必溏須待小便

便利屎定成鞭乃可攻之宜大承氣湯甚矣大承氣湯之不可驟用也如此

述此章凡五節論陽明自病非關轉屬首節反覆辨論

以示不可輕攻之意後四節又於陽明中從內經悍氣

之胃悟出悍熱之氣為病最急又不泥於不可輕攻之

說徐徐緩下以成莫救之患也

然亦不可拘於不輕下之說以誤事也陽明有悍熱之氣

為害最速不可不知靈樞動輸篇云胃氣上注於肺其悍

氣上衝頭者循咽上走空竅循眼系入絡腦出頰下客主

人循牙車合陽明併下人迎此衛氣別走於陽明故陰陽

上下其勤若一傷寒六七日為一經已週其悍熱之氣上走空竅而循目系故目中不了

子睛不和其悍熱之氣別走陽明上循無表裏證唯其無裏證故

大便不便而佳唯其無身不大熱微熱者此悍氣之為實

也急下之宜大承氣湯急下之以救其陰稍緩則無及矣

述此言陽明悍熱為病是當急下又不可拘於小便利

而後下之也不了者病人之目視物不明了也睛不

和者醫者視病人之睛光或昏暗或散亂也○按此症

初看似不甚重至八九日必死若遇讀薛立齋張景岳

書及老秀才多閱八家書慣走富貴門者從中作主其



死定矣。余所以不肯為無益之談，止合拂衣而去矣。

又有宜急下者。陽明病，其發熱係悍氣之汗多者，為熱勢炎炎而

無陰緩則無及。急下之宜大承氣湯。

此言悍熱之氣內出，迫其津液外下者之宜急下也。魏

于子云：止發熱汗出，無燥渴鞭實之證，而亦急下者，病

在悍氣愈明矣。

更有宜急下者，悍熱為病發汗，以傷陰不解，悍熱之氣反

陽氣盛也。陽盛則陰虛，復發汗，液其病不解，留於腹其

腹滿痛者，與燥屎之可以急下之宜大承氣湯。

述此言悍熱之氣不上走於空竅而下循於臍腹者，亦

宜急下也。以上為陽明三急下論。

三急下之外，又有不可以言急而腹滿不減，即減

亦不可以姑緩者，醫者不可不明腹滿不減，即減

分亦不足言，難不甚當下之，以其病在陽明，無形之悍氣

與陽明之木宜大承氣湯，方足以濟之也。

述承上文而言腹滿痛者固宜急下，若不痛而滿云云

雖不甚急而病在悍氣，非下不足以濟之也。問曰三

急下證，本經並不說出悍氣，茲何以知其為悍氣也？答

曰：陽明有胃氣有燥氣有悍氣，氣者別走陽明而下循於臍

腹，素問痺論云：衛氣者水穀之悍氣也，其氣慄疾滑利。

不入於脈循皮膚之中分肉之間熏氣散於曾期自  
中不了了睛不和者上走空竅也發熱汗多者循皮膚  
分肉之間也腹滿痛者熏氣膜面散胸腹也慄悍之氣  
傷人甚捷非若陽明燥實之證內歸中土無所復傳可  
以緩治也故下一急字有急不容待之意焉所謂意不  
盡言也學者得其意而通之則緩急攸分輕重立見庶  
不臨時舛錯也

按仲師自序云撰用素問大卷可知傷寒論全書皆素  
問九卷之菁華也錢塘張氏註中補出悍氣二字可謂

讀書得問然長沙何以不明提此二字乎不知傷寒論

字字皆經却無一字引經撰用之所以入神也

○今病既審脈而知其順與否陽明為金少陽為木火合

病則上受木尅必下利少陽脈弦格其脈不負者與病機為

順也若以見少陽之脈弦而不負者於正氣為失也

能乘其所勝而尅金土金土却亦能五相尅賊兩敗名為

負也蓋陽明負於少陽則下利少脈滑而數者乃有宿食

也陽明或上有餘少陽初生之當下之以平土中之敦阜

宜大承氣湯

此言陽明少陽合病審其應下者下之中寓土鬱奪之  
木鬱達之二義○述經云食入於胃散精於肝又土得  
木而踈陽明土勝少陽木屈則為頑土故木不可太勝  
土亦不可太旺平則治偏則病也

○病有不在陽明之經胸而在於陽明之絡者不可病人  
不知然而絡病下後又有瘀血與便膿血之不同病人  
外無頭痛惡表證內無諤裏證發熱七八日之期陽明主氣

退則陰雖脈浮數者宜汗而不宜下然發熱內不惡寒汗  
液日頭之不可欲為發熱證善一去路亦

可斟酌下之以除絡中之熱然謂之可者幾經假令已下其

脈浮見數不解是絡熱不因下而除合於胃熱胃則消穀

易經論卷之三十一 陽明篇 三三



喜飢至七日再值陽明主不大便者熱得燥氣而橫血有

瘀血也宜抵當湯夫抵當湯為攻瘀之的方茲不直斷之

審其有身黃小便自利喜忘如若脈存已數不解而且下

利不止是血不為熱灼而為必又協腸胃熱而便膿血也

此證溫劑有桃花湯寒劑有白頭翁湯淺而易知不必特立方治也

### 此論邪于陽明之絡處方宜詳慎而靈活也

○陽明之裏即是太陰今其傷寒法應發汗所以使發汗

已通身與目俱為黃所以然者暴感之寒邪鬱以本有寒

濕病在裏者不解故也蓋濕熱之黃以寒為黃不可下也

當於寒濕中求其法而治之

此言寒濕發黃不可誤以濕熱之法治之五苓真武皆

正方也時法加入茵陳蒿亦妙

述此章凡四節論陽明之熱合太陰之濕而為發黃證

濕熱之黃傷寒七日又當丹經之期身黃如櫛子色濕熱現於外故

鬱於裏故小便不利其腹微滿者因小便不利茵陳蒿湯二之

此言濕熱鬱於內外也

傷寒濕熱已發於外故身黃發熱而無者以梔子蘘皮湯

主之

此言濕熱之發於外也

梔子蘘皮湯方

梔子一十五箇

甘草一兩

黃蘗二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

傷寒表證未解而

痰熱在裏與太陰之濕氣混合

身必發黃

以麻黃連解

赤小豆湯主之

此言濕熱之痰於內也。述太陽之發黃乃太陽之標

熱下合太陰之濕氣陽明發黃亦陽明之燥熱內合太

陰之濕化若止病本氣而不合太陰俱不發黃故曰太

陰者身當發黃若小便自利者不能發黃也

麻黃連軀赤小豆湯方

麻黃二兩去節 赤小豆一升 連軀二兩

杏仁四十箇去皮尖 大棗十一枚擘 生梓白皮一升

生薑二兩 甘草二兩炙

右八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服半日服盡○按無梓皮以茵陳代之