

臨證指南醫案（三）

臨證指南醫案目

卷三

遺精

淋濁

陽痿

汗

脫

脾胃

木乘土

腫脹

無此病

臨證指南醫案卷三

清關李大瞻翰圖

古吳葉 桂天士先生著 錫山華南田岫雲同較

邵 銘新甫

遺精

陳 厥後吸短多遺議攝下焦

熟地、四錢 桑螵蛸、二錢

湖蓮、三錢 茄實、二錢

覆盆子、一錢 五味、一錢
茯神、三錢 山藥、二錢

某十夢遺精、濁煩勞卽發三載不痊腎臟精氣已虧相火

陰虛陽動

易動無制。故精不能固。由煩動而泄。當填補下焦。俾精充陽潛。可以圖愈。

熟地

八兩

麥冬

二兩

茯神

二兩

五味

二兩

線膠

四兩

川斛膏

四兩

沙苑

二兩

遠志

一兩

芡實

三兩

湖蓮

三兩

金櫻膏丸

馬二陰虛體質。常有夢泄之疾。養陰佐以潛劑。仍參入通藥可效。六味去丹澤。加湖蓮。芡實。五味。遠志。秋石。

金櫻膏丸

張陰精走泄。陽失依附。上冒爲熱。坎水中陽不藏。古人必以厚味填之。介類潛之。乃從陰以引陽。與今人見熱。

投涼不同。

熟地

龜甲

淡菜

青鹽

茯神

柏子仁

女貞子

山藥

旱蓮草

某二脈左弦右濡夢遺咳逆氣急。

熟地

麥冬

萸肉

五味

牡蠣

茯神

女貞子

山藥

湖蓮

川斛膏

芡實

金櫻膏

加蜜丸

每服四五錢

淡鹽湯下

楊 脹垂入尺有夢遺精議填陰攝固其下。

熟地

萸肉

五味

山藥

茯神

覆盆子

遠志

線膠

湖蓮

芡實

金櫻膏丸鹽湯下

劉

先患目疾流淚嘈雜不欲食內鬱勃陽氣過動陰虛
不主攝納春半連次遺泄腰脊酸楚皆肝腎病矣

熟地

龍骨

萸肉

茯神

丹皮

湖蓮

芡實

遠志

某

勞損漏瘻大便時溏陰火上升下則遺滑

熟地

龜版

芡實

山藥

女貞

建連

炙草

稽豆皮

某

少年頻頻遺精不寐心嘈乃屬腎中有火精得熱而
妄行日後恐有腎消之累

焦黃柏

生地

天冬

茯苓

煅牡蠣

炒山藥

某

脈虛色白。陡然大瘦。平昔形神皆勞。冬至初陽動精。

搖下泄。加以夜坐不靜。養暴寒。再折其陽。身不發熱。時

時驚惕煩躁。從仲景亡陽肉瞞例用救逆湯法。必得神

氣凝靜。不致昏瘡癰癧之變。救逆湯去芍。

費

色蒼脈數。煩心則遺。陽火下降。陰虛不攝。有濕熱下

注。此固滯無功。

熱
陰虛濕

草薢

黃柏

川連

遠志

茯苓

澤瀉

桔梗

苡仁

吳二病形在腎肝。但得瀉頭中痛微緩少腹陰囊亦脹。想陰分固虛而濕熱留着致腑經之氣無以承流宣化理。固有諸先泄厥陰鬱熱兼通腑氣再議。

龍胆草

胡黃連

草薢

丹皮

茯苓

澤瀉

又。閱病原。是臟陰陰精之虧。致陽浮頭痛。兼有遺精。月數發。下虛上實。純以補濇。決不應病。性不耐丸劑。與通攝兩用。

龜版

藥症必通篇
卷之三
亦基全石

秋石

熟地

女貞

遠志

芡實

湖蓮

茯苓

熬膏

錢十二脈右弦左垂陰虛濕熱遺精瘡蝕。

黃柏

知母

熟地

草薢

茯苓

遠志

蜜丸

某夢遺病乃是陰氣走泄而濕熱二氣乘虛下陷墜自

腰中至囊環跳膝蓋諸處可見久遺八脈皆傷議用通

藥兼理陰氣 猪苓湯

又熟地

五味

芡實

茯苓

湖蓮

山藥

宋二無夢頻頻遺精乃精竅已滑古人謂有夢治心無夢

治腎腎陰久損陽升無制喉中貯痰不清皆五液所化。

下損及
脾胃
中兼治

胃納少而運遲。固下必佐健中。

人參、桑螵蛸、生龍骨、鎖陽、

桂附子

、遠志、金櫻膏丸、

、芡實、

、桂附子

熟地、

茯神、

、遠志、

金櫻膏丸、

一

、桂附子

華_二九神傷於上精敗於下心腎不交久傷精氣不復謂之損內經治五臟之損治各不同越人有上損從陽下損從陰之議然必納穀資生脾胃後天得振始望精氣生於穀食自上秋至今日甚乃裏真無藏當春令泄越生氣不至漸欲離散從來精血有形藥餌焉能驟然充長攻病方法都主客邪以偏治偏閱古東垣丹溪輩於損不肯復者首宜大進參术多至數觔謂有形精血難生

無形元氣須急固耳。况上下交損，當治其中。若得中甦加穀，繼參入攝、納、填、精、斂、神之屬。方今春木大泄，萬花盡放，人身應之。此一月中急挽勿懈矣。

參术膏米飲調送

接進寇氏桑螵蛸散去當歸

此寧神固精收攝散亡乃濇以治脫之法。

又 半月來服桑螵蛸散以固下參术膏以益中遺滑得止其下關頗有收攝之機獨是晝夜將寢心中諸事紛紛來擾神傷散越最難斂聚且思慮積勞心脾營血暗損血不內涵神乃孤獨議用嚴氏濟生歸脾方使他臟

真氣咸歸於脾。今夏前土旺司令，把握後天。於理最合。

歸脾湯

立夏四日，診左脈百至餘，頗有斂聚之意。右關及尺，芤動若革，按臍下過寸，動氣似若穿梭，此關元內空衝脈失養，而震躍不息。此女子胞胎，男子聚精之會也。大凡內損精血形氣，其胃旺納食者，務在滋填。今食減不納，假寐片晌，必煩驚惕，醒而汗。自述五心熱熾，四肢骨節熱痿如墮，明是陰精內枯，致陽不交陰，轉枯轉涸。自下及中至上，前投桑螵蛸散，固濇精竅，遺滑經月不來。奈寢食不加，後天生氣不醒，膿厚填補於理難進。卽參

聰明人易於悟。若能刻刻加此自考其學，必更進矣。

术甘溫益氣。又恐益其枯燥。宜參生脈以滋三焦。晨進入乳一杯。使氣血陰陽引之導之。迎夏至一陰來復。早用人乳一盞。隔湯燉熟服。午後略饑。用生脈四君子湯。

又一月來雖經反覆。參脈症形色生陽頗有根蒂。近食蚕豆滯氣。腹中微膨。食後口味酸濁。是久臥重着。脾陽運動之機尚少。而火升心煩。動氣汗出遺精。雖減於昔。未得平復。總是內損已深。若調治合宜。只要精氣復得一分。便減一分。病象長夏脾胃主令。培土助納爲要。而精氣散越。仍兼攝固之法。刻下味酸微膨。補脾少佐疏胃。宜晚進。其早上另製補攝丸劑。益臟真以招納散失。

之氣

晚服人參

茯苓

白术

炙草

廣皮

華氏五大醫案
功過相半學者
能於此處細細
分別學必大進

早方人參丸

桑螵蛸

白龍骨

淡蕘蓉

五味

芡實

茯神

棗仁

金箔

金櫻膏丸淡鹽湯送三四錢

右弦胃氣所
難復

又形色有漸復之象。較之夏至病去三四。但診右脈弦大。尚少冲和。左脈細促未靜。穀進運遲。有吞酸脹脹。寐中仍欲遺精。此中焦之陽宜動則運。下焦之陰固則能守。乃一定成法。午後服異功散加炒穀芽。

晨服

遺症固滯下焦乃通套治法。想精闢已滑滯劑不

能取效必用滑藥引導同氣相求古法有諸。

牛骨髓

羊骨髓

猪脊髓

麋角膠

白龍骨

生牡蠣

熟地

萸肉

茯神

五味

山藥

芡實

湖蓮

遠志

砂仁

膠體代蜜丸

晨服四錢

秋石二分化水下

毛二長夏暑濕熱鬱都令脾胃受傷色黃神倦氣分自餒。
因有遺泄一症在盛年陰虛爲多及詢納食未爲強旺。
遺發必勞煩而來脈象非數搏議以養脾立法。

歸脾去黃芪桂圓加益智龍骨

治病立方必有
妙義精思一味
蠶補終有附錄
之患

項脈左弱右弦色黃食少腹脹便溏常有夢遺洩此非
陰柔濡膩可服用煦陽以涵陰。

毫毛絲子 覆盆子 蛇床子 五味子 韭子

益智仁 煙補骨脂 龍骨 建蓮粉丸

陰精走泄陽不內依欲寐卽醒心動震悸所謂氣因
精奪當養精以固氣從前緩藥不錯但不發剛柔爲偏
陽是以見血莫見血投涼

龜版去牆削光一兩桑螵蛸殼三人參一錢 當歸一錢

青花龍骨飛三錢抱木茯神三錢

姚二始於念萌不遂其慾陽下隣而精洩先夢者心陽注

腎久則精血日損。不充養筋骨爲痛。下損及中食不運化。此非更地。膩膈以及。濇精可效。妙香散。

許十陰氣走泄遺精。務宜滋填塞固。今納穀少而不甘。胃氣既弱。滋膩先妨胃口。議用桑螵蛸散。蜜丸服三四錢。戈遺精數年。不但腎關不固。陽明脈絡亦已空乏。欲得病愈。宜戒慾寧心一年。寒暑更遷。陰陽漸交。用桑螵蛸散治之。

顧十九滑精。用陰藥頓然食減。藥先傷胃。據述夢寐驚狂。精走無以護神。當固無形矣。

人參

生龍骨

桑螵蛸

益智仁

茯神

茯苓

遠志

木香

呂七有夢乃遺。是心有所觸而致經營操持皆擾神動心。
說商賈客於外。非關酒色矣。妙香散。

俞三壯年形質偉然。脈來芤虛。述心悸怔多畏懼。夜寐不
甚寧靜。此陽不易交於陰。過用勞心使然。用妙香散。

張四形壯脈小。自述心力勞瘁。食減遺精。倣景岳精因氣
而奪。當養氣以充精理。其無形以固有形。妙香散。

支二痰多鼻塞。能食有夢遺精。醫投疏泄肺氣消痰。六十
劑不効。問讀書夜坐。陽氣必升。充塞上竅。上盛下衰。寐
則陽直降。而精下注爲遺。用補心丹。

黃三真陰損傷，而五志中陽。上燔喉痛，下墜爲遺精。髓日耗，骨痿無力。必延枯槁而後已。藥餌何足久恃。

早服補心丹 晚服桑螵蛸散

胡

遺精四年。精關久滑不固。陰久傷。陽氣不入。陽躡穴夜寤不寐。前以鎮攝小效。獨心中怔悸不已。以桑螵蛸散從心腎治。

畢

二六有夢遺精。是心腎病。清心固腎。是爲成法。得以水火

交合。病當漸減。內傷病從內起。豈得與外來六氣混治。

熟地

龍骨

遠志

五味

茯神

芡實

建蓮

金櫻膏丸

程。左脈剛堅。火升。神氣欲昏。片刻平復。宛若無病。此皆勞心五志之陽動。龍相無制。常有遺泄之狀。先用滋腎丸三錢。淡鹽湯送。

又早服補陰丸。晚服三才加炒黃柏砂仁。

又交霜降。絡中陡然熱蒸。肢節皆麻。火風震動。多因脾腎液枯。議用二至百補丸。意斑龍二至百補丸加黃柏。林入診脈細濶。寐則遺精。心熱口渴。不時寒熱。此腎陰內損。心陽暗熾。補心丹三錢四服。

某冬令煩倦。嗽加。是屬不藏。陽少潛伏。兩足心常冷。平時先夢而遺。由神馳致精散。必鎮心以安神。猶喜胃強。

納穀。若能保養，可望漸愈。

桑螵蛸

金樓子

覆盆子

芡實

遠志

茯神

茯苓

龍骨

湖蓮

煎膏煉蜜收，餓時服七八錢。

楊十八冲年遺精，知識太早，難成易虧。真陰不得充長，及壯盛未有生育，而久遺滑漏。褚氏謂難狀之疾者，蓋病傷可復，精損難復也。診脈上動尺芤，心動神馳，神馳精散，草木性偏焉。得見長務，宜斷慾百日，以妙香散、桑螵蛸散方，理心脾以交腎，固腎氣以寧心。早晚並進，百日以驗之。

呂

二成婚太早，精血未滿久洩，必關鍵不攝。初則精虧變

濁，久則元精滑溢，精濁之病。巢氏分晰彰著，經言腎虛

氣漫爲脹，鹹爲腎味。上溢口舌，皆下失攝納之權。

生兎絲子粉 蛇床子 覆盆子 陝沙苑子

家韭子 五味子 鯉魚膠丸

許九脈虛芤，應乎失血遺精。先天既薄，更易泄少藏。正褚氏所云難狀之疾，冲年須潛心靜處，冀水火自交，可以精固，莫但圖藥餌，須堅守瞬刻強制之功。

鮮河車膏 九蒸熟地 五味

萸肉

山藥

湖蓮

砂仁

芡實

金櫻膏丸

李二脈小色白失血遺精屢發猶喜納穀胃安封藏固補使其藏聚若再苦寒瀉火胃傷廢食坐以待困矣。

熟地

萸肉

五味

覆盆子

河車膏

生鬼絲粉

山藥

湖蓮

茯苓

芡實

金櫻膏丸

某脈左部數有鋒芒初夏見紅久遺滑入夜痰升肋痛。

肝陽上冒腎弱不攝固攝助納必佐涼肝。

熟地

湖蓮

芡實

生白龍骨

茯神

川石斛

章脈數虛氣衝心熱。嗆咳失血屢因嗔怒肝陽升則血
兼失血

涌墜則精遺。春末土旺。入夏正當發泄主令。暮蒸晨汗。
陰陽樞紐失固。議進攝真。其清寒肺藥須忌。

魚鱠膠 生龍骨 桑螵蛸 茶實

茱萸 五味 秋石調入

陸一肌肉鬆柔。脈小如數。常有夢遺。陰精不固。上年冬令
過溫。溫則腠理反疏。陽動不藏。諸氣皆升。絡血隨氣上
溢。見症如頭面熱。目下肉瞤。心悸怔忡。四肢汗出。兩足
跗腫。常冷不溫。走動數步。卽吸短欲喘。何一非少陰腎
氣失納。陽浮不肯潛伏之徵。况多夢紛擾。由精傷及神
氣。法當味厚填精。責重鎮神。佐以收之。甘以緩之。勿

遺精之方十日
六七令人心煩

因血以投涼。莫見下寒。輒進燥熱。恪守禁忌。以安之。經年冀有成功。所慮冲年志慮未純。貽憂反覆。

水製熟地

人參

秋石

白龍骨

炒杞子

五味

炒山藥

茯神

牛膝炭

遺精之法固平
外乎填精鎮心
本無神妙方。法
俗醫往往用溫
熱及粘膩等物。
必至傷人。此老
全不犯此。但此
症總有伏邪。爲
患如火如痰。如
濕如風。不能搜
剔。餘邪難以排
和臟氣委曲。

小腸膀胱病。夫精之藏制雖在腎。而精之主宰則在
心。其精血下注。濕熱混搖而遺滑者。責在小腸膀胱。
故先生於遺精一症。亦不外乎。寧心益腎。填精固攝。

清熱利濕諸法。如腎精虧乏。相火易動。陰虛陽冒。而爲遺精者。用厚味填精介類潛陽。養陰固濇諸法。如無夢遺精。腎關不固。精竅滑脫而成者。用桑螵蛸散。填陰固攝。及滑濇互施方法。如有夢而遺。煩勞過度。及脾胃受傷。心腎不交。上下交損而成者。用歸脾湯。妙香散。參木膏。補心丹等方。心脾腎兼治之法。如陰虛不攝。濕熱下注而遺滑者。用黃柏草薢。黃連芩澤等。苦泄厥陰鬱熱。兼通腑氣爲主。如下虛上實火風震動。脾胃液枯而爲遺滑者。用二至百補丸。及通攝下焦之法。如龍相交熾。陰精走泄而成者。用三才封

髓丹滋腎丸。大補陰丸。峻補真陰。承制相火。以瀉陰中伏熱爲主。又有房勞過度。精竭陽虛。寐則陽陷而精道不禁。隨觸隨泄。不夢而遺者。當用固精丸。升固八脈之氣。又有膏粱酒肉飲醇厚味之人。久之脾胃釀成濕熱。留伏陰中。而爲夢泄者。當用劉松石猪肚丸。清脾胃蘊蓄之濕熱。立法雖爲大備。然臨症之生心化裁。存乎其人耳。鄒滋丸。

淋濁

濕熱

某二三濕熱下注淋濬當分利。

草薢

淡竹葉

瞿麥

赤苓

細木通

扁蓄

某二八濕熱下注。濁痛淋濬先用分利法。

草薢

淡竹葉

木通

赤苓

茵陳

海金沙

魏

脈數垂淋濬愈後再發脅脹便不爽餘滴更盛。

草薢

猪苓

澤瀉

白通草

臨邑

海金沙

晚蠶沙

丹皮

黃柏

又滯濁下行痛緩議養陰通腑。

阿膠

生地

猪苓

澤瀉

山梔

丹皮

毛三壯盛體豐當夏令濕熱蒸迫水穀氣墜而有溼濁服寒涼腹脹得固滯無效皆非腑病治法子和桂芩飲

又前用甘露飲淋濁已止而頭暈左肢麻木冒眩腹中
清上利下
饑則欲痛咽喉中似有物粘著咳咯咽飲不解診脈左
勁右滿據症是水弱木失滋涵肝陽化風過膈達咽達
嶺大乘胃土陽明脈衰不司東筋骨以利機關腕腹中

痛得食則緩者。胃虛求助也。今壯年有此。已屬病中根。
萌養肝腎之液以熄虛風。補胃土以充絡脈。務在守常。
勿圖速效。可望全好。

製首烏

蕤蓉

天冬

杞子

柏子霜

茯神

菊花炭

青鹽

紅棗肉丸

服四錢

晚服豬肝丸方

某膏淋濁膩濕熱居多。然亦有勞傷腎傷。下虛不攝者。
今以酒客。腹中氣墜。便積苦辛寒分消治。

黃柏

茯苓

草薢

海金沙

川棟子

青皮

防己

蠶沙

汪 脈左堅入尺。濕熱下墜。淋濁痛。滋腎丸。

周二便濁莖痛。滋腎丸三錢。

吳

二四

久瘡不愈。已有濕熱。知識太早。陰未生成。早泄致陽。

光易升。易降。牙宣。齦血。爲濁爲遺。欲固其陰。先和其陽。倣丹溪大補陰丸。合水陸二仙丹。加牡蠣金櫻膏丸。

黃 舌白氣短。胸中痛。目暗。微淋。乃陰虛於下。氣阻於上。

暫停參劑。早上服都氣丸三錢。晚服威喜丸二錢。

葉 八 脈數形瘦。素有失血。自覺氣從左升。痰嗽隨之。此皆

積勞。陽氣鼓動。陰弱少制。六味壯水和陽極是。近日便

濁。雖宜清熱。亦必顧其陰體爲要。

生地

丹皮

甘草梢

澤瀉

山梔

黑豆皮

某陰虛濕熱在腑爲濁

六味去萸加車前牛膝黃柏

萆薢

某遺由精竅淋在溺竅異出同門最宜分別久遺不攝

是精關不攝爲虛但點滴莖中痛痒久腹堅滿此屬淋

閉乃隧道不通未可便認爲虛况夏令足趾濕腐其下焦先蘊濕熱熱阻氣不流行將膀胱擣滿故令脹堅議

理足太陽經五苓散

某四淋濁溺短濶痛先通陽氣

下焦陽
不流行

高醫指掌錄卷之三

卷之三 淋濁

十六

心火下
陷

草薢 三錢

烏藥 一錢

益智 五分

赤苓 三錢

遠志 四分

琥珀末 五分

蕭 脈沉淋濁 分清飲加山梔丹皮茯苓猪苓

某 淋濁小便不利當清利火腑 導赤散生地用細者

加赤苓瞿麥

心熱下遺於小腸則爲淋濁用藥以苦先入心而小腸火腑非苦不通也既已得效宗前議定法

人參

黃柏

川連

生地

茯苓

茯神

丹參

桔梗

石菖蒲

王 淋屬肝膽濁屬心腎心火下陷陰失上承故瀦濁不

禁。

人參

川連

生地

茯神

氣閉

某氏氣閉成淋。

柏子仁

遠志

紫苑
瓜蔞皮

枇杷葉
鬱金

杏仁
黑山梔

降香末

膀胱熱
血淋

又食入痞悶。小便淋痛。

照前方去紫苑黑梔加苡仁

某三小溲短赤帶血。

導赤散加琥珀末五分赤茯苓

胡三熱入膀胱。小溲血淋。莖中猶痛。非止血所宜。議用錢

氏導赤散加知柏以清龍雷。

許十血淋尿管溺而痛。脈沉實形色蒼黑。治從腑熱。

蘆薈

山梔

郁李仁

紅花

當歸

酒大黃

龍膽草

丹皮

又血淋未已。用堅陰清熱。

小生地

粉丹皮

黃柏

知母

淡竹葉

山梔

非血淋也

虛精濁陰

祝四中年已後。瘦人陰虧有熱。飲酒濕熱下墜。精濁痔血。皆熱走入陰。則陰不固攝。前方宗丹溪補陰丸。取其介屬潛陽苦味堅陰。若用固滯。必致病加。

水製熟地

龜版膠

鹹秋石

天冬

茯苓

黃柏

知母

豬脊筋搗丸

范二精走濁淋。脊骨生熱屬陰虛胃弱勿用膩滯。

龜腹甲心

覆盆子

五味

歸身

鹿角膠

秋石

芡實

金櫻膏丸

腎氣不
攝

戈四

脈左細勁腰痠溺有遺瀝近日減穀難化此下焦臟

陰虛餒漸及中焦腑陽收納肝腎勿損胃氣

熟地

杞子

柏子仁

當歸身

紫衣胡桃

補骨脂

杜仲

茯苓

青鹽

蜜丸

某六旬有五下焦空虛二便不爽溺管痺痛姑與腎氣

湯主治。腎氣湯細絹濾清服

朱六三血淋管痛。腑熱爲多。經月來。每漏或大便。其墜下更甚。想陰精既損。腎氣不收故也。

鹹蕊蓉 柏子仁 杞子 大茴

牛膝 茯苓 非血淋方也

某淋濁經年。陽損腰痛畏冷。

熟地 杞子 鹿角膠 巴戟

杜仲 柏子仁 潤蓮 茶實

敗精濁
瘀阻竅

葉

七淋屬肝膽。濁屬心腎。據述病。溺出渾濁如膿。病甚則

多或因遺泄後。濁痛皆平。或遺後痛濁轉甚。想精關之間必有有形敗精凝阻其竅。故藥中清潔熱通腑及固

濟補陰久餌不效先議通瘀腐一法考古方通淋通瘀用虎杖湯今世無識此藥每以杜牛膝代之

用鮮杜牛膝根水洗淨搗爛絞汁大半茶杯調入真麝香一分許隔湯燉溫空心服只可服三四服淋通卽止倘日後病發再服

又 淋病主治而用八正分清導赤等方因熱與濕俱屬無形腑氣爲壅取淡滲苦寒濕去熱解腑通病解若房勞強忍精血之傷乃有形敗濁阻於隧道故每溺而痛徒進清濕熱利小便無用者以溺與精同門異路耳故虎杖散小效以麝香入絡通血杜牛膝亦開通血中敗

濁也。

此治淋血爲淋之方

。圭白汁九製大黃一

。生白牽牛子一

。兩

歸鬚五錢

桂枝木生三錢

炒桃仁二

兩

小茴三錢

圭白汁法丸

李

敗精凝隧通瘀癥宣竅已效

生桃仁 杜牛膝 人中白 生黃柏 膜香二分

調入

徐四五旬又四勞心陽動陰液日損壯年已有痔瘍腸中
久有濕熱酒性辛溫亦助濕熱熱下注爲癰爲淋故初
病投八正五苓疎氣之壅也半年不痊氣病漸入於血
絡考古方惟虎杖散最宜 虎杖散

張丹溪謂五淋症濕熱阻竅居多三年前曾有是病月

前舉發竟有血塊、窒塞、尿管大痛，不能溺出。想房勞強忍，敗精離位，變成污濁瘀腐，且少腹堅滿，大便秘滯，臟氣無權，腑氣不用。考瀕湖發明篇中，有外甥柳喬之病，與此適符。今倣其義，叅入朱南陽法。

下瘀血爲淋

兩頭尖

川棟子

韭白

小茴

桂枝

歸尾

沖入杜牛膝根汁

又 痛脹皆減，滴瀝成淋。前投通濁已效，只要凝塊全無，便不反覆。陰藥呆鈍，桂附劫液通陽，柔劑爲宜。

茺蔚

歸尾

柏子仁

炒遠志

杞子

茯苓

小茴

當加入養皿藥

馬淋、閟屬肝膽居多，桂附劫陰與剛臟不合。診脈沉濇無力，非五苓八正可投。議用朱南陽法，仍是厥陰本方耳。

老韭根白一兩兩頭尖一百粒小茴香五分川棟子肉一錢

歸鬚二錢

穿山甲末一錢

徐

由淋痛漸變赤白濁。少年患此，多有慾心暗動，精離本宮，腐敗凝阻，溺竅而成。乃有形精血之傷。三年久病，形消肉減，其損傷已非一臟一腑。然補精充髓，必佐宣通，爲是自能潛心安養，尙堪帶病延年。

熟地

生麋角

從蓉

炒遠志

赤苓

牛膝

某每溺尿管窒痛。溺後渾濁敗精阻竅。濕熱內蒸。古方虎杖散宣竅通腐甚妙。若去麝香必不靈效。較諸湯藥更上一籌矣。

酒煨大黃 炒龍膽草 炒焦黃柏 牽牛子

川棟子

黑山梔

小茴

沉香汁

某陰精上蒸者壽。陽火下陷者危。血淋久而成形窒痛。煩心心火直升。老人陰精已憊。五液化成敗濁阻竅不通。欲溺必痛。得泄痛減。卽痛則不通。痛隨利緩之謂。故知柏六味及歸脾逍遙之屬愈治愈劇。其守補升補滋。

滯濇藥。決不中病。用琥珀痛減。乃通血利竅之意。然非久進之方。以不傷陰陽之通潤立方。

生地

益母草

女貞子

阿膠

琥珀

稽豆皮

奇脈病

顧二敗精宿於精關。宿腐因溺強出。新者又瘀在裏。經年累月。精與血並皆枯槁。勢必竭絕成勞。不治醫藥當以任督衝帶調理。亦如女人之崩漏帶下。醫者但知八正分清。以濕熱治。亦有地黃湯益陰。瀉陽總不能走入奇經。

鹿茸

龜甲

當歸

杞子

此方不能通用
驗精

茯苓

小茴

鮑魚

夏六、桑臘神耗過動天君。陽燧直升，直降水火不交。陰精變爲腐濁，精濁與便濁異路。故宣利清解無功。數月久延其病，傷已在任督。凡八脈奇經，醫每棄置不論。考孫真人九法，專究其事。欲涵陰精不漏，意在升固八脈之氣。錄法參末，方不甚清楚。

鹿茸

人參

生兔絲粉

補骨脂

韭子

柏齒香

覆盆子

茯苓

胡桃肉

柏子霜

蒸餅爲丸

劉九脈緩濶，後有血，或間成塊。晨傾溺器，必有膠濁粘

膩之物。四肢寒凜。納食如昔。病傷奇脈。

生鹿茸

當歸

杞子

柏子仁

沙苑子

小茴

此非治血淋之方

王五悲憂驚恐。內傷情志。沐浴薰蒸。外泄陽氣。絡中不寧。血從漏出。蓋衝脈動。而諸脈皆動。任脈遂失擔任之司。下元真氣。何以固納。述小便欲出。有痰楚如淋之狀。診脈微小滯。最宜理陽通補。用青囊斑龍丸。

淋有五淋之名。濁有精濁便濁之別。數者當察氣分與血分。精道及水道確從何來。大凡秘結宜通滑脫。當補若因心陽亢而下注者。利其火腑。濕熱甚而不

治淋之法有通
有塞要當分別
有瘀血積塞住
膀胱者宜先通
無瘀積而虛滑
者宜峻補不但
煎丸各別并外
治之法亦復多
端宜博識而詳
攷之案中並未
見及也

宣者徹其泉源氣陷用升陽之法血瘀進化結之方。
此數端人所易曉也獨不知厥陰內患其症最急少
腹遠前陰如刺小水點滴難通環陰之脈絡皆痺氣
化機關已息先生引朱南陽方法兼參李瀕湖意用
滑利通陽辛鹹泄急佐以循經入絡之品豈非發前
人之未發耶若夫便濁之恙只在氣虛與濕熱推求
實者宣通水道虛者調養中州若虛實兩兼又有益
臟通腑之法精濁者蓋因損傷肝腎而致有精瘀精
滑之分精瘀當先理其離宮腐濁繼與補腎之治精
滑者用固補斂攝倘如不應當從真元調之景岳謂

理其無形。以固有形也。然此症但知治肝治腎。而不知有治八脈之妙。先生引孫真人九法升奇陽。固精絡。使督任有權。漏卮自己可見。平日若不多讀古書。而臨症焉知此理。若不經先生講明。予今日亦不知此方妙處。又尿血一症。虛者居多。若有火。亦能作痛。當與血淋同治。倘清之不愈。則專究乎虛。上則主於心脾。下則從乎肝腎。久則亦主於八脈。大約與前症相同。要在認定陰陽耳。邵新甫

陽痿

徐三脈曰：小數濇上熱火升。喜食辛酸爽口。上年因精滑陽痿。用二至百補通填未效。此乃焦勞思慮鬱傷。當從少陽以條暢氣血。

柴胡

薄荷

丹皮

鬱金

山梔

神麴

廣皮

茯苓

生薑

心腎不
交

仲二三旬以內而陽事不舉。此先天稟弱。心氣不主下交於腎。非如老年陽衰。例進溫熱之比。填充髓海。交合心腎宜之。

勞心過度

熟地

雄羊腎
杞子

補骨脂

黃節

遠志

茯苓

胡桃

青鹽

鹿筋膠丸

王七述未育子向衰莖縮凡男子下焦先虧客館辦事的
運神思心陽久吸腎陰用斑龍聚精茸珠合方

男子以八爲數年逾六旬而陽事痿者理所當然也。
若過此猶能生育者此先天稟厚所謂陽常有餘也。
若夫少壯及中年患此則有色慾傷及肝腎而致者。
先生立法非峻補真元不可蓋因陽氣既傷真陰必
損若純乎剛熱燥滯之補必有偏勝之害每兼血肉
溫潤之品緩調之亦有因恐懼而得者蓋恐則傷腎。

恐則氣下治宜固腎稍佐升陽有因思慮煩勞而成者則心脾腎兼治有鬱損生陽者必從膽治蓋經云

凡十一臟皆取決於膽又云少陽爲樞若得膽氣展舒何鬱之有更有濕熱爲患者宗筋必弛縱而不堅舉治用苦味堅陰淡滲去濕濕去熱清而病退矣又

有陽明虛則宗筋縱蓋胃爲水穀之海納食不旺精非專論數千言多端更僕難盡不不明密旨另詳茲不復贅

岫雲

陽痿之病其症多端更僕難盡

衛陽虛

汗

某二脈細自汗下體怯冷衛陽式微

微微然

黃芪三錢

熟附子

七分

熟於朮一錢半

分

炙草

五分

煖薑一錢

南棗三錢

朱三脈微汗淋右脇高突而更色痿足冷不食易飢食入六卽飽此陽氣大傷衛不擁護法當封固

人參

黃芪

製川附子

熟於朮

孫五肉瞞筋陽心悸汗出頭痛愈畏風怕冷陽虛失護用八

真武湯

既現汗症必兼
汗治甚附意能
治陽虛之汗若
陽盛之汗則反
有害

某勞傷陽虛汗泄。

此方不治陽虛之汗

黃芪三錢 白朮二錢 防風六分 灸草五分

顧氏勞力憤怒心背皆熱汗出往時每以和陽治厥陰肝臟得效今年春夏經行病發且食納頓減褚氏謂獨陰無陽須推異治通補既臻小效不必見熱投涼用鎮其陽以理虛。

人參

此為正方

半夏

茯苓

炙草

牡蠣

小麥

南藥

張五脈弦大身熱時作汗出良由勞傷營衛所致經云勞者溫之六脈弦大身熱時作汗出良由勞傷營衛所致經云勞者溫之

嫩黃芪三錢

當歸一錢半

桂枝木一錢

白芍一錢半

炙草五分

煨薑一錢半

南棗三錢

某二脈細弱。自汗。體冷。形神疲瘁。知饑少納。肢節痠楚。病在營衛。當以甘溫。

生黃芪

桂枝木

白芍

炙草

煨薑

南棗

某汗出寒凜。真氣發泄。痰動風生。用辛甘化風法。

生黃芪

桂枝

炙草

茯苓

防風根

煨薑

南棗

梅四案牘積勞。神困食減。五心汗出。非因實熱。乃火與元

胃陰虛

氣熱不兩立。氣泄爲熱。爲汗。當治在無形。以貢火宜清。

虛熱宜補耳。議用生脈四君子湯。

新加牡蠣

方

茹素惡腥。陽明胃弱。致厥陰來乘。當丑時。濶然汗出。

少寐多夢。

人參

龍骨

茯神

棗仁

炒白芍

炙草

煎藥吞送

蒸熟五味子三十粒

又 鎮攝汗止火升咳嗽。仍屬陰虛難得充復。育陰滋液
爲治。

川斛

茯神

熟地炭

人參

炒麥冬

五味

炒萸肉

女貞子

接服瓊玉膏方

出總由于心

不寧屬熱者

多屬寒者少今

諸方皆用補陽

治法乃一偏之

見皆由不知汗

出之液在何經

也悞人多矣。

氣飛越下焦空

症非參附不能

回陽與自盜等

大不相同醫者

全然不知并爲

一病貽悞無窮

經云。陽之汗。以天地之雨名之。又云。陽加於陰。謂之汗。由是推之。是陽熱加於陰。津散於外。而爲汗也。夫心爲主陽之臟。凡五臟六腑表裏之陽。皆心主之。以行其變化。故隨其陽氣所在之處。而氣化爲津。亦隨其火擾所在之處。而津泄爲汗。然有自汗。盜汗。之別焉。夫汗本乎陰。乃人身之津液所化也。經云。汗者。心之液。又云。腎主五液。故凡汗症。未有不由心腎虛而得之者。心之陽虛。不能衛外而爲固。則外傷而自汗。不分寤寐。不因勞動。不因發散。溱溱然自出。由陰蒸虛此乃危急之症。非參附不能回陽與自盜等。大不相同醫者。全然不知并爲一病。貽悞無窮。

汗盜汗者。卽內經所云寢汗也。睡熟則出。醒則漸收。由陽蒸於陰分也。故陽虛自汗。治宜補氣以衛外。陰虛盜汗。治當補陰以營內。如氣虛表弱。自汗不止者。仲景有黃芪建中湯。先賢有玉屏風散。如陰虛有火盜汗發熱者。先賢有當歸六黃湯。柏子仁丸。如勞傷心神氣熱汗泄者。先生用生脈四君子湯。如營衛虛而汗出者。宗仲景黃芪建中湯。及辛甘化風法。如衛陽虛而汗出者。用玉屏風散。芪附湯。眞武湯。及甘麥大棗湯。鎮陽理陰方法。按症施治。一絲不亂。謂之明醫也。夫復奚愧。鄒滋九

第一以涼心爲主竟不卷之

此湯並不以此禁

此是二陽之方

陽脫

脫

陳遺尿目瞑口開面亮汗油陽飛欲脫無藥力挽擬參附湯法加入童便圖元真接續耳。

又子丑爲陰陽交界之時更逢霜降正不相續後現脫

象進兩攝陰陽方參附湯加五味子

又陽回汗止神甦無如陰液欲涸心熱渴飲姑救胃汁

人參 麥冬 五味 茯神 建蓮

又腎真未全收納便溺自遺無如咽燥喉痛陽雖初回陰氣欲盡難進溫熱之補大意收攝真陰爲治

人參

麥冬

五味

熟地炭

茯神

遠志炭

菖蒲根

又 胃虛客氣上逆爲呃噫痰帶血腥咽中微痛用鎮攝法。

人參

熟地

北味

茯神

青鉛

周 脈革無根左尺如無大汗後寒症頭顱痛躁渴不寐。

此屬亡陽平昔飲酒少穀回陽辛甘未得必達有乾嘔格拒之狀真危如朝露矣勉議仲景救逆湯收攝潰散之陽冀有小安再議治病。救逆湯加參附

此是妊娠症

徐 恰交第七日鼾聲呵欠目瞑煩躁診脈微細而促此

致心熱渴飲又用麥冬五味以收火氣入于肺子陰也故欲止其汗必用陰藥以維繫之如直武湯爲亡陽之祖方必重用白芍此義顯然今純用陽藥已屬一偏又不知卽用納陰之藥以

情反覆歷歷不爽今特指明之後之學者宜審焉蓋陽脫者非無陽也乃陽氣上越而不肯附

虛陰陽並

中尤爲大犯。咽喉痛有由來矣。又不知急清

肺胃。仍用生脈

熟地補塞。土氣

呃噫。真腫邪火。

不降陰氣。不承

遂成敗症。非鑿

鑿可證者乎。觀

此一案。則此者

于亡陽一症。亦

皆耳食之學。更

皆二氣不相接續。衰脫之徵最速。是清神熄風方法難以進商。急固根蒂。倣河間地黃飲。

熟地

當首屬夢草宜峻補

附子

旋覆

萸肉

杞子

遠志

菖蒲

川斛

黃 腎脈不得上榮。肝風突起。掀旋呵欠鼾聲。口噤汗出。陰陽不續。危期至速。地黃飲子極是。

熟地炭

萸肉炭

川斛

天冬

淡旋覆

牛膝炭

五味

遠志

茯神

飲子煎法

臘之名惟陽氣驟越。陰陽相離。汗出如油。六脈垂絕。一時急迫。之症。方名爲脫。

至于病久。深

陰無速功。急急鎮固陰陽。冀其甦息。

元氣已憊病夢
垂危理宜峻補

望有轉机此則

凡病將死之時

無不盡然不很

名脫所列諸藥

皆係將死之候

不得入于脫期

人參

茯神

阿膠

淮小麥

龍骨

牡蠣

又陰液枯槁陽氣獨升心熱驚惕倏熱汗泄議用復脈湯甘以緩熱充養五液復脈去薑桂加牡蠣胃弱微嘔暫與養陽明胃津方

人參

炒麥冬

炒白粳米

茯神

鮮蓮子肉

川斛

又人參

秋石水拌烘熟地炭

天冬

麥冬

茯神

鮮生地

又秋燥上薄嗽甚微嘔宜調本兼以清燥

人參
秋石水拌烘
麥冬

玉竹

生甘草

南棗
白梗米

非脫症

又 安胃丸二錢
秋石拌人參湯送

某氏脈如雀啄色枯氣促身重如山不思納穀乃氣血大

虛慮其暴脫不治之症

人參
生地
阿膠

麥冬

炙草
左牡蠣

又 補攝足三陰

人參
熟地炭
棗仁

茯苓

五味
鮮蓮子肉

朱氏

久損不復、真氣失藏、交大寒節、初之氣厥陰風木主

候、肝風乘虛上擾、氣升則嘔吐、氣降則大便、寒則脊內更甚、熱則神煩不寧、是中下之真氣杳然、恐交春前後、有厥脫變幻、擬進鎮逆法。

此防脫之方

人參

生牡蠣

龍骨

附子

桂枝木

生白芍

炙草

艾

自半月前寒熱兩日、色脈愈弱、食減寢少、神不自持、

皆虛脫之象、議固之、滻之、不及理病、

固滯即以治病、治病不姑固滯何必分途

人參

生龍骨

牡蠣

桂枝

炙草

南棗肉

宜加補血藥

又

脈神稍安議足三陰補方

人參 砂仁末炒熟地

炒黑杞子

茯神

五味

牛膝炭

脫是病象死是
總名如下文之
陽脫陰脫可稱
爲陽死陰死耶

脫卽死也。諸病之死，皆謂之脫。蓋人病則陰陽偏勝。偏勝至極，卽死矣。人之生也，負陰抱陽。又曰：陰在內，陽之守也。陽在外，陰之使也。是故陰中有陽，陽中有陰，其陰陽樞紐，自有生以至老死，頃刻不離。離則死矣。故古聖先賢創著醫籍，百病千方，無非爲補偏救弊，和協陰陽，使人得盡其天年而已。夫脫有陰脫陽，脫之殊。內經論之最詳，難經又言：脫陽者見鬼，脫陰

者目盲。此不過言其脫時之情狀也。明理者須預爲
挽救則可。若至見鬼目盲而治之已無及矣。今觀先
生之治法回陽之中必佐陰藥攝陰之內必兼顧陽
氣務使陽潛陰固庶不致有偏勝之患。至於所脫之
症不一。如中風眩暈嘔吐喘劖汗多亡陽之類。是陽
脫也。瀉痢崩漏胎產下多亡陰之類。是陰脫也。痧脹
乾霍亂痞脹痙厥臟腑窒塞之類。是內閉外脫也。陽
脫於上。陰脫於下。卽人死而魂升魄降之謂也。總之
陰陽樞紐不脫。病雖重不死。然則陰陽樞紐何在其。
在於命門歟。

華岫雲

脾胃

此篇治法獨得真傳

胃陰虛
不飢不納

錢

胃虛少納。土不生金。音低氣餒。當與清補。

麥冬

生扁豆

玉竹

生甘草

桑葉

大沙參

王數年病傷不復。不飢不納。九竅不和。都屬胃病。陽土喜柔。偏惡剛燥。若四君異功等。竟是治脾之藥。腑宜通。即是補甘濡潤。胃氣下行。則有效驗。

麥冬

一本是黃錢

火麻仁

一錢半炒

水炙黑小甘草

五分

生白芍

二錢

臨服人青甘蔗漿一杯

某二病後胃氣不甦。不飢少納。姑與清養。

鮮省頭草

三錢

白大棗仁

五錢

新會皮

一錢

陳半夏麴

一錢

川斛

三錢

烏梅

五分

某三脈濇體質陰虧偏熱。近日不飢口苦。此胃陰有傷。邪熱內熾。古稱邪火不殺穀是也。

金石斛

陳半夏麴

生穀芽

廣皮白

陳香豉

塊茯苓

某理肺養胃。進以甘寒。

甜杏仁

玉竹

花粉

枇杷葉

川貝

甜水梨汁

某

脈數口渴有痰乃胃陰未旺

炒麥冬

生白扁豆 生甘草

白粳米

北沙參

川斛

陳十知飢少納胃陰傷也

麥冬

川斛

桑葉

茯神

蔗漿

某

胃陽受傷腑病以通爲補與守中必致壅逆

人參

粳米

益智仁

茯苓

廣皮

炒荷葉

某

食穀不化胃無火也

生白芍

厚朴

新會皮

益智仁

胃陽虛

歸薈

砂仁

計三陽微痰黑食入不化。

人參

生益智

桂心

茯神

廣皮

煨薑

高入脈裏小帶弦知飢不欲食晨起吐痰是胃陽不足宜用外臺茯苓飲。

又人參

白朮

茯苓

廣皮

半夏

枳實皮

白蒺藜

地栗粉

席三脈右濡臍上過寸有聚氣橫束幾年來食難用飽每三四日一更衣夫九竅失和都屬胃病上脘部位爲氣

分清陽失司。倣仲景微通陽氣爲法。

薤白

瓜蔞汁

半夏

薑汁

川桂枝

鮮菖蒲

某二脈濡自汗、口淡無味、胃陽憊矣。

人參

淡附子

淡乾薑

茯苓

南棗

王

脈小右弦病屬勞倦飲食不和醫投柴葛雜入消導。

升表攻裏致汗泄三日脫中不饑全是胃陽大傷彷彿有
喊亢厥逆之變。此方可取參丸。

喊亢厥逆之變。

此方可取參丸。

生益智仁

薑汁

半夏

茯苓

丁香

炒黃米

孫長夏熱傷爲瘧爲痢。都是脾胃受傷。老年氣虛。不肯自復。清陽不肯轉旋。腕中不得容納。口味痰吐不清。脈弦右濡濇。下焦便不通調。九竅不和。都胃病也。此剛補不安。陽土不耐辛熱矣。議宜通補方。如大半夏湯之類。

大半夏湯加川連薑汁

又 小溫中丸

錢二壯年肌柔色黯。脈小濡濇。每食過不肯運化。食冷物。脣上卽痛。色脈參合。病象是胃陽不旺。濁陰易聚。醫知肺陽宜通。自有效果驗。

良薑

草果

紅豆蔻

厚朴

脾陽虛

生香附
烏藥

汪舌灰黃、脘痺不饑、形寒怯冷、脾陽式微、不能運布氣機、非溫通焉能宣達、

半夏

茯苓

廣皮

乾薑

厚朴

草撥

周十脈象窒塞、能食少、運便溏、當溫通脾陽。

生白朮

一錢半

茯苓

三錢

益智仁

一錢

淡附子

一錢

乾薑

一錢

草撥

一錢

又溫通脾陽頗適、脈象仍然窒塞、照前方再服二劑、如

丸方、當以脾腎同治著想、

吳 酒多穀少。濕勝中虛。腹痛便溏。太陰脾陽少健。

平胃合四苓加穀芽

脾胃陽虛

王十五素有痰飲。陽氣已微。再加悒鬱傷脾胃。脾胃運納之陽愈憲。致食下不化。食已欲瀉。夫脾胃爲病。最詳東垣。當升降法中求之。

人參

白朮

羌活

防風

生益智

廣皮

炙草

木瓜

張九金加便溏。胃醒脾不運也。方藥當以太陰陽明是調。

異功散加甘松益智

周二脈緩弱。脘中痛脹。嘔湧清涎。是脾胃陽微。得之積勞。

午後病甚，陽不用事也。大凡脾陽宜動則運，溫補極是而守中及膩滯皆非。其通腑陽間佐用之。

人參

半夏

茯苓

生益智

生薑汁

淡乾薑

大便不爽間用半硫丸

朱

五陽微食後吞酸

茯苓

四兩

炒半夏

二兩

廣皮

二兩

生於朮

二兩

厚朴

一兩

淡乾薑

一兩

草澄茄

一兩

淡吳萸

一兩

公丁香

五錢

水法丸

濕傷脾
胃

某八脈弦食下腹脹，大便不爽，水穀之濕內著，脾陽不主默運，胃腑不能宣達，疎脾降胃，令其升降爲要。

金石斛

三錢

厚朴

一錢

枳實皮

一錢

廣皮白

一錢

苦參一錢

神麴半錢

茯苓皮三錢

麥芽一錢

陳三

厥陰三瘧半年夏至節交春木退舍大寒熱而倏解。

病傷未旺雨濕蒸逼外臨內受水穀不運洞泄之後而神倦食減濕傷脾胃清氣用東垣清暑益氣主之。

清暑益氣法

脾腎陽虛

洪姪脈虛濇弱面乏淖澤鼻冷肢冷肌腠麻木時如寒凜微熱欲溺大便有不化之形穀食不納此陽氣大衰理進溫補用附子理中湯。

中氣虛

趙三氣分本虛衛少外護畏風怯冷冬天大氣主藏夏季氣泄外越此天熱煩倦一因也是氣分屬陽故桂附理

陽賴投。攻八味。古稱腎氣有通攝下焦之功能。使水液不致泛溢。其中陰藥味厚爲君。乃陰中之陽藥。施於氣虛。未爲中窪。歷舉益氣法。無出東垣範圍。俾清陽旋轉。

脾胃自強。偏寒偏熱。總有太過不及之弊。補中益氣加

麥冬北陳。又間服四君子湯。

宣三痛而納食稍安。病在脾。禁因饑餓而得。當養中焦之營。旨以緩之。是其治法。歸建中湯。

戈小便短濁渾濁。大便頻溏。不欲納穀。此傷食惡食也。

當分消土。

食傷

錢傷

生益智

膚皮

茯苓

澤瀉

醫學編

卷二

炒白芍 炒山楂

脾胃之論，莫詳於東垣。其所著補中益氣、調中益氣、升陽益胃等湯，誠補前人之未備。察其立方之意，因以內傷勞倦爲主，又因脾乃太陰濕土，且世人胃陽衰者居多，故用參芪以補中，二尤以溫燥升柴升下陷之清陽，陳皮木香理中宮之氣滯，脾胃合治。若用之得宜，誠效如桴鼓。蓋東垣之法，不過詳於治脾，而略於治胃耳。乃後人宗其意者，凡著書立說，竟將脾胃總論，即以治脾之藥籠統治胃，舉世皆然。今觀葉氏之書，始知脾胃當分析而論。蓋胃屬戊土，脾屬己陰。

名言至論深得
內經之旨此老
必有傳授其學
不爾未能如此
深造也

土戊陽已陰。陰陽之性有別也。臟宜藏。腑宜通。臟腑之體用各殊也。若脾陽不足。胃有寒濕。一臟一腑皆宜於溫燥升運者。自當恪遵東垣之法。若脾陽不虧。胃有燥火。則當遵葉氏養胃陰之法。觀其立論云。納食主胃。運化主脾。脾宜升。則健胃。宜降。則和。又云。太陰濕土得陽。始運。陽明陽土得陰。自安。以脾喜柔潤也。仲景急下存津。其治在胃。東垣大升陽氣。其治在脾。此種議論。實超出千古。故凡遇稟質木火之體。患燥熱之症。或病後熱傷肺胃。津液以致虛痞。不食。舌絳咽乾。煩渴不寐。肌燥熇熱。便不通爽。此

九竅不和。都屬胃病也。豈可以芪朮升柴治之乎。故先生必用降胃之法。所謂胃宜降則和者。非用辛開苦降。亦非苦寒下奪以損胃氣。不過甘平。或甘涼濡潤。以養胃陰。則津液來復。使之通降而已矣。此義。即宗內經所謂六腑者。傳化物而不藏。以通爲用之理也。今案中所分胃陰虛。胃陽虛。脾胃陽虛。中虛饑傷。食傷。其種種治法。最易明悉。余不叅贅。總之脾胃之病。虛實寒熱。宜燥宜潤。固當詳辨。其於升降二字。尤爲緊要。蓋脾氣下陷。固病。即使不陷。而但不健運。已病矣。胃氣上逆。固病。卽不上逆。但不通降。亦病矣。故

脾胃之治法與各門相兼者甚多。如嘔吐、脹脹、泄瀉、便閉、不食、胃痛、腹痛，木乘土諸症尤宜並參，互相討論，以明其理可也。華岫雲

發明亦切當

圖說指掌錄

卷之三

肝胃

木乘土

此是症不是病從古無此名也假如火刑金燥傷腎亦可立一病名耶

某

肝厥犯胃入膈

半夏

薑汁

杏仁

瓜蔞皮

金鈴子

延胡

香豆豉

曰蔻

鮑三情懷不適陽氣鬱勃於中變化內風掀旋轉動心悸流涎麻木悉歸左肢蓋肝爲起病之源胃爲傳病之所飲酒中虛便易溏滑議兩和肝胃

桑葉

炒丹皮

天麻

金斛

川貝

地骨皮

吳 脈左數。右濡氣塞心痛。養胃平肝。

半夏

茯苓

炒麥冬

柏子仁

川棟子

青橘葉

顧五脈弦。胃脘痺痛。子後清水泛溢。由少腹湧起。顯是肝
厥胃痛之症。此是瘀胃痛之病。

吳萸

五分

川棟子

一錢

延胡

一錢

茯苓

二錢

桂枝木

五分

高良薑

一錢

某二脈左弦。右濇中。脘痛及少腹。病在肝胃。

川棟子

青皮

生香附

小茴

茯苓

南棗

某三舌白惡心。液滌泛溢。病在肝胃。當通陽泄濁。

吳萸七分乾薑一錢薑汁三分茯苓三錢南棗一枚

任人此情志不遂。肝木之氣逆行犯胃。嘔吐脹脹。開懷談笑可解。凝滯血藥乃病之對頭也。

延胡 川棟子 蘇梗 烏藥
香附 紅荳蔻

王四胃脘痛高突而堅。嘔清涎、血沫、滴水不能下咽。四肢冷。肌膚麻木。搥背脊痛。勢略緩。此屬肝厥犯胃。
此是實寒症

此症最多必有
蓄飲爲患。徒治
其氣未必見效。

開口吳萸 金鈴子 炒延胡 生香附
高良薑 南山楂

某 脈左弦少寐氣從左升泄肝和胃。

生左牡蠣五錢 川棟子肉一錢 化州橘紅半錢

茯苓三錢 澤瀉一錢

某 脈緩左弦晨倦食減在土旺之候急調脾胃。

戊己湯去甘草加穀芽

程五曲運神機心多擾動必形之夢寐診脈時手指微震。
六食納痰多蓋君相動主消爍安穀不充形骸首宜理陽明以制厥陰勿多岐也。

人參 枳實

半夏

茯苓

石菖蒲

某 通補陽明和厥陰。

人參

茯苓

半夏

高良薑

吳萸

生白芍

某四肝逆犯胃。脘痛腹鳴。氣擰至咽。

川棟子

桂枝木

淡乾薑

川椒

生白芍

吳萸

烏梅

茯苓

程五操家。煩動嗔怒。都令肝氣易逆。乾嘔味酸。木犯胃土。
風木動。乃晨泄食少。形瘦脈虛。先議安胃和肝。

人參

半夏

茯苓

木瓜

生益智

煨薑

華二據說氣攻脇脹。春起秋愈。此內應肝木。飽食不和。肝
三

據說氣攻脇脹。春起秋愈。此內應肝木。飽食不和。肝

傳胃矣。

焦白朮

半夏

柴胡

枳實

生香附

廣皮

乾荷葉湯泛丸

毛

目微黃舌黃煩渴脇肋板實呼吸周身牽掣起於頻

吐食物痰飲卽胸脘痛脹此肝木犯胃諸氣痺阻雖平

昔宜於溫補今治病宜通氣分

半夏一錢

廣皮白一錢

大杏仁十粒

白蔻仁八分

川棟子一錢

炒延胡一錢

生薑五分

土瓜蔓皮一錢

又

心中懊惱噎痛氣分熱痰未平用溫膽法

竹茹一錢

炒半夏一錢

茯苓一錢

枳實一錢

桔梗八分 橘紅一錢 生薑三分

三分

王十三癥積是重著有質今痛升有形痛解無跡發於暮夜衝逆欲嘔不吐明是厥氣攻胃由惱怒強食氣滯紊亂而成病發時用河間金鈴子散兼以宣通陽明凝遏可愈。

金鈴子

延胡

半夏

瓜蔞皮

山梔

橘紅

秦七面長身瘦稟乎木火之形氣阻脘中食少礙痛胃口爲逆乃氣火獨熾之象忌用燥熱劫津治以平肝和胃。

降香

鬱金

山梔

橘紅

枇杷葉

蘇子

川貝母

薑皮

朱五十半百已衰。多因神傷思慮。夏四月大氣發泄。遂加便塘。長夏暑熱無有不大耗氣分。寒熱之來乃本氣先怯。而六氣得以乘虛。今不思納穀之因。皆寒熱二氣擾逆。胃脘清眞受戕。所以致困莫甦。不煩不渴。胃陽虛也。凡醒胃必先制肝。而治胃與脾迥別。古稱胃氣以下行爲順。區區甘之守升柴之升。竟是脾藥。所以鮮克奏效。

人參

茯苓

炒麥冬

大麥仁

木瓜

烏梅

董

病久正氣已衰。喜熱惡寒爲虛。診得左脈尚弦。病在

肝但高年非伐肝平肝爲事。議通補胃陽。

人參

茯苓

煨薑

新會皮

炒粳米

炒荷葉蒂

陸三咽屬胃。胃陰不升。但有陽氣薰蒸。致咽喉干燥。不成寐。衝逆心悸。震動如驚。厥陰內風。乘胃虛。以上僭。胃脈日虛。肢肌麻木。當用十味溫膽。合秫米湯。通攝兼進。俾肝胃陽和。可以痊安。

人參

茯苓

棗仁

知母

竹茹

半夏

黃色秫米

又用泄少陽。補太陰法。

六君去甘草。加丹皮桑葉金

解湯法丸

郭脈弦。心中熱。欲嘔。不思食。大便不爽。乃厥陰肝陽順乘胃口。陽明脈絡不宣。身體掣痛。當兩和其陽陰。苦泄熱。少佐微辛。此方用苦辛酸法最合經旨。

川連

桂枝木

生牡蠣

烏梅

生白芍

川棟子

寒必化熱。若淺學之人不能知也。

芮前議肝病入胃上下格拒。考內經諸痛皆主寒客。但經年累月久。痛寒必化熱。故六氣都從火化。河間特補病機一十九條亦然。思初病在氣。久必入血。以經脈主氣絡脈。主血也。此臟腑經絡氣血。須分晰辨明。投劑自

可入穀。更詢初病因驚。夫驚則氣逆。初病肝氣之逆久。則諸氣均逆。而三焦皆受。不特胃當其衝矣。謹陳緩急先後進藥方法。厥陰篇云。氣上撞心。飢不能食欲。嘔吐涎沫。夫木既犯胃。胃受尅爲虛。仲景謂制木必先安土。恐防久尅難復。議用安胃一法。

烏梅

淡薑渣

歸鬚當少用

橘紅

川棟子

川椒當少用

生白芍

內經以攻病尅制曰勝方。補虛益體須氣味相生曰生方。今胃被肝乘。法當補胃。但胃屬腑陽。凡六腑以通爲補。黃連味苦能降。戴元禮云。諸寒藥皆凝滯。惟

有黃連。不澁濇。有薑椒歸鬚氣味之辛。得黃連川棟之苦。倣內經苦與辛合。能降能通。芍藥酸寒。能泄土中木乘。又能和陰止痛。當歸血中氣藥。辛溫上升。用鬚力薄。其氣不升。梅占先春花發最早。得少陽生氣。非酸斂之收藥。得連棟苦寒。內經所謂酸苦泄熱也。以氣與熱俱無形無質。其通逐之法迥異。故辨及之。

又 奉分前七日。診右脈虛弦帶濇。左脈小弦勁而數。胃痛已緩。但常有畏寒。鼓慄。俄頃發熱而解。此肝病先厥後熱也。今歲陰厥司天。春季風木主氣。肝病既久。脾胃必虛。風木鬱於土宮。營衛二氣未能流暢於經脈。爲營

不必

養護衛。此偏熱偏寒所由來矣。夫木鬱土位。古人制肝
補脾升陽散鬱。皆理偏就和爲治。勿徒攻補。寒熱爲調。
今春半天令漸溫。擬兩和氣血。佐以宣暢少陽太陰。至
小滿氣煖泄越。必大培脾胃後天。方合歲氣體質調理。
定春季煎丸二方。

- 人參 茯苓 廣皮 矢草 當歸
間用
煎方 人參 廣皮 桑葉 薑裏湯法丸
黃芩 丹皮 穀芽 灸草 白芍

此二方俱不中
病有畏寒熱等
症當先和營養

下有年。冬藏不固。春木萌動。人身內應乎肝。水弱木失

滋榮陽氣變化內風乘胃爲嘔攻腸爲痛仲景以消渴心熱屬厥陰內經以吐涎沫爲肝病肝居左而病熾偏右木犯土位之徵經旨謂肝爲剛臟非柔不和閱醫藥沉桂萸連雜以破泄氣分皆辛辣苦燥有剛以治剛之弊倘忽厥逆瘛瘲奈何議鎮陽熄風法

生牡蠣

阿膠

細生地

丹參

淮小麥

南棗

又內風陽氣鼓動變幻皆有形無質爲用太過前議鹹苦入陰和陽佐麥棗以和胃制肝獲效蓋肝木肆橫胃土必傷醫治既僻津血必枯唇赤舌絳咽乾穀味卽變

此症屬痰飲
方不切

酸、膩顯是胃汁受劫。胃陰不復。夫胃爲陽明之土。非陰柔不肯協和。與脾土有別故也。

方不切

生牡蠣

阿膠

細生地

小麥

炒麻仁

炒麥冬

炙草

張五七脈小弦納穀。脘中哽噎自述。因乎悒鬱強飲。則知木火犯土。胃氣不得下行。所致議苦辛泄降法。

黃連

鬱金

香淡豆蔻

竹茹

半夏

丹皮

山梔

生薑

又 前方泄厥陰。通陽明爲衝氣。吐涎。脘痞。不納穀而設。且便難艱阻。胸脹悶。上下交阻。有年最虛關格。與進退

黃連湯。

江晨起腹痛。食穀微滿。是清濁之阻。按脈右虛左弦。不思飲食。脾胃困頓。都屬虛象。古人培土必先制木。做以爲法。此症有痰飲不可補。

人參

淡吳萸

淡乾薑

炒白芍

茯苓

周_五酒熱濕痰。當有年正虛。清氣少旋。遂致結秘。不能容納。食少。自述多鬱易嗔。議從肝胃主治。

半夏

川連

人參

枳實

茯苓

薑汁

當用潤劑

王_五歲逆舉。發湯食。青吐病在胃之上。腕但不知起病之

因由據云左脇內結瘕聚肝木侮胃明係情懷憂勞以致氣鬱結聚久病至頗能安穀非純補可知泄厥陰以舒其用和陽明以利其腑藥取苦味之降辛氣宣通矣。

川棟子皮 半夏

川連

薑汁

左牡蠣 淡吳萸

唐 痘逆惡心是肝氣犯胃食入臥著痛而且脹夜寐不安亦是胃中不和貴乎平肝養胃致其復若見有形衝逆之狀攻代競進有痞滿成脹之患。

川連

神麴

吳萸

川棟子

查肉

鬱金

姚 寒熱嘔吐。脇脹脘痺。大便乾濁不暢。古云九竅不和。

都屬胃病。法當平肝木。安胃土。更常進人乳薑汁以益

血潤燥宣通。午後議用大半夏湯。

人參

半夏

茯苓

金石斛

廣皮

菖蒲

葛根

阿膠

胡氏經後寒熱氣衝欲嘔。忽又如饑。仍不能食。視其鼻淖

亮欬汗氣短多。藥胃傷肝木升逆。非上焦表病。

炙甘草

小生地

芝麻仁

阿膠

麥冬

白芍

牡蠣

又 照前方去牡蠣加人參。

又 衡陽上逆。則煩不得安。仍是陰弱。夫胃是陽土。以陰爲用。木火無制。都係胃汁之枯。故腸中之垢不行。既知陰虧。不必強動大便。

人參

鮮生地

火麻仁

天冬

麥冬

炙草

徐氏經候適來。肢骸若撤環口。肉瞞蠕動。兩踝臂肘常冷。夫衝脈血下躡。維脈怯不用。衝隸陽明厥陰對峙。因驚肝病。木乘土位。以致胃衰。初則氣升至咽。久則懶食。脘痞。昔人有治肝不應。當取陽明。陽明不闔。空洞若谷。厥氣上加。勢必嘔。脹。吞酸。然陽明胃腑通補爲宜。剛藥畏

經來之時而病
狀如此總是血
虛而肝風乘之
宜用血藥

其劫陰少濟以柔藥法當如是。

人參二錢

半夏

薑汁炒
三錢

茯苓三錢

淡附子分七

白粳米五錢

木瓜一錢

胃虛益氣而用人參非半夏之辛。茯苓之淡。非通劑矣。少少用附子以理胃陽。梗米以理胃陰。得通補兩和陰陽之義。木瓜以酸救胃汁以制肝。兼和半夏附子之剛復此大半夏與附子粳米湯合方。

張氏肝病犯胃心痛乾嘔不能納食肢冷泄瀉腑經陽失流展非虛寒也。金鈴子散加川連烏梅桂枝生薑

徐氏屢屢墮胎下元氣怯而寒熱久嗽氣塞填胸湧吐涎

沫乃鬱勃嗔怒。肝膽內寄之相火風木。內震不息。犯胃則嘔逆吞酸。乘胸侵咽。必張悶喉痺漸漸昏迷欲厥。久延不已。爲鬱勞之疴。此治嗽清肺重鎮消痰。越醫越凶。考內經肝病主治三法。無非治用治體。又曰治肝不應。當取陽明。蓋陽明胃土。獨當木火之侵侮。所以制其衝逆之威也。是病原治法大略。安胃丸。椒梅湯送。

鮑嫗 風泄已止。胃逆不納食。

人參

川連

烏梅

木瓜

川斛

橘紅

朱氏 嘴怒動肝氣。逆惡心胸。脇閃動氣。下墜欲便。是中下

二焦損傷不復。約束之司失職。擬進培土泄木法。亦暫時之計。

烏梅

乾薑

川連

川椒

人參

茯苓

川棟

生白芍

王氏寡居多鬱。宿病在肝。邇日暑邪深入。肝病必來犯胃。吐衄下利得止。不思穀食。心中疼熱。仍是肝胃本症。况暑濕多傷氣分。人參輔胃開痞。扶胃有益。幸無忽致疲可也。

枳實

牡蠣

人參

川連

半夏

薑汁

又 胃開思食。仍以制肝和胃。

人參

金石斛

半夏

枳實

茯苓

橘紅

呂氏季脇之傍是虛里穴。今跳躍如梭乃陽明絡空也。況衝脈卽血海亦屬陽明所管。經行後而病忽變。前案中說已著。茲不復贅。大凡絡虛通補最宜。身前衝氣欲張。衝脈所主病內經所謂男子內結七疝。女子帶下瘕聚。今也痛無形象。諒無結聚。祇以冷汗跗寒。食入惡心。鼻準明環口色青。肝胃相對。一勝必一負。今日議理陽明之陽。佐以宣通奇脈。仲景於動氣一篇都從陽微起見。

即謂指掌醫業

卷三

倣以爲法

人參

茯苓

淡熟附子

生薑艾

桂枝木

炒黑大茴

紫石英

生杜仲

朱氏上冬用溫通奇經帶止經轉兩月間納穀神安。今二

月初二日偶涉嗔忿卽麻痺乾嘔耳聾隨卽昏迷如厥。
診脈寸強尺弱食減少口味淡微汗此厥陰之陽化風。
乘陽明上犯蒙昧清空法當和陽益胃治之。

人參一錢

茯苓三錢

炒半夏一錢

生白芍一
錢

烏梅七分

小川連二分

淡生薑二
半分

廣皮白一
錢

此厥陰陽明藥也。胃腑以通爲補故主之以夫半夏。

湯熱擁於上故少佐菖連以瀉心肝爲剛減。參入白芍烏梅以柔之也。

又 三月初五日經水不至。腹中微痛。右脇刺而動。皆

陽明脈絡空虛。衝任無貯。當與通補入絡。

人參一錢

當歸二錢

菟刺子二錢

香附一錢

茯苓三錢

小茴一錢

生杜仲二錢

又 照方去茺蔚杜仲白芍官桂

某氏久有痛經氣血不甚流暢。驟加暴怒傷肝。少腹衝氣上犯。逆行於肺爲欬。寒熱聲囁。腸中拘急。不飢不納。乃左升右降。不可轉旋。致失胃氣。下行爲順之旨。故肝用

宜泄。胃腑宜通爲定例矣。

鉤藤 丹皮

桑葉

半夏麪

茯苓 廣皮白 又 威喜丸

唐 積勞內傷。脫悶。脇脹。嘔吐。格拒。眩暉。不得臥。陽挾內風。暴張。恐其忽然懊厥。議通胃平肝法。

小川連

薑汁

半夏

牡蠣

川棟子

生白芍

江 拙按爲實。患目病來屬肝。痛必多嘔。大便秘滯。肝病及胃。當苦辛泄降。少佐酸味。

小川連

生淡乾薑

半夏

枳實

黃芩

生白芍

顧五陽明脈衰形寒痞飢不食心痛泄兼嘔。

人參

吳萸

茯苓

半夏

生薑

炒黃粳米

此鹽肚之主方

某勞怒傷陽氣逆血鬱致痛痞脹便溏風木侮土前方既效與通補陽明厥陰大半夏湯去蜜加桃仁柏子仁當歸薑棗湯法丸

某脈微小弱是陽氣已衰今年太陰司天長夏熱泄氣分不食不運味變酸苦脾胃先受困也稍涉嗔怒木乘土中益加不安從東垣培土制木法。

人參

廣皮

茯苓

益智

木瓜

淡薑渣

夏
通補陽明開泄厥陰

人參

半夏

茯苓

橘紅

吳萸

白芍

橘紅

肝脾

汪氏
氣滯脾弱

逍遙散加鬱金砂仁末

肝脾胃
席
大便未結腹中猶痛食入有欲便之意胃陽未復肝
木因時令尙橫用泄木安土法。

人參

木瓜

厚朴

茯苓

益智仁

青皮

江 鎮衝任溫養下焦頗效所議治嗽肺藥寒涼清火背謬顯然

炒黑杞子 淡蕊蓉 小茴香拌炒當歸

沙苑 石殼建蓮 茯神

紫石英煎湯
煎藥

又 動怒腕下痛不飲食是肝厥犯脾胃病外生枝最非

善調之理理氣皆破泄難用議進制肝木益胃土一法

人參一錢

炒焦白芍一錢

真枷南香

汁沖五
小匙

炒焦烏梅

三分酸
泄肝陽

茯苓

五錢切小塊
甘淡益胃

化橘紅

五分宣
通緩痛

又 人參

嫩鈞藤

鵝天麻

化橘紅

炒烏梅肉

茯苓

伽南香

朱 胃弱痰多。補虛宜通。肝陽易升。左頰赤。佐泄少陽。

人參

炒半夏

茯苓

鈎藤

經霜桑葉

煨薑

南棗

脾腎

范七脾竅開舌。舌出流涎爲脾病。憇脾者少陽膽木以養

脾泄膽治。

人參

於朮

天麻

薑黃

桑葉

丹皮

葛根

補太陰泄少陽。

人參

茯苓

焦朮

炙草

廣皮

白芍

炒丹皮

桑葉

又

照方去甘草桑葉加木瓜

李

十五

少陽木火犯太陰之土持齋淡薄中虛熱灼以補脾

和肝爲久長調理四君子加芩芍桑葉丹皮

金能食運遲舌紋裂左頤肉腫不喜飲水太陰脾陽鬱法當補土泄木此症有火有痰有風不得用燥藥

於刺

茯苓

新會皮

炙草

煨益智

柴胡

丹皮

白芍

張二九脈小弱是陽虛體質由鬱勃內動少陽木火木犯太陰脾土遂致寢食不適法當補土泄木

人參一錢

半

白朮一錢

半

半夏一錢

茯苓二錢

甘草五分

五分

廣皮一錢 丹皮三錢 桑葉一錢 薑一錢 藰二錢

肝爲風木之臟。又爲將軍之官。其性急而動。故肝臟之病較之他臟爲多。而於婦女尤甚。肝病必犯土。是侮其所勝也。本臟現症。仲景云。厥陰之爲病。消渴氣上撞心。心中疼熱。飢而不欲食。食則吐。下之利不止。又內經所載肝病。難以盡述。大凡其脈必弦。脇或脹或疼。偏寒偏熱。先厥後熱。若一犯胃。則惡心乾嘔。脘痞不食。吐酸水涎沫。尅脾則腹脹。便或溏或不爽。肢冷肌麻。案中治法。有陰陽虛實之殊。略舉而敘述之。若肝陰胃陰未虧。肝陽亢逆犯胃。先生立法用藥。

則遠柔用剛泄肝如吳萸椒桂通胃如半夏薑汁薑附加益智枳朴等則兼運脾陽中虛必用人參故大半夏湯附子粳米湯進退黃連湯瀉心法治中法溫膽等湯是也若肝陰胃汁已虛木火熾盛風陽擾胃用藥忌剛用柔養肝則阿膠生地白芍麻仁木瓜養胃則人參麥冬知母粳米秫米等是也至於平治之法則剛柔寒熱兼用烏梅丸安胃丸逍遙散若四君六君異功戊己則必加泄肝之品用桑葉丹皮者先生云桑葉輕清清泄少陽之氣熱丹皮苦辛清泄肝膽之血熱用金鈴子散者川棟苦寒直泄肝陽延胡

專理氣滯血濇之痛。此皆案中之綱領也。余另分此一門者。因嘔吐不食。脇脹腹痞等患。恐醫者但認爲脾胃之病。不知實由肝邪所致。故特爲揭出。以醒後人之目耳。且世人但知風勞。臌膈爲四大重症。不知土敗木賊。肝氣日橫。脾胃日敗。延至不救者多矣。可不究心於此哉。華岫雲

諸案大抵皆胸痺痞滿及痰飲內蓄之症。治瘧痺之方量忌人參。而此欲其壯土以制木用者甚多。必有遺病。至於蓄痰症全不齒及。尤屬辨症不清。其中精思巧意。中病立頗多。亦得失參半也。

腫脹

某_一食穀不運，腹脹、嘔惡，大便不爽，脈弦色黃，此胃陽式微，升降失司使然。法當溫通陽氣。

吳萸八分

半夏三錢

草撥一錢

淡乾薑一錢

生薑汁五分

廣皮白一錢

方太燥

陳_二診脈右大而緩，左如小數促。冬季寒熱身痛，汗出即解。自勞役飢飽嗔怒之後，病勢日加。面浮足腫，呼吸皆喘，目淚鼻衄，臥著氣衝，欲起食納，留中不運。時序交夏，脾胃主候，覩色脈情形，中滿脹病，日來矣。蓋此症屬勞

論極明而方不
中病本屬難治
而浮足腫無川
人參之理鎮氣
消炎營利水
庶幾近之

倦致損。初病卽在脾胃。東垣云。胃爲讐之本。脾乃營之源。臟腑受病。營衛二氣晝夜循環失度。爲寒爲熱。原非瘧邪半表半裏之症。斯時若有明眼。必投建中而愈。經言勞者溫之。損者益之。建中甘溫。令脾胃清陽自立。中原砥定。無事更遷。仲景亦謂男子脈大爲勞。則知內經仲景東垣垂訓。真規矩準繩至法。且汗泄積勞。都是陽傷。醫藥辛走劫陽。苦寒敗胃。病人自述飲蔗。卽中脘不舒。頃之少腹急痛。便稀。其胃陽爲苦辛。大傷明甚。又述咳頻。衝氣必自下上逆。夫衝脈隸於陽明。胃陽傷極。中乏坐鎮之真氣。衝脈動則諸脈交動。濁陰散漫上布。此

臥著欲起矣。愚非遙指其脹。正合內經濁氣在上。則生
脹脹。太陰所至爲腹脹相符也。昔有見痰休治痰。見血
休治血。當以病因轉變推求。故微試若此。

厚朴

杏仁

人參

茯苓

蜜煨薑

南棗

厚朴杏仁。取其能降氣。參苓薑棗。取其建立胃中之
清陽而和營衛也。

脾陽虛

吳二單脹。溺少溫通。頗適當用太鍼沙丸一錢二分。大服四錢

某食下脹脹。舌黃。當治脾陽。

生白朮

半錢廣皮一錢

茯苓三錢

厚朴一錢

本草 卷三

木瓜 五分 淡附子

七分

徐九攻痞變成單脹脾陽傷極難治之症

生白朮 熟附子 茯苓 厚朴

生乾薑

錢 食入腹脹已五十日且痛必有形攻動頭中微痛夫痞滿屬氣痛因氣滯二便既通其滯未必在乎腸胃從

太陰脾陽傷以辛溫開泄主之

桂枝

方解

生白芍

淡乾薑

厚朴

又

照方去白芍加生益智仁茯苓

楊十五飲酒聚濕太陰脾陽受傷單單腹脹是濁陰之氣錮結不宣通二便不爽治以健陽運濕

凡嘔必有實
一味溫補是無
真病也內經云
諸脹腹大皆屬
乎熱不可背也

吳三_四食下脹脹便溏不爽肢木不仁此脾陽困頓不能默運使然溫通中陽爲主

厚朴

茯苓

生菜朮

草菓

附子

廣皮

草撥

猪苓

炮薑半錢

桂枝木一錢

白朮二錢

附子一錢

炮薑半錢

桂枝木一錢

茯苓三錢

草撥一錢

炮薑半錢

桂枝木一錢

僧七俗語云膏粱無厭發癰疽淡泊不堪生腫脹今素有
脘痛氣逆嘔吐漸起腫脹乃太陰脾臟之陽受傷不可
鼓動運行陰土宜溫佐以制木治

生於朮

茯苓

廣皮

椒目

厚朴

益智仁

良薑

某七六左脈弦、脹滿不運便泄不爽當溫通脾陽。

草果仁

此通氣利溼
一錢

茯苓皮

三錢

大腹皮

一錢

廣皮

一錢半

青皮

一錢

厚朴

一錢半

木猪芩

一錢半

椒目

五分

吳

寒熱傷中、腹微滿舌白用治中法。

人參

益智

廣皮

茯苓

澤瀉

金斛

木瓜

久嗽失血陰

大傷可燥

周五久嗽四年後失血乃久積勞傷酒肉不忌濕鬱脾陽爲脹間小溲僅通大便仍溏濁陰乘陽午後夜分尤劇。

生於朮

熟附子

陳五積勞脾陽傷食下脹足腫

生白朮

茯苓

熟附子

草東仁

厚朴

廣皮

某躬耕南畝曝於烈日漬於水土暑濕內蒸爲瀉痢邪去正傷臨晚跗腫腹滿乃脾陽已困諸氣不司運行濁陰漸爾竊據內經病機諸濕腫滿皆屬於脾

生白朮

草蔻

茯苓

厚朴

附子

澤鴻

鄒三深秋霍亂轉筋必有暴冷傷及脾胃病機一十九條河間皆謂熱亦屬偏見愈瀉愈脹豈是實症夫酒客之

濕皆脾胃陽微不運致濕邪凝聚氣壅成脹見脹滿徹
投攻下不究致病之因故曰難調之症

生白朮

草菓

熟附子

厚朴

廣皮

茯苓

脾胃陽虛

陳四苦寒多用胃陽久傷右脇痛嘔酸濁皆濁陰上干用辛甘溫中補虛痛減病人述早上腹寬暮夜氣緊微硬大便不爽有單腹脹之憂

人參

生白朮

茯苓

肉桂

歸身

益智

廣皮

煨薑

趙五胸腹脹滿久病痰多

生白朮二兩 茯苓三兩 厚朴一兩 肉桂五錢 薑汁九

本草云厚朴與白朮能治虛脹倣潔古枳朮之意也。
佐茯苓通胃陽肉桂入血絡則病邪可卻矣。

楊

脈沉小弦中年已後陽氣不足痰飲水寒皆令逆趨。

致運納失和漸有脹滿浮腫法以辛溫宣通以本病屬

脾胃耳。

人參一錢 茯苓三錢 白芍一錢 淡附子一錢 薑汁三分
半錢 調

倪十二腹更膨便不爽臍陽不行。

生益智

茯苓

生穀芽

廣皮

砂仁殼

厚朴

又六腑不通爽。凡濁味食物宜忌。

雞肫皮 麥芽

山楂

砂仁

陳香櫞

又 脘沉小緩早食難化晚食夜脹大便不爽此腑陽久傷不可流行必以溫藥疎通忌食閉氣粘葷

生白朮

附子

厚朴

草菓

茯苓

廣皮白

檳榔汁

虛
腎胃陽

浦

四

九腎氣丸

五苓散

一攝少陰

一通太陽

濁泄溺通

腹滿

日減

不爲錯悞

但虛寒脹病

而用溫補

閔古人調劑必

是通法

蓋通陽則濁

陰不聚

守補恐中

焦易鈍

喻氏謂

能變胃

而不受胃變

苟非純剛之藥

曷勝其任

議於暮

此是正治

萬正方

卷三

夜服玉壺丹五分。晨進。

人參 半夏

薑汁

茯苓

枳實 乾薑

陳六老人脾腎陽衰。午後暮夜陰氣用事。食納不適。腸鳴
腹脹。時泄。治法初宜剛劑。俾陰濁不僭。陽乃復辟。

人參一錢

淡附子一錢

淡乾薑八分

茯苓三錢

炒免絲一錢

胡蘆巴一錢

淡乾薑八分

茯苓三錢

脾腎陽虛

此治陽明之陽也。若參入白朮甘草。則兼走太陰矣。
某三七腫脹由足入腹。診脈細軟。不能運穀。當治少陰太陰。

生白朮

厚朴

茯苓

淡附子

淡乾薑

草撥

馬六暮食不化黎明瘕泄乃內傷單服之症脾腎之陽積弱據理當用腎氣丸。

顧四脈微而遲色衰萎黃蠣爲介屬鹹寒沉降凡陽氣不足者食之損陽其致病之由自試二次矣久利久泄古云無不傷腎今浮腫漸起自下是水失火而敗若非緩下徒見泄瀉有紅爲脾胃濕熱必致中滿敗壞。

生茅朮

見紅非宜

熟地炭

熟附子

淡乾薑

茯苓

車前

某脾腎虛寒多瀉由秋冬不愈春木已動勢必尅土腹

滿小便不利乃腫病之根若不益火生土日吃疲藥焉能卻病

人參

白朮

附子

生益智

兔絲子

茯苓

腎陽虛

姚八

四據說情懷不適因嗔怒痰嗽有血視中年形瘦肉消

漸漸腹脹跗腫下午漸甚陽氣日奪早服腎氣丸三錢。

不宜過熱
晝服五苓散

殷

氏

行動氣墜於下臥著氣擁於上此跗腫晝甚頭脹夜甚總是有腹大喘急之事濟生丸十服

某陽微陰結腫脹

附子

苡仁

白朮

木防己

澤瀉

細辛

澤瀉
細辛

肝胃不和

朱

陽明

胃逆

厥陰

來犯

丹溪謂上升之氣

自肝而出清

金開氣亦有制木之功能

而痛脹稍緩

議以溫膽加黃

連方

半夏

茯苓

橘紅

枳實

竹茹

川連

生白芍

某人舌微黃痕逆腕胸悉脹當和肝胃

桂枝木

乾薑

青皮

川棟子

炒半夏

秦

兩年初秋發癲。暈絡氣血不爲流行。而腹滿重墜。臥則頗安。臍左動氣。臥則尤甚。吐冷沫。常覺冷氣麻語塞。肝風日熾。疎泄失職。經以肝病吐涎沫。木侮土位。自多贓脹。丹溪云。自覺冷者非真冷也。兩次潰瘍之後。剛燥熱藥似難進。商議以宣通肝胃爲治。有年久恙。貴乎平淡矣。

本不切藥。用和藥之藥。

雲茯苓一錢 三角胡麻搗碎滾水洗
十次三錢 厚橘紅一錢
嫩鈎藤一錢 熟半夏炒黃一
錢半 白旋覆花一錢

瀘清服一杯 四帖

又 接服大半夏湯

熟半夏炒二錢半雲苓小塊五錢

薑汁調服四分

人參同煎一錢

肝鬱犯
胃兼溫

方五 診脈百至。右緩濇。左弦勁。始而腸鳴泄。氣由漸腹滿。

脹。脹納食幾廢。便難溺少。此皆情懷少曠。清氣不轉。肝木侵侮胃土。腑陽窒塞。脹滿日甚。據云先因胃脘心下痛。症氣鬱顯然。非旦晚圖功之象。議河間分消法。

杏仁

厚朴

海金沙

陳香椽

鬱金

萊菔子

木通

雞肫皮

王三 食入不運。脘中脹。病由悒鬱。經年不愈。視色黃形瘦。按脈小而濡。喜涼飲。欲惡熱。大便未經通調。九竅不和。皆胃病矣。

川連

雞肫皮

枳實

廣皮

桔梗

瓜蔞實

半夏

萊菔子

鬱金

杏仁

薑汁竹瀝丸

楊

四肝鬱乘胃爲脹。經年內結有形。用緩消一法。

生茅朮

雞肫皮

川連

生厚朴

淡薑渣

針砂製

椒目湯法丸

畢

濕熱由腑滯及腸中。大便不爽。食入不適。平昔肝木

易動厥陰。不主疎泄。少腹形脹。無非滯氣之壅。久則凝

瘀日踞。小溫中丸三錢十服。

程十三脈右弦。面黃腹滿。按之漚漚有聲。每大便先腹痛。便

不能乾爽。此胃氣不降。陽氣自滯。由乎嗔怒不息。肝木橫逆。疎泄失司。腹脹之來。皆由乎此。議泄肝通腑。濁宣脹減之義。

杏仁

紫厚朴

猪苓

鬱金

椒目

枳榔汁

接服小溫中丸

某五七不飢不運。少腹胃脘悉滿。診脈左弦。乃肝木犯胃。二腑不主流行。濁陰漸次瀰漫。他日單脹之作。竟有難以杜患者。速速戒惱怒。安閑自在。誠治斯疾之良圖。

小溫中丸一錢五分開水送下

夏 夏四月脾胃主氣。嗔怒怫鬱無不動肝。肝木侮土。而

朴是乃常自
此戒何也

脾胃受傷。鬱久氣不轉舒。聚而爲熱。乃壯火害氣。宜乎減食。膩脹矣。當作木土之鬱調治。桂附助熱。萸地滋滯。鬱熱益深。是速增其病矣。

鈎藤

丹皮

黑山梔

川連

青皮子

紫厚朴

萊菔子

廣皮白

薄荷梗

又

前方之故
脹勢已緩。脈來弦實。此濕熱猶未盡去。必淡泊食物。

清肅胃口。以清滲利水之劑。服五六日再議。

猪苓

澤瀉

通草

海金沙

金銀花

茯苓皮

黑櫟豆皮

又

診脈浮中沉。來去不爲流利。氣阻濕鬱。膠痰內著。議

用陞涎丹六分緩攻。

又。服控涎丹。大便通而不爽。診右脈弦實。目黃舌燥。中焦濕熱不行。因久病神倦。不敢過攻。議用丹溪小溫中丸。每服三錢。乃泄肝通胃。以緩治其脹。

謝。形神勞煩。陽傷腑氣不通。疝瘕陰濁。從厥陰乘犯陽明。胃爲陰濁蒙閉。腸中氣窒日甚。年前邪勢頗緩。宣絡可效。今閉錮全是濁陰。若非辛雄剛劑。何以直突重圍。脹滿日增。人力難施矣。

生炮川烏頭

生淡川附子

淡乾薑

淡吳萸

川棟子

小茴香

猪膽汁

此非大熱之藥
可治當消其過

唐氏
紫苑

杏仁

通草

鬱金

黑山梔

又三焦不通。脘痺腹脹。二便皆秘。前方用開手太陰肺苦辛潤降。小洩得利。兼進小溫中丸。泄肝平胃。脹勢什減有五。但間日寒熱復來。必是內鬱之氣。陽不條達。多寒戰慄。議用四逆散和解。其小溫中丸仍用。

生白芍

枳實

柴胡

黃芩

半夏

杏仁

竹茹

生薑

張

姬

腹、臍、膩、脹、大、便、不、爽、得、煖、氣、稍、快、乃、陽、氣、不、主、流、行、

蓋六腑屬陽。以通爲補。春木地氣來升。土中最畏木乘。

勢猖熾。治當泄木安土。用丹溪小溫中丸。每服三錢。

納穀。周身寒凜，四肢微冷。嘗胃中無陽，濁上僭踞，而爲

腹脹。所謂食不得入，是無火也。

人參

吳萸

乾薑

附子

川連

茯苓

桑葉

生香附

未鬱氣
滯血濁

丁十三嘆怒氣血逆亂，右脇不和，夜食噉噫，腹脹乃肝胃病。

治以解鬱，宣通氣血。

鉤藤

丹皮

桑葉

生香附

茯苓

神麌

降香木

炒黑查肉

徐平素肝氣不和，脇肋少腹，腹脹，氣血不調，痰飲漸聚。

厥陰陽明同治。

桃仁

延胡

歸尾

小茴

香附

半夏

茯苓

橘紅

神麴

桃仁

郁李仁

歸尾

小茴

紅花

製大黃

桂枝

川棟子

馬三脈實久病瘀熱在血胸不爽小腹墜能食不渴二便濇少兩進苦辛宣腑病未能卻此屬血病用通幽法。
又 畫日氣墜少腹夜臥不覺甚則頭昏胸悶今年五月初用疎滯繼通三焦續進通幽其墜脹仍若議辛香流氣法。

氣法

川棟子 延胡

小茴

黑山梔

青木香 橘核

生香附磨汁法丸

董

初因下血轉痢繼而大便祕艱自左脇下有形漸致
瘀積成痞
脹大堅滿小便自利病在血分久病兩年形瘦氣短不
敢峻攻若五積成例議用古禹餘糧丸每日一錢

鄭氏得食腹痛上及心胸下攻少腹甚至筋脹擾於周身

經絡之間大便欲解不通暢此乃腸胃氣阻故痛隨利
減神保丸一錢

肝鬱犯
脾

張脈左弦右浮濶始因脘痛貫脇繼則腹大高凸納食
減少難運二便艱滯不爽此乃有年操持勞慮太甚肝

木拂鬱。脾土自困。清濁混淆。脹勢乃成。蓋臟真曰濁。腑陽不運。考古治脹名家。必以通陽爲務。若滋陰柔藥。微加桂附。疑陰沴濁。豈是良法。議用局方禹糧丸。燉其水

臟。攻其穢濁。俟有小效。兼進通陽剛補。是爲虛症內傷。

脹滿治法。至於攻瀉劫奪。都爲有形而設。與無形氣傷之症不同也。局方禹餘糧丸。

陳姫久鬱傷及脾胃之陽。面無華色。納粥欲嘔。大便溏泄。
胃氣陷則跗腫。氣呆則脘悶。有中滿之憂。用治中法。

人參

生益智

煨薑

茯苓

木瓜

炒廣皮

肝犯脾

肝脾不和
和夾暑

邪

程文脈數惡心。脘脹。

炒半夏

廣皮

藿香

黃連一分
煎水拌

茯苓

鬱金

又暑傷脾胃則肝木犯土。左腹膨泄瀉。

人參

厚朴

廣皮

炒澤瀉

茯苓

木瓜

炙草

炒查肉

人參

炒柴胡

炒白芍

炒黃芩

茯苓

炙草

生薑

大棗

土木火犯

宋食入脘脹此屬胃病。視色蒼形瘦。自述飲酒嘔吐而得。又述耳鳴肉瞞是木火犯中鬱勃病甚。議用逍遙減

白朮合左金方。

朱三
四癰癧馬刀都是肝膽爲病。病久延及脾胃。腹滿便濁。舌黃微渴。非溫補可服。泄木火以疎之。和脾胃以調之。冀其脹勢稍減。

吳萸拌川連

生於朮

川棟子

炒山楂

黑山梔

厚朴

青皮

椒目

唐

女氣臌三年。近日跌仆嘔吐。因驚氣火更逆。胸臆填塞。

脹滿二便皆通。自非質滯喜涼飲。而起癰癧。從病能篇。

驟脹屬熱。

川連

淡黃芩

半夏

枳實

乾薑

生白芍

鐵鑄針

肝犯脾
胃陽虛

有濕

顏

今年風木加臨。太陰陽明不及。遂爲腹脹。小便不利。

兩跗皆腫。大便滯滯。治在腑陽。用分消湯方。

生於朮

茯苓

澤瀉

猪苓

厚朴

椒目

海金沙湯煎

吳 金歲厥陰司天加臨。驚蟄節病。腹滿喘促。肢腫而浮。
寒熱汗出。皆木乘土位。清陽不得舒展。濁氣痞塞。僭踞。
故泄氣少寬。姑擬通腑以泄濁。

生於朮

茯苓

椒目

紫厚朴

澤瀉

淡薑渣

朱九鬱勃久坐中焦不運寒熱小溲不通腹脹脹滿脈小而濤全_四是腑陽失司與泄木通腑分消法

四苓加椒目厚朴大腹皮青皮

用脾不和清陽
痺結

陳

壯盛年歲形消色奪診脈右小促左小弦勁病起上
年秋季腕中卒痛有形梗突病後疎遇驚觸漸次食減
不適食入不運停畱上腕腹形脹滿甚則脇肋皆脹四
肢不暖暮夜漸溫大便旬日始通便後必帶血出清早
未食自按臍上氣海有痕形甚小按之微痛身動飲水
寂然無踪天氣稍冷爪甲色紫細推病屬肝脾氣血不
通則爲鬱遏久則陽微痺結上下不行有若否卦之義

閱醫藥或消或補，總不見效者。未知通陽之與耳。

薤白 桂枝 瓜蔞仁 生薑

半夏 茯苓

又 離白汁 桂枝

瓜蔞實 川棟子皮

半夏 茯苓

歸鬚 桃仁

延胡 薑汁

二汁法九

某

脹滿跗腫。小溲短濶不利。便泄不爽。當開太陽爲主。

五苓散加椒目。

濕濶疑
滯小溲
不行當
開太陽

某六七少腹單脹。二便通利稍舒。顯是腑陽窒痺。濁陰凝結所致。前法專治脾陽。宜乎不應。當開太陽爲要。

五苓散加椒目

鄭

兩投通裏竅法。痛脹頗減。無如陰陽不分。舌絳煩渴。不欲納穀。想太陽膀胱不開。陽明胃不可闔。法當仍與通陽腑爲要。但五苓桂朮斷不適用。議用甘露飲意。

此方不外逐水法

猪苓

茯苓

澤瀉

寒水石

椒目

炒橘核

程

今年長夏久熱。熱勝陽氣外泄。水穀運遲。濕自內起。漸漸浮腫。從下及上。至於喘咳。不能臥息。都是濁水凝痰。阻遏肺氣下降之司。但小溲不利。太陽氣亦不通調。此雖陽虛症。若腎氣湯中黃芩之酸膩力難下行矣。

止嗽之聖藥
但于熱症有
益

茯苓

桂枝木

杏仁

生白芍

乾薑

五味

生牡蠣

澤瀉

馬初起胸痺嘔吐。入夏跗、臙少腹悉腫。食穀不運。洩短不利。此陽氣式微。水穀之濕內蘊。致升降之機失司。當開太陽。姑走濕邪。

猪苓

三錢

桂枝木

八分

茯苓皮

三錢

澤瀉

一錢

防已

一錢半

厚朴

一錢

四帖

邱歲六齡。穉年夏至。濕熱外薄。所食水穀之氣。蒸爲濕滯。阻遏氣機。脾不轉運。水道不通。腹笥滿脹。幼科但知消導。不曉通腑泄濕。致脾氣大困。泄瀉不分陰陽。參苓之

小兒另有治法

補僅救消滌之害。不能卻除濕滯。故雖受無益於病。病根都在中宮。泄肝以安胃。分利以通腑。必得小瀨頻利。冀有中窓之機。當用末藥以漸消之

濕壅三
兼肺氣
不降

吳

猪苓

澤瀉

海金沙

通草

椒目

平昔濕痰阻氣爲喘。茲因過食停滯陰臟之陽不運。陽腑之氣不通。二便不爽。跗腫腹滿。診脈沉弦。猶是水寒痰滯。阻遏氣分。上下皆不通調。當從三焦分治。頃見案頭一方。用免絲子升少陰。吳茱萸泄厥陰。不知作何解釋。不敢附和。仍用河間分消定議。

大杏仁

萊菔子

猪苓

澤瀉

葶苈子

厚朴 桑白皮 廣皮 細木通

又三焦分消泄。肝通腑。二便不爽。如昔診脈浮小帶促。聞聲呼息不利。是氣分在上結阻。以致中下不通。喘脹要旨。開鬼門以取汗。潔淨腑以利水。無非宣通表裏。務在治病源頭。據脈症參詳。急急開上爲法。合金匱風水反登義矣。

麻黃

杏仁

石膏

甘草

苡仁

朱初因面腫邪干陽位氣壅不通二便皆少桂附不應即與導滯滯屬有質濕熱無形入肺爲喘乘脾爲脹六腑開合皆廢便不通爽澀短渾濁時或點滴覩其舌絳

口渴。腑病背脹。臟病腹滿。更兼倚倒左右。脢脹隨著處。
爲甚。其濕熱布散三焦。明眼難以決勝矣。經云從上之下者治其上。又云從上之下而甚於下者必先治其上。而後治其下。此症逆亂紛更全無頭緒。皆不辨有形無形之誤。姑以清肅上焦爲先。

飛滑石

一錢半

大杏仁

去皮尖十粒

生苡仁

三錢

白通草

一錢

鮮枇杷葉

刷淨毛去筋手內揉爛三錢

茯苓皮

三錢

淡豆豉

一錢半

黑山梔殼

一錢

急火煎五分服

此手太陰肺經藥也。肺氣窒塞當降。不降。杏仁微苦。則能降。滑石甘涼。滲濕解熱。苡仁通草淡而滲氣分。

喘脹此方甚合
足見心思靈巧
如此等治法真
可編入醫案其
重複套大半可
刪

枇杷葉辛涼能開肺氣。茯苓用皮。謂諸皮皆涼。梔豉宣其陳腐鬱結。凡此氣味俱薄爲上焦藥。倣齊之才輕可去實之義。

某暴腫氣急。小溲濇少。此外邪壅肺氣。分不通治。當從風水皮水宣其經隧。以能食能寢爲佳。勿得誅伐無過之地。

前胡

蜜炙麻黃

牛蒡子

薑皮

紫苑

杏仁

茯苓皮

廣皮

下焦寒濕流經

王脾尻微腫。小腿下臙腫甚。乃腑陽不行。病甚於暮。宜辛香通其經腑之鬱。

生於尤

炮川烏

北細辛

茯苓

漢防己

川獨活

又 中滿用餘糧丸獲效得煖下泄濁之力腹脹已去而
脾尻足跗肌肉腫浮夫臟寒生滿病煖水臟之陽培火
生土是法究竟陽未全復四末流行未布前議幽香通
其下焦經脈果得腫減議用加味活絡丹

炮川烏

方不中用乾地龍

乳香

沒藥

北細辛

桂枝木

用油松節三兩酒水各半煎汁法丸

濕熱塞
塞經喙

汪 腫自下起脹及心胸遍身崩膚赤癩溺無便滑濕熱
蓄水橫瀆經隧氣機閉塞呻吟喘急濕本陰邪下焦先

受醫用桂附芪朮。邪蘊化熱。充斥三焦。以致日加凶危也。此危病也無治法。

川通草一錢半
海金沙五錢
黃柏皮一錢半
木猪苓三錢

生赤豆皮一錢半
真北細辛一分

又煎法腫消三四仍以分消。

川白通草
猪苓
海金沙
生赤豆皮

草薢子
茯苓皮
晚蠶沙

又間日寒戰發熱渴飲此爲瘧乃病上加病飲水結聚下痛脹不敢用涌吐之法。暫與開肺氣壅遏一法。

大杏仁

蜜炒麻黃

石膏

此方無語

又。濕邪畱飲。發紅癰。胸聚濁痰。消渴未已。用木防己湯。

木防己一錢

石膏二錢

杏仁三錢

苡仁二錢

飛滑石一錢

寒水石一錢

通草煎湯代水

陳

進神芎導水丸二日所下皆粘膩黃濁形色余前議

集句名言此老
有時與此相背
不知何故

其理而疎針之

反有大害

腹滿下至少腹三陰都已受傷而周身瘀滯數年不

冀可皆安。戊己丸三錢用二日後再進前藥一服。

薛十腹滿下至少腹三陰都已受傷而周身瘀滯數年不

斷脈絡中必有濕熱就腹痛泄瀉。腑陽不通不獨偏熱偏寒之治常用四苓散。

此方全無實氣當用蒼蠅治法

猪苓三錢 茯苓三錢 澤瀉一錢 生於朮一錢 椒目五分

倪姪濕熱腳氣上攻心胸腕中滿脹嘔逆乃濕上甚爲熱化與苦辛先平在上之滿脹用瀉心法。

川連 黃芩 枳實 半夏

薑汁

杏仁

再加梔榔汁尤妙

濕鬱瘡

囊腫腹脹此屬瘡蠚

此非瘡蠚外治
並加赤豆銀花等藥則得之矣

茯苓皮 海金沙 白通草

大腹皮絨

厚朴

廣皮

猪苓

澤瀉

不火天
絡

某三性躁氣有餘便是火。肝膽中木火太絡成形爲脹。便

溺皆赤喉痛聲嘶瘻血。肝病過膈犯肺久延爲單腹脹。

難治小溫中丸三錢。

氣逆入
絡

吳五氣逆腹脹汨汨有聲已屬絡病難除病根。

老蘇梗

生香附

厚朴

白蔻仁

土瓜蔓

桔梗

枳殼

黑山梔

陽虛單
脈濁陰
凝滯

汪脈右濇左弱面黃瘦露筋乃積勞憂思傷陽濁陰起於少腹漸至盤踞中宮甚則妨食嘔吐皆單鼓脹之象大著調治最難欲驅陰濁急急通陽。

乾薑

附子

猪苓

澤鴻

椒目

又通太陽之裏驅其濁陰已得脹減嘔緩知身中真陽向爲羣藥大傷議以護陽兼以泄濁法

人參 塊茯苓 生乾薑 淡附子 澤瀉

又陰濁盤踞中土清陽蒙閉腹滿膜脹氣逆腹痛皆陽氣不得宣通濁陰不能下走擬進白通法

此症最宜緩劑不用此症本屬不治無用議也

生乾薑 生炮附子 沖猪膽汁

黃三停滯單脹並不渴飲晝則便利不爽夜則小溲略通此由氣分鬱渾致中焦不運先用大針砂丸每服一錢五分緩其水臟以泄濁

某向有宿痞夏至節一陰來復連次夢遺遂腹形堅大

二便或通或閉。是時右膝癰腫潰瘍。未必非濕熱閉阻經絡所致。診脈左小弱。右緩大。面色青減。鼻准明亮。納食必腹脹愈加。四肢惡冷。熱自裏升。甚則衄血。牙宣全。是身中氣血交結。固非積聚停水之脹。考古人於脹症。以分清氣血爲主。止痛務在宣通。要知攻下皆爲通腑。溫補乃護陽以宣通。今者單單腹脹。當以脾胃爲病藪。太陰不運。陽明愈鈍。議以緩攻一法。此亦敗症不治。

川桂枝一

錢

熟大黃一

錢

生白芍一

錢

厚朴一

錢

枳實一

錢

淡生乾薑一

錢

三帖

又

診脈細小。右微促。

畏寒甚。右脇中氣觸入小腹。著臥。

半

。

。

卽有形堅著。議用局方禹餘糧丸。煖水臟以通陽氣。

早晚各服一錢。流水送

八服

又 脈入尺弦勝於數。元海陽虛是病之本。肝失疏泄以致膩脹。是病之標。當朝用玉壺丹。午用疎肝實脾利水。分消太陽太陰之邪。

紫厚朴

炒一錢半

縮砂仁

炒研一錢

生於朮

二錢

豬苓

一錢

茯苓

塊三錢

澤瀉

一錢

又 脈弦數。手足畏冷。心中兀兀。中氣已虛。且服小鍼砂丸。每服八十粒。開水送。二服。以後藥壓之。

生於朮。雲茯苓。膚皮。煎湯一小杯後服。

又 脈如濇。凡陽氣動則遺。右脇汨汨有聲墜入少腹。可知腫脹非陽道不利。是陰道實。水穀之濕熱不化也。議

用牡蠣澤瀉散。

左牡蠣四錢泄濕澤瀉半錢

花粉一錢半

川桂枝木五分通陽

茯苓三錢化氣

紫厚朴一錢半

午服

又 脈數實惡水。午後手足畏冷。陽明中虛。水氣聚而爲飲也。以荅桂朮甘湯劫飲。牡蠣澤瀉散止遺逐水。

照前方去花粉加生於朮三錢。

又 手足畏冷。不喜飲水。右脇汨汨有聲。下墜少腹。脈雖數而右大左弦。信是陽明中虛。當用人參熟附生薑溫。

經補虛之法。但因欲回府調理數日。方中未便加減。且用前方調治太陽太陰。

生於朮

三錢

左牡蠣

生四錢

澤瀉

炒一錢

雲苓

三錢

生益智

四分

桂枝木

四分

炒厚朴

一錢

午後食遠服

脾胃氣
窒不和

楊柳

十味

過辛酸。脾胃氣傷結聚。食入則脹滿。曾服礞石大

黃丸。滯濁既下不愈。病不在平腸中。前賢治脹治滿。必曰分消。攻有形不效。自屬氣聚爲瘕。疎胃宜清。調脾當暖。此宗前賢立法。

生茅朮 廣皮

丁香皮

黃柏

草豆蔻

脹俱在脰外
兼膈膜之間

川黃連 厚朴

茯苓

澤瀉

水法丸

脹滿之爲病。卽使正虛終屬邪。實古人慎用補法。又脹必有濕。濕則有熱。內經所以指爲熱症。今多用溫補之藥。內雖有通利之品。而臣不勝主。殆誤必多細閱。諸案愚愈者少而不治者多也。

脹滿必有有形之物。宜緩緩下之。
腫脹證。大約腫本乎水。脹由乎氣。腫分陽水陰水。其有因風因濕因氣因熱外來者。爲有餘。卽爲陽水。因於大病後。因脾肺虛弱。不能通調水道。因心火尅金。肺不能生腎水。以致小便不利。因腎經陰虧。虛火燦肺。金而渴少。悞用行氣分利之劑。漸至喘急痰盛。小水短赤。釀成腫證。內發者爲不足。卽爲陰水。若脹病之因更多。所脹之位各異。或因濕因鬱。因寒因熱。因氣因血。因痰因積。因蟲。皆可爲脹。或在臟在腑。在脈絡在皮膚。在身之上下。表裏皆能作脹。更或始因於

寒久鬱爲熱。或始爲熱中，未傳寒中。且也，脹不必兼腫。而腫則必兼脹。亦有腫脹同時並至者。其病形變幻不一。其病機之參伍錯綜，更難敘述。故案中諸症，有濕在下者，用分利。有濕在上中下者，用分消。有濕而著裏者，用五苓散通達膀胱。有濕鬱熱兼者，用半夏瀉心法苦辛通降。有濕熱氣鬱積者，用雞金散加減。消利並行，有氣血鬱積，夾濕熱之邪，久留而不散者，用小溫中丸，清理相火，健運中州。有濕熱與水寒之氣交橫，氣喘濁少，通身腫脹者，用禹餘糧丸。崇土制水，緩下泄濁。有寒濕在乎氣分，則用薑附。有寒濕

入於血分。則用桂附。有濕上甚爲熱。則用麻杏膏。或等味。清肅上焦之氣。有濕下著爲痺。則用加味活絡等劑。宣通下焦之鬱。有藉平製黃歸尾者。搜逐血沫之痺結於腹脇也。有藉平製黃歸尾者。搜逐血沫之凝滯於經隧也。有藉乎玉壺控涎神保神芎者。視其或輕或重之痰。飲水積而驅之也。此皆未損夫臟氣。而第在腑之上下膜之表裏者也。若有胃陽虛者。參苓必進。脾陽衰者。尤附必投。更有傷及乎腎者。則又湯疎厥陰之逍遙散。蓋由證之牽連而及。是又案中

法外之法也已。姚亦陶