

De Constructione Problematum Solidorum, sive
 Æquationum tertiae vel quartæ Potestatis, unica
 data Parabola ac Circulo efficienda ; dissertati-
 uncula : Authore *Edm. Halley.*


Quo pacto æquationes omnes Cubum vel Quadrato-quadratum quantitatis incognitæ involventes, ope Parabolæ cujuscunq; datæ & Circuli, construi possint, clare tradit ac Liquido demonstrat præclarus ille Cartesius in Lib. III. Geometriæ suæ : sed primum jubet secundum æquationis terminum, si adfuerit, tollere, ac deinde reductæ æquationis Radices regula ibidem exposita elicere. Cum vero operatio ista nimis laboriosa videatur, nonnullis visum est constructionem similem etiam absq; ulla prævia reductione comminisci ; inter quos Franciscus a Schooten Methodum valde facilem ac simplicissimam pro construendis Cubicis quomodolibet affectis prodidisset, si modo exposito principio unde regulam derivavit, Lectoris memorie, quam plurimis ac intricatis cautionibus obruit, melius studuisse. Nuper vero Vir Cl. D. Thomas Baker nostras, integro libello de constructionibus hisce conscripto, non solum Cubicas sed etiam Biquadraticas omnes cujuscunq; generis unica generali regula complexus est, eamq; demonstrationibus ac Exemplis per omnes casus abunde satis illustravit ; nec non sub finem modum proponit unde regula ista generalis investigari possit : Haud tamen illum ipsum ostendit, cuius ope (uti suspicor) Clavem suam Geometricam Catholicam obtinuit, vel saltem multo facilius obtinere potuit. Cumq; perplexis cautionibus de signis + & — Regula hæc D. Bakeri non minus obnoxia sit quam illa Schooteni, ut vix absente libro constructiones illas quis tuto peragat ; haud injucundum nec Tyronibus incommodum fore vi-

tum est, viriusq; fundamentum exponere, ac simul emendata methodo, in re tam difficulti, lucem quantum valeam afferre.

Construcción quam tradit Cartesius, quæq; facilime radices æquationum omnium Cubicarum vel biquadraticarum, ubi deficit secundus terminus, eruit, ut nota supponi potest; attamen cum cardo sit a quo subsequentia pendent, ne dissertatiuncula hæc capite truncata videatur, ex illius Geometria desumptam placuit Regulam adjungere, pauculis nonnullis in melius uti reor transpositis.

Deficiente secundo termino omnes æquationes Cubicæ reducuntur ad hanc formam $z^3 + \frac{a}{z} = 0$, ac Biquadraticæ ad hanc $z^4 + \frac{a}{z^2} = 0$. (ubi a designat Latus rectum Parabolæ cuiusvis datae, quam in Construccióne adhibere licet.) vel sumendo a pro Unitate, ad hanc $z^3 - \frac{p}{z} + q = 0$, vel ad hanc $z^4 - \frac{p}{z^2} + q = 0$.

Jam data Parabola F-
A G cujus Axis fit A C-
D K L ac latus rectum a
vel 1, fiat A C ejus dimen-
suum ac collocetur semper
a vertice A versus interio-
ra figuræ: dein sumatur
 $CD = \frac{1}{2}p$ in linea illa
A C continuata versus C
si in æquatione fuerit $-p$,
vel versus alteram par-
tem si habeatur $+p$. Por-
ro e puncto D, aut ex punc-
to C si non habeatur quan-
titas p, erigenda est ad
axem perpendicularis D-
E æqualis $\frac{1}{2}q$, dextror-
sum quidem si fuerit $-q$, ad alterum vero axis latus si fuerit
 $+q$; ac Circulus centro E radio A E descriptus, si æquatio fu-
erit tantum Cubica, Parabolam tot punctis F & G intersecabit
quot veras habet Radices, quarum quidem affirmativæ ut G K



erunt

erunt ad dextram Axis partem, Negativæ ut F L ad finistram.

Ast si $\text{Æquatio Biquadratica}$ fuerit, augeri vel minui debet Circuli Radius AE, addendo si fuerit $-r$, vel subducendo, si sit $+r$, ex ejus quadrato rectangulum a r, seu contentum sub Late-re recto & quantitate data r; id quod nullo fere negotio efficitur Geometricæ. Hujus vero Circuli intersectiones cum Parabola omnes veras Biquadraticæ Æquationis radices dimissis ad Axem perpendicularis exhibebunt; Affirmativas quidem ad dextram Axis, Negativas vero ad finistram. Totius demonstrationem Cartesio ejus inventori relinquo.

Notandum hic me operam dare ut semper habeantur Radices affirmativæ ad dextrum Axis latus, ut evitetur confusio a pluribus cautionibus, quarum causa minime evidens est, necessario critura.

His præmissis, ut aditus pateat ad constructionem etiam earum æquationum ubi reperitur terminus secundus, consideranda venit regula pro tollendo termino secundo, ac reducenda æquatione ad aliam quæ methodo præcedente construiri possit. Omnes vero hujus classis æquationes cubicæ ad hanc formam $z^3 \cdot b z z \cdot a p z \cdot a a q = 0$, vel ad hanc $z^3 \cdot b z z \cdot * \cdot a a q = 0$. Biquadraticæ vero ad hanc $z^4 \cdot b z^3 \cdot a p z z \cdot a a q z \cdot a^3 r = 0$, vel hanc $z^4 \cdot b z^3 \cdot * \cdot a a q z \cdot a^3 r = 0$, vel, $z^4 \cdot b z^3 \cdot a p z z \cdot * \cdot a^3 r = 0$ vel deniq; ad hanc $z^4 \cdot b z^3 \cdot * \cdot * \cdot a^3 r = 0$ reduci possunt: e quibus omnibus, prout signis + & - diversimode connectuntur, ingens oritur varietas; unde Regula generalis omnibus inserviens obscura ac maxime difficultis redditur, nisi methodo quam sub-jungimus illustrata nodisq; extricata tractetur.

Tollitur in Biquadraticis secundus terminus, ponendo $x = z - \frac{1}{4}b$, si fuerit $+b$ in æquatione, vel $x = z - \frac{1}{4}b$, si fuerit $-b$: hinc $x - \frac{1}{4}b$ in prima casu, & $+ \frac{1}{4}b$ in altero æquatur z; & in æquatione quavis proposita, substituta loco z quantitate æquali, prodibit nova æquatio termino secundo carens, cuius radices omnes x data differentia $\frac{1}{4}b$ vel excedunt vel deficiunt a radice quæsita z: Cum vero in rebus istiusmodi plus exempla quam præcepta valere solent, proponatur una vel altera æquatio Construenda.

Exemp. I.

$$z^4 + bz^3 - apzz - aaqz + aaar = 0.$$

$$\text{Sit } x - \frac{1}{4}b = z \quad \text{Et erit}$$

$$xx - \frac{1}{2}bx + \frac{1}{16}bb = zz$$

$$xxx - \frac{3}{4}xxb + \frac{3}{16}xbb - \frac{1}{64}bbb = z^3$$

$$\& x^4 - bx^3 + \frac{3}{8}bbbxx - \frac{1}{16}b^3x + \frac{1}{256}b^4 = z^4.$$

binc.

$$\begin{aligned} x^4 - bx^3 + \frac{3}{8}bbbxx - \frac{1}{16}bbb x + \frac{1}{256}b^4 &= z^4 \\ + bx^3 - \frac{3}{4}bbbxx + \frac{3}{16}bbb x - \frac{1}{64}b^4 &= +bz^3 \\ - apxx + \frac{1}{2}apbx - \frac{1}{16}apbb &= -apzz \\ - aaqx + \frac{1}{4}aaqb &= -aaqz \\ + aaaa & \end{aligned}$$

Harum omnium summa fit æquatio nova secundo termino carens, quæq; proinde juxta regulam Cartesianam construi possit, sumendo loco $\frac{1}{2}p$ dimidium coefficientis termini tertii per a sive Latus rectum divisi, hoc est $-\frac{3}{16}\frac{bb}{a} - \frac{1}{2}p$; ac Loco $\frac{1}{2}q$, dimidium coefficientis termini quarti per aa divisi, sive $+\frac{1}{16}\frac{bbb}{aa}$

$$+ \frac{1}{4}\frac{pb}{a} - \frac{1}{2}q.$$

Cujus partes signo + notatae sinistrorum ab Axe, signo - notatae dextrorum collocandæ sunt, ut habeatur centrum Circuli ad constructionem requisiti, ac cuius intersectiones cum Parabola, dimissis in axem perpendicularis, radices omnes veras x designet, affirmativas quidem ad dextram axis, negativas vero ad sinistram. Cum vero $x - \frac{1}{4}b = z$, ducendo linéam Axi parallelam, ad dextrum ejus latus & ad distantiam $\frac{1}{4}b$, perpendicular illa ad hanc parallelam terminata designabunt omnes radices quæsitas z, affirmativas ad dextram, negativas vero ad sinistram. Radium circuli quod attinet, habetur ille addendo partes negativas ac auferendo partes affirmativas termini quinti per a a divisi, e quadrato lineæ AE, a centro invento E ad

Ver-

Verticem Parabolæ Adiuctæ : id quod maxima ex parte efficitur capiendo loco lineæ AE lineam EO, quæ ad O intersectionem Parabolæ ac parallelæ prædictæ terminatur ; ejus enim quadratum omnes termini quinti partes ex ablatione termini secundi æquationi novæ ingeßtas complectitur (uti facile probabitur :) ac restat solummodo ut ipsis EO quadratum augeatur, si in æquatione habeatur $-r$, vel minuatur si sit $+r$, additione vel subtractione rectanguli a r, unde conflatur quadratum Radii Circuli quæfisi.

Hæc est methodus investigandi regulam centralem Dni Bakeri omnibus cautionibus libera ac satis facilis ; ac sola differentia ex eo provenit, quod ego juxta Axem, ille vero juxta Axi parallelam circuli ejusdem centrum determinat : quodq; ego semper radices affirmativas ex Axis dextro latere invenio, quas ille nunc dextro nunc sinistro constituit.

Æquationes cubicas quod attinet, eæ reduci debent ad Biquadraticas, antequam eadem regula generali construi possint ; id quod fit ducendo æquationem propositam in radicem suam z, unde provenit æquatio Biquadratica in qua deficit terminus ultimus sive r : quapropter sublato secundo termino & invento centro E, linea EO est radius Circuli ; cum scilicet a r sit = 0, & in nova æquatione totus terminus quintus ex ipso ablatione termini secundi eriatur. Construenda sit hæc æquatio.

Exemp. II.

$$z^3 - bz^2 + apz + aaq = 0 : \text{Quæ ducta in } z \text{ fit}$$

$$z^4 - bz^3 + apzz + aaqz = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{Ad tollendum secundum terminum ponatur } x + \frac{1}{4}b = z, & \text{ & fit} \\ x^4 + bx^3 + \frac{3}{8}bbxx + \frac{1}{6}b^3x + \frac{1}{2\cdot 5\cdot 6}b^4 & = +z^4 \\ = bx^3 - \frac{3}{4}bbxx - \frac{3}{8}b^3x - \frac{1}{6}b^4 & = -bz^3 \\ + apxx + \frac{1}{2}abpx + \frac{1}{6}apbb & = +apzz \\ + aaqx + \frac{1}{4}aaqb & = +aaqz \end{aligned}$$

In bac nova Æquatione, tertii termini semicoefficiens per a divisa, viz. $= \frac{3}{16} \frac{bb}{a} + \frac{1}{2}p$, loco $\frac{1}{2}p$ usurpanda est ; ac coeffi-

cientis termini quarti dimidium, divisum per a a Lateris recti quadratum, viz. — $\frac{b b b}{16 a a} + \frac{p b}{4 a} + \frac{1}{2} q$, vicem ipsius $\frac{1}{2} q$ in constructione Cartesii subit; unde centrum E determinatur. Deinde ducta Axi parallela ad distantiam $\frac{1}{4} b$ ad finitrum ejus latus (ob $x + \frac{1}{4} b = z$) cuius intersectio cum Parabola sit O; circulus centro E, Radio EO descriptus Parabolam fecet vel tangat in tot punctis quot aequatio veras habet radices: quae quidem radices seu z sunt perpendiculara de punctis illis in Axi parallelam demissa; ad dextram-quidem Affirmativa, Negativa ad sinistram.

Si in aequatione defuerit terminus tertius vel quartus vel uterque, in investiganda regula centrali nulla omnino observanda est methodus differentia, sed deficiente quantitate p vel q, derunt partes illae linearum C D ac D E ex quantitate illa aliquo modo deductae, ac procedendum est cum reliquis coefficientibus termini tertii and quarti in aequatione nova, sicut in præmissis exemplis prescriptum est.

Hactenus Cl. Bakeri methodum generalem pertractavimus, qua quidem nulla alia facilior ac parator expectanda est, assumpta ad constructionem sive Parabola, sive alia quævis linea curva, cum scilicet aequatio ad Biquadraticam ascendit. Etenim dum hæc scribo mihi occurrit regulæ Centralis Effectio Geometrica præter omnem spem expedita, ac barum rerum Curiosis abunde satisfacta.


Descripta Parabola N A M, cuius vertex A, Axis A B C ac latus rectum a, reducatur aequatio ad hanc formam $z^4 \cdot b z^3 \cdot a p z z \cdot a a q z \cdot a^3 r = o$ vel ad hanc $z^3 \cdot b z z \cdot a p z \cdot a a q = o$ si cubica tantum fuerit: dein ad distantiam B D = $\frac{1}{4} b$ ducatur linea D H Axi parallela, ad sinistram quidem si fuerit $-b$, ad dextram si $+b$, parabolæ occurrens in punto D; de quo dimittatur perpendicularum in axem B D. In linea A B continuata versus B fiat B K = $\frac{1}{2} a$, & ducatur linea D K utrinq; interminata. Porro sit K C = 2 A B in Axe semper ultra K continuato; ac si habeatur quantitas p signo — affecta, versus easdem partes etiam sumatur C E = $\frac{1}{2} p$, vel in contrarias,

si habeatur $+ p$, ac e puncto E erigatur Axi perpendicularum E F (vel e puncto C si defuerit quantitas p) linea D K, si opus est continuatæ, occurrens in puncto F; quod quidem circuli requisiti centrum est, si defuerit quantitas q; At si habeatur q, sumenda est in F E, si opus est continuata, linea FG = $\frac{1}{2}q$, sinistrorsum quidem si fuerit $+ q$, dextrorsum si $- q$ collocanda: Et punctum Gerit centrum circuli ad constructionem propositam idonei; ejusq; Radius, si defuerit quantitas r, hoc est si tantum cubica fuerit, erit linea G D; cuius quadratum in Biquadraticis augendum est, si fuerit $- r$, vel minuendum si $+ r$ additione vel subduktione rectanguli sub r & latere recto. Descripto sic Circulo, ab intersectionibus ejus cum Parabola demissis in lineam D H perpendicularis, que ad sinistram sunt, ut NO, radices æquationis negativas semper designant, que ad dextram ut ML affirmativas.

Aliter ac paulo simplicius æquationes cubicæ juxta Schootenii Regulam construuntur, quaq; etiam radices ad Axem referuntur: quoniam vero ipse inventor nec modum inveniendi nec demonstrationem inventi exponit, non abs re erit ejusdem fundamentum bic adficere, simul atq; Effectiōnem Geometricam concinniorem reddere, atq; cautionibus quibus implicatur extricare.

Hæc Regula derivatur ex eo quod omnis æquatio Cubica reduci possit ad Biquadraticam, in qua deficiet terminus secundus: Hoc fit ducendo æquationem propositam in $z - b = 0$, si fuerit $+ b$ in

W w 2 equa-



α equatione, vel in $z + b = 0$, si fuerit $-b$; & α equatio nova produc $\ddot{\alpha}$ ta easdem habebit radices cum Cubica, atq, insuper alteram ipsi $-b$ α equalem, si fuerit $-b$ in α equatione, vel contra.

Proponatur conſtruenda $z^3 - z^2 b + apz + aaq = 0$.

Hoc ducta in $z + b$ fit $z^4 - z^3 b + apz^2 + aaqz$
 $+ z^3 b - bbzz + abpz + aaqb$.

Hic deficit secundus terminus, ac coefficiens tertii $-bb + ap$
 $dat - \frac{b}{a} \frac{b}{a} + \frac{1}{2} p$ loco $\frac{1}{2} p$ vel C D in Constructione Cartesii,


& ex dimidio coefficientis termini quarti fit $+ \frac{1}{2} q + \frac{bp}{2a}$ loco

$\frac{1}{2} q$ vel DE usurpanda; adeoq; determinatur centrum circuli queſti: atq; ob datam unam ex radicibus α equationis novae, viz. $-b$ vel $+b$, dabitur etiam punctum in circumferentia, id est Radius ejus. Deniq; descripto circulo, ab intersectionibus ejus cum Parabola demissa in Axem perpendiculara α equationis radices exhibebunt, affirmativas & negativas, eadem lege ac ſupra.

Investigatur autem centrum Circuli constructione querquam facili, ceterisq; omnibus in Cubicis praeferenda. Descriptae Parabolæ A M D fit vertex A, atq; Axis

A F: ad diſtantiam ipsi
 b α qualem ducatur Axi
 parallelia D K, ad dextram si fuerit $+b$ in α equatione, ad finitram si
 $-b$, quæ Parabolæ occurrat in puncto D. Centris D & A desribantur
 radiis α equalibus arcus occulti utring; ſeſe interſecantes, ac per ſectionum
 puncta ducatur linea interminata B C, quæ
 medio lineæ ſuppoſitæ A D
 perpendiculariter inſtitat,

& Axi occurrat in puncto E. Ab E, inferne quidem si in α equatione habeatur $= p$, vel ſuperne versus A si fuerit $+p$, ponatur



tur $E F = \frac{1}{2} p$; & ex \bar{F} (vel ex E si defuerit p) educatur perpendicularum $F G$, linea $B C$ occurrens in puncto G ; & in $G F$ producta fiat $G H = \frac{1}{2} q$, dextrorsum quidem si in æquatione habeatur $-q$, aliter sinistrorsum, applicanda: ac punctum H erit centrum quæsitum, $H D$ vero circuli Radius, qui demissis in axem perpendicularis ab intersectionibus suis cum Parabola, ut $L M$, Radices omnes, ut prius, commonstrabit. Quomodo vero constructio hæc ex præmissis consequatur, per se satis edens est, nec opus est ut in eadem demonstranda diutius immorer.

Ne in his edendis frustraneam navasse operam, & ex aliorum inventis gloriolam captare videar, consulat Lector Cl. Bakeri librum Anno 1684 Londini editum, & quæ de hoc Argumento scriptis a Schooten in Commentario suo in Librum III. Geometriæ Cartesianæ. Brevi concessò otio tractatulum alium de numero Radicum in hujusmodi Aequationibus, earumq; limitibus, ex contemplatione Constructionum paœcedentium, aggredi ac in lucem proferre statuo.
