


25



OCT 31 1999

赤水玄珠第十三卷

內傷門

傷飲

傷食

不能食

積聚門

附五臟積方

石癥

腸覃



赤水玄珠第

三卷

初安生生子孫一奎著輯



內傷門

茲以傷飲傷足之症則節

言為一門而勞心竭力不抄東垣脾胃論附之

傷飲傷食

生生子曰傷飲傷食之症多是有餘當另標一門

不當與內傷門混治何者夫內傷二字乃病機

總辭凡諸勞心勞神耗竭精氣及損傷營衛臟

腑筋骨血脉莫不皆以傷病也故古人有五勞

七傷之謂斯為不足之疾証多類似東垣內外

傷辨惑已詳之矣夫有餘當消不足當補天壤懸絕症涉疑似而又溷為一門恐初學於有餘中之不足不足中之有餘及純有餘純不足之証茫無分別則用藥未免有虛、實、之悞予故所以另標 一門庶幾易於尋治也且也以証所患甚多系關妙處只三節隨輕重緩急治之百發百中初食傷之時填塞胸膈脹滿疼痛急宜用吐法吐而出之緣食未入於胃停積膈間吐之甚易証謂在上者因而越之是也食已

下膈入胃則不可用吐法強吐之亦不能盡出又不宜遽用下藥下之早則傷中氣胃既為飲食所傷又復能受藥之傷乎而清純冲和之氣并為之下陷故曰雜病酒積下之早亦作痞氣惟當健脾消導俟其盡入大腸而痛在臍腹乃可用下法下之經謂在下者引而竭之是也皆順其勢而利導之殊易為力故治亦無所悞也

東垣曰陰陽應象論云水穀之寒熱感則害人六

腑痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自
倍腸胃乃傷此乃混言之也分之為二飲也食
也飲也者水也無形之氣也因而大飲則氣逆
形寒飲冷則傷肺肺病則為喘咳為腫為水瀉
輕則當發汗利小便使上下分消其濕解醒湯
五苓散生姜半夏枳實白朮之類是也如重而
蓄積為物也有形之血也如生氣通天論云因
而飽食筋脈橫解腸癖為痔又云食傷太陰厥
陰寸口大於人迎兩倍三倍者或嘔吐或痞滿

或下痢腸澼當分寒熱輕重治之輕則內消重
則除下如傷寒物者半夏神麴乾姜三稜廣茂
巴豆之類主之如傷熱物者枳實白朮青皮陳
皮麥蘗黃連大黃之類主之亦有宜吐者陰陽
應象論云在上者因而越之瓜蒂散之屬然而
不可過劑過則反傷腸胃蓋先因飲食自傷又
加之以藥過故腸胃復傷而氣不能化食愈難
消矣漸至羸困故五常正大論云大毒治病十
去其六小毒治病十去其七常毒治病十去其

八無毒治病十去其九不可過之此聖人之深戒 傷飲多以五苓散為主

五苓散 治飲煩渴飲水過多或水入即吐心中

澹澹停濕在內小便不利 方見暑門 治傷

冷飲者煎五苓散送半夏枳朮丸 治傷飲不

惡寒胸中微覺忤悶身重飲食不化者或小便

不利者五苓散去桂依前斟酌服之 如痰熱

在裏身發黃疸食前濃煎茵陳湯調服愈

除濕散 傷馬牛乳酪及米水一切冷物

半夏炮 乾姜各三錢 車前子炒 澤瀉各五錢 甘草

紅花各二錢 茯苓七錢

右為細末每服二錢食前白湯調下

導飲丸 治水飲 吳茱萸三錢 白茯苓 蒼朮

黃連各一錢五 獨活七錢 右為細末神麩糊丸服

丹溪茱萸丸 治飲 白滑石六兩 甘草

吳茱萸各一兩 水丸服

傷酒

東垣曰酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也

八十三卷
四
若傷之只當發散汗出則愈矣其次莫如利小便乃上下分消其濕今之病酒者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血垂悞甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之亦損腎水真陰及有形陰血俱為不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是以元氣消爍折人長命不然則虛損之病成矣酒疸下之早又則為黑疸慎不可犯宜以葛花解醒湯主之

王海藏曰治酒病宜發汗若只利小便炎焰不肯下行故曰火鬱則發之以辛溫散之是從其本性也是知利小便則濕去熱不去若動大便尤為踈陋蓋大便秘者有形質之物酒者無形之水從汗而發之是為近理濕熱俱去故治以苦溫發其火也佐以苦寒除其濕也

統旨曰傷酒惡心嘔逆吐宿酒昏冒眩暈頭痛如破宜二陳湯加黃連乾葛煎服或沖和湯縮脾湯五苓散用乾葛煎湯調服久困於酒遂成

酒積腹痛泄瀉或暴飲有灰酒亦能致之並宜
酒煮黃連丸○多飲結成酒癖腹中有塊隨氣
上下沖和湯加黃連蓬朮酒停胸膈為痰飲者
枳實半夏湯加麴孽用吐法尤妙

劉宗厚曰酒者是有形之物即水飲同躰也今言
無形元氣受病不得傷于有形陰血者蓋謂酒
者濕熱之物入胃則臟氣俱熱逐氣升降之際
而半有消耗之矣至傷於腸胃則升之不散降
之不下鬱於氣分無形之地位故言無形之物

非若水飲性躰全降於腸胃中也若今人之飲
醇酒則便少以此其可驗是以傷則宜汗之瀉之
不得用重峻下劑蓋以此等藥不能入氣分反傷
有形陰血耳但斯意隱然使人不能無疑故或
有辨之者茲不復具然昔人有用下劑者蓋或
有酒飲傷積日久而汗之泄之不能愈則重峻
下劑而或可哉故用者自宜對症詳審勿以辭
害意可也

東垣葛花解酲湯 飲酒太過嘔吐痰逆心神煩

亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

青皮三分木香一分橘紅各五分人參一分茯苓一分猪苓一分

各一錢神麴炒澤瀉一分乾姜一分白朮各二錢白芷一分

葛花一分砂仁各五錢右為細末每服三錢白湯調

下但得微汗則酒病去矣此蓋不得已而用

之豈可恃此酣飲成病自損元氣惟病酒者宜

之

舟溪烏梅丸 治酒毒化痰消食 烏梅一斤

半夏各八兩白礬各二兩生薑二兩右為細末以新瓦

二片夾定火焙三日夜為度次入神麴麥芽陳

皮青皮莪朮枳殼丁皮大腹子各四兩糊丸每

服四五十九姜湯下

潔古百杯丸 酒停胸中膈氣痞滿面色黃黑將

成癖疾飲食不進日漸羸瘦如欲飲者先服不

醉 生薑一斤去皮切片以鹽一分橘紅一分乾姜各三

兩木香一分茴香各一錢廣茂三錢益智仁二十粒

丁香五十粒砂仁一分白豆蔻各三粒甘草一分三稜各

錢二右煉蜜丸每一兩作五丸硃砂為衣姜湯

嚼下

酒煮黃連丸 方見下血門

濟世方酒積烏梅丸 烏梅一兩

青木香錢四砂仁

五錢巴豆霜一錢

半夏錢七麩

枳實錢五

杏仁錢三

黃連浸一兩宿

右飪餅糊為丸 菘荳大每服八

丸白湯下

傷食

生生子曰傷食痛急者用前上中下三法不痛而發熱頭疼痞悶者究其所傷何物寒熱孰多而

為之治今收各家方法詳列於後

東垣脾胃論中已具者

不復入但于飲茶治可也

丹溪曰傷食惡食者胸中有物宜導痰補脾用二

陳湯加白朮山查川芎蒼朮服之

憂抑傷脾不思飲食炒黃連酒炒芍藥同清六

丸末加香附以姜汁浸蒸餅糊為丸服

統旨曰傷食胸膈痞塞吐逆噯酸噫敗卵臭畏食

頭疼發熱惡寒病似傷寒但身不痛氣口脉緊

盛治中湯加砂仁或十香丸

察古枳朮丸 治痞積消食強胃

王海藏云本仲景枳朮湯也今易老改為丸治

老幼虛弱飲食不化或臟腑軟弱者

枳實去白麩炒一兩白朮二兩 右為末荷葉包燒飯為

丸桐子大每服五十九白朮湯下服白朮者本

意不取其食速但久服令人胃氣強食不復傷

也

麩朮枳朮丸 為人強食所致心胸滿悶不快

神麩炒麥朮炒枳實炒各一兩白朮二兩

右為末荷葉燒飯為丸每服五十九

木香枳朮丸 破滯氣消飲食開胃

木香 枳實各一兩白朮二兩 照上法為丸服

又方 開胃進食 木香三錢人參各一錢乾姜各一錢

枳實一兩白朮二兩 為末照上法為丸白湯吞

五十九

檳榔丸 消食破滯氣 檳榔三錢木香 人參各二錢

陳皮五錢甘草一錢 右蒸餅糊為丸每服五

十九

羅太無檳榔木香丸 踈三焦寬胸膈破痰飲快

意潤腸 方在氣門

丹溪保和丸 治食積酒積 山查肉一兩半夏製姜

蘿蔔子炒黃連姜汁炒橘紅 神麴各五錢麦芽炒

錢 右神麴糊為丸每服七八十丸姜湯下

大安丸 脾經消導之劑 山查二兩神麴炒半夏

製茯苓各一兩陳皮 連翹 蘿蔔子炒各五錢白朮

二兩 右神麴糊為丸每服五十丸

白朮丸 治傷豆粉濕麴油膩之物

白朮 半夏製神麴 枳實各一兩橘紅七錢黃芩

五錢 枯礬三錢 右浸蒸餅糊為丸量所傷多寡加

減服之如素食多用乾姜故以黃芩瀉之

半夏枳朮丸 治因冷食內傷 半夏姜製二兩枳實

炒白朮各一兩 右末荷葉飯為丸一方有澤瀉

木香乾姜枳朮丸 破滯氣消寒飲食

木香三錢乾姜炮五錢枳實炒一兩白朮二兩

右荷葉飯為丸每服五十丸

丁香爛飯丸 治食傷太陰又治卒心痛胃夜

丁香 甘草炙三稜炮 廣茂炮 木香各一 玉皮

甘松淨砂仁 益智仁各三錢 香附五錢

右浸蒸餅糊為丸每服七十九

香砂和中湯 治飲食所傷脾胃嘔吐胸滿噯噫

或胸腹脹疼 藿香 砂仁各半 蒼朮二錢 厚朴

陳皮 半夏 茯苓 青皮 枳實一錢 炒各

甘草三分 大便瀉枳實青皮加麥蘩山查

水二鍾姜三片煎八分食遠服

加味枳朮丸 白朮米泔浸 枳實去白 炒二兩 陳皮

半夏泡 神麴炒 麦芽炒 山查肉各一兩 如胃寒或

冬月加砂仁一兩 氣滯不行加木香五錢 常有

痰火又兼胸膈痞悶加黃連炒 姜汁 茯苓各一

右末荷葉飯為丸每服五六十丸

化食養脾湯 人參 白茯苓 陳皮 半夏

神麴炒 麦芽炒 山查各一錢 砂仁八分 甘草三分 白朮

半一錢 胸膈痞脹甚者加厚朴枳實各一錢

胃脘痛加草薹仁一錢 氣滯痰盛者去人參加

香附半一錢 夏倍之 水三鍾姜三片煎八分食

遠服

秘方思食調中

脾胃久弱飲食不消氣滯胸

膈痞悶嘔逆痰水

白木

米泔浸

人參

七錢

木香

五錢砂仁

香附

陳皮

半夏麴

炒

神麴

炒麥芽

炒各一兩甘草

炙四錢

右末陳米糊為

丸梧子大每服百丸白湯下

治中湯

即理中湯加青皮陳皮

十香丸

傷飲食胸膈腹疼或氣滯積聚皆可服

甘松

炒

益智仁

炒

香附子

各四兩

京三稜

二兩

莪朮

一兩

青皮

陳皮

各三兩

砂仁

一兩

木香

二兩

甘草

炒一兩

水浸蒸餅糊為丸梧子大每服五

十丸姜湯下

枳實半夏湯

枳實

炒

半夏

泡各五錢

姜五片水

二鍾煎服

治心腹膨脹

多食積所致

南星

姜製

半夏

姜製

瓜蒌仁

各一兩半

香附

童便浸一兩

黃連

姜汁炒三兩

青蒙石

煨

蘿蔔子

炒

連翹

陳皮

各五錢

射香

少許

右末神麴糊為丸

治因麪內傷發熱頭痛作吐 白朮半一錢 白芍

陳皮 蒼朮錢各一 茯苓 黃連 人參 甘草

各五 姜三片 口渴加葛根錢二

楊氏家藏葶藶橘紅散 溫脾養胃升降陰陽和

三焦化宿食 丁香 木香各一兩 人參 白朮

仁 厚朴製姜 橘紅 神麪炒 乾姜炒

半夏麪 甘草炒 藿香 白朮各五錢

每服五七錢姜三片枣一枚水煎服

紅丸子 溫脾胃消寒冷食積併治冷瘧

京三稜 莪朮 陳皮去白 青皮去白各五斤 乾姜

炮 胡椒各二斤 右末醋煮糊為丸梧子大以礬

紅為衣每服二十九食後姜湯下

消食化氣香殼丸 醒脾去積順氣化痰

青皮炒 陳皮炒各四兩 蘿蔔子炒 木香 三稜炒

蓬朮 神麪 麥芽各一兩 枳殼炒二兩 半夏二兩

枳實炒一兩 香附子醋炒一兩 檳榔 山查 草菓

各一兩 陳倉米一升同巴豆二十粒

右末醋糊丸梧子大每服四五十九漸加至

七十丸食後白湯下

青橘皮散 食過飽痞悶消食化氣醒酒

青橘皮去白炒 葛根一兩 砂仁五錢 為細末濃茶

調服

寬中丸 治胸膈痞悶停滯飲食 山查肉

蒸熟為末丸服

除濕益氣湯 傷濕麩心腹滿悶肢躄沉重

枳實炒 白朮 黃芩各一兩 蘿蔔子炒半兩 神麩

一兩 紅花三錢 荷葉飯為丸 藜豆大五服 下丸

白湯下

二黃丸 傷熱食痞悶兀兀欬吐煩亂不安

黃芩二兩 黃連一兩 升麻酒炒 柴胡各三錢 甘草二錢

枳實炒五錢 餅糊為丸 每服七十丸 姜湯下

白朮和胃丸 病久不能食而臟腑或結或滯

由胃虛弱也常服則和中理氣消痰去濕熱飲

食 厚朴炒 半夏各一兩 白朮一兩 陳皮八錢 枳實

枳實各二錢半 木香一錢 人參七錢 甘草三錢

右末姜汁浸蒸餅糊為丸 梧子大每服五十

丸白湯送下

吳梅坡冲和健脾丸 益心開胃健脾寬胸順氣

進食和中資扶三焦培植五内凡躰欠強盛者
多服大有益也慎勿以人參見疑膈氣膈食翻
胃噎食中滿者亦効

白朮炒四兩 白豆蔻一兩拌白朮末勻飯上蒸 人參三兩 陳皮三兩

同參飯上蒸 白茯苓二兩 山查肉二兩 石斛盪水洗同茯苓上

熟蒸 甘草綿紙上炒焦黃色七錢 右各自為末麥芽粉打

糊為丸每服五十九丸白湯下

家傳三因冲和丸 養心扶脾疎肝開胃暢達三

焦通貫五臟贊坎離有升降之能和表裏無壅

塞之患利用一元斡旋五内家傳四世之秘也

歌曰 醫家綱領在三因 多少鑽研那得真

發出肺肝玄妙處 信乎一决勝千金 人參

石斛 白苳仁 廣陳皮各為末 山查肉末二兩

已上五味合研勻碗盛碟盖飯上蒸熟取起待

冷方開以乃調胃補心接丹田之氣也

遠志甘草湯泡去心取末一兩 山柅炒焦色取末二兩 香附童便浸半日洗

淨醋炒末二兩以三味共研勻如上法蒸熟勿令洩氣

乃透暢心胞達膈間之滯氣也

海石末二兩蒼朮米泔浸洗去浮皮炒黃取末二兩以二味如上

法同蒸乃消痰飲而通內外之用也

川芎末二兩北柴胡末一兩青代一兩以三味和勻

蒸如上法乃疎肝鬱調達者也

夫心為脾母補心則土有力肝為脾賊平賊則

土乃和故曰安穀則昌用穀孽取粉打糊為丸

梧子大晒乾用益元散五錢水飛過神砂五錢

為衣食後少頃白湯下量人大小輕重丸數服

之常用五十九丸胃開氣順少覺舒泰則減數服

之可與補中益氣湯六君子湯相兼服以丸不

犯炎涼久服無妨平康為度不拘內外諸病服

其該科之藥而兼以丸每日一服則胃和脾壯

行諸藥以健成功以秘妙之囑慎毋忽焉

參苓造化糕 人參二兩虛者用四兩白茯苓四兩乾山藥

芡實 蓮肉去皮炒苡仁炒白扁豆炒各半斤稗米

打白炒白糖霜二斤右為末磁瓶收貯每用四

五錢白湯隨加白糖霜調服一日三四次以平
調脾胃又服精神倍加

吐法

瓜蒂散 上部有脉下部無脉其人當吐不吐者
死 瓜蒂 赤小豆 為末每服一錢七溫漿
水調下取吐為度設兩手脉不絕無者不可
使用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胸
中窒塞不通以指探去之如不得吐者以物
探吐之得吐則已如是食不得去者方用此

藥吐之

攻下之劑

備急丸 療心腹諸疼卒百病 大黃 乾姜

巴豆

去皮各一兩

右擇精品者為末蜜和搗于杵

丸如小豆大每服三丸大小量之若中惡客
忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤尸
厥卒死者以酒或湯服之口噤以物攪開灌
之藥一下咽須臾差如未差更與三丸以腹
中鳴轉即吐下便愈若口噤須折齒灌之忌

蘆筍猪肉冷水肥膩之物易水張先生又名
獨行丸乃急劑也

神妙列仙散 飲酒所傷以致遍身疼痛腰脚強

跛手足頑麻胃脘疼痛胸膈滿悶肚腹膨脹嘔

吐瀉痢及酒食停久或一切積聚黃疸熱鼓並

皆治之 沉香 木香 茴香 炒 檳榔 各一

扁蓄 錢三 大黃 一微炒 麥芽 半一兩 瞿麥 錢五

右末每服三五錢五更熱酒調下能飲者多

飲二三杯不妨仰面卧手叉胸前至天明取

下大便如魚腦小便如血効忌生冷硬物葷腥

惟啖米粥

木香和中丸 和脾胃消宿食利胸膈化痰涎除

膈熱進飲食 木香 黃芩 青蒙石 枳殼

檳榔 青皮 橘紅 各五錢 白滑石 二兩 沉香 二錢

大黃 一兩 黑牽牛 取頭末二兩三錢 右末水丸梧子大

每服五十九丸姜湯或茶清下

木香檳榔丸 一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大

小便結澁不利者 木香 檳榔 青皮 去白

陳皮去白枳殼 莪木煨 黃連 黃柏各一兩 香附

大黃炒 黑丑取頭末各三兩 右末水丸梧子大每服

六十丸生姜湯下以利為度

枳實導滯丸 傷濕熱之物不得施化痞悶不安

茯苓 黃芩 白朮 黃連各三錢 澤瀉二錢

大黃一兩 枳實炒 神麩各五錢 右蒸餅糊丸菘豆

大每服七十丸

三黃枳朮丸 傷食肉濕麵辛辣厚味之物填塞

悶亂 黃芩二兩 黃連 大黃煨 神麩炒 白朮

陳皮各一兩 枳實炒五錢 証餅為丸服如上

海藏神應丸 一切冷物冷水及潼乳酪小腹痛

腸鳴穀不化 巴豆 杏仁 乾姜 百草霜

各五錢 木香 丁香各二錢 黃蠟一兩 先將黃蠟用

醋煮去渣將巴豆杏仁同炒黑烟盡研如泥將

蠟再上火入少油溶化入在杏仁等藥內攪勻

旋下丁香等藥研勻搓作挺子油紙裹了旋丸

每用三五丸食前米飲下

秘方化滯丸 理一切氣化一切積奪造化有通

塞之功調陰陽有補瀉之妙久堅沉痾磨之自

消暴積乍留導之立去 丁香 木香 青皮

去橘紅 黃連 各二錢 京三稜 煨 莪朮 煨各五錢

半夏麴 二錢俱為末 巴豆 去壳滾湯泡過再研

好酒煮乾用六錢研細 烏梅 肉厚者去核焙乾

和煎藥末再研入後藥 醋調畧清慢火 熬成膏入煎藥 右共和勻以麵糊為丸粟米大

每服五七丸人盛者十九五更陳皮湯下常

服磨積不飲瀉者津液嚥下

停食飽悶枳殼湯下 但有所積物取本物

煎湯冷下 因食吐不止津液嚥下即止

食瀉不休及霍亂嘔吐俱用冷水下

赤痢甘草湯冷下 白痢乾姜湯冷下

心痛石菖蒲湯下 小腸氣痛茴香酒下

婦人血氣當歸湯下 若飲攻積熱姜湯下

仍加丸數未利再服瀉不止飲冷水一口立

止 小兒量歲數加減服 疳積米飲下

孕婦勿服以藥得熱則行冷則止

丹溪小胃丹 芫化 好醋拌勻過一宿於瓦器上不住手炒至黑色勿令焦

甘遂

濕麵包水浸半日洗曬乾一云水浸冬十日春秋五日或用水煮亦可

大戟

水煮一時洗曬乾各半兩 大黃 濕紙裹煨勿焦焙乾再

半黃柏

炒三兩 右末以白木膏丸蘿蔔子大臨

卧津液吞下或白湯送下取其膈上濕痰熱

積以意消息之欬利空心服 一方加木香

檳榔各五錢餛餅糊為丸每服七八十丸

東垣觸飲枳實丸

逐飲消痰導氣清膈

枳實

炒半夏製橘紅各二兩 黑丑 取頭末三兩

右末麵糊為丸每五十丸食後姜湯下如所

食在膈間兀兀欬吐及鬱悶亂以物探吐甚

者用瓜蒂散

海藏金露丸

肉傷心痞氣不升降水穀不消

大黃

一兩 枳實 炒五錢 桔梗 二兩 黑丑 二錢

右末荷葉燒飯丸每服白湯下三五十九丸常

服減半一方姜糊丸

傷狗肉不消心下堅硬或腹脹口乾發熱妄語水

煮蘆根汁飲之

傷魚鱠及生鮓停在胸膈不化必成癥瘕

馬鞭草搗汁飲之 飲生姜汁亦消
椒攪煎湯飲之亦佳

傷豆腐以蘿蔔煮食或用蘿蔔子煎湯飲之消
傷蟹用紫蘇生姜煎湯飲

傷瓜果以健脾消食之劑內加射香服之立消
不能食

生生子曰不能食者由脾胃餒弱或病後而脾胃
之氣未復或痰客中焦以故不思食非心下痞
滿而惡食也治當補益以開豁之丹溪導痰運
脾之法皆是也下元虛亦令人不思食宋黃山
谷乃筆手稟載云有將兔絲子淘淨炒乾日服
數是酒下服之十日飲食如湯沃雪又有服補
脾藥不效用二神丸治之愈

羅謙甫云脾胃弱而飲食難任者不可一槩用尅
伐之劑宜錢氏異功散補之自然能食或嗜食
太過傷脾而痞滿嘔逆權用枳朮丸一服慎勿
多服昔人有治久瘧後食少汗多先用補劑加
黃連枳實月餘食反不進汗亦不止因悟謙甫

之言純用補劑又令粥多于藥氣虛甚者加附
子一二分佐之

錢氏異功散 治脾胃虛弱難任飲食

人參 白朮 茯苓 粉草 橘紅 木香各

分加姜枣煎服

二神丸 脾胃虛弱全不思食服補脾藥不効者

破故帛炒四兩 肉果生二兩 右末肥枣四十九枚生

姜四兩切片煮爛去姜剝去枣核研膏入藥

末和丸桐子大每三四十九鹽湯下

積聚門

黃帝針經百病始生得三云積者蓋厥氣生足悅

悅生胫寒脛寒則血脉凝滯凝滯則寒氣上入

腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁沫迫聚不得散

日以成積卒然多飲食則腸滿起居不節用力

過度則絡脉傷陽絡傷則血外溢血外溢則衄

血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡

傷則血溢于腸外有寒汁沫與血相搏則并合

凝聚不得散而成積矣或外傷于寒內傷于憂

怒則氣上逆氣上逆則六輸不通溫氣不行勞
血蘊裹不散津液凝瀦滲著而不去而成積矣
難經云肝之積名曰肥氣肥氣以季夏戊巳日
得之何以言之肺病傳于肝肝當傳脾脾季夏
適王王者不受邪肝復欲還肺肺不肯受故留
結為積故知肥氣以季夏戊巳日得之心之積
名曰伏梁云脾之積名曰痞氣云肺之積
名曰息賁云腎之積名曰奔豚云並見本
方

滑伯仁曰越人之意蓋以五行之道推其理勢之
所有者演而成文爾初不必論其感亦不必論
其還不還與其必然否也請以所勝傳不勝及
王者不受邪遂留結為積觀之則不以詞害意
而思過半矣

論婦人腸覃石瘕

水脹篇云石瘕何如岐伯曰石瘕生于胞中寒氣
客于子門子門閉塞氣不通惡血當瀉不瀉血
以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆

生于女子可導而下

寶鑑曰夫膀胱為津液之府氣化則出矣今寒客于子門氣塞不通血壅不流而衄以止之結硬如石是名石瘕也此氣先病而血後病故月事不來則可宣導而下出者也故難經云任之為病其內苦結男子為七疝女子為瘕聚與之謂也非大辛之藥不能已可服見睨丹

腸覃何如岐伯曰寒氣客于腸外與衛相搏氣不得營因有所繫痞而內著惡氣乃起瘰肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下與其候也

夫腸者大腸也覃者延也大腸以傳道為事乃肺之府府主衛衛為氣氣得熱則泄寒則凝今寒客於大腸故衛氣不營有所繫止而結瘕在內貼著其延久不已是名腸覃也氣散則清氣聚則濁結為瘕聚所以惡氣發起瘰肉乃生小漸益大至期而鼓其腹則如懷子狀也此氣病而

血未病故月不斷以時下本非妊娠可以其為辨矣

劉宗厚曰按此謂石瘕為血壅不流故月事不來腸覃為氣聚而濁結成瘕故血未病月水不斷而知此二積之異然亦有諸積所致或有病癥膿而似此二證者不可不察也

丹溪曰痞塊在中為痰飲在右為食積一云痰積在左為血塊氣不能作塊成聚塊乃有形之物痰與食積死血而成也用醋煮海石醋煮三稜蓬朮

桃仁紅花五靈脂香附之類為丸石醮白朮湯吞下瓦壘子能消血塊次消痰石醮一物有痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積治塊當降火消食積即痰也行死血塊塊去須大補凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不去當用消積藥使之融化則根除矣凡婦人有塊多是血

生生子曰積聚一證難經以其日得積及不受欲還之說後人皆難尊信以下諸書雖亦各有發

明終未有能擴其蘊而可為萬世法者近汪子
良特揭而辨之乃分表裏邪正臟腑內外曰積
曰聚及著治驗數條多有啟悟與丹溪治案可
相表裏深有功於難經者而後人得以此取則
焉幸亦大矣謹述於左

汪子良曰嘗讀難經積聚之說而疑之雖有及於
病情而其說自相矛盾有膠固而難通予慮後
學之悞于承用也為之辨論附以積聚常變之
法亦有自效於匡救之忠已乎

五十五難曰積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而
伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰
聚故積者五臟之所生聚者六腑之所成積者
陰氣也其始發有常處聚者陽氣也其始發無
根本上下無所留止其痛無常處又五十六難
曰肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足
久不愈令人癢欬連年不已以季夏戊巳日得
之何以言之肺病傳脾脾季夏適旺者不受
邪肝復欲還肺肺不肯受故留結為積故知
肥氣以季夏心之積名曰伏梁起臍上大如臂
戊巳日得之

上至心下久不愈令人煩心以秋庚辛日得之

何以言之腎病傳心當傳肺秋適旺者

不受邪心復欲還腎不肯受故留結為積故

知伏梁以庚脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如

盆久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌

膚以冬壬癸日得之何以言之肝病傳脾當

受邪脾復欲還肝不肯受故留結肺之積名

曰息賁在右脇下覆大如杯久不已令人洒洒

寒熱喘嗽發肺癰以春甲乙日得之何以言之

肺當傳肝以春適旺者不受邪肺復欲還

心不肯受故留結為積故知息賁以春甲乙

日得腎之積名曰奔豚發於少腹上至心下或

上或下無時久不已令人喘逆骨痠少氣以夏

丙丁日得之何以言之脾病傳腎當傳心心

肝不肯受故留結為積故夫謂積者陰氣也

聚者陽氣也是以血氣分陰陽也殊不知陰血

陽氣也皆能成積但臟腑所主之不同耳心肝

多主于血丹溪所謂在左屬血是也脾肺多主

於氣本文所謂肺積息賁者是也息者氣之息

也是陽氣亦能成積况又曰氣之所積名曰積

與其積陰之說不相合矣。又謂積者五臟之所生也。聚者六腑之所成也。殊不知有形質之物積滯不行則為之積。五臟六腑俱有之。如仲景所謂熱結膀胱搏血畜積下焦其人如狂小腹滿硬而小便自利抵當湯主之。又東垣所謂食積腸胃腹滿卒痛者備急丸下之。是六腑之位亦有其積。豈謂積于臟乎。至論肝積肥氣夫肥氣者言其皮裏膜外有塊以致皮膚有肥滿之狀所謂瘧母是也。此肝之外積非肝之內積也。

又謂脾積痞氣夫脾居於右脇今積在於心膈之位乃與本文積在本位之說不相合矣。又謂腎積賁豚發於少腹上至心下若豚狀或上或下無時乃與聚証走動相類與本文積屬陰沉伏之比不相合矣。且五臟之積未言所因治何所據。又謂肝積於季夏戊巳日得之之類其說之失。明者自當知之。愚謂積伏而有常處其症靜也。因於血氣痰食水火之所成。聚者對散而言。散而無形或集為有象其症動也。因於氣虛

不能運行之所致。作於腹中者屬內。作於皮膚四肢者屬外。如血積左脇作痛。日輕夜甚。其脈沉澹者。所謂在左屬血。治用芎歸紅花蘇木射香肉桂莪朮之類。又有火鬱左脇而痛甚者。治用當歸龍會丸之類。又有裏熱畜水在於左脇而作痛者。如仲景所謂心下痞硬痛引脇下乾嘔短氣汗出不惡寒者。十棗湯主之。又有食積右脇而作痛者。所謂在右屬食。丹溪云。右脇一條降起作痛。色不紅者。以食積也。予嘗用補中

益氣湯去陳皮加青皮草果木香之類。又有食塊積於右脇而不痛者。宜治消導為主。如白朮枳實三稜莪朮砂仁吳茱萸之類。又有痰飲積於心膈作痛。終食熱辣湯則暫止。而脈沉滑。治用白螺丸之類。又有氣積胸中。而為脹痛喘急。脈沉者。治用紫蘇杏仁之類。又有水積胸膈作痛。手不可近。身涼脈沉緊者。治用陷胸湯之類。又有濕鬱心膈而為痞滿者。治用大消痞丸之類。所謂五臟之積者如此。又有積于六府之位。

者。余嘗治一人。膈下大痛。有塊不移。嘔吐不食。吐兼腹痛。此中焦吐也。從於積。用紫沉丸下之。而愈。又嘗治一人。腹中。大痛不移。纔得大便。其痛稍減。兩尺脉沉弦而瀉。他醫作房後陰症。治之弗應。余曰。據其尺脉陰沉。當作陰症。治之。據其大便去後。而痛減者。此食積也。用備急丸下之而已。又嘗治一婦。產後將及一月。小腹之位。有塊如雞卵。作痛。日輕夜重。嘔吐寒熱。此血積也。治用芎歸肉桂。莪朮。乳沒。琥珀。射香之類。

服而塊消。諸症悉退。又寶鑑云。寒氣客於子門。則氣塞不通。血壅不流。而衄以止之。結硬如石。是名石瘕。見覲丸主之。又云。清濁之氣。結聚腸外。成如懷妊。按之則堅。推之則移。月事以時下。名曰腸覃。晞露丸。又嘗治一婦人。經閉三月。臍下脹痛不移。他醫作血積。治弗效。予曰。此氣虛不能上升。而陷於下也。丹溪所謂陽病極於下者。此也。治用人參。陳皮而安。又嘗治一人。臍左有塊不痛。或時降起。此亦食積也。治用白朮三

稜莪朮砂仁吳茱萸木香神麩糊丸服之外於塊上灸之而消又嘗治一人小腹左邊有塊堅痛不移大便燥結或因惱怒辛苦即作膈痛嘔吐不食諸醫罔效已一年餘余作痰火治用順氣消痞丸遠志肉桂炒黃連姜製厚朴各二兩海藻昆布青皮山查肉神麩蒼朮川芎枳實各一兩玄明粉六兩同牛肉一斤切碎煮熟焙乾同前諸藥為末醋煮蒸餅糊為丸每服二錢空心湯下未及一月而塊消痛止又治一人右脇塊痛用三補丸加梳子蒼朮服至半月而愈所謂六府之積者如此其餘菜菓酒肉寒冷等積可類推焉

臍之積甚者倒倉法治之此皆內積之症治者也又有外積者作于皮膚四肢之位也如癰疽瘰癧瘡母之類治各從其所宜夫癰疽屬陽者仙方活命飲之類屬陰者內托復煎湯之類瘰癧未消者破結散之類已破者如神散之類瘡母又名肥氣宜降痰火之劑余嘗治一人瘡後左脇之下皮裏膜外有塊大如掌許用七臍散治之瓦壘子煨天蓼花子各二兩為末猪胰七箇針亂刺孔同玄明粉四兩煮熟入前二末搗爛焙乾為末每服二錢酒下為丸服亦可服之而效此皆外積之

症治者也且以聚病言之夫內聚者腹中走痛也由於氣虛不能運行故耳余嘗治一人腹中有塊作痛或上或下或有或無此聚也治用人參黃芪白朮當歸枳殼木香之類而止其內聚之症治者也又有外聚者亦由氣衰滯於四肢百節作痛痛作隨腫痛退腫消經曰先痛而後腫者氣傷形也此也治用補氣散邪之劑如人參黃芪白朮為君佐以羌活五加皮薏苡仁之類此外聚之症治者也由是觀之積者由汗氣

血痰食水火之所成而有臟腑外內之分也聚者由于氣虛不運之所致而表裏邪正之別也則常變虛實之治得矣難經之說云乎哉

湯氏三稜散

治積氣肚痛

砂仁

甘草炒

益智仁

炒去壳

三稜

莪朮

青皮

去穢炒各等分

右末白湯點下

散聚湯

久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下心腹絞

痛攻刺腰脇小腹填脹大小便不利

半夏

檳榔

當歸

各三分

陳皮

杏仁

去皮炒

桂各二兩 茯苓 甘草 炙附子炮 川芎 枳殼

厚朴 吳茱萸湯洗各一兩 大黃看勢輕重用

每服四錢水煎 大便利者去大黃

大七氣湯 治同上 京三稜 蓬朮 陳皮

益志各一兩半 香附各一兩半 肉桂 藿香 甘草

青皮各三兩 桔梗各三兩 每服五錢水煎

玄胡丸 內消癥瘕氣結虫煩心腹脹痛

玄胡索 川歸 青皮 木香 雄黃飛另研

檳榔 廣朮炮各四兩 京三稜炮六兩 右末入雄黃

拌勻糊丸梧子大每服三十九丸姜湯下不拘時

木香三稜散 和胃進食消化生冷物心腹刺痛

木香 神麴炒各一兩 京三稜炮 甘草炙各二兩 廣茂六兩

益志 橘紅各四兩 右末每二錢入鹽沸湯點服

五食丸 虛實積氣蠱脹積塊水氣年深癥瘕

大戟去皮 甘遂生各半兩 牙皂去皮生子 芫花醋浸一宿炒黃

胡椒各一兩 巴豆去心膜醋煮二十箇研半兩 右末入巴豆和

勻糊丸菜豆大每服五七丸氣實者十九夜卧

水一鍾用白米白麵黑豆生菜猪肉各少許煎

至半鍾去渣用湯下藥忌油膩粘滑物

聖散子 遠年積塊及婦人乾血氣

礶砂 麥蘖各六兩 大黃八兩 乾漆燒過 扁蓄 茴香

炒 檳榔各一兩 如婦人乾血氣加川山甲二兩

右細末每三錢温酒調下仰卧此藥只在心

頭至天明大便如魚腸小便赤為驗並無毒

神効小兒用一錢十五以上二錢空心服之

更効

荆蓬煎丸 破痰癖消癥塊及冷熱積聚順氣消

食 木香 檳榔 枳殼 青皮 茴香

三稜各二兩酒浸冬三日夏一日 廣茂二兩醋浸冬三日夏一日 以去皮

巴豆二十箇同炒黃色去巴豆不用

右末糊丸如菉豆大每服三十九丸姜湯下

三稜丸 治五穀等積食

陳倉米一兩巴豆五枚去殼同炒焦色去巴豆不用 陳皮 三稜各一兩

砂仁各二錢 麥芽 木香一錢 右末醋糊丸

菉豆大每十五丸至二十丸姜湯食遠服

麩孽丸 治熱酒積噫酸脇痛

神麴 麥芽 各一兩

黃連 五錢同巴豆五粒炒黃色同用

右末沸湯和丸桐子大每五十九食遠姜湯

送下

一方 治冷酒積 平胃散加丁香砂仁麥芽神

麴姜枣鹽煎服

水積丸 甘遂 一錢 為末以猪槽頭肉一兩細切搗

爛和末作一丸紙裹火煨令香熟取出臨卧嚼

細酒嚥下取下病根 若治酒積用枣湯吞下

涎積炒粉丸 積聚涎塊結於心腹乾嘔刺痛

蚌粉 一兩 巴豆 七枚去壳及膜 右二味同炒赤色去巴豆

以醋丸桐子大丈夫臍腹痛炒茴香酒下二

十九婦人血氣姜酒下敗血冲心童便和當

歸酒服常服姜湯下

茶積丸 治茶積飲食減少面黃腹痛

陳倉米 半升巴豆七粒去壳同炒赤色去巴豆 青皮 陳皮 各二兩

右末醋丸如菉豆大每二十九食後淡姜湯

下

又方 花椒為末麵糊丸桐子大每二十九茶湯

任下

茶癖散

治茶積

黃芩

石膏

升麻

等分

為末每三錢砂糖湯調下

鱉甲桃仁煎丸

治諸積

桃仁

泡去皮尖五兩水研漉汁三升

三稜煨木香

檳榔

青皮

各一兩

鱉甲

醋炙黃三兩

右末將桃仁汁慢火熬二升再加醋一升再

熬如糊和藥丸桐子大每服七十九淡醋湯

下空心食前日二服

晞露丸

感寒氣凝結腸外久為癥瘕疼痛名腸

軍廣木

三稜

各一兩酒浸用巴豆三十粒去壳同木稜炒黃色去巴豆

不用乾漆

炒川烏

炮各五錢

茴香

炒

青皮

雄黃

各三錢

川山甲

炮二錢

礞砂

研四錢

輕粉

射香

五分

右姜汁糊丸桐子大每服二三十丸空心姜

湯下

阿魏丸

諸積聚癥瘕痞塊

山查

南星

皂角水浸

半夏

同上

麦芽

神麴

黃連

姜炒各一兩

連翹

炒

阿魏

醋浸

瓜蒌

貝母

各五錢

石礮

風化硝

蘿蔔子

胡黃連

各二錢半

右末姜汁浸餽餅糊

為丸桐子大每服五十丸姜湯下

見現丸 婦人石瘦狀如懷子者 大附子 炮

鬼箭羽 紫石英錢各三 肉桂 玄胡索 澤瀉

木香錢各二 血竭 水蛭一錢炒烟尽 檳榔二錢半 桃仁

三十枚炒 三稜錢五 大黃酒浸一宿倍 右末酒糊丸桐

子大每三十九食前益湯或酒下

脾積膏 治諸積神效 雞子五枚 阿魏五分 黃蠟一兩

鍋內一處煎分作十服温湯空心服諸物不

忌設腹痛是積化動十日後當有血大便中

出是其効也

剪紅丸 專治久積有虫者 雷丸 檳榔

三稜 莪木各醋煮 木香 蕪荑 黑丑

狗脊 大黃 史君子 鶴虱 牙皂 錫灰

茵陳 黃丹各等分 為末以茵陳煎湯為丸梧子

大外以黃丹為衣大人每服三錢小兒每用一

錢空心以酒下 福建者以冷茶吞

奇驗方 黑羊肝一副入左顧牡蠣三錢黃蠟一

兩水煮肝爛食肝并湯空心食肝盡即効但不

厭其苦須多服効

敷方 蕎麥麵水調圍硬處內用皮硝蔥重重鋪

三層以火熨之日三次 外服橘半枳木丸加

莪朮

又方 以紅麴為糟將生威靈仙同搗極爛敷之

外覺痞塊消即拭去遲恐壞肌膚

熨痞方 吳茱萸三升研碎酒煮熟以布裹熨癥

上冷更炒更番熨之癥逐移走熨之消乃止

二仙膏 貼痞氣及積塊

明礬 雄黃 為末先將二兩水糊和成膏貼

患處俟大便如膿下即愈未愈再以二兩和

膏貼之即効

七胰散

汪子良論中七胰散有瓦楞子

只用皮硝七錢每一

錢擦一胰醃七日鉄器上焙乾燥為末又水

紅花子只用七錢無瓦楞子

羅太無乾柿丸 取虛實積下膈甚妙

硃砂飛為衣沒藥 牙皂去皮弦末乾姜炮乾漆炒

三稜炮輕粉 青礞石煨各一錢巴豆三十粒去皮膜醋煮

十錢鉛一錢
沸水銀結成砂子 右末和勻飯丸菜豆大

煎柿蒂湯冷下三丸或五丸 有孕婦人服

神功助化散 男婦腹中痞塊不拘氣血食積所

成 扁蓄 麥芽各五錢 瞿麥穗 甘草各五分

木香一錢半 沉香 神麴各二錢半 大黃二兩

右末和勻男以淡竹葉甘草等分煎湯及無灰

酒同調服 婦以紅花灯心當歸等分煎湯及

無灰酒同調服俱酒多於湯 忌油膩動氣之物

及房事一月其藥夜服大小便見惡物為度

此方神妙不可盡述

紅丸子 大人脾積氣滯胸膈滿悶面黃腹脹四

肢無力酒積不食乾嘔不止脾連心胸及兩乳

痛婦人脾血積氣諸般血癥氣塊及小兒食積

骨瘦面黃腹脹氣急不嗜飲食漸成脾虛並宜

服之方見傷食

二賢散 進食消積塊 橘紅一斤 甘草四兩

鹽半兩 用水三四碗從早煮至夜以爛為度水

乾則添日乾為末淡姜湯調下 有塊者加

姜黃半兩 氣滯者加香附二兩俱同煎藥
煮 氣虛者加沉香半兩 噤口痢加蓮肉
二兩去心俱另入

小三稜煎 食癢酒癖血癥氣塊時發刺痛全不

思飲食積不消心腹堅脹痰逆嘔噦酢吞酸

京三稜

蓬朮

各四兩

芫花

一兩去梗葉

右同入甕器中用米醋五升浸滿封器以炭
火煨令乾取出稜朮將芫花以餘醋炒令微
焦焙乾為末醋糊丸菜豆大每十五丸姜湯下

猪腰子方 治腹中有塊

猪腰子一雙切薄片木鱉子肉一兩與猪腰片
相間縛定外用温紙包火煨熟去紙搗盆肉
搗如泥入黃連末和丸每二十九烏梅甘草
湯下第二服二十五丸三服三十九丸漸加至
以痛為度大便利其塊自消神効

元戎温白丸 治心腹積聚久壅痞塊大如杯碗
黃疸嘔吐滿悶上氣腹脹心下堅結上搶心傷
及脇十種水病八種痞塞翻胃吐逆噎膈五種

淋疾九種心疼積食不消成瘡連年不瘥及一切風身軀頑痺不知痛痒或半身不遂眉髮墮落七十二種風三十六種遁尸症忤癩癩或婦人諸疾斷續不生下淋瀝五邪失心憂愁思慮不樂飲食無味月水不調及一切病有似懷孕羸瘦困弊或歌如鬼所使等症

川烏去皮臍炮 紫苑 菖蒲 柴胡 厚朴

吳茱萸 桔梗 皂莢去核 茯苓 乾姜

人參 黃連 巴豆炒 桂 蜀椒去目

右末入巴豆令勻蜜丸桐子大每三九姜湯

下食後臨卧服加至五六丸止

肝之積肥氣温白丸加柴胡川芎治之 心之積

伏梁温白丸加菖蒲桃仁黃連治之 脾之積

痞氣温白丸加乾姜吳茱萸治之 肺之積息

賁温白丸加人參紫苑治之 腎之積奔豚温

白丸加丁香茯苓遠志治之

肥氣丸 肝之積在左脇下如覆杯脉弦而細

青皮 當歸 蒼木各一兩半 蛇含石煨醋淬七次

蓬朮 三稜 鉄孕粉 各二兩與三稜蓬朮同入醋煮一伏時

右末醋煮米糊丸菘豆大每四十九丸當歸酒

送下

伏梁在心下結聚不散用桃奴三兩為末空心温

酒調下桃奴樹上乾桃子是也 正月採經冬不落者

肺喘久不愈為息賁五靈丸

五靈脂 二兩半 木香 半兩 馬兜苓 炒一兩 葶藶

右末枣肉丸桐子大每二十九丸姜湯下日三

本事云肺之積曰息賁在右脇下大如杯令人酒

酒寒熱喘嗽發肺癘寒膏丸

葶藶子 陳皮 桔梗 各等分

右下二味末入葶藶研勻煮肥枣肉和丸桐

子大每五七丸米飲下予嘗患停飲久漬肺

經食已必噎喘覺肺系大急服此良驗

當歸丸 治婦人月經不調血積

當歸 赤芍 川芎 熟地 京三稜 廣藿

各五 神麩 百草霜 各二錢半 右末酒糊丸桐子大

温水下

尚書媳婦馬氏年三十二腹中血塊作疼經五六
 年形已骨立衆皆曰不可為柰其未死何家甚
 貧而大小慙之一日召杜至告杜曰但以濟物
 為懷則可業已請召明公非所言也遂以少物
 帛贈杜杜不受曰但服其藥必獲安無以是為
 疑遂示方用沒藥牛膝乾漆當歸各半兩硃砂
 木香水蛭炒紅娘子炒紅花牡丹皮硃砂各一
 分海馬一箇斑猫去翅足炒十四箇為末酒醋
 各半升熬為膏每日天明用一皂子大酒醋化

下二月病退六十日漸安果如其言

黑神丸 神麴 茴香 木香 川椒 炒香出汗

丁香 各半兩 檳榔 四箇 乾漆 六兩半生半熟用姜湯煮半日令香

右除椒漆外五物皆半生半炒為細末用前
 生熟漆和丸彈子大又用茴香十二兩鋪陰
 地蔭乾候外乾并茴香收器中至乾去茴香
 用治腎氣膀胱疝癰及疝墜五膈血崩產後
 諸血漏下赤白並一九分四服死胎一九皆
 綿灰酒下若難產炒葵子四十粒杵碎酒煎

下 諸疾不過三服 瘕氣十服 膈氣癥癖五服 血瘕三丸 一婦有塊如杯 每發痛不可忍 諸藥莫愈 投此丸三服 杯塊盡消 終身不復 作矣

沒藥散 治一切血氣臍腹作痛 產後惡露兒枕

痛 血竭 沒藥並細研 桂心 當歸 蒲黃

紅花 木香 玄胡索 乾漆炒 赤芍各等分

右細末 每服二錢 熱酒調下 食前 血塊

心痛甚者 以大順散三錢 酒調服 立止

牡丹散 婦人久虛羸瘦 血塊走注 心腹疼痛

牡丹皮 玄胡索 桂心 當歸各一兩 牛膝

赤芍藥 莪木各三兩 京三稜一兩

每服三錢 水酒各半 盞煎服

芍藥湯 治產後諸積 不可攻 宜養去熱

芍藥一斤 黃芩 茯苓各六兩

右每服半兩 水煎 日三服

帝曰 病脇下滿 氣逆二三載 不已 是為何病 岐伯

曰 病名曰息積 矣不妨於食 不可刺灸 祇為導

引服藥藥不能獨治也

奇病論〇王註云氣逆息難故名息積也

用息賁法治之亦可

磨積丸 胡椒一百五十粒 木香二錢 全蝎十枚
去毒

右末粟米糊丸菜豆大每十五丸陳皮湯下

耗氣湯 治息積

木香 砂仁 桂心各二錢 甘草炙 茴香炒

丁香皮 青皮 陳皮 乾姜 蓬朮炮各半兩

沉香 胡椒各一錢 右末每服二錢姜蘇鹽湯調

下婦人醋湯服

肝之積肥氣丸 治積在左脇下如覆杯有頭足

久不愈令人欬逆瘕瘕連年不已

厚朴半兩 黃連七錢 柴胡二兩 椒四錢 巴霜五分 川烏炮去

皮臍一分 乾姜五分 皂角去皮弦子煨一錢半 白茯苓一錢半

廣茂炮 昆布 人參各二錢 甘草三錢

右除茯苓皂角巴豆外為極細末再另研巴

霜旋入和勻煉蜜丸桐子大初服二九一日

加一丸二日加二丸漸加至大便微澹再從

兩丸加服周而復始積減大半勿服 右後

積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在
 各條下秋冬加厚朴一半通前重一兩減黃
 連一錢半若治風癰於一料中加人參茯苓
 菖蒲各三錢黃連只依春用七錢雖秋冬不
 減淡醋湯空心服下

加減肥氣丸 治同前仲夏合此

柴胡 厚朴 各半兩 黃連 一兩 川椒 甘草 各五分
 肉桂 川烏 各二錢 巴霜 六錢 乾姜 人參 各半兩
 右細末旋入巴霜研勻煉蜜丸桐子大初服

二九一日加一九二日加二九漸加至大便秘

微澹丹從二九加服空心淡醋湯下大便秘

秋冬去乾姜半錢加厚朴一倍減黃連一半

心之積伏梁丸 起臍上大如臂上至心下久不

愈令人心煩 黃連 半兩 人參 厚朴 去皮姜製各半

兩 黃芩 三錢 肉桂 紅豆 茯苓 丹參 各一錢

菖蒲 乾姜 巴霜 川烏 炮去皮臍各五分

右末研已霜旋入和勻煉蜜丸桐子大初服

二九日加一九漸加至大便秘從二九加服

食遠淡黃連湯下周而復始即減半勿服秋
冬加厚朴半兩減黃連半兩黃芩不用

鯀甲湯 治伏梁積氣心下如臂痞痛不消小便

不利 鯀甲去裙醋炙黃色 三稜 大腹皮 芍藥

當歸 柴胡 生地各一兩 官桂 生姜切片焙乾各三

分每服三錢水一大盞入生姜木香半錢同煎

至八分空心溫服

脾之積痞氣丸在胃脘腹大如盤久不愈令人四

肢不收發黃疸飲食不為肌膚

厚朴製半生半炒 黃連八錢 吳茱萸 黃芩 白朮各三

錢 白茯苓另為末 澤瀉各一錢 巴豆霜另研四分 乾姜炮

縮砂 茵陳各一錢半 川烏炮去皮 川椒炒各五分 桂四分

人參一錢 右末旋入巴霜茯苓和勻煉蜜丸桐

子大初服二丸日加一丸漸加至大便微溏再

從二丸加服食遠淡甘草湯下周而復始積減

大半勿服

加減痞氣丸 孟秋合此

黃芩酒炒 益智 吳茱萸 歸尾 橘紅

附子

各三分

厚朴

錢一

黃連

酒炒

半夏

紅花

各五分

青皮

廣茂

神麩

茯苓

昆布

熟地

人參

炙甘草

巴霜

葛根

各二分

澤瀉

右末蒸餅糊丸桐子大初服二九日加一九

加至大便微澹再從二九加服淡甘草湯下

宣明白木丸

治息積脇下氣逆妨悶喘息不便

呼吸引痛不已不可針灸宜導引服藥爾

白朮

枳實

官桂

各一分

人參

兩二

桔梗

醋炒陳皮

甘草

各一分

為末煉蜜丸桐子大每服二十九

溫酒下日三服

加減息賁丸 仲夏合此其積為病寒熱喘欬氣

上奔脉瀦失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒

熱相叅氣分寒血分熱治宜益元氣洩陰火破

氣消其堅也 川烏 乾姜 桔梗 白豆寇

各一分

人參

桂枝

各二分

陳皮

錢八

黃連

一兩紫苑

厚朴

茯苓

川椒

炒去汗

京三稜

天門冬

去心

各一分

青皮

七分紅花

許少巴豆霜

四分

右末

餽餅糊

為丸桐子大初服二九日加一九加至大便

微澹徒二丸加服食前姜湯下忌酒麵辛辣生冷物

腎之積奔豚丸 癸於小腹上至心下若豚狀或

上下無時久不已令人喘逆骨痠少氣及男子

內結七疝女子瘕聚帶下 苦棟酒煮三錢黃連炒五錢

錢 白茯苓 澤瀉 菖蒲各二錢 川烏炮 丁香各五錢

分 玄胡索一錢半 全蝎 附子 獨活各一錢 巴豆

霜四分 厚朴姜製七錢 肉桂三分 右末旋入巴豆霜茯苓

苓和勻蜜丸桐子大服法如前食遠淡鹽湯

下秋冬加厚朴半兩 如積熱堅大先服前

藥不減於一料中加牡蠣三錢疝帶勿加

如大積大聚消其大半乃止藥過劑則死

如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先

服本臟積藥諸疾自愈是其本也餘積皆然

如服藥人覺熱加黃連 如服藥人氣短加

厚朴 如服藥人悶亂減桂

治積要法 許學士云大抵治積或以所惡者攻

之所喜者誘之則易愈如礪砂水銀治肉積神

麩麥蘗治酒積水蛭蚘虫治血積木香檳榔治
氣積甘遂牽牛治水積雄黃膩粉治痰積巴豆
礞石治食積各從其類也若用群隊之藥分其
勢則難取効須要認得分明是何積聚兼見何
證然後增加佐使之藥不爾反有所損要在臨
時通變也治積當察其所痛以知其病有餘不
足可補可瀉無逆天時詳臟腑之高下如寒者
熱之結者散之客者逐之留者行之堅者削之
强者奪之臧以栗之苦以瀉之全真氣藥補之

隨其所積而行之節飲食慎起居和其中外可
使必已不然遽以大毒之劑攻之積不能除反
傷正氣終難復也可不慎歟

治魚蟹積

香蘇散多加生姜陳皮橄欖煎服

菓菜積

平胃散加丁香射香為末鹽湯調服

索粉積

紫蘇濃煎汁加杏仁泥服即消

麩積阿魏丸

濃煎羅蔔子湯下

糞糕傷積

酒麩五錢木香一錢為末鹽湯調服

口有酒香是効

治婦人血塊有孕難服峻藥

香附子四兩 桃仁一兩去尖 海石二兩醋煮 白木一兩

神麩糊為丸

奇方 治一切癥瘕積聚 鱉甲一兩醋煮 三稜五錢

白木五錢 青皮 桃仁 紅花 昆布各二錢 香附

醋煮七錢 右末糊丸梧子大每一錢煎白木湯下

治中脘有塊中常跳動 橘紅四錢 桃仁去皮尖二錢

木通一錢 白木八錢 水煎服

治中脘水飲積塊堅大如盤 白木二兩 枳實七錢

分三服水煎

治小兒疳積 大安丸加胡黃連末五錢神麩糊

丸黍米大米飲下

丹溪治一人肚左邊帶脇下有塊先吃匾食牛乳

者成氣痛又因酒肉塊大如桃食減三分之一

滑石五錢 白木四錢 陳皮 三稜各三錢 蘿蔔子

黃連 連翹各一錢 乾葛二錢 桃仁二十枚 甘草一錢

半錢 黃芩一錢 分三帖水煎服

一婦脇下有塊大如掌脉瀆時作熱此虛中有氣

積先與補虛次與磨積藥

白芍藥 當歸尾各四錢 白朮三錢 青皮 川芎

木通各一錢 甘草五分 水煎服

磨積藥 三稜醋煮一錢 青皮 枳實 桃仁 大黃

各五錢 桂枝半一錢 海藻醋煮三錢

神麴糊為丸梧子大每服五十丸

一人有塊在脇內有痰熱汗不得泄而脉大而散

軟此挾虛症 三稜五錢 黃連 白朮 連翹

木通各三錢 人參二錢半 桂 川芎各一錢 甘草五分

水煎吞下保和丸

一婦瘡後左脇下有塊小便少

厚朴 柴胡各二錢 三稜 青皮 木通各五錢

白朮六錢半 甘草五分 姜一片水煎服

一人因飽食牛肉豆腐患嘔吐又不節飲食右脇

下生一塊漸長大如掌痛發則見痛止則伏脉

弦數性急塊上不可按按之愈痛痛則必吐黃

酸苦水此足太陰食積濕痰

荔枝核二枚 山梔仁五枚 枳實十五枚 山查九枚

吳茱萸

炒九粒

一方有人參 急流水一盞煎沸入生姜汁服四

帖止其痛却與消塊藥

消塊藥方

半夏末

六錢皂角六枚水煮取汁拌半夏末晒乾

黃連

炒五錢

石碱

二錢

右末以糖球膏為丸胡椒大

驚風成塊者妙應丸加川山甲炒鱉甲燒各三錢

玄胡索蓬朮各四錢每服五十九加至七十九

以利為度

妙應丸即控涎丹方觀痰門

酒積方累効

即烏梅丸方出傷飲門

愆義有人病心腹懣煩彌二歲診曰腹有蠱誤食

髮而然令餌雄黃一劑少刻吐一碗如拇指無

目燒之有髮氣乃愈此殺毒虫之驗也

丹溪治食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈

雜眩運身熱時作時止

黃連

一兩半吳茱萸益智仁同炒

山梔

半兩炒

神麩

桃仁

去皮尖

三稜

蓬朮

各半兩並醋煮

香附

童便浸

山查

各一兩

蘿卜子

炒一兩半

一方有青皮

半兩

白芥

子炒一兩半

右麵糊丸

治婦人血塊

牛膝根切焙乾酒煎溫服効

物覃生於腸外月事時下石瘦生於胞中月事不

以時下二病皆似蠱脹並見脹門

產後消血塊

滑石錢三

浸藥錢二

血竭錢一

右末醋糊丸如惡露不下以五靈脂為細末

麵糊丸白湯下陳皮湯下炒

又方 消血塊

香附童便浸

桃仁上質皮

為末醋糊丸

陳無擇云導引法隨立心行之皆可愚謂或按摩滿

處或手足相屈伸或八段錦或六字氣之類以

氣通為効

卷之三

五

