


醫國聖元戒


九之十



庫文閣内	
函	漢
冊數	12422
冊數	6 ( 5 )
函號	300 215







醫聖元戎第九

少陰證

仲景真武湯

四逆湯

四逆湯

木附湯

易簡真武湯

易簡姜附湯

白通加猪膽汁湯

四逆加猪膽汁湯

茯苓四逆湯

四逆加人參湯

姜附湯

白通湯

易簡四逆湯

易簡附子湯

通脈四逆湯

麻黃附子細辛湯





麻黃附子甘草湯

四物附子湯

附子白朮湯

少陰證

王朝奉論悸并方

仲景桔梗湯例

仁宗御名如聖湯

孫思邈單方

海藏紫花散

漱茶青龍散

仲景附子湯

桂枝附子湯

王朝奉辨陰陽證

肺癰門

耳枯二生湯

如聖丸

百效丸

行義蛤蚧散

錢氏如聖散

椿皮茯苓湯

黃耆鱉甲散

定肺散

解毒丹

古方紫苑散

咽痛例

咽痛備急丸

代鍼散

梗膿丸

桔梗枳殼湯

桔梗湯

硃砂膏

定肺丸

蛤蚧散

增損防風通聖散

人參清肺散

瓮声散



定

解毒丸

消毒散

玉壺散

赴筵散

振博酸枣仁例

胡洽酸枣仁湯

活人酸枣仁湯

八味又志丸

保真定志丸

又方

鵬砂散

漱菜地黃散

五痺散

聖惠方

酸枣仁飲子

局方定志丸

保神丸

預知子丸

茯神例

人參茯神湯

延壽丹

保真秘一丹

日月丹

仲景腎氣例

仲景八味丸

茯苓丸

東坡四神丸

天門冬例

神注丹

補心丹

張尺師草還丹

無比山茱丸

易老天麻丸



古方天地丸

純武看眼天門冬例

易簡真降心丸

螽斯丸

又治耳聾方

丁香丸

温经湯

内茱續生丸

保安丸

玉抱壯

增損三才丸

二芎丸

温元丹

神注丹

紫石英丸

抱朴子法

萬子丸

大效牡丹皮散

錦襠法

七宝散

烏金散

神效丸

五補例

局方五補丸

牡蠣地黃丸

乾荷葉散

玉粉散

海藏大五補丸

瓊玉膏

卷第十

素問癰疽例

骨碎補丸

二金翼乾地黃丸

虎骨散



明目例

六合丸

益陰丹

諸風例

湯老祛風丸

烏白散

龍蛇散

退風散

黃蘗例

大鳳髓丹

七仙丸

永壽丹

御方祛風丸

大傳方

復肌丸

正鳳髓丹

解毒丸

回元丸

秘真丸

賀蘭先生解毒丸

小鳳髓丹

拔毒丹

易老珍珠丸

保真丸

清心丸

經進十精丸

十補丸

大和膏

腎氣肉消丸

枳壳五倍丸

解毒丸

回元丸

秘真丸

賀蘭先生解毒丸

大麻丹

神仙大子丸

補虛五味子丸

驪珠丹

金鈴子丸

碩夫枳殼茴香丸



香壳丸

越婢湯

耳草麻黄湯

黄耆芍药桂枝苦酒湯

桂枝加黄耆湯

桂枝去芍药加麻黄附子细辛湯

枳实湯

海藏集仲景水气例

仲景葶藶大枣泻肺湯

仲景十枣湯

易简枳数湯

防己加茯苓湯

附子麻黄湯

三花神祐丸

除湿丹

越痛丸

五皮散

紫苑散

水气求黄法

取瘡跟中痛例

弓方神助散

又方

食治十種水气

又方治十種水气

玄青丹

明理越痛丸

调胃白朮汉浮散

仲景十枣湯

化水丹

神方

百一方

又方

治役气方



沈香湯

木香塌氣丸

又方

折傷門

乾城劉家接骨丹真方

接骨散

貼茶

又丁方

導滯散

又方

錢氏塌氣丸

木香散

接骨散

神骨正骨茶黑舍散

聖惠方

又方

又方

正骨膏

接骨散

瘡瘍痲癩例

神仙太乙膏

白龍膏

仲景治煩人陰瘡蝕爛方

又方

追膿錠子

治大小癰疔無頭方

蝕惡瘡方

又方

善應膏

摩風膏

御茶大紅膏

督鍼膏

張子和泄水丸

生肌茶



生肌肉

銀絲膏

五板膏

治惡瘡或有小虫方

治疥癩癬

拍痛神志膏

金絲膏

肉紅散

消腫痛

又方

栝榔散

治便癰外貼方

治熱油湯火燒瘡疼痛不可忍

蜘蛛咬變成瘡方

治下疳久不愈方

醫聖元戎卷第九

趙州教授兼提舉管内醫學王好古進之全源

少陰證 先足經從湯液 後午經從雜例

仲景真武湯

主治脩製並見本方

茯苓 芍藥 白朮 附子 生姜

茯苓四逆湯

治療脩製並見本方

茯苓 乾姜 人參 附子 甘草

四逆湯



耳草 一兩 乾姜 七錢半 附子 半錢

四逆加人參湯

四逆加豬胆汁湯 二第主療 並見本經

四逆散

柴胡 枳實 芍藥 甘草 耳草

欬加五味子 悸加桂 腹痛加附子

泄瀉下重者煎薤白內菜小使不利加茯苓  
海藏云此散因訛少煨四逆從舉或欬或悸  
故用以散若果四逆手足厥冷下利腹痛更  
不復用此散也

姜附湯 無汗者用塊主療並見本方

乾姜 炮 附子 炮

朮附湯 自汗者用塊主療並見本方

白朮 附子

白通湯 主療加減並見本方

附子 乾姜 葱白

易簡真武湯

治傷寒救日以後發熱頭痛頭目昏沉四肢  
沉重疼痛大便自利小便或利或澀或嘔者  
皆宜服之若已經汗下不解仍發熱者心下



悸頭眩暈身動振、欲擗地者此由渴後  
飲水停留中脘所致並宜服之

茯苓

芍藥

熟附各三

白朮二

右哎咀每服四錢姜五片水一盞半煎至八  
分去粗溫服小便利者去茯苓大便利者去  
芍藥加乾姜二分嘔者無服加生姜五片同  
煎欬者加五味子二分細辛乾姜各一分發  
熱而泄瀉者服此未退當投四逆湯仍服震  
靈丹用之應手而愈此藥不惟陰證傷寒可  
服若虛勞之人發熱自利時復增寒皆宜服

因取名曰真陽增損並如前法

### 易簡四逆湯

治陰證傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱  
作小便或澁或利脈微絕腹弦滿手足厥冷  
或悸或欬內寒外熱下利清穀四肢沉重或  
汗出厥逆者或汗出發不去並宜服之及治  
一切虛寒冷厥或傷寒病有表醫誤下之續  
後下利不止雖實頭疼能痛發熱惡寒四肢  
拘急表證悉具未可攻表宜服此藥以助陽  
求陰次服桂枝以解表證



甘草

一两

乾姜

熟附各三分

右以咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓  
温服利止虛者加人參半兩吧者加生姜一  
兩面赤者每服加葱白一根腹痛者加芍藥  
一兩利止脉不出者加人參一兩霍乱吐瀉  
之後宜服之陰證傷寒或每汗唇青面黑  
身背強痛四肢厥冷昏不知人如欲服四逆  
湯先与附子散用附子三分官桂當歸白朮  
各半兩半夏乾姜各一分葱煎服被覆取汗  
或氣虛陽脱脉冷每脉氣息欲絕不肯事

易簡姜附湯

者當灸丹田氣海仍以葱一把以索纏如餅  
大切去根葉存白二寸以烈火烘一面令通  
熱勿令灼人乃以熱處着病人脐中上以熨  
斗盛火熨之温則換以他餅其人甦醒手足  
湿而有汗乃瘥仍服四逆姜附之類

治中寒口噤四肢強直失音不語或卒然暈  
倒口吐涎沫状如暗風手足厥冷或後煩燥  
兼治陰證傷寒大便自利而熱者

乾姜

熟附各二兩



右以咀每服四錢水一盞半煎七分去滓服  
或慮以茱萸大燥即以附子理中湯相繼服餌  
姜附本治傷寒經下之後又復發汗內外俱  
虛自無大熱晝則煩燥夜則安靜不吐不渴  
六脈沉伏並宜服此不知脈者更宜審之兼  
治中脘虛寒久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋  
四肢厥逆一方附子湯以生者名白通湯治  
傷寒下利一方用白通湯加白朮倍之甘草  
減半名生附白朮湯治中風溫昏悶恍惚腹  
滿身重手足從緩自汗失音不語便利不禁

一方用姜附湯加麻黃白朮甘草人參等名  
附子麻黃湯治中寒濕昏暈緩弱項背強急  
口服喘斜語渾濁心腹膜脹氣上喘促  
不能時動更宜審而用之

易簡附子湯

治風寒濕合痺骨節疼痛皮膚不和肌肉重

着四肢纏縱腰脚痠疼仲景附子湯方內亦

生附一兩芍藥有以方在厥陰門官桂甘草

茯苓人參各五錢白朮三方

右以咀每服四錢水二盞半姜五片煎至六分



去粗食前眼惡鉅者減甘草一半兼治疲極  
筋力氣虛倦怠四肢痠疼一方治歷節風四  
肢疼痛如搥鍊不可忍者如乾姜半兩先生  
附加熟附等分名附子八物湯煎如前法若  
尋常寒濕相搏頭痛兩脚軟痛及氣虛頭眩  
止用白朮附子各一兩甘草半兩姜同煎  
服名增損朮附湯又履濕地腰重脚軟宜  
服之若為濕氣所中則白朮倍附子之數仍  
用白朮半兩酒一盞煎至六升連進數服取  
微汗即愈不能飲者以水煎若冒雨濕着汗

肢麻肌膚或膝理開汗出澡浴得病於增損  
朮附湯中加茯苓官桂如甘草之數名茯苓

白朮湯

白通加豬膽汁湯

附子

乾姜

葱白

人溺

豬膽汁

通脈四逆湯

減溺 以上通治裏茺

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

以上通治和裏茺

仲景附子湯



附子 人参 白朮 茯苓 芍药

甘草附子湯 四物附子湯内减生姜芍也

四物附子湯

附子 官桂 白朮 甘草 乾姜

易簡附子湯 見前姜附湯後與下方注小異

附子湯 四君子湯加桂附芍药

外臺云論療傷寒八九日因風濕相搏身躄煩疼不能轉側不渴不嘔下之脉浮虛而瀼者属桂枝附子湯若大便鞅小便自利者附子白朮湯

桂枝附子湯

桂心 四兩 附子 三枚炮 生姜 三兩

炙甘草 二兩 乾姜 十二枚

右五味切以水六升主取二升去滓分温三

服忌生葱猪肉海藻菘菜

附子白朮湯

白朮 四兩 炙甘草 二兩 生姜 三兩

附子 二枚炮作四片

右五味切以水六升煮取二升去粗分温三服初一服其人自如痺半日許腹服之都尽



其人如胃狀自怪此以水附性走皮中逐氣  
朱除故使人如胃狀者本云附子一枚加之  
二枚名附子湯忌見前千金翼同張仲景治  
法當加桂枝四兩此本一方二法次大便鞭  
小便自利故去桂也以大便不鞭小便不利  
當加桂枝附子三枝恐多也虛弱家及產婦  
宜減服之一句即知男子婦人同一治也男  
子服四物以滋血亦于婦人同

少陰證

王朝奉論悸

并方

悸者動也病源內有虛熱則渴而飲水少氣  
乘心振寒而心悸也傷寒二三日心中悸  
而煩小建中湯 發汗臍下悸欲作奔豚發  
汗過多心下悸飲得按者桂枝甘草湯 發  
汗止仍發熱心下悸身動真武湯 傷寒  
脈結代心悸動炙甘草湯 少陽不可發汗  
發汗則譫語屬胃不和煩而悸小柴胡湯  
傷寒厥而心下悸宜先治水茯苓甘草湯却  
治其厥不爾上漬入胃必作利 中風往  
來寒熱或心下悸小柴胡湯 錢氏腎病見



夏水勝火腎勝心也當治腎輕者病退重者  
當悸動者小指也易老云腎水乘心者悸  
仲景不治木火調其水也

王朝奉朝陰陽證

夫病發熱而惡寒者發於陽也不發熱而惡  
寒者發於陰也發於陽者可攻其外發於陰  
者可溫其內發表以桂枝溫裏以四逆湯  
張仲景論少陽通脈四逆證面色赤又少陰  
下利脈沈遲面色少赤此二證似陽然皆下  
利清穀為異也凡小陰證無汗類麻黃湯麻

黃湯證脈陰陽俱緊少陰脈微細為異也又  
汗出為陽微故仲景云陰不得有汗脈陰陽  
俱緊而久汗出為亡陽也屬少陰仲景論傷  
寒脈浮自汗出小便數脚奉急為反桂枝攻  
表誤也常器之云便合用桂枝加附子湯治  
之若誤服桂枝湯即便有發厥吐逆謔語等  
證治其本論太陽上篇中孫兆云陽證即頭  
痛身熱脈洪救也陰證則頭微痛而身不熱  
脈沈細遲緩凡陰病宜與四逆理中輩皆  
自愈若夏日得陰證亦慮四逆大發宜與理



中最佳也。又云大抵發熱惡寒者是表證，屬太陽也。只惡寒是陰證也。然陰證却有發熱者，蓋是表熱裏寒，其脈必沈遲，或手足微厥，或下利清穀，更以別證驗之可知也。又云本是陰病，醫以熱藥過多，却見熱證者，亦斟酌以涼藥解之。又云陰證形靜無發狂者，惟餌溫藥過多，胸中熱實，或大便硬，有發狂者，亦宜用養氣輩而下之，不可輕用。本是陽病，無證醫誤，吐下過多，遂成陰證者，却與理中四逆輩溫之，病源云傷寒病過經而

不愈，脈反沉遲，手足厥逆者，此為下部脈不至，陰陽隔絕，邪客於足少陰之經，毒氣上薰，故咽喉不利，或痛而瘡。

仲景耳枯湯例

仁宗御名如聖湯治少陰咽痛

炙甘草 一兩 桔梗 三兩

右麻末水煎，如生姜煎亦可。一法加訶子及二錢煎去粗飲，清名訶子散治失音无色，如欬逆上氣者加陳皮，如涎嗽者加知母貝母，如酒毒者加葛根，如少氣者加人參麥門。



冬如唾膿血者加紫苑如疫毒腫者加黍粘  
子大黃如欬渴者加五味子如吧者加生姜  
半夏如用赤者加梔子大黃如胸滿膈不利  
者加枳殼如不得眠者加梔子如心胸痞者  
加枳實如膚痛者加黃耆如面目腫者加茯  
苓如咽痛者加黍粘子竹筴如肺痿者加阿  
膠能統氣如癸班者加防風荆芥如舌不出  
者加半夏

肺痿門

經云帝曰勞風之病何如岐伯曰勞風癸在

肺下其為病也使人強上真視唾出若涕惡

風而振寒此為勞風之病帝曰治之奈何岐

伯曰以救俛仰巨陽引精者三日中年者五

日不得者七日欬出清黃涕其狀如膿如緇

子大從口中出者從身中出者則傷肺傷肺

則死也肺痿之門在太陽門仲景麻黃升  
麻湯條下

孫思邈單方一門並見金匱祖方

耳草 二面

右吹咀以水三升煮一升半分作三服

此證初得可治久則難愈脈微緊則膿未成



脉緊數則膿已成喘而不得卧葶藶大棗浮肺湯主之

葶藶 二西炒紫色

右杵碎成丸以水三升煮大棗二十個取二升去粗内麻黄五味子各半西取清飲頓服令三日服一劑瘥叔和云衄血吐血沉細而忽然浮大即傾危唾血之脉沉弱言忽然实大死来侵脉要云肺脉悸堅而長當病吐血注云肺虛極則終逆今則血浮故唾血出也無汗惡寒脉浮緊

傷寒得者麻黄 肺痿上枯水之源下竭水之本 傷酒得者葛根 有汗惡熱肺沉实

耳枯二生湯

治欬胸中滿振寒脉救咽乾不渴時濁吐腥臭久吐膿如未粥肺痿作癰也膿在胸中者為肺癰

耳草 桔梗 各等分

右剉以水三升煮取一升去粗分二服必然吐出膿血矣 又一法治一切咳唾膿血及



欬而出不止 好酥三十斤三遍煉停取凝  
成膏醍醐服一合日三服瘥

海藏紫苑散

姜治欬唾中有膿血虛勞證肺痿變癰

人參 紫苑 知母 桔梗

貝母 耳單

右廉未生姜水煎一法加五味子一法加茯

苓一法加阿膠

經云陽明司天唾出白血者其狀淺紅如肺色

故曰白血

海藏云以正對化分輕重

人參紫苑散

治唾膿血以有耳桔故入少陰例以肺腎為

母子當補肺以生腎水之源以泄命門便五

液不上行也及以金花丸酒製芩礞丸青黛

為衣隨經增損並見本條又以易老門冬飲

加天門冬人參保定肺氣右以四君子湯倍

生姜大益脾胃以固中州又以三才丸如當

飯以補骨髓如唾血從治者加桂枝乾姜

寸口脉虛實之圖



嗽 治

微為發渴者欲愈始萌可救  
虛小者為肺痿熱之所過初結為膿  
寸口脉二者皆欬唾膿血在胸中  
實大者為肺癰血為凝滯化為五色  
者難治成膿難已

如聖丸

治風熱毒氣上攻咽喉痛痺腫塞妨悶及肺  
癰噴漱膿血胸滿振寒咽乾不渴時出濁沫  
氣臭腥臭久咯膿狀如米粥

龍腦別研 牛黃別研 桔梗 耳草生用各一錢

右為細末煉蜜丸每兩作二十丸每服一丸

噲化

嗽茱青龍散

石膏八兩 朴硝 耳草生用各一錢 青黛五錢

右為細末 每服二三錢煎薄荷湯點熱漱冷吐

治肺痿唾膿涎痰唾多出血心中温方

右以耳草一味重二兩以水三升煎作一升

半分為三服

百部丸 治諸嗽不得氣息唾膿血方

百部根二兩 升麻半兩 桂心 五味子



耳草

乾姜

右為末細蜜丸桐子大飲服三九日三以和為度

行義蛤粉散

在前陽明經衄血犀角地黄湯

條下

治肺虛嗽久成瘡吐膿血

犀角

羚羊角

犀角

阿膠

蛤粉

搜膿散

治諸瘡膿汁不絕腐盡

黃耆

白芍藥

香白芷

各等分

右為細末乾上患處上用膏藥粘貼一日一換

敷

換

換

海藏云此方魚云上瘡吐膿血久不盡

者亦宜用此藥作湯散煎調服之又宜糊為

丸桐子大白湯下三五丸或乾糝細末咽

津大效

錢氏如聖散

桔梗

耳草

阿膠炒白

煎耳桔取清內膠化

桔梗枳殼湯

陳皮

一兩

桔梗

一兩

耳草

七錢

枳殼

兩

姜煎服



橘皮茯苓湯

陳皮一兩 茯苓半兩 甘草七支

右為細末生薑煎服 一法加麻黃杏仁治

外感咳嗽 吧加半夏噦加竹筴 寒者加

乾姜

桔梗湯

桔梗 半夏製陳皮 各一兩

枳實 半兩

生薑煎服

黃耆鱉甲散

治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱

口燥咽乾頰赤心忪日晚潮熱夜有盜汗胸

腹不利減食多渴欬唾稠粘時有膿血

知母 焙 桑白皮 去紅皮 黃芩 去治

炙甘草 赤芍藥 紫苑 去芦已上六

秦芫 洗去 白茯苓 去皮焙一本忌

柴胡 去芦 地骨皮 去骨已上三味 肉桂 皮

不見火 人參 苦梗 已上三味 各

鱉甲 去裙用酥 天門冬 湯洗去心焙一本忌火

半夏 五分 全照已上二味各一兩

右為麻末每服土大錢水一盞煎至七分去



粗食後溫服 海藏云以方內瀾黃耆疑黃  
芩芩黃耆也然內有黃芩有小果胡令治虛  
熱故為有盜汗亦每妨也兼加知母地骨皮  
赤芍芩石錢氏地骨皮散也治盜汗亦效內  
有桂本治發熱惡寒即柴胡加桂也天門冬  
人參地黃即三才丸也秦艽果胡耳草鱉甲  
芍藥即黃龍湯也紫苑桔梗耳草即紫苑散  
也桂芍黃耆耳草即黃耆建中湯也又云此  
方治本無傷寒風而得 仲景麻黃升麻湯  
治唾膿血從傷寒而得 孫真人治唾膿血

用麻黃升麻之類及青龍湯之類亦從傷寒  
而得也內多五味子多皆祖仲景法每論傷寒  
傷風皆可加五味子又云桔梗一味有辛有  
苦辛以散之苦以泄之當如上下之意

御醫院正方

硃砂膏 鎮心神解熱除煩唾血等證

硃砂 別研 半西

珍珠末

生犀角

人參

玳瑁末

耳草 各一西

金箔 泥一分

粉 一錢半

蘓香油 一西

牛黃 別研

麝香

龍腦 別研



南硼砂

琥珀

鈴羊角

遠志

赤茯苓

已各五錢

安息香

石五錢

右為細末入研茱極細練蜜丸蘓香油和諸  
某為錠子更以金箔為衣每兩作五錠每服  
一皂角子大噲化人參湯下亦得並阿膠丸

相離服尤勝至宝丹

肺癰痿其皮如麩糖有胃腕成癰其皮緊如  
甲錯有腸癰裏大膿血於腸胃之間 叔和

云寸乳積血在胸中闕肉逢乳腸裏癰

定肺散

御末穀

炒二兩

知母

烏梅肉

各五錢

貝母

人參

枯菴

半兩

白朮

各二錢半

右為細末水煎生姜湯點服祿蜜丸彈子大

噲化亦得

定肺散

疑冬花

柴苑

知母

貝母

人參

炙耳草

桑白皮

御末穀

麥門冬

百部

馬兜鈴

五味子

烏梅肉

已上各等分



解毒丹  
右細末煉蜜丸彈子大噙化一丸

桔梗 生甘草 大黃 當歸  
荆芥 疆蚤 紫河車 赤芍藥

桑白皮 各六方

右細末煉蜜丸彈子大新水化下一丸

蛤蚧丸 治勞嗽

蛤蚧一對 炙耳草 麻黃 南星 炮  
人參 半夏泡 知母 貝母  
烏梅肉 瓜蒌 槐花子 炒各等分

右為細末生姜五片水煎服

古万紫苑散

紫苑 半兩 欬冬花 半兩 百部 二錢

右為細末烏梅湯點服生姜亦得 如欬加

五味子喘加杏仁 渴加烏梅 氣逆加陳

皮 頭痛加細辛 三錢耳草二錢 氣脫者

加御米殼蜜炒 麩末水煎

增損防風通聖散 治鼻塞不通 肺氣不利

桔梗 桑白皮 紫花茸 鼠粘子 各半  
荆芥穗 三兩 耳草 二兩已上各生用



右為蘇末防風通聖散各一半和勻每服  
四錢水一盞半生姜五片煎至七分去滓  
溫服食後

咽痛例

仲景有口瘡赤爛之證上實下虛熱重咽  
喉又脾熱重上焦故口生瘡宜  
升麻六物湯

升麻

危子

各二錢

大青

杏仁

黃芩各一錢半

右為粗末每服五錢匕水一小盞半芩心白三  
莖煎至一盞去粗溫服又法黃蘗蜜漬一宿  
噉之嚥汁勿絕瘥

咽喉備急丹

青黛 三兩

芒硝

耳草

各四

姜蚕

一兩

右四味為細末用臘月牛胆汁兒黃者盛菜  
於其中懸於背陰處四十九日數過多去  
如用時旋取如腮喉閉用皂子大塊碾碎  
為末以竹筒子吹之咽喉內愈  
人參清肺散



治咽喉腫痛並喉閉

人參 山梔子 黃連 盆硝 各一兩

連翹 大黃 黃芩 白附子 各一兩

耳草 二兩 生用 薄荷 一兩半

右為末煎水煎每服三錢水一盞半煎至七

分去粗食後溫服

代鐵散

治咽喉腫痛氣息難通

硃砂 少許 為君 白礬 皂角子 大為臣 牙硝 七錢 為良

硝石 四兩 為梢 黃丹 五方 小 巴豆 六六個

右為末吹喉中

奪命散

治咽喉腫痛語聲不出經進方

活萎根 剉 白僵蚕 去頭 耳草 已上各半 方各炒黃

右為細末每服三錢溫酒調下或生薑自然

汁調下更用半錢綿裹嚙化津燕亦得不拘

時候三日兩服

解毒丸 見煎安肺丸後凡熱上攻咽喉腫痛

又治咽喉腫痛欲死者喉閉急也 此方與備

不同宜定奪用之



白疆蚕 南星 各等分

右並生用同為末生姜自然汁調服主愈  
鵬砂散

治心氣焚毒內發咽喉生瘡腫痛木舌臃腫  
甚悶寒水食不下

玄參 貫衆 茯苓 縮砂 仁白燕  
滑石 荆芥 穗 山豆根 甘草 各生

南鵬砂 兩 薄荷 一兩

右為細末每服半錢新汲水調下或乾糝吞

上噪津

消毒散

治咽喉腫痛小兒癰疹已出不勻虫出不快

壯熱狂躁咽膈窒塞卧睡不安大便秘澀

牛房子 炒六兩 甘草 二兩 荆芥 穗 一兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓

食後溫服

嗽茶地黄散

治脾胃熱風熱上攻咽喉腫痛生瘡閉塞不通

或生舌根

黃芩 八兩 甘草 二兩半 荆芥 錢 薄荷 葉 一兩



右為細末每服二錢水一盞入薄荷少許同煎四五沸去滓無時嗽冷吐

玉壺丸 治三種瘰當在少陽條下

海藻 海帶 昆布 雷丸 各等

右細末米飲為丸如梧子大食後嚼化饋

便芟不斷神效

五痺散 治五種喉痺

大黃 白疆蚕 炒各等分

右細末每服五錢生姜自然汁蜜各半盞一

處調服以利為度

赴筵散 治舌上瘡不能食

銅綠 研半兩 香白芷末 一兩

右杵和勻糝舌上溫醋嗽立愈

振悸酸枣仁例

胡洽酸枣仁湯

治振悸不得眠

酸枣仁 人參 白朮 茯苓 各二

兩

兩

兩

兩

兩

兩

兩



耳草 五錢

右切以水半斗生姜六兩同煎三升作四

服

聖惠方

治胆虛睡臥不安心多驚悸

酸枣生用一兩 金錠茶二兩 生姜汁 全炙令微焦

右為細末每三錢水七分煎至六分無時服之

治人酸枣仁湯

治傷寒吐下後心煩令氣盡不得眠

酸枣仁四升 麥門冬一升 炙甘草二兩 茯苓各二兩

川芎三兩 知母二兩 茯苓各二兩 乾姜各二兩

右煎末每服四錢水煎服

酸枣仁飲子

治虛煩不得眠下氣上衝心

酸枣仁二錢 半炒 桂心五分 生姜二錢 陳皮去白

茯苓各一錢 人参各一錢

右切水三盞煎至一盞半去滓分作二服

海藏百合四君子湯 治老弱人不得眠

心虛則熱收。內定志丸補心丹 腎虛則



寒動于中八味丸骨氣丸以一藏不足者補之心盛則生熱浮心湯三黃湯腎盛則生寒姜附湯四逆湯以藏有餘二收干內動于中則累干所生之寒熱豈可止一熱字便作熱斷止一寒字便作寒斷誤矣當看前後上下文勢則可也

定忠丸隨證加料

髓竭不足加生地黃當歸肺氣不足加天門冬麥門冬五味子心氣不足加山黨人參茯神菖蒲脾氣不足加白朮白芍芩芩益智

八味丸

肝氣不足加天麻川芎腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮膽氣不足加細辛酸棗仁地榆神昏不足加硃砂頑知子茯神

八味定志丸

補益心神安鎮魂魄治痰去胸中邪熱理肺腎

人參 菖蒲 遠志 茯苓 茯神

硃砂 白朮 麥門冬 各等分 牛黃

右細末煉蜜丸桐子大未飲下三十九丸無時每十九日三服亦得



局方定志丸

治心氣不足五臟不安悲憂不樂忽多夢遺  
朝瘧暮劇狂眩不宰

遠志 菖蒲 茯苓 人參 各三兩

右細末煉蜜丸桐子大硃砂為衣米湯下五

七九日三作散服亦佳亦名茯神丸

保真定志丸加

黃連 破故紙 藕節 連子肉

茯神 三兩 硃砂

保神丸

調和心腎浦養精神

白茯苓 黃連 菖蒲 各二兩 遠志 一兩

硃砂 十錢 一半入芩一半為衣

右為細末浸蒸餅為丸桐子大硃砂為衣陰

乾每服五十丸煎人參湯送下臨卧加七

十九一法定志丸加保真黃連丸治勞

黃連 茯苓 各等分

右為細末沔糊丸桐子大茴香沔盪湯下破

故紙湯下亦得說不尽者一切製度並取前

後例



又方此陰陽各半

黃連 茯苓 破胡紙 菖蒲 各五錢

右為細末沔糊丸桐子大每服五十丸空心

沔鹽湯任下

預知子丸

主治并法見木方於定志丸內加預知子

山茱 於杞子 柏子仁 地骨皮

黃精

茯神例

人參 茯神湯

人參 茯神 遠志 菖蒲

耳草

麻末水煎服

千金翼聖惠同補心虛治健忘令人耳目聰明

用戌日取東引桃枝三寸松之開心目不忘

菖蒲 遠志

右搗為細末服方寸匕食後令人耳目聰明

從外見裏坐見千里之外令人長生去三百

病毒不能為

開心明目使人不忘



開遠志去心 茯神 各一分 菖蒲 三分

右合每服方寸匕食後服之令人不忘大聰

明

延壽丹

齊戒沐浴服之千日成仙

人參 菖蒲 遠志 白朮

天門冬 麥門冬

柏子仁 車前子

地骨皮 五味子

右細末煉蜜木臼杵丸各從製法

神注丹 後丁香條子神注日法日月當在

此條

補心丹

茯神 遠志 人參 菖蒲

硃砂

右為細末糊丸桐子大豬心血拌和丸亦可

保真秘一丹

白茯神 木猪苓 各一兩

右切作塊微煨透去豬苓不用茯神細末一

兩好蠟一兩溶開和作八九半且向東空心



細嚼燕津服吸三同燕八味本草

張天師草還丹

此藥久服輕身隨風而去如列子之乘也若

髮白者從根而黑如未白者永不白有不信

者將藥拌飲与白柏食之一日即黑此亦下

地骨皮 生地黄 石菖蒲 牛膝

遠志去心 兗絲子河浸三宿

右等分細末煉蜜丸桐子大每服三十九空

心温沔下監湯亦得脩製忌婦人雞犬見上

下少陰上下厥陰之藥也海藏云若如天門

冬人參內有三才丸也又為上下大陰与增  
損三才丸相為表裡

日月丹

丁香 木香 茴香 炒 沒藥 碎

麝香 乳香 木通 各二錢

蓮子肉 代赭 沔淬 硃砂 各三錢

蛤蚧一對頭尾全 青娘子七箇去尾 紅娘子六箇

右細末糯米糊丸櫻桃大單日一丸髮日兩

九宜心温沔下至十日為度後再服



腎邪

仲景腎氣例

仲景八味丸

熟地黄

補腎真水

肉桂

補腎真水

附子

能行諸桂而不止兼益大

牡丹皮

補神志不足

白茯苓

能代腎邪濕滯

澤瀉

去胞中水

枳及遠物

乾山茱

能治及毛中燥酸澁

山茱萸

治精滑

右八味皆君主之劑若不依易老加減服之

終不得効若加五味子為都氣丸迷類家形

之芾也 聖惠云各地黃丸能代腎邪若

芾也宜加減用 楊氏云常服去附子加五

味子桃仁張久仲肘後加減不同其說雖當

然莫若易老之稅愈也 易老之治脉耗

而虛西北二方之劑也 金弱木勝水少火虧

或瓠鼓按之有力服之亦効何也 答曰緊者

為寒火虧也為內虛水也少為木勝而金弱

七故服八味丸亦効 益大之源以渚陰翳

壯水之主以制湯光錢氏地黃丸減桂附

無比山茱丸 一名萬安丸 主治並見局方

茯苓丸篋中秘室方与上方同且錙銖異耳欲

進食者加麻茸欲身肥者加石膏欲躰潤者

加柏子仁欲能紀不忘者加遠志



末壯 柜

易老天麻丸

天麻六兩焙乾兩酒浸三日

牛膝六兩焙乾兩秤壯浸三日

玄參六兩機兩管兩鎮兩

杜仲七兩使兩骨兩相兩若兩

草薢六兩東壯另骨為

當飯二十益兩和

附子一兩炮兩行血

羌活十兩骨兩去風

獨活五兩去腎

生地黄一斤益

易老云治脉弦而虛東北二方之劑木弱水少火虧西南有二温熱一也燥熱一也視上二法則三隅可知為觸類而長更當以逆順推之天下之能事畢矣易老補丸春秋方

之氣

東坡四神丸

醫又云專此四味久服可以愈大風疾

羌活 玄參 當飯 熟地黄

素問云不知持滿不時御神務快其心逆於生樂帝御一十女而登天令人有一妻而喪命以不知陰陽之要故也人之交會陽氣秘蜜神不妄施生氣以強而能久長有若空瓶小口頓溉不入為無出者氣故不得入也又如虛管以水注楊捻竅懸之水固不泄每為



入者氣則不得出也故當志不乱意不狂真  
不泄是謂得要世以戰勝氣交河逆龜飲諸  
法背不及黃帝法內即丹葉固裏外不用陰  
引陽陰陽會合氣過屏翳例行上入升至九  
太即成太丹素問去兩者不和若春每秋若  
冬無夏用而和之乞謂至度大凡陽氣發盛  
中外相應先得陰氣女子面赤然後陽施而  
不縱為則無傷也又云勇者氣強而已怯者  
著而為病焉得陰之氣能養真陽不可肆行  
以失其精所謂陽勝則強也陽氣能強陽氣

絕傷陰平陽秘精神乃治苟或力強腎氣乃  
傷高骨乃壞何以久常帝曰以人療人真得  
其真所以長久百禔為神

孫真人口訣 東垣先生論議當在此下 復  
有仲景治陰股汗出一條在仲景設石子條  
下統以此條在三才丸後并蠱斯等丸

天門冬例

古方天地丸 一名二儀丸

天門冬 地黃 各等分

右不犯錢石器用木臼木杵搗為細末煉蜜



和丸如梧桐子大空心沔下三五丸誤犯  
鯉魚以浮萍草解之

補髓煎

天地丸內加當飯是也 三才丸天地丸內加人

參是也

增損三才丸 一名續嗣丸 一名說丸

天門冬沔洗熟地黃沔瀝柳雜人參去芦

茯苓沔浸遠志去心五味子 茯苓沔浸

透骨乾 麻茸 殊灸透

一法加白馬莖殊灸 一法加附子補相火

不足 一法加麥門冬令人有子 一法加

續斷以續筋骨 一法加沈香暖下元虛冷

右木杵臼確皆研搗可一本細稀絹羅則可若蜜恐

不下煉蜜杵午下然後可丸桐子大每服五

十九空心好酒下 年老欲補如混沌衣全

一入菜即胎衣

魏武帝服天門冬例

魏武帝與皇甫隆令曰聞卿年出一百歲而躰

力不衰耳目聰明顏色和悅此盛事也何所

服食施行可得聞乎相蜜示封上疏對曰臣



逐

聞天地之性人為貴人之所貴莫貴於生荒  
唐每始却運每窮人及其間或如電過每一  
思其惘然心熱生不再來逝不可道何不抑  
情養性以自保惜今四海垂定太半之象又  
須當展才布德萬歲每窮猶當修道之甚易  
知但不能什臣嘗聞道人薊京年已百七十  
八歲而甚丁壯言當朝夕服食玉泉啄齒使  
人丁壯有顏色去三出而堅齒玉泉者口中  
唾也朝且未起早漱津令滿乃吞之輒啄齒  
二七遍如此者亦名曰煉精薊道人年二百

面少告臣言但取天門冬去心切乾之搗取  
方寸七日三令人不老補中益氣愈百病也  
仲長統曰王候之宮羨女兼千鄉士之家侍  
妾救百晝則以醇酒淋其骨髓夜則以房室  
輸其氣血耳聾淫声目樂邪色亘日不出遊  
外不返三公得之於上豪傑馳之於下及其  
生產不時孕育大早或以童孺而擅氣或以  
疾病而造精之氣薄惡血脉不統傷胎孩脆  
而病未及堅剛復縱情慾重々相生病々相  
仍門無良医々每審術茨佐其間過謬常有



或有一疾病者莫能自免當令少有百歲之  
人者豈非所習不絕正耶  
易簡真降心丸

治心腎不足躄熱盜汗健忘遺精及服熱藥  
過多上盛下虛氣血不降小便黃赤稠濁不

清鎮益心神補虛羸血益丹田秘精氣

天門冬去心秤三兩遠志并草煮去中草去

熟地黃洗去泥焙茯苓去皮乾山茱萸

人參各二兩硃砂各二兩

右細末煉蜜丸桐子大人參湯下三十九

綿裹肚法亦浴法固嗣法孫真人口

訣日辰宜忌法並當在此條下

章帝泰和御穗方但從權而每益非若此方神

驗大有補益每損可以壽而康也諸本草

乃諸子書異傳具載以德久服皆成仙不為

虛語

二茸丸

肉蓯蓉酒浸牛膝酒浸免孫干酒浸

石斛酒炒枳椇子巴戟

山茱萸沈香白茯苓



澤浮 乾山菜 五味子

杜仲 各二兩

冬夏二至加麻茸四兩酥炙四十已上加天

雄二兩 右為麻末煉蜜丸桐子大空心温

酒下三五十九丸

蝨斯丸

治婦人每子絕產

厚朴

杜仲

秦艽

桂心

各三錢

防風

附子

白薇

半夏

各六錢

乾姜

牛膝

沙參

各二錢

人參

細辛 五錢

茯苓 六錢

右並生用杵羅為末煉蜜丸小豆大每服

五丸空心温酒下漸加至十九丸不妨十餘日

覺娠三日後不可更服有一人妻年七九

歲服藥十二日有娠餘藥與石門主薄其

專新產十二年服此藥有子人余藥與

前大守子中舍字交其專年四十九歲五

子服此藥十三日有娠若寡婦不宜服此藥

婦人有娠若食馬肉雖則當產出月始

皇母先懷而後性恐知則教食馬肉則



延期而生

混元丹此藥可增入三才丸

胞衣一箇頭尾兒者斟用酒浸曝乾細

判為末

經驗後方

華山錠子茯苓研削如末許大令四方

有角安新甌甌中以好酒浸三重紙封其

頭候百日開其色如飴糖可日食二塊百

日後肌體潤澤服一年後可夜視物久之

治婦人始覺始娠養胎轉女為男

雄黃一兩囊盛帶之

治耳聾方

雄黃 硫黃 各等分

右為細末綿裹塞耳中

神注丹 在定志丸前

茯苓四兩 硃砂四錢

右糯米酒煮茯苓至軟切片子陰乾為末

入硃砂末二錢和勻乳香水打糊為丸桐子

大硃砂為衣餘不盡者用茱陽日二丸陰日

一丸要秘新汲水下要逆氣遇空心温酒下



作陽日一丸陰日二丸可較也  
丁香丸

丁香頭代赭石五錢南乳香紫色者別研

丁香有油者各三錢舶茴二錢

右二味先杵碎為末次二味搗羅為末後入香和勻重羅至勻好釀醋浸莖餅為丸如雞頭大好心紅三錢為衣當辰火日合蒸并火日初服一日一丸次日二丸三日一丸四日二丸週而復始至十日為度許十九丸每服早晨汲新水迎日光照水然後飲嚥送下

孫真人枕中記服茯苓百日百病消除二百日夜如盡三年後能便鬼神四年後至女來從抱朴子云任子季服茯苓十八年玉女來從之能隱能斡不食米穀矣癥瘕面生光玉澤

紫石英丸治婦人絕子當在姦斯丸後

紫石英研水飛天門冬酒浸去心焙乾三西當歸切

川芎紫威蒼柏去根桂

川烏炮去皮熟地黃藏麩石斛去根

禹餘糧醋淬七次辛夷仁各二桑生



續斷 細辛根 厚朴 姜製

乾姜炮 食茱萸 牡丹皮

人參 牛膝酒浸各一 柏子仁

炙甘草 烏魚骨燒炙 山預各一

右二十六味為極細末煉蜜凡桐子大每服

三十九溫酒末飲住下空心食前日二

溫經湯

當歸 川芎 人參 芍藥

牡丹皮 桂 甘草 阿膠熬

吳茱萸洗破已上 麥門冬云心洗

半夏一兩半製

右剉每服三錢水一盞半生姜五片煎至八

分去粗得清內膠化開溫服空心食前此劑

即調和也

抱朴子法

婦人絕嗣孕 弓弦用緊腰 三箇月定候

胎氣受道途

內茱萸生丸 並見珍珠囊藥後

母丁香 附子 枯荖 肉豆蔻

烏魚骨



右製度綿裹內陰中打糊入菜內為與丸綿  
裹內之

治帶下絕產

川烏 拈卷

右等分為細末陳蜜丸彈子大 裹內陰中

太白薇丸 小白薇丸 熟地黃丸 沃蘭丸

在牡丹丸下 牡丹煎丸 二葉並治婦人血

保安丸 保命救生丹 並見後

御方菴蓉姜多服宜子孫

肉菴蓉洗淨去鱗甲皮垢 心如有黃白  
好酒洗乾糯酒浸透

羊脊骨連髓三兩別判碎銀器內水

鹿腰脊髓或半腰脊髓 不計多少

松子仁湯澄皮去薄皮 胡桃仁湯浸去薄皮

山茶不計多少

共右將上仲物於羊骨汁內先入松泥胡桃

泥作羹熟入五時味隨意調和空心与服餅

鶴鷄飛硫黃鱈魚鷄等皆可作羹食用鴨子

亦得 粳米与熟鷄頭泥相和作粥食之可

以益精髓強心志耳目聰明粳亦作糯夏月

食鷄頭肉次食粳米粥飯亦妙



萬安丸 一名山茱丸 一名菴蓉丸

菴蓉 酒浸 四兩 山茱 半兩 五味子 二兩半

杜中 切焙 三兩 牛膝 酒浸 鬼孫子 酒浸

赤石脂 紫巴戟 去心 各二兩 白茯苓

沢泻 熟地黄 山茱萸 各一兩 七錢

右各搗細末別拌菴蓉末酒熬膏和丸桐子

大每服五十九丸空心温酒下忌大醋羊血自

死物七日内顔也精神 菴蓉丸四加法欲

進者加白馬莖骨如每以麻茸代之陰下湿

痒者加蛇床子一兩

大治胎前產後三十六種冷血爪半身不遂手

脚疼痛又治八爪十二痺疝瘕乳中爪淋血

聚胎動不安子死腹中胎衣不出赤白帶下

吧逆惡心痰滿臍下痛此方出草細辛條下

赤茯苓 牡丹皮 芍藥

人參 當歸 桂

中膝 白芷 木香

藁木 麻黃 去根節 川芎

附子 細辛根 沢蘭



炙甘草

凝水石

防風

桔梗

蟬殼各五錢

萊更

沈香

生地黄

馬胡退

各一兩世用出

蚤紙非也 蚤復退下皮即真馬胡退也兼初蠟蟻非退也乃生也世人以其退皮故以蚤紙歲月既淹習以成製用者當以詳之

一法加細墨乳香各少許一法以硃砂為衣

右為細末煉蜜丸彈子大每服一二九細嚼

酒下

### 大效牡丹皮散

治五臟虛風及頭目不利不思飲食手足煩

怯悸

熱支節拘急疼痛胸膈不利大腸不調陰陽相干心驚胎悸或時旋運支節勞倦

牡丹皮

枳殼

麩炒各一兩

當歸

延胡索

桂皮

陳皮

炙甘草

三稜

炮

乾姜

半夏

洗

各五錢

川芎

二兩

白朮

麩炒

木香

各三分

訶子肉

芍藥

二錢

右細末每服二錢水半盞煎至五七沸食前溫服此茶婦人常服益血海退血風勞攻注



消寒癩<sup>痰</sup>實脾胃理血氣攻刺及氣虛惡寒潮  
熱等證至妙

仲景治陰汗

波石子燒灰先以溫湯浴了以綿輕裹然後  
敷藥裏上甚良

玉胞壯

川烏

細辛

良姜

乾姜

桂

天仙子

牡蠣粉

桐椒

右為細末醋調塗臍下綿衣覆之

綿襠法去陰汗濕痒或注瘡

荊芥

地骨

小椒

廣零陵香

何首烏

牡蠣

細辛

蛇床子

吳茱萸各一兩

大艾葉

右細末每用一匙入葱白三寸許煎救沸得

茶力熱溲淋洗

七宝散

為汗熱浸漬成瘡痛痒不已

黃耆

當歸

防風

荊芥穗

木通

地骨皮

各二兩

枯荖

右煎末每服一兩水三大碗煎至六七沸去



粗熱淋洗患處域乾避風少時  
千金方治大夫陰下濕痺蒲黃敷之良

陰囊溫痺槐枝煎湯漂洗

乾荷葉散

治陰腫痛及陰痿囊溫痺又陰下濕痺若熱

則扼子金華丸

蛇床子 乾荷葉 浮萍各等份

右粗末每服三大錢水一碗煎三五沸去滓

淋瀝避風寒

間曰翕奄沈名曰滑何調也然沈絕陰合羽

為正陽陰陽和合故令氣滑潤尺自平陽脈

微沈食飲自可少陰脈微滑者緊之浮名也

此為陰實其人必肢內汗出陰下濕也若痺

則者風宜以

白附子 白蒺藜 黃耆 獨活

防風

右等分若虛則補宜八味丸

烏金散

治夢泄精滑不禁

九助鼈甲每服一字用清酒半盞童子小便



半小盞葱白七八寸同煎至七分和滓空心

玉粉散

治汗熱浸漬生瘡腫痒椒痛

定粉各九兩半 蛤粉各九兩半 滑石六兩

白石脂 石羔 白龍骨各五錢

粟末粉 寒水石 各一兩

右為細末乾摻患處

神效丸

原原蚕蛾取東連者不以多少去頭尾毛羽

右乾為細末煉蜜丸桐子大每服七九至十

九臨臥菖蒲湯下

千金云臨其時當便玉莖至陰節間而止不尔

則遇子宮矣予問其故師曰則少陰之分肅

穀之方何以生化淺則厥陰之分融和之方

故能生奪所以受胎之處在淺而不在深也

忌辰非月經後皆不可用事但經後一日男二

日女三日男此之外皆不成胎大瓜大兩六

寒大暑陰晦日月蝕八節非常之變易皆不

可交接所生男女痴聵瘖瘂四肢不完多窮



下賤垂戾異常若不犯杜即大聰明智惠寫  
貴之子  
五補例  
局方五補丸  
人參  
熟地黄  
右細末煉蜜丸桐子大空心酒下二十九丸  
十方服數服以七宝丸泄之  
必一泻之數泻必一補之所以不失通塞之  
道補必虛泄泻實必虛滯則通之使後葉必

能成功若不泄有服八味丸一二年不成效  
者化補後泄滯不必七宝丸泄之可以去滯  
者皆是也

海藏大五補丸 此當在三才丸下

天門冬 麥門冬 茯神 石菖蒲

人參 益智仁 枸杞子 地骨皮

遠志 熟地黄 各等分

牡蛎地黄丸

論云火多水少亡精血損之源火少水多陽  
竭停液之本精遇水衰者熱退而愈精衰熱



盛者服滿而痛經云尺內兩傍以候服尺外以候腎注云服之上腎之分服之內腹之分若脾胃得積濕塞其水路肝臟不足每血漬其腎熱也又曰伏穀氣以生精北鹹寒以追

批若服此味糧命延年

生地黃

二兩

牡蛎

煨在性

括萎

各一兩

當歸

壹便浸

天門冬

各二

人參

一兩半

車前子

三兩

右細末生姜自然汁糊丸桐子大下如足腫炒葶藶湯下如服下滿塩姜湯下如潮

熱小便赤拖豉湯下

如腹痛芍藥甘草湯

間服五十九空心服

如飲食少無味人參

湯下

瓊玉膏鐵卷先生方

人參

二十四兩

生地黃

一十二斤取汁不

白茯苓

十四兩

白芍藥

一斤取汁不

右件人參茯苓為末用白礞蜜十斤生用過地黃取自然汁木石白皆可取汁盡去滓用菜一處拌勻入銀器內或好甌器內對如器物小或兩處亦可用二三十重封閉



入湯內以桑炭煮六日連夜火煮三日夜取  
出旧湯內煮一日用蠟紙救重包裹瓶口懸  
井中以去火毒一伏時取之再入旧湯內煮  
一日以出水氣取出用封取三匙作三盞好  
温酒化開服不飲者白陽化之此膏填精補  
髓髮白變黑返老還童行如飛羽日進數服  
終日不餓不食通心強志日誦萬言神識高  
邁夜無夢寐人等二十七歲已前服此一料  
壽二百六十歲四十五歲以上服者可壽二  
百歲六十三以前服者可壽一百二十四歲

已上服者可壽百歲誠不虛說若服之十劑  
絕嗜慾修陰功可地仙矣一料分五處可救  
五人癰疾分十處可救十人勞瘵合時預齊  
戒沐浴淨室焚香者勿輕易當謹慎脩製每  
示非人惟此菜可以與三才丸為表裡







石或捻之不痛久則然後變也疼痛漸熨而成膿如汙而稀久不能瘡瘡口不合變為疔漏敗壞肌肉侵損骨髓以致痿痺宜以此骨碎神丸主之方 魯山新製

骨碎補

補骨脂

熟地黄

川當飯

續斷

石南葉

黃耆

石斛

牛膝

杜仲

草薺

以上各二兩

附子

炮一兩

白芍藥

川芎

兔絲子

沙參

羌活

防風

獨活

天麻

各一兩  
五錢

此方與大儒方相表裏前桂枝拾遺後者

木瓜

兔絲子

白朮

邪三郎家小兒病寒疽久不愈先以四物穿

山甲湯透之後以地黃當飯湯補之繼以骨

碎補丸外治

骨碎補丸 主治並見局方

諸痺筋骨疼痛脚膝痺痛

骨碎補

虎骨

自然銅

天麻 酒浸

當飯

沒藥

另研



牛膝 酒浸

川芎 去皮 各五盞

乳香

硃砂 各三錢 各另研

右細末酒糊丸桐子六每服三五十九食前

温酒送下

虎骨散 虫局方為末酒糊丸

千金翼乾地黄丸

治肚热人常服之終身不發癰疽恍惚剛勞

苦

生地黄

天門冬

去心 各四兩

巴戟

桔槩

肉蓯蓉

人參

桂心

各六兩 當飯

黃耆

黃芩

遠志

石斛

炙甘草

各二兩 大黃 三兩

右細末練蜜丸桐子大酒服十九加至二十

丸或三十九

明目例

按經云天明則日月不得明邪害空竅天所以

藏德者為其欲隱大明故大明見則小朋減

攻火朋之德不可不藏天若自朋則日月

之朋隱矣所論者何言人之其氣亦不可泄



苟

露當飯淨法道以保天真苟離於道則虛邪  
入空竅空音孔竅湯氣者閉寒地氣者冒明陽  
謂天氣亦凡熱也地氣謂濕亦雲霧也凡熱  
之害人則九竅閉塞露之為病則掩醫精  
神取類者在天則日月不光在人則耳目隱  
耀也靈把經曰天有日月人在眼目易曰表  
明于易豈非失養正之道也雲霧不精則上  
亦白露不可露者雲之類露者雨之類陽盛  
則地不上亦陰虛則天不下交故云露不化  
精微之氣上亦於天而為白露不下之咎矣

陰陽亦象大論云地氣上為雲天氣下為雨  
雨出地氣雲出天氣明二氣交合乃成雨露  
又盛衰論曰至陰虛天氣絕至陽盛地氣不  
足是朋氣不相召不能交合

六合丸

天門冬

麥門冬

生地黃

熟地黃

枸杞子

地骨皮

七仙丸

鬼孫子

車前子

巴戟天

肉蓯蓉

熟地黃

枸杞子



并菊花

名駐車丸菊花丸桐合七味

益陰丹

熟地黄

四兩

茯苓

酒浸 三兩

巴戟天

去心

枸杞子

各二兩

右為末酒糊丸梧子大

永壽丹

天門冬

熟地黄

枸杞子

并菊

已上方皆煉蜜丸桐子大米飲湯下酒亦得

諸風例

凡氣與太陽俱入行諸脈俞散於分肉之間與

衛氣相示其道不利故使肌肉腫脹而有癢

衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也病者

有榮衛熱附其氣不清使其鼻柱壞而色敗

皮膚癢腫矣凡寒客於脈而不去名曰疝風

或者曰寒熱癩疝又云因而露凡乃生寒

熱亦疝風也

易老祛風丸

治疥癩經云凡中血脉而成疝風、即癩



也

黃耆 枳殼 防風 芍藥

甘草 生地黄 熟地黄 地骨皮

枸杞子

梧 右九味末白杵為細末練蜜丸楮子大空心

治 白湯下廿九粒菜與摩爪膏子外洗相表

裡

御方祛風散

生地黄 熟地黄 防風 甘草

枳殼 芍藥 枸杞子 地骨皮

桐 右細末練蜜丸楮子大每服五十五丸溫酒

下

烏白散

治大風遍身生瘡累醫不効者

白芷 烏梢蛇 地龍 去土

荊芥 細辛 天麻 當歸 各一

白芷 蔓荊子 苦參 牡蠣

不灰木 葛蒲 天門冬 去心

紅芍藥 定風草 川芎 胡麻子 炒

烏 何首烏 木鱉子 去皮油 羌活



烏 草烏頭木 蒼木製 咸靈仙 去土

井菊花 沙苑蒺藜 木賊

并草 沙參 紫參 已上各二兩

右細末每服三二錢温酒調服日二三服忌

動風之物并鷹事

大俵方陽氣者精則養神氣則養筋閉闔不得

寒氣從之乃生大俵

羌活 防風 細辛

附子 當歸 甘草

川芎 續斷 白芍 藥

白朮 桂 麻黃

黃耆 熟地黃

此藥當與曾山骨碎補丸桐表裡

仲景旋覆花條下注痲痺二證

龍蛇散

治風虛頭麻遍身白癩紫癩癰疹痒痛者

烏 白花蛇 去骨炒 烏梢蛇 去骨炒 草薺

天麻 骨碎補 金毛狗脊

自然銅 黃芪 楓杏研

地龍 去土 草烏双 槐水浸剉各一兩



乳香

沒藥 各二錢

麝香 二錢

右細末酒糊丸梧子大每服一十五丸食後

可酒下為細末酒調下亦得內有佐經丸亦甲

烏例草烏後

獲肌丸

治肺氣赤白癩瘡痒并烏癰瘻口眼喎斜

烏

白花蛇

烏梢蛇

各酒  
去皮

天麻

牛膝 酒浸

白芷

各一兩

白附子

白僵蚕 各一兩  
兩半

右為細末煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服二

十九溫酒下

退風散

治痺肺風攻注皮膚癢疼痛痒一切肺風

苦辛

白茯苓

右等分為細末酒調食後服

黃蘗例

大鳳髓丹

半夏 炒

木豬苓

茯苓

紅蓮菜

益智

各三錢  
半

黃蘗

炒二兩

縮砂仁 一兩

并草

五錢



治心火狂陽火盛補腎水真陰虛損心有所  
欲逮於盛動心之於腎疾於施世固真元降  
心火益腎水大有神効

正鳳髓丹

黃蘗 二兩 縮砂 一兩

并草 五錢

經云腎息燥以辛酒之縮砂仁味辛以潤腎燥  
又云急食苦以堅之黃蘗味苦以堅腎水又  
云以并後之并草味耳以緩腎急又云并補  
之并味以生元氣古人云瀉心者非也及浮  
相火益腎水之劑若以黃蘗浮心火則黃連

當浮何經 二藥並用酒煮糊為丸桐子大  
空心溫酒下三十丸晨服

小鳳髓丹 一名養真丹

并草 一兩 黃蘗 二兩

梔子金花丸 即活人解毒湯丸也

加蘆薈沉香為蘆薈丸青黛為衣 去大黃

加防風名五黃丸 加連翹為連翹金花丸

蘆薈丸治小兒疳積黃糊丸黍米大

溫水送下二十丸時

鮮毒丸



渴

治大小積熱咽喉目赤癰腫心忪不安中暑  
發熱湯者

寒水石

一兩

青黛

八錢

石羔

一兩

一錢

已上  
各研細末

右和勻蒸餅丸鷄頭實大每服一二丸新汲  
水花下姜湯亦得

拔毒丹

一名拔毒散

治肉色變赤四肢拘攣走欲然腫痛

黃柏

并草各一錢

石羔二錢

寒水石

二錢

右細末水調搽

与

水

水

海藏云子觀此方極有理不惟外治內亦効  
量見大小以水調服方寸匕更以掃之內外俱  
治療也凝水石泄腎石羔池三焦大熱黃蘗  
又治瘡門相火之本并草以消毒緩急所以  
多効故入小鳳髓丹例

固九丹

治血枯大脫血崩中漏下不止房室過度氣  
竭肝傷五心煩熱或勞保真益血脈尺中及  
三部而實膏梁有餘者主之

黃柏

四兩

生地黃

三兩

縮砂

二兩



桐

益智一兩 升草 生用一兩

右為極細末滴好醇酒為丸桐子大每服三十丸空心淡鹽湯下漸加至八十丸以意消息治之加真續斷二兩治心火加黃連一兩治風加當歸川芎各一兩代續石為衣

易老珍珠丸

黃蘗 蛤粉 各二兩

右劉黃柏新瓦上炒二味共細末水丸溫鹽酒任下治陽盛陰虛精不禁之奇方也

秘製丸

紅蓮葉

益智仁

縮砂

茯苓酒浸

黃柏各一兩

豬苓

半夏各五錢

右細末蒸餅丸桐子大每服五十丸空心米

飲下

保真丸 脫精命門相火盛服此方止之

黃柏

黃連

黃芩

枳子

大黃

縮砂

升草

生地黄

白茯苓

益智

人參

地骨皮



蓮子皮

右細末生地黄汁糊丸桐子大  
賀蘭先生解毒丸 一名保命丹 一名化毒

丹

善治毒諸茶毒山嵐瘴氣魚果肉麩菜毒冬  
丹毒復月暑毒楊寒餘毒小兒疹瘡癩毒熱  
毒喉痺急毒凡有名之毒悉皆治之

黃柏

管仲

茯苓

藍根

乾葛

地黄

雄大豆

升草

骨石

縮砂

陰地蕨

薄荷各二兩

山豆根

土馬鬃

豆粉

益智

大黃

寒水石生

紫河車

馬勃

龍膽

白殭蚕

石藥煎

山梔子各一兩

尾

右為細末練蜜丸每服兩作十丸細嚼新水  
下一丸津嚥亦得 小兒驚風薄荷湯下  
或蜜水浸蒸餅為丸亦可夏月尤宜時服永  
無熱病冬服無傷寒 昔云賀蘭仙人也者  
日帝問日朕聞卿能點化石礫為黃金然否



公雍容對曰陛下貴為天子富有四海臣願  
以堯舜之道點化天下 帝慙子嘗以此推  
之先生望明君精存此心術後之人當如何  
耶

清心丸

黃栢 生二兩 麥門冬

龍腦

一法加天門冬黃連

右細末煉蜜丸桐子大每服十九丸麥門冬酒  
下薄煎湯亦得

錢氏浮心湯 浮丁也 導赤散 浮丙也

火府丹 丙丁俱浮

黃芩

黃連

生地黄

木通

右細末蜜丸桐子大每服二三十丸臨卧溫  
水下

經進十精丸

賜紫金魚袋監中岳重福宮臣覽諸方一千  
餘卷檢見此方其功大如臣服半料多病眼  
昏而復明氣衝而實四肢輕捷石節舒暢乃  
病消除臣今進方中後 皇祐二年正月進

于

枸杞子 天之精

熟地黄 地之精



乾山茶<sup>土</sup>之精 兔絲子 金之精 水浸

桂木之精 栝子仁 滋之精

并菊花 陽之精 肉苁蓉 水之精

茯苓 十年之精 漢椒 火之精

搗

右件十味各揀淨批製造如法搗羅為細末  
乾浸藥酒打糊為丸桐子大每服二十九茶  
酒監湯任下空心日進二服男子元氣損耗  
精神虛弱面色痿黃肢體瘦乏脣腹久冷五  
淋損傷夜夢遺精五勞七傷上實下虛行步  
難艱小腸疝氣腎虛脚弱及婦人子宮久冷

有

神効

神仙六子丸

血氣滯多實胎石結飲食無味四肢 沉困夜  
夢難分脬腹虛痛心疾頭疼世藥服之立者  
此藥石日黑如漆  
治男子血氣衰敗未及五十歲髮班白若脹

兔孫子 金鈴子 枸杞子

覆盆子 五味 蛇床子

何首烏 舶茴各二兩 牛膝

地骨皮 木瓜 熟地黃 三兩



右蜜為丸每服五十九空心酒下要髮黑煎  
併藥肉別加人參茯苓石菖蒲名一兩忌蘿  
蔔生韭薤菜蒜

十補丸

治男子腎藏虛精氣寒滑婦人血海冷經脈  
不調除寒濕養脾胃手足溫和

玄胡索

葫蘆也

破故紙

茴香

川薑

附子

桂

當歸

紫也戟

肉蓯蓉各等分

右細末酒糊丸桐子大每服三五十九空心

溫米飲子酒鹽湯亦可

補虛五味子丸

主治製脩並見局方

治婦人五淋小便赤

右方麻角霜凡乃驢珠大和之祖也

並見湯液

條下故疑白膠阿膠皆麻角膠也蓋白膠而  
白膠香在本部阿膠即黑驢皮在高部麻角  
膠石獸部五者可知

太和膏

劉扶浩仙進方補其壯下元治本藏虛弱追  
食強筋骨助脾胃補損傷久服延年益壽長



生不老消除百病

當飯酒浸

茯苓酒浸

川芎各四兩

大船箇六兩

川練子

破故紙

楮實子

遠志去心

白木

韭子

白茯苓

葫芦巴

枸杞各三兩

黃蠟一兩半

葱白十根

胡椒五十箇切作片

右卧麻角三十斤東流河水三十擔銅灶鐵

鍋二隻靠麻頂截角用赤石脂鹽泥於截動

處塗固之勿令透氣於甑內煎一炊時用馬

於 与

藺刷就熱湯刷去麻角上血刺塵垢訖可長三四寸截斷麻角外將前件藥一十六味拌和勻停先鋪一層角於鍋內角上鋪一層菜如卅勻作五層鋪之將河水添在菜鍋內其水也角上常令高三寸無烟木炭聚令常小沸勿令大沸外一鍋內專將河水煎場亦勿令火滾如菜鍋內水積下却中熱湯內取添上令三寸却取河水添在熱湯內續之倒添至二十四時任火候冷時將麻角撈出用白絹濾取汁其菜滓不外用將菜汁如煎法再



煎更不用加水如膏滴水不散凝結方成  
驪珠丹

鹿角霜

白茯苓

澤厚

白龍骨

二兩水

再同為細末以醇酒一升鑄開太和膏六兩  
人鍊蜜四兩更熬令勻投和前茶成劑丸如  
桐子大每服三十七丸空心溫酒下漸至百  
凡其効不可具述 海藏云大低益陽之  
茶不為命門桐火衰陽事不舉有誤子孫之  
計故聖賢著書立意投虛補不足也後人孰

嗜慾喪身天命惜哉

腎氣內消丸

山茱萸

食茱萸

馬蔴花

川練子

陳皮

吳茱萸

茴香

木香

右細末醋湖丸桐子大每服二三十丸空心

鹽酒送下

入方

青皮

川烏

草撓

木香

茴香

紅皮



挑仁

葫芦巴

破故紙各等分

右細末酒糊丸桐子大每服三十丸鹽湯下

全鈴子丸 治小腸氣疼不已或腫偏大

金鈴子

茴香

當飯

葫芦巴

蠟各等分

右為細末酒調下一二錢

枳殼五倍丸

治痔漏

枳殼

五倍子炒各等分

右末蜜丸空心溫酒下三五丸一本枳殼五兩五倍

子二兩蜜丸米飲下

碩夫枳殼茴香丸

枳殼

二兩麩炒去穢苦為末

茴香

一兩另為末鹽炒

好酒半碗入茴香末熬成膏子次入枳殼末  
凡桐子大却用龍骨末一二兩磁鉢內培養  
服時去龍骨末每服三十丸酒鹽湯任下

用

又一法用

枳殼

二兩

茴香

一兩

龍骨

半兩

右酒糊為丸如用噲五味散枚燕津

香散丸



枳殼 三棗 麩炒 茴香 炒 黃 各等分

右細末酒糊丸桐子大空心酒下二三十九

局方括搗枳殼散主治脘製並見局方

易簡枳殼湯

服之縮胎易產妊婦臨月服之特有神効天

夫婦人寬中下氣治腸中諸痛尤得其宜

枳殼 五兩 甘草 一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至六合去滓煎

服或為細末更加香附子一兩尤妙 如大

夫婦人冷氣攻刺服即疼痛加葱白二寸火

煨入煎茶服能飲者細嚼葱白熱酒調下服之

之 如胸膈氣閉飲食不進葱白湯調服

腎氣腫痛煨葱白二寸茴香一大撮同嚼熱

酒服若久服之永不斃動 腰背氣痛用

葱白湯調服訖即卧少時旋能作効 脚氣

癢痛空心熱湯調服 婦人因得寒血閉成

塊熱酒調服之 產後血氣不和熱湯調服

心腹氣痛吐清水飲食不消胸膈脹葱

白湯調服 冷物傷脾癢痛每時胡椒煎湯

大調服 大小便秘煎白牽牛湯調服 婦人



暈

血暈兩太陽痛頭旋欲倒者煎艾湯調服  
婦人經脈不行手足發熱或身潮熱先用葱  
白湯次用蒲黃湯調服若經脈不調脾胃稍  
壯者當用大聖散服之數在神効若經血不  
調血藏疼痛者當用小濕經湯以當飯附子  
二味等分白水煎服 小兒面黃胃冷吐食  
煎木瓜湯調

一者因而飽食筋脈橫解腸澀為  
二者因而大飲則氣逆肺氣奉故氣逆而上  
三者因而強力腎氣乃傷膏骨乃壞強力入  
房骨乞體枯

金匱要略水氣病脈證治

後代名醫諸書取  
說皆取此以為法

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗  
風水其脈自浮外證跗腫按之沒指不惡風  
皮水其脈亦浮外證跗腫按之沒指不惡風  
其腹如鼓不可當穿其汗 正水其脈沈遲  
外證自喘 石水其脈自沉外證腹滿不喘  
黃汗其脈沉遲身體發熱胸滿四肢頭面  
腫久不愈必致癰疽 脈浮而洪浮則為



不

風洪則為氣風氣相擊身體洪腫汗出乃愈  
惡風則虛此為風水惡風者小便通利上  
焦有寒其口多涎此為黃汗大陽病脈浮緊  
法當骨節疼痛而反不疼身體反重而酸其  
人不渴汗出則愈此為風水惡寒者此為極  
虛發汗得之湯而不惡寒者此為皮水身體  
冷狀如周痺胸中滿不能食反聚痛暮燥不  
渴眠此為黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此  
為脾脹其狀如腫發汗則愈然諸病此者  
渴而不便小便數者皆不可發汗裏水者

渴

及

一身面目洪腫其脈沉小便不利故令病水  
假令小便自利亡津液故令渴也跌陽脈  
當伏令及緊本自有寒症腹中痛匡反下  
之即胸滿短氣也跌陽脈當伏令及  
水入寸口脈浮而遲浮脈則熱遲脈則潛熱  
數本自有熱消穀小便數反不利此欲作  
潛相搏名曰沉跌陽脈浮而數浮脈則潛熱數  
脈則止熱止相搏名曰伏沉伏相搏名曰水  
沉則絡脈虛伏則小便難虛難相搏水走皮  
膚即為水矣寸口脈弦而緊弦則衛氣不



行即惡寒水不洽流走在腸間 少陰脈緊  
而沉緊則為痛沉則為水小便則難沉得諸  
沉當積有水身體腫重水病脈出者死 夫  
水病目下有卧蚕面目鮮澤脈伏其人消渴  
之病問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿  
目腫者何也答曰此法當病水若小便自利  
水腹大小便不利其脈沉絕者有水可下  
反汗出者自愈 心水者其身重而少氣不  
得臥煩而燥其人陰腫 肝水者其腹大不  
能自轉則腸下腹痛時 津液微生小便續

通 脈水者其自腫小便難時 鴨澹 脾  
水者其腹大四肢若重津液不生但要小氣  
小便難 腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺  
陰下濕加牛鼻上汗其足逆冷面皮癢 師下渴  
曰諸有水者腰以下腫當利小便腰已上腫  
當發汗愈師曰寸口脈沉而遲沉則為水遲  
則為寒 水相搏跌陽脈伏水穀不化胆氣  
衰則驚澹胃氣衰則身腫少陰脈細男子則  
小便不利婦人則經水不通經為血 不利  
則為水名曰水分 問病者若水面目身體



四肢皆腫小便不利師曰脈之不言水及言胸中痛氣上衝咽狀如魚肉當微欬喘雷如師言其脈何類師曰寸脈沉則為水緊則為寒沉緊相搏結在鬲元如時當盛年或不覺陽衰之後榮衛相干陽損陰盛結寒微動緊氣上衝咽唯塞噫脹下急痛醫以為留飲兩大下之氣上衝緊不去而病不除後重吐之胃家虛損咽燥欲飲水小便不利米穀不化面目手足浮腫又子葶藶凡下水當時如小瘥飲食過度腫復如初胸脇攻痛象若奔豚

其水揚溢則浮而動喘逆當先攻擊衛氣

治欬土其脇自瘥先治新病之當在後

風水脈浮目重汗出惡風者防已黃耆湯主之

腹痛加芍藥凡水惡風一身悉腫脈浮不渴

續自汗出而無大熱者越婢湯主之

麻黃去節六兩石膏各二兩

生薑二兩切東

十五枚

右以咀五味以水六升先煮取麻黃再沸去

上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服惡風

者加附子一枚炮古今錄驗云風水加木四



皮水為病四肢腫水氣在皮層中四肢甚及  
動者防已加茯苓湯主之

防已 桂枝 黃耆 各三 茯苓 去皮 六兩

炙甘草 二兩

右五味咀咀以水六升煮取二升去粗分溫  
再服

裏水越婢加水湯主之 方見脚氣中

又甘草麻黃湯亦主之方

甘草 炙二兩 麻黃 去節 八兩

右二味咀咀以水五升先煮麻黃去粗沫內

并草煮取三升去粗濕服一升重覆出汗不

汗復服慎風寒

水之為病其脈沉小屬少陰浮者為風無水

虛脹者為氣水澼其汗即已脈沉者宜附子

麻黃湯脈浮者宜芻子湯

杏  
附子麻黃湯

附子 一枚 炮 去皮 麻黃 三兩 甘草 炙 二兩

右三味咀咀次水七升先煮麻黃再沸去上

沫內諸菜煮取二升半去粗溫服八合日三取



**杏** 杏子湯 **未** 東見方恐是麻黃杏仁并身石羔湯

也 厥而皮水煮蒲黃散主之 常見清湯

中師曰黃汗之為病身體腫一作強 堯懣汗

出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如漿汁脈

自沉問曰從何得之師曰以汗出入水中浴

汗從孔中入得之黃汗

黃耆芍藥桂枝杏酒湯主之

黃耆 五兩 芍藥 三兩 桂枝 兩 浮皮 二

右三味以水七升苦酒一升相和煮取

三升去粗濕服一升當心煩也至六七日乃

解若心煩不止者以苦酒阻故也 一方用姜

**苦** 清醯代苦酒

黃汗之為病兩頰自冷假令發熱此屬歷節食

已汗出又身常暮臥盜汗出者此榮氣虛若

汗出已及反發熱者久其身心申錯發熱

止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久

必身胸即胸中痛有又從腰已上必汗出

下無汗腰下弛痛如有物在皮中壯劇者不

能食身疼重煩燥小便不利此為黃汗桂枝

加黃耆湯主之方

**甲**



桂枝皮去麻

生姜

芍藥 各三兩

甘草炙

黃耆 各二兩

右以咀入棗一十二枚擘以水八升煮取三

升去粗濕服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助

師曰寸口脈遲而澁遲則為寒澁則為虛不足

跌陽脈微而遲微則為氣遲則為寒氣不

足則手足厥冷手足厥冷則榮衛不利榮衛

不利則腹滿胸鳴相逐氣轉膀胱榮衛俱勞

陽氣不通則身冷陰氣不通則骨疼陽前通

則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃

行火氣一轉其氣乃散矣則失氣虛則遺溺

名曰氣分氣分心下堅大如盤如旋杯水飲

所作桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯主之

方

桂枝皮去浮

甘草炙

麻黃去節

生姜切

附子一枚炮去皮

細辛兩

大棗二十枚

右以咀以水七升先煮麻黃再沸去沫內諸

藥煮取二升去粗分溫三服當汗出如虫行

皮中愈

次



心下堅大如盤如旋杯水飲取作枳  
之方

枳實

白朮

各三兩

右二味以水五升煮取三升去粗分温  
三服腹中更即當散也

附方

夫風水脉浮為在表其人或頭汗出表無化病  
二者但下重故知從腰以上為和腰以下當  
腫及陰難以屈伸防已黃耆湯主之  
方見風  
濕中見  
出外臺

海藏水氣問難

便

宜

經云諸水身半以下腫者當利小便身半以上  
當發汗經云身半以上天氣主之身半已下  
地氣主之天氣主之者其在皮也其在皮者  
故汗而發之 問肌肉之外皮膚之裏首至  
足一身皆腫者當作何治答曰亦宜汗之也  
與身半以上同法身半以上汗之者尺寸之  
天地也故汗之肌肉之外皮膚之裏一身盡  
腫者從天而汗之此表裡之浮沈凡治之法  
當如是也肺心肝腎中州已上俱宜汗中州



已下皆宜汗如小便利而渴不宜汗不宜下  
以其重七津液故也問曰仲景者少陰脈緊  
而沉緊則為痛沉則為水小便則難脈得諸  
沉當附骨身體腫重水病脈去者死也叔和  
云水氣浮大即延生二者不問何也答曰少  
陰證當沉故脈出者死也此水附骨以當沉  
而下出則當微去本部即定得生也此箇出  
字去本部之外故死也經云陰陽俱虛脈出  
者死于此同意水氣浮大即延生者總而言  
之也**五藏六府上下表裡及諸部分但在其**

中矣此陰盛而陽虛也故暴出方死何以然  
少陰脈沉知周身無陽也水病滯塞不通脈  
暴出陽何以周流於一身養育一體故死也  
腹上腫者屬厥陰腰腫者屬腎水氣源流並出素問水  
海藏集仲景水氣例水氣源流並出素問水  
熱坑論高低內外輕重表裡隨經補浮要當  
外謹察肺胃腎三經病即瘥也  
仲景葶藶大棗浮肺湯治喘嗽痰涎面目浮  
腫

甜葶藶 苦葶藶 等分 大棗



仲景枳朮湯 治心下水結如盤

仲景牡蛎澤浮散 治腰已下有水气

仲景生姜泻心湯 治兩腹水气腹中雷鳴

仲景耳聾附子白朮桂枝湯 治陰證自汗身

微腫風濕相搏小便不利

仲景真武湯 治少陰三二日不已至四五日

腹痛小便不利四肢沉重疼痛則不利世皆

水气其人或欬或小便不利而吐者

仲景十枣湯

大戟 芫花 甘遂 各等分

三花神祐丸

十棗湯加 牽牛 大棗 輕粉

水丸

陰濕丹

神祐丸加 黃蓮 黃蘗 青黛

玄青丹

神祐丸加 黃連 黃柏 青黛

右已上四料丸藥極有毒不可輕用也

趁痛丸

大戟 甘遂 白芥子



大麥麵

各一兩

右三味藥為末拌和勻作餅大慢火炒黃熟再為細末用大麥麵一兩同生藥拌勻糊丸桐子大空心冷酒下十九至十五丸

明理趁痛丸

治脚氣上攻風毒走注疼痛神効又治水氣浮腫

白芥子

肥甘遂

大黃

各生末各一兩

醋

右件用白麵一兩半滴水丸作餅子焙令黃不可過焦為末醋糊丸桐子大冷酒下二十

丸無時量虛實加減

水氣下為跗腫上為喘呼不得卧者標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得卧者分為相輪俱受者水氣之取留也

伏梁水氣日華子曰在本草羞活條下五皮散

生薑

茯苓皮

桑白皮

大復皮

陳皮

一法加牽牛各等分白水煎服之

海藏老人方



調胃白朮沢浮散

治痰病化為水氣傳為水穀不能食

白朮

沢浮

芍藥

陳皮

茯苓

生姜

木香

檳榔子各等分

一法加白朮木朮各半治臍腹上腫如神心

痞

下痞者加枳實下盛者加牽牛

紫苑散

木香

人參

白朮

鐵腳紫苑

川芎

各二兩

右藥末生薑烏梅煎次日又服

夫水氣者胃土不能制腎水逆而上行傳入于

肝故令人腫治者惟知泄水而不知益胃故

多下之強令水出不依天度流轉故胃愈虛

食不滋味則澆而不能治也莫若行其取無

事則為上計不可不知

仲景十棗湯

治太陽中風吐下哕逆者可攻也若病懸飲

者此湯亦主之

芫花

甘遂

大戟

各不分

右大棗十枚水一升半煮取八合去粗肉諸







木通

脾沉胃浮

白朮

芍藥

生薑

赤小豆

棗

枳實

黃耆

甘草

石羔

肝沉膽浮

川芎

芍藥

細辛

腎沉膀胱浮

澤瀉

茯苓

豬苓

白朮

木通

樛草

通草

牡蛎

滑石

澤蘭

附子

葶藶

瞿麥

車前

防己

化水丹

止消渴化停水

烏頭

大者四  
個炮

牡蛎

煨二錢

蛤粉

六兩

右細末醋糊丸桐子大冷水下三五十九飲

水一擔者一服愈

易老云益火之源以消陰翳則使溺有節烏附之類是也牡水之主以鎮陽光則渴飲不思蛤蛎之類是也



取瘡跟中痛例

子和泄水丸改名大智丸泄水散改名大智散

藏用凡加減例

局方神助散 治十腫水氣小便赤澀大便自

利

葶藶炒香

豬苓去黑皮澤瀉各二兩

牽牛炒末

椒目一兩

右細末每服三錢匕葱白漿水入酒調下

次以葱白湯收之忌麪鹽等物大小便利後太

宜將息斷鹽房室三年 男子疝瘡或痛在

莖之竅或在竅之標皆手足太陽 不利熱毒

下傳入手足厥陰故為紫黑色作蝕瘡壞其

至而死以子和泄水丸散導其濕毒無不愈

者如已成瘡先泄其根蒂次從標而外治以

葱白黑豆汁漂洗拭乾以黃連末香蜜陀僧

乾胭脂之類細末塗之如內潰膿不出以追

膿散上之後竅如膿少可用黃連末香胭脂

等貼之

泄水丸散亦能治足跟中痛腎主濕濕主痛故

大泄之而愈以去其濕也 丙傳壬壬傳乙



石

乙子庚合故以泄水丸之則愈也

誦水風水石水之源

陰陽活邪少陰少陽名曰石水小腹腫三陽獨

至者是三陽符至由此則但有陽而無陰也

右水者謂冬月水冰如石之時故曰石水也

火暮於盛冬陽氣微之石水而死也腎肝並  
沉為石

帝曰有痛腎氣者面跗腫然壅塞可刺否岐伯

曰虛不當刺不當刺而刺後五日其氣必至

帝曰其至何如岐伯曰至必少氣時熱時從

苦

胸背上至頭汗出才熱口乾者渴小便黃目

下腫腹中鳴身重難以行月事不來煩而不

能食不能正偃正偃則欬病名曰風水論在

刺法中帝曰願聞其說岐伯曰邪之取濇其

氣必虛陰虛者必濇之故七氣時熱而汗出

也小便黃者小腹者火也不能正偃者胃中

不和也正偃則欬氣上迫肺也諸有水氣者

微腫見於目下也帝曰何以知之岐伯曰水

者陰也目下亦陰也腹者至陰之取居故水

在腸者必使目下腫也真氣上逆故苦舌



客

乾卧不得正偃正偃則欬出清水也諸水病者故不得卧則驚駭則欬甚也腹中鳴者病本於胃也薄胃則煩不能食之不下者胃皖隔也身腫難以行者胃脉在足也月事不來者胞脉閉也胞脉属心而絡於胞中令氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也帝曰善帝曰諸水皆生於腎乎岐伯曰腎者

傳於跗腫本之於腎名曰風水帝曰七陰何以主腎之何以主水而岐伯對曰腎者主陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰冬脉也故其本在腎其末在肺皆積水也帝曰皆何以聚水而生病岐伯曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也上下濕於皮膚故為跗腫者腎水而生病也陰陽別論曰三陽結之為水注云脾肺之寒無脈此但之陰而少皆一陰也湯液醪醴論曰三焦閉澀水道不通水滿皮膚身體病腫索滯府為水之



法也。平人氣象云：頰血脉動，喘咳，曰水。目窠微腫，如臥蚕起之狀，曰水。足脛腫，曰水。此上下之別也。帝問岐伯曰：水之起也，膿、臍、石、癥、石、水，何以別之？岐伯曰：水之起也，目窠上微壅，如新蚕卧起之狀，其頰脉動，時欬，陰收，間足寒，脛壅，腹乃大，其水已成也。以手按其腹，隨手而起，如囊中之水，此其候也。諸水大抵胃上不能制腎水，凡治水者，人惟知治水而不補胃，如補胃多先之壅滯，當用何法？本草云：赤小豆治水腫，通氣補脾。

胃

神方

烏雞子一個去頂取清黃汁調臍粉一大錢，令勻內殼中以蒸餅劑裹之，蒸熟去殼，聚熟黃二莖，麩等分炒為末，上俚黃蘗餅等和，便丸如豆大，每服三五丸，車前子湯下，小便澀不通煎瞿麥湯下。

又方治單腹脹水氣，右隔紙炒苦苧莖二錢，細末，無根水下，百一方，羣大腸水腫。



垂

青雄鴨以水五升煮取一升飲尽厚覆取汗  
治十腫水氣不瘥垂死

以青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味  
煮令極熱作粥食之

又法治水氣脹滿小便澀

白鴨子一隻去毛腸饋釵半升与椒薑同醃  
鴨腹中縫定如法蒸熟食之

又法治十腫水氣垂死

鯉魚一箇重一斤者和冬瓜葱白羹食之

治鼓氣方

滑石 輕粉各錢 槐花一錢半

右不犯鐵器為細末取生地黄自然汁生薑

自然汁停滴在茶中為丸桐子大一日服三

木凡次日服四九五日以來早晨只一服用生

地黄汁濕送下小便中水盡為度得腫後日

服嘉未散十日永不再發

胞轉小便不通能小腸膀胱厥陰之氣也蓋因

強力房事或過小便以致此疾非可利之藥

取能利之也法當治氣宜以

沉香湯主之方



服

錢氏塌氣散

胡椒

一兩

蝎梢

半兩

右為末細麵糊丸粟米大每服五七丸至一

二十丸陳米湯每時服

木香塌氣丸

丁香

各半兩

胡椒

各二錢

蝎梢

一兩

木香

各半兩

枳實

三錢

白牽牛

各一兩

郁李仁

四錢

沉香 木香 各一錢

右為細末煎陳皮茯苓湯調服空心

右為細末飯丸菘豆大每服十九至十五丸

陳皮生姜湯任下

木香散

木香

青皮

白朮

薑黃

阿魏

各一兩

草豆蔻

已上各半兩

草澄茄

右為細末醋糊丸菘豆大每服二十丸

生姜湯下

又方

治鼓氣

大蠟燭一筒新丸二筒相合麻繩纏定盛在



内鹽泥固濟厚令慢太燒之成坭存性温酒  
調脈三五錢

折傷例

乾城劉家接骨丹真方

虎骨 一兩

生硫黃

青皮

沒藥 各半

當飯

附子

川烏

草烏

脊

官桂

陳皮

金毛狗脊

骨碎補

川練

縮砂

木鱉子

半兩錢碎

羊腔骨

川芎

狗腔骨

菴蓂 酒浸洗去

牛膝 酒浸已上

赤芍藥

自然銅

各四兩火煨酢

乳香 半兩

碎七塊

右二十五味為細末為二七分細者每瓶一

錢酒調脈濕三分小黃米粥為丸桐子大温

酒下二三十丸隨病上下食前後間服之

接骨散

治從高墜下馬踏車碾筋斷骨碎痛不可忍

接骨續筋止痛活血

鵬砂 一錢半

定粉

當飯 各一錢

右原末煎蘓木湯調下二錢脈熱時服蘓



木陽投之

接骨丹 治可撲損傷但筋體不折皆治之

乳香碎

當飯

宿酒浸一宿

威灵仙

酒浸一宿

骨碎補

去毛酒

日乾

鬼絲子

酒浸一宿

龜殼

龍骨

酒浸

虎骨

酒浸酥炙以

右細末 蠟丸 彈子大 十歲以下服半丸 二十

歲已上服一丸 好酒三盞 煎用柳莢子攪勻

和查只一服 不得再服 恐過節必至 蘆茹後

用煎藥

黃松脂 二兩

沒藥

研半兩

乳香

研三錢半

右細末用麪伸勻調攤在緋綿上貼傷處用

綿竹篾夾定封須要子細對得骨正更用紙

封

神仙正骨茶黑金散

半兩

錢

火燒醋浮

水蛭

炒黃

自然銅

醋

乳香

各半

沒藥

一兩

麝香

一錢

右細末四十已上服半錢四十已下服一字

二三服即効如蘆節用生薑自然汁濕酒一

盞調服



如腰已上損折食後腰已下食前若骨不損者茶自吐出無忌 繆刺云人有取髓惡血留內腹中脹滿不得前後先飲刺茶此上傷厥陰之給刺足踝之下然骨之前血脈出血刺足附上動脈衝陽胃之原刺入同身寸之三合留五呼可灸三壯不及刺三炷上各一痛見血立已左刺右之刺左謂大敦穴厥陰之井也其後議論當在此條下

麝香 水蛭 各一兩

右剉炒令烟出研為末酒調一錢當下畜血未止再服其效如神 梅師方打撲傷損瘀血在內不散

蒲黃

右末酒調服 產後惡血不下蒲黃水煎服 日月未足欲產蒲黃水調服

又三方

大黃 一兩 當歸 半錢 麝香 一字

生乾地黄 二錢

右剉水煎或醋 童子小便亦得



馬

醒患方 治胎落車馬筋骨疼痛不止

延胡索一兩

右細末豆淋酒下二錢已不計時

導滯散

治重物壓傷跌撲或從高墜下癸在口內吐血下血出不止或瘀血在內胞脹痛喘粗

當飯 剉微炒 大黃 剉炒各三錢

右細末淋酒調下二錢匕不拘時服

又方 治冬高墜下打撲損傷或損骨而不損

骨者有瘀血者

當飯 生地黃 剉炒各二兩

穿山甲 炮研 半兩

右麻未拌三錢好酒煎服水煎入酒亦得煎

成調穿山甲末一錢

又方

五香乳香二錢 沒藥 當飯各三錢 自然銅 醋淬半兩

白芍藥 青皮 各二錢 穿山甲 炮 木香 各一錢

右細末酒調服

又方



葛根子分 黄米半勺 烏菴去核二十

右細末蜜丸彈丸大嚼一丸温酒化開隨上  
下食前後服

正骨丹

川烏 草烏 南星 半夏

當飯 芍藥 木鱉 官桂

白芷已上各等分

右細末黄蠟銕開小油和勻煎菜末熬成膏

子免軟捏作餅子攤紙上貼損加品依常法

因濟

治腦骨破及骨折葱白爛研和蜜厚封換處

立効

一方葱白黄米粉同炒為末醋調糊裹暖封傷

損處

接骨丹

沒藥 乳香 當飯 川椒

自然銅碎 赤芍藥 骨碎補 敗龜板炙

虎骨 白芷已上等分 千金藤柳李仁是也亦等分

右細末化蠟半兩丸彈丸大每服一丸好酒

半升化開煎用東白柳枝攪散熱服



又方加 龍骨 川芎

此二味不加亦不妨若服茶人亡後骨節處  
加金色圍之此方係黃大人夫傳神驗

貞觀七年七月十三日 唐相王珪進尉遲恭經

驗傳到鍼入肉不出者用之神效下酉十二

日五口才二未人備細傳字出箭頭方五日

初四日尋下天仙子窠木屨微動其根用水

灌之回元至端午日早起不認前去着根損

一声日先無在此一木槩之出背上至家勿

令婦人視之放氣用石杵白之成劑凡如彈

撞

子大緋絹袋盛之掛梁間勿令婦人見如用

時置脐中以裹肚繫之一伏時自出如若其

皮不能出者捺開皮肉自出也箭出後不復

瘡愈着愈高墜下重物撞打箭鐵刀傷心腹

胸中停積鬱血不散以上中下三焦命之別

其部分以易老犀角地黄湯桃仁承氣湯抵

當尤之類下之亦有以小便酒同煎治之者

更有內加生地黄當飯煎者有大黃 者又法

虛人不禁下之者以四物湯加穿山甲煎服

妙亦有用花藥石散以童子小便煎或酒調



与

服之者此菜<sub>子</sub>前寒藥正分陰陽可不辨也  
若瘀血已去復元通氣散加當飯煎服亦可  
又一法筋骨損傷用伏經丸之類或用草烏  
頭末肉為丸服之以諸行經者以其內無疼  
血益故用之菜性寒熱濕涼不一惟智者擇  
之不可偏執也此當在前繆刺條下

瘡瘍疥癬例

神仙大乙膏

治虛疾八法癰疽一切惡瘡軟癰不問年月  
遠近已成膿未成膿貼之即效蛇蝎虎犬湯

先

水洗瘡拭乾用帛子攤藥貼用水下 血氣  
木通湯下 赤白帶下當飯酒下 咳嗽喉  
閉纏喉風綿裹噙化 一切風赤眼貼太陽  
穴後用山梔子湯下 打撲傷損貼菜仍用  
橘皮湯下 腰膝痛貼吃鹽湯下唾血桑白  
皮湯下 諸漏<sub>先</sub>以鹽湯 洗其瘡並量大  
小以紙攤藥貼之 已上藥每服一丸旋丸  
櫻桃大蛤粉為衣其藥可收十年不壞愈久  
愈烈神効不可言







桂 如豆大 木鱉子 當飯 杏仁 各一兩

右陳乳香沒藥黃丹外餘藥浸七日炭火上  
用鐵鍋熬分藥變色瀘去渣不用證滿入黃  
丹用柈枝五寸長如錢粗攪令黃色變褐攪  
錫在地又令柈枝攪令烟出尽然後入乳香  
沒藥在內柈枝攪勻候冷傾磁合內候藥硬  
切作塊乾以油紙包裹此藥春三月秋八月  
合餘月不可  
白龍膏 治一切惡瘡疔硬疼痛

沉香 防風 芍藥 白檀

木香 白茯苓 白芷 白附子

桔梗 白欬 當飯 白薇

白木 川芎 瓜蒌根 白木通

獨活 升麻 甘草 槐白皮

零凌根 黃耆 木鱉子

人參 生地黃 白芨 杏仁

桃仁 苦參 桑白皮

清油 皂粉

右剉碎油浸七日夜內銀器內慢火煎候白



芷黃色綿漚去渣清於磁器碗中慢火煨動  
次下黃蠟一十四兩攪勻次下尾粉再攪勻  
慢火熬成膏用時旋攤白絹上用

摩風膏

面瘡一切瘡疹腫毒王製並見御院方

黃耆半二兩 當飯 芍藥 白芷

杏仁 桃仁 白附子 白欬

零陵香 川芎 天麻 防風

獨活 木通 龍腦 清油一

黃蠟夏十二兩 冬九兩半 瓜蒌根一兩

仲景治婦人陰瘡蝕爛方

狼牙三箇咬咀水煎去粗入醋一小鐘以綿

漚湯瀝患處四五次愈

又方以雄黃末傳之

御菜大紅膏

珠子青一分 白膠香二兩

右二味銀銅鍋內銕同慢火不可火緊錦漚

過後子菜同熬 當飯二 木鱉子二錢 研

小油二 北三味固熬稍燒色漚去木且下

煎二味內攪勻下 乳香兩 沒藥三 同



研細再下前四味都用綿漚過銅內熬成不  
住手攪勻攤紙上貼之

追膿錠子

雄黃錢 巴豆半錢 輕粉一錢半

右為細末油和作餅子生麪亦得

替鍼膏

雄黃錢 巴豆錢 蛇皮錢 信霜錢

右用石臼研為膏

治大小癰瘡每頭方

皂角刺鍼不拘多少右燒存性研為末酒調

服即可見烙處薄頭也此茶內亦可加穿山

甲炮焦為末酒調之

治下疳先用張子和泄水丸泄去其根本後用

飛藥乾土

黃連兩 滑石兩 定粉錢 蜜陀僧錢

乳香錢 輕粉少許

右細末乾土或加乾胭脂或加末香檳榔

蝕惡瘡者非奇異惡瘡不可用

銅綠錢 硃砂厚 石膽礬 細研半錢

生肌茶



龍骨 虎骨 烏魚骨 白石脂

惡瘡入腹心逆茶食不下

豆粉錢 乾胭脂 定粉錢

右細末新水調下神效

生肌肉 滑石錢 沒藥錢

乳香錢 白芨錢 龍骨錢 凝水石錢

右細末洗淨瘡上茶貼

銀絲膏

乳香 水銀 錫 朱砂 膩粉

鹿射香 瀝青 小油

右各研為細末定磁器內油熬沸下乳香末  
次下水銀次下朱砂次下瀝青次下輕粉次  
下麝香熬成膏勺傾水下洗令白也沒十日  
磁器內盛之緋帛攤貼

五枝膏日

槐枝 榆枝 柎枝 柏枝

桑枝 陳皮錢 蒼朮錢

杏仁 巴豆 沒藥錢 當歸錢

木鱉 積殼 赤芍藥錢 人參錢



右吹咀好酒一升慢火煎令焦也瀝去粗下  
 瀝青半錢黃蠟五分黃丹四兩炒黑入前菜  
 同熬成膏膏入乳香二錢半輕粉一錢麝香  
 半錢攪令勻帛攤貼之

治惡瘡或有小虫

膽礬錢一 龍骨錢一 輕粉錢一 鹿骨錢二  
 白礬半錢 麝香錢一 乳香錢一 硃砂錢一  
 腦子錢一 土蜂蜜錢一 露蜂窩半錢 雄黃錢一  
 右細末刺破鹽水洗看紫慢上菜神効  
 外臺治惡寒齋似欲瘡皆或已生瘡腫癢疹起方

滑石 兩三

右暖水一升和消令冷取冷故香布搽三重  
 於赤處方圓濕布搦之然即煩易立差  
 治疥癩癬此方湯液取載摩風膏相似

栝朮 白膠 當歸 防風  
 杏仁 草麻 黃蠟 小油  
 鉛丹 若右槐栞投于摩風膏相  
 似此物要氣較

拓痛神應膏

乳香 錢一 沒藥 錢一 油 斤一 鉛丹 兩四  
 當歸 杏仁 木鱉 錢各三 槐枝



柎枝 各半

右熬成膏滴水不散放脂冷入乳没末

金線膏

珠子青 兩半 柎油 兩二 小油 兩一

右熬成膏

肉紅散

凝水石 燒

黃丹

右同研細末

追膿去死肉生肌

白丁香

茵茹

雄黃 計

消腫痛

大黃

黃栢

右細末過水調掃凉水亦可

又方

龍骨

寒水石 燒

右細末先敷遍微用銅綠末再敷肉自下而

不成腫

下瘡腫

白殭蚕

右細末洋調塗根自出



治瘡弩肉如蛇虫救寸俗呼翻花瘡是也硫  
黃研細薄傅之便縮

丁瘡壅死菊花葉一握搗汁一升下口即活如

不神冬菴葉用根

足跟瘡久不愈毒氣攻注

白末不以多少

右將監漿水溫洗乾貼二日一換可以負重

涉險

蝕惡瘡

前銅綠錢

硃砂字

石膽礬錢

右細末少上膏貼一法迴瘡加金頭蜈蚣一

條非久敗惡勿輕用之

換椰散

治癰疽瘡癤膿潰之後外觸風寒腫焮結硬

膿水清稀去而不絕肉湊空虛惡汁臭敗瘡

追乾及好肌不生及療疥癬惡瘡連滯不差

下疳腫瘡浸清不斂

黃連

木香

換椰

右各等分為細末貼某

金瘡痛甚者



凝水石

右生為末小油調傳若唇口肉內有傷者粉乾上之其痛立止一法內菜有金頭蜈蚣

治灸疽灸背已成瘡

寒水石入輕粉上出膿

治疔疽灸背不可忍

凝水石燒粉研細上之

治破傷血出不止

大竈底懸黑灰

鹿射香錢

右碾勻先令病人駭而使之氣怯速以此茶

上搽捻之立止不灸以至乾者

治大小諸瘡不可者兼治內外腫瘡久不愈先

以漿水溫洗拭乾上茶瘡乾小油調塗

恙活

獨活

白礬

各等分細末

治便癰外貼方

大黃

牡蛎

梔子

小黃米麩

白芥子

豬牙皂角

右等分細末小油調攤緋絹上貼之

治批心油湯火燒瘡疼不可忍

石膏搗末

細研粉貼瘡



治一切傷見血

寒水石細末貼瘡即愈不疼

外臺秘要治丁瘡

磁石搗為粉好醋和封其根立出差

小兒丹毒

黃芩細末水調服大人火丹毒亦然

婦人飲酒食魚兔兔風等物胙下二陰俱生瘡

男子同治並見馬齒笑青黛條下服菜八正

散等燒灰上瘡法亦在此中

治背瘡肉長疾及不及裏見風即成腫

寒水石燒細研

右微傳土再用銅綠細末微土之內即當下

皮乃及長而不作腫

蜘蛛咬遍身成瘡

青葱葉一莖小頭作一孔盛蚯蚓一條捏

兩頭不令透氣搖動化為水也點咬處差

聖惠方治馬咬毒入心

馬齒莧煎湯食之

又方治翻花瘤

馬齒莧一個燒灰細研豬脂調傳



又方治瘰癧結成核

馬齒莧燒灰臘豬脂調暖清泔洗瘡拭乾

傳之日三壯者玄明粉瀉之

王繩昌方治蝎螫毒不可忍

米粉

葱白

三根細切

右二味同炒焦研為細末以津唾蘸搽毒腫

痛之處

外臺秘要治五十年毒不愈塗熊膽取差神効

諸方不及此

千金方治百虫入耳

折菹汁灌入耳中立差亦治漆瘡

又方

雄雞冠血滴耳中立出即差

治蚰蜒入耳

酪灌耳中若入腹飲酪一升化為黃水馬

糞汁酪灌即差乾酪勝濕酪

治蝎蝎蛇毒

雞卵輕敲小孔合咬處即差

又蜈蚣蜘蛛毒

雞冠血傳之



治蛇咬

男子陰毛口含二十莖嚥其津毒不入暖

治下疳久不愈

橡斗子二個合成黃丹令滿相和以亂髮  
厚纏定燒烟尽為度同研為細末克以葱  
白鴉漿水洗瘡膿尽次上茶甚者不過三

次如神

劉禹錫治壯痔酒痔腸痔血痔氣痔食痔羊姪痔

五痔脫肛以

小蛇一杖指大者温用堀地坑燒之在板

穴蓋坑坐孔上虫盡為愈大効

醫首星元戎卷第十





御覽書卷第十

下麻久不食

攝子子三個各成黃丹今滿相如以乳黃

厚凝更隨烟之為度相

子無實本流唐藥天說

沈如神

劉名錫詩時痛病身時時

取時收水以

先盡於坐以此五更盡為余沈後院之在極





