

臨證指南醫案

卷三

暑溫熱 風寒風疽 痘瘍 呕吐 嘘噦
吐衄 不食 腸痺 便閉 肺痺 咳嗽 哮喘
胸痺 呃逆

於陰衰陽上結
於下關格

臨證指南醫案卷三

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田畊雲同較

(噎膈反胃)

吳

脈小濶。腕中隱痛。嘔惡吞酸。舌絳不紅。此高年陽氣結於上。陰液衰於下。為關格之漸。當開痞通陽議治。

一法

川連

人參

薑汁

半夏

枳實汁

竹懸

盧

陰陽逆亂已成關格。議用附子瀉心湯。為上熱下寒。主治。

徐七八老人食入涎湧。吐痰畧能啖粥。二便艱少。是陽不轉旋上結。陰枯於下。便難極難調治。勿用腥油羶味。脈弦大而搏。議妙香丸。又妙香丸仍服。每五日服大半夏湯。

毛

老年形消不食不便。氣衝湧涎乃關格之症。議用進退黃連湯。

川連

淡乾薑

半夏

薑汁

人參

茯苓

附子

生白芍

川連

枇杷葉

半夏

薑汁

杏仁

枳殼

川連

半夏

薑汁

杏仁

枳殼

川連

枇杷葉

半夏

薑汁

杏仁

枳殼

畢

夏問診。曾說難愈之疴。然此病乃積勞傷陽。年歲未老。精神已竭。古稱噎膈反胃。都因陰枯而陽結也。

某

脈寸口搏大。按之則濶。形瘦氣逆。上不通食。下不通便。老年積勞內傷。陽結不行。致脫陰枯。腑乏津營。

必二便交阻。病名關格。為難治。

人參 枳實 川連 生乾薑

川連

生乾薑

半夏

茯苓

肝陰
胃汁

蘇。四向來翻胃。原可撐持。秋季驟加驚憂。厥陽陡升。莫制。遂廢食不便。消渴不已。如心熱嘔吐涎沫。五味中喜食酸甘。肝陰胃汁枯槁殆盡。難任燥藥通關。胃屬陽土。宜涼宜潤。肝為剛臟。宜柔宜和。酸甘兩濟其陰。

烏梅肉

人參

鮮生地

阿膠

麥冬汁

生白芍

某
陽明汗乾成膈。

梨汁

柿霜

玉竹

天冬

麥冬

甜杏仁

川貝

生白芍

三角胡麻

王三老年血氣漸衰。必得數日大便通爽。然後腕中納食無阻。此胃汁漸枯。已少胃氣下行之旨。噎症萌矣。病乃操持太過。身中三陽。燔燥燒津所致。故餌藥未能全功。議用丹溪法。此潤膈之妙方若噎燥亦無效

麥冬汁

鮮生地汁

柏子仁汁

甜杏仁汁

黑芝麻汁

杜蘇子汁

松子仁漿

水浸布紙絞汁

濾清燉自然膏

馬六勞心勞力經營。向老自長。平日服餌桂附生薑三十年。病食噎不下膈吐出。此在上焦之氣不化。津液不

注於下。初病大便難滯。按經云。味過辛熱。肝腸有餘。肺津胃液皆奪。為上燥。做噎言清燥法。不治之症

麥冬

麻仁

鮮生地

甜水梨

桑葉

石膏

生甘草

某
脈濶左大。食入為噎。是屬液虧。先宜理氣。後用潤劑。

半夏

雲茯苓

枇杷葉

枳實

竹瀝

之症

程
舌黃微渴。痰多咳嗽。食下欲嘔。病在肺胃。高年姑以輕劑清降。

鮮枇杷葉

杏仁

鬱金

瓜萎皮

山梔

淡香豉

沈
格拒食物。涎沫逆氣。自左上升。此老年悒鬱所致。必使腑腸濁泄。僅可延年。議兩通陽明厥陰之法。

半夏

苦杏仁

茯苓

橘紅

竹瀝

薑汁

又
酒熱鬱傷。脫中食阻而痛。治以苦辛寒。

小川連

半夏

香豉

枳實

茯苓

薑汁

肺胃
鬱傷
氣逆

鮮枇杷葉

紫苑

蘇子

杏仁

鬱金

桃仁

某憂思鬱結。凝痰阻礙。已屬噎塞之象。當怡情善調。

炒半夏

錢半
茯苓

林米三

枳實一錢

薑汁三小匙

憂鬱
阻塞

楊四脈弦而小濶。食入脘痛格拒。必吐清涎。然後再納。視色蒼。眼筋紅黃。苔肥今瘦。云是鬱怒之傷。少火皆變。壯火氣滯痰聚。日擁清陽。莫展腕管。寒上臨不能食物。噎膈漸至矣。濁當苦以降之。辛以通之。佐以利痰清膈。莫以豆蔻沉香劫津可也。不治。

川黃連

杏仁

桔梗

土瓜蔓皮

半夏

橘紅

竹懸

薑汁

虛陽

朱三未老形衰。納穀最少。久有心下忽痛。畧進湯飲不安。近來常吐清水。是胃陽日薄。噎膈須防。議用太半夏湯。補肺為宜。

人參

半夏

茯苓

白香粳米

薑汁

河水煎

白五少食頗安。過飽食不肯下。間有冷膩涎沫湧吐而出。此有年胃陽久餒。最多噎膈反胃之慮。飲以熟酒。腕

中似乎快爽。顯然陽微欲結。所幸一便仍通。濁尚下泄。猶可望安。

熟半夏

薑水炒二兩

茯苓

生益智仁一兩

丁香皮五錢

新會皮一兩

淡乾薑一兩

右藥淨末分量用香

淡豆豉一兩

洗淨煎汁法丸淡薑湯服三錢

呂十六勞倦飢飽。皆傷胃陽。年及花甲。最慮噎膈翻胃。此麪飯酒肉重濁之物。與病不合。

半夏

薑汁

香豉

土瓜蔓皮

杏仁

橘紅

馮六有年陽微酒濕厚味。釀痰阻氣。遂令胃失下行。為順之旨。腕窄不能納物。二便如

不治

病在上中。議以苦降

辛通。佐以養胃。用大半夏湯。

不治

半夏

人參

茯苓

薑汁

川連

枳實

又胃屬腑陽。以通為補。見症腕中室塞。納食不易。過膈膚淺。見識以白豆蔻木香沈香麝。冀獲速功。不知老

人日衰。愈投泄氣斯冲和再無復振之理。故雲岐子九法。後賢立辨其非。夏季宜用外臺茯苓飲加葛蒲。

佐以竹懸薑汁。辛滑可矣。

顧十四脈濡緩無力。中年胸脇時痛。繼以早食晚吐。此屬反胃。乃胃中無陽。濁陰腐壅。議倣仲景陽明辛熱宣通。

之例。

吳萸

半夏

草撥

淡乾薑

茯苓

又辛熱開濁吐減。行走勞力即吐痰水食物。陽氣傷也。用吳萸理中湯。尤脈緩右關弦。知飢惡食。食入即吐。肢浮便溏。溺少不渴飲。此胃陽衰微。閉合之機口廢。老年噎膈反胃。乃大症也。不治 乾薑附子並用。此劫陰方也 三佳之陽皆通耳。若枳朴仍是泄氣。與前義悖矣。

人參

茯苓

淡附子

淡乾薑

淡附子

劉五脈左小弦。右濡濁。五旬又四。陰陽日衰。勞煩奔走。陽愈傷。致清氣欲結。食入脘痛。痰涎湧逆。皆噎膈反胃見症。其飲酒愈甚。由正氣先餒。非酒能致病。

川連

枳實汁

茯苓

半夏

廣皮白

黑山梔

薑汁

竹茹

澤瀉

竹瀉

竹瀉

包十六

胸脘痞悶

嗳逆三四日

必嘔吐粘膩或黃綠水液

此屬反胃

六旬有年

是亦重病

陸

脈沉微

陽氣大傷

陰濁僭踞

且食不能暮食

周身掣痛

背脹

病狀著難愈之症

人參

附子

乾薑

茯苓

澤瀉

薑汁和丸

姚二

脉搏元也

六腑陽不通降

濁壅為反胃

累遭病反

老年難以恢復

自能潛心安養

望其悠久而已

藥不能愈是病矣

某

積勞有年

陽氣漸衰

濁凝瘀阻

脘中常痛

怕成噎膈便塞之症

桃仁

紅花

延胡

川棟子

半夏

橘紅

鬱金汁

瓜萎皮

陽衰
脘痺

陽虛
濁陰

噎膈有此
方為宜

李兩關脈緩清。食人氣阻。吐涎稍通。前已吐過。瘀濁膠粘。此皆久積勞倦。陽氣不阻。旋運為噎膈脣脣之症。此病最多反覆。必須身心安逸。方可却病。徒藥無益耳。

反胃十全
八九噎膈
子死八九

半夏

薑汁

桃仁

韭白汁

香豉

瓜蒌皮

鬱金

胃痛得瘀血去而減。兩年宿病復起。食進痞悶。怕其清陽結而成膈。大意益氣佐通。仍兼血絡為治。

人參 半夏 茯苓 新會皮 木香 生益智 當歸 桃仁 水法丸服三錢

張三草食暮吐。大便不爽。病在中下。初因勞傷胃痛。痰瘀有形之阻。

半夏 枳實 製大黃 桃仁 韭白汁

桃仁 韭白汁

經云。三陽結謂之膈。又云。一陽發病。其傳為膈。仲景云。朝食暮吐。暮食朝。宿穀不化。名曰胃反。丹溪謂噎膈反胃。名雖不同。病出一體。多因氣血兩虛而成。然歷觀噎膈反胃之因。實有不同。大抵飲食之際。氣忽阻塞。飲食原可下咽。如有物梗塞之狀者。名曰噎。心下格拒。飢不能食。或食到喉間。不能下咽者。名曰膈。食下良久復出。或膈宿吐出者。名曰反胃。夫噎膈一症。多因喜怒悲憂。恐五志過極。或縱情耆忿。或恣意酒食。以致陽氣內結。陰血內枯而成。治宜調養心脾。以舒結氣。填精益血。以滋枯燥。夫反胃者。中無陽。不能容受食物。命門火衰。不能薰蒸脾土。以致飲食入胃。不能運化。而為朝食暮吐。暮食朝。宿穀不化。火之源以消陰翳。補土通陽以溫脾胃。故先生於噎膈反胃。各為立法以治之。其陽結於上。陰虧於下。而為噎膈者。用通陽開痞。通補胃腑。以及進退黃連附子瀉心諸法。上熱下寒為治。其肝陰胃汁枯槁。及煩勞陽亢。肺胃津液枯而成噎膈者。用酸甘濟陰。及潤燥清燥為主。其液虧氣滯。及陽衰血瘀而成噎膈者。用理氣逐瘀。兼通血絡為主。其胃陽虛而為噎膈反胃。及憂鬱痰阻而前者。用通補胃腑。辛熱開濁。以及苦降辛通。佐以利痰清膈為主。其肝鬱氣逆而為噎膈者。兩通厥陰陽明為治。其酒熱鬱傷肺胃。氣不降而為噎膈者。用輕劑清降。及苦辛寒開肺為主。而先生於噎膈反胃治法。可謂無遺謳矣。張景岳云。治噎膈大法。當以脾腎為主。其理甚通。當宗之。又有飲膈熱膈。及憂氣恚食寒之膈。其主治各載本門。茲不復

是證。每因血枯氣衰致此。凡香燥消滯之藥。久在禁內。案中雖有一二微用辛熱。而亦必諦審其為陽微

贊鄉治九

濁踞者。其餘或苦辛泄滯而兼潤養。或酸甘化液而直滋清。或鬱悶於氣分。而推揚穀氣。或勞傷於血分。而宣通瘀濁。總以調和機關。和潤血脈為主。陽氣結於上。陰氣衰於下。一語實為證之確切論也。姚亦陶

果係膈症。百無一生不必言治。若反胃則古人自有主方。不得泛用通治之品。此老尚未明也。

案中多用人參。其意以為不食胃虛。不可用參。以補其精氣。不知噎膈之症。必有瘀血頑痰。逆氣阻隔。其已成者。百無一治。其未成者。用消瘀去痰降氣之藥。或可望其通利。若用參。雖或一時精氣稍壯。而病根益深。是永無愈期矣。

(噫噯)

王二初用。辛通見效。多服不應。想雨濕泛潮。都是濁陰上加。致胃陽更困。做仲景胃中虛。客氣上逆。噫氣不除。

例。人參

旋覆花 代赭石 半夏 茯苓

乾薑

此正方也。但仲景以治呃逆。若噯則有別。

人參

薑汁

治呃逆。若噯則有別。

茯苓

某味淡。嘔惡噯。氣胃虛濁逆。

白旋覆花 釘頭代赭

半夏

半夏
炒

治呃逆。若噯則有別。

人參

汪十三壯年飲酒聚溼。脾陽受傷已久。積勞飢飽。亦令傷陽。遂食入反出。噫氣不爽。隔拒在乎中焦。總以溫通鎮逆為例。

白旋覆花

半夏

茯苓

半夏

治呃逆。若噯則有別。

人參

徐噫氣不爽。食後甚。

杏仁

半夏
細炒

橘紅

厚朴

鬱金

桔梗

陳十
勞氣虛寒。久病虛寒。多噎脣膈。不爽。胃陽弱。宜薄味。

生白朮

茯苓

新會皮

半夏
細炒

益智仁

厚朴

生薑

某嘔氣腹微痛。脾胃未和。

人參

焦白芍

茯苓

炙甘草

胃陽虛。脾虛。不和。胃

霍所傳。并最病也。如口人有之方。亦云嘔。非病也。嘔。即冷逆。俗名嘔。亦切。是病者。如逆。並爲是。如逆。則是。食。是食。而氣出。胃。口人有。

內經止有噫字。而無噯字。故經云。五氣所病。心為噫。又云。寒氣客於胃。破逆從下上散。復出於胃。故為噫。夫噫噯一症。或傷寒病後。及大病後。多有此症。蓋以汗吐下後。大邪雖改。胃氣弱而不和。三焦因以失職。故清無所歸而不升。濁無所納而不降。是以邪氣留連。噯酸作飽。胸膈不爽。而為心下痞鞕。噫氣不除。乃胃陽虛而為陰所格阻。陽足則充。周流動。不足則膠固。格阻矣。仲景立旋覆代赭湯。用人參甘草養正補虛。薑棗以和脾養胃。所以安定中州者至矣。更以旋覆花之力。旋轉於上。使陰中陽阻之陽升而上達。又用代赭石之重。鎮墜於下。使戀陽留滯之陰降而下達。然後參甘大棗。可施其補虛之功。而生薑半夏。可

王曰：早上水飲米粥至晚吐出不化。知濁陰酉戌升逆。瘕形痛而漸大。九藥吐出不化。胃陽之極矣。兩逆平肝理氣不效。法當辛熱開濁。不治之症

吳萸 熟附子 良薑 川棟子 狗苓 草果

某

肝風犯胃。嘔逆眩暈。苦降酸泄和陽。佐微辛以通胃。

川連

黃芩

烏梅

白芍

半夏

薑汁

李

厥吐

腹痛氣衝

安胃丸

王 胃虛少穀。肝火乘趕。嘔吐不能受納。蓋臟厥象也。

人參

川連

附子 黃芩

乾薑

枳實

張氏勉強攻胎。氣血受傷而為寒。經脈乏氣而為身痛。乃奇經衝任受病。而陽維脈不用事也。內經以陽維為病。苦寒。熱維者一身之剛維也。既非外感。羌蘇柴葛三陽豆發。世無是病。又苓施枳朴之屬。辛散繼以苦寒。未能中病。胃口屢傷。致湯飲皆噦出無餘。大便不通。已經半月。其吐出形色青綠涎沫。顯然肝風大動。將胃口翻空。而腸中污水得風。翔如浪濤。東西蕩漾矣。熄風鎮胃。固是定理。但危篤若此。明理以邀天眷耳。

淮小麥

百粒

大麻仁錢 阿膠二錢 生地二錢 秋石拌人參錢

南棗肉錢

一方不切病宜專治吐

陳氏未病先有耳鳴眩暈。恰值二氣之交。是冬藏根蒂未固。春升之氣泄越。無以制伏。更屬產後精氣未復。又自乳耗血。去液虧真。陰日損陽。氣不交於陰。變化內風上顛犯竅。衝逆肆橫。冒掀吐食。攻腸為瀉。襲走脈絡。肌肉皆腫。譬如諸門戶盡撤。遂致暴風飄漾之狀。醫者辛散苦降重墜。不但病未曾理。致陽更泄。陰愈涸煩則震動即厥。由二氣不能自主之義。閻王先生安胃一法。最為卓識。所參拙見。按以兩脈右手濶弱虛象。照然。左脈空大。按之不實。亦非肝氣肝火有餘。皆因氣味過辛散越。致一氣造偏。茲以病因大旨。兼以經義酌方。

人參

茯苓

半夏

白芍

煨薑

產後人之藥

炒粳米

周 痛從少腹上衝。為嘔。為脹。是厥陰臟濁致患。

濁厥陰

此症乃
血留中之
病。此老乃之
能如之。

韭白根

淡吳萸

小茴香

桂枝木

雨頭尖

菝葜

又炒橘核

火山甲木

韭白

歸尾

川棟子

延胡索

小茴香

徐六氣衝偏左厥逆欲嘔嘔盡方適伏飲在於肝絡辛以通之。

吳萸泡淡八分

半夏錢三

茯苓塊錢三

淡乾薑錢一

代赭石錢三

旋覆花錢二

某脈搏肢冷嘔逆下利白積生冷水寒鬱生陽氣上擾心大痛乃厥陰濁邪上攻

吳萸

丁香

薑香

川棟子

木香

廣皮

菝葜

褚二清涎上湧食物吐出乃飢飽傷及胃中之陽禁鮮葷冷滑經年可安。

半夏

厚朴

生益智

薑汁

生白朮

菝葜

宋三陽微不運水穀悍氣聚溼致食入即嘔周身牽掣不和乃陽明之脈不用事也久延恐致腫脹。

苓薑木桂湯加厚朴椒目

陸十食已即吐病在胃也用辛以通陽苦以清降。

半夏 川連 厚朴 茯苓 薑汁

曹七早食頗受晚食必胃痛嘔吐陽氣日微濁陰聚則有形夜痛至曉陰邪用事乃劇。

半夏薑十

淡乾薑

秦椒

厚朴

茯苓

王診脉右濡左弦舌白不飢瘀血上吐下瀉胃陽大傷藥餌下咽則湧前醫用大半夏湯不應詢如所吐皆係酸水痰沫議以理陽方法此飲症也人參 茯苓 川椒 乾薑

潘八十食後吐出水液及不化米粒一便自通並不渴飲五年不愈宜理胃陽用仲景法。

熟附子

半夏

薑汁

白梗米

又泄濁陰劫水飲以安胃陽服四日腹脹吐水已減知陽腑之陽非通不闢再宗仲景法。

范真武湯加人參
脉虛無神聞訥乾嘔汗出振寒此胃陽太虛不必因寒熱而攻邪

人參

茯苓

炒半夏

薑汁

烏梅

陳皮

又

脈微細小。胃陽太衰。以理中兼攝其下。

人參

淡熟附子

茯苓

炒粳白米

炒黃淡乾薑

金

參藥不受。

皆濁陰在上。

阻塞氣機

幾無法矣。

勉與白通湯

加人尿

猪膽汁

急進以通陽泄濁。

附子

生淡薑

葱白

五寸

人尿

猪膽汁

沈九

吹笛震動元海病。

治宜填實下焦。

但嗆食吐出。

又便溏不實。

中無砥柱。

陰藥下未受益。

中再受傷矣。

做補益中宮。

仍佐鎮逆一法。

人參

焦術

炒焦半夏

茯苓

旋覆花

代赭石

吳寒熱邪氣擾中。

胃陽大傷。

酸濁上湧吐出。

脘痛如刺。

無非陽衰。

陰濁上僭。

致胃氣不得下行。

高年下元衰

憊必得金底緩蒸。

中宮得以流通。

擬用仲景附子瀉心湯。

通陽之中原可泄熱開導。

前藥按法用之。

人參錢

熟附子錢

半

淡乾薑錢

三味另煎汁

川連分

炒半夏錢

半

枳實錢

人參

茯苓錢

後四味

用水一盞涼水一杯煎三十沸

和入前三味藥汁服

江

脈弦遲。

湯水不下膈。

嘔吐涎沫。

此陽結飲邪阻氣。

議以辛熱通陽反佐苦寒利膈。

用瀉心法。

人參

附子

乾薑

先煎一杯入薑汁四分

川連

黃芩

半夏

枳實

滾水煎和入前藥服

孫四十

食物隨人即吐並不渴飲當年以苦辛得效。

三載不發。

今心下常痛如辣。

大便六七日始通。

議通膈。

生薑瀉心湯。

生薑汁四分

川連六分

黃芩二錢泡

熟半夏三錢

枳實一錢

人參五分

同煎

又問或不吐食。

物腹中腰脅似乎氣墜。

自長夏起。

心痛頭重。

至今未減。

思夏熱必乘濕。

在裡水穀之濕與

來之熱相洽。

結聚飲邪矣。

當緩攻之。

議用控涎丹五分。

間日一用。

五診脉左弦右弱。

食粥脫中有聲。

氣衝湧吐。

比肝木乘胃。

生陽已薄。

皆情懷不適所致。

大半夏湯。

某中焦火衰食下不運。

作酸嘔出。

炒黃乾薑錢

川椒炒三

半夏少錢

茯苓魄三錢

炒飴糖四錢

黃氏靈樞經云。中氣不足。溲便為變。是崩漏也。皆脾胃欲敗之現症。今湯水下。嘔少。頭傾囊湧。非胃陽無有。失司納物乎。奈何業醫者。中懷疑惑。但圖疲藥待其自安。怕遭毀謗耳。此症一投柔藥。濁升填塞。必致脹滿。仲景與陽明滿實。致慎攻下者。恐以太陰之脹悞治耳。今舌微紅微渴。皆是津液不肯升揚。脾弱不主散精四布。世豈有面色如白紙。尚不以陽氣為首重也耶。

人參 熟於木 炙甘草

炮薑 炮薑 砂仁

茯神 南棗

張 嘔吐脹悶。虛中氣滯。人參

茯苓

砂仁

某氏脈微肢冷。嘔吐清水。食不下化。帶下。脊酸皮硬。陽氣素虛。產後奇脈不固。急扶其陽。用附子理中湯。

人參 生白朮

炮薑

炙草

附子

人參

生白朮

炮薑

炙草

又 煖胃陽以劫水濕。帶下自緩。照前方加葫蘆巴。

又 脈象稍和。已得理中之效。議用養營法。養榮去遠志黃芪五味。即作丸方。

蔡姬凡論病先論體質。形色脈象。以病乃外加於身也。夫肌肉微白屬氣虛。外以豐溢。裡真大怯。蓋陽虛之體。為多溼多痰。肌珠汗淋。唇舌俱白。乾嘔胸痞。煩渴引飲。由乎脾胃之陽傷觸。邪得僭踞於中。留於不解。正衰邪熾。試以脈之短濶無神論之。陽衰邪伏顯然。况寒涼不能攻熱。清邪便是傷及胃陽之藥。今杳不納穀。大便漸稀。若不急和胃氣。無成法可遵。所謂肥人之病。慮虛其陽。參擬一方。仍候明眼採擇。人參半夏

生於术

枳實

茯苓

生薑

吳三壯年形偉。脈小濡。惡聞穢氣。食入嘔噦。緣陽氣微弱。濁陰賴聚。口鼻受污濁。累氣先入募原。募原是胃絡分布。以上逆而為嘔吐。此病理標者。用芳香辟穢扶正氣治本。以溫上通陽。

藿香

草果

公丁香

茯苓

厚朴

砂仁殼

廣皮

草撥

又 人參

茯苓

生益智

葫蘆巴

煨木香

煨薑

廣皮

草撥

卦中寒
津熱
胃中寒
氣識濁受
陽虛

鮮竹茹錢半

半夏半錢

金石斛錢

茯苓半錢

廣皮白半

枳實錢

薑汁許

吳

雨

春

探吐脫

立止

氣固宣暢

胃津未

能無損

風木來乘

外冷裡熱

診脈右大

並不搏指

當少少進穀以

養胃多噫多下泄

氣調和中食為宜

炒竹茹

半夏

川斛

橘紅

黑山梔

香豉

曹四

少腹屬肝

肝厥必犯陽明

胃脈故作痛

區一年來

病人已不知因

何起病

醫徒見病圖治

想肝腎心自內

傷為病久則奇經

諸脈交傷

謂衝脈動而

諸脈交動也

議溫通藥潤劑

從下焦虛損主治

淡葛根半錢

人參

炒半夏

半夏

當歸二錢

杞子一錢

炒沙苑半錢

肉桂心五分

後加鹿角霜

內熱邪

上脈逆

虛衝

內結

暑穢

痰火

火熱

嘔吐

胸中格拒

喜煖飲怕涼

平昔胃陽最虛

熱邪內積體虛

邪實最防煙厥

某

舌亦濁嘔

不寐不飢

陽邪上擾

以苦辛

進瀉心湯

某

鬱熱阻飲

渾渾有聲

嘔吐之病

秋前舉發

已得小安

近痛嘔復來

身體煩熱宿病未罷

而暑熱熾氣上竅侵入

三焦混淆恐內閉變現症候

川連

淡黃芩

半夏

薑汁

黑山梔

枳實汁

某

舌黃不渴

飲久嗽

嘔吐前用全

瘞麥門冬湯

養胃小效

自述背寒

口吐清痰

暑濕客邪未盡

虛體當輔

正醒脾却暑○人參

茯苓

廣皮

杏仁

廣皮白

枳實

薑汁

內熱邪

上脈逆

虛衝

內結

暑穢

痰火

火熱

嘔吐

胸中格拒

喜煖飲怕涼

平昔胃陽最虛

熱邪內積體虛

邪實最防煙厥

郭八

知飢能納忽有氣衝

涎沫上湧

脫中格拒不堪容物

內經謂肝病吐

涎沫丹溪云上升之氣自肝而出木

火上凌桑

金受剋

咳嗆日加治以養金制木使土宮無狀賊之禍滋水制火令金臟得消化之權

此皆老年

積勞致傷草攻病可效

曹四五

勞倦嗔怒嘔吐身熱得汗熱解而氣急不寐不飢仍是氣分未清先以上焦主治以肺主一身氣化也

火上凌桑

金受剋

咳嗆日加治以養金制木使土宮無狀賊之禍滋水制火令金臟得消化之權

此皆老年

積勞致傷草攻病可效

蘇子

麥冬

枇杷葉

杏仁

北沙參

桑葉

丹皮

降香

竹懸

否仁

鬱金

山梔

香豉

橘紅

瓜蔞皮

嘔吐症。內經與金匱論之詳矣。乃後人但以胃火胃寒，痰食氣滯立論。不思胃司納食，主乎通降。其所以不降而上逆嘔吐者，皆由於肝氣衝逆，阻胃之降而然也。故靈樞經脈篇云：足厥陰肝所生病者，胸滿嘔逆。况五行之生剋，木動則必犯土。胃病治肝，不過隔一之治。此理淺近易明。人乃不能察，而好奇之輩，反誇隔二隔三之治，豈不見笑於大方也哉？試觀安胃丸、理中安丸、丸所用椒梅及胃虛客氣上逆之旋覆代赭，此皆胃藥乎？抑肝藥乎？於此可省悟矣。今觀先生之治法，以泄肝安胃為綱領，用藥以苦辛為主。以酸佐之，如肝犯胃而胃陽不衰有火者，泄肝則用芩連棟之苦寒，如胃陽衰者，稍減苦寒，用苦辛酸熱，此其大旨也。若肝陰胃汁皆虛，肝風擾胃嘔吐者，則以柔劑滋液養胃，熄風鎮逆。若胃陽虛濁陰上逆者，用辛熱通之，微佐苦降。若但中陽虛而肝木不甚亢者，專理胃陽，或稍佐椒梅。若因嘔傷寒，變化熱劫，灼胃津，則用溫膽湯加減。若久嘔延及肝腎，皆虛衝氣上逆者，用溫通柔潤之補下焦主治。若熱邪內結，則用瀉心法。若肝火衝逆，傷肺，則用養金制木滋水制火。總之治胃之法，全在溫通。虛則公用人參，藥味皆屬和平。至於治肝之法，藥味錯雜，或寒熱互用，或苦辛酸鹹並投，蓋因厥陰有相火內寄，治法不得不然耳。但觀仲景烏梅丸法，概可知矣。案輯六十有餘，大半皆由肝邪為患，非先生之卓識，安能暢發此理乎哉。

所錄諸方。屬蓄飲者四五屬反胃者一二三四皆有主治之法。蓄飲亦有成方可用。乃全不分列。惟以治肝胃之藥參錯成方。又用參及蓄附者七八皆與反胃蓄飲相反則嘔吐一症。此老全未嘗見也。審諸病者亦大不幸矣。

厥陰吐衄寒熱嘔嘯心胸拘拒舌黑渴不欲飲極重之症
烏梅肉錢桂枝木一錢炒黑川椒四分白芍一錢小川半錢

烏梅肉錢半
桂枝木錢一
炒黑川椒分四
白芍錢一
小川連三分
黃芩錢一
生淡乾姜錢一
脉右歇舌白渴飲。脫中痞熱多嘔逆。稠痰曾吐蛔蟲。此伏暑濕。皆傷氣分邪。自裏發。神厥昏冒。溼熱不達。

自利粘液議進瀉心法。半夏瀉心湯

又凡吐衄上出者皆屬厥陰乘犯陽明。內風入胃。嘔吐痰濁沫。如仲景厥陰篇中先厥後熱同例。試論寒熱後全無汗解。謂至陰伏邪既深。焉能隔越諸經以達陽分。閱醫藥方初用治肺胃。後用溫膽茯苓飲。但和胃治痰。與深伏厥陰之邪未達。前進瀉心湯苦可去濕。辛以通痞。仍在上中。服後胸中稍舒。逾時稍寐。醒區吐濁沫。有黃黑之形。大色帶青黑。係胃底腸中逆湧而出。老年衝脈既衰。所謂衝脈動則諸脈皆逆。眞迷嘔吐之時。周身牽引。直至足心。其陰陽錯雜。不得自固。斷然矣。仲景於半表半裡之邪。必用柴芩。今上下格拒。當以桂枝黃連湯為法。參以厥陰引經為通理之使。俾衝得緩。繼進通補陽明。此為治厥陰章旨也。

淡乾薑 桂枝 川椒 烏梅 川連 細辛 茯苓 此病宜用鎮安法
又 肝鬱不舒。理進苦辛。佐以酸味者。恐其過剛也。做食穀則嘔。例
人參 茯苓 半夏 川連 烏梅

又 瘿來得汗。陰分之邪已透陽經。第痰嘔雖未減。青綠形色亦不至。最屬可喜。舌心白苔未淨。舌邊漸紅而神倦困憊。清邪佐以輔正。一定成法。
人參 半夏 茯苓 枳實汁 乾薑 川連
又 食入欲嘔。心中溫溫液液。痰沫味鹹。脊背上下引痛。腎虛水液上泛為涎。督脈不司約束。議用真武散。其水寒之逆。二服後接服。
人參 半夏 桂枝 茯苓 媽薑 南棗

又 別後寒熱三次。較之前發減半。但身動言語氣衝。湧吸吐逆。四肢常冷。寒熱汗出時。四肢反熱。此陽衰胃虛。陰濁上乘。以致清氣無以轉舒。議以胃中虛客氣上逆為嘔氣嘔吐者。可與旋覆代赭湯。仍佐通陽以制飲逆。加白芍附子。

又 鎮逆方雖小效。究是強制之法。凡痰飲都是濁陰所化。陽氣不振。勢必再熾。仲景謂飲邪當以溫藥和之。前方劫胃水以醒陽。亦是此意。議用理中湯減甘草之守。仍加薑附以通陽。并入草菓以醒脾。

二服後接用。

人參

半夏

生白朮

附子

生白芍

乾薑

王

脈沈弦。腹痛。嘔吐。鼻燥舌絳。面帶青晦色。夏秋伏暑發熱。非冬月乃悞表禁食。胃氣受傷。致肝木上干胃土。蛔蟲上出。遂成重病。常有厥逆之慮。擬進泄肝和胃。得痛止嘔緩。冀有轉機。

川椒

川連

烏梅

乾薑

人參

茯苓

生白芍

川棟子

程

大病後。

胃氣極傷。肝木乘土。蛔欲透膈。腕脇陣痛。

是土衰木旺。古以狐惑蟲厥。都以胃虛少穀為訓。

安胃丸

人參川椒烏梅湯化迷一錢

周一兩脇痛。尤甚於左。嘔吐蛔蟲。年前好食生米。此飢飽加以怒勞。胃土不和。肝木來犯。試觀幼稚有食米麥泥炭者。皆裏滯久聚。初從溼熱鬱蒸而得。宜和陽宣腑。辛竅通絡。溼去熱走。脈絡自和。

川連

乾薑

桂枝

金鈴子

延胡

蘆薈

白芍

枳實

烏梅丸服三錢

李身不壯。熟二便頗通。已非風寒停滯之病。因驚動肝厥氣下泛。蛔蟲上攻觸痛。嘔吐清涎。仲景云。蛔厥

都從驚恐得之。

人參安蛔法。

又古人云。上井吐

木星下降。狐惑皆胃虛少穀。肝臟厥氣上干耳。既知胃中虛。客氣上衝逆犯。斯鎮逆安胃方。

是遵古治法。

人參

代赭石

炒當歸

炒白芍

烏梅肉

川椒

川棟子

炒川椒

生白芍

烏梅肉

川連

細辛

胃陰於熱

又忽然痛再發。診脈微細。恰值立夏之際。正氣不相接續。有復厥之慮。

人參

桂枝木

川棟子

炒川椒

生白芍

烏梅肉

川連

細辛

葉七熱氣上門。耳聾身熱。神識不清。當清心營肺衛。

又暑濕熱內蒸。吐蛔口渴。耳聾。

川連水炒

半夏錢

枳實錢

廣白皮錢

葛蒲半

杏仁三錢

竹葉心

飛滑石

連翹

川貝

石菖蒲根

生菜豆皮

又身熱三候不解。胸痞入暮譫語。耳聾吐蛔。此熱結厥陰症勢最險。

四分半

葛蒲半

杏仁三錢

川連

黃芩

枳實

半夏

薑汁

茯苓

葛蒲

吐蛔本屬肝胃症。因厥陰之邪上逆。蛔不能安。故從上而出也。今所輯方案皆因客邪病而致吐蛔者。雖有瀉心湯桂枝黃連湯安胃丸等。然皆不離乎仲景之烏梅丸法。以苦辛酸寒熱並用為治。當與嘔吐門同參。至於幼稚有吐蛔瀉蛔及諸蟲之病。治標則有殺蟲之方。治本則溫補脾胃。或佐清疳熱。前人各有成法。不必重贅。華玉堂

所列諸案大半皆嘔逆症。並非痃病。其治吐蛔之方亦惟烏梅丸一方加減。並無精思。博識隨症立法。其用人參雖本屬烏梅丸之意。而多不對症。知此老於此病未深諳也。

(不食)不食亦是症。諸病皆有不食之條。何得另立一門。潘生地。麥冬。知母。竹葉心。火麻仁。銀花。

胃陽

胃陰

王
張脈虛緩。不食不飢。形寒浮腫。
楊氏胃傷惡食。絡虛風動。浮腫先與荷米煎。
潘不飢不食。假寐驚跳。心營熱入。胃汁全虧。調攝十日可愈。此症當治驚跳與不食。

人參。生益智。廣皮。半夏麵。茯苓。生白芍。煨薑。
人參。新會皮。檀香泥。炒粳米。炒荷葉蒂。

浮腫者是用

熱搗胃汁。不飲食穀。

麥冬

蜜炒知母

地骨皮

川貝母

竹葉心

嘉定花粉

生甘草

甜梨皮

鮮省頭草

鮮蓮子

茯苓

大麥仁

川斛

炒知母

生甘草

甜梨皮

少麥冬

木瓜

烏梅肉

大麥仁

川斛

炒荷葉蒂

生甘草

甜梨皮

某風溼氣痺不肌

杏仁

滑石

土蔞皮

連翹

橘紅

鬱金

甜梨皮

上焦熱阻氣

翁二夏季溫熱上受。首先入肺。河間主三焦。極是今世醫者初用非發散。即消食散則耗氣。消則利胃。究竟熱

蘊未除。而胃汁與肺氣皆索。故不飢不食不便。上脘似格似阻。酸濁之氣皆是熱化病延多日。苦寒難以勝。

進先擬開提上焦氣分。

蘇子 杏仁

土瓜蔓皮

枇杷葉

黃芩 降香

有胃氣則生。無胃氣則死。此百病之大綱也。故諸病若能食者。勢雖重而尚可挽救。不能食者。勢雖輕而必致延劇。此理亦人所易曉也。然有當禁食。與不當禁食之兩途。如傷寒之邪傳入陽明之腑。胃有燥熱昏譖者。有乾霍亂之上下不通。或正值吐瀉之際。或癥瘕未達於表。或溫疫之邪客於募原。或瘧邪交戰之時。或初感六淫之邪。發於膀胱。邪氣充塞。滯滿區惡痞脹不飢。或傷食惡食等症。此雖禁其惡食可也。其餘一切諸症不食者。當責之胃陽虛。胃陰虛。或濕熱阻氣。或命門火衰。其他散見諸門者甚多。要知此症。淡飲淡粥。人皆惡之。或辛或鹹。人所喜也。或其人素好之物。亦可酌而投之。以醒胃氣。惟酸臍甜濁不可進。至於案中治法。一覽可盡。茲不重贅。華玉堂

張

食進。脘中難下。大便氣滯不爽。腸中收痛。此為腸痺。

大杏仁 枇杷葉

川芎

土瓜蔓皮

山梔

香豉

夏七食下腹脹。旬日得一更衣。腸胃胸腑以通為用。

丹溪每治腸痺。必開肺氣。謂表裏相應合法。

杏仁 紫苑

冬葵子

桑葉

土瓜蔓皮

又

腸痺

開肺不效。

此等外有作用。

用更衣丸二錢。

吳身重不能轉移。屍體板著。不得撫摩少安。大便不通。小溲短少。不飢少飲。此時序濕邪。蒸鬱化熱。阻於氣

分。經腑氣隧皆阻。病名濕痺。

既是溼痺。何又列此。

木防己一錢

杏仁二錢

川桂枝一錢

石膏三錢

桑葉一錢

丹皮一錢

桑葉一錢

又舌白不渴不饑。大便經旬不解。皮膚麻癢。腹中鳴動。皆風溼化熱。阻遏氣分。諸經脈絡皆閉。昔丹溪謂腸

痺。宜開胃氣以宣通。以氣通則溼熱自走。做此論治。

杏仁

瓜蔞皮

桔梗

枳殼汁

山梔

香豉

紫苑

沈五溼結在氣。二陽之痺。丹溪每治在肺。肺氣化則便自通。

(便閉) 此症與前腸痺不必另立一門。

葉十陽氣鬱勃腑失導。導納食中痞大便結燥。調理少進酒肉堅凝。以宣通腸胃中鬱熱可效。

川連

蘆薈桔梗葉

萊菔子

炒山楂

廣皮

川棟子

厚朴

廣白皮

青皮

又熱鬱氣阻三焦通法

杏仁

鬱金

厚朴

廣白皮

蘆薈

川棟子

厚朴薑汁

李九診脈如前。服鹹苦入陰。大便仍閉。清鹹刺一次。病無增減。可謂沉鉗之疾。夫病著深遠。平素飲酒厚味。濕聚。熱清筋燙骨。既已經年不拔。區區湯液。焉能通逐。議以大苦寒堅陰燥濕方法。參入酒醴引導。亦同氣

相求之至理。

黃柏

茅术

生大黃

乾地龍

金毛狗脊

川連

草薢

晚蠶沙

川山甲

漢防已

仙靈脾

海金沙

川獨活

北細辛

油松節

白芨根

黃酒燒酒各半

浸七日

吳姬脈右如昨。左略小動。肝風震動。裏氣大燥。更議鎮重苦滑以通火腑。逾六時便通瀉行。亦肝喜疎泄之一助。更衣丸一錢五分。

腫火
溫熱
小鴨
大瘡
不通

腫火
溫熱
小鴨

大瘡

不通

江脾宜升則健。胃宜降則和。蓋太陰之土。得陽始運。陽明陽土。得陰自安。以脾喜剛燥。胃喜柔潤。仲景急下存津。治在胃也。東垣大升陽氣。治在脾也。今能食不運。醫家悉指脾弱是病。但診脈較諸冬春。盛大兼弦。據經論病。獨大獨小。斯為病脉。脾臟屬陰。肺屬陽。脈見弦大。非臟陰見病之象。久病少餐。猶勉强支撑。兼以大便窒塞。泄氣不爽。坐談片刻。受氣頻頻。平素痔瘡。腸紅。未嘗安適。此脈症全。是胃氣不降。腸中不通。腑失傳導變化之司。古人云。久數不和。都屬胃病。六腑為病。以通為補。經年調攝。不越參木桂附。而毫乏應效。不必再進湯藥。議倣丹溪小溫中丸。服至七日。俾三陰三陽一週。再議治之義。

小溫中丸。一兩一錢。

必再進湯藥。

議倣丹溪小溫中丸。

服至七日。

俾三陰三陽一週。

再議治之義。

便閉
虛風
腎燥
熱

某足麻痺。大熱陰傷內鬱。大便不通。由懷抱不舒病加。先用滋腎丸四錢。鹽湯下四服。

某茂木守中。漸生滿脹。小便少。大便室。腸氣亦滯。病久延虛。補湯難進。議以每日開水送半硫丸一錢五分。

以通經脈之陽。

吳有年二氣自虛。長夏太氣發泄。肝風鳴張。見症類中。投劑以來。諸恙皆減。所嫌旬日。猶未更衣。仍是老人風秘閉。古人書以半硫丸為首方。今當採取用之。半硫丸一錢。開水送。三服。

陳心用苦藥。反十四日不大便。腸中陽氣空閉。氣結聚成形。非硝黃攻堅。半硫丸一錢一分。

又陽氣空閉。濁陰凝痞。成氏稱為陰結。口甜夜脹。清濁未分。每日用來復丹一錢五分。

甘五脈左微弱右弦。前議入夜反胃脘痛。是濁陰上攻。據說食粥不化。早食至晚吐出。仍是不變之火土不生。不可腐熟。溫藥一定至理。第氣攻膈中。究濁不能爽。必腸間屈曲隱處。無以旋轉機制。風動則鳴。議用半硫丸。

周一減食過半。糞堅若彈丸。脾胃病從勞傷治。

當歸

麻仁

柏子仁

肉蓯蓉

松子肉

桂酒拌白芍

麥冬

川斛

地黃

人參

茯神

川斛

桂酒拌白芍

麥冬

茯神

川斛

柏子霜錢 松子仁錢

天冬錢 麦冬錢

柏子霜錢

牛膝

生地錢

阿膠錢

天冬錢

麥冬錢

柏子霜錢

松子仁錢

丸

虎潛丸去鎖陽加鹹從容。猪脊筋丸。

柏子仁 郁李仁

牛膝

炒山楂

歸身

伏神

沙苑

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根
一
錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

通草

半

蘆根

一

錢

桔梗

錢

滑石

半

連翹

錢

腑與方書並腫欬症有問議河間法

飛滑石 石膏 寒水石

大杏仁

厚朴

猪苓

澤瀉

絲瓜葉

又 川連 淡黃芩 生白芍

枳實 六一散 廣皮白

生穀芽

陳暑熱不得解散壅腫脹閉宜通六腑已現壅盛非輕小症

苡仁

防已

茯苓皮

猪苓

通草

海金沙

又 經腑室熱不通治在氣分三焦之病何疑

滑石 石膏 寒水石

猪苓

澤瀉

蠶沙湯煎藥

又 定三焦分消

茅薦

杏仁

厚朴

大腹皮

猪苓

澤瀉

海金沙煎湯

腎不通二便俱閉小腸

陳火昨用五苓通膀胱見效治從氣分繼而亂治溲溺不通糞溏急當通陽

生乾薑

爆黑川附子

調人猪膽汁

海金沙

海金沙

海金沙煎湯

孔六膏梁形體壯盛壯年不覺醜積既久溼熱壅滯致小腸火腑失其變化傳導之司一便閉阻日盛右脇壅阻作痛當以苦寒通調必臻小效

蘆薈

川棟子 郁李仁 郁李仁

炒桃仁

當歸鬚

紅花

夜服小溫中丸一錢

高多鬱多怒諸氣皆脾腸胃不司流通攻濁有形乃肝膽厥逆之氣木必犯土嘔咳惡心致納食日減勉進

水穀

小腸屈曲不司變化為一便不爽所謂不足之中而兼有餘醫勿妄視

丹溪小溫中丸

每服一錢五分

丹溪小溫中丸

每服一錢五分

丹溪小溫中丸

丹溪小溫中丸

溼熱小腸

小腸

小腸

小腸

小腸

小腸

小腸

小腸

小腸

濕熱

小腸

小腸

小腸

小腸

小腸

小腸

小腸

小腸

不降肺氣

肺氣邪可宣通

葦莖湯去瓜瓣加滑食通草西瓜翠衣

許暑溼熱皆氣分先病肺先受傷氣少司降致一便癃閉此滋血之燥無效今雖小安宜生津清養胃陰

麥冬

知母

甜舌仁

白沙參

三角胡麻

王

濾清汁泛為丸。每日進食時服三錢。用紅棗五枚。生艾葉三分煎湯一杯服藥。遠行勞動。肝腎氣乏。不司約束。肛門痛墜。若是瘍症。初起必然寒熱排毒。藥味苦辛寒燥。下焦陰陽再傷。二便皆清。此為瘻閉。背寒煩渴。少腹滿脹。議通厥陰。

老韭根

穿山甲

兩頭尖

川棟子

歸鬚

小茴

橘紅

乳香

又

驅濁泄肝。僅僅泄氣。二便仍不得通。倣東垣治王善夫瘻閉意。滋腎丸三錢三服。

氣鬱腸中。二便交阻。清理腸胃壅熱。

川連

黃柏

川棟子

吳萸

黑山梔

青皮

通草五錢。海金沙五錢。煎湯代水。

又

大便閉塞。當約其製。

川連

黑山梔

丹皮

川棟子

吳萸

海金沙

飛滑石

按便閉症。當與腸痺。淋濁門兼參。其大便不通。有血液枯燥者。則用養血潤燥。若血燥風生。則用辛甘熄風或鹹苦入陰。故三才五仁通幽虎潛等法。所必用者也。若血液燥則氣亦滯。致氣血結痺。又當於養陰潤燥中。加行氣活血之品。若火腑秘結。宜苦滑重鎮者。用更衣丸以通之。若老人陽衰風閉。用半硫丸溫潤以通之。腑陽不行。則用玉壺丹。陽室陰凝。清濁混淆。脹用來復丹。若鬱熱阻氣。則用苦寒泄熱。辛以開鬱。或用三焦通法。若溼熱傷氣。阻遏經脈。則理肺氣以開降之。此治大便之閉也。小便閉者。若小腸火結。則用導赤濕連三焦。則用河間分消膀胱氣化失司。則用五苓。若濕鬱熱伏。致小腸痺鬱。用小溫丸。九清熱燥濕。若腎與膀胱陰分蓄熱致燥。無陰則陽無以化。故用滋腎丸。通下焦至陰之熱閉。以上諸法。前人雖皆論及。然經案中。逐一明晰。不啻如耳提面命。使人得有所遵循矣。至若膏梁麫藥。釀成漏人。瀆筋爛骨。用大苦寒。取陰燥濕。仍用酒醴引導。又厥陰熱閉為瘻。少腹脹滿。用穢濁氣味之品。直泄厥陰之閉。此皆發前人未發之秘。學者尤當究心焉。大凡小便閉而大便通調者。或係膀胱熱結。或水源不清。濕症居多。若大便閉而小便通調者。或二腸氣滯。或津液不流。燥症居多。若二便俱閉。當先通大便。小溲自利。此其大略也。至若胃腑邪熱化燥便堅。太陽熱邪傳入膀胱之腑癰秘。又當於仲景傷寒門下法中。

承氣五苓等方。酌而用之。斯無遺義矣。

華岫雲

大便燥結。本有承氣湯。更衣等丸下之外。用猪膽蜜煎潤之。可謂無遺蘊矣。然竟有效有不效者。蓋因燥糞未嘗不至肛門。奈肛門如錢大。燥糞如拳大。縱使竭力努掙而終不肯出。下既不得出。則上不能食。而告危矣。余友教人。先以膽汁或蜜煎導之。俟糞既至肛門。令病者親手以中指染油探入肛門內。將燥糞漸漸挖碎而出。中指須要有指甲者為妙。竟有大便一次燥糞挖作百餘塊而出者。據云此法輒轉授人。匡救四五十人矣。若患此症者。切勿嫌穢而棄之。

肺痺

某 肺氣痺阻而浮。肺痞寒熱。葦莖湯。某 肺痺卧則喘急。痛映兩脇。舌色白。一便少。葦莖湯。

曹二 清邪在上。必用輕清氣藥。如苦寒治平。下上結更附。某 經熱津消。欬痰。痺痛。牛蒡子 桔梗 生甘草 杏仁 射干 麻黃。兜鈴 桂枝 桑枝 木防已 生石膏 杏仁 茯苓。又渴飲欬甚。大便不爽。餘熱壅於氣分。紫苑 通草 石膏 花粉 木防已 茯苓 杏仁。偏冷偏熱。肺氣不和。則上焦不肅。用微苦辛以宣通。陸

薄荷梗

桑葉

象貞

杏仁

沙參

黑山梔

某女溫邪形寒。脘痺肺氣不通。治以苦辛。杏仁 瓜蔞皮 鐵金 山梔 蘇梗 香豉。治。曹氏肺痺右肢麻脹痛。咳逆喘急。不得卧。一便不利。脘中痞脹。得之憂愁。所以肺臟受病。宜開手太陰為活水蘆根。一 大杏仁。三連翹半錢。通草半錢。桑皮一錢。桔梗錢。

某二濕邪鬱肺。氣痺。咳嗽。寒熱。頭痛。開上焦為主。活水蘆根。一

杏仁 瓜蔞皮 鐵金 山梔 蘇梗 香豉

某計胸院中消瘦。痰氣。腹脹。開肺理氣為主。

某計胸院中消瘦。痰氣。腹脹。開肺理氣為主。

王

枇杷葉

厚朴 杏仁 滑石

茯苓皮 通草

白蔻仁 茵仁

脈搏勁。舌乾赤。噦氣不展。狀如呃。緣頸吐。胃傷諸經之氣上逆。填胸聚脣。出入幾逆。周行脈廩。肌肉著席而痛轉加。平昔辛香燥藥不受。先議治肺經。以肺主一身之氣化耳。

枇杷葉汁

杏仁

共煎湯。沖桔梗。枳實汁。

某天氣下降。則清明。地氣上升。則晦塞。上焦不行。下腕不通。周身氣機皆阻。肺榮頗投。謂肺主一身之氣化者也。氣舒則開。胃進食不必見病。治病印定眼目。

枇杷葉

杏仁

紫苑

苡仁

桔梗

通草

朱

風溫不解。邪結在肺。鼻竇肝焦。喘急腹滿。聲音不出。此屬上痺。急病之險篤者。急急開其閉塞。

葶苈大棗合葦莖湯。

又

風溫急是肺痺險症。未及周歲。臟腑柔嫩。故溫邪內陷易結。前用葦莖湯。兩通太陰氣血。頗驗。仍以輕藥入肺。晝夜堅抱勿令橫卧為要用。瀉白散法。

桑白皮

地骨皮

苡仁

冬瓜仁

蘆根汁

竹瀝

某

風溫化熱上鬱。肺氣咽喉阻塞。胸脫不通。致呻吟呼吸不爽。上下交阻逆而為厥。乃閉塞之症。病在上焦。幼科消食發散苦降。但表裏之治。上氣仍阻。久延慢驚。莫可救療。

蘆根

桑葉

滑石

梨皮

苡仁

通草

李

肺象空懸。氣竇齶音不出。舌乃心苗。熱灼則舌本不展。以唇口肺微之病。乃辛熱酒毒之痺。主以輕揚為

治。乃無質之病。

羚羊角

連翹心

竹葉心

野赤豆皮

川貝母

金銀花

又暮服威喜丸一錢

唐

脈小濶。失血嘔逆之後。脘中痞悶。納穀腹脹。小便短赤。大便七八日不通。此怒勞致氣分逆亂。從肺痺主

治。

鮮枇杷葉

土瓜蔓皮

黑施皮

鬱金

杏仁

杜蘇子

紫降香

鈎藤

主

氣逆耳喉

所列諸症

不過喘咳

又更衣丸

肺為呼吸之橐籥。位居最高。受臟腑上朝之清氣。稟清肅之體。性主乎降。又為嬌臟。不耐邪侵。凡六淫之氣。一有听著。即能致病。其性惡寒惡熱。惡燥惡溼。最畏火風邪。著則失其清肅降令。遂痽塞不通爽矣。分先生立法。因於風者。則用薄荷桑葉牛蒡之屬。兼寒則用麻黃杏仁之類。若溫熱之邪壅遏而痽者。則有羚羊射干。連翹山梔。兜鈴竹葉沙參象貝。因濕則用通草滑石桑皮苡仁威喜丸。因燥則梨皮蘆根桔梗紫苑。開氣則薑皮杏豉蘇子桔梗蔻仁。甚葦莖湯。葶苈大棗湯。一切藥品。總皆主乎輕浮。不用重濁氣味。是所謂微辛以開之。微苦以降之。適有合乎輕清嬌臟之治也。肺主百脈。為病最多。就其配合之臟腑而言。肺與大臟為表裏。又與膀胱為氣化。故二便之通閉。肺實有關係焉。其他如肺痿肺癰。哮喘咳嗽失音。各自分門。茲不復贅。華岫雲

浦中陽

浦

浦	中陽困頓。濁陰凝沕。胃痛微脅。午後為甚。即不嗜飲食。亦是陽傷。溫通陽氣。在所必施。
薤白	半夏
六錢	三錢
因勞。胸痺。陽傷。清氣不運。仲景每以辛滑微通冥陽。	茯苓
王	桂枝
胸前附骨板痛。甚至呼吸不通。必搘背稍緩。病來迅速。莫曉其因。議從仲景胸痺症。乃	桂枝五分
薤白	瓜萎皮
川桂枝尖	茯苓
半夏	生薑
高氣聚如瘕。由乎過勞傷陽。	加白酒一杯同煎
謝衝氣至腕則痛。散漫高氣聚如瘕。由乎過勞傷陽。	

謝

卷之三

桂枝

扶苓

卷之三

臨服

四

某五脉弦

憊痛欲

此清

氣

久延

喧格

薤白

杏仁皮

半夏

卷之三

厚

桂枝

洪武

1

王七氣逆自左升。胸脘阻。僅飲米湯形質不得下咽。此屬胸痺。宗仲景法。瓜萎薤白湯。

又脈沉如伏。痞脹格拒在脘膈上部。病人迷亂壅。自左覺熱。凡木鬱達之火鬱發之。患在上宜吐之。

巴豆霜

一分製分

川貝母

二分桔梗

為細末服。吐後服涼水即止之。

某六肺衛室痺。胸膈痺痛。咳嗆痰粘。苦辛開鬱為主。當戒腥羶。

瓜萎皮

炒桃仁

冬瓜子

苦桔梗

紫苑

川貝母

華陽

陽氣微弱。胸痺。

苓桂木甘湯

某十脈弦色鮮明。吞酸胸痺。大便不爽。此痰飲凝滯。清陽失曠。氣機不利。法當溫通陽氣為主。

薤白

杏仁

茯苓

半夏

厚朴

桔梗

橘紅

薑汁

某八氣阻胸痛。

鮮枇杷葉

半夏

杏仁

桔梗

橘紅

薑汁

某九脈沉短氣咳甚。嘔吐飲食。便溏瀉。乃寒濕鬱。胸痺如悶。無非清陽少旋。

小半夏湯加薑汁

王三始於胸痺。六七年來發。必嘔吐。甜水黃濁。七八日後漸安。自述病發秋月。意謂新涼天降。鬱折生陽。甘味

色黃。都因中焦脾胃主病。故內經專以勝甘論。

色黃。

都因中焦脾胃主病。故內經專以勝甘論。

半夏

淡乾薑

杏仁

茯苓

厚朴

草蔻

薑汁法丸

某胸

痛久入血絡。胸痺引痛。

炒桃仁

延胡

川棟子

木防己

川桂枝

青葱管

與胸痞不同。胸痞有暴寒鬱結於胸者。有火鬱於中者。有寒熱互鬱者。有氣實填胸而痞者。有氣衰而成虛痞者。亦有肺胃津液枯滯。因燥而痞者。亦有上焦濕濁瀦漫而痞者。若夫胸痺。則但因胸中陽虛不運。久而成痺。內經未曾詳言。惟金匱立方俱用辛滑溫通。所云寸口脈沉而遲。陽微陰弦。是知但有寒症。而無熱症矣。先生宗之加減而治。亦惟流連上焦清陽為主。莫與胸痞結胸噎膈痰食等症混治。斯得之矣。

華玉堂

此即俗名
心頭痛也。
病有數種。
偶然卒得者。
不外仲景
諸家各有所
治法。非一
前制所能
及。中俱必
愈。不能
及。見及
不一能。見及

寒濕
脾胃虛

血絡
痺痛

五氣逆自左升。胸脘阻。僅飲米湯形質不得下咽。此屬胸痺。宗仲景法。瓜萎薤白湯。

瓜萎薤白湯

寒

王

受寒。哮喘。痰阻氣不能著枕。

桂枝湯

一錢同

杏仁半錢

炙草四分

白芍一錢

製麻黃五分

卜九哮喘當暴涼而發。診脈左大右平。此新邪引動宿邪。議逐伏邪飲氣。

徐四宿哮廿年沉痼之病無奏效之藥。起病由於驚憂受寒。大凡憂必傷肺。寒入背俞。內合肺系。宿邪阻氣。

痰病發喘不得卧。譬之宵小潛伏里閈。若不行動犯竊難以強執。雖治當於病發。投以搜逐而病去必當養正。今中年涼無大害。精神日衰。病加劇矣。

此症全用桂枝湯。肾氣丸。桂膝。病發時葶苈大棗湯或草英丸。

陳四哮喘常不日失血後胸中略疼。

葦莖湯加葶苈大棗

三十六哮喘久咳。

桂枝木 杏仁 橘紅 厚朴 炒半夏 炒白芥子

馬二宿哮喘痰端煩發。

真武丸 朱五宿哮喘遇勞發。

小青龍去麻辛加糖炒石膏

鄭七宿哮喘肺病久則氣泄汗出脾胃陽微。

痰飲留著有食入泛嘔之狀。夏三月熱傷正氣宜常進四君子湯以

益氣不必攻逐痰飲。

人參 茯苓 白朮 火草

某十宿哮喘久咳。

桂枝木 杏仁 橘紅 厚朴 炒半夏 炒白芥子

馬二宿哮喘痰端煩發。

真武丸 朱五宿哮喘遇勞發。

小青龍去麻辛加糖炒石膏

鄭七宿哮喘肺病久則氣泄汗出脾胃陽微。

痰飲留著有食入泛嘔之狀。夏三月熱傷正氣宜常進四君子湯以

益氣不必攻逐痰飲。

人參 茯苓 白朮 火草

由外邪壅遏而致者。邪散則喘亦止。後不復發。此喘症之實者也。

若因根本有虧。腎虛氣逆。濁陰上衝而

喘者。此不過一二日之間。勢必危篤。用藥亦難奏功。

此喘症之屬虛者也。若天哮症亦由初感外邪失於

表散。邪伏於裏。留於肺俞。故煩發頻上。淹縗歲月。更有痰呼鹹孝醋哮過食生冷及幼稚天哮諸症案雖

未備。閔先生之治法。大概以溫通肺臟下攝腎真為主。久發中虛又心補益中氣。其卒散苦寒割破氣

之劑。在所不用。此可謂治病必求其本者矣。此症若得明理鍼灸之醫。按穴灸治尤易除根。噫然目難遇

其人耳。

華玉堂

根非火不降

水氣

肺鬱

伊

喘

先

寒

後熱

不飢

不食

繼浮腫

喘嗆

俛不能仰

仰卧不

安

古人以先

喘後

脹治肺

先脹

後喘治脾

今

田氣分

以上諸方能治一時
症有區別
斯病無別
治根也

不降

臍鬱以致水道阻塞大便溏瀉仍不爽利其肺氣不降二腸交阻水穀蒸腐之濁積趨脛絡腹由溌加豆亂醫可效粗述大略與高明論證。

肺位最高主氣為手太陰臟其臟體惡寒惡熱宣辛則通微苦則降若藥氣味重濁直入中下非宣肺法矣故手經與足經大異當世不分手足經混治者特表及之。

麻黃

苡仁

茯苓

杏仁

甘草

某氣逆咳嗆喘促小青龍去桂枝芍草加杏仁人參。

某氣逆咳嗆喘急淡乾薑

半夏人參

五味子

細辛

單瘡毒內攻所進水穀不化蒸變濕邪清於經隧之間不能由腸而下膀胱不利濁上壅逼肺氣不降喘滿不堪著枕三焦閉塞漸不可治議用中滿分消之法必得小便通利可以援救。

草庵

苦杏仁

桑皮

厚朴

通草

大腹皮

茯苓皮

澤瀉

汪脈弦堅動怒氣衝喘急不得卧息此肝升太過肺降失職兩足逆冷入暮為劇議用仲景越婢法

又按之左脇衝氣便喘背上一線寒冷直貫兩足明是肝逆挾支飲所致議用金匱旋覆花湯法

旋覆花青葱管

新降

炒半夏

姜勞煩喘喘是為氣虛益肺主氣為出氣之臟氣出太過但泄不收則散越多喘是喘症之屬虛故益肺氣藥皆甘補土母以生子若上氣散越已久耳目諸竅之阻皆清陽不司轉旋之機不必縷治

人參建中湯去薑

沈三晨起未食喘急多痰此竟夜不食胃中虛餒陽氣交升中無彈壓下焦陰傷已延及胃難以驟期霍然

黃精

三角胡麻

炙草

茯苓

猪苓

澤瀉

吳濁飲自夜上千填塞故陽不旋降衝逆不得安卧用仲景真武法

人參

淡熟附子

生淡乾薑

茯苓塊

猪苓

澤瀉

胃虛
腎陽
虛濁
飲上逆

肝升
飲邪
上逆

增補

卷三 端

十六 龍文書局校印

徐一色瘦脰疎陽虛體質。平昔喜進膏梁。上焦易壅。中宮少運。厚味凝聚蒸痰。頻年咳嗽。但內傷失和。薄味自之健脾理痰。多是守劑。不令宣通。獨小青龍湯。微飲以就太陽。初服喘緩。得宣通之意。夫太陽但開。所欠通補陽明一段工夫。不得其關。暫開復病矣。且喘病之因。在肺為實。在腎為虛。此病細診。色脈是上實下虛。以致耳聾鳴向。治下之法。壯水源以熄內風為主。而胸次清陽少旋濁火。阻氣妨食於卧時。繼以清肅上中二焦。小劑守常。調理百日。圖功至於接應世務。自宜節省。勿在藥理中也。

熟地沙仁

萸肉

龜甲心

阿膠

牛膝

茯苓

遠志

五味

磁石

秋石

蜜丸早服。卧時另服威喜丸。竹瀝薑汁泛丸。

張子幼年哮喘已愈。上年夏令勞倦。內傷致病。誤認外感。亂治其氣泄越。哮喘音亞。勞倦不復。遂致損怯。夫外感之喘。治肺內傷之喘。治腎。以腎主納氣耳。加減八味丸。每服一錢。五分鹽湯下。六服。

胡十六脈沉短氣以息。身動即喘。此下元已虛。腎氣不為收攝。痰飲隨地氣而升。有年陡然中厥最劇。

熟地

淡附子

茯苓

車前

遠志

補骨脂不成功

吳氣不歸元。喘急。踶脰冷汗。足寒面赤。中焦痞結。先議通陽。

熟附子

茯苓

生薑汁

生白芍

王十九陰虛喘。用鎮攝固納。

熟地

萸肉

阿膠

淡菜膠

山藥

茯神

湖蓮

芡實

翁四脈細尺垂。形瘦食少。身動即氣促喘。大凡氣出不爽。而喘為肺病。客感居多。今動則陽化。由乎陰弱失納。乃吸氣入而為喘。腎病何辭。治法惟以收攝固真。上病當實。下焦宗腎氣方法意。

熟地

萸肉

五味

補骨脂

胡桃肉

牛膝

茯苓

山藥

車前子

蜜丸

沈三陰虛陽升氣不攝納為喘。

熟地

萸肉

海參膠可笑

淡菜膠

茯神

山藥

芡實

湖蓮肉

紫明桃

楊一老年久嗽。身動即喘。晨起喉舌乾燥。夜則漫溺如淋。此腎液已枯。氣散失納。非病也。衰也。故治喘鮮效。便

身熱不宜
用參

今人有少
年成嗽等
症亦從脾
腎主治故
謂

難乾涸。宗腎惡寒以平潤之。

熟地 杞子 牛膝 巴戟肉 紫衣胡桃 青鹽

巴戟肉 紫衣胡桃 青鹽

紫衣胡桃 青鹽

青鹽 紅丹片

人參

火草 五味

紫衣胡桃 熟地

萸肉炭 茶神 炒山藥

又攝固頤應。

人參

附子

五味

菟黃丸

白朮

炒山藥

某

瘡痍於疾致氣喘咳出血痰。固是肺壅熱氣令飲食一便如常行動喘急與前喘更有分別緣高年下虛

腎少攝納元海不固氣逆上泛是腫脹之謂。宜未雨綢繆六味丸加牛膝車前胡桃

孫望八大牛因冬溫內侵遂至痰嗽暮甚。診脈大而動搏察色形枯汗泄吸音頗促似屬痰阻此乃元海根微不可藏納神衰藝語陽從汗出最有晉脫之變古人老年咳嗽喘症都從脾腎主治今溫邪擾攘中二焦留熱雖無溫之理然攝固下真以治根本所謂陽根於陰豈可不為講究難治

熟地炭

胡桃肉

牛膝炭

車前子

雲茯苓

青鉛

某

熱熾在心上下不接冲逆陞發偏身麻木喘促昏冒。腎真不固肝風妄動久病湯藥無功暫以玉真丸性

喘症之因在肺為實在腎為虛先生揭此一語為提綱其分別有四大凡實而寒者必挾凝痰宿飲上千阻氣如小青龍桂枝加朴杏之屬也實而熱者不外乎蘊伏之邪蒸痰化火有麻杏甘膏千金葦莖之治也虛者有精傷氣脫之分填精以濃厚之劑必兼鎮攝腎氣加沉香。都氣入青鉛從陰從陽之異也氣脫則根浮吸傷元海危亡可立而待思草木之無情剛柔所難濟則又有人參河車五味石英之屬急續元真挽回頃刻補天之治古所未有更有中氣虛緩土不生金則用人參建中案焦三十法九十九其層次輕重之間絲絲入扣學者亦深玩而得焉邵新甫

呃

此篇治下之法已備治上之法尚多遺漏不可不講也

某面冷頻呃總在咽中不爽此屬肺氣贖鬱當閉上焦之源蓋心胸背部須藉在上清陽舒展方能曠達耳

上濁陰虛

王

脈微弱。面亮戴陽。呃逆脇痛。自利。先曾寒熱下利。加以勞煩傷陽。高年宜反復。乃欲脫之象。三焦俱有見症。議從中治。

不治

人參

附子

丁香皮

柿蒂

炮附子

乾薑

難治

陳

食傷脾胃復病。嘔吐發呃。下利。診兩脈微濶。是陽氣欲盡。濁陰衝逆。閑方雖有薑附之理。陽反雜入。歸呆鈍牽制。後方代赭重墜。又混表藥總屬不解。今事危至急。合理陽驅陰無別法。

不治

人參

茯苓

生乾薑

丁香

柿蒂

炮附子

乾薑

吳萸

生乾薑

丁香皮

炮附子

乾薑

某

脈歇止。汗出呃逆。大便溏。此勞倦積傷。胃中虛冷。陰濁上干。

人參

茯苓

生淡乾薑

炒川椒

炒烏梅肉

丁香皮

炒半夏

淡乾薑

丁香皮

淡乾薑

丁香皮

淡乾薑

丁香皮

丁香皮

黃

脈小舌白。氣逆呃感。畏寒微戰。胃陽虛。肝木上犯。議用鎮肝安胃理陽。

人參

茯苓

生淡乾薑

炒川椒

炒烏梅肉

丁香皮

炒半夏

淡乾薑

丁香皮

淡乾薑

丁香皮

淡乾薑

丁香皮

丁香皮

又

舌白苔厚。胃陽未醒。厥逆濁陰上干。為呃。仍用通法。

人參

淡附子

丁香皮

淡乾薑

丁香皮

淡乾薑

丁香皮

淡乾薑

丁香皮

淡乾薑

丁香皮

淡乾薑

丁香皮

丁香皮

又

人參

炒川椒

附子

茯苓

淡乾薑

炒粳米

丁香皮

淡乾薑

丁香皮

淡乾薑

丁香皮

淡乾薑

丁香皮

丁香皮

丁香皮

又

呃逆一症。古無是名。其在內經。本謂之噦。因其呃呃連聲。故今人以呃逆名之。觀內經治噦之法。以草刺鼻嚏。嚏而已。無息而疾迎引之。立已。大驚之亦可已。然歷攷呃逆之症。其因不一。有胃中虛冷。陰凝陽滯而為呃者。當用仲景橘皮湯。生薑半夏湯。有胃虛虛陽上逆。病深聲嘶者。宜用仲景橘皮竹茹湯。有中焦脾胃虛寒。氣逆為呃者。宜理中湯。加丁香。或溫胃飲。加丁香。有下焦虛寒。陽氣竭而為呃者。正以元陽無力。易為抑遏。不能暢達。而然宜用景岳歸氣飲。或理陰煎。加丁香。有食滯而呃者。宜加減二陳。加山楂烏藥之屬。或大和中飲。加乾薑木香。凡此諸法。不過略述其端。其中有宜有不宜。各宜隨症施治。不可以此為不易之法。故先生謂肺氣鬱滯。及陽虛濁陰上逆。亦能為呃。每以開上焦之藥。及理陽驅陰。從中調治。

穀疽

為法可謂補前人之不逮。丹溪謂呃逆屬於肝腎之陰虛者，其氣必從腋下直衝上出於口。斷續作聲必由相火炎上挾其衝氣，乃能逆上為呃。用大補陰丸峻補真陰，承制相火。東垣嘗謂陰火上衝而吸氣不得入，胃脈反逆，陰中伏陽即為呃。用滋腎丸以瀉陰中伏熱，一法均為至當。審證參用高明裁酌可也。
仲景治呃逆以旋覆代赭石湯為主。方中獨不用此方而純用補熱之劑，碑
症屬虛寒，上逆者，因有此法，但不知何以俱屬寒逆，不識當時曾有悟用處否。

疽

沈九能食煩倦。手足汗出。目微黃。常鼻衄失熱則消穀。水穀留濕，甚生熱精微不主四布。故作煩倦。久則發黃穀疽。當與猪肚丸。蒼朮換白朮。重用苦參。

張三述初病似瘧。乃夏暑先伏。秋涼繼受。因不慎食物。胃脘氣滯生熱。內蒸變現黃疽。乃五疽中之穀疽也。溺煩便秘。當宣腑濕熱。但不宜下。恐犯太陰變脹。

綿茵陳

茯苓皮

白蔻仁

枳實皮

杏仁

桔梗

花粉

苡仁

酒疽

汪三飲酒發黃。自屬濕熱。脈虛濶。腹鳴不和。病後形體瘦減。起居行動皆不久耐。全是陽氣漸薄。兼之思慮勞煩致損。議兩和脾胃之方。

煩

致損

兩和脾胃之方。

戊己加當歸柴胡

不識

姜南棗

不識

不識

不識

不識

不識

不識

王右腸鬲突刺痛。身面發黃。不

不

便瘀熱。久聚恐結癰陽。

大豆黃卷

木防己

金銀花

生牡蠣

飛滑石

黃柏

枳實

苡仁

張脈沉濕熱在裏。鬱蒸發黃中痞惡心。便結溺赤。三焦病也。苦辛寒主之。

杏仁

石膏

半夏

薑汁

山梔

黃柏

枳實

苡仁

黃一身面目發黃。不飢渴。亦積毒少倦。再感溫熱之氣。誤以風寒發散。導濕甚生熱。所以致黃。

連翹

山梔

通草

赤小豆

花粉

香豉

煎送保和丸二錢

劉三心下痛。年餘屢發。痛緩能食。漸漸目黃溺赤。此絡脈中凝瘀。濕熱與水穀之氣交蒸所致。若攻之過急。必變脹滿。此溫燥須忌。議用河間金鈴子散合無擇穀芽枳實小柴胡湯法。

痘變
腫脹

蔣

金鈴子 延胡 枳實 柴胡 半夏 黃芩 黑山梔 穀芽
由黃疽變為腫脹。濕熱何疑。法亦不為謬。據些少小丸。諒非河間子和方法。溫下僅攻冷積。不能驅除。
濕熱。仍議苦辛滲利。每三日兼進濱川丸六七十粒。

痘後
鬱損

心脾

雞肫皮

海金沙

厚朴 大腹皮

豬苓

通草

痘後
鬱損

脾液

外越

楊十七夏熱泄氣。脾液外趨為黃。非濕熱之疽。繼而不欲食便溏。用大半夏湯。通胃開飲。已得寢食。露降痰。乃氣曳不收。肅令淺不必以少壯熱症治。順天之氣。是老年調理法。

疽變
濕熱

炙草

生扁豆

山藥

茯神

苡仁

黃疽。身目黃溺黃之謂也。病以濕得之。有陰有陽。在腑在臟。陽黃之作溼。從火化。瘀熱在裡。膽熱液泄。與胃之濁氣共併。上不得越。下不得泄。薰蒸逼鬱。侵於肺。則身目俱黃。熱流膀胱。溺色為之變赤。黃如橘子色。陽主明。治在胃。陰黃之作溼。從寒水。脾陽不能化熱。膽液為濕所阻。清於脾。浸淫肌肉。溢於皮膚。色如董黃。陰主晦。治在脾。傷寒發黃。金匱黃疽立名雖異。治法多同。有辨證三十五條。出治一十二方。先審黃之必發不發。在於小便之利與不利。疽之易治難治。在於口之渴與不渴。再察厥熱入胃之因。或因外併。或因內發。或因食穀。或因酣酒。或因勞色。有隨經蓄血。入水黃汗。上盛者一身盡熱。下鬱者小便為難。又有表虛裏虛。熱除作寒。火劫致黃。知病有不一之因。故治有不素之法。於是脈弦脹痛。少陽未罷。仍主以和渴飲水漿。陽明化燥急當瀉熱。濕在上以辛散。以風勝。濕在下以苦泄。以淡參。如狂蓄血。勢所必攻。汗後漏白。自宜投補。酒客多鬱熱。先用清中。加之分利。後必顧其脾胃。女勞有穢濁。始以解毒。繼之滑利。終當峻補腎陰。表虛者實衛。裏虛者建中。入水火劫。以及治逆變症。各立方論。以為後學津梁。若不識。

在裏之治陽明篇中。惟見一則不出文論。指人以寒濕中本益脾。本潤而喜風。火者。黃一證外。不因於六淫。內不傷於嗜欲。惟寒惟濕。譬以脾監之土。須暴風日之陽。純陽之病。療以辛熱無疑矣。方雖不出法已顯然。故不用多。恐滋人惑耳。今考諸家之說。丹溪云。不必分五阻。總是如盦將酉相似。以為得治黃之阨要。殊不知是言也。以之混治陽黃。雖不中寢。不致增劇。以之治陰黃。下咽則斃。何異操刃一言之易。遺悞後人。惟謙甫羅氏。具有卓識。力辨陰陽。遵傷寒寒濕之指出。因陳四逆湯之治。繼往開來。活人有術。醫雖小道。功亦茂焉。喻嘉言陰黃一證。竟謂仲景方論亡失。恍若無所循從。不意其註傷寒。註金匱。辨論數千言。而獨於關鍵處明文。反為之蒙昧。雖云智者一失。亦未免會心之不遠也。總之羅氏可稱勤矣。古訓朱氏失於小成。自狃嘉言。喻氏病在好發議論而已。今觀葉氏黃疽之案。寥寥數則。而於案中所云夏秋疽病。溼熱氣蒸而成其陽黃之治了然於胸。中案中又有治黃也。而有非黃之論。揣其是病。必求虛實。於是知其是病。必辨陰陽。如遇陰黃。求治於先生者。決不以治陽之法治陰。而殃人長命也。苟非師仲景。而貌丹溪博贍群賢之論。而不陷於一偏之說者。烏能及此。名不浮於實。道之得以久行也。固宜。蔣式玉

某七風傷衛寒熱頭痛脫悶。

蘇梗錢一

淡豆豉錢一

杏仁三錢

桔梗錢一
不可升提

厚朴錢半

連翹半錢

通草錢一

滑石三錢

淡豆豉錢半

蘇梗錢一

杏仁三錢

桔梗錢半

連翹半錢

通草錢一

滑石三錢

某二風邪外襲肺衛。是風發熱咳嗽脫悶。當用兩和表裏。

江五勞倦過月。氣弱加外感。

頭痛惡風。營衛二氣皆怯。則閃爍筋掣而痛。大凡先治表。後治裏。世間未有先

投黃連清裏。後用桂枝和表。此非醫藥。

當歸建中湯。

沈虛人得感微寒熱。

參歸桂枝湯加廣皮。

湯。

體虛

風傷營衛誤治

所列諸案
即俗所謂
傷風輕症
也

寒邪

經云風為百病之長。蓋六氣之中惟風能兼五氣。如兼寒則風寒。兼暑則曰風溼。兼燥曰風燥。兼火曰風火。蓋因風能鼓盪此五氣而傷人。故曰百病之長也。其餘五氣則不能互相全兼。如寒不能兼暑與火。暑亦不兼寒。溼不兼燥。燥不兼溼。火不兼寒。由此觀之病之因乎風而起者目多也。然風能兼寒。寒不兼風。何以辨之。如隆冬嚴寒之時。即密至重障之中。人若裸體而卧。必犯傷寒之病。此本無風氣侵人。乃但傷於寒而不兼風者也。風能兼寒者。因風中木有寒氣。蓋運性本寒。即巽卦之初爻屬陰是也。因風能流動鼓盪其用屬陽。是合乎巽之一爻、二爻皆陽爻也。如炎歎溽暑之時。若使數人揜一人。其人必致汗孔閉。頭痛惡寒。骨節疼等。傷寒之病作矣。斯時天地間固毫無一些寒氣。實因所煽之風。風中卻有寒氣。故令人受之寒疾頓作。此乃因傷風而兼傷寒者也。故有但傷寒而不傷風之症。亦有因傷風而致兼傷寒之症。又有但傷風而不傷寒之症。有因傷風而或兼風溫。風濕。風燥。風火等症。更有暑溼燥火四氣各自致傷。而絕不兼風之症。故柯韻伯所註傷寒。云傷風之重者。即屬傷寒。亦有無汗脈緊。骨節疼諸症。此柯氏之書。所以能獨開仲景生面也。至仲景所註傷寒書。本以寒為主。因風能兼寒。故以風陪說。互相發明耳。學者看書不可不知此理。若夫臟腑一切內外諸風。各有現症。具載內經。尤當詳攷。

華岫雲

(寒)

某二客邪外侵頭脹。當用辛散。蘇梗 杏仁 桔梗 當用桂枝 桑皮 橘紅 連翹
某寒熱頭痛。脘悶。淡豆豉 嫩蘇梗 杏仁 桔梗 厚朴 枳殼
某五復受寒邪。背寒頭痛。鼻塞。桂枝湯加杏仁
某十時邪外襲。衛渾發熱。頭痛。先散表邪。淡豆豉 蘇梗 杏仁 厚朴 木防已 淡芩皮
楊四太陽脈行。由背抵腰外來。風寒先傷陽經。雲霧自下。及上經氣逆而病。發致嘔吐。頭痛。小便數行。病解膀胱氣通。斯逆者轉順矣。當通太陽之理。用五苓散。倘外感病發再議。

某人勞傷陽氣。形寒身熱。頭痛。脘悶。身疼。

杏仁錢

川桂枝八

生薑
錢

厚朴錢

廣皮錢

茯苓皮
錢

洗頭俗名傷寒之症，人經絡之病也。何公牽引傷寒，大症發諸議論及細間此編竟無治傷寒一門，即此數方為傷寒，禁失笑夫。醫者之學問全在明傷寒之理，則萬病皆通。故仲景之書，只有二種傷寒論治傷寒之法也。而金匱之方，又半從傷寒論中來，則傷寒乃病中之第一症，而學醫者之門功，第一也。今此獨闢此編，平日

傷寒症。仲景立法於前。諸賢釋註於後。先生雖天資穎敏。若擬其治法。恐亦不能出仲景範圍。其所以異於庸醫者。在于能辨症耳。不以冬溫春溫風溫濕溫熱溫伏暑內傷勞倦溫疫等症。誤認為傷寒。其治溫熱暑濕諸症。專辨邪之在衛在營。或傷氣分。或傷血分。更專究三焦。故能述前人溫邪忌汗。濕家忌汗。當用手經之方。不必用足經之藥等明訓。垂示後人。此乃先生獨擅見長之處也。若夫傷寒之書。自成無己註解以後。凡註疏者。不啻數百家。其尤著者。如嘉言二書。景岳書。傷寒三註。四註等篇。近有柯韻伯來蘇集。傷寒論翼。方翼王晉三古方選註中所解一百十二方。諸家析疑辨義。處雖稍有異同。然皆或登仲景之堂。或造仲景之室者。業醫者當日置案頭。潛心參究。庶乎臨症可無誤矣。華岫雲

所習何疾耶此者數十年醫道宣無大行。此局數千百人之過乃編之。此老之人之書竟錄此方以了。

風溫

忽諸華玉堂

僧二近日風溫上受。寸口脈獨大。肺受熱灼。聲出不揚。先與辛涼清上。當薄味調養。日風溫傷肺。

某陰虛風溫氣從左升。

生黃芪

少陽

火

風溫

牛蒡子 薄荷 象貝母 杏仁 冬桑葉 大沙參 南花粉 黑山梔皮

某風溫從上而入。風屬陽溫化熱。上焦進肺。肺氣不得舒轉。周行氣阻。致身痛腕悶。不飢宜微苦以清降。微

生石膏末

少陽

火

風溫

楊脈左實大頭目如蒙。清竅不爽。此風溫仍在上焦。擬升降法。乾荷葉 薄荷 象貝 連翹 鈎藤

杏仁 薄荷 象貝母 杏仁 冬桑葉 大沙參 南花粉 黑山梔皮

某風溫入肺。肺氣不通。熱漸內鬱。如舌苔頭脹咳嗽發疹。心中懊憆。脘中痞滿。猶是氣不舒展。邪欲結壅宿

有痰飲不欲飲水。議梔皮合涼膈方法。

山梔皮

杏仁 豆豉 黃芩 瓜萎皮 枳實汁

郭風溫入肺。氣不肯降。形寒內熱。胸痞。背臍鬱之象。辛涼佐以微苦手太陰主治。

黑山梔

火

風溫

杏仁 香豉 麻金 山梔 瓜萎皮 蜜炒橘紅

秦六體質血虛。風溫上受。滋清不應。氣分燥也。議清其上。

石膏

火

風溫

生甘草 薄荷 桑葉 杏仁 連翹 又照前方去連翹薄荷加陳皮鬱金梔皮

某風火上鬱。耳後結核。目眶痛。薄荷 牛蒡子 前胡 象貝 連翹 黑山梔皮

某風溫熱伏。更劫其陰。日輕夜重。煩擾不寧。生地 阿膠 麥冬 白芍 火草 茯苓

火

風溫

馬三風溫熱灼之後。津液未復。陽明脈絡不旺。骨酸背楚。治以和補。

生黃芪 鮮生地 阿膠 麥冬 白芍 火草 茯苓

少陽

火

風溫

北沙參 玉竹 麥冬 歸身 番丸

桂枝湯加花粉杏仁

火

風溫

火

風為天之陽。溫乃化熱之邪。兩陽薰蒸。先傷上焦。種種變幻情狀。不外乎三陰為病。數頭脹汗出。則咳嗽必然。並見當與辛涼輕劑清解為先。大忌辛溫消散。劫爍清津。太陰無肅化之權。救逆則有滌汁蘆根玉竹。門冬之類也。苦寒沉降。損傷胃口。陽明頓失循序之司。救逆則有復脈建中之類。大凡此症。驟變則為瘧厥。緩變則為虛勞。則主治之方。總以甘藥為要。或兼寒。或兼溫。在人通變可也。邵新甫

入肺邪

(溫熱)

某十二脈數暮。熱頭痛。腰疼口燥。此屬溫邪。

連翹 淡豆豉 淡黃芩 黑山梔 杏仁 桔梗

阿膠 天冬 花粉

某溫邪化熱。肺痺喘急。消渴胸滿。便溺不爽。肺與大腸見症。

淡黃芩 知母 鮮生地 阿膠

桔梗 香豉 橘紅 枳殼

薄荷 連翹 荸苓

冬瓜子 沔仁

謝積勞傷陽衛。鍊溫邪上受。內入乎肺。肺主周身之氣。氣室不化。外寒似戰栗。其溫邪內鬱。必從熱化。令氣短胸滿。病邪在上。大便瀉出稀水。肺與大腸表裏相應。亦由熱迫下泄耳。用辛涼輕劑為穩。

杏仁

桔梗

香豉

橘紅

枳殼

薄荷

連翹

茯苓

龜

襁褓吸入溫邪。釀為肺脹危症。

蘆根

桃仁 沢仁

冬瓜子

施久患虛損。原寢食安舒。自服陰柔藥補。不但減食不寐。脫巾常悶渴。欲飲涼。此口鼻及入溫邪。先干於肺。

誤補則邪愈熾。氣機阻塞。弱質不敢開泄。援引清揚肅上。兼以威喜丸。淡以和氣。上佳得行。可進養胃法。

白沙參 沢仁 天花粉 桑葉 鬱金 兼服威喜丸

王溫邪發熱。津傷口糜氣穢。

知母 嘉定花粉 知母 麥冬

金石斛 連翹 宜再加氣分藥

某春溫身熱。六日不解。邪陷劫津。舌絳骨節痛。以甘寒熄邪。

竹葉心 知母 花粉 滑石 生甘草

梨皮

丁口鼻吸入熱穢。肺先受邪。氣壅不主宣通。其邪熱由中及於募原。散布營衛。遂為寒熱。既為邪踞。自然瘧

胃熱傷

進日無人能知者

劫津邪

(溫熱)

進日無人能知者

悶不飢。雖邪輕未為深害。留連不已。熱蒸形消。所謂病傷漸至於損而後已。

桂枝白虎湯

又氣分之熱稍平。日久胃津消乏。不飢不欲納食。大忌香燥破氣之藥。以景岳王文前多進可效。忌食辛辣肥膩自安。

竹葉石膏湯加鮮枸杞根皮

楊伏邪發熱。煩渴知飢無寐。乃胃津受傷所致。擬進行葉石膏湯加花粉。

葉熱傷氣分用甘寒方。白虎湯加竹葉

某右脈未和。熱多口渴。若再劫胃汁。怕有脫瘻不飢之事。當清熱生津。仍佐理痰。俟邪減便可再商。

麥冬

人參

石膏

知母

粳米

竹葉

半夏

葉心仲景云。陰氣先傷。陽氣獨發。不寒。不熱。令人消瘦。肌肉條例下不註方。但曰。以飲食消息之。後賢謂甘寒生津。解煩熱。是矣。今脈數舌紫渴。氣分熱邪未去。漸次轉入血分。斯甘寒清氣熱中必佐存陰。為法中之

法。

宣毒加桂枝或他風寒二味

生地石膏

生甘草

知母

粳米

竹葉心

白芍

毛十六溫邪熱入營。手太陰肺經。心熱。頭脣。肋痛。平素痰火與邪膠結。致米飲下咽皆脹。老年五液已涸。忌汗忌下。

生地

杏仁

柏子仁

知母

炒川貝

橘紅

連翹

馬少陰伏邪。津液不勝。喉燥舌黑。不喜飲水。法當清解血中伏氣。莫使液涸。

犀角

生地

丹皮

竹葉

元參

連翹

陳姫熱入膾中。夜煩無寐。心悸怔。舌絳而乾。不嗜湯飲。乃營中之熱。治在手經。

犀角

鮮生地

黑元參

連翹

石菖蒲

炒遠志

又鮮生地

元參

天冬

麥冬

麥冬

又陽升風動。治以鹹寒。

生地

阿膠

天冬

人參

川斛

茯神

金箔

張營絡熱心震動。復脈湯去薑桂。參加白芍。

陸六高年執病八九日。古燥煩渴。澹語。邪入心胞絡。中深怕液涸神昏。當滋清去邪。兼進牛黃丸。驅熱利穀。

胡

金銀花

鮮生地

連翹心

元參

犀角

石菖蒲

脈數舌赤耳聾胸悶素有痰火近日冬溫引動復病加以勞復小溲不利議治胞絡之熱

鮮生地五錢竹葉心一錢

丹參錢半

元參錢半

石菖蒲根六分

陳膽星分

顧

溫邪誤表劫津邪入胞絡內閉

香議用局方至寶丹

至寶丹

施溫邪如瘧陰氣先傷苦辛再傷陽及胃內風肆橫肢掣瘓疾邪閉心胞絡中痰潮神昏乃熱氣蒸灼無形無質此消疲清食清火竟走腸胃與病情隔靴搔癢速速與至寶丹三分冷開水調服若得神清再商治法顧飲酒又能納穀是內風主乎消燥當春盡夏初陽氣弛張遂至偏中於右診脈左弦且堅肌腠隱約斑點面色光亮而少舌苔灰黃其中必夾伏溫邪所怕內閉神昏治法以清絡宣竅勿以攻風劫痰扶助溫邪平定廓清真其帶病久延而已

犀角

生地

元參

連翹心

鬱金

小青葉

竹葉心

石菖蒲

又目瞑舌縮神昏如醉邪入心胞絡中心神為蒙謂之內閉前案已經論及溫邪鬱蒸乃無形質而醫藥都是形質氣味正如隔靴搔癢近代喻嘉言議謂芳香逐機宣竅頗為合理絕症難挽天機用意聊盡人工

至寶丹四丸勻四服涼開水調化包老年下虛春溫上受痰潮昏譫舌絳黃苔面赤微痙先清上焦

天竺黃

金銀花

竹葉心

連翹

竹憑

張溫邪自裡而發喉腫口渴舌心火帶上焦熱最怕寢開閉合瘡苦寒直降攻其腸胃與溫邪上鬱無涉連翹黑施皮牛蒡子杏仁花粉馬勃瓜蒌皮夏枯草金汁銀花露

張週歲內未得穀味精華。溫邪吸入上焦。先受頭面頤領腫浮。邪與氣口混處。刀針破傷經絡。溫邪內附。壅蔓延三焦。昏昧痰潮。舌利卷縮。小溲點滴渾濁。熱氣結涸在裏。但膏腎苓梔之屬。藥性直降。竟由胃連腸。而熱氣如烟如霧。原非形質可蕩可掃。故牛黃產自牛腹。原從氣血而成。混虛氣血之邪。藉此破其鑑結。是得效之因由也。夫溫熱時癧。上行氣分而漸及於血分。非如傷寒足六經順傳經絡者。大抵氣烏張。必薰塞經絡內竅。故昏躁皆裡竅之欲閉。欲宣內門。須得芳香氣血久鬱。必致傷毒內攻。謹陳大意。參用紫雪丹三分。微溫開水調服。

褚溫邪中自口鼻始而入肺為咳嗽。喘繼傳膻中則倉血。乃心營肺衛受邪。然邪在上焦。壅遏阻氣。必聚為熱。痰臭嗆渴。是欲內閉。惜不以河間三焦立法。或謂傷寒主六經。或謂肺癰或泄氣血致熱。無出路。胸突腹大。危期至速矣。即有對病藥餌。氣湧沸騰。勢必湧吐無餘。馬望有濟夫溫熱穢濁。填塞內竅。神識昏迷。脹悶欲絕者。須以芳香宣竅。佐牛黃金銀深入臟絡。以收錮閉之邪。今危篤若此。百中圖一而已。紫雪丹。

陳溫邪逆傳膻中。熱痰敗阻空竅。所進寒涼消導。徒攻腸胃。毫無一效。痰乃熱薰津液所化。膻中乃空靈之所。是用藥之最難。至寶丹芳香通其神明之竅。以驅熱痰之結極。是但擇年受溫邪。最易虧陰津耗。必兼滋清以理。久伏溫邪為正。

犀角

鮮生地

元參

連翹心

丹皮

石菖蒲

化服至寶丹

某溼為漸熱之氣。迷霧鬲閉。神機不發。三焦皆被邪侵。豈是小恙。視其舌伸縮如強痰涎粘著。內閉之象已

見。宣通膻中。望其火熱。無暇清至陰之熱。

至寶丹四分

石菖蒲金銀花湯送下

王人夜熱早涼。熱退無汗。其熱從陰而來。故能實形瘦。脈數左盛。兩月不解。治在血分。

生蠶甲

青蒿

細生地

元參

丹皮

淡竹葉

許溫邪已入血分。舌赤音低。神呆潮熱。即發斑疹。亦是血中熱邪。悞汗消食。必兼養厥。

犀角

細生地

丹皮

紫雪丹

丹皮

鬱金

石菖蒲

舌絳裂紋。面色枯槁。全無津澤。形貌畏冷心中熱焚。邪深竟入厥陰。正氣已經虛極。勉擬仲景復脈湯。合乎邪少虛多治法。復脈去人參生薑加甘庶汁代水煎。

又熱病悞投表散消導。正氣受傷。神昏舌強勢如燎原。前進復脈法略有轉機。宜遵前方去桂加參。以扶正氣為主。復脈湯去桂加人參甘庶汁代水煎藥。

又進甘藥頓安。奈陰液已涸。舌強音縮撫之乾板。較諸已前齟肉映血有間。小便欲解掣痛。猶是陰氣欲絕。欲昧昏沉。午間煩躁。熱深入陰之徵。未能穩訐。愈期也。

生白芍

炙甘草

阿膠

雞子黃

人參

生地

麥冬

炒麻仁

某

悞下熱陷於裏而成結胸。所以身不大熱。但短氣胸滿煩躁。此皆邪熱內燔擾亂神明。內閉之象。棘手重

恙。倣仲景瀉心法備參未議。再候明眼定裁。

川連

黃芩

半夏

炮淡乾薑

生薑

枳實

吳

神氣如迷。不飢不食。乃苦辛消導發散。劫奪胃津所致。蓋濕邪手經為病。今世多以足六經主治。故致此。

細生地

竹葉心

麥冬

元參心

連翹心

鬱金

王姬

溫熱十二日。舌黃。心中悶痛。初病手經。不當用足經方。老人怕其液涸。甘寒醒胃。卻熱。

鮮生地

竹葉心

麥冬

鬱金

川斛

菖蒲根

傷寒

冬溫

吳

近日天未寒冷。病虛氣不收藏。所感之邪。謂冬溫。參苓益氣薄荷桔梗杏仁泄氣。已屬背謬。加補骨脂溫濁腎臟。尤不通之極。自述夜寐深更。繁縝有汗。年陰不充。陽易泄。論體質可邵病。

桑葉

大沙參

玉竹

苡仁

生甘草

糯米湯煎藥

陳半

冬溫入肺。膠痰化熱。因未納穀之身。不可重藥消痰。

炒麥冬

桑葉

大沙參

甜杏仁

地骨皮

氣血

傷

某脈數右大。煩渴舌絳溫邪。氣血兩傷。與王女煎。

生地

竹葉

石膏

知母

丹皮

甘草

陰虛
邪感溫

陳三陰虛邪。甘寒清上。

白沙參

甜杏仁

玉竹

冬桑葉

南花粉

生甘草

燥陰液

勞倦感溫

黃體虛溫邪內伏。

頭汗淋漓心腹空塞。

上熱下冷舌白煩渴。

春陽升舉為病猶是冬令少藏所致色脈參視

極當謹慎。

阿膠生地

麥冬炒生地

炒丹皮

青甘葛根煎

張五勞倦內傷溫邪外受兩月不愈心中溫溫液津液無以上供夜卧喉乾燥與復脈湯去薑桂參三服後

可加參。

汪勞倦更感溫邪陽升頭痛寒熱戰慄冷汗邪雖外達陽氣亦泄致神倦欲眠舌赤黃胎口不知味當以育

除熱為主辛散苦降非宜復脈湯去參薑桂麻加青甘葛漿。

曹脈促數舌白不飢寒熱汗出初起腹痛脣右有形乃久傷勞倦復感溫邪今病兩旬又六微咳有痰並不

渴飲寒來微微齒痙此營衛二氣大衰恐延虛脫議固衛陽養工熱得平。

黃芪桂枝白芍炙甘草

牡蠣生白芍

茯苓

生牡蠣

生白芍

廣皮白

枳實

半夏

黑山梔

陳氏腹滿已久非是暴症近日面頸腫脹牙關緊閉先有寒熱隨現是家診脈右搏數左小乃溫邪觸自口鼻

上焦先受氣血與熱膠固致清敷不利候有壅塞之變理當先治新邪况頭面咽喉結邪必辛涼輕劑以宣

通若藥味重濁徒攻腸胃矣做東垣普濟消毒意

連翹牛蒡子馬勃射干滑石夏枯草金銀花露金汁

脾虛

陰虛

病退

胃不和

熱結上焦

勞倦感溫

胃虛

衛虛

兼虛

勞倦感溫

細詳諸家
都是氣邪
悞治人臟腑
之壞症居多
時邪熱之症

陰熱邪
氣傷

人立法全以育陰祛熱。但今見症陰分固有伏邪。真陽亦不肯收納。擬倣劉河間濁藥輕投。不為上焦熱阻。下焦根蒂自立。冀其煩躁熱蒸漸緩。

熟地炭

茯苓

淡竹茹

遠志炭

川石斛

五味子

飲子煎法

晚診陰中伏邪。晡時而升。目赤羞明。舌絳而渴。與育陰清邪法。

生地炭

元參心

川石斛

炒麥冬

犀角

石菖蒲

加茯神黃柏金箔

晚進周少川牛黃清心丸一服。

又脈左數右軟。舌乾苔白。小溲淋澀。吸氣喘促。煩汗。腎陰不承。心神熱灼蒙門。議以三才湯滋水制熱。三才

質太衰。舌邊色淡。下利稀水。夫故陰是要言。讀仲景少陰下利篇。上下文征闊闊。欲撤必以堵塞。陽明為治。

以陽明司閽。有閑無閭。下利之陰。仍從走泄矣。議用桃花湯。

人參

赤石脂

炮薑

白粳米

又晚服照方加茯苓

又脈左沉數右小數。暮熱微汗。時煩。辰刻神清。虛邪仍留。陰分議用清補。

人參

茯苓

川石斛

炙甘草

黑糟豆皮

糯稻根鬚

又金匱麥門冬湯

程仁溫熱病。已傷少陰之陰。少壯陰未易復者。恰當夏令發泄。百益酒釀造布灰。辛熱劫陰泄氣。致形體頗然

藥難見效。每日餌雞距子生用。其湯飲用馬料豆湯。

冬傷於寒。春必病溫者。重在冬不藏精也。蓋煩勞多慾之人。陰精久耗。入春則裏氣大泄。木火內燃。強陽

無制。燔燎之勢。直從裏發。始見必壯熱煩冤口乾舌燥之候矣。故主治以存津液為第一。黃芩湯堅陰邵

邪。即此義也。再者在內之溫邪。或發在外之斯邪。又如葱豉湯最為捷徑。表分可以肅清。至於因循貽悞。豈止一端。或因氣燥津枯。或致陰傷液涸。先生用挽救諸法。如人參白虎湯。黃連阿膠湯。玉女煎。復脈法。

此非治暑

暑傷
氣分
門禁

申明條例甚詳。餘則治煙厥以甘藥緩肝。晉閉用幽芳開竅。熟痰之溫膽。蓄血而論通瘀。井井有條。瀆

周到。邵新甫

(暑)

某大亢暑與熱。天為暑在地為熱。地中之氣吸受致病。亦必傷人氣。分氣結則上焦不行。下脘不通。不飢不欲食。不大便。皆氣分有阻。如天地不交。遂若否卦之義。然無形無質。所以清之攻之不效。

杏仁

通草

象貝

桔梗皮

白蔻

鬱金汁

妣余走氣亂。復飲燒酒。酒氣辛熱。有升無降。肺氣鬱。上下不通。舌白消渴。氣結自胸及腹。澼澼自利。不爽。周身膚腠皆痛。汗大出不解。無非暑濕熱氣。始由肺受。漫布三焦。群醫消導苦藥。但攻腸胃。在上痞結仍然。議淡滲佐以微辛。合乎軒岐上病治上之方。

西瓜翠衣

川白通草

大豆黃卷

馬兜鈴

射干

苡仁

杏仁

石膏

炒半夏

黑山梔

厚朴

竹茹

又

痰多咳嗽。是暑鬱在上。

醫家亂投沉降。所以無效。

石膏

杏仁

鬱金

滑石

香豉

黑山梔

王

舌白煩渴。心中脹悶。

熱邪內迫。氣分阻閉。當治肺經。倘逆傳膻中。必致昏厥。

杏仁

鬱金

滑石

黃芩

半夏

橘紅

桔梗皮

陳五

暑濕傷氣。肺先受病。

諸氣皆痺。當午後陽升煩喘。更加夫無形氣病。醫以重藥推消。多見不效。

西瓜翠衣

活水蘆根

杏仁

桔梗皮

桔梗皮

桔梗皮

桔梗皮

桔梗皮

又

酒客中虛。重鎮攻消。

清氣愈傷。夫暑邪皆善氣分。苟肺司清肅。則其暑不攻自罷。議仍以鄭清為法。若面

露

天下降火。敵自湯掃無餘。

威臺丸二錢十服。

某一身熱頭暈。脫悶咳嗽。此暑邪外襲於肺衛。當清上焦。

綠瓜葉

連翹

飛滑石

野蠣金汁

大杏仁

川貝母

陳

脈左動右濡。頭痛脫悶。麻痺欲死。舌白。此暑邪內中蒙閉清空。成瘡之象。平昔陰虛勿犯中下二焦。

嫩竹葉

連翹

飛滑石

野蠣金汁

大杏仁

川貝母

龔

四脈寸大頭暈。脫中食不多。下暑熱氣從上受。治以苦辛寒方。

竹葉

杏仁

鬱金

滑石

香豉

山梔

張

七三瘡之邪在陰。未經向愈。春季洞利不食。想春雨外濕。水穀內聚亦濕。即濕多成五泄之謂。瘡瘍僅世腫

隧濕邪。而裏之濕邪未驅。長夏吸受暑邪。上蒙清空諸竅。咳嗽耳聾的係新邪。非得與宿病同日而語。

連翹

飛滑石

嫩竹葉

荷葉邊汁

桑葉

杏仁

象貝

黑山梔

程六暑風火挾濕。濕火傷於氣分。斷瘡瘍發。即濕邪內發之徵。濕伏熱蘊致氣壅塞咽底脫中。及至進穀無礙。二便均調中下無病顯然。

白通草

西瓜翠衣

活水蘆根

苡仁

龔

十六暑火挾濕。二者皆傷氣分。從鼻吸而受。必先犯肺。乃上焦病。治法以辛涼微苦。氣分上焦廓清則愈。惜乎

專以陶嘗六經看病。仍是與風寒先表後裏之藥。致邪之在上漫延。結綱四十餘日不解。非初受一經。不須再辨其證。經云病自上受者。治其上援引經義以論治病。非邪僻也。宗河間法。

杏仁

括蔞皮

半夏

薑汁

白蔻仁

石膏

知母

竹懸

秋露水煎

又

脈神頤安。昨午發疹。先有寒戰。蓋此病起於濕熱。當此無汗。肌腠氣密。至膚閉皮脫如皴。猶未能全泄其邪。風疹再發。乃濕因戰慄為解。一月以來病魔而肌無膏澤。瘦削枯槁。古謂瘦人之病。慮涸其陰。陰液不充。

疾熱不至復聚。從來三時熱病。怕反復於病後之覆。當此九仞。幸如意留神為上。

元參心

細生地

銀花

知母

生甘草

川貝

丹皮

橘紅

鹽水

竹懸

此前藥方口用二劑可停。未大便時。用地冬汁膏。大便後。可用三子湯。

池

伏暑至深秋而發。頭痛煩渴少寐。

薄荷

淡竹葉

杏仁

連翹

黃芩

石膏

赤芍

木通

張病幾一月。猶然耳聾。神識不慧。數甚痰粘。呼吸喉間有音。此非傷寒暴感。皆夏秋間暑濕熱氣內鬱。新涼引動內伏之邪。當以輕劑清解三焦。奈何醫者不曉。伏氣為病。但以發散消食寒涼清火為事。致胃津消亡。真陰盡灼。舌邊赤齒板燥裂血。邪留營中。有內閉癥瘕厥逆之變。况右脈小數。左脈濶弱。熱固在裏。當此陰傷日久。下之再犯亡陰之戒。從來頭面。皆是清竅。既為邪蒙精華氣血不肯流行。諸竅失司。聰明矣。此輕清解斷然也。議清上焦氣血之壅為先。不投重劑苦寒。正倣古人肥人之病。慮虛其陽耳。

連翹心

元參

犀角

鬱金

橘紅

蜜水

黑梔皮

川貝

鮮葛蒲根

加竹懸

又昨進清上焦法。諸症雖然略減。而神識猶未清爽。總由病久陰液內耗。陽津外傷。聰明智慧之氣俱被濁氣蒙蔽。所以子後午前稍清。他時皆不清明。以陽盛時人身應之也。擬進局方至寶丹。藉其芳香。足以護陽逐邪。庶無內閉外脫之虞。至寶丹每服二人燈心嫩竹葉湯送。

又脈右緩大。左弱。面垢色已減。痰嗽不爽。良由胃中津液為辛散溫燥所傷。心營肺衛。悉受熱燔蒸迫。致神呆喘急。耳聾。清陽阻滯。九竅不利。首方宣解氣血。繼方芳香通竅。無形令其轉旋。三焦自有專司。豈與俗醫但曉邪滯攻擊而已。今已獲效。當與清養胃陰肺氣。體素豐厚。陽弱不耐。沉寒然深。秋冬交天氣降。則上焦先受。試觀霜露下垂草木皆色。人在氣交。法乎天地。兼參體質施治。

枇杷葉

炒黃川貝

橘紅

鬱金

茯苓

苡仁

桑肺

暑風熱氣入肺

土熱痰喘

石膏

連翹

竹葉

杏仁

桑皮

苡仁

橘紅

生甘草

又 肺壅過氣身熱喘嗽少 草莖合草梗大棗湯

某二暑風外襲肺衛氣阻頭脹咳嗽畏風微熱防作肺癰

絲瓜葉

大杏仁

香薷

桔梗

連翹

六一散

某舌灰黃頭痛咳嗽。左肢掣痛此煩勞陽動暑風乘虛襲入最應風動中厥。

鮮荷葉錢

鮮蓮子錢

淡神半錢

益元散三錢

川貝母半錢

橘紅一錢

楊女暑熱穢濁阻塞肺部氣痺腹滿宜以輕可去實。

西瓜翠衣

白通草

活水蘆根

生苡仁

臨好加入石膏末二錢

周二暑風熱神呆

鮮荷葉

苦丁茶

滑石

木通

杏仁厚朴廣皮白蔻仁

郁六暑熱頭暈咳嗽

鮮荷葉

杏仁

射干

橘紅

桑皮桔梗木通

滑石

胡不飢不食不便比屬胃病乃暑熱傷氣所致味變酸澀熱痰聚脫苦辛自能泄降非無據也半夏瀉心湯去甘草乾薑加杏仁枳實

王身熱自汗腹痛大小便不利脈虛右大左小暑熱內閉擬和表裏法

薄荷

枳實

黃芩

生白芍

竹葉心

黑山梔

通草

甘草

程四穢熱由清竅入直犯募原初頭痛肌脹今不飢渴悶以苦辛寒法

杏仁

半夏

厚朴

橘紅

竹葉

黃芩

滑石

又脈虛舌赤消渴伏暑熱氣過衛入營治在手厥陰

竹葉

犀角

生地

麥冬

元參

某六舌黃脣悶頭脹口渴欲短此吸受穢氣所致

飛滑石

白蔻仁

杏仁

厚朴

通草

廣白皮

某三穢暑吸入內結募原脫悶腹痛便泄不爽法宜芳香逐穢以疏中焦為主

藿香梗 杏仁 厚朴 茯苓皮 半夏麪 廣皮 香附 麥芽

秋暑內燥 煩渴喜得冷飲。脈右小弱者暑傷氣分。脈必芤虛也。此非結胸症。宜辛寒以徹裏邪。

石膏 石膏 知母 厚朴

杏仁 半夏 薑汁

沈二脈小色白。氣分不足。兼之胃弱少食。聞穢濁要刮痧。陰柔之藥妨胃助濁。常以豬肚丸養胃。入夏令熱更傷氣。每食遠進。生脈四君子湯一劑。恪守日服。可杜夏季客暑之侵。生脈四君子湯。長服豬肚丸。

卜八春夏必吞酸肢痠麻木。此體虛不耐陽氣外泄。乃熱傷氣分為病。宗東垣清暑益氣之議。

人參 黃芪 白朮 甘草 麥冬 五味 青皮 陳皮 澤瀉 葛根

升麻 黃柏 歸身 神曲

神曲

青皮

澤瀉

葛根

任督冲年真陰未長。逢長夏濕熱交迫。斯氣泄煩倦。當靜坐涼爽。過月涼颸至。暑散去。乃卻病之期。與清暑益氣之屬。清暑益氣法。

徐十長夏濕熱令行枝起。心家煩倦不嗜食。此體質本怯。而濕與熱邪皆傷氣分。當以注夏同參。用清暑益氣法。

人參 白朮 廣皮 五味 麥冬 川連 黃柏 升麻 葛根

葛根

神曲

麥芽 谷芽

乾荷葉泛丸

施四以煩勞傷陽。交長夏發泄令加見症。都是氣弱亦熱傷氣也。煩渴有痰。先治其胃。益陽明經脈。辛平束筋骨以流利機關耳。金匱麥門冬湯。

吳 診脈肝膽獨大。尺中動數。先天素弱。水虧木少。滋榮當春深長夏。天地氣機泄越。身中煩倦食減。皆熱傷元氣所致。進以甘酸充養胃陰。少俟秋肅天降。培植下焦。固納為宜。

炒麥冬 木瓜 北沙參 生甘草

烏梅

程 暑久入營。夜寐不安。不飢微痞。陰虛體質。識理心用。
鮮生地 元參 川連 銀花 連翹 丹參

心營
暑入

煩勞
胃虛

顧三陰虛過熱。小便淋。近日胃苦。初起寒熱頭痛。汗出不解。飢肉麻木。手足痺強。神昏如寐。成瘧則輕。瘧厥則重。

犀角

元參 小生地 連翹心 竹葉心 石菖蒲 滑石 化牛黃丸二錢

某初病伏暑傷於氣分。微熱渴飲邪犯肺也。失治邪張。遂走膻中。遂舌絳縮。小便忽閉。鼻燥裂血。口瘡耳聾。神呆由氣分之邪熱。漫延於血分矣。夫肺主衛。心主營。營衛二氣晝夜行於經絡之間。與邪相遇。或涼或熱。今則入於絡。津液被劫。必漸昏迷。所謂內閉外脫。

鮮生地

連翹

元參

犀角 石菖蒲

金銀花

汪暑風久入營絡。微熱忽涼。議用玉女煎。

玉女煎去麥冬。牛膝加丹皮竹葉。

金熱止津。津汗出。伏暑已解。只因病魔日久。平素積勞。

形色脈象虛衰。深慮變病。今飲食未進。瘧狀未寘。議以斂液補虛。

人參

茯神

麥冬

五味子 炒白芍

塊辰砂一兩綿裹同煎。

又熱久胃汁被劫。不飢不便。亦病後常事耳。古人論病。

必究寢食。今食未加餐。難寐。神識未清。為病傷元氣。

而熱病必消燬真陰。議用三才湯意。

人參 天冬 生地

麥冬

五味子

顧右脈空大。左脈小芤。寒熱麻痺。腰痛冷汗。平素積勞內虛。秋暑客邪。遂干臟陰。致神迷心熱。煩躁刮痧似乎略爽。病不肯解。比非經絡間病。頗慮熱深劫陰。而為瘻厥。張司農集諸賢論暑病。謂入肝則麻痺。入腎為消渴。此其明徵。議清陰分之邪。仍以養正補之。

阿膠

小生地

麥冬

人參

小川連

烏梅肉

某暑溼熱氣觸入上焦孔竅。頭脣悶。不飢。腹痛惡心。延久不清。有瘡痢之憂。醫者不明三焦治法。混投發散消食。宜乎無效。

杏仁 香豉 橘紅 黑山梔

半夏 厚朴

滑石 黃芩

杏仁 滑石 黃芩 半夏 厚朴 橘紅 黃連

鬱金 通草

某暑熱鬱。頭脣悶。口渴尿短。當清三焦。

某廿暑熱鬱。頭脣悶。口渴尿短。當清三焦。

絲瓜葉 飛滑石 淡竹葉 茶芩皮 厚朴 蕙香 廣皮 通草

暑溼皆客邪也。原無質故起初頭脹胸滿但傷上焦氣分耳。酒家少殺胃氣素薄一派消導難以卒散苦寒胃再傷殘在上。濕熱延及中下遂協熱自利三焦邪蒸氣衝塞填胸躁亂口渴瓜菓下脫格拒相鬪此中宮大傷况進熱飲略受其為胃陽外備而邪結內踞可知矣。考暑門時風煩燥清濁交亂者昔賢每以來復丹五六十粒轉運清濁為先攻補難施之際望其效靈耳。來復丹

吳目黃脫悶咽中不爽嘔逆寒少熱多暑濕客氣之傷三焦不通非風寒之症。

大竹葉

苦芩

杏仁

滑石

陳皮

厚朴

半夏

薑汁

又

暑溼熱皆氣也正釀蓄濁痰於胃。蓬口甜滯膩不飢議以宣氣理痰。

川貝母

桔梗皮

杏仁

黑山梔

澤瀉

另用一賢散

某四診脈弦午後惡寒似熱不飢渴澀短赤暑熱炎蒸外襲肺衛遊行三焦致氣分虛瘦而然當用和法宜溥滋味度症瘧患

杏仁

香薷

木通

飛滑石

淡竹葉

厚朴

白蔻仁

淡竹葉

又照前方去香薷加半夏

楊二暑熱必挾濕吸氣而受先傷於上故仲景傷寒先分六經河間溫熱須究三焦大凡暑熱傷氣濕著阻氣肺主一身周行之氣位高為手太陰經據述病樣面亦足冷上脫瘧寒其為上焦受病顯者緣平素善飲胃中濕熱久伏半溫燥裂不但肺病不合而胃中溼熱得燥熱錮閉下利稀水即協熱下利故黃連苦寒每進必利甚者苦寒以勝其辛軟藥味尚留於胃底也然與初受之肺邪無當此石膏半寒半入肺知母為味清涼為肺之母氣熱不明肺邪徒曰生津馬是至理昔孫真人未診先問最不悞事再據主家說及病起兩旬從無汗泄經云暑當汗出勿止氣分窒塞日久熱侵入血中咯痰帶血舌紅亦不甚渴取上佳不解漫延中下此皆急清三焦是第一章旨故熱病之瘀熱留絡而為遺毒注腑腸而為洞利便為束手無策再論溼乃重濁之邪熱為薰蒸之氣熱處濕中蒸溼之氣上迫清竅耳為失魄不與少陽耳聾同例青蒿咸柴胡一等亦

是少陽本藥。且大病如大敵。選藥如選將。苟非慎重。鮮克有濟。議三焦分清治從河間法。初三日。

飛滑石 生石膏 寒水石

大杏仁

少黃竹始

川通草 翩白金汁

金銀花露

又暮診。診脈後。腹胸肌腠發。發現癰瘍。氣分濕熱。原有暗泄之機。早間所談餘邪遺熱。必解毒者。為此下午進藥後。診脈較大於早晨。神識亦如前。但舌赤中心甚乾燥。身體體微之熱。甚於早間。此陰分亦被熱氣蒸傷。瘦人慮其液涸。然痰咯不清。養陰藥無往而准。膿滯。議得早。進清膈一劑。而三焦執穢之蓄。當用紫雪丹二匙。藉其芳香宣竅。逐穢斯銷。熱可解。濁疾不粘。繼此調理之方。清營分滋胃汗。始可瞻顧。其宿垢欲去。猶在旬日之外。古人謂下不嫌遲。非臆說也。紫雪丹一錢六分。

知母

竹葉心

連翹心

炒川貝

犀角

元參

金汁

銀花露

一劑後用

竹葉心

知母

桑豆皮

元參

鮮生地

金銀花

又

一劑後去銀花。桑豆皮。加人參麥冬。

又初十申刻。診經月時。邪脈形小。數小為病。退數為餘。故皮腠微脫。氣血有流行之義。思食欲餐。胃中有醒豁之機。皆佳兆也。第舌赤而中。黃苔熟。蒸既久。胃津陰液俱傷。致嚥物咽中若阻。澀漫尿管。猶痛咯痰。濃厚宿垢未下。若急遽攻奪。恐真陰再涸矣。此存陰為主。而清腑兼之。故亂進食物。便是助熱。惟清淡之味。與病不悖。自來熱病。最怕食復勞復。舉世共聞。非臆說也。

細生地

元參心

知母

炒川貝

麥冬

地骨皮

銀花露

竹懶

脈症如昨。仍議滋清陰分。餘熱佐清上膀熱痰。

絲瓜葉

錢三

大杏仁

錢三

六一散

錢三

茯苓皮

錢三

又

綿茵陳錢一

細木通

漢防已半

白蔻仁五分

王某

暑邪寒熱。舌白不渴。吐血。此名暑瘵重症。

此症總有
立此等方
少此老人
偶一為之
近人則
藥用此法

暑
厥

萬

西瓜翠衣

竹葉心

青荷葉汁

杏仁

飛滑石

苡仁

。

川連

黃芩

乾薑

生白芍

川椒

烏梅

人參

枳實

。

暑
症

江

暑邪深入厥陰舌縮少腹堅滿聲音不出自利

上下格拒危期至速勉擬暑門酸苦泄熱輔正驅邪一法

。

。

。

。

。

。

某心勞傷挾暑肺氣受戕咳血口乾先清暑熱

朱三伏中陰氣不生陽氣不潛其頭脹身痛是暑邪初受暑溼熱必先傷氣分故舌白口渴身痛早晨清爽

午後煩蒸狀如溫瘧沐浴繞動血絡宿病得時邪而來仲景云先治新病後理宿病是亦陰氣先傷陽氣獨

發也。

。

。

。

。

。

徐三勞傷挾暑咳血不飢

。

。

。

。

。

。

。

。

鮮荷葉汁

大沙參

生苡仁

六一散

。

。

。

。

。

天之暑熱一動地之溼濁自騰人在蒸淫迫之中若正氣設或有隙則邪從口鼻吸入氣分先阻上焦

清肅不行輸化之機失於常度水穀之精微亦蘊結而為溼也人身一小天地內外相應故暑病以此溼

者即此義耳前人有因動因靜之分或傷或中之候以及入心入肝在瘧在痢中炒霍亂暴厥卒死種種

傳變之原各有精義可參茲不重述想大江以南地卑氣薄溼勝然未當此時候更須防患於先昔李笠

翁記中所謂使天只有三時而無夏則人之病也必稀此語最確蓋暑濕之傷驗者在當時為寒緩者於

。

。

。

。

秋後為伏氣之疾其候也脈色必滯口舌必膩或有微寒或單發熱熱時脘痞氣窒渴悶煩冤每至汗後

。

。

。

。

。

。

。

。

則甚。入暮更劇。熱至天明。得汗則諸恙稍緩。日日如是。必要兩三候。外日減一日。方得全解。倘如元氣不支。或調理非法。不治者甚多。然是病比之傷寒。其勢覺緩。比之瘧疾。寒熱又不分明。其變幻與傷寒無二。其愈期反覺纏綿。若表之汗不易徹。攻之便易溏瀉。遇清則肢冷區惡。遇燥則唇齒燥裂。每遇秋來。最多此症。求之古訓不載者多。獨已任編名之曰。秋時晚發感症似瘧。總當人感症之法治之。要知伏氣為病。四時皆有。但不比風寒之邪。一汗而解。溫熱之氣投涼即安。夫暑與濕為薰蒸粘膩之邪也。最難驟愈。若治不中。致暑熱從陽上薰而傷陰。化燥濕邪從陰下沉而傷陽。變濁以致神昏耳聾舌乾齦血脫瘡嘔惡。洞泄肢冷棘手之候叢生。竟至潰敗莫救矣。參先生用甘草劉河間三焦論立法。認明暑濕一氣何者為重。再究其病實在營氣。何分大凡六氣傷人。因人而化。陰虛者火旺。邪歸營分。為多。陽虛者濕勝。邪傷氣分。為多。一則耐清。一則耐溫。臟性之陰陽。從此可知也。於是在上者。以辛涼微苦。如竹葉連翹杏仁薄荷之類。在中者。以苦辛宣通。如半夏瀉心之類。在下者。以溫行寒性。質重開下。如桂苓甘露飲之類。此皆治三焦之大意也。或有所失。又須通變。至於治氣分有寒溫之別。寒者宗諸白虎法。及天水散。意溫者。從乎二陳湯。及正氣散。法理營分。知清補之宜。清者如犀角地黃。加入心之品。補者有三才復脈等方。又如濕熱沉混之蒼朮石膏湯。氣血兩燔之玉女湯。謂閉逐穢與牛黃及至寶紫雪等劑。扶虛進參附及兩儀諸法。隨其變幻審其陰陽運用之妙。存乎心也。附驥蕪詞高明教正。邵新甫

所列諸案。皆平素伏暑之症。為多其卒然受暑之病。絕少。若卒受之症。則當以香薷飲為主。不可不慎也。此老治暑邪。能用輕清涼潤之品。以和肺是其所長。但暑邪深入。必有悶亂煩躁等症。近於霍亂。比則更壞。症治法。至於病重。症危屬熱邪。橫逆不但人參不可輕用。而桂附乾薑服之。無不立癒。乃亦假仲景傷寒

許名。本於此老。我見死者甚多。傷心慘月。不得不歸咎於作俑之人也。

增補臨證指南醫案

肆

臨證指南醫案目錄

卷四

溫燥疫癰
瘡瘍瘻瘍

疫

痰飲

鬱

不寐

饑

三消

脾腫

瘡瘍

瀉

補註本草綱目

目錄

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲仝校

濕上焦肺不虛降

禹三舌白頭脹身痛肢疼胸悶不食弱阻當開氣分除濕。

飛滑石

杏仁 白蔻仁

大竹葉

炒半夏

白通草

王二酒肉之濕助熱內蒸釀痰阻塞氣分不飢不食便溺不爽亦三焦病先論上焦莫如治肺以肺主一身之氣化也。杏仁 桔梗皮

白蔻仁 飛滑石

半夏

厚朴

上焦肺不虛降

吳五酒客濕勝變痰化火性不喜甜熱聚胃口犯肺氣逆吐食上中濕熱主以淡滲佐以苦溫。

大杏仁

金石斛

飛滑石

紫厚朴

活水蘆根

孔心中熱不飢不寐目黃自利濕熱內伏

淡黃芩

連翹

炒杏仁

白通草

滑石

野赤豆皮

某九濕溫阻於肺衛咽喉痛足跗痺痛當清上焦濕走氣自和

飛滑石

竹葉心

連翹

桔梗

射干

蘆根

周病起旬日猶然頭脹漸至耳聾正如內經病能篇所云因於濕首如裹此呃或鼻衄皆邪混氣之象况舌色帶白咽喉欲閉邪阻上竅空虛之所諒非苦寒直入胃中可以治病病名濕溫不能自解即有昏瘡之變

醫莫泛稱時氣而已。連翹

牛蒡子

銀花

馬勃

射干

金汁

辛三時令濕熱之氣觸自口鼻由募原以走中道遂致清肅不行不飢不食但溫乃化熱之漸致機竅不為靈動與形質滯濁有別此清熱開鬱必佐芳香以逐穢為法

桔梗皮

桔梗

黑山梔

香豉

枳殼

降香末

某吸受穢邪募原先病嘔逆邪氣分布營衛皆受遂熱蒸頭脹身痛經旬神識昏迷小水不通上中下三焦

濕熱
阻竅

濕溫
阻肺

交病舌白渴。不多飮是氣分空塞。當以芳香通神淡滲宣竅。俾穢濕濁氣由此可以分消。

苡仁 茯苓皮 藥芩 大腹皮 通草 淡竹葉 牛黃丸二丸

吳 濕邪中傷之後脾胃不醒。不飮口渴。議清養胃津為穩。

鮮省頭草 知母 川斛 茵仁 炒麥冬

張姐體壯有濕。近長夏陰雨潮濕。著於經絡。身痛自利發熱。仲景云。濕家大忌發散汗之。則變痙厥。服來小弱而緩。濕邪凝遏陽氣。名濕溫。溫中熱氣橫冲。心胞絡以致神昏。四肢不緩。亦手厥陰見症。非與傷寒同法也。犀角 連翹心 元參 石菖蒲 金銀花 野赤豆皮 煎送至寶丹

蔡 陽虛挾濕邪。熱內陷。所以神識如蒙。議用瀉心法。人參 生乾薑 黃芩 川連 枳實 生白芍

張六此濕溫氣中足太陰之氣。不為鼓動。運行。試以痞結胸滿。仲景列於太陰篇中。概可推求其理矣。

半夏 醋炒 茯苓 川連 厚朴 通草湯煎

周 濕傷脾陽。腹膨小溲不利。茅朮 厚朴 茯苓 淚瀉 猪苓 素皮

又 五苓散 又 二木膏

范 四肢乍冷。自利未已。目黃稍退。而神倦不語。濕邪內伏。足太陰之氣不運。經言脾鍼在舌。邪滯竅必少靈。以致語言欲塞。必當分利佐辛香以默運坤陽。是太陰裏症之法。

生於水鏡 厚朴散 茯苓鏡 草葉仁散 木瓜散 滬瀉散

又 身體稍稍轉動。語塞神呆。猶是氣機未為靈轉。色脈非是有餘。而濕為陰邪。不徒偏寒偏熱已也。生於木 茯苓 茵仁 鐘金 炒遠志 石菖蒲汁

又 脾胃不醒。皆從前濕蒸之累。氣升咳痰。參藥緩進。

炒黃川貝 茯苓 茵仁 鐘金 地骨皮 淡竹葉

此等症多由風痰所生。上焦散寒以治之。未得之法。當以利水除濕。兼清熱。此等症多

濕阻
中魚

又 濕滯於中氣蒸於上。失降不得寐。口數白痴。仍不渴飲。胸上鬱。佐中運利腸間。亦是宣通三焦也。
生於木錢 治仁三錢 寒水石錢 桔梗錢 猪苓錢 澤瀉錢 廣皮白半錢

曹三腸胃屬肺。濕久生熱。氣阻不爽。仍以通為法。

生於木

川黃連

厚朴

廣皮白

酒煨大黃

水法丸服三錢

李四五脈小澇。痰多上湧。食入脘阻。大便不爽。上秋至今夏不愈。自述飢飽失和。曾病黃疸。以濕傷氣庫主治。

大杏仁

半夏

薑汁

橘紅

鬱金

香豉

俞五酒濕鬱傷。脘中食阻而痛。治以辛苦寒。

小川連

半夏

薑汁

枳實

茯苓

香豉

某九舌白目黃。口渴溺赤。脈象呆鈍。此屬濕鬱。

綿茵陳三錢

生白朮一錢

寒水石三錢

飛滑石錢

桂枝末一錢

茯苓皮三錢

木猪苓錢

澤瀉錢

李酒客中虛。卑地潮濕。長夏涉水外受之濕。下起水穀不運中焦之濕。內聚治法。不以宣通經腑致瀉。阻氣

分鬱而為熱。自脾胃不主運通水濕。橫瀆於脈腠之間。二便不爽。濕熱鬱氣交扭。混亂前輩治中滿必曰分消。此分字明謂分解之義。但亂藥既多。不能去病。就是脾胃受傷。於藥蔓延。腿肢腫極且痛。病深路遠。藥必從喉入胃。然後四布。病所未得藥。益清陽。先已受傷。此湯藥難以進商也。議用丹溪小溫中丸三錢。專以疏利腸中。取其不致流散諸經。亦一理也。小溫中丸八服。

某六陽微體質。濕痰內聚。便溏。脘悶。肌麻舌乾。清理濕邪。氣機升降自安。

金石斛

茯苓

半夏

廣皮白

鈎藤

白蒺藜

張脈右緩。濕著阻氣。

厚朴

廣皮

煨草莖

炒查肉

藿香梗

白蒺藜

某二不耐煩勞。是本虛。脘悶。便泄屬濕邪。先治濕後治本。

大腹皮

茯苓

厚朴

廣皮

澤瀉

猪苓

陸濕滯如痞。

山茵陳

草莖仁

茯苓皮

大腹皮絨

厚朴

廣皮

澤瀉

猪苓

汪三舌黃脫悶。穢濕內著。氣機不宣。如久釀蒸。必化熱氣。即有身熱之累。

杏仁

藿香

茯苓皮

滑石

厚朴

廣皮白

某鬱病源皆濕熱內停之象。當走濕清熱為主。至於藥酒。溫助熱尤當永戒。

生白朮

赤小豆皮

綿茵陳

黃柏

茯苓

澤瀉

某脈濡頭脹。身重著而痛。寒熱微嘔。此濕阻氣分。

厚朴

杏仁

白蔻仁

木通

茯苓皮

大腹皮

滑石

竹葉

某長夏外受暑濕。與水穀之氣相併。上焦不行。下脘不通。氣阻熱從濕下蒸。逼不飴不食。目黃舌白。氣分之結。

厚朴

廣皮

茯苓

半夏

薑汁

滑石

竹葉

某脈緩身痛。汗出熱解。繼而復熱。此水穀之氣不運濕。復阻氣鬱而成病。仍誠宣通氣分。熱自濕中而未徒進清熱不應。黃芩

滑石

茯苓皮

大腹皮

白蔻仁

通草

猪苓

方四形質頗然。脈遲小濶。不食不寐。腹痛大使。室癰平昔嗜酒。少穀中虛濕結陽。傷寒濕濁。陰鴟聚為痛。

炒黑生附子

炒黑川椒

生淡乾薑

葱白

調入猪膽汁一枚

熟附子

生白朮

王五冷濕損陽。經絡拘束。形寒酒客少穀。勞力所致。

桂枝

淡乾薑

熟附子

生白朮

桂皮

桂心

桂皮

某六地中濕氣。自足先腫。濕屬陰邪。陽不易。復畏寒筋骨。猶幸強無力以金匱。苓薑桂皮湯。

陳一濁凝氣結。有形酒肉挾濕。薑撥

生香附汁

木香

草菓

茯苓

廣皮白

江脈緩臍上痛。腹微脹。便稀溺短不爽。此乃濕鬱脾胃之陽。致氣滯裏急。宗古人導濕分消。用桂苓散方。

生茅木 官桂 桂苓 厚朴

廣皮白

飛滑石

猪苓

澤瀉

炒杏肉

林五中年清陽日薄。忽然脫中痞悶。乃清陽不自轉旋。酒肉濕濁之氣。得以凝聚矣。過飲塘瀉。濕傷脾胃。胃陽

亦有羸者。

助熱尤當永戒。

人參

茯苓

熟附子

生於朮

生白芍

生薑

又酒濕類聚。例以分利診脈。微陽氣已敗。濕壅生熱。至胃癰膿清熱。則陽亡即死。朮苓運中祛濕。佐附迅走氣分。亦治濕一法。

茯苓

熟附子

生白朮

左牡蠣

澤瀉

車前子

龐四食久脾陽消乏。此不得寒治。年水育子腎真亦敗微安腎光。

鹿草

胡蘆巴

附子

韭子赤石脂

補骨脂

真茅朮

茯苓

免絲子大茴香

張亟陽傷疫。有濕麻痺痔血。

生白朮

附子

乾姜

茯苓

車前子

某人舌白身痛。足跗浮腫。從太谿穴水流如注。此濕邪伏於足少陰。當用溫蒸陽氣為主。

鹿草

草藥

免絲子

茯苓

車前子

厚朴

楊厥陰為病。必錯雜不一。瘡痢之後。肝臟心肺發症。左脇有痞。腹中塊。外堅脇下。每常汨汨有聲。虛就實。常有寒熱。胃中不知飢而反餌。雜吞酸脹長而數。顯然厥陰陽明濕熱下滲。前陰陽縮而為濕凝症也。議

用升發陽明胃氣。滲泄厥陰。濕熱。其症自愈。

不行。用藥先須斷酒。

生白朮

炮黑川烏

薑汁

白芥子

厚朴

廣皮

草樹

茯苓

徐溫瘧初愈。驟進濁膩食物。濕聚熱蒸。蘊於經絡。寒戰熱厥。骨骱煩疼。舌起灰滯之色。面目痿黃。顯然濕熱為癥。仲景謂濕家忌投發汗者。恐陽傷變病。蓋濕邪重著。汗之不却是苦味平適為安耳。

防已

杏仁

滑石

醋炒半夏

連翹

山梔

苡仁

野赤豆皮

入經
終為
毒溫鬱
散筋筋
冷痛肝胃
溫熱陽農
溫傷鬱生
胃主

某人風暑濕溼雜氣。不主宣。咳嗽頭脹不飢。右股若廢。法當通陽驅邪。

杏仁

桂枝伍

生薑伍

厚朴

半夏

漢防己

白芍藥

方不重複
合體者生
病滿者皆
意之為

經脈
痛

治濕不用
燥熱之品
皆以苦香
淡涼之藥
健脾消痰
未備則於
國本之方
增立之耳

增
扁
指
目
卷
某
汗
分
熱
津
肺
胃

濕家本有汗不解 次仁 竹葉 白蔻仁 滑石 茯苓 川芎草
濕為重濁有質之邪。若從外而受者。皆由地中之氣升騰。從內而生者。皆由脾陽之不運。雖云霧露雨濕。上先受之地。中潮濕下先受之。然霧露雨濕亦必由地氣上升而致。若地氣不升。則天氣不降。皆成燥症矣。何濕之有。其傷人也。或從上。或從下。或遍體皆受。此論外感之濕邪。著於肌軀者也。此雖未必即入於臟腑。治法原宜於表散。但不可大汗耳。更當察其兼症。若兼風者。微微散之。兼寒者。佐以溫藥。兼熱者。佐以清藥。此言外受之濕也。然水流濕火就燥。有同氣相感之理。如其人飲食不節。脾家有濕。脾主肌肉四肢。則外感肌軀之濕。亦漸次入於臟腑矣。亦有外不受濕。而但濕從內生者。必其人青梁酒醴過度。或者飲茶湯太多。或食生冷瓜菜及甜膩之物。治法總宜辨其體質陰陽。斯可以知寒熱虛實之治。若其人色蒼赤而瘦。肌肉堅結者。其體屬陽。此外感濕邪。必易於化熱。若內生濕邪。多因膏粱酒醴。心患濕熱。濕火之症。若其人色白而肥。肌肉柔軟者。其體屬陰。若外感濕邪。不易化熱。若內生之濕。多因茶湯生冷太過。必患寒濕之症。人生若一小天地。今觀先生治法。若濕阻上焦者。用開肺氣佐淡滲通膀胱。是即啟上問。開支河導水勢下行之理也。若脾陽不運。濕滯中焦者。用木朴薑半之劑。以溫運之。以芩澤腹皮滑石等。滲泄之。亦猶依註濕處。必得烈日曬之。或以剛燥之土培之。或開溝渠以泄之耳。其用藥總以辛苦寒治。濕熱以苦辛溫治。寒濕。聚以淡滲佐之。或再加風藥。甘酸膩濁。在所不用。總之腎陽充旺。脾土健運。自無寒濕諸症。肺金清肅之氣下降。膀胱之氣化通。調自無濕火濕熱暑濕諸症。若夫失治。變幻則有種脈。黃疸。瀉淋閉塞。飲等難。俱於各門兼參之可也。華岫雲

某
脈右數大議清氣分中燥熱。桑葉 杏仁 大沙參 袤貝母 香豉 黑棗
夏秋燥致傷都因陰分不足。

虛

火熱
上焦
心陽
過動
陽液

胃陰
虛
熱劫
陰液

冬桑葉

玉竹

生甘草

白沙參

生扁豆

地骨皮

麥冬

花粉

某 燥火上襲。頭暈眼痛。當辛涼清上。

薄荷梗

達翹殼

生甘草

黑梗皮

桔梗

菉豆皮

王六老人言。屬肉消肌枯。心事繁冗。陽氣過動。致五液皆涸。而為燥。冬月無妨。夏月深處。林壑心境凝然。可以延年。每早服牛乳一杯。

陳 秋燥復傷宿恙。再發未可補瀆。姑與甘藥養胃。

麥冬

玉竹

北沙參

生甘草

茯神

橘核根鬚

某 上燥治氣。下燥治血。此為定評。今陽明胃腑之虛。因久病嘔逆。投以辛耗破氣。津液劫傷。胃氣不主下行。致腸中傳迷失所。經云。六腑以通為補。半月小效。全在一通補工夫。豈徒理燥而已。議甘寒清補胃陰。

鮮生地

天冬

人參

甜梨肉

生白蜜

張 脈數虛舌紅口渴。上齶乾涸。腹熱不飢。此津液被劫。陰不上承。心下溫。溫液液用炙甘草湯。

炙甘草

阿膠

生地

麥冬

人參

麻仁

某 氏心中煩熱。正值經來。而熱渴不已。若清肺氣。大謬用復脈法。

炙甘草

生地

阿膠

麥冬

棗仁

陳設

某 陽津陰液重傷。餘熱淹留不解。臨晚潮熱。舌色若赭。頻飲救亢陽焚燒。究未能解渴。形脈俱虛。難投白朮。議以仲景復脈一法為邪少虛多。使少陰厥陰二臟之陰少耗。冀得胃腑復振。而左關尺空數不藏。非久延所宜耳。人參 生地 阿膠 麥冬 炙草 桂枝 生薑 大棗

燥為乾涸不通之疾。內傷外感。宜分。外感者由於天時。風熱過勝。或由深秋偏亢之邪。始必傷人。上焦氣分。其法以辛涼甘潤肺胃為先。喻氏清燥救肺湯。及先生用玉竹。久禁葉薄荷。梨皮甘草之類。是也。內傷者乃人之本病。精血下奪。而成或因偏餌燥劑所致。病從下食陰分。先起其法。以純陰靜養。柔養肝腎。為宜。大補地黃丸。六味丸之類。是也要知是症。大忌者。苦寒。最喜者。甘柔。旨氣全之。又勿以

入癰
心平治

外此等方
若癰疽則
一時傳染
惡毒非用
通靈金石
之品處製
泰發也。不
能隨症施
用。

失治則槁及乎上喘咳瘧厥三消噴脣之崩。總由此致大凡津液結而為患者必佐辛通之氣味精血丸而為患者必藉血肉之滋填在表佐風藥而成功在腑以緩通為要務古之滋燥養營湯潤腸丸五仁湯瓊玉膏一丸牛羊乳汁等法各有專司也。邵新甫

有因風而燥當兼
治風寒中未備

痘

朱 痘癰邪從口鼻吸受分布三焦瀰漫神識不是風寒客邪亦非停滯裏症故發散消導即犯劫津之戒與傷寒六經大不相同今喉痛丹疹舌如硃神躁暮昏上受穢邪逆走膻中當清血絡以防結閉然必大用解毒以驅其穢必九日外不致昏憊冀其邪去正復

屏角 生地 玄參 葛蒲 變金 銀花 金汁

姚 痘毒口糜丹疹喉啞治在上焦

屏角 鮮生地 玄參 連翹 石菖蒲 銀花 金汁 至寶丹

譚 口鼻吸入穢濁自肺系漸於心包絡初病喉痛舌燥最怕寂閉神昏之象疫毒傳染之症不與風寒停滯

同法 玄參 連翹 鐘金 銀花 石菖蒲 龍葉 射干 牛蒡 冲入真白金汁一杯

楊 吸入疫毒三焦皆受久則血分漸瘀愈結愈熱當以鹹苦之製仍是清揚理上做古大製小用之意

玄參 西瓜翠衣 金銀花露 蒼白金汁

金氏人靜則神昏癰邪竟入膻王先生方甚妙愚意兼以芳香宣竅逐穢至寶丹

疫屬一症都從口鼻而入直行中道流布三焦非比傷寒六經可表可下夫疫為穢濁之氣古人所以飲

芳香採蘭草以襲芬芳之氣者重除穢也及其傳變上行極而下下行極而上是以邪在上焦者為喉啞

為口糜若逆傳膻中者為神昏舌絳為喉痛丹疹今觀先生立法清解之中必佐芳香宣竅逐穢如屏角

蒼蒲銀花鬱香等類乘進至寶丹從表透裏以有靈之物內通心竅搜剔幽隱通考通鎮者鎮若邪入營

中三焦相溷。熱愈結邪愈深者。理宜鹹苦大製之法。仍恐性速。直走在下。故用玄參金銀花露金汁。原葉皮輕揚理上。所謂倣古法而不泥其法者也。考是症。推張景岳。喻嘉言。吳又可論之最詳。然宗張。喻。二氏。恐有遺邪留患。若宗吳氏。又恐邪去。正傷。惟在臨症權衡無盛。無虛。而遣人夫殃。方不愧為司命矣。

鄒滋九

三焦
伏熱

濕溫

張

伏氣熱蘊三焦。心脾熱發煩渴。遍體赤斑。夜躁不寐。雨脈數搏。

羚羊角

犀角

連翹心

玄參心

鮮生地

金銀花

花粉

石菖蒲

桂枝

川連

黃芩

花粉

牡蠣

枳實

又

寒熱必有形象。攻觸及於胃脘之下。口渴喜飲。緩湯。斑已發現。病不肯退。此邪氣久伏。厥陰之界矣。

桂枝

川連

黃芩

花粉

牡蠣

枳實

嚴

濕溫雜受。身發癰瘍。飲水渴不解。夜煩不成寐。病中強食。反助邪威。議用涼膈疏斑方法。

連翹

薄荷

杏仁

鬱金

枳實汁

炒牛蒡

山梔

石膏

又

舌邊赤白。譖早輕夜重。斑疹隱現。是溫濕已入血絡。夫心主血。邪干膻中。漸至結閉。為昏瘡之危。苦味沈寒。竟入中焦。消導草溫。徒劫胃汁。皆溫邪大禁。議清疏血分。輕劑以透斑。更參入芳香。逐穢以開內竅。近代

喻嘉言申明戒律。宜遵此。

犀角

連翹

玄參

連翹

銀花

石菖蒲

某

江

風溫發疹

薄荷

赤芍

連翹

杏仁

牛蒡子

桔梗

桔梗皮

紫苑

山梔

風溫發疹

薄荷

赤芍

連翹

杏仁

牛蒡子

桔梗

桑皮

甘草

山梔

風溫發疹

薄荷

赤芍

連翹

杏仁

牛蒡子

桔梗

桑皮

甘草

山梔

風溫發疹

薄荷

赤芍

連翹

杏仁

牛蒡子

桔梗

桔梗皮

紫苑

山梔

風溫發疹

薄荷

赤芍

連翹

杏仁

牛蒡子

桔梗

桔梗皮

紫苑

山梔

風溫發疹

薄荷

赤芍

連翹

杏仁

牛蒡子

桔梗

桔梗皮

紫苑

山梔

風溫發疹

薄荷

赤芍

連翹

杏仁

牛蒡子

桔梗

桔梗皮

紫苑

山梔

熱邪
入胞

風溫

風溫發疹

薄荷

赤芍

連翹

杏仁

牛蒡子

桔梗

桔梗皮

紫苑

山梔

風溫發疹

薄荷

赤芍

連翹

杏仁

牛蒡子

桔梗

桔梗皮

紫苑

山梔

風溫發疹

薄荷

赤芍

連翹

杏仁

牛蒡子

桔梗

桔梗皮

紫苑

山梔

為妙
此症乃
中
有
熱
毒
須
於
未
發
之
前
服
藥

溫邪
內陷
膽大
胃虛
脾蒸

陽明
外寒
內熱

濕熱
肺病
陰陽

連翹心
飛滑石
石菖蒲

炒金銀花

射干

通草

煎化牛黃丸一丸

蘆根一
半
杏仁
桔梗錢一
半
飛滑石錢一
半
桑皮分一
通草錢一

地骨皮

川斛

麥冬

生甘草
穀芽

某
痧後伏火未清。內熱身痛。
玉竹
白沙參
生扁豆
炙甘草
生扁豆
炒麥冬
川斛
麥冬
生甘草

章
涼風外襲伏熱內蒸。秋金主令。內應乎肺。喘咳身熱。始而晝熱繼而暮熱。自氣分漸及血分。頭面紫而肌

壘發疹。卒寒清散為是。
薄荷
連翹
石膏

淡竹葉
杏仁
桑皮

苡仁

吳
病在暴冷而發肌表頭而不透。是外經為寒。內伏為熱。肺病為衛。衛氣分而解為是。

麻黃
石膏
牛蒡子
枳殼汁
杏仁
射干
桔梗

生甘草

尹
環口燥裂而痛。頭面身半以上。發出瘡痏。赤紋乃陽明血熱。久蘊成毒。瘦人偏熱。頗有是症。何謂醫人不

識。
犀角地黃湯
再加風藥尤妙。

江
溫邪自利癰疹。
黃芩
連翹
牛蒡子
桔梗
香豉
薄荷
杏仁
橘紅
通草

李二發瘧熱腫。獨現正面。每遇九十月大發。五六月漸愈。七八年如是。因思夏令陽氣宣越營衛。流行無制。秋冬氣凜。外薄氣血凝滯。此濕熱漫無發泄。乃少陽木火之鬱。及陽明蘊蒸之濕。故上焦尤甚。耳法以平涼。位以苦寒。俾陽分鬱散。得疏原幾發作勢緩。

夏枯草
鮮菊葉

苦丁茶

鮮菊葉邊

羚羊角

黑施皮

鬱金

苡仁

唐四五
麻木忽高腫。發癟必有風濕襲入皮膜。乃軀殼病。昔人每以宣行通劑。此防變風症。

片薑黃
羚羊角

川桂枝

撫芎

半夏

白芥子

某十
風塊瘡癰。咳嗽腹痛。躬著表裏。當用雙和。

牛蒡子
杏仁
連翹
桔梗

桑皮

象貝母

煎藥送通聖丸

症者有觸目之色。而無礙手之質。即稠如錦紋。稀如蚊跡之象也。或佈於胸腹。或見於四肢。總以鮮紅起

汗者為吉。色紫成片者重。色黑者為凶。色青者為不治。蓋有諸內而形諸外。可決其臟腑之安危。邪正之勝負也。殆傷寒、瘧、疫諸症。失於宣解。邪藪於胃腑。而走入營中。每有是患耳。考方書之治。其法不一大抵由失表而致者。當求之汗。失下而致者。必取乎攻火。甚清之毒甚化之營氣不足者。助其虛而和之。託之。至於陰癥一說。見象甚微。若必指定些些之癥點為陰。猶恐不能無誤。想前人此例。無非覺後人勿執見癥為實熱之義也。吾故曰。必參之脈象及兼證方多。瘀、疹、癰、瘍之通稱。其頭粒而如粟象。癰者。即疹之膿腫而易庠。須知出要周。引發宜徐緩。不外乎太陰陽明之患。故繆氏耑以肺胃論治為精也。若先生之法。本乎四氣。隨其時令之勝。復酌以辛涼辛勝。及甘寒苦寒。鹹淡滲等法而治之。凡吾幼科諸友於此尤當究心焉。邵新甫

疫

汪八宿嘯久矣。不發心悸震動。似半悞懶之象。此屬疫火。治以宣通鬱遏。勿徒呆補。

半夏 川連 石菖蒲 蛤粉 枳實 桔芩 川鬱金 橘紅 竹瀝姜汁泛丸
劉 痘火鬱遏氣滯。吸煙上熱助壅。是酒肉皆不相宜。古稱疫因氣滯。熱鬱治當清熱理氣為先。
川連 白朮 枳實 厚朴 桔芩 半夏 淡薑湯泛丸

沈三瘦火久嗽。海蛤丸

張姪瘦火風眩暈防仆跌。明天麻 炒半夏 桔芩 橘紅 純羊角 鈎藤

陳姪老年瘦火咳嗽。逐痰有穢氣。蘆根 茵仁 桃仁 絲瓜子 草蔻 大棗

即兼肺癰治法

又下虛不納濁泛嘔。逐痰穢氣。熟地炭 紫衣胡桃肉 炒杞子 炒牛膝 川斛 茶神

某 瘦火上逆。蒙蔽耳鳴頭暈。二陳加天麻鈎藤甘菊羚羊蔓皮

某 夏至節雨。關脈弦長。五火燔燎而肝陽胃陽尤甚。動怒抽掣為肝病。食辛香厚味即病。至胃病。便然瘦火根深。非頃刻可除。惟靜養易患。忿薄味以清勦。此病發之勢。必緩。由漸加功議藥。乃近理治法。

羚羊角	犀角	川連	鬱金	山梔	北秦皮	牛黃	麝香
生石膏	寒水石	金箔	方諸水法丸	竹葉燈心湯	送下		
何姐	診脈右關弦滑。痰多舌乾微強。語言似蹇。蓋因痰火上蒙津液。不得上承。高年頗慮風癆。宜清上宣通。勿						
宜可乘人小勞一劑。							

通陽清火散之藥
半夏 金石斛 橘紅 黑山梔 茶葉 鬱金 生甘草 石菖蒲 竹瀝 薑汁
皆如寐。神憤如迷。熱痰內閉。勢非輕渺。半夏 石菖蒲 桔梗 松實 鬱金 橘紅 竹瀝 薑

某鬱痰半夏麴
鬱金石菖蒲明天麻白蒺藜
橘紅茯苓
陶脈左弦堅搏痰多食不易運此鬱處已甚肝侮脾胃有年最宜開濶不致延及噎膈

半夏
薑汁
茯苓
杏仁
鬱金
橘紅

文，脉如前，痰气未降，前方去杏仁加白芥子。

金六濕熱內蒸痰火日盛根本漸怯陽泄為汙陰泄遺瀉酒客喜於爽口食物醫藥中滋膩補方決不適用也

葉久寓南土水穀之濕蒸熱聚疾脈沈弦目黃肢木易有瘡疾皆濕熱感致氣隧不得流暢法當苦辛寒清裏通肌倣前輩瘦因熟起清痰為要

生茅术 黄柏 木葵實 山楂 茄菔子 川連 半夏 厚朴 橘紅 竹瀝薑汁丸

病後厚味蒸瘦
風化硝
瓜萎仁霜
桔實
鬱金
生茯苓
薑汁炒山楂
竹瀝法丸

脈脈溫陽熱痰半夏茯苓黑山梔橘紅
製菟葵蒸志降香
易功丸。用該半升。其上止心口易下等之症。一服即平。同千管之風

仲景用滋養肺腎陰藥水和陽亦屬近理。夏季肺主三陽，脾火更易於傷肺。在中土掌權，之侮陽明脈衰瘦多經絡不利矣。議清少陽鬱熱使中宮自安。若畏虛滋補，上中愈實，下焦愈虛。二陳去甘

草加金解桑葉丹皮 文 脈左浮弦數。痰多脫中不爽。煩則火升。眩暈靜坐神識安舒。議少陽陽明同治。

羚羊角 連翹 廣皮 炒半夏 麵 黑山梔皮 香豉

文 脈兩手已和。惟煩動恍惚。欲量議用靜藥。益陰和陽。人參 熟地 天冬 金箔

汪 痰火上盛。腎氣少攝。下焦暮服清肅。上焦方法。

羚羊角 半夏 茶芩 橘紅 黑梔皮

熟地 淡從容 杞子 五味 牛膝

曹五色鮮明屬上有痰飲。蓋上實則下虛。半百年歲未得種玉。診得脈左小不靜。右部弦滑。法當清肺胃之熱。

痰。益腎肝之精血。做曼倩衛生方法。淡鴻膠

甜梨膏 人參 黃芪 麥冬 山藥 茶芩

於赤 黃節 黑節 鹿尾膠

羊內腎 淡從容 故紙

胡桃肉 杞子 五味 牛膝 遠志 車前 蜜丸

熟地 淡芩 补骨脂 胡桃肉 杞子 五味 牛膝 遠志 車前 蜜丸

痰症之情狀變幻不一。古人不究標本。每著消痰之方。立消痰之論者甚多。後人一其法而用之治之不

驗。遂有稱痰為怪病者矣。不知痰乃病之標。非病之本也。善治者。治其所以生痰之源。則不消痰而痰自

無矣。余詳考之。夫痰乃飲食所化。有因外感六氣之邪。則肺脾升降之機失度。致飲食輸化不清而生

者。有因多食甘膩肥腥茶酒而生者。有因本質脾胃虛濕濁凝滯而生者。有因鬱則氣火不舒。而蒸變

者。又有腎虛水泛為痰者。此亦因土衰不能制水。則腎中陰濁上逆耳。非腎中真有痰水上泛也。更有陰

虛勞症。龍相之火上交燄肺以致痰嗽者。此痰乃津液所化。必不濃厚。若欲消之。不惟無益。而徒傷津液。其餘一切諸痰。初起皆由濕而生。雖有風火燥痰之名。亦皆因氣而化。非風火燥。自能生痰也。其主治之法。惟痰與氣。一時壅閉咽喉者。不得不暫用豁痰降氣之劑。以開之。餘皆當治其本。故古人有見痰休治。

肝腎
大
虛上
腎多
瘧症

疫之論此誠千古之明訓。蓋疫本飲食濕濁所化人豈能禁絕飲食若弗欲消之由於外邪者邪散則疫或可清如寒疫溫之熱疫清之濕疫燥之燥疫潤之風疫散之是也若涉本原者必於消旋生有至死而疫仍未清者矣此乃不知治本之故耳今觀案中治法有因鬱因火者必用解鬱清火為君以消疫佐之有因濕因熱者則用燥濕清熱略佐化疫之品若因肝腎虛而生疫者則純乎鎮攝固補此真知治疫之本者矣若因寒因濕者更當於疫飲門兼參而治之

華岫雲

所謂方藥皆治肺胃浮疫之藥若透經入絡盤山試解及三

鶴隱處之老疫尚有岐厲製煉之方此等方不能奏效也

疫飲

某六高年衛陽式微寒邪外侵引動飲邪上逆咳嗽形寒仲景云治飲不治咳當以溫藥通和之

杏仁錢

粗桂枝一錢

淡乾薑半錢

茯苓錢

苡仁錢

炙草四錢

當午時服

周

向有耳聾鳴响是水虧木火蒙竅冬陽不潛亦屬下元之虛但今咳嗽喉下有痰音腸痛臥著氣衝乃衝

陽升而疫飲泛脹浮當此驟冷恐有外寒引動內飲議開太陽以肅上

雲茯苓

粗桂枝一錢

乾薑

五味子

同薑

白芍

炙草

當午時服

某二新涼外束肺受寒冷氣餒不降宿飲上干而病發矣

法當暖護背心宿病可卻

淡生薑粉

半夏

蛤蜊粉

茯苓

桂枝木

淡仁煎湯

某十五背寒咳逆此屬飲邪先當辛通飲邪以降肺氣

鮮枇杷葉

杏仁

茯苓

橘紅

生薑

半夏

某五服右大弦氣喘咳唾濁沫不能着枕喜飲湯水遇寒病發此屬飲邪留於肺衛如見咳投以清潤愈投愈

劇矣

夢慈子

山東大棗

徐氏疫飲上吐喘不得卧乃溫邪阻蔽肺氣氣不下降壅滯不能着右議用宣通開氣分方法

小青龍去細辛麻黃加苡仁白糖炒石膏

沈姪父溫陽不潛伏伏飲上逐仲景云脈沈屬飲面色鮮明為飲飲家咳甚當治其飲不當治咳緣年高下焦

根蒂已虛。因溫暖氣泄不主收藏。飲邪上擾乘肺。肺氣不降。一身之氣交阻薰灼不休。絡血上湧經云不得卧。卧則喘甚。壅塞乃肺氣之逆亂也。若以見病固病。昧於色診候氣必致由咳變幻。腹脹滿漸不可挽明眼醫者勿得忽為泛泛可也。茲就管見略述大意。議開太陽以後。飲濁下趨。仍無礙於冬溫。從仲景小青龍。

越脾令法

杏仁

茯苓

苡仁

炒半夏

桂枝木

石膏

白芍

炙草

方氏冷暖失和。飲泛氣逆為浮腫喘咳。腹脹。卧則衝寒。議用越脾方。

石膏

杏仁

桂枝

炒半夏

茯苓

炙草

桂枝

枳實

不用麻黃不成越脾。

施四勢煩太甚。胃陽受傷。外衛單薄。怯寒畏冷。食物少運。痰飲內起。氣阻濁凝胸背。皆痛。辛甘理陽已效。當此長夏。脾胃生令。索其生氣。體旺病可全好。

六君子加益智木香。

黃四五身居沿海。氣煙霧露。客邪侵入。清陽陽傷裏寒。久嗽。病人不知却病。護身猶然用力承辨。裏結飲邪沈痼。

不卻病。

茯苓桂枝湯

胡六脈沈而微微。則陽氣不足。沈乃寒水陰凝。心痛怔忡。漸及兩脇下墜。由陽衰不主運行。痰飲聚氣欲阻致痛之來。其心震之謂。亦如波撼岳陽之義。議用外臺茯苓飲合桂苓方。

人參

茯苓

半夏

枳實

桂枝

薑汁

桂枝

枳實

半夏

金石斛

白六脈沈小弦為陰濁。飲邪稟質陽不克。旺胸中清氣不得舒展曠達。偶觸入寒冷。或誤進寒物。飲邪暴冷凝結。胸痞。當平日。食物忌用酒肉腥濁。便清陽流行。常服仲景苓桂朮甘湯。百利。若病來因冷。即服大順散。

戴笑議外臺茯苓飲方。

人參

茯苓

廣皮

枳實

半夏

金石斛

朱九煩勞太過。陽傷瘦飲日聚陽躋脈空。寐不成寐。衛陽失護。毛髮自墜。乃日就其衰。卒矣。初進通飲。渴以甦。

陽接服外臺茯苓飲

夏夜服後。背中冷。左偏微痛。食少欲嘔。四肢痺強。此飲邪內結。議通陽氣。

桂枝

茯苓

茯苓

半夏

薑汁

炙草

大棗

某眩暈心胸悶不爽。脈右弦左弱。面色紅亮。此乃痰飲上泛有厥中之事。

炒半夏

製蒺藜

橘紅

煨天麻

石菖蒲

茯苓

薑汁

尤口中味淡。是胃陽虛。夫濁飲下降。痛緩向有飲濕為患。若不急進溫通理陽濁飲。必致復聚。議大半夏湯法。

人參

半夏

淡芩

枳實

薑汁

脾陽
不運

張氏酒客穀少中虛。常進疏散表藥。外衛之陽亦傷。其痰飲發曉。胸中痞塞自述。或飢遇冷。病來。其為陽氣受病何疑。不必見瘧。投逐但護中焦脾胃。使陽氣健運。不息陰濁痰涎焉。有竊據之理。

生於朮

川桂枝

茯苓

淡薑渣

苡仁

澤瀉

薑棗湯法九

王三脈沈為痰飲。是陽氣不足。濁陰欲蔽。當以理脾為先。俾中陽默運。即仲景外飲治脾之意。

苓桂朮甘加半夏陳皮水法九

某嘔舌白。咳逆不渴。非飲藥而何。宜宣溫藥和之。

杏仁

半夏

乾薑

粗桂枝

茯苓

厚朴

炙草

脾處

某食後脘中痞塞。按之濿漉有聲。手麻脇痛。心煩耳目昏眩。是氣不流行。痰飲內聚。中焦用桂苓丸竹瀝薑黃

汁法丸

又桂枝

人參

茯苓

半夏

廣皮

炙草

黃味過甘膩。中氣緩不主運。延綿百天。聚氣結飲。束垣云。病久髮不鮮。毛不落。不食不飢。乃痰飲為患。飲屬陰類。故不渴飲。仲景五飲互異。其要言不煩。當以溫藥和之。通陽方法。固無客疑惑。大意外飲。宜治脾內飲。治脾是規矩準繩矣。議用苓桂朮甘湯。

某形體似乎壯實。陽氣外泄。畏風怯冷。脾陽消乏。不可健運。水穀得氣。變蒸痰飲。壅道日壅。上實下虛。仲景謂飲邪當以溫藥和之。苓桂朮甘得效。從外飲立方。

人參

淡附子

生於朮

枳實

茯苓

澤瀉

荆瀉薑汁法九

某 老人久嗽妨食。議以外飲治脾。

芩桂朮甘湯

王三脈沈背寒心悸如墜形盛氣衰漸有痰飲內聚當溫通補陽方復辟斯飲濁自解。

人參

淡附子

乾薑

茯苓

生於朮

生白芍

馮 陽虛則形寒汗出痰飲痞聚都是陰濁成形乘陽氣衰微致上干竊踞古人法則必通其陽以掃陰氣但宿病無急攻方况平素臺鬱氣滯血濁久耗之體不敢純剛防劫液耳。

人參

熟附子 淡乾薑 炒川椒 川桂枝

烏梅肉

生白芍

另真武丸三兩

程四左脈沈靜右脈微弦四旬清陽日薄脾臟鼓運漸遲加以煩心煥思水穀悍氣蘊然痰飲仲景謂外熱當治脾陽况中年常有遺泄之患浪非龍相之動搏議固下益腎轉旋運脾二方分早晚服早一從遲少數精七寶參用丸方熟地 茯苓 枸杞 五味 菟肉 茯神 山藥 茄絲 蕤盆 魚膠 菖蒲

遠志

龍骨 青鹽

熟蜜同棗肉搗丸早服五七錢

茅丸

於术 半夏 桔芩 廣皮 生益智 白蒺藜 鈎藤

蔓荳湯泛丸晚服三錢開水下

徐 清陽未展濁陰欲踞久延少結痰飲議用真武丸二錢五分人參一錢煎湯送胃陽得震濁當退遲矣十服

某 脈波弦飲泛嘔咳乃下虛無以制上議早服腎氣丸攝納下焦散失以治水泛之飲午服外臺茯苓飲轉旋中焦使食不致釀痰茯苓飲去木

杏仁

桔芩 錄 川桂枝 藏

生薑錢

生薑錢

苡仁

炙草分

大棗

顧四咳嗽數月嘔出涎沫建中不應已非營衛損傷視其面色鮮明飲食仍進微利主治

小半夏湯加桂枝杏仁薑汁

李心分傷陽氣內虛痰飲卧者氣絕飲阻其氣為多痰出稍通熱綫且體常汗泄殊風寒表邪不解並不飲渴

脾陽
飲食
嘔嘔

亦非火炎燉金。仲景云飲家而效當治飲不當治效。
茯苓 桂枝木 茵仁 灸草 薑汁

陳脈濇小舌白不渴。身動嘔痰。身如在舟車中。此寒熱攻胃。致傷逆氣。痰飲互結。通補陽明為正。白朮甘草守中。未能去濕宜緩商。人參汁 半夏 枳實汁 茯苓 竹瀝 薑汁

馬啞肌肉豐溢。脈來沈緩始發。右季脇痛。湯飲下咽。汨汨有聲。吐痰涎頭痛。此皆脾胃陽微寒。濕滯聚年方壯盛。不必介懷。溫中佐其條達運動為宜。

茱朮 厚朴 半夏 茯苓 陳皮 淡薑渣 菖蒲巴 火草 薑汁泛丸

馬四甘緩頗安。卒泄不受。此陽分氣寒。將來飲邪日聚。然臥著數多。清氣失旋。先用苓桂朮甘湯。繼進外臺茯苓飲。

曹七中年陽氣日薄。痰飲皆屬陰濁。上干清道為衝逆咳嗽。仲景治法。外飲治脾。內飲治腎。分晰甚明。昔年曾用桂苓澤心。得效是治。支飲治法數年。真氣更衰。古人謂飲邪當以溫藥和之。須忌治嗽肺藥。

先用小青龍湯去麻辛。接服外臺茯苓飲。

程五昔肥今瘦為飲。仲景云。脈沈而弦。是為飲家。男子向老。下元先虧。氣不收攝。則痰飲上泛。飲與氣湧。斯為咳矣。今醫見嗽。輒以清肺降氣消痰。久而不效。更與滋陰不明。痰飲皆屬濁陰之化。滋則堆砌。助濁滯氣。試述者枕咳嗽一端。知身體臥着。上氣不平。必下衝上逆。其痰飲伏於至陰之界。腎臟絡病無疑。形寒畏風陽氣微弱。而藩籬疏攢。仲景有要言不煩曰。飲邪必用溫藥和之。更分外飲治脾。內飲治腎。不讀聖經。焉知此理。桂苓甘味湯。熟附都氣加胡桃。

陳痛久氣亂。陽微水穀不運。蘊釀聚濕。胃中之陽。日薄。痰飲水濕。必傾囊上湧。而新進水穀之氣。與宿邪再聚復出。致永無痊期。仲景云。飲邪當以溫藥和之。又云不渴者。此為飲邪未去故也。則知理陽通陽。誠有合於聖訓。斷然矣。真武湯

張四痰飲喘咳。肌肉麻痺。瘧服不堪納穀。冬寒日甚。春暖日減。全是一陽氣日衰。陰濁逆干犯上。肺藥治嗽無非

辛泄滋潤。蓋辛散則耗陽。滋清助陰。濁阻在陽分。氣不肅為夜不得眠。小青龍意主乎由上以泄水寒直從太陽之裏。以通膀胱。表中裏藥也。仲景謂飲邪當以溫藥和之。驅陰邪以復陽。一定成法。

早腎氣去莫操白芍

炒查炭水法丸 晚外臺茯苓飲 薑棗湯法丸

程六腎虛不納氣。五液變痰上泛。冬藏失職。此病為甚。不可以肺咳消痰。當用八味丸。收納陰中之陽。暫時撤

飲用仲景桂苓味甘湯。

孫未交冬至一陽來復。老人下虛。不主固納。飲從下泛。氣阻升降而為喘嗽。發散寒涼。苦瀉諸藥。馬得中病。仲景云。飲家而咳。當治飲。不當治咳。復腎母以老人喘嗽從脾腎溫養。定論是悟遵聖訓也。

桂枝

茯苓

五味子

甘草湯代水加淡薑茶

李 腸紅久病。不必攻治。今者氣衝喘嗽。脘腸痞阻。是飲濁上僭。最宜悉究。

川桂枝分

茯苓

五味子

同薑合

杏仁一錢半

白芍錢

炙草分

生左牡蠣

錢

吳七壯年下元久虛。收納氣泄。每交秋冬受冷。冷氣深入。伏飲夾氣上衝。為咳嗽。嘔吐。肺降氣不致者。病在腎絡中也。蓋精血少壯不旺。難以搜逐。病根不去。謂此絕症一年。小暑艾灸靜養一百二十天可愈。附都氣加車前。

桂枝

半夏

薑汁

汝仁

炙草

又

早腎氣丸

夜真武丸

潘九勞力喘甚。肩背惡寒。飲泛上逆。皆係下元虛損。莫以喘用瀉肺等藥。薛氏八味丸。
王 秋深天氣收肅。背寒喘咳。飲濁上泛。緣體中陽氣少振。不耐風露所致。最宜暖護背部。進通陽以治飲。
徐岑 桂枝 半夏 薑汁 汝仁 炙草 又 早腎氣丸 夜真武丸
陳 脈虛微春陽地升。濁陰上干喘。不得眠。治在少陰。

人參

淡然附子

猪膽汁

此非急症不導
用此以傷胃氣

人參

淡然附子

生白芍

茯苓

薑汁

又 真武泄濁。脫通思食。龍寐昨宵已有渴欲飲水之狀。考金匱云。渴者飲邪欲去也。當健補中陽以資納餌。
又 真武泄濁。脫通思食。龍寐昨宵已有渴欲飲水之狀。考金匱云。渴者飲邪欲去也。當健補中陽以資納餌。

刻治於理未合。急用小青龍法使膀胱之氣無阻礙。濁飲痰氣自無逆冲之患矣。

桂枝

杏仁

乾薑

五味

半夏

茯苓

章

伏飲陰濁上干。因春地氣主升而發。嘔吐不飢。自然脾胃受傷。六君子宣補方法未嘗不妙。今診得吸氣甚微。小腹晨通。暮瘡足跗浮腫。其腑中之氣閉鬪失司。最慮中滿。夫太陽司開。陽明司闔。濁陰瀰漫。通腑即

是通陽。倣仲景開太陽一法。

牡蠣

澤瀉

防已

茯苓

五味

乾薑

張七嘯喘哮。坐不得卧。神迷如呆。氣降則清。水寒飲邪上冲。膻中用逐飲開濁法。

薑汁炒南星

薑汁炒白附子

茯苓

桂枝

炙草

石菖蒲

某三咳緩痰少。脫中不爽。肌腠瘡癰皆濕邪未盡。痰飲竊踞之象。當用六安法。

杏仁

白芥子

炒半夏

茯苓

淡乾薑

橘紅

王當年陽虛濁飲上泛。喘急用真武湯丸而效。因平素嗜酒。少穀中虛濕聚熱。蘊蒸痰目黃。銀血未可為實。

熟論治議方用外臺茯苓飲減甘草佐以微苦。清滲理其濕熱。以酒客忌甜故也。

茯苓

人參

桂仁

枳實

橘紅

汪面色鮮明。脘中濁濁欲嘔。因鬱勃熱氣蒸為痰飲。宜暫緩參求務清中焦熱痰。

杏仁

枳實

半夏

茯苓

桔梗

黑梔皮

張氏痰飲挾燥咳嗽中癥。

杏仁

花粉

茯苓

象貝母

橘紅

半夏麴

陳姬痰飲挾氣火上踞。脘悶脹不爽。宜理氣熱。

半夏

茯苓

瓜萎皮

黑梔皮

橘紅

鬱金

某脈弦右濬。面亮舌白口乾。不喜飲。頭重。岑然胸脘痺塞而痛。得嗳氣稍舒。酒客穀少中虛痰飲。聚蓄當

此夏令地氣上升。飲邪挾氣上阻。清空遂令前症之來。金匱云脈弦為飲色鮮明者為留飲。口乾不欲飲水者。此為飲邪未去故也。况藜菜汗出。豈是風寒春夏溫邪。早溫發散為大禁。自云身體空飄年已六旬。又四

中焦
熱痰

上沖
肺胃

濁飲
濕痰

痰飲
氣火
不降

喘

半夏

薑汁

川連

吳萸

茯苓

枳實

竹瀝

潘三遠客路途風寒外受。熱氣內蒸。痰飲日聚於臟之外。脈絡之中。凡遇風冷。或暴烈日或勞碌形體心事不得宜。除根不速。到老年歲。仍受其累耳。小青龍湯去細辛。

飲大

經絡

脚次

清陽

大經

支脈

結飲

支脈

生取仲景之小半夏代苓湯。外臺飲三湯從脾胃二經分派飲立法。而先生又別作之。如外寒引動宿飲上逆及膀胱氣化不通飲。飲臂氣真武等法以理陽。通陽及固下益腎。轉旋運脾為主。如外寒引動宿飲上逆及膀胱氣化不通飲。逆肺氣不降者以小青龍合越婢等法。開太陽膀胱為主。如飲邪伏於經絡及中虛濕熱成痰者。則有川椒烏蜀漆之溫經通絡。外臺茯苓飲去甘草少佐苦辛。清滲理濕之法。其飲邪上冲。膻中及懸飲流入胃中而為病者。又有薑附南星。菖蒲旋覆。川椒等驅飲。開濁辛通陽氣等法。絲絲入扣。一以貫之。病情治法。胸有成竹矣。非深於得道者。其孰能之。鄧瀛九

子五鬱損心陽。陽墜入陰為淋濁。由情志內傷即為陰虛致病。見症亂治最為庸劣。心藏神。神耗如遺諸寢失司。非偏寒偏熱藥治必得開爽。莫有向安服藥以草木功能恐不能令其歡悅。妙香散帶入麝氣

川連 乾薑 半夏 薤汁 茯苓 廉皮瓜蔞
季六老年情志不適。鬱則少火變壯火。知飢脫中不爽。口舌糜爛。心脾營損。木火劫燬精華。肌肉日消。惟悅悅
開爽。內起鬱熱可平。但執清火苦寒。非謂情志內鬱熱矣。

金石斛	連翹心	炒丹皮	經霜桑葉	川貝	茯苓
接服養心脾之營少佐苦降法	人參	川連	炒丹皮	生白芍	小麥
脘痛已止味酸乃肝鬱也	<small>富貴家集</small>	金石斛	黑山梔	茯神	橘紅
		丹皮	半夏麪	桃杞葉	

某初起左邊麻木舌強筋吊。腦後痛痰阻咽喉此係肝風上引必由情懷鬱勃所致。

羚羊角

連翹心

鮮生地

元參

石菖蒲

鬱金汁

肝脾
鬱氣血

某氣鬱不舒木不條達。嘔則少寬道遙散去白朮加鬱金。某肝鬱成熟加味道遙去白朮加鬱金。某鬱熱吞酸溫膽湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連。沈三脈虛濁。情懷失暢。肝脾氣血多鬱半載不愈。難任峻劑。議以局方逍遙散兼補中益氣莫以中宮虛寒為泥。

吳十四勞倦嗔怒致傷病在肝脾又有腦泄髓脂暗損暫以解鬱。繼當宣補。

鈎藤

生香附

丹皮

桑葉

神曲

白芍

茯苓

廣皮

葉氏隱言。鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味。火風變動氣橫為痛為脹。疏泄失職便秘忽渴。情志之鬱。藥難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再膏肓劫奪必變格拒中滿與辛潤少佐和陽。

柏子仁

錢歸賾

桃仁

錢生白芍

錢

小川連

分一

川棟子

錢

某憤怒肝鬱思慮脾傷而黃脈濁痞不成寐。宗薛氏法治之。

人參

黃芪

熟於术

茯苓

來仁

桂圓肉

當歸

炙草

黑山梔

丹皮

遠志

戴氏隱情曲意不伸是為心疾。此草木攻病難以見長乃七情之鬱損以丹溪越鞠方法

香附

川芎

小川連

茯苓

半夏

橘紅

炒杏肉

神曲柴丸

程姬脈弦濁外塞內熱齒痛舌乾無寐乃肝脾鬱結不舒。

鬱金

鈎藤

丹皮

夏枯草

生香附

薄荷梗

鈎藤

廣皮

茯苓

吳一操作過勤肝膽陽升。胃氣日減脈應左搏從鬱熟治。

丹皮

黑山梔

薄荷梗

鈎藤

廣皮

白蒺藜

丹皮

鈎藤

廣皮

茯苓

肝膽
鬱熱

陸四鬱傷筋脈心痛薄荷生香附鬱金白蒺藜丹皮鈎藤廣皮茯苓

胃虛
升逆
肝鬱
升逆
風火

王三勞怒傷陽氣逆。血鬱致痛。癰脹便溏。風木侮土。前方既效。與通補陽明厥陰。
大半夏湯加桃仁柏仁當歸棗棗湯法。

朱二因抑鬱悲泣。致肝陽內動。陽氣變化。火風有形有聲。貫膈冲咽。自覺冷者。非真寒也。內經以五志過極皆火。但非六氣外來。苓連之屬。不能制伏。固當柔緩以濡之。合乎肝為剛臟。濟之以柔。亦和法也。

生地 天冬

阿膠

茯神

川斛

牡蠣

小麥

人中白

慈膏

趙四鬱勃日久。五志氣火上升。胃氣逆則脘悶不飢。肝陽上潛。風火凌竅。必旋暈咽痺。自覺冷者。非真寒也。皆氣痺不通之象。病能篇以諸禁。鼓燥屬火。丹溪謂上升之氣從肝膽相火。非無遠矣。

生地

阿膠

玄參

丹皮

川斛

黑稽豆皮

人中白

慈膏

朱氏脈弦右大乳房利痛。經阻半年。若遇勞怒腹痛。逆氣上衝。此邪鬱既久。少火化為壯火。氣純不循。脈胞遂痺。治以泄少陽。補太陰。氣血流利。鬱熱可解。

人參

柴胡

當歸

白朮

丹皮

茯苓

甘草

吳心脈弦濶數。頭項結癰。咽喉腫痛。阻瘻水穀難下。此皆情志鬱勃。肝膽相火。內風上循清竅。雖清熱直降。雖制情懷之陽。是以頻藥勿效也。

鮮杞杞葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

朱情懷悒鬱。五志熱蒸痰聚阻氣。脘中窄隘不舒。脹及背部上焦。清陽欲結。治肺以展氣化。務宜治悅開懷。莫令鬱痺綿延。

鮮杞杞葉 杏仁 瓜萎皮 鬱金 半夏 茯苓 薑汁 竹沥

又脈左大弦數。頭目如蒙。背俞膩脹都是鬱勃。熱氣上升。氣有餘便是火。治宜清上。告辛清解鬱勃。頭自己清而膈喫氣順。覺微濁。此肝膽厥陽。由胃系上冲所致。丹溪謂上升之氣自肝而出。是其明徵矣。

羚羊角 夏枯草

青葙葉

瓜萎皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又告辛清解鬱勃。頭自己清而膈喫氣順。覺微濁。此肝膽厥陽。由胃系上冲所致。丹溪謂上升之氣自肝而出。是其明徵矣。川連 薑汁 半夏 枳實 桔梗 楊紅 瓜萎皮

木火
上升
肺不
虛降

膽脾
膽血
上升
喉腫

升逆
肝鬱
升逆
風火

胃虛
升逆
肝鬱
升逆
風火

卷之三

七

龍文書局校印

金氣血久鬱成熱。耽悶壅悶。不通常有風寒腹痛。瘀血已深。發時宜用通聖一劑。半時以通調氣熱之藥。

土苓蔓皮

枇杷葉

黑山梔

鬱金

桃仁

杏仁

楊驚惶忘起。都主肝陽上冒。血沸氣滯於濁。宜宣通以就下。因慢投止塞。舊燒不清新血。入瘀絡中。匝月屢屢反覆。究竟肝膽氣血皆鬱。仍宜條達宣揚。漏腸在肛。得體中稍健設法。

水覆花

新絳

青葱管

炒桃仁

柏子仁

趙氏療癰寒熱盜汗。腕中癰聚。經期不來。大使溏。喰減食。春深至冬未痊。此乃鬱損成勞。難治之症。

香附

丹皮

歸身

白芍

川貝

茯苓

牡蠣

夏枯草

胡氏頭頂結核。暮夜寒熱盜汗。乃是憂鬱不解。氣血皆虛。倘若經阻便難調治。

炒當歸

炒白芍

炙草

廣皮

茯苓

神曲

鈎藤

南星

張氏據說喪子悲哀。是情志中起。因鬱成勞。知訊不能食。內珠忍陷。忽脹。兩脹忽若刀刺。經先期色變瘡紫。半年來醫藥無效者。情懷不得解釋。草木無能為矣。

人參

當歸

生白芍

炙草

肉桂

炒杞子

茯苓

南星

素問六元正紀大論。言五鬱之發。乃因五運之氣。有太過不及。遂有勝復之變。由此觀之。天地且有鬱。而況於人乎。故六氣者。人皆能鬱而致病。如陽寒之邪。鬱於衛。鬱於營。或在經。在腑。在臟。如暑濕之蘊結。在三焦。瘟疫之邪。客於募原。風寒濕三氣雜感而成瘡症。總之邪不解散。即謂之鬱。此外感六氣而成者。也前人論之詳矣。今所輯者。七情之鬱居多。如思傷脾。怒傷肝之類是也。其原總由於心。因情志不遂。則鬱而成病矣。其症心脾肝膽為多。案中治法。有清泄上焦。鬱火或宣暢少陽。或開降肺氣。通補肝胃泄膽。補脾宣通脈絡。若熱鬱至陰。則用鹹補苦泄。種種治法。未能按症分晰詳論。今舉其大綱。皆因鬱則氣滯。氣滯久則必化熱。熱鬱則津液耗而不流。升降之機失度。初傷氣分久延。血分延及鬱勞沈疴。故先生用藥大旨。每以苦辛涼潤宣通。不投燥熱峻滯呆補。此其治療之大法也。此外更有當發明者。鬱則氣滯。其滯

或在形體。或在臟腑。必有不舒之現症。蓋氣本無形。聚則似有形。而實無質。如胸膈似阻。心下虛痞。脹脹。背張。脘悶。不食。氣疲。攻衝。筋脈不舒。醫家不察。誤認有形之滯。放膽用破。氣攻削。迄至愈治愈劇。轉方又屬呆補。此不死於病。而死於醫矣。不知清志之鬱。由於隱情。曲意不伸。故氣之升降。開闔。樞機不利。雖內經有泄折違。發尊五鬱之治。猶慮難獲全功。故疏五過論。有始富後貧。故貴脫勢。總屬難治之例。蓋鬱症全在病者。能移情易性。醫者構思靈巧。不重在攻補。而在乎用苦泄熱。而不損胃。用辛理氣。而不破氣。用滑石濡燥潤。而不滋膩。氣機用宣通。而不揠苗。助長庶幾。或有倖成。若必欲求十全之治。則惟道家有一言可以啟之。曰欲要長生。先學短死。此乃治鬱之金丹也。華山雲

肝火

此亦各病有之。不得另立一門。如此則五臟之火當立五門矣。

秦氏年前肝風眩暈。主以涼血分和陽熄風。一年未發。今歲正月春寒。非比天暖開泄。此番病發。必因勞怒觸動。情志。至於嘔逆。微冷。侵熱。交互。漸作耳鳴。咽痺。食納久留。脘中想少。陽木火盛。於寅。膽脈貴耳。犯逆之威。必向陽明。而後上憑諸竅。脈右濇大。胃逆不降。食味不甘。而脘中逆亂。蒸蒸日熾。營血內耗。無以養心。斯寢不肖寐。心搖蕩漾。有難以鳴狀之象。今頭重。脘痺。全是上焦為木火升騰。阻遏清陽。前方滋清。血藥居多。必不奏功。今議湯劑。方以苦降其逆。辛通其瘻。然湯宜小。其製度以久病體虛。初春若此。冬藏未為堅固。可知其丸劑當以局方龍膏丸。暫服半月再議。

連翹

半錢

黑梔皮

一錢

羚羊角

一錢

鮮菊葉

三錢

紫苑

錢

鬱金

八分

大杏仁

研六粒去皮尖勿

土瓜萎及錢

錢

鮮菖蒲根

四分

尾鐵

半錢

午服

沈女腹痛少減。嘔逆已止。上焦熱。下焦冷。肝陽尚和平。擬進當歸龍膏法。

當歸

龍膽草

川棟子

蘆薈

清白散方加其苦

川連

吳萸

大茴

黃氏肝膽風火上懸。頭面清空之筋掣不和。治以清散。

不通之症

不得犯沈苦

大腸熱結

大腸熱結

荷葉梗

薄荷梗

青葙葉

勞心
陽動
本火
上蒙

氣火
鬱脫
大痛

怒動
陽升
陰虛

肝腎
風陽
上升

怒熱

鄭氏癲服神迷經脈抽痛服間不欲納食一月經期四至此鬱傷氣血成病。龍膏丸一錢二分十服。

葉氏厥陽擾亂神明經色已黑肢冷面青便秘。關八誦讀吟咏身雖靜坐而心神常動。凡五志之動皆陽。陽胃無制清靈遂蒙易旨。以蒙乃外加之義。述病發之時頭中欲招。腕欲撫摩。二便必不自利。此腑氣之室。由乎肝膽厥逆起見矣。議從手經上焦治。

唐女脈左濇右弦氣火不降胸臆隱痛腕不爽最慮失血。羚羊角連翹心元參石菖蒲根鬱金麥冬竹葉

川貝

山梔

丹皮

鬱金汁

鈎藤

瓜萎皮

茯苓

橘紅

又

氣火上鬱腕中空痛嘔涎先以開通壅遏。

香豉

瓜萎皮

山梔

鬱金

竹茹

半夏麴

杏仁

橘紅

葛

噴怒喧囂氣火逆飛致血痺咽痛

食物厭惡

耳前後遠肩背刺

議解少陽

夏枯草

丹皮

桑葉

鈎藤

山梔

地骨皮

橘紅

朱

五頭痛神煩忽然而至五行之速莫如風火然有虛實內外之因非徒發散苦寒為事矣。如向有肝病目疾

喪明是陰氣久傷體質今厥陰風木司天春深發泄陽氣暴張即外感而論正內經冬不藏精春必病溫育

陰可使致清大忌發散蓋陰根久傷表之再傷陽劫陰液仲景謂一逆尚引日再逆促命期矣余前主阿膠

雞子黃湯佐地冬杜水芍甘培土亟知其厥陽衝逆之威鹹味入陰甘緩其急與內經肝病三法恰合今已

入夏三百虛陽條上煩躁頭痛當大滋腎母以甦肝子補胃陰以杜木火乘侮旬日不敢反覆經月可望全

好。

安生是無言若作周則太極矣

人參熟地天冬

麥冬

龜膠

阿膠

北味

茯神

陸

鼻塞有血左肩胛背痛

督君相多動

鬱氣偏

脈得左虛右數

先以清肝通絡

丹皮

山梔

羚羊角

鬱沙

鈎藤

達翹

青菊葉

肝者將軍之官相火內寄得真水以涵濡真氣以制伏此火遂生生之機本無是症之名也蓋因情志不

舒則生鬱。言語不投則生嗔。謀慮過度則自竭。斯罷極之本。從中變火。攻衝激烈。升之不熄為風陽。抑而不透為鬱氣。脘腸脹悶。眩暉猝厥。嘔逆淋閼。狂躁見紅等病。由是來矣。古人雖分肝風肝氣肝火之殊。其實是同一源。若遇鬱者。宜平宜涼。乘勢達之為妥。過升者宜柔宜降。緩其旋擾為先。自竭者全屬半虛。當培其子母之臟。至於犯上侮中。乘下諸累。散見各門可矣。邵新甫

不寐

倪
多痛陽升。陰液無以上注。舌涸赤絰。煩不成寐。當益腎水以制心火。

鮮生地
元參
麥冬
萊豆皮
銀花

吳

少陽鬱火不寐。
丹皮
半夏
鉤藤
桑葉
茯苓
橘紅

程氏

上晝氣逆。填膀胱。夜寐不肯寐。乃陽氣不降。議月溫膽湯。

溫膽去枳實加金斛。

滾痰九二錢五分。

顧

四鬱鬱已。蒼面色光亮。操心煩勞。陽上升動。痰飲亦得上溢。

靈樞云。陽氣下交入陰。陽蹻脈滿。令人得寐。今氣越外池。陽不入陰。熟飲酒醴。欲其神昏假寐。非調病之法程。凡中年已後。男子下元先損。早上宜用八味丸。暇時用半夏秫米湯。

某
陽不交陰。夜卧寐躁。
小半夏湯

趙氏
嘔吐眩暉。肝胃兩經受病。陽氣不交於陰。陽蹻穴空。寤不肯寐。

靈樞方半夏秫米湯主之。

又
接用人參溫膽湯。

某
四脈滯不能充長肌肉。夜不適脾胃。消家無以灌溉。故耳。當用歸脾湯養溫之。

嫩黃芪
於朮
茯神
遠志

某
肝陽不降。夜無寐。追酸棗仁法。

棗仁
知母

知母
炙草

炙草
桂圓

桂圓
新會皮

桂圓
小麥

小麥
川芎

膽瀉
膽陽

虛
脾營

陽虛
脾虛

膽火

心火

東仁

知母

茯苓

川芎

炙草

陳陰精走泄復因洞漏重亡津液致陽暴升胃逆食入故嘔神識不靜無寐議酸棗仁湯

棗仁五錢

炙草分五錢

知母錢二錢

茯苓錢二錢

肝腎陽浮

某三宿不成寐食不甘味色羸脈細數濶陰液內耗厥陽外越化火化風燔燎煽動此屬陰損最不易治姑與

仲景酸棗仁湯

棗仁炒黑力研三分錢

知母錢一錢

雲茯神三分錢

生甘草分五錢

川芎分五錢

田臟液內耗心腹熱灼陽氣不交於陰陽躊躇穴空令人寤不成寐靈樞有半夏秫米法但此病及損及肝腎欲求陽和須介屬之鹹佐以酸收甘緩麻近理

欲求陽和須介屬之鹹佐以酸收甘緩麻近理

龜膠淡菜熟地

黃柏

茯苓

萸肉

五味

遠志

又鹹苦酸收已效下焦液枯煩填實肝腎

龜鹿膠

淡菜

天冬

萸肉

五味

茯苓

羊內腎

龜鹿膠熟地

淡菜

天冬

萸肉

五味

茯苓

羊內腎

不寐之故雖非一種總是陽不交陰所致若因外邪而不寐者如傷寒瘧疾等暴發營衛必然窒塞升降必然失常愁楚呻吟日夜難安當速去其邪攘外即所以安內也若因裏病而不寐者或驚煩過度而繼宮內燃從補心丹及棗仁湯法或憂勞憤鬱而耗損心脾宗養心湯及歸脾湯法或精不凝神而龍雪震盪當壯水之主合靜以制動法或肝血無藏而魂搖神漾有鹹補甘緩法胃病則陽躊躇穴滿有靈樞半夏秫米湯法膽熱則口苦心煩前有溫膽湯先生又用桑葉丹皮山梔等輕清少陽法營氣傷極人參人乳並行陽深不攝七味八味可選餘如因驚宜鎮因怒宜疏飲食痰火為實新產病後為虛也邵新甫不寐之因不一案中十不得一博考可知

餽亦不必另立一門此症中之一也

餽

亦不必另立一門此症中之一也

陽升

心陽

某

陽升餽雜

麥冬三錢

生地二錢

柏子仁錢

川斛三錢

茯神錢

黑櫟豆皮錢

心中煩熱頭上汗泄汗止自安易餽

淮小麥

柏子仁

茯神

炙草

南棗

辰砂

血虛
肝陰
虛火

程氏血虛心嘈咽 咽地 天冬 麦冬 女貞子 生白芍 灵草 茯神

丹參 天冬 茯神 白芍

麻仁

某氏經半月一至夜嘈痛。生地 何鵬 天冬 茯神 丹參
 餃有虛實真偽。其病總在於胃。經云飲入於胃。遊溢精氣上輸於肺。入云。脾與胃以膜相連耳。又云脾主為胃。行其津液者也。由此觀之。脾屬陰主平血。胃屬陽主平氣。胃易燥。全賴脾陰以和之。脾易濕。必賴胃陽以運之。故一陰一陽互相表裏。合冲和之德。而為後天生化之源也。若脾陰一虛。則胃家飲食遊溢之精氣全輸於脾。不能稍留津液以自潤。則胃過於燥而有火矣。故欲得食以自資。稍進則餽難愈。甚得食則餽可暫止。若失治則延。便閉。三消噎膈之症。治當補脾陰養營血。兼補胃陰。甘涼濡潤。或稍佐微酸。此乃脾陰之虛。而致胃家之燥也。更有一切熱病之後。胃氣雖漸復。津液尚未充。亦有是症。此但以飲食調之可以自愈。此二種乃為虛餽症。所謂實者。年歲壯盛。脾胃生發之氣與腎陽充旺。食易消磨。多食易飢。而餽得食即止。此非病也。不必服藥。以上皆是真餽症所云。偽者。因胃有痰火。以致飲食輸化不清。或現惡心吞酸。微煩眩暉少寐。似飢非飢。雖飽食亦不能止。此乃痰火為患。治宜清胃。稍佐降逆。苦寒及滯膩之藥不宜多用。又有胃陽衰微。以致積飲內聚。水氣泛溢。似有凌心之狀。淒淒戚戚。似酸非酸。似辣非辣。飲食減少。此屬脾胃虛。治宜溫通。做痰飲門而治之。此二種乃似餽之偽症。若夫所云心嘈者誤也。心但有煩而無餽。胃但有餽而無煩。亦不可不辨明也。今先生之法。僅有四案。倘好喜之士。更能搜採補入。則幸甚。華山雲

三消 消病乃人症。僅列此數案。編書之遺漏耶。

許十四能食善飢渴。飲日加齷。心燒。內火自燃。乃消症大病。

生地

知母

麥冬

石膏

生甘草

生白芍

王五肌肉瘦減。善飢渴。飲。此久久煩勞。壯盛。不覺體衰。病發。皆內因之症。自心營肺衛之傷。漸損及乎中下。按脈偏於左搏。營絡虛熱。故苦寒莫制其熱。甘補無濟其虛。是中上消之病。

煩火

熱

督

火

肝陽
紀胃

又 固本加甜沙參

楊火肝風厥陽上冲眩暈犯胃為渴

石膏

知母

阿膠

細生地

生甘草

生白芍

某 液涸消渴是臟陰為病。但胃口不醒。生氣易振。陽明陽土非甘涼不復。肝病治胃是仲景法。

人參

麥冬

粳米

佩蘭葉

川斛

陳皮

陽津動

腎消

胡元陽變動為消與河間甘露飲方。

河間甘露飲

麥冬

知母

生白芍

錢五陽動消燉甘緩和陽生津 生地

炙黑甘草

麥冬

棗仁

生白芍

楊六渴飲頻飢渴溺渾濁此屬腎消陰精內耗陽氣上燔。舌碎絳赤乃陰不上承非客熱宜此乃臟液無存。豈

是平常小恙

熟地

牛膝

車前

某 脈左數能食 六味加二冬。翹版女貞草蓮川斛。

山藥

茯神

車前

王四形瘦脈搏渴飲善食乃三消症也。古人謂入水無物不長。入火無物不消。河間每以益腎水制心火除腸

胃激烈之燥溌身津液之枯是真治法。

五女煎

腎陰大旺

腎消

某 脈左數能食 六味加二冬。翹版女貞草蓮川斛。

山藥

茯神

車前

姜三經營無不勞心心陽過動而腎陰暗耗液枯陽愈燔灼。凡入火之物必消燉乾枯是能食而肌肉消瘪。

用景岳玉女煎

金匱之消渴非三消症也乃卒然之症渴而小便多則火在上而腎陽反亢故用腎水制火而壯腎水令歸

三消一症雖有上中下之分其實不越陰虧陽亢津涸熱淫而已。考古治法惟仲景之腎氣丸助真火蒸化上升津液本事方之神效散取水中鹹寒之物遂其性而治之二者可謂其通天手眼萬世準繩矣。他

如易簡之地黃引子朱丹溪之消渴方以及茯苓丸黃芪湯生津甘露飲皆錯雜不一毫無成法可遵至

先生則範於法而不囿於法。如病在中上者膈膜之地而成癥病之場即用景岳之玉女煎六味之加二

冬。翹版女貞草蓮川斛

一以清陽明之熱以滋少陰一以救心肺之陰而下顧真液如元陽變動而為消燉者即用

三消之
酒而欲使
八味井津
以養胃則
莫若矣

中虛
伏熱

某
某

脾痺

川連

淡黃芩

人參

川連

淡乾薑

人參

枳實

升皮

橘紅

竹茹

生薑

生白芍

生薑

升皮

橘紅

竹茹

生白芍

升皮

橘紅

竹茹

升皮

<

池故初用似效繼用則無功莫若漸以甘肥投之或稍佐鹹溫或佐酸溫發養四陽使胃壯而氣日厚此所謂藥補不如食補也又有腎陽胃陽兼虛者曾見久服鹿角膠而愈即此意也未識高明者以為然否

華岫雲

瘡寒

(瘡)

陰氣先傷。陽氣獨發。猶是伏暑內動。當與金匱瘡癰同例。

竹葉

麥冬

生地

玄參

知母

梨汁

茱萸

施

發熱身痛。咳喘暑濕。外因內阻。氣分有似寒躁。皆肺病也。

竹葉

連翹

薄荷

杏仁

滑石

鬱金汁

茱萸

又

微寒多熱。舌心乾渴。飲脫不爽。此屬瘡癰治在肺經。

程

陰氣先傷。陽氣獨發。有輝熱無寒之處。

鮮生地

知母

麥冬

竹葉心

滑石

唐

未病形容先瘦。既病暮熱朝涼。猶然行動安舒。未必真正重病傷寒也。但八九日病來。小愈驟食粉糬腥

麩。當未食穀。發熱損穀則愈。仲景未嘗立方。此腹痛洞瀉。食滯限其腸胃。大腑不司變化。究其病根。論幼科

體具純陽。瘦損於病前。亦陽亢為消樂。仲景謂瘡瘍者。單熱不寒。本條云。陰氣孤絕。陽氣獨發。熱均煩怒令

人消瘦肌肉亦不設方。但云以飲食消息主之。嘉言主以甘寒生津可愈。重後天胃氣耳。洞瀉既頻津液更

傷。苦寒多餌熟。仍不已。暮夜昏譖。自言胸中格拒。腹中不和。此皆病輕藥重。致陰陽二氣之殘僵。法當停藥

與穀。諒進甘酸。解其煩渴。方有斟酌。

又

鼻煤脣裂。舌腐頻與苓連。熱不肯已。此病本輕藥重於攻擊。致流行之氣結閉不行。鬱遏不通。其熱愈甚。

上則不嗜飲。不納食。小溲頗利。便必管痛。三焦皆閉。神昏瘞症。有諸。

達翹心鉢

川貝母

鮮石菖蒲汁半錢

杏仁二十粒

射干二分

淡竹葉錢

又

自停狼藥。日有向愈之機。胃困則痞閉不欲食。今雖未加餐。已知甘美。皆醒之漸也。童真無下虛之理。漫

溺欲出。尿管心痛。良由肺津胃汁。因苦辛燥熱烈氣味劫奪枯槁。腸中無以運行。膚腎觀此。必以分利所謂泉源既竭。當滋其化源。九竅不和。都屬胃病。

麥門冬錢

甜水梨皮錢

甜杏仁錢

蕉漿一水

張

舌赤煩汗不寐。肢體忽冷。乃脾虛寒也。暑邪深入所致。

杏仁

滑石

西瓜翠衣

知母

花粉

溫瘡

又某

熬甚而厥。幼稚瘡痘皆然。

竹葉石膏湯去人參半夏加知母。

建翹

黃芩

青蒿

滑石

丁

脈右數。左小弱。面明夏秋伏暑。寒露後發微寒。多熱。嘔逆身痛。蓋素有痰火。暑必挾濕。病自肺經而起。致氣不宣化。不飢不食。頻渴短縮。乃熱在氣分。當與溫瘡同例。忌葛根足六經藥。

桂枝白虎湯加半夏

胡

按仲景云。脈如平人。但熱無寒。骨節頻痠微嘔而渴者。病名溫瘡。桂枝白虎湯主之。桂枝白虎湯。蓋今年夏秋久熱。口鼻吸暑。其初暑邪輕小。不致病發。秋深氣涼。外來裏熱欲出。與營衛二氣交衝。邪與二氣遇觸。斯為熱起。臨解必有微汗者。氣邪兩泄。然邪不盡。則混處氣血中矣。故聖人立法。以石膏生寒清氣分之。伏熱佐入桂枝。辛甘溫之輕揚引導涼藥。以通營衛。兼知母專理陽明獨勝之熱。而平太陰肺亦得秋金肅降之司。甘草粳米。和胃陰以生津。此一舉兼備。方下自註云。一劑知。二劑已知者。謂病已知其對症。已者中病當愈之稱耳。

鄧

寒少熱多。胸中痞脹。溫邪未解。設言止哉。淡黃芩

炒半夏

薑汁

生白芍

草菜

知母

烏梅

文 照前方去半夏。薑汁加蜜甲。

吳

間日寒熱。目黃口渴。溫邪兼而濕外薄為癥。

滑石

杏仁

白蔻仁

淡黃芩

半夏

鬱金

此非柴胡不可

暑症

又

飲食不節。腹中不和。瘧邪攻胃。

鮮首烏

烏梅肉

生鼈甲

黃芩

丹皮

草菓

知母

送保和丸二錢

又

人參

生穀芽

枳實汁

茯苓

廣皮

炒半夏麵

朱

舌黃煩渴。身痛心腹中熱躁暑熱不解。為瘧經言暑脈自虛皆受從前疫藥之累痺。

石膏

知母

生甘草

炒粳米

麥冬

竹葉

何

勞倦傷氣道淺傷陰。暑邪蠶瘡。識則煩冤。最盛分解使邪散輕。參朮葛附。皆固閉邪氣也。

草莢仁

知母

淡黃芩

川貝母

青蒿梗

花粉

馮

暑傷氣分。上焦先受河間法至精至妙。後醫未讀其書。焉能治病。臻致邪深則瘧來日遲氣結必胸中混

淡黃芩方

淡黃芩

川貝母

青蒿梗

花粉

湯

如瘧無形之熱。漸蒸有形之痰。此消導發散都是劫津無能去邪矣。

黃

脈數目皆黃。舌心乾白黃胎。口中粘膩。脘中痞悶。不思納穀。由於逐次暑風客邪。內侵募原營衛不和致

發瘧疾。夫暑必兼濕。濕也熱也。熱也氣也。氣與邪搏。則清濁交混。升降自阻。古稱濕遏必熱。自生矣。聖帝論病

本乎四氣。其論藥方推氣味理。必苦降辛通。斯散氣痞結可開。消導攻滯。香燥泄氣。置暑熱致病之因於不

治。不識何解。瘧邪而不以柴胡散少陽出入之邪。不知何解。

黃芩

花粉

桔梗

白蔻仁

鬱金

橘紅

六一散

又

苦降能驅熱除濕。辛通能開氣宣濁。已經見效。當減其製。仍祖其意。

川連

桔梗

白蔻仁

厚朴

茵陳

茯苓皮

銀花

白通草

胡

滑石

黃芩

厚朴

杏仁

通草

白蔻

半夏

瓜萎皮

知母

又 董芩

草菓

知母 半夏

生白芍

烏梅

汪氏微冷。熱多舌白。膀胱嘔惡。暑穢過暮原為瘧。

杏仁

鬱金

滑石

厚朴 董芩

炒半夏

白蔻仁

橘紅

某

舌白。膀胱寒起。四末渴喜熱飲。此濕邪內蘊。脾陽不主宣達。而成濕瘧。

厚朴

杏仁

草菓

半夏

董芩

廣皮白穢

廣皮

某二瘧止而浮漸及膀胱

苡仁

桑白皮

半夏

大腹皮

薑皮

廣皮

某間瘡寒熱俱微。此屬濕瘧。

杏仁

厚朴

桂枝木

飛滑石

草菓

炒半夏

董芩皮

綿茵陳

牛八寒來喜飲熱湯。發熱後反不渴。間瘡已四十日。今雖止不飢不思食。五味入口皆變。初病舌白乾嘔。濕邪中於太陰。脾絡濕鬱氣滯。喜熱飲暫通其鬱邪。蒸濕中生熱。六腑熱灼。津不運行。至大便鞭秘。此為氣壅濕結。當導氣緩調。令氣分清肅與脾約似同。但仲景氣血兼治。此病却專傷氣分。

炒黃半夏

半夏

生益智仁

綿茵陳

廣皮

厚朴

董芩

艾瘡止舌白不飢。大便旬日不通。此皆留邪堵塞。經脈隧道之流行。久延必致腹脹癰瘕。

杏仁

白蔻仁

半夏

厚朴

生香附

廣皮

董芩皮

接服半碗丸

橘紅

某脈右弦左弱。留邪未盡。大使粘稀。最防轉痢。較七八日前勢減一二。但去疾務盡。若半寒去其蘊伏而通

利小便亦不可少。

草菓

知母

厚朴

董芩

木通

滑石

曹身痛舌白。口渴自利。此濕溫客氣為瘧。不可亂投柴葛。仲景有濕家忌汗之律。

此真榮胡之症。

飛滑石

杏仁

鬱金

淡黃芩

白蔻仁

防己

又濕甚為熱。心痛舌白。便溏治在氣分。

竹方心

參冬

鬱金

菖蒲

鴟骨石

商工

乙辰年夏月

人參與柴
人參之疾
同用則
為托邪之
藥與肉桂
同用則為
溫補矣

陽虛

又 川連 淡黃芩 乾薑 半夏 人參 枳實

神氣稍清。痛處漸下至肺。濕傷在氣。熱結在血。吐咯帶血。猶是上行為逆。熱病瘀留。必從下出為順。

川連

黃芩

乾薑

半夏

人參

枳實

白芍

炒查肉

寒清上徹邪。不可謂遺泄而病。輒與溫補助邪。

半夏

人參

枳實

白芍

炒查肉

黃芩

知母

白芍

鬱金

裏皮

厚朴

杏仁

半夏

蓋汁

石膏

竹葉

甘草

麥冬

南棗

曹

知母

石膏

竹葉

甘草

橘紅

五味

半夏

麵

張

瘡家濕瘻

忌用表散

蒼朮白虎湯加草葉

沈

脈濡口渴餘熱尚熾

人參

知母

石膏

竹葉

甘草

橘紅

五味

半夏

麵

曹

寒從背起汗泄甚而無津澤。舌色仍白。邪未盡。正先怯心虛。煙霞恐亡。陽厥脫。議用仲景救逆法。加參

又

舌絳口渴。汗泄瘻來日安寒。熟過多。身中陰氣大傷。剛補勿進。議以何人飲

人參

當歸

肉桂

何首烏

孫

熱緩不欲食。津液受燼。當和胃生津

人參

炒白芍

知母

橘紅

五味

半夏

麵

半夏

生薑汁

茯苓

炙甘草

南棗

沈

陽微復瘻

桂枝

當陽

黃芩

防風

鹿角霜

薑汁

南棗

范

三勞瘻入陰。夏月陽氣發泄仍然。勞苦經營。以致再來不愈。用藥以辛甘溫理陽為正。但未易驟效取

人參

當歸

肉桂

炙草

川蜀漆

生薑

南棗

吳

人參

鹿茸

炒當歸

炙草

鹿角霜

官桂

薑甲煎丸

背寒

風邪未淨也

非溫補可禦

柴胡是
病主藥焉
根不得並
言

生白朮 厚朴 桂枝 附子 草菓仁 茯苓 人 照方去茯苓加人參炙草生薑。

程 寒熱經月不止屬氣弱留邪以益氣升陽 补中益氣湯 何以肯用柴胡

又 生鹿茸

鹿角霜

人參

歸身

茯苓

炙草

生薑

某氏建中法甚安。知營衛二氣交設。夫太陽行身之背。瘧發背冷。不由四肢。是少陰之陽不營太陽。此汗大泄而已矣。孰謂非柴葛傷陽之咎歟。議用桂枝加熟附子湯。人參桂枝湯熟附子

華氏二十歲天矢始通。面黃汗泄內熱外冷。先天既薄。瘧傷不復。內經謂陽維為病。苦寒熱剛雜無以振頤。四肢骨節疼痛。通入脈以和補調經可以却病。

淡蕪容 鹿角霜 當歸 川芎 杜仲 小茴 茯苓

顧氏進護湯方法。諸症已減。寒熱未止。乃久病陽虛。脈絡未充。尚宜通補為法。

人參 生鹿茸 當歸 紫石英 茯苓 炙草 煙薰

人參 生鹿茸 當歸 紫石英 茯苓 炙草 煙薰

大棗

又 經邪不必其熱。未止緣瘧久。營衛氣傷脈絡中空乏。屢進補法。僅能填塞。脈絡中空隙不能驅逐伏之邪。擬進養營法。役其養正邪自却之意。

人參 當歸 枳子 生白朮 茯神 桂心 灸草 遠志 煙薰 南棗

哀姪 脈弦緩。寒戰甚則嘔吐。噫氣腹鳴。溏瀉是足太陰脾寒也。且苦半寒。厚用不效。俱不對病。反傷脾胃。

人參 半夏 草菓仁 生薑

新會皮

醋炒青皮

又 靈樞經云。中氣不足。溲便為變。况老年人驚恐憂勞。深夜不寢。安寐遂致寒戰。瘧發當以病因而體貼。歸視其為內傷實。屬七八日瘧通。已屬非法。若云肺瘧。則秋涼可致。何傳及於冬令。小雪當以勞瘧補之。夫

勞必傷陽氣。宜乎四末先冷。瘧邪傷中為嘔惡腹鳴矣。用露薑飲。

又 陽陷入陰。必瞑目欲寐。寒則肉膝筋骨皆疼。其藩離護衛太甚。杳不知飢。馬得恩殘。老年人煩血氣充溢。

使邪不敢陷伏。古賢有取升陽法。嫩毛鹿角。人參。當歸。桂枝。炙甘草。此老諸家此理。竟也。守此

痘別制
痘耳入煎
痘方
見

又前謀勞傷陽氣當知內損邪陷之理。凡女人天癸既絕之後，其陰經空乏，豈但營衛虛偏之寒熱而已哉？溫脾胃及露蓋治中宮營虛，但畏寒不知熱為丸瘡。蓋丸為陰，身體重者亦是陰象。此辛甘理陽，鹿茸自督脈以煦之，非丸蓋附。但走氣分之剛暴，驅邪益虛，却在營分。奇經曰陽維脈為病發寒熱也。

火 鹿茸 鹿角霜 人參 當歸 淳桂 茯苓 灸草
正氣和營瘡已止。當小其製。人參 鹿茸 當歸 炒杞子 沙苑 茯苓 灸草
某 痘後脾腎陽虛，便溏畏寒，肢體疲倦，當防腫脹。

附子

白朮

茯苓

澤瀉

苡仁

生薑

大棗

大棗

大棗

某

陰瘡已亂汗多。桂枝 杜鵑 生黃芪 炙草 归身 五味子 煙蓋 大棗

某

脈沈舌白，呃或時時煩躁，向係陽虛，痰飲瘡發三次即止。此邪窒不能宣越，並非邪去病解。今已變病陰沴，痰濁阻塞於中，致上下氣機不相維續，症勢險篤，捨通陽一法，無方可擬。必得中陽流運，瘡症復作庶有愈機。波附子半錢 生草棗仁半錢 生白芍三錢 茯苓錢 生厚朴一錢 薑汁五分一劑。此冷香真武合劑。

某

生薑

大棗

大棗

大棗

某

伏暑冒涼，發瘡以羌防蘇，意幸溫大汗。汗多衛陽大傷，胃津亦被劫乾，致渴飲心煩無寐。診脈左弱右促，目微黃，酒必中虛，較少易於聚滯，甚熱勿謂陽傷驟補，倣內經辛散太過，當食甘以緩之。

大麥仁 火草 炒麥冬 生白芍 茯神 南棗

某

生薑

大棗

大棗

大棗

又 藥不對症，先傷胃口。宗內經辛苦急，急食甘以緩之。仲景謂之胃減，有不飢不欲食之患。議用金匱麥門冬湯，醒胃汁以開痰飲，仍佐甘藥，取其不損陰陽耳。金匱麥門冬湯，去棗米加茯神、橘核、稻根鬚。

又

脈右大，間日寒熱，目晝微黃，身痛。此平素酒濕，挾時邪流行，經絡使然。前因辛溫大汗，所以暫養胃口。今

脈症既定，仍從瘡門調治。草葉 知母 人參 枳實 黃芩 半夏 薑汁

牌

胃

項

瘡已過月，形脈俱衰，平素陽虛，虛則邪難解散，腹脹是太陰見症，治從脾胃。

瘡

門

調

治

從

脾

胃

陰虛

人參
參錢一半夏
錢二生於朮
錢二茯苓
錢二草茱仁
錢二淡薑
錢一

陳邪伏於裏。積久而發。道路已遠。未能日有。寒熱汗出不解。攻裏無謂。昔肛垂骨痛。必有濕痰阻隧。舌白不喜飲。治在太陰陽明。炒半夏。厚朴。

某遺泄損陰瘧熱。再傷陰聲嘶火升。乃水源不充易怒。神躁水不涵木之象。用何人飲佳。清陰火。

製首烏葛根附子散加附子

人參

天冬

麥冬

知母

茯苓

草茱

知母

薑汁

杏仁

某氏瘡已半年。今但微熱無汗。身弱自乳。血去傷陰。此頭痛是陽氣浮越。心痛如飢。哺熱都是陰虧。成勞若不斷乳。經去不至。為乾血。則服藥亦無用。

生地錢三

阿膠半錢

生白芍一錢

火麻仁四錢

麥冬半錢

大麻仁錢一

粗桂枝木三分

炙甘草四錢

川斛

火麻仁一錢

粗桂枝木三分

炙甘草四錢

某瘡後心悸氣促。便後有血。是熱入傷陰。用固本丸。加首烏阿膠。

人參

生地

熟地

天冬

麥冬

火麻仁一錢

粗桂枝木三分

炙甘草四錢

川斛

火麻仁一錢

粗桂枝木三分

炙甘草四錢

某陰液消亡。小溲短赤。皆瘧熱所傷。不飢不納。陰藥勿以過膩。甘涼養胃為穩。

人參

生地

天冬

麥冬

火麻仁一錢

粗桂枝木三分

炙甘草四錢

川斛

火麻仁一錢

粗桂枝木三分

炙甘草四錢

川斛

鄭自來陰虛。有遺泄瘧邪。更傷其陰。寐多盜汗。身動氣促。總是根本積弱。不主飲攝。此養陰一定成法。

熟地

生白芍

炒山藥

茯神

天冬

麥冬

火麻仁一錢

粗桂枝木三分

炙甘草四錢

川斛

火麻仁一錢

粗桂枝木三分

炙甘草四錢

張脈數瘧。來日連舌乾渴。飲積勞犯鬱內傷。居多致邪氣乘虛。漸劫陰氣。熱邪墜於陰。熱來小溲頻數。故汗

多不解。議清陰分之熱。以滋津液。

活體甲

知母

草茱

鮮生地

炒桃仁

花粉

桑葉

丹皮

花粉

蘿甲

知母

知母

翁脈左弦。暑熱朝涼汗解。渴飲在少陽。

青蒿

桑葉

丹皮

花粉

蘿甲

知母

知母

知母

知母

知母

知母

知母

沈尤用力失血。無非陽乘。攻絡瘧熱。再傷真陰。肌消食減。自述夏暑汗泄頭顱脹大。都是陰虛陽升。清火。皆苦

寒。未必能和身中之陽也。

蠶甲

生白芍

天冬

首烏

炙草

茯苓

澤泻

澤泻

澤泻

澤泻

澤泻

某氏瘡熱陽偏小。腹滿痛。

生地

龍甲

丹皮

知母

知母

知母

知母

知母

知母

知母

知母

知母

朱五齋久復陰傷承血 炒蕷六味加龜甲黃柏

熱邪
痞結

吳門陰瘧後內熱 清胃散

肺病
痞結

項陽氣最薄。暑入為瘧先由肺病。桂枝白虎湯氣分以通營衛為正治。今中焦痞阻冷飲不適。熱邪宜清胃陽亦須扶護。用半夏瀉心法。半夏 川連 薑汁 人參 枳實

王

汗出不解。

心下有形。

自按則痛。

語言氣室不爽。

瘧來鼻塞。

先寒邪結在上。

當開肺瘧。

醫是瘧治瘧。

馬得中

病桂枝

杏仁 火草

仲景真堅關瘧。

生牡蠣 黃芩

又 照前方去花粉加知母草葉

又 龜甲煎丸

一百八十粒

大杏仁 川桂枝

薑汁 薑花

桂枝白虎湯加杏仁

炒白芍

桑仁 茯苓

桂圓

桂枝白虎湯加桂圓

范脈寸大。汗出口渴。伏邪因新涼而發。間日瘧來。議治手太陰。

淡竹葉

大杏仁

滑石

花粉

淡黃芩

橘紅

金氏肺瘡脫開。

黃芩

白蔻仁

杏仁

青蒿梗

白芍

張姬暑風入肺成瘡。

淡黃芩

杏仁

滑石

橘紅

連翹

陳六冷暖不調。夜熱多汗。咳嗽忌葷腥油膩。可免府勞溫邪。如瘧當治手太陰。

麥冬

粳米

飛滑石

知母

火草

柳暑濕都傷氣分。不渴多嘔。寒起四肢。熱聚心胸。乃太陰瘧也。仍宜苦辛。或佐宣解裏熱之藥。

川連

炒半夏

枳實

白芍

薑汁

某寒起嘔痰。熟久不渴。多煩中焦之邪。仍以太陰脾法。

知母

炒半夏

桂枝木

煩躁甚。另用牛黃丸一丸。

葛瘧久舌白。泄瀉。太陰脾傷。肌肉微浮。宜補中劫邪。大忌消耗發散。

人參

茯苓

煨老薑

炙草

王脈濡不渴。嘔痰不飢。是太陰脾瘧。當辛溫以理中焦之陽。

生於朮

半夏

桂枝木

早服藍甲煎方

艾葉久舌白。泄瀉。太陰脾傷。肌肉微浮。宜補中劫邪。大忌消耗發散。

草莖

烏梅

桂枝木

早服藍甲煎方

某二寒起四肢。渴喜熱飲。屬脾瘧狀。尤當溫散。

杏仁

厚朴

草莖仁

知母

生薑

方少遞佐以通藥則無礙。

生於朮

桂枝木

炒常山

茯苓

生鹿角

人參半夏。

草莖

白芍

桂枝木

早服藍甲煎方

沈十脈濡寒熱瘧。日遲。腹微滿。四肢不暖。是太陰脾瘧。用露薑飲以升陽。

草莖

橘紅

黃芩

知母

生薑

丈太陰脾瘧必有寒滯。阻其運動之陽。所防久虛變幻。浮腫腹脹。人參未能多用。權以生朮代之。但與絡

桂枝木

炒常山

茯苓

生鹿角

生薑

金既成間日寒熱瘧。嘔吐痰涎。其瘧邪大犯脾胃。故不飢不食。脈仍虛。舌白。治在太陰。不必攻表。

人參半夏。

草莖

橘紅

黃芩

知母

生薑

厥陰
虛

人參錢

生薑錢

露一宿溫暖服

華

用勤藥瘧止。新冰瘧來陽邪失衛。外邪直侵入裏。試以瘧來不得汗邪。不從外解大著。

川桂枝 炮黑川烏 生白朮 炒黑蜀漆

全蝎 厚朴

薑汁丸

王五暑濕傷氣。瘧久傷陰。食穀項熱。愈加邪未盡也。病已一月。不飢不飽。大便秘阻。仍有潮熱。全是津液暗傷。胃口不得甦醒。甘寒清熱。佐以酸味。胃氣愈振。清補可搜。

杏仁 乾首烏

烏梅肉

知母 大麻仁

生白芍

既如邪未盡。方中何不卻邪。

高陰虛溫瘧。雖止而腰獨痛。先理陽明胃陰。俾得安靜。再商治歸。

北沙參

麥冬

木瓜

蜜水炒知母

大麥仁

烏梅

周舌白脈小。暑邪成瘧。麻黃劫汙。傷陽遂變經症。今痰鹹有血。右脇痛引背部。不知飢飽。當先理胃津。

大沙參

桑葉

麥冬

茯神

生扁豆

苡仁

楊高年瘧熱。刻胃汁透。不飢不飽。不食不便。渴不嗜飲。味變酸濁。藥能變胃方甦。

人參

川連

枳實

牡蠣

淡乾薑

生薑

徐脈數左寸。大關弦。瘧後食大草太早。胃氣受傷。不得下降。致痞悶惡心。瘦多。神躁大便不利。俱是腑氣不宣之象。擬進溫膽湯。法以和胃氣。

炒魚竹茹

炒焦半夏

草茱仁

生枳實

杏仁

橘紅

金斛

花粉

黃瘧後不飢咽即吐。此脘膈痰與氣阻。略不降。則不受納。做溫膽湯意。佐以苦味降逆。

鮮竹茹

松實

炒半夏

茯苓

橘紅

川連

苦杏仁

鬱金汁

李不飢口湧甜水。瘧邪未清。肝胃不和。

川連

乾薑

枳實

瓜萎仁

半夏

廣皮白 薑汁

又文口湧甜水。脾腫。川連。誰芩。厚朴。半夏。生乾薑。廣皮。煎送脾約丸。

肝胃

寒自背起衝氣由腋下而升。清涎上湧。嘔吐遂飢。不能食。此瘧邪深藏。厥陰邪動。必犯陽明。舌白形寒。勝都主胃陽之虛。然徒補鈍守無益。

人參

半夏

廣皮白

薑汁

川椒

烏梅

附子

生乾薑

方

先厥而瘧。蚊蟲下出。嘔逆腹鳴。脫瘻塞。

此厥陰瘧疾。勿得亂治。

川連

淡乾薑

薑汁

川桂枝

生白芍

烏梅肉

黃芩

秋露水煎

又

陽微寒勝疫。久不已理。冒陽以壯中宮。使四末之邪。不令徒犯脾胃。

人參

炒半夏

生薑

烏梅

草菓

炒常山

秋露水煎

又

辛酸雨和肝胃已效。

人參

草菓

生薑

生白芍

烏梅

炙臘甲

吳體豐色白。陽氣本虛。夏秋伏暑。挾疫飲為瘧。寒熱夜作。邪已入陰。冷汗頻出。陽氣益傷。今診得脈小無力。

舌白虛象已著。恐延厥脫之患。議進救逆湯法。

人參

龍骨

牡蠣

火草

桂枝木

炒蜀漆

煨薑

南棗

又
關產陽氣偏泄。今年久熱傷元。初瘧發散。不能去病。便是再劫。胃陽致邪入厥陰。昏冒大汗。思肝腎同屬。

下焦厥陽挾內風。冒厥吐涎沫。膠膜陽明。胃中久寒熱戕擾。空虛若谷。風自內生。閑醫藥不分。經辨症。但以

稱虛道實。宜乎鮮有厥效。但用仲景安胃泄肝一法。

人參

川椒

烏梅

附子

乾薑

桂枝

川連

生杜蠟

生白芍

又
諸症略減。寒熱未止。尚宜責陽明。泄厥陰為法。

人參

炒半夏

淡乾薑

桂枝木

茯苓

生杜蠟

炒黑蜀漆

又
天暮冷陽傷泄瀉。脈得左手似數而堅。口微渴。舌仍白。陰液既虧。飲水自耗。非熟識也。議通塞兩用。其

寒熱再緩。人參

淡附子

桂枝木

茯苓

生杜蠟

炒黑蜀漆

蔡惡建後食。舌乾脹。不飢不知味。宿多寐。少苔。由瘧汗。嘔逆。都令諸陽爻升。肺氣不降。則不會陽不升。督

則無邪。用屬內裏則火升心熱法當和胃陽平肝氣。月水而生。以常火氣有病者。

知母 北沙參 麥冬 新會皮

烏梅肉 新穀露冲

金玉強截瘧疾。裏邪居結心下水飲。皆嘔吐無餘。病在胃口之上。老年陽衰。防其呃厥。舍瀉心之外。無專方。

人參

枳實

乾薑

半夏

川連

黃芩

新穀露冲

又舌白氣衝心痛。愛噫味酸。嘔吐涎沫。皆胃虛肝乘。倣仲景胃中虛客。氣上逆。可與旋覆代赭石湯。

旋覆花

代赭石

人參

半夏

茯苓

薑汁

粳米

又諸恙向安。寢食頗逸。平昔肝木易動。左脈較右脈弦長。味變酸。木侮土。秋前宜慎。

人參

半夏

黃芩

廣皮

生穀芽

生白芍

新穀露冲

馬瘡半月不止。左脇下已有瘧母。寒熱時必氣痞嘔逆。乃肝邪乘胃。有邪陷厥陰之象。擬進瀉心法。

川連

乾薑

半夏

生穀芽

人參

枳實

朱女厥陰衝氣。上攻眩暈間瘧。安胃丸三錢。椒梅湯送。

陳氏瘧母是瘧邪入絡。與血氣扭結。必凝然不動。今遇冷勞怒。衝氣至膀胱必嘔逆。必三日氣降痛緩。而後水飲得入。此厥逆之氣由肝入胃。衝脈不和。則經水不調。

延胡

川棟子

半夏

蓬朮

蒲黃

五靈脂

薑汁

韓二瘧不止。欲吐。

炒半夏

厚朴錢

青皮一錢

炒焦知母錢

草莖仁一錢

橘紅錢

臨服調入薑汁一錢。

吳背寒瘧來漸晏。邪有入陰之意。此伏邪不肯解散。都因久積煩勞。未病先虛也。飲水少腹。如墜膀胱。居中瘡結不舒。中焦屢受邪迫。陽氣先已餒弱。議雨和太陰陽明法。

草莖

知母

半夏

厚朴

薑汁

烏梅

黃芩

花粉

又進雨和陰陽。寒熱已止。診脈右濡明是氣衰。宜和胃生津。使餘邪不攻自散。

人參

知母

災龍甲

生白芍

烏梅肉

大麥仁

炒丹皮

又 脈左數舌絳暮渴

炒麥冬

人參

首烏

白芍

丹皮

茯神

另更衣丸二錢

陸六口瀉清涎不飢不食

寒氣邪氣交會中食脾胃日困

半夏

大半夏湯加草藥烏梅

火

炒常山

草藥

烏梅

凌三瘡久脾胃氣傷不食倦怠半年不肯復元論理心用參朮益氣但貧窘不能久用然久延不醒偶腹滿浮腫便難調治

白朮朮加砂仁末

某三瘡邪由四末以擾中宮脾胃受傷無疑但寒暑更遷病邪既久臟腑真氣自衰兩年來納穀不運漸覺衰微

不耐風冷之侵並無凝痰聚氣見症此心胸中宗氣自餒致清陽不司轉運當以仲景苓桂朮甘湯

又 六君子湯去甘草加檀香泥桂枝木

吳 瘧已復瘡漏濁淋痛痒年脾瘡食物不慎色黃腹腳有滯脾胃愈良東垣云中氣不足溲便乃變初秋交

冬迷加反覆久則五疳發癥當慎於食物令脾胃氣靈可致宗脾胃論升降疏補法

人參

茯苓

炙草

廣皮

使君子

神曲

查肉

麥芽

澤瀉

祝此瘡傷陽氣更感冷熱不正之氣身熱無汗肢冷腹熱自利舌灰白微嘔顯然太陰受病

診脈小右濡不

飢入夜昏譖語但如寐不加狂躁論脾為柔臟體陰用陽治法雖多從未及病當遵前輩冷香縮脾遺意

人參

益智仁

茯苓

新會皮

生厚朴

苡仁

木瓜

砂仁

又 脈右弦來去不齊左小弱舌邊紅舌心白黃微綿鼻冷四肢冷熱時微渴不飢不思食前議太陰脾臟受病瘡邪從四末乘中必脾胃受病鼻單四肢皆冷是陽氣微弱因病再傷竟日不暖但形肉消瘦不敢剛

刦攻邪以宣通脾胃之陽在陰伏邪無發散清熱之理

人參

草藥

炒半夏

生薑

茯苓

新會皮

蒸烏梅肉

二帖後加附子後又加牡蠣

吳江瘡傷脾胃腹中不和脈右澀食入脹甚前方通調氣血佐以泄水服之續滯既下痛隨利減仍宜制木安

陳四瘧邪由四末以擾中。皆陽明厥陰界域。陽明衰則厥陰來乘。津液少。斯內風必動。首脅以麻屬氣虛。本是濕痰敗血。今亥頻熱行走。淋汗顯然。液虛陽動。風生脂液不得灌潤。肢末非濕痰氣分之患。

冬桑葉九錢

熟首烏

黑芝麻

柏子仁

茯神

當歸

杞子

菊花炭

蜜丸

李

脈左弦

嘔吐發熱後

脫中

瘧悶不爽

宜慎

口腹清肅

上中二焦

不致再延

成瘧

進苦辛法

杏仁

欒金

山梔

豆豉

白蔻

枳殼

孫

高年發瘧

寒熱夜作

脚悶不欲食

煩渴熱頻

最慮其邪陷為厥

進陽旦法

桂枝

黃芩

花粉

生白芍

生左牡蠣

生牡蠣

煨薑

南茱

姬

瘧脈沈濁

中脫疼結

此屬裏症

用瀉心法

半夏

川連

橘紅

松實

黃芩

生薑汁

文

脈沈右關大

瘧未止

寒熱子後

作煩渴中悶不欲食

醋炒半夏

杏仁

黃芩

花粉

生薑

葛葉

生薑

陸

瘧載虛氣痞結

成身癟

桂枝

炒魚半夏

薑汁

廣皮白

當歸

茯苓

錢氏

暑熱傷氣成瘧

胸膈痞結

嘔吐痰沫

皆熱氣之結

前醫瀉心法極是

人參汁

枳實汁

黃連

黃芩

炒半夏

杏仁

厚朴

薑汁

汪

此濕熱與水穀交蒸

全在氣分

嘗稱三焦分消清解

既成間日瘧疾

邪正互爭

原無大害

初誤於混指傷

寒六經再認於參尤守補

致邪滯漫神昏喘急

妄譖痘瘡皆邪無出路

內附則外脫求其協熱下利已不可得

診脈細濁按腹脇滿

夫脾滿屬氣燥實在血

今洞利後而加腹滿

諸氣皆結豈非閉塞而然

潰敗決裂至

此難望挽救

細葉菖蒲根汁

二草茱仁

茯苓皮

紫厚朴

綿茵陳

辰砂益元散

連翹心錢

金銀花錢

另用牛黃丸一服

用涼開水緩緩以茶匙挑化服

潘氏

伏邪發熱厥後成瘧

間日一至

咳嗽痰多惡心中痞

其邪在肺胃之絡

擬進苦辛輕劑

杏仁

黃芩

半夏

橘紅

白蔻

花粉

程氏脈右大寒熱。微嘔脫瘻。不納四末。瘡邪交於中宮。當苦辛泄降。

酸苦泄熱。邪勢再減二三。必從清補可愈。

川連

炒半夏

薑汁

黃芩

知母

草藥

炒厚朴

烏梅肉

毛氏用玉女煎。寒熱未已。渴飲仍然。嘔惡已減。周身背痛。診脈兩手背數。舌色灰白。邊赤汗泄不解。擬用酸苦泄。其在裏熱邪務以瘡止再調體質。

黃芩

黃連

草藥

白芍

烏梅

知母

用秋露水煎藥

又寒邪由四末以擾中宮。胃口必當其戕害。熱悶不飢。胃傷邪留。清熱利便。固為要法。但有年氣弱。兼之病經匝月。清邪之中。必佐補正。議半夏瀉心法。人參半夏。黃連黃芩。枳實薑汁。

陳方勞瘧再發。人參草藥生薑烏梅。秋露水煎。又補中益氣湯。加草藥知母薑棗。

絡虛則痛。陽微則脹。左脇有痞。母邪留正傷此勞瘧。

人參

當歸

肉桂

焦朮

炙草

茯苓

廣皮

生薑

南桑

四劑後用五苓散一服

某瘡未止。熱陷下痢。中痞不欲食。

人參

川連

黃芩

生白芍

廣皮

炒當歸

炒山楂

乾薑

枳實

銀花

又瘡後勞復

人參

當歸

白芍

棗仁

茯神

廣皮

生薑

南桑

范三脈小濫。

病起瘡後。食物不和。仍誦讀煩勞。遂至左脅連及少腹。常有厥起。或攻胃脘。或聚腹中。凝着腹脰。古語云。脈不離乎肝膽。亦猶咳不離乎肺也。蓋肝得邪助。木勢張揚。中土必然受侵。本氣自怯。運納之權。自然清陽既少。展舒。濁陰日踞。漸為痞滿。上年溫養。卒甘久進。未見病去。其治體之法。諒不能却。自述靜處病加煩動。小安其為氣血久阻。為鬱。議用通絡法。以病根由瘡久邪留絡。中耳。

凝結

瘀血

癰瘍

瘻瘍

萬 痘熱既多。邪入於絡。絡屬血分。汗下未能逐邪。仲景製龍甲散。大一湯。桂枝湯。內當保之。月二十六日。山房。

早午暮各服七粒。

某 瘡邪經月不解。邪已入絡。絡聚血邪。攻則血下。究竟寒熱煩渴。目黃舌膩。渴亦短少。全是裏邪。水清。凡腫

瘡。宜禁疏食。不助邪壅。閏醫藥柴葛攻表。消導通便。與瘡無與。

用仲景龍甲煎。尤朝十粒。午十粒。黃芩十粒。開水送下。

費 瘡邪迫傷津液。胃減不飮。腸燥便紅。左脇微堅。有似瘡母結聚。當宣絡熱。以肅餘邪。

生地

知母

丹皮

麻仁

生龍甲

某 氏瘡邪內陷。變成陰瘡。久延成勞。務以月經通瘀。不致邪劫乾血。

生龍甲兩

桃仁錢三

炒丹皮錢一

穿山甲錢三

查內糴

生香附錢半

夏枯草

顧 左脇有瘡母。乃氣血交結之故。治宜通絡。

龍甲

桃仁

金鈴子

牡蠣丹皮

江 遠谷水土各別。胃受食物未和。更遭嗔怒。動肝木犯胃土。瘡僵腸中有形瘕聚。三年宿恙。氣血暗消。但久

必入血。湯藥難取效。宜用緩法以疏通其絡。若不追拔。致陽結陰極。釀成噎膈難治矣。

生龍甲

桃仁

麝香

蘆薈

生白根粉

歸鬚

郁李仁

冬葵子

慈骨

吳凹瘡及反覆左脇瘡母。

生龍甲

生牡蠣

炒桃仁

當歸鬚

炒延胡

柴胡梢

桂枝木

炒查肉

青皮

某 夏秋濕熱。瘡癰正虛邪留混。入血絡結成瘕瘕瘡母。夫濕氣熱氣本屬無形。醫治非法。血脈蘊邪。故寒熱間發。仲景立法。務在緩攻。急則變為中滿。慎之。兼服龍甲煎丸。

知母

草葉

半夏

黃芩

烏梅

生蓋

秋露水煎

金牛經年老瘡。左脇已結瘡母。邪已入絡。與氣血交結成形。區區表裏解散之藥。焉得入絡通血脈。攻堅。佐以辛香。是絡病大旨。生牡蠣錢。歸鬚錢。桃仁錢。桂枝伍錢。炒蜀漆錢。公丁香三粒。

三日
瘡陽
虛

某人少陰三瘡已久。當升陽溫經。鹿茸 熟附子 人參 麝桂枝 寶歸 炒黑蜀漆
呂呻陰瘡一年方止。羸瘦妨食。食入不運。不飲湯水。四肢無力。診脈微弱。不鼓。屢進六君益氣無效。當溫其裏。

通陽從火生土意。

人參

熟附子

生益智

茯神

白芍

生薑

南棗肉

生薑

炒黑蜀漆

炒黑蜀漆

吳一三瘡愈後。反覆寒多。有汗勞則陽泄。致瘡。議護陽却邪。

川桂枝

熟附子

生於朮

生薑

桂枝木

當歸

炙甘草

大棗

烏梅

烏梅

肝胃
心肺
虛

試看後期。瘡至何如。

蔡氏三日瘡。一年有餘。勞則欲發。內熱素有結癥。今長大攻走不定。氣逆欲嘔酸。經閉四載。當燮陰陽明同治。

半夏

川連

乾薑

吳萸

茯苓

桂枝

白芍

川椒

烏梅

蔡三五三瘡不飢不納。惡心渴喜熱飲。診脈沈細。脾陽困頓。不能運邪外出。治以四獸飲。

沈二三瘡腹脹不渴。嘔水邪在脾胃之絡。溫疎裏邪。勿用表散。

草葉

麝桂枝

生薑

厚朴

炒蜀漆

茯苓

又溫脾通胃得效。

生於朮

炭附子

川桂枝

炒黑蜀漆

厚朴

生薑

厚朴

生薑

烏梅

某四五三瘡經年。至今復受濕邪。及發日來。舌白脫閣。渴喜熱飲。當溫太陰。

杏仁

草葉

知母

桂枝

半夏

生薑

厚朴

烏梅

詹二三瘡脾發。用露蓋法。寒止熱盛。加入烏梅五分。取其酸味。以和陰。謂其瘡久陰亦傷耳。

胡陰瘡滯傷脾胃。用苦辛溫得效。瘡未已。腹脹便血。議理中陽。

人參

益智

木香

茯苓

厚朴

廣皮

生薑

錢正遇勞瘡發數年初起即三陰。此傷損已在臟陰之絡。最難速效。甘溫益氣。久進益氣湯。

某三三瘡早截中陽空塞膀胱不運背寒股冷

草葉仁
杏仁

半夏

桂枝

廣
良

卷之三

某脈濱面黃舌白脫中格拒湯水腎區三日瘡一至據色診脈乃足太陰陽微飲結當以溫藥和之
李初病勞倦膚熱投東垣益氣湯未嘗背諉而得湯反劇聞聲氣穢間日瘡來渴思涼飲此必暑邪
半夏草根草蔻厚朴薑汁
草根草蔻厚朴薑汁
草根草蔻厚朴薑汁

初病

卷之三

益氣湯

說而得

卷一百一十一

日瘡

初病勞倦肺熱投東垣益氣湯未嘗背諱而得湯反劇。間設氣機間日瘧來渴思涼飲此之暑邪內伏致營衛週流與邪觸者為寒熱分爭矣。故甘溫益氣升舉脾臟氣血與暑熱異歧。胃中熱灼陽上愈燥上脫不納腸結便閉其初在經在氣其久入絡入血由陽入陰間日延為三瘧。奇脈蹠雖皆被邪傷內經謂陽維為病苦寒熱也。維為一身綱維故由四肢寒凜而起但仍是脈絡為病故參芪尤附不能固陽以益其虛歸桂地芍無能養營以却邪矣。昔軒岐有刺瘡之旨深慮邪與氣血混成一所汗吐下無能分其邪耳。後漢張仲景推廣聖經蘊奧謂瘡邪經月不解勢必邪結血中有癥瘕痞塊之累。瘡變方鼈甲煎丸方中大意取用虫蟻有四意謂飛者升走者降靈動迅速追其沈混氣血之邪蓋散之不解邪非在表攻之不驅邪非著裏補正却邪正邪並樹無益故聖人另闢手眼以搜剔絡中混處之邪治經千百歷有明徵服十二日平支一週尚未全功當以升其八脈之氣由至陰返於陽位無有不告安之理。

某陰瘧兩月或輕或重左脇按之瘧痛邪伏厥陰血絡恐結瘧母議通絡以逐瘧邪用仲景鼈甲煎丸早服三十粒當寒熱日勿用。

昌曰三瘡皆邪入陰絡故汗下為忌經年瘡還發瘕瘍母仍聚李腸邪攻血氣之結攻逐瘀聚升降以通陰陽乃仲景成法但診脈細微食減神衰攻法再施恐擾中滿前與溫補通陽頗安然守中之補姑緩為宜

當歸

淡附子

淡乾蓋

卷

卷三

八

人參

諸瘧由伏邪而成非旦夕之因為患也六淫之氣惟燥不能為害而新涼收束實屬有_{卷之三}_{考證}關考之聖訓獨手三陽手厥陰却無其症名醫者但辨其六氣中所傷何氣六氣中病涉何經若小柴胡專主少陽竟能兼

瘦母

凝氣
燄血

自歸於深
算之中矣
嗚呼其自
歸固不足
惜而當時
多集荼毒
者試何罪
古聖凡一
病必有一主
方如瘧疾小
禁胡湯主方也
此方有病者
以此方治之
則不犯也此
老決不妄用
人傳余謂此
老此今不主
此方此亦不主

括也夫溫瘡瘍瘍食瘡瘍諸瘍皆有成形平不復贅但此症春月及冬時間有惟夏秋暑濕為患者居多暑必挾濕而傷氣分第一要分別其上焦中焦之因暑濕二氣何者為重若暑熱重者耑究上焦肺臟清氣瘧來時必熱重而寒微唇舌必絳赤煩渴而喜涼飲飲多無痞滿之患其脈色自有陽勝之候當宗桂枝白虎法及天水散加辛涼之品為治若濕邪重者當議中焦脾胃陽氣瘧來時雖則熱勢蒸燔舌必有粘膩之苔渴喜暖湯胸脘覺痞脹嘔惡其脈色自有陽氣不舒之情狀當示正氣散及二陳湯去甘草加杏蔻生薑之類主之必要陽勝於陰而後配和陽之劑日後方無貽累倘症未雨乘則兩法兼之可也大凡是症若邪氣輕而正不甚虛者寒熱相等而作止有時邪氣重而正氣法者寒熱模糊來勢必濕而不分又云邪淺則一日一發邪稍深則間日一發邪最深則三日一發古稱為三陰大瘧以肝脾胃三臟之見症為要領其補濕寒溫亦不離仲景治三陰之法為根蒂可知陽經輕淺之方治之無益也所云移早則邪達於陽移晏則邪陷於陰陰勝陽復於此可參若久而不已必有他症之處太陰之虛浮脹滿有通補之理中法開腑之五苓湯少陰之痿弱成瘻有滋陰之復脈湯溫養之并奇法厥陰之厥逆吐蛔及邪結為瘧母有烏梅丸與蠶甲煎法又如心經瘧久勢必動及其營則為煩渴見紅之累肺經瘧久理必傷及其津則為胃秘腸痺之候一則涼陰為主一則清陰為宜然而瘧之名目不一而瘧之兼症甚多若不達權通變而安能一一盡善即如暑濕格拒三焦而嘔逆不納者宗半夏瀉心法穢濁蒙蔽膻中而清靈昧甚用牛黃清心丸心陽暴脫有龍蠅之救逆胃虛嘔逆有旋覆代赭之成方如表散和解通陽補氣滋陰化營搜邪入絡動藥劫辛酸雨和營氣並補及陽瘧之後養胃陰陰瘧之後理脾陽之法已全備矣臺集諸家融通無拘所謂用藥如用兵先生不愧良工之名也卽新甫

皆依樣畫葫蘆之談

溫周

因長夏濕熱食物失調所謂濕多成五泄也先用胃苓湯分利陰陽。胃苓湯去甘草。

長夏濕勝為瀉腹鳴溺少腑陽不司分利宜用厚溫和中。胃苓湯

泄瀉

此老之離經
經道真出人意表
者矣夫柴胡為少陽經之主方

凡寒熱往來之症亦佳是夏秋調攝最宜加意擬夏秋應用方備採天暖氣蒸南方最有中病痞脹諸恙
觸入穢邪遂令脾胃不和是夏秋調攝最宜加意擬夏秋應用方備採天暖氣蒸南方最有中病痞脹諸恙
未受病前心懷疑慮即飲芳香正氣之屬毋令邪入為第一義

藿香梗

白蔻仁

橘紅

桔梗 杏仁

鬱金

降香

厚朴

夏至後熟勝濕蒸氣傷神倦用東垣益氣湯若汗出口渴兼生脈散飲液

某

秋暑穢濁氣從吸入寒熱似瘧上咳嗽下洞泄三焦蔓延小水短赤議芳香辟穢分利滲濕

藿香 厚朴 廣皮 茯苓塊

甘草 猪苓 澤瀉 木瓜

滑石

檀香汁

丈

進藥稍緩所言穢濁非臆說矣其陰莖震腫是濕熱甚而下墜入腑與方蓄莖歇症有間議河間法

藿香 厚朴 杏仁 滑石

甘草

猪苓 澤瀉

木瓜

滑石

檀香汁

絲瓜葉

某

陰瘡久傷成損候不能臥脊強脈壅足跗浮腫乃督脈不用漸至僵廢兵近日暑濕內侵泄瀉先宜分利和中 厚朴 藿香 廣皮 茯苓 澤瀉 木瓜 炒扁豆 炒查肉 炒砂仁

蔡二氣短少續為虛近日腹中不和泄瀉暑傷先以清暑和脾預防滯下

厚朴 廣皮 炙草 茯苓 澤瀉 木瓜

炒扁豆

麥芽

炒查肉

砂仁

又香砂異功散

葉五平素操持積勞五志之火易燃上則鼻竇堵塞下有肛痔漏紅冬春溫邪是陽氣發越邪氣乘虛內伏夫其色黃赤紫膿小便不利必隨大便而稍通此腎闕樞機已廢二腸陽腑失司所進水穀脾胃不主運行釀濕墜下轉為瘀腐之形正當土旺入夏脾胃主氣此濕熱內滯由乎脾胃日傷不得明理之醫一誤再誤必致變現腹滿矣夫左脈之緩濇是久病陰陽之損是合理也而右脈弦大豈是有餘形質之滯即仲景所云弦為胃減大則病進亦由陽明脈絡漸弛腫自下而上之義守中治中有妨食滋補之弊主旨中宜運通下宜分利必得小溲自利腑氣開闢始有轉機若再綿延月餘夏至陰生便難力挽矣四苓加椒目厚朴益

不不出莫煎一日其塊等誤者如不用其塊怪事也此老之離經道真出人意表者矣夫柴胡為少陽經之主方仲景用柴胡之處最最當論多傷寒論東坡之柴胡有數論他見一症便是不必急其推求胡此老偏與聖人相背猶不用柴胡譬如此不計用程陽症此必許用葛根此有名長人無如老名醫而有此等誤者真天下之怪事也

智廣皮白

又服分消方法。五日瀉減，渴適足跗浮腫未消。要知脾胃久困，濕熱滯濁無以運行。所進水穀其氣蒸變為濕，濕勝少成五瀉。欲使濕去必利小便，然滻利太過，望六年歲之人。又當慮及下焦久病，入夏正脾胃司令時候，脾臟宜補，則健胃腑宜疏，自清扶正氣驅濕熱乃消補兼施治法。

晚服資生丸炒米湯送下

脾

人參 廣皮 防己 厚朴

茯苓

生木 澤瀉 神妙

黃連

吳萸

濕熱

朱

口腹不慎

濕熱內起，泄瀉復至此，濕多成五瀉。氣瀉則腹脹矣。

人參

茅术

川連

黃芩

白芍 廣皮 茯苓

澤瀉

神妙

澤瀉

查肉

陳

脈緩大腹痛

泄瀉

小溲不利

此水穀內因之濕變

蒸腸胃致

清濁不分

若不清理分消

延為積聚

粘膩滯

下議用苓芍湯

淡黃芩

生白芍

廣皮

茯苓

澤瀉

厚朴

蒼朮

豬苓

張脈緩

腹滿痛瀉不爽

氣鬱滯久

濕凝在腸

用丹溪小溫中丸

針砂

小川連

蒼朮

白朮

香附

半夏

廣皮

青皮

神妙漿丸

程診脈肝部獨大

脾胃緩弱

平昔納穀甚少

而精神頗好

其先天充旺

不待言矣

目今水瀉

少腹滿脹

少腹

為厥陰肝位

由陰陽不分

濁踞於下

致肝失疏泄

當以五苓散導水利濕

倣古急開支河之法

黃久瀉兼發瘡癰

是濕勝熱鬱苦寒

必佐風藥合乎東垣

脾宜升胃宜降之旨

人參

川連

黃柏

廣皮

炎草

生於朮

羌活

防風

升麻

柴胡

神妙

麥芽

朱三形瘦尖長

木火體質

自土年泄瀉

累用脾胃藥不效

此陰水素虧

酒食水穀之濕

下墮陰弱

不能包涵所

致宜苦味堅陰涼滲勝瀉

炒川連

炒黃柏

厚朴

廣皮白

茯苓

猪苓

澤瀉

炒查內

凍

寒濕已變熱傷

六腑為虛為瀉

某三酒濕內聚。痰飲餘濕下注五泄。常用一味茅术丸。

炒半夏

茯苓

苡仁

利蒺藜

新會皮

王氏頭脹喜冷。飲咳嘔心中脹。泄瀉不爽。此為中暑。故止瀉血藥。更甚舌色白。議清上焦氣分。

石膏

淡黃芩

炒半夏

橘紅

厚朴

杏仁

王氏自春徂冬。瀉白積至今。腹痛小水不利。想食物非宜。脾胃水寒偏注大腸。當分其勢。以導太陽。胃苓湯主之。

胡二三瘧劫截。不效。必是陰臟受病。血熱渴食入不化。痛瀉二者相反。思病延已久。食物無忌。病中勉強進食不能克長精神。即為滯濁阻壅。先以脹瀉調理。不必以瘧相混。

草薢

厚朴

陳皮

木香

大腹皮

猪苓

澤瀉

郁八

經營勞心。納食違時。飢飽勞傷。脾胃受病。脾失運化。夜屬陰晦。至天明洞瀉。粘膩食物。不喜脾胃。惡食柔潤之物。五苓通膀胱。分泄濕氣。已走前陰之竅。用之小效。東垣謂中氣不足。瀉便乃變。陽不運行。瀉多成五泄矣。人參

白朮

茯苓

炙草

炮薑

肉桂

某八

形寒便瀉舌苔

厚皮

廣皮

半夏

桂枝木

生薑

程氏

寒濕腹痛惡泄一瀉

厚朴

藿香梗

益智仁

廣皮

炒茅术

煨木香

火茶

澤瀉

吳氏

寒凝胃陽。腹痛泄瀉

草薢

厚朴

茅朮

廣皮

吳萸

炒查肉

程氏

瀉後腹脹

人參

生薑

炮薑

茯苓

厚朴

廣皮

砂仁

陸姬氣滯為脹。濕鬱為瀉。主以分消。

炒厚朴

大腹皮

茯苓

澤瀉

煨益智

廣皮

炒查肉

某氏

雨濕涼氣乘於脾胃。

泄瀉之後。腹脹減食。宜健中運瀉。

焦白朮炭

厚朴

廣皮

生薑芽

炒扁豆

木瓜

澤瀉

茯苓

程女濕鬱脾陽腹滿肢冷泄瀉。四苓散加厚朴廣皮。

鄭姬濕傷泄瀉。小便全少。腹滿欲張。舌白不飢。病在足太陰。脾濕中。佐火分利。

生茅朮 厚朴

草葉

廣皮

茯苓

猪苓

澤瀉

炒砂仁

又 早服真武丸。薑送二錢五分。

一兩 夜服針砂九。開水送一錢五分 六錢

又 人參 附子 桂實

茯苓

乾薑

生白芍

廣皮

羌活

獨活

防風

澤瀉

某氏脈沉緩。肌肉豐盛。是水土烹質。陽氣少於運行。水穀聚濕。布及經絡。下有重著。病痛食稍不運便易

泄瀉。經水色淡。水濕交混。總以太陰脾臟調理。若不中窩恐防脹病。

人參 茯苓 白朮 火草

廣皮

羌活

獨活

防風

澤瀉

倪六陽傷濕熱。便溏足腫。粗桂枝

生白朮

木防己

茯苓

澤瀉

又 腹緊足腫。便溏陽微。濕聚氣不疏暢。怕成單脹。

照前方加茵陳

又 夏晨泄股腫。生白朮

桂枝木

淡附子

茯苓

澤瀉

陸一當脾動氣。子夜瘕泄。晝半自止。是陽衰寒濕。互凝腑陽不運。每瀉則脹減。宜通不宜瀉。

製川烏

生茅朮

茯苓

木香

厚朴

廣皮

朱 消渴乾嘔。口吐清涎。舌光赤瀉。濕熱病四十日不愈。熱邪入陰。厥陽犯胃。吞酸不思食。久延為病。傷成勞。

川連

烏梅

黃芩

白芍

人參

諤子皮

陶氏病由春木正旺。中焦受剋。先泄瀉。繼以腹痛。小便不利。食不思納。皆是六腑不和所致。夫胃為陽土。肝屬陰木。腑宜通肝。宣柔耳涼。治胃必主泄肝。制其勝也。閑方呆補。不知臟腑陰陽。故辨及之。

泡淡黃芩 炒小川連

炒廣皮

厚朴

生白芍

炒烏梅肉

猪苓

澤瀉

楊一因驚而瀉。腹痛欲嘔。是為眩厥。當用酸苦。忌追甜物。

川連

波乾姜

金鈴子

延胡索

桂枝木

生白芍

炒半夏

人參

枳實

茯苓

炒烏梅肉

潘

入夜咽乾欲嘔。食納腹痛即瀉。此胃口大傷陰火內風劫脾津液。當以肝胃同治。用酸甘化陰方。

人參半
焦白芍三
阿子皮放
炙草五分

陳倉米三
又去陳米加南棗一枚

丈

咽乾不喜湯飲。腹鳴漏瀉。五液消爍。虛風擾於腸胃。

人參

木瓜

焦白芍

赤石脂

炙草

朱

經月減食。泄瀉下焦無加以扶土泄木法。

人參

焦朮

炒益智

茯苓

木瓜

廣皮

炙草

廣皮

某

病後陰傷作瀉。烏梅

白芍

炙草

廣皮

茯苓

荷葉

王

霍亂後泄瀉已緩。心中空洞。肢節痿弱。此陽明脈虛內風門熱。蓋虛象也。

異功參水加烏梅木瓜白芍。

丈

上吐下瀉之後。中氣大虛。身痛肢浮。虛風內動。以補中為法。

異功散加木瓜葛根。

某

腹鳴長泄。頭眩脫瘡。形質似屬陽不足。診脈小弦。非二神四神溫固之症。蓋陽明胃土已虛。厥陰肝風震動。內起久病而為飧泄。用甘以理胃酸以制肝。

人參

茯苓

烏梅

炙草

廣皮

木瓜

沙苑綠餅

某頭痛目眩。黎明腸鳴泄瀉煩心。必日刻痛流淚。是木火生風。致脾胃土位日成姑議。泄木安土法。

人參

半夏

茯苓

桑葉

丹皮

桑葉

徐公自春來。胸腹脹滿。以及腹中疼痛。從治肝小愈。腹鳴泄瀉不止。久風飧泄。都因木乘土位。東垣云。治脾胃

必先治肝。微此。人參

焦朮

炙草

木瓜

烏梅

沙苑綠餅

扶土制木法

葉左腸氣脹在皮膜之裏。此絡脈中病也。泄肝破氣。久服脾胃受困。而為泄瀉。得養中小愈然。以藥治藥服。

絡之病仍在

半夏 桂枝 茶芩 遠志

人參 归鬱

木瓜 炒烏梅

橘紅 蓼藥湯泛丸

附方真龍隱叶風

桂枝 茶芩 木瓜 炒烏梅 炒毫綠子

張姬腹鳴膜脹清長瘕泄先以熄肝風安脾胃風又泄肝醒胃方吳萸

生白芍

炒烏梅

人參 茶芩

木瓜 炒烏梅

橘紅 蓼藥湯泛丸

陽虛脾虛某脈右弦腹脹鳴响痛瀉半年不瘥此少陽木火鬱傷脾土久則浮腫脹滿法當疏通泄鬱非草溫燥熱可治

黃芩 白芍

桑葉 丹皮

柴胡 青皮

附子 乾薑

白朮 茄蘆巴

厚朴 鎏金

大黃分

趙農泄難忍臨晚稍可甯而易飢善食仍不易消磨其故在乎脾胃陰陽不和也讀東垣脾胃論謂脾胃宜升則健胃而降則和援引升降為法

人參 生於木 炮附子 炙草 炒歸身 炒白芍 地榆炭 壘葛根 壘升麻 炮薑炭

厚朴 鎏金

廣皮 銀

製大黃分

又 腸風鳴震泄利得緩猶有微痛而下都緣陽氣受傷垢滯永不不清楚必以溫通之劑為法

生茶末 銀 炙草分 生地附子 銀 厚朴 鎏金

廣皮 銀

製大黃分

金八能食不化腹痛泄瀉若風冷外犯肌肉著冷其病頃刻即至上年用石膏安腎丸初服相投兩日不效知是病在中焦不必固下矣自述行走數十里未覺脹倦痛處繞脅議用治中法足太陰陽明主治

生於木 生薑末 生益智 淡乾薑

胡蘆巴 茶芩

木瓜 茶樹

茱萸

王五三年久損氣怯神衰此溫養補益皆護元以冀却病原不藉半桂附烹熟以劫陰泄今胃減咽乾大便溏泄經月夏三月脾胃主候宜從中治

人參 炒白芍 炙草 壘葛 炒木瓜 茶芩

廣皮

製大黃分

茱萸

橘紅 蓼藥湯泛丸

金 冲年遺恙先天最壅夏秋癰傷食少不運痞脹滯瀉都是脾胃因病致虛當薄味調和進治中法

人參 益智 廣皮 茶芩 木瓜 炒澤瀉

茱萸 壘葛

橘紅 蓼藥湯泛丸

附方真龍隱叶風

桂枝 茶芩 木瓜 炒烏梅 炒毫綠子

脾虛

陽虛

李氏脉沉形寒腰痺章強腹鳴有形上下攻觸每晨必瀉經水百日一至做仲景意

淡芩

炮淡乾薑

生於木

肉桂

脾陽
虛

某氏陽微濁滯。

吐瀉心痛當草溫開氣胃陽甦醒乃安。

火桂

炒半夏

厚朴 廣皮 益智仁 煙木香 烏藥 香附汁 薑汁

某七色白脈更體質陽薄入春汗泄神力倦疲大便溏洩不爽皆脾陽困頓不克勝舉無以鼓動生生陽氣耳

刻下姑與和中為先 益智仁分 廣皮錢 薑友分 薑友三錢 生穀芽錢

楊 小便不利大便溏泄補脾法中佐以淡滻分其陰陽

人參

熟朮 茶芩

象牙屑 澤瀉

苡仁 廣皮

白芍

薛十水穀濕邪內著脾氣不和腹膨不飢便溏四肢瘦廬

厚朴 茶芩皮 大腹皮 防已 廣皮 澤瀉

苡仁 桂枝木

桂枝木

澤瀉

脾虛

馬四飲酒少穀七氣久虛養泄下部冷腎陽脾陽兩憊知飢少納法當理陽酒客性不喜甘膩滋柔之藥

茶芩

覆盆子 生益智 炒菟絲餅

補骨脂

艾實

朱十四酒濕內因脾腎陽虛用黑地黃丸蒸餅水煮和丸

徐九晨泄病在腎小腹有瘕亦是陰邪若食葷腥厚味病即頓發乃陽氣積衰議用四神丸

席四五陰瘧初愈不慎食物清陽既微健運失司腸胃氣滯遂為洞泄且足跗微腫慮其腹笥欲滿夏季脾胃主

令尤宜淡薄藥以通陽為先平時脾胃兩治

胃苓散去白朮甘草

換服黑地黃丸去五味

朱四久瀉無有不傷腎者食減不化陽不用事八味腎氣乃從陰引陽宜乎少致議與升陽

鹿茸

人參

陽起石

茶芩

炮附子

淡乾薑

又久瀉必從脾胃主治但痛利必有粘積小溲短縮不爽溫補不應議通腑氣

厚朴 廣皮 茯苓 猪苓 澤瀉 川連 煙木香 炒山楂 炒神麩

僧五瘦泄一年。食減腹鳴。屬脾胃陽衰。近腹中微痛。烹理氣滯。用陳無擇三神丸。

某背部牽掣。入腸晨瀉。苓桂朮甘去甘加鹿角霜。

龔五診脈兩關緩弱。尺動下垂。早晨未食。心下懊憹。納穀仍不易化。蓋脾陽微。中焦敗滯。則小運腎陰衰。固攝失司。為瘕泄。是中宜旋則還。下宜封乃藏。是醫藥至理。議早進治中法。夕用四神丸。

高氏經來腹脹。膀胱痙攣。自秋季泄瀉不已。脘痞妨食用。濟生丸不應。

鹿角霜 炒菟絲子 生杜仲 淡蕕苓 沙苑 焦歸身 炒黑小茴

陳氏產育十五胎。下元氣少。固攝晨瀉。自古治腎陽。自下涵養。脾陽始得運轉。王氏以食下不化為無陽。凡腥膩沈著之物當忌。早用四神丸。晚服理中去木草。加益智木瓜砂仁。

張姬泄瀉脾腎虛。得食脹。人參 炒菟絲子 增益智 木瓜 炒黃乾薑 茯苓

某瀉五十日。腹鳴渴飲。溲溺不利。畏寒形倦寐醒。汗出用溫中平木法。

人參 胡蘆巴 炙薑 炒菟絲子 詞子皮 附子 粟蔻

某脾腎不攝。五更瀉。巴戟 菟絲子 五味 补骨脂 茄實 建蓮 山藥 火草

某久瀉脈虛。人參 久瀉糧石

張氏產後不復腹疼。瘕瀉。炒菟絲餅 鹿角霜 生杜仲 淡補骨脂 炒黑小茴 炒杞子 茯苓

顧氏問病原是勞損。自三陰及於奇經。第腹中氣升胃痛。暨有形動觸衝任脈乏守。補則滯涼潤則滑。漏煥熟。最為吃緊。先固攝下為治。人參 炒菟絲子 茄實 湖蓮 赤石脂 茯苓

某腎虛瘕泄。炒香菟絲子 生杜仲 炒魚補骨脂 茴香 雲茯苓

文陽枳子後腹鳴。前方瘕泄已止。

人參 炒菟絲子 炒補骨脂 湖蓮肉 茄實 茯苓 澤瀉 炒黃乾薑

顧 脾腎瘕泄。腹脹肢腫。久病大虛。議通補中下之陽。

人參 川熱附 茯苓

某

因虛利泄乃下焦不機納而恐傷陰液以胃炎燥也

中虛
腹痛

高

脈細下垂。高年久嗽。腹痛泄瀉。形神憔悴。乃病傷難復。非攻病藥石可愈。擬進甘緩法。

火甘草 炒白芍 炒飴糖

火甘草 生穀芽

火甘草 茯神 南茱

廣皮 荷葉蒂

火甘草 二藥服十二日。

王

過食泄瀉。胃傷氣陷津不上源。臥則舌乾被渴。且宜薄味調攝和中之劑。量進二三可安。

人參 葛根

火甘草 火甘草

火甘草 茯神

火甘草 南茱

火甘草 廣皮

火甘草 荷葉蒂

泄瀉注下症也。經云。瀉多成五泄。曰飧。曰溏。曰瀉。曰滑。曰濡。飧泄之完穀不化。濕兼風也。溏泄之腸垢污積。濕兼熱也。瀉泄之澄清弱白。濕兼寒也。濡泄之身重軟弱。濕自勝也。滑泄之久下不能禁固。濕勝氣脫。也是以胃風湯治有血之飧泄。清六丸療腸垢之熱。溏瀉便清弱白。中有硬物。選用理中治中滑泄。脈微氣脫。洞下不禁。急投四柱六柱丸。惟濡泄有虛有實。或以胃苓。或以术附。至於脾泄。胃泄。腎泄。大腸泄。小腸泄。大瘕泄。瘦泄。鬱泄。傷酒傷食泄。古方古法條載甚詳。其急則治標必使。因時隨症理固然也。及其緩其治本。惟知燥脾滲濕。義有未盡者乎。蓋脾同坤土。本至靜之體。而有乾健之用。生萬物而役於萬物。從水從火。為寒為熱。歷觀協熱下利者。十不得一二。從水之寒泄者。十常八九焉。言當然者。主治在脾。推所以然者。必求之水火。因思人身水火猶權衡也。一勝則一負。火勝則水負。水勝則火負。五泄多濕。濕水同氣水之盛。則火之衰也。於是推少陽為三陽之樞。相火寄焉。風火扇胃而熟腐。五穀少陰為三陰之樞。龍火寓焉。薰蒸臟腑而轉輸糟粕。胃之納脾之輸。皆火之運也。然非蓄藏龍馳。何能無燥無漏。勢有胃明燎上之毒。如累土真水安。從此不汎不濫。定無清氣在下之患矣。吾故曰五泄之治。平水火者。清其源。崇隄土者。塞其流耳。今觀葉氏診記配合氣味。妙在清新縱橫治術。不離規矩。依然下者升滑者固。寒者溫。熱者清。脈弦治風。脈濡滲濕。總之長於辨症立方。因而投劑。自能輒效。所謂讀古而不泥於古。採方而不執於方。化裁之妙。人所難能者。余友夏子翼丈。昔在葉氏門牆。曾言先生洞達人情。諳練時務。使之應曲。