

醫學經典  
卷九

背面毒



此背面毒受在肝肺經氣血凝滯不通結聚成毒  
此是惡症也當用清毒流氣飲

紫蘇

桔梗

枳殼

甘草

烏藥

白芷

腹皮

黃芩

當歸

白芍

川芎

防風

羌活

柴胡

白芨

連翹

姜三棗一煎服

后用定痛內托飲

人參

當歸

芍藥

厚朴

桔梗

川芎

甘草

防風

白芷

黃芪

茯苓

羌活

烏藥

宮桂


紫蘇

香附

右煎法同前


圍藥用金瘡散敷之

頭後蜂窠散注




此症發於頭後如是蜂窠者急宜救之若焮赤腫  
痛起者得療瘻發者必難治矣急用調治之若或  
流於兩肩者決不可療也治法與發胸者同

枕痕



此毒蓋因風熱上攻入於內發此疽疾量人年紀  
老少用藥人年五十以上難治少壯可治更服內  
疎黃連湯十數貼加 羌活 金銀花 荆芥  
千金托裏散 宜服黃芩丸 外貼金絲膏治法  
與對口瘡同

腦疽



此毒受在腎藏虛實熱壅上腦戶結伏成毒也初起三日者剃去髮以艾炷如豆大者灸五壯外用圍藥庶能消矣當用三香內托散定痛消毒飲治

之

人參

當歸

升麻

川芎

白芍

桔梗

枳殼

茯苓

半夏

柴胡

甘草

羌活

防風

厚朴

白芷

天花粉

右剉姜三片燈心三十莖空心服

三香內托散

人參

木香

黃芪

厚朴

甘草

紫蘇

枳殼

官桂

烏藥

白芍

白芷

川芎

防風

乳香

姜三棗二水煎不拘時服

上中下三搭手俱用此

對口瘡



此毒因虛陽上攻熱入於腦故生此疽正近咽喉

之所諸陽之會間速宜調治初起用千金內托散  
加 羌活 獨活 柴胡 天花粉 煎服先散  
其虛熱之氣然後服荆防敗毒散 外貼金絲膏  
更服內托十宣散加 白芍 羌活 金銀花煎  
服多服蠟礬丸護心散

圍藥

雄黃末 二分 白芨末 一分 和勻用蟹搗汁調敷留  
孔時用水潤之


另有圍藥方在項門瘡中取用

兩邊髮際發



文藝卷首集印  
不急聚毒人血肉腫脹多癰水腫中止此  
文外翻四轉髮脈赤轉頭氣耳更寒熱寒  
禁更而發首急宜追舌譙舉喉嚨小發終無  
也並坐腰痛兩數本汗熱三一四口參宜  
大

此症生頸後兩邊左右鬢髮邊發生急宜救之如  
核硬而發者急宜取去病根如腦心發者熱氣上  
攻於腦四畔邊焮赤腫硬連於耳項寒熱疼痛若  
不急療毒入血肉腐壞為膿水頭中出血者氣喘  
及痰發者難治法同前宜加減用引經藥



面發毒



此症之發多起於房勞太過乘虛風入經絡陽明  
經虛發於面也或面生癧癰患者欲求速愈而庸  
醫或以毒藥敷点或以艾火灸之或以針刀刺之  
或犯尻神惡宿或破後房事不戒或受狂風霜雪  
寒露暴戾之氣或服金石草木諸部惡毒相攻相  
反之劑以致病症自劇殊不知面為諸陽之首禁  
火禁刀禁毒兒耳目口鼻之官總係一處比四肢  
不同若不保重命亦難生何也面為陽火氣入之  
薰蒸肌肉刀針刺之卽傷經絡毒藥点之暴剝皮  
肉轉爲患繼之以風邪入之則頭面虛腫目鼻

腫脹患處日腐其臭穢難聞脾胃日削寒熱交作  
痛楚萬狀難以盡言若有五善而無七惡外敷清  
涼拔毒之藥內服參术內托之劑每合犀角鬱金  
散服之以拔積毒其命方可保也否則難生

清涼拔毒散

白芨

雄黃

射香

乳香

山茱萸

花粉

黃柏

烏藥

右爲末鷄子清調付蜜水潤之

參术內托散

人參

白术

粉草

犀角

貝母

黃連

防風

黃芩

酒  
炒

羌活

桔梗

當歸

生地

白芍

前葫

天花粉

因病之逆從而加減之

加姜三片

犀角鬱金散

犀角

鬱金

真珠

牛黃

粉草

乳香

真粉

辰砂

煉蜜為丸噙化

寒瘡



一人面上及遍身生瘡似貓眼有光彩無膿血冬  
則近脰名曰寒瘡此乃脾家濕熱所化宜服雄黃  
解毒丸再服清肌滲濕湯多食魚鷄葱韭而愈惟  
鯉鮒魚蝦蟹不可食

清肌滲濕湯

蒼术

白术

升麻

甘草

澤鴻

山梔

黃連

厚朴

茯苓

當歸

川芎

青皮

木通

苦參

車前子

小柴胡

癩瘡



此症手少陽三焦經主之大抵二經多氣少血因

驚憂思慮故生此疾初起生於耳下及項間并願  
舍下至缺盆在鎖子骨陷隱皮膚之內初生如  
豆漸長如李核之狀或一粒或三五粒按之則動  
而微痛不發熱惟午后微熱或夜間口乾飲食少  
思四肢倦怠則堅而不潰而不合皆因氣血不  
足往々變為癆瘍自覺紅腫或上或下或左或右  
連串三五箇破潰遍項漸流膿血致成瘰癧獨形  
者為結核續欲連結者為瘰癧但此症原不係膏  
梁之變因虛勞氣鬱所致宜以益氣養榮之藥治  
之其瘡自消若金石暴悍之劑血氣愈損不能生

矣若不速治必至喪生

益氣養榮湯 治抑鬱及勞傷氣血頸項或四肢脰  
硬或軟而不赤不痛日晡微熱或潰而不斂並治  
之大効

人參  
炙白朮  
炒茯苓  
陳皮  
貝母  
當歸  
川芎  
黃芪  
熟地  
白芍  
桔梗  
甘草  
香附米

右作一劑水二鍾煎八分食遠服

胸痞滿人參地黃各減三分 口乾加五味子麥  
冬 往來寒熱加小柴胡地骨皮 腫清倍加入

參黃芪 腫多加川芎當歸 腫不止加人參黃  
芪當歸貝母 肌肉遲生加白斂官桂

馬刀瘡與瘰癧同條少陽膽經主之此二經亦多  
氣少血或在耳之前后或在耳下連及頤舍或在  
胸及胸側或在兩脇久堅不潰皆謂之馬刀瘡也  
故多堅少軟膿白如稀糊似泔水狀治者求水清  
可也形表如蛤者為馬刀瘡

夏枯草湯 瘰癧馬刀瘡不問已潰未潰或久成漏  
並宜服之

夏枯草 六兩 水三碗煎至一碗去渣食遠服此生

血補虛消毒之聖藥濃煎膏并塗患處多服十全  
大補湯加貝母香附遠志

治瘰癧已成未成已潰未潰以手置肩上微舉起則  
肘骨尖自現是灸處如患左灸左肘患右灸右肘  
若左右俱患兩肘皆灸以三十四十壯爲期更服  
補劑一年灸一次三灸其瘡自除如患三四年不  
愈者辰時灸起至酉時方止三灸卽愈更服益氣  
養榮湯

父方灸法未成膿者用大蒜切片如二錢厚者安患  
上用艾炷於蒜上灸之至三五壯換蒜每日灸十

數蒜片以拔鬚毒如破久不合內有棗或瘀肉此  
因氣血不足不能腐爛更用江西豆豉爲末唾津  
和爲餅如前灸之以助陽氣內服補藥外貼金絲  
膏瘡日自合矣

療瘡瘍挾噙藥

昆布

酒洗

海藻

酒洗

大黃

酒拌蒸

殭蚕

姜汁拌炒

青黛

各二分

桔梗

一子

連翹

三枚

膽星

二分

柴胡

片芩

酒炒

橘紅

黃連

酒炒

瓜萎

各一分

右爲末煉蜜丸如艾實大不拘日夜噙之

神効灸治療瘻穴法



二鼠尾穴在手臂上大肉處是穴

治男子婦人小兒患此症者依此四六燒灸無不  
効肩骨尾盡處是肩井二穴左肩灸左右肩灸右  
左右俱有俱灸風尾一穴用草一莖男比左手女  
比右手中節橫紋攢量過四肢紋盡處比交折斷  
將至絲螺骨尖中比至脚后總筋中是穴風尾左  
灸左右灸右俱有俱灸一年五壯年深多灸專治  
一切發者須要禁忌房事神効不虛可以活人灸  
畢瘡爛車前草葉搗爛貼之看遍身神人所在禁  
忌并擇天醫黃道吉日

火忌 既灸忌諸魚熱麵生酒生冷物鮮肉及房勞

又灸兩手掌后四寸兩筋間各七壯以病人中指橫  
紋量至本指尖爲四寸再灸肘尖左病灸右右病  
灸左各三壯不過二次除根  
如神散 瘰瘍已破瘻口不合

松香末 一兩 白凡 三錢 為細末油調搽乾摻亦可  
散腫潰堅丸 瘰瘍馬刀服益氣養榮湯不能消散  
者宜服此丸五日再服益氣湯五日相兼服之

知母

黃柏

廣茂

天花粉

俱酒  
拌炒

昆布

炒酒

連翹

黃連

炒

葛根

白芍

京三稜

各三子炒

升麻

當歸梢

甘艸

小柴胡

各一兩

草龍膽

四兩

黃芩

一錢

五分一半生  
用一半酒炒

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服七八十九白沸湯送下

神秘散

服散堅丸益氣湯不愈宜進此藥再服益

氣湯

班猪

十枚去頭是翅膀  
米炒去米不用爲末

荆芥穗

二分

黑牽牛末

一分子

僵蚕末

二分子

和勻每服二錢五更溫酒調下日午惡物從小便中出如小便澀或痛以葱白湯飲之或木通湯更

以米粥補之若不下明早五更再服以下爲度無力者不可下每早服之五早爲度

得效針頭散

追蝕惡瘡瘻肉

赤石脂半

乳香

白丁香各二粒

生用

黃丹各一錢

輕粉七分

射香三分

生用

蜈蚣一條

炙

右爲末摻於瘻肉上或瘻口小就捺瘻口上瘻肉自去更以膏藥貼之肉亦去審用砒末二錢以白凡末二錢和勻同火上飛過用凡一錢合藥亦効但不及生砒之功速耳

柴胡連翹湯

治馬刀瘡

小柴胡 五分 鼠粘子 二分 薄桂 五分 連翹 五分

瞿麥穗 六分 灸草三分 生地 三分

歸尾 一分

黃柏 三分 酒炒 知母 三分

黃芩 酒炒

右勻作四貼煎服

消毒湯 治馬刀瘡

柴胡 二分 連翹 二分

歸尾 一钱

紅花 一钱

甘草 一钱 生芩 二分

黃連 五分

花粉 二分

鼠粘子 五分 黃芪 二分

柴胡通經湯 小兒項側有瘡堅而不潰亦名馬刀瘡

瘡

柴胡

連翹

歸尾

黃連

黃芩

生甘草

鼠粘子

桔梗

三稜

紅花

川芎

必効散

治療癰

朋砂

二分

輕粉

一子

麝香

五分

枳榔

一枚

班捕

四十去

巴豆

五枚去皮心膜

右同研末取鷄子清二枚去黃調藥勻傾在鷄子殼內濕綿紙數層糊定勿令透氣飯上蒸熟取藥晒干研末用時看病人虛實虛者用五分實者用一錢並用煨熟老姜煎酒五更空心調下天明取

下惡物如小腹內疼痛便用天麻子燒灰一錢沒  
藥一錢同研爲細末茶清調下一錢取下惡物或  
如爛肉或如初出老鼠或新成卵內雀兒是藥効  
驗婦人有孕不可服

治頸上痰核飲之半月卽効

青木香根葉 獨脚將軍草 各一斤

右用大酒十斤放二味在瓶內封固瓶口重湯煮  
三枝官香爲度理地中三日出火毒飲之

立消紅腫痰核 用石灰窯內紅土摃爲末菜油調

搽空中出毒出膿以膏藥貼之

風毒發疽



此瘡受在氣血不通凝滯脾胃有傷經絡或過食  
炙燉或被毒氣聚結成瘡或乘虛爲賊風所吹當  
用溫中順氣飲 順氣飲孕婦加減服

溫中順氣飲

生地

茯苓

厚朴

白术

甘草

青皮

枳殼

桔梗

當歸

川芎

防風

木香

白芍

蓬朮

右用姜三片棗二枚不拘時服

若孕婦去蓬朮厚朴加砂仁陳皮

項門瘡



此癰受在六府與陰陽不調氣上熱壅而成癰毒  
傷於腦經於是毒症不可輕忽先用敗毒流氣飲  
後服內托流氣飲治之

外用救苦拔毒膏

雄蠅蚰一二條和葱白二寸搗極爛如雄黃末一  
錢白芨末一錢和勻敷患處留孔乾用水潤之何  
為雄蠅蚰背上白紋者是也對口瘡發癩發疽  
之症亦治

用敗毒流氣飲

人參

乾葛

枳殼

桔梗

甘草

柴胡

防風

細辛

薄荷

川芎

羌活

芍藥

獨活

白芷

紫蘇

天花粉

姜三片棗一枚食後服  
不消用內托流氣飲

人參

木香

黃芪

厚朴

甘草

紫蘇

桔梗

官桂

冬加夏減

梔榔

烏藥

枳殼

當歸

川芎

芍藥

白芷

姜三片棗二枚

或熱加柴胡黃芩

去官桂

或痛加玄胡索 五靈脂乳香

或瀉痢加附子 人參 白朮

土炒澤瀉

胃氣不順加陳皮 荆芩 半夏

山藥

嘔吐加生姜藿香

眉風毒



此毒受在肝經氣血上壅結聚成毒當用敗毒流氣飲內托流氣飲清肝飲治之

敗毒流氣飲

紫蘇

桔梗

生地

薄荷

青皮

枳壳

甘草

防風

川芎

羌活

前胡

連翹

芍藥

小柴胡

內托清肝飲

人參

黃芪

厚朴

甘草

防風

桔梗

花粉

枳殼

藁本

升麻

烏藥

當歸

白芍

白芷

川芎

金銀花

姜三片棗一枚

園藥 用項門癰救苦拔毒膏治之如無蛇蠍急用  
金箍散敷之立効

金箍散

發眉瘡



發眉瘡從眉至頭生瘡色黑其腰漸腫氣浮滿

面其瘡如石針刺無膿其水自出痛不可忍悶亂  
嘔逆者正是此瘡六日可刺出膿如吐逆心悶漸  
減可治如不能減男子二十四日而殞女子七日  
而終矣急用止疼之藥治之

止痛拔毒散

升麻

甘草節

鼠粘子

乳香

山梔

黃連

歸須

川芎

白芍

生地

桃仁

黃芩

羌活

獨活

桔梗

白芷

青皮

蟬殼

連翹

金銀花

宜採紫金錠

服護心丸

上下眼丹



此毒受在心肝氣毒上攻擁而聚此丹毒當用清  
心流氣飲治之兼服黃連敗毒丸

清心流氣飲

茯苓

防風

甘草

紫蘇

羌活

獨活

川芎

青皮

薄荷

黃芩

柴胡

荆芥

赤芍

麥冬

連翹

蔓荆子

石膏

煎服

黃連敗毒丸

黃連二兩

甘草一兩

連翹一兩

防風一兩

羌活一兩

細辛一兩

薄荷五錢

黃芩一兩

酒炒

甘菊一兩

右爲細末煉蜜丸如梧子大每五十丸食後白湯

下

搽藥 皂角五錢 五粉草二兩 二味同煎濃膏加冰

片少許用鴨毛潤眼眶上即愈

發鬚毒



此毒受在手陽明經氣虛風熱上壅風毒成瘡當用清心流氣飲次用內托流氣飲治之此症客于會合之前灌在閨後形如米粒漸次赤腫遍身潮

熱

清心流氣飲

茯苓

防風

甘草

柴胡

羌活

川芎

獨活

紫蘇

連翹

赤芍

人參

白芷

前胡

山梔

內托流氣飲

人參

黃芪

厚朴

甘草

紫蘇

桔梗

枳殼

烏藥

細辛

當歸

防風

川芎

白芷

鼠粘子

芍藥

姜三片煎服

蠟燭丸日進三四服

鬚疽

此疽受在脾胃心肺熱氣結成毒也當用敗毒流氣飲清肝流氣飲治之或醫緩之命亦難生矣慎之、



敗毒流氣飲

紫蘇

桔梗

枳殼

甘草

白芷

川芎

薄荷

生地

乾葛

麥冬

當歸

芍藥

柴胡

天花粉

鼠粘子

清肝流氣飲

桔梗

枳殼

甘草

防風

前胡

羌活

青皮

生地

黃芩

獨活

川芎

當歸

芍藥

茯苓

小柴胡

姜三棗一煎服

蠟燭丸時、服之

痄腮毒



此毒受在牙根耳聛通于肝腎氣血不流壅滯頰腮此是風毒症先用清肝流氣飲後用托裏流氣

飲治之

清肝流氣飲

枳殼

桔梗

黃芪

前胡

羌活

甘草

石膏

防風

川芎

芍藥

荆芥

白芷

生地

薄荷

托裡流氣飲

人參

黃芪

當歸

川芎

白芍

甘草

防風

厚朴

烏藥

官桂

木香

姜三棗一服

患處用圍藥敷之

耳風毒



耳風毒受在心腎氣不流行壅在心經致傷于耳  
五種耳痔耳蕈耳壅耳濕耳爛可用清肝流氣飲

後用定痛降氣湯治之如遇耳癆耳聾先用針刺  
破用紅玉膏點之耳脹痛用虎耳草汁滴入耳內  
痛即止耳疔以燒酒滴疔根上方得脫隨用苦茶

洗解酒毒

清肝流氣飲

枳殼

桔梗

黃芩

前胡

羌活

青皮

小柴胡

薄荷

生地

烏藥

甘草

防風

川芎

白芷

石膏

赤芍

右用水煎服

定痛降氣湯

紫蘇

厚朴

陳皮

甘草

半夏

前胡

川芎

防風

芍藥

白芷

當歸

黃柏

知母

乳香

小柴胡

姜三片棗一枚煎服  
若耳輪赤爛清涼膏貼之

耳脹痛

用江魚齒又名腦內骨火煅爲末水調滴入耳內

耳門癰

