

已4
86<45

聖濟總錄

吳錫璇著

大德重校聖濟總錄卷第一百八十一

小兒門

小兒鼻塞

論曰肺氣通於鼻鼻和則知香臭小兒鼻塞者肺氣不利也肺主氣諸陽之氣上榮頭面其氣不和風冷乘虛客於腦與氣停滯搏於津液鼻道壅遏故為鼻塞

治小兒鼻塞黃連丸方

黃連去須兩分

升麻各一分

防風去根一錢

朴消二錢

大黃

炒半分

右六味擣為細末鍊蜜和更擣一二百下丸如菉豆大每服三五丸溫水下食後臨臥服隨兒大小加減

治小兒鼻塞不通利丹參膏方

丹參

細辛去苗葉

芎藭

當歸焙

桂皮粗

防風

去根兩分

蜀椒去目并開口者炒出汗

乾薑

炮各半兩

右八味剉如麻豆大豬脂五兩羊髓五兩與藥相和入銚子內慢火熬候藥

黃色取下絞去滓入鼻中日三

治小兒顛氣虛腫鼻塞不通白芷膏方

白芷

細辛

去苗葉

木通剉

當歸

切焙各半兩

右四味剉如麻豆大以羊髓四兩與藥同入銚子內慢火熬候白芷黃成膏
絞去滓入瓷器中每用少許傅顛上兼內鼻中

治小兒鼻塞不通細辛膏方

細辛

去苗葉

木通剉

車夷格

一杏人

湯浸去皮尖

雙人炒半兩

黃連

去須半錢

右四味剉如麻豆大以羊髓豬脂各三合同藥入銚子內慢火熬候色黃絞
去滓入瓷器中貯之塗鼻內

治小兒鼻塞不聞香臭龍腦散方

龍腦

研一

瓜蒂松

四赤小豆蔻

黃連

去須半錢

右四味先以三味為細散入研者藥和勻臨卧粟米許吹入鼻中少頃有清
水出

治小兒鼻塞不通不能乳木香膏方

木香

零陵香

各一

右二味為細末用醍醐三合與藥末同入銚子內煎成膏用塗頭上及鼻中
如小豆許日再

治小兒鼻塞生肉細辛散方

細辛去葉 木通剉各一兩

右二味為細散以綿纏裹大豆許內鼻中日再

治小兒鼻塞不通羊髓膏方

羊髓 薑陸香各參兩

右二味於銚子中慢火熬成膏去滓入瓷器中盛貯以膏摩背候鼻通為効

小兒鼻多濁涕

論曰人之津液涕唾得熱則燥涸得冷則流溢小兒因解脫不時風冷傷於肺經或冷中顙戶皆令兒涕液不收蓋肺氣通於鼻腦液下通於鼻故也

治小兒鼻多濁涕菊花湯方

甘菊花擣

甘草炙各一分

防風去叉

山茱萸一枚

右四味粗擣篩每一錢匕水一盞煎至六分去滓分溫三服早晨日午晚後各一更量大小加減

治小兒肺傷冷鼻流濁涕前胡橘皮湯方

前胡去蘆

陳橘皮湯浸去白
焙各半兩

白茯苓去黑
桂皮去粗

白术

人參

細辛去苗
葉

甘草一分

右八味粗擣篩每服一錢七水一盞煎至五分去滓溫服日三隨兒大加減
治小兒腦戶傷風冷鼻多濁涕精神昏悶防風湯方

防風去
義

甘菊花擣

白术

人參

細辛去
葉

白茯苓去黑
皮

甘草吳茱萸各
一分

右七味粗擣篩每服一錢匕水一盞人生薑少許同煎至五分去滓溫服不
拘時更量大小加減

治小兒鼻塞多涕杏人膏方

杏人湯浸去皮尖
櫻入炒半兩

蜀椒去目并開口附子炮裂去
汗

細辛去苗葉
一分

右四味除椒外剉如麻豆大以醋五合漬藥一宿明日以豬脂半片與藥相
和入銚子內慢火同熬候附子黃成膏去滓取出貯瓷器內放冷取塗鼻中
兼摩頂上日三五度

治小兒肺寒鼻多濁涕精神不爽不思乳食通肺湯方

人參

前胡去蘆

細辛去苗葉

杏仁

湯浸去皮殼
雙人搗破去

桂皮去粗

甘草炙分

右六味粗搗篩每服一錢匕水一盞人生薑少許棗一枚擘破煎至五分去滓溫服不拘時量大小加減

治小兒風冷傷顛鼻塞多涕細辛膏塗方

細辛末一兩

麻油合

右二味以油煎細辛令微黑入蠟半兩候消令凝每日薄塗顛上日三易

小兒腦熱鼻乾無涕

論曰肺氣通於鼻鼻上通於腦腦體下滲而為涕故涕為肺之液而其出從鼻小兒肺藏壅滯內有積熱上攻於腦津液內涸故令鼻乾無涕也

治小兒腦熱鼻乾無涕升麻丸方

升麻

防風去叉

桔子人各半

右三味搗羅為末青羊腦髓和丸如麻子大一二歲每服三丸溫熟水研化下食後午時臨臥各一量兜大小加減

治小兒腦熱鼻乾燥常閉目黃芩湯方

黃芩去心 黑青葙子

大黃剉半兩 各蜀漆

甘草火略一兩

右五味粗搗篩五六歲兒每服一錢匕水一盞煎至五分去滓放溫食後日

二服量大小加減

治小兒腦熱鼻乾無涕茯神湯方

茯神去木

桔梗根

麥門冬去心各半兩

黃耆剉半兩

生地黃洗焙兩

酸棗人炒半兩

羌活頭蘆

葛根剉一分

羚羊角鋤各一分

右九味粗搗篩每服一錢匕水七分浸藥良久煎至四分去滓放溫服日三食後良久

治小兒腦熱鼻乾無涕藁本湯方

藁本去苗一兩

牡蠣羊角鋤各半兩

防風去叉各半兩

芎藭

細辛去苗葉

白朮

人參

芷胡去苗

菊花去萼

山梔子人白茯苓去黑皮各半兩

甘草炙

黃芩剉黑心一分

右一十四味粗搗篩每服一錢匕水七分入青竹葉五片同煎至四分去滓澄清放溫細呷食後日再

治小兒腦熱鼻乾無涕犀角散方

黃連

半兩

右一味粗搗為末童子小便一盞浸一宿每日取清汁半合服之量太小加減治小兒鼻乾身熱韭根汁方

韭根

右一味搗取汁澄清兩鼻孔各滴如黑豆許勿多多則有毒

治小兒腦熱鼻乾白礬塗方

白礬

生末

黃米粉

兩

右二味每用一錢匕清水半合調如泥塗腦上日三

小兒多涕

論曰鼻之氣有出有入入則界內已而復出出則界外已而復入肺開竅於鼻肺氣不和風冷乘之使氣道遏而不通則風冷與氣上界蒸而為液其液復界於下故令鼻多涕

治小兒肺寒鼻多清涕精神不爽減乳食人參湯方

人參

前胡

去蘿

細辛

去苗

桂皮

去粗

杏仁

湯浸去皮

甘草

去節去梗

右六味粗搗篩每服一錢匕水半盞入生薑少許棗一枚擘破煎至三分去
滓溫服不拘時更量兜大小加減

治小兒肺藏傷冷鼻流清涕前胡湯方

前胡去頭蔓

陳橘皮

湯浸去白
焙各半兩

白茯苓去黑桂皮粗

白术

人參

甘草

炙

細辛去苗葉

右八味粗搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓溫服日三更隨兜大小
加減

治小兒腦戶傷於風冷鼻內多涕精神昏悶甘菊花湯方

甘菊花

白术

細辛去苗

白茯苓去黑

桂皮防風去

人參

甘草

炙剉各
兩

右七味粗搗篩每服一錢匕水半盞入生薑少許煎至三分去滓溫服不拘
時更量大小加減

治小兒風傷額閉致鼻塞不通塗額方

麻油

二合

細辛末

兩

右二味同煎微黑色入蠟半兩鎔化停凝每日三度薄塗之

小兒喉痺

論曰喉痺之病喉中腫塞痺痛水飲不下呼吸有妨寒熱往來得之風熱客於肺肺熏發咽喉小兒純陽尤多是疾若不速治毒邪入心則煩悶懊惱立致危殆治小兒喉痺由肺脾蘊熱血氣結塞慎勿刺破但以此方治之木通湯方

木通

剉一兩

升麻

分

大黃

剉炒一分

麻黃

去根節一分

犀角

燒一錢

石膏

剉半兩

甘草

炙一錢

右七味粗搗歸每二錢匕水一盞煎至七分去滓下朴消末一錢匕攪勻再煎一二沸分溫二服早食後臨臥各一服五歲已上以意加之治喉痺水漿不下備急三物丸方

大黃

剉一兩

乾薑

炮

巴豆

去皮心別搗如脂

右三味等分先搗二味為細末入巴豆再研鍊蜜丸如菜豆大每服三丸溫水下取利為度

治小兒喉痺咽喉傍腫如癰子身體壯熟如不作癰結空氣急喉中噎塞即是肺脹犀角湯方

犀角

鋸屑一分

射干

兩

桔梗

炒

絡石

升麻

甘草 炙
山梔子人各一

右七味粗擣篩每二錢匕以水一盞煎至六分去滓下朴消末半錢匕攬令勻分溫三服早晨日午臨臥各一

治小兒喉痺咽喉傍腫如癰子身體壯熱如不作顆結空氣急喉中喧塞即是肺脹射干湯方

射干

升麻

百合

木通剉

桔梗炒

甘草 炙各一

右六味粗擣篩每用一錢匕以水七分煎至四分去滓下馬牙消末半錢匕攬勻食後細細溫呷

治小兒喉痺痛咽塞不利羚羊角湯方

羚羊角 烧屑升麻炒

射干

陳橘皮

湯浸去白焰各一

白藥半兩

右五味粗擣篩每一錢匕以水七分煎至四分去滓分溫二服早晨日午夜臥各一五歲已上以意加減

治小兒喉痺上焦積熱壅毒天竺散方

天竺黃

馬牙消

甘草 炙各一

蛤粉白醋

丹砂研一

右五味搗研為細散每服半錢匕取新汲水揉薄荷相和入龍腦少許量兜
大小湯化服之食後臨臥

治小兒喉痺咽喉傍腫喉中噎塞麻黃湯方

麻黃去根節半兩

桂去粗皮一分

射干一錢

杏人湯浸去皮尖

數人炒半兩

右四味粗搗篩每一錢匕以水七分煎至四分去滓食後分溫二服

治小兒走馬喉痺白礬散方

白礬煅培研一兩

消石研各

苦參末半兩

右四味同研為細散每服半錢匕冷水調下併三服

治小兒喉痺馬蘭湯方

馬蘭子炒升麻各一

右二味粗搗篩每一錢匕水半盞煎至三分去滓下白蜜少許攪勻分溫二
服如無馬蘭子即用根少許入水搗絞取汁細呷

治小兒喉痺方

葛蔓

右一味燒為灰水服一錢匕

治小兒喉痺方

棘刺

右一味燒灰水調服半錢匕

又方

魚膽一枚

右一味以竈下黃土同研塗吹喉中立差

小兒重舌

論曰小兒重舌者舌本之下或如臥蠶亦如小舌之狀此由心脾二藏壅熱所致蓋心主舌脾之絡脉連舌本散舌下故二藏有熱熱隨脈上至於舌本之下血脉脹起變生重舌宜急治之刺法中論刺舌下兩邊出血後以藥治之不然即滿口塞喉便致危殆

治心脾經為邪熱所客重舌腫脹語聲不出水飲不下三物備急丸方

大黃炒

乾薑炮

巴豆去皮心膜各等分

右三味擣研為末鍊蜜丸如菉豆大每服五丸溫水下大便利為度
治小兒重舌舌強不能收唾鹿角散方

鹿角末

兩

右一味每用少許傅舌上日三度

治小兒重舌口中生瘡涎出桂礬傳方

桂礬

去粗皮一分

白礬

燒令汁盡半分

右二味擣研為末乾傅舌上日三

又方

蒲黃

露蜂房

一錢

白魚

燒灰一錢

右三味都研令勻用酒少許調傅重舌上日三

治小兒重舌蛇蛻皮方

右取蛇蛻皮燒作灰塗舌下一法以醋調鵝毛獐舌下愈

又方

右以烏賊魚骨燒灰和雞子黃塗喉及舌上差

又方

右取黃蘖以竹瀝漬取汁細點口中良

又方

右以嚼粟哺之差

治重舌衣魚散方

右取衣魚燒作灰傳舌上

治小兒重舌口中瘡涎出蒲黃傳方

右以蒲黃傳舌上不過三次愈

治小兒重舌欲死者方

右取亂髮燒灰傳舌下良

治小兒重舌木蘭皮方

右取木蘭皮一尺廣四寸削去粗皮細剉以苦酒一升煮取半升適寒溫漬
兩手食項間小渴須臾乾復潰兩足出乾復潰大良

治小兒重舌方

右燒瓶帶灰傳之

又方

右取桑汁塗乳飲之

小兒木舌

論曰小兒木舌者以心氣蘊熱熱氣隨脉上至於舌則血脉脹起漸漸腫大滿口塞喉若不急治便致危殆經云畜則腫熱砭射之也先宜砭射後以藥治之治小兒木舌腫脹滿塞口中三物備急丸方

大黃炒剉

巴豆去心皮研

乾薑炮各等分

右三味擣研為末鍊蜜為丸如菉豆大每服五丸溫水下大便利為度治小兒木舌紫雪散方

紫雪細研一分

竹瀝

右二味每用紫雪一字竹瀝少許調服一日四五服治小兒木舌方

衣中白魚五枚去骨

朴消研一錢半

右三味擣研為細末每用少許傅舌上

治小兒木舌長大鯉魚貼方

鯉魚切肉去骨片

右一味將魚肉貼於舌上以線繫定

治小兒木舌長大蓬砂散方

蓬砂研

甘草半兩

白芷二錢

白藥子二兩

蒲黃一兩

右五味擣研為散每服半錢匕薄荷煎湯入蜜少許調下食後服三歲已上

每服一錢匕

治小兒木舌日漸長大滿塞口中人參散方

人參一兩

白茯苓去黑皮二兩

甘草一兩

白藥子二兩

白术一兩

槐花

白芷各半

甘草二兩

白藥子二兩

白术一兩

右七味搗羅為散用薄荷汁調如糊塗舌上嚥下不妨不拘時用如患重舌

亦可服

小兒燕口瘡

論曰小兒燕口瘡者口吻兩際瘡生如燕口世亦謂之肥瘡此由脾胃客熱上衝口脣熏發為瘡或者以燕泥傅之甚良蓋治之以其意也

治小兒燕口瘡石膽散方

石膽研半兩

龍腦研少許

右二味共研勻以少許塗瘡上差

治小兒燕口瘡胡粉散方

胡粉炒研
一分
黃連末兩

右二味同研勻以少許傅瘡上

治小兒燕口及口內生瘡方

羖羊鬚燒灰

右一味研細以臘月豬脂和日三四上塗之

又方

雞膾胫黃皮不以多少燒灰

右一味研為末以乳汁調半錢已服之日三

治小兒心藏虛熱生燕口瘡方

柘木根

右一味以水三盞煎取半盞去滓用汁塗瘡上不拘度數以差為止

治小兒燕口黃肥瘡方

右取羖羊角燒灰和臘月豬脂傅之差

治小兒燕口黃肥瘡方

右取燕窠土一分入麝香半錢研勻臨臥傅之

治小兒口黃肥瘡方

右燒亂髮一分為灰研細和猪脂塗之差

治小兒口瘡蘆皮散方

右用黃蘆皮為末飴汗調塗傳瘡上差

小兒口瘡

論曰小兒口瘡者由血氣盛實心脾蘊熱薰發上焦故口生瘡蓋小兒純陽易生熱疾或衣服過厚飲食多熟血脉壅盛皆致此疾

治小兒口瘡一捻散方

青黛

黃蘆皮去粗

诃梨勒炮去蜜陀僧

右四味等分擣研為散取一捻繆舌上如喉咽內有瘡亦繆喉中微微嚥津治小兒口瘡紫金散方

黃蘆如兩指面大二片去粗皮塗蜜炙令紫

诃梨勒炮去蜜陀僧

膚香研少

膩粉研少

右四味擣羅為散每服一字許繆舌上立差

治小兒口瘡寒水石散方

寒水石一分燒通赤地上一宿出火毒白礬桔梗一分鉛白霜一分

右三味研為散每用少許糁口瘡上食後臨臥以差為度嚥津無妨
治小兒口瘡香白芷散方

香白芷半兩 鹽綠錢 五倍子分 麝香計

右四味擣研為細散每用一字糁瘡上

治小兒口瘡蓬砂散方

蓬砂研 蟻蝴蝶研 蜜陀僧各半錢研

右三味用生蜜四兩與藥同熬紫色以新汲水冰冷盞合盛每用以雞翎傅之

治小兒口瘡鉛丹煎方

鉛丹半兩 蜜陀僧半兩 白蜜四兩

右三味先以蜜於銚子內煎令沸下鉛丹同煎令紫色次下蜜陀僧攪令勻成煎於盞合盛每用小豆大匙津

治小兒口瘡蚺蛇膽散方

蚺蛇膽研一 石膽研一 龍腦分

右三味同研細每用一字塗瘡上日三五次

治小兒口瘡大青湯方

大青
分

黃連
分

右二味粗擣篩每服半錢匕以水半盞煎至二分去滓食後服

治小兒口瘡地黃湯方

生地黃汁
桑根白皮汁各一

右二味入蜜半合同煎十餘沸每服二分日三

治小兒口瘡黃蘗膏方

黃蘗
去粗皮一
壹分

大豆
一

右二味粗擣篩以水一盞煎至二合去滓重煎如錫入少許龍腦研和塗傅治小兒口瘡爛殼神驗散方

寒食麴
五錢

消石
七錢

右二味同研遇夜新水調藥半錢匕塗在紙花子上男左女右貼腳心

治小兒口瘡蛇蛻拭方

右取蛇蛻水漬令濕輒拭口內瘡一兩度即差

治小兒口瘡蟾蜍散方

蟾蜍
全數矣

右一味擣羅為散每用一字傅瘡上

治小兒口瘡牛膝酒方

牛膝加兩

右以清酒二盞煎至七分去渣分溫三服日二以差為度

治小兒口瘡蠶蟬散方

晚蠶蟬一兩

右擣羅為散每用一字傅口瘡日三兩次

治小兒口瘡赤爛羊乳飲方

右取羊乳五合冷點口中不過三兩上差

治小兒口瘡赤爛赤葵散方

赤葵莖焙乾半兩

右擣羅為散每用一字蜜調塗之

治小兒口瘡赤爛亂髮拭方

右以父母亂髮淨洗纏桃枝蘸井華水東向以拭口中

治小兒白口瘡滿口如浸餅起者貝母散方

貝母去心
二兩

右一味為散先煮麯撥粥七箇抱孩兒門限內坐將逐箇撥粥擦兒口內瘡了棄門限外令犬喫便以藥末半錢水五分蜜少許煎三分冷與服仍以藥繆貼每日用三四次即差

治小兒口生白瘡桑汁塗方

桑根白皮汁

右以塗兒脣口即差

治口瘡舌軟言語不得方

白礬燒令
汁盡
一兩

桂粗皮
各一兩

右二味擣研為末繆舌上即差

治小兒口瘡馬芹塗方

馬芹子汁

右先揩脣上血出塗藥日三次驗

大德重校聖濟總錄卷第一百八十

大德重校聖濟總錄卷第一百八十一

小兒門

小兒語遲

論曰心為言肝為語其經屬手少陰足厥陰其氣上通於舌舌者聲之機若稟受之初母懷驚怖則子之心火不足而肝木弱故令機關不利氣不宣揚而語遲甚者有經數歲不能言者

治小兒心氣不足舌本無力語遲芍藥湯方

赤芍藥

兩

黃耆

炒參

犀角

銹

檳榔

剉

甘草

炙各半兩

右五味粗搗篩每服一錢匕水一小盞煎至五分去滓量兒大小不計時候加減溫服

治小兒諸病後六七歲不能語雞頭丸方

雄雞頭

燒灰灰去翅足一枚鳴蟬去翅足一枚炒參枝

甘草

炙半兩

大黃

炒

麥門冬

去心焙各一兩半

當歸

切

黃耆

剉

芎藭

各半兩

達志

去

木通

剉各半兩

人參

一兩

右十一味搗羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服以粥飲下五丸至七丸量兒

大小加減不計時候

治小兒五六歲不語葛蒲丸方

葛蒲

人參

黃連

去須各半兩

丹參

赤石脂

各分

天明冬

去心培

麥門冬

去心培各一兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服五七丸溫水下不拘時候日三量

兌大小以意加減

小兒齒不生

論曰牙齒者是骨之所終髓之所養手陽明足太陽之脉並入於齒若血氣充實則骨髓強盛雖其齒損落猶能更生也若虛弱者血氣衰耗風冷乘之致令齒久不生假令生者或齧或蟲落不能復生也

治小兒齒不生或因落不生方

牛糞中黑豆

右一味取二七枚小開去頭上皮此豆頭開處注齒根上時時用之當効
治小兒牙齒不生方

雄蕊糞粧

七

右一味每日用糞一枚齒根上拭至二十一日其齒當生

又方

道傍遺穢粒

右一味於齒落處點三七下其齒自生

治小兒齒不生無問遠近皆得便生神効方

雄雞糞

二七枚
頭尖者

雌雞糞

二七枚
頭圓者

右二味燒灰存性先用鍼挑開齒斷上以雞糞灰點之

小兒咽喉諸病

論曰咽喉者肺脾經所主也小兒肺脾有熱蘊積上焦熏發喉間故令咽喉赤腫吞吐不利或塞或壅憎寒壯熱欬嗽痰涎是其候也昔人謂藏熱則咽門腫而閉塞豈虛言哉

治小兒咽喉中鳴欬嗽喘急款冬花丸方

款冬花

炒

甘草

尖

紫苑

去苗

麻黃

去根節

煎去沫

貝母

炒

麥門冬

去心焙

各參分

右六味搗羅為細末鍊蜜丸如菜豆大每服三丸至五丸食後米飲下五歲

已上以意加之日三

治小兒咽喉舌腫脹咽氣不利朴消散方

朴消分

衣中白魚炒參

鹽炒

右三味擣研為細散每服以指搘少許在舌下

治小兒咽喉項腫啼聲不出牛黃散方

牛黃研半分

代赭兩

麝香錢研半分

玄參分

厚朴去粗皮生薑汁煎參分

升麻兩

射干兩半

大黃剉炒一兩

木香參分

白朮半

犀角镑屑半分

甘草炙半兩

右十二味搗羅十味為細散入研藥和勻每服半錢匕以人乳汁一蛤蜊殼許調下空腹日一服三歲至五歲以上每服一錢匕棗湯調下未飲亦得日再

治小兒咽喉中鳴效嗽疾壅牽牛散方

牽牛子炒半生半熟二兩

杏人去皮尖雙人炒

甘草炙

吳茱萸湯洗培乾炒

陳橘皮法白培各一分

右五味搗羅為細散每服半錢匕空腹以沸湯調下微利出惡物即差量兜

大小加減服

治小兒咽喉腫熱肺脹氣急喉中似有物塞麻黃湯方

麻黃去根節煎

桑根白皮湯浸去皮尖

桂去粗皮各半兩

大黃生

射干

杏人

湯浸去皮尖
雙人各一分

右六味粗搗篩每服一錢匕以水半盞煎至三分去滓溫服

治小兒咽喉腫脹咽氣不利黃蘗湯方

黃蘗去粗皮

甘草尖各一分

右二味粗搗篩每一錢匕以水半盞煎至三四分去滓溫服不計時候

治小兒熱病口爛咽喉生瘡水漿不下當歸膏方

當歸剉頭

射干剉

升麻一兩各

白蜜四合

附子半兩炮去

皮臍剉

右五味切以豬脂四兩先煎成油後內諸藥入於油中用文火熬令附子黃色濾去滓投蜜更熬一兩沸成膏以瓷器收每取杏人大含化嚥津無妨日三四用之

治小兒咽喉腫痛毒氣熱極咽塞不利生薑湯方

生薑二兩

升麻二兩

射干二兩

陳橘皮一兩

湯浸去皮尖

右四味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

治小兒咽喉腫痛壯熱躁渴不止升麻湯方

升麻

射干

大黃

糲炒各

右三味粗搗篩每一錢匕水半盞煎至四分去滓分溫二服早晨日午各一
治小兒膈熱脣口生瘡咽喉腫痛玉芝散方

甘草

剉作半寸許劈破湯浸一日微炒

石膏

研如粉各一兩蜜煎沸瀉

山梔子

去皮微炒二兩

右四味搗研為細散每服半錢匕以新汲水調下量兒大小加減服
治小兒風熱咽喉腫塞生瘡搖頭煩悶及蟲咬心痛龍腦丸方

龍腦

研半錢

白礬

銚子內鍊沸瀉盡汁為度研

立明粉

錢一

蟬殼參十枚去足炒研末

牛黃

研半字

蛇蛻皮

一條長二尺上燁焦研為末

右六味再一處細研入沙糖少許和丸如梧桐子大冷水化破一丸服之
治小兒咽喉腫痛苦藥子散方

苦藥子

白僵蠶等分

右二味搗為細散每服半錢匕白礬水調下量兒大小加減

治小兒忽腫毒著咽喉露蜂房散方

露蜂房

燒灰

白僵蠶

分一

右二味細研每服半錢已用乳香湯調下看兒大小以意加減

治小兒喉痺血氣結塞慎勿刺破但與藥通利升麻湯方

升麻

木通

大黃

麻黃

各一錢

犀角

一錢

石膏

碎

甘草

生剉各半兩

朴消

研一兩

右八味粗擣篩每二錢巴水一盞煎至七分去滓量大小分減服

小兒誤吞物

論曰小兒多以珠璣錢環之類為玩弄之具或藏於口中因驚或啼遂誤吞嚥倉卒不得出為害亦大當隨物所宜以方術治之

治小兒誤吞錢在喉中不下方

魅炭

研末

右一味以指彈少許入喉中少頃自吐出一方用羊腔炭研細為末

治小兒誤吞針方

磁石

一塊大吸鐵

鑿者

右一味入口內吸令鍼出或繫繩定送咽喉引出亦得

治小兒誤吞鉤繩方

右凡吞釣繩猶在手者莫伸引俱以珠璫若穿了薏苡子之類就其繩穿稍
稍推至釣畔即急推前入繞釣離刺處復緩緩引出

治小兜誤吞珠璫方

右燒銅弩牙令赤淬水一椀旋飲其物即出

治小兜誤吞銀環及釵方

右以飴糖隨兜大小多少食之若能多食釵環即隨出

治小兜誤吞髮方

右用木梳燒灰細研粥飲調下半錢也不下再服

治小兜誤吞梅核方

右以溫水旋從小兜頭淋下却接其水與兜飲之

治小兜誤吞環方

右以鵝毛半兩燒灰細研米飲調下半錢未効再服

小兜緊脣

論曰脾主肉其華在脣脾胃有熱壅發於口則令脣際生瘡又為風邪寒濕之氣搏於腫處故癥結不消濕爛汁出時發時差積久不愈謂之緊脣瘡又名瀰

脣也

治小兒脣瘡未已復被風冷所搏瘡口濕腫此名緊脣順脾散方

山芋

兩

人參

分

鉛丹

一分

肉豆蔻

二枚

甘草

一錢

白朮

一分

訶梨勒

炮去核半兩

木香

半兩

甘草

一錢

白茯苓

去黑皮

黃耆

一分

白芷

一分

右十一味擣羅為散每服半錢匕沸湯點服量兒大小加減

治小兒緊脣瘡二鉛散傳方

鉛丹

一分

鉛霜

研半分

蛤粉

研

晚蠶蛾

微炒半錢

各麝香

研一錢

右五味各為散用蜜合調傳瘡上

治小兒緊脣瘡腫皮急黃連散傳方

黃連

去須

黃蘖

去粗皮

甘草

生

凝水石

碎半兩

檳榔

一分剉生

右五味擣羅為散用蜜調傳脣上頻換為効

治小兒緊脣及脾熱攻脣瘡腫烏蛇散傳方

烏蛇

燒灰

右一味細研以酥和傳脣上頻換為効

治小兒脣瘡白及膏傳方

白及

白斂

白蠟各一兩

黃耆剉

乳香研

牡丹皮

芍藥

丁香各一兩

麻油兩

右丸味除油蠟外並細剉先煎麻油令沸次入前項藥以柳木枝不住手攪
綿濾過去滓再煎入蠟膏成入銀石器中盛候冷不拘多少取傳瘡上

治小兒脣瘡不合龍膽丸方

龍膽

大黃剉微炒各一分

施子人

朴消

郁李仁

去皮別研入各半兩

茵陳蒿分

右七味擣羅為末鍊蜜和丸如麻子大每服五丸至七丸溫水下量兒大小
加減

治小兒脣瘡方

黃蘖去粗皮細末

右一味濃煎薔薇根汁調塗瘡上立効

治小兒脣生瘡方

桑根白皮細切

右一味擣取汁塗瘡上大効

治小兒脣瘡方

藍葉細切

右一味研取汁洗之日三上差

小兒涎液不收

論曰小兒因氣不升降膈院否滯致令乳飲不化流入胃中隨氣上溢故令多涎其候胸滿短氣飲食遲化內經謂脾為涎當調脾胃升降其氣則病可愈治小兒脾風多涎心胸壅悶不下乳食昏多睡鉛霜散方

鉛霜研

牛黃研

半夏生薑汁

製燒乾龍腦研各半分

白附子炮

馬牙消研

防風去

丹砂研

天竺黃研

犀角屑

細辛去苗葉

黃芩去黑心

甘草尖剗各一分

右一十三味擣研為散再同研勻每服一字用生薑蜜溫水調下更量兒大小以意加減不計時候

治小兒脾肺風熱膈上多涎心神昏悶少欲乳食防風湯方

防風去

羚羊角屑

黃芩去黑心

人參

枳殼炒

聖濟錄

卷二十一

甘草一兩各半夏半分生薑汁製焙乾

右七味粗擣篩每一錢匕水八分入生薑少許煎至五分去滓不計時候量
兜大小分減溫服

治小兒脾熱乳食不下胸膈多涎半夏丸方

半夏

半分生薑湯洗七偏去滑

皂莢子人

半兩研

右二味擣羅為末用生薑汁和丸如麻子大不計時候以溫水下三丸隨兜
大小以意加減

治小兒脾胃氣不升降氣溢於上涎液不收半夏丸方

半夏

微炒一兩

白礬

半兩生研

右二味先以半夏為細末再入白礬和勻麪糊和丸如粟米大每服五七丸
量輕重加減食後臨卧生薑湯下

治小兒胃氣上溢氣不升降涎液不收清膈降氣丸方

牛房子

梔子人

甘草

半兩

川消

礬金

半兩上各

枳殼

一分麸炒去瓤

龍膽

半兩研

右七味擣羅為末麪糊和為丸如麻子大用薄荷水化下二丸至三丸不計

時候量兜大小加減服之

治小兜脾熱乳食不下胸膈痞悶涎溢不收桑白汁方

新桑根白皮少細剉

右一味取自然汁塗於兜口內立効如無新桑根白皮取乾桑根白皮一兩細剉用水一盞煎至半盞放溫塗兜口內極妙

小兜胎赤眼

論曰小兜眼胎赤者是初生洗目不淨令穢汁浸漬於眥中使眥赤爛至大不差故云胎赤眼也

治小兜胎赤皆爛黃連丸方

黃連去頑一兩

防風去火

龍膽去土

大黃炒

細辛去苗葉各半兩

右五味搗羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服五丸至七丸溫熟水下日三更量

兜大小加減

治小兜眼胎赤風毒所攻腫痛升麻湯方

升麻

黃耆剉

立參

甘草半兩

犀角屑

防風去火

蕤人湯浸去破研各一

右七味粗搗篩每錢七分以水七分煎至四分去滓分溫二服更量兜大小加減
治小兜眼胎赤腫痛上焦壅熱麥門冬湯方

麥門冬法心犀角屑 芒消 防風法 甘草半錢 旋覆花分

右六味粗搗篩每一錢七分煎至四分去滓量兜大小分減溫服日四五
治小兜眼胎赤久不差牛黃丸方

牛黃細研 黃連半兩決明子分 鮑人浸去皮一分湯犀角屑半 龍腦一錢

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大每服以溫水下五丸日三四服更量
兜大小以意加減

治小兜眼胎赤反生瘡怕見風日方

龍腦半錢

鮑人去皮研一分湯浸

杏仁

皮尖雙人研浸去

右三味滴少水都細研如乳汁每日三四度點之

治小兜眼胎赤痒痛方

龍腦半錢

桑葉五兩燒

右二味水一升半先煎桑葉灰取半升綿濾去滓後入龍腦攪令勻日

三四上少點

治小兒眼胎赤龍腦煎方

龍腦錢一

鹽綠半兩

蕤人湯浸去皮一分

右三味都研令極細以蜜調似面脂用點眼日三兩上

治小兒眼胎風赤爛不以年月發歇視物淚出澁痛不可忍黃連膏方

黃連一兩

去須搗

盧會一分

龍腦一錢

右三味先將黃連盧會搗研羅為末以新綿裹用水一盞於銀器中以重湯煮候藥汁三分減二即去藥綿入龍腦攪勻以瓷瓶收每日三兩上點之

治小兒眼胎赤兼有翳膜杏人膏方

杏人

研如膏失雙人一兩

膩粉一錢

鹽綠

黃連末各一錢

右四味同研極細以真酥調如膏攢於銅碗內以熟艾如雞子大挾小坑子燒艾烟出使覆銅碗熏之勿令氣洩候烟盡更研令勻每取少許以綿裹用

人乳汁浸一宿日三四度點之

治小兒眼胎赤經年月深遠者銅青散方

銅青

膩粉各一錢

龍腦半錢

乾地龍土一條

土為末

右四味同研極細每用半小豆許點目皆日一兩度

小兒斑瘡入眼

論曰小兒脾肺壅熱或緣時氣溫病表裏俱虛邪毒發於肌表致生斑豆甚者偏體班如毒頭作熛漿毒氣炎盛上攻眼目發於睛輪先須於臉脣上用藥貼膏次可調利肺脾切不得用藥點眼點藥則令斑瘡潰爛穿壞睛輪不可不慎也治小兒斑瘡入眼連翹散方

連翹子

苦蘚

黃蘖

去粗皮一錢胡麻去油一錢

甘草

分參

右五味擣羅為散用白湯調放冷食後服五歲以下半錢五歲以上一錢如眼內有白丁子者不日退去

治小兒熱盛攻眼及斑瘡入眼井泉石散方

井泉石

為末研飛過蟬殼土

蛇蛻皮

炙一錢

甘草

炙一兩

右四味擣研羅為散每服半錢至一錢以蜜水調下

治小兒斑瘡入眼柳絮散方

柳絮

穀精草

石決明

夜明砂各等分

右四味擣羅為散每服一錢以積豬肝一片批開摻藥在內以線子扎定米泔一大盞煮至五分取出乘熱以湯熏眼良久服之日一服

治小兒斑瘡入眼生翳膜遮睛烏龍散方

烏骨
貝齒
猪指甲
各一兩

右三味同入沙合子內用鹽泥固濟令乾燒通赤為度取出細研每服半錢
七用羊子肝一枚拭開搽藥在內麻縷扎定粟米泔一盞煮熟為度細嚼米
飲下

治小兒斑瘡入眼成皰瘡如聖散方

蛇蛻皮
一尺
皂子
十四枚
馬勃
一分

右三味以蛇皮裹皂子更用馬勃裹蛇皮入罐子中瓦蓋黃泥裹合暴乾炭
火煅候烟欲斷即止取出油單貼入地中出火毒一宿研細入麝香少許再
研每服半錢七葱湯調下日三服忌一切發眼物

治小兒斑瘡入眼及生翳通聖散方

白菊花
如無用甘菊花代
菜豆皮
穀精草
各一兩

右三味擣羅為散每服一錢七用乾柿一枚生粟米泔一盞與藥同煎水盡
為度只喫乾柿一日可二服不計時候若患十日已裏三五服即差一月已
裏十數服差

治豆瘡子入眼妙應散方

蛇蛻皮一兩
蟬殼五枚

右二味用罐子泥固濟暴乾火斷過地上出火毒一宿研為末蜜水調下一字匕食後日三

治小兒出瘡子後眼內生青膜翳暈蛤粉散方

蛤粉一分
甘草炭一錢

右二味將甘草搗羅為末與蛤粉同研令勻每服一錢匕新汲水調下不拘時候

治小兒斑瘡入眼成白膜但不作丁子者服之必効螺旋散方

螺旋蛸二兩
麝香少許

右二味擣研為細散每服一錢半七生米泔調下臨卧服

治小兒瘡疹入眼成翳膜蟬殼湯方

蟬殼
羊子肝

右二味搗羅為末每服二錢匕用水煎羊子肝湯調下日三

治小兒斑疹入眼生翳膜方

穀精草 細蛤粉已上各

兩

右二味搗研為細末每用一錢匕豬肝二兩批開摻藥在內捲了用青竹葉裹麻縷扎定水一椀煮令熟入收口瀝瓶內薰眼後取肝食之服不過十日必差日二

治小兒斑瘡入眼輕粉散方

輕粉一兩
內炒令黑色
用銀器

右一味如患左眼用紙擦纏左耳右耳亦如之以填滿為度如耳根痛其膜自落

小兒眼生翳膜

論曰眼者肝之候也五藏六府精氣皆上注於目小兒體本挾熱將養過溫致府藏積蓄邪熱熏漬肝經上衝於目始則赤痛若不即治蘊結變生障翳熱氣輕者生白翳如黍米大者如麻豆重者乃生兩三翳又甚則翳生白障侵遮瞳人滿目悉白遂致失明然障亦有輕者黑睛邊微有白膜來侵黑睛漸染散漫當急治之即免侵遮黑睛有瞽矇之患

治小兒熱毒氣盛翳膜侵睛兼赤眼疼痛難人丸方

蕤人

湯浸去皮別
擣一兩半

兔肝

火一
具

梔子人

黑

黃連

去須各
半兩

升麻

決明子

各參
細辛去苗葉
一分

右八味搗羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服三丸至五丸溫水下早晨日晚各
一服更隨兒大小加減

治小兒風翳散漫侵瞳人及風疳眼惡實散方

惡實

炒

木通

剉

蒺藜子

炒去角
各一兩

右三味搗羅為散每服半錢匕以水搗羊子肝汁調下早晨日晚各一服更
量兒大小加減

治小兒眼赤或生翳膜或眼常合不開決明子散方

決明子

車前子

梔子人

防風

去

黃連

去須各

右五味搗羅為散每服一字至半錢匕搗生豬肝投熟湯取汁調下早晨日
晚各一服更量兒大小加減

治小兒肝受病目昏漸生翳膜散漫侵睛因此失明須內外治之龍膽飲方

龍膽

鈎藤

土瓜根

茯神

去木各半兩

甘草

尖

桑根白皮

炙
防風去
絲各

右七味粗擣篩每一錢匕水一盞入棗半枚去核同煎至六分去滓分作二服量兌大小加減早晚服

治小兌肝熱眼生翳膜或生血輪腫脹切宜急治車前子湯方

車前子

防風去叉

甘菊花

甘草去節各半兩

人參

芥菜子

青葙子各半兩

梔子仁

黃連去須各半兩

大黃

右九味粗擣篩每服一錢匕水一盞入淡竹葉七片煎至五分去滓溫服日三量兌大小加減

治小兌疳眼翳膜沙澀煮肝散方

黃連去須各半兩

沙參

玄精石

決明子

右四味等分搗羅為散每半錢匕用羊子肝一片竹篦子切作縫子捲末在內線繫入沙罐子內垂掛勿令到底以米泔煮熟淡食羊肝每一片分作兩服或三服量兌大小與食

治小兌五歲已下肝藏熱毒目生丁翳黃芩湯方

黃芩去黑心

升麻

甘草半兩

吳茱萸各半兩

玄參

犀角一分

皇齊急錄

卷之十一 小兒門

十一

右六味粗擣篩每一錢匕水七分煎至四分去滓分溫二服量兒大小加減
日三四服

治小兒肝藏壅熱眼生瘡醫車前子丸方

車前子

甘菊花

芎藭

黃連

當歸切焙各一分

大黃

濕紙裹燒

黃芩去黑心各半分

右七味擣羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服五七丸量兒大小加減煎桑枝湯下
治小兒風熱疳氣攻眼赤痛障翳撥雲膏方

桃人

杏人

各四枚并去皮尖雙人

蕤人

郁李人各五枚并去皮

右四味同生研細滌入蜜龍腦麝香膩粉各少許再研極勻點之
治小兒因瀉痢日久眼生翳膜并疳眼退翳如聖散方

蛇蛻

兩條用絲繩燒灰研

穀精草一兩

蟬蛻去土一分

附子生去皮二錢

石決明

一兩凈研

胡粉研四錢

右六味擣研為散每服一字半羊子肝一片批破摻末用麻皮線纏米泔煮
熟先熏眼後與食量大小加減如未能食研汁灌之

治小兒眼有障翳七八歲瞳子未堅不宜點藥用蝕翳珊瑚散方

珊瑚半兩

右一味細研如粉每點時取如黍米大內醫上日再點

治小兒目睛有膜白礬膏方

白礬

熱令冷
盡一分

右一味以清水四合置熟銅器中煎取半合去滓入少許白蜜以綿濾過每日三度點如黍米大

小兒目赤痛

論曰目者府藏之精華肝之外候也小兒藏府有熱與膈間疾飲相搏氣不宣通熏漬於肝肝經受熱則血脉壅滯循經上衝於目故令目赤痛不即治熱甚則生障翳

治小兒眼赤隱澁不開膈中有熱決明湯方

決明子炒

黃芩去黑心一兩一分

芷胡去苗

大黃研炒各一兩半

升麻

石膏碎

梔子仁各一兩半

甘草炙

枳殼去瓤炒各半兩

右九味粗擣篩每一錢七水七分入竹葉五片同煎至四分去滓分溫二服
隨兒大小加減食後服

治小兒赤眼黃芩飲方

黃芩去黑心半兩 寒水石一兩升麻

甘草炙剉各一分

右四味粗擣篩每一錢匕水七分入竹葉五片同煎至四分去滓分溫二服食後臨卧隨兒大小加減

治小兒赤眼決明丸方

決明子

牛黃研

蕤人等分

右三味搗研為末鍊蜜丸如麻子大臨臥時乳汁下二丸隨兒大小加減如熱痛不可忍者用豬膽汁丸立差

治小兒肝熱眼赤疼痛涼膈退熱白華散方

蛤粉

水飛研

連翹

甘草剉

白藥子

白附子

炮等分

右五味搗研為散每服半錢匕用麥門冬蜜熟水調下量兒大小加減

治小兒目赤腫痛清肝散方

芍藥

去殼一兩

防風去根各一分

太黃剉

羌活頭

甘草剉各半兩

右五味搗羅為散每服一錢匕水半盞入燈心黑豆少許煎五七沸去滓食後溫服量兒大小加減

治小兒風熱眼赤痛敗毒湯方

大黃

剉碎炒

甜消

研

甘草

炙剉各二兩

陳橘皮

去白焙參兩

右四味粗搗篩每服一錢七水七分入薄荷三葉煎至四分去滓食後量兌

大小加減服無薄荷入乳香亦得

治小兒赤眼朴消膏點方

朴消

燒令乾一分

黃連

去須參一分

右二味搗為粗末綿裹以乳汁浸之點眼良

治小兒眼爛皆痒痛淚出不能視物風傷則痛黃連膏方

黃連

去須參一分

大銅錢

七文

白礬

燒灰一分

右三味以水并白蜜各三合用銅器盛於飯上炊一次綿濾去滓貯瓷合內

點眼

治小兒眼赤痛不開洗眼生地黃湯方

生乾地黃

二兩決明子

黃芩

法黑一兩

竹葉

各一兩

芍藥

半兩

右五味細剉以水二升煮五六沸去滓澄清洗眼一日三次大人通用

治小兒赤眼黃蘗湯洗方

黃蕉皮去粗皮剉

秦皮各一兩剉

蕤人去皮半兩

右三味粗搗篩每用兩匙頭以水一椀入乾棗三枚同煎三五沸去滓適寒溫洗眼

治小兒目暴赤痛鉛丹丸洗眼方

鉛丹一兩再研

右一味用白沙蜜調如稀糊同入銀器內攢勻炒候鉛丹紫色可丸即丸如皂子大每用一丸沸湯化乘熱淋洗

治小兒目赤澀痛漸生翳膜昏暗大黃丸方

大黃剉

蠻金

人參

黃連去須各二錢

右四味搗羅為末研臘肝和丸如菉豆大每服三丸米泔下如食後服量兒大小加減

小兒聾耳百蟲入耳附

論曰腎氣通於耳心寄竅於耳疏通不窒則其聽為聰小兒心藏熱實貫衝耳脉開竅者塞結而為腫或生膿汁故謂之聾耳或因沐浴水入耳內停積不化亦為聾耳久不治則致聾聵

治小兒聰耳汁出不止礬石散方

白礬

熬令
汁枯

龍骨

鉛丹

炒各
半兩

麝香

竹艸末

一分

右五味同搗研細先用綿杖子拭乾耳內以藥少許繆之

治小兒聰耳出膿汁疼痛不可忍者竹艸散方

竹艸糞

一兩

白礬

熬令
半兩枯

雄黃

錢二
錢

麝香

一字

右四味同研勻細先用綿裏杖子拭乾耳中次以藥少許繆之

治小兒聰耳膿血塞耳赤石脂散方

赤石脂

白礬

熬令
汁枯

黃連

去
須

烏賊魚骨

去甲各
一分

右四味搗研為散每取少許綿裏塞耳中大人可用一錢匕一方無赤石脂有龍骨

治小兒聰耳夜明沙散方

夜明沙

錢二

麝香

一字

右二味同研極細先以綿杖子拭去膿用藥半錢匕繆入耳中

治小兒聰耳出膿螺旋散方

桑螵蛸

煑桑
殼尖木之

右一味入麝香少許同研先用物拭膿淨然後繆藥
治小兒耳聾膿出久不差者紅白散方

白礬熬令汁枯 染烟脂

右二味等分研為細末先以綿杖子纏去膿極乾用藥半錢七繆之不過三
兩次

治小兒水入耳內膿出疼痛日夜不止如聖散方

箭筈內艸末如有蟲子同研令細用參錢研 脂粉 麝香各一錢研

右三味同研細先以綿杖子拭乾耳取藥三劄耳子深繆入耳以綿塞定如
覺刺劄即是惡物要出去綿側耳令出甚者三度差大人亦可用

治聰耳有膿水狼牙散方

狼牙 白歛 竹蛀屑各一錢

右三味擣研細每用少許繆耳內

治聰耳膿水不絕礬脂散方

白礬熬令汁枯 松脂

木香

花烟脂各一錢

右四味擣羅為散每用綿拭膿後滿耳填藥

治小兒聾耳汁方

黃連去須
參分

龍骨燒研
半兩

烏賊魚骨去甲
一枚尖

右三味搗研為末麻油調少許日三四度點耳中

治小兒聾耳汁出漬外生瘡雄黃散方

雄黃研一
兩

黃芩法黑
一錢

曾青研各
兩

右三味擣研為散以少許移外瘡更用綿裹一大豆塞耳中日再換之

治小兒蚰蜒入耳胡麻枕耳方

胡麻不煑
分

右一味先熬後擣貯以葛囊枕之即出

治小兒飛蟲入耳雄黃油方

雄黃分

右一味研細以麻油調抹耳中

治小兒蟲入耳桃心塞耳方

桃心葉二七
葉焙

胡麻子炒一升

右二味先以桃葉塞耳中其蟲必出如不出以胡麻子炒令香以葛袋盛枕

聖濟經全

治蟻子入耳方

尖肉

右一味安在耳邊蟻子自出

又方

韭

右一味擣絞取汁滴耳中

又方

藍青

右一味擣絞取汁滴耳中

又方

葱

右一味取涎滴耳中

大德重校聖濟總錄卷第一百八十一

大德重校聖濟總錄卷第一百八十二

小兒門

小兒諸丹

論曰風熱發丹古方謂小兒得之最忌以其氣血未定肌膚柔脆無以勝悍毒故也是以諸丹不同其發無定處俗又謂之溜流走經絡散發肌表如塗丹之赤有法可驟洩去毒氣不爾則丹毒入腹近心即死但初發於頭者不可驟爾治小兒丹毒赤腫壯熱百治不差者藍青湯方

乾藍青二兩

凝水石碎

石膏研

山梔子人各一兩半

茈胡去苗

犀角鋸

黃芩心去黑

杏人湯浸去皮尖雙人炒

甘草炙

赤芍藥

羚羊角鋸

葛根剉各半兩

知母一兩

右一十三味粗摶篩每一錢乙水半盞煎至四分下蜜半錢竹瀝少許再煎至三分去滓空心日晚分溫二服更量大小加減

治小兒丹毒偏身黃芩湯方

黃芩去黑心

麻黃去節根

秦艽去苗

升麻一分

大黃爛

防風去叉半雨各

右六味粗搗篩每一錢七水七分煎至四分下朴消末半錢七去滓空心分
溫二服晚再服更量兜大小加減

治小兒丹毒黃耆湯方

黃耆剉

蒺藜子角炒去

黃芩法黑

大黃焙

甘草炙剉各一

右五味粗搗篩每一錢七水七分煎至四分下朴消末半錢七去滓食前分

溫二服更量兜大小加減

治小兒丹若入腹及下部陰卵百癰不差麻黃散方

麻黃去根

升麻各半

消石研一

右三味搗羅為散每服半錢七井華水調下空心日晚各一

治丹入腹澤蘭湯方

澤蘭

桔梗

附子炮裂去皮膜

藜草

藁本去苗土

細辛

去葉

茵芋分

右七味剉如麻豆每一錢七水七分煎至四分去滓分溫二服空心日晚各一

治小兒丹毒防入腹甘草散方

甘草剉一

油麻片

右二味先取油麻去皮研細絞取汁一合調甘草末半錢匕服日再

治小兒丹毒青藍汁方

青藍汁合 竹瀝合

右二味和勻空心溫服一合日晚再服以差為度

治小兒丹數十種大黃搗湯方

大黃

甘草

炙

當歸

焙切

芎藭

白芷

獨活

去蘆頭

黃芩

去黑心

芍藥

各半兩

升麻

沉香

參

木香

木蘭皮

各半兩

苦消

消參

右一十三味粗擣篩拌勻每用二兩以水六升煎至四升去滓以綿二片蘸之更互溫搗丹上冷即易日五七度即差

治小兒發丹毒熱痛吳藍湯搗方

吳藍

大黃

槐白皮

商陸

榆皮

各二

右五味細剉每用三兩以水五升煎至四升去滓入朴消半兩攪勻以綿二片浸於湯中更互搗丹上日三五度即差

治小兒發丹毒麻根湯洗方

苧麻根剉參 小豆合

右二味都用水七升煎至四升去滓溫洗丹上冷即再暖日三五度即差

治丹毒偏身絳色鯽魚塗方

生鯽魚一頭參兩 麻油二兩

右二味擣魚令細入油研勻塗丹上日三五度即差

治丹行走皮中浸癢者名丹火也入腹殺人蟾蜍散塗方

乾蟾蜍

右一味破末油調塗之以差為度

治小兒野竈丹從膝起蕘葉塗方

乾蕘葉末

香薷末

赤小豆末各半兩

生蒴藋葉莖

一握細剉

右四味細研蒴藋入諸藥末和調如糊塗丹乾即易之以差為度

治小兒胡吹竈丹從陰下起泥醋塗方

右用磨刀水搘下泥和醋調膏塗之乾即更塗以差為度

治小兒胡漏竈丹從臍中起伏龍肝塗方

伏龍肝

右一味用屋漏水去清取淀和調如糊塗之乾即再塗以差為度

治小兒神氣丹從項起犬骨灰塗方

犬枯骨

右一味為末以青羊脂調如糊塗之日三五次

治小兒飛竈丹從項起鐵槽水洗方

右取淬鐵槽中水日洗三五度

治小兒家火丹發如大指日長一寸偏著兩脇傍兩頰上梓木灰塗方

梓木白皮 蓼葉各一
兩

右二味燒灰研末以雞子白調如糊塗之以差為度

治小兒煙火丹從身起豬槽泥塗方

豬槽下泥合生麻油一
兩

右二味和調如糊塗之以差為度

治小兒烟火丹從背上起或走兩臂足赤如火真珠塗方

真珠粉一兩 慎火草天是也
研細研如膏汁景

右二味和調如糊塗之以差為度

治小兒神竈丹起兩額傍不出一日變為赤黑色慎火草汁塗方

慎火草

右一味絞取汁先以刀子微鎌丹上令血出塗藥以差為度

治小兒天竈火丹發尻間正赤流陰頭赤腫血出葱薑莞塗方

葱五莖和須切研

薑莞五莖生者和梗切研

赤小豆末研各

竈門上灰研各

右四味合研勻細以青羊脂三兩調勻塗之以差為度

治小兒地竈丹從陰下起入踝骨上廢竈塗方

廢竈燒灰各一兩

屋四角茅燒灰各一兩

右二味和研勻細以新汲水調如糊塗丹乾即易之以差為度

治小兒私竈丹從背上起竈土塗方

竈中黃土研

右一味取打鐵磨刀槽中水和調如糊塗丹乾即易之以差為度

治小兒廢竈丹從兩脚赤及從臂曲上起五加灰塗方

五加葉根燒灰

右一味研為細末取打鐵磨刀槽中水調如糊塗丹乾即易之以差為度

治小兒鬼火丹發兩臂赤起如李子及從面上起戎鹽塗傳方

戎鹽分

附子一枚

右二味燒過研細用雄雞血調塗丹上日五遍以差為度

治小兒野火丹發偏身斑如梅李狀雌黃塗方

雌黃

研

戎鹽

研各一兩

右二味以雞子白調塗丹上日三五次以差為度

治小兒茱萸丹初從背起偏身如細纈一宿成瘡者雞子塗方

雞子白

赤小豆末

右二味和調如糊塗之以差為度一方云治水丹

治小兒螢火丹發灼灼在脇下正赤色而長初從額起而多痛伏龍肝塗方

伏龍肝

研細五合

生麻油

右二味和研如糊塗傳乾即易之以差為度

治小兒五色丹蒴蘆塗方

蒴蘆葉

右一味爛擣塗傳丹上乾即易之以差為度

治小兒白丹豬通灰塗方

豬屎灰

雞子白

右二味調和如糊塗之以差為度

治小兒火丹走皮中發赤如火燒狀須臾爍爍起醋豉塗方

豉

右一味研細入醋調塗丹上以差為度

又芭蕉塗方

芭蕉葉根

右一味取擣汁塗之以差為度

治小兒火丹熱如火達腰須急救之芸薹塗方

芸薹葉

右一味爛擣和汁塗傅之以差為度

又治火丹鍼挑方

右於兒男左女右大拇指面螺旋紋上鍼挑有筋斷之即差

治小兒伊火丹從兩脇下起青黑色羊脂塗方

煅鐵下槽中鐵屎燒研為末半兩

羊脂二兩

豬糞燒灰一兩

右三味研勻如糊塗之以差為度

治小兒骨火丹初在臂起赤黑色二蒜塗方

大蒜

小蒜各一兩

右二味爛搗厚塗傅之以差為度

治小兒尿竈火丹發膝下從兩股起及臍間走入陰頭桑木根洗方

桑木根五兩

右一味細剉以水五升煎至三升去滓溫洗日五七度即差

治小兒尿竈丹從踝及胫起茅灰塗方

茅草

取燒灰研爲四角者

雞子白

右二味和調如糊塗之以差為度

治小兒朱田火丹先發背偏身一日一夜而成瘡棘根湯洗方

棘根剉碎半兩

右一味以水五升煎至三升去滓溫洗丹上三五度即差

治小兒赤丹色純赤為熱毒搏於氣血馬齒莧汁方

馬齒莧

右一味爛搗絞取汁三合空心溫服一合午晚再服即差

治小兒丹毒赤腫壯熱百醫不差者藍青煎方

藍青切

竹瀝格一

生葛根汁

澄清蜜二升

寒水石

研四兩

石膏研參兩

山梔子人二兩

知母焙二兩半

茈胡去

犀角

鏘一錢

黃芩法黑心

杏人去皮尖炒赤芍藥

羚羊角灰

研甘草一錢剉各一

右十五味除研藥并汁外㕮咀以水五升并竹瀝先煎去滓取三升次內
杏人葛汁及蜜微火煎成煎每服半合至一合米飲化下日三
治小兒月內發丹升麻黃芩湯方

升麻

黃芩法黑

犀角鏘

大黃爛

茈胡

山梔子人焙半

藍葉切二

石膏參分

甘草尖剉一分

右九味粗擣篩每二錢入水一盞煎至半盞去滓食後分溫二服更量大小
加減

小兒遊腫赤痛

論曰小兒遊腫由風熱客於經絡隨氣行移流走肌膚致赤腫疼治病法當內

服藥以滌其蘊熱外傅劑以散其癢痛則遊腫自消

治小兒風熱遊腫色赤犀角飲方

犀角銬

黃芩法黑

升麻

山梔子人

黃耆剉

牛黃研

防已各一

朴消分

右八味除牛黃外粗擣篩每二錢七以水一盞煎取六分去滓下牛黃一大豆許分作二服早晨日晚各一隨兒大小以意加減

治小兒遊腫豬脂膏方

豬脂鍼過四合

附子生去皮臍

蜀椒生去目開口者各一分

食鹽研參分

右四味擣研三味為末入脂內熬過候冷塗之以差為度

治小兒頭及體赤遊毒腫痛升麻膏方

升麻兩

犀角銬

射干

黃芩法黑

梔子人

玄參各一兩半

芍藥

大黃

藍實

羚羊角銬各一兩

大青半兩

生乾地黃二兩半

右一十二味細剉以豬脂二斤半入鑑中於慢火上熬不住手攪煎成膏去滓瀝器中盛取摩腫處差不拘多少

治小兒風熱赤遊腫枯樓散方

枯樓剉

右一味擣羅為散以釀醋和塗之

治小兒赤遊腫行流於體若不急治入腹即死白豆散塗方

右取白豆末水和塗之勿令乾差

治小兒赤遊腫漸漸長引不止塗傳方

牛膝剉

甘草剉各二兩

右二味擣羅為散每用二錢匕以水一盞煎至六分去滓調竈下黃土和塗之乾即易

治小兒風熱赤遊腫方

右以麥麴末水和塗之

又方

右取伏龍肝和雞子白塗之乾即易

小兒癰瘡

論曰經謂六府不和則留結為癰蓋小兒榮衛否溢不得通利遂於肉理致肌

肉腫結皮薄而澤是癰之狀也癰既不得內消則膿潰穿穴而成瘡故謂癰瘡也
治小兒癰腫成瘡犀角湯方

犀角屑

蓼蕤

升麻

甘草

麥門冬

去心
焙

赤芍藥

藜莞

立參

各半
水

右八味粗擣篩每服一錢匕水半盞煎至四分更入消石末一字匕再煎、鎔去滓溫服量兒大小加減

治小兒癰瘡瘍藏府壅熱心神煩躁大小便不利大黃湯方

大黃

炒

升麻

梔子人

朴消研

枳殼

去瓤
炒

黃耆

剉各半
兩

右六味粗擣篩每服一錢匕水七分煎四分去滓溫服量兒大小加減

治小兒癰瘡煩熱疼痛黃芩湯方

黃芩

剉黑心
半

梔子人

立參

升麻

大黃

炒

黃耆

剉

連翹

犀角屑

藍葉

甘草

木香

右一十二味粗擣篩每服一錢匕水半盞煎三分去滓溫服量兒大小加減

理 治小兒癰瘡腫痛益母草飲方

生益母草不拘多少
少洗剉

右一味搗取汁每取三二分服之更量大小加減以滓傅癰上乾則易治小兒一切癰腫毒諸風熱神驗黃蘗散方

黃蘗去粗皮蜜炙一兩

陳橘皮白炒湯浸去

人參

葛根剉各半兩

右五味搗羅為散用溫水調下半錢尤量兒大小加減日三兩服

治小兒癰瘡腫痛方

右取豬腦塗紙上貼之乾即易日數偏

又方

右用芥子爛研水和塗紙上貼之

又方

右用馬齒莧搗傅之

又方

右以地龍糞新汲水調塗之

又方

右用薑石末和蒜擣封上

又方

右用馬鞭草擣傅之即消

又方

右以芸薹菜擣塗之

治小兒癰有膿令潰方

右取雞羽毛七枝燒末服之即潰

又方

右用人乳和麯封上至晚膿血出盡

小兒疽瘡

論曰小兒因五藏不和寒邪壅滯榮衛閉塞逆於膚肉遂生疽腫其狀腫結皮
強上如牛領然疼極堅硬深附筋骨既得膿後其疽可愈更須用排膿換肌之
藥若餘毒未去封斂稍疾則源流復生或痒或痛肌汁不斷瘡竅不得合矣
治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒熱瘡癰漏蘆湯方

漏蘆去蘆頭

連翹

白斂剉

芒消

甘草剉

升麻

麻黃去根節湯
煮掠去沫

黃芩心去黑

枳實炒黃
各一分

大黃剉炒一兩

右一十味粗擣篩每二錢七水一盞煎至五分去滓分溫二服量大小加減治小兒熱毒腫色白或惡核癰癰附骨癰疽節解不舉白丹走偏身中脇瘡五加減

香連翹湯方

木香

薰陸香

沉香剉

雞舌香

黃芩法黑

麻黃去根節湯
煮掠去沫

麝香研各一分

連翹

海藻洗去鹹焰

射干

升麻

枳實各半兩

去瓢趁炒

大黃剉炒二兩

右一十三味粗擣篩每二錢七水七分煎至四分去滓入竹瀝一合更煎一兩沸分溫二服量大小加減

治小兒癰疽瘡癰腫黃耆湯方

黃耆

剉

連翹

升麻

惡實炒各半兩

立參

丹參

露蜂房尖

枳殼去瓤
炒

甘草火各一分

右九味粗擣篩每服一錢七水七分煎至四分去滓食後臨臥溫服量大小加減

治小兒痘瘡藍葉湯方

吳藍葉

犀角

升麻

黃耆

山梔子人

連翹

甘草

黃芩

大青

玄參

大黃

剉炒

右十一味粗擣篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓食後臨卧溫服量
免大小加減

治小兒痘瘡木通湯方

木通

剉

升麻

赤芍藥

黃芩

法黑

山梔子人

麥門冬

去心倍
各二分

犀角

大黃

剉炒各一兩

枳殼

去瓤炒半兩

右九味粗擣篩每二錢匕水一盞入生地黃汁半合同煎至七分去滓分溫
二服食後臨臥服量大小加減

治小兒瘡腫癰疽黃耆湯方

黃耆

剉

葛根

剉

麥門冬

去心一兩

黃芩

法黑

犀角

剉

升麻

甘草

炙各一兩

木香

半兩

右八味粗擣篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓食後服量大小加減
治小兒癰疽犀角知母湯方

犀角

銹

知母

焙

黃耆

剉

黃芩

法黑

人參

丹參

葛根

剉

大黃

炒

甘草

炙各一兩

玄參

參

麥門冬

去心焙一兩半

右十一味粗搗篩每服一錢匕水半盞入生地黃汁半合同煎至四分去滓食後臨臥溫服量大小加減

治小兒癰痘瘍毒未破或膿未潰憎寒壯熱五香丸方

木香

分

沉香

剉

蘇合香

研各半合麝香研半分

犀角

銹二兩

大黃

生剉一兩半

雞舌香

研

吳藍葉

研各半分

梔子

人一兩

熟乾地黃

二兩

白芍藥

兩

人參

一兩

白茯苓

去皮一兩

右一十三味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煎黃耆湯下食

前服

又方

乾蠶蟇

一箇

右一味燒灰細研以豬脂和傅之

又方

敗鼓皮不以多少燒灰

右一味細研以豬脂和傅之

小兒癩癧結核

論曰小兒身生熱瘡久不差者必生癩癧其狀作結核在皮肉間三兩箇相連
瘡也是風邪搏於血氣凝結所生也

治小兒癩癧焮腫疼痛身體壯熱大腸壅滯小便赤澀心神煩躁少得眠臥犀
角散方

犀角銹屑一兩

惡實一兩

連翹二兩

麝香研一兩半

木通剉炒一兩

立參二兩

沉香剉半兩

丁香一兩半

朴消一兩

右九味粗擣篩每二錢七以水一盞煎至六分去滓分溫三服早晨日午晚
後各一以利為度更量兜大小以意加減

治小兒頸生癩癧榆白皮傳方

右以榆白皮爛擣如泥封頸上頻易

治小兒癩癧鉛丹塗方

鉛丹參兩

右以銚子熬當有脚如黑灰取脚不計多少更研如粉用面脂調塗以故帛貼數拭患處有惡汁出拭却更貼半月差內消不作瘡極効

治小兒癩癧連綴如梅李核狀硇砂丸方

硇砂 砉黃各一

右二味研如粉用糯米飯為劑擦如小麥粒大有患者即烙破內一丸五日一換後用生肌膏

治小兒癩癧生肌膏方

鉛丹

兩半

杏人

湯浸去皮尖
雙人炒一兩

蛇蛻皮

炒焦剝一條
兩

頭髮

如胡桃
大一團

菜子油

半斤

皂莢子

炒黑剝
并

右七味先擣杏人蛇皮皂莢如粉與諸藥於銚子中煎以柳籠子不住手攪成膏但有瘡塗貼日換無不差者

治小兒癩癧結核久不差追毒斑貓膏方

斑貓

二枚去頭
足及頭
燒

巴豆

二十枚去皮
心漿水煮

松脂

半斤

右三味先研二味為粉次入松脂鎔化攬令勻更擣一二百杵作餅熱貼在癩癧上藥力盡別換以差為度

治小兒腦熱結癩癰連兩耳下腫痛身體寒熱坐卧不安飲食不下立參膏方

立參

紫葛

黃藥子

大黃剉炒

木香

卷柏

芒消

紫檀香各一

右八味擣羅為細末以雞子白調和稀稠得所塗於瘡上瘡腫破時則去芒消塗之

治小兒癩癰結核寒熱防風丸方

防風去蘆

連翹

桑根白皮

炙牡丹皮

白頭翁

黃芩去粗皮

微火豉黃炒令

獨活去蘆

秦艽去苗土各一兩

海藻

洗去鹹

焙參各二兩

右一十味擣羅為細末鍊蜜丸如麻子大每服三丸米飲下早晨日晚各一服更量兜大小加減

治小兒癩癰麝香散方

麝香研分一

鴿糞炒參偏

右二味再同研如粉每服半錢匕酒調下日二服早晨晚後各一更量兜大小加減

治小兒熱毒風腫癩癰內消赤小豆散方

赤小豆炒

豬牙皂莢莢去黑皮并子

黃藥子

消石

大黃炒剉

木鼈子去殼一兩

黃藥子

右六味擣為散每用量瘡大小以不語津唾調塗乾即易以差為度

小兒惡瘡

論曰小兒氣血純陽肌肉柔脆風毒邪熱易以致傷若榮氣不從逆於肉理結成悍毒疼痛腫焮非常故名惡瘡其候或痒或痛或赤根隱肉鞭不作膿或穿穴作膿久不得差治法隨內外證藥之則瘡可愈

治小兒惡瘡鉛丹膏方

鉛丹十
風化石灰
豬脂各一

右三味將二味同研細以豬脂搜作餅火燒通赤如此五度藥成擣羅為末濕瘡乾貼如乾瘡即作膏用豬脂調紙上貼

治小兒惡瘡大黃湯洗方

大黃生剉
黃連須一錢
黃芩去黑
澤蘭
白礬枯

石南各一兩
戎鹽一分
蛇床子炒參合

右八味粗擣篩每以二兩用水三升煮取二升去滓適寒溫以綿絮內湯中

薰洗之日三

治小兒惡瘡茵芋湯浴方

茵芋一

兩

甘草

剉

苦參

各參兩

細辛

去苗葉

黃連

法須

各

兩

蕤人

二十枝去皮

右六味粗搗篩每以三兩用水五升浸汁煮取三升去滓浴兒逐日用

治小兒惡瘡偏身如麻豆狀包裹膿汁乍痛乍痒甘草散方

甘草

剉生用

芍藥

黃芩

法黑心

白斂

剉

黃連

法須

黃蘖

各半兩去粗皮剉

右六味搗羅為細散用白蜜和塗於瘡上日再亦可作湯浴之

治小兒惡瘡人所不能識者胡粉散方

胡粉

色五分金黃黃連須

黃蘖

各半兩去粗皮剉

右三味搗羅二味為散與胡粉相和一處研勻傅瘡上日再立驗

又方

豆豉

炒黃一合

右一味擣羅為末傅瘡上

又方

蝦墓

一枝燒灰

右一味搗羅為細散入麝香一分一處同研勻乾傅瘡上

又方

柳枝葉

麥門冬炒研

右一味用水五升煮至三升去滓入鹽少許淋洗瘡上

治小兒頭上惡瘡黃粉膏方

胡粉

黃連末各一兩

水銀分

糯米二升

赤小豆二升研

黃連一粒和

右五味先將水銀於手掌中唾研化後即以麻油調藥入水銀和勻塗瘡上

小兒凍爛瘡

論曰小兒肌肉柔脆外邪易侵故風寒搏於肌肉凝於氣血則致皴裂久而生瘡或痒或痛其狀焮腫破出膿汁多在兩耳或手足間故謂之凍爛瘡

治小兒凍瘡蜀椒湯方

蜀椒去目并開口炒出汁

鹽兩

右二味以清酒五升煎至二升數數蘸之其藥可五六日用

治小兒凍足爛瘡附子散方

附子生剉
二枚 乾薑炮
二兩

右二味搗羅為散入綿中裝囊如有瘡膿即調臘月豬脂塗之

治小兒凍耳成瘡或痒或痛黃藥散塗方

黃藥去粗皮
炙剉
兩 白斂各半

右二味搗羅為散先用湯洗瘡後以生麻油調塗之

治小兒凍脚或痒或痛小麥湯方

小麥半
剉 糜草參握

右二味用醋一升水二升同煮至二升去滓放溫洗足

治小兒凍手皴折痛白斂散方

白斂分
兩 生麻油二合
搗爛生

右三味將白斂白及同搗羅為散與油同研勻更入炊菜菔一枚爛研以酒調如糊先以童子小便洗手後塗手上

治小兒凍耳并手面皴痛積豬脰膏方

積豬脰具

右一味研如膏入漿水少許候稀稠得所先用童子小便洗手面後以匙抄少許勻塗手面上

治小兒凍瘡手足指欲墮及耳欲落柏葉膏方

柏葉

火乾為末參兩

杏人

二十枚湯浸去皮尖別搗如膏

麻油

參兩

頭髮

一團如雞子大

鹽

研

一

乳香

研半分

蠟

半兩

右七味先煎油蠟沸即下諸藥以髮消為度攪勻貯瓷器中每用先以小便洗瘡綿纏手指裹乾厚塗膏即以軟帛裹之如脚指相淹處尤須多用膏裹帛紗厚以綿裹勿令寒氣得入每兩日一洗瘡換藥稍愈後三四日一換

小兒疥

論曰小兒瘡疥率因於蟇蟲變化而生小兒多此疾仍喜生于手足指縫間浸淫偏體近暖及衣服過厚則痒悶不任搔之黃汁出疼痛不止蓋由風熱客於肺脾散於肌肉熏發皮膚使然也

治小兒風熱肺疳皮膚生疥鼻內瘡疥苦參丸方

苦參末

四兩以酒參升熬成膏

胡黃連分

黃連去頤一兩

棟實去皮

蕪荑

炒

蠅蠻翅尖

木香各二

右七味搗羅六味為末入苦參膏內和擣千杵如粳入蜜少許和丸如麻子
大一二歲兒每服五丸食後溫水下更量兒大小加減

治小兒瘡疥三黃散塗方

黃連法須

黃蘖去皮尖

臭黃研

赤小豆各二兩

水銀研

右五味將黃連黃蘖赤小豆三味搗羅為散與水銀臭黃同研勻細旋取油

調塗瘡上

治小兒瘡疥體熱黃連散塗方

黃連法須

黃蘖去粗皮尖

秫米炒各一兩

赤小豆

膩粉研各一分

右五味搗研為散油調塗舊帛上先洗去瘡痂封之

又方

黃連法須

糯米粉各二兩

水銀壹兩研

胡粉炒研一兩

吳茱萸湯浸炒

赤小豆為末各

一分

右六味先以水銀和津於手中研如泥次以豬脂四兩入瓷器內慢火化去
津下五味藥末攪勻成膏先洗瘡拭乾塗之

治小兒瘡疥蛇床子散方

治小兒瘡疥蛇床子散方

蛇牀子

吳茱萸
湯浸燒炒硫黃

研各少許
蕪荑人

右五味搗研為散用油一合入葱一莖同煎候葱黃色停冷調藥塗之

治小兒頭面瘡疥癬大麻子塗方

大麻子

五升

右一味擣末水和絞汁塗瘡上

小兒癬

論曰小兒體有風熱脾肺不利或濕邪搏於皮膚壅滯血氣皮膚頑厚則變諸
癬或斜或圓漸漸長大得寒則稍減暖則痒悶搔之即黃汁出又或在面上皮
如甲錯乾燥謂之癩癬此由飲乳乳汁漬著乃生復以乳汁洗之即差

治小兒癩風痒雌黃膏方

雌黃

研

黃連

去須

莽草

蛇牀子

炒

黃蘖

去粗皮尖

苦參

蕪荑

炒各半兩

蒸蘆

消石

研各一分

松脂

半兩

杏人

湯浸去皮尖
別研如膏一兩

右十一味除雌黃松脂杏人外擣羅為末取臘月豬脂半斤和松脂入鑄
中煎令沸下杏人次下諸藥末攪勻凝為膏每用先以醋泔洗拭乾塗之日三

治小兒癬疥赤腫及濕癬久不差黃連膏方

黃連去頭

黃蘖皮去粗
入膏中各一兩

蛇牀子炒
蘭茹

礬石大煅
別研

右六味擣羅前四味為末以臘月豬脂四兩同入銚子內煎四五沸下礬石末又煎三兩沸取下良久下水銀攪如稀泥候冷先以清泔皂莢湯洗拭乾以火炙痒塗之日三

治小兒一切瘡癬痒痛不止桑螵蛸散方

桑螵蛸十枚燒存
二分性

臘粉錢

麝香半錢

右三味研為細散生油腳調雞翎掃候乾有裂處再掃

治小兒濕癬附子散方

附子生皮去
附子

雄黃研

白礬燒灰

吳茱萸

湯浸炒各一分

米粉半兩

右五味擣研羅為散每日三次用綿搘撲之

治小兒諸癬及瘡痒蛇牀子散方

蛇牀子炒
兩

右一味擣羅為散以緒白膏和傅之

又方

羊蹄根

汁搗取

右一味以蜜和勻先刮瘡四邊以藥塗之半日許拭去更以陳米醋和羊蹄根滓傳癬上

又方

槐白皮

五兩

右一味以水一升煎三五沸候冷數洗之

治小兒乾濕癬

雄黃散方

雄黃

麝香各一
分

右二味細研為散用煎油調塗之乾再上

治小兒濕癬

枸杞根散方

枸杞根

一兩

右一味擣羅為散和臘月豬脂傳之

又方

桃枝青皮

二兩

右一味搗羅為散醋和傅之

小兒風癩癮胗

論曰小兒風癩癮胗者由風邪客於腠理搏於榮衛傳而為熱熏散肌肉溢於皮膚變生癩胗狀如瘡癰乍差乍發痒癩不時搔之血出其痒不已故名風癩癮胗赤胗者熱白胗者寒治法不可不察

治小兒肺風癩痒癮胗疥癬五參散方

人參

紫參

白附子

炮裂各半分

桔梗根剉
天麻各半

立參

剉

沙麻

剉各一兩

丹參

參分

右八味同擣為散五十日至百日兒每服一字二百日至一歲兒每服一字半嬪汁調下二歲至三歲每服半錢匕煎薄荷金銀湯或棗湯調下空心午後各一服如乳母服每服一錢匕溫酒調下

治小兒風胗壯熱心躁黃耆湯方

黃耆

剉

白鮮皮

剉

防風去叉各枳殼炒去黑

一升分

黃芩去黑

甘草

炙各一錢

右六味粗擣篩每服一錢匕水一盞煎至五分去滓溫服食後臨臥各一

治小兒癩胗風痒防風湯方

聖濟全錄

卷二十一

各

防風去叉白茯苓去黑皮升麻貝母去叉葛根子角炒去大黃剉炒甘草一分各

右七味粗擣篩每服一錢匕水七分煎至四分去滓溫服食後日二

治小兒風脇皮膚腫枳實湯方

枳實去瓢炒黃兩片芍藥一分

右二味粗擣篩每一錢匕水半盞煎至三分去滓入清酒半合更煎三五沸分溫二服空心午間晚後各一更量大小加減

治小兒風脇石南湯方

石南葉一把蜀椒去目及開口者炒出汗半兩

右二味以水二盞煎取一盞半去滓下消石白礬各半兩攪令消以綿搘塗於脇處乾即易

治小兒癰脇莽草湯方

莽草一兩防風去叉附子炮裂去皮臍一兩牡蠣煅過各

右四味粗擣篩以水一斗煮取七升去滓通寒溫浴避風

治小兒風脇出不止塗傅方

白礬去叉汁桔

右一味研爲末酒調用雞翎掃塗脇上

又方

景天大草是也一兩一分慎

藍參兩

右二味同搗研絞取汁以熱手摩塗之日再

治小兒風脇壯熱心躁犀角湯方

犀角銬

升麻

麥門冬

去心茱萸子

炒去角

甘草

炙去毛

葛根

右五味㕮咀如麻豆大每服二錢七水一盞煎至五分去滓食後溫服更量

歲數加減

小兒癩疝

論曰小兒陰核氣結腫大者癩疝也由稟受之初肝經虛弱因啼怒腫氣氣脉下墜擊於陰器則筋脈緩縱結聚不散是爲癩疝也若氣偏虛則其腫亦偏蓋足厥陰肝之經環陰器抵少腹是動則爲癩疝少腹痛之疾

治小兒氣癩土瓜根湯方

土瓜根

當歸

切

芍藥

各半兩

右三味粗擣篩一二歲兌每一錢七水半盞煎至三分去滓分溫二服空心

日晚再服量兒大小加減

治小兒癩瘡薏苡人散方

薏苡人

芍藥

土瓜根

蛇床子

黃芩法黑

桔梗炒

蛇含絡參

右七味擣羅為散一二歲兒每服半錢七空心溫酒調下日午晚後再服量
大小加減

治小兒陰癩狐陰丸方

狐陰一具
火黃

蜚生蟲微四枚
桂皮

桂皮粗附子炮裂去皮

乾薑炮

桂皮

蒺藜子角炒去苗各

細辛去苗各一
參分

桃仁湯浸去皮研
蜜入炒別研

卷柏炮

桂皮各半

右九味擣研為末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒米飲下五丸空心日晚各
一服量大小加減

治小兒陰癩氣病發作有時芍藥丸方

芍藥

大黃剉各
半兩炒

赤茯苓去黑半夏
湯洗去桂皮

蜀椒

出汗各參分
去目及開口炒

右六味擣羅為末鍊蜜和丸如葵豆大三四歲兒食前米飲下五丸日三服

量兒大小加減

治小兒陰癆偏腫牡丹丸方

牡丹皮

豉炒

防風去火

黃蘖

去粗皮微火滑石刷

桂去粗皮各一分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每服五丸米飲下早晨日晚各一服量兒大小加減

治小兒陰癆韭子丸方

韭子

炒參兩半

附子

炮裂去皮臍參分

狐陰

一具炎黃

右三味搗羅為末鍊蜜和丸如麻子大一二歲兒每服五丸米飲下早晨夜臥各一服量兒大小加減

治小兒陰癆腫硬桂心散方

桂心

半兩

地膚子

一兩

白朮

一

右三味搗羅為細末三歲兒每服以溫酒調下半錢七日三服量兒大小以意加減

治小兒癩癟攻注連腎外囊腫脹或疼痛偏墜昆布丸方

聖齊彙錄

卷一百八十二

小兒門

十八

昆布參洗瀉香子

半兩微炒

木香

甘草

微炒

黃芩

丁香

爛牡蠣

生用一分

銅青

以上各

右八味擣羅為末用熟棗肉為丸如麻子大每一二歲兒煎甘草湯下三丸

量兎大小以意加減

治小兒癩瘡腫痛方

枳殼

參半兩微炒

右一味擣為散每用柏枝煎臘汁調厚塗兎囊腫處妙

治小兒癩不消白蒺藜散方

白蒺藜

半兩微炒去刺

香豉

半兩微炒

鼠婦

蜜蟲

微火

川大黃

剉微炒

右七味擣羅為細散一二歲兎每服以溫酒調下半錢七早晨晚後各一服
量兎大小以意加減

治小兒陰癩日夜疼痛桃仁丸方

桃仁

三分湯浸去皮大雙仁微炒

川大黃

半兩微炒

赤芍藥

半兩

防葵

半兩

半夏

一分

滑石

桂心

一分

赤茯苓

半兩

川椒

一分去目開口者微炒去汗

右八味擣羅為末鍊蜜和丸如菉豆大每三歲兒食前以溫酒下五丸看兒
大小虛實以意加減

又方

蟬皮一錢

存性燒

右一味研細臨卧熱酒調下一錢七

治小兒癩疝及少陰受邪冷氣滯正氣散丸

京三稜

一枚三分

心

存性紙

裏一重

淨土埋

令中宿

右一味搗羅為散每服一字匕煨葱米飲調下不拘時候

治小兒癩疝蓖麻丸方

蓖麻仁

參十枝

棘剛子

去皮二枝

石燕子

燒一枚

滑石

末二錢七

麝香

研半錢七

右五味擣研勻稀麪糊和丸如菉豆大每服十五丸空心煎燈心湯下一服
即消

治小兒癩疝發作疼痛木通散方

木通

剉

膽礬

一分

右二味擣研為散每服半錢匕米飲調下

治小兒癩瘡腫鞭疼痛滑石丸方

滑石

碎

澤蘭

錢二

粉霜

錢一

續隨子

去皮半兩

右四味擣研為末白麪糊和丸如菉豆大五歲以下每服五丸五歲以上七丸豆蔻酒下空心臨臥服

治小兒陰癩偏大白頭翁根傳方

右取生白頭翁根擣隨偏腫處傳一宿當作瘡二十日愈

治小兒陰癩蕷菜根傳方

右取蕷菜根擣碎傳之立差馬鞭草傳亦佳

治小兒陰核氣結腫大或偏腫疼痛漆燕散方

漆燕

一枚入瓦瓶子內用鹽泥固濟陰乾炭大燒令通赤為度放冷取出研令細

續隨子

去皮一錢

右二味擣研為細散每服半錢匕米飲調下

治小兒肝經虛弱筋脉緩縱氣脈下墜陰器腫大久成癩瘡三應散方

礞香蟲

一枚研汁膩粉二錢

胡黃連

分一

右三味同研令乾每服一字匕陳米飲調下不拘時

大德重校聖濟總錄卷第一百八十二