

臨證指南醫案（十一）

序

華興余家世為姻姪華君岫
雲精通岐黃術常存利濟救
人之心致不倦向慕吳門葉天
士先生為嘗世醫扁留心覓其
醫案約計盈萬分門逐刻共
成十卷名曰附證指南已通行
海宇矣壬申歲又將其續補醫

案溫熱論與平生所集各種經
驗奇方付刊以備救急其願甚
誠急於癸亥謝世其方止刻于
二三半塗而廢見者咸為惋惜
華君好友岳丈廷璋不忍膜視
力勦徽蘇義商程葉兩君子
授梓完璧以公同志一日漢川
程君來蜀出此編丐余作序予

素不知醫且當公務終攀軍
書旁午竟不暇及第展閱一過
了然心目洵為青叢家不可缺
一之書名盧扁後起志未能舍
是而別闇空冥實倘於鄉陬僻壤
忘患奇絳一時罕有良醫調劑
備此查攷對症用藥立能起死
回生功效匪淺慎勿以此編易

簡而忽諸

乾隆四十年冬小春月

賜進士出身

欽命四川按察使司按察司加三

級擬臺杜玉林撰并書



種福堂續選臨證指南總目

及門諸子同較刊

卷一

溫熱論

續醫案

卷二

中風

補益

盜汗

咳嗽

勞

赤白濁

蠱

吐

膈

便閉

痞塊

針灸

黃疸

河白

中暑霍亂

消渴

瘟疫

痧

瘻瘍

瘡

泄瀉

痢

脫肛

痔漏

腸風

溺血

卷三

疝氣

心口胃脘痛

呃逆

欬逆

耳

目

鼻

口

舌

牙

咽喉

癰疽

疔

瘻瘍結毒

下疳

中毒

諸瘡

諸丹毒

無名腫毒

卷四

跌打損傷

園藥

提藥

降藥

代針點頭

長肉收口

麻藥

癰癧

諸風

疥癬

雀斑

疣瘻

小兒門

初生

雪口

臍風

稀痘方

痧痘

急慢驚風

疳積

婦人門

胎前

產後

經帶

血崩漏

乳疾

雜症

種福堂公選溫熱論醫案卷一

葉桂 天士先生論 錫山華南田岫雲較

溫熱論

邪從口鼻而入故曰上受但春溫冬時伏寒藏於少陰遇春時溫氣而發非必此所論邪也則溫邪乃

溫邪上受。首先犯肺。逆傳心胞。肺主氣屬衛。心主血屬營。辨營衛氣血。雖與傷寒同。若論治法。則與傷寒大異。蓋傷寒之邪。畱戀在表。然後化熱入裡。溫邪則熱變最速。未傳心胞。邪尙在肺。肺主氣。其合皮毛。故云在表。在表初用辛涼輕劑。挾風則加入薄荷牛蒡之屬。挾濕加蘆根滑石之流。或透濕於熱外。或滲濕於熱下。不與熱相搏。勢必孤矣。不爾。風挾溫熱而燥生。清竅必乾。謂水主之氣不能上榮。

是溫風
濕溫之

發於春
末夏初

兩陽相劫也。濕與溫合。蒸鬱而蒙痺於上。清竅爲之壅塞。
濁邪害清也。其病有類傷寒。其驗之之法。傷寒多有變症。
溫熱雖久。在一經不移。以此爲辨。

前言辛涼散風。甘淡驅濕。若病仍不解。是漸欲入營也。營
分受熱。則血液受劫。心神不安。夜甚無寐。或斑點隱隱。卽
撤去氣藥。如從風熱陷入者。用犀角竹葉之屬。如從濕熱
陷入者。犀角花露之品。參入涼血清熱方中。若加煩躁。大
便不通。金汁亦可加入。老年或平素有寒者。以人中黃代
之。急急透斑爲要。若斑出熱不解者。胃津亡也。主以甘寒。
重則如玉女煎。輕則如梨皮蔗漿之類。或其人腎水素虧。

雖未及下焦。先自傍徨矣。必驗之於舌。如甘寒之中。加入
鹹寒。務在先安。未受邪之地。恐其陷入易易耳。若其邪始
終在氣分流連者。可冀其戰汗透邪。法宜益胃。令水與汗
併熱。達腠開邪。從汗出解後。胃氣空虛。當膚冷一晝夜。待
氣還。自溫暖如常矣。蓋戰汗而解。邪退正虛。陽從寒泄。故
漸膚冷。未必卽成脫症。此時宜令病者安舒靜臥。以養陽
氣來復。旁人切勿驚惶。頻頻呼喚。擾其元神。使其煩躁。但
診其脈。若虛軟和緩。雖倦臥不語。汗出膚冷。却非脫症。若
脈急疾。躁擾不臥。膚冷汗出。便爲氣脫之症矣。更有邪盛
正虛。不能一戰而解。停一二日。再戰汗而愈者。不可不知。

再論氣病。有不傳血分。而邪留三焦。亦如傷寒中少陽病也。彼則和解表裡之半。此則分消上下之勢。隨症變法。如近時杏朴苓等類。或如溫胆湯之走泄。因其仍在氣分。猶可望其戰汗之門戶。轉瘧之機括。大凡看法。衛之後方言氣。營之後方言血。在衛。汗之可也。到氣纔可清氣。入營猶可透熱。轉氣如犀角。立參羚羊等物。入血就恐耗血。動血直須涼血。散血如生地丹皮阿膠赤芍等物。否則前後不循緩急之法。慮其動手便錯。反至慌張矣。且吾吳濕邪害人最廣。如面色白者。須要顧其陽氣。濕勝則陽微也。法應清涼。然到十分之六七。即不可過於寒涼。恐成功反棄。何

辛涼開肺便是
汗劑非如傷寒
之用麻桂辛溫也

以故耶。濕熱一去。陽亦衰微也。面色蒼者。須要顧其津液。清涼到十分之六七。往往熱減身寒者。不可就云虛寒而投補劑。恐爐烟雖熄。灰中有火也。須細察精詳。方少少與之慎。不可直率而往也。又有酒客裡濕素盛。外邪入裡。裡濕爲合。在陽旺之軀。胃濕恒多。在陰盛之體。脾濕亦不少。然其化熱則一。熱病救陰則易。通陽最難。救陰不在血。而在津與汗。通陽不在溫。而在利小便。然較之雜症。則有不同也。

再論三焦。不得從外解。必致成裡結。裡結於何。在陽明胃與腸也。亦須用下法。不可以氣血之分。就不可下也。但傷

寒熱邪在裡。劫爍津液。下之宜猛。此多濕邪內搏。下之宜輕。傷寒大便溏。爲邪已盡。不可再下。濕溫病大便溏。爲邪未盡。必大便硬。慎不可再攻也。以屎燥爲無濕矣。再人之體。腕在腹上。其地位處於中。按之痛。或自痛。或痞脹。當用苦泄。以其入腹近也。必驗之於舌。或黃或濁。可與小陷胸湯。或瀉心湯。隨症治之。或白不燥。或黃白相兼。或灰白不渴。慎不可亂投苦泄。其中有外邪未解。裡先結者。或邪鬱未伸。或素屬中冷者。雖有腕中痞痛。宜從開泄。宣通氣滯。以達歸於肺。如近俗之杏蔻橘桔等。是輕苦微辛。具流動之品可耳。

再前云舌黃或濁須要有地之黃。若光滑者乃無形濕熱。中已虛象。大忌前法。其臍以上爲大腹。或滿或脹或痛。此必邪已入裡矣。表症必無或十之存一亦要驗之於舌。或黃甚。或如沉香色。或如灰黃色。或老黃色。或中有斷紋。皆當下之。如小承氣湯用枳榔青皮枳實玄明粉生首烏等。若未現此等舌。不宜用此等法。恐其中有濕聚太陰爲滿。或寒濕錯雜爲痛。或氣壅爲脹。又當以別法治之。

再黃胎不甚厚而滑者。熱未傷津。猶可清熱透表。若雖薄而乾者。邪雖去而津受傷也。苦重之藥當禁。宜甘寒輕劑可也。

再論其熱傳營。舌色必絳。絳深紅色也。初傳絳色中兼黃白色。此氣分之邪未盡也。泄衛透營兩和可也。純絳鮮澤者。胞絡受病也。宜犀角鮮生地連翹鬱金石菖蒲等。延之數日或平素心虛有痰外熱一陷裡絡就閉。非菖蒲鬱金等所能開。須用牛黃丸至寶丹之類。以開其閉。恐其昏厥爲症也。

再色絳而舌中心乾者。乃心胃火燔劫爍津液。卽黃連石膏亦可加入。若煩渴煩熱。舌心乾四邊色紅。中心或黃或白者。此非血分也。乃上焦氣熱爍津急用涼膈散散其無形之熱。再看其後轉變可也。慎勿用血藥。以滋膩難散。至

舌絳望之若乾。手捫之原有津液。此津虧濕熱薰蒸。將成濁痰蒙閉心胞也。

再有熱傳營血。其人素有瘀傷宿血在胸膈中。挾熱而搏。其舌色必紫而暗。捫之濕。當加入散血之品。如琥珀丹參桃仁丹皮等。不爾。瘀血與熱爲伍。阻遏正氣。遂變如狂。發狂之症。若紫而腫大者。乃酒毒衝心。若紫而乾晦者。腎肝色泛也。難治。舌色絳而上有粘膩。似苔非苔者。中挾穢濁之氣。急加芳香逐之。舌絳欲伸出口。而抵齒難驟伸者。痰阻舌根。有內風也。舌絳而光亮。胃陰亡也。急用甘涼濡潤之品。若舌絳而乾燥者。火邪劫營。涼血清火爲要。舌絳而

有碎點白黃者。當生瘡也。大紅點者。熱毒乘心也。用黃連
金汁。其有雖絳而不鮮。乾枯而瘦者。此腎陰涸急。以阿膠
雞子黃地黃天冬等救之。緩則恐涸極而無救也。其有舌
獨中心絳乾者。此胃熱心營受灼也。當於清胃方中。加入
清心之品。否則延及於尖。爲津乾火盛也。舌尖絳獨乾。此
心火上炎。用導赤散瀉其腑。

再舌胎白厚而乾燥者。此胃燥氣傷也。滋腎藥中加甘草。
令甘守津還之意。舌白而薄者。外感風寒也。當疎散之。若
白乾薄者。肺津傷也。加麥冬花露蘆根汁等輕清之品。爲
上者上之也。若白苔絳底者。濕遏熱伏也。當先泄濕透熱。

防其就乾也。勿憂之。再從裡透於外。則變潤矣。初病舌就乾。神不昏者。急養正微。加透邪之藥。若神已昏。此內陷矣。不可救藥。又不拘何色。舌上生芒刺者。皆是上焦熱極也。當用青布拭令薄。荷水揩之。卽去者輕。旋卽生者險矣。舌苔不燥。自覺悶極者。屬脾濕盛也。或有傷痕血跡者。必問曾經搔挖否。不可以有血而便爲枯症。仍從濕治可也。再有神情清爽。舌脹大不能出口者。此脾濕胃熱。鬱極化風。而毒延口也。用大黃磨入當用劑內。則舌脹自消矣。再舌上白苔粘膩。吐出濁厚涎沫者。口必甜味也。爲脾癰病。乃濕熱氣聚。與穀氣相搏。土有餘也。盈滿則上泛。當用

醒頭草。芳香辛散以逐之。則退。若舌上苔如碱者。胃中宿滯。挾濁穢鬱伏。當急急開泄。否則閉結中焦。不能從募原達出矣。

舌有烟
煤

若舌無苔而有如烟煤隱隱者。不渴肢寒。知挾陰病。如口渴煩熱。平時胃燥舌也。不可攻之。若燥者甘寒益胃。若潤者甘溫扶中。此何故。外露而裡無也。

論舌黑

若舌黑而滑者。水來尅火爲陰症。當溫之。若見短縮。此腎氣竭也。爲難治。欲救之。加人參五味子。勉希萬一。舌黑而乾者。津枯火熾。急急瀉南補北。若燥而中心厚痞者。土燥水竭。急以鹹苦下之。

論舌淡紅無色

論舌白如粉

舌淡紅無色者。或乾而色不榮者。當是胃津傷而氣無化液也。當用炙甘草湯。不可用寒涼藥。

若舌白如粉而滑。四邊色紫絳者。溫疫病初入募原。未歸胃腑。急急透解。莫待傳陷而入。爲險惡之病。且見此舌者。病必見凶。須要小心。凡癥疹初見。須用紙燃照。看胸背兩脇點大而在皮膚之上者爲斑。或雲頭隱隱。或瑣碎小粒者爲疹。又宜見而不宜見多。按方書謂斑色紅者屬胃熱。紫者熱極。黑者胃爛。然亦必看外症所合。方可斷之。然而春夏之間。濕病俱發。疹爲甚。且其色要辨。如淡紅色。四肢清口。不甚渴。脈不洪數。非虛斑卽陰斑。或胸微見數點。面

赤足冷。或下利清穀。此陰盛格陽於上而見。當溫之。若斑色紫。小點者。心包熱也。點大而紫。胃中熱也。黑斑而光亮者。熱勝毒盛。雖屬不治。若其人氣血充者。或依法治之。尚可救。若黑而晦者。必死。若黑而隱隱。四旁赤色。火鬱內伏。大用清涼透發。間有轉紅成可救者。若夾斑帶疹。皆是邪之不一。各隨其部而泄。然斑屬血者恒多。疹屬氣者不少。斑疹皆是邪氣外露之象。發出宜神情清爽。爲外解裡和之意。如斑疹出而昏者。正不勝邪。內陷爲患。或胃津內涸之故。

再有一種白瘡。小粒如水晶色者。此濕熱傷肺。邪雖出而

氣液枯也。必得甘藥補之。或未至久延。傷及氣液。乃濕鬱衛分。汗出不徹之故。當理氣分之邪。或白枯如骨者多凶。爲氣液竭也。

再溫熱之病。看舌之後。亦須驗齒。齒爲腎之餘。齦爲胃之絡。熱邪不燥胃津。必耗腎液。且一經之血。皆走其地。病深動血結辨於上。陽血者色必紫。紫如乾漆。陰血者色必黃。黃如醬辨。陽血若見。安胃爲主。陰血若見。救腎爲要。然豆瓣色者多險。若症還不逆者。尚可治。否則難治矣。何以故耶。蓋陰下竭。陽上厥也。

齒若光燥如石者。胃熱甚也。若無汗惡寒。衛偏勝也。辛涼

泄胃。透汗爲要。若如枯骨色者。腎液枯也。爲難治。若上半
截潤水不上承。心火炎上也。急急清心救水。俟枯處轉潤
爲妥。若咬牙斷齒者。濕熱化風癰病。但咬牙者。胃熱氣走
其絡也。若咬牙而脈症皆衰者。胃虛無穀以內榮。亦咬牙
也。何以故耶。虛則喜實也。舌本不縮而硬。而牙關咬定難
開者。此非風痰阻絡。卽欲作瘡症。用酸物擦之。卽開。酸走
筋。木來泄土故也。

若齒垢如灰糕樣者。胃氣無權。津亡。濕濁用事。多死。而初
病齒縫流清血。痛者。胃火衝激也。不痛者。龍火內燔也。齒
焦無垢者死。齒焦有垢者。腎熱胃劫也。當微下之。或玉女

煎清胃救腎可也。

再婦人病溫與男子同。但多胎前產後以及經水適來適斷。大凡胎前病。古人皆以四物加減用之。謂護胎爲要。恐來害姪。如熱極用井底泥藍布浸冷。覆蓋腹上等。皆是保護之意。但亦要看其邪之可解處。用血膩之藥不靈。又當審察不可認板法。然須步步保護胎元。恐損正邪陷也。至於產後之法。按方書謂慎用苦寒藥。恐傷其已亡之陰也。然亦要辨其邪能從上中解者。稍從症用之。亦無妨也。不過勿犯下焦。且屬虛體。當如虛怯人病邪而治。總之母犯實實虛虛之禁。况產後當血氣沸騰之候。最多空竇。邪勢

必乘虛內陷。虛處受邪爲難治也。如經水適來適斷。邪將陷血室。少陽傷寒言之詳悉。不必多贅。但數動與正傷寒不

同。仲景立小柴胡湯。提出所陷熱邪。參棗扶胃氣。以衝脈隸屬陽明也。此與虛者爲合治。若邪熱陷入。與血相結者。當宗陶氏小柴胡湯。去參棗。加生地。菟仁。查肉。丹皮。或犀角等。若本經血結自甚。必少腹滿痛。輕者刺期門。重者小柴胡湯去甘藥。加延胡。歸尾。桃仁。挾寒。加肉桂心。氣滯者。加香附。陳皮。枳殼等。然熱陷血室之症。多有譫語如狂之象。防是陽明胃實。當辨之。血結者。身體必重。非若陽明之輕旋便捷者。何以故耶。陰主重濁。絡脈被阻。側旁氣滯。連

胸背皆拘束不遂。故去邪通絡。正合其病。往往延久。上逆心胞。胸中痛。卽陶氏所謂血結胸也。王海藏出一桂枝紅花湯。加海蛤壳仁。原爲表裡上下。一齊盡解之理。看此方大有巧手。故錄出以備學者之用。

種福堂公選醫案

葉桂天士先生方

錫山華南田岫雲較

脾胃寒嘔

曹六述去冬因惱怒時食厚味。遂致不饑。嘔氣脘渾。食物。

不下。視舌上佈苔如粉。不渴飲。大便通調。議從太陰脾
陽爲寒痰濁氣凝遏。辛溫定法。

厚朴

草果仁

薑汁

草撥

生益智仁

廣皮白

又前因陽結濁聚。舌胎白厚。不渴飲。用芳香辛溫得效。
近日食物不慎。水穀氣凝。清陽再窒爲嘔。舌胎猶未淨。
便下白膩如凍。腑陽亦衰。

公丁香柄

草撥

茯苓

生益智仁

厚朴

生乾薑

木乘土
嘔瀉

胡六二。疾走作勞。身前脇腹。閉氣上下串痛。交正月。寒戰氣衝。呼吸皆阻。腹脹脣上橫梗。有形作痛。自痢已兩月。思勞必傷陽。春令病加。是木旺侮土。中陽困憊。濁氣充塞。正氣全傷。大肉盡削。述食入逾時。必加嘔噫。後天生化之源大困。議急理中土之陽。

人參

茯苓

公丁香柄

川椒

烏梅肉

炒黃乾薑

便血督
腎虛寒
潘四

中年脈垂入尺澤。按之緩濡。腰椎痠痛。形體卽欲僵。

僂旬餘大便必下血。此少壯不慎腎真先奪。督脈不可

固束。議用青囊斑龍丸。

噎膈反胃陽結

高七老年逆氣右升。腕阻妨食。涎沫上湧。此屬反胃。夫陽氣結閉爲無形之傷。前藥小效。未幾反覆。以老人生陽不至耳。

人參 生淡乾薑 炒黑附子 猪胆汁

瘡瘍癩

沈十七兀坐目注針黹。少陽氣火上升。陽明氣血因熱怫逆。遂有結癰瘍癩之累。前醫不明解鬱。兩和肝胃之治。致病日加增。今每日寒熱。心躁若裂。經水較前已少。須慮熱熾血乾。且納穀大減。難投重劑清寒。

生鱉甲

牡丹皮

川貝母

香附

穀芽

夏枯草花

楊七。食入卽饑。心空易驚。經水或歇或至。病起產後。逾年。

不復。自述多食生冷。據理肝陰久損。不宜驟用溫補。

人參

茯神

炙草

黃精

龍骨

金箔

滯
腹痛氣

顧。腹痛氣上下行動卽緩。從腑陽治。

人參

生穀芽

茯苓

煨薑

新會皮

砂仁壳

嘔
腎氣
不納

李三。哮喘久發。小溲頻利。此腎虛氣不收納。痰飲從氣而

上初病本屬外邪。然數年混處。邪附臟腑之外廓。散逐焉得中病。宿哮不發時。用腎氣丸三錢。喘哮坐不得臥。議用開太陽之裏。小青龍湯去麻辛。

痞中陽虛

唐五病是勞傷陽氣。陽衰不主流行。清濁升降。不得自如。是爲虛痞之結。內經謂勞者溫之。此溫字乃溫養之稱。若吳萸大熱開泄。仍是攻尅。與勞傷原氣相反。

苓桂木甘湯

吐血中陽不運

賈二痰血頻發七八次。形寒妨食。無治痰嗽之理。急扶後天生氣。望其知味進穀。戊己湯。

吐血陰陽升虛

錢八十冲年陰精走泄。陽無依倚。血隨氣升。色紫成塊。此血

出於肝絡。法當鎮補。

人參

炒黑棗仁

炒白芍

炙草

青花龍骨

金箔

咽喉溫
邪傷陰

姚一述四月患蛾喉痺必係溫熱犯上溫不盡解留邪化
熱肺津劫燥喉燥痒嗆防有氣損熱熾失血之累甘寒
潤劑不致傷胃

菜荳殼

麥冬

生甘草

連翹

南花粉

金銀花

蔗漿半杯

又浮熱上炎精走泄於下致陰液陽精不肯上供望色
萎瘦納食不旺攝陰恐妨胃口况初夏曾患喉症大暑

熱泄陰難生復。先議水陸二仙丹。攝固精關。

人參

秋石

芡實

金櫻子膏丸

舌營陰虛

顧四操持無有不動心神。心陽上引。相火交升。燔灼營液。舌爲心苗。遂起癥癓。病由情志不適。非湯藥直清直降可治。議天王補心丹。制伏躋陽道路。營液得以升降。如然必心境怡悅。方能却病。天王補心丹。

濕暑熱

李四長夏時令溫熱。內阻氣分。宗內經濕淫於內。治以淡滲。佐以苦溫。

飛滑石

川通草

淡竹葉

杏仁

厚朴

頭痛肝腎陽浮

茹三向來無病。因服地黃丸。反左脇腰中臍旁氣攻作痛。

間有遺精。目暗虛花。或起浮翳。據述用細辛。桂枝。翳退。
遂加頭痛。此體質陽虛。誤用陰寒。膩濁所致。夫肝主疏
泄。腎主藏固。肝宜涼。腎宜溫。納腎佐以通肝。溫下仍佐
腎陰。以制木火。是爲複方。

當歸

小茴

補骨脂

胡桃肉

茯苓

穿山甲

炒黃柏

青鹽

虛勞暑
熱傷陰

林十色蒼形瘦。稟質陰虛火亢。津液不充。喜冷飲。夏季熱
蒸。須培生氣。順天時以調理。

麥冬

知母

川貝

地骨皮

丹皮

蕤荳皮

虛 淋帶陰

項二心熱。巔空交寅卯帶下。向來陰不足。少陽陽動。中虛食減。靜養至秋涼可望陰充。

人參

柏子仁

丹參

天冬

茯苓

建蓮

龍骨

白薇

癇肝火

曹十

笑則癇厥病發。晝少夜多。思二月起病。春木正旺。內

應厥陰肝臟木火。乃陽極之化。其來迅速。由內而升。神明遂亂。口吐涎沫。四肢寒冷。肝病何疑。由春病及長夏。醒則如無。納食如昔。法以純苦直泄厥陰躄陽。

蘆薈

青黛

龍胆草

川棟子

黑山梔

白芍

青皮

歸尾

猪胆汁

又 前方用純苦。直清肝胆。初服卽瀉。病久陰分已虛。議理陰和陽。入酸以約束之。

生雞子黃

阿膠

川連

黃柏

生白芍

米醋

吐血中
陽虛
噎膈反胃氣滯血瘀

徐二六胃減。痰血頻發。上年誤服玄參山梔。致便溏瀉。此受苦滑寒涼之累。人參建中湯。

鄒五三酒客食管窄隘。向有脘痛。今多食卽反胃。氣阻日久。必致瘀凝。食物宜淡薄。以上中二焦宣通氣血治。

桃仁

蒲黃

降香末

蘇梗

香附

橘紅

寒陰虛
陽浮

程六形瘦肌削。稟質偏熱。夏秋病甚。是陰虧不耐暑熱發泄之氣耳。霜降收肅令行。浮陽潛伏。陰得自守。病覺稍退。述食辛辣熱燥不安。其臟陰五液爲陽蒸變痰。非如痰飲。可用陽藥溫通者。

人參

萸肉

川石斛

磁石

淡秋石

胡桃肉

女貞子

旱蓮草

分熱

吐血氣

和

痰血。上午偏多氣分熱熾。

金石斛

川貝母

桑葉

南花粉

大沙參

知母

鬱心脾

單歲七爲母喪悲泣。淹淹不食。面黃唇淡。情志不適。生陽鬱。

重福堂公選醫案

卷一

六

室內經謂思爲心疾。鬱必傷脾。病屬無形。非傷食惡食之比。穉年調理後天脾胃爲要。佐以開益心氣。

人參

茯苓

炙甘草

淮小麥

益智仁

石菖蒲

吐血勞
傷氣逆

于 馳騎習武。百脈震動。動則絡逆爲痛。血沸出口。納食起居無異平日。非虛損也。凡氣爲血帥。氣順血自循經。不必因血用沉降重藥。

枇杷葉

炒蘇子

生苡仁

金石斛

炒桃仁

降香末

噎膈反
胃關格

王四望五年歲。真陽已衰。納食逾二三日。反胃湧吐。仍有

不化之形。痰涎濁水俱出。大便漸秘。此關格大症。陰枯
陽結使然。

人參 半夏 茯苓 泡淡吳萸

生淡乾薑 夜另服半硫丸一錢五分

產後下焦陰陽並虛

蔣

三五

晨瀉數年。跗腫足冷。長夏土旺初交知饑。痞悶妨食。

述兩三次半產不育。下焦氣撒不固。任督交空。本病當以肝腎奇脈設法。今議先以胃藥。以近日雨後暑濕乘隙侵犯耳。

人參

梔苓

益智仁

砂仁殼

炒扁荳

木瓜

又連年半產不育。瘕泄足跗浮腫。前用養胃和肝。非治本病因暑濕傷而設。議固下焦之陰。益中宮之陽。

人參

禹糧石

紫石英

五味子

菟絲餅

砂仁

用蒸餅爲丸

淋帶陰
傷絡熱

邢

暴怒傷肝。白帶下注。繼而間血。人身衝任督帶諸脈。皆麗身半已下。醫用上中二焦涼藥。焉能圖倖。自言月事來而漏帶息。初起必少腹腰痛。此內熱是血絡陰液損傷耳。性嗜酒。酒力先入肝胆。急當禁止。議固脈以攝下。

炒枸杞

炒黑當歸

白薇

桑螵蛸殼

虛勞陽

青花龍骨 生紫石英 煎藥送靈丹

陸二腰冷。膝骨瘦弱。淋濁後。莖中空痛。少年未婚。此是
勉強勞傷精關。且臥床必要墊實腰膂。虛象大著。交冬
病加。問食少胃弱。非地黃膩滯。知柏瀉陽可投。

菟絲子 覆盆子 茄實 沙苑 家韭子

補骨脂 船茴香 金櫻子 線魚膠丸

遺精勞
心損神

王二過用心思。營氣日滯。心悸眩暈。遺精。腰膝下部畏冷。
陰陽造偏。心腎交損。議鎮怯。佐以固攝溫納。

桑螵蛸

人參

茯神

青花龍骨

金箔

瓊陽

蜜丸

泄瀉腎
陽衰

顏

病已半年。夜寐易醒。汙泄。自覺元海震動。腹鳴晨瀉。

年歲望六。不僅經營煩勞傷陽。腎真亦漸散越。仍議固

下一法。

人參

赤石脂

禹餘糧

五味子

泡淡乾薑

調經奇
脈陽虛

徐九三月事將至。尻骨脊椎痠痛。此督脈循行之位。况經水之下。必由衝脈。產育頻多。奇脈失固。議治陰中之陽。

麋茸

人參

歸身

炒黑小茴

茯苓

川斛

調經肝
胃不利

唐二經來一日偶食冷物。經水卽止。遂痞悶不食。乳旁堅

腫痛脹。此是肝氣鬱結。蓋經水由衝脈而下。衝隸陽明。
胃中受冷。而衝脈血凝。理從肝胃同治。

青橘葉

香附汁

漏蘆

蒲公英

厚朴

杏仁

產後傷
神怯

徐二八。產後未經旬。長途驅馳。以勞形神。歸值母喪。悲哀哭泣。傷及情志。述肉瞶易驚恐。少寐。產傷陽分起見。肌肉悉熱如焚。乃陰不攝陽。

熟地炭

萸肉

龍骨

扶神

淮小麥

南棗肉

何十三述無病時形瘦。病發時形充。古稱入水之物。無物不

長陰寒襲入右肢肉瞞筋惕而痛。指不屈伸。法當通瘡塞。以逐留著。

川烏

一兩
炮黑

金蠍

一兩
炙焦

蜂房

五錢
炙焦

自然銅

五錢
煅

麝香

五分
分

炒熱大黑豆淋酒汁爲丸。每服一錢。陳酒下。

熱
三消肺

汪

肺熱膈消熱灼迅速如火。臟真之陰日削。先議清肺。以平氣火。法當苦降以輕。鹹補以重。繼此再商滋養血液。

枯黃芩

煎湯

溶入阿膠二錢

孫三行走閃剉。左腿筋弛無力。亂藥雜投。五六不愈。延及精血內損。不司束筋充骨矣。猶幸年壯。冀其生直。

損
瘦精血

續旺藥用平補。然必絕慾戒勞。庶克臻效。

虎潛去瑣陽加蓴蓉精羊肉膠丸

痺寒濕

施二陰寒已入陰股。道路深遠。湯藥過胃。其力已薄。邪錮仍在。議用許學士法。蠲痛丹每服一錢二分。

虛勞勞
傷中陽

趙納食不充肌膚。陽傷背痛。陰囊冰冷。經營作勞。勞則氣乏。經言勞者溫之。甘溫益氣以養之。歸芪建中湯

肝風下
虛不攝

陳五操勞動怒。耳鳴顛脹。暈眩肢麻。內起火風。皆厥陽之化。中年以後。男子下元先虛。慮其仆中。議填鎮固攝以

實下。合乎上病治下之旨。

熟地

玄武版

靈磁石

五味子

山萸肉 炒杞子 天冬

牛膝

青鹽

鬱木乘
土

程二標梅逾期。病由情志鬱傷。庸醫不究病因。朝暮更方。
病延日久。內經謂二陽之病發心脾。蓋思傷心。鬱傷脾。
二臟有病。不可繞血。笄年莫重於經水通調。今經閉半
載。嘔吐清涎。腹痛泄瀉。心熱皮寒。顯是木鬱乘上。胃口
漸敗。生氣曷振。病成乾血勞怯。考古通經等丸。難施於
胃憊乏穀之體。姑議安胃和肝。俟秋深時再議。

人參 白芍 川棟子 生淡乾薑
川連 烏梅 粗桂枝 炒焦歸身

溫兼風

董二風溫濕上受。痺阻氣分。上則咳嗽不得臥息。下則溺少便溏。夫肺主一身之氣化。邪壅則升降不得自如。做經旨濕淫於內。主以淡滲。佐以苦溫爲治。

飛滑石

茯苓皮

白蔻仁

竹葉

厚朴

杏仁

蘆根

火氣升
不降

陳四煩勞。氣火多升少降。喉中梗阻。痰出噫氣。凡酒肉皆助熱。痰凝氣分。上焦瘻塞。

枇杷葉

瓜蔞皮

降香末

杜蘇子

黑梔皮

苡仁

虛勞陰

宋二精壯年歲。面色萎浮。氣冲逆。必心悸眩暈。問足跗易

冷間有遺洩。此皆煩勞辦事。心陽過用。暗吸腎陰。下元日虛。虛風挾陽。旋動不息。全是內損之病。治法取質味。凝厚以填之。甘酸以緩之。重以鎮怯。補以理虛。方是培本尋源之治。

熟地

四兩

萸肉

二兩

瑣陽

二兩

茯神

四兩

五味

一兩半

龜甲心

二兩

秋石

一兩

青龍骨

二兩生研

金櫻膏

二兩

芡實

四兩

蜜丸

夏三陰筋曰宗筋。肝主之。冷則筋縮。熱則弛長。少壯莖痿。

起於長夏天氣已熱。地中濕蒸。內經病機一十九條。例謂因濕者。大筋契短。小筋弛長。契短爲拘。弛長爲痿。此

雖統論瘧症而言。非指革瘧立論。然理亦相通。今逾年不愈。大暑時令。診得脈象。非下焦陽衰。兩目紅赤。想經營煩冗之勞。陽氣交集於上。與暑熱內迫。加以水穀之濕。濕蘊化熱。而爛筋致瘧矣。法當苦以堅陰。燥以勝濕。介以潛陽。濕去熱清。自有愈期。

生虎骨

熟地

蒼朮

黃柏

茯苓

龜版

石決明

天冬

虛勞皆
虛不攝

鍾四

未及五旬。肉消食減。此未老已衰。身動喘急。足跗至晚必腫。皆是腎真不可收攝。納氣根本先撥。草木微功。

難以恢復。

利水生少陰醫案

人乳粉

五味子

胡桃肉

蜜丸人參湯送下

吐血勞
傷心神

王三

煩勞曲運神思形與神交傷陽氣旋動絡血何以安

靜甘以緩熱補可益虛必佐寧神鎮怯以攝之固之

人參

柏子霜

炒枸杞

焦歸身

桂圓肉

炙甘草

龍骨肉

茯神

金箔

腸痛絡
熱滯血

單

因悶挫脇痛久則滯血絡血氣熱內迫新血瘀逆

鮮生地

藕節

生桃仁

新絳

暑滯入營舌絳煩渴形脈皆不足怕邪陷神昏

宋

暑熱入營舌絳煩渴形脈皆不足怕邪陷神昏

犀角尖

南花粉

連翹心

益元散

暑滯熱

虛勞陰

淡竹葉 細葉菖蒲汁

程五二男子思念未遂。陰火內燔。五液日奪。孤陽升騰。薰蒸上竅。已失交泰之義。此非外來之症。凡陰精殘憊。務在胃旺。納穀生陰。今咽喉鼻耳諸竅。久遭陰火之迫。寒涼清解。僅調六氣中之火。而臟真陰火。乃閃電迅速。莫遏。清寒必不却病。良由精血內空。草木藥餌。不能生精充液耳。

細生地 清阿膠 猪脊筋 天冬 川石斛

姜四二久患胸右有形形瘦畏風怕冷。卧則咳。嗆痰沫。凡治痰飲。須辨飲食。食少已極。議治中宮之陽。

痰飲中
陽虛

苓桂术甘湯

疝肝腎
虛寒

徐

狐疝氣墜。

鹿茸

大茴

當歸

沙苑

乾蕊蓉

生薑

肉桂

羊肉丸

調經陰
虛熱灼

徐七經水未來。春末夏初。痰血形瘦耳鳴。食過如饑。饑不納。食肝陰不生。熱自內灼。漸成乾血勞症。必要經來可愈。但女工針黹。凝眸諦視。卽動陽升火。此大忌。

細生地

天冬

柏子仁

丹參

澤蘭

知母

鬱氣阻
血凝

曹辛溫芳香。開氣舒鬱。嘔出血餅。嘔吐頓減。蓋氣阻血

凝堵。塞腕中升降之路而痛。自服藥以來。微微欲飲。而大便結燥。知不耑於辛溫矣。

青葱

桃仁

歸尾

麻仁

郁李仁

冬葵子

又 瘰盡。喫氣間嘔。此陳腐未擣。乃無形之聚。用辛芳涼滑治之。

鮮省頭草

五錢

滾水泡湯和入竹漿

五錢

分作三
次服

虛勞奇
脈陽虛
腰痛

孫八 遙腰近臍。久痛若空。秋深届冬。四肢不暖。此由幼年精未充旺。早洩既損。難復。八脉失司。是陰傷及陽。藥湏達及奇經。可冀漸效。

鹿茸 淡蕪蓉

巴戟

當歸

茯苓

虎膝骨 牛膝

大茴

羊肉膠丸

淋濁脾
腎陽衰

吳二精濁已久。行步無力。食冷口吐酸水。陽氣微弱。治在

脾腎。

益智仁 家韭子 覆盆子 胡蘆巴 遠志

小茴 兔絲子 金櫻膏丸

泄濁腎
虛

王五陽結於上。陰泄於下。晨泄多因腎虛。陰傷及陽。胃口自憊。舌畏辛辣。不受桂附之猛烈。虛腫虛脹。先宜固劑。

人參

禹餘糧

赤石脂

五味子

砂仁末

道精陰
脈陽浮

周三精遺越日陰火忽冲神亂肉瞶筋惕此陰不戀陽以

補虛鎮攝收斂幸年壯胃口不敗可以全愈。

熟地

萸肉

五味

龍骨

湖蓮

茯神

遠志

淋濁陰
火

邵六望七男子下元必虛操持勞思陽墜入陰精腐節化

紫黑之色宿者出竅新復瘀結漏出不痛非久積宿腐

據述常飲火酒酒毒辛熱必先入肝腎虛宜溫補肝宜清涼閱方用歸脾湯且非嚴氏法雜湊成方焉能治此

大症。

細生地

清阿膠

黑穧荳皮

赤芍

養精血
虛

丹皮

童便一杯冲入

周十五陽維脈循行外踝遇勞形辦事。環跳跗骨酸麻而痛。
丹溪云。麻爲氣虛。蓋年力已衰。不得安養。怡悅。瘦論云。
意傷肢欲廢矣。且痛處肉消形癟。無腫赤之象。此氣血。
不布。涵濡筋骨不足之症。比比然。

生精羊肉 虎脰骨 肉蓴蓉 桔杞子 沙苑

巴戟肉 牛膝 當歸 川石斛

翁四少腹有形。左脇脹脹。內發必肌肉麻木。嘔吐痰沫不。
爽。此屬肝厥。由乎懷抱抑鬱。不得條達。數載病不肯愈。
者爲此。

瘧厥肝

者爲此。

淡吳萸

川棟子

生香附

南山杏

青橘葉

牡蠣

虛勞陰
陽雨虛

何二壯年脉芤少神色瘦肉瘦食進不充形骸不耐煩勞。

乃內損也。節欲養精安神養氣藥用血肉有情氣血兼補年少望其生振。

河車

人參

熟地

五味

山藥

茯神

蓮肉

芡實

暑膀胱
熱閉

宋大吸受暑熱異氣入表中之裡爲淋痛溺赤形肥素有

濕痰議通太陽。

桂枝

木猪苓

茯苓

草薢

海金沙

寒水石

中風水
鬱風動

鄭五
九

夏至陰生忽然口渴頰斜耳竅無聞此非外來之邪。

皆由男子望六下元已空下虛則上實水鬱風內起凡

腎以溫爲養肝宜涼乃平溫養腎精必佐涼肝水中有真陽內蓄是爲命根蓋肝膽相火內寄性惡熱燥用七

方中之復方

熟地

磁石

龜版

丹皮

五味

天冬

枸杞

蕤英

菊花炭

川斛

方七高年宿痼不愈入夏陰囊足跗腹大乃陰臟之真漸
渴腑中陽氣不行一派濁陰迷漫二便皆不通利明

中風水
鬱風動

鄭五
九

知老弱久虛，然呆補必助濁壅塞，議通陽一法。

白通湯去葱白

日肝虛

周正視一物見二。睨視則否。凡積勞氣洩陽傷。當夏熱氣再大泄。雖曰肝竅開目。實臟真精華會聚之處。當甘緩理虛酸收其散。大忌苦降辛開。

桂圓肉

枸杞子

炙黑甘草

五味子

山萸肉

菊花炭

肺痿勞
傷

俞前五久嗽失音。飲食仍進。自覺淹淹無力。此是內傷勞倦。夏月泄利。是暑濕氣感。不在本病之例。食減肉消。治嗽無益。以肺痿論。

白芨

生黃芪

炙甘草

苡仁

黃精

產後草

周二尋勞。下元先空。咳音不轉。必致嘔吐。是衝脈虛。氣逆。

上攻。薰蒸肺臟。延及不饑。減食。腹痛便溏。乃清內熱。泄肺。醫嗽之悞。

炒當歸

生白芍

炙草

南棗肉

濕燥傷
陽氣

吳平。昔飲酒。夏令再受地濕之感。內外濕邪。傷陽。阻遏

氣机流行。遂致一身盡腫。針刺出水。稍瘳。復腫。皆由陽氣已衰。水濕無以分逐。苟非氣雄通陽。陰凝何以走泄。所服八味湯。僅溫煦腎陽。與陽維不合。

川烏

附子

生白朮

茯苓

木香

黑荳皮

曹三陰火喉痺。

滋腎丸

喉嚨陰火
虛病精血

李

四

勞必疝墜。按之有聲而解。是虛而氣乘。非因寒也。閱

所服之藥半屬辛熱。不知質偏精血內空。法當攝固。不必偏熱偏寒。

熟地

茯神

炒遠志

線魚膠

柏子仁

五味子

紫胡桃肉

沙苑子

管六七少腹有形。六七年漸加脹滿。述臨暮納食。夜必腹鳴。瘕泄。蓋老年坎陽日衰。坤土不運。濁陰下聚。凡冷滯肥

膩食物宜忌勿預家務怡悅情懷以爲却病之計若徒恃醫藥非義生之法矣。

人參

兔絲子

胡蘆巴

茯苓

舶薑香

上肉桂

補骨脂

砂仁

金鈴子

肉果山藥糊搗丸

吐血鬱

吳七

腸中刺痛血逆心中漾隨嗽吐出兼有嘔惡腹痛

此笄年情志鬱勃陽氣多升絡血逆行經水不下恐延

乾血重症

山楂

桃仁

柏子仁

丹皮

延胡

益母草

胃
肝風犯

楊 四 肝風化熱犯胃。惡心痞悶。食入作脹。口渴。議養胃制
肝。

暑濕蘿
三焦

人參 金石斛 烏梅肉 麥冬 新會皮

施 坐不得卧。胸滿氣喘。暑風濕氣漫處三焦。太陽膀胱。
不開邪鬱生熱。氣滯生腫。先議開三焦氣分之窒。

杏仁 白蔻仁 滑石 寒水石

猪苓 廣皮 厚朴 茯苓皮

虛勞煩
勞陽升

王 六 据勞形。操持勞神。男子向老。下元精血先虧。陽先
交護。浮越上胃。致耳目清空。諸竅不爽。凡下虛者必上
實。此非風火由陰不配陽使然。 虎潛丸

遺精陰
火動

李十肌柔色白形氣不足當知識年歲龍雷突起無制乾
嗰咳逆情萌不遂有夢遺精見熱理嗽清熱胃減墮入
虛勞能知命靜養冀其漸次充復。

三才湯加蓮肉芡實茯神柏子仁

姜八痢已八月久痢自必傷腎下失收納據述泄氣糞通
稍爽非寒膩固滯所宜用景岳理陰煎。

唐二陽浮汗泄衄血皆下焦真陰不充適值乘龍之喜與
病相悖議填實下元之陰制伏浮陽。

衄肝腎
陰虛

痢腎虛

熟地

更肉

五味

女貞子

旱蓮草

茯神

瘧邪陷
厥陰

秋石

黑殼建蓮 蜜丸

王三瘧邪流入肝絡。莖舉。寐中夢擾。熱逼筋骨。液傷痠痛。
正虛邪伏。滋養不效。

生鱉甲

生地

胡黃連

丹皮

黑山梔

青黛

濕熱

計四酒客內有濕熱。瘍曬初愈。精神未復。小暑泛潮。外濕與內濕併合。致傷脾胃之絡。便血繼以吐血。久延肉消神倦。然脈絡之濕蒸熱蘊仍在此。病邪爲本。虛爲標。非

補濇藥所宜。

茵陳

茯苓皮

厚朴

廣皮

海金沙

日陰虛
受暑濕

王二

目患其來甚驟。醫投風藥寒涼。漸起翳障。眵肉欲遺。
未泄已見淋濁。陰虛弱質。暑濕熱氣直入於陰經。非欲
速易愈之症。

雞肫皮

大腹皮

查肉

砂仁殼

石蟹

苦丁茶

金石斛

桑白皮

飛滑石

乾荷葉

夏枯草

桑白皮

脾胃暑
濕內伏

顧

十五稟質聰慧。當此已有知識。勤讀夜坐。陽升則上熱下

冷。真陰不能生旺。長夏變幻腹疾。以瘦濁渾熱論之。乃

虛人暑伏脾胃。議用東垣法。

人參

煨葛根

廣皮

黃柏

虛勞心
鬱不交

生穀芽

澤瀉

茯苓

川連

胡三形質偉然。吸氣不入。是腎病。自言心緒少適。六七年久藥無效。近來納食不運。夜必驚惕而醒。先以兩安心腎。鎮怯理虛。

人參

茯苓

龍骨

小麥

炙草

金箔

瘡濕熱

顧四凡寒濕瘡久則變熱。六氣客邪悉從火化。邪客軀殼節骱。熱氣還蒸諸竅。膚腠癰疹搔痒。忌食酒肉。方可向愈。

羚羊角

犀角

殭蠶

噎膈反胃

錢五

中年食入涎沫上壅吐食此屬反胃姑以淡薄滋味。

清肅上氣平昔飲酒惡甜藥不宜重以損胃。

鮮枇杷葉

杜蘇子

降香

橘紅

蘆根

苡仁

癰瘕寒凝氣結

張二

上年產後至今夏經轉寒凜遂結氣瘕自少腹攻至

胃脘。脘痛氣結宜開先用金鈴子散。

延胡

金鈴子

青葱管

山楂

生香附

蓬莪术

沈一平素飲食少用已見脾胃不和暑濕熱氣從口鼻入。

粗桂枝

花粉

白蒺藜

幕原受邪邪氣蒸搏口舌瘡蝕脾營胃衛異氣混受遂爲瘧潮熱。稊質純陽微冷熱勝當以廓清三焦蘊伏而脾胃最爲衝要。

飛滑石 大竹葉 杏仁 厚朴

廣皮白 桔芩皮 白蔻仁

癰鬱盜

方三 正在壯年交四月陽氣升舉忽然跌仆無知頭搖肢搐越旬又發間病因忿怒所致大凡病來迅速莫如風火鬱怒由肝逆木火生風從此而發癰厥若僅謂痰火用辛香燥劑劫痰利氣宣竅厥陽不寧病奚得減。

龍薈丸 每服二錢 四服

胃痛氣
帶血瘀

陳

酒濕熱氣氣先入胆。濕着胃系。痰聚氣窒。絡血瘀痺。

痛在脘。忽暎少腹。氣血交病。先和少陽陽明之陽。酒客

惡甜。治以苦辛寒。

土蔞皮

半夏

枳實

川連

生薑

痘厥濕
溫邪閉

周五陰虛質弱。風溫濕溫。皆邪在氣分。汗散傷液。邪入心營。神識昏昧。肢節微痙。仲景痘濕暘萃於一門。小溲不利。有三焦阻閉之危。

飛滑石

鮮葛蒲根

茯苓皮

川通草

寒水石

廣皮

煎藥化服牛黃丸

許一

暑濕皆氣窒成瘡。初起舌白嘔吐。乃太陰脾病。誤用

寒涼滋柔陰藥。助其濕邪。引邪入營。舌赤不喜飲水。何從氣分開其結。逐其濕。倣古賢治瘡務在通陽。

茯苓

兩

園圃厚朴

草果仁

半夏

新會皮

高良姜

冲入薑汁五分

蔣

上年久暖少寒。冬不藏固。花甲已外。腎真既虧。水不涵木。肝陽化風。勃然上泛。遂令眩暈。經云下虛上實爲厥。乃欲仆中之根萌也。此非外來六氣所感。由操持繁思。五志之陽刻升。煩動在裏。營血肢液暗耗。診脉左尺空弦。望色浮紅光亮。欲便用力。汗洩藜藜。偶爾立起。則

足附骨瘻色脉見症顯明彰著閱所服諸藥未叅內典聖訓昔劉河間內經奧旨凡上實下虛耳鳴足瘻便溺竅阻等症每以濁藥清投名曰飲子宗是議主治

製熟地

肉蓯蓉

炒遠志

柏子仁

川斛

天冬

五味

淮牛膝

泄瀉寒濕

劉山

西

泄瀉二年食物不減胃氣未損脾陽已弱水濕陰濁不易輸運必湏慎口勿用寒滑厚味議用緩中佐運法

生茅术

生於术

炒香菟絲子

茯苓

便血肝
胃不和

張

瀉血八年腹左有形梗痛液耗渴飲肝風大震腑氣開闔失司溲溺不利未可遽投固澁

茯苓

木瓜

炒白芍

炒烏梅

澤瀉

炙草

寒風濕
熱邪

許風濕熱。爍於經脉。右肢牽掣。邪未驅盡。發爲瘡疾。有年。陽明脉空。遂致偏癱。

生黃芪

歸身

防風

丹皮

木防己

黃柏

銀花

虛勞營

沈背寒。鼓慄而後發熱。二便頗利。並不渴飲。入暮倚枕。

氣自下衝。嗆咳不已。脈空大。按之不鼓。肌消神饑。是煩勞抑鬱。傷陽。寒熱戊起丑衰。解時無汗。非外感表病。顯然溫養營分。立方叅入奇脉。宗陽維爲病苦。寒熱之例。

川桂枝

鹿角霜

當歸

炙草

生薑

南棗

又進通和營分。兼走奇脈。一刺寒熱已止。而操持煩心。
皆屬傷營耗氣。未免滋擾反覆。經謂心營肺衛之虛都
是上損。立方不越益氣養營矣。

人參

茯苓

廣皮

炙草

炒白芍

當歸

棗仁

生薑

虛勞陰
虛陽升

麗久損精神不復。刻下土旺。立春大節。舌碎鰥腐。陽升。
陰不上承。食不知味。欲吐下損及胃。最屬不宜。

人參

炒麥冬

紫衣胡桃肉

鬱肝火

熟地

雞子黃

茯神

豬 氣鬱。肝不疏泄。神狂譫語。非是外感。乃七情之病。先

進滌痰湯法

川連

胆星

石菖蒲

半夏

鉤藤

山梔

遠志

橘紅

風溫上
焦濕熱
壅閉

方 風溫上受。心營肺衛皆熱。氣不宣降。則痞脹熱薰膻中。則神迷。此上焦客邪。想有酒食內因之濕。互相挾持。七八日未能清爽。以梔豉湯主之。

山梔

荳豉

杏仁

鬱金

蕤皮

鮮菖蒲

調經經
閉肝脾
不和

郭小姐診脈。左勁似數。右寸虛大。中下虛濡。面色㿠白。少寐。
消渴。納穀最少。經候不至。已十四月。上年夏秋間。頭面
肢體。曾發風疹。此屬血液內奪。陽動化風。以和肝清熱。
得安。今思藏血統血。固在肝脾。必得陽明脈絡充旺。斯
海流行稱職。議甘補佐以兩和方意。

便血肝
腎虛

人參 炙黑甘草 歸身 赤白製首烏
茺蔚子 酒炒白芍 桂圓肉 小黑稽豆皮
潘 下血。純用苦寒。幸得補陽救正。陰陽造偏。浮腫咳嗽。
此藏聚失司。當春升發洩之候。宜通補攝納。治其肝腎。
若芪水呆補。恐助濁凝。有脹滿之變。

人參

五味

茯苓

車前

熟地炭

炒杞子

炒歸身

巴戟肉

刺脾腎
陽虛

袁

脈濡面赤呃嘔吐自利。此太陰脾陽受傷濁陰逆侮。

高年不可純消。擬用理中法。

人參

炒黃乾薑

厚朴

薑汁炒

炒半夏

又 中下陽微嘔呃下利溫中不應恐延衰脫夫陽宜通陰宜守此關閘不致潰散春回寒谷生氣有以把握候

王先生主議。

人參

附子

炮薑

炒梗米

赤石脂

生白芍

便血鬱
熱

宋四七脉濡濇減食不運。腕中常痛。糞後血下如線。按經云。
陰絡傷則血下溢。閱前方補陰不應。反滋脹悶。蓋因不明經營操作。多有勞鬱。五志過動。多令化熱。氣鬱血熱。三焦失於宣暢。若非條達氣熱。焉望血止。

於术炭

枳實炭

鬱金

廣皮

炒焦桃仁

炒白芍

炙草

茯苓

嘔吐胃
陽虛

褚

柏所致。其苦寒。胃先受傷矣。先用小半夏湯加黍米。晨起未納飲食。吐痰致嘔。減穀。胃陽傷也。由多進知。

痺勞傷
氣血痺

席

積勞氣血凝遏。腕悶肋痺。食減治以宜通脉絡。

桃仁

當歸鬚

鬱金

柏子仁

小胡麻

桑葉

桑芽膏丸

施三

忽然神迷。逾時自醒。病起一年。頻發漸近。今診脈細。

弱必未實。熟此因憂慮。情志受傷。手厥陰膻中之清真。
爲濁涎所阻。內因之病理難速攻。姑以宣通神明。兼理。

痰氣爲治。

午服

鮮菖蒲根

天南星

遠志

竹節附子

茯苓

薑汁

夜服白金丸

失音肺
熱

徐三

聲音不宣。痰出鼻竅上焦肺氣窒塞。經營着急。

傷肺酒熱薰蒸亦主傷肺。宜辛涼以宣之。薄味以清之。

每日吃淡豆腐花一杯。

枇杷葉

薄荷葉

桑葉

杏仁

牛蒡子

甘草

午前服

徐二十九病氣血膠結絡中不和。攻補皆不去病。仿古五積

治例。每以疏通緩逐爲法。不必峻劑。

雞內金

海浮石

蛤粉

歸鬚

桃仁

半夏

瓜蒌實

枳實

山楂

便血陰
傷及陽

肝風動

呂 脈動如數。按之不鼓。便血自去。秋大發。今春頻發。不已。凡夜寐夢泄。便血隨至。平時身動吸促如喘。氣衝咳嗆。心悸耳鳴。足肢痿弱。不耐步趨。種種見症。顯然肝腎

真陰五液大傷。入脈無以攝固。陰既虧損。陽無有不傷。此滋補原得安受。嘗讀仲景少陰病治例。有填塞陽明。一法意謂脂液大去。關闢皆撤。而內風虛陽。得以掀旋。內擾。屢投補陽。晴風隨至。聖人每以填塞其空。似與內經腑通爲補之義相左。然關門不固。焉有平期。既驗之後。再以血肉有情。另佐東垣升陽之法。安養調攝。自有成驗。先用方。

禹糧石 赤石脂 人參
木瓜 蒸餅爲丸
五味

萸肉

李先知曰。下焦有病人難會。湏用餘糧赤石脂。以土

屬外剛內柔味酸質厚能填陽明空漏人參益氣生津合木瓜以入胃更味酸收斂液固陰以熄肝風。蓋陽明陽土宜濟以柔不用剛燥慮其劫液耳。前方用二十日後接服

膾肺臍

鹿茸

家韭子

補骨脂

生兎絲子粉

赤白茯苓

暮夜兼進東垣升陽法

人參

黃芪

熟术

廣皮

炙草

炒歸身

防風

羌活

獨活

吳
辛泄太過肺胃津傷咽喉乾涸出納氣阻蓋肺爲出

氣之臟姑進滋養上焦。以充化源。

生雞子白 玉竹 夢冬 甜杏仁 生甘草

肝風脾虛

嚴

填陰則陽和風熄。雖已獲效。春分後。診左脈垂尺已減。右脈弦。恐夏熱氣泄。有減食神煩之慮。早上仍用前方。晚進戊己法。倣仲景肝病實脾之意。

人參

熟术

茯苓

炙草

廣皮

白芍

眩肝陽升動

方

饑不欲食。氣衝咽嗌。頭眩。寒熱汗泄。皆肝陽升動太過。若加怒勞。恐有暴厥之慮。

川連

烏梅

人參

牡蠣

生白芍

炙草

風熱風
陽上升

包

熱灼耳鼻諸竅皆痒。浮陽化風上擾。汗多不渴飲。此非氣分實火。鎮固不應。法當攝補。

三才湯合參夢散主之。

肝鬱怒傷

葉

四三鬱怒致病。心胸悶背痛甚。至氣阻咽喉。呼吸有音。吐涎沫。又不熱渴。由肝病蔓延。所傷非一經矣。先理上焦。

與苦辛輕劑。

鮮枇杷葉

香豉

苦杏仁

鬱金

瓜蔞皮

黑山梔

勞傷
陽氣

何三臍流穢水咳嗽。腹痛欲瀉。詢知勞動太過。陽氣受傷。

三年久恙大忌清寒治嗽法當甘溫以治之。

黃芪建中湯去薑

喘下焦
陽虛

陸_五服腎氣湯。是下焦陽微致神氣冒昧。吸不得入。

爲喘。溫補收納一定成法。

人參

熟附

茯苓

車前

紫衣胡桃肉

嘔肝犯
胃

姚 脉左弦。肝風犯胃。水穀下咽卽嘔。經月不愈。胃氣大

虛泄。未必兼安胃。

人參

川連

黃柏

川棟子

川椒

桂皮

烏梅

生白芍

陰虛肝
陽動

潘

眉心痛。心中熱。腰脊痠痛。五心皆熱。自產後半載。形消食減。乃下焦陰液大耗。而肝風挾陽震動矣。病自內損。固當補益。然閱所服方藥。雖曰養陰。半投芎柴辛散。是昧於根蒂已虛。雜用升泄。恐咳嗽躁厥至矣。

生地

阿膠

生白芍

麻仁

炙草

麥冬

羚羊角磨汁

瘕液涸
氣墜

伍

崩淋已久。少腹結瘕。液涸氣墜。辛甘溫潤之補冀得宣通。勿謂崩症。徒以滋藥。

淡蕊蓉

杞子

柏子仁

郁李仁

冬葵子

歸身

風溫劫
損胃汁

任

奶奶

風溫乃手太陰肺病與傷寒足經不同輕劑恰合治

上無如辛散消尅苦寒清火劫損胃汁致嬌柔肺臟一
傷於邪再傷於藥氣鬱不行壅塞喘咳不饑不飽此胃
氣已逆旬日以外當甘涼生胃津少佐宣降不宜重劑。

玉竹

霜桑葉

大沙參

生甘草

甜杏仁

甘蔗汁

胃陽虛

方

脉形濡弱形寒汗出頻吐涎沫三日來寤不能寐此
胃中虛冷陽氣困憊法當溫中佐以運通宣導寒涼斷
勿輕投。

丁香皮

益智仁

半夏

腑陽不通便難

錢

腑陽不通。肝失疏泄。至腹痛便難。咽阻目赤。此酸苦泄熱以通陽竅。倣前賢龍會遺意。陽和風化。腸垢始下。脈雖小安。而舌乾少寐。陽明胃汁未充。仍宜甘寒爲主。以性躁肝急。脾胃易虧也。

茯苓

廣皮

煨薑

生地

阿膠

麻仁

炒麥冬

生白芍

茯神

溼熱
內壅

洪

勞心營耗。風火交熾。飲啖酒肉。濕熱內壅。絡虛脉實。肉腫如癰。當此小滿。陽氣大泄。陰未復致。內風挾陽上巔。耳目孔竅不清。舌胎黃厚。並不大渴。雖與客熱不

風溫

同。但口中酸濁吐痰。酒客不喜甘藥。議進滋腎丸。

王 風溫上腫氣窒不饑。仍從上治。

活水蘆根
兜鈴

白蔻仁
杏仁

大豆黃卷
生苡仁

乾蟾丸五丸

李

溫濕熱蒸傷脾胃。身熱泄瀉。

黃芩

生白芍

滑石

猪苓

俞

穢濁纏染。口鼻吸受時序雨潮之濕。亦屬不正異氣。

此芳香開氣。淡滲利濕。一定成法。

白蔻仁

藿香梗

嫩竹葉

杏仁

大豆黃卷

厚朴

滑石

廖 脉細自痢瀉血。汗出淋漓。昏倦如寐。舌紫絳不嗜湯飲。兩月來悠悠頭痛。乃久積勞傷。入夏季發泄。陽氣冒嶺之徵。內傷悞認外感。頻投苦辛消導。大劫津液。少陰根底欲撤。陽從汗泄。陰從下泄。都屬陰陽樞紐失交之象。此皆見病治病。貽害不淺。讀長沙聖訓。脈細如寐。列於少陰篇中。是攝固補法。庶可冀其散而復聚。若東垣芪术諸方。乃中焦脾胃之治。與下焦少陰無預也。

人參

禹糧石

赤石脂

五味子

木瓜

炙草

此仲景桃花湯法。原治少陰下痢。但考諸本草。石脂

餘糧乃手足陽明固瀉之品。非少陰本臟之藥。然經言腎爲胃關。又謂腑絕則下痢不禁。今腎中陰陽將離。關闢無所以固胃關。即是攝少陰耳。

瘕病傷
厥陰

薛奶奶

瘕痛在少腹左旁。病傷厥陰絡脉。宗仲景法。

當歸三錢

生精雄羊肉切片漂去血水

生薑一錢

炒黑小茴香一錢

濕熱脾
瘧

徐

目黃。脘悶汗多。嘔吐濕勝。症屬脾瘧。

痰飲

厚朴

炒半夏

草菓

藿香根

白蔻仁

袁頭旋目暗心悸。不渴不饑。勉強進食。二便自通。不致

脹。阻病經臥床一月。東垣云。久病不知饑飽。不見皮枯。

勞遺泄

毛瘁。乃痰飲爲患。當陽氣上升時。令恐延痰厥。

炒焦熟半夏 枳實 高粱米 茯苓 薑汁

華

戊申三月廿一起恙。至四月初一日診脉虛促。舌微腫。心悸。神恍忽。遂肌麻痺。遺泄。晝夜卧不成寐。腰以下痠。不勝坐立。此屬陰液素虧。值春夏之交。陽氣發泄。陰乏戀陽。加以步趨嗔怒。都令五志中陽大動。誠如內經煩勞則張。精絕辟積於夏。令人煎厥薄厥之謂。蓋張指陽氣之弛張。精絕謂真陰之內奪。木失水涵。肝風大動。皆爲厥之因也。法宜味厚固陰。甘緩和陽。內風熄。可冀悸定安寐。倘執方書不寐。投以溫胆湯。或畏虛亂補。

是不明陰陽臟腑之先後矣。

人參一錢

茯神三錢

眞阿膠二錢

麥冬一錢

生牡蠣三錢

龍骨三錢

生白芍二錢

細甘草炙黑一錢

又

己酉歲正月初九日診夢寐欲遺丸方

人參二兩

熟地四兩

河車膠一具

五味一兩

覆盆子一兩

菟絲子一兩

茯神二兩

湖蓮肉二兩

遠志一兩

山藥粉和丸

陽傷便

周

病小愈。卽食腥滯粘膩之物。胃陽尙弱。穢濁痞結。中焦不運。腸氣不行。大便七八日不更衣。舌自涎湧。鼻覺氣穢。清濁混亂。所服之藥半係辛寒。不究陽傷致纏綿。

逾月先用來復丹。每服一百粒。薑湯送下。

瘧肺失
降合

汪 日前議味淡輕揚。少佐微辛。正合經言肺欲辛之旨。然發表之。辛則升。開洩之辛則降。夫肺主一身之氣。清空之體義不受濁。前云穢瘧上入肺位最高。受戕最先。因失治而漫延中下。內經色診。謂從上病者治其上。斯源清流潔矣。

水蘆根 白通草 山茵陳 生苡仁 浙茯苓

桑皮 研入白蔻仁末 卧時服威喜丸二錢

又 濕阻經絡爲痛。初在虛里穴。漸延肋背附骨。日來背部發現濕症。微微紅色。此濕邪由氣及於血分。丸藥攻

瘧濕阻
經絡

滯。僅走腸中。未能引經宣通。所用氣分肺藥。咳喘濁痰。已緩。今經絡久痛。當以三因癥症叅看。

製蒺藜

通草

木防己

炒焦半夏

生苡仁

浙茯苓

炒熟石膏

潮濕下
痢陽傷

陳

大雨潮濕。下痢都是陰寒。服黃連。陽傷腹脹。繼雖用溫。又是守中。今二便不爽。脹必兼痛。腑爲陽。陽宜通。通則濁陰不聚。痛脹自減。大針砂丸。每服一錢二分。

產後衝
任虛

金

娘

少腹痠鬱不和。據述因寒濕而起。緣產後精采不復。

衝任已空。躊躇不攝。經言陽微爲病。苦寒熱矣。若云瘧邪。焉有三五日休息而至。蓋脉絡空乏。湏填補孔隙。區

區滋清之補。與產後奇脈之病迥殊。故不獲效。

人參 紫石英 炒歸身 鹿角霜 炒杞子

茯苓 接服斑龍丸加參

中惡吸
穢濁氣

舒

口鼻觸入臭穢濁氣。蒙閉心胞。遂心胸痛嘔瘀血。且欲昏閉。卽方書中惡之症。蘇合香丸。能辟穢惡之邪。若

悞認陰症。擅投桂附。則抱薪救火矣。蘇合香丸二丸。
張小姐時時驚恐。不食不便。狀如神附。頭面肌浮。舌強唇腫。

寐不能寐。夜多妄言。經少紫黑。此五志煎厥。風陽上逆。

倣俞氏治楊季登女例。用龍會丸三錢。

厥陰頭痛
痛

吳 厥陰頭痛。舌乾消渴。心下煩疼。無寐多躁。少腹脹滿。

小洩滴瀝。時時痙攣。最怕厥竭。

阿膠

鮮生地

雞子黃

小黑穧荳皮

煎半盞送滋腎丸二錢

哮喘宿
陰虛

顧

幼稚哮喘。由外來風寒。必從肺治。因過食甘膩。必兼理胃。久發不已。病氣蔓延。不獨在肺胃間矣。故因勞致發。遇冷而發。乃衛陽已虛。煩動火升。面赤皆腎陰內怯。雖非色慾之損。然因病致虛也。須知病是有餘。體屬不足。不可徒用攻痰逐氣。取快一時。當未發之時。病機潛伏。只宜培土以運痰。土旺則肺氣充壯。水納氣以益腎。子氣充長。母氣自強。此爲子母相生之治。守之日久。發

作自緩。况宿病無急攻之法。或寓攻於補。或攻補互施。然寒暄飲食之調攝。於此症尤當加慎。

早上服補納腎氣方

薑汁製熟地 生白芍 懷山藥 丹皮 雲苓
紫衣胡桃肉 醣秋石 澤瀉 密丸桐子大

午後服健中運濕方

人參 熟半夏 新會皮 茯苓 枳實
地栗粉 金石斛湯法丸

王 濕鬱熱蒸。必陽氣鼓運。濕邪乃解。是寒戰後身痛已緩。蓋濕從戰而氣舒。戰後陽氣通和。爲身熱汗出耳。但

脉濡神倦。餘邪未盡。正氣已虛。有轉瘧之象。用大半夏。

湯通補陽明。

人參

半夏

茯苓

薑汁

嘔吐大便不通

蘇

早食暮吐。大便不爽。病在中下。初因勞傷胃痛。痰瘀

有形之阻。

桃仁

半夏

韭汁

枳實

姚

老年伏氣。溫邪五十日不解。脘痞不饑。心中脇內獨

熱。藥下咽則嘔痰多呃逆。舌焦微渴。四末微冷。此胃傷

已極。久乏穀氣。致津液不復。氣機鬱悶。用藥湏忌苦燥

辛溫妨胃。先請芳香輕清兼以穀氣。開醒上中。

痘陽傷
瘡

瘡

香梗露 香櫞露 玫瑰露 銀花露 米漿

劉 痘聚攻觸中脘。心痛映背。嘔吐涎沫。凡久病。病必在絡。絡空必成脹滿。已經旦食苟安。暮食痛嘔。其胃中清陽久失旋運之司。飲食尙助嘔脹。焉能承受湯藥。病退無期。頗爲棘手。閱古方書於久病有形。通劑是議。先擬通陽改投小丸。一味阿魏丸。硃砂爲衣服五分。

張 形寒手足痛。肌肉漸腫。勞力行走。陽氣受傷。客邪內侵。營衛失和。倣局方庫在四肢。汗出陽虛者。與黃芪五物湯。

渾汗出
陽虛

黃芪

桂枝

茯苓

炙草

便血怒
勞血鬱

胡

胸臆不爽。食入內脹。糞後便血。病已二年。診脉左小澀。右微弦。食減形瘦。是內傷悒鬱。初病在氣。久延血絡。而瘀隔色鮮。血液皆下。從怒勞血鬱治。

當歸

煨薑

南棗

桃仁

杏仁

柏子仁

歸尾

紫苑

冬葵子

嘔吐腑
陽滯濁

費

臍下有形。攻觸氣上。則嘔吐。降下。則失氣。脹消。脹中必有濁滯阻塞。椒附難投。僅能開無形陰濁。老年陽衰。

不可遽投。攻下用半硫丸一錢。俾腑陽流通。滯濁自去。
丁 脉右弦。脘痛。映背。得嘔。痛發。氣鳴。痛緩。乃胃氣少降。
背胃氣 脘痛映

少降

寒暄七情皆令痛發。病屬肝胃。議河間金鈴子散。

金鈴子 延胡 炒半夏

薑汁 茯苓 橘紅

肝犯胃
平肝和胃

杜

酒客胃中釀熱。嗔怒亦令肝陽犯胃。今納穀脘中微

痛。乃陽逆失降。酒家忌用甘膩。辛苦清降。平肝和胃治之。

川連 吳萸 半夏 薑汁

茯苓 橘紅 竹瀝

溫邪劫
傷津液

王 清明穀雨。氣候已暖。所感溫邪。從口鼻吸收。自上及中爲三焦病。羌防乃散足太陽風寒表邪。溫病篇云。悞

用辛溫表散。卽爲重劫津液。今頭身痛。咽痛心胸煩悶。視其舌心灰黃。邊紫絳渴飲不能下咽。斑疹隱隱。津涸呼吸漸閉。所謂一逆尙引日再逆促命期矣。重症之尤勿與目下時行客邪同視。

立參

連翹

銀花

白金汁
冲

大豆黃卷

飛滑石

象貝

川通草

厥怒傷
肝陰

錢

肝藏魂。因怒則諸陽皆動。所見病情。皆屬陽動化風而爲厥。故凡屬厥症。都隸厥陰。考內經治肝之法。不外辛以理用。酸以治體。甘以緩急。今肝陰素虧之體。驟加暴怒。病已浹旬。液涸陽亢。急急鎮固收攝。猶慮弗及。閱

所服諸方。僅以泄肝。用平肝爲事。膚淺膚劣。一至於此。不知補法。都以子母相生同治。蓋壯水則木得滋榮。陰充則風陽自熄。醫不師古。尙敢稱虛道實耶。

生地

阿膠

麥冬

人參

金箔

生雞子黃

瘧熱傷陰

謝

瘧熱傷陰。心腹中熱。浮陽升降。鼻衄汗出。遺精便難。此因瘧加病。久卧氣機呆鈍。食入難消。然調脾胃之藥。皆氣勝助燥。施於液虧體質。於理有悖。

鱉甲

白芍

服二劑後接服後方

焦穀芽

生地炭

炒知母

製首烏

夢遺督
任二脈失司

汪

穀露 人參 麥冬 鮮生地 北五味

久遺洩溺。淋瀝三年。下焦常冷。督腎腰髀疼。楚如墜。

此腎臟虛寒。但填精固瀉多進不應。是督任二脈失司。

粘膩滯藥。未能走入奇經。倣孫真人九法中采用。

鹿茸 補骨脂 家韭子 蛇床子 生菟絲子

覆盆子

金櫻子

瑣陽

生杜仲

炙草

茯苓

黃精

羊內腎

青鹽

共爲丸

痰飲支
脉結飲

蔣

病已三載。仍然能寢能食。諒非臟腑虛損。自述冷氣或聚胸臆。或貫脇肋水。飲下咽。汨汨有聲。氣得下降。宛若病去。此必支脈結飲。久久阻遏。氣隧流行。決非重墜。

攻逐以及溫補厥濁可治。蓋脈絡爲病，非辛香何以開鬱？議宣通氣血方法。

降香

枇杷葉

鬱金

橘紅

蘇子

桔梗

苡仁

桑葉

淡薑渣

大黃

遺精溫
養通攝

金動氣兼有遺精，已是下焦陰陽虛損，况久病欲進溫養，必須通攝桂附氣雄而剛，非下損藥也。

淡蕊蓉

補骨脂

胡桃肉

生茺絲子

覆盆子

家韭子

舶茴香

茯苓

遺精風
火劫傷

安

脉小數色蒼，心痛引背，脇肋皆脹，早上牙宣齦血。

寐常有遺洟，此形質本屬木火，加以性情動躁，風火內

督陰

燃營陰受劫。故痛能進食。歷來醫藥治痛。每用辛溫香竄。破泄真氣。不知熱勝涼傷。適令助其躁熱。是經年未能痊期。議以柔劑。熄其風。緩其急。與體質病情。必有合竅之機。

細生地

阿膠

牡蠣

玄參

丹參

白芍

小麥

南棗

冬溫傷
肺胃津
液

季

秋瘧愈未復原。冬季連次感觸溫邪。老年平素有痰嗽。本恙溫風燉肺氣。劫胃汁。致痰多咳甚。欲嘔。脈數倏熱。右脇常痛。火色升於右頰。由胃津漸傷。肺不主降。而升騰莫制。古稱肺乃柔金。胃爲陽土。已經百日纏綿。開

提半屬苦辛。辛泄肺氣。苦再傷胃。致不思納食。議甘藥。

濡胃潤肺。胃汁自充。肺氣自降。土旺生金。古賢定法。

玉竹 麥冬 花粉

甜杏仁 橘紅 蕎麥

脾脹
腎陽衰

秦 老年腫脹。四肢俱冷。皆陽氣衰憊。濁陰僭踞。蓋脾陽主運。腎陽司納。今食入愈脹。二便不爽。中下之陽消乏。豈可小視此病。

炮黑附子 淡乾薑 生白朮

生厚朴 茯苓 澤瀉

九 由肝氣升舉犯胃。胃逆不降。幽門不通。旁趨爲脹。數

脾脹
犯胃

月久延氣分已入血分，

桃仁

郁李仁

降香

歸鬚

川棟

山梔

氣
溫熱阻

嚴

雨寸脈獨搏，不餓不食。上焦氣分之阻。

時當仲夏。必

有濕熱客氣內伏。

半夏麴

瓜蔞皮

滑石

黃芩

通草

杏仁

種福堂公選良方卷二

葉桂 天士先生論

全人公較

中風

牛黃清心丸

此藥專治痰厥。昏暈不醒。口噤痰喘。及小

兒驚風。發搐五癇等症。極效。

胆星

一兩薑
汁炒

白附子

一兩
鬱金

五錢川烏
包煨

半夏

一兩皮硝湯泡五次皂
莢湯泡五次
次次曬乾

右五味共爲細末。用臘月黃牛胆三個。取

汁和藥。仍入胆內。紮口掛風簷下。至次年取膽內藥一
兩四錢。加度過芒硝。水飛辰砂。硼砂各一錢。冰片。麝香。
各一分。研極細末。和在一處。稀糊爲丸。如芡實大。金箔

爲衣。薑湯化下。

治暴仆痰涎壅塞。

竹瀝一盞。薑汁五匙。調入白礬末。

一錢灌下。

治筋骨疼痛。如夾板狀。不可忍者。

用驃子修下蹄爪。

甲燒灰存性研末。或黃酒。或湯調服立愈。

治癱瘓秘方。

熟牛骨髓

一
碗熟白蜜

一
筋半
濾過
炒白麵

筋

炮薑末

三
兩

右四味。和勻如彈丸大。每日三四丸。細

嚼黃酒下。大效。

又

威靈仙

蒼朮

牛膝

桂枝

木通

各一
兩

右爲末。黃酒五觔。煮一炷香。早晚服。

治雞腳風。手足及指拳攀如雞腳狀。疼痛不時發者。當從鬼眼灸之。左右膝骨蓋下兩邊各有小窩共四穴。謂之鬼眼。各將斬艾灸三壯即愈。愚謂以驅寒溼雷火針針四穴亦效。

補益

奇想補心丸。柏子仁二觔去油爲末白朮一觔炒生地一觔紅棗肉一觔蒸熟右煉蜜爲丸。彈子大。每日三服。百日後百病消除。

桃子丸

烏鬚黑髮煖腎種子。陽虛人宜服此藥。

棉花子十數觔。用滾水泡過。放蒲包內悶一炷香。取出曬裂。壳口取仁。并去外皮。用淨仁三觔。壓去油。用火酒

三効泡一夜取起蒸三炷香曬乾。

故紙一効鹽水泡一夜炒

乾杜仲

一効去外蠟皮黃酒泡一
夜曬乾薑汁拌炒去絲

杞子

一効黃酒浸蒸曬乾

兔絲

子一効

吐絲爲度酒煮

共爲細末蜜丸桐子大每服三三錢。

養元固本暖腰方。

廣木香 真川椒 大茴

炒

紙

升麻各一兩

川附子五錢

斬艾半錢

効丁香四錢

上肉桂

棟子

各一兩

先將艾搓軟次以各藥爲末和勻用綫

絹做暖腰入藥密行腰上著肉者神妙。

腰痛神方。

雄豬腰子

一付銅刀破開去中間血膜及外邊油膩青鹽炒二

大茴

一錢當歸

一分杜仲

五錢

右爲末入腰子內

放磁器中過一宿明早用韭菜上下鋪蒸熟用火酒洗

去藥末。將腰子用銅刀切片。好陳酒空心送下。多年者吃五六付。乍起者一二付卽愈。

又

杜仲

補骨脂

牛膝

香附

各三錢

青鹽

一錢半

將雄豬腰二對。竹刀剖開去筋絲。每個內外拌藥。用溼草紙包灰火煨熟。去藥酒下一醉卽愈。

治下部無力。

雄豬肚一個

紅棗肉

半兩

蓮肉

四兩

苡仁

四兩

將糯米半升。填入肚內。好酒一鍾。醬油少

許。煮熟每日切幾片。空心好酒下。

長春方。

治腎虛精冷之症。

魚鱠

一筋蛤粉炒成珠極焦

棉花

子

一筋取仁去盡。油酒蒸

白蓮鬚

八兩金櫻子

一筋去毛川石斛

八兩沙

蒺藜

四兩

杞子

六兩

菟絲子

四兩

五味子

四兩

炒

兩

將鹿角

五

角

鋸薄片

河水煮

三晝夜

去角取汁

熬膏

和藥末爲丸

桐子大

每服三錢

歸圓酒方

甘菊花

八兩

杞子

一

當歸

八兩

龍眼肉

三

角

三

角

右藥將火酒三

觔酒

釀十

觔泡

二十一日用

三仙酒方

燒酒一

罇十

觔入

龍眼肉一

觔桂

花四

兩

白糖八

兩

將泥封固

愈久

愈佳

癆

治吐血癆症。

桂圓七

個紅棗十四

個蓮子二十

個小黑豆四

個

水二碗煎一

碗空心早服

連棗吃完爲妙

九
粒

治虛癆咳嗽。吐血肺痿肺瘡。吐膿血垂危者。服之卽愈。
用茭白細根。約三四兩搗碎。將真陳酒煮絞汁。每日服
一二次。至一二十日卽愈。

治咯血吐血。癆嗽久不止。
雪梨六十隻。取汁二十杯。
生地茅根藕各取汁十杯。蘿蔔麥冬各取汁五杯。將六
汁煎煉入蜜一觔。飴糖八兩。薑汁半杯。再熬如稀糊則
成膏矣。每日用一二匙。

治酒癆吐血。
用雞距子一兩。水二鍾。煎一鍾。不拘時。
服。渣再煎服。服至數十日愈。

盜汗

治盜汗方。

蓮子

七粒
黑棗七個
浮麥一合

馬料荳一合

用水一大碗煎八分服三劑愈。

又

黃芪 馬料荳

二味煎服半月愈。

又

五棓子去蛀末炙乾研末男用女睡女用男睡調

厚糊填臍中外用舊膏藥貼之勿令泄氣兩次即愈。

止汗方。

黑荳三錢
浮麥一錢
烏梅一個
煎湯服

咳嗽

治痰嗽諸虛奇驗方。

藕汁 梨汁 蘿蔔汁 人乳

薑汁

白糖

沙糖

童便

各四兩

將八味放磁瓶內

用炭火熬煎只剩一劙爲止

每日空心白滾湯送下四

錢服完卽愈。如能常服，則精神強健，永無虛損。

治小兒吼噉併大人咳嗽屢驗方。

款冬花三錢 晶糖五錢

將二味放茶壺內泡湯當茶吃，自然漸愈。

治小兒天哮。一切風溼燥熱咳嗽痰喘，兼治大人。

浮石

淨末四錢

飛滑石

淨末四錢

甜杏仁

淨末四錢

薄荷

淨末四錢

右爲極細末，每服二錢，用百部煎湯下。

治痰火骨蒸。吐血不止之症，重者十服，八服卽愈。

人參

天冬

麥冬

二味去心各一錢五分

茯苓

五分

杏仁

二粒去皮尖

紅棗

二枚去核

蓮肉

六粒去心

人乳

二匙

白密

三匙

大甜梨

一枚銅刀挖去心

將前藥製碎，納梨內，仍以梨蓋蓋之，用綿紙封固，飯上

海

蒸熟日間吃其藥。臨臥吃此梨。

治痰火方。咳嗽吐痰。面鼻發紅者。一服卽愈。

青黛

水飛極細。曬乾。
再研用三四錢。蛤粉三錢。

二味煉蜜爲丸。如指頭大。

臨臥口噙三丸。其效如神。

治痰火神水方。一名玄霜。

黑鉛一觔。烊成一薄餅。

中穿一洞。以繩繫之。將好米醋半甕。卽以鉛餅懸掛甕中。離醋約一寸許。甕口用皮紙箬子。紮緊。再以磚石壓之。勿使泄氣。放屋下陰處。待數日。取起。鉛餅上有白霜拭下。每鉛一觔。取白霜二兩爲止。其霜治噎膈。每服五分。噙口內。以白湯送下。若治痰火咳嗽。每服三分。照前

法服

治癆火方。

批杷葉五十葉。去淨毛。水五十杯。煎至五六杯。再重湯燉至三四杯。每藥三茶匙。用蜜一茶匙。調下立愈。

治老人上氣喘急。嗽不得臥。

生薑汁五兩。黑砂糖四兩。用水煎二十沸。時服半匙。漸漸嚥之。

治喘。

瓜蔞一個。明礬棗大一塊。同燒存性研末。以熟

蘿蔔蘸食。藥盡病除。

吐血。

治吐血不止。用碗盛清水。吐血在內浮者。肺血也。沉者。肝

血也。半浮半沉者心血也。各隨所見。以羊肺肝心煮熟。蘸白芨末。日日吃之。或只用白芨爲末。米飲調服亦效。

治吐血方。吐血者。偶吐一二口。或不時吐之。

側柏葉濃煎。和童便常服之。

又。用藕節爲末。入炒蒲黃血餘灰等分。調服之。奇效。

又。用雞子一個。打開。和三七末一錢。藕汁一小杯。陳酒半小杯。隔湯燉熟食之。不過兩三枚。自愈。

赤白二濁

治赤白濁。兼治夢遺。名將軍蛋。

生大黃三分。生雞

子一個。將雞子頂尖上敲損一孔。入大黃末在內。紙

糊煮熟空心吃之四五朝即愈神奇秘方。

治色慾過度精濁白濁小水長而不痛者并治婦人虛寒。

淋帶崩漏等症。

生龍骨

水飛

生牡蠣

水飛

生兔絲粉

生韭菜子粉

右四味各等分不見火研末生乾麵

冷水調漿爲丸每服一錢或至三錢晚上陳酒送下清

晨服亦可。

治遺精白濁有溼熱者。

生蠶沙研末每兩加生黃柏

末一錢空心開水下三錢六七服即愈。

治白濁。

用頭生雞蛋五枚開一小孔每個入生白蘆

肉二枚飯上蒸熟每日吃一個即愈。

治遺精滑失。

白龍骨

研細一兩

韭菜子

炒一合

右爲末。

空心陳酒調服二錢。

小兔絲丸。治女癆。夜及遺精白濁。崩中帶下諸症。

石蓮肉

二兩白茯苓

二兩蒸

兔絲子

五兩酒浸研

右爲細末。

山藥糊爲丸。桐子大。每服五十丸。加至百丸。或溫酒。或鹽湯下。空心服。如腳膝無力。木瓜湯下。晚食前再服。此方治遺精之聖藥。屢用屢效。但石蓮子陳久者難得。

治精氣虛。滑遺不禁。

龍骨

蓮鬚

芡實

烏梅

肉各等分爲末。用山藥丸如小豆大。每服三十丸。空心米飲下。

治遺精方。

文蛤研細末。以女兒津調貼臍內立止。

治一切淋閉白濁。因火結莖中濤痛。

鮮鮮苡仁根。搗

爛絞汁一碗。或滾酒。或滾水。冲入空心服。二三次必效。

思仙丹。治陰虛火動。夢遺神方。

蓮鬚十兩。石蓮肉十兩

去內青翳
并外皮 茅實十兩

右爲末。再以金櫻子三飴去

毛子。水淘淨入大鍋內。水煎濾過再煎。如飴糖和勻前藥丸如桐子大。每服七八十九丸。

蠱

治五臟神方。

蘿蔔子四兩用巴豆十六粒同炒

牙皂一兩五錢沉

香錢五

枳壳四兩火酒

大黃一兩

琥珀一兩

右共爲末。

每服一錢。隨病輕重加減。雞鳴時熟酒送下。薑皮湯亦可。後服金匱腎氣丸。調理收功。

治水臌腫胖。

輕粉二錢

巴豆四錢

生硫黃一錢

右研末。做成餅。先以新棉一片鋪臍上。次以藥餅當臍按之外。以帛縛之。如人行五六里。自然瀉下。候五六次除去藥餅。以溫粥補之。久患者。隔日方取去藥餅一餅。可救二十人。其效如神。愈後忌飲涼水。

治水臌方。

陳芭蕉扇

去筋燒灰存性

千金子

去油壳分五釐

滑

石分二

共爲細末。以腐皮包。滾水送下。十服全愈。

治水臌氣臌方。

活黑魚一尾。重七八兩。去鱗甲。將肚

剖開去盡腸入好黑礬五分。松蘿茶三錢。男子用蒜八瓣。女用七瓣。共入魚腹內放在磁器中蒸熟。令病人吃魚連茶蒜吃更妙。此藥從頭吃起。病從頭上消起。如從尾上吃起。卽從腳上消起。立效之仙方也。

治氣臌方。將大蝦蟇一隻。破開用大砂仁填滿腹中。黃泥封固。炭灰蝦紅冷定。去泥研末。陳皮湯調服。放屁卽愈。

治氣臌氣脹方。蘿蔔子二兩搗研。以水濾汁。用砂仁一兩。浸一夜炒乾。又浸又曬。凡七次爲末。每米湯送下。一錢立效。

治臌脹方。

四五月將黃牛糞陰乾，微炒黃香爲末。每服一兩，煎半時濾清服之。不過三服即愈。

解脹敷臍方。治一切臌脹肚飽發虛。

大田螺一個雄

黃錢甘遂末一錢，麝香一分。

先將藥末用田螺搗如泥。以麝置臍放藥臍上。以物覆之束好。待小便大通去之。重者用此相兼。小便大通病即解矣。

治中滿臌脹。

陳葫蘆一個要三五年者佳。以糯米一

斗作酒待熟。用葫蘆瓢於炭火上炙熱。入酒浸之。如此五六次。將瓢燒灰存性爲末。每服三錢。酒下神效。

治臌脹方。

雄豬肚子一個入大蒜頭四兩。加小楨榔

砂仁末三錢。木香二錢。砂鍋內河水煮熱。空心服豬肚立效。

又 取舊葫蘆一個。浸糞坑內一月。取起掛長流水中三日炒黑爲末。每兩加木香末二錢。每日空心砂仁湯送下二錢。

治肝氣方。 烏梅二個。鮮橘葉三錢。青鹽二分。真川椒二錢。

右藥空心服。

痞塊

治痞塊方。 不問男女。左右癩瘕積聚瘡病。收取水紅

花。即邊蓼半老穗頭連葉帶子。曬乾不拘多少量用者。蒜

頭去皮膜。同放石臼內打爛捏成餅。曬乾爲末。每酌入
蚶子壳。煅灰研粉四兩。再將老蒜打膏爲丸。桐子大。每
服百丸。空心食後白湯下。一日三服效。

治大人小兒痞積。將水紅花子爲細末。以麵和作一
處。少加麝一釐。放痞上。以熨斗烙之。數次卽愈。

又 水紅花子熬膏。入麝少許。貼之亦效。

治痞塊。用水紅花新鮮者。同老蒜打爛。量入皮硝一
二兩。捏成餅。比痞塊大一圍。放痞上。用祫紮緊。待乾再
換。則痞亦消。

又 紅芥菜子血芥。卽猪不拘多少。生薑汁浸一宿。大約芥

子一酒杯。加麝香一錢。阿魏三錢。同搗極爛。如膏藥攤青布上。貼患處外用汗巾紮緊。一宵貼過。斷無不消。

又名藥豬胞。

麝香

一錢。阿魏

三錢。

水紅花子

大黃

歸尾

甘遂 急性子 甘草

各五錢

右爲細末。用

豬水胞一個。量痞塊大小。用尿胞大小裝入乾燒酒半胞。將前藥末放入胞內。緊紮住口。用白布將胞兜紮於患處。俟塊化盡。卽去之。不可遲也。

治痞塊八反膏。

鱉頭

莧菜

葱 蜜

甘草

甘

遂

芫花

海藻

阿魏

鱉甲

水紅花子

右應爲末者爲末。應搗爛者搗爛。入末再搗。如和不勻。

加燒酒調之。先以水調白麵作圈。圍瘡上大六七分厚。
其藥敷在瘡上。外用錫注二把。放燒酒在內。熨瘡上。冷
則更換。至瘡內動痛方止。明日大便下膿血。卽除根。

治氣癬。在小腹上攻衝心痛。用穿山甲片土炒脆爲
末。砂糖調陳酒送下。每服三錢。止痛如神。如不能飲糖
酒調亦可。

化癬膏。治塊如活鱉能行動。諸藥不效者。每日空
心將靛花三四五匙。沖熱陳酒內服。至十日卽不動。服
一二月卽消盡矣。外用敷之。

治大人小兒癬塊方。

甘草

甘遂

各三錢

硇砂一錢
木鱉

子

四個去壳

莧菜

三錢

鱉肉

一兩

葱頭

七個

右加蜜少許搗

成膏以狗皮攤貼。如藥乾用葱蜜潤之。二次卽消。

治癬塊方。腹中攻痛而黃肌瘦者愈有應驗。

真陳阿

膠

一兩蛤粉炒鬆研細

九製陳膽星

五錢人乳浸微火烘研

川貝母

一兩去心麝

香

四分急見火

鱉甲

三個必要九骨七骨佳真麻油炙脆黃研

以上五味共爲

細末用無蠟眞柏油二兩火鎔開後入前藥末在內攪和每服用乾腐衣溫水浸軟取乳腐大一塊包藥約一分五釐不拘滾湯飯湯茶酒送下清晨服三包飯後服三包不必多服柏油用三兩亦可極重者兩料必愈。

治傷寒結胸停食方。

陳香糟

六兩

生薑

兩

水菖蒲根

四兩

鹽二兩

右炒熱爲餅。敷胸前以火熨之。內嚮卽去。如

口渴任吃茶水。待大便利下惡物卽愈。

治腹內虫痛方。

烏梅一調

老薑二片

榧子十粒

花椒十四粒

右加黑糖少許。煎服虫盡出矣。

膈

治膈食膨脹效方。

五六月。

用老生薑二三觔或四五

觔放在竹簍內或麻布袋浸在糞釘內。七日取出洗淨。竹刀刮去皮切片。空中弔著陰乾爲末。每服三錢。火酒調下。不過三服卽愈。

治一切痰膈食膈效方。

黑砂糖一

連皮老生薑

觔

動

將二味共搗如泥。成膏入磁罐內。封固埋乾燥淨黃土地內。七日取出。每日和滾水服之。

繆仲淳秘傳膈噎膏

人乳 牛乳 蘭漿 梨汁

蘆根汁 龍眼肉濃汁 薑汁 人參濃汁

右七

味俱等分。惟薑汁少許。隔湯熬成膏子。下煉蜜徐徐頗服之。其效如仙丹。更須安心平氣。勿求速效。

又

好陳酒

一升米糖

十兩貝母

二錢砂仁

二錢廣木香

二錢廣陳

皮

二錢

右咀片入磁瓶內。箬葉紮緊。上放米一撮。重

湯煮以米熟爲度。每日清晨服一大杯。藥完病痊。

又

糖坊內上好糖糟一觔。加水薑四兩。先將糟打爛。

和薑再搗，做小餅曬乾，放磁瓶內置竈煙櫃上，每日清晨將餅一枚，泡滾水內，少停飲湯，已經屢試屢驗。

治噎食。

生薑汁 雪梨汁 蘿蔔汁 甘

蔗汁 蜂蜜 白蘿蔔汁 竹瀝
右各一盞，和勻飯上蒸熟，任意食之。

治翻胃膈氣。

此症必起於腸枯血燥，大便三四日一次。

糞如馬栗，若如羊屎者不治。口常吐白沫者不治。

牛乳 羊乳 人乳 不拘分量，總宜常服。生血潤腸之妙藥。

又 青州柿餅五六枚，飯上蒸熟食之，不用湯水，常服。

卽愈。

治噎膈氣不通方。

用雞喙燒研。入木香丁香沉香紅

棗丸服。

治膈氣暫開關方。

用荔枝一個去核。將蜒蝣一條。放

在荔枝肉內。將冰片三四釐摻在蜒蝣上。卽將荔枝肉裹好。仍放在荔枝壳內。熟好。卽令病人含在口內。有冷涎水滲出。可徐徐咽下。俟一時許。蜒蝣卽化完。亦無水滲出。令病人連壳吐去。只服一次。可以立進飲食。逾四五月。但不可病人知之。恐其嫌穢不肯吃也。

便閉

五子丸。治老人大腸燥結等症。

火麻仁 紫蘇子

松子肉

杏仁

炒去皮尖芝蔴炒

共研如泥。磁器收貯。

每服一丸。彈子大蜜水化下。

治大便不通。

皮硝三錢水化開 香油一盞

皂角末五分

右三味入豬胆內。再用竹管一頭入胆口內用線紮緊。一頭入穀道內。用力將豬胆一擠。其藥入臟立通。

治大便燥結。用雞子白一二枚。生食卽愈。

治老大便艱澁方。

熟地

三錢

山藥

四錢

山萸肉

一錢

丹皮一錢澤瀉一錢人乳半杯白蜜五錢

先將六味煎湯去渣。後入人乳蜜煎一沸。空心溫服一二劑愈。

治小便不通。

獨囊大蒜一個。梔子一個。

鹽一匙。

共搗數

臍中。良久卽通。若不通。敷陰囊上。立愈。

治中暑。大小便不通。

用田螺三枚搗爛。入青鹽三分。

攤成膏。貼在臍下一寸。卽愈。

風寒濕痺

治太陽風寒頭痛。及半邊頭痛。

生薑三片。將桑皮紙

好水濕入灰火中煨熟。乘熱將印堂兩太陽各貼一片。

以帶纏之。立愈。

治半邊頭痛。因風寒而起者更效。

肉桂心一分。麝香二分。

釐

人言。釐北細辛半分。辛夷半分。胡椒十粒。

共爲末。用棗肉搗

丸。如豌豆大一粒。放膏藥中心貼准太陽穴內。一日見效。如壯年火盛者。愈後服黃芩大黃瀉火則目自愈。

又 白芷 細辛 石膏 乳香去油 沒藥去油 右等分爲末。吹入鼻中。左痛吹右。右痛吹左。

又 此治暑天甚怕風。亦欲綿裏頭極重之症。

用鷺

兒不食草陰乾。將上好燒酒浸一宿。日間晒乾。晚間又浸。如此七次。若右邊痛。將此草塞右鼻。左痛塞左鼻。約一時許。鼻流冷水盡。即愈。

治箭風方。俗名鬼箭打。或頭項手足筋骨疼痛。半身不遂等疾。照方一服即愈。真仙方也。

山甲一錢 炒研白薇

二
錢澤蘭三錢

照分量好酒煎服。

治一切麻木痺症。痛風。虎骨木通煎湯。頻頻多。

吃即愈。

治痛風。 厲節四肢疼痛。用醋磨硫黃敷之。或用葱白杵爛炒熱熨之。

又 紅花 白芷 防風各五錢 威靈仙三錢 酒煎服取

汗。三服全愈。

治脚氣。

足疾。腫痛拘攣。

川牛膝

威靈仙

各等

分爲末蜜丸。每服五十丸。空心服。

治癰方。

眞茅山蒼朮五觔。洗淨泥垢。先以米泔水浸

三宿用蜜酒浸一宿去皮用黑荳一層拌蒼朮一層蒸
二次再用蜜酒蒸一次用河水在砂鍋內熬濃汁去渣。
隔湯燉滴水成珠爲度每膏一觔和煉蜜一觔白湯調
服一老人專用此方壽至八十餘身輕體健甚於少
年

治風寒濕痺藥酒方

川羌

一錢

川桂枝

一錢

歸身

五分

秦

艽

一錢

金毛狗脊

一錢

虎骨

一錢

防風

一錢

杜仲

二錢

川斷

川芎

八錢

晚蠶沙

二錢

熟附子

一錢

加桑枝

三錢

生薑

一大

片大棗二枚陳酒二觔浸煎服

治濕氣初起法

嫩松枝

小松秧

不拘多少

將一味入

石臼內搗爛傾入陳酒。絞取濃汁。燉熱隨量飲醉。醒時痛卽止。多飲幾次更好。

七製松香膏

治濕氣第一神方

松香三觔

第一次

薑汁煮。第二次葱汁煮。第三次白鳳仙汁煮。第四次燒酒煮。第五次閼楊花汁煮。第六次商陸根汁煮。第七次

紅醋煮。

桐油三觔

川烏

草烏

蒼朮

官桂

乾薑

白芥子

草麻子

以上各

四兩

血餘

八

兩

右八味共入桐

油熬至藥枯髮消。滴水成珠。濾去渣入牛皮膏四兩烊化。用前製過松香漸漸收之離火。加樟腦一兩。好麝香

三錢。厚紙攤之。貼患處神效。

九製松香膏。名九汁膏。上好片松香三觔。用清水煮
烊。拉拔過傾去水。再換水煮。再拉拔換水如此。以十徧
爲度。將松香研末。用薑汁。葱汁。白鳳仙汁。燒酒。開楊花
汁。商陸根汁。韭菜汁。童便。挨次將松香拌。浸透曬乾。作
八次製過。其第九次。將好醋少許不可多。再拌松香曬
乾研極細末。川烏。草烏。蒼朮。上肉桂。白芥
子。乾薑。草麻子以上各四兩。血餘八兩。另用桐油三觔。
浸藥春五夏三秋七冬十日。熬枯瀘去渣再熬。先入廣
膠四兩。俟溶化後。將製過松香末。篩入收之離火。入樟
冰一兩。待冷入麝香二錢。攬勻收貯。摊貼神效。

見眞膏。專治風寒濕氣，骨節疼痛，歷節痛，風癩痺，麻木不仁，鶴膝風，偏頭風，漏肩風等症。並治跌撲閃剄等傷陰症，無名腫毒，已破爛者勿貼。小兒孕婦勿貼。

活短頭髮

曬乾二兩用壯年入荆下者

大黃

靈仙

雄鼠糞

各一兩

川烏

草烏

劉寄奴

各八錢

土鱉虫

大者三十個

羌活

獨

活

紅花

蛇牀子

蒼术

當歸

生南星

生半

夏

白芥子

各五錢

右十八味俱切碎

樟水

一
兩

甘松

山奈

花椒

豬牙皂

山甲

炙草撥

沒

藥

以上各三錢不必去油同乳香炙熱

同衆藥研細

乳香

五錢

白芷

五錢

右十味

研極細末

鮮鮮煙葉汁

一筋松香

六

鮮鮮商陸根汁

兩收曬乾

一

筋松香

六

鮮鮮商陸根汁

一 劍松香

鮮鮮閹羊花汁

半劍松香

鮮鮮艾葉汁

半劍松香

三兩收

白鳳仙花汁

半劍松香

老生薑汁

半劍松香

葱汁

半劍松香

韭汁

半劍松香

大蒜汁

四兩松香

用足秤。

秤麻油二觔四兩先將頭髮入油熬半炷香再將前藥入油熬至焦黃色不可太枯卽濾去渣入前松香熬化再將絲綿濾去渣再熬至油面起桃花紋先加入極細蜜陀僧四兩再徐徐加入好西硫黃末一觔投此二味時務湏慢慢灑入不可太多太驟以滴水成珠離火待溫然後摻入細藥攪勻磁器收貯熬時湏用桑枝不住手攬青布攤貼每張淨藥重四錢臨時加肉桂末五

釐。細辛末二釐。

集寶療瘧膏。

川烏 草烏 南星 半夏 當歸

紅花 羌活 獨活 大黃 壽仁

各四錢

山甲

一兩

白芷

五錢 肉桂

一兩

麻油

一觔

汁碗

薑汁

一碗

松香

一觔

陀僧

二兩

硫黃

半觔

右收煎好加乳香沒藥血竭胡椒樟冰細辛牙皂

各二錢

希

末各二錢若加商陸根鳳仙閼楊花鮮烟葉鮮蒜鮮希
希等汁更妙。

摩腰膏。治老人虛人腰痛婦人帶下清水不臭者虛寒

者宜之。

附子

川烏 南星

各二錢

川椒

雄黃

樟腦

丁香

各一錢

乾薑

一錢半

麝香

一分

右爲末蜜丸彈子

大用生薑自然汁化開如糜。蘸手掌上烘熱。摩腰中痛處。卽以緩帛紮之。少頃其熱如火。每日飯後用一丸。

摩風膏。治風毒攻注筋骨疼痛。

草麻子

淨肉研一兩

川

鳥頭

生去皮五錢半研

乳香一錢

右以豬油研成膏。烘熱塗患處。以手心摩之。覺熱如火效。

治寒濕氣方。

真白芥子研爛。陳窖醋調攤厚雙皮紙

上做夾紙膏。以針密密刺孔。先將新棉花薄薄鋪一層。放在患處。然後將夾膏貼在棉花上。片時卽似火燃熱過。卽揭去。棉花以薄爲妙。此膏不可預製。須要臨時

調合。攤就卽貼。

針灸

雷火針。治風寒濕毒留住經絡。痛腫不散者。

蒼耳

子肉

去油乳香

沒藥

各三錢

羌活

川烏

穿山甲

炒丁土

香

麝香

茯苓

豬苓

黑附子

澤瀉

大茴香

白芷

獨活

廣木香

肉桂

各一錢

右共研細末

和。先將斬艾採綿用紙二層鋪於上。捍薄以藥末摻上。要極密外用烏金紙捲緊粘固兩頭。用線紮緊。用時以手捺患處。用墨點記。將針在火上燒著。用紅布二三層鋪於痛處針之。

又

蘇艾

一兩搓成絨

辰砂

二錢

乳香

沒藥

雄黃

菟樹

皮 川烏 草烏 硫黃 山甲各一錢 麝香五分 右爲

細末。作針。按穴針之。忌尻諸神值日。

三氣合痺針。 乳香 沒藥 牙皂 羌活 獨活

川烏 草烏 白芷 細辛各五分 肉桂 蒼朮 雄黃

硫黃 山甲 檀冰各一錢 麝香三分 艾絨半兩 作針

百發神針。 治偏正頭風。漏肩。鶴膝。寒溼氣。半身不遂。手足癱瘓。痞塊。腰疼。小腸。疝氣。痘疽。發背。對口。痰核。初起。不破爛。俱可用。各按穴針之。

乳香 沒藥 生川

附子 血竭 川烏 草烏 檀香末 檀香末 大

貝母 麝香各三錢 母丁香四十粒淨斷艾綿二兩 或作針

消癬神火針。

蜈蚣一條

木鱉

五靈脂

雄黃

乳香

沒藥 阿魏

三稜 蓬术

甘草

皮硝

各一錢

羊花 硫黃 山甲 牙皂

各二錢

麝香

三錢

甘遂

五錢

二兩作針

陰症散毒針。

乳香 沒藥

羌活

獨活

川烏

草烏

白芷

細辛

牙皂

各五錢

硫黃

山甲

大貝

五靈脂

肉桂

雄黃

各一分

蟾酥

三錢

麝香

三分

艾絨

半兩作針

香硫餅。

治寒溼氣。

麝香

二錢

辰砂

四錢

硼砂

二錢

細辛

四錢

以上俱爲細末

角刺二錢 川烏尖二味俱用

酒半觔煮乾爲末

硫黃四錢

酒半觔煮乾爲末

硫黃四錢

酒半觔煮乾爲末

硫黃四錢

右先用硫黃角刺。川烏入銅杓內。火上化開。再入前四味末攬勻。潑在乾淨土地上。候冷取起打碎。成黃豆大。用時以乾麪捏成錢大。比錢薄些。先放在患處。置藥一塊在上。以香火點著。連灸三火即愈。

蒸法 治腿膝疼痛。風寒溼三氣傷於足膝。名爲足痺。

川椒一把 葱三大莖 鹽一升 小麥麩麵四五升 右用醋和溼潤

得所炒令極熱。攤臥褥下。將所患腿脚就臥薰蒸。薄衣被蓋得汙出。約半個時辰。

待一兩個時辰。覺汙稍解。勿令見風立效。

腰寒溼痺痛。麻木不仁妙方。

川烏 草烏 草撥

甘松

山奈

各五錢

右爲末炒熱布包熨痛處神效。

熨背法。

治胸背疼痛而悶。因風寒溼而起者。

肉桂

心附子

羌活

烏頭

細辛

川椒

各一錢半

川芎

一錢

右共爲細末。以帛包之。微火炙。令暖。以熨背上取瘥止。

黃疸

治疸神飲。

將茵陳草煎濃湯。每日以多吃數爲妙。要

忌暈腥魚肉。并忌鹽味。而淡食則能速愈。此草真治疸

神藥也。若腹中不快。量加神麴麥芽同煎服之。更無他

藥功能勝此者。若小便不利。或以車前子湯同吃。或用

瓜蔞根打汁碗許服。連服更效。

劄黃疸方。

雄鯽魚

一個去頭骨止
用背上肉兩塊 胡椒每歲一粒至

麝香

三分

右二味同春燭，麝香另加不必同春，恐粘染

臼上。將蛤蜊壳填滿合於病人臍上。用絹縛緊。一日夜

即愈。

河白

治河白良方。

將梔子黃同雞子白飛麪搗成餅貼臍

內再以

茵陳草

通草

甘草

燈草

煎湯服之。

名四草湯。

中暑霍亂

治中暑昏眩煩悶欲絕急救方。

取田中乾泥嵌一圈。

堆在病人肚上。使少壯人撒尿於泥圈肚臍中。片時即得生矣。甦後不可飲冷湯。湏進溫米湯。

又 挖地深三尺。取新汲水。傾入坑內。攬濁飲數甌。即愈。

治中暑法。

用大蒜一握。同新黃土研爛。以新汲水和之。瀘去渣。灌入即活。凡中暑傷暑。不可便與冷物。俟稍甦方可投冷物。則中氣運動無患也。

治傷暑霍亂神方。

絲瓜葉一
片白霜梅肉一枚并

核中仁

右同研極爛。將新汲水調服。入口立瘥。切不可卽飲熱湯。

又 取柏葉搗汁一碗飲之立愈。

治傷暑急暴霍亂吐瀉方。

陳皮

藿香

各五錢

右用

土澄清水二杯煎一杯服之立愈。

急救霍亂吐瀉抽筋危症方。

不問轉筋霍亂令人僵

臥將膝下腕內以手蘸溫水輕輕急拍。直待紫紅筋現
起用磁鋒刺出血立愈。此名委中穴在膝後對面。

治乾霍亂煎方。上不得吐。下不得瀉。身出冷汗。危在頃

刻者。

食鹽

一兩
五錢
兩
薑切片

同炒變色。以水一大碗煎

服。吐出自愈。不可熱服。好後切不可邊吃飯食。俟餓極
後方可吃稀粥。

治乾霍亂方。只一樣腹痛。絞痛不可忍者。切不可吃藥。并熱湯水。一吃卽死。將冷水一碗。調入食鹽二三錢。吃下。吐則再吃。多吃多吐。則邪散而愈。

消渴

玉泉散。治消渴之神藥也。

白粉甘葛 天花粉

麥冬 生地 五味子 甘草 糯米 右服一劑

還津丸。生津止渴。

霜梅

烏梅各二十五個。但去核。蘇薄荷

末兩冰片一分硼砂一錢五釐砲砂五分

共研極細爲丸。每含一丸。

津液立止。

消渴潤燥方。

白蜜

人乳酥各一

右溶化一處。每

日不拘時服。

消渴方。用繅絲湯飲之。

瘟疫

辟瘟丹方。

此藥燒之能令瘟疫不染。空房內燒之可辟

穢惡。

乳香 蒼术 細辛 川芎 甘草 檀香

各一兩

再加檀香一兩亦可。共研細末。棗肉爲丸。如芡

實大。

神聖辟瘟丹。

蒼术爲君倍用 羌活

獨活

白芷

香附

大黃

甘松 山奈 赤箭 雄黃

各分

右爲末

麵糊丸。如彈子大。黃丹爲衣。曬乾焚之。

治大頭瘧方。

頭面腮際。腫脹極大。寒熱交作。甚者崩裂。

出膿不可敷藥。恐邪氣入內。以至於死。

人中白

即馬

桶底下尿垢也

火煅研末。每服二錢。白滾湯調服。

又

將好青黛末。白滾水調服二錢。

又

只用馬藍頭一把搗汁。將鷺毛搽上。一日五六次。

熱氣頓出。親驗真神方也。

治抱頭火丹。

卽大頭瘧。

將扁柏葉搗爛。用雞子清

調敷神效。

治鷄頭瘧方。

兩腮脹脹。憎寒惡熱者。

外用赤荳半

升爲末。水調敷。或用側柏葉搗爛敷之。內用薄荷濃湯

卷之三
熱服。

痧

治痧脹腹痛方。凡痧脹。夏月多患此症。面色紫赤。腹痛難忍。使飲熱湯便不可救。卽溫湯亦忌。如遇此症。速取生黃豆。咀嚼嚥下。約至數口。立刻止痛。平人食生荳。最引惡心。止有痧脹人食之。反覺甘甜。不知腥氣。此方既可療病。且可辨症。真奇方也。

沉香鬱金散

治痧氣寒凝。以及腹痛。

沉香

木香

鬱金

各一錢

烏藥

三錢

樟香

二錢

細辛

五錢

右忌見火。

生研

爲細末。每服三分。將砂仁湯稍冷送下。

痧藥方。名火龍丹。

牛黃一錢麝香二錢冰片二錢硃砂二兩

飛草撥一錢真金箔一百張雄黃三兩火鎗硝一兩硼砂五錢牙

皂一錢各研極細端午午時合如痧脹腹痛將此藥嗅鼻中并放舌尖上吃下亦可

又名蟾酥丸。

雄黃三錢麝香分木香一錢丁香一錢以上俱不

見蒼朮

三錢

蟾酥一錢

石菖蒲一錢

炒山茱萸一錢

右共爲

末火酒化蟾酥爲丸如粟米大硃砂爲衣如雞丸少加米飲每用二三丸放舌尖上化下加入西牛黃金箔端午日午時合尤妙。

又

沉香

銚研細

母丁香

硃砂水

飛雄黃五錢

以上各廣木香

各廣木香

一
兩 麝香

三
錢 茅山蒼术

米泔浸去毛
淨末二兩

真蟾酥

三
錢 右俱忌

見火爲細末各稱准分量。將火酒化蟾酥爲丸。如丸不

就。少加米飲。丸如粟米大。每服二三丸。放舌尖上化下。

神妙痧藥方。

北細辛

三
兩 荆芥

六
錢 桂香末

二
錢 鬱金

一
錢

一
錢

右共爲末。每用一茶匙放舌上。冷茶送下。或津唾嚥下。

白痧藥方。

白胡椒

一
兩 牙皂

一
錢 火硝

檀香末

明礬

各五

金箔量加。

瘰癧

內消瘰癧毒方。未穿破者爲痰核。已穿破者爲瘰癧。

三五個連者爲瘧串。

用羊角數對。以威靈仙四兩。

共入瓦罐內。加清水煮數沸。候角軟取出切薄片。用新瓦燒紅。將角鋪上。焙炒過研細。每灰一兩。加廣木香一錢。白芥子三錢。共爲末。煉蜜爲丸。用梔榔煎湯下。或夏枯草湯下亦可。服至七日後。大便下如黑羊屎。小便出黑水自消。婦人如爛開兩脇。服之亦效。忌生冷。煎炒房事。

內消瘰癧應驗方。

土貝母

白芷各五錢

共爲末。糖

霜調陳酒下三錢。重者三服愈。

治癰核方。半夏末。川貝末。各一分。用雞蛋大頭穿一

孔。不破內膜。入藥在壳內膜外虛空處。如虛人。再加人參末三分和入。以紙封固。置飯鍋內蒸熟吃之。每日一個久之自愈。

又 每雞子一個。入貝母末三匙。照上法蒸熟。夏枯草湯。或銀花湯下。

取癰核法。名提癰丹。

水銀 硼砂 火硝 明礬

皂礬 食鹽各一兩 硼砂二錢 用粗瓦盆放前藥上。合粗碗一隻。鹽泥封固。炭火煉三炷香。先文後武。冷定取出。昇在粗碗上藥。白米飯搗丸。菉荳大。硼砂爲衣。每用一丸。放瘡上。棉紙封二三層。一日夜急揭起。則核隨紙帶

出丸可再用。

治瘰癧方。好胡蘆一枚。劈做兩半。將一半挖去肉。以蟬脫塞實對合。用山泥包好。煅存性。研細陳酒下。每日服一枚。一月愈。

治療癰結核。

九真藤即何首烏藤

洗淨。日日生嚼。并取葉

搗塗之。

蝙蝠散。

治療癰多年不瘥。

蝙蝠一個。貓頭一個。

右同

燒作灰。撒上黑豆。煅其灰骨化碎爲細末。濕即乾。摻乾則油調敷。內服五香連翹湯效。

治瘻核瘰癧方。

用鼠糞揀兩頭尖者爲雄。兩頭圓者

爲雌。揀開各曬乾研末。男用雌。女用雄。將雞子一個。頂上打一小洞。傾去白。但存黃。入鼠糞在內。以滿爲度。攬勻用皮紙封固小洞。飯上蒸熟去壳。臨睡時搓碎。好酒送下。隔一日再服。雖遠年破爛者。不過三四枚而愈。未破者卽消。

燕鼠膏。治療癰瘍核。瘡疽發背腫毒。

全蝎

熱水浸透洗三

山甲

久曬乾淨二兩

白芷

黃連

黃柏

黃芩

當歸

各一兩

生地

赤芍

各五錢

官桂

二兩五錢

海藻

二兩三錢

番木

五錢切碎

用麻油

一觔四兩

浸藥五日

熬焦黑色去渣

將淨油秤準每油二兩

用飛淨黃丹一兩

收滴水不散

先入白占一錢五分。黃占三錢。即下黃丹。再下杭粉一
兩。用桑枝不住手攬成膏。候冷入水浸三四日。再用文
火溶化。再入

沒藥

三錢去油

阿魏

三錢麝香一錢

血竭

二錢朝

南燕窩泥

五錢雄黃一錢

硃砂一錢

兩頭尖

七錢

白昇丹

四錢

以

上各藥爲極細末。入膏內攬極勻。用時隔湯溶化。攤貼。
勿見火。

白昇藥方。

水銀

皇礮

火硝

白礮

炒熟鹽。共研極細。照昇三白頭法昇之。

治療癰敷藥方。瘡已破膿。正多瘡正腫。用此敷之。呼膿

退腫。

蚯蚓糞

韭菜地者佳

細芽茶

炒灰存性

肥皂核

獨活者存性

瓦上壁虎

焙乾存性

蜣螂虫

用泥包生存性

壁虎

瓦上焙乾存性

猫頭骨

炙存性

雄鼠糞

焙存性

右各

等分共爲細末。和生麻油調敷。每日清晨用藥湯洗淨。
敷之。一日洗五六次。敷五六次。待膿乾卽用膏藥貼之。
敷瘻核癧癰方。

生南星

生半夏

各三錢

海藻

昆布

各二錢

麝香

冰片

各二分

紅花

牡蠣

各二錢

青鹽

六分

右

俱生研極細末。另將白芨兩許切片煎膏。和前藥做成

挺子曬乾用時磨敷。

又

生南星

生半夏

生大黃

各一兩

大貝母

昆布

海藻

海浮石

銅綠

明礬

各五錢

右用商陸根汁。

葱汁薑汁蜜四味調敷。

又

用鉛三兩。鐵器中熬久。當有腳如黑灰。取此灰和。

脂塗癰上。或用醋調塗。以舊帛貼之。數換舊帛拭去惡汁。又貼如此半月許。不痛不破。不作瘡。內消爲水而愈。大紅膏。治痰核瘰癧。不分新久。未穿破者。南星二兩

銀硃

血竭

消石

潮腦

各三錢

輕粉

乳香

各二錢

猫頭骨

一具

石灰

一兩

大黃

五錢切片同石灰炒

紅色去大黃不用

右共爲

末陳醋熬稠。調藥敷核。三日一換。敷後繕皮。核不消者。

另換紫霞膏貼之。其核自消。

痰核瘰癧膏。治未穿破者。貼之即消。

猫頭骨牙爪

一付

火煅存性

蟻蟬虫

炙磁石

醋煅各五錢

乳香

沒藥去油各一錢

生明礬

五錢入雄豬腳爪壳內煅存性

海藻

一兩

大貝母

一兩

草麻子肉

五錢

用麻油四兩。同上海貝麻三味。熬至滴水不散。濾去渣。入乳沒。再熬。將稠離火。乘滾入貓頭。蟻薌。磁石。飛礬。攪勻。燉冷。水中出火氣。乘軟取起。打條。臨用攤貼。凡去渣後。入細藥時。仍用青州丹。少加松香黃蠟看。老嫩得宜。方入貓頭等末。始易成膏。如已穿破。再取客廁梁上塵加入。

治痰核癰瘡立消膏。五臺頭草汁四五碗。煎至數十滾。用松香半觔。收乾汁水。用麻油四兩。煎熬滴水成珠。松香收油成膏。用草麻子肉三兩。干搗成膏。要紅加銀硃。要綠加銅青。要黃加雄黃。各一兩。再五臺頭草收入。

瓶內作爛去渣取汁亦妙

癩癰收口藥方。

龜版

煅過埋地中四十九日
如要緊埋七日亦可

青黛

陰乾

煅右同研細末收口神效

瘧

治三日大瘧神妙方。

用活大烏龜一個連壳左右肩

上各攢一孔近尾處亦攢一孔以明雄黃九錢研細每孔摻入三錢外以磁黃泥包固勿令泄氣炭火上煅存性研細每服准一錢空心陳酒送下二三服即止

又用陳香圓一個去頂皮大者每隻加透明雄黃三錢中者二錢小者一錢雄黃須研細摻入香圓內炭火

中煅存性。再研極細。每服七分。用軟腐衣分作六七包。
乾咽下。此日不可吃湯水。任其嘔去。頑痰即愈。

截瘧丹。

斑猫 巴豆肉

硃砂各一錢

麝香二分

雄黃一錢

五分蟾酥

右用黑棗二三個搗丸如棗莢大貼眉心

穴一周時揭下投長流水中。

又 只聞香氣不必煎食亦可愈瘧。

常山

草菓

川烏

草烏

陳皮

甘草各一錢

右將絹袋盛貯聞

於鼻間即止。

貼臍截瘧丸。

胡椒

雄精

右二味等分研末。將飯

研爛爲丸。如桐子大。外以珠砂爲衣。將一丸放在臍中。

外以膏藥貼上。瘡即止。親驗。

治諸瘡代參丸。

白术

一觔
土蒸

生薑

一觔
白术渣

搗出汁
曬乾

搗出汁
揉

右爲末。將黑棗一觔。煮爛去皮核爲丸。

治瘡方。虛寒瘡更效。孕婦忌貼。

桂心

一分
麝香

二分
川

椒粒

七
雄黃

七
釐

共研極細末。納臍中外。以膏藥貼之。

桂心

一分
麝香

二分
釐

二分
川

治不論雙單瘡方。用大荸薺。將好燒酒。自春浸至秋
間。如瘡至不貪飲食。食則脹滿不下者。每口服荸薺兩
個。三日即愈。

泄瀉

治老幼脾瀉久不愈神方。

飯鍋杷

四兩
淨末

蓮肉

四兩
心淨
未去

白糖四兩

右共和勻。每服三五匙。一日三次食遠服。

止久瀉丸。

治一切久瀉。諸藥無效。服此一服自愈。

黃丹飛過

枯礬

黃蠟各兩

一石

榴皮

入錢炒

將蠟溶化。

小銅

杓內再以丹礬二味細末投入乘熱爲丸如豆大空心

服五丸。紅痢清茶下。白痢薑湯下。

治白瀉不止神效方。

乾飯鍋粑

二兩

松花

二兩

臘肉骨

研末存性炒

頭五錢

共爲末砂糖調。

不拘時服即止。

治脾泄方。

陳火腿骨

研末存性

紅麴

松花

右三味

各等分砂糖調。

陳酒送下。

痢

治痢初起法。

不問男婦室女。姪娠小兒。皆能治之。無有

不效。

白蘆薈二三觔。洗淨連皮放石臼內搗碎。絞

取濃汁。如十歲以內小兒。每日吃一飯碗。大人每日吃

二三飯碗。俱要冷吃。不必見火。忌葷腥雜味。併治疫痢

如神。

又

水晶糖四兩。如赤痢用濃苦茶一杯。白痢用薑汁一杯。赤白兼痢用濃茶薑汁各半杯。將水晶糖入內燉
烊服。見糞即愈。吃至二服無不見效。親驗。

治噤口痢。此係元氣虛極者。

人參

錢

石蓮肉

炒二錢

黃連一錢。鮮荷葉一片。老黃米一撮。

水二鍾煎六分。入木香

未三分和勻服。積未淨者加山楂二錢。枳榔枳壳各七分。

又米粒不下百藥不效者。

用五穀蟲焙乾爲末每

服二三錢米湯下。

又不能飲食者。

用烏梅肉和蟶蟶搗爛成丸含口

內片時卽能飲食。烏梅渣不宜嚥下。

又

蒼朮 甘草 陳皮 厚朴

右各等分爲粗末。

用布包之放在肚上將熨斗盛火熨布上逼藥氣入腹。病者覺腹中爽快卽將藥放枕頭下以受藥氣一日連熨三四五次痛痢漸止口中卽飲食矣。

治赤白痢并水瀉

車前子

炒

紅麴

炒

赤石脂

滑石

右各等分爲末。砂糖調。每服三錢。滾水送下。一服即效。

治赤白痢。不論初起久痢俱可用。柿餅一個開一

口。入白蠟三分在內。將紙包好紮住。以水溼透紙。放在灰火中。煨熟食之。大人兩個。小兒一個。即愈。

治赤痢。木耳灰。槐米灰。紅麴灰。砂糖調空心服。

治赤痢久不愈者。初起者宜先服通利清溼熱之藥幾劑。然後用此方。用鮮紅菱連壳搗爛。絞自然汁。

一飯碗露一宿。加白糖霜少許。隔湯燉略溫。清晨空心服。每日一服。兩三服必愈。加糖者恐其味濁也。如不畏濁。即可不加。

香參丸 治痢極效。百發百中之藥也。

木香四兩苦參四兩

酒炒六兩 右爲末。將甘草一筋熬膏。丸桐子大。每服三錢。白痢薑湯下。紅痢甘草湯下。噤口痢砂仁蓮肉湯下。水

瀉豬苓澤瀉湯下。

治久痢如神。用刀荳莢。飯上蒸熟。洋糖蘸食。二日即愈。

又 陳火腿骨

燉存性四錢

黃連

薑汁炒一錢

砂糖

炒乾四錢

烏梅肉

右共爲末。將烏梅煮爛搗丸。每服三四十丸。空心

分五黃米湯下。

治久痢虛滑不禁。可以實腸。裏急後重腹痛者不可服。

用臭椿樹皮根切碎酒拌炒爲細末。用眞阿膠水

化開和爲丸。如桐子大。每服三五十丸。空心米湯下。

治久痢。初起者不可服。

松花

三錢地榆二錢

乾荷葉二錢

臭椿樹根皮

一兩取向東南者去外粗皮

右爲細末。白痢紅糖調

紅痢蜜調。紅白相兼蜜與糖調。加溫水少許。每服二錢。

忌麵食葷腥油膩等物。

又

烏梅

四個煅略存性

白滑石

淘淨

臭椿樹根皮

一錢土者剝淨

兩取在

皮曬乾爲末

右用陳米飯搗爲丸。每服四五十九。空心米

湯下。

治痢方。不拘赤白泄瀉。痢至八九年者。三四服卽愈。

香菇二十兩 蕃香十兩 蘇葉七兩 木瓜五兩 檀香二兩 木香二兩

赤芩五兩 甘草一兩 厚朴五錢 枳壳五兩 右爲末蜜丸彈子

大約重二錢。每服一丸。白痢淡薑湯下。紅痢木香湯下。

其餘開水下。

治久瀉久痢方。

陳石榴皮酸者焙乾研細末。每服三

錢。米飲湯下。患二三年。或二三月。百方不效者。服之卽止。不可輕忽。

治休息久痢。但痢而後無重痛者。用壯大豬小腸一條。不落水。將箸頂翻。轉出腸中油膩穢濁刮下。但將刮下之物。在瓦上炙焦乾。存性研末。用砂糖少許。空心調服一條。腸垢大者分作二服。小者只作一服。若翻轉腸內有糞。先去其糞。但刮其近腸之血膩油垢炙用。重者吃兩三條。腸垢必愈。

治赤白久痢。腹中不痛者。

桂圓七個。粟壳七個。荔枝七個。

建蓮去心七粒。水二碗。煎八分。空心服。朝服可以一日晚

服。可以一夜不痢。親驗良方。

治毒痢方。下膿血者是。金銀花一兩。煎湯送。香連

丸三錢。

脫肛

潤腸散。治痢後脫肛。

鱉頭灰

五倍末。伏龍肝

生礪末。赤石脂

訶子肉

各五錢俱曬乾

右爲極細末。

葱湯洗淨摻於腸頭上。頻頻攤之以愈爲度。

治脫肛方。名棓礪煎。

五棓子

三錢白礪少許

右爲末。

水一碗。煎湯洗之立效。若婦人產後脫肛。五棓子末摻之。

縮肛散。

鱉頭

煅

枯礪

分五棓子分

煅三

共研極細

摻之。

又用爬牆草煎湯溫洗。浸肛隨浸隨縮上。此草地
上生根。一路沿牆而上者。但有二種。一種葉大似絲瓜
葉者。不可用。須小葉如茶匙樣光亮者。

痔漏

縮痔秘方。

內痔落下。

用大團魚頭一個。火蝦爲末。

搽痔上。卽刻收進。親驗。

治外痔疼痛坐臥不得者。

大田螺入九個。將針挑開

醫蓋。入冰片白礬末少許在內。以螺尖埋土中。令其蓋
仰上。經一宿取螺水。以雞毛搭痔上。六七次卽消愈。

薰洗痔方。

五棓子

三四個皮硝一撮

水二碗煎濃。先薰

先後洗二二次卽愈絕妙。

治痔漏丹方。名長明酒。用積年舊琉璃燈洗淨油膩火煅研細以紅酒服四錢不過七日其管自去。

點痔方。

銀硃錢大雄黑背蜒蟠三條

共搗爛用鹽泥

封固作糰要畱一孔火昇煙盡爲度取出用田螺水調搽卽縮上不用銀硃將上好黃丹拌之亦效。

又

蜒蟠一條

冰片五釐

膽礬二釐

和化蜒蟠水點之。

止痔下血方。

蜒蟠一條

用鹽泥裹硼砂一錢

煨通紅去泥用硼砂

硃砂

雄

黃冰片共爲極細末入龍骨少許更妙大便時乘其脫出以細草紙盛藥少許託之使入大效。

治痔漏方。

新象牙屑二觔爲末。每早用熟雞子三個。

將牙末和吃。或入稀粥內吃亦可。服盡一料自愈。

又

露蜂房

一大個每孔入鹽填滿煅存性

殼蠶

二錢

木香

各三錢

象牙末

猪胰油

打爛豬懸蹄蜜炙各五錢

白頸蚯蚓

用石壓去血陰

陽瓦焙乾淨末一錢

右共爲細末。用黃占半觔。溶化將藥漸入

搗勻爲丸。如棗核大。每服一丸。心好酒送下。連服三

丸。瘡口自消。隔一日第五日再服一丸。第七日再服一

丸。痔管自退出矣。將玉簪花根三段。三日搗爛搽上。自愈。

又名蛭蟾丹。

螞蝗

十數條將黃泥做成小管如筆管大入螞蝗在內上以磁黃泥

塗護之以鐵絲捆緊外再以鹽泥封固炭火燶以煙盡爲度取出去火毒爲未貳錢蟾酥一錢熊胆

八分麝香五分冰片三分

看漏淺深用飯粒爲條插入盡頭。

久者五六條近者二三條其管化爲膿水用洗藥洗

方 烏柏樹根皮 枸杞根皮 槐花 五味子

水楊樹桿鬚 瓦花 黃柏 荔枝草 右煎湯 大

鍋先薰後洗再以十寶丹收口。十寶丹方 龍骨

入象皮七分琥珀六分血竭五分黃丹五分冰片四分珍珠二分牛

黃二分乳香 没藥各一錢三分共爲細末收貯聽用。

痔漏退管方

象牙末二分人腳指甲炙五分牛骨腮炙一

兩

牛骨腮炙一

豬腳格炙一兩 刺猬皮鍋內蜜滾炙乾

右爲末再將地榆槐

角二味。入豬臟內。煮熟搗爛。共搗蜜丸。每服三錢。
空心滾湯送下。其管自出。半月即愈。

又 白鵝糞一升。放罐內以滾水冲入罐中。乘熱病人
坐於罐口上薰之。其管自落。數日即收口。要坐久忍痛。
又 用豬臟頭水煮爛。或鹽或醬油蘸吃。每日吃一個。
吃至二三百個必愈。若脾胃畏油膩者。只吃近肛門處
管一段亦可。再每日切荸薺蒂一片。吃數片。二物常兼
吃更妙。

又

金餘卽人手指甲 銀餘卽人腳指甲

二味不計

分量均在黃沙內炒脆。眞血餘

兩血珀

五錢

黃牛角腮

火煅

四兩羊角腮

火煅

四兩新象牙屑

烘三

豬懸蹄壳火煅四兩蟹爪尖炒一兩蟶螂虫瓦上煅十九個刺蝟皮

二張刮去毛黃沙內炒

陳松蘿茶葉烘三兩

先用醋炒再槐

穿山甲用酒炒四兩

角子炒兩

青黛用水淘淨五錢

地榆兩

以上十六味如法

煅練爲細末。用黃犬大腸煮爛加煉老白蜜爲丸。如無犬腸以豬臘代之亦可。空心淡鹽湯送下三錢。壯盛者加。或至五錢。虛人桂圓湯下。

痔漏插藥方。

百草霜

黃連

各二錢半冰片分

麝香二錢

蟬虫

旱蓮草頭

五錢炒

螞蝗十五條瓦上焙焦

共爲細末。

丸如粟米大。入管口自進藥。三日後待管自化出。用長

肉收功末藥。

收功末藥方。

輕粉

乳香

麝香

韶粉 東丹

血竭 共爲末摻之。

又 雄大蟻螂。不拘多少。陰乾生研。加冰片少許。將綿紙燃作條。用白芨水蘸溼。曬乾待硬。再蘸溼染藥末於紙條上。量漏孔淺深。插入漸漸生肉。其條自然退出。用剪刀剪去外一段。即滿醫矣。

治痔漏丸方。

刺蝟皮

大者一張小者二張
新瓦上炙脆爲末

象牙屑

一兩

荳蔻粉

一兩

青黛

三錢

槐花末

一兩

陳細茶

五錢

右共爲

末。用陳四糙米煮爛飯。和藥打爲丸。每服三錢。金銀花湯送下。一料不效。二料永不再發。

治多年頑漏神驗方。

用大腳魚一個。再取上好冰片

三錢鍾乳石五錢俱研極細末。放入腳魚口內。放完將腳魚扣住腳倒掛三四日。待腳魚頭腫大。取快刀殺下頭來。用陰陽瓦兩塊對合。將魚頭裝入瓦內。放炭火上。兩頭將鹽泥封固。瓦上留一小孔出煙。待煙稍盡存性。將小孔封固。拿至地上。俟冷打開研細。用四五分好酒送下。病重者兩三服。其管自出。再用長肉藥收功。

治漏疾秘方。
香菜油一觔。以三十歲婦人血餘二兩。入油內熬煎去渣。每日用油一鍾。煎雞子三枚。將象牙細末三錢摻在內。淡吃連吃三五日。或將元米粉。摻象牙屑攤餅吃亦可。象牙末吃至一二觔。再無不效。此法

不用刀針掛線。有管自然退出。屢試屢驗。象牙要真更
要新而雪白者。鎊碎再用。乳鉢細研。

腸風

治腸風下血丸方

槐花

二兩一半炒半曬爲末

柿餅

七個去蒂烏梅

十四個

共打爲丸。桐子大。每日空心滾湯送下。卽愈。

又 末藥方。

扁柏葉

一觔蜜浸宿曬乾爲末

青州柿餅

一觔炭火煅過

末爲 右二味拌勻。每服五錢。空心陳酒送下。極重者。五六服可除根。

治血痔腸風方。

將龜肉煮爛吃一碗。血卽止。其效如神。

治腸風并痔漏。

木耳一觔。煮成膏。再入豬肉三觔。煮。

熟食盡卽愈漏管自出

治痔瘡下血方。

棉子仁

四兩曬乾去油生研

青州柿餅

十二兩蒸搗爛

百草霜

四兩

烏梅肉

四兩蒸爛

共搗爲丸每服三錢白滾湯

下或腐漿加青黛少許下更妙

治腸風下血方。

青州柿餅

三個大蝦地榆

槐米

各炒五錢

共研末分七服空心開水調服忌燒酒椒蒜芥

又

當歸身

一兩

懷生地

一兩

竹刀切片烘脆黃肉

一兩

眞阿膠

一兩

膏二兩研碎和炒成珠去石膏不用候冷研爲細末

棉子仁一筋燎去外面花衣

粒爆開并至真柿霜

卽柿餅上白霜也但假者甚多入

焦黑色存性

藥研末後方和入

右逐味炒焦要如墨色又各要存性共研

爲細末。和入柿霜拌勻。每日空心服藥末四錢。白滾湯一飯碗。沖和將筋調末。卽半浮半沉。連湯飲下。若下血太甚。臨晚再服三錢。俟糞色變黑。血漸止矣。忌食胡椒燒酒辛熱之物。有此病者。終身宜戒。此方修合之法。不過極細極黑四字。則藥末浹洽於臟府。所以要黑者。血遇黑而止。以水尅火五行之理也。

治腸風。

臭椿樹根皮

四兩紮爲一大把

大茴香

一大粒

木耳

四兩

以雄豬肚子一個。將藥俱裝入肚內。紎好煮爛去椿皮。

但吃木耳肚子。連湯吃完。重者兩料必愈。

治腸風久不愈者。

臭椿樹根皮

烏梅

共煎陳酒

沖服卽愈。

治腸風。青州柿餅一個。內放白蠟一錢。飯鍋上蒸熟。食數次愈。

治大便下膿血。卽日夜數次。數年久病皆愈。

雄豬

大臟一條。洗淨。桂圓肉二兩。鮮鮮白扁豆花四兩。將二味同打爛。用白糯米拌和。裝入臟內。兩頭紮住。砂鍋內燒爛。忌見鐵器。然後將人中白朮脆研末。蘸吃。或醬油蘸吃亦可。不論吃粥吃飯。空口皆可吃。吃四五條。卽愈。

治大便下血。荸薺搗汁半鍾。將好酒半鍾冲入。空心溫服。三日卽愈。

治大便下血。用涼藥不效者。
用歸脾湯加槐花黃芩。
治之自愈。

治大便下血虛弱者。
旱蓮草陰乾爲末。以槐花煎湯
調炒米粉。糊丸桐子大。每日服五錢。以人參五分。煎湯
下二服即愈。

溺血

治溺血者。
不痛而小便出血也。痛者爲血淋。
用頭髮燒灰研末。每服三錢。空心滾酒調下。或用百草
霜酒調服。或用伏龍肝。白溪湯調下。夏月水調。痛者用
車前草絞取濃汁碗許。入糖霜一二匙。燉溫服之。此可

多服自愈。初痛時用韭汁亦好。或將亂髮灰糊丸桐子大。每服七十九空心開水下。

治男子莖中痛。及婦人血結腹痛。取牛膝一大握。酒煮飲之立愈。

治小便下血。用清利不效者。用補中益氣湯。加車前子治之自愈。

治小便下血立效。旱蓮草。車前子各等分。將二味搗自然汁。每日空心服一茶杯。