T7903/1383(30)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 24 1958

古方婦人

景岳全書

六十一

會稽　張介賓　會卿著
會稽　魯　超　謙菴訂

婦人

安胎飲一　治妊娠五七個月用數服可保全產

人參　各一錢　白朮　川芎　白芍藥　紫蘇　炙黃芩　當歸　熟地　陳皮　甘草炙

古用薑水煎服○一方有砂仁

安胎散二　治妊娠卒然腰痛下血

熟地　艾葉　白芍炒　川芎

黃芪炒　阿膠炒　當歸　甘草炙

地榆各一錢

右加薑棗水煎服

泰山盤石散三　治婦人血氣兩虛或肥而不實或瘦而血熱或脾肝素虛倦怠少食屢有墮胎之患此方平和兼養脾胃氣血覺有熱者倍黃芩少用砂仁覺胃弱者多用砂仁少加黃芩更宜戒慾事惱怒遠酒醋辛熱之物可永保無墮○徐東皐曰婦人凡懷胎二三個月慣要墮落名曰小產此由體弱氣血兩虛藏府火多血分受熱以致然也醫家又謂安胎多用艾附砂仁熱補尤增禍患而速其墮矣殊不知血氣清和無火煎爍則胎自安而固氣虛則提不住血熱則溢妄行欲其不墮得乎香附雖云快氣開鬱多用則損正氣砂仁快脾氣多用亦耗眞氣況香燥之性氣血兩傷求以安胎適又損胎而反墮也今惟太山磐石散千金保孕丸二方能奪化工之妙百發百效萬無一失甫故表而出之以爲好生君子

共知也

人參　黃芪　當歸　川續斷

黃芩各一錢　川芎　白芍藥　熟地各八分

白朮二錢　炙甘草　砂仁各五分　糯米一撮

水一鍾半煎七分食遠服但覺有孕三五日常用一服四月之後方無慮也

地黃當歸湯　一名內補丸○治妊娠衝任脉虛補血安胎

熟地二兩　當歸一兩

右每服五錢水煎服○爲丸法以當歸炒爲末熟地蒸搗膏和丸桐子大每服百餘丸溫酒或滾湯下○許學士曰大率妊娠惟在抑陽助陰然胎前藥最惡陰陽雜亂致生他病惟枳殼湯所以抑陽四物湯所以助陰耳然枳殼湯其味多寒若單服恐致胎寒腹痛更以內補丸佐之則陽不致强陰不致弱陰陽調和有益胎嗣此前人未嘗論及也

良方　當歸湯五　治胎動煩燥或生理不順唇口青黑手足厥冷

當歸　人參各二三錢　阿膠炒　甘草炒各一錢

連根葱白一握

右水四碗煎四味至半去滓下葱再煎一碗分二服

良方 阿膠散 六 或頓仆或因毒藥胎動不安或脇痛腹痛上攻短氣

阿膠　艾葉　當歸　熟地
川芎　白芍　黃芪　炙甘草 等分

右每服四錢薑棗水煎

良方 膠艾湯 七 治妊娠頓仆胎動不安腰腹疼痛或胎上搶或去血腹痛○又金匱膠艾湯在後九十三

阿膠 炒 一兩　艾葉 數莖

右二味以水五升煮取二升分三服

七味阿膠散 八 治胎動腹痛

阿膠 炒　白朮 炒　白芍　川芎
當歸　陳皮 各一錢　甘草 炒 三分

右薑棗水煎服

良方 黃芪湯 九 治氣虛胎動腹痛下水

糯米 一合　黃芪 炒　川芎 各一兩

右水煎分三服

良方 鉤藤湯 十 治妊娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絕

鉤藤鉤　當歸
茯神　桑寄生

人參各一錢　苦梗一錢半

右水煎服○如有煩熱加石膏

良方　白朮散十一　治妊娠傷寒內熱等證

白朮　黃芩炒各二錢

右用薑棗水煎服○若陰證者不可用

良方　三味白朮湯十二　治妊娠內熱心痛

白朮四錢　赤芍藥三錢　黃芩炒二錢

右水煎服○忌桃李雀肉

良方　四味白朮湯十三　治妊娠胃虛惡阻吐水甚至十餘日漿粥不入

白朮炒一錢　人參五分　甘草炒　丁香各二分

右薑水煎服

全生白朮散十四　治妊娠面目虛浮四肢腫如水氣名曰胎腫

白朮一兩　生薑皮　大腹皮　陳皮

白茯苓各半兩

右爲末每服二錢米飲下○如末應佐以人參甘草

探胎飲十五　婦人經水不來三月疑似用此驗之

川芎不拘多少爲末不見火

空心煎艾湯調下方寸匕覺腹中動則有胎也臍之下動者乃血瘕也不動者血凝也病也

當歸芍藥湯十六　治妊娠心腹急痛或去血過多而眩運

當歸　白芍藥炒　白朮炒　茯苓

澤瀉各一錢　川芎二錢

右水煎服

益母地黃湯十七　治妊娠跌墜腹痛下血

生地　益母草各二錢　當歸　黃芪炒各一錢

右薑水煎服

良方獨聖散十八　治妊娠有所傷觸激動胎元腹痛下血極效

砂仁不拘多少帶皮同炒勿令焦黑取仁爲末

右用熱酒調服四五分或一錢○此物有安胎導滯易產之功實妊婦之要葯也

良方安胎寄生湯十九　治妊娠下血或胎不安或腰腹作痛

桑寄生　白朮　茯苓各五分　甘草一錢

右水煎服

二黃散二十　治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈或煩躁

作湯或脇肋脹痛等證

生地　熟地

右爲末每服三錢煎白朮枳殼湯下

四聖散二二　治漏胎下血

條芩　白朮

右爲細末每服二錢艾湯調下〇一方有芍藥無阿膠〇按此方若改爲湯砂仁用當減半

良方續斷湯二二　治妊娠下血尿血

當歸　生地黃各一　續斷　赤芍藥各半兩　阿膠各等分

右爲末每服二錢空心用葱白煎湯調下

枳殼湯二三　治胎漏下血或因事下血亦進食和中并治惡阻

枳殼炒　黃芩炙各半兩　白朮炒一兩

右爲末每服一錢白湯調下〇前四證若因脾胃虛弱宜用補中益氣湯加五味〇若因脾胃虛陷宜用前湯倍加升麻柴胡〇若因肺熱內熱宜用逍遙散

滑胎枳殼散二四　此方能令胎瘦產易〇湖陽公主每產累日不下南山道人進此方

粉草炒一兩　商州枳殼麩炒二兩

右爲末每服二錢空心沸湯調日三服凡孕六七月宜服之

○温隱居方加當歸廣木香各等分○或加香附一兩亦可

枳殼散二五　方在寒陣百一

治婦人血熱氣滯經候不調

千金鯉魚湯二六　治妊娠腹脹胎中有水氣遍身浮腫小便不利或胎死腹中皆效

當歸　芍藥各一錢　白朮一錢　茯苓一錢半

橘紅五分　鯉魚一尾不拘大小

右作一服將鯉魚去鱗臟白水煮熟去魚用汁鍾半入藥加生薑五片煎一鍾空心服當見胎水下如水未盡胎死腹中脹悶未除再制一服水盡脹消乃已

竹葉湯二七　治妊娠心驚膽怯煩悶不安名曰子煩○一方有當歸防風梔子仁

白茯苓　麥門冬　黃芩各三兩

右每服四錢竹葉五片水煎服○若因血虛煩熱宜兼用四物○若因中氣虛弱宜兼用四君

紫蘇飲　治妊娠失調胎氣不安上疠作痛名曰子懸或

臨產氣結不下等證

大腹皮　川芎　白芍藥　陳皮

蘇葉　當歸各一兩　人參　甘草各半兩

右每服一兩薑葱水煎服○一方有香附無人參○若肝脾氣血虛而有火不安宜兼逍遙散○若脾氣虛弱而不安宜用四君芎歸

安榮散二九　治妊娠小便澁少遂成淋瀝名曰子淋甚妙

麥門冬　通草　滑石　當歸

燈心　甘草　人參　細辛等分

右水煎服○一方人參細辛加倍爲末每服二錢麥冬湯調服○若因肺經鬱熱宜用黃芩清肺飲○若因膏粱厚味宜用清胃散○若因肝經濕熱宜用加味逍遙散

天仙藤散三十　治妊娠三月之後足指發腫漸至腿膝飲食不甘狀似水氣或脚指間出黃水名曰子氣

天仙藤洗畧炒　香附炒　陳皮　甘草

烏葯等分

右每服三五錢加生薑木瓜各三片紫蘇三葉水煎食前日進三服○若因脾胃虛弱宜兼六君子○中氣下陷須用補

中益氣湯

羚羊角散 三一　治妊娠虛風頸項强直筋脉攣急語言蹇澁痰涎不利不省人事名曰子癇

羚羊角 鎊　川獨活　棗仁　五加皮

薏苡仁 炒　防風　當歸　川芎

茯神　杏仁 去皮尖各五分　炙甘草　木香 各一分

右加薑五片水煎服○若因肝經風熱或怒火所致須用加味逍遙散

人參橘皮湯 三二　治妊娠脾胃虛弱氣滯惡阻嘔吐痰水飲食少進益胃和中○一名參橘散

人參　陳皮　麥門冬　白朮 各一錢

厚朴 制　白茯苓 各五分　炙甘草 三分

右加淡竹茹一塊薑水煎溫服○若因中脘停痰宜用二陳枳殼○若因飲食停滯宜用六君加枳殼○若因脾胃虛宜用異功散

竹茹湯 三三　治孕婦嘔吐不止惡心少食服此止嘔清痰

竹茹 彈子大一丸　陳皮　半夏　茯苓 各錢半

生薑 二錢

水鍾半糉米一撮煎七分溫服忌羊肉雞魚麵食

良方半夏茯苓湯三四　治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏泡炒黃連陳皮　砂仁炒各一錢　白茯苓二錢

甘草炒五分

右用薑棗烏梅水煎服一二劑後用茯苓丸在三九

烏附湯三五　治孕婦惡心阻食養胃調和元氣

烏藥　香附制　白朮土炒　陳皮各一錢

人參　炙甘草各八分

水鍾半薑三片煎七分服○吐甚者加丁香砂仁各七粒

千金保孕丸三六　治妊婦腰背痛善於小產服此可免墮胎之患○此即良方杜仲丸但彼等分用

杜仲四兩同糯米炒去絲　川續斷二兩酒洗

右爲末山藥糊丸桐子大每服八九十丸空心米飲下忌酒醋惱怒

一母丸三七　一名知母丸○治妊娠血熱頓仆胎動不安或欲墮產

知母炒爲末

右搗棗肉爲丸彈子大每服一丸人參湯嚼送或丸桐子大

每服三四十丸白湯下或嚼嚥之

東胎丸三八　懷胎七八個月惡胎氣展大難產用此扶母氣

東皃胎易產然必胎氣強盛者乃可服

條黃芩　酒炒勿太熟各一兩　白朮三兩　陳皮二兩
白茯苓　七錢半

右爲末粥糊丸子大每服五十丸白湯下

茯苓丸三九　治妊娠煩悶頭暈聞食吐逆或胸腹痞悶

赤茯苓　八參　桂心　乾薑炮
半夏泡洗炒　橘紅各一兩　白朮炒
黃芩　甘草炒

枳殼麩炒各二兩

右爲末蜜丸桐子大每服五十丸米飲下日三服（）右原方仍有葛根二兩似非所宜也用者當酌之

達生散　四十　妊娠臨月服之

兼別證以意增減（）詩云誕彌厥月先生如達註曰先生首生也達小羊也羊子易生故以此名之

人參　白朮
陳皮　紫蘇各一錢　當歸　白芍
炙甘草二錢　大腹皮酒洗晒乾三錢

水一鍾半煎服（）一方無當歸白芍白朮

佛手散 四一 一名芎歸湯亦名當歸湯○治産後去血過多煩暈不省并一切胎氣不安亦下死胎

川芎二錢 當歸三五錢

右四每用半両水煎服○若腹疼加桂○若腹痛自汗頭眩少氣加羊肉若不應用八珍湯○若用下胎當爲末以酒調服

錢氏生化湯 四二 此錢氏世傳治婦人者

當歸五錢 川芎二錢 甘草炙五分 焦薑三分

桃仁十粒去皮尖雙仁 熟地三錢

右㕮咀水二鍾棗二枚煎八分温服○一方無熟地 附加減法○凡胎衣不下或血冷氣閉血枯氣弱等證連服生化湯二三劑即下或用此送益母丸一丸即下蓋益母草行血養血性善走而不傷人者也○一凡婦人無論胎前産後皆宜此藥○一凡血暈虛暈加荆芥穗六七分○一凡産婦氣虛氣脫倦怠無力加人參黃芪○一凡陽虛厥逆加附子肉桂○一脉虛煩渴加麥冬五味○一氣壅有痰加陳皮竹瀝○一血虛血燥便結加麻仁杏仁蓯蓉○一多汗不眠加茯神棗仁黃芪上體多汗加麻黃根下體多汗加漢防巳○一

煩熱加丹皮地骨皮○一口噤如風反張瘈瘲者加荊芥防風各三四分○一惡露未盡身發寒熱頭痛脇脹其小腹必然脹痛加紅花丹皮肉桂各三四分玄胡一錢○一內傷飲食加山查陳皮砂仁或神曲麥芽○一外傷寒濕或加蒼朮白朮○一血積食積胃有燥糞臍腹脹痛加大黃二錢○一產後下血不止或如屋漏水沉黑不紅或斷或來或如水或有塊淋瀝不休此氣血大虛之候不可誤用寒凉其脉浮脫者可加附子輩諸陽分葯否則無救矣○佛手散單用當歸三錢川芎二錢此即其變方也

會稽錢氏世傳曰嘗論產證本屬血虛陰亡陽孤氣亦俱病如大補則氣血陡生倘失調則諸邪易襲四物避芍藥之寒四物得薑桃之妙氣毋耗散法兼補虛食必扶脾勿專消導熱不可用芩連恐致宿穢凝滯寒不宜用桂附反招新血流崩三陽見表證之多似可汗也用麻黃則重竭其陽三陰見裏證之劇似可下也用承氣則大涸其血耳聾脇病乃腎虛惡露之停休用柴胡譫語汗多乃元弱似邪之證毋同胃實厥由陽氣之衰難分寒熱非大補不能回陽痓因陰血之虧豈論剛柔非滋營胡以潤絡潮熱似瘧以瘧治則遷延神亂

如邪以邪論則立困總屬大虛須從峻補去血多而大便燥蓯蓉加於生化非潤腸和氣之能通患汗出而小便難六君倍用參芪必生津助液之可利加參生化頻服救產後之危活命長生調攝須產前加意

當歸川芎湯 四三　治小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒

當歸　熟地黃　白芍藥炒　玄胡索炒

川芎　桃仁　紅花　香附

青皮炒　澤蘭　牡丹皮

右水煎入童便酒各小半○若以手按腹愈痛此是瘀血爲患宜用此葯或失笑散消之○若按之反不痛此是血虛宜用四物參苓白朮○若痛而作嘔此是胃虛宜用六君子○若或作瀉此是脾虛宜用六君子送二神丸

加味芎歸湯 四四　治分娩交骨不開或五七日不下垂死者

生男女婦人髮一握燒存性　自死龜殼一個或占過者亦可酥炙

川芎　當歸各一兩

右咀每用一兩水煎服良久不問生死胎自下

當歸黃芪湯 四五　方在補陣九八

治姙娠下痢腹痛

芎歸補中湯 四六　治氣血虛半產

川芎　當歸　黃芪炙　白朮炒

人參　芍藥炒　杜仲炒　艾葉

阿膠炒　五味子拌炒各一錢　甘草炙五分

右每服五錢水煎服○若脾氣虛弱須用補中益氣湯○若氣虛有火宜用安胎飲

保生無憂散 四七　臨產服之補其血順其氣或胞胎肥厚根蒂堅牢者皆可使之易產又治小產瘀血腹痛

當歸　川芎　白芍　乳香

枳殼　南木香　血餘

右等分每服二三錢水煎日二服○若胞衣既破其血已涸或元氣困憊急用八珍湯斤許水數碗煎熟時飲救之飲盡再制亦有得生

人參黃芪湯 四八　治小產氣虛血下不止

人參　黃芪炒　當歸　白朮炒

白芍炒　艾葉各一錢　阿膠炒二錢

右作一劑水煎服

良方牛膝散 四九　治胎衣不下腹中脹病急服此藥腐化而下

緩則不久

牛膝　川芎　朴硝　蒲黃各三兩

當歸一兩半　桂心半兩

右每服五錢薑三片加生地黃一錢水煎服

局方　黑神散五十　一名烏金散　靈苑方名肉桂散○治產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心腹病不止及治脾腎陰虛血不守舍吐衄等證

黑豆二兩炒　當歸去蘆酒洗　熟地　蒲黃

白芍　甘草炙　乾薑炮　肉桂各一兩

右爲末每服二錢童便酒各半調服○良方黑神散有炮附子半兩無蒲黃

簡易　黑神散五一　方在和陣二一一

治一切失血

經驗滑石散五二　治產難凡水下胎乾胎滯不生用此最效

滑石飛過一兩　白蜜　香油各半盞

右將油蜜慢火熬熟三四沸掠去沫調滑石末頓服外以油調於產婦臍腹上下摩之立效

難產方五三

令產婦以自己髮稍含於口中惡心卽下亦治胎衣不下

良方 桂心散 五四

治妊娠因病胎不能安者可下之

桂心　瓜蔞　牛膝　薤白各五分　或二錢　當歸一錢或二三錢

右水煎

桂香散 五五

治胎死腹中不下

桂心三錢　射香五分

右爲末作一服酒調下

下胎小品方 五六

用麥蘗一升搗碎水二升煮一升服之卽下神效○按麥蘗能損氣破血如此故凡脾胃虛弱及飲食不化者不宜用明矣○又方用牛膝一兩酒一鍾煎七分作二服卽下

廣濟下胎方 五七

并下死胎俱效

天花粉四兩　肉桂　牛膝各三兩　豆豉

右咀用水七碗煎二碗半分三服每服後一時許又進一服扶羸小品方 五八

虛弱人欲下胎宜用此

人參　粉草　川芎　肉桂

乾薑　桃仁　黃芩　瓜蠃

右等分每服一兩水二鍾煎八分空心服未動再服

下死胎 五九　凡胎死腹中其舌多見青黑口中甚穢面暗腹中不動祇覺陰冷重墜者是

用平胃散一兩以黃酒河水各一鍾煎至一鍾入朴硝三錢再煎三五沸温服其死胎即化水而出萬不失一〇又方單用朴硝末三錢以熱酒和熱童便調服立出或用佛手散以酒調服亦妙

千金去胎方 六一

大麥麵五升

漬酒一斗煮二三沸去滓分五服隔宿勿食且再服其胎如

麝母無所苦千金不傳

良方 硫黃散 六二　治產後陽氣虛寒玉門不閉

硫黃　烏賊骨

右爲末摻患處日二易

硫黃湯 六三　治產後玉門不斂陰戶突出

硫黃 三錢　吳茱萸 各二錢　蛇床子 一錢半

兎絲子

右研勻用水二鍾煎湯頻洗自收

良方 益母丸 六四　一名返魂丹○治婦人赤白帶惡露腫下不

汁

止及治婦人胎前產後經中諸般奇痛無所不療本草云此草胎前無滯產後無虛故名益母

益母草 一味 一名充蔚子一名野天麻方梗對節生葉葉顆火麻四五月間開紫花是白花者非

右於五月採取晒乾連根莖葉勿犯鐵器磨爲細末煉蜜丸如彈子大每服一丸用熱酒和童便化下或隨證用湯引送下○一方以此爲末每服二錢或酒或童便或隨證用引服之○一方凡產時倉卒未合只用生益母草搗汁入蜜少許服之其效甚大○一益母膏方依前採取搗爛以布濾取濃汁用砂鍋文武火熬成膏如黑砂糖色爲度入磁罐收貯每服二三匙酒便調下或於治血湯藥中加一匙服之尤妙

良方 奪命丹 六五 治瘀血入胞脹滿難下急服此藥血即消衣自下○按此方頗有廻生丹之功用下死胎必效須用當歸方

附子 炮半兩 乾漆 碎之炒煙盡 牡丹皮 各一兩

右爲細末另用大黃末一兩以好醋一升同熬成膏和前藥丸桐子大溫酒吞五七丸○一方有當歸一兩

廻生丹 六六 治婦人產後諸疾汚穢未淨及一切實邪疼痛

死胎瘀血衝送等證

大黃膏法　用蘓木三兩河水五碗煎至三碗去柤聽用

紅花三兩炒黃色用好酒一大壺煮十餘滾去柤聽用

黑豆三升煮熟存汁三碗去豆去皮晒乾爲末俱聽用

大黃一斤爲末用好醋八碗熬成膏次下紅花酒蘓木湯

黑豆汁攪勻又熬成膏盆內收盛候用將鍋焦焙乾爲末

同豆皮末俱入之

人參　白朮　青皮　木瓜各三錢

當歸　川芎　元胡　蒼朮

香附童便炒　蒲黃　赤茯苓　桃仁泥

熟地各一兩　牛膝　三稜　山茱萸

五靈脂　地榆　甘草　薑活

陳皮　白芍各五錢　良薑四錢　烏葯二兩半

木香　乳香　沒藥各一錢

右爲末用前大黃膏爲丸彈子大金簿爲衣不拘時隨證擇

用湯引送下一丸

斷產灸法六七　一傳方欲絕產者灸臍下二寸三分陰動脉

中三壯　此當自臍中至骨際拆作五寸約之

千金斷產方 又六七

四物湯一劑　芸臺子一撮卽油菜子紅花

水鍾半煎八分經後空心服則不受胎

斷產小品方 六八　斷產墮胎有驗

故蠶退紙方一尺

丹溪斷子法 六九

右燒爲末空心酒調服終身不受孕

用白麪麩一升無灰酒五升作糊煮至三升半濾去滓分作三服候經至前一日晚五更及天明各吃一服經卽不（無一字）

行終身無子矣

仲景羊肉湯 七十　治產婦腹中疙痛寒痛血氣不足虛弱甚者及寒月生產寒氣入於子門手不可犯臍下脹滿此產後之寒證也并治寒疝腹中痛及脇痛裏急者

精羯羊肉一斤　當歸三兩　生薑五兩

右用水八升煮取三升加蒸椒鹽溫服七合日三服○若寒多者加生薑成一斤○痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩

良方 羊肉湯 七一　治產婦脾虛寒邪內乘以致腹痛或頭眩臍脇急痛

精羊肉 四兩　當歸 川芎 各半兩　生薑一兩

右以水十盞煎至四盞分四次空心服

良方 黃雌鷄湯 七二　治產後虛羸腹痛

當歸　白朮 炒　熟地黃　黃芪 炒

桂心 各半兩　小黃雌雞一隻去頭足腸翅細切

右先用水七碗煮鷄至三碗每用汁一碗藥四錢煎日三服

母鷄湯 七三　治產後褥勞虛汗不止

人參　黃芪　白朮　白茯苓

麻黃根　牡蠣 煅各二錢

右用母鷄一隻去毛雜淨水六七碗同藥煮至三碗任意服之

豬腰湯 七四　治產後褥勞寒熱如瘧自汗無力欬嗽頭痛腹痛俱效

豬腰一對　當歸　白芍藥 酒炒各一兩

右以藥二味用水三碗煎至二碗去滓將豬腰切如骰子塊同晚米一合香豉一錢如葱椒鹽煮稀粥空心日服一次神效○或加人參更妙

四神散 七五　治產後血虛或感血腹痛

當歸二錢　川芎　芍藥炒各一錢　炮薑五分

右水煎服

太嚴蜜湯七六

治產後陽氣虛寒心腹作痛不食嘔吐四肢厥逆

生地　當歸　芍藥炒　乾薑

吳茱萸　桂心　甘草炒

小草各一兩　細辛半兩　獨活

右每服半兩水煎服

良方人參湯七七

治產後諸虛不足發熱盜汗內熱口燥等證

人參　當歸等分

右爲末先以豬腰子一枚切片糯米半合葱白二莖入水二鍾煎汁八分再入粉三錢煎服

白茯苓散七八

治產後虛勞頭目肢體疼痛寒熱如瘧

白茯苓一兩　人參　當歸　黃芪

川芎　白芍藥炒　熟地　桂心各半兩

豬腰一對

○此卽參歸湯亦名圓參散

右以水三盞入豬腰并薑棗各三事煎二盞去棗入前藥半兩煎一盞服

良方 七珍散 七九　治產後不語

人參　石菖蒲　生地　川芎各一兩
細辛 七錢　防風　朱砂另研各半兩

右爲末每服一錢薄荷湯調服

良方 趁痛散 八十　治產後骨節疼痛發熱頭重四肢不舉

牛膝酒炒　甘草炒　薤白各一兩當歸
白朮炒　黃芪炒　桂心　獨活加薑各半兩

右每服半兩水煎

補脬飲 八一　治產後傷動脬破不能小便而淋瀝

生黃絲絹一尺剪碎　白茯各一錢俱爲末

用水一碗同煮至絹爛如餳空心頓服服時不得作聲作聲則不效

良方 止汗散 八二　白牡丹皮根

牡蠣煅粉半兩　小麥麪入兩炒黃爲細末

右每服三五錢用猪肉汁調服

良方 麻黃根湯 八二　治產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

麻黃根　人參　黃芪炒　當歸

牡蠣煅粉　甘草

右每服四五錢水煎服

三味參蘇飲 八四　治產後瘀血入肺欬嗽喘急

人參一兩　蘇木二兩

右作一劑水煎服○若既愈當用六君子以補脾胃○若口鼻黑氣起宜急用此葯加附子五錢亦有得生者

良方 黃龍湯 八五　治妊婦寒熱頭疼嘿嘿不食脇痛嘔痰及產後經後外感風寒熱入胞宮寒熱如瘧等證○按此即小柴胡湯之去半夏也

柴胡二錢　黃芩炒　人參　甘草各一錢

右用水煎服

陳氏 二母散 八六　治產後熱血上攻留於肺經欬嗽喘促

知母　貝母　人參　桃仁

杏仁俱去皮尖　白茯苓

右等分每服五錢薑水煎服

猪蹄湯 八七　治氣血不足乳汁不下

用八物湯加黃芪漏蘆陳皮木通先以猪蹄煮汁二碗煎葯服之○或加天花粉

又方　用猪蹄一副通草二兩川芎一兩甘草一錢川山甲十四片炒將猪蹄洗切入水六碗同葯煎煮約至三碗加葱薑鹽料取汁飲之忌冷物要喫羹湯助其氣血乳汁自下夏月不可失蓋時用葱湯洗乳爲佳

良方　湧泉散八八　下乳忌食薑椒辛辣飲食

王不留行　藿麥　麥門冬　龍骨各二錢

右用猪蹄汁一椀酒一杯煎服以木梳於乳上梳下

玉露散八九　治產後乳脉不行身体壯熱頭目昏痛大便澁滯

人參　白茯苓　當歸　炙甘草各五分

桔梗　川芎　白芷各一錢　芍藥七分

右水煎食後服○如熱甚大便秘結加大黃三五分炒用

良方　漏蘆湯

治婦人肥盛脉氣壅結乳少

漏蘆二兩　蛇退一條　土瓜根

右共爲末酒調下二錢

括蔞散九一　治吹乳腫痛

括蔞一個　乳香二錢

右用酒煎服○外用南星爲末以温湯調塗

滑氏補肝散九二　治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或脇脹頭暈寒熱發熱或徧身作痛經候不調

熟地　白朮炒各一兩　棗仁炒　獨活各四兩

當歸　川芎　黃芪炒　山藥

五味子炒杵　山茱萸肉　木瓜各半兩

右㕮咀每服五錢棗水煎服

金匱膠艾湯九三　治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不止

阿膠炒　川芎　炙甘草各一兩　艾葉

當歸各兩半　白芍　熟地各二兩

右㕮咀每服五錢水煎服○一方加地榆黃芪即名安胎散

集驗加味八珍湯九四　治婦人思慮過傷飲食日減氣血兩虛月經不調夜夢交感或出盜汗寢成勞損

人參　白朮　茯苓　當歸

生地各一錢　炙甘草　川芎　芍藥

軟柴胡　黃芪各五分　香附制　丹皮各八分

水鍾半大棗一枚煎七分食前服

集驗調衛養榮湯 九五 治婦人室女一切月經不調或先或後或絶閉不通憎寒壯熱口苦無味欬嗽躁煩頭眩漸成勞證者

當歸 生地 麥冬 沙參
陳皮 白朮各一錢 牡丹皮 地骨皮各八分
柴胡稍 桔梗各五分 穀芽一錢 甘草四分

右加蓮子薑棗水煎服○瘧中見血加側栢葉○煩躁口乾加炒山梔倍麥門冬○臍下脹疼加青皮川芎○胸膈滿悶加黃連薑炒枳實去麥冬地骨皮○夜出盜汗加黃連黃芪去柴胡桔梗○大便秘結加桃仁倍當歸○咳嗽不已加瓜蔞仁阿膠○小水不利加木通茯苓

良方當歸散 九六 治經水妄行不止及產後氣血虛弱惡露內停憎寒發熱當服此去之

當歸 酒洗 川芎 白芍 炒 白朮 炒
黃芩 炒 各半兩 山茱萸肉二兩半

右爲末每服二錢酒調日三服○一方無山茱萸○氣虛者去芩加桂心一兩

良方丹參散九七　良方云丹參一味其治頗類四物湯能破宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶下調經下產後惡血兼治冷熱勞腰脊痛骨節煩疼

丹參　酒洗去土晾乾切

右爲細末每服二錢溫酒調下○經脉不調食前服○冷熱勞不拘時服

玄胡當歸散九八　亦名延胡索散○治血積小腹疼痛或因氣逆月經不行肚腹作痛

當歸　赤芍藥　劉寄奴　沒藥

枳殼麩炒　玄胡索炒等分

右爲末每服一錢熱酒調下

牛膝散九九　治月水不利臍腹作痛或小腹引腰氣攻胸膈

當歸酒浸　牛膝酒炒　赤芍藥　桂心

桃仁去皮尖　玄胡索炒　牡丹皮各一兩　木香三錢

右爲末每服一錢溫酒調下或每服五七錢水煎服

良方交加散百　治經脉不調腹中撮痛或結聚癥瘕產後中風

○又交加散方在和陣二五二

生地一斤取汁　生薑十二兩取汁

右以地黃汁炒薑柤薑汁炒地黃柤乾爲末每服三錢溫酒調服○加芍藥立效當歸蒲黃桂心各一兩沒藥紅花各五錢尤效

薑黃散　百一　治瘀血疑滯肚腹刺痛或腹脹發執等證

薑黃　當歸酒洗　桂心　川芎　蓬朮醋炒　紅花　右水酒各半煎服　玄胡索炒　丹皮各五分

琥珀散　百二　治心膈迷悶肚腹攪痛月信不通等疾

烏藥二兩　當歸酒洗　蓬朮醋炒各一兩

右爲末每服二錢溫酒調服

溫經湯　百三　治寒氣客於胞血室以致血氣凝滯膀胱腹作痛其脈沉緊

人參　牛膝酒炒　甘草炒各一錢　當歸　川芎　芍藥　桂心各五分　右水煎服

經驗失笑散　百四　治婦人心腹痛氣刺不可忍及產後兒枕奮血惡血上攻疼痛并治小腸氣痛

五靈脂淨者　蒲黃等分俱炒

右爲末每服二三錢用酒煎熱服○一方用好醋一杓熬成膏再入水一鍾煎至七分熱服○一方用醋糊和丸龍眼大每服一丸以童便和水各半鍾煎七分溫服○按此方若用以止痛蒲黃宜減半若用止血則宜等分或靈脂減半亦可

澤蘭湯百五　治勞怯經閉

澤蘭葉二錢　當歸　芍藥炒各一錢　甘草炙五分

用水煎服

當歸沒葯丸百六　治血瘀作痛及血風筋攣骨痺手足麻木疼痛

當歸　五靈脂炒各一兩　沒葯五錢

右爲末醋糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

醋附丸百七　治元臟虛冷月候不調腹中急痛赤白帶下渾身寒熱胎氣壅滯不固

香附米半斤醋煮焙干爲末

右以醋糊爲丸桐子大每服三四十丸米飲下

栢子仁丸百八　治血虛有火月經耗損漸至不通日漸羸瘦而生潮熱慎勿以毒葯通之宜栢子仁丸或前澤蘭湯主之

栢子仁炒研　牛膝酒拌　卷栢各半兩　澤蘭葉

續斷各二兩　熟地黃三兩酒拌蒸爛杵膏

右爲末入地黃膏加煉蜜丸桐子大每服百餘丸空心米飲下

烏賊魚骨丸百九　此即內經治血枯方

烏賊魚骨去甲四兩　蘆茹一兩即茜根

右爲末以雀卵搗丸小豆大每服五丸或十丸鮑魚煎湯下以飯壓之○鮑魚即今之淡乾魚也

增損四物湯百十　治脾虛不攝血去不止

人參　當歸　芍藥炒　川芎

乾薑炒各一兩　甘草炙四錢

右每服四錢水煎服

奇效四物湯百十一　治肝經虛熱血沸騰而崩久不止

當歸酒拌　熟地　白芍　川芎

阿膠炒　艾葉炒　黃芩

右每服四錢水煎

良方加減四物湯百十二　治婦人血積

當歸　川芎　芍藥　熟地

蓬朮　三稜　肉桂　乾漆炒烟盡等分

右㕮咀每服五七錢水鍾半煎七分食遠服

四物二連湯 百十三　治婦人血虛發熱或口舌生瘡或晝安夜熱

當歸　川芎　芍藥　熟地

胡黃連　宣黃連各一錢

右作一劑水煎服

人參當歸湯 百十四　治去血過多內熱短氣頭痛悶亂骨節作痛或虛煩咽噪

人參　當歸　生地　桂心

麥冬　白芍藥各等分

右用粳米一合竹葉十片水二鍾煎一鍾去米入葯五錢棗二枚煎服或總煎之亦可虛甚者用熟地黃

良方 一味防風散 百十五　治肝經有風以致血得風而流不歸經者

用防風去蘆為末每服一錢白湯調服○一名獨聖散每服二錢空心食前用酒煮白麵清飲調下極效

龍骨散 百十六　治血崩不止

龍骨 煅　當歸　香附 炒各一兩　棕毛灰 五錢

右爲細末每服四錢空心米湯調下忌油膩鷄魚炙煿物

如聖散 百十七　治血崩三服全愈

棕櫚子　烏梅肉　乾薑 俱燒存性爲末各等分

右每服二錢空心烏梅湯調服○一方單用棕皮半燒半生爲末每空心服二錢亦妙

槐榆散 百十八　治血崩及腸風下血

槐花　地榆 等分炒焦

右二味用酒煎飲之

七灰散 百十九　治血崩神效

蓮蓬殼　罌粟殼　醃蟹殼　益母草

旱蓮草　棕毛葉　藕節 各分俱燒存性爲末

空心醋點湯調下三錢○一秘方用綿花子以銅鍋炒黑爲末黃酒調下二三錢三兩次即止并治崩漏小產血不止

棕灰散 百二十　方在和陣二一五

治大腸下血及崩漏失血

栢葉散 一二一　治元氣虛弱崩中漏血年久不愈亦治白帶

栢葉 炒　當歸　生地　續斷

川芎　龜甲炙　禹餘糧各一兩半　阿膠炒五錢

鱉甲炙兩半　赤石脂煅　牡蠣煅　地榆

艾葉炒　鹿茸炙各五錢

右爲末每服二錢粥飲調下

子芩散一二二　一名黃芩散○治壯熱崩中下血是陽乘陰分故經血泛溢宜清其北方

條黃芩不拘多少爲細末

右燒秤錘焠酒食前調下三四錢○一方有乾薑白芷○一方以木耳黃芩等分爲丸俱效

良方　防風黃芩丸一二三　治肝經風熱以致血崩便血尿血等證

條芩炒黑　防風等分

右爲末酒糊丸桐子大每服三五十丸食遠或食前米飲或溫酒送下

劫勞湯一二四　治勞嗽發熱盜汗體瘦唾中有血或成肺痿○此救本也非劫勞也能用此者庶可望生此外恐非佳劑矣

白芍藥炒一錢　人參　黃芪炒　當歸

熟地　甘草炒　白茯苓　五味子杵炒

阿膠炒　半夏制各五分　此上方其原方似有不足用者仍宜加倍

右薑棗水煎日三服○鄉人楊元鼎女及笄病此甚危百藥無效偶遇名醫得此方服三十餘劑遂愈不發

集驗歸神湯一二五　治婦人夢交盜汗心神恍忽四肢乏力飲食少進

人參　白朮　白茯苓　歸身各一錢

棗仁　陳皮各八分　圓眼肉之枚　甘草

羚羊角　琥珀末各五分

右羚羊琥珀二味不煎餘藥煎熟去祖入二末和勻食前服

白芷散一二六　治下元虛弱赤白帶下或經行不止等證

白芷一兩　海螵蛸二枚燒　胎髮一團煅

右爲末每服二錢溫酒調下

海藏白芍藥散一二七　治婦人赤白帶下臍腹疼痛如神

白芍二兩炒　乾薑半兩炒

右爲細末每服三錢空心溫米湯調下晚又進一服十日見效

克應丸一二八　治婦人赤白帶下

熟地　赤芍各二兩　當歸二兩　赤石脂煅醋焠

龍骨　牡蠣煅酒焠　茯苓　丹皮

艾葉製　川芎各一兩

右爲末醋糊丸桐子大每服五十丸空心白湯送下

良方滑石散一二九　治熱淋

滑石五分研　通草　車前子　葵子各四分

右爲末以漿水調服

芍藥散百三十　治婦人血滯腰脇痛

白芍藥　玄胡炒　肉桂各一兩　香附米二兩醋一升鹽半兩

同煮乾

右爲細末每服二錢不拘時白湯調下

良方通氣散一三一　治腎虛腰痛神效

破故紙酒炒爲末

右每服二錢先嚼胡桃肉半箇空心以溫酒送下

四製香附丸一三二　調經養血順氣受孕

香附米一斤分四制酒醋童便米泔各浸一宿晒乾用　當歸酒洗

熟地酒洗　白芍藥四兩　川芎各四兩　澤蘭葉

白朮　陳皮各三兩　黃蘗酒炒　甘草酒炒各一兩

右爲末酒糊丸桐子大每服七十丸空心白湯送下

大典女金丹　一三三　此韓飛霞方也一名不換金丹○內加熟地黃一兩即名勝金丹○治婦人久虛無子及產前產後一切病患此藥能安胎催生妊娠臨月服五七丸產時減痛婦人子宮寒冷無孕如服月餘男女自至又治半身不遂帶濁血崩及產後腹痛吐逆子死腹中氣滿煩悶臍腹作痛月水不通中風口噤痢疾消渴敗血上衝頭疼寒熱血運血泄見鬼迷悶產後傷寒虛煩勞瘦凡婦人諸疾不問久近並宜服之兼治男子下虛無力等證

人參　白朮炒　茯苓　炙甘草

當歸　川芎　白芍　白薇酒洗

丹皮　白芷　藁本　肉桂

玄胡　沒藥另研　赤石脂另研上各一兩

香附醋浸三日炒香十五兩

右共十六味爲末煉蜜丸彈子大以磁瓶收貯封固每服一丸空心溫酒化下食乾物壓之服至四十九丸爲一劑以癸水調平受妊爲度妊中三五日服一丸產後二三日服一丸醋湯下亦妙

琥珀丸 一三四　治婦人或老或少或產前產後百病及療三十六種諸病七疝八瘕心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風十二痺手足瘦疼乳中結核結毒懷胎驚動傷犯不安死胎不下並治

琥珀　硃砂 各另研　沉香　阿膠 炒珠

附子 制　川芎　肉桂　五味子

石斛 各五錢　牛膝 酒浸　當歸　肉蓯蓉 酒洗晒

人參　熟地　續斷　木香

沒藥 各一兩

一方有牛黃　珍珠　乳香　玄胡 各一兩共二十一味

右煉蜜爲丸彈子大每服一丸空心食前午後溫酒化開服○凡服法或薑湯或米湯或酒或燈草湯或隨證用引皆可下○若傷寒中風角弓反張用麻黃湯隨證改湯引送下○孕婦臨月宜一日一服至產順利不覺疼痛○凡婦人服至五服十服之後日倍飲食其功言不盡述服者當自覺也

延年益嗣丹 一三五　滋補元氣益精黑髮○按此方即還元丹也但製法分兩不同宜參酌用之方在補陣一三九

人參　天門冬 酒浸去心　麥門冬 同上各三兩　熟地黃 酒蒸搗

生地黃各二兩　酒浸　白茯苓　晒乾　地骨皮　酒浸各五兩　何首烏鮮者半斤

右將何首烏去皮切片如乾者用米泔水浸軟拍切外用砂鍋入黑羊肉一斤黑豆三合量着水上用餳簞簞上放首烏煮而蒸之以肉爛爲度鍋蓋須密勿令洩氣取起晒乾爲末煉蜜丸梧子大每服七八十丸空心溫酒送下

續嗣降生丹一三六　治婦人五臟虛損子宮冷憊不能成孕

○并治男子精寒不固陽事衰弱白濁夢泄婦人帶下寒熱諸虛百損盜汗短氣無不感應○此方乃溫隱居求嗣保生篇所載云東京焦員外三世無嫡嗣後遇一神僧問其故曰無嗣者有三一祖宗無德自身無行二夫妻年命恐犯禁忌三精神不守妻妾血寒焦公曰治之有道乎僧曰先修德後修身三年之後到臺山令行童賜以方藥名續嗣降生丹依方服之後不及二十年子孫數人皆貴顯○此方無怪誕尅伐之品且溫且固凡血海虛寒者服之必雀但溫力有餘補力不足倘益以人參白朮熟地川芎炙甘草各一兩則八珍全而溫補賛育之功當非淺也因命名曰加味續嗣降生丹

當歸酒洗　杜仲酒炒　茯神　益智仁　龍骨煅　桂心　吳茱萸制　乾薑半生半熟

川椒去目　台烏藥各一兩　白芍藥酒炒　川牛膝酒浸

半夏制　防風　秦艽　石菖蒲去毛

北細辛　桔梗各五錢　附子一枚重一兩者臍下作一竅入朱砂一錢麪裹煨熟取出朱砂留為衣　牡蠣大片者以童便浸四十九日每五日一換取出用硫黃一兩為末酒和塗徧用皮紙糊實米醋浸濕外以鹽泥厚固之候乾用炭五斤煆過為末每料止用二兩餘可收貯再用

右為末以酒煮糯米糊為丸梧子大以前朱砂為衣每服三五十丸漸至七八十九空心滾白湯或鹽湯溫酒下

河車種玉丸

紫河車一具　只要母氣壯盛厚大新鮮者但去胞內瘀血不必挑去鮮紅血脈以米泔水洗淨用布絞乾石臼內生杵如糊用山藥末四五兩收乾捻為薄餅八九個於砂鍋內焙乾以香如肉脯為妙

大熟地酒洗烘乾八兩　枸杞烘乾五兩　白茯苓人乳拌晒三次　歸身酒洗

人參　兎絲制　阿膠炒珠各四兩　丹皮酒洗

白薇酒洗各二兩　沉香一兩　桂心　山茱萸

香附米用酒醋水三件各半碗浸三日晒干畧烘各三兩　大川芎酒浸切片晒乾二兩

右煉蜜和丸桐子大每服百餘丸空心或酒或白湯鹽湯任下○如帶濁多者加赤白石脂各二兩須以清米泔飛過用

○服藥後忌生蘿卜生藕葱蒜綠豆粉之類

八珍益母丸 一三八 治血氣兩虛脾胃並弱飲食少思四肢無力月經不調或腰痠腹脹或斷或續赤白帶下身作寒熱罔不獲效服一月之後即可受胎虛甚者用藥一觔必能受子

人參　白朮土炒　茯苓　川芎各一兩

當歸酒洗　熟地酒洗各二兩　炙甘草五錢　芍藥醋炒一兩

益母草四兩五六月採取止用上半截帶葉者不見鐵器晒杵爲末

右爲末煉蜜丸彈子大空心蜜湯或酒下一丸或爲小丸亦可○脾胃虛寒多滯者加砂仁一兩薑汁炒○腹中脹悶者加山查肉一兩飯上蒸熟○多鬱者加香附一兩酒製○此徐思鶴醫統方又一方名八珍益母十全丸於前方內用益母草八兩外加沉香四錢◉思鶴曰資益坤元補養氣血除淋帶壯形體胎前和氣産後補虛眞婦人之聖劑超古今之神方有室家者不可不知也予哂斯世之醫惟集古方香附勝金丹爲女人開鬱調經之要藥殊不審古今虛實之異古人氣實故可用香附開導香附味辛性燥但能開破而已多用之大耗氣血虛者愈虛病者愈甚而於滋補何有哉今世

十婦九虛非補不可再用香附以耗之寢成怯弱之證是辨之不早則危殆而難痊矣○婦人經脉不調或氣血兩虛而身體素弱者宜服此以調養之○經不通者服一料即通不調者一月即調○素不孕者服一月即孕○胎前間用一服則胎固而安○産後用一服以童便酒化開調下則無壅滯血運之候○多服之補虛活血凡治産後諸病極穩○若急欲取效以酒調化服

烏鷄丸　一三九　治婦人羸弱血虛有熱經水不調崩漏帶下骨蒸不能成胎等疾

烏骨白毛公雞一隻重二斤半許者閉殺之去毛臟外用艾葉四兩青蒿四兩切碎納一半在鷄肚內以小酒壜一個入鷄并所剩蒿艾用童便和水灌令沒雞二寸許煮絕乾取出去骨餘俱同搗如薄餅焙乾爲細末聽用

南香附去毛淨一斤　分四分用米泔童便酒醋各浸一分春秋二二日夏一日冬四日取出晒乾畧炒

人參　熟地　當歸酒浸洗　生地

川芎　白芍　各三兩　黃芪　白朮

川牛膝　柴胡　丹皮　各二兩

知母

鱉甲醋浸炙黃三兩　白茯苓三兩半　秦艽一兩半　黃連炒

地骨皮　貝母　玄胡索　乾薑炮焦各一兩

右俱爲末用酒醋各半煮糊爲丸桐子大每服五六十丸漸加至百丸溫酒米飲任下忌煎炒辛辣等物及莧菜

又烏雞丸百四十

熟地　當歸　白朮　山藥

山茱萸　棗肉　柿餅　蓮肉各四兩

黃芪蜜炙三兩　鹿角膠　狗脊　杜仲

枸杞　蓮鬚　香附　阿膠

川芎各二兩　烏藥一兩半

右藥製淨用烏骨雞一隻悶殺之乾去毛去雜連骨椎碎用酒醋各半同藥煮熟去骨烘乾共爲末即將餘汁少入麪打糊爲丸任意用引送下

唐氏烏鷄丸一四一

人參　懷生　懷熟　青蒿子去梗

香附四制　鱉甲各三兩　白朮　棗仁肉

枸杞　麥冬　雲苓　地骨皮去骨

丹皮去骨　白芍各二兩　歸身二兩半　川芎

甘草各一兩

右先將諸藥備完聽用乃取絲毛烏骨白公雞一隻約重一斤許者撲倒去毛穢頭足腸雜不用將雞切作四塊先以鱉甲鋪銅鍋底次入雜葯以免焦腐漸漸加童便約至斗許煮至極爛撈起晒乾爲末將鱉甲去裙并雞骨俱以原汁醮炙至乾爲末同前藥煉蜜爲丸桐子大每空心用清湯送下百餘丸

秘方 烏雞煎丸 一四二 治婦人百病血氣虛勞赤白帶下

人參 官桂 地骨皮各二兩 茯苓二兩

黃芪蜜炙 當歸各六兩 生地 熟地

香附各四兩

右將烏骨白雞一隻男用雌女用雄籠住將黃芪末和炒麪丸如芡實喂雞二七日將雞縛死乾撏去毛并腸雜令淨槌碎其骨八前葯於腹內縫密用酒醋各一瓶煮一宿取去骨焙乾爲末用前汁打麪糊丸桐子大每服五六十丸空心鹽湯下

萬病丸 一四三 治月經瘀閉臍腹作痛及產後癥瘕等病

乾漆炒烟出青白爲度 牛膝酒洗焙各一兩

右爲末生地黃汁一升用砂鍋慢火熬膏充桐子大每服二十九空心米飲下

以下通用方

四君子湯一四四　方在補陣一

治脾肺氣虛諸證

六君子湯一四五　方在補陣五

治脾胃虛弱嘔吐吞酸等證

五味異功散一四六　方在補陣四

治脾胃虛寒飲食少思　方證

補中益氣湯一四七　方在補陣三一

治勞倦傷脾外感不解寒熱瘧痢氣虛不能補血等證

四物湯一四八　方在補陣八

治一切血虛勞弱之病

八珍湯一四九　方在補陣十九

治氣血兩虛調和陰陽

十全大補湯百五十　方在補陣二十

治氣血俱虛補救元陽

歸脾湯一五一　方在補陣三三

治心脾虛損

人參理中湯一五二

溫中補脾胃虛寒諸證

逍遙散一五三　方在補陣九三

治肝脾血虛鬱怒傷肝等證

加味逍遙散一五四　方在補陣九四

治肝脾血虛發熱等證

七味白朮散一五五　方在小兒七

治虛熱作渴

六味地黃丸一五六　方在補陣一二一

壯水制火之劑

八味地黃丸一五七　方在補陣一二三

治命門火衰之劑

薛氏四神丸一五八　方在熱陣一五二

治脾腎虛寒泄瀉

五積散一五九　方在散陣三九

治感冒寒邪

參蘇飲百六十　方在散陣三四

治四時傷寒感胃

人參敗毒散一六一　方在散陣三六

治四時傷寒瘟疫

當歸六黃湯一六二　方在寒陣六五

治血熱陰虛盜汗

柴胡清肝散一六三　方在寒陣五九

治肝膽風熱瘡瘍怒火寒熱

梔子清肝散一六四　方在寒陣六十

治肝膽三焦風熱

八平散一六五　方在寒陣百十五

治藏府秘結小便赤澁

五苓散一六六　方在和陣一八二

治小便不利

犀角地黃湯一六七　方在寒陣七九

治心火動血及斑黃瘡疹

導赤散一六八　方在寒陣一二二

治心火及小腸熱秘淋澁

桃仁承氣湯一六九　方在攻陣五

治瘀血小腹作痛其人如狂

玉燭散 一百七十 方在攻陣二十四

治血虛有滯經閉不通

腎著湯 一七一 方在熱陣百三十

治腎虛身重腰冷

舒筋湯 一七二 方在和陣七七

治產後血滯作痛

麥加散 一七三 方在和陣二五二

治產後口吐涎沫不省人事

加味小柴胡湯 一七四 方在散陣二十

治乳母肝火發熱

良方蜜酥煎 一七五 方在補陣六六

補虛潤肺止欬嗽

柴胡名膏湯 方在散陣二三

治小陽陽明外感挾火發熱頭痛

都梁丸 一七七 方在散陣七七

治胎前產後傷風頭痛

瓜子仁湯 一七八 方在外科一六四

治產後瘀血腸癰腹中疙痛
子和通經散一七九　方在攻陣四六
治氣逆經閉
二神散百八十　方在寒陣八七
治吐血血崩下血
小薊飲子　方在寒陣百二
治下焦結熱漫血崩淋
海藏愈風湯　方在和陣二二七
治一切失血及產後搐擲

鎖精丸一八三　方在固陣二六
治白濁白帶
青娥丸一八四　方在補陣一四五
治腎虛腰痛
獨參湯一八五　方在補陣三六
治諸氣虛脫
奪命散一八六　方在補陣三七
治陽邪傷氣暴脫煩燥發渴

全書卷六十一終

卷首題目
卷首題目 一 人四 古今醫統大全
卷首題目 一 人五 古今醫統三
卷首題目 一 人七 古今醫統三
卷首題目 一 人六 古今醫統三