外祥集成

四十六

漢書門
類 一二七
號 五
函 二
架 七
冊 五〇

内閣文庫
和書
類
號 四五〇二七
冊 五〇
架 二十

内閣文庫
番號 和 45027
冊數 50 (46)
函號 196 50

国立公文書館
National Archives of Japan

大學東校典籍局之印

外科集成卷四十六目録

瘻瘤篇四十八
瘻瘤主治方
瘻瘤外治方
胎瘤主治方
瘰癧篇四十九
瘰癧主治方
瘰癧外治方

修澤舍活板

結核主治方
諸瘻主治方
諸瘻外治方

痔漏篇五十

痔瘡主治方
痔瘡外治方
痔漏主治方
痔漏外治方

脫肛主治方
脫肛外治方
腸風主治方
藏毒主治方

修澤舍活板

国立公文書館
National Archives of Japan

外科集成卷四十六

果嶋道樞正弘編輯

官醫瘍科

瘻瘤篇四十八

清肝蘆薈丸 治惱怒傷肝致肝氣鬱結獨瘤其堅硬色紫壘々青筋結

若蚯蚓遇喜則安遇怒則痛者服之

川芎當歸白芍生地酒浸搗膏各二

瓦粉炒瓦蘆薈昆布海粉宜草節牙皂

煎連翹各五錢為末神麯糊為丸如梧子大每服八十丸白滾湯

量病上下食前後服之正宗

修澤舍治板

芩連二母丸

治心火妄動逼血溢騰外受熱涼經為血瘤其患後緊微紅軟硬間雜皮膚隱隱纏如紅絲皮破血流禁之不住者五服黃連黃芩知母貝母川芎當歸白芍地骨皮各等分甘草減半角地骨皮各等分甘草減半右為末側柏葉煎湯打寒食麵為丸如桐子大每服七十丸燈心湯送下或作劑服之亦効

通氣散堅丸

聚結為瘤色白不赤軟而不痛堅絲陰陽失度隨喜怒消長者宜此陳皮半夏茯苓甘草石菖蒲枳實炒八參膽南星天花粉桔梗川芎當歸則母酒附海藻黃芩酒炒各等分右為末荷葉煎湯調丸如豆大每服一錢食遠燈心二寸浪泡湯送下紅

順氣歸脾丸

治思慮傷脾致脾氣鬱結乃生肉瘤軟如綿膠似饅脾氣虛弱日久漸大或微疼或不疼者服陳皮貝母香附烏藥當歸白朮茯神黃芪酸棗仁遠志人參各一兩木香甘草各二錢右為末給歡樹根皮四兩煎湯者米糊丸如桐子大每服六十丸食遠白滾湯送下正宗

調元腎氣丸

治房慾勞傷憂恐損腎致腎氣弱而骨無榮養遂生骨瘤其堅硬如石形色或赤或不紫推之不移堅貼於骨形體日漸衰羸氣

血不榮肉腐枯槁甚者寒熱交作飲食無味舉動艱辛脚膝無力看井服之惟生地消者煮搗膏四兩山芋肉四兩桑牡丹皮茯苓各二兩人參當歸牛膝澤瀉爲末各一錢白蜜丸如梧子大每服八十丸空心溫酒送下忌甘蘿蔔火酒房事正綜

海藻玉壺湯

治瘿瘤初起或腫或硬或赤但未破者服海藻貝母陳皮昆布青皮川芎當歸半夏連翹甘草各一錢海藻五分木二

鍾乳二八分量病上下食前後服之風服此門藥餌先斷厚味不葷次宜慈痛心者爲妙正綜

活血散瘿湯

治瘿瘤已成日久潮大無痛陳皮川藭半夏熟地人參茯苓牡丹白芍當歸白芷甘草節五花見血木香甘草各一錢紅分青皮肉桂各二分水二鍾煎八分量病上下食前後服之風服後飲酒一小杯正綜

六軍丸

治瘿瘤已成潰者不論年月新久并五服蜈蚣去頭足蟬脫全蝎姜蚕炒蔴夜明砂穿山甲以上等分爲末糊丸如黍米大硃砂爲衣每服三分食遠溫下忌蔥蒜炒白漸河消正綜

琥珀黑龍丹

治五癰六瘡不論新久初未破者並宜服之琥珀一兩血竭二兩乳香一錢以上各為細末麝香三錢麝香一錢蜜丸一錢重金箔為衣晒乾密收每服一杯量病上下食前後隨用美膳壓服如患在下部服後隨用美膳壓之

十全流氣飲

治憂鬱傷肝恐慮傷脾致脾氣不行逆於內裏乃生氣癆肉溜皮色不變日久漸次沉重服此藥

陳皮赤茯苓川芎當歸白芍各一錢香附八分青皮六分甘草五分木香三分槟榔二錢枳殼二錢木二錢煎八分食遠

分食遠服準繩

清上消癰湯

治痰火氣血鬱結作核成瘤脉弦而滑在上部者見痛玄明粉陳皮半夏薑製黃連海藻我朮川芎香附青黛白茯苓石薄荷煎服準繩

除濕解下湯

治濕熱鬱結血氣凝滯作核成瘤在下部者海蘇黃柏三棱茯苓附子肉桂皮梔子炒連翹拱

消癰散

一錢治各瘻海藻龍膽草甘草半夏各小麥麵一撮附子一分抓根二錢黃芪各五

用冰糖水調必效無情

化瘿丹

治諸瘿海藻半夏桔梗各三錢甘州陳皮各一錢茯苓五錢水煎服

陷腫散

治胥瘤石癭瘤烏賊魚骨乾姜琥珀英石硫黃紫石各一錢白石英各二分鍾乳附子各三分丹參八分水煎服十劑全消韻

消瘤丹

可消諸瘤白水二兩茯苓十兩人參三兩陳皮三錢生甘草一兩薏仁炒黃澤瀉半夏各五兩右為末米飯為丸常服自消其虛

沈香化氣丸

消氣瘤沈香枳殼檳榔各一兩木香人參香附各二兩白茯苓茯苓天花粉各四兩白水貫芪各八兩附子五錢各為細末蜜為丸每日服三錢一丸全消藥

人參化瘿丹

治瘿瘤海帶海藻蛤粉昆布上四味皆焙澤瀉炒連翹各一兩猪靨羊靨即猪羊腎乃虜中之卵也各丁香別片焙乾右為末蜜丸芡實大食後噙化一丸月三個且瘿瘤多用昆布海藻海帶鹹軟堅之藥治之居參

舐掌散

治瘿海藻海帶連翹各一兩右為末取鵝卵清三分之二止藥空傳一方海藻海帶貝母蓬朮青鹽等分為末蜜丸彈子大噙化嚥下日三丸忌

神効開結散

治瘰癧皆效沈香二錢本香三錢陳皮四錢真珠四十九粒火煅存厚肉子生猪項下喉龍系一枚如棗大微煨色紅有四十九粒瓦上焙乾右為末每二錢臥時冷酒調和徐徐嚥下輕者三五服效重者一料全愈入門全

破結散

治五瘰瘰大如茄子潮熱形瘦百方去松蘿代真桑寄生有人生瘰瘰即海藻散堅亦也為不效得此方服三五日其瘰自消散而愈

治瘤方

統治各瘤神效但不可久日久之瘤根細最效水銀一錢兒茶二錢共研至無星為度加入冰片二分再加入麝香五厘再研又入硼砂五厘再研不見水銀不可用此藥敷于瘤處肉瘤血瘤粉瘤俱化為水約二日必消盡然後服消瘤丹每用一兩滾水吞服不拘時如瘤膏之瘤內外二法俱不必用蓋二瘤無害于人不必治亦不必治也奥當

銀銹散

治初起血瘤水銀輕粉朝腦鏡鏽各一錢兒茶三錢黃栢二錢水片三分各為末共研水調塗患者

内托外消

治内瘤血瘤麻瘤蕃瘤瘰癧生瘰水銀一兩兒茶二兩共研

至無星處反冰片一錢輕粉三錢麝香五分又入硇砂五分不見水銀始可用以水調藥敷于瘤處瘤枯脫盡然後再服湯藥用人參二錢白朮茯苓各三錢陳皮生甘草各五分柴胡八分白芍三錢或水煎服十劑未即脫落瘤亦不死治然亦不死石也脫瘤亦不必治必治必

枯瘤方

治瘤初起成形未破者及根蒂小而不散者白礬硇砂黃丹輕粉雄黃乳香沒藥硼砂各一錢班蝥二箇研極細糯米粥調和捏作小棋子片兵瓶中乾燥乾先灸瘤頂三炷以藥餅貼之上

用百草末水調蓋敷藥餅候十日外其瘤自然枯落次用飲口藥四味

秘傳飲瘤膏

治癭瘤枯藥落後用此搽貼自然肌完日血碰輕粉龍骨海螵蛸象皮乳香各三錢雞蛋十五枚煮熟用黃蜜油一小鍾以上各等細末共再研和入雞蛋油內攪勻每日早晚用草湯洗淨憑上雞翎蘸貼立效

治肉瘤方

男婦生不面上頭上千上即到去之日並人參各五分煎湯任手長十粒泡于日並人參之內敷日將半長切平頻搽應效如手取但不可治痰血之瘤也恐難收口臭之瘤

南星散

治風癇頭項面上瘤大如拳小者如栗或軟或硬不痛不痒用此藥切有可輒用鍼灸多致不救至天南星大者一枚石細研調入好醋五七點拌如膏兜以細針刺患處令氣透却以膏藥攤貼覺痒則頻換貼取效幸勿

枯瘤膏

治六瘤瘰癧痔漏草烏四兩川烏四兩平礦石灰桑柴灰各一兩乾桑耳桑朽木各一碗石將罩烏頭乃烏桑耳桑朽木共燒成灰和礦石灰桑柴灰蕎麥稭灰一處裝入酒盛內以棕裹其漏竅用水二斗煎滚淋沖慢火煮濃以十碗取一碗為度以厚實磁器收貯密封瓶如用入

礦石灰勻點糊瘤頂上以濕紙數重貼藥上如法未乾不須貼若苦久藥乾以唾調塗直待干分黑腐以刀剪刮取之腐肉未盡又點又刮如怕剪刮者却用井金散點之以漸腐爛自去不用針刀復刮次膏藥貼之去盡腐肉為度準繩

井金散

治六瘤瘰癧大有神効土黃三錢硇砂生晒乾燥雄黃各二錢輕粉朱砂乳香沒藥各一錢麝香少許為末以唾調為稀糊塗瘤頂上唾濕紙用重蓋之發用黃蠟膏貼紙上間日一度如此上之無復漸漸折之後根韭葉如此上之無復漸漸折之後根拔出然有裂豐隆復自下來若腐肉

未去盡者挑針頭散不痛四圍肉上貼膏藥二日一換直待腐肉去盡為度

化瘤膏

治內肿脹起生瘤漸大如蔽一兩大黃川芎朱砂乳香黃芩黃連當歸白蘞各五錢吳茱萸二錢半右為末雞子黃調勻攤帛貼之類膠用艾丸灸丁壯即用醋磨出膿更用膏藥重貼二日愈

治面生瘤贅方

硫黃塗紙上剪如螺螄掩孔灸處一炷候瘤出膿如菉豆粉即愈

孔大貼所灸處

黃羅蘇甫作雄黃等分

五福化毒丹

治小兒福猶胎毒以及諸瘡痘疹傷風班疹日后生瘡發延蹙盛譫言頭熱夜無不寧渴弄坊玄參若梗赤各二兩人參黃連龍膽胡黃黛牙硝各一兩甘草五錢冰片五分硃砂三錢金箔二十張為衣右為末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷燈心湯化服及治產後餘血上攻口齒延出臭穢以生地黃汁化下亦和胃除煩渴竹葉燈心湯亦可用

瘰癧第四十九

治耳下至鈌盆或至胸上生瘰壓破如石動之無根者名馬刀瘡從手足少陽經中來也或生耳兩脇或已流膿作瘡或未破並宜治之當歸酒流黃芩連蒺藜連翹散堅湯

連翹散堅湯

茂酒炒京二錢細剉同廣茂酒洗二次微炒乾白芷各半兩土瓜根酒洗炒草龍膽酒洗各一兩紫胡根一兩二錢酒炒茶曲各三錢芍藥一錢乾姜一錢甘草六錢黃連酒炒蒼朮各三錢為細末煉蜜為丸如菉豆大每服一伯丸或一丸五十丸一錢水一盞半煎八分先浸半時煎去滓熱服臨臥頭低脚高去枕血瘀每服

作膏如藥留一口送服丸子服法如常安臥

升陽調經湯

治遶項下或至頰車生瘰癧若其瘡深遠隱曲肉低是思少陰脉經中來也足陽明經中來也

瓦子堅硬大小不等並皆治之或作傳奇水傳書俱作

丸服亦得外麻八錢連翹草龍膽酒炒桔梗黃連酒洗京三棱酒洗同廣茂酒洗炒各一兩細黃芪酒炒二次七錢半甘草炙半兩知母酒洗炒廣茂酒洗炒各一兩細黃柏酒炒二次七錢半茶酒炒六錢半作丸如櫻桃大每服一兩或一百五十丸一伯丸或一兩半作丸如綠豆大每服一錢半兩若能食大便硬可旋加至一至二錢水二盞先浸半時煎至八錢止

去浮熱服臥身脚在高處去枕頭飲一口作拾次嚥之留一口在發送下

凡子服藥畢臥如常也若馬刀瘡結硬如石在耳下

散脂潰堅湯

治手足少陽經中及瘰癧遍下頸或至頰輪堅而不潰在足陽明經中抗出或二瘡已破及赤腫不消皆治之

三錢白芍藥六錢黃芩稍八錢一半酒洗炒一半

少大便硬軟少意消息之柴胡四錢草龍膽酒炒黃芩酒炒知母炒瓜蔞根酒洗甘草各半兩甘草炙各二錢牛蒡子根各二錢連翹當歸各一錢

[illegible]

[illegible]

[illegible]

連黃柏胡粉而用之猴骨在上焦加黃連半夏在中焦加黃柏知母防己在下焦加酒製大黃少利之通而滋其邪盛者選用之類大便不通者加麻仁泥黃以潤血燥而大便不行者加桃仁以利之風燥而大便如羊糞者加麻仁以潤血燥而大便如羊糞者加桃仁以利之

炮附子乾薑煎服以局方半硫丸或加砂仁大抵加減皂角仁之類以苦寒證爲主

用藥之法不惟蒼朮一味服之多諸疾病人

氣素性弱者當去苦寒之藥補元氣補血補多元氣則

參黃芪甘草之類以補之

餘當飲正

氣短及不調血喘者加之黃芪護表毛實腠理及指血氣又實表補元氣乃瘡家之聖藥也真漏蘆升麻葛根草龍膽胡黃連一味減寸二味復足陽明本經藥也升麻能調中和諸藥瀉火益胃經藥也牡丹皮去腸胃經中之藥不可無者能散血結氣聚此瘡家之神藥也牡丹皮去腸胃中蓄滯宿血當歸身生地黃熟地黃能生血凉血聚血也白芍藥和夏月倍之其味酸其氣寒能補中益氣治腹痛如冬月寒症勿用因在大辛熱能散緩聚如已症勿用反用之此義因熱用之惑又爲陰寒者勿服其瘡用大平熟用之去之煩躁者宜用柴胡功同連翹玄參其瘡在少陽經物用柴胡無應不用見於味厥若

瘰疬堅硬甚者湧之膽軟堅也系三
稜廣茂二味痛堅硬甚者用之不硬
者勿用差活獨活防風三味少關子
足太陽證本頭項強不可回顧腰似
折頭似拔防風辛溫如焰焰能開正雖
無手足太陽經證亦當用之為能散
結去上部風邪故也益智仁如唾液
者胃不和也或吐沫吐食胃中無者
加之無則勿用麥芽消食健脾神曲
不消化者用之童便浸焙厚朴
加腹脹加之黃柏如有熱或跟腳無
力加之苑頭躁欲去水者非腎中伏
火也更互相之淨躁

柴胡通經湯

治日馬刀亦治瘰疬奬胡連

消腫湯

牛蒡炒各等分炒
治馬刀瘡柴胡黃芩各二錢黃連
錢半連翹三錢當歸尾甘草各一錢
紅花防風各一錢
盖煎至一盞去滓食後服此是攻裏內消又劑準繩

柴胡連翹湯

治男子婦人馬刀瘡柴胡連
翹知母酒製黃芩炒各等分
黃柏酒製生地黃酒製各三錢當
歸尾一錢甘草三分牛蒡子二錢
麥芽炒二錢
國五錢水二大盞煎至一盞去滓食

後稍恐時寒服之準繩

消堅湯

治馬刀挾纓猪當歸白芍金銀花三錢炙甘草二錢蒲公英赤茯苓五錢柴胡二錢天花粉二錢全蝎三個蜈蚣一條皂角刺自消如倘未破口服可消如日久未破本方加附子三錢五分火煅汁一碗分連服數劑亦消退皆

防風羌活湯

治瘰癧發熱者防風羌活連翹升麻甘草牛蒡子川芎荷葉酒浸甘草黄芩酒浸甘草黄連大黄水煎服虛者加人參當歸實者加

聖麥飲子

治瘰癧馬刀鼠瘻等力連年經久多不能速驗宜待歲月之久除也瘰癧

挾椰散

治瘰癧前胡赤茯苓牛蒡子炒各一兩人參枳殼炒沈香防風各半兩甘草炙二錢半右剉碎每服四錢以水一盞入生姜半分煎至六分去查空心及晚食前溫服半補

皂角煎丸

治風毒瘰癧皂角不蛀者三十挺內十挺炮黑十挺酥炙十挺用水一鍾煮軟揉取汁用何首烏玄參薄荷葉各四兩右為細末以皂角汁熬膏同煉蜜為丸如豌豆大每服三四丸沈後溫湯送下準繩

祛風丸

治風毒瘰癧何首烏蒸軟薄荷葉玄參各四兩為末精羯肉半斤皂角三十挺用半挺火燒欲過半挺酥多去皮半挺水浸取汁去滓石臼皂角水煮肉使爛細研和藥為丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒或薄荷湯送下

絳宮丸

大黃酒蒸紫沉各二兩川芎當歸酒洗芍藥仁蘆薈甘草芸薹子各一兩黃連酒浸荊星酒浸海藻酒洗各一兩半升麻羌活梗防風各半兩黃芩酒炒半兩右為末用神麯糊為丸已成加入麥一兩作膏用甘草半兩為末精羯肉半斤皂角三挺用半挺火燒欲過半挺酥煎和藥為丸如梧桐子大每服二十丸空心溫酒或薄荷湯送下

防風解毒湯

治風毒瘰癧無量不調勞嗽痰結腫或外寒內熱痰凝氣滯者並効

防風荊芥桔梗半兩房子連翹甘草各一錢

薄荷枳殼川芎各半錢

水二鍾燈心二十根煎八分食後服

宋正

連翹消毒飲

治熱毒瘰癧過食炙煿醇酒膏粱用致蘊熱腮項成核

天行赤熱腫痛不能轉側者效

連翹陳皮桔梗玄參黃芩赤芍當歸各一錢

山梔甘根麝香天花粉紅花各半錢

甘草大黃初起便燥者加之

二錢煎八分食後服有膿者加乳香一錢正宗

加味藿香散

治氣和漏癰外受風邪內鬱以致頸項作腫肩膊強痛四肢不舒寒熱如瘧及胷脇不利

藿香 甘草 桔梗 荆芥 白朮 茯苓 陳皮 柴胡 紫蘇 夏枯草各等分 白芷 厚朴 川芎 香附 鍾乳八分 食遠服 正方

滋榮散堅湯

治一切瘰癧惡物傷毒加硬腫痛毋分新久但未穿潰者並効

川芎 當歸 白朮 茯苓 桔梗 甘草 熟地 陳皮 白朮 香附 各一錢 甘草 海粉 貝母 人參 昆布 各五分 升麻 紅花 各三分 二連 薑三片 棗二枚 夏八分 食遠服 煎榮湖 貫各自汗盜汗去升麻

加入參 黃芪 歡食無味加藿香砂仁食而不化加山查麥芽胃脘痞悶加澤瀉 木香 蔻皮 嗽痰 痰氣不清加杏仁麥冬口乾作渴加知母五味子腫脹不寧加黃柏 遠志 棗仁 驚悸健忘加茯神石菖蒲 有汗惡寒加薄荷 手足無力惡寒加茅朮 藿香 女人經事不調加茯苓 牡丹 皮 腹脹不寬加厚朴 大腹皮 正方

益氣養榮湯

治抑鬱或勞傷氣血或四肢頸項筋絡結成果丸如黃珠狀謂之痼癧此患皆繇思慮太過神氣受傷乃勞伤所致得者也其患或軟或硬或痛不痛或黑鋪發熟或潰而不斂者宜人參茯苓陳皮

見母香附當歸川芎黄芪熟地白芍
合一錢甘草桔梗各五分白朮二錢
薑三片棗二枚水二鍾
煎八分食後服正午

玉燭散

治瘰癧自消和血通經當歸芍藥
大黄甘草熟地黄白朮硝黄芩川芎
各等分石為粗末每服三錢水一鍾
生薑三片煎至七分去查溫服日進
一服七八月效準繩

羌活連翹湯

治瘰癧初發寒熱腫痛防風
羌活連翹貫衆草柴胡混布
枳殼黄芩酒炒川蒡牛蒡子甘州金
銀花石薄荷水煎服次以通毒散行
之以化堅湯消
大效準繩

小犀角丸

常服除去根株截其源流應効
如神諸癧並五服犀角清及
陳皮各一兩黑牽牛一兩半麩
連梗半兩石為細末用皂角二條去
取核子炮熟以布絞取汁一碗許又
用新薄荷二斤研取汁同熬成膏以
前藥末為丸如桐子大每服三十丸
連煮麩湯食後服間以薄荷茶調服
組

開鬱散

治肝膽鬱結之瘰癧神效白芍五
錢當歸二錢甘草二錢柴胡一
錢炙甘草八分全蝎三個白朮炒一本
錢炙甘草八分全蝎三個白朮炒一本
錢乳香附沃麥草各二
寸剉用愈奥結

培土化毒丹

治脾胃多痰瘰癧難消之

神曲炒 麥芽 各六兩 炙甘草 一兩 白朮 二兩 茯苓 二兩 陳皮 一兩 川芎 一兩 蘇葉 八錢半 白芷 七錢 木香 三兩 各 通一兩 金銀花 十兩 天花粉 三兩 各 爲末蜜爲丸一服一錢須斷色慾三月奥旨

消慾破結釀

治瘰癧遍頸項連耳

芥子炒一兩 白朮 二兩 附子 二兩 白芷 一兩 白蒺藜 炒五錢 全蝎 五個 不去頭足尾 分紫貝天葵根八兩 洗將前六味各爲末將天葵煮汁一碗同入在買酒內浸一日後取出用酒二十加煮三炷香三日後取出服三錢早晚各服三錢

升麻散堅湯

治瘰癧遍頸項至頰連耳

升麻 陽明核深遠隱曲內底入屬足少陰腎府甘草 桔梗 川芎 當歸 黃芪 當歸各五分有痰加天花粉 水二鍾煎八分食後服再用上藥加龍膽皇葛根川芎白芍芎藭草連翹二錢煎爲末蜜丸藥豆大每服百丸寅酒嚼嚥不拘

加味敗毒散

治風熱上壅頸痛或因怒氣憎寒壯熱即別所敗毒散加

朱芳 玄參 如服四五劑不效

尅効散

治瘰癧赤小豆 各四兩 木鼈 四十九箇不去翅足炒 粳米 炒 甘草 各四兩 木鼈 炒粳米養榮湯準備

内閣文庫

共錢石五味研為細末物服一字次服半錢次服三字又次服四字而章柳根湯送下空心服以小便淋瀝併作滴為效惡心嘔吐黃水無効甘草瘡日自消矣綱目

三聖丸

治瘰疬瓦香乃研一錢右香立方粳盤蚕十箇廣粳湯浸研爛如泥和前藥令勻丸如菉豆大每服五七丸食前溫酒送下日進三服五七日外覺小便淋瀝是藥之效或便不如常筋膜之狀是病之根也慰混麸毒食補目

連翹湯

連翹麥各一分大黃三兩甘草二兩右剉麻服一兩水二碗煎

一盡半早晨後已時服在頭面遍濕足少陽經服藥十餘日後可形瘢痕泣九分二壯服藥不可往至五六日方効加大黃木通貝母各五兩雄黃七分捩榔平兩減甘草不用前藥為細末熟水調下三五錢綱目

必勝丸

治瘰疬不動年深月近及腦後兩邊有小蕊塊連復數箇兼勞瘵腹內有塊鯽與一箇去腸並子雄黃一孤雞子大硇砂二錢已上二味並入在鯽魚腹內仰安奠于炭火上燒烟盡取出蚯蚓全者一條逢木乎而梔子五箇皂角二挺已上四味並燒存性研麻油五箇去殼盞上燒黃明膠

三文左爲末別用皂角二挾去皮捶碎以水三碗揉去滓煮清漿肉四兩研成膏和藥末丸如菉豆大硃砂爲衣溫酒浸晨下十丸一服至晚看肉充脊手若項有五箇則以五服藥取之視其竹生多少以爲服數既可更進數服細用

白花蛇散

發熱或痛或不痛白花蛇酒浸軟去皮骨焙乾二兩犀角光半兩黑牽牛半生半炒青及白丑各半兩右爲末每服二錢加麝香半錢研勻五更糯米飲調下已時利下惡物乃瘡之根也更服十餘日再進一服忌發風蒸熟物如已成瘡一月可効神驗細用

神龜散

治瘡腎不交瘰癧久不愈者神效

大龜一個一雌一雄逐志一兩漆各三兩山朱萸四兩肉桂一兩白术炒五兩蒼术二兩熟地黃各十兩參各四兩夏枯草五兩各爲細末將大龜飯鍋蒸熟火焙乾爲粉每用蜜爲丸如梧桐子後送茶三錢一日早晚日滾水各一飯料必全愈其藥

六丁神散

治瘰癧甚丁香六枚或五枚半錢甘草一錢苦參不拘五分磨刀泥青石一名龍粟粉赤小豆白殭蚕去系嘴炒各一錢大蜈蚣七箇去頭足炒右六味共爲細末每服一錢重空心用無灰酒調下神効

雞鳴散

治氣瘧發痛及熱毒蒂核或多頃間熟血少寒者牽牛一兩胡粉一錢大黃蒸二錢朴硝乘成粉各三錢雞鳴出井花水石為細末每服三錢調服以利為度勿再服

法製靈雞彈

治瘰癧刀水注在鬢發間髓上蔽開些小入藥在內紙封固七箇去頭翅足方將無手一箇頂上蔽了放飯上蒸熟取出去殼劫出去藥五更空心和米飲嚥服後小便通如米汁水狀如膏即驗過如大便不通却服琥珀散三二貼催之然後當服後却將此散與連翹乃相服所藥後常須服杜薄荷皂角炙蛀蟲去皮連翹何首烏蔓荊子黃芩各一兩右為末好豉仁兩半以米醋煎淋瀝鼓淹令軟研如糊和丸如梧桐子大每服三五丸食後熟水下且

妙靈散

治氣瘧二錢半藤何首烏各二兩海藻二兩海帶青葙子各半兩右為末每服三二錢食後溫酒調下半錢

內消連翹丸

治瘰癧連翹三兩漏蘆胡桃仁夏枯茂各一兩半瓜蔞子王瓜根射干澤蘭沙參白酒糊為丸如梧桐子大每服三五丸空心食前塩酒下準繩

薄荷丹

解瘰癧風熱之毒但小便去宜毒

一服兩服雖愈常服之準親

四聖散 治瘰癧服白花蛇散轉利後服此藥調之永法其根海藻石決明煅各等分右為細末每服卷指撮麥德二錢用米湯調下清水盞為度詳繩

海菜丸 治癧瘰久頸項正交接名蛇蟠瘰微燃去絲嘴右等分為細末海藻菜蕎麥炒白蜜蚕旋炒研篩湯泡用取肉減藥用竹泡梧桐子大每服六七十丸食後臨臥米飲送下其毒自大便內泄若與淡菜連服為煎益淡菜生於海藻上亦治低病悉宜腐雞羊消麵日五六服準繩

蟾酥膏 蟾酥如大豆許白丁香十五粒麝香少巴豆五粒麝食麩些少右各別研如作千膏再研煉蜜為丸如綠豆大每用一丸或二三丸納入針竅中如膿未盡再用數丸以膿盡為度詳繩

綠雲膏 黃連大黃黃芩玄參黃柏木鼈子去殼各一錢石膽研末用香油一盞同熬焦色去藥入淨松香五兩再煎成膏瘡入火中拔令金色入鉢再熬一宿綿濾去祖右用竹篦帶溫攪勻然後加當歸貼無治瘡口不乾加乳香沒藥輕粉尤妙準繩

金寶膏 去腐肉朽肉不傷良肉新肉長來次五碗用沸湯十碗淋汁先四厚

紙一層皮紙二層放羅底次置灰於上沙土紫山兒二兩煨研飛硇砂二錢杏仁七粒同研細生地黄二兩辰砂一錢物箱別研麝香各半錢右將灰江漉巾下鍋煎濃下甲末候焦乾一盞下麝香次下粉霜乾及九分下辰砂候沸鼎下炒石灰末以成塊子即收入小鑵內勿見風準繩

龍珠膏

龍骨五兩 真珠五兩 辣椒根半兩 海藻二錢半 蘇木半兩 右切量水二斗碗煎二碗去查又用桑柴灰石灰二碗半以草紙兩層皮紙兩層放鑵底次置灰於上用煎湯熱淋取灰汁加硇砂許澄清入鍋內熬成膏用巴豆霜白丁香石膏麝香輕粉硇砂礞子收貯取傅核上再傅即去舊藥併腐肉新藥其核即潰而愈根小直但只塗藥於根上其核自潰

樟腦丹

治瘰癧潰爛達至胷前兩腋塊如茄子大或準至兩肩上四五等不能瘰者治之其效如神樟腦三錢雄黄三錢為末先用荊芥根下一段黑以針刺一去血再洗三日次點發剪碎煎沸湯溫洗良久看爛破處紫用樟腦雄黄末麻油調掃上出水泡再洗再掃以瘥為度專忌酒毒誤食根小直但只塗藥於根上其核自潰

治瘰癧未破方

治百藥不應者累效悉樹葉陰乾為末二分半即天甲白蝙蝠火焙乾為末二分半白花蛇燒為灰

敗瘰癧方

存性為末二分羊蜜蜂出筒燒為末
右將杏樹葉不用清水調刮四遍
任藥末調勻傅患處却將乾
用針刺孔貼藥上無氣者右用膠香海螵蛸貼
止刷之每一晝夜換藥一次如面上紙片
發熱服清涼飲子數日退明礬用水
虛外以米紙掩之一多而退未捻思
者蜂二十一箇蛇蛻七分平螵蛸
二味蝟午前收者右用香油四兩
切三藥入油內用桑枝
粉二兩用桑枝七條用文瓦火熬成膏
候冷出火氣七晝夜條瓦可用大紙
貼患處綱目

貼瘰癧方

用大鴨頭五箇火炮五箇生用
並去皮臟天皇炭二條半以坩
米醋二鍾煎炙醋乾為度一半焙乾
並去黑皮又用炒擂米一百六十粒
同研末以好米醋於火上略煎微
膠傳貼患處入蜜少許尤佳綱目

蝸牛散

治瘰癧遺毒未潰皆可貼蝸牛不
拘多少以竹簽穿丸上晒乾燒存
性右為末大小貼之一法以帶殼蝸
牛七箇生用取去肉入丁香七枚於
瓦內燒存性與因同研成膏用紙
花貼之綱目

粉金散

黃柏州烏等分為末蜜調傅之綱目

清涼散餅 山慈菇生用良薑等分石俱搗爲餅去汁卷之能散去寒熱或乃山慈菇磨調酒服大妙此藥太甚散癰如神細且

龍泉散 瓦粉龍泉粉炒即磨刀石上粉也乾石同爲極細末京三稜各半兩滑淨炒昆布廣茂塗之用此法尤速綱目

奇功散 治瘰癧馬刀頑惡等猪野糞火乾一兩蜜陀僧無名異各半兩皂角乳香沒藥各三錢石蠶用鹽泥封固炭火煅之去泥取出同藥五味研爲末加麝香少許用清油調勻曼敷生濕即乾換其功神效淨繩

蝙蝠散 治癧多年不癒蝙蝠頭各一箇石同熟作灰撒上黑豆煅其灰膏化膏爲細末濕即乾換乾則油調傅內脹五倍連殼燒存性石爲細末破者香油調傅淨繩

螺灰散 田螺連殼燒存性石爲細末破者乾貼末

神聖換肌散 生瘰癧頑瘡白蕈蚕二錢白足艸烏頭青黛各一錢半砒霜空蟹蛻去翅研極細末乾換藥蓋護其惡肉化膿水準蠅

生肌乾膿散 治瘰癧馬刀膿汁不斷者黃連明丹降真香煅存性白芨海螵蛸五倍子炒黑芸香各五錢輕粉五分石爲末用漿水洗次撒此末外貼膏藥淨繩

如神散 治瘰癧已潰腐肉不去瘡口不合者日用煅三錢松香熔化預地上一兩右末搽少許於瘡口上外貼膏藥乎稱

消風化痰湯 治痘核因風邪鬱結而附子藥連翹天麻甘草通絡一錢南星半夏赤茯苓天門冬牛蒡子蒼耳子金銀花皂角各五分全蝎陳皮各四分甘草毛分白芷防風荒活二分治到作一貼薑五分水煎服

開氣消痰湯 治胃中胃脘至咽門窄狹如線疼痛及手足俱有核如胡桃桃者結梗香附宮姜參各一錢陳皮片芩枳殼各七分桔梗柳前胡半夏炒實羌活荊芥射干威靈仙各五分甘州四分木香三分右到作一貼入姜三服医聚

含化丹 治耳項結核酒蒸大黃白殭蚕胃藥牛膽南星各等分為末蜜丸

彈子大食後嚥
服一丸以門

内托白斂散

治腋下痰核因消怒氣發腫
連蓋各二錢白
芷白蔹炮本酒炒瓜
蔞仁各八分川
芎天花粉乳香各七
分防風桔梗柴
胡各五分白蒺藜生
甘草各四分右
治痰核瘰癧氣
久不消海帶青皮貝
母陳皮各等
分右為末蜜丸彈子
大食後嚥化
一丸嚼且
治咽喉結核
頸項不得回轉
兩腋下或有
各一錢陳皮枳
塊如石硬南星半夏
連連常赤芍藥
防風獨活白附子蘇
子蓬莪蔓荊子木通甘草各五分若
別作一服姜三片燈心一團同煎服
春

消解散

消核丸

治頸項耳後結核三五歲漸漸
紅不腫不痛者橘紅鹽水拌焙
赤茯苓大黃酒炒梔子炒各八錢牛夏麴
拌牡蠣煅童便淬別研天花粉瓜蔞
仁桔梗各七錢白姜蚕炒六錢牛甘
草節四錢右為末湯浸蒸餅和丸
綠豆大每服五丸十丸
春

空青商陸散

治狼漏如發於頸腋無頭有腫大瓜得之憂恚氣上不得下其根起然欲盆之狀連延耳根在肝空青主之商陸爲之佐方空青蝟腦各二分蝟肝一具乾川芎各分獨活黃芩驚伸歸人蓯蓉陸班猫于姜地膽當歸各等一分蜀椒三十粒去子六味治和飲酒下方寸匕日三服十五日服之手全

荏子指梗圓

治蠼蛄漏始發於頸項狀如瓜某實尋不去其根在大腸荏子王之指梗爲之佐五莊子龍骨各半兩附子一兩蜀椒百粒荏子沈桂乾姜礬石獨活芎藭各一分右下味爲末以束二寸取合

搗醋漿和丸如大豆溫漿下五丸加至十丸每服

礬石防風散

治蛇蟲傷毒此蟲得之食中有蛇蟲毒不去其根在腎礬石主之防風為之佐雌黃獨活胃氣班猫白芷松脂芍藥海藻蠹皮各三分甘草瓜蒂各四分蜀椒百粒石斛一錢匕水味治下節飲服一錢匕七日三服

理骨知母散

治鼠漏蛇蟲發於頸無頭尾如食有鼠毒不去其根在胃理骨主之知母為之佐瓜瓣狐人參熟肉此得之甲山鱉殼甘草蕤仁乾姜各等分右八味治下節飲服方寸匕日三服

雌黃芍藥散

治瘰癧漏蛇毒於頸有根不水濕結髮汗流於頸其根在腎雌黃主之芍藥為之佐雌黃芍藥茯苓續斷乾地黃空青礬石乾姜桔梗蜀椒恒山虎腎狸肉烏賊班猫蓉下各一分附子一兩右十七味為末蜜丸如大豆酒服十九日二千丸

班猫白芷圓

節轉脈漏始發於頸轉若螫傷乳振黑熱此得之因驚臥失枕其根在小腸班猫主之白芷為之佐班猫白芷綠青大黃各一分升麻鐘乳甘草防風地膽續斷麝香礬石各一分入參當歸桂心各二兩白朮麥門冬各二兩右十七味蜜丸如大豆酒服十丸日二丸

加味蠟礬丸

治久新諸漏象牙五錢蜜蜂房自然殭蠶蛇退燒血竭末各三錢乳香一錢甘草二兩右為末醋糊丸如梧子大溫酒下二三十丸入四

內生肌丸

治漏瘡枯白礬鹿角屑胎麻各一兩為末蜜丸梧子大溫酒下三十丸空腹服

乳癰雲母膏

治漏瘡等山甲一百片蛾蛾粉取甲為末四兩乳香末一錢麝香末半錢炙和雲母膏丸如貼和丸梧子大溫酒下三十丸直指

骨碎補丸

治痢漏骨碎補補骨脂熟地黃牛膝杜仲萆薢川當歸續斷石斛桑寄生芡石解一兩白芍藥川芎兔絲子沙參淫羊藿防風獨活天麻各一兩半右為末煉蜜丸空心鹽湯下準繩

桂附丸

治氣漏諸瘡桂心附子炮裂木醋浸再炮三五次去皮臍厚朴薑製茯苓各一錢石斛炙甘草各一兩木香二錢半乳香研一錢石膏細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下二三十丸丹溪云精耗孤冷只因嬰孩時乳哺過與桂附丸此冷只因產久不合風冷乘之血氣不潤而成也厚朴雖溫其薄衛尤速恐不若參芪茂倫以陳皮麻乎與病情相得再方治谷漏諸法應加減加味十

全湯隨時令經絡加減用之為宜

又虛甚者宜參水飲芪膏丹

治九漏方

蜜青商陸知母狸骨牡蠣防風
雞黃甘草赤石脂茯苓
分右十八味為末蜜丸如大豆以酢
服三丸日三次知四十日愈不出日
一丸生日二丸
後漸漸增加
一日內慎房室一方渴飲酢服

治諸漏方

班猫四十枚或四十九枚元首
蝟蚣一升半羊蹄角牛黃各桑枝大石
八味為末蜜丸如梧子大飲服二丸
須更多作酸棗粥冷飲之病從小便
出尿盒中相視如有蟲形狀又似膠
汁其病乃止間日一服飲粥如常小
弱者隔三四日候無蟲出強羸猶將
息油臟一切器物皆須灰洗乃作食
子余

曾青散

石附子各半兩沾蠻根露蜂房當
歸防風芎藭黃芪柱子參
二兩細辛兩蜀椒根皮甘草各
五枚右十味為散以酒服一方寸匕日再夕飲

內塞散

拘杞瘦益久不差人參黃芪當歸
茯苓防風白芷桔梗川芎遠志厚
朴官桂赤小豆甘草附子五錢
炮一箇右為末每取二錢溫酒調下

温解散 治漏瘡散風令蒼朮厚朴陳皮藿香半夏麻黃白芷細辛各一錢川芎白芍甘草各二錢官桂白蔻各七分右剉粗一貼入薑三東二水煎服得效

牽牛酒 九漏瘡中惡氷目大腸出黑牽牛以水二錢入楮腰子內以線扎濕紙包煨熟空心細嚼麄酒送可入門●一名猪腎消夫水屬腎也腎虛氷溢則滲漏瀉行腎之氷無如黑牽牛取細末入猪腎服之則借腎入腎而得其復恐水已泄則不復滲漏矣直指

馬齒莧膏 治一切瘻瘡馬齒莧陰乾臘月獨根先切溫泄清洗拭乾搗爛各等分右為細末以臘猪脂和然後以藥傅之日三度

黑靈散 治漏瘡壯蜥蜴粉硫丹硫黃研各一為細末入髮灰一分麝香少許和勻傅之一分麝

陷脉散 治漏瘡及二三年瘻瘤或大如盃盃久不癒致有漏潰令人驚惕臥內消盡或堅或軟或潰令人驚惕臥保不安體中發痛愈而復作乾姜炮號明矾研大黃附子炮去皮各一兩丹參七錢半石硫黃研半兩右為末貯以瓷合盞盛切令泄氣若瘡混即傳熱即煎

豬脂和傅之以乾而度成肌不消肌這兩二兩益佳準備

附子散

治冷麻痛附子炮半兩川椒雄黃各二錢半麝香少許白凡七錢半細研各二錢半麝香少許勻再用清麻油調傅瘡上準備

雄黃散

治冷癰膏瘡口雄黃研百合蕾石灰各一分

石灰為細末研勻先用漿水煎甘草柳枝湯溫洗拭乾傅之

猪骨膏

治諸瘡月氣冷不差猪筒骨二箇敗鼠連去鬚爪末白芨研末各二錢半乳香研二錢半黃連研明者研二錢半鉛丹別研膏蠟各半兩右搗研熔蠟和為膏瓦拘貯傅之準備

治漏方

鍛落鐵屑狗頰車連齒骨炙虎糞鹿皮合毛燒為灰各等分右四味治丁瘡以猪脂和入瘡中須臾即易日五六度子金

蜂房散

治久年漏出膿水蜂房炙兩七錢半穿山甲焦龍骨各二錢半麝香少許右為末臘脂服調付之入膿脂

地膽甘草散

若浮沮漏始發於頭如雨指大熱欲臥不得之因思慮然其根在膽地膽主之甘草為之佐地膽雄黃乾薑須斷石決明菖蒲根龍膽各三分細辛二分大黃半分甘州一分四五度子金丁味治下節傳為日

地黄膏

治鼠漏瘻瘡復發及不愈出膿血不正右取黄牛脂中令小中氷猪脂或咀生地黄相淹和煎六七沸其滓棄之地黄膏傳上用桑灰汁洗去惡汁水日一易千金

雄黄黄芩散

治蜂螫腫如發于頸項羅三四日尖毒不去其根在脾雄黄生乃風毒之黄芩爲之佐雄黄芩各一兩蜂房一具茴香吳茱萸干薑各半兩蜀椒二百粒巴豆一百粒蜜丸如豆大一丸度甲石八味治下部傳瘡

五白膏

治鼠漏及瘻白馬屎白牛屎白猪屎白雞屎各一升漏蘆二所石六味各不石上燒作灰研細末各一升三合乳香一兩髮一兩節之以猪膏一斤極沸盡消乃內諸末微火煎五六沸藥成去滓瓶以塩湯洗新帛瓶然後傳膏若無瓶猶須湯洗日再若膏清當以綿裹上勿令泄風冷薄貼膏上勿令風入膏中令氷猪脂或咀生地黄相淹和煎

雄黃膏 治久瘻冷濕油髮沃黃蠟各五錢雄黃末硫黃末各二錢乳香油二兩和勻熬化候成膏貼之眞驗

洗漏瘡方 凡漏瘡孔中多有獗惡常須避風洗淨白芷露蜂房皮爲末乾膠末乾取東向石榴根皮爲末乾膠以殺淫蟲入門●洗諸瘡切忌生冰洗得效

熏漏瘡方 艾葉五倍子白膠香苦楝根右等分燒香法置瘻內坐其上熏之精效

痔漏第五十

防風秦艽湯 治痔瘡不論新久肛門墜重腹血作痛者無效防風秦艽當歸川芎生地白芍赤茯苓連翹各一錢柴胡甘草梔子地榆枳殼槐角白芷蒼朮各六分水二鍾煎八分食前服便秘者加大黃二錢正宗

加味四君子湯 治痔瘡色淡黃怠惰耳鳴腳弱氣之及一切脾胃虛弱不能攝血致便血不禁者弟中氣虛不能攝血致便血不禁者弟參白茯苓甘草各一錢炒各一錢炒薏苡仁各一錢炒黃芪各一錢炒白扁豆各一錢炒黃芪各一錢炒白扁豆各一錢炒薏苡仁

提肛散

治氣血虛弱胃虛脇等症則芎歸身甘草人參黃芪陳皮甘草各一錢升麻柴胡條參遠服直再煎服正參

芎歸湯

治便血或失血過多婦人產後血虛煩熱頭眩昏暈盜汗等症並妨川芎三錢當歸八分食前服自汗手足冷者加人參二錢正參

三黃二地湯

治腸風諸痔便血不止及面色萎黃四肢無力生地黃各一錢半黃柏黃連黃芩甘草防風人參各一錢甘草防風澤瀉地榆各六分馬槽二個水二碗煎五分食前服正參

當歸郁李湯

治痔失血苦痛不能忍者當歸郁李仁澤瀉牛地黃各一錢麻子仁研一錢五分正角一錢水二鍾煎八分空心服正參

粟殼散

治諸痔及腸風下血諸藥不止者五服之粟殼溫湯泡去內穰去蒂切蜜水拌炒一錢當歸陳皮蓽茇黃芪生地黃熟地各一錢黃柏黃芩人參蒼朮厚朴升麻各六分荷葉蒂七個甘草五分地骨皮一錢二分水二碗煎八分食前服頭為細末每服二錢空心溫服正參

五痔散 治五痔及諸痔猪去懸蹄甲治腸痔驚甲治牡痔猬皮治牝痔蛇退治氣痔右各燒存性為末每二錢入麝少許空心井水調下三服○一名五灰散五味各等分并心

神應散 治五痔黄牛角鰓一枚槌碎蚯蚓皮一撮牙皂角七箇柴山甲出片猬皮一兩刺猬皮一兩刺右各細剉入缸內黄泥固濟火煅通紅候冷細研為末臨臥時細嚼胡桃仁一箇如糊用好酒一盞送下便睡至五更時以溫酒調一錢至辰時更進一服下藥未三錢服盡效雖久病不過三服也效細且一服

槐角丸 治五痔久諸痔槐角四兩地榆黄芩防風當歸枳殼各二兩石為末酒糊和丸如梧子大空心溫酒下三丸至五十丸宜忌

神應黑玉丹 懸蹄二寸五隻牛角鰓三兩亂髮敗棕各二兩槐角一兩半苦楝根一兩二錢半雷丸脂麻各一兩右剉碎盛缸內火煅存性為末入孔雀膽五錢麝香二錢和勻酒糊和丸如梧子大先嚼胡桃肉一枚以溫酒吞下三五十丸空心宜忌

豹腸丸 治諸痔及久瘻脫肛下膿血黄瓜蔓猬皮各一箇胡桃肉七箇俱燒存性雞冠花二兩半甘附子天南星茯苓三味並生用枳殼訶子皮各一兩亜麻附子牛各五錢君爲綠礬白丹亜麻赤醋糊和丸如梧子大空心溫酒下三

五十九
得效

乾葛湯

治酒痔乾葛 枳殼 主麸 赤茯苓 生甘草各一錢 猪苓 黄芩 仁各一錢 麻黄 白芍各五分 右剉作一貼 黑豆百粒 薑三分 甘梅百箇 同煎服入門

加味香蘇散

各一錢 紫蘇 莖葉 陳皮 枳殼 川芎 檳榔 花 仁香附 炮 桔各五分 右剉作一貼 姜三片 棗二枚 同煎服入門 ●一名橘皮湯 得效

逐瘀湯

治諸痔通利大小便取下惡物 大黄 赤芍藥 枳殼 蓬朮 五靈脂 阿膠 赤茯苓 茯神 木通 甘草各七分 右剉作一貼 薑五片 棗一枚 同煎服入門

一貼薑五片 棗三枚 同煎服 直指

地黄丸

番花痔 缸砂 水浸半日微煨 一兩 孫本 白芍 用皂角末二錢側制 各四兩 連槐角子 各二兩 枝子 黄花地丁 各一兩 青黛 五錢 右為末用大柿餅肉為丸 桐子大 每服四五十丸空心清湯送下 久成

牛黄定痛丸

門外諸痔 牛黄 五分 胡黄連 黑一兩 密陀僧 四錢 枝子 炒黑 五錢 槐米 炒黄 一兩 為末 糊丸 黍米大 每服三分 臥時 槐花湯下 久成

百草丸 治痔瘡疼痛不可忍脉款日積氣血一兩黃連槐花地榆不限錢焙末糊丸如梧子大每服三錢清湯下次減

蕃肛散 內痔服此一劑即時蕃出極效三兩生用陳皮一兩作一劑水二鍾煎一鍾空心服外痔服此一劑即收入陳皮一兩水二鍾煎一鍾服妙用喚痔散敷外痔服此一劑即收入陳皮一兩水二鍾煎一鍾服妙用喚痔散敷外痔

收肛散 治痔瘡疼痛內經曰諸痛癢瘡皆屬心火此諸痔皆因之源也此藥主之黃連一兩茯神赤茯苓各五錢為細末蜜丸梧子大空心米飲下百丸如

清心丸 治痔瘡疼痛不可忍脉款日積氣血主之郁李仁泥一兩半羌活一兩天黃煨八錢滑石為末蜜丸梧子大白湯下三五十丸微利即愈切不可快利其痛滋甚此痛丸入門一名

七聖丸 治肛門痛不可忍脉款日積氣血主之郁李仁泥一兩半羌活一兩天黃煨八錢滑石為末蜜丸梧子大白湯下三五十丸微利即愈切不可快利其痛滋甚

寬腸丸 治痔瘡天使祕澁痛用此寬腸貫連枳殼等分為末麥麩糊和丸梧子大米飲下五十丸又用藥粘痔後大便堅硬難下大黃煨枳殼萸肉酒浸各等分為末蜜丸梧子大空心服

槐角子湯 外痔併漏根蒂落下然後服此藥除腹內之毒槐角子枳殼黃

芪蔞連各五錢薄荷二錢右㕮咀作二服水二鍾煎至八分空心食

木香散

用藥後小便不通服此藥不通車前子各三錢淡竹葉蟬蛻黃芩五錢猪苓三十根右㕮咀無服四錢水一鍾半煎七分空心服

槐米湯

痔瘡點藥之後然毒不盡將槐米一兩炒黃色用水一鍾煎至七分渴半鍾溫服之

槐角

凡槐角去梗為末入烏牛膽內掛透風處為末煉蜜丸每服四十丸至

胃散作湯下全書

臟連丸

治痔無論新久但舉發便血作痛

猪大臟盡頭一段長一尺二寸溫湯洗淨將連末二兩用公

緊洞煮酒二斤半砂鍋內煮酒將黃

瓦罐取起藏罈內兩頭以綵扎

晒一時許復搗光如桐子大每服七

十丸空心溫酒送下久服除根玉

加味槐角丸

治諸痔及腸風藏毒通用槐

角生

甘黃連條芩枳殼蒺藜防風連翹地

榆外麻各一

錢右為末酒糊和丸梧子大空心升麻

或米飲下五七十丸空心升麻

蒺藜木湯

治腸風燥結而為痔其腸

頭成塊者腫熱作痛

者風也太陽秘結者燥也此藥兼治之效
蓽茇皂角仁燒存性挑仁泥各二錢
蒼朮防風各七分黄柏酒洗五分當
歸梢酒洗澤瀉柴胡末各三分大黄
二分右除柴胡皂角仁外餘藥
到作一貼水三盞煎至一盞空心
滓入三味末再煎至一盞空心
服以美饍壓之一服即愈東垣

療痔神方

黄蘗末用二合滚湯調成餅飯上
蒸熟空心食之全書

壯氣收腸方

治翻花內痔痔頭落腸不收
防風厚朴當歸各二兩川芎蔓荊子
桂梗木香各一兩人參三錢內桂五
錢右爲細末每服三錢空心棗子湯
調下日進三服力壯其腸自收妥整

豬肚膏

用雄豬肚一枚去垢洗淨以皂角刺
一兩猪脂定兩頭煮爛去藥空心任
意喫又不可用鹽醬服
三肚硬即除根全書

水馬散

治一切痔夏月三伏內於止來中
抹潤子一名水馬兒高脚來面跳
走者是也抹取二十箇用三箇紙包
每包十箇於背陰處懸掛陰乾每包
作一服研爛空心溫酒調下良久乃
喫飯三日連三服十日內見效久痔
服絕根全妙三十

洗痔枳殼湯

治痔瘡腫痛肛門下墜毋論新久洗之痛自消瀨蝦蟇草一名茘枝卿四季寫有面青紫皆然紋壘皮者二兩枳殼二兩河水二瓢同上二味煎數滚先熏後洗良久湯留再熟熏洗若二次即消洗淨隔孫煎藥正宗

五倍子散

治諸痔舉發堅硬甚痛難忍或臟垂肛門泛出腫硬不收不効五倍子大者敲一小孔用陰乾癩蝦蟆揉碎塡裝五倍子內用紙塞孔濕紙包煨泥時就取出待冷去紙碾爲細末每有一錢加輕粉三分冰片五厘共研極細待通湯洗後用此乾搽痔上即腫勿動藥腫痛即除开洲

痔瘡二方搽洗亦可除根永不再發極効極効上藥

田螺水

治痔瘡堅硬作痛及脫肛腫淡不收者並用之以大田螺一枚用大水片五厘研末用尖刀挑起螺蓋將大水片末放用雞翎蘸搽患上鄭多掃

喚痔散

凡醫內痔即出草鳥生用二錢新磚皮一錢燒存性枯礬五錢食鹽炒三錢麝香五分冰片二分石研細末先用溫湯洗淨肛門隨用津唾調藥三錢填入肛門片時痔即當出去藥上護痔膏正宗

護痔膏

用喚痔散痔出之後先用此藥圍護四邊好肉自發石膏黃連各三錢乘片麝香各二分石研細末雞蛋清調成膏護四邊好肉方上藥散

枯痔膏

凡痔瘡泛出即用此藥塗之年淺者五七日深者八九日待痔乾黑後不用此藥每日用落痔湯洗之且凡二兩磨酥二錢輕粉四錢砒霜一兩天靈蓋四錢用青線水浸沙靈蓋煅紅水內浸煅七次共研極細末太小針鐵鍋內上用麄磁碗蓋鹽泥封固炭火煅至二炷香待冷取開將藥研末搽痔上每日辰午申三時用溫湯洗淨上藥三次上至七八日

起痔湯

其痔枯黑堅硬佳藥裂縫待其自落換洗起痔湯正方治諸痔上枯藥之後黑色堅硬裂縫方此藥洗黃連黃柏黃芩大黃防風荊芥枝子槐角苦參甘草各一兩朴硝五錢已上藥分作三次用水煎洗待痔落換搽生肌散正方之後

生肌散

治痔上枯藥之後脫落孔竅不收香冰用此藥乳香沒藥各一兩海螵蛸未煮五錢黃丹乘粉四錢黃柏四錢未石脂煅七錢龍骨煅四錢血竭三錢熊膽四錢玉鍊冰片二錢麝香八分珍珠煅二錢共研極細末磁罐收貯早晚日搽二次膏益漸斂而平正方

洗痔腫痛方

魚腥草苦楝根柳枝朴硝馬齒莧瓦楞花各一兩以水十碗煎七八碗先薰後洗諸痔腫痛可消正方

人中白散

治諸痔腫痛堅硬墜重脫肛等症若果溫湯洗淨隨後搽藥患者即臥勿動其腫痛漸減此藥常有便于痔故附錄而用之正方●五見諸痔瘡門

煮線方

治諸痔及五瘻六瘤瓜蒂釘而頂面大者五用血線繫其患根自死尤用血線繫其患根自死二錢用白色細拈線一條用水一碗盛貯小磁罐三錢同上二味用水一碗盛貯小磁罐內慢火煮至湯乾為度取線陰乾凡遇前患用線一根患大者二根雙

扣緊於根帶兩頭留線出瀉緊之其患自然萎黑冰冷不熱為度軟者七日直者十五日後必枯落後用珍珠散收口至効止

蝸牛膏

治痔瘡腫脹作熱如火蝸牛一箇入戶臼搗碎各少許同入瓦器內盛頓半日自化成水取塗痔上痛止腫消止愈得効

蜈蚣油

一名蝎牛膏

治諸痔端午日取全蜈蚣一條放在發陰乾臨發前一寸煎塗斷根入門謝塗輕則不發重則次年對周日又發再前一寸煎塗斷根入門

枯礬散

治五痔痛痒枯白矾一錢片腦五分右為末先以藥湯洗後撒少許得効

血竭散

治痔瘡痛不可忍血竭牡蠣粉髮灰各等分為末入麝少許津唾調付或合化泥直指

孫眞人射香膏

射香二分孔香三分皂角四分右為一處以小紅枣煮去皮核肉和藥作餅依痔大小放痔正用膏藥貼之痔內血水黃膠水流出貼痔患之再換一二次即愈金匱

內塞散

一名龍射丸

彌用此藥塞入谷道內三四夜止痛尤佳年苦天竺黃研末收以內痔腫痛出血甚效

腦麝各五分乳香沒藥薄荷葉各一錢分為末用蜜丸如櫻桃為丸如陳皮大再研末所為末臥時塞

一九入谷道內七夜
屬正除根不發決效

如聖散

內外一切諸痔出日落黑糞四
面用雌雄鷄二隻餓二日次早用
雞肺子切碎拌糯米粉一二合徐徐
喂之六七日接糞四面爲度晒乾聽
用雌黃爺六錢明凡及硼各一
錢膽礬五錢共爲末入傾銀罐內用
瓦蓋之以煨青煙爲度取出加乳香
沒藥各三錢研匀共爲末磁罐
收貯用唾津調敷痔上良久去藥
再上藥如此七次看痔黑色則不須
上藥待七日其痔自脫畧用
生肌散二三日收口大成

二仙丹

一名礬金散治外痔金瘡出血二錢
白礬一兩三味爲末傾銀罐煆煙
盡爲度加蝎尾七箇君陪生草爲
一錢共末敷痔加聖散法次成

熊膽膏

熊膽片腦各少許研調塗痔上得効

痔藥膏子

石外痔以灰花椒肛腫痛腫
一拖和一次加烏梅杏黃各二錢慢
火熬至平碗入甘草一錢數沸下淨
石灰水半匙畧沸三五次用絹兩重
濾過再熬成膏候冷次膽礬五分研
極細瓦器盛貯臨用入龍腦末少許
和匀以銀筯蘸藥塗付痔一次重者
三五次先以粟米洗
乾乃塗之神效細目

護痔散

護痔外好肉出皮次黃黃柏芩參
蒼朮石菖蒲粉各等分爲細末熟

調塗好肉上妙藥也

卻毒湯

洗痔漏焰硝一兩丸松馬齒莧甘草五錢五倍子川椒防風側柏葉各五錢白礬水不三錢右末丸三梧桐葉三次用春

無花湯

洗痔效無花菓葉葉湯

太倉公方

治痔波硝三錢乙蕙三條胃苦一遠蕙陽洗之一連洗五日全

愈陰囊見與腿腫俱以此方洗之神效奥旨

凉血飲

治痔漏因風熱燥歸于大腸故不血為主以參黃芪黃芩連生地當歸川芎槐角孫草枳殼升麻各一錢右㕮作一貼水煎空心服或加服丹

猬皮丸

治痔漏槐花又藻炒黃狀殼地榆當歸川芎黃芩白芍白花枯貫衆各五錢猬皮燒一兩髮灰三錢猪蹄甲十枚豕焦龜角一枚醋炙右為末丸如麻子大空心米飲下五丸十丸入門

活龜丸

治腸風痔漏大烏龜一箇先以柴火燒熟地以罩蓋龜地熱逼出臭屁待屁盡以稀繩都牙包縛外用黃泥固濟庶火中煨熟撈起剝淨取肉研如泥其殼用半骨鬚堂炙五七次心透酥乾為末又用黃連一兩丸蒸

豚胃丸

丸晒富飯尾三錢三分為末和豚龜肉搗丸梧子大每湯下五七十丸服治痔漏亦治諸瘻槐花二兩黃連錢石刻入猪肚內縫定煮爛去藥食牡丹皮各一兩猬皮七錢赤活六肚如硬再服以患處軟為止或同上藥為丸服亦可入胃

全生丸

治多年痔漏如神白芷槐子殭蚕炒各四兩川山甲炭窪土炒全蝎去足分炒淨各二兩蜈蚣二條象黃陳米煮飯搗為丸每日服三錢日漱水下服完漏管自消忌房欲鵝肉茄地上終身不行走事二三十年不愈者三服

蓮花藥散

治痔瘻蓮花藥黑牽牛頭末各一兩半猪飯五錢樊紅二錢右為末先忌食肉六七日空心食肉一頓取溫酒下藥三錢下隱血或嚴是數丹心

胡連追毒丸

治痔漏不拘遠年近日有漏道孔出者先用此丸追盡服毒每服務必樊目然取効最穩胡黃連一兩切片再炒黃為末麝香二分一兩炙訖再炒黃為末麝香二分軟飯為丸麻子大每服一錢食前酒下服藥後膿水反多是藥力到也勿慎之正宗

黃連閉管丸

胡黃連淨末一兩川山甲麻油內煮黃色石決明煅槐花各五錢煉蜜丸如麻子大每服一錢空心清米湯送下早晚日進

二服至重者四寸宜而愈此方不用針刀掛線小多受苦楚誠起痛疾之良方也如漏之四邊有硬肉突起者加蚤蘭二寸箇妙未和入藥中尸及遍身諸漏皆効証点

秦艽羌活湯

治痔漏成塊下墜不任其痛

羌活一錢五分 秦艽 黄芪 各一錢五分 防風 北柴胡 麻黄 柴胡 丹皮 草 各三分 細辛 紅花 各二分 右剉作一貼空心水煎服

黑地黄丸

治久痔漏下血虛者服之神効治痔之聖藥也

酒浸熟地黄一分 枸杞 味子 八兩 乾姜 秋冬一兩春夏七錢半 五錢 右為末煉蜜丸如梧子大空心米飲或溫酒下百丸漸加

秦艽當歸湯

治痔漏大便結燥疼痛大黄 煨四錢 秦艽 枳實 各一錢 澤瀉 當歸 梢 皂角仁 燒 白朮 各五分 紅花 二分 桃仁 二十粒 為泥 右剉作一貼水煎服東垣

通聖散

治痔漏腫痛大便閉結不通防風 荆芥 各八錢 荆芥 赤芍藥 屈尾 拘杞 連翹 黄芩 各日朮 各一錢 薄荷 八分 川芎 五分 甘草 五分 桔梗 八分 石膏 八錢 滑石 二錢半 大黄 五錢 朴硝 三錢 每劑加漏蘆 二兩 生薑 三片 紅棗 七個 燈心 三十根 用水煎服 瀉二三次 發涼粥正之忌葷腥油膩三五日 粗消熱毒 凡

煎香服此一劑
瀉去餘滓次

黃芪六一湯

治漏孔穿開膿水細孔
芪六錢蜜水拌炒甘草節一
錢水二鍾煎八分食遠服
寸餘服膿水自乾大成

蠟礬丸

天丸漏孔穿開即服此丸乾膿收
白丸乃漏症緊要之藥也黃蠟一兩
白丸一兩三錢先溶蠟化離火候稍
溫方下丸末攪勻乘熱搓成豫藥烘
證治相子大每服六七十丸
白滾湯送下日進三服大成

琥珀丸

治一症同前自象牙一兩血竭三錢
乳香沒藥各一錢射香三分共為細末用黃蠟溶化和藥為丸每
一錢共末用黃蠟溶化和藥為丸每
服五七十丸白滾湯下日進三服妙

三品一條鎗

治十八種瘻漏凡用藥敷搽
次挿藥三條上至七日六日藥力滿足瘻變紫黑
條上至七日六日藥力滿足瘻變紫黑
方住挿藥候瘻四邊翻腐至十
四日期滿瘻落用甘草湯洗淨換搽
鳳雛膏或玉紅膏俱可生肌收斂膿
羽首無眼春血健脾之藥最為穩當
大抵腎天能取瘻者皆此方也不可
輕其藥而棄之矣

●五見瘰癧門

生肌鳳雛膏

用雞蛋煮熟去白用黃寸餘
銅杓內熬油傾入盞內約
涵三錢加輕粉細末一錢乳香血竭
龍骨各末五分共入油內和勻每日
早午晚雞翎蘸塗患孔內膏蓋
避風深者半月可以完口正法

取漏膿方

治內痔久漏取膿最效焰硝三兩苦參一兩手右為末用布四寸長二寸開縫一條入藥半袋以砒三分放藥末中間方入全藥裝滿縫紉紉出頭安帶子如騎馬繫住入肛

取痔蟲方

痔漏有蟲根瘟麥半升猪牙皂角一寸右為末大猪腰子一隻內用朱砂煮空心食之少頃腹痛上廁蟲皆隨出作丸如地坑埋之薄粥補之丹心●蟲蝕瘡腫下膿血槐白皮濃煎湯盛盆中坐其上熏數道冷則易煖湯良久欲大便時蟲出三度愈本草○又方蟲出臭腸以五味多貼痔漏上良久蟲出即去之三次漏出同上●又加蜈蚣

塞漏孔方

生橋為丸塞肛門孔中引痔蟲出盡永差本草○痔漏決洞者用波藥散爛水漬令濃去滓盛盆漬之蟲自出本草

白丹散 痔漏有竅用朱石脂白石脂枯礬白丹腦子同為末塞之或飲如然藥挿入丹心●藥塞竅用石膏便煅煉甘草粉龍骨密陀僧丹心●祕方用煉密半兩蛇床子一兩分再煉入水成珠丹部猪繫綿裹搽成搽子將密陀研細搽在搽子上仍用竹挿腦熊膽各半分研細搽在搽子上挿入滿眼內底至盡頭則止如眼多醫得一箇又醫一箇不可一齊上藥外皮潰爛用黃蠟丹麻油煎貼膏貼緊一七日效膏匱

辰砂膏

痔漏塞竅信砒一錢白丹二錢蜜陀僧辰砂各五分石膏研信砒研細上火煅明矾研細白糖和匀作尖挺子如小麥大取一粒納漏孔內●一名辰砂錠子全書

上品錠子

專治十八種痔漏紅蓉一兩二錢半信砒火煅五錢乳香沒藥朱砂各二錢半牛黃二分半硇砂五分熟二分生石為末麝糊和匀捻成錠子看瘡大小深淺挿入竅內如內黑色勿拔生肌散直待黑肉去盡方上生肌散丹丸

生肌散

牡蛎粉紅藤根乾漆各五錢藤黃雄黃雌黃硫黃輕粉粉霜麝香砒霜枯黃丹各一錢右為末陳米飲和搗丸如棗核大每一丸納肛內換下惡物除根東垣

一寸金錠子

生肌合瘡口龍骨煅五錢琴水石煅輕粉各一錢乾胭脂三分右為末每用一錢血竭兒茶各五分冰片一分共為末吹入漏孔內收口大效

參茯湯

治肛門漏寒脫出人參黃芪蜜炒當歸白朮生地黃白芍藥酒炒白茯苓各二錢升麻桔梗陳皮乾姜炒各五錢甘草炙三分右剉作一貼水一盞煎至七分食後服

摺皮散

治因泄痢或努力脫肛摺皮龜甲各二箇燒存性磁石煅醋淬七次五錢桂心三錢右為末每二錢空心米飲下仍用草鞋底炙熱按入忌房事

縮砂散

治肛門下脫石榴皮木賊蓉等分若為末每二錢米飲調下

龍骨散 治大腸虛肛門脫出龍骨訶子各五錢罌粟殼赤石脂各四分沒石子大者四箇右爲末每服二錢空心米飲調下得效●一名提肛散亦治小兒脫肛同方

二槐丹 治脫肛痔瘻花各等分右爲末生羊血調成塊晒令乾勿使血熟每二錢黃酒送下医鑑

補中益氣湯 本方加荊芥防風加蒺藜加皂角穿治虛人脫肛全書●加川芎薄荷知母蒼朮黃芩桃仁大便閉塞加皂角穿治虛人脫肛門見瘡疽門

獨虎散 治脫肛五倍子半兩水三椀煎至半入硼砂荊芥各一錢浸熟熏洗用五倍子末撒之並效

蚊蛉散 治脫肛不收五倍子末入白礬末研爲細末先以井水洗淨肛門芭蕉葉上摶入或長尺餘者以兩床相接中空以器盛藥水滿架起與床平令病者仰臥浸器中逐日如此縮盡爲度得效

浮萍丸 治脫肛於秋暮取霜露打過浮萍不拘多少以淨瓦罐閉陰乾其瓦一日一易不可見日務要陰乾用紙包起研爲細末先以井水洗淨肛門取藥末卷上摻肛裡令即入四卷●一名水晶散至驗

孩兒丸 治肛脫熟脂煎膽五分孩兒茶二分片腦一分右為末入乳調塗肛上熱汁自出而肛收入門出門

掺藥方 乳香紅絨灰牛黃各五分沒藥珍珠象皮灰各三分血竭冰片各二分右為極細末用後藥洗淨乾掺須要避風塗言○孩兒茶五倍各二分右為極細末用後藥洗淨乾掺須要避風塗言○又方大人小兒用赤石脂伏龍肝各一兩為末付腸頭上時時上三次同上

洗藥方 用生鐵五斤水二斗煎至五升出器洗之日三次明日再易新鐵物前洗之全書○又方枳殼朴硝川芎當歸須桑枝艾葉各地榆荄木石煎湯洗之但肛門收上十有一二須服補劑調攝之其餘者漸多就退結痂圓

壁土散 治肛門滯出故屋裏壁土一升研皂莢二挺各長一尺二寸右二味先搗土為散挹粉肛頭出處次取皂莢炙煖裹遍熨炙入即止手全

黑聖散 治脫肛久痛大蜘蛛一箇孤葉重研天黃丹少許研勻右以白凡慈菇煎湯洗浴拭乾將藥末卷在肛上以手托入全驗

治冷積利脫肛方 治冷積利脫肛枳殼一枚麩炒令焦熟之冷定易取縮入止全○一方治久痢脫肛黑色生教君巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煮入朴硝少許洗歇用清油點三滴放三角取出

治脫肛方

凡脫過龍骨次許熟未勒於肛頭以芭蕉葉扎上便易分出入以門分將滾水傾入罩內泡驚坐其上熏之良久將水洗拜後將因作膏食之將竈頭作末糊肛上匡鑒○一方治脫肛以糯米濃煎汁洗肛卻取專燒紅洗醋胎布鋪其上令溫坐亦上肛自收入細且出轉虛不可入服龍腦溫塗隨手捫按得納入千金

拾遺為粉切猪

當歸和血散

治腸風射血及濕毒下血當歸 芍藥 荊芥 甘草 各一錢半 桃花炒青 分右為末每二錢空心米飲調下一名桃花散 陸鑒

升陽除濕和血湯

治腸澼下血作痛其血如豚腦 柴胡 羌活 獨活 防風 甘草 各一錢 陳皮 升麻 各七分 至地黃 牡丹皮 至甘草 各五分 當歸 熟地黃 各一錢半 黃芪 蒼朮 蒸 共四味 為粗末 每服 東垣

涼血地黃湯

治腸澼射血知母 黃柏 各一錢半 熟地黃 當歸 酒 桃花炒 青

黄連湯 治下血腹痛不止黄連當歸各二錢甘草一錢水煎服

芍藥黄連湯 治大便下血腹痛白芍藥黄連各二錢当歸川芎各一錢桂心二分半

升陽補胃湯 治腸澼白芍藥一錢半升麻羌活黄芪各一錢半柴胡防風柱开皮甘草茯苓陳皮當歸葛根各三分肉桂二分右剉作一貼水煎服東垣

益智和中湯 治腸澼下血色紫黑腹痛惡熱之內寒明矣自芍藥一錢半當歸黄芪升麻炙甘草各一錢丹皮柴胡葛根益智半夏各五分桂枝四分肉桂黄連炮各二分右剉作一貼水煎服東垣

香殼丸 若因飽食膏粱腸澼痢膿連一兩枳殼厚朴各五錢當歸四錢荆芥穗木香槟榔各三錢猪皮二錢麸炒焦水丸五七予丸日一空腹

香附散 治腸風香附子炒一兩枳殼七錢半當歸川芎各五錢槐花炒黑草

止血散

各二錢半右麝末每三錢重三片棗二枚米飲服冰硼眼冰事

治腸風在糞前為近肝腎血也在糞後為遠心肺血也胡桃仁破敗紙炒槐花炒各三兩共皂角刺燒灰二兩右為末米飲或溫酒調下二錢

柏葉湯

石腸風側柏葉富飯出乾地黃等連翹芥穗炒穀槐花炒地榆各一錢半甘草炙五分右剉作一貼姜三片棗二枚水煎服

斷紅丸

治腸風猬皮燒黃連炒蒸地榆角子各一兩當歸猴柳皂角仁燒黃槐角子各一兩荊芥穗炒穀各五錢大黃煨桃仁泥各三錢右為末麵糊和丸梧子大日腸下五十丸血多加條間連房灰各五錢正傳

絲瓜散

治腸風藏毒時漏脓血絲瓜根經霜一二次收採淨洗取露十餘宿懸當風處陰乾每服三錢到散水煎熟去滓滴香油卯錢大空心溫服忌羅猪燒酒一盞服即效

槐花散

治腸風藏毒槐花炒柏葉焙荊芥炒穀各等分為末每二錢空心米飲調下本傳

腸風黑散

腸風藏毒並治之荊芥穗二兩一兩半亂髮槐花槐角各一兩同入鐵內鹽泥固濟燒存性記次罪再入甘草炒炒穀炒各一兩右

為末每二錢空心米
飲或溫酒調下得效

清榮槐花飲

治腸風藏毒當歸白芍藥地黃槐花炒各一錢防風寬歸甘芍藥連翹炒荄木茹炒各毛分川芎防風各八分枳殼條芩
酒炒各毛分川芎防風各八分枳殼條芩
生甘草各四分右剉作一貼水煎服四春

槐黃湯

治腸風藏毒槐花炒金銀花黃耆根
白皮炒各一錢防風寬歸甘芍藥
荆芥穗川芎黃連枳殼各八分地榆
烏梅甘草各三分右剉作一貼水煎
炒心服
空腹

玉屑丸

治腸風藏毒久不止痔根白皮酒
乾四兩槐根白皮酒
炒苦楝根寒食麵

各三兩滅靈仙一兩沃蒲黃半夏各
研銀石為末酒水和丸梧子大每三
十丸以米一盞煎丸子令淨以
匙抄吞送下不嚼芸勿本事

熟紅丸

治腸風藏毒下血久不止面色萎
黃日漸羸瘦宿歸酒浸一兩側柏
葉炒鹿茸去毛醋煮附子炮續斷酒
浸黃芪蜜炒阿膠珠白芍枯各五錢
右為末醋糊和丸梧子大空心米飲
下七八十丸久用溫粥此方
正合其五味

芎歸丸

治腸風藏毒久不止門穿寬歸黃
芪神麯炒地榆槐花炒各一兩防
膠荆芥木賊髮灰各五錢右為末蜜
丸梧子大空心米飲下五至十丸

槐黄

炒焦黄連酒炒各四兩右為末入猪大腸一尺內抽去非取腸煮爛去非取腸粟爛搗如梧子大空心米飲下八九十丸醫鑑

黄連除湿湯

治藏毒初起湿熱流注肛門結腫疼痛小水不利太便秘結身熱口乾脈數有力或裏急後重

黄連黄芩川芎當歸防風蒼朮厚朴枳殼連翹各一錢甘草五分天花粉各二錢

凉血地黄湯

治藏毒已成未成或腫不腫或泄或秘時當復血頭暈眼花腰膝無力者

川芎當歸白芍生地白朮茯苓各二錢黄連槐榆人參山梔天花粉甘草各五分水二鍾煎八分食前服正宗

解毒湯

治藏毒黄連黄芩黄柏梔子連翹

右到作一貼水一鍾細辛甘草各五分

黄連解毒湯

治好飲法酒縱食膏粱積熱流入大腸致肛門結成腫痛多刺如鍼堅硬如石五服立愈○方見瘡疽門

内托黄芪散

治藏毒已成紅色光亮已欲作膿不必内消宜服此藥清熱川芎當歸陳皮白术黄芪白芍甘草桔梗二分水二鍾煎服用針砭一錢入參食前

槐花散

治藏毒初發痛如刺骨出于驕奢情性縱肆不知節制飲食過度致成此病

藥味本外麻不七分防風側柏葉各五分右剉作一貼空心水煎服四劑

枳殼散

治藏毒初發二兩黄連白芍藥各一兩槐花炒地榆各一錢

我平右剉作一兩空心水煎服

治藏毒出于驕奢情性縱肆不知節制飲食過度致成此病急暴烈火猛狂思不如願不已拈鴉火不發泄旺而又鬱蒸而又旺以致肛門結腫毒攻內藏痛如刺熱如火炙不淋漓者宜服此藥免生惡瘡也下○方見瘡疽門

金液戊土丹

治肛門腫沒痛極不可加來歷命極細脩春簡

珍珠散

治肛門腫痛極上早晚日用二次正宗○方見瘡瘡門

外科集成卷四十六

内閣文庫

長崎奉行所 卷四十六

国立公文書館
National Archives of Japan

国立公文書館
National Archives of Japan