

地

倭漢三才圖會

五十九

毒草類

六十九


蔓草類

庫文閣内		
二七二函	一九四九	和
四架	四一冊	類

内閣文庫	
番號	和 19499
冊數	41 (38)
函號	271 74

第	第	第
三	七	零
類	門	號

冊號



綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

前
第 三
第 二
第 一
門
類



和漢三才圖會卷第九十五目錄

毒草類

大黃

防葵

大戟

續隨子

蓖麻子

木藜蘆

高陸

狼牙

澤漆

葭蓉

常山

萬年青

狼毒

藺如

甘遂

雲實

藜蘆

附子

烏頭

白頭

和漢三才圖會

毒草類 卷九十五

目錄一



草烏頭

歡喜草

半夏

射干

玉簪

曼陀羅花

平戸躑躅

映山紅

小射干

白附子

芍药

蚕休

烏扇

小玉簪

羊躑躅

永來部躑躅

芫花

其躑躅

天南星

菩薩草

鬼臼

鳶尾

鳳仙花

藕躑躅

山躑躅

堇花

岩躑躅

醉魚草

石龍芮

葶苈

鉤吻

リネ

莽草

毛茛

海芋

茵芋

牛扇

透山根

風建草

金英草

本草三才圖會

毒草

卷之五

目錄二

酒會草	百餘內
...
...
...

和漢三才圖會卷第九十五

△黃大黃... 攝陽 城醫法橋寺島良安 尚順編

毒草類



大黃

黃良 將軍 層如 火參 和名於保之

本綱大黃蜀川河東陝西皆有之而蜀川錦文者佳二月
 卷生黃赤其葉子莖並侷羊蹄莖高三尺許脆其葉四四
 相當粗長而厚三月花黃五月實黑八月采根其根有黃
 汁大者如盤長二尺切片陰乾然性溫潤而易性壞火乾
 乃佳作時燒石使熟橫寸截著石上燂之一日微燥以繩

和漢三才圖會 毒草類 卷第九十五

穿狼乾

一種出於秦隴者名土番大黃正月內生青葉但莖麻大者如扇根如芋大者如盤長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅但莖莖花者莖青紫色形如竹株根去黑皮切作橫片火乾相蜀大黃乃作緊片此乃作橫片物切用等

一種有羊蹄大黃雖似大黃實非一類見羊蹄根之老者也

大黃味苦寒氣沉而降陰也頂峻下者生用若邪氣在上非酒不至必用酒浸驅熱而下若用生者則遺至高之邪熱也下瘀血破癥瘕積聚蕩滌腸胃推陳致新如數定禍亂以致太平所以有將軍之號血分之藥也凡病在氣分及胃寒血虛并婦娠產後勿輕用黃芩為之使無所畏惡氣

△按大黃豎或橫殺片者名殺大黃通冗繩繫者名繫大黃雖謂如錦文者佳今藥肆錦文者無之蓋歷月日故錦文消失乎今多出倭大黃皆羊蹄根及酸橫根大者也

也凡通利之劑可用唐大黃傳齊癘諸瘡宜用倭大黃



商陸

シロロツ

俗云山牛蒡

章柳 白昌

馬尾 夜叫

和名伊保須木

本綱商陸生園圃中春生苗高二四尺青葉大如牛舌而厚長脆莖青赤至柔脆夏秋開花作莖根如蘿蔔而長八月九月采根日乾花赤者根赤花白者根亦白其白者入藥赤與黃色者有毒不可食昔人種之為蔬根苗莖並可洗蒸食或用灰汁煮過亦良其形類人者入藥

根酸毒陽中之陰能療水腫切生根雜鯉魚煮作湯服赤根者搗爛入麝香一分貼於臍心以魚束之得小便利即腫消

△按商陸處處有之葉如煙草嫩葉其花房如旋覆花而大其根如牛蒡因俗稱山牛蒡出於越州及攝州者良

或云水腫者食之無功，利瀉利蓋疑，不撰赤白，用赤者，被中毒，與但粘臍藥用，赤可也。



根毒

本綱根毒葉似商陸及大黃，莖葉上有毛，根皮黃，肉白，以實重者為良，陳而沉水者良，輕者力劣，此六陳之一也。
六陳者麻黃、橘皮、半夏、防葵及草蘭、姑能似根毒，誤混用，最宜詳審。

根辛平有毒，治九種心痛，一蟲二姓三風四怪五食六飲七冷八熱九氣，又治連年積冷流注，心胸及落馬墮車，瘀血中惡等證，名九痛丸。根毒臭，香與茱萸湯泡，巴豆去心，乾薑炮，人參各一，附子去皮各為末，煉蜜丸，梧子取霜。

大每空服，溫酒下，一丸。



防葵

ヤまのいひ 房苑 梨蓋 利茹

和名夜未奈須比

本綱防葵莖葉似葵，每莖三葉，一木十數莖，中發一幹，其端開花如葵花，景天輩而色白，六月開花，即結實，根似防風，香味亦如之。今乃用枯朽，根毒當之，緣真相似也，勿誤用。根辛寒無毒，治疝痕腸洩，膀胱熱結，溺不下，欬逆癩癩驚邪。



狼牙
牙子 狼齒
犬牙 抱牙
支蘭

和名士末豆奈木

本綱狼牙苗似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之牙齒七月華八月實黑色其根三六月未暴乾若中濕腐爛生衣者殺人色白者善

根有苦寒 治邪氣熱氣疥癬惡瘡

△按狼牙山野處處有之高下二尺莖枝葉花並似萩而小七月開花作莢如小豆莢中子黑色其根甚強故芻人可繫牛馬俗呼名駒繫

本草綱目卷之五十五 毒草 狼牙



蔞如

和名 阿佐美 又云仁比萬草


和名 阿佐美 又云仁比萬草

本綱蔞如春初生苗高二三尺莖葉如大戟而葉長微闊不甚尖折之有白汁抱莖有短葉相對團而出尖葉中出莖莖中分二三小枝二三月開細紫花結實如豆大一顆三粒相合生青熟黑中有白仁如續隨子之狀其根長大如蘿蔔蔓菁狀或有岐出者皮黃赤肉白色破之有黃漿汁初斷時汁出凝黑如漆往往用其根充狼毒誤也根無漿汁以

根辛寒有毒 治惡肉敗瘡又治甲疽 黃芪 二兩苦酒 以猪脂五合合煎取膏三合日三塗之 即消又能治馬疥

△按蘭如古本朝有之今無識者

皮黃肉白者更峻利



紅芽大戟紫色



大戟

たいげき

功鉅一下馬仙

和名被夜
此止久佐

タア、キツ

本細大戟生平澤春生紅芽漸長叢高一尺以來莖中空折之有白漿葉長狹似柳葉而不團其稍葉密攢而上三四月開黃紫花團圓似杏花杭州紫大戟為上江南生者葉似芍藥為次又北方綿大戟色白其根皮柔韌如綿甚峻利能傷人弱者服之或至吐血

根苦寒有小毒利大小便治十二水腹滿急痛不問年月淺深大戟當歸橘皮兩各一切以水二升煮取七合頓服利下水二三升勿怪至重者不過再服便瘥禁毒食一年永不復作凡大戟得棗即不損脾反甘草用之使惡薯蕷

△按大戟和州金剛山之產良名小木戟丹波伊豫次之其葉圓葉間開細花有白赤紫數品結實以芋麻根偽之宜擇之



澤漆

とじいんご

五鳳草 漆莖
貓兒眼睛草
綠葉綠花草


俗云燈臺草

ツエツツイツ

本細澤漆原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢柔莖如馬齒莧綠葉如甘藷葉葉圓而黃綠頗似貓睛莖頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠色復有小葉

莖葉若微寒利水治浮腫功類大戟而其莖有白汁亦同故誤以為大戟然大戟根苗皆有毒澤漆根硬不可用苗亦無毒可作菜食使小豆為之
△按此草形狀似燭臺俗呼名燈臺草其莖汁能治疣黑

子且牛馬亦不食此草乃有毒明矣




甘遂

かんすい
甘藁 陵藁
重澤 甘澤
白澤 苦澤
丰田
カンスイ 鬼醜

本綱甘遂苗似澤漆莖短小而葉有汁根皮赤肉白作連珠大如指頭續隨子

根苦寒能瀉十二種水腫木結胸中非此不能除故仲景大陷胃湯用之但有毒不可輕用瓜蒂為之使惡人多以麩煨熟用以去其毒

△按甘遂一名途波曾本朝古有之今無



續隨子

千金子 拒冬
菩薩豆 聯步
千兩金

ソツスイツラ

本綱續隨子苗如大戟初生一莖莖端生葉葉中復出葉花亦類大戟自葉中抽幹而生實青有殼秋種冬長春秀秋實莖中亦有白汁可結水銀人家園亭中多種以為飾子辛溫下水最速然不可多服此與大戟澤漆甘遂莖葉相似主療亦相似其功皆長干利水又治疔黑子以續隨子熟時塗之自落

△按續隨子其殼青子如小豆大而黃色紀州之產良



良若

ランタン

横唐 行唐
天仙子

和名於保
美留久佐

本細良若生海濱川谷今處處有之苗莖高二三尺葉似地黃王不留行紅藍等而闊如三指莖葉皆有細毛四月開花紫色白色五月結實有殼作聖子狀如小石榴房中子至扁細青白色如粟米粒其子不可生服傷人見鬼狂亂煮之一二日而芽方生其毒為物可知矣良若雲實方葵赤商陸皆能令人狂惑見鬼者

子苦温 療顛狂方然不可過劑綠豆甘草升麻犀角並解其毒

△按良若海濱有之其葉形畧似野菊而莖葉皆有白細毛四五月開花有白有赤結實如聖子俗稱之河原艾非也河原蓬別有種今人不知良若和名而漫補之而已或以良若誤



雲實

イシニツ

粘刺草子名
員實 雲英
天豆 羊石子
馬豆和名濱

本綱雲實平澤處處山原多赤莖中空有刺高者如蔓其葉如槐三月開黃花纍然滿枝莢長三寸許狀如肥皂莢有子五六粒正如鵲豆兩頭微尖有黃黑班紋厚殼白仁咬之極堅重有腥氣其花有毒能令人見鬼發狂

實辛温無毒 治泄痢腸澼去邪惡結氣除寒熱治瘡

△按雲實原野池堤有之俗謂之鴉乃豌豆

一種有野豌豆者其花淡紫色其葉似胡豆葉而結莢一種有野胡豆者其花紫白色其葉似槐葉而結莢共出柔滑菜部而人食其葉雲實相似而有開黃花之異耳不可不知是毒草之屬也



苧麻

和名如良加之波
一云如良衣

本綱苧麻夏生苗葉其莖有赤有白中空其葉似大麻葉而甚大每葉凡五尖夏秋間極裏抽出花穗顯黃黃色高丈餘每枝結實數十顆上有刺攢簇如蠟毛而軟凡三四子合成一顆枯時劈開狀如巴豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛蠟再去斑殼中有仁嬌白如續隨子仁有油可作印色及油紙子無刺者良子有刺者毒

子甘辛有毒外用屢奏奇効但不可輕內服搗膏點六畜舌根下即不能食點肚內即下血死其毒可知矣如服者下生不得食炒治口眼喎斜搗膏左貼右貼左即正又催生下胞取七粒去殼研膏塗脚心若胎及衣下

便速洗去不爾則子腸出如子腸出即以此膏塗項則腸自入也

油追膿乃外科要藥鷓鴣油能引藥氣入內苧麻油能拔病氣出外故諸膏多用之

△按苧麻和名唐搗言其葉唐在言其油今俗稱唐胡麻出於和州者良紀州藝州之產次之近頃煉成用代蠟燭又取油法苧麻仁去殼五外用水一斗煎之沫出盡取一點入水不散為度

朱印色

其方有數品一方苧麻子五十錢去皮川棟子五十個取肉黃蠟錢二銀朱錢二艾葉錢二用川棟子肉黃蠟煉和冷定苧麻油及艾膏合成絹裹用又黑印用油煙灰和苧麻子油用之

一種有博落迴者生江南山谷莖葉如苧麻莖中空吹之作聲如博落迴折之有黃汁不可用入口有大毒入立死

△按博落迴本朝未知有之



常山

恒山鷄屎草
互草鴨屎草
根名常山
葉名蜀漆
和名久佐木
一云山字豆木

本綱常山生山谷間莖圓有節高者不過三四尺葉似茗而狹長兩兩相當二月生白花青莖五月結實青圓二子為房其草暴燥色青白堪用若陰乾便黑爛鬱壞其根似荊根黃色而破細實黃者為雞骨常山用之最勝五月采一種出於海州者葉似楸葉八月有花紅白色子碧色似山棟子而小

常山苦寒蜀漆辟羆共為治瘴之最要不可多進令人吐逆老人久病切忌之則氣稍緩少用亦不致吐也

△按常山處處有之出於丹波者為良其葉甚臭高文許木之屬故稱臭木葉似梓楸葉而闊大畧皺不澤六月開細花白紅雜攢亦似梓楸花蓋蘘頰所謂海州之常山是半然本草不言葉臭者未審人以其葉為治瘴藥屢有効但本經常山葉如茗葉者本邦未有之



蒜藜蘆

山葱 葱薺
豐蘆 葱薺
葱薺 鹿葱

本綱藜蘆山谷處處有冬凋春生苗葉似初出機心又似車前草莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮畏葶

和名三才圖會

生草

卷之九十五

九

皮有花肉紅色其根似馬腸根長四五寸許黃白色鬚三
二寸許二三月采根陰乾生高山者為佳

根辛寒或云吐上膈風涎癩病凡吐藥不一常山吐瘧瓜

下吐熱烏附火痰濕萊服子痰藜蘆則吐風痰者也

黃連為之使及芍藥細辛人參沙服之吐不止飲葱湯

即止
△按藜蘆今多植庭園愛其花形狀全如上說而根少異

耳性宜陰處冬亦不凋葉似車前草而厚長布地生三

四月抽莖開花肉紅色或淡黃或棕色或外裡內白或

外紫內黃或椀色或外青內白者名五須手或淡紫者

名出船根圓似皂莢而中根多如髭故名蝦根恐此藜

蘆也然自古以万羊青為和藜蘆葯非也

倭方有桑山小瓶丸能治小兒諸蟲驚癇方中有苦參

藜蘆此相友之物何得宜乎但如倭方藜蘆即用万羊

青佳也故藥肆和藜蘆万羊青根也 見于後



木藜蘆

黃藜蘆 鹿驪

俗云檳木綿 又云濱芭蕉

モツリイロ

本綱木藜蘆生近水溪澗石上小樹也莖葉與藜蘆大同
葉狹而長多皺文四月開細黃花五月結小長子如小豆
大根鬚百餘莖若辛温不入藥用

△按木藜蘆南紀海濱溪澗有之高二尺許莖葉微似芭

蕉而狹長又似蜀黍苗有淺黑皮裹蘆數片層層夏抽

莖開黃花不如藜蘆花之艷性畏寒移植之於京大坂

多難茂又以不甚美人不為珍自古以藜蘆稱於毛止
故是亦呼曰濱於毛止蓋誤而已



萬年青

千年益萬年春

今云於毛止

本草新編云氣味苦
澀微寒入腎經及脈
畢通在督之脈

三才圖會云万年青葉似芭蕉隆冬不衰以其多壽故名
 △按万年青性好陰濕石間葉布地生似玉蜀黍葉而小
 厚勁深青四時不凋夏根傍抽莖生花無葉瓣其莖一
 寸許淡青色花房黃白色而亦一二寸大如櫻桃形如
 橫槌結子初青後正赤累累攢生大如櫻桃
 一種有葉縱文白者呼名筋万年青以為珍三才圖會所
 畫有縱理聚富今書云一具於春秋二分時分壹四月
十四日採舊葉葉體令人踏則新葉茂盛
 俗誤藜蘆為万年青之訓花實大異終以万年青根為
花實大異終以万年青根為
 倭藜蘆沽之豐前中津之產良遠列朝比奈藝列廣島
 亦佳挿葉及實於花瓶稱万年青前置以為極秘傳



附子

別有草烏頭
白附子故呼
之為黑附子
川烏頭

本綱烏頭乃附子之母綿州彰明縣多種之故稱川烏頭
 最為上江南來者不堪用每年以上田熟耕作壟十一月
 播種春月生苗其莖類野艾而澤其葉類地麻而厚其花
 紫瓣黃糝長苞而圓其品凡七本同而未異其初種之小
 者為烏頭附烏頭而旁生者為附子又左右附而偶生者
 為高子附而生出或變出形長而不生子者為天雄附而
 尖者為天錐附而上出小者為側子附而散生者為漏藍
 子皆脈絡連貫如子附母凡種一而子六七以上則皆小
 種一而子二三則稍大種一而子特生則特大
 附子辛溫有大毒 陰證要藥凡寫寒傳變三陰及中寒夾陰

雖身大熱而脉沉者必用之或厥冷腹痛脉沉細甚則
唇青囊縮者急須用之有退陰回陽之力起死回生之
功湯中陰浮中沉無所不至為諸經引用之藥
凡附子無乾薑不熟得甘草則性緩得桂則補命門得生
畏防風薑則能發散以熱攻熱又導虛熱下行以除冷麻
角忌波汁得蜀椒食鹽下連命門以薄生正節角少
者為上其色以花白者為上有節如鼠乳色亦識色者
次之形不正而傷缺風皺者色亦青綠者為下
本草必讀云市肆售者有以鹽水浸之取其潤濕
體重買者當以體乾堅實項圓正底平者為良

烏頭

別有草烏頭故呼之川烏頭乃附子之母也能治諸風
附子性重滯溫脾逐寒若寒疾即用附子風疾即用
烏頭性輕疎溫脾去風川烏頭

天雄

一名白幕種附子生出長者至三四寸許或種附子而
盡變成長者即如種芋形狀不一之類也但不生子故
曰天雄其長而尖者謂之天雄象形也頂重一兩半有
象眼者乃佳

天雄辛溫有大毒治大風寒濕痺骨節痛凡虛寒須用附子
風家多用天雄烏頭附子共是補下焦命門陽虛之藥

側子

一名煎子蓋附子之側粘連小者名側子辛大熱有大
子治癰腫風痺又治遍身風癢神妙也烏頭乃原生得
同移居乎中者也側子散生旁側體無定在其氣輕揚宜
其發散四肢充達皮膚毛為治風之藥天雄長而尖其氣
親上宜其補上焦之陽虛漏籃子則餘氣所
結其形惟殘直其不入湯服令人喪目也

漏籃子

一名木鼈子又名虎掌天南星之小者亦名此乃附子

之瑣細未成者小而漏籃故名之苦辛此不堪服宜入瘡科也服之令人喪目

△按附子有毒藥而虛寒厥冷症必用之良藥也凡體重賣一個十錢有余為上七八錢者為下浸鹽水渡之故至夏月如不曝乾則濕爛不堪用

延喜式有貢附子則昔本朝出附子乎今止有草烏頭耳中華亦四川外多無之



草烏頭

鳥喙兩頭 土附子 苦毒 耿子 毒公 金鴉苗名良 及董音 獨台草

又名鴛鴦菊汁煎名射罔本綱云草烏頭根苗花實並與川烏頭同但此係野生又無釀造之法其根外黑內白皺而枯燥為異爾然毒則甚焉鳥喙則偶生兩岐俗曰兩頭

尖者也附子天雄之偶生 正月始生葉厚莖方中空葉四

四相當與蒿相似

氣味辛溫有毒 治中風惡風洗洗出汗破積聚寒熱遠志 烏使

反半夏括樓貝母白芨畏 節糖黑豆冷水能解其毒

射罔

苦有大毒此即草烏頭生去皮搗芋莖汁瀝汁澄清旋漆晒乾取膏為射罔以傳箭射禽獸十步即倒中人亦死人中其毒以甘草藍汁小豆葉浮萍冷水蘸危皆可

一味禦之

△按草烏頭俗呼名 葉似菊葉而厚八九月開花淺紫色形似伶人所着烏冠故名之又有白花者其根乃草烏頭也用殺頭瘰癧外科用之和州金剛山之產良若州江州次之今人家種之賞花此與蝦夷射罔一物別種也 壞東人每用射罔毒塗箭其鏃圓木也名燕以射禽獸

彼土無兵器用之禦入中者斃焉如今能知其解毒藥
 不強飾矣羽州有之樹上葉形尋常草烏頭無異其
 毒甚烈誤食一葉即死土人名燕射罔蝦夷人所用
 射罔是也



白附子

ペツノウツク

本綱白附子本出高麗新羅生砂磧下濕地獨莖似鼠尾
 草細葉周匝生於穗間根正如草烏頭之小者長寸許乾
 者皺文有節蓋因與附子相似故名白附子彼稱黑附子
 實非附子類也

氣味辛甘溫 陽明經藥純陽引藥勢上行治中風失音
有小毒 一切冷風



天南星

虎掌
 鬼菟藟
 虎膏
 和名天保今曾美

テンナンスイ

本綱虎掌 河北多有之三四月生苗高尺餘獨莖上有
 葉如爪五六出分布尖而圓一窠生七八莖時出一莖作
 穗直上如鼠尾中生一葉如匙累莖作房旁開一口上
 尖中有花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布地
 一子生一窠其根初如豆大漸長大似半夏而扁年久者
 根圓大者如雞卵周匝生圓芽三四枚或五六枚
 天南星 冀州菜園中種之二月生苗似荷梗其莖高一
 尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月
 結子作穗似石榴子紅色其根似芋而圓扁與蒟蒻相類
 但蒟蒻莖斑花紫此是根小柔膩肌細炮之易裂為可辨

本草綱目卷之五十五 毒草 天南星

爾蓋天南星即本經虎掌也小者名古方多用虎掌不言

天南星始於唐時之名虎掌因葉形似之非根也南星因根

圓白形如老人星狀故名南星

天南星有苦辛乃手足太陰脾肺之藥味辛而麻則得風

故能治風散血氣溫而燥則得牛膽故能勝濕除涎性紫

而毒則得火炮故能攻積拔腫而治口喎舌糜長附子乾薑生薑

欲其下行以黃蘗引之

△按虎掌本名也後名抄亦有虎掌無天南星蓋天南星

之名始出於唐時也明焉今却虎掌無識者疑此從虎

掌子種所出異品名天南星一物異品近頃亦出異品

歡喜草之類是也既虎掌與天南星相似而各別也又

天南星有二種花房淺青色而末如鼠尾者高不過尺

惟如是及佛後光也無鼠尾者高二尺許是自一類二

種也三才圖會及本草必讀出虎掌與天南星之二圖

為二物明焉天南星日向薩摩之產最良豐前中津縣平

州廣島之產次之



武藏鏡

草珊瑚珠

△按此出於虎掌子種高尺許葉大似虎掌三四月開花

外青內赤黑色形似馬鏡故俗名武藏鏡其稍秋結實

似天南星及石韋青子而小橫生為一團正紅色至冬

葉落而唯見子耳故側植石韋而假用其葉



歡喜草

歡喜草

雪筋草

皆俗稱也

△按歡喜草，即天南星變生於子種者也。近頃始出豫州，移栽攝陽，人以為奇異好事者，附異名也。二三月生，一莖作花房，其本一二寸如筒，帶微褐色，而為半片如匙，白色亦似佛，後光末尖，曲覆于花上，其花生筒中，圓白如餅，故名雪餅草。四五月花落結實，形如玉蜀黍而細小，青色熟乃紅色，莖葉如菟藟。



菟藟

人亦名
菟藟頭 鬼芋
舉 和名古通
夜久

本細菟藟本出蜀中宜樹陰下掘坑積糞春時生苗至五月移之長一二尺與天南星苗相似但莖多而點其花紫色宿根亦自生苗經二年者根大如碗及芋魁其外理白秋後采根須淨擦或搗或片段以臘灰汁煮十餘沸以水

淘洗換水更煮五六遍即成凍子切片以苦酒五味淹食不以灰汁則不成也切作細絲沸湯灼過五味調食狀如水母絲

根辛寒有毒生則斂人咳出血延壽書云有人患瘵百物不忌見隣家修菟藟求食之美遂多食而瘵愈又有病肥癰者數人多食之亦皆愈

△按菟藟紀州粉河總州鍋山之產為上備煎丹波次之讚州又次之七八月采根晒乾掛檐間煮之為餅詳干造釀又為紙衣糊煮熟以裨心透通取出搗為糊又瘡疾人食之發

苦薩草

本細生江浙州郡凌冬不凋秋冬有花直出赤子如菟藟頭冬月采根用味苦無毒主中諸毒酒毒研服之又諸蟲傷搗汁飲并傳之

△按菩薩草即今云歡喜草之類乎然歡喜草冬枯春生
苗此物凌冬不凋以為異故重出



半夏

守田 水玉
地丈 和姑

和名保曾久美
俗云烏打

本綱半夏以青州齊州者為佳二月始生苗一莖莖端三
葉淺綠色頗似竹葉白花圓上也月令五月半夏生蓋當
夏之半故名之八月采根實大生江南者似芍藥葉根下
相重上大小皮黃肉白

根辛生微寒肉白者佳不厭陳久凡用生者執人咽喉
熟溫有毒

方中有半夏必須用生薑者以制其毒也惡皂莢畏生

頭柴胡為之使治熱痰佐以陳白木忌海藻飴糖口渴者禁用為其燥也孕婦忌之用生薑

○修治 洗去皮茹以湯泡浸七日逐日換湯令滑盡眼

乾切片薑汁拌焙入藥

半夏餅 用半夏研末以薑汁和作餅子日乾用

半夏麩 用半夏研末以薑汁白礬湯和作餅楮葉包

置籃中待生黃衣日乾用

經云腎主五液自入為唾入肝為泣入心為汗入脾為痰

入肺為涕有痰曰嗽無痰曰欬痰者因嗽而動脾之濕也

半夏治痰之標不能治痰之本治本者泄腎也俗以半夏

為肺藥非也

俗以半夏有毒用貝母代之夫貝母肺經藥半夏足太陽

經藥何可以代若勞虛咳嗽吐血咯血肺痿肺癰婦人乳

癰及癰疽惡毒乃禁用半夏故皆以貝母為向導倘可代

也至於脾胃濕熱涎化為痰久則生火痰火上攻昏憤僵

仆寒濕等症生死且夕亦豈貝母可代者耶

△按半夏 出於豫州者最良豐州中津藝州廣島雲州

島根郡江州之產皆次之也。大粒而色白無皮者為良。小粒而色不白及有皮者不可用也。藥肆所造，麴半夏多用小者，其薑製亦不精也。特有之藥，修製不可輕忽，宜自製，詳審也。

治五絕急病，自益。墻壁木石。壓。瀉水。魔魅。產乳。以丸半夏細末，用冷水和丸如大豆，納鼻孔中心頭溫者，雖經一日可治。



蚕休

蚕休 三層草
七葉 一枝花
草甘遂 蟹休
紫河車 重臺
白甘遂

本綱又名金線重樓，或云重生。深山陰濕之地，一莖獨上，莖當葉心，葉綠色，似芍藥。又云葉似玉絲，莖如麻。凡一二三層，每一層七葉莖頭，夏月開花，一花七瓣，有金線蕊，長三四寸，又有至五七層者，根如鬼臼，蒼木狀，外紫中白，有粘糯

根或云微寒有毒

摩醯傳癰腫蛇毒甚有效，俗諺云七葉

一枝花，深山是我家，癰疽如遇者，一似手拈弩是也。



鬼臼

鬼臼 天臼 鬼藥
解毒 解毒 早荷
害藥 羞天花
木律草 八角盤
唐婆鏡 獨脚蓮

獨荷草。山荷葉。馬目。毒公。瑤田草。有數本綱有一種根皆似天南星，赤莖直上，莖端生葉，一種葉凡七瓣，一種葉作數層，葉似蓖麻，面青背紫，而有細毛，葉下附莖開一花，狀如鈴鐺，倒垂青白色，黃蕊中空，結黃子，風吹不動，無風自搖。又曰：此草一年生，一莖既枯則生一白，及入九年八九白，然一年一白生，而一白腐，蓋陳新相易也。

根辛溫 解百毒，治子死腹中胞破不生者。此方累效，救

鬼臼不拘多少，黃色者去毛為細末，不用篩羅，只熬每

服一錢酒一盞同煎八分通口服立生如神名一字散



射干

野萱花草薑
黃遠 仙人掌
紫金牛

本綱射干有數說今取春生苗高一二尺葉大類變薑而
狹長橫張踈如鳥翅及扇之狀中抽莖似萱草莖而強硬
六月開花大如萱花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中
子黑色

根苦寒 有毒多服瀉人能降火故治咽喉腫痛射干根山豆

根乾陰為未吹之如神

△按本草綱目射干與烏扇為一物因條名抄亦云射干

一名烏扇和名加良 須布木並未詳審其二物莖葉花形狀各
別也種頌所謂莖梗踈長正如射之長竿之狀者射干

也莖短葉側相比而如扇者烏扇也

射干葉似鷲尾而闊段段抱莖上生中心抽一莖高三
四尺七月開花似萱草花而六瓣黃赤俗呼紅有細點
畧如山丹花結實作房如胡麻房而三稜一房六隔有
中子二三十粒大如豌豆而生青熟紫黑色而硬
一種小射干射干名姬葉小而長六七寸如石苜蓿花亦
小淺紫畧似苜蓿花而小美可愛



烏扇

烏扇妻 烏吹
烏蒲 鳳翼
鬼扇
和名加良須
阿布岐
俗云檜扇

△按本綱烏扇射干以為一物今別之異名亦分附于此
凡物某與某以相似者謂之鳥此似官家所持檜扇故
名烏扇又名檜扇乎其葉似鷲尾而狹勁色亦深潤比

比匾平相雙頗如扇抽莖不過一二尺四月開花狀似
鴛尾花而小灰白色有黃文而不結實其根蘆微紫色
俗相傳修驗者呪咀調伏以此花為佛供故尋常忌之
未知然否

又世俗所謂烏扇乃射干射干乃烏扇也共以形狀辨
之則自明焉蓋一物培柴灰於根則葉生皺以為奇珍
射干之名有二佛經射干貂楮此是惡獸似青黃狗食人
能緣木阮公云射干歸層城者是樹殊有高大者本草射
干是草節今人所種者也



射干

イユニウイ

本綱鴛尾其苗低下於射干葉布地生狀如鴛之尾其

似射干而潤短不抽長莖夏開花紫碧色根似高良薑節
大數箇相連皮黃肉白

根錯評嚼之戟人咽喉但治邪氣鬼疰諸毒

四物鴛頭散治邪魅邪氣鴛頭黃牙金黃石于防
葵為末方酒服欲令病人見鬼增防葵一分欲令鬼

又增一分立驗不可多服

△按鴛尾莖矮形狀似烏扇而艷色似射干但烏扇射干
翻可覓三四月抽短莖開花形似燕子花而紫色花之
底微白



玉簪

ヨツラツラ

白鶴山
俗云岐保字之

本綱人家栽為花草二月生苗成叢高尺許柔莖如白菘

其葉大如掌圓而有尖葉上紋如車前葉青白色頗嬌瑩
 六七月抽莖莖上有細葉中出花朶十數枚長二三寸本
 小未大未開時正如白玉搔頭簪形又如羊肚蘑菇之狀
 開時微綻四出中吐黃蕊頗香不結子其根連生如鬼白
 射干生薑輩有鬚毛舊莖死則根有一白新根生則舊根
 腐

根甘辛寒 治癰腫搗酒服以渣傳之

古今醫統云嚴冬用稻草覆其根則來春易發
 畫譜云春初移種肥土中則茂其花辨入少糖霜煎食香
 清味淡可入清供

△按玉簪葉潤圓末尖似橋欄干之形故俗呼名破保宇
 之五月開花也如上說六七月結實作莢長寸許一莖
 十余莢垂下生青熟枯黃邑內有細子正黑色也然本
 草謂不結子者非也又蘑菇之茹當作菰疑傳寫之誤
 矣而羊肚菜俗云井 蘑菇俗云孫 詳于芝栴類



小玉簪

本綱玉簪之紫花者葉微狹○畫譜云玉簪紫者花小葉
 上黃綠間道喜水分種盆右栽之可玩
 △按俗云小玉簪葉狹長抽莖也二三尺長於白鶴仙其
 花微紫或純白也又有葉上黃縱理者謂之箭玉簪花
 以為異近年出之畫譜所言者是也



鳳仙花

急性子 旱珍珠
 金鳳花 小桃紅
 深指甲 草菊婢
 夾竹桃 海蔘

本綱鳳仙花極易生二月下子五月可再種苗高二三尺
莖有紅白二色其大如指中空而脆葉長而尖似桃柳葉
而有鋸齒極間開花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦
自變易狀如飛禽頭翹尾足具如鳳狀女人采其花及葉
包凍指甲自夏初至秋盡開謝相續結實累累大如櫻桃
其狀微長色如毛桃生青熟黃犯之即自裂皮卷如拳苞
中有子似蘿蔔子而小褐色

子微若溫能治骨哽以竹筒灌入其內但此草不生蟲蠹
蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也其子性急速故能透骨
軟堅危人烹魚肉硬者投數粒即易軟爛是其驗也凡
服之者不可着齒也最損齒與玉簪根同多用亦戟人
咽

畫譜云金鳳花六種有重瓣單瓣紅白粉紅紫色淺紫如
藍有白者上生紅點疑血俗名洒金六色花開一落即去
其蒂則花茂與月季同

△按鳳仙花蜂蝶亦不近之說非也特蝶喜吸其花也然
為人則可有小毒能解物骨故亦不可不損人齒



曼陀羅花

風茄兒
山茄子

ミントウロハク

本綱曼陀羅花生北土人家亦栽之春生苗夏長獨莖直
上高四五尺生不旁引絲莖碧葉葉如茄葉八月開白花
凡六瓣狀如牽牛花而大攢花中抽駢葉外包而朝開夜
合結實圓而有下撈中有小子九月采實

法華經言佛說法時天雨曼陀羅花又道家北斗有陀羅
星使者手執此花故後人因以名之
花子辟毒治面上生瘡曼陀羅花晒乾研末少許貼之
時珍曰相傳此花笑米釀酒飲令人笑舞采釀酒飲令

入舞予常試之飲酒半酣更令人或笑或舞引之乃
 驗此與火麻子花陰乾等分爲末熱酒調服三錢少頃
 昏昏如醉割瘡灸火宜先服此則不覺苦
 △按近頃來於朝鮮今人家多栽之花似大牽牛花及博
 多百合花故俗曰朝鮮牽牛花其實似檳榔子而有細
 礪文又別有名曼陀花者同名異種 見溫草部



羊躑躅

黃躑躅 老虎花
 黃杜鵑 鷓鴣花
 玉枝 羊不食草
 開羊花 開當作
 俗云蓮華豆之

本網近道諸山皆有之小樹高二尺葉似桃葉三四月開
 花黃色似凌霄花而五出蕊辨皆黃而氣味皆惡
 花辛溫有毒 羊食其葉躑躅而死
 △按羊躑躅一名以波豆之槌本草之諸說則今云蓮

華躑躅也丹波及和州吉野山多有之其木一二尺高
 者五六尺葉似楊梅葉而薄有微白毛二月開花五出
 似凌霄花一莖八九莖遠望之如蓮華故名之又有赤
 蓮華者換頌云嶺南有深紅凡躑躅之品類雖多黃花
 者惟蓮華躑躅豆其躑躅之二種也而穉躑躅岩躑躅
 等亦一類而花色不黃

豆其躑躅

俗云未女加良豆豆之

△按豆其躑躅深山巖石間有之三四月開花似芙蓉柳
 花而黃色其葉四時不凋瑞卷反似豆其躑躅之
丹波水生郡之山中



穉躑躅

俗云毛知豆之

△按躑躅葉淺綠色有細毛枝少花繁三四月開花淺紅似桃花色而一枝數萼其花及萼觸手即黏如黏故名之花形色不美今人四月八日灌佛用之或插竹竿供之未知其據但當此時甚多故取其簡易耳

一種有躑躅名江戶萬葉似躑躅其花千葉而色濃不黏為異

一種有岩躑躅伊波豆葉花共小花色深赤



琉球躑躅

平戶躑躅

△按平戶九州之地名本出於琉球四月開花草辨白最易繁茂其大者至一二丈

一種有朝鮮躑躅高五六尺葉似檀葉三四月開花大如平戶躑躅花而淡鼠白色潤澤最為珍



永來部躑躅

△永來部薩摩之南島也出於彼土甚暖故如雖移種于畿內怕寒難茂盛其花赤大徑五六寸許甚奇凡躑躅之種類最多不下三百種不能悉記之



山躑躅

山石榴
杜鵑花
和名阿伊豆之
今云左豆木

甘子ツ子ヨツ

本綱山躑躅處處山谷有之高者四五尺低者一二尺春
生苗葉淺綠色枝少而花繁一枝數萼二月始開花如羊
躑躅而蒂如石榴花有紅者紫者五出者千葉者小兒食
其花味酸無毒

草本叢譜云杜鵑花喜陰惡肥天蚤以河水澆之樹陰下
放置則茂葉色青翠可觀有黃白二色

一種有藤牽牛花者葉似躑躅而花似山石榴而大淡紫
色蓋藤者言色牽牛花者言形

按山躑躅高者五六尺其花有白有赤有紫有桃紅有
赤白襍開者至三百餘種四月始開五月為盛入呼五月
月稱佐豆幾故名之凡紀列遠列等山中躑躅山鵲花
共大木多有高一二丈周二尺許者

攝列須磨一谷二谷至權現山凡三四里許遠列秋葉
山麓乾川兩邊亦三四里許躑躅山鵲花甚多夏月滿
山頗如錦凡正月折枝插地則活攝列多田鄉圃人常
栽之販市又木槎最堅燒炭以為圍炭圍者茶湯室名
詠曰加父井



映山紅

俗云岐利(未)

草本叢譜云映山紅生蒲山頂其年豐給人競之

按本草綱目山躑躅杜鵑花杜鵑花映山紅躑躅以為一物今
別為二種凡躑躅葉形類桃及柳葉映山紅葉畧帶圓
形杜鵑花葉形比映山紅狹長三種大異也

映山紅花類杜鵑花而小深赤色單葉三月開花能狀
蒲山故名之有大小二種小映山紅開花最繁叢枝條
堪愛今又有白花者有單葉八葉千葉之數品大抵二
三尺高者一二丈以為珍薩摩日向山谷多有之移種
于諸國彼地有霧島嶽每嶺燒起且此花映山故名之

朝鮮載晉山世稿云大明成化年中當得日本躑躅數盆及其花開葉單而花瓣甚大色類石榴重附疊萼久而不衰其與我國色紫而千葉者妍蚩不啻若嬪母與西施也上嘉賞之命下上林園分植外人秘莫能得後一以種盆一以種地以試之種地者凍死而盆者無恙數年之間枝條方盛按此杜鵑花或大映少紅之類也



荒花

杜堯敗萃赤荒
毒魚兒草去水
頭痛花其根名
黃木戟 蜀桑
俗云以波布知

本綱荒花近道處處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月采花

五月采葉八九月采根陰乾小人爭鬪者取此葉按捺皮膚輒作赤腫如被傷以証入其花有紫赤白者絳州出者花黃謂之黃荒花凡因其氣惡呼為頭痛花荒花苦溫治欬逆上氣喉鳴喘咽腫瘰癧水腫用當微熱不可近眼反留陳久者張仲景治傷寒太陽證表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水氣乾嘔痛引兩脇或喘或欬者用十棗湯治之中有荒花

△按荒花俗云藤葉花並似藤而小三月開花紫色或白色乃如有紫藤白藤二種然未見赤黃者別有谷藤出干蔓草類又有華鬘草出干蔓草類濕共似荒花而異




荒花
饒音

和名波末仁禮

本草綱目卷之九十五 毒草 卷之九十五 三十一

本綱荒花即荒花黃色者也小株花成簇生其花生時色黃乾則如白或言無荒花以桃花代之取其利耳氣味苦寒治傷寒溫瘧下十二水破積聚癥瘕

△按荒花有和名則古者有之乎今無之



醉魚草

開魚花榿木
魚尾草

本綱醉魚草在塹岸邊作小株生高者三四尺根狀如狗把莖似黃荊有微稜外有薄黃皮枝易繁行葉似水楊對節而生經冬不凋七八月開花成穗紅紫色儼如荒花一樣結細子漁人采花及葉以毒魚盡圍圍而死池沼邊不可種之此花色狀氣味並如荒花毒魚亦同但花開不同時為異爾

又有狀如藕而赤華名曰葶薺者可以毒魚



莽草

茵草 芒草
鼠莽 莽俗
音 作莽
罔或入木部

本綱莽草木若石南而葉稀無花實揉之其臭如椒搗以和陳粟米粉納水中魚吞則死浮出人取食之無妨又山人以毒鼠周禮煎氏掌除毒物以茵草熏之則死氣味辟温治喉痺及牙痛取葉煎湯熱含冷則吐之誤食之害人惟黑豆煮汁服可解豆汁澆其根即爛性相制也

△按莽草俗以為檿者非也檿有花實是亦入水中魚死故相誤乎檿見干香木下



茵芋

茵蕒 莞草
甲共
和名仁豆之
云乎加豆之

本綱茵芋雍州絳州杭州有之春生苗高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實

莖苦温 茵芋莽草皆古人治風藥為妙品近世罕知
△按茵芋和名有躑躅之號詳今躑躅類中無結實者



石龍芮

地楳天豆 石能
魯果能 水莖
胡椒菜 莖莖
彭根 苦莖
和名不加豆美
俗云田芥

本綱石龍芮生近水下濕地高者尺許其根如薔二月生苗叢生圓莖分枝一枝三葉葉青而光滑有三尖多細缺四五凡開細黃花結小實大如豆狀如初生桑椹青綠色槿散則子甚細如葶藶子宜半老時采之入藥有二種
水生葉光末團者石龍芮也
陸生葉毛末銳者毛莨也
子根無毒 治風寒濕痺心腹邪氣利關節補陰氣久服輕身明目不老
治蛇咬傷瘡及血疝乃平補之藥古方多用之其功與枸杞覆盆子相符而世人不知用何哉
△按石龍芮葉如人參葉而花實與毛莨同截瘡接葉貼寸口一夜作泡功亦與然則是不無毒者也



毛茛

毛建草 水莖
毛莖 天灸
自灸 猴蒜
俗云鬼田芥子
今云金寶花

本綱毛茛下濕處即多蓋其音乃草烏頭之苗此草形狀及毒皆似之故名之春生苗高者尺餘一枝三葉葉有三尖及細缺與石龍芮莖葉一樣但有細毛為別四五月開小黃花五出甚光艷結實狀如欲綻青桑椹而有尖峭與石龍芮子不同

葉及子辛温有毒 惡瘡癰腫疼痛未潰者搗葉傅之今入爛 截瘡采葉按貼寸口男左女右一夜作泡如火燎
△按毛茛形狀如上說今千葉花亦有花罷莖枝則更生苗一莖一葉無枝極無毛畧似小款冬而冬亦不枯至春別抽莖枝葉形變生毛躡青色不似石龍芮光澤



牛扁


倭名未知未知佐

ニウペン 扁特 扁毒

本綱牛扁生平澤下地似葦草石龍芮莖根如秦艽而細根苗苦微寒無毒 治身皮膚熱氣可作浴湯殺牛虱又能治牛病

虱建草

本綱生山足濕地發葉似山丹微赤高一二尺味苦無毒接汁沐頭虱蟣盡死



蕁麻

毛蕁 蕁蕁

本綱蕁麻山野諸處多其莖有刺高二三尺葉似花桑或青或紫背紫有毛芒可畏觸入如蜂螫蟻蓋以入湯麻之則解有花無實冒冬不凋接投水中能毒魚

氣味辛苦寒有大毒 治蛇毒楊塗之人食之吐利不止按投水中能毒魚杜子美有除蕪草詩是也



海芋

かいよ

觀音蓮羞羞草

隔河仙天荷

ハクイイヨイ

本綱海芋生蜀中今處處有之春生苗高四五尺大葉如芋葉而有幹其大者可以禦雨葉背紫色夏秋間抽莖開花如一瓣蓮華碧色花中有蕊長作穗如觀音像在圓光之狀其根如芋魁大者如升筥長六七寸蓋野芋之類也以可變金味辛有大毒

透山根

本綱生蜀中山谷其草類藤蕪昔有人採藥誤研此草刀忽黃軟成金也取汁可以點鐵成金有大毒人誤食之化為紫水見胸樓神書及庚辛玉龍

一種有金英草亦生蜀中狀如馬齒莧而色紅槓鐵成金亦有入毒入口殺人須臾為紫水也

△按蜀中者今之四川地出諸藥名草透山根金英草亦有之矣但變鐵成黃金者變色耳



鉤吻

ケムリ

野葛斷腸草

毒根胡蔓草

黃藤火把花

ケウホツ

俗云奈倍和利

本綱鉤吻南方桂州益州等村墟閭巷間皆有蔓生莖大如箭而方其葉如柿圓面光春夏嫩苗甚秋冬枯老稍緩五六月開花似櫻柳花而色紅又有黃花者數十朵作穗其根新米者皮白骨黃宿根似地骨與白花藤相類人

亦惑之新者折之無塵氣經年以後則有塵起從骨之細孔中出今又折枸杞根亦然人誤食其葉者半日則黑爛死無復生少入口則鉤人喉吻也故名鉤吻然羊食其苗大肥物有相伏如此或云葉如茶然謂昔岐伯對黃帝言黃精益壽鉤吻殺人乃是二草善惡死如食鉤吻葉而飲冷水即死急也冷水發其毒也薤菜能解其毒取薤菜汁滴鉤吻苗即萎死如中鉤吻毒口不可開者取大竹筒洞節以頭拄其兩脇及臍中灌冷水入筒中數易水須臾口開乃可下藥解之惟多飲甘草汁人尿汁或取雞卵抱未成雛者研爛和麻油灌之吐出毒物乃生稍遲即死

△按駿列遠列及備列有鉤破者延蔓生莖有刺葉似山茶葉而不尖有縱野六月開小花秋結實熟則外皮開裂內子赤其葉有毒誤亦唇舌裂故名鉤破鉤破如此鉤吻草之類乎然本草鉤吻不言子有無

和漢三才圖會卷第九十八目錄

蔓草類

兔絲子	五味子	蓬蘽
覆盆子	樹莓	蛇莓
使君子	木鼈子	馬錢子
馬兜鈴	蘿藦	檣藤子
預知子	牽牛子	旋花
纏枝牡丹	鐵線草	風車草

紫葳

荼蘼花

繅絲花

王瓜

天門冬

萹薹

白薺

九仙子

墙藜

月季花

棣棠花

葛

百部根

菝葜

楮魁

黃藥子

佛見笑

玫瑰花

枯槿仁

黃環

何首烏

土茯苓

鵝抱

山豆根

解毒子

茜草

通脫木

白英

葎草

絡石

常春藤

玉蔓

白藥子

防己

釣藤

赤地利

羊桃

木蓮

千歲藥

鈴樹草

威靈仙

木通

雪下紅

紫萹

烏薺莓

地錦

忍冬

天仙藤

和漢三才圖會

蔓草 卷九十六

目錄二

南藤

藤黃

項王草

粘魚鬚

野木瓜

錦荔枝

出子藤菜

省藤

荊藤

谷藤

留紅草

牛尾菜

水胡蘆

紫藤

羅生門

千里及

狗掉尾草

落花生

和漢三才圖會卷第九十六

攝陽

城醫法橋寺

良安 尚順 編

蔓草類



兔絲子

唐音

トウストラツ

赤網玉女

菟縷野狐絲

菟蘆金線草

菟藟火燄草

菟丘唐蒙

本綱兔絲子、田野荒園多有之、其子入地、初生有根如細絲、不能自起、及長得他草、梗則纏繞而生、其根自斷、無葉、有花白色、微紅、香亦襲人、結實如批豆、而細、色黃、生干、梗上尤佳、子氣味平、辛、甘、益氣力、補不足、強陰、堅筋骨、養肌、久服、明

自延年治男女虛冷得酒良暮黃松脂
苗甘平 治面野粉刺絞汁塗之立瘥

△按菟絲子俗云根奈出於和州金剛山者佳丹波之產
次之物色と云はわりの根の葉たがせり引くは



五味子

莖藉玄及
會及

和名佐祢加豆良

本綱五味子皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味而五味具故名之春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類蓮花狀七月成實叢生莖端如豌豆許大生青熟紅紫有南北二種南產者色紅北產者色黑入滋補藥必用北產者乃良可取根種之當年就旺若一月種子大

年乃旺須以架引之

子酸微若鹹 陰中微陽入手足太陰血分 酸鹹入肝而補

腎辛苦入心而補肺甘入中宮益脾胃總收肺氣乃火熱必用之藥故治嗽以之為君但有外邪者不可驟用

恐閉其邪氣必先發散而後用之乃良入補藥熟用

△按五味子朝鮮之產最良中華次之倭亦次之日本處處多有之而紀州田邊之產良藝州廣島及日向丹波之產次之其梗乾者形也浸水取粘汁塗髮甚佳俗呼名美軟石名義



蓬蘽

覆盆 陵蘽
陰蘽 寒莓
割田蔗

俗云豆留以智

本綱此類蓬蘽覆盆子。凡有五種時珍嘗親采以爾雅所列者校之始得其的諸家異說多皆未可信也蓋蓬蘽者藤蔓繁衍莖有倒刺逐節生葉葉大如掌狀類小葵葉面青背白厚而有毛六七月開小白花就蒂結實三四十顆成簇生則青黃熟則紫黯微有黑毛狀如熟椹而扁冬月亦苗葉不凋

子甘酸安五臟益精氣強志倍力久服輕身不老



覆盆子

莖西國草 缺盆畢楞伽 太麥每挿田 蕙烏蘽子 和名以知古

本綱覆盆子蔓小於蓬蘽亦有鈎刺一枝五葉葉小而面背皆青光薄而無毛開白花四五月實成子亦小於蓬蘽而稀疎生則青黃熟則烏赤冬月苗葉凋

食子有子

蓬蘽覆盆子二物功用大抵相近雖是二物其實一類而二種也一早熟一晚熟兼用無妨

蘽

蘽田蘽其蔓小於蓬蘽一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃似覆盆而太赤味酸甜可食不藥入用



樹莓

懸子木莓 俗云木以知古

本綱樹莓樹生高四五尺其莖白色有倒刺其葉有細齒青色無毛背後淡青頗似櫻桃葉而狹長又似地棠花葉四月開小白花結實色紅與覆盆子一様但色紅為異氣味酸平止渴除痰醒酒去酒毒

△按木莓似蒲萄葉而硬深青色莖無刺時珍言者蛇莓之莖葉也



蛇莓

蛇蘆 地莓 蠶莓

俗云及老亦汲以知古

本綱蛇莓田野道旁有之就地引細蔓節節生根每枝三葉葉有齒刻四五月開小黃花五出結實鮮紅狀似覆盆而面與蒂則不同其根甚細其實不堪啖

莖葉根汁甘酸大寒有毒治傷寒大熱胸腹大熱不止通月經又孩兒口禁以汁灌之傳湯火傷痛即止俗傳食之能殺入

△按蛇莓樞州處處多出之俗傳用蛇莓莖葉煎服治麻痺或與忍冬同用治濕瘡癬疥也未知其據蓋有毒草多服豈得宜乎今人治便毒腫痛按葉丸如大豆三粒空心服多試皆有効



使君子

留求子

スラキニツ

本綱使君子原出嶺南交趾今閩蜀皆栽種之亦易生其藤如葛繞樹而上葉青如五加葉五月一簇一二十葩紅色輕盈如海棠其實長寸許五瓣合成有稜類椰子嫩時半黃老則紫黑其中仁長如椰子色味如栗久則油黑不可用此藥療小兒疾故名留求子氣味甘温治小兒百病五疳小使白濁瀉痢虛熱健脾

胃凡殺蟲藥多是苦辛惟使君子樞子甘而殺蟲亦異也服之者忌飲熱茶犯之即瀉此物殺蟲小兒要藥也俗醫乃謂殺蟲至盡無以消食鄙俚之言也樹有蠹屋有蟻國有盜福耶禍耶修養者先去三尺可類推也△按原始曰使君子味甘即是用肉然肉少難得今醫家或兼用也近來所渡者多無仁故皆用殼



木鼈子

木蟹

本綱木鼈子今湖廣諸州皆有之蔓歲一枯但根不死春生苗作藤生葉有五極狀如山藥蒲葇葇青色面光四月生黃花六月結實似枯樓而極大生青熟紅黃色肉

軟刺每一實有核三四十枚其形扁礪礪大如圍其子似鼈及蟹狀其仁青綠色

氣味苦微甘 治折傷消惡瘡生肌乳癰肛門腫痛痔瘡

療癰腰痛及小兒疳疾倒睫拳毛等良

○倒睫拳毛因風入脾經致使風痒不住手擦日久赤爛

左患塞右鼻右患塞左鼻其毛自分上七下七次服蟬蛻藥為妙



馬錢子

火矢刻把都

末知年者馬錢之唐音也

本綱馬錢子狀似馬之連錢故名之生回回國今邛州諸處皆有之蔓生夏開黃花七八月結實如枯樓生青熟赤亦如木鼈其核小於木鼈而色白能毒狗至死

氣味苦寒 治傷寒熱病咽喉痺痛消痞塊

西番人言用馬錢治一百二十種病每證各有湯引又云以豆腐制過用之良

△按馬錢 治小兒諸蟲藥中入用為桑山氏秘方原異國傳來方乎 毒鼠鼠食之即死慎勿令狗食之 殺禽獸以鐵屑少加之和飯則毒烈但不仁者所為耳



馬兜鈴

都淋藤 土青木香根 雲南根 根名

獨行根 同

本綱馬兜鈴諸州郡皆有之春生苗作蔓繞樹而生葉如山

山積葉而厚大背白六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實如大棗狀似鈴作四五瓣葉脫時其實尚垂狀如馬頂

之鈴故名之其根微有香氣似木香大如小指赤黃色故呼為土青木香有結嶺南人用其根治蠱毒隱其名為

三百兩銀藥

實 微苦 入手太陰經清肺熱治欬嗽痰結喘促

△按青木香 重出下用之雜偽於木香又倭無馬兜鈴而蘿藤根似之故亦偽為青木香

燈上燒存性為末溫酒服立效

△按青木香 重出下用之雜偽於木香又倭無馬兜鈴而蘿藤根似之故亦偽為青木香



蘿藤

實名雀瓢 合子羊婆奶 婆婆鐵線包

本綱蘿藤三月生苗蔓延離垣極易繁衍其根白軟其葉長而後大前尖根與莖葉斷之皆有白乳如構汁六七月

開小長花如鈴狀紫白色結實長二三寸大如馬兜鈴丁
 頭尖其殼青軟中有白絨及漿霜后枯裂則子飛其子輕
 薄亦如兜鈴子商人取其絨作坐褥代綿甚輕詩云芄蘭
 之支童子佩觿觿音畦解角錐也此芄蘭之葉童子佩
 鞞音涉長弓指鞞也此葉
 子葉辛甘微主治虛勞補益精氣強陰道擣子傳金瘡生
 層止血搗葉傳腫毒取汁傳丹毒及蛇蟲毒

一種莖葉及花皆似蘿藦但氣臭根紫結子圓大如豆生
 青熟赤為異此乃藤生女青也與蛇銜根之女青名同
 物異宜互效之

△按蘿藦俗云加莖有白汁名羊婆奶與沙參同名又有
 倭沙參則名攷亦蘿藦之類也山草類今或取蘿藦

根偽為青木香青木香是然此根未詳治何病其葉似
 旋花葉而畧大結實本大末窄青色內白有白絨如絲
 此絲子如柘榴子而小白味甘白絨枯飛狀似馬兜鈴



楨藤子

象豆 楨子
合子

本綱楨藤子生廣南山林間作藤着樹如通草藤其實三
 辛方熟角如弓袋子若雞卵其外紫黑色微尖大一二寸
 圓而扁人多剔去肉其殼用作藥瓢置于腰間貯丹藥經
 年不壞
 仁平治諸藥毒五痔下血小兒脫肛血痢燒灰存性
 米飲服之



預知子

聖知子
聖光子
盞合子
仙沼

チネイツウダ

本綱預知子諸州皆有之蔓生依大木上葉綠有三肉面
 深背淺七八月有實作房生青熟深紅色每房有子五七
 枚如皂莢子斑褐色光潤如飛蛾今蜀人極貴重之亦難
 得相傳取子二枚綴衣領上遇有蠱毒則聞其有聲當預
 知之故以名之
 氣味苦寒治諸毒殺蟲研皮治一切風補五勞七傷消
 宿食利小便催生治一切病每日吞二七粒不其功不
 過三十粒永瘥也
 可備述



黑丑 白丑
 牽牛子 草金鈴 狗耳草
 盆甌草 和名阿佐加保
 ケニウツウ

本綱此藥初出田野人牽牛謝藥故名之處處處有之

種子三月生苗作藤蔓繞籬牆高者或二三丈七月生花
 其花不作瓣如鼓子花而大但微赤帶碧色日出開日西
 萎八月結實外有白皮裹作毬每毬內有子四五枚大如
 蒼菱有三稜有黑白二種


黑者 尤多蔓有白毛斷之有白汁葉有三尖如楓葉
 白者 多種之其蔓微紅無毛有柔刺斷之有濃汁葉團

有斜尖其花小干黑牽牛花淺碧帶紅色
 子苦寒發利大小便除虛腫落胎乃瀉氣之藥也不脹
 滿不大便秘者不可輕用臨用者去黑皮或只碾取頭
 熟用

△按牽牛花寅卯辰三時為盛向日光則萎再不開而余
 蒼開花乃一莖數十花逐日開不經旬皆結實其花有
 深碧淺碧純白淺紅色四種而紅者希也

一種有小牽牛花高三四寸未延蔓不倚架二葉而開花

故名二葉牽牛花亦小美也蓋此生瘠地不能長者也
 復種其子乃如之
 有朝顏晝顏夕顏之三品朝顏牽牛也晝顏也旋花夕顏之類花
 皆以其花盛時稱之



旋花

鼓子花 旋菑
 拖腸草 筋根
 天劍草 美州
 續筋根

ソシ
 ン

和名波夜
 比止久佐

本綱旋花生于田野甚多難鋤艾治之又生其根寸截置
 土灌既涉旬苗生逐節蔓延葉如波菜葉而小至秋開
 花如白牽牛之花而粉紅色不作瓣狀如軍中所吹鼓子故
 名之不結子其根白色大如筋
 一種千葉者色似粉紅牡丹謂纏枝牡丹

莖葉花根微苦 益氣利小便久服續筋骨合金瘡

凡藤蔓之屬象人之筋所以多治筋病旋花根細如筋
 △按旋花盛于日午而且暮萎故俗對以牽牛花稱朝顏
 此名晝顏加保



纏枝牡丹

マシ
 ン

本綱纏枝牡丹即旋花之一種千葉而色粉紅似牡丹
 草本花詩譜云纏枝牡丹柔枝倚附而生花有牡丹態度
 甚小纏縛小屏而開爛然亦有雅趣
 △按纏枝牡丹未見如此者有鐵線花者形狀稍似而花
 葉大異也



ろん

本名未詳

鐵線花

△按鐵線花二月苗生於宿根一莖三葉微似芍藥秧而小莖細韌甚勁故俗曰鐵線無蔓其葉乃倚架繁行四月開花葉下有六葉抱莖一異也其花白色六瓣平開而葉圓紫色最艷美其本有子採之八月種之

千葉鐵線 外六瓣白色如常 內瓣亦白色 十葉短細 隨開葉青色外瓣既綻落則內

ろん

本名未詳

風車草

小兒所翫之風車似此花形故名



△按風車草者鐵線草之類而葉不同花亦鐵線六瓣是乃八瓣也葉大於鐵線而無叉一枝三葉四五月開花單葉蒼碧色又有白花者有千葉者花綻葉亂形與鐵線之息同凡鐵線出葉於繁枝風車出葉於舊枝



紫葳

ツツライ

のうんぐろ 凌霄 陵君
 陵時 女葳
 芙蓉 武葳
 瞿陵 鬼白
 和名未加夜木
 云農世宇

本綱陵若多生山中人家園圃亦或栽之初蔓纏數尺得木而上即高數丈年久者藤大如杯春初生枝一枝數葉尖長有齒深青色自夏至秋開花一枝十餘葉大如牽牛花而頭開五瓣赭黃色詩云有若之其黃矣秋深更赤八月結莢如豆莢長三寸許其子輕薄如榆仁馬兜鈴仁其根長亦如兜鈴根狀其花不可近鼻聞傷腦花上露入目令人昏矇

花根甘酸莖葉苦手足厥陰經藥行血分能去血中伏

火故治產乳崩漏諸疾及血熱生風之證也

△按陵若乃字世牟延蔓于高樹生故民間鮮



牆藤

薔薇 山棘
牛勒 刺花
牛棘 訓無波良 又呼字音 實名薔實

本綱牆藤野生林藪間春抽嫩莖小兒搗去皮刺食之既長則成叢似蔓而莖硬多刺小葉尖薄有細齒牛喜食之四五月開花四出黃心有白色粉紅二者以白花者為良結子成簇而生如管星然故謂之管實和名無皮生青熟紅其核有白毛如金櫻子核人家栽玩者莖粗葉大延長數丈花亦厚大有白黃紅紫數色百葉八出六出者營實能入陽明經除風熱濕熱生肌殺蟲

故癰疽瘡癤古方常用

○小便失禁尿床者用薔薇根煮汁飲或為末酒服野生白花者更良

○口舌糜爛者用薔薇根煮濃汁溫含冷則吐冬用根皮 夏用枝葉凡口瘡日久延及胸中生瘡三年已上不瘥者皆效南番有薔薇露云是此花之露水香馥異常

△按薔薇之蕪字當作蕪胡貢草萊心長也

本草綱目卷之六 木部 九十六

水滸三ノ圖

卷九ノ六

十一



宝相花

佛見笑

ガク

本綱墻藤之花最大者名佛見笑其小者名木香皆香艷可入不入藥用

書譜云寶相花其花較薔薇大瓣塞心有紅粉色二種較字當作輒字

△按佛見笑俗名牡丹凌其實相花亦一物二名矣正月剪稍枝并於陰處濕地則能活生最棘多而花艷美以壁之女人華嚴經云外面似菩薩内心如夜叉蓋佛見笑之名概此矣凡有棘刺之草通稱無波良俗用茨字茨音慈蒺藜之别名

俗云古也平坡

茶藤花



畫譜云其花大朵色白而香千瓣枝梗多刺詩云開到茶

藤花事盡為當春盡時開耳外有密色一種△按茶藤花道成八殘所言亦同今名古夜乎岐者是乎

其花白單瓣狀似花石榴之花



リウリョウ 月月紅 勝春

月季花

閩雪紅瘦客 俗云長春 勝春之訛



ニツリイバ

本綱月季花人家多栽挿之亦薔薇類也青莖長蔓硬刺

中葉三寸圖繪

蔓草

卷九ノ六

十一

葉小於薔薇而花深紅千葉厚瓣逐月開放不結子
氣味甘溫 活血消腫治癩癧未破者

月季花頭 二錢 沉香 五錢 芫花 炒三錢 各碎剉入大瓶

魚腹中就以魚腸封固酒水 各一盞 煮熟食之即愈魚

須安養水內遊死者方効 此是家傳方 治人多年

△按月季花塔被之類挿之能活有單葉千葉大小數品



玫瑰花

俗云波木奈須

盡譜云色黃花稍小於紫玫瑰種紫玫瑰多不久者用入
瀝澆之即斃種以分根則茂本肥多悴黃亦如之紫者乾
可作囊以糖霜同搗收藏謂之玫瑰醬各用俱可
△按玫瑰花薔薇之屬棘刺多四月開花單瓣有白有紫亦

並花最大又有赤紫而千瓣者其花稍小有香氣但黃
花者未見之



繖絲花

俗云 阿蘭陀棘

盡譜云繖絲花儼如玫瑰而色淺紫無香枝生刺針時至
煮繖花盡開放亦以根分




棣棠花


地棠花 御帶花 金盃喜水 草山吹

導生八歲及草本花詩譜云棣棠花若金黃一葉一莖生

甚延蔓春深海濱黃薇河開可助不色單葉者名金碗喜木
 秘傳花鏡云棟棠花藤本叢生葉如茶葉多尖而小邊如
 鋸齒三月開花金黃色圓若小球一葉一蕊但繁而不香
 其枝比薔薇更弱心延蔓屏樹間與薔薇同架可助一色
 春分剪嫩枝於肥地則活其本如在不生蟲味
 △按棟棠花其葉似櫻桃葉而長尖四月開花千瓣深黃
 單葉者花大其色艷如山吹之黃金故名又有單葉白
 花者不美橘諸兄公愛之山州并手里宅地多植之公
 任翰朗詠集用欸冬字者誤也欸冬即山落也訓也未布个木
 花陰乾能止血本草



根



仁



桔樓仁

朱贏 瓜蒌
 天瓜 菓瓜
 地樓 澤茹

此後名非也 此後名非也

本綱桔樓仁三四月生苗引藤蔓葉如甜瓜葉而窄作
 有細毛七月開花似壺蘆花淺黃色結實在花下大如拳
 生青而如瓜至九月熟赤黃色而如熟柿山家小兒亦食
 其形有正圓者有銳而長者內有扁子大如絲瓜子殼色
 褐仁色綠多脂作青氣炒乾搗爛水熬取油可點燈其根
 直下生年久者長數尺皮黃肉白作粉潔白如雪故謂之
 天花粉秋後掘者有粉一名白藥又名瑞雪
 桔樓仁有寒潤肺燥能降上焦之火使痰氣下降治嗽
 之要藥也且又能洗滌胸膈中垢膩鬱熱為治消渴之
 神藥

桔樓根甘微苦 酸微寒 即天花粉治虛熱解煩渴能生津心中
 枯涸者非此不能除消腫毒乳癰瘡癤箭鏃或針刺入
 肉不出枯樓根搗 乳汁不下枯樓根燒存性研末服
 △按桔樓出於紀州者良豫州藝州並次之



老鴉瓜。土瓜
馬兜瓜。狗薺
赤雹子。野薺
師姑草。今人多
以名加良須
字里

本綱王瓜生垣墻間三月生苗其蔓多鬚嫩時可茹葉圓

如馬蹄而有尖面青背淡澁而不光六七月開五出小黃
花成簇莢子累累熟時有紅黃二色皮亦粗澁其殼徑寸
長二寸許上微圓下尖長七八月熟殼中子如螳螂頭其
根如枯樓根之小者澄粉甚白臍須深掘二三尺乃得正
根作蔬食味如山藥月令云四月王瓜生即此也熟則鴉
喜食之故名老鴉瓜
根若寒有小毒 治消渴痰血月閉帶下乳汁不下止小
便數不禁又能利大小便
小便不通者王瓜根搗汁入少水解之筒吹入下部大

便不通者吹入肛門內

黃疸變黑醫所不能治用王瓜根汁平且溫服一小升

午刻黃水當從小便出不出再服

△按王瓜葉似枯樓葉但無又缺有毛刺其實殼中子如
玉章後書翰卷封人誤以為此與枯樓一物和名亦相
混者非也蓋枯樓此作古王瓜即老鴉瓜加良須和名
自明也



葛 音 雞齋 鹿藿
黃斤音大
鹿食九草此其
也故名鹿藿
和名久須
加豆良

本綱葛有野生有家種其蔓延長一二丈紫色取治可作
絺綌其葉有三尖如楸葉而小面青背淡七月着花其花
成穗累累相綴紅紫色其莢如小黃豆莢亦有毛其子綠

葛 卷九十五

色扁扁如鹽梅子核生嚼腥氣其根外紫內白長者七八尺者頸也服之令人吐有微毒故以入土深者為佳今人多作粉食冬月取生葛搗爛入水中揉出粉澄成漿入沸湯中良久色如膠其體甚軟以蜜拌食韌音忍與韌同堅柔難斷葛根味甘辛平氣輕而上行浮而微降陽中陰也其用有四止渴一解酒二發散表邪三發瘡疹難出四陽明經藥兼入脾經治傷寒有葛根湯以其主大熱解若太陽初病未入陽明而頭痛者不可便服升麻葛根發之是反引邪氣入陽明為引賊破家

凡痲痘已見紅點不可用升麻葛根湯恐表虛反中諸藥毒發狂煩悶吐下欲死者葛根煮汁服佳葛花甘平消酒同小豆花乾末酒服飲酒不醉也
 △辨葛蔓長者二三丈其葉韌薄微似于楮葉而面青背白至風則能翻恰如反掌婆娑而作聲故稱歌人葛葉

裏見譬人恨其蔓青黑色有微毛強韌不可截斷本草綱目謂紫色者乃枯舊色也以堪縛器物葛根出於和州金剛山者良丹波次之葛粉吉野瀑葛為最上西國亦多有之春月取根搗爛漬水一宿以白漚為上其次灰白色者俗布野人充食渣如絲灰皮以代薪凡此物葉及蔓至根其用居多為民利用



黃環

實名狼跋子
 又名度殼
 凌泉 大就
 就葛 生芻
 根韭

本綱黃環亦葛之類生山谷二月生苗正赤高二尺作藤生葉黃而圓端大經日葉有汁黃白其花紫色其子名狼跋子跋乃狼足此莢角亦似皂莢其根名黃環黃色從理如車輻解

氣味苦寒有毒治鬼魅百邪痰嗽利小便消水腫



天門冬

蔓冬、顛刺、萬歲藤、天棘

和名須未呂久佐

本綱天門冬春生藤蔓大如銀股高至丈餘葉如荀香極尖細而疎滑有逆刺亦有澀而無刺者其葉如絲杉而細散夏生細白花又有黃色及紫色者秋結黑子在其根枝旁入伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指圓實而長二二寸一科一二十枚同撮頗與百部根相類雖曝乾猶脂潤難搗必須曝於日中或火烘之

氣味苦甘入手太陽足少陰經氣分藥也潤五臟補五勞七傷吐血治嗽消痰益滋腎全其母氣故清痰殊功

○生地黃為天門冬之使地黃為麥門冬之使

之使若有君無使是獨行無功也服天門冬禁食鯉魚誤食中其毒者并汁解之



百部

野夫門冬、婆娑草

和名保止豆良本朝古者有之而今則無之

本綱百部是天門冬之類春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青而光

一種有細葉如荀香者其莖青肥嫩時可煮食其根近尺新時肥實但乾則虛瘦無脂潤根下一撮十五六枚黃白色其多者百十連屬如部伍故以名之百部根月微天門冬之類故治肺病殺蟲如百蟲入耳

百部根炒研生油調一字干耳門上一切樹木生蟲盡
之即死重衣去虱百部根温而不寒寒嗽宜之
百部根温而不寒寒嗽宜之
百部根温而不寒寒嗽宜之
百部根温而不寒寒嗽宜之
百部根温而不寒寒嗽宜之
百部根温而不寒寒嗽宜之
百部根温而不寒寒嗽宜之
百部根温而不寒寒嗽宜之
百部根温而不寒寒嗽宜之
百部根温而不寒寒嗽宜之



何首烏

交藤九真藤
夜合陳如白
地精桃柳藤
赤葛馬肝石
瘡帝紅肉消

本綱何首烏春生苗蔓延竹木墻壁間莖紫色葉葉相對
如薯蕷而不尤澤夏秋開黃白花如葛勒花結子有稜似
蕎麥而雜小纒如粟大其根大者如拳各有五稜瓣似小
甜瓜有雌雄赤者雄白者雌又云雄者苗色黃白雌者黃
赤根遠不過三尺夜則苗蔓相交或隱化不見春末夏中
秋初二時候晴明日兼雌雄米之乘間以布帛拭去泥

勿損皮烈日曝乾密器貯之每月再曝用時去皮為末煎
下有疾者即用茯苓湯下凡服用偶日二四六八日服
以衣覆汗出導引心良是本神仙之藥

氣味苦温足厥陰少陰藥白者入氣分赤者入血分不寒不燥功在
地黃天門冬諸藥之上能益氣血離疽瘰癧諸疾可治
矣此藥流傳雖久服者尚寡

右昔能嗣潁州南入山取交藤任教始服之六十有余
歲而始生數男皆壽其中延秀百六十歲延秀生首烏
首烏服藥亦生數子羊百二十歲髮猶黑仍以何首烏

為此名深山產者即大而佳心諸血無
七寶美髯丹烏髮壯筋骨固精氣續嗣延年

赤白何首烏大明嘉靖初有連生皇太子於此天下大行矣
赤白茯苓各十斤去皮研末牛膝八兩酒浸當歸拘杞子兔絲子各酒補骨脂黑胡麻

和莫二寸同合

妙香皆忌鐵器煉蜜丸空心酒服一百丸

△按何首烏狀如小瓜有五路紋而有三四相連者今所
渡者多切片正黑不能辨其赤白此用黑豆蒸製者矣
倭稱何首烏者黃獨而非何首烏其黃獨出柔根髭多
其子如零餘子而畧大然則根葉子形狀甚異入藥宜
用唐何首烏也本草彙言曰何首烏固精斂氣截癰止
痢之藥也延年種子之說屬荒唐屢有服此而後至死
而人不識此藥之毒也蓋此言亦徧也何首烏乃薯蕷
之屬本有毒類然深山自然生歷數年雌雄夜交蔓
者謂有奇効則不擇雌雄老嫩而何有效况黃獨乎



草薺

赤節 百枝
竹木白菝葜
抄名土古呂
野老 此漢書抄用
若延喜式用之
忍此和字

本綱草薺處處皆有之作蔓生苗葉俱青葉作三叉似山
薯又似綠豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者根
黃白色多節三指許大又有根亦如山薯而體硬其苗列
蔓葉似蒼麥子三枝者
根若平 足陽明厥陰經藥也 厥陰主筋屬風 草薺之功
長于去風濕所以能治緩弱瘠痺遺濁惡瘡諸病之屬
風濕者草薺菝葜土茯苓三物形雖不同而主治之功
不相遠 根大黃柴胡前胡

△按草薺蔓葉頗似薯蕷開小白花結青子三枝其根須
老薑薯蕷之狀最肥者如甘藷而黃色有節多長鬚俗
以為野老以蝦為海老共充嘉祝之食品出於武陽者
肥大肉柔味苦甘相半煮之食甚佳也山中自然生者
肉瘠味甚苦呼曰鬼野老豫州今治蕪州廣島多出草
薺可藥入用

和漢三才圖會

卷之六

卷之六

卷之六

○草薺黃獨佛掌諸薯蕷之蔓葉相似難辨各圖于左

草薺




黃獨
訛云何首烏



佛掌諸



薯蕷



唐何首烏亦似

△按草薺葉小黃獨葉大相似而色淺潤橫文理鮮明佛掌諸葉圓薯蕷葉長共色稍深不潤橫文理幽微薯蕷無橫文附聚之處深入背



接莢

接莢 金剛根
王瓜草 鐵蒸肉

俗云惠比豆伊波良
又云五郎四郎柴

本綱接莢山野中甚多其莖似蔓而堅強植生有刺其莖團大狀如馬蹄光澤似枕葉秋開黃花結紅子其根甚硬有硬鬚如刺其葉煎飲酸澆或采其根葉入漆家用

根甘酸溫性 足厥陰少陰藥治腰背寒痛風痺與草薺併而收 彷彿又治時疾瘟瘴故元且所飲辟邪屠蘇酒中亦用
△按接莢和河二州山中多出之俗以為倭山飯來西國野人用葉包麥餅



土茯苓

トウホリン

仙遺糧 刺猪苓
冷飯團 土置薺
硬飯 草禹餘糧
山猪糞 山地栗
俗云山歸來
又云加天草

本綱土茯苓生山谷蔓生如蔓莖有細點其葉不對狀頗類大竹葉而質厚滑如瑞香葉而長五六寸其根狀如菘蕒而圓其大若雞鴨子連綴而生遠者離尺許近或數寸

和菓二折圖

接莢

卷九十六

三

其肉軟可生啖有赤白二種入藥用白者良昔人不知用此近時弘治正德間大明因楊梅瘡盛行故自廣東人始率用輕粉藥取效毒留筋骨潰爛終身後人用此遂為要藥諸醫無從考證性性以草薛及菘菹與土茯苓相混其根苗迥然不同也蓋此亦草薛菘菹之類也

根甘淡 食之當穀不飢調中健行不睡健脾胃強筋骨去風濕止泄瀉治拘攣骨痛惡瘡解汞粉毒忌茶酒△按土茯苓阿媽港之產為最上皮薄外色淺赤內白如朱粉然近年絕不來今以廣東者為上交趾東京並次之太寬為下但色白柔輕虛者良色赤堅重實者不可

凡楊梅瘡盛流行也於今凡不過二百年市中好淫人交濁陰彼此傳染歟焉古者罕識其治療而肢體拘攣終至眼鼻腐爛故如有患之者則不同器中其重者或棄於山野近來多服土茯苓用使病人自山歸來實良藥也其方有數品總名歸建方中得效驗者以為家秘

土茯苓為君若治木通杜仲黃連薏苡苦歸之輩為佐但服之有時瘡既出盡結痂將愈時宜用之永免癰疽之患如瘡未出盡時駭不可服之服藥間忌浴湯及飲酒凡瘡小如麻疹者一二箇月而結痂謂之四十日物稍重者曰八十日物瘡平圓如灸瘡緣隆或堆大如楊梅者即楊梅瘡俗云唐瘡不經半年不如其間無雜病者必不服藥最忌補藥恐令瘡毒補住如年久餘毒留滯一處腐爛或為疔者宜用五寶丹方出萬病回春



白菡

白草 白根 兔核 崑崙 貓兒卵

本綱白菡二月生苗多在林中作蔓赤莖枝端有五葉其葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵而長三五枚

和莫三十圖會

蔓草

長九尺六寸

二二

和名夜未加之夫

同一窠皮黑肉白惟治瘡方多用之故名首斂

一種赤斂花實功用皆同但表裏俱赤爾

白斂根苦平治癰疽發背癩癧痔漏血刺刀箭瘡生肌

止痛生取根搗傳癰腫有效

△按白斂本朝古者有之今則無焉長而色白輕者為良

本草用斂字疑此傳寫誤矣斂音酬斂音廉欲也斂收也

赭魁

名爲正木

和名爲正木

既有倭名則本朝古者有之乎

チエ、シイ

本綱赭魁蔓生草木上葉似杜衡根膚黑肌赤形如魁器又似何首烏切破中有赤理如檳榔有汁赤如赭味甘治心腹積聚闌人用入深青甌中云易上色或以漆皮製靴



鵝抱

ガヤ

俗云末女古介

ゴウ、バウ

本綱鵝抱生山林中附石而生作蔓似大豆其根形似菜蕨大者如三升器小者如拳二八月采根切片陰乾氣味苦寒治風熱上壅咽喉腫痛

△按鵝抱葉圓扁徑三分許裁之鹽鉢石傍則延蔓一面蔽石如藪敷青豆其根最細小所謂如菜蕨者未見

九仙子

キウ、スエ、ニ、ツ、ク

キウ、スエ、ニ、ツ、ク



キウ、スエ、ニ、ツ、ク

本綱九仙子出均州大和山二月生苗蔓高六七尺莖細而光葉如烏柏葉而短扁不圓每葉極生子枝或一或二鳥鳥下至六七月開碎青黃色花隨即結實碎子叢簇如穀精草子狀其根連綴九枚大者如雞子小者如半夏白

氣味苦涼 治咽痛喉痺散血 磨以新汲水或醋磨汁含嚙甚良



黃藥子

大苦 木藥子 赤藥紅藥子

本綱黃藥子原出嶺南今處處裁之以忠州萬州者為勝莖高二三尺柔而有節節有殺相當似藤非藤葉大如拳長三寸許其根長者尺許大者圍二三寸外褐內黃亦有黃赤色者肉色頗似羊蹄根人皆擣其根入深藍甌中云易變色也

黃藥子根 苦平 涼血降火消癭凡吐衄不止者水煎服或與蒲黃等分為末掌中舐之 肺熱疾

んづん 解毒 黃結

山豆根

中藥



本綱山豆根以忠州萬州產為佳苗蔓如大豆葉青經冬不凋此物能解諸藥毒生廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕其鼠取腸胃曝乾解毒 根極苦言 解咽喉腫毒妙



解毒子

地木容
苦藥子

本綱解毒子，戎州忠州出之。蔓生，葉青如杏葉而大，厚硬。凌冬不凋，無花實。根黃白色，外皮微粗，褐纍纍相連，圓大。根苦大，解蠱毒，止蠱毒，止煩熱，辟瘴癘，利喉閉及痰毒。治五臟邪氣，清肺。

藥實根

藥子 奴那疎樹子


本綱生通州渝州樹也。葉似杏花，紅白色，子肉味酸，去皮中仁，辛平。研服，治破血，止痢，消腫，能療諸病。然本草本經誤載根字。
△按解毒子用根得子，名藥實根，用子仁得根名。



白藥子

又別有
陳家白藥
甘家白藥
會列白藥
突厥白藥
其功畧同

本綱白藥子出於原州。三月生苗，葉似苦苣。四月抽赤莖，長似壺盧蔓。六月開白花，八月結子，亦名瓜蔓。九月葉落，枝折，采根用。根皮黃色，今嶺南江西亦有之。江西出者，葉似烏柏子，如綠豆，至六月變成赤色，治馬熱，方用之。根辛溫，止吐衄，血消痰，止咳，解毒，治疔眼，傳折傷，金瘡。



威靈仙

宇豆保久佐
布那波良
右二和名古名
而非也

根 本草必讀

三才圖會

ワイリンセン

本細威靈仙其生先于衆草方莖如銀股數葉相對初生
 作蔓七月生花六出淺紫或碧白色作穗似蒲臺子亦有
 似菊花頭者實青色根稠密多鬚似穀每半朽敗每半旁
 引羊深轉茂一根叢鬚數百條長者二尺許初時黃黑色
 乾則深黑

別有數種根鬚一樣但色或黃或白皆不可用
 根鹹溫治痛風之要藥也在上下者皆宜服之其性好
 走亦可橫行通十二經脉去衆風朝服暮效魏類
 商州有人病手足不遂不履地者數十年莫能療親屬
 置之道旁以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥
 可治但不知此土有否因爲之入山求索果得乃威靈
 仙也使服之數日能步履其後山人知之遂傳其事性
 大抵疎利久服恐損真氣以性猛曰威以功神曰靈仙
 按威靈仙俗云九藝州豫州丹波及金剛山多出之初
 生似蔓後立莖高二三尺莖細圓而如莞葉似虎尾草

而六七葉對生頗如車輪最長者九段許故名六月開
 花人家栽者四月開花形亦似虎尾草及葦草花而作
 穗碧色結實如雞冠實其根多髭如芥根乾則黑色是
 能合干上說惟所謂莖所圖花穗少異耳
 或採藥人用徐長卿根充威靈仙可辨徐長卿根白色如
細辛詳見干山草



茜草

五月生
 牛蔓和名阿
 加補

本細茜有東方而少不如西方多故爲西說文所謂人血
 所化之說恐亦俗傳耳詩云茹蘆在阪者是也生山谷今
 圃人亦作畦種蒔十二月生苗蔓延數尺方莖中空有筋
 外有細刺數寸一節每節五葉葉如烏藥葉而糙澀面青
 背綠七八月開花結實如小椒大中有細子根紫赤色北

即今深絳者也

氣味微酸而帶鹹溫 手足厥陰血分之藥專于行血活血女子

經水不通以一兩煎酒服之一日即通甚効鐵氣

△按西赤根也河州石川郡山田茜為上可以深絳近世用橫方木代茜

此防已

條防已



防已

わづい
あさろく

解離 石解

和名 阿乎加
豆良

本細防已莖如葛蔓延其根外白內黃如桔梗內有黑紋如車輪解者良但漢中出者破之文作車輪解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通然他處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有下疳子名木防已此因所出物一曰漢木二防已即是根苗為名

治風用木防已治木用漢防已

蒙筌云漢防已即根破之故作車木防已 丁足子青白虛軟宗此辨認黃實馨香

氣味苦辛 療風水要藥利大小便能瀉血中濕熱通其

滯塞大抵上焦濕熱者皆不可用下焦濕熱流入十二經致一陰不通者然後審而用之

△按防已有漢木二品而今自中華所渡者皆長六七寸

切大者徑寸許黃色帶赤破之文作車輪解而甚香所謂漢防已也而別木防已者不來

倭之產長七八寸切大小如木通莖而青白色皮皺不香所謂木防已是也二物共苗莖而非根也明焉今藥肆以唐為漢防已以倭唯稱防已藝州廣島為上丹波

之產短細為下蓋本草必讀所圖之瓜防已者未勸



木通

通草 萬年藤
附支 丁翁
子名 燕覆

本綱木通藤生蔓大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉
頗類石韋又似芍藥二葉相對夏秋開紫花亦有白花者
結實如小木瓜食之甘美其枝謂之木通莖有細孔兩頭
皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良紫者反厚味辛
白者皮薄味淡
木通甘淡 手厥陰經包手足大陽勝小腸之藥上能通心
清肺治頭痛利九竅下能泄濕熱利小便通大腸治遍
身拘痛利其小便也與琥珀同功無他藥可比者
凡氣味與之同者茯苓澤瀉灯草猪苓琥珀瞿麥
車前子之類皆可以滲濕利小便泄其滯氣也
△按木通自華所渡者有香氣佳倭之產出於丹波者良

蘇州者次之


根



通脫木

通草 古托元
離南

本綱通脫木蔓生山側莖大者圍數寸高丈許大葉似荷
而肥其莖空心中有瓢輕白可愛女人取以飾物今園圃
亦有種蒔者或作蜜煎充果食之甘美
氣味甘淡 入太陰肺經引熱下降而利小便與燈心入
陽明胃經通氣上達而下乳汁催生
△按通脫不者木通之屬而大者如燈心草莖中有白瓢
本朝未曾有之蔓草也



鈎藤

テロウエン
俗云布知止毛
殺利

本綱鈎藤處處山中皆有之藤長八九尺又一二丈大如
柶指其中空狀如葡萄藤長其莖間有刺若鈎鈎紫色療
小兒不入餘方也以莖中空小人用致酒甕中盜取酒以
氣吸之消渴不斷

氣味初微甘後微苦 古方多用皮后世多用鈎取其力銳爾手
足厥陰藥足厥陰主風厥陰主火 小兒驚癇弦連皆肝風相入之
病鈎藤通心包平肝木風靜火息則諸證自除
一種有倒掛藤 生深山有逆刺如懸鈎倒掛于樹葉尖
而長治產後諸疾結痛血上欲死煮汁服之
△按鈎藤出於豐州中津者良藝州廣島者次之



雪下紅

草本花詩譜云其藤生子類珠大若芡實色紅如日繁葉
下垂積雪盈影似更有致故名雪下紅



白菜

ハツイン
一云豆又美乃伴比孫
今云鶴上戸

本綱白英蔓生正月生苗白色可食秋開小白花葉似玉
似小長而五極子圓如龍葵子生青熟紫赤色
根苗 甘寒 補中益氣治消渴黃疸

本草綱目 卷九十六 蔓草 白菜

子 酸平 明目

△按白英葉似菊葉而柔大深叉七月開小白花五瓣抱子翻外有飛鳥之狀其子赤熟時鵲喜啄之故俗曰鵲上戶亦鵲為嗜之故曰鵲鴿然鵲鴿不如嗜蟻蚋



赤地利

赤薺 薺 五葳 毒草 蛇菌 山蒼向來 以之美加波 又云牛菜

本綱赤地利所在皆有春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蒼麥葉七月開白花亦似蒼麥結實青色根若莢莢皮紫赤肉黃赤八月采根 根若平 治赤白痢赤白帶下癰疽惡瘡生肌肉

△按赤地利作蔓莖赤葉青似蒼麥根長別貫莖小圓葉如輪夏開小白花結一子於小葉中熟碧色莖及葉背筋有細刺其根如桔梗薺之輩

葉背筋有細刺其根如桔梗薺之輩 倭方用赤地利薺葉為折傷金瘡要藥 如膠故名石膠 其葉畧似赤地利故以之偽 一種有田蒼麥 其葉畧似赤地利故以之偽



紫葛

和名衣比加豆良 紫葛亦和名后

本綱紫葛生山谷中春生冬枯苗似葡萄莖一丈許根皮肉俱紫色其根大者徑一二三寸但有二種此是藤生者 根皮 甘苦 治癰腫惡瘡 金瘡傷損生肌散血 葛二兩水三盞煎 半分二服 酒煎亦好 按紫葛葉似蒲萄而不結子又一種有野蒲萄者出于瓠果類下

本草綱目 卷之六 紫葛



猪殃殃

葎

葎草

勅草 葛藟蔓
來莓草

和名毛久良
俗云無久良
毛與無通

本綱葎生故墟道旁二月生苗莖有細刺葉對節生一葉五尖微似范麻而有細齒八九月開細紫花成簇結子狀如黃麻子夏米莖葉曝乾用

氣味甘苦 主瘀血 止精益氣 利小便 治五淋 治久痢 成疳 入肚門中

猪殃殃

救荒本草云猪殃殃生山野道傍猪食之則病故名之人春時采莖葉煮熟食之
△按稱無久良者多而葎草少有之猪殃殃又有葎草

生水溝傍 見于濕草部



羊桃

鬼桃 羊腸
長楚 銚尾
細子

倭名伊良今葎


本綱羊桃生山林及田野莖大如指似樹而弱如蔓春長嫩條柔軟葉大如掌上綠下白有毛狀似苧麻而團其條浸水有涎滑花紫赤色似桃花子細如黍粒其根似牡丹近下根乃切其皮着熱灰中脫之可鞣筆管其子苦不堪食詩云隰有萋楚者即是也
莖根 苦寒 利小便 又煮汁洗風痒及諸瘡腫極功



烏蕨

拔音五葉蕨
龍草 龍葛
赤葛 五爪龍
赤發藤
俗云五爪

木綱烏蕨堪整間多其藤柔而有稜一枝一鬚凡五葉葉長而光有疎齒面青背淡如白蕨葉故名烏蕨七八月結苞成簇青白色花大如粟黃色四出結實大如龍葵子生青熟紫內有細子其根白色大者如指長一二尺擣之多涎滑氣味酸苦寒治癰瘡及蟲咬擣根傳之



絡石

石鏡 懸石
耐冬 雲花
雲丹 雲英
石血 雲珠
石龍藤

本綱絡石生陰濕處冬夏常青其蔓折之有白汁其莖蔓延透樹石側莖節着處即生根鬚包絡石旁其葉小千指頭厚實木強回青背淡濇而不光有尖葉圓葉二種若在石間者葉細厚而圓短透樹生者葉大而薄人家亦種之為飾

莖葉甘微酸神農列之上品治筋骨關節風熱癰腫不老延年通神又刀斧傷瘡傳之立瘥杜仲牡丹為之今醫家鮮知用者豈以其近賤而忽之耶

△接絡石和石豆太俗云定家葛相傳黃門定家卿之古墳石生因名之葉似藪柑葉而無刻齒無花實又蔓白汁無



木蓮

薛荔 木饅頭
鬼饅頭


和漢三才圖會

卷之九

木部

木蓮

本綱木蓮延樹木垣牆而生四時不凋厚葉堅強大干絡石不花而實其實大如盃微似蓮蓬而稍長正如無花果之生者六七月實內空而紅八月後則滿腹細子大如繆子一子一鬚其味微澆其殼虛輕烏鳥童兒皆食之葉酸平治背癰下利即愈又治血淋痛瀉子甘澆下乳止血治腸風下血治一切癰疽初起不問發於何處解開溫服功與忍冬草相上下



地錦

別石草類有地錦草與此不同

本綱地錦生林下葉如鴨掌藤蔓着地節處有根亦緣樹石冬月不死氣味甘溫治產後血結及赤白帶下或有鬼不能飲食者並煎服



常春藤

龍鱗薜荔土鼓藤

本綱常春藤生林薄間作蔓繞草木上其葉頭尖結實正圓熟時如珠碧色小兒取其藤於地打作鼓聲故名土鼓莖葉苦子甘溫癰疽初起研汁和酒服利下惡物去其根本



千歲菓

蔓蕪 芭瓜 倭名何未 豆良 俗云甜茶

本草綱目卷之九 藤類 忍冬

本綱千歲藥蔓延木上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而味甘五月開花七月結實八月采子青黑微赤冬惟凋葉春夏間取汁用

葉甘平 補五臟益氣續筋骨長肌肉久服不飢通神明
△按千歲藥代茶煮吃味甚甘故俗名甜茶如小兒多吃則發蟲

一種樹生之甘茶葉似荻而深綠色似茶而嫩味甚甘出於山州宇治由原



忍冬

金銀藤 老幼鬚
鴛鴦藤 鷺鷥藤
左纏藤 通靈草
金釵股 蜜痛藤
和名須比加豆良

本綱忍冬附樹延蔓莖微紫色對節生葉葉似薔薇而

有濇毛三四月開花長寸許一蒂兩花二瓣一大一小如

半邊狀長藥花初開者藥瓣俱色白經二三日則色變黃

新舊相參黃白相映故呼金銀藤氣甚芬芳其藤左纏凌

冬不凋故有忍冬左纏等之名今以莖葉為忍冬以花為金銀藤

忍冬甘小寒 煮汁釀酒飲補虛療風益壽可常采服而仙

經少用凡易得之草人多不肯為之更求難得者貴遠

賤近庸人之情也昔人稱其治風除脹解劑為要藥而

後世不復知用後世稱其消腫散毒治瘡為要藥而昔

人並味言及乃知古今之理萬變不同未可一轍論也

忍冬酒

用葉入沙盆研爛入生餅酒少許稀稠得所塗于四圍中留一口洩氣其藤只用五兩木槌槌損和鐵寸草節生用一兩同入沙瓶內以水二盞文武火慢煎至一

本草綱目卷之九 藤類 忍冬

益入無灰酒一大盃再煎十數沸去滓分為三服一日
 一夜喫盡病勢重者一至大小腸通利則藥力到能治
 癰疽發背不問發在何處發有發頤或頤或頂或腹之
 俟其疽破仍以神異膏貼之其効甚妙
 △按忍冬處處皆有之攝州之產良其忍冬酒紀州羽山
 源上昂太夫之製得名但欲為藥用者若本草製而所
 矣

玉蔓

たまぐさ



△按玉蔓其蔓引地葉似忍冬葉而厚春開小花色青綠
 可愛

俗稱木字

鈴掛草



△按鈴掛草引蔓其葉似櫻而圓小夏秋葉間著花紫色
 而圓畧似十日紅之花

天仙藤



テンスン

本綱天仙藤生浙江山中春生苗蔓作藤葉似葛葉圓而
 小有白毛四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人多用之
 氣味苦温 同麻黃治傷寒發汗同大黃墮胎得安胎藥


治子癰症又治姪娠水腫始自兩足漸至喘悶似水足
 有風氣或衝任有血風不可作水為接
 湯藥宜天仙藤散主之詳干婦人良方
 △按天仙藤本草無開花之說然三才圖會所圖者有花



南藤

風藤 石南藤
 丁父 丁公藤
 丁公寄
 俗云風藤蔓

本綱南藤諸大山有之細藤圓臍紫綠色一節一葉葉深
 綠色似杏葉而微短厚其莖貼樹處有小葉瘤疣中有小
 孔四時不凋莖葉皆臭而極辣白花蛇食其葉
 氣味 辛温 治金瘡痛去風邪強腰脚除痺
 △按南藤能治諸風故有風藤之名乎今瘰癧癰瘻人用
 為洗藥瘰癧瘻腫痛者用
 風藤煎汁頻洗有効



省藤

赤藤 紅藤
 俗云登字
 止呼藤一字
 音為名

本綱省藤生南方深山皮赤大如指堪縛物片片自解也
 或織草履
 氣味 苦平 治蛇蟲通五淋煮粥飼狗去癩

科藤

音科

明張燮東西洋考云科藤蔓抽被地無枝葉有皮裹其
 外如竹皮剥之則落長數丈不值翦伐可纏繞數國
 齋民要術云科藤圍數寸重於竹可以代篾以縛船及
 以為席勝竹也
 △按省藤科藤恐此一物矣凡如柬埔寨太泥六甲暹羅

咬啣吧ハカマ番且南方多出藤及藤庭ハシロ今所來藤皆無外皮黃白色滑堅大如箭竹ハシロ纖破之甜白肉以縛卷器物其用最多今用其白肉入淋病藥中



招豆藤

紫藤 此用藤一子訓鳥名

ソワテニ

本綱紫藤藤皮着樹從心重重有皮四月生紫花可愛長安人亦種飾庭也其子作角角中仁熬香着酒中令酒不敗敗酒中用之亦正其花接碎拭酒醋白腐瘰氣味甘微温煎如糖服下水瘰癧瘰音野心病也
△按紫藤花象一二二天纏樹垂架最艷美攝州野田藤得其名蓋冬月酒糟汁及米泔汁灌根則茂盛

又有白藤 葛葉皆無異唯花白耳 凡楠藤花於水最易萎灌酒於其本蔓則歷時不凋




藤黃 沙黃 臘黃 俗云喜和字

本綱藤黃出岳州鄂州諸山崖樹名海藤花有葉散落石上彼人收之謂之沙黃就樹采者輕妙謂之臘黃此與石無異畫家及丹竈家時用之又真臘國有畫黃乃樹脂彼人以刀斫樹枝滴下次年收之不知即石與一物否也今畫家所用藤黃皆經煎煉成者祇之麻人
△按藤黃今畫家漆土以塗黃色又堂塔塗椽椽是也

くまがら

俗稱木字

谷藤



△按谷藤蔓草也葉似小梅葉而圓三月葉間開花似紫藤花

一種有岩藤即此荒花也詳千毒草類

くまがら

俗稱木字

四羅生門



△按羅生門蔓草也葉似胡麻葉而短三月葉間開小花
深青俗云紺色

しろうせいもん

俗稱木字

項王草



△按項王草葉似贊波丁子葉開單黃花結小莢宿根不生當年下種即開花自四月至十月有花贊波丁子出於濕草

けいおうくさ

俗稱木字

留紅草



△按留紅草細莖韌葉細密如杉藻而表裏淺青色莖而出蔓八月枝又抽短莖開花形如丁子樣而紅色長六七分可愛花罷結角中有細子

本草綱目卷之九
千
千里及



千里及
セムアミキウ

本綱千里及生天台山又笈州有生淺山及路旁葉似菊而長背有毛枝幹圓而青春生苗秋有黃花不結實采莖葉入服藥

龍鬚菜



粘魚鬚

農政全書云粘魚鬚生山野中初先發葉其後延蔓生莖發葉每葉間皆分出一小又及出一絲蔓葉似土茜葉而

大又似金剛刺葉而光澤味甘


ぎしんさい



牛尾菜

全云牛尾菜生山野間苗高二三尺葉似粘魚鬚葉葉間分生叉枝及出一細絲蔓又似金剛刺葉而小紋脈皆豎莖葉相間開白花結子黑色其葉採嫩葉燻熱水浸淘淨油鹽調食

くまざい



狗掉尾草

農政全書云狗掉尾苗生山中苗長二三尺拖蔓而生莖
 方色青其葉似歪頭菜葉稍大而尖鞘色深綠紋脈微多
 稍間開五瓣小白花黃心衆花攢開其形如穗
 葉微酸採嫩葉燂熟去酸味油鹽調食



野木瓜

八月檀并瓜

農政全書云野木瓜生山野中蔓延而生妥附草木上葉
 似黑豆葉微小光澤四五葉攢生一處結瓜如肥皂大味
 甜熟者可採食

農政全書云水胡蘆生水邊就地拖蔓而生每節間開四
 葉而葉如指頂大其葉尖上皆作三叉味採嫩秧連葉
 燂油鹽調食



水胡蘆

致富全書云落花生藤蔓莖葉似扁豆開花落地一花就



落花生

番豆 土露子
 滴水生
 長生果

和漢三才圖會 卷之六 雜木類

地結一果其形與香蕈相似亦二月內種之喜鬆土用隔
年肥灰壅宜栽背陰處秋盡冬初取之煮食味甚甘美人
所珍貴若未經霜則苦難入口

△按落花生近年來于長崎形似蠶豆而畧斜壺大寸余
皮灰白色文理堆熬剝皮中有三四子褐色形味共似
胡桃海松子等香美試雖數百粒種難生

櫻新編圖會

葉面葉底皆具大具葉尖上皆有三尖和十枚葉外葉
脈文全書云木質白而皮不盡枯或嫩或硬而主壽壽開

似黑正葉嫩小光澤一而葉上一定時八加也也



木時薑

和名

