欽定四庫全書總目

續名醫類案六十卷

國朝魏之琇撰之琇既校刊江瓘名醫類案病其尚有未備因續撰此編雜取近代醫書及史傳地志文集說部之類分門排纂大抵明以來事為多而古事為瓘書所遺者亦間為補苴故網羅繁富細大不捐如疫門載神人教用香蘇散一條猶曰存其方也至腳門載張文定患腳疾道人與綠豆兩粒而愈一條是斷非常食之綠豆豈可錄以為案又如金瘡門載薛衣道人接已斷之首使人回生

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

編修邵晉涵家藏本

一條無藥無方徒以語怪更與醫藥無關如斯之類往往而是殊不免蕪雜又蟲獸傷門於薛立齋蟲入耳中一條註曰此紫耳門亦收之非重出也恐患此者不知是蟲便檢閱耳云云而腹疾門中載金臺男子誤服乾薑理中丸發狂入井一條隔五六頁而重出又是何義例乎編次尤未免潦草然採摭既博變證咸備實足與江瓘之書互資參考又所附案語尤多所發明辨駁較諸空談醫理固有實徵虛揣之別焉

續名醫類案序

黃帝言不能起死人而不殺生人扁鵲述其言是病已成雖黃扁不能使之生明矣其有本無病或小有病而誤鐵之誤藥之以至于不可救則粗工之罪也然而病者之妻子父母轉諉之命與數而粗工嘵嘵自解且以為吾嘗盡心于是而不謂其人之不克承也天下如此其大歲月如此其悠且又粗工偏滿宇宙如此其衆計其一日之中方心毒手所斬刈戕賊者各列其姓氏各存其醫案蓋較之刑部秋審之冊或相什伯或相千萬而不可底止幸矣其各相抵諱閔默而不以告人故其

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

案如飄風陰火隨時滅没而世不知也一二上工診脉審運鍼當處方慎又遇其人之福厚而筭長者會逢其適而瘥者立起于是乎喜談而樂道之或以為得効或以為經驗筆之為書而立之為案自宋迄今凡幾百家傳其術者寶其方神其術鰓鰓焉轉相告語隨隨焉貼耳而聽受杭子曰嘻甚矣其沾沾自喜也以陰陽而論人有二十五生是人即有是病有是病即有是醫醫者知其人知其時知其脉因勢而利導之黄帝扁鵲去人不遠也不讀黄帝扁鵲之書而欲試黄帝扁鵲之術死者不能使之生而生者即可致之死語云學醫則人費

人之類多至二十有五而醫之殺人則一曰不學而已學之道何從則曰讀黄帝扁鵲之書而已黄帝扁鵲之書何在是發明其書之旨也類案傳雖謂黄帝扁鵲至今不死可也篁南江氏彙集前哲之案而刊之吾友魏玉横氏又從而廣之粗工觀之則以為已陳之芻狗而杭子觀之則以為醫學之蒙求何也玉横氏能讀黄帝扁鵲之書者也合土者必有其范伐柯者必有其則以是足為學醫者之範與則而思過半矣醫案云乎哉仁和杭世駿序

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

續名醫類案目録

錢塘魏之琇玉横撰

卷之一　傷寒上
卷之二　傷寒下
卷之三　傷寒門
疫　大頭疫
卷之四　雜病門

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

中寒 中風
卷之五 祿病門
厥 痙
卷之六 祿病門
感症
卷之七 雜病門
傷風 暑 暈 麻木
卷之八 雜病門 濕
熱病 燥
卷之九 祿病門 火
惡寒 寒熱 霍亂 癉
卷之十 祿病門
嘔吐 反胃 瀉
卷十一 祿病門
癇 痢 瘧痢
卷十二 雜病門
消渴 黃疸 赤丹
飲食傷
卷十三 祿病門
癥瘕 痞
卷十四 祿病門

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

鼾症　內傷
卷十五　雜病門
虛損　勞瘵
卷十六　雜病門
吐血　衄血　下血　溺血
卷十七　褵病門
癱瘓　痠　痛　痺
卷十八　褵病門
腫脹　膈　關格
卷十九　褵病門
諸氣　哮　喘
卷二十　褵病門
咳嗽
卷二十一　褵病門
痰　飲　吞酸
卷二十二　褵病門
頭　眉髮　面　目　耳　鼻　附鼻淵
卷二十三　褵病門
口　脣　齒　脫齗　舌　喉　附瘖
卷二十四　雜病門

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

心胃痛　脇痛　腋氣
卷千五　雜病門
腹痛　腰痛　前陰　鶴膝風　脚
腿　足跟　脛
卷千六　褵病門
遺精　白濁　淋　疝　小便秘
小便不禁　大便不通
卷千七　褵病門
驚恐　顛狂　癇　笑哭　不眠
卷千八　褵病門
跌撲　誤吞諸物
卷二十九　雜病門
蟲　諸蟲　蚘症　中毒　丹石毒
卷之三十　雜病門
邪祟　奇疾　飛尸　詐病　鍼灸　色診
卷三十一　婦人門
經水　熱入血室　崩漏　白帶
交腸
卷三十二　婦人門
求子　妊娠　胎不長　胎動　子懸

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

子腫　轉脬　胎墮　胎死　異胎　鬼胎
卷三十三　婦人門胎前
妊娠傷寒　感寒　傷暑　喘逆　咳嗽
煩熱　嘔吐　瀉　遺尿　祕結　癃
痢　癃痢　內傷　虛損　增附　悲傷
心腹痛　膈　瘡　乳病　惡阻
下血　癥瘕　子癎　見鬼
卷三十四　婦人門產後
產難　胞衣不下　隱疾　即脫陰　瘀滯
癥瘕　血迷　血虛

卷三十五　婦人門產後
產後感症　暑　火熱　惡寒　喘
咳嗽　嘔吐　瀉　小便頻數　附不祕結禁
癃　痢　疸
卷三十六　婦人門產後
類風　痙　痛痺　頭痛　瘡　乳病
腰脇痛　腹痛　浮腫　虛汗　虛損
驚悸　顛狂　見鬼
卷三十七　疸疹門
疸　報疸　黑疸　白疸　嬌紅

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

卷三十八　痘疹門
痘順症　虛　梟毒　毒壅　血熱
諸熱　汗　中暑　渴　痛　痒
疥癬　疔　水泡 附膿泡　夾斑　夾疹
夾丹　失血　傷食
卷三十九　痘疹門
寒戰咬牙　寒析　厥逆　昏冒　驚搐
煩躁　詑妄　喘急　咳嗽　嘔吐噦
瀉　吐瀉及蛔　大小便祕　疫癘
怪異

卷之四十　痘疹門
目　口唇　口疳　咽痛　瘡　發核
腹痛　腰痛　手足
卷四十一　痘疹門
膿期　癈期 附痂後　倒靨　毒　腫脹
倦怠　嗜卧　羸瘦
卷四十二　痘疹門
疹
卷四十三　小兒門
小兒初生　走馬牙疳　臍風　赤丹 即

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

遊風 胎毒 乳病 變蒸 喉舌滯頤
瘖
卷四十四 小兒門
傷寒 感症 傷風 暑 傷食 受驚
驚風 慢驚風 搐搦 癒癡 即發搐
慢脾風
卷四十五 小兒門 風癇
發熱 嘔吐 瀉 吐瀉
卷四十六 小兒門
癡痢 咳嗽 喘 哮
癡 痢
虛損
卷四十七 小兒門
疳 腫脹 癖積 蟲 吐蚘 心腹痛
黃疸 啼哭 語遲行遲 胎疾 慝病
相思
卷四十八 小兒門
跌撲損傷 發背 結核 下疳 疝
便血 疳瘡 瘍症
卷四十九 癰疽門
癰疽 附襠門 腦疽 鬢疽 頤毒 項毒

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

肩癰　臂癰
卷之五十　癰疽門
乳癰　胸癰　脇癰　馬刀　腋癰　腋疽
卷五十一　癰疽門
發背
卷五十二　癰疽門
肺癰　腹癰　腰疽
卷五十三　癰疽門
腸癰　腸風臟毒
卷五十四　癰疽門
痔附肛　漏　臀癰
囊癰　懸癰　疝癖即便毒　腿癰　臁瘡
脫疽　多骨疽
卷五十五　癰疽門
附骨疽
時毒　疔　疣附癭　結核
卷五十六　癰疽門
瘰癧　流注
卷五十七　癰疽門
膿疥　癬　疣贅　血風癮疹　瘙痒
卷五十八　癰疽門
腎臟風　癘風
瘡瘍　患瘍便祕

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN.GOV.TW

下疳　梅瘡　白癜風　斑瘡　天泡瘡
卷五十九　癩疽門
跌撲
卷之六十　癩疽門
杖瘡　金瘡　湯火傷　竹木刺傷
蟲獸傷
破傷風

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

續名醫類案卷之一

錢塘魏之琇玉横撰

傷寒

許叔微云有病傷寒身熱頭疼余視之曰邪在表此表實症也當汗之以麻黄湯或問曰傷寒大抵因虛故邪得以入之今邪在表何以云表實也余曰古人稱邪之所湊其氣則虛留而不去其病則實蓋邪之入人也始因虛入邪居中反為實矣大抵調治傷寒先

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

要明表裡虛實能明此四字則仲景三百九十七法
可立而定也何以言之有表實有表虛有裡實有裡
虛有表裡俱實有表裡俱虛余于表裡虛實歌中常
編其事矣仲景麻黃湯之類為表實而設也桂枝湯
之類為表虛而設也裡實則承氣之類是也裡虛則
四逆之類是也表裡俱實所謂陽盛陰虛下之則愈
也表裡俱虛所謂陽虛陰盛汗之則愈也常讀華佗
傳有府吏倪尋李延其症俱頭痛身熱所苦正同佗
曰尋當下之延當發汗或難其異佗曰尋外實延內
實故治之異耳外實內實汗下倒施疑有誤○此可以當傷寒症之總論也

一人初得病四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰症
也急服金液破陰來復等丹其脉遂沈而滑沈者陰
也滑者陽也病雖陰症而見陽脉有可生之理仲景
所謂陰病見陽脉者生仍灸氣海丹田百壯手足溫
和陽回得汗而解或問滑沈之狀如何便有生理曰
仲景云翕奄沉名曰滑何謂也沈為純陰翕為正陽
陰陽和合故名曰滑古人論脉滑雖曰往來前却流
利旋轉替替然與數相似仲景三語而足也此三字
極難曉翕合也言張而復合也故曰翕為正陽沉言
忽降而下也故曰沉為正陰方翕而合俄降而沉奄

為忽忽間仲景論滑脉可諦當矣其言皆有法故讀者難曉宜細思之 治陰症法○可作讀傷論指南

一人病傷寒下利神昏多困譫語不得眠或者見下利便以譫語為陰虛症許曰此亦小承氣症衆駭曰下利而服小承氣仲景之法乎許曰此仲景之法也仲景曰下利而譫語者有燥糞也屬小承氣湯而得解予嘗讀素問云微者逆之甚者從之逆者正治從者反治從多從少視其事也帝曰何謂反治岐伯曰寒因塞用通因通用王氷註云大熱內結注瀉不止熱宜寒療結腹須除以寒下之結散利止則通因通用

也正合於此又何疑焉 引經證論治法乃如指掌○治裡症法也

一人患傷寒五六日頭汗自出自頸以下無汗手足冷此是熱厥心下痞悶大便秘結或者見四肢冷又汗出滿悶以為陰症診其脉沈而緊曰此症誠可疑然大便結非虛結也安得為陰脉雖沈而緊為少陰症多是自利未有秘結者此症半在表半在裡投以小柴胡湯得愈仲景謂四肢冷脈沈緊腹滿全似少陰然大便鞕頭汗出不得為少陰蓋頭者三陽同聚若三陰止胸而還有頭汗出自是陽虛故曰汗出為陽微是陰不得有汗也若少陰頭有汗則死矣故仲景平脉

法云心者火也明少陰則無頭汗者可治有汗者死心為手少陰腎為足少陰相與為上下惟以意逆志者斯可得之治半表半裡法

一人患傷寒得汗數日忽身熱自汗脈弦數心不得寧真勞復也診之曰勞心之所致神之舍未復其初而又勞傷其神營衛所以失度也當補其子益其脾解其勞庶幾得愈授以補脾湯佐以小柴胡湯解之而愈補脾湯人參白朮甘草橘皮青皮乾薑各等分勞復治法○或問曰虛則補母今補其子何也曰子不知虛與勞之異乎難經曰虛則補其母實則瀉其子此虛當補母人所共知也千金曰心勞甚者補脾氣以益之脾旺則感之于心矣此勞則補其子人所未聞也益母生我者也子繼我而助我者也方治其虛則補其生我者與錦囊所謂本骸得氣遺體受蔭同義方治其勞則補其助我者與荀子所謂未有子富而父貧者同義此治虛與治勞之異也

侯國華病傷寒四五日身微斑渴欲飲診之沈弦欲厥陰脉也服溫藥數日不已又以薑附等藥覺陽微回脉生因渴私飲水一杯脉復退又見頭不舉目不開問之則犯陽易若只與燒羣散則寒而不濟矣遂更用吳茱萸湯一大服燒羣散連進二服出大汗兩晝夜而愈陽易治法

衍義治傷寒汗不出搐脚法用海蛤粉烏頭各二兩穿山甲三兩為末酒糊為丸大一寸許搗匾置患人足

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

心下擘葱白蓋藥以帛纏定于暖室取熱湯浸脚至膝下又則水温又添熱水候遍身汗出為度凡一二日一次浸脚以和為度（外治取汗法。以上俱係醫藥綱目）

張子和曰余之常豁雪中冒寒入浴重感風寒遂病不起但使煎通聖散單服之一二日不食惟渴飲水亦不多飲時時使人槌其股按其腹凡三四日不食日飲水一二十度至六日有譫語妄見以調胃承氣湯下之汗出而愈常謂人曰傷寒勿妄用藥惟飲水最為妙藥但不可使之傷常令揉散乃大佳耳至六七日見有下證方可下之豈有變異哉奈何醫者禁人飲水至有渴死者病人若不渴強與飲水亦不肯飲也予初病時鼻塞聲重頭痛小便如灰淋汁及服調胃承氣一兩五錢覺欲嘔狀探而出之汗出漿漿然須臾下五六行大汗一日乃瘳當日飲氷水時水下則痰出約一二椀痰即是病也痰去則病去矣予時年六十一歲

焦百善偶感風寒壯熱頭痛其巷人黠蚤茶一椀使啜之焦因熱服之訖偶思張語曰凡苦味皆能涌今煮頭痛是病在上試以箸探之吐畢其痛立解

孫兆治俞伯道忽患微熱心下滿頭有汗不能解衆醫

以為溫病用表有謂食在膈者治之不愈召孫至用半夏茯苓湯遂瘥衆問其故曰頭有汗心下滿非濕症乃水結胸也小便既去其病乃愈且如濕氣心下滿自當遍身有汗有食心下滿豈得汗若言是表身又不惡寒疼痛表症何在故凡水結胸脇頭必有汗

許叔微治頭汗自出心下痞悶作半表半裡之法而治之用小柴胡而瘥○出傷寒口訣也

實材治一人患肺傷寒名別頭痛發熱惡寒咳嗽肢節疼脉沉緊叔微紫脉沈緊亦作半表半裡之法而治服華蓋散黃耆建中湯暑解至五日昏睡譫語四肢微厥乃腎氣虛也灸關元五百壯服薑附湯始汗出而瘥愈

一人病患傷寒昏睡妄語六脉弦大實曰脉大而昏睡定非實熱乃脉隨氣奔也強為之治用烈火灸關元穴初灸病人覺痛至七十壯遂昏睡不疼灸至三鼓病者開眼即思飲食令其服薑附湯待至三日後方得元氣來復大汗之下症得瘥解

一人患傷寒至八日脉大而緊發黃生紫班噫氣足指冷至脚面此太陰症也最重難治為灸命關五十壯關元二百壯服金液丹鍾乳粉四日汗出而愈

一人患傷寒之症至六日上診之脉來弦緊身發黃色自汗此乃太陰症也先與服金液丹後欲點命關穴

奈病不宜灸鍼傷寒惟太陰少陰二症死人最速若不早灸雖服藥劑無功効也不信至九日瀉血而死

一人病傷寒至第六日微發黃色一醫與服茵陳湯次日黃色更深遍身如屁子狀此太陰症也誤服涼劑而致肝木侮脾即為炙命關五十壯服金液丹而愈

一人患傷寒初起即厥逆脉一息八九至諸醫以為必死實曰乃陰毒也（厥逆脉數斷為陰毒必有瓜蒂吐利蹈卧等症）與薑附湯一盞至半夜汗出而愈若以脉數為熱下涼藥必死決無疑也

張子和之僕嘗與隣人同病傷寒俱至六七日下之不通隣人已死僕發熱極投於井中撈出以汲水貯之檻使坐其中遶張遊他方家人偶記張治法曰傷寒三下不通不可再攻便當涌之試服瓜蒂散良久吐膠涎三椀許與宿食相襍在地狀如一帚頓快乃知世醫殺人多矣又一吏吐訖使服太白散甘露散以調養之而占安愈（邪結陽明發為狂熱吐之猶是宿食非若燥糞便鞕可下而愈也）

張子充治南陵富人子傷寒不知人氣息僅屬張視之曰此嗜卧症也（新別後三日當蘇蘇則欲飲欲飲與此藥必熟睡覺當得汗也已而果然新安志）

萬密齋治縣尹唐肖峰二月間患傷寒醫進九味羌活

湯不効又云内傷挾外感進補中益氣湯不効又進
柴苓湯去人參病畧減四日復發熱頭苦痛醫欲下
之未決萬脉之洪長而弦曰此元氣素虛因起早感
寒得之今病在陽明少陽乃併病也乍熱乍涼者少
陽也頭苦痛者陽明也宜小柴胡少陽合葛根葱白湯
陽明唐曰吾素多痰火病勿用人參萬曰元氣不足乃
虛火也實火宜瀉虛火宜補幸勿疑一劑而病愈
胡晏年五十病傷寒十六日不解其症乍寒時即以衣
被厚覆蒙頭而卧不勝其寒乍熱時即撤去衣被裸
露其身更用扇不勝其熱如此一日夜十餘次醫皆
不識萬至告以病狀可怪邀診其脉曰不必診此易
知耳夫惡寒病在表也何以無頭痛症惡熱病在裡
也何以無煩渴及便溺不利症此病在半表半裡陰
陽混亂也陰氣乘陽則惡寒陽氣乘陰則惡熱宜用
小柴胡以治其半表半裡之邪庇子豆豉以治其陰
陽錯襍之邪服之是此寒熱不再作也即占痊愈
李養晦患傷寒苦於右脇作痛醫用陶節菴法以小柴
胡加枳殼桔梗服之無効已十七日矣萬脉之沈弦
且急曰此水畜症也經云沈潜水支飲脉弦急必得
之飲水過多問曾服何方以前藥對萬曰只用此方

再加牡蠣以洩其畜水可耳一服而痛立止

一門子病傷寒醫與發汗七日後不愈小腹滿而痛欲下之未敢萬脉之沈弦而急問曾渴飲水乎荅曰甚渴雖飲水渴不止曰此畜水似痂症不可下也乃用五苓散以利其水加川楝子小茴香以止小腹之痛一服洞泄四五行皆清水次日再求診曰不必再服藥矣畜水盡泄止也至三日後症果安愈

病傷寒汗下後病不解身無大熱不惺惺醫者但云譫語以症論之乃錯語也（譫語錯語極宜細辨）若作知母麻黃湯症非瘧後昏沈也乃汗下之後元氣未復神

識不清與進補中益氣湯去升柴二味加入麥冬生地熟附子等味一劑服下症即占安

孫文垣治張二官發熱頭痛口渴大便秘結三日未行脉洪大曰此陽明少陽二經之病用大柴胡湯行三五次所下皆黑糞夜出臭汗次日清爽惟額上仍熱（陽明）用白虎湯加葛根天花粉因食粥太早又復發熱咳嗽口渴殊甚且惡心（食復）用小柴胡加枳實山屐麥芽次日渴不可當（半夏枳實麥芽皆能耗陽明津液）改以白虎湯加麥冬花粉外與辰砂益元散以井水調下五錢熱始退渴始定不虞夜睡失蓋復受寒邪天明又大發熱

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

再加牡蠣以洩其畜水可耳一服而痛立止

一門子病傷寒醫與發汗七日後不愈小腹滿而痛欲下之未敢萬脉之沈弦而急問曾渴飲水乎荅曰甚渴雖飲水渴不止曰此畜水似痂症不可下也乃用五苓散以利其水加川楝子小茴香以止小腹之痛一服洞泄四五行皆清水次日再求診曰不必再服藥矣畜水盡泄止也至三日後症果安愈

沈天禄病傷寒汗下後病不解身無大熱不惺惺醫者但云譫語以症論之乃錯語也（譫語錯語極宜細辨）若作知母麻黄湯症非瘥後昏沈也乃汗下之後元氣未復神識不清與進補中益氣湯去升柴二味加入麥冬生地熟附子等味一劑服下症即占安

孫文垣治張二官發熱頭痛口渴大便秘結三日未行脉洪大曰此陽明少陽二經之病用大柴胡湯行三五次所下皆黑糞夜出臭汗次日清爽惟額上仍熱（陽明用白虎湯加葛根天花粉因食粥太早又復發熱咳嗽口渴殊甚且惡心食復用小柴胡加枳實山栀麥芽次日渴不可當半夏枳實麥芽皆能耗陽明津液改以白虎湯加麥冬花粉外與辰砂益元散以井水調下五錢熱始退渴始定不虞夜睡失蓋復受寒邪天明又大發熱

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

不知人事復感急用小柴胡加升麻葛根前胡薄荷等汗出熱退神思大瘁四肢皆冷語言嬾倦且咳嗽以生脉散加石斛百合大棗白芍服後咳嗽尋止精神日加飲食日進諸症悉退而安復如故矣

繆仲醇治姚平之傷寒頭疼身熱舌上胎胸膈飽悶三四日熱不解奄奄氣似不屬者邪熱甚則正氣餒一醫以其體素弱病久虛甚意欲投參少許繆叱曰一片入口死矣亟以大黃二兩瓜蔞二枚連子切片黃連枳實下之小陷胸主人驚疑不得已減大黃之半二劑便通熱立解遂愈以拯是症熱未解猶有表邪何不可誤認為虛以下之而愈金匱曰吸而微數其病在中焦實也當下之則愈上云奄奄氣似不屬殆其候歟然非明眼未能辨此

高存之一家人婦傷寒來乞方繆已疏方與之矣見其人少年曰若曾病此否曰然曰愈幾日而妻病曰八九日曰曾有房慾曰無之繆故曰若有房慾此方能殺人者也其人即置方不取遂以禪襠雄鼠糞麥冬非白柴胡二劑勢定更用竹皮湯二三劑全愈視此則傷寒初愈藏府尤多熱毒時師不察驟投參耆朮附溫補其遺患可勝言哉

一奴病傷寒熱解後復下血不止主人以痢藥投之更甚繆曰此乃傷寒失汗之餘症也遂用地榆麥冬知母竹葉等味以代仲景諸血症藥遂占安愈

翁具汝感胃壯熱舌生黑胎煩渴（陽明症）勢甚劇諸昆仲環視揮涕群醫束手繆以大劑白虎湯加人參三錢一劑立甦或問繆治傷寒有秘方乎繆曰熟讀仲景即秘方也

常熟吳見吳在京邸時有小青衣患傷寒愈而復復而愈愈而再復不知其幾謂繆曰非兄不能救診之病人黃白面色（有胃色）六脉微弱（有胃氣）大便不通胸中不快亦不思食曰為傷寒百合（無經絡百脉一宗患致病謂之百合病）症（正氣已虛邪氣留滯及過經不解瘥後虛羸少氣皆謂之壞病）之餘邪且退矣（以色脉斷之）胸中不快虛而氣壅非實邪也不大便者乃病津液枯氣弱不能送也投以人參五錢麥冬一兩枳殼炒八錢共煎飲服盡劑諸症立解而瘥

梁溪一男子素虛春中感冒頭痛肌痛發熱羌活二錢麥冬三錢炙甘草一錢紫蘇一錢五分北細辛七分前胡一錢五分次日頭痛止熱未退繆用白芍五味子人曰風未退遽用酸斂何也曰因人而施爾一杯即愈麥冬三錢甘草一錢括蔞根二錢乾葛一錢五分桑皮三錢桔梗一錢白芍一錢五味子五分

四明虞吉卿因三十外出疹不忌猪肉蒸之好飲作泄八載矣忽患傷寒頭疼如裂滿面發赤（汗出不徹舌生黑

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

胎煩躁口渴時發譫語兩眼不合者七日皆屬陽明洞泄如注較前益無度協熱也脉之洪大而數實熱為疏竹葉石膏湯方因其有腹瀉之病石膏止用一兩病初不減此兄素不謹一友疑其虛也云用肉桂附子凡診病淺見者反若深慮多令病家無所適從或以其言來告之乃曰誠有是理但前者按脉似非此症豈不數日脈頓變耶復往視仍洪數而大曰此時一投桂附即發狂登屋必不捄矣一照前方但加石膏至二兩或曰得毋與瀉有妨乎曰邪熱作祟此客病也不治立殆渠泄瀉已八年非暴病也治病須先太甚急治其邪徐并其風恙除之金匱云病痼疾加以卒病當先治其卒病後乃治其痼疾急進一劑其病遂安即省人事再劑而前惡症頓去不數劑霍然但瀉未止耳為疏脾腎雙補丸而加黃連乾葛升麻以痢痢法治之不一月瀉竟止八載沈痾一旦若失

莊欽之一庄僕因受寒發熱頭痛如裂太陽兩目俱痛陽明渾身骨肉疼痛下元尤甚勞傷狀如刀割不可忍熱甚傷陰口渴甚大解日解一次胸膈飽脹不得眠已待斃矣為疏一方乾葛三錢石膏一兩五錢麥冬八錢知母三錢五分羌活二錢五分大瓜蔞二箇連子打碎枳殼一錢桔梗一錢竹葉一百片河水煎服四劑而平

此太陽陽明病也貧人素多作勞故下體疼痛尤甚以羌活去太陽之邪石膏竹葉葛麥冬知母解陽明之熱括蔞桔梗枳殼疎利胸膈之留邪故遂愈

又莊一僕因傷寒後勞復發熱頭痛腹內作瀉勢甚危篤為疏一方用山屐四錢枳實二錢豆豉一兩川黃連二錢乾葛三錢調六一散五錢服二劑熱退瀉止頭痛亦除但不思飲食為去山屐枳實黃連加鱉甲四錢炙甘草二錢五分麥冬五錢不數劑而痊愈

朱遠齋治從祖近湖公少年因房勞食犬肉傷寒諸醫以其虛也攻補兼施至發狂登屋奔走號呼（陽明府虛實熱）日夜令壯夫看守幾月餘矣急走使延朱朱先命煎人參膏二觔以待用潤字號丸藥數錢下之去黑糞無算熱遂定奄奄一息鄰於死矣徐以參膏灌之至一百二十日全瘳（右自纓仲淳至此十一案俱見蔡煥然陽寒約言）

龔子才治一人頭疼發熱增寒身痛發渴譫語日久不出汗以大梨一枚生薑一塊同搗取汁入童便一椀重湯煮熟服之汗出如水即愈（製方甚妙愈于甘露飲旦免把黃之忌）面紅唇赤面白躋身而卧諸太守劉雲亭患陽寒發熱百藥之類數劑弗效診之六脈浮醫以小柴胡湯解毒湯之即是戴陽（合脉與症）以人參附子沈香大無力此命門無火也（即是戴陽）以人參附子沈香

一服立愈三服全安

一姬年七旬傷寒初起頭疼身痛發熱增寒醫以發散數劑不效淹延旬日漸不飲食昏沈口不能言眼不能開氣微欲絕（純見虛症○凡雜症見此亦宜獨參猛進貧者以重劑杞地少入乾薑）與人參五錢煎湯徐徐灌之須臾稍醒欲飲水煎查服之頃愈又十年乃卒（當與疫症內蘇韜光一案同參）

李士材治一人傷寒九日以來口不能言目不能視體不能動四肢俱冷咸謂陰症診之六脉皆無（熱甚而脉伏也）以手按腹兩手護之（拒案是也）眉皺作楚（實邪實邪）按其趺陽大而有力乃知腹有燥矢也（大承氣湯）欲與之病家惶懼

不敢進李曰吾郡能辨是症者惟施笠澤耳（此等症人便稀）（識可為浩歎耳）延診之若合符節遂下之得燥矢六七枚口能言語體能轉動矣若如按手不及足者何能以救此種垂絕之症也耶

一人傷寒煩躁面赤昏亂悶絕時索冷水手揚足擲難以候脉五六人制之方得就診洪大無倫按之如絲李曰浮大沈小陰症似陽也與附子理中湯當有生理其弟駭曰醫者十輩至不曰柴胡承氣則曰竹葉石膏今反用熱劑烏乎敢李曰溫劑猶生涼劑立斃矣卜之吉遂用理中湯加人參四錢附子一錢煎成

入井水冷與飲甫及一時狂躁定矣再劑而神爽服參至五觔而安（凡遇此等傷寒之症能以將全料六味加減去苓瀉二味加入麥冬杞子二味用大砂罐濃煎與之代茶而飲必數杯而後酣寢汗出而即愈矣于時此法未開惟倚仗人參之力取效本陰竭之症乃峻補其陽必待陽復生陰而愈故用參多至數觔使在今時非猶頓之家不可為矣）

一人傷寒至五日下利不止懊憹目脹諸藥治之不見功效有以山藥茯苓與之慮其瀉脫也李診之六脈沈數按其臍腹則痛協熱自利中有結糞乃用小承氣倍大黃服之果下結糞數枚遂利止懊憹亦痊

一人傷寒第二日頭痛發熱正屬太陽李曰方今正月時令猶寒必服麻黃兩日愈矣若服冲和湯不惟不得汗即使得汗必致傳經遂以麻黃湯熱飲之更以滾水入浴桶置牀下熏之得汗如雨加以密覆半日易被神氣已即清爽矣至晚遂思飲索粥家人不與李曰邪已解矣必不傳於裡也食粥無妨矣至明日果安愈不以麻黃汗之傳變深重非半月不能安也

吳光祿煎太陽頭痛腹脹身重不能轉側口內不和語言譫妄有云表裡俱有邪宜以大柴胡下之李曰此三陽合病也誤下之決不可救以白虎湯連進兩服諸症俱即漸減更加花粉麥冬二劑下之而全安

楊學師妾發熱頭疼六日後忽見紅疹衆皆以為發班

用升麻犀角等湯凡有五日不能取效李至視之曰此疹也非班也班為陽明火毒疹為太陰風熱一表一裡判如天淵乃用防風二錢黃芩一錢甘草五分薄荷桔梗蟬退各計一錢與服四劑霍然而安

一人傷寒六日譫語狂笑頭痛有汗大便不通小便自利衆　承氣湯下之脉之浮而大因思仲景云傷寒不大便六七日頭疼有熱小便清知不在裡仍在表也方今仲冬宜與桂枝湯衆皆咋舌掩口謗之甚力以譫狂為陽盛桂枝入口必斃矣李曰汗多神昏故發譫妄雖不大便腹無所苦和其營衛必自愈耳遂

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

違衆用之及夜笑語皆止明日大便自通故夫病變多端不可膠執向使狐疑而用下藥其可活乎

盧不遠治來熙菴姪身體碩傷寒已二十八日人事不省不能言語手足揚擲腹脹如鼓而熱烙手目赤氣粗齒槁舌黑參附石膏硝黃芩連無不服之諸醫告退診之脉濁鼓指用大黃一兩佐以血藥（以血藥佐下穩妥微妙之）一劑下黑血一二斗少甦四劑始清蓋此症寒邪入胃畜血在中其昏沈揚擲是喜忘如狂之深者也當時大黃未嘗不用而投非其時品劑輕小不應則惑矣寧望放胆哉（先時雖用過大黃仍是失下合脉與症復大下之非高手不能也○）

盧云黑奴丸乃治陽毒發狂發斑大渴熱極之症也
即此丸用水化服彈子大一粒立可見愈如方劑用
小麥奴即麥穗上黑黴者又梁上之塵釜底黑灶突
墨等此取火化之類順其性而治之者煤墨梁塵黑
黴乃火之劣狗用治熱極之症使之復于平常非否
之泰乎此又用藥味之精義一種者也故特記之耳

蜀孝廉阮太和病寓吳山下名診披衣强坐對語甚莊
神氣則內索也身熱進退舌胎黃而厚益自吳門受
寒以肉羹為補而時啜之遂纏綿匝月盧用疎散輕
劑熱退又復強啖再熱不能起坐逾五日診之譫語
呼笑不識人已三日矣形如骨立汗仝雨下而內熱
特甚胸脇之熱捫之烙手茅喜脉象尚有神氣乃用
人參八錢加四逆散中與服一劑而譫妄即定服至
三劑而熱邪清矣自言其神魂窮天之上極地之下
飛揚奇變得太乙神符名之返愈後問藥狀曰此寒
傷心氣荏苒厥深而湊於胸也以不第南旋病淹中
道骨肉遼遠藥石弗周則心已傷矣又反復再四汗
液多亡內無主宰熱遂入胸胸為心主之宮城精神
因而渙散是以游魂為變也遂用四逆方使熱外出
加用人參俾神內凝氣復邪散是以症退得占生耳
吳孚先治一人病患傷寒身寒逆冷時或戰慄神氣昏
昏大便閉塞小便赤紅六脉沈伏或憑外象謂是熱
症擬投熱劑或以脉氣沈伏亦作陰治吳乃診之脉

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

果沈伏而重按之則滑數有力愈按愈甚視其舌則燥探其足則暖曰此陽症似陰設投熱劑火上添油矣乃用苦寒峻劑煎成乘熱頓飲而瘥安矣（寒因熱用法○按內真寒而外假熱諸家嘗論之矣至內真熱而外假寒諸家論及者罕矣故此案載之正宜熟玩之耳）

一人患病昏昏默默如熱無熱如寒無寒欲卧不能卧欲行不能行虛煩不耐若有神靈莫可名狀此病名百合雖在脉實在心肺兩經以心合血脉肺朝百脉故也蓋心不於神肺藏於魄兩皆失故見其症也良由傷寒邪熱失於汗下和解以治致熱伏血脉而成其症乃用百合一兩生地汁半鍾二味煎成分為二次與其進服必俟大便通解如漆者乃瘥（論百合病深得真諦）

張景岳治王生年出三旬病陰虛傷寒其舌芒刺乾裂焦黑如炭身熱便結大渴喜冷而脉則無力神則昏沈群謂陽症陰脉必死無疑察其形氣未脫遂以甘溫壯水等藥大劑進之以救其本仍間用涼水以滋其標蓋水為天一之精涼能解熱甘可助陰非苦寒傷氣之比故於津液乾燥陰虛便結而熱渴火盛之症在所不忌由是水藥並進前後凡用人參熟地葦各一二觔附子肉桂各數兩冷水亦一二斗然後諸症漸退飲食漸進神氣俱復矣但察其舌則如故心

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

甚疑之閱數日忽舌上脫一黑殼其內新肉燦然始悟其膚腠焦枯死而復活使非大為滋補安望再生若此一症特舉其甚者凡舌黑用補得以保全者甚多蓋傷寒之舌實固能黑以火盛而焦也虛亦能黑以水虧而枯也若以舌黃舌黑之胎便即悉以認為實熱之症而不參辨則陰虛之症萬無一生矣按是症既云虛陰燥渴用涼水是矣而又襍與桂附各數兩治法未能無疵至舌胎脫殼恐桂附之投不能無過也

一衰翁年逾七旬陡患傷寒初起即用溫補調理至十日之外正氣將復忽爾作戰自旦至辰不能得汗寒慄危甚用六味回陽飲入人參一兩薑附各三錢煎服下咽少頃即大汗如浴時將及午而浸汗不收身冷如脫鼻息幾無令以前藥復煎與之曰先服此藥已大汗不堪今又服此尚堪再汗乎笑而謂曰此中有神非爾所知者也急令再進遂汗收神復不旬日起矣嗚呼發汗用此而收汗復用此無怪乎人之疑慮也不知汗之出與汗之收皆元氣為之樞機耳

喻嘉言治黃長人犯房勞病傷寒守不服藥之戒身熱漸退十餘日外忽然昏沈渾身戰慄手足如冰乃熱深厥深亦深也亟請喻至一醫已合就薑附之藥矣見而駭之診畢再三闢其差謬主人自疑陰症言之不入又不

可以理服乃與醫者約曰此一病藥入口中出生入死關係重大吾與丈各立擔承倘用藥差誤責有所歸醫者云吾治傷寒三十餘年不知甚麼擔承喻笑曰有吾明眼在此不忍見人活活就斃吾亦不得已也如不擔承待吾用藥主人方安心請治與以調胃承氣湯約重五錢煎成熱服半盞少頃又熱服半盞其醫見厥漸退人漸退知藥不誤辭去乃與前藥服至劑終人事大清忽然渾身壯熱（厥止則陽回復現熱症也）再與大柴胡一劑熱退身安門人問曰病云係陰症見厥先生確認為陽症而用下藥果應其理安在答曰其理頗微吾從悟入可得言也凡傷寒病初起發熱煎熬津液口乾鼻燥便秘漸至發厥者不問知其為熱也若陽症忽變陰厥者萬中無一從古至今無一也蓋陰厥得之陰症一起便直中陰經唇青面白遍體冷汗便利不渴身蹉多睡醒則人事了了與傷寒傳經之熱邪轉入轉深人事昏惑者萬萬不同諸書類載陰陽二厥為一門即明者猶為所混況昧者乎如此病先犯房勞後成傷寒世醫無不為陰症之名所惑往往投以四逆等湯致陰竭莫救促其暴亡尚不知悟總由傳派不清耳蓋犯房勞而病感者其勢不

過比常較重如發熱則熱之極惡寒則寒之極頭痛則痛之極所以然者以陰虛陽往承之非陰盛無陽之比況病者初能勿藥陰邪必輕旬日漸發尤非暴症安得以陰厥之例為治也且仲景明言如發熱六日厥反九日後復發熱三日與厥相應則病旦暮愈又云厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈明明以熱之日數定厥之痊期也又云厥多熱少則病進熱多厥少則病退厥愈而熱過乂者必便膿血發癰厥應下而反汗之必口傷爛赤先厥後熱利必自止見厥復利利止反汗出咽痛者其嗾為痺厥而能食恐為除中厥止思食邪退欲愈凡此之類莫非熱深發厥之旨原未論及於陰厥也至於陽分之病而妄汗妄吐妄下以致熱極如汗多亡陽吐利煩躁四肢逆冷者皆因用藥差誤所致非以四逆真武等湯挽之則陽不能回亦原不為陰症立方也蓋傷寒幾一發熱發渴定然陰分先虧以其誤治陽分比陰分更虧不得已從權用辛熱先救其陽與純陰無陽陰盛隔陽之症相去天淵後人不窺制方之意見有成法轉相效尤不知治陰症以救陽為主治傷寒以救陰為主也此一語為治傷寒之秘旨耳傷寒縱有陽虛當治必

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

看其人血肉充盛陰分可受陽藥者方可回陽若面
黧舌黑身如枯柴一團邪火內燔者則陰已先盡何
陽可回耶故見厥除熱存津液元氣於什一已失之
晚況敢助陽刼陰乎證治方云若證未辨陰陽且以
四順丸試之直指方云未辨疑似且與理中丸試之
亦可見從前未透此關縱有深心無可柰何耳因為
子輩詳辨并告後之業醫者云爾

成無已云凡厥若始得之手足便厥而不溫者是陰經
受邪陽氣不足可用四逆湯溫之若手足自熱而至
溫從四逆而至厥者傳經之邪也四逆散主之必須
識此勿令誤也又當外症別之耳予嘗治一中年婦
人惡寒身熱而渴脉數細弱先厥後熱用溫藥治之
反為增劇後改以四逆散兼用參朮各半服之厥愈
脉出洪大而安痊按成所論陰經受邪及傳經之邪二厥一用四逆湯溫治一用四逆散涼治已昭然矣若揭喻或未之見耳是故列其案於此也

續名醫類案卷之一

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷之二

錢塘魏之琇玉橫撰

傷寒

陸平叔文學平素體虛氣怯面色痿黃藥宜溫補不宜寒涼固其常也秋月偶患三瘧孟冬復受外寒雖迫寒熱一班而未至大寒大熱醫者以為瘧後虛邪不知其為新受實邪也（因舊病感新邪最易誤人）投以參耆補劑轉致奄奄一息遷延兩旬間有從外感起見者用人參

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

白虎湯畧無寸效昏昏嘿嘿漫無主持已治木矣喻
診之察其脈未大壞腹未大滿小水尚利謂為可治
但筋脉牽掣不停祇恐手足痿廢仲景云筋脉動惕
者久而成痿今病已二十餘日血枯筋燥從可知矣
今治則無治當于仲景之外另施手眼以仲景雖有
大柴胡湯兩解表裡之法而無治痿之法（治痿獨取陽明清陽明之熱邪則痿不治而愈況此症原屬暴傷非緣虛損也）變用防風通聖散成方
減白朮以方中防風荊芥薄荷麻黃桔梗為表藥大
黃芒硝黃芩連翹扈子石膏滑石為裡藥原與大柴
胡之制相仿且內有當歸川芎白芍正可領諸藥深

入血分而通經脉減白朮者以前既用之貽誤不可
再誤耳當晚連進二劑一劑殊相安二劑大便始通
少頃睡去津津汗出次早診之筋脉不為牽掣但陽
明胃脉洪大反加隨用白虎湯石膏知母每各兩許
次加柴胡花粉芩柏連翹扈子一派苦寒連進十餘
劑（要知前誤温補之劑亦不少矣）神識清飲食進半月起于床一月
步于地畧過啖即腹痛泄瀉儼似虛症不之顧但於
行滯中加柴胡桂枝升麻散餘邪不使下濁變痢然
後改用歧黃二冬畧和胃氣間用人參不過五分前
後治法一一不違矩矱始克起九死于一生也耶

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

徐國楨傷寒六七日身熱目赤索水復不飲異常大躁
將門牖洞啟身卧地上展轉不快更求入井一醫沟
沟急以大氷氣與服喻診其脉洪大無倫重按無力
謂曰此用人參附子乾薑之症柰何認為下症耶醫
曰身熱目赤有餘之邪躁急若此再與薑附踰垣上
屋矣喻曰陽欲暴脫外顯假熱內有真寒以薑附投
之尚恐不勝回陽之任況敢以純陰之藥重却其陽
乎觀其得水不欲咽熱在陽明經者情已大露豈水
尚不欲咽而反可咽大黃芒硝乎天氣燠蒸必有大
雨此症頃刻大汗不可救矣且既認大熱為陽症則

下之必成結胸更可慮也惟用薑附所謂補中有發
并可散邪退熱一舉兩得不必疑慮以附子乾薑各
五錢人參三錢甘草二錢煎成冷服服後寒戰戛齒
有聲以重棉衣被和頭而覆之縮手不宵與診陽微
之狀始著再以前方之藥復煎一劑與其服下即得
微汗熱亦退除而去安泰（一載陽症耳說得甚奇然此症實不多見也）
張卿子治塘棲婦人傷寒十日熱不得汗或欲以錦黃
下之主人懼延卿子脉之曰脉強舌黑而有芒投錦
黃為宜今舌黑而潤不渴此附子症也不汗者氣弱
耳非參者助之不可也乃服一劑即發汗而愈（仁和縣志）

張路玉治范主事求先患寒傷營症惡寒三日不止曾用發散二劑第七日躁擾不寧六脉不至（伏也）手足厥逆診之獨左寸厥厥動搖（心主汗故也）知是欲作戰汗之候令勿服藥（宜記省）但與熱薑湯助其作汗若誤藥必熱不止後數日間枉駕謝別乃詢之果如前日所言其病不藥而竟獲愈（戰汗治法）

吳氏子年二十餘素有夢交之疾十月間患傷寒頭疼足冷醫用發散消導屢汗而昏熱不除反加喘逆更醫用麻黃重劑頭面大汗喘促愈甚或以為邪熱入裡或以為元氣大虛議用冬地爭持未決張診之六脉鼓鼓按之欲絕正陽欲脫之兆急須參附庶可望其回陽（此喻嘉言所謂誤治致陽虛也）遂疏回陽返本湯加用童便以飲其陽一劑服下稍得安寧三啜安卧改用大劑獨參湯仍加用童便調理數日頻與稀糜而安愈

一人途次患傷寒經吳門泊舟求治詢之自渡淮露卧受寒恣飲燒酒發熱在京口服藥行過兩次熱勢畧減而神昏不語不時煩擾見其唇舌赤腫燥裂以開水與之則嗽不與則不思察其兩寸鼓鼓虛大兩尺小弱按之六脉皆虛曰此熱傳手少陰心經也與導赤瀉心湯一啜神識稍安泊舟一日夜又進二帖便

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

溺自知次早解維再診脉静神安但與小劑五苓去桂易用麥冬與服二帖薫囑其頻飲粥糜可収功也

吴介臣傷寒餘熱未盡曲池壅腫不潰不消日發寒熱殤醫禁止飲食日服消火清毒藥上氣形脫倚息不得卧渴飲開水一二日腹脹滿急大便燥結不通兩月中用蜜導四五次所去甚艱勢大危診之其脉初按繃急按之絶無此中氣逮盡之兆豈能復勝藥力耶乃令續進稀糜搨前以鴨煮之香氣透達徐以汁啜之是夕大便去結糞甚多喘脹頓止飲食漸進數日後腫亦漸消此際雖可進保元獨參之類然力不能支僅惟穀肉調理而安近有一人困過餌消導胃氣告匱聞穀氣則欲嘔亦用上法治之不藥而痊

高鼓峯治徐五宜長君傷寒危甚延往頃之有人來言病者晚來狂叫暈去五六次早起一暈竟絶不必往也問病來幾日云九日矣又問胸尚熱否曰胸但不冷耳曰可救也急往視之至則僵尸在床口鼻無氣面色青黯口噤目閉手撒獨唇色紫黒高笑曰此人不死陰虛症誤服白虎所致耳切其脉兩尺尚在脉在仍是厥耳遂取人參一兩熟地二兩炮薑五錢濃煎湯挖而灌之盡劑口開面色轉紅不及一時大叫冷甚厥之

明驗連以熱湯飲之即發壯熱通身淋漓汗下而甦比晚腹脹不便曰無憂也大汗之後虛不能出耳再飲藥一鍾即得解次日諸病已悉除矣但多妄言怒罵如有鬼神驅之者（却是何故）調治數日至夜半診其脈曰虛至此乎復以大劑附子理中建中與其投治服數日而病皆愈復安如初（結局處却與陰虛矛盾）杭友沈僑如甥病傷寒診其脉浮數有力舌黑胸脯痛脹此得之勞倦後復傷飲食（戰汗而解不得單謂飲食勞倦）醫以寒涼消導攻之火受遏抑無所歸也急以大劑參朮歸耆炮薑救之戒其家人曰夜半當發戰戰則汗而解矣如戰時頻頻以粥與之時高卧天長寺四鼓時病家急叩門曰服藥後果寒甚索被頃之大熱昏沈而死矣先生尚有法救之否曰不足計也汗來矣但戰時曾進粥否曰寔未也曰吾語汝戰汗時須與粥要以助胃氣使汗來速不至困乏耳今亦無妨第歸此時當得汗矣果如言鼾睡而安（與粥助汗亦仿仲景桂枝之治法也）

張隱菴治一少年傷寒三四日頭痛發熱胸痛不可按病家曰三日前因食麵而致病張曰不然麵飯糧食何日不食蓋因外感風寒以致內停飲食非因食麵而為頭痛發熱也故凡停食感寒只宜解表不可推

食如裹氣一鬆外邪即陷入矣（為庸師說法也）且食停于內在胸下胃脘間按之而痛今胸上痛不可按此必誤下而成結胸病家云昨延某師告以食麵故乃用消食之藥以致胸中大痛也因診其外症尚在仍用桂枝湯加減而治之一服下病即安愈

一婦人患傷寒十餘日手足躁擾口目瞤動面白身冷譫語發狂不知人事勢甚危篤其家以為風縛其手足或以為痰迷心竅或以為虛或以為寒或以不治辭之張診之切其脈全無（脈因厥而伏也）問其證不知按其身不熱（邪已入府也）張曰此非人參附子證即是大黃芒硝證出此入彼死生立判因坐視良久聆其聲重而且長（亦有中焦實而奄奄氣似不屬者亦下之而愈見縲仲凉治姚平之一案）曰若是虛寒證到脈脫之時氣沈沈將絕那得有如許氣力大呼疾聲又而不絕即作大承氣湯牙關緊閉宛開去齒藥始下咽黃昏即解黑糞半牀次早脈出身熱人事亦知舌能伸出而黑又服小陷胸湯二劑而愈

一婦人素有虛弱之症後患傷寒一醫以為陰虛發熱用滋陰之藥命食雞子火肉而病更甚所用皆玉竹骨皮丹皮歸芍之類十餘日死症悉具延張至其人已死（此與高鼓峯治徐氏子案同皆厥而脈雖補瀉不同其狀若死則一也）張請視之氣

雖絶而脉尚在且滯滑曰此症不宛乃誤服補藥邪不解胃絡不通胃家實也幸正氣未敗可治少頃果甦（亦以厥故）即用調胃承氣湯一服與飲而結糞即解諸症即漸痊愈次日乃大汗如雨此虛象也復用人參三錢耆朮各用五錢棗仁五錢全安如舊矣（善後法欠妥）

一男子新婚患傷寒吐蛔發熱醫以為陰症用理中湯愈甚張診其脉緩而長一日夜吐蛔十餘條以為風木生虫濕熱相顯頓然而生隨生隨吐欲用黃連等清濕熱之藥不信復易一醫用歸芍玉竹之類吐益甚虫愈多復延張張曰必欲治非黃連不可遂用黃連厚朴枳實廣皮半夏各等分煎服其吐稍止再服不吐清清虫從大便而出約數十餘條大小不等後再加用白朮等味以補之即脹不安共用黃連枳實二十餘劑而安愈此乃千百中偶見之症實所罕有不可目之以為常也（據發熱脉緩而長則是陽明經之症也案與治蛔似乎脫畧○此案本非傷寒若入于傷寒而非傷寒八字是矣故加批之耳）

陸養愚治周兩峯頭痛身熱又舟行遇風幾覆比至家脇大痛耳聾煩渴譫語醫來見吐血盆許喘息不定診後曰兩尺不起寸關弦緊今煩渴譫語是陽症也弦乃陰脉仲景曰陽病見陰脉者死況兩尺乃人之

根蒂今不起根蒂已絶孤陽上越逼血妄行據症脉不可為矣辭去（此人亦不甚昧亦須福命）脉之兩寸闕弦而微數兩尺累沈而不起蓋症屬少陽弦數宜矣兩尺不起亦自有故經云南政之歲少陰在泉則兩尺不應今歲已酉乃是南政酉為陽明燥金司天少陰君火在泉故不應耳吐血者因舟中驚恐血菀為熱所搏也譫語者三陽表症已盡將傳三陰也先以小柴胡和之俟實堅而下之旬日當愈也因與二劑明日脇痛減耳微聞譫語但胸滿舌上黃胎尚在仍以小柴胡加枳桔黃連日服一劑二日胸脇少寬而胎黑有刺大便不行者約有六七日矣乃以潤字丸三錢用前湯送下至夜更衣身涼諸症頓失後去枳桔加歸芍調理旬日而安起

王野溪病傷寒六七日已發表矣忽身熱煩躁口渴咽乾大小便利而不任風寒或用涼膈散反胸前見斑數十點色微紅乃投消斑青黛飲又發譫語手足厥逆謂熱深故擬用承氣下之陸脉之浮數六七至按之而空曰此陰盛格陽症也下之立斃內經至真要論云病有脉從而病反者何也岐伯曰脉至而從按之不鼓諸陽皆然今脉浮之而數按之而空乃陽虛

為陰所拒不能內入而與陰交身熱煩躁口渴咽乾浮陽外越之故也惡風畏寒陽氣不足也發斑者因寒藥激之致無根之火聚于胸中上熏于肺傳之皮膚也譫語者神不守舍也厥逆者陽將竭也若冷至肘膝則無及矣此與東垣治馮內翰之姪目赤煩渴王海藏之治侯輔之發斑譫語同例一用真武一用理中此先哲之成驗後學不知取法耳急用大料參朮薑附峻補回陽麥冬五味甘草白芍斂而和之濃煎俟冷徐徐服之日夜令藥不斷三日夜病勢漸始輕減至旬日後又加減退月餘而安痊起卧矣

吳子玉病發熱頭痛腰疼煩躁口渴無汗有主麻黃湯者有主羌活冲和湯者脉之陽部浮數而不甚有力陰部沈弱而濇謂曰此症此脉有兩感之象必重有所用力燕之房勞而得者不可輕汗宜先投補劑托住其氣血待日期而汗之或曰太陽症而用補仲景有此治法乎曰雖無此法而未嘗無此論太陽症宜汗假令尺中遲不可發汗何以知之以榮氣不足血少故也今寸脉浮數而無力表症不甚急尺脉沈弱而澁則裡虛可知傷寒有失汗而傳裡者亦有誤汗而傳裡者此症是也衆不決姑服羌活冲和湯一日

夜二劑前症俱劇仍不得汗擬麻黃者以藥輕病重故大汗之陸曰若服麻黃湯以陽譫語即見斃命可以立而俟者也乃用補氣養榮湯二劑服之病未減亦不加劇診之寸關如故兩尺稍有神再服二劑又約一日夜方以參蘇飲微汗之汗出後諸症悉愈

凌東陽患傷寒已經汗下身體外不熱捫之則熱極不能食而餓不可忍及强進稀粥即脹不可任必用力揉之一二時始下甫下又飢不能支大便五六日不行亦不鞕滿或以汗下身涼而用開胃養血順氣之劑病日甚診之兩寸關浮數兩尺沈數有力曰此畜血症也因下之太早濁垢雖去邪熱尚留致血結成瘀胃中飢甚者火也仍飢者腸中空洞協熱消穀也語妥欠法宜清上焦之熱去下焦之瘀而後議補或曰許學士謂血在上則喜忘血在下則發狂今云瘀而何以無此也曰成無已固深于傷寒者也謂不大便六七日之際無喜忘如狂之症又無少腹鞕滿之候何以知其有畜血蓋以脉浮數故也浮則熱客于氣數則熱客于血下後浮數俱去則病已如數去而浮仍在則邪獨留于衛善飢而不殺穀潮熱反渴也浮去而數仍在則邪獨

留于榮血熱下行血得瀉必便濃血若大便六七日不行血不得泄必在下焦而為瘀須以抵當湯下之此前賢之成案也乃用淡鹽湯送抵當丸三錢取鹽走血之意以去榮中之結熱隨濃煎人參湯調凉膈散五錢徐徐送下以去衛中之浮熱用人參湯者病久數下恐元氣不能支也如此兩日結血去浮熱解飲食進後以清氣養榮湯與進調理旬日而愈

湯二老病傷寒已發汗矣後忽下利身熱頭痛昏憒或謂合病下利復用解肌發表藥反增劇自汗惡風或謂陰虛用理中合四物遂不眠妄見躁煩譫語或云此協熱下利也用白頭翁湯二劑病畧可數日諸症不減四肢厥逆脉之浮按散大而數（表虛）沉按細數而有力（裡實）曰向云協熱者是也第宜調胃承氣湯下之不當止用白頭翁湯耳或云下利厥逆可復下乎曰內經云塞因塞用通因通用王太僕云大熱內結浮鴻不止熱宜寒療結復須除以寒藥下之結散利止此通因通用之法也又仲景云下利譫語有燥屎也厥逆者熱深厥亦深也承氣下之第此症初見時下之即愈今日數已久元氣將脫不得竟下因用人參二錢濃煎送潤字丸五錢半日許出燥屎數十枚利

減半手足稍温第昏沈更甚問之不語左脉微浮畧數右脉少沈微數無力再用人參五錢濃煎送潤字丸二錢少時又去燥矢數枚溏便少許遂能語索食稀粥與之次日身涼神爽後用調養氣血少佐清熱之品旬日漸愈惟大便常結用八物倍生地而瘳

一卒傷寒大小便不通予與五苓散而皆通五苓固利小便矣而大便亦通者津液生固也或小便通而大便尚不通宜用蜜煎法導之而即通也資生經醫說續編

施秘監尊人患傷寒欬甚醫告技窮試檢灸經于結喉下灸三壯即差益天突穴也神哉神哉全上

陸肖愚治臧茗泉患傷寒發熱鼻燥口乾嘔惡胸脇痛滿小水短赤大便瀉利或投柴苓湯反增頭痛如破徹夜不寐已三日脉之左弦右洪寸關數兩尺稍和以柴葛解表為君黃芩石膏知母清腑為臣枳桔寬中為佐竹茹甘草平逆為使一日二劑嘔止痛減餘如故因去知母黃芩竹茹倍柴葛加生薑五片亦一日二劑熱退安卧瀉亦止矣口尚微渴以花粉麥冬甘草陳皮黃芩桔梗枳殼四帖漸安後十日食復身熱譫語如見鬼狀舌黑有刺大便三日不行日輕夜重脉沈而有力兩尺帶弦用枳實黃連薤仁桃仁白

芍梹榔元明粉等數味共煎服至二劑諸症悉減而
惟大便未行再用桃仁十枚煎湯送潤字丸一錢五
分下之所患全愈後以清氣養榮湯而調安之
吳煦野子年二十三歲精神素旺清明節自館中歸有
房事五更小解忽臍下作痛腸中雷鳴大便瀉水小
便不利明日遂發寒熱頭痛醫來告以酒後犯遠歸
之戒醫疑是陰症陽寒即以理中湯二劑令其一週
時服盡至次日嘔逆大作煩躁口渴飲食不進晝夜
不卧診之已三日矣其脉左弦右洪寸關有力尺部
尚和面赤戴陽乃與柴葛解肌二劑因述遠歸陰虛
投理中不減咸擬倍加參附陸曰脉症俱陽縱有房
事陰未嘗盡若再投參附不可為矣令今夜必服此
二劑庶不傳裡病者心虛止服一劑明早診之症不
增劇脉仍洪大并兩尺亦大曰熱邪已入腑矣日晡
必劇以白虎湯與服二劑病者猶豫謂曰今日怕石
膏明日大黃也怕不得延挨未服而煩渴躁熱大作
且有譫語遂連進二服熱略不減再以前方二劑與
之至五更始得少睡早間診視兩尺沈實舌胎已厚
改用小陷胸湯送潤字丸一錢至晚又進一錢夜半
出燥矢數十枚熱減瀉止又服枳實黃連至數十劑

少用滋補即痞膈飲食不進調治二月方得全愈

陸祖愚治顧玉巖年及六十歲病患傷寒之症服藥頭疼骨痛已除身熱煩躁兼發赤斑而狂診之六脉沈數有力目瞪直視噤不出聲舌黑芒刺四肢氷冷詢其大便二十日不行謂年雖高而脉象尚有神故可力任無事即投以大承氣湯下之目閉昏沈咸謂決死矣至一二時許頃聞腹中鳴響去燥矢若干諸症脫然僅存一息改用人參麥冬歸芍耆朮調理而安

吳開之二月間患頭痛身熱服藥已愈旬日矣忽耳後紅腫作痛大發寒熱或以為毒用花粉連翹解毒數劑不效或以為痰核用南星半夏數劑反甚胸脇滿痛飲食不進氣喘而粗夜卧不安脉之兩寸關弦數兩尺和此本傷寒少陽之邪不解所以發腫耳之前後上下乃少陽部分寸關弦數亦少陽不和之脉宜小柴胡湯和解之用軟柴胡七錢乾葛黃芩各三錢生甘草一錢桔梗一錢蘇子一錢白芥子一錢薑棗煎服二劑喘定四劑服畢腫痛全行消退而痊安

王節齋治陳湖一男子患傷寒仰卧一月且耳聾意其病尚在少陽故脇痛不能轉側及耳聾也與小柴胡湯加山卮一劑即能轉側耳亦有聞尾閭處內潰皆

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

蛆蝨少陽屬風木故能生虫也病在少陽明驗者哉
范汪方云故督郵頓子獻得病已瘥詣華專視脉專曰
尚虛未復復勿為勞事御內即死臨死當吐舌數寸
其妻聞其病除從百餘里來省之止宿交接中間三
日發病一如專言婦人傷寒雖瘥未滿百日氣血骨
髓未牢實而合陰陽快者當時即未覺惡經日則令
百節解離經絡緩弱氣血虛骨髓空竭恍恍吸吸氣
力不足著牀不能動搖起居仰人食如故是其症也
丈夫患此病者其理亦從同耳此乃病源論也○醫說續編摘要附錄
有士蓋正者疾愈後六十日已能射獵一犯房事即吐
涎而死及熱病房室名為陰陽易皆難治近者有一
士大夫小得傷寒瘥已十餘日能乘馬行來自謂平
復亦以房事即小腹急痛手足拘攣而死矣全上
婦人溫病雖瘥尚未平復血脉未和尚有熱毒而與交
接得病者名為陰陽易醫者張苗說有婢得病瘥後
數日有六人與其姦之皆死此千金方也○全上
林觀子父因積寒腹痛以疹症刺指而愈數日後神思
欝結胸腹不寧日就羸頓不能自言所苦然絶無表
裏症猶日餐粥二三次大便溏日二三行雜治兩旬
餘漸劇後一醫診之曰傷寒之邪尚在何悞至此也

服小柴胡八劑別下結糞十數枚而安此亦臟結類所謂飲食如故時時下利也此係林觀子注手傷寒折衷者也

吳仁齋治一人傷寒十餘日脉沈細手溫而足冷大便不通面赤嘔吐煩渴藥不能下惟喜涼水一二口或西瓜一塊食下良久吐出此陰甚于內逼其浮陽上冲咽嗌故面赤煩嘔也遂用附子大者一枚以生薑自然汁煮出和白麵粉包裹煨熟去麪去皮夾切片又以人參三錢炮薑二錢二味全入水煎取出浸冷水中待其冷而後服之何不愈驗也係參薑之汁隔浸冷水中者一人傷寒七八日服涼藥太過遂致變身涼手足厥冷通身黑斑惟心頭溫暖乃伏火所致也診之六脉沈細昏不知人不能言語狀如尸厥遂用人參三白湯加熟附半箇乾薑二錢服下約一時許班漸紅手足漸暖甦矣數日復有餘熱不清此伏火後作再用黃連解毒竹葉石膏湯調治而安復也此先用溫補後用涼解之法也

馬元儀治沈某發熱七日神昏譫語中州結塊高突拒按作痛診之右脉虛微左見弦澁此正氣奪而邪氣盛也症實脉虛法在不治不得已必先補後攻庶幾萬一與人參桂枝炮薑半夏枳實厚朴廣皮補正散結脉稍起再與附子加桂理中湯以恢復元氣二劑

右脉已透四劑兩脉有神而前症猶在中痛轉甚時衆議交沮蓋此症原有積滯可攻兩日用藥嵩行溫補者全是顧慮元氣若早下之必先脫矣今已補完胃氣即可施治實之法也以人參三錢大黃五錢厚朴一錢枳實一錢桂枝五分服下未及一時大便連行三次其塊如失諸症悉平次與調理脾腎而愈

卜晉公患傷寒數日面赤躁煩手足搐搦起卧轉側不安口燥渴大便結無甚表症只一味燥火為患耳或用清火發散俱不應診其脉虛濇兼結夫濇則傷陰結則氣滯得之憂思勞欝肺胃受傷津液虧而虛邪結也散邪清火適所以耗其陰而留其邪耳治法必須以大劑之藥滋解之乃可用瓜蔞實一兩紫菀三錢枳殼十錢桔梗一錢秦艽一錢杏仁蘇子半麪等一劑煎服便得大睡身安調理數日諸症霍然如失而痊寧矣

鮑坤厚病經半月兩寸獨鼓兩關尺虛微頭痛如斧劈汗出不止讝語神昏曰寸大尺小本為上盛下虛之候況頭痛如破者虛陽上僭也汗出不止者虛陽外散也讝語神昏者孤陽氣浮神失其守也非人參附子無以追散失之元氣非童便豬膽葱白無以通僭逆之陽氣法當用白通湯以急救之時夜半特宰猪

取膽比藥成牙關緊急不知人事乃控而灌之黎明神氣漸清此陽氣已漸歸原但欲其深根固蒂非大劑溫補不可乃用人參四兩附子一兩肉桂五錢合附子理中湯法連投數劑痛定汗止調理而安

一人傷寒六日兩脈微弱不起面垢遺尿自汗譫語身重不能轉側此三陽合病汗下兩不可用仲景云腹滿身重口不仁而面垢譫語遺尿自汗者白虎湯主之蓋三陽合邪至遺尿譫語其中州擾亂真氣與津液並傷可知故仲景復云發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷以汗則偏於陽而津液益傷下則偏于陰而真氣復損惟白虎湯一法解熱而不礙表裡但三陽病其脈當浮大而反微弱不起者以邪熱欝遏不得外達非陽衰脈微之比但清其壅熱而脈自起矣故用大劑白虎湯投之一劑服下便得大睡（再）次劑續進神清脈起再與補虛清熱之（南產）味調治全愈

張氏子傷寒四五日兩脈虛微神氣昏亂躁煩不寧時欲得水復置不飲棄衣而走勇力倍常言語狂妄不避親疎此陰盛格陽欲脫外假熱內真寒也欲與理中湯投之咸謂火熱有餘之症欲行寒下曰豈有大熱症而不引水自救之者況兩脈微弱明屬陰盛陽

微之象若再不為其溫補待到大汗一下即不可治矣與喻嘉言治徐國楨之論同也急用前方加人參至四兩煎成候冷服之約一二時許狂亂頓止反見寒慄欲覆重被再將前藥一劑服之神氣即清熱亦退除而全安

周禹九傷寒五日發熱中痛嘔逆須三四人搖扇取涼不已與藥服之隨行嘔吐診視其脉寸虛空大關尺虛小曰兩寸空大者陽欲從上越也關尺虛小者陰欲從下脫也若大汗一至陰陽兩絕不可為矣以白通湯加用人尿猪膽汁一味服後嘔逆隨已寸脉即平關脉即起後見口燥中痛脉實乃以承氣湯下之周身發斑疹兩頤發腫轉用黃連解毒湯治之而愈

張氏僕病經五日發熱脉沈微口燥煩躁不眠曰發熱為陽脉沈微為陰少陰症似太陽也口燥煩躁乃邪氣內擾當用麻黃附子細辛湯投之以溫少陰之經而驅內陷之邪彼以子身安得陰症乃用附子別商瓜蔞滋解之法症益甚再脉之沈微轉為虛散已犯條欵者也不得已惟用四逆湯一法治之或可挽回遂連進二服是夜即得安睡至次日熱退脉起而安

李季虬曰趙和齋年六十患病予以他事請見延至中堂云偶因勞倦體疲正欲求教為診視細按其六部

并察其形神謂云翁病屬外邪非勞發也須著意珍重時葛存誠在坐私謂曰此病是極重外感邪氣有內陷之兆恐難挽回別去三日復邀看則神氣已脫脉無倫次問所服何藥云石膏湯曰病症固重服藥又差無汗發熱非陽明症何得用石膏此太陽症未經發汗邪氣傳裡裡虛水涸不勝邪熱真氣已脫必不可救也其時猶以余言為妄不兩日而斃矣廣筆記

張意田治一人春間傷寒七日後煩躁咽痛胸悶泄瀉皆作濕熱治不效診得脉來細急乃少陰脉象也夫少陰上火下水而主樞機水火不交則脉急胸滿而煩躁火上咽痛水下泄瀉此神機內斡旋轉不出不得周遍于內外之症也與少陰下利咽痛胸滿心煩之論吻合宜用豬膚湯法用豬膚六兩刮取皮上白膚煎汁一大椀去滓及浮油加白蜜五錢穀藥一兩炒香研末文火熬成半椀溫服之症稍減其脉細而短濇此戊癸不合以至陽明血液不生經脉不通之候也與炙甘草湯宣通經脉會合陽明遂脉緩而愈

薛立齋云鄭汝東妹壻患傷寒得純黑舌醫士曾禧謂當用附子理中湯人咸驚駭遂止迨困甚治棺曾往視之謂用前藥猶有生理其家既以待其死拚而從

之即投數劑果然痊復大抵舌黑之症有火極似水者即杜學士所謂薪為黑炭之意也宜用涼膈散之類以瀉其陽有水來克火者即魯所療之人是也宜理中湯以消陰翳又須以老生薑切平擦其舌色稍退者可以治之若堅而不退者不可治也（一云以薑切平以蘸蜜擦之）

弘治辛酉金臺姜夢輝患傷寒亦得純黑舌手足厥冷餧逆不止衆醫作火治幾致危殆判院吳仁齋用附子理中湯而愈夫醫之為道有是病必用是藥附子療寒其效可數奈何世人皆以為必不可用之藥寧視人之死而不救不亦哀哉至于火極似水之症用藥得宜效應不異不可謂百無一治而棄之也（傷寒折衷）

庚辰年少司馬楊夫人傷寒誤服附子藥一鍾即時咽喉赤腫急邀薛治薛謂仲景先生云傷寒症桂枝下咽陽盛則斃何況附子乎治不治而去是日果死

辛卯年一吏傷寒誤用附子藥一鍾發躁奔走跌死夫盛暑之際附子桂薑三藥併用連進三四劑無事嚴冬時候三藥單用一味止進一劑者却死可見羅謙甫先生捨時從症權宜用藥之妙

吳洋治汪伯玉從嫂病衆醫窮洋始至目家人曰易與爾弟以寒水飲之其黨謂病者三日不飽奈何予水

忽左作勿

挾疑作狹

洋曰傷寒陽明熱甚恃藥將不遑即投所宜忽藥可也乃督汲者陳榻下先以一杯飲之病者爽然遂盡一斗病良已乃進人參白虎湯而平太函集

吳橋治表姪方輅自浙病傷寒諸醫不效歸再挾日熱不退耳稍聾體倦心煩醫率投以補劑漸至昏瞀絕食掮衣已治木且逆橋至六脉弦緊而數病由傷寒未解而復感寒幸而年力方彊非汗不愈尋以麻黃石膏湯進之得汗而解全上

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷之三

錢塘魏之琇玉橫撰

疫

王宇泰曰聖散子方因東坡先生作序由是天下神之宋末辛未年永嘉疫災服此方被害者不可勝記余閱葉石林避暑録云宣和間此藥盛行于京師太學生信之尤篤殺人無數醫頃廢之昔坡翁謫居黄州時其地瀕江多卑濕而黄之居人所感者或因中濕

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

而病或因雨水浸淫而得所以服此藥而多效是以通行于世遺禍於無窮也弘治癸丑年吳中疫癘大作吳邑令孫磐令醫人修合聖散子遍施街衢并以其方刊行病者服之十無一生率皆狂躁昏聵而卒噫孫公之意本以活人殊不知聖散子方中有附子良薑吳茱萸豆蔻麻黃藿香等劑皆性味燥熱反助火邪不死何待若不辨陰陽二症一槩施治殺人利于刀劒有能廣此說以告人亦仁者之一端也（續醫說○薛立齋曰嘉靖甲申春南都大疫煎聖散子普濟老幼並服衆者接踵死者塞途良可哀憫殊不知此方因嶺南風土而作且浙之與廣相去萬里殊域異方天時人事大不相侔豈有槩一治療而無誤者哉）

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

張子和曰元光春京師翰林應泰李屏山得瘟疫症頭痛身熱口乾小便赤澁渠素嗜飲醫者便與酒癖丸犯巴豆利十餘行次日頭痛諸病仍存醫者不識復以辛温之劑解之加之卧于暖炕强食葱醋湯圖獲一汗豈知種種客熱疊發併作目黃斑生潮熱血泄大喘大滿後雖有承氣下之者已無及矣至今議者紛紛終不知熱藥之過往往歸罪于承氣湯用承氣湯者不知其病已危猶復用藥學經不明故也良可罪也然議者不歸罪于酒癖丸者亦可責也夫瘟症在表不可下況巴豆之丸乎巴豆不已況復發以辛

熱之劑乎彼隨衆毀譽者皆妄議者也

宋寶慶二年丙戌冬十一月耶律文正王從元太祖下靈武諸將爭掠子女玉帛王獨取書籍數部大黃兩駝而已既而軍中病疫惟大黃可愈活人數萬（得 數 輟睥錄）

職方外紀云哥阿島曩國人盡患疫內有名醫名依卜加得以不藥石令城內外遍舉大火燒一晝夜火息而病亦愈矣蓋疫為邪氣所侵火氣猛烈能盪滌諸邪盡而疾愈亦至理也（焦書初編。此法惟徽外可施。火攻法）

邱汝誠因訪友聞其隣家哭聲問何故曰某甲得時疾邱令汲水置桶以黨橫其人於上遂愈（揮麈新譚。水攻法）

蘇鶚光侍郎云予作清流縣宰縣倅申屠行父之子婦患時疫三十餘日已成壞症余令服奪命散又名復脉湯人參一兩水二鍾煎一鍾以井水浸冷服之少頃鼻梁有汗出脉復立瘥凡傷寒時疫不問陰陽老幼如誤服藥餌者必致困重垂死并發脉伏不省人事者凡七日之後此藥皆可服之百無一失

吳嗣昌治浙督趙清獻公名臣也常遘危疫吳獨排衆議投氷水立甦之公尊禮若神曰君其不朽矣（仁和縣志）

孫文垣治一老妓三月患頭痛身熱口渴水漱不止身重不能反側日漸昏沈耳聾眼合讝語諸醫不效有

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

主補中益氣者有主附子理中者煎成皆未服孫診之六脈洪大面色內紅外黑口唇乾燥舌心黑胎不省人事曰此疫症也法當清解急以小白湯進之猶可生也益氣理中殺之耳安可用問小白何湯也曰小柴胡合白虎湯即是曰泄瀉如此石膏可用乎曰此協熱下利當早服之既服至夜半神氣甦醒惟小水不利熱渴未退師仲景法渴而身熱小水不利者宜當利其小便乃以辰砂倉六一散一兩用燈心湯調和下之服至兩帖其症全除而即瘥愈矣

張淨宇發熱腹疼泄瀉口渴嘔吐不止有認寒者有認熱者有認傷寒者孫診之曰此係時疫瀉也以二陳湯倍用白朮加入青蒿葛根酒芩白芍猪苓澤瀉滑石等數味同煎與其進之甫下一劑漸安復

一僕病身如燒火頭痛如破小水赤色口渴鼻乾不得眠睡胸膈膨脹飢不能食六脉弦而且數孫與竹葉石膏湯加用枳殼知母白芷葛根倍加青蒿一帖而熱痛減半胸膈亦寬唯小水短澁睡卧不安又與化瘟丹三錢井水化下渴止少得安睡頭暈腳軟再與四物湯加用青蒿酒芩茨仁木瓜等味煎服全愈

一僕病與前相似醫與藥乃大吐大瀉熱益增頭痛不

可當煩躁口渴鼻乾嘔吐小水短濇已十四日甚危孫詢所服藥乃藿香正氣散加砂仁厚朴山查大耗元氣之品時五月火令當權之疫當以甘寒之劑治之何可以辛熱香竄益其火而枯其津耶急投人參白虎湯加竹茹葛根青蒿升麻一帖熱除再劑頭痛止諸症盡去後連治數人皆如此蓋天行之疫一方多有先以甘寒清解之劑投之熱退即以四物湯養陰血稍加清熱之品而青蒿之功力居勝（治疫症盡此數語）

吳某婦先感風邪後傷飲食發熱頭痛腹脹醫與巴豆丸瀉之熱如初又以大黃重瀉之熱亦如初再後者謂瀉而熱不退者為虛大用參耆朮補之四日神氣昏沈不省人事孫診之左脉弦數右關尺沈數有力舌尖沈香色舌根焦黑芒刺語言不清蓋不知飢饉之餘疫氣為癘妄下妄補誤成壞症危且殆矣姑以柴胡知母各用三錢石膏六錢枳實花粉各用五分甘草黃芩麥冬各用一錢山卮生地各用七分人參六分竹葉三十片薑三片將水濃煎飲之中夜後人事稍清微微有汗舌亦柔和次日前方去生地加白芍舌心焦黑盡退大便五日不行身尚痛咳嗽與七製化痰丸二帖再以石膏二錢麥冬貝母各一錢前

胡枳殼黃芩厄子各六分甘草三分桑皮八分全安程氏婦乃夫没于疫病七日疫即及之大熱頭疼口渴胸脇併痛醫與小柴胡湯夜忽夢夫交洩而覺冷汗淫淫四肢如解神昏譫語面如土色舌若焦煤強硬孫診之六脈沈弦而數大小便俱秘此亦陰陽易類也疫後有是危已極矣與生脈湯加柴胡黃芩桂枝甘草煎成將乃夫昔穿袴襠燒灰調下兩劑而神醒體溫汗斂舌柔焦退前方加棗仁竹茹四肢能以運動乃即進粥湯漸瘥子女妯娌婢僕凡六人次第均以六神通解散與其投服汗下而即安與陸紫丁程川相仝也

一婦人發熱頭痛醫與九味羌活湯十神湯不效加口渴舌黑如煤又一醫與如神白虎湯竹葉石膏湯亦不見效加泄瀉不止人事昏沈四肢厥冷呼吸氣微米粒不進者十有四日具含斂矣孫至診之脈細如蛛絲曰此疫症也合生脈理中二湯飲之連進二帖夜半神氣即稍甦投飲粥湯半盞次早診之六脈漸見喜曰脈絕微續者生可無虞矣仍與前藥進之至晚泄止口不渴舌煤退精神爽再用人參白朮各一錢麥冬三錢五味子十五粒仍是錢炮薑炙草各一錢棗二枚水煎服理中生脈不拘時服數日全愈此即壞症也前醫凉散過當故以溫補之劑奏功也

吳球泉內人痢疾後感寒月水遽至壯熱頭微疼口渴遍身疼胸膈飽悶煩躁耳聾大便瀉舌上白胎脉七八至亂而無序（脉躁多由第此為熱鬱之極而然躁極而靜鬱極而通後之伏而戰汗勢也亦理也）孫曰此三陽合病春瘟症也且投三陽藥服之挑察徵應再為區處以柴胡三錢葛根白芍各二錢枳實桔梗酒芩竹茹各一錢天花粉八分炙甘草桂枝各五分服後遍身如氷面與四肢尤甚六脉俱無（脉雙伏或單伏而四肢厥冷欲戰汗也宜熟記）舉家及醫者皆歎為物故矣孫曰非死候也蓋夜半陽生勢欲作汗譬之天將雨必六合晦冥諸醫咸皆匿笑四鼓後果戰而汗出衣被皆濕肢體漸温神思清爽且索粥唯耳尚聾腹中大響脉近六至改以柴芩湯加周烏梅兩帖而愈

族孫醉後房事二起而小便即臍下作痛水瀉腸鳴一日十餘度發熱頭痛醫與理中湯一帖反加嘔逆煩躁口渴孫診之左脉弦大右洪大俱七至不食不眠面赤唇燥舌胎黃厚自云房勞失後陰症傷寒小腹痛且漏底乃笑曰春温症也族人交口謂的屬陰症故嘔吐水瀉不可因其面赤便認為陽厥戴陽症與此近似幸加察焉咸擬理中湯再加附子肉桂庶可保全（房勞外感即謂陰症而與熱藥殺人多矣當與喻嘉言治黃長人一案同參喻案見傷寒門）

孫曰桂枝下咽陽症即斃陰陽寒熱之間辨之不真死生反掌茲當舍症從脉也即症論發熱頭痛亦非陰症也以溫膽湯加薑汁炒黃連柴胡乾葛二帖令當夜飲盡俾不他傳因畏竹茹黃連只進一服嘔逆止餘症悉在次日脉之洪大搏指與白虎湯加竹茹兩帖亦令服完因畏石膏只進一服瀉止小腹仍痛又次日脉洪長堅硬邪已入腑非桃仁承氣不可乃覷面煎服連飲二劑下黑燥矢五六枚痛熱俱減再診之六脉皆緩弱以四君子湯加白芍黃連香附調養數日而愈

喻嘉言治錢仲昭患時氣外感三五日發熱頭疼服表

汗藥疼止熱不清只乾唇裂因而下之遍身紅斑神昏讝語飲食不入大便復秘小便熱赤脉見緊小而急曰此症前因誤治陽明胃經表裡不清邪熱在內如火燎原津液盡乾以此神昏讝妄若斑轉紫黑即刻死矣昔人以斑紫黑為胃爛目今本是難救但其面色不枯聲音尚朗乃平日保養腎水有餘如旱田之側有下泉未絕故神雖昏亂而小水仍通乃陽氣未絕之徵尚可治之不用表裡單只用一和法取七方中小方而氣味甘寒者用之惟如神白虎湯一方足以療此盞中州元氣已離大劑急劑複劑俱不敢用而虛熱

內熾必甘寒氣味方可和之耳但方雖宜小而服則宜頻如飢人本欲得食不得不漸漸與之必一晝夜頻進五七劑為浸灌之法庶幾得以使邪熱漸然而解脾胃得元氣即可以漸然而生也若小劑之而復以曠日易服之縱用藥味極為得當亦無及矣如法治之更一晝夜熱退神清脉和食進其班自化而愈

程凡腮頰紅腫嘔惡惡寒發熱不食下午煩躁口苦不寐此俗名鸕鷀瘟是也乃少陽陽明二經之症法當清解以柴胡貫仲各二錢乾葛竹茹半夏麴各一錢黃連枳殼各七分甘草四分一帖而減二帖而安

鑑春日病瘟誤治兩旬釀成極重死症壯熱不退譫語無倫皮膚枯澁胸膛板結舌卷唇焦身踡足冷二便略通半渴不渴面上一團黑滯前醫所用之藥不過汗下和溫之法絕無一效喻曰此症與兩感傷寒無異但彼日傳二經三日傳經已盡即死不死者又三日再傳一週定死矣此春溫症不傳經故雖邪氣留連不退亦必多延幾日待元氣竭絕乃死觀其陰症陽症兩下混在一區治陽則礙陰治陰則礙陽與兩感症之病情符合仲景原謂兜症不立治法然曰發表攻裡本自不同又謂活法在人神而明之未嘗

教人執定勿藥也吾有一法即以仲景表裡二方為
治雖未經試驗吾天機勃勃自動若有生變化行鬼
神之意必可效也于是以麻黃附子細辛湯兩解其
在表陰陽之邪果然皮間透汗而熱全清再以附子
瀉心湯兩解其在裡陰陽之邪果然胸前柔活人事
明了諸症俱退次日即思飲粥以後竟不需進藥矣
只此二劑而起一生九死之症快矣哉此案後學宜反覆詳玩之
盧不遠治永嘉王龍友望其色黯紫舌本深紅知其次
日當病果發熱越三日其叔培竹欲歸將發診其脉
沉而散盧極力挽留謂龍友雖病而脈有神理君雖

未病而邪實深入病中路將奈何至次晚大吐脉隨
脫藥以人參三錢脉復有以棗仁等劑投之者其熱
轉盛十四日脉八至舌短神昏盧謂今晚非用下必
然胃爛因用芩連大黃一劑次日遂愈蓋疫為癘氣
人受之多從口鼻入先由寒鬱火故其色紫紫為水
剋火之色也火病之發應心之苗故舌色深紅杜清
碧謂之將瘟舌而脉體須浮浮脈象火病發必順若
沈者則邪已深入臟矣故河間多用下法如當下
之際而失其時必致胃爛而死黙能救也

吳又可治朱海疇年四十五歲患疫得下症四肢不舉

身卧如塑目閉口張舌上胎刺問其所苦不能答因問其子兩三日所服何藥云進承氣湯三劑每劑投大黃一錢許不效更無他策惟待日而已診得脉尚有神下症悉具藥淺病深也先投大黃一兩五錢目有時而稍動再投舌刺無苔口漸開能言語三劑舌胎稍去神思稍爽至四日服柴胡清燥湯至五日復生苔刺煩熱又加再下之七日又投承氣養榮湯（承氣養榮宜考）肢體自能稍動計半月共服大黃十二兩而愈又隔數日始進糜粥調治（理）兩月平復如故凡治千人所遇此等不過三四人而已姑存案以備參酌耳

施幼升婁卜頗行年四旬稟賦肥甚六月患時疫口燥舌乾胎刺如鋒不時太息咽喉腫痛心腹脹滿按之痛甚渴思冷水日晡益甚小便赤澁得涓滴則痛甚此當急下之症也緣通身肌表如氷楮甲青黑六脉如絲尋之則有少按則無醫者不究裡症熱極但引陶氏全生集以為陽症但手足厥逆若冷過乎肘膝便是陰症今以通身氷冷比之冷過膝更甚宜其為陰症一也且陶氏論陰陽二症全在脉之有力無力中分今已脉微欲絕按之如無比之無力更甚宜其為陰症二也陰症而得至陰之脉又無說焉遂投附

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

子理中湯未服延吳至以脉相參表裡正較此陽症之最者因内熱之極氣道壅閉下症悉具但嫌下之晚耳今亢陽已極以至周身氷冷此體厥也六脉如無者群龍無首之象症亦危矣（吳于此時即令以新汲水靚面飲之必可破其疑惑不知出此惜哉）急投大承氣湯囑其緩緩下之脉至厥回便得生矣其妻以一回陰症一回陽症天地懸二疑而不服更一醫指言陰毒須炙丹田又三醫續至皆言陰症妻乃惶惑醫者自言何不卜之神明遂卜得從陰則吉從陽則凶（從陰者謂從陰藥也神自明而人自黯耳）更惑於醫之議陰症居多乃進附子湯下咽如火煩躁之極

嘆曰吾已矣藥之誤也言未已轉劇不逾時竟殞

吳江沈氏婦少寡多鬱怒而有吐血之病（症）歲發三四次吐後即已三月間小發熱頭疼身痛不惡寒而微渴次日舊病大發吐血踰常更加眩暈手振煩躁飲食不進且熱加重醫者但見吐血以為舊病不知其時疫也以發熱為陰虛頭疼身痛為血虛不知吐血前一日已發熱頭痛之矣非吐血後所加也衆議用補劑治之問於吳可否吳曰失血補虛權宜則可今兼時疫非昔比也于是初用人參二錢茯苓歸芍佐之兩服後虛症咸退熱減六七醫者皆謂用參得

效欲速進吳禁之不止遂覺胸中煩懣腹中不和求
嘔不得遍體不舒終夜不寐蓋虛邪得補而退實邪
得補而劇也因少與穀氣微利之而愈按此病設不
用利藥靜養數日亦愈以其人大便一二日一解則
知地氣自通邪氣在內日從胃氣下趨故自愈也

嚴氏婦年三十時疫後脉症俱平飲食漸進忽然肢體
浮腫別無所苦此即氣復也蓋大病後血未成氣暴
復血乃氣之依歸氣無所依故為浮腫嗣後飲食漸
即加增浮腫漸旋即消除若如以投行氣利水之藥投之
定致謬矣（據所云則養血之劑所宜投之也○吳又有痢門一案亦身忽腫後即漸銷也）

一人感疫發熱頃渴思飲氷水醫者禁服生冷甚嚴病
者苦索不與（張子和曰病人不能飲水雖强與之不飲也醫何愚哉凡遇熱病欲得水者與之立愈）遂致兩目火迸咽喉焦躁晝夜不寐目中見鬼
陰脫見鬼為多病人困劇自謂冷水得一滴下咽雖死無恨
于是乘隙匍匐竊取井水一盆置之枕旁飲一杯目
頓清亮二杯鬼物潛消三杯咽喉聲出四杯筋骨舒
暢不覺熟睡俄而大汗如雨衣被濕透脫然而愈蓋
其人本瘦而多火素稟陽藏醫與升散不能作汗則
病轉劇今得冷飲表裡和潤自然汗解而安痊矣
張路玉治洪氏女壬子初冬發熱頭痛胸滿不食已服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

發散消導四劑至六日周身痛楚腹中疼不時奔響屢欲圊而不行口鼻上唇忽起黑色成片光亮如漆與玳瑁無異醫駭辭去張診之喘汗脈促神氣昏憒雖症脈俱危喜其黑色四圍有紅暈鮮澤若瘡瘡之根腳緊附如綫他處肉色不變許以可治先與葛根黃芩黃連湯加犀角連翹荊防紫荊人中黃解其肌表毒邪俟其黑色發透乃以涼膈散加人中黃紫荊烏犀微下二次又與犀角地黃湯加人中黃之類調理半月而安此症書所不載唯龐安常有玳瑁瘟之名而治法未備人罕能識先是一人患此瀕危口鼻

孔皆流鮮血亦不能救大抵黑色枯焦不澤四圍無紅暈而灰白色黯者皆不可救其黑必先從口鼻至顴頰目胞兩耳及手臂足脛甚則胸腹俱黑從未見之于額上及背肩陽位者也

陳瑞之七月間患時疫初發獨熱無寒或連熱二三日或暫可一日半日熱時煩渴無汗熱止則汗出如漉自言房勞後乘涼所致服過十味香薷九味羌活柴胡枳殼桔梗等十餘劑煩渴壯熱愈甚張診之六脈皆洪盛搏指舌胎焦枯唇口剥裂大便五六日不通雖云病起於陰實則熱邪亢極胃府剥腐之象急與

凉膈加黃連石膏人中黃得下三次熱勢頓減明晚復發熱煩渴與白虎加人中黃黃連熱渴俱止兩日後左頰發頤一晬時即平而氣急神昏此元氣下陷之故仍與白虎加人參犀角連翹升柴甘桔牛蒡馬勃二服右頤又發一毒高腫赤亮瘍醫調治四十日而安同時患者頗多良由時師不明此為濕土之邪初起失于攻下槩用發散和解引邪泛濫而發頤毒多有腫發綿延以及膺肘臂膊如流注潰腐者縱用攻下解毒皆不可救不可以發頤為小症而忽之

一遼東人患時疫寒熱不止舌胎黃潤用大柴胡下之煩悶神昏襍進人參白虎補中益氣熱勢轉劇頻與苓連知母之類服之不應張診之左脉弦數而勁右脉再倍于左周身俱發紅班惟中脘斑色皎白諸醫莫審白斑之所由起因喻之曰良由過服苦寒之劑致中焦陽氣失職故也法當通達其斑兼通氣化無慮班色之不轉也遂用犀角連翹山卮人中黃等味晝夜連進二服下之大小二便齊行而班立化熱退神清飲食即進能起坐徐行矣其昆季同時俱染其氣並進葱白香豉人中黃連翹薄荷之類皆隨手愈

一人壯熱十餘日神昏語言難出自利溏黑舌胎黑燥

唇焦鼻煤先誤發散消導數劑煩渴彌甚恣飲不輟此本伏氣鬱發更遇風邪遂成風溫以熱邪又伏少陰從火化出太陽即是兩感幸年壯質强已逾三日六日之期症之危殆良由風藥性升鼓激周身元氣皆化為火傷耗真陰少陰之脉不能內藏所以反浮古人元無治法唯少陰例中則有救熱存陰承氣下之一症可借以迅埽又伏之邪也審其鼻息不鼾知水之上源未絕無慮其直視失溲也（喻嘉言治錢仲昭亦以其腎水未竭故傷寒多死下虛人非虛語也）酌用涼膈散加人中黃生地急救垂絕之陰服後下溏黑三次舌胎未潤煩渴不減更與大劑涼膈大黃加至二兩兼黃連犀角三下方得熱除于是專以生津止渴大劑投之舌胎方去津回渴止而愈（按喻嘉言治金鑑類兩感其論症與此畧同第金則舌卷足冷身踡而便略通此則舌黑唇焦鼻煤而利溏黑故合設金則以麻黃附子細辛及附子瀉心此則專用涼膈其治法不同如此也）

楊乘六治一人病疫大熱大渴唇焦目赤兩顴嬌紅語言謬妄神思昏沈手冷過肘足冷過膝其舌黑滑而胖其脉洪大而空曰此戴陽症也外熱內寒雖身熱而如烙不離覆蓋口渴引飲不耐寒涼面色雖紅却嬌嫩而游移不定舌胎雖黑却浮胖而滋潤不枯症類白虎然白虎症未有厥冷上過肘下過膝者遂以大

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

劑八味飲加人參濃煎數椀探冷與服諸症乃退繼
以理中附子六君歸芍調理而安愈先是有用白虎
者幸未服之不然幾乎誤命而人尚不明也
張學海業醫以疲於臨症染時疫微寒壯熱頭痛昏沈
服發散藥數劑目直耳聾病勢增劇口渴便秘改用
瀉火清胃解毒等劑熱尤熾油汗如珠譫語撮空惡
候悉具楊診之其脉洪大躁疾而空其舌乾燥焦黃
而胖座皆醫也僉擬白虎承氣楊以養榮湯用參附
各試三錢與之曰服此後當得睡睡則諸脉俱靜諸
症俱退而舌變嫩紅滑潤矣第無撓旁議翌日復診

果如所言蓋症有真假憑諸脉脈有真假憑諸舌如
係實症則脉必洪大躁疾而重按愈有力如係實火
則舌必乾燥焦黃而欽束且堅卓豈有重按全無滿
舌俱胖尚得謂之實症也哉仍用原方將參附減去
一半令其守服數劑下之其症即占安而愈
陸養愚治費西村患時疾頭疼身熱口渴氣喘下午熱
潮更甚或以藿香正氣散投之煩躁特甚舌心焦黑
譫語發班又與柴苓湯投之更加嘔噦且自汗不止
診之脉來浮數而微曰此少陽陽明合病之虛熱也
用白虎湯加人參黃耆葛根柴胡燈心竹葉熱減十

分之七汗亦稍止後以人參麥冬五味黃芩山巵甘草等味二劑服下斑亦漸退痰亦漸愈

陳好古患兩太陽痛左脇作疼口渴大便瀉水小便短赤面色如塵埃脉之滑大而數右關為甚時春末夏初曰此疫症也陳怒溫病之名（此種人世上不少醫者亦宜知之耳）辭去或以胃苓湯投之煩渴異常語言錯亂再求診脉仍前症似危急然細忝症候不過熱欝之極故煩亂沈昏耳其瀉者因表氣不舒故裡氣不固也用白虎合解肌湯二劑投之而神思即清又服二劑而起

丁程川之寵患疫而死半月後丁自病頭痛身熱口渴煩躁或與小柴胡湯忽夜夢與亡寵交接驚覺而精已洩汗出如雨不能轉側神昏譫語亟陸診之其脉沈微如絲面色如泥四肢厥冷幸未過肘膝而陽事尚自翹然令剪其亾寵舊襯襦燒灰以附子理中湯調灌之兩劑神清陽亦收斂矣後再以人參麥冬五味白芍黃連棗仁知母黃柏等味煎進調理而安

柴嶼青治吳氏婦患病家人謂因怒而致醫遂用沈香烏藥代赭等味煎用表劑二十餘日胸膈脹悶壯熱不休服之左手稍平右三部洪數此疫症邪熱入腑表散徒傷衛氣病亦不解乃連進瓜蒂散二劑吐去

涎痰察其未哀又與小承氣湯服二劑即下宿垢數
行而熱漸退除調治二十餘日脉象始得平復
繆仲淳治史鶴亭太史丁亥春患瘟疫頭疼身熱口渴
吐白沫胃熱晝夜不休醫誤謂太史初罷官歸妄投解
鬱行氣藥不效又與四物湯益甚諸醫謝去謂其必
死迎繆至病二十餘日矣家人具以前方告繆曰誤
矣瘟疫者四時不正寒熱之謂發於春故謂之瘟疫
不解又不下使邪熱彌留腸胃間幸元氣未盡故不
死亟索淡豆豉約二合許炒香麥冬一兩許知母數
錢石膏兩許一劑大汗而解時大便尚未通史問故
曰非汗如雨邪盡矣弟又病津液未回故大便不通
此腸胃燥非有邪也今可食甘蔗二三株蕪多飲麥
冬湯不及三日即下燥糞六十餘塊而病即全愈矣
張鳳逵萬歷丁未三月間寓京師吏部劉蒲亭病劇求
治已備後事譫語抹衣不寐者七八日矣御醫院吳
思泉名醫也偕數醫治之張診脉只關脉洪大其餘
皆伏乃書方用竹葉石膏湯咸驚曰吾等已煎附子
理中湯何氷炭如是張詰之吳曰陽症陰脈故用附
子張曰兩關洪大此陽脉也其餘經為火所伏實非
陰脉也一劑投之譫語抹衣即止就寐片時復再脉

之洪者平而伏者起矣又用辛凉藥調理全愈

元時江西泰和縣瘟疫大作有醫者視病中夜而歸忽遇神人騎馬導從而來醫知非人拜伏于地神至前叱曰汝何人也答曰某醫人也神曰汝今醫病用何藥答云隨病冷熱輕重用藥治之神曰不然天一類用香蘇散好醫如其言試之皆效香附炒去皮紫蘇各四兩陳皮甘草各一錢右為細末每服三錢用水一盞煎至七分擬去渣澤乘熱服不拘時候日進三劑必須戒除葷腥酒肉等物其治無不應効

又記云昔城中大疫有白髮老人教一富家人合香蘇散施城中病者服之皆得痊愈其後疫鬼作人問其富人家富人家以實告於鬼鬼相顧而言曰此即老教三人所傳施也遂稽顙而退之（全上。此則萬密齋保命歌括）

醫者喬姓奉呂仙甚謹一夕間夢呂仙告之曰水上浮萍甚能愈疾幸須多貯之喬即遵收積至十車是冬大疫喬有藥中每加浮萍一撮服之無不立愈其門請治如市遂獲重貲他醫效之都不見驗（雲間襍誌）

錢國賓治管舡王元暴病頭疼身熱倦卧嫺動不惡寒止畏熱舌紅肌黃二便不利六脉浮洪視其症脉瘟病也用清涼發散之劑八日罔效再四審之心胸腹

脇俱無他症口渴飲水欲向外卧令人移出解衣視
其前後心間有黑點數十如疣蚤斑知為羊毛瘟也
用小針刺于黑處一挖即出羊毛一莖如是者凡取
數百莖乃得少安每日與食西瓜一箇數日乃愈
吳橋治胡有濡壯年偶以訟繫士師歸數日而發熱譫
者以為痰火治之旬日而病益危橋診六脉隱見不
常且舉身紫班發矣耳聾口噤目上視掀衣摸床昏
聲絶食者五日語所親曰疫也即以寒水下辰砂六
一散與服稍飲輒少安尋授柴胡石膏犀角湯連
下及二劑而病遂去者大半至七日而全愈

太函集

楊兆成母六十餘病疫頭痛身熱嘔惡不眠時醫見其
面赤又舌胎燥黑棄之勿治延余診投以白虎湯入
生地杞子各一兩二劑嘔即漸止舌胎忽盡退色如
乾猪腰形如乾荔子捺之堅硬觸手此為津液匱竭
不可為矣不得已改與犀角地黄湯加麥冬三錢杞
子一兩一劑服下熱即漸退頭痛漸已舌雖轉赤其
乾如故再與大劑甘露飲去枳殼茵陳加入杞子一
兩三四劑舌方舒潤仍以前方出入加減調治而愈
一輿人婦年近三十初夏患疫醫與燥散消導十餘日
耳無聞目無見矣又經水暴至米粒不入醫禁與生

冷苦索荸薺不得已枯悴如鬼且時時見鬼診之脉如沸令舀井水一甌置其前病者即大悦有笑容急持欲呷其夫前奪之戒勿爾已一飲而盡乃曰目前亮矣猶持甌苦乞令再與一甌飲之如前則曰今日活了也欲再得則戒勿與遂以甘露飲方令服四劑竟獲霍然余所治熱病有以水發汗者有以水止嘔者有以水退熱者有以水止瀉者茲特舉其一耳

王治安年三十餘初夏病疫診之脉虛弦微數踡卧語言無力腰痛面赤黑而黯足冷微嘔身無大熱頭亦不甚痛唯不欲食時忽煩躁自言未病時見疫氣甚熾時時恐懼畏其傳染乃終不免察其脉症大有類乎直中陰經與外間時行迥異意其必先房勞過甚所染疫氣則輕腎虛故善恐也徑與甘露飲加杞子投之次日復診則面色開爽矣改用左歸而愈

大頭瘟天行

李東垣治一人病雷頭風症頭面疙瘩增寒發熱狀如傷寒諸藥不效此病在三陽不可過用寒藥重劑誅伐無過因處清震湯與其治之而瘟愈用荷葉一枚升麻五錢水煎溫服益震為雷而荷葉

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

之形象震體其色又青乃涉類象形之義者也

孫東垣治張孝廉患大頭瘟頭大如斗不見頂唇垂及乳色如紫肝昏憒不知人事見者駭走脉之浮弦而數初以柴胡一兩黃芩元參各三錢薄荷連翹葛根各二錢甘草一錢服三劑寒熱退弦脉減但洪大改以貫仲一兩葛根天花粉各三錢甘草一錢黑豆四十九粒甘草黑豆二味乃治瘟古方也一劑腫消其半再劑全消復與小柴胡湯兩劑始納乾糕兩條次日進粥而愈新

金谿令太夫人以八旬誕辰過勞且多食魚腥蝦蠣陽明風熱之端偶發寒熱少陽三日不退至四日左耳前後及頰車皆紅腫陽明五日右邊亦腫六日腫及滿頭紅大如斗眼合無縫昏憒不知人事譫語若有邪祟粒米不進者八日陽明熱壅孫脉之六部皆洪大而長曰此大頭瘟也即以貫仲石膏各六錢柴胡葛根各三錢赤芍花粉各二錢甘草一錢黑豆四十九粒日進二帖脉始減半九日方進粥飲半盂前藥除石膏又四帖而痊是症乃陽明少陽二經熱壅而然夫陽明多氣多血之經也宜可下以高年故不用硝黃惟投輕清解散之劑使因微汗而解脉症相對故雖重可生

柴嶼青治妹壻張道淵忽增寒壯熱狀如傷寒頭面俱

生疣瘡腫痛異常頻以黃連石膏等苦寒之劑清火而病不衰來問于柴柴乃答曰此名雷頭風症也東垣有言其病在于三陽切不可以過服寒之重劑誅伐無過茲宜清震湯與其投治病家依治二服而安龔子才曰萬壓丙戌春寓大梁屬溫熱大作閭巷傳染甚至滅門其症頭疼身痛增寒壯熱頭面頸項赤腫咽喉腫痛昏憒此乃冬應寒而反熱人受不正之氣至春發為此症至夏發為熱病名曰大頭瘟大熱之症也余製一方名二聖救苦丸用皁牙以開鬪竅而發其表大黃以瀉諸火而通其裡一服即汗一汗即

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

愈真仙方也全活不可勝數凡稟厚者百無一失其虛弱者只與人參敗毒散輕者即愈如未愈用牛蒡荅連湯可以得收全功也（前方固妙合後兩治之法始為十全者也）

姚允吉云今年瘟疫氣多腫頭面頸項治法宜用金銀花二兩濃煎一盞飲之腫可立消而瘥（續金陵瑣事）

薛立齋云甲申年閭有一男子時疫發厥誤以為陰症而治服薑桂藥一鍾即發狂溺水而死（外科心法寓入瘟疫門）

錢國賓治鹽商黃近州發丑夏季忽抱頭痛身熱之症卧床二十餘日吐痰火盛頭漸大如斗諸藥不效昏沉不省人事延診乃霹靂之脉寸關俱盛惟尺脉少

沈數大便不解風熱上壅之症有失升清降濁三陽經脉壅塞其症危殆已至如此非灶底抽薪之法莫能救也欲用三黃湯加大黃四兩下之本家與同道未允欲辭去其子苦留宵用半劑以權宜就彼日服二次至三更下積糞升許其脈少平又以前藥再催下衆糞十餘粒其頭腫漸即消除調復一月如故

羅謙甫云總帥相公年近七旬戊午秋南征過揚州俘虜萬餘口內選美色室女近笄者四置於左右予因曰總帥領十餘萬衆深入敵境非細務也況年高氣弱凡事宜慎且新虜之人其驚憂之氣畜于內加以飲食不節多致疾病近之則邪氣相傳其害為大總帥笑而不答其副帥時亦在座異日名余曰我自十三歲從征回鶻此事亦在座經汝之言深可信矣至臘月中班師值大雪三日新掠人不禁凍餒皆病頭疼咳嗽自利腹滿多致死亡者春正月至汴隨路多以禮物來賀相公因痛飲數次遂病脉得沈細而弦三四動而一止其症頭疼咳嗽腹痛自利與新虜人病無異其脈短澁其氣已衰病已劇矣三日而卒邪氣害人其禍如此內經云乘年之虛遇月之空失時之和因而感邪其氣至骨又曰避邪如避矢石錢仲陽亦

曰糞履不可近襁褓嬰兒多生天弔驚風亦由正氣尚弱不能勝邪故也由是觀之聖人之言信不誣矣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷之四

錢塘魏之琇玉橫撰

中寒

萬密齋治一婦人病至十三日其家人來求藥告以病狀初苦頭痛到今十日昏睡不醒喉中痰響手足俱冷其身僵直萬思之時辛酉二月朔後平地雪尺餘此婦元氣素弱必因遠行而得（三陰脉從腹下走足也）問之果於初三日冒雪往親戚家歸即病也曰此寒邪中足

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

少陰厥陰二經也默默喜睡者足少陰腎病也頭苦痛厥逆僵直痰響者足厥陰肝病也乃以十全大補湯去地黃白芍加細辛半夏乾薑與三劑去五日來謝曰病安矣

吳孚先治一人傷寒頭痛不發熱乾嘔吐沫醫用川芎藁本不應吳曰此厥陰中寒之症乾嘔吐沫厥陰之寒上干於胃也頭痛者厥陰與督脉會於顛寒氣從經絡上攻也用人參大棗益脾以防木邪吳茱萸生薑入厥陰以散寒邪且又止嘔嘔止而頭痛自除設頭痛又屬太陰而非厥陰矣（設頭痛句費解且○直中太陰無頭痛）

病但有少陰症反發熱

一人患厥陰直中四肢厥冷脉細欲絕爪甲青紫但不吐利與四逆湯至三日肢暖甲紅發熱脉轉實數有力此陰極陽生也便與涼劑病家疑一日寒溫各異不肯服至九日熱不退熱利下重飲水不輟再求診用白頭翁秦皮黃連黃柏各二錢一帖減二帖痊（真寒症斷無飲水下痢之變）

按肢冷脉伏恐是陽厥至爪甲青紫則是欲戰汗也四逆湯之誤特隱不彰耳余有凌二官案可參吳孚先治汪掖蒼母忽心腹奇痛異常左右脉弦緊用

二陳去甘草加肉桂乾薑木香病不減次日寒熱交作往來如瘧熱已復寒寒已復熱晝夜無度脉轉疾數前方加人參五錢附子二錢不應復增參至一兩附至五錢脉反漸脫吳謂少陰中寒當與參附今不效畢竟病深藥淺故時有醫者四人一欲用枳實貝母一欲用全蝎防風一欲用八味丸一欲用人參黃耆各八分肉桂四分附子三分吳曰業已泄瀉反用枳實虛極汗多反用全蝎此二人全不知病八味丸係調理之藥尚在末着參耆桂附庶幾合症但杯水車薪曷克有濟夫用藥如用兵衝堅搗厚非猛士多

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

多不可孛信之敗可監也用耆四兩煎湯代水人參四兩附二兩煎膏時病人面色如粧汗出如珠六脉俱脫呼吸全無牙關緊閉幸太谿脉尚在乃以筋抉齒鍬灌半鍾移時又進半鍾猶防脉之暴出也既而重按兩尺隱躍指端乃曰脉漸出大有起色矣復進半鍾自午至晚方眼開語出欲啜粥已而反畏寒喉痛頻索冷水或疑是火曰畏寒者真情索冷者假象少陰脉循喉嚨邪客其絡令人咽痛今寒邪由臟出經病將退耳仍前方加桔梗甘草而痛止自後每日參必一兩附必三錢調理百日而愈愈後遍體發疹

夾生疣瘡奇痒異常爬搔不輟不寐汗多用六君子
另將黃耆二兩煎湯煮藥十日不應汪撿準繩風疹
門與閱俱係風藥並無補方曰神而明之存乎其人
不可泥仍守前方數劑霍然
馬元儀治陸濟臣患症甚篤診之兩脈虛微自汗厥逆
面青唇青飢逆不止曰此少陰真陽素虧寒邪直中
之候也陰寒橫發上干清道旁逆四末甚為危屬無
以自汗不止虛陽將脫法當用桂附理中湯以消陰
攝陽陽既安位則羣陰畢散矣是夜連進二劑脈漸
收五六劑症始霍然

吳洋治結林潘氏子始彊早起有事牖下尋病作頭痛
惡寒諸飲食自鼎沸中致之不盡三之一其一以為
寒矣即他人嘗之莫不糜爛彼口舌自如當暑重裘
猶以為薄衆醫累治不效乃連洋洋曰病由下虛故
寒氣深入固結不散法當不治即幸而可治不出三
年尋以温補劑愈之參附輒倍他藥其後復病而卒
終三年太函集

中風

黃帝問岐伯曰中風半身不遂如何灸答曰凡人未中

風一兩月前或三五月前非時足脛上忽酸重頑痺
此將中風之候急灸三里絕骨四處三壯後用薄荷
葱桃柳葉煎湯淋洗驅逐風氣於瘡中口出灸瘡春
較秋灸秋較春灸常令兩脚有瘡為妙凡人不信此
法飲食不節酒色過度忽中此風言語蹇澁半身不
遂宜七處齊下火各三壯風在左灸右在右灸左百
會耳前髮際肩井風市三里絕骨曲池七穴神效不
能具錄依法灸之無有不愈 醫說續編

徐平中風不省得桃源主簿為灸臍中百壯 即神闕穴多灸良久灸以鹽實之 始蘇更數月乃不起鄭紆云有一親表中風

醫者為灸五百壯而蘇後年餘八十使徐平灸三五百壯安知其不永年耶 全上

許叔微云范子默自壬午五月間口眼喎邪灸聽會等三穴即正右手足麻無力灸百會髮際等七穴愈次年八月間氣塞涎上不能語金虎丹臘粉服至四丸半氣不通涎不下藥從鼻中出魂魄飛揚如墜江湖中頃欲絕灸百會風池等左右頰車共十二穴氣遂通吐涎幾一椀許繼又下十餘行伏枕半月餘遂平爾後又覺意思少異於常心中憒亂即便灸百會風池等穴立效 本事方云十二穴謂聽會頰車地倉

百會肩髃曲池風市足三里絕骨髮際大椎風池也
用之立效 仝上

鄉里有人忽覺心腹中熱甚急投藥鋪說其狀鋪家以
為此中風之候與治風藥而風不作予心中藏之至
夷陵見一太守夏中忽患熱甚不免以水洒地設簟
臥其上令人扇之次日忽中風數日而殂人皆咎其
臥水簟上而用扇也暨到澧陽見一老婦人夏中亦
患熱夜出臥廳上次日中風偶其子預合得小續命
湯服更召醫調理數日愈始知人之中風心腹中多
大熱而後作小續命湯不可不服也 以上並資生經 仝上

岳鄂鄭中丞頃年至潁陽因食一頓熟肉便中暴風外
甥盧氏為潁陽尉有此方當時便服得汗隨差神效
其方用縣細牛蒡根取時須避風以竹刀或荊刀刮
去土用生布拭淨搗絞取汁一大升和灼熱好蜜四
大合溫分為兩服每服相去五六里初服得汗汗出
便差 本草 仝上

新武義唐丞季潤名灌云切記風中人不可便服風藥
氣中人不可便服氣藥或覺有此症候急用真好麝
香肉三錢乳缽內研令極細以真清麻油不拘多少
調令稀薄可飲為度即令患人一服頓盡須辨菜子

油不可用藥少即見效遲如牙關緊攙開灌入候少
甦省然後服紫湯其方用川獨活刷洗去沙土薄片
切以豆淋酒煎濃汁服之累服至一二劑無害服此
二藥永無手足偏廢語言蹇澁之患後見得是中風
只服小續命湯之類見得是中氣只須服匀氣散自
然無事也渠作漢東教官得之太守張少衛云屢試
有驗季潤亦以治數人矣云麻油麝香煎五積散
是齊方全上

羅謙甫曰按察書吏李仲寬年逾五旬至元巳巳春患
風症半身不遂四肢麻痺言語蹇澁精神昏憒一友
處一法用大黃半觔黑豆三升水一斗同煮豆熟去
大黃新汲水淘淨黑豆每日服二三合則風熱自去
服之過半又一友云通聖散四物湯黃連解毒湯相
合服之其效尤速服月餘精神愈困又增瘡瘂不能
言氣冷手足寒命余診視細詢前由盡得其說診之
六脉如蛛絲細謂之曰夫病有表裡虛實寒熱不等
藥有君臣佐使大小奇偶之制君所服藥無考憑故
病愈甚今為不救君自取耳未幾而死有曹通甫外
郎妻蕭氏六旬有餘孤寒無依春月忽患風疾半身
不遂語言蹇澁精神昏憒口眼喎邪與李仲寬症同

余刺十二經井穴接其經絡不通又炙肩井曲池詳
病時月處藥服之減半余曰不須服藥病將自愈明
年春張子敬郎中家見其行步如故余歎曰夫人病
得全者不亂服藥之力由此論之李仲寬亂服藥終
身不救蕭氏貧困恬澹自如獲安內經曰用藥無據
反為氣賊聖人戒之一日姚雲齋舉許先生魯齋之
言曰富貴人有二事反不如貧賤人有過惡不能匿
救有病不能醫療噫其李氏之謂歟

陳自明治一婦人中風牙關緊急痰涎溢出與神仙太
乙丹一粒服之而愈方見蠱門

宋時東京開河掘得石碑梵書大篆一詩無能曉者真
人林靈素逐字辨繹乃是治中風方名去風丹也詩
云天生靈草無根幹不在山間不在斥始曰飛絮逐
東風汎梗青青飄水面神仙一味去沉痾采時須在
七月半選甚癱風與大風些小微風都不筭豆淋酒
化服三丸銕鏁頭上也出汗其法以紫色浮萍晒乾
為細末煉蜜和丸彈子大每服一粒以豆淋酒化下
張子和治左癱右瘓三十六種風偏正頭風口眼喎邪
大風癩風一切無名風及脚氣并打撲傷折及胎孕
有傷服過百粒即為全人此方後人易名紫萍一粒

丹此與茅蒼丸相類亦惟實症可用廬者未必宜也本草綱目

許叔微云范子默記崇寧中仆兩中風始則口眼喎邪次則涎潮閉塞左右共灸十二穴得氣通十二穴者謂聽會頰車地倉百會肩髃曲池風市足三里絶骨髮際大椎風池也依而用之無不效醫學綱目

高評事中風稍緩張令涌之後服錢彈丸在普濟加減方中或問張曰君常笑人中風服錢彈丸今以用之何也張曰此收後之藥也今人用之於大勢方來之時正猶蚍蜉撼大樹不識次第故也

頼長吏病口眼喎邪張療之目之斜灸以承泣口之喎灸以地倉俱效苟不效者當灸人迎夫氣虛風入而為偏上不得出下不得泄真氣為風邪所隔故宜灸之正謂此也所以立愈又東杞一夫亦患此脉其兩手急數如弦之張甚力而實其人齒壯氣充與長吏不同蓋風火交勝乃調承氣湯六兩以水四升煎作三升分四服令稍熱啜之前後約瀉四五十行去一兩盆次以苦劑投之解毒數服以升降水火不旬日而愈

王克明治廬守王安道中風噤不語他醫望而去克明曰此非湯劑可及燒地洒藥舁安道其上須臾而甦

江西通志○或即許亂宗治王太后之法

李東垣治董監軍寒月忽覺有風氣暴作診得六脉俱弦甚按之洪實有力其症手攣急大便閉澁面赤熱此風寒始至加于身也四肢者脾也風寒之邪傷之則筋攣本人素嗜酒内有實熱乘于腸胃之間故大便閉澁而面赤熱内則手足陽明受邪外則足太陰脾經受風寒之邪用桂枝甘草以却寒邪而緩其急搐黄柏之苦寒以瀉實而潤燥急救腎水用升麻葛根以升陽氣行于足陽明經不令遏絶更以桂枝辛熱入手陽明經為引用潤燥復以白芍甘草專補脾氣使不受風寒之邪而退木邪專益肺金也加人參以補元氣為之輔佐加歸身去裡急而和血潤燥名活血通經湯惟桂柏二錢白芍五分餘皆一錢水煎熱服令煖房中近火摩搓其手乃愈

宋瑞州楊某醫道盛行招者相繼郡守得危疾夜急招之楊適醉歸不能升車裹藥授价旦起盥面不見澡豆而所裹藥在焉方知其誤而郡守謝禮至矣蓋郡守得卒風證澡豆中有皂角去風也 墅談

荆和王妃劉氏年七十病中風不省人事牙關緊閉群醫束手李時珍尊人太醫吏目月池翁診視藥不能

入自午至子不獲已打去一齒濃煎藜蘆湯灌之少頃噫氣一聲遂吐痰而甦調理而愈本草綱目

龔子才治桑環川劉前溪年俱近五旬而桑多慾劉嗜酒其脈左手俱微人迎盛右脈滑大時常手足酸麻肌肉蠕動此氣血虛而風痰甚也謂三年內俱有癱瘓之患曰勸其服藥謹慎以防未然桑然其言每年製搜風順氣丸此藥亦未可常服延齡固本丹各一料後果無恙劉不信縱飲無忌未及三年果中風卒倒癱瘓語濇因求治與養榮湯加減并健步虎潛丸兼服年餘始愈

萬密齋治蕭敬吾庚戌冬得風疾醫治之未盡辛亥春右肩膊抽掣唇吻隨動診之脈浮緩而濇此風邪在太陰經也右寸浮而濇肩膊動者肺病也手太陰右關脈緩唇動者脾病也足太陰以黃耆蜜炙白芍酒炒甘草炙作大劑服之問何以不用治痰之藥曰此緩則治本也益風傷衛肺者衛氣之主也黃耆之甘溫以補肺白芍味酸曲直作酸酸者甲也甘草味甘稼穡作甘甘者已也所以補脾經曰諸風振掉皆屬于肝肝苦急急食甘以緩之用甘草肝欲收酸以收之用白芍乃守法調理至初夏而安

孫文垣治吳勉齋體豐腴嗜炮炙任性縱欲年六十七極躁急一日跌傷齒恬不為意後連跌兩次將中而頓眩暈也次日晚左手足忽不能動口眼喎邪診之左洪大右緩大其色蒼黑神昏鼾呼呼長而吸短呼至口氣勃勃出不能回終日偃卧如醉人問曰此非半身不遂者中風已過之疾其勢仍緩亦有十餘年無恙者今纔病勢便若此乃中風且不可測與六君子加全蝎天麻兩日無進退問作吐前藥再加竹茹兩日神始甦欲言舌不能掉前藥加石菖蒲遠志紅花始能進粥數口夜與正

舌散同前藥飲之又三日能坐粥亦頗加言尚蹇澁以筆書我左手痛甚大小便艱少又用四君子加陳皮竹茹當歸白芍紅花鉤藤天麻服三日神思大好飲食日加服彌月手痛減語言亦漸清唯大便十日一行此血少故補養又自當瘥病人常自言吾疾乃痰在隔間安得一吐為快養陰俾龍雷之火下歸元海醫之過也孫曰攄脉乃大虛非痰為害不可輕吐有醫謂是病痰吐而後補可全瘳不然必成痼疾病人欲速效決意吐之家人不能阻一吐而煩躁猶曰吐不快耳須大吐始可再吐而神昏氣促汗

出如雨竟斃矣

程曉山客湖州四十誕辰徵妓行酒宴樂彌月一日忽覺兩小指及無名指掉硬不舒且不為用口角一邊常牽引診之六脉皆滑大而數浮而不斂其體肥面色蒼紫據脉滑大為痰數為熱浮為風蓋濕生痰痰生熱熱生風也以善飲故多濕近女故真陰竭中風之症已兆喜面色蒼紫神藏猶可治宜戒酒色以自保愛以二陳湯加滑石為君苓連為臣健脾消痰撤熱從小便出加胆星天麻以定風竹瀝薑汁拌晒仍以竹瀝薑汁打糊為丸引諸藥入經絡化痰又以天麻丸滋補筋骨標本兩治服二料遂十年無恙迨五十妓飲如舊酒色荒淫忘其昔之致疾也于是手指口角掉硬牽引尤甚未幾中風右體癱瘓矣歸而召診脉皆洪大不斂汗多不收呼吸氣短蓋腎虛不能納氣歸原故汗出如油喘而不休雖和扁無能為矣閱二十日而卒

李士材治一商人忽然昏仆遺尿手撒汗出如珠咸謂絶症既見決無生理李曰手撒脾絶遺尿腎絶法在不治惟大進參附或冀萬一遂以人參參兩熟附五錢煎濃灌下至晚而汗減復煎人參二兩耆朮附各

五錢是夜服盡身體稍稍能動再以參附膏加生薑竹瀝薑許連進三日神氣漸爽後以理中補中等湯調養二百日而安

唐太守多鬱多思又為府事勞神昏冒痰壅口喎語澹四肢不隨時欲悲泣脉大而軟此脾肺氣虛風在經絡以補中益氣去黃耆加秦艽防風天麻半夏十劑症減二三更加竹瀝薑汁倍用人參煎與八味兩月乃愈

一人自遠方歸忽然中風昏冒牙關緊閉先以牙皁末取嚏次以筋抉開灌蘇合二丸然後以防風散投之連進三服出汗如洗此邪自外解矣去麻黃獨活羚羊角加秦艽半夏胆星鈎藤薑汁十劑痰清神爽服六君子加竹瀝薑汁鈎藤兩月而瘥

姚太史中風昏憒語言不出面赤時笑非腎絕而笑是心臟中風也時初秋診之六部皆得石脉李曰石者冬令之脉也新秋見之非其時矣其象先見于非時當其時豈能再見耶果至冬月而歿

一人年近六旬昏倦不能言鼻塞二便閉此心肺二臟中風也服順氣疎風化痰之劑已瀕于危矣診之六脉洪大按之搏指乃至虛反有盛候也宜補中為主

佐以祛風化痰方可回生病家惶懼兩日不決乃力任之遂以大劑補中益氣加秦艽鉤藤防風竹瀝再劑而神爽加減調治五十日始愈李共五案

黃履素曰余從弟履中年方強仕以勞心憂鬱忽然昏憒痰升遺溺眼斜視逾時不醒竟類中風灌以童便而甦此等症候皆火挾痰而作又非三生飲可治者并薑湯亦不相宜也此當與江選薛立齋治王進士案同參

趙以德治陳學士故初因醮事跪拜間就仆倒汗注如雨診之脈大而空虛年當五十新娶少婦今又拜跪致勞故陽氣暴散急煎獨參湯連飲半日而汗止神氣稍定手足俱痿瘡而無聲遂于獨參湯中加竹瀝開上涌之痰次早悲哭一日不止因以言慰之遂笑復笑五七日無已時此哭笑為陰陰下疑有脫字動其精神魂魄之臟相併故耳正內經所謂五精相併者心火併于肺則喜肺火併于肝則悲是也稍加連柏之屬瀉其火八日笑止手動一月能步矣出醫通

陸養愚治吳少參年五十新得美寵榮歸祭祖跪拜間就倒仆汗注如雨渾身壯熱人事不省或欲灌以牛黃脉之鬲尺浮數而空兩寸透入魚際此陰虛甚而陽亢極也若灌牛黃即死矣急用生地自然汁一升

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

人參一兩麥冬五錢五味子百粒濃煎灌之二三服
神氣稍定汗止似睡非睡至五更時作恐懼狀如人
將捕之至清晨又作盛怒狀罵詈不止至午間又大
笑一二時至薄暮又悲泣自此夜靜日作病家以為
鬼祟此即內經所謂五精相併也并于腎則恐并于
肝則怒并于心則喜并于肺則悲劉河間云平時將
息失宜腎水不足心火亢極乃顯此症夜間陰盛邪
乃暫息日中陽隆遂遊行五臟而無寧時也仍用前
方減人參之半旬日間或但悲笑或但罵詈恐懼人
事時省時不省飲食與之盡食方止不與不思索大
小便亦通至半月後始寧靜乃調養氣血百劑始愈

此與趙以德治陳學士一案大同小異

長興林中尊年逾五旬初覺身體倦怠頭目眩運既而
頭振動搖欲語不能喉中喘逆咸與牛黃蘇合丸大
小續命湯已旬日病如故脉之沈緩而弱左關尺尤
甚此肝腎虛精氣暴奪之候也詢其由乃因按院嚴
厲惟恐失錯煩勞之極歸而病作內經云諸風掉眩
皆屬于肝劉河間曰此非外來風邪由將息失宜腎
水不足心火亢甚所致又經云諸逆衝上皆屬于火
今振動喘逆職是故也夫恐傷腎今以矜持太過而

氣下故聲不出且肝腎之脉俱挾舌本故宜壯二經之氣以治其標滋二經之血以治其本用枸杞為君以補腎天麻川芎為臣以益肝又用人參少加附子以為佐二冬以為使二劑約數兩服後諸症頓減用八味丸間服十劑全愈（又經云句移肝字下去經字乃妥）

鄒春元心泉年未五旬患中風耳聾鼻塞二便不通四肢不隨而厥言語不出或言皆說亡故之人已灌牛黃錢許矣或曰經云脫陽者見鬼脫陰者目盲今口說亡人目無所見是見鬼與目盲也又潔古云中腑者著四肢中臟者滯九竅今手足不隨上下秘塞是臟腑兼中也且六脉弦數無倫脉訣云中風之脉遲浮吉急實大數三魂孤脉症俱危恐無生理立方人參五錢熟地一兩桂附各二錢半未服陸至脉之浮按果極急數中按稍覺和緩此猶有胃氣第兩尺重按覺空耳乃曰陰陽兼補誠治本之法第當上下秘塞之時恐不能奏效宜先通二便使濁陰降則清陽之氣得以上升然後議補經謂病發而不足本而標之先治其標後治其本咸謂病勢已危急恐不可迂緩遂將前藥灌之連進數劑俱停胸中探之作聲而不下腹再促診脉仍前即袖中出家製神佑丸數十

粒抉其口納之令灌以淡薑湯藥已下即為灸百會穴使陽氣上升又灸關元穴不使陽氣下陷一二壯目即能開眉頻蹙問痛否能點頭四肢亦少動謂之曰忍至七壯可生矣亦點頭灸將畢腹鳴欲便既而前後俱通去垢穢極多少頃又瀉一行令急以前藥倍人參煎候及再便有暈意徐灌之自甦此後人事漸省第手足振掉左半身不遂於大補氣血藥中少佐却風順氣消痰之品調治半餘而愈蓋此症初起氣血不足為本九竅閉塞為標先通其秘者急則治其標也迨後見風症亦不足為本風症為標而專補氣血少佐風藥者緩則治其本也

范溪菴患口喎不正四肢拘急自汗惡風九針灸塗貼諸風藥遍嘗不效已半年年脉之左手浮緊右手洪緩此風客陽明留而不去雖宜解散然邪在一經襟進諸經之藥誅伐無過徒虛其表而不能去邪故反見惡風自汗而無救于口之喎也經曰胃足陽明之脉挾口環唇所生病者口喎唇邪是乃陽明一經之症麻桂羌活豈所宜哉以葛根五錢升麻二錢以逐陽明固結之邪白芷二錢僵蠶一錢五分以達頭面不正之氣黃耆一錢五分桂枝五分以固周身疎泄之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

表桔梗一錢甘草五分載諸藥上行二劑便效數劑全愈後以養榮血實腠理少佐清熱去痰之品調理之（此宜與許叔微一案合參）

李思塘母年六十體肥盛正月間忽中風卒倒不省人事口噤喉鳴手足不隨服牛黃丸小續命不效脉之浮洪而滑右手為甚緣奉養極厚形氣盛而脉有餘經云凡消癉擊仆偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏粱之疾也又云土太過令人四肢不舉丹溪所謂濕生痰痰生熱熱生風也當先用子和法涌瀉之乃以稀涎散藿汁調灌之去痰涎數椀少頃又以三化湯灌之至晚瀉兩三行喉聲頓息口亦能言但人事不省知上下之障塞已通中宮之積滯未去也用二陳湯加枳實黃連萊菔子木香白豆仁每日二服數日人事漸爽腹中知飢令進稀粥大便閉結每日以潤字丸五分白湯點薑汁送下猶時有拘攣燥結之患知為血耗津衰用四物加秦艽黃芩甘草數十帖三月而愈

陸祖愚治趙一陽年過五旬中風卒倒牙關緊閉戴眼上竄手握而四肢振掉或以稀涎散吹入鼻中吐稠痰數椀投小續命湯二劑反閉開手撒眼合遺溺四

肢厥逆人事昏沈喉鳴發熱脉之洪滑而歇至症已危甚勉加方用二陳加南星枳實以導其痰四物以養其血佐以牙皁薑汁竹瀝二劑痰喘漸輕六劑人事清爽改用參朮歸芍大補氣血而安

李翠岩年近六旬肥盛多勞一日行至門外視一人如兩人一路如兩路一門如兩門不知從何處入遂卒然仆倒扶歸嫺於言語尚能道其病狀咸以中風治之投消痰搜風十餘劑遂冷汗如雨驚惕振掉昏不知人脉左寸浮大按之無神餘俱遲弱而空已神識昏沈不能言矣此屬虛脫宜培補正氣為主用四君加者歸地芍天麻杜仲牛膝棗仁二劑汗止五劑能言語識人七八劑頓愈每劑加人參三錢二十餘劑飲食步履如常

馬元儀治周某神昏不語狀如中風已半月脉之右虛微無力乃陽虛之候也胸中時滿或氣力如呆上焦之陽不用矣足膝無力轉側不能下焦之陽不用矣諸陽既微陰乃用事不行溫補陰日以長陽日以消一如氣化有肅殺而無陽和物其能久乎遂與附桂理中湯大培陽氣半月而神始清便乃行一月而食漸進足可履蓐進八味丸調理而安

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

馮楚瞻治張銓部先年以焦勞遂得怔忡耳鳴諸症醫以痰治涌出痰涎斗許復用滾痰丸痰勢雖清精神內奪初秋卒倒僵仆痰涌鼾睡目窵口開手足强直自汗如雨危甚脉之六部皆豁大無倫其候欲脫刻不容緩矣乃用人參三兩白朮二兩附子五錢濃煎灌之日三劑按時而進服後脉勢漸斂身熱漸和潰汗漸收次日仍用前方日二服夜一服至三日諸症漸減但僵仆不省如故此工夫未到故標症稍平而元神未復也仍照前服服後必灌濃米汁半鍾以保胃氣助藥力或有勸入風藥者曰保之不暇敢散之乎有勸加痰藥者曰補之難實敢消之乎有勸入清火者曰此尤誤矣元陽欲脫挽之尤恐不及敢敗之乎今重用人參附子者既壯人參培元之功而消痰去風息火之義已在其中若稍涉標治則虛症蜂起勢益難矣違衆勿用三日所用人參計三十五兩附子六兩白朮二十四兩至晚間忽能言語稍省人事進粥半椀而睡其鼾目窵諸症仍在早間陽分用大補心脾氣血之藥如棗仁當歸白朮白芍茯神遠志人參桂圓五味之類下午陰分用八味湯沖人參濃汁服之六七日後諸症漸平每日人參尚用四五

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

兩後早間以生脉飲送八味丸之加牛膝杜仲鹿茸
五味子者四五錢日中加減歸脾與八味湯飲食倍
進一月而起大凡治危篤症候全在根本調理得力
自然邪無容地先哲云識得標只取本治千人無一
譚掌科年六十餘卒然暈仆痰涎涌盛不省人事頃之
損也 與李士材治商人案大同小異
吐痰椀許少甦長班用力擁之與中挾其兩腿而歸
醫與疎風清熱豁痰旬餘痰涎不減煩躁倍常頭痛
腿疼更甚脉之兩寸甚洪大兩尺右關甚沈微此孤
陽獨亢于上弱陰不能斂納且中宮脾土亦虛陽無

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

退藏之舍上浮顛頂為脹為疼宜壯水以制之培土
以藏之補火以導之佐以滋肺清金以成秋降之令
則收斂歸藏矣熟地八錢為君乳炒白朮五錢為臣
米炒麥冬三錢為佐製附子一錢五分為使煎成另
用人參五錢熬汁冲服頭疼頓減諸症漸痊但腿痛
如故蓋長班用力挾之而傷也視之五指之痕在焉
此外因當外治用猪肘生精肉搗爛入肉桂細末葱
白食鹽和勻厚罨患處而安後因素患晨瀉飲食不
甘令早晨空心參湯送八味丸午間食前以炒黄白
朮三十兩製附子三兩共熬成膏人參細末六兩收

成細丸白湯吞三錢半月後脾胃頓强精神倍長

景氏婦年五旬中風已五六日汗出不止目直口噤遺尿無度咸以為壞症脉之雖甚微而重按尚不疾不徐自然之熱此即胃氣也乃曰遺尿本屬當下脫症故不治若多日安得不尿且坐視數日而不脫斷非絶症者也投以參附湯二三劑漸甦重服温補而愈

金教諭夏月壯熱頭痛咳嗽醫謂感冒用羌前橘蘇半枳之類未終劑頭疼如破舌强不清潰汗黏手左臂麻木神氣不堪脉洪大而空緩而無力知為氣虛類中誤投發散當此疎泄之時幾成脫症與熟地一兩二錢麥冬三錢炒白朮四錢牛膝二錢四分五味子八分製附子一錢五分入參八錢另煎冲服日二劑不五日全安時有李庠生同日得病症候無異一劑發散汗出徹夜次日死矣

張路玉治春榜趙明遠平時六脉微弱患中風經歲不痊診之左手三部弦大而堅知為腎臟陰傷壯火食氣之候且人迎斜内向寸又為三陽經滿溢入陽維之脉是不能無顛仆不仁之虞右手三部浮緩而氣口以上微滑乃痰涌于隔之象以清陽之位而為痰氣占據未免浸漬心主是以神識不清語言錯誤也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

或者以其無口角微涎目睛恒不易轉為邪在經絡用祛風導痰之藥不知此本腎氣不能上通于心虛熱生風之症良非風燥藥所宜或者以其小便清利倍常為腎虛而用八味壯火之劑不知此症雖虛而虛陽伏于肝臟所以陽事易舉飲食易饑又非益火消陰藥所宜或者以其向患休息久痢大便後常有淡紅清沫而用補中益氣不知脾氣陷于下焦者可用升舉之法此陰虛又痢之餘疾有何清氣在下可升發乎若用升柴升動肝腎虛陽鼓擊隔上痰飲能保其不為喘脹逆滿之患乎今與河間地黃飲子助其腎通其心一舉而兩得之但不能薄滋味遠房室則藥雖中病終無益于治療也惟智者以善調攝為第一義

侍衛金漢光妾中風四肢不能舉動喘鳴肩息聲如曳鋸不能著枕寢食俱廢半月餘脉之右手寸關數大按又無力尺內尤虛左手關尺弦數按之漸小惟寸口數盛或時昏眩煩亂所服皆二陳導痰襍以秦艽天麻之類不應又與牛黃丸痰涎愈逆殆甚因以六君子或加膽星竹瀝或加黃連當歸甫四劑喘頓除再二劑飲食漸進堪就枕又四劑手足運動十餘劑

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

後可徐行矣

漢川令顧莪在夫人高年氣虛痰盛近以抑鬱忽然下體墮牀便舌强不語肢體不遂以是日曾食濕麵群議消導不應轉增困憊人事不省頭項腫脹診之六脈皆虛濡無力醫謂大便六七日不通擬攻下張曰脈無實結何可妄攻且病人素有脾約大便常五七日一行乃令先試糜飲以流動腸胃之樞機日進六君子湯每服用人參二錢分二次服四劑後大便自通再四劑自能起坐數日間可扶掖徐行因戒其左右慎防步履以病人氣虛痰盛故也

呂東莊治沈凝芝內人時當就卧忽作寒熱至夜半即不能言喘急或以為感傷或以為寒熱氣逆痰結用烏藥順氣散不效診之聲如曳鋸手撒遺尿口開不能言自汗如雨曰此類中風也已傷臟不可治矣凝芝曰即無救理應用何藥曰初發即當用易簡附子散今無及矣乃自進之喘聲忽止且稍發語凝曰尚可救曰五臟俱絕今得參附氣少甦耳終無濟也果三日而歿

韓貽豐治司空徐元正風氣滿面浮虛口角流涎不已語含糊不能出喉兩腿沈重足趿趿不克踰戶限脉

之曰此症非針不可遂呼燃燭舉手向頂門欲用針
徐公及其令孫皆大惶駭云此處安可用火攻強之
再三終不允而罷後聞韓之針頗神復邀與針百會
神庭腎俞命門環跳風市三里涌泉諸穴道俱二十
一針方針之初下也以為不知當作如何痛楚及藥
熏氣行氤氳不可名狀連聲贊歎以為美妙積久周
身之病一時頓去 神針心法

柴嶼青治考功吳景星太翁卒中昏憒滿面油光兩顴
弦緊投以附子理中湯次日心中明白面上浮光即
飲調理數月而康

薊州牧楊芊丙寅春五旬餘卒中肢廢口不能言大小
便難中府而燕中臟也初進通幽湯不應加大黃麻
仁二劑始通舌稍轉動又用加減大秦艽湯數劑始
能言但舌根尚硬後用地黃飲子及參耆朮等煎服
舌柔胃強左手足尚不能舉動此由心境不堪煎之
參餌調治也今庚午秋聞其在楚竟已全愈

大司寇阿年七旬偶患胃痛延治至則其勢已減診其
六脉平和兩尺神完氣足如此稟厚者不可多見乃
以曾經口眼喎邪至今面部微有不正為患曰陽臟
之脉前因心火暴盛無制遂流經絡而然今惟有壯

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

水之主以鎮陽光常服丸劑可保期頤

薛立齋治靳閣老夫人先胸脇脹痛後四肢不收自汗如雨小便自遺大便不實口緊目瞤飲食頗進十餘日或以為中臟甚憂曰非也若風既中臟真氣將脫惡症已見禍在反掌安能延至十日乃候其色面目俱赤而或青診其脉左三部洪數惟肝尤甚乃知胸乳脹痛肝經血虛肝氣否塞也四肢不收肝經血虛不能養筋也自汗不止肝經血熱津液妄泄也小便自遺肝經熱甚陰挺失職也大便不實肝木熾盛剋脾土也遂用犀角散四劑諸症頓愈又用加味逍遙散調理而安後因鬱怒前症復作兼發熱嘔吐飲食少思月經不止此木盛剋土而脾不能攝血也用加味歸脾為主佐以逍遙散而愈後每遇怒或睡中手足搐搦復用前藥愈

大參朱雲溪母於九月內忽仆地痰眯不省人事唇口喎邪左目緊小或用痰血之劑其勢稍緩至次年四月初其病復作仍進前藥勢亦漸緩至六月終病乃大作小便自遺或謂風中于臟以為不治診之左關弦洪而數此屬肝火血燥也遂用六味丸加五味麥冬芎歸一劑而飲食頓進小便頓調隨用補中益氣

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

加茯苓山梔鈎藤丹皮而安至十月復以傷食腹痛作瀉左目仍小兩關尺脉弦洪鼓指以六君加木香吳茱升麻柴胡一劑而痛瀉俱緩復以六君加肉果故紙一劑諸脉頓平痛瀉俱止夫左關弦洪由肝火血燥故左目緊小右關弦洪由肝邪乘脾故唇喎邪腹痛作瀉二尺鼓指由元氣下陷設以目緊口喎誤作風中投以風藥以腹痛泄瀉誤作積滯投以峻劑復耗元氣為害甚矣以陽虛惡寒圍火過熱致痰喘誤服寒劑而平

一婦人因怒仆地語言謇澀口眼喎邪四肢拘急汗出遺溺六脉洪大肝脉尤甚皆由肝火熾盛蓋肝主小便因熱甚而自遺也（經云肝虛者善溺）用加味逍遙散加鈎藤及六味丸尋愈（亦可入氣脉）

一婦人經行口眼歪斜痰涎壅盛此血虛而肝火動用加味逍遙散加丹皮治之尋愈後因飲食停滞日吐痰涎此脾氣虛不能攝涎歸經也用六君子二十餘劑而安

一婦人因怒口眼喎斜痰涎上涌口噤發搐此脾肺氣虛而肝木旺用六君子加木香鈎藤柴胡治之漸愈又用加味歸脾湯調理而安

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一婦人元氣素虛勞則體麻發熱痰氣上攻或用烏藥順氣散祛風化痰丸之類肢體瘂軟痰涎自出面色痿黃形氣倦怠而脾肺二脉虛甚此氣虛而類風朝用補中益氣湯夕用十全大補湯漸愈又用加味歸脾湯調理尋愈

一婦人口眼歪斜四肢拘急痰涎不利而惡風寒其脉浮緊此風寒客于手足陽明二經先用省風湯二劑後用秦艽升麻湯而愈

王海藏云某黃門卒中風病發時服紫菀丸泄出惡濃四升赤黃水一升一肉虫如亂髮愈 方見瘋風門

姚增垣治大將軍樂平公竇集暴感風疾精神瞀亂無所覺知諸醫先視者皆云已不可救增垣後至曰困則困矣終當不死若專以見付相為治之其家忻然請受方術增垣為合湯散所患即瘳大將軍永世公叱伏列椿苦利積時而不廢朝謁燕公謹嘗問增垣曰樂平永世俱有痼疾若永世差輕對曰夫患有淺深時有剋殺樂平雖困終當保全永世雖輕必不免死謹曰君言必死當在何時對曰不出四月果如其言謹歎異之 周書

高祖親戎東討至河陰遇疾口不能言瞼垂覆目不復

瞻視一足短縮又不得行增垣以為諸臟俱病不可
竝治軍中之要莫先于語乃處方進藥遂得言次又
治目目疾便愈末乃治足足疾亦瘳比至華州帝已
痊復 全上

李季虬曰予乙卯春正月三日忽患口角歪邪右目及
右耳根俱痛右頰浮腫仲淳曰此內熱生風及痰也
治痰先清火清火先養陰最忌燥劑蘇子橘紅天冬
花粉鮮沙參甘菊花各三錢貝母白芍各四錢麥冬
五錢甘草七分天麻一錢連翹二錢加竹瀝童便各
一杯霞天膏四五錢日服兩劑初四至初九日加生
地初十加牛膝四錢黃柏二錢十三日去連翹加石
斛三錢五分五味七分扁豆二錢乾葛八分十八日
去天麻乾葛扁豆加蓮肉四十粒廿二日定方天冬
甘菊沙參各三錢麥冬生地牛膝各五錢炙草一錢
貝母蘇子橘紅花粉各二錢棗仁六錢五味八分蓮
肉四十粒二月十二日定方天冬茯苓貝母沙參各
三錢麥冬棗仁牛膝各五錢蘇子橘紅甘菊各二錢
五分黃柏甘草各一錢五分花粉元參各二錢五味
七分生地白芍各四錢蓮肉六十粒十日後去花粉
後又去元參加石斛至五月盡病始全愈前方中曾
加參二錢

服二劑反覺浮火上升即去之　廣筆記

沈明生治潘子芬軀幹魁梧素無恙然室多姬貳且縱飲皆致疾之媒也乙巳夏忽患類中風項强胸滿不食于行纔舉足即覺首重而欲仆地或知其嗜酒及內病由上盛下虛即用參附峻補治久轉劇診之六部沈滑有力殊非腎家不足之象然病人傍人舍補而別商則紛然辨難棄不用矣因語之曰病本不足更無可疑但補虛而不去病甚于攻剋也今當分塗治之湯劑以補虛吾立方而君自製服丸劑以去病則有家秘神方未可明告奉饋服之兩旬必奏殊功

潘以愈期甚邇欣然見從煎方以六君理中加減而不用附子別製大劑消痰丸服十日而項强若失然更衣陸續去痰積稠黏甚多潘惟恐其虛復生猶豫乃謂之曰大便雖行神氣日旺況有參朮以培養脾元何慮之有去疾莫如盡此之謂也勉其盡劑果越兩月而步履康復矣

續名醫類案卷之四

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷之五

錢塘魏之琇玉橫撰

厭

孫兆杜壬同診仁宗最寵貴妃一日飲次忽仆倒遍身卒冷急奏上上乃急召孫杜既至奏曰不妨此乃氣厭爾少頃吐即復甦也御坐良久果吐而甦上問因何而得二人竝奏曰此貴妃方食因憂怨氣上遂與食相併故如此者吐即氣透故復甦也上問妃有何事如

此妃對曰陛下無嗣臣妾不能為陛下生皇嗣所以自怨氣忽上逆至驚動聖駕上曰朕亦自責乃勞汝致病耶因嘉獎孫杜之能良久曰醫道如此豈非良醫也耶醫學綱目

于敖青衣為崔侍御所得忽暴死梁革曰此非死乃尸厥也刺心及臍下數處衣以單衣臥床上縛其手足置微火于床下稍甦以葱粥灌之而青衣遂活九病尸厥

呼之不應脉伏者死脉大反小者死。談薈

實材治一人因大惱悲傷得病晝則安靜夜則煩悗不進飲食左手無脉右手沈細世醫以鬼症論之實曰

此腎厥病也因寒氣客肝腎二經灸中脘五十壯關元五百壯每日服金液丹四神丹至七日左手脉生少頃大便下青白膿數升許全安此由真氣大衰非藥能治惟艾火灸之原注此症非灸法不愈非丹藥不効二者人多不能行醫人僅用泥常藥以治其何能生

一婦人產後發昏二日帶濇面上發麻牙關緊急二手拘攣實曰此胃氣閉也亦由肝邪上逆胃之大絡而成厥胃脉挾口環唇出於齒縫故見此症令灸中脘五十壯即日而愈原注若產後血厥倉公白薇湯

一婦人時時死去已二日矣凡醫作風治之不効實與

炙中脘穴五十壯即愈（此即尸厥）

張子和治一夫痰厥不知人事牙關緊急諸藥不能下候死而已張見之問侍病者曰口中曾有涎否曰有遂（先）以防風藜蘆煎湯調瓜蒂末灌之口中不能下乃取長蛤甲磨去殳以紙裹其尖灌于右鼻竅中嘅然下咽有聲後灌其左竅亦然曰可治矣良久涎不出遂以砒石一錢又投之鼻中忽偃然仰面似覺有痛斯須吐噦吐膠涎數升頗腥砒石尋常勿用以其病大非如此莫能動然無瓜蒂亦不可便用宜消息之大凡中風痰塞往往止斷為風專治（求）風藥靈寶至寶誤人多矣故劉河間治風捨風不論先論二火也

常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛張曰四肢者諸陽之本也當夏時散越而不痛及乎秋冬收斂則痛以三花神祐丸大下之熱遂去（此熱氣厥也）

張叟年六十餘病熱厥頭痛以其用涌藥時已一月間矣加之以火其人先利年高身困出門見日而仆不知人家人驚惶欲搽撲之張曰大不可擾續與西瓜涼水蜜雪少頃而甦蓋病人年高涌泄目脉易亂身體內有炎火外有太陽是以跌仆若是擾之便不救矣惟安神定思以涼水投之待之以靜便屬水自

然無事臨症者當諳練也

常仲明之子自四歲得風痰疾至十五歲轉甚每月發一兩次發必頭痛痛則擊顙百拳出黃綠涎一兩盞方已比年發益頻目見黑花發則昏不知人（厥也）三四日方省諸醫皆用南星半夏化痰之藥終無一効偶遇張於澧水之南鄉以雙解散發汗次以苦劑吐痰病去八九續以分劑平調自春至秋方獲全愈（此即中與令嗣皆宜涌之病也）（痰壅）

莊一生治金壇庠友張逢甫內人方食時觸暴怒忽仆地氣遂絕一醫用皁角灰吹鼻中不嚏用湯藥灌之不受延至午夜謂必不治告去急叩莊過視之六脈尚全而獨氣口沈伏細尋之滑甚曰此肝木之氣逆衝入胃胃中素有痰致痰夾食閉胃口氣不得行而暴絕也（實紫中亦有胃氣閉之說）但歷時久湯藥不可入矣急宜吐之可活所謂木鬱則達之也亟令覆其身垂首向床下以鵝翎蘸桐油啟齒探入（喉）中展捎引吐出痰與食纔一口氣便稍通再探吐至兩三口便覺油臭以手推翎但不能言莊曰無妨矣知其體怯不宜多吐急煎枳橘推蕩之藥灌之盡劑而甦後以平肝和胃藥調理數劑復故此因暴怒怒則氣上逆痰因氣壅

故現斯症耳所謂尸厥也治厥往往有誤余故表其症以示後來云 廣筆記

李季虬曰太學朱方仲內人稟賦極弱薦之作勞善怒內熱怔忡膽虛氣怯已三四年矣壬申夏忽發厥胃痰氣上升則兩目上竄手足發搐不省人事初時一日一發三四日後則連發不止日夜幾百次牛黃竹瀝遍嘗不効余計已窮意欲用參附峻補因其時常口渴大便不通不敢輕投遶一友至極其讚決謂非附不可強用附子二錢人參六錢作一劑投下午後進藥黃昏發大熱煩躁渴甚不兩日斃矣此固非因

附子而然弟症候決不宜用徵徖之愈念漫試也 遇能

自訟此古今醫家所無者。全上

張意田治一人患泄瀉數次僵仆神昏目瞪肉瞤口噤狀若中風脈之沈弦而緩手足不冷身強無汗鼻青腮此肝鬱之復也用童便慈葱熱服稍醒以羌活防風柴胡鉤藤香附烏藥之屬次用天麻白朮湯加歸芍丹烏而愈或問肝鬱之復故曰運氣不和體虛人得之本年陽明燥金司天金運臨酉為不及草木晚榮因去冬晴暖無雪冬不潛藏初春乘其未藏而草木反得早榮燥金主肅殺木欲達而金勝之故近日

梅未標而吐華密霰凄風交亂其側本氣鬱極則必
思復經所謂偃木飛沙筋掉眩風熱之氣陡然上
逆是為清厥今其脉沈弦而緩乃風木之象因審量
天時用童便蔥使之速降濁陰透轉清陽則神氣
自清用羌防等以舒風木香附卮子解肝而清鬱火
再用天麻白朮湯加歸芍丹卮培土清火暢肝木以
成春雖不能斡旋造化亦庶幾不背天時也已

李東垣治中書舍人脚膝尻腰皆冷脉沈數有力用黃
柏滋腎丸再服而愈

汪石山治一人卒厥暴死不知人先前因微寒數發熱
面色癍黃六脉沈弦而細知為中氣久鬱所致與人
參七氣湯一服藥未熟而暴絶汪令一人緊抱以口
接其氣徐以熱薑湯灌之禁止喧鬧移動移動則氣
絶不返矣少頃果甦温養半月而安不特此症為然
凡中風中氣中寒暴厥俱不得妄動以斷其氣內經
明言氣復返則生若不諳而擾亂其氣不得復致天
枉者多矣（遇卒暴病者病家醫士皆宜知此蓋暴病多火擾之則正氣散而死也余女年十八忽暴厥家人不知此羣集喧鬧又扶挾而徙他所致甦而復絶救無及矣今錄張汪二案五內猶摧傷也）

盛用敬治一婦卒厥昏昏若醉夢手足筋攣盛診之六
脉俱脫忽有麻衣者在側問其人則病者之壻也問

其服妻之服也問其妻之死僅半月死以産後症忽悟曰此病必憂鬱所致以木香流氣飲投之一服而瘥（吳江縣志）

陸怡華亭人善醫汴人段氏客比隣一夕溘死怡取馬櫪去底置大釜上舁死者內之蒸以葱藥及旦皮膚而氣復（江南通志）

孫文垣治丁耀川長姊常患暈厥（諸風掉眩俱屬于肝）吐痰椀許乃甦（痰因火動）一月三五發後又口渴五更倒飽（二字新）腸鳴腹疼泄瀉小水短濇咳嗽（皆肝火為患）脉之兩寸濡弱兩關滑大此中焦痰積所致也（却是標症）先與二陳湯加蒼朮山查麥芽以腱脾為臣以白芍止痛為君以滑石澤瀉引濕從小便出為佐黃芩為裨佐（張致）十帖二陰之痛俱止（前未敘明）改以六味加知柏牛膝而愈（按此女之病稟母氣也余常見父母有肝病者其子女亦多有之證病厥亦肝病也其母病甚在二陰見鬱症門）

白仰雲令眷每觸怒即暈厥必閉門合目靜坐不令一人在旁（可見此病不宜擾之）手足皆冷汗出如雨氣息俱微越一時許甦如常原以項生瘰癧多服女醫斑猫等毒藥致脾胃損元氣虧也年三十八未嘗生育欲睡則腿必槌敲既睡則心常驚跳經將行小腹先疼二日色紫有塊（以上無非肝病）惟肌肉飲食如常人（脾胃不病）診之兩

寸短弱左關大而有力右關滑左尺滑右尺沈微據脉肺氣虛肝木實胃中有痰之症也木熱則流脂斷無肝火盛而無痰者不必責諸胃也用六君子湯加丹參酒連青皮外與珠母丸及獨活湯調理而安二方出醫學綱目

龔子才治劉司寇患卒倒不省人事口眼相引手足戰掉一醫作風治一醫以痰火治俱罔效診之六脉沈數氣口緊此非風非痰乃氣夾食也其家人始悟曰適正食之際被惱所觸遂致如此用行氣香蘇散加木香青皮山查即愈萬病回春

喻嘉言治吳添官生母時多暴怒致經行復止入秋以來漸覺氣逆上厥如畏舟船之狀動則暈去久久卧於床中時若天翻地覆不能强起百治不效因用人參三五分畧寧片刻最後服至五錢一劑日費數金至家財盡費病轉凶危大熱引飲腦如刀劈食少瀉多已治木矣喻診之謂可救蓋怒甚則血菀於上而氣不返於下者名曰厥巔疾厥者逆也巔者高也氣與血俱逆於高巔故動輒眩暈也又上盛下虛者過在足少陽膽膽之穴皆絡於腦鬱怒之火上攻於腦得補而熾其痛如劈同為厥巔之疾也風火相煽故振摇而蒸熱木土相凌故艱食而多瀉也於是會內

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

經錢落鎮墜之意以代赭石龍膽草蘆薈黃連之屬降其上逆之氣以蜀漆丹皮赤芍之屬行其上菀之血以壯蠣龍骨五味之屬欲其浮游之神最要在每劑中生入猪膽汁二枚蓋以少陽熱熾膽汁必乾亟以同類之物濟之病者藥入口便若神返其舍忘其苦口連進十數劑熱退身涼食進瀉止能起行數步然尚覺身輕如葉不能久支因恐藥味太苦不宜多服減去猪膽及蘆薈等藥加入當歸一錢人參三分薑棗為引平調數日全愈

李士材治晏給諫夫人先患胸腹痛次日卒然暈倒手足厥逆時有醫者以牛黃丸磨就將服矣診之六脉皆伏惟氣口稍動此食滿胸中陰陽否隔升降不通故脉伏而氣口獨見也取陳皮砂仁各一兩薑八錢鹽三錢煎湯以指探吐得宿食五六椀六脉盡見矣左關弦大胸腹痛甚知為大怒所傷也以木香青皮橘紅白朮香附煎服兩劑痛止更以六君子加木香烏藥調理十餘日方瘥

楊太史夫人忽然暈倒醫以中風之藥治之不效李診之左關弦急右關滑大而輭本因元氣不足又因怒後食停先以理氣消食藥進之下黑矢數枚急以六

君子加薑汁服四劑而後暈止更以人參五錢者朮
半夏各三錢茯苓歸身各二錢加減調理兩月而愈
一人年五旬荒於酒色忽頭痛發熱醫以羌活湯散之
汗出不止昏暈不省孛為炙關元十壯而醒四君子
加薑桂日三劑至三日少康因勞怒復發厥用好參
一兩熟附三錢煨薑十片煎服稍醒但一轉側即厥
一日之間計厥七次服參三兩至明日以羊肉羹糯
米粥與之尚厥二三次至五日而厥定乃泣而問曰
可再生否曰脉有根蒂但元氣虛極非三載調攝不
能康也幸其恪信堅守兩月之間服參四觔三年之

內煎劑六百帖丸藥七十觔方得步履如初親友眾
多議論襍出此最病家大忌若非病人任之崙久而見疑服
藥必怠未有獲生者也
張路玉治顧允祥之內暴怒傷食喘脹嘔逆不止怒則氣上
醫者誤認風邪而與表藥遂昏憒目瞪不語呼之不
省鼓動肝邪而成厥診之其脉六部濇伏知為痰因氣閉所
致本當因勢利導探吐以通其竅緣病家畏其吐劇
加檳榔鐵落得下而安
黃履素曰凡人精神極壯實者偶患痰厥可服牛黃丸
友人屠伯尚忽然痰壅不能語服牛黃丸立愈余姊

丈周公美一日忽神呆目怒頃之痰涌手揚足擲有類中風不服藥次日自愈此等稟賦百無一二

薛立齋治一婦人因怒發搐嘔吐痰涎口禁昏憒氣口脉大于人迎此氣滯而食厥用平胃散加茯苓半夏木香治之而甦更以六君子湯加木香漸愈乃去木香又二十餘劑而痊

陸養愚治許省南忽得暴疾如中風口不能言目不識人四肢不舉服蘇合牛黃丸不效或與小續命湯反增喘急壯熱手足厥逆或以六脉沈微擬用附子理中湯診之兩寸似有似無兩尺難以求索此由氣壅鬱然而然非不足而欲脫也按其胸即眉為之皺按其腹即體為之舉詢其由因日間煩冗無暇喫飯至晚陪客畢即病發曰饑極過飽此食中也昏憒不語脉伏皆飲食填塞清道所致四肢不舉經謂土太過之病也初時一吐即已今已一二日上中下俱受病當吐下消導以分殺其勢乃先以生薑淡鹽湯探之涌痰涎湯水數椀少頃神思少清診之寸關逼逼而來又以稜茂檳枳橘麴木香白豆仁萊菔子煎送潤字丸五錢下三四行勢大減再診關尺俱見且沈實有力第胸腹按之猶痛再以前方煎送潤字丸二錢四

日後方與稠粥改用二陳少佐歸芍以養榮血參朮
以扶胃氣木香豆仁以寬其未盡之痞旬日而安
陸肯愚治潘碧泉婦年近五旬因大怒後忽然仆倒牙
關緊急脉之兩寸關滑大兩尺沈無以稀涎散藘水
調撬牙灌之吐痰盆許少頃而甦弟人事尚未清爽
再診寸關稍平兩尺已起以二陳加貝母黃連香附
數劑而安
陸祖愚治郁仲開勞心之後復感怒氣清晨篦頭未畢
忽然昏暈四肢厥逆口目不開喉聲如鋸二便不利
脉之左三部弦滑而數右三部沈實有力此痰厥也
先用牛黃丸薑湯化開加川牛黃一分連灌四五丸
再用陳皮貝母花粉膽星黃芩黃連枳實瓜篓前胡
桔梗阜莢薑汁竹瀝頓服涌去稠痰二三椀前方去
阜莢陳皮加青皮二劑行二次其老痰俱從便出症
頓減後用健脾養血清火消痰之劑調理而安
鄭顯夫年六十餘因大怒遂昏仆四肢不用余以怒則
火起于肝以致手足厥陰二經之氣閉而不行故神
無知怒甚則傷于筋縱其若不容故手足不用急以
連柏瀉其上逆之火香附降其肝氣一二日神智漸
回後以調氣血壯筋骨之劑補之一月安矣藥要或
問。醫

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

朱丹溪治呂宗信有積塊足冷至膝用大承氣湯加減下之其塊積皆愈（積塊易知足冷為實熱之厥人或未知故入厥門）

吳洋治里人病歸自浙四肢厥冷六脉若亡尸寢旬餘水漿不入衆醫以為死矣洋至曰此熱厥也乃就浴室貯盤水水皆汲新版築傅之臥病者其上則以青布幕四體挹水沃之即以水酬病者唇欲得水甚遂盡其量而飲之乃瘥（太函集）

吳橋過章祁有人遊道告曰汪一洋年五十所溲血後發熱畢致諸醫或以為傷寒劑以發散或以為痢後虛損劑以補中久之譫語昏迷四肢厥冷蓋不食者旬日矣即其家絕望以待晝願一診之橋曰此熱厥也吾能活之則予石膏黃連湯一服而蘇再而間五服而愈（全上）

絕緑飲妹病厥昏不知人目閉鼻煽年壽環口皆青手足時時抽掣自夜分至巳牌湯水不入脉之大小參伍無倫次謂此肺金大虛肝火上逆火極似風之候唯獨參湯可愈他藥必不受也參已煎或沮之遂不敢與一醫用菖蒲遠志以開心氣茯神棗仁以安神麥冬貝母以清痰辰砂錢鏞水以鎮墜柰藥從左灌

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

入即從右流出絶不下咽群視束手時已過晡再視之則面額間漸變黑色令急灌參湯猶可活乃以茶匙注之至六七匙喉間汩然有聲已下咽矣察其牙關漸開再以米飲一盞和參湯灌下遂目開身動面額青黑之氣豁然消去徐飲薄粥一甌起坐而愈後嘗復厥但不甚唯與地黃沙參麥冬杞子即瘥

顧氏女年十六內膳有瘡三陰之病其素也以歲暮勞于女工脇痛發熱咳嗽吐痰一醫與廣半荊防香砂枳桔等三四劑覺中脘有物如拳上頂食不能下又一老醫謂此痰也其盛盈斗必消去乃已其方與前仿增蒼朮厚朴竹瀝薑汁服二劑病益劇延治開歲之二日也比至則曰死矣無庸診也詢死幾時曰天黎明忽目閉口張挺卧僵直呼喚不應湯水不入詢其胸腹如何其母拊之曰猶暖遂入診已無脉面死白殺青牙齦迸紫血亦已凝泛令曳其四肢尚軟謂本元虛勞役而病誤行燥散傷其肺金致肝木挾火上逆又加酷暴之品遂令水涸木枯而厥胃第痰食之厥可一吐而甦此陰亡陽越之厥唯有魂升魄降而已今生氣未絶姑以熟地二兩杞子一兩沙參麥冬各五錢急煎徐灌但慮其不下咽耳下咽即活乃

如言次日延診告以初時藥不能下以簪撬灌久之入咽有聲今起坐自如矣前方減半入篋仁二錢八劑全愈後數年出嫁不得于姑脇痛不能卧一醫令木香為末調服錢許數服竟一厥而終

痙

痙症詩曰強直反如弓神昏似中風痰流唇口動瘛瘲與癇同

許叔微治一人項强筋急不可轉側自午後發黃昏時定此肝腎二臟受風也謂此必先從足起少陰之筋自足至項筋者肝之合今日中至黃昏陽中之陰也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶畢法云離至乾腎氣絶而肝氣弱肝腎二臟受邪故發于此時用宣州木瓜二個取蓋去瓤沒藥二兩乳香二錢五分二味入木瓜內縛定飯上蒸三四次爛研成膏每用三錢入生地黃汁半盞無灰酒二盞煖化溫服及都梁丸服之而愈

易思蘭治宗室毅齋年五十二素樂酒色九月初忽倒地昏不知人若中風狀目閉氣粗手足厥冷身體强硬牙關緊閉有以為中風者有以為中氣中痰者用烏藥順氣散等藥俱不效又有作陰治者用附子理中湯愈加痰響五日後召易診治六脉沈細緊滑愈

按愈有力問此何病曰寒濕相搏痙症也痙屬膀胱當用羌活勝濕湯主之先用稀涎散一七吐痰一二椀昏憒即醒隨進勝濕湯六劑全愈以八味丸調理一月精神復常

張路玉治吳江郭邑侯公子患柔痙用桂枝湯及六味地黃湯咸加蠍尾服之而愈

朱丹溪治王秀濕熱大作脚痛手筋拘攣足乏力生地當歸川芎白朮各二錢蒼朮一錢甘草炙三分木通五分煎湯下大補丸三十丸太補丸須炒煖

張子和治新寨馬叟年五十九因秋欠稅官杖六十得驚氣成風搐已三年矣病大發則手足顫掉不能持物食則令人代哺只目張睒唇舌嚼爛抖擻之狀如線引傀儡每發市人皆聚觀夜卧發熱衣被盡去遍身燥痒中熱而反外寒久欲自盡傾產求醫至破其家而病益堅叟之子邑中舊小吏也以訊張張曰此病甚易治若隆暑時不過一涌再涌奪則愈矣今已秋寒可三之如未更刺俞穴必愈先以通聖散汗之繼服涌劑則去痰一二升至晚又下五七行其疾小愈待五日再一涌出痰三四升如雞黃成塊狀如湯叟以手顫不能自探妻與代探咀嗌腫傷昏憒如

醉約一二時許稍稍醒又下數行立覺足輕顫減熱亦不作足亦能步手能巾櫛自持是筋未至三涌病去如濯病後但覺極寒張曰當以食補之久則自退蓋大疾之去衛氣未復故宜以散風導氣之藥切不可以熱劑溫之恐反成他病也琇按是症本因驚而得尤不能無鬱也益驚入心心受之則為顛癇今心不受而反傳之肝而為瘛瘲亦母救其子之義也肝病則乘其所勝于是生風生痰怪症莫測治以上涌下泄乃發而兼奪之理益行不悖張案于此症尤為合法

黃如村一叟兩手搐搦狀如曳鋸冬月不能覆被張之舞陽道經黃如不及用藥針其兩手大指後中注穴上曰自肘以上皆無病惟兩手搐搦左氏所謂風淫末疾者此也或刺後谿手太陽穴也屈小指握紋盡處是穴也

完顏氏病搐先右臂并右足約搐六七十數兩目直視昏憒不識人幾月餘求治先逐其寒痰三四升次用導水禹功散泄二十餘行次服通聖散辛涼之劑不數日而瘥

薛立齋治一婦人素有內熱月經不調經行後四肢不能伸臥床半載或用風濕痰火之劑不效其脉浮緩按之則濇名曰瘛症屬風寒所乘用加味逍遙散加肉桂防風四劑頓愈更以八珍湯調理兩月餘而瘥

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

一婦人素經行後期因勞怒四肢不能屈名曰瘛症此血虛而風熱所乘先用八珍湯加鈎藤柴胡漸愈更佐以加味逍遙散調理而治痊

一婦人四肢攣屈煩痛自汗小便短少畏見風寒脉浮弦緩此氣血虛而風寒濕熱相搏先用東垣清燥湯漸愈再用加味逍遙散及八珍湯加丹皮而痊

一婦人素有火忽然昏憒瘛瘲抽搐善伸數欠四肢筋攣痰涎上升此肺金燥甚血液衰少而然也用清燥湯六味丸兼服尋愈

一婦人因怒經事淋漓半月方竭遇怒其經即至甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰瘧搐搦瞳子上視此肝火熾甚以小柴胡湯加熟地山巵鈎藤治之後不復發

一婦人素陰虛患遍身瘙痒誤服祛風之藥口噤抽搐肝脉洪數薛曰肝血為陰為水肝氣為陽為火此乃肝經血虛火盛耳宜助陰血抑肝火用四物麥冬五味柴胡山巵甘草熱搐頓止又以八珍黃耆麥冬五味鈎藤炙甘調理而痊

一婦人發瘛遺溺自汗面赤或時面青飲食如故肝脉弦緊此肝經血燥風熱名瘛也肝主小便其色青入心則赤法當滋陰血清肝火遂用加味逍遙散不數

劑諸症悉退而安

一人感冒後發瘧不醒人事磨傷臀肉三寸許一塊此膀胱經必有濕熱診其脉果數謂此死肉最毒宜速去之否則延潰良肉多致不救遂取之果不知疼痛因瘧不止疑為去肉所觸謂此風熱未已彼不聽另用乳末之劑愈甚復以祛風消毒藥數貼查春田飲以祛風凉血降火化痰之劑而愈金工部載陽傷寒後亦患此甚危亦去出死肉以神效當歸膏數貼以內疎黃連湯飲之狂言愈甚其脉愈大更以凉膈散二劑又以四物湯加芩連數劑而愈凡患瘡者責效大迫服一二劑未應輒改服他藥反致有悞不思病有輕重治有緩急而槩欲效于一二劑之間難矣況瘡瘍一症其所由來固以深久又形症在外肌肉潰損較之感冒無形之疾不同安可旦夕取效患者審之

許叔微云同官歙丞張德操常言其內子昔患筋攣脚不得屈伸逾年動則令人抱持求醫于泗水楊吉老云此筋病宜服下三方一年而愈春夏服養血地黃丸熟地蔓荊山萸狗脊地膚子白朮乾漆蠐螬天雄車前草解山藥澤瀉牛膝秋服羚羊湯羚羊角肉桂

附子獨活白芍防風川芎冬服烏頭湯大烏頭細辛川淑甘草秦艽附子官桂白芍乾薑茯苓防風當歸獨活

馬元儀治章氏婦患頭身振搖手足瘛瘲諸治不效診之兩脉浮虛蕪濇浮為氣虛濇為血傷得之憂思勞鬱陽明損甚也益陽明胃為氣血之海主束骨而利機關若氣血不充則筋脉失養而動惕不寧仲景云發汗則動經身為振振者茯苓桂枝朮甘草湯主之凡汗傷津液猶足擾動經脉況氣血內涸乎但彼有外邪搏飲當滌飲散邪（苓桂）俾津液四布以滋養經脉此屬勞鬱所傷必峻補陽明使氣血內盛以充灌周身令服參乳兩月而安

吳橋治程嗣恩故肥白藥瘍過當勝理皆踈（治覺汗多）久而益甚一發則汗下如雨厥逆反張口噤目瞪痰喘竝作良久氣反小便不禁瞑不能言旬日益深日十數作諸醫謝去橋既而按諸方則曰經云汗多亡陽此柔痙也諸君失之矣乃重參耆次附桂芍藥次龍骨牡蠣飲之半劑而寢復者將升屋而號橋曰藥中病而行得寢乃復非死也亟為粥湯待之頃之呻吟呼粥湯少進再劑而愈三月而後復初

頭暈

實材治一人頭風發則旋暈嘔吐數日不食為針風府穴向左耳入三寸去來留十三呼病人頭內覺麻熱方令吸氣出針服附子半夏湯永不發華陀針曹操頭風亦針此穴立愈但此穴入針人亦昏倒其法向右耳橫下針則不傷大筋而無暈乃千金妙法也（此針法奇妙須與高手針家議之方得無悞）

龔子才診熊槐二宮年六十餘身體胖大其脉下手即得五至一止乃驚曰君休矣渠曰連日微覺頭暈別無恙也何故出此願教焉龔曰越十日用藥相哂而退少頃閒中痰求救於龔知其必不可治令以香油灌之即醒逾十日果卒

張路玉治董司業夫人體雖不盛而恒有暈眩之疾診其六脉皆帶微弦而氣口尤甚蓋緣性多欝怒怒則飲食不思恒服消導之味則中土愈困飲食皆化為痰痰從火化而為眩暈矣豈平常肥盛多濕之痰可比例乎為疏六君子方水泛為丸服之以培中土健運當無數化不及番結為痰而成眩暈之慮所謂治病必求其本也

繆封君偶因小憤遂眩暈痞悶三月來服豁痰利氣藥不應反覺疲倦飲食日減下元乏力診之六脉似覺有餘指下畧無冲和之氣氣口獨滯不調時大時小兩尺俱濡大少力此素多痰濕漸漬于水土二經加以剥削之劑屢犯中氣疲倦少食迨所必致法當先調中氣輸運水穀之精微然後徐圖温補下元為疏六君子湯加當歸調營血庶無陽無以化之虞

朔客梁姓者邀診時當夏月裸坐盤餐倍於常人形偉氣壯熱汗淋漓於頭項間診時不言所以切其六脉沈實不似有病之候惟兩寸畧顯微數之象但切其左則以右掌抵額切其右則以左掌抵額知其肥盛多濕而夏暑久在舟中時火鼓激其痰而為眩暈也詢之果然因與導痰湯加黄柏澤瀉茅朮厚朴二服而安

吳友良年逾古稀頭目眩暈乃弟周維素擅岐黄與補中益氣數服始用人參一錢加至三錢遂痞滿不食坐不得卧三晝夜喃喃不休（上盛下虚之症服補中益氣其害如此）診時見其面赤進退不常左頰聶聶瞤動其六脉皆促或七八至一歇或三四至一歇詢其平昔起居云自五十即絶慾自保飲痰且强此壯火爍陰燕肝風上

擾之兆與半料六味除去萸肉入鈎藤大劑煎服是夜即得酣寢其後或加鱉甲或加龍齒或加棗仁有時妄動怒火達旦不寧連宵不已則以秋石湯送靈砂丹應如桴鼓盛夏酷暑則以小劑生脉散代茶後與六味全料調理至秋而安

陸養愚治陳巽源室向有頭眩之症不藥亦止八月中旬偶作勞煩悶飲酒數杯坐月下更餘方寢便覺微熱不安次早忽眼黑頭旋且微痛如在風雲中發比平時較劇醫謂脉得浮數此熱極生風也用芩連山巵等以清之二劑眩暈不減而頭痛如破上身如火而欲厚覆又謂無痰不作暈再以清火之品合二陳湯二劑亦不效脉之左手浮弦而緊右手浮數而弱且寸强尺微右脉乃正氣之虚左脉乃邪氣之實尺微寸强邪在上也此必乘虚感邪中於上焦所致經曰筋骨血氣之精而與脉并為目系上屬于腦後出于項中故邪中于項因逢其人之虚其入深則隨目系以入于腦入于腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣今作勞以致煩悶非虚乎月下坐至更餘頭項之間能不為霧露之清邪所中乎法當驅上焦之邪補中焦之氣而徐議消痰清火則自愈

矣因先用參蘇飲加蒺本二劑頭痛頓止眩亦少差再以補中益氣佐以二陳芩連數劑而安

龔子才治大學士高中玄患頭目眩暈耳鳴眼黑如在風雲中目中溜火或與清火化痰或與滋補氣血俱罔效診之六脉洪數此火動生痰以酒蒸大黃三錢為末茶下一服而愈益火降則痰自清矣

薛立齋治一婦人頭暈吐痰用化痰理氣藥肢體痠麻服祛風化痰藥肢體常麻手足或冷或熱此脾土虛而不能生肺金用補中益氣加茯苓半夏炮薑二十餘劑脾氣漸復諸症稍愈更用加味逍遥散三十餘劑而愈後因怒吐痰自服清氣化痰丸飲食不進吐痰甚多胸脇脹滿教用六君子倍加參朮少加木香數劑而愈

陶天爵妾媵素多時患頭暈痰甚勞則肢體痿軟筋骨作痛殊類風症以為腎虛不能納氣歸源用加減八味丸而痊後因房勞氣惱頭暈項强耳下作痛此肝火之症仍用前藥滋腎水生肝血制風火而愈

張飛疇治一婦胸滿身熱六脉弦數無力形色倦怠渴不甚飲云自遊虎邱暈船吐後汗出發熱頭痛服發散四劑頭痛雖緩但脹暈不禁復用消導四劑胸膈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

愈膨聞穀氣則嘔眩因熱不退醫禁粥食已半月日惟飲清茶三四甌今周身骨肉痛楚轉側眩暈嘔噦曰當風汗嘔外感有之已經發散矣吐則飲食已去消剋則更傷脾脾虛故脹甚脾絕穀氣則嘔土受木剋則暈宜勿藥惟與米飲繼進粥食使脾土有主更用蘇合香丸惟孟得生何也曰二症因腎虛不能納氣而為頭暈不能制水而為痰涎陳專服攻痰行氣涯陳東谷俱為無嗣納罷已而得疾皆頭暈吐痰竝

孟專服益火補氣故耳後余他往桐石房勞過度亦患前症或用清氣化痰愈甚顧曰我病是腎虛不能納氣歸源治者不悟而殁惜哉

昌平守王天成頭暈惡寒形體倦怠得食稍愈勞而益甚寸關脉浮大此脾肺虛弱用補中益氣加蔓荊子而愈後因勞役發熱惡寒譫言不寐得食稍安用補中益氣而瘥

大尹祝支山因怒頭暈拗內筋攣時或寒熱日晡熱甚此肝火筋攣氣虛頭暈用八珍湯加柴胡山茄丹皮二十餘劑而愈（瑣按肝火亦作頭暈不定屬之氣虛也經云諸風掉眩皆屬于肝肝之支

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

脉上絡顖頂余嘗以一味
加吳萸炒黃連二三劑即愈

朱丹溪治一男子年七十九歲頭目昏眩而重手足無力吐痰口口相續左手脉散大而緩右手緩而脉大不及于左重按皆無力飲食畧減而微渴大便三四日一行衆人皆與風藥至春深必死曰此皆大虛症當以補藥大劑服之衆怒而去乃教用人參黃耆當歸白芍白朮陳皮濃煎作湯使下連柏丸三十粒如此者服一年半而精力如少壯時連柏丸冬加乾薑少許餘三時皆依本法連柏皆薑汁炒為細末又以薑汁煮糊為丸 琇按此症大補而佐以連柏妙不可言吳蓋一眼注定肝腎二經以連清肝火柏清腎火也既慮其寒重以薑汁製之可謂盡善然不若竟用地黃杞子如左歸加減尤為善中之善也

陳自明治一婦人苦頭風作痛數年服太乙丹一粒吐痰椀許遂不再發 方見蠱門

馮楚瞻治金紹老夫人因歲事積勞忽眩暈不省妄有見聞語言譫亂診其脉細數無倫真陰真陽竝虧已極乘此初起即為挽回愈久愈虛愈虛愈脫矣用全真一炁湯日進二劑每劑人參八錢不十日而全瘳

錢國賓治陳叔明幼年多讀抱學貧居自甘清淡有品士也至三旬外一見日光即覺昏暈漸至見光昏暈

遂坐于帳凡有隙處莫敢窺如是二十年矣諸藥遍嘗親友憐其品行時以升斗周之與診乃陽虛陰極之症須返本還元之藥可治也用首經人乳臍帶胎髮秋石煉蜜丸如芡實大硃砂為衣三更酒下一丸月餘而愈適錢有此丸因與之也

麻木

王損菴治大理卿韓珠泉遍身麻木不能舉動以神效黃耆湯加減授之用耆一兩二錢參芍各六錢他稱是一服減半彼欲速效遂併二服為一服服之旬日病如失諭以元氣未復宜靜養完固而後可出渠不能從盛夏遽出見朝謁客勞頓累日忽馬上欲墜仆從者扶歸邀診視辭不治數日沒嗚呼行百里者半於九十可不戒哉治法彙

張路玉治沈步雲解組後以素稟多痰恒有麻木之患為疏六君子湯服之頗驗而性不喜藥入秋以來漸覺肢體不遂脉之得奕滑中有微之象仍以前方去陳皮加歸耆巴戟平調半月而安然此症首重樽節方可保全毋徒恃藥力為也

巴慈明婦產後眩暈心悸神魂離散若失臟腑之狀開

眼則遍體麻木如在雲霧之中必緊閉其目似覺少可晝日煩燥夜則安靜服四物等則嘔逆不食薑附等則躁擾不寧其脉虛大而數按之則散舉之應指此心火浮散之象因艱產受驚痰飲乘虛襲入心包絡中留伏膈上有入無出致綿延不已蓋目開則諸竅皆開痰火堵塞心竅所以神識無主目閉則諸竅皆閉痰火潛伏不行故得稍安與東垣所云合眼則陽氣不行之麻迥別況晝甚夜輕明是上焦陽位之病與理痰清火之劑諸症漸寧然或因驚恚或因飲食不時舉發此伏匿膈上之痰無從搜滌也乘發時用獨參湯下紫雪開通膈膜仍與前藥調補半年而愈

黃履素曰余年四十七時忽患小指麻軟時作時止每夏愈而冬甚素聞指麻當防中風因講求預防之法有言宜祛風化痰者其說大謬有言順氣活血者謂氣行則痰自消血活則風自滅其言近是及讀薛氏醫案治蔣州判中滿吐痰頭暈指麻云中滿者脾氣虧損也痰盛者脾氣不能運也頭暈者脾氣不能升也指麻者脾氣不能用也遂以補中益氣湯加茯苓半夏以補脾土用八味地黃丸以補土母而愈後惑

于乾坤生氣方云凡人手指麻軟三年後有中風之疾可服搜風天麻二丸以預防之乃朝餌暮服以致大便不禁飲食不進而歿夫預防之理當養氣血節飲食戒七情遠帷幙可也若服前丸以預防遮所以招風取中也讀之快然遂守其法今十有三年矣

陸養愚治丁慕雲患麻木左手足不能舉惡風或時自汗服小續命十劑不效或謂風症宜大汗之小續命祖以補養氣血之品故不效耳因倍風藥減參芍等二劑汗如雨反覺一身盡痛游走不定并左手足不能舉昏沈厥逆甚危診之陽脉弦細而數陰脉遲濇

而空謂此雖似風然昔人云麻者氣虛木者血虛手足不任者脾虛具此三虛止宜調養氣血則風症自除小續命正以風藥過倍血藥殊少何反倍風藥而去參芍宜其劇矣仲景云大法夏宜汗以陽氣在外也春月陽尚稚初出地下大汗之使衛氣亟奪而失守榮血不隨所以遍身走痛昏沈厥逆皆氣血垂絕之象也急用大料十全大補湯濃煎灌之少甦為妙風池百會肩井曲池間使三里六穴各數壯以防中臟之危自此諸症漸減飲食漸進第大便常結痞悶微熱此汗多津液不足故下不去則上不舒以潤字

九五分日二服便行猶燥以八物倍歸地加麥冬知母以潤之少佐檳榔木香豆仁以調其氣（可不必）自後每燥結服潤字丸五分甚則一錢月餘全愈

張文叔傳木香丸續命丹二方戊辰春中書左丞張仲謙患半身不遂麻木太醫劉子益與服之汗大出一服而愈故録之（雖有治張業在江選中風門寶鑑○醫說續編）

李東垣治杜彦達患左手右腿麻木右手大指次指亦常麻木至腕已三四年矣諸醫不效求治曰麻者氣之虛也真氣弱不能流通填塞經絡四肢俱虛故生麻木不仁與一藥決三日效遂製人參益氣湯服二日便覺手心熱手指中間如氣滿脹至三日後又覺兩手指中間皮肉如不敢觸者似痒痛滿脹之意指上瑟瑟不敢用手擦傍觸之曰真氣遍至矣遂于兩手指甲傍各以三棱針一刺之微見血如黍粘許則自息矣後再與調理而愈

繆仲淳治顧仲恭心腎不交先因失意久欝及平日勞心致心血耗散去歲十月晨起尚未離牀忽左足五指麻冷倏已至膝便不省人事良久而甦乍醒乍迷一日夜十餘次醫者咸云痰厥繆云純是虛火服九藥一劑今春體稍覺健至四月後九藥不繼而房事

稍過至六月初十偶出門前症復發扶歸良久方醒是日止發一次過六日天雨稍感寒氣前症又發二次見今兩足無力畏寒甚自腹以上不畏寒繆云人之五臟各有致病之由謹而察之自不爽也夫志意不遂則心病房勞不節則腎病心腎交病則陰陽將離離則大病必作以二藏不交故也法當清熱補心降氣豁痰以治其上益精强腎滋陰增志以治其下則病本必拔以心藏神腎藏精與志故也平居應獨處曠野與道流韻士討論離慾之道根極性命之源使心境清寧暫離愛染則情念不起真精自固陰陽互攝而形神調適矣湯方貝母茯苓遠志棗仁蘇子石斛麥冬甘草木瓜牛膝石菖蒲入牛黃末一分天竺黃一分竹瀝一杯後加人參五錢枇杷葉三片霞天膏五錢丸方遠志天冬麥冬茯神茯苓棗仁生地白芍甘草黃柏牛膝五味蜜丸空心及臨卧服五六錢石斛湯加竹瀝送下

當歸草堂鈔本

續名醫類案卷之五

續名醫類案卷之六

錢塘魏之琇玉橫撰

感症

朱丹溪治一人因感寒倦怠不食半月後發熱惡寒遍身痛脉浮大按之窈然此極虛受寒以人參為君黃耆歸芍為臣蒼朮陳皮通草為使大劑服五劑大汗而愈

沈明生治丁惠書秋得感寒停食之症入夜輒寒熱如

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

瘧竟夕作嘔病數發醫亦數更體弱不勝昏沈垂殆
矣或謂晝靜夜劇屬乎陰症或謂胃寒而嘔當理中
湯沈獨以為晝靜夜劇由于陽氣陷入陰中嘔噦聲
長明是諸逆衝上屬火不惟不可溫直應用寒不惟
不可補更宜攻伐竟投三黃等味一劑知二劑減三
四劑其嘔若失神情始甦但嘔止而胸脹繼作或疑
寒涼傷胃故沈曰食雖消而火未歸原猶留連膈上
王太僕云寒之不寒責其無水當求其屬以衰之乃
改用純甘壯水之劑益川牛膝車前使熱從水道發
洩果氣順脹消膻中清廓而安

陸養愚治邱全谷年正方剛九月間忽身微熱頭微痛
心神恍惚有時似夢非夢自言自語醫謂此輕傷寒
也當發散之用解表二劑汗不出熱反甚妄言見鬼
前醫因無汗欲再表病家疑又延一醫因妄言見鬼
謂熱已傳裡欲下之而大便之去未久不能決脉之
輕按浮數而微重按澁而弱微數者陽氣不足也澁
弱者陰血不足也此陰陽俱虛之候不可汗尤不可
下主表者曰汗既不出何謂陽虛曰此症雖有外邪
因內損甚氣餒不能逼邪外出而作汗法當補其正
氣則汗自得而邪自去矣若再發之徒竭其陽而手

足厥逆之症見矣其主下者曰仲景云身熱譫語者有燥矢也何不可下曰經謂譫語者氣虛獨言也此症初止自言自語因發散重虛其陽所以妄言見鬼即難經所謂脫陽者見鬼也王海藏曰傷寒之脉浮之損小沈之損小或時悲笑或時太息語言錯亂失次世疑作譫語狂言者非也神不守舍耳遂用補中益氣湯加薑棗附子煎服一日二劑至晚汗澉澉而來清晨身竟凉頭不痛弟人事未甚省此陽氣少復陰氣未至耳仍用前湯吞六味丸旬日猶未精采調理月餘而愈蓋此人因房室之後而繼以勞力也

韋汝經春初肆業于蕭寺其房屋新撤不甚謹密天寒夜坐至一二更倦怠倚几而睡洎醒身覺寒甚頭微痛天明自服參蘇飲二劑未得汗他無所苦但頭痛數日不止或謂其體弱必攻苦勞神上氣不足而痛也令以補中益氣湯倍人參服之後便覺神氣昏悶胸膈不舒從早至夕粒米不進晚發呃逆睡卧不安醫以脉帶數是火也用知貝苓連竹茹葛投之反遍身壯熱呃逆不止亟診之面赤戴陽鬱冒嘔呃左脉沈數而弦右脉尚和乃曰病輕藥誤耳不汗而劇得汗即解矣乃以火鬱湯倍麻黄强覆大汗之至晚

諸症如失明日索藥曰昨見几上尚有補中益氣湯一帖服此足矣（琇按補中益氣為東垣治內傷外感之第一方後人讀其書者鮮不奉為科律然不知近代病人類多陰分不足虛下盛者十居九焉即遇內傷外感之症投之輒增劇非此方之謬要知時代稟賦各殊耳陸麗京曰陰虛人誤服補中益氣往往暴脫司命者其審諸）朱晴川內先感風邪後傷飲食發熱頭疼中脘痞悶醫以牛黃散下之瀉兩三行而熱不減痞亦不寬再服復瀉兩三行熱不減而痞更甚又醫曰瀉而熱不減者虛熱也通而脹不減者虛痞也乃用人參白朮黃耆甘草補之初服無進退至四劑人昏不省人事手足厥逆舌有黑胎脉之浮數而空喜面不黑黯猶可救乃以枳實五錢黃連三錢人參七分麥冬一錢五味十粒燈心煎灌之二劑人事稍清六脉畧有神熱亦減半又二劑熱仍劇大便五日不行始以潤字丸一錢下之不動又催一服復不動至一服三錢而後行行後熱漸退矣飲食少思稀粥與之而氣之不足以息仍以前方去枳實之半人參加一錢五分三日後大便又不行而熱即微微來復以潤字丸一錢五分下之便通而熱退自此一日不服人參則自汗力不能支三日不投潤字丸則便閉而熱發直至人參服過一斤潤字丸數兩而後愈（雖云先外感始終未進表劑）

陸肖愚治鄒氏子年十八新昏感冒症似傷寒或以九味羌活湯嘔吐一二日不止改用藿香正氣散吐少止而倦乏食即飽悶腹中漉漉有聲四肢微厥小便短赤大便或溏或秘口渴而不喜飲晝輕夜重煩悶有主調氣者清火者滋陰者皆不效而滋陰尤為不宜脉之寸關沈緩而弱尺脉頗和曰此得之煩勞傷氣非得之使內傷陰也用四君子湯加棗仁豆仁木香薑棗數劑如故乃倍人參加熟附子五分而胸膈寬飲食進二十劑全愈

陸方伯年過古稀因仲冬天氣有非時之熱患時氣咳嗽醫以芎蘇散汗之汗出不止咳嗽連綿不絕飲食不進昏憒經旬脉之浮大無力以五十動脉法按之二三十動間覺常有止意曰此高年勞倦即有微邪豈可妄汗今雖昏憒喘急尚可止宜扶正氣以勝之圖安弟壽算恐不出三年外耳用補中益氣湯加棗仁以助參朮斂汗又加枇杷葉桑皮蘇子石斛以降氣定喘二劑汗止四劑嗽亦減矣十劑而安後報訃果不出三年

陸祖愚治朱明宇子婦年二十未出痘疹患痰症類傷寒脉之右手氣口洪滑而數左三部沈實蒸蒸內熱

五六日不大便腹滿氣喘用黃連枳實山查厚朴花粉前胡桔梗瓜蔞生薑兩服後通身發班或謂疹子或云石痘乃用炒黑麻黃柴葛荊防甘草牛蒡蟬退黃芩薄荷等味服後即痰聲如鋸氣不轉舒譫語發狂不時昏暈又用薑汁竹瀝牛黃通天散探嚏吐濃痰數口方醒仍灌前藥又復昏暈如是三日細班轉而成片嘔血數椀後聞已死陸往唁之身雖冷而脉未絕以牛黃丸竹瀝灌下少頃手足微動又灌一丸有呻吟聲四肢微溫兩顴紅色脉大起反覺洪數而滑用人參瓜蔞枳實黃連黃芩大黃元明粉徐徐溫服用炒麪皮熨腹止約兩時腹痛異常即下燥矢十餘塊白痰稠積若干再用獨參湯灌下以防其脫六脉弱甚四肢厥冷口不能言精神恍惚用參附歸芍芩朮之類元氣復飲食進調理月餘而愈五年後陸往閩中其病復作嘔血數番莫能救

王敬溪年五十六先富後貧心事多鬱七月間恣食羊肉酒麪當風而卧內傷外感相並或與發散頭不疼身微熱惟胸腹不快或與疎利便通溲利而否滿如故或與溫胃或與消導月餘其症依然診之左脉浮弦而弱右脉浮滑有力或議下之陸曰此症內傷雖

重于外感然有否滿而無實堅且舌無胎口不渴脉
雖有力而浮尚帶表症爲可下耶宜用小柴胡和之
俟實堅脉沈而下之方爲萬全自此半月症猶未減
又半月脉沈便結乃以潤字丸五錢三次吞服去垢
穢若干內有羊肉數枚始知饑餓改用健脾調理之

劑又月餘而瘥

張意田治一人戊寅三月間發寒熱胸悶不食大便不
通小便不利身重汗出心悸而驚發表消食不減更
加讝語喊叫診其脉弦緩乃時行外感值少陽司天
之令少陽症雖少其機顯然脉弦寒熱者少陽樞象
也胸悶不食者逆于少陽之樞分也少陽三焦內合
心包不解則煩而驚甚則陽明胃氣不和而讝語少
陽循身之側樞機不利則身重而不能轉側三焦失
職則小便不利津液不下則大便不通此症宜以傷
寒八九日下之胸滿煩驚小便不利讝語一身盡重
不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯之法主治之服後
果愈

陸祖愚治曾邑宰因隆寒出入勞頓感冒身熱骨痛而
體極倦怠氣難布息脉之左弦右緩與疎氣養榮湯
二劑彼見用歸芍謂傷寒何遽投滋補曰此家傳治

類傷寒之方毫無差池不必疑也服後其病如失
潘衷弦毋年六十餘勞倦感冒次早仍然飲食晡時遂
發寒熱頭疼骨痛嘔吐酸水冷肝心痛一醫知其平
日多欝多火乃引經云諸嘔吐酸皆屬于熱投以清
涼愈甚吐蚘數條脉之兩關緊盛兩尺空虛乃風寒
飲食之故用橘半枳桔查朴藿苴桂枝薑砂症少減
次食復傷飲食症仍劇夜不得卧先用烏梅丸三錢
以安蚘隨用檳榔青皮枳實厚朴山查陳皮半夏炮
薑藿香黃連薑砂之類寬其中又用麩皮炒熨中脘旬
日後用小承氣加元明粉去燥矢二次調理半月愈

汪敬泉子年十六稟賦薄弱病十餘日他醫不效診之
外症身如炙昏倦舌上黃黑胎尚有津液胸不可按
日瀉黑水十餘次六脉細數重按有神而氣口獨有
力（氣口脉甚傷于食也）曰此雖起于不足而內傷甚重宜先消
後補用小陷胸加減症不減夜間煩躁再與前方日
進二服四帖胸膈畧舒而虛怯煩渴暫投麥冬棗仁
山庵豆豉之類稍安而熱與痛不減瀉已止遂與潤
字丸一錢少頃又催一錢去燥矢三四枚而虛煩之
症又見仍用安神滋補之藥畧轉而舌胎未退明知
宿垢未清元氣弱甚不敢急攻乃消補間進調理兩

月胸腹始暢又月餘乃安

吳文學季鴻體弱多鬱偶患內傷外感先則過汗後則下早竟成結胸（表症未罷而下之乃成結胸今云過汗豈表症猶未盡耶）診之胸不可按身熱如火肢冷如氷不寐譫妄恍惚如見鬼狀已二十餘日矣脉則兩寸空虛兩尺微有根蒂乃以培埴元氣中稍加消導之品療之十日後胸膈已柔其熱盡在下焦繞臍硬痛時轉矢氣舌胎有刺而尺脉漸覺有神乃用潤字丸三錢以歸尾枳實黃連山查元明粉為煎藥送之去燥矢甚多乃用四君四物兼安神之劑調理而瘳

表兄費祖修初夏勞倦怒氣復感風寒飲食診之左手浮弦氣口緊盛謂兩手脉俱挾邪病方進也不信次日漸頭痛身熱胸膈飽悶項強（強）骨痛醫與九藥數錢服之遂瀉不止轉加飽悶惡寒再求診知其表症具在而遽下之竟成結胸矣與五積散二劑表症已除減去芎芷蘇桂等又二劑胸寬瀉止改用歸芍六君子湯十餘劑方用潤字丸一錢薑湯送下連進三服所去甚多飲食漸進調理四十餘日始痊

張靖山子年十五稟賦薄弱患內傷外感醫治半月矣視其面赤唇焦舌胎白燥身熱欲得近衣手臂不敢

祖露反引手入被診之六脉鼓擊而大乃用人參知母五味當歸白芍一服甜睡半晌一醫再診謂陽明經病改用柴葛解肌遂大劇再求診則面如土色身冷自汗四肢厥逆六脉鰕遊急以人參一兩附子三錢灌之隨服隨醒次早大便一次仍前虛脫又以人參一兩二錢附子三錢煮汞各二錢入童便服之得以挽回

董蔚如弟飽餐麵食樹下納凉困倦熟寢遂頭痛身熱骨節煩疼胸腹否塞醫以九藥下之表症未除胸滿煎痛又行表汗頭痛減胸痛更甚或消導或推逐其痛漸下而未得舒暢幾兩月診得六脉澁數面容白黃舌胎灰黑而潤按其胸腹柔軟臍下堅硬晡時微熱小水自利大便不通此蓄血症也乃用桃仁承氣湯服後滿腹攪刺煩躁欲死其父母哭泣詈罵不可堪至夜半下黑糞鰕血若干遂腹寬神爽改用調理之劑而痊

葉能甫七月患外感內傷之症或用煎劑解表丸藥攻裡遂連瀉數次胸悶口乾潮熱譫語舌上黑胎手足微冷脉之左三部沈細而澁右寸關沈滑尺脉空虛此陽症見陰脉也若再一瀉必然不治乃用陳皮甘

草山查小柴胡木通澤瀉厚朴炮薑先溫消分利三劑後竟不瀉矣但兩手俱沈實改用黃連枳實山查黃芩厚朴瓜蔞五六劑急轉矢氣投潤字丸二錢少頃去燥矢二三次前症悉除遂投養血健脾之藥調理一月而安

易思蘭治王孫章湖壯年七月間秋收忙迫飢食二雞子酒數杯時因惱怒至暮風雨大作又當風沐浴夜半身熱寒戰腰背脊強胸滿腹痛醫用五積散發汗涼戰止惟頭額肚腹大熱又服柴苓湯半月不愈大便雖去不去每出些須即時作痛又用大黃下三五行病仍不減反加胃寒吐逆飲食入口即吐吐時頭汗如雨至頸而還四肢或厥冷或發熱大便一日二三次小便如常飲食不進者四十餘日亦不知飢形瘦日甚診之左手三部俱平和無恙惟大腸與脾胃脉俱沈緊按之則大時一結堅牢有力推之不動按之不移曰此氣裹食積也下之則愈先以紫霜丸二十一粒溫水送下二時不動又進七丸約人行三五里腹始鳴下如血餅者五六塊血水五七升隨腹飢索食以清米飲薑汁炒鹽少許一二杯與之神氣頓生次早復診右寸關脉豁然如左以平胃合二陳湯

日服一劑復用補中益氣湯加麥冬砂仁侵晨服六味丸調理一月而愈

張令韶治孝廉項恂如秋患傷寒用發散二劑愈甚又二劑神昏不語大熱診之六脉已脫急用人參耆朮各一兩附子三錢薑桂各二錢午後脉漸出更進六七劑而病如故更加舌腫唇爛渴飲湯水不絶（如何猶可入熟地）曰病是此病藥是此藥服之反甚得無誤乎細審不差又數劑仍如故十餘日總不能言其子終窾治曰藥已至矣病終不轉迨死症也更用八味丸全料濃煎六椀冰冷與之一日夜服盡舌腫消即能言語識人每日用藥一劑粥食數椀佐之以火肉白鮓鯽魚之類大便不行聽之將一月腹始脹食後更甚乃以參苓耆朮薑桂附煎汁去查加大黃二錢服後額上微汗出手足躁擾不安此正氣虛極也又與大料溫補一劑遂安卧夜間下宿垢半桶飲食如故後用溫補百餘劑而愈共用人參五觔餘附子三十餘枚後稍失調理便發熱脫落下頦直至次年夏間始康健（張氏三案皆用溫補此與陳婦皆唇舌咽喉腫爛案中亦不明指藏府一味含糊知其幸獲多矣）

錢泰菴同道也五月間患傷寒十餘日熱不退泄瀉一二次或用炮薑白朮等而瀉止忽發狂譫語大渴改

荊芥防風蟬退紅花筍尖連翹等更加昏讝欲飲冷水脉之散大斑色淡而隱隱不明曰此手少陰心之病也由勞心過度真火虛極神氣外浮故現此假症不可治斑少頃必發狂遂用人參者朮各三兩茯苓麥冬附子各六錢五味子三錢分作三劑煎未就果發狂人不能制服一劑狂如故再劑稍定三劑遂睡次日復進藥如初神清渴止斑亦不見連進二十餘劑每日晡尚有讝語數句幸粥食進而大便不行忽一日心中開亮如開窓見日然讝遂已乃曰先生所云手少陰心病果然也或問何以不用薑桂而止用附子曰乾薑入太陰肉桂入厥陰附子入少陰今病乃少陰君火衰微故宜用附子也又少陰下水上火而主神機出入凡病足少陰腎水者雖亥易愈病手少陰心火者治得其法間有生者否則十無一生何也心藏神腎藏精精者有形神者無形治有形易治無形難也

陳纘先長媳上年患虛寒之症張治之而愈次年七月間又患發熱惡寒之症診其脉虛用桂枝乾薑白朮等一劑次日更大熱反加喉痛腫連頸項腹大嘔吐不止再召診曰得毋薑桂太熱乎張曰余亦意其太

熱也脉之如初乃曰咽喉腫痛固屬火然亦有虛寒者吾不慮其腫痛而慮其大吐不止也可多請高明治之不愈再來名我彼見勢危即遍延諸公皆曰人雖虛固不可太涼然而熱藥豈可用乎俱用甘桔山皀麥冬人參之類隨服隨吐藥俱不受病轉劇復召張張曰諸公之論極是但此病却不然也初余所以辭者一則再用熱藥恐不信二則必有識此病能用温補者何必功自我出也遂用人參三錢桔梗一錢五分甘草柴胡桂枝乾葛附子炮薑各一錢下咽不吐少頃大寒戰覆以重綿不解更與二服復大熱數

刻隨大汗如雨睡覺而痛腫俱消後薑附者參术二十餘劑而愈

呂東莊治蔡氏婦病感症初服疎表降火清痰之劑半月愈甚胸脹痛用温膽湯及花粉瓜蒌痰反急用理中加肉桂延胡二陳枳殼痛結不可忍醫謂調補不應技窮矣呂曰調補固如是耶即理中氣入破氣之藥已能益痛至甘草一味若蚘動者便非所宜故仲景安蚘散去甘草加椒梅也病人果向多蚘結症（九病吐蚘便蚘多由肝火煎厥乃厥陰病故名蚘厥非結也）乃仍用理中湯去甘草加白芍三錢木香五分痛減半脉之細數甚口渴欲

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

飲水不能嚥進湯輒吐手足時冷時熱面顴嬌紅不
定體如燔炙此邪火內沸怒木乘土五陽火隨之上
燔下爍真陰龍雷飛越以藥嘔之陽格于外伏陰互
結而致（辭躁而多疵病）遂以大八味丸作飲與之曰得汗病
已黃昏服藥即少睡面紅即退為白頃乃索被曰俟
之汗至矣及三鼓煩亂異常至黎明診之脉緊數至
八九至曰汗已泊矣而虛不能發也急煎人參一兩
耆朮歸芍五味甘草為佐飲之汗大至曰未也次日
再服汗又大至如雨諸症頓愈或曰前之甘草不宜
服今兩劑俱重用何也曰初胃中氣血攻竭空虛寒
凝故蚘發而痛得甘則蚘愈昂上故不可今得濡潤
之藥胃氣冲和蚘頭下伏雖濃煎與之無害也法可
執哉（昔賢謂戰汗則不可與藥否則必胎後患今呂之治蔡婦勞婚二案何獨反是）

沈凝芝側室病傷寒壯熱不止疎散之愈甚神情昏憒
不寐呂診之曰此感症也然起于勞倦不當重虛其
虛即投以參朮等得汗神情頓清次用地黃飲子下
黑矢熟寐惟熱未盡退前方加炙甘草一錢即安繼
以滋腎養榮等藥調理復初

呂姊婿勞仲虎初夏勞倦致感寒熱口苦嘗用重藥發
散之復用查朴枳半花粉瓜蔞攻其中熱益甚痰嗽

喘急語言無序診知其誤急止餘藥重用滋水清金之劑一服痰喘漸退神情稍清次日脉之浮洪而數語急遽而收輕手指時作微脹曰此皆虛象也邪未嘗入陽明而先攻之傷其元氣邪反隨而入陽明矣重虛其虛愈不能鼓邪外出今雖稍定夜必發譫語當急以人參救之遞箋中所帶不多只用人參二錢黃耆一兩次日家人言夜來甚狂亂不安似不可救曰無妨參力不足故耳時鼓峯在邑拉之同往曰汗已至矣何慮為乃用參兩許仍入前藥進之或議參與痰喘譫妄相背乃曰無庸疑吾輩在此坐一刻待其汗至而別何如衆在猶豫間因出酒食過午舉杯未盡內出報曰汗大發矣是夜熱退痰喘悉平繼用補中調土之劑而起

林觀子治一人頭痛身熱體痛傷寒證也然舌乾燥（邪入裡未嘗不乾燥繆仲淳謂舌根不燥者其症輕非真傷寒也）好沈睡診之脉豁大無倫次知其勞于房慾復感邪也與補中益氣湯入人參一錢五分服之得汗熱減三日內進八劑漸起食粥而安初服彼甚疑後見藥入口必小汗熟熟周身和暢始信而服之（傷寒折衷）

劉雲密曰余于癸巳春因老人氣虛而春每有暴寒時

或冒之欲疎散而氣益虛遽投參耆而微寒更不去
將補益與疎散酌用又未能恰中用荔枝肉肥厚者
五枚煮酒一鐘屢服之頗效○又壬寅冬癸卯初春
余時因微寒胸膈稍滯鼻塞不暢用荔枝浸酒每飲
一杯入蘇葉陳皮湯十分之二服之及數杯無不捷
效是則丹溪所謂能散無形質之滯氣誠不虛也
吳孚先治魏司馬夫人感冒發熱頭痛項强遍身拘急
脉浮緊醫用羌防芎蘇等發散毫無汗意曰浮則緊
矣獨不按其沈則澁乎且左部尤甚灼見陰虛血不
足不能作汗也即以前方加當歸熟地血藥使雲蒸
而雨自降一劑汗如雨表症悉除
馮楚瞻治常侍衛據云感冒得之醫以發散繼以凉藥
已五六十劑粒米不進每日惟飲凉水而已下身寒
冷而木漸致胸腹皆冷而實手足面目肌肉痛痒不
知語言無音難以布息按其脉沈微欲脫令以人參
一兩附子三錢早晚一服服後倘暫有煩躁無慮也
既而果然二三日間漸即相安脉稍起肢體之冷亦
非若前之徹骨矣乃以附子理中湯去甘草（以胸腹實滿也）
早晚各一劑以温米湯壓之數日後冷減神氣稍清
早晨仍服前方午後以濃參汁冲服去丹皮加牛膝

杜仲之八味湯又數日骨節疼痛不堪曰此陽回冰解之象也無復慮矣後以八味加鹿茸虎脛牛膝杜仲為丸加減十全大補湯送之兩月後言語始有聲三四月後始能步履年餘始能鞍馬常患腹痛必服溫煖之劑而愈

杜中堂子年十九夏月病感脉之時而洪弦尺弱時而弦細尺鬱乍寒乍熱（脉隨寒熱而變也）飲食即吐靜則吐少減動則吐更甚詢其病由因偶雨冰雹駭而出視背上受寒發散和解不效繼用清熱之劑內有黃芩山屐服後即發嘔矣益暑天感寒中表之氣不固可知

況先天薄弱膏粱嬌養只宜溫中調理寒邪自散不知出此致寒鬱火升兩耳之下漸腫及頰又誤為實火濟以寒涼釜底之火既浮中宮之陽復損尚堪延納飲食乎今欲溫中開胃則耳頰之腫痛為礙（仍以參朮薑附奏效非溫中而何）欲滋陰培本則中脘之道路不通初用八味加牛膝麥冬五味大劑沖人參汁服下即吐改用人參炮薑附子為末以焦白朮熬膏略入薑汁和勻為丸少少參湯吞服幸不吐頃之腹痛大便知其下行吐可止矣次日仍以昨煎方作大劑人參湯飲之日用參兩餘出入加減漸愈後以地黃歸脾二湯

間服遂瘳

李士材治一人勞神之後煩躁大熱頭痛時作時止（便非外感）醫者禁其飲食與之解表見四日熱不退欲與攻裡診之曰脉不浮緊安得表耶又不沈實安得裡耶惟心部大而濇此勞心而虛煩乃類傷寒非真傷寒也（并非類寒宜曰此內傷非外感也）若禁飲食即餓絶矣便以粥與之無進歸脾湯五日而安

張三錫治一人熱而頭身痛七日不已擬是下症診之左脉浮緊且時惡寒仍屬表熱投大羌活湯加葱薑遂汗出而愈一人症同此多煩躁時值炎月與六神通解散亦大汗而解

張路玉治陳太倉夫人素患虛羸骨蒸經閉少食偶感風熱咳嗽誤進滋陰清肺二劑遂昏熱痞悶異常（凡素患虛損人忽有外感宜細審之）診之人迎虛數氣口濡細寸口瞥瞥兩尺搏指此肝血與胃氣皆虛復感風熱之狀與加減葱白香豉湯一服熱除痞止但欬則頭面微汗更與小劑保元湯而安

王氏子四月間患感冒昏熱喘脹便秘腹中雷鳴服硝黃不應脉之氣口弦滑痰按之則乱（瘀）其腹脹滿按之則濡（濕）此痰濕挾瘀濁陰固閉之候與黃龍湯去

芒硝易桂苓半夏木香下瘀垢甚多因宿有五更咳嗽更以小劑異攻加細辛潤之大抵腹中奔響之症雖有內實當下必無燥結所以不用芒硝而用水香苓半也用人參者借以助胃氣行其藥力則大黃葦得以振破敵之功非謂虛而羔補也當知黃龍湯中用參則硝黃之力愈銳用者慎之

錢慎所素有內傷因勞力感寒發熱頭痛表散數劑胸膈痞悶不安以大黃下之痞悶益甚更一醫用消剋破氣藥過傷胃氣遂厥逆昏憒勢漸危脉六部縈縈如蛛絲舌上焦黑燥凋異常此熱傷陰血不急下之真陰立槁救無及矣因以生地黃黃連湯去芩防風加人中黃麥冬酒大黃另以生地黃一兩酒浸搗汁和服夜半下燥矢六七枚天明復下一次乃與生脉散二帖以後竟不服藥日進糜粥調養而大便數日不行晬門迸迫如火令用導法通之更與異攻散調理而安

楊乘六治沈氏婦感症身熱口苦脇痛頭眩或以表劑發散身熱益甚舌黑唇焦口渴煩燥手足腫痛大便艱澁小便短赤寢食俱廢脉之浮數無序乃肝鬱致感因發散太過血少陰虛而火燥生風也以滋水清

肝飲倍熟地一劑諸症悉退次用歸脾湯去木香加白芍丹皮調理而愈踰年產後復因勞力致感乃恐踰前轍不敢發散一味養陰漸致大便不實飲食不進氣促如喘晝夜不眠合眼即見一白髮老嫗坐立面前胸中戰跳恍惚不寧仍邀診曰脫陽者見鬼非真有鬼也蓋陽氣大虧則神不守舍其所見者即其不守舍之元神也所以男病必見男形女病必見女狀且虧在某藏則某色獨見脉之浮取如絲沈則緩大無力面色晃白眼光散大舌胖而嫩且白滑此中虛挾感逼以寒涼致陽氣益虛而陰氣乘之耳乃與參附養榮湯倍棗仁白芍五味服訖則老嫗不見而熟睡矣繼用補中益氣加白芍五味數劑全愈（感症即類傷寒也亦無表裡然多內傷重而外感輕以元氣壯實者即感而易已也抑或渾施汗下消剋以致危篤諸家不無妙用而要以楊氏為最楊雖師承高呂要之青出于藍非虛譽也）

簡某病感症發熱飽悶神思昏沈不更衣者八日矣諸發表攻中不效且益甚脉之滑而有力面壅熱通紅氣粗舌胎黃厚而燥按其胸微痛此感症兼食俗名停食傷食也乃用逍遙散加熟地二兩或曰如許發熱又兼飽脹補藥可遽投乎曰此非補藥乃發表攻裡之劑用之以代麻桂硝黃者也（此法固妙要當用于發表攻裡之後）

第服此則汗至矣而便通熱自退脹自除矣一劑淋
漓汗下二劑下黑矢十數枚諸症悉愈或問其旨曰
此症初起本一逍遥合小柴胡養汗開肌助脾消食
則愈矣乃用風燥混表腸胃乾枯宿物燥結愈不能
出所以仍用逍遥重加熟地養陰使陰氣外溢則汗
自至陰氣下潤則便自通也繼用六君歸芍而愈

吳某病感症先微寒繼壯熱頭暈惡心吐沫不絶脹悶
嫩言氣難布息四肢麻木痠疼腰痛如折寢食俱廢
大便秘結俱屬感觸傷重之候醫與清暑解表消食益熱益脹
不時暈絶脉左手沈細右手緩大皆無力面晃白舌

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

胖嫩且白滑知其多慾陽虛致感也與養榮湯加附
子或疑熱甚脹而投溫補令但服此諸症自退若
再用芩連枳朴則真誤事矣一劑即卧醒則大叫冷
甚比及半時汗出如雨再劑胸寬食進便通熱退又
以兩腿外膪向生瘡腫循皮爛臭膿水淋漓痛痒甚
一切膏丹洗帖不愈已六七年問治當何法曰病有
內外源無彼此因陽氣素虧不能下達毒氣時隆
不宵上升故也第用前方作丸久服則陽分充足氣
血溫和而毒氣自出瘡口自收矣如言兩月愈

潘某自京回南勞頓感寒發熱時作微寒發散數劑熱

漸熾改用清火養陰數劑熱轉甚比到家舌胎已由白而黃由黃而焦乾燥裂黑如炭色神思昏沈手足振掉撮空自汗危症蝟集矣醫見其熱勢謂寒之不寒是無水也與六味飲不應見其舌色謂攻伐太過胃陰乾枯也與左歸飲又不應脉之左關尺細而緊右寸關大而緩舌浮胖謂症乃陽虛火衰非陰虛火旺也益陰虛火旺者其舌必堅斂蒼老今雖焦黑乾燥而見胖嫩且服六味左歸而症反加（反加二字毋乃太過）其為陽虛無疑矣以養榮湯用人參五錢加附子三錢一劑熟睡竟夜次早舌上胎盡脫變為紅潤滑嫩矣

原方減人參二錢附子一錢五分四劑回陽作汗愈

戴氏子年二十四病感症寒熱或用發散譫妄發狂又以苦寒下之危症蜂起又有用二冬二地石斛黃芩者五六劑益狂悸不安診之面白無神舌滑無胎脉細緊無力知其臟寒真陽欲脫以養榮湯用人參五錢加附子三錢又知其必為旁議所阻也囑其午後至申察病人足冷過膝則亥子之交不可言矣已而果然乃自戌至亥始盡劑子時後由腰至足漸溫五鼓進粥半甌而睡熟矣又十餘劑諸症悉愈未半月忽右足大指攣（大敦隱白所在乃肝脾二經發源之地）筋縮而痛外科

與乳香末藥痛劇呼號再診之乃因思慮傷脾人但不知謀慮又傷肝也不能榮養本經筋脉所以筋攣燥痛也以歸脾去木香加白芍數帖愈

陸氏子病感症發熱咳嗽發散轉甚氣短如喘痰涌如潮甚至譫妄撮空脉之輕按滿指重按則空面色晃白眼睛寬大神水散漫舌胎嫩黃中間焦燥兩手振掉症由氣虛致感誤用峻表致陰被劫而將亡陽無附而欲脫非救陰攝陽不能挽也乃用左歸去茯苓加人參五味大劑濃煎服訖即睡六時許方寤則身涼嗽止喘定痰消繼以生金滋水飲一劑養榮湯四劑全瘳○又其母嬭居卧病不起二載矣或作濕或作癆治之不效并乞診之脉緩大無力面色痘黃舌胖而滑詢其飲食不思畧食即飽夢中常見鬼神醒則胸中戰跳否其如所言此命門火衰元陽虛憊脾土不生以致四肢無力不能運動也亦用養榮湯煎送八味丸不一月而瘳

沈某病感症身熱自汗或乍寒倦卧嫺言手足心熱目輕夜甚或與發散愈熾口渴譫語煩燥便秘又襍進寒涼解毒等劑勢垂危脉之洪大而數按之不鼓面色淺紅游移不定舌黑而潤手足厥冷此假熱症也

與八味飲加人參諸劑以火症悉具力爭參桂附不可服曰外雖似實熱內甚虛寒初悞發散令津液傷而口渴便閉煩躁譫妄復用寒涼重陰下逼致龍雷之火不安其宅非人參桂附何以挽回公等不信但以附子作餅熱貼臍間時許便覺稍安矣外試法妙試之果然乃進藥不及一時面紅立退譫妄煩渴悉除次用生金滋水補中益氣調理而愈未半月其父亦病感症危甚延楊楊驗其舌黑而枯滿舌遍裂人字紋曰脉不必診也驚問故曰此腎氣湊心亦八味症也悞用芩連無救矣翌昨一日夜果服芩連兩許問何

以知之曰舌上明明現出耳姑求診以冀萬一曰脉隱難憑不若舌之顯而可據也何必診踰日果殁

諸某年五十四冬杪因勞力致感頭痛發熱時作微寒緣混表太過口乾便秘壯熱不退復用苦寒瀉火頭汗如油下頷脫斷口角流涎鼾聲如鋸語言錯亂甚至循衣摸牀撮空諸惡畢備脉之洪大躁疾重按全無舌糙刺如沙皮焦黃如烘糕并舌底俱乾燥欲裂如荔枝肉而滿舌却甚胖壯日進稀糊椀許大便半月未行乃曰若論外象百無一治幸脾氣不泄胃氣不絕尚有生理第服藥後神得收斂而睡脉得靜細

而洸乃佳遂以大劑養榮湯重加附子與之服訖果睡脉亦和四劑舌轉紅潤惡症悉退頻進稀粥惟交陰分尚有微熱或疑陽藥助火欲去者朮桂附曰勞傷脾肺氣虛發熱非甘溫不能除方嫌火力不及不能蒸土回陽推出陰邪耳俟其力到地氣升而為雲則天氣降而為雨頃刻為清凉世界矣守方十二劑始戰汗汗後身冷如冰問之不應推之不理或問其故曰此病既到今日斷然不死不過汗後虧其衛外之陽故身倦嬾言無氣以動子刻自平復已而果然次日欲便扶至圊虛坐努責數次忽小水癃閉點滴不能出少腹脹痛不可言此因大便彌月不行腸胃所積已多今頻加努責將宿物推倂大腸致壅塞膀胱所以癃閉不出也（妙解）須以輕清之劑升舉之則小水自利立煎補中益氣與飲頃刻即通大便亦潤繼以養榮作丸補中煎送兩月而健

馬元儀治沈某發熱惡寒頭身俱痛燥渴譫語脉之洪數而濇此外感而病危者以五志過極陰氣素虧邪復乘之重傷其陰而火熱愈甚也先與解肌一劑惡寒已而熱未除譫語轉增神魂飛越蓋肝藏血而舍魂心藏脉而舍神木火太過不獨自傷且賊真陰之

氣以肝腎為母子其氣相通也心本制于腎而亦傷腎者臟邪暴甚反侮所不勝也法當養肝之陰使不誅求于腎而水自充抑心之陽使不擾亂乎腎而水以安用生地知母甘草茯神丹參貝母花粉等一劑知三劑已調理而安

丁某病經二十餘日脉之左手弦數兼溢右手溢結少神發熱神昏譫語胸中滿結中痛拒按舌胎黑刺面色枯瘁時有喘咳日晡愈甚此肝木內鼓心火上炎肺金失養而胃土無滋也用瓜蔞枳殼半麴蘆根汁紫菀杏仁蘇子等服後倦卧片時神氣頗清右脉亦透但溢象不減重按少神舌上胎刺去而復生此津液元氣枯竭之甚轉用人參三錢生首烏一兩知母生地川連蘆汁兩劑脉溢減症漸安但胎未盡去中脘滯悶前方加枳實查肉一劑頓已改用滋陰補虛之品二劑諸症盡退左脉向和右脉轉浮而數微熱發疹此正氣復餘邪盡從外達也與荊炭牛蒡乾葛防風杏仁桔梗蘇子薄荷清透之品經云因其衰而彰之之意也二劑後再與益元氣滋陰燥調理而痊

一婦人四旬外頭痛發熱口乾便閉不眠已月餘矣此邪風外煽實熱內燔表裏邪結之候也前所用藥仍

是發表攻裡而不愈者藥不勝病耳今上下分消表裡交治而于攻發之中仍用溫養斯汗不傷於過下不傷于峻也用荊防薄荷麻黃輕揚發表使邪從汗而散于上大黃芒硝梔子滑石通幽利水使邪從便而泄之于下黃芩連翹清其上白朮甘草和其中桔梗石膏開其肺川芎歸芍養其肝一劑而減三劑而

安

安氏子年二十初得惡寒發熱身疼症診得內傷之脈而顯陽微之象曰此病枝葉未害根本先撥乃陽虛受邪症也若誤行表劑則孤陽飛越而危殆立至當用參朮等大培元氣以攝虛陽加桂枝透表以散外邪不信越四日發熱不休自汗不止神氣外揚或且欲用柴胡疎表之劑乃曰此症似太陽而得少陰之脈當是平素下虛故真陽上越耳遂定參耆建中湯而別或復謂外邪初入太陽表散即愈若陡進參耆遠助邪而滋患也越三日症變危篤再診脈幾微欲絕汗出如雨昏沈欲脫此非大劑溫補不能挽回以人參六兩合附桂理中湯連進三劑汗漸收脈微續然神氣尚未安和也復用人參三兩附子五錢方得陽氣內充餘邪盡從外達兩頤透發漸調而安

固屬虛而邪熱原有或與表散未嘗無功至汗出脈復弟與大劑養陰其病立已乃恣用桂附遂致發厥尚得為善治乎哉

楊氏子年二十許四月初以啖麵過飽午睡覺即身熱頭痛醫與消散至七日而愈兩日後因食水團復病仍與消運不應乃以小承氣下之連去糞水數次二劑皆無燥矢更醫與厚朴山查陳皮枳殼之類穀芽用至兩許月餘病不減而股肉盡落枯瘠如柴不食日進糜粥數盞寒熱往來小便亦少最後一醫教用膽箭導之膽入而糞不出又用蠟燭探之燭化而糞亦不出其膽汁與燭油凝注下部楚不可堪號呼之慘四隣為動時已四十餘日方治木邀診以決早晚察其脉弦而迫迢尚有神氣其聲尚明亮按其腹不拒至臍下若有物築築然振手解衣視之狀如百錢梗起其父曰此必宿食不下而然曰非也糞穢在腸豈能跳動此緣悞下悞消傷其本元肝腎之氣不藏橫亘奔突經所謂動氣是也幸屬少年尚可活熟地一兩五錢肉蓯蓉五錢甘杞子一兩麥冬當歸各三錢三劑下黑燥矢尺餘者二膽油俱去號呼頓息始得睡再按之則若百錢者仍在再與前劑不減令辦參數錢勉措十金僅得錢半煎調前藥服下遂泯然

立能進食唯寒熱每日一作知非本病必卧室湫溢
天氣暴暑乘虛感瘧也且勿亟仍與前方減半數日
後飯食大增乃以常山二錢火酒炒透五更前服寒
熱亦瘥

湯某年四十餘新秋病感冒醫屢發散至乂八日無汗
脉弦數且長身重頭眩尿少而赤舌乾不眠微熱而
渴此邪漸入裡腎陰不足肝脾血燥表之則不能作
汗下之必成壞症既非少陽無庸和解問欲飲水乎
曰甚欲而不敢飲命與一大盞猶覺未足再與一小
盞令且勿藥逾二時許汗大至身冷如氷亟再診脉
之虛細而弦少腹旁跳躍振手此動氣也緣多服表
散令汗出邪去而虛症見矣與生地杞子等峻養肝
腎一劑減二劑平三劑全愈

陳士華兄武生也值鄉試伊邇日與朋儕練習技勇忽
感冒醫治月餘不效脉之弦大而濇外症已不發熱
大便秘小便少兩顴深紫若胭脂腰痛口乾不欲食
所服藥類皆燥散之品此少陰不足勞傷外感治之
失宜熱邪內陷法當內托令其汗出自愈用熟地生
地杞子各五錢麥冬三錢萎仁二錢黃芩一錢石斛
三錢傍晚服下黃昏忽胸膈脹悶欲絕躁擾異常其

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

家大懟以為誤補必死矣怒持藥甌擲之門外環視涕洟一更後忽大汗如雨衣被沾濕汗止即索粥連進兩盞已而酣睡達旦明晨延診脉已圓滑頗赤亦退第困乏無力耳因問夜來脹悶汗出之故曰病由前藥斂其津液外邪乘虛內結今以大劑甘潤投之即借其熱結之力蒸欝勃發乃一涌而汗出邪散此所謂內託之法也今再方再服四劑病即起矣如言而愈

李韞玉母年逾四旬素有脇痛肝火之病深秋感冒醫與表散數劑熱猶未退以不大便投大黃元明粉下之遂脇痛大作暈厥欲脫更醫用人參附子乾薑肉桂等厥止復煩躁汗時出不眠小便短澁醫恐虛脫日投參朮薑桂每汗出則加五味黃耆龍骨以斂之又時時欲利則加補骨脂肉豆蔻以固之如是四十餘日已服參數兩病益進而食不進診之脉躁數時大時小微有寒熱舌黑而強鼻煤溢出塗顴頰唇口如墨小便惟點滴兩手索刺如柴弟神氣不昏語音猶亮此由表邪未清誤下邪陷入裡且傷其真陰致肝急而厥又誤投辛熱固澁令熱邪與熱藥欝結臟腑今幸元氣尚存猶可活也治法仍當汗下否則邪

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

何由解正何由復或詢曰是症寧可再用攻表乎曰不可第可用不攻表之汗下耳疏方以生地杞子各五錢麥冬二錢沙參三錢萎仁一錢五分黃芩一錢或謂前醫深恐泄瀉今所用藥一派寒滑服之必利下無疑將弗服又或曰前醫治經月餘且辭不治曷進此以窺進退服一劑果利數行然病人殊不困遂日進一劑四日則利下頻數腹痛後重日夜十餘次所下穢惡不堪青紅黑白而黃者絕少唯飲食漸進舌本漸柔鼻煤漸退小便漸長仍前方加熟地五錢黃連五分夜乃汗出其汗亦極臭穢半月餘汗乃止

利漸減乃加生熟地至一兩減黃連增白芍甘草凡五十餘劑病始瘥計服萎仁斛許

姚氏婦年逾四旬素有胃痛（痛）蓋肝火上逆也夏日患感冒發熱頭痛眩暈不眠善嘔初服發散未減改以二陳左金治嘔嘔未愈而腰連少腹痛不可忍議為邪入厥陰症將危始欲用四逆回陽之劑診之脉微數而弦手見紅疹面殊清白舌兩旁及尖皆紫色中則微黃口乾不甚喜飲斷為肝膽之火熾盛遇暴寒折之不得宣洩乃上冲胃絡作嘔故頭痛偏甚於左紅疹見於四末者木鬱則乘脾也其初與逍遙自愈乃

用燥散之劑更擾其陽而傷其陰是以腰腹窘痛症
本厥陰然非傳經亦非直中也今標屬陽明宜用竹
葉石膏湯入杞子一兩飲下嘔止腰腹之痛亦除唯
頭痛仍在改與逍遥湯加川芎當歸時方霉雨至夜
半忽霹靂一聲病人覺四肢疲脹異常此少陽之欝
本諸外淫因雷得發越也已而頭痛如失次日診之
脉既和平與四物去川芎加女貞石斛平調而愈余
表甥嘗病疫因熱深厥冷一名醫亦與四逆散幸而
病人自知為熱症不之服用小柴胡合白虎湯而愈
宋復華兄俞氏姊初夏病感症天癸適來病隨愈益熱

隨血去也越七日遇端節食雞子五枚酒二盞又進
飯半甌臨窗少坐少頃即頭痛發熱次日前醫詢知
病原以山查三錢穀芽三錢葛根三錢其他消散大
約稱是連進三劑勢忽大劇亟余至則前醫已在與
一隣醫議處方診之已昏不知人事面色死青呆白
目閉口張氣出手撒呼之不應脉如沸羹重按則無
症已敗矣幸未大汗令人以手按其心下亦不拒知
其病初愈臟腑餘熱未清食入腸胃一時不能運化
又感微邪遂如復症使勿藥則展轉自愈乃誤以大
劑消散投之元虛血弱之人鼓動其火反致長熱不

退猶以為藥力未到再進三進至陰陽脫離如是叩
其今日將用何方則云總是雞子五枚硬飯半甌為
患既消散不應唯有承氣一方下之而已曰承氣固
是第真元已奪恐宿食未下而遽脫柰何乃曰正為
此耳曰余有一方且弗顧其病但服之令病人目開
口閉神氣稍回再為調治二醫欣然齊諾乃用熟地
一兩六錢當歸五錢炮薑八分屬其急煎服遲則不
及第得藥下咽則必活矣抵暮來告病者不知飲藥
以匙抄灌數口喉間汩汩有聲遂全盞傾與少頃果
目開口閉能轉側似大有生機求再往診曰無庸但

以前方再劑并前查濃煎與服可也明日視之
神氣清明脉亦圓穩第稱口燥舌乾小便短澁夜卧
不寧就前方去炮薑加沙參麥冬一服汗出遍身能
進粥矣再以前方加減而愈

續名醫類案卷之六

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷七

錢塘魏之琇玉橫撰

傷風

孫文垣治王祖泉乃眷朝飯後稍寒惡風發熱傷風惡風遍身疼痛汗大出不止傷風則有汗口中熱腹中不知餓小水短肺氣不利而汗多也六脈皆濇不營衛和投以白芍五錢白术二錢桂皮黃芩各一錢甘艸八分二帖汗止寒熱除去白术加當歸身痛亦愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

費一吾六弟婦遍身痛發熱汗大出昏如醉卧不能起孫診之兩寸短弱六脈皆數而無力此勞倦之餘故汗大走也身痛發熱乃屬傷寒黄耆三錢白芍四錢甘草一錢五分桂皮八分當歸一錢石斛二錢與前柴俱就減孫于襟疤多一帖熱除痛汗皆止惟倦不能起前方加用此方

人參陳皮兩帖而瘥

一婦人先傷風發熱咳嗽二日乃分娩熱出未退食雞汁肉等太早嗽熱愈盛已八日矣胸膈脹痛頭痛口渴大便秘肺金壅而也咳出之痰色黑而臭小水短少喘不得卧右脇不能著席汗出不止疤甚危以瓜蒌五錢薤子一錢枳殼酒芩各六分前胡桔梗各五分甘艸三分薑三片製方甚妙服之胸膈痛減半喘稍定再進前藥大便用蜜棗調不能用大劑生地乃此熱盡退諸疤尋愈

胡鏡陽尊堂年七十二脾泄十五年不愈近加吐紅咳嗽爽多爽不易出肺金壅滿可知申酉時潮熱胸膈壅塞不能就枕飲食大減且惡風終日坐幔中諸醫謂發熱吐紅法當寒凉脾泄多年氣虛老蓐法當温補二疤且身熱脈大血家所忌束手無策皆矛盾難於投劑且身脈皆浮洪而數皆帶滑據脈洪數離去孫診之兩手

為熱滑為痰浮為風邪在表以傷風故惡風法當清解可無慮也謂二病矛盾者暗于先後者也夫脾泄已久未嘗為害新病熱熾宜當速去所謂急則治標俟邪去復補脾未晚且潮熱為風邪所致之熱非陰虛火動之熱吐血乃當汗不汗之血非陰虛火動之血經云奪血者無汗奪汗者無血當汗不汗邪鼓血動但得表解熱退血自止耳胡曰昔老母過錢塘遇風濤受驚因發熱咳嗽血出痰多令以公言膏之誠由風邪起病也用蘇子前胡麻黃薄荷解表為君枳殼桔梗桑白皮瓜蔞紫菀貝母消痰治嗽為臣酒芩

甘草為佐二帖五更微汗而熱退胸膈不壅嗽亦少減血止大半始進稀粥次日減麻黃加茯苓夜服七制化痰丸嗽又減半自是不惡風而去慢矣前方去枳殼加茯仁調理而安

黃履素曰余弱冠患傷風不遠床第每晨起即鼻重流涕竟日痰不絕口嗌連月餘遂見痰中緌血遺害無窮醒結成勞蓋金水二藏情關子母金病則不能生水子瀉則其母愈虛水不能制火火乘金而金益敗此勞嗽之症所由成耳信乎傷風雖小病最不可不慎者故補脾保肺乃養生家第一義而

肺病極宜斷色慈相關相應捉手影響

又曰余臨場慮不耐風寒合玉屏散服之風反自汗津不止益防風與黃耆各等分之謬也本艸云黃耆得防風其功愈大用黃耆七分配防風三分斯得之矣（九傷風未經和解此方斷不可服慎之）

喻嘉言治石關曉傷風咳嗽未嘗發熱自覺急迫欲死呼吸不能相續診之見其頭面赤紅躁擾不歇脉亦豁大而空謂曰此症頗奇全似傷寒戴陽症何以傷風小恙亦有之急宜用人參附子等藥溫補下元收回陽氣不然子丑時一身大汗脫陽而死矣渠不以為然及日落陽不用事愈慌亂不能少支忙服前藥服後稍寧片刻又為床側添同寢一人逼出其汗如雨再用一劑汗止身安咳嗽俱不作詢其所由云連服麻黃藥四劑遂爾躁急欲死然後知傷風亦有戴陽症與傷寒無別揔因其人平素下虛是以真陽易於上越耳（傷風而服麻黃至四劑即壯實人亦不能無害矧下虛者哉○此人既為麻黃所誤大傷肺腸幾成脫症喻君以參附治之即收一時之效後必不起此弦外之音淺人不足與道也）

盧不遠治嚴忍公內人病發熱無汗（傷風亦多無汗）嘔吐不止脈反沉弱（傷風脉當浮今沉故曰反）人皆以為少陰症盧脉之沉弱中猶石關表弦而中滑益風邪挾胃中水飲停積

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

所致用乾葛半夏吳茱黃連急煎緩服嘔吐遂止而熱轉盛復診視脉勢欲浮命其進粥旨不敢予再三強之呷濃米飲半杯遂有汗而熱平再進薄粥汗多而熱退乃問曰風寒之邪世俗大熱飲食今啜粥而熱退何也曰風之與寒原自有別世益涵之耳仲景桂枝湯治風服已啜粥古人之精義也蓋風者木也木剋土脾胃受之仲景治法妙在不治風木直欲濕土氣行而風木之邪自散今熱轉盛而脉勢欲浮是風邪欲散也非穀氣揚益則胃力孱弱汗何從來是借桂枝之義以除風邪之不能汗者按傷寒及感症日久津液既枯不能行汗必得大劑三才一氣湯一服乃蒸變為汗而愈若多服風藥及香燥者藥入必大作服一二時許然後來蘇後賢以此為內託之奇予謂仍是仲景啜粥法耳後人安能越古人之範圍我○已丑九月二十四日注

吳孚先治盧歛菴署月傷風服羌防發散汗出已愈後復感冒又用發散旋愈旋感前藥不應吳曰屢散不愈肺氣已虛徒攻表而不微表風邪不虛而入無已時矣方用君黃耆五錢實肺氣以固衛佐防風一味助耆力以祛邪玉屏風散如是則舊邪無少容而新邪無可入也二帖而痊愚謂傷風一症殊非小恙有寒燠不時衣被失節而成者此必鼻塞聲重咳嗽多痰在元氣平和之人即弗藥自愈有等腎水素虧肝火已然不過因一時風寒所束遂作乾

咳嗽痛此外邪本輕內傷宜重醫者不察緩與表散致鼓其風木之火工夫反令發熱頭痛繼又寒熱往來益與清解不至十劑肝腎與肺三藏已傷損無遺久者周年近者百日遠然逝矣而世俗談者咸以傷風不醒便成勞為言噫彼勞者豈真由傷風而成也卯愚哉言也當易之曰傷風誤表必成勞耳○己丑九月廿四日黃氏信筆書

柴嶼青曰乙丑新正張妹婿家人之婿董四患傷風咳嗽來寓求診即決其不治內人曰彼少年粗人傷風小病何遽若此柴曰脉象已敗不可為也後果殁此肝腎大傷之候也

張三錫治一婦人傷風自汗發熱不止自以為虛服補中益氣湯熱轉劇之脉弦而長寸有力與升麻葛根湯倍白芍加桂枝少許一劑汗止熱盡治法彙

一人瀉而左脉浮急自汗鼻塞乃傷風作瀉也與五苓散加防風白芷升麻葛根薑葱煎服全上

陸肖愚治吳邇齋夫人年六旬外素有脾泄之疴三月間患咳嗽吐血痰多而咯之不易出日晡潮熱胸膈支結不能就枕畏風畏寒或以脉數吐紅身熱咳嗽皆血虛火盛也此與孫柴胡陽毋同與養血清涼疴不減而脾泄頓甚或以高年久瀉豈宜清涼與六君子湯泄未已而痰壅益加遂以吐血不宜身熱脉數一以泄瀉不宜身熱脉大俱弊不治脉之左寸關浮洪右寸

關滑數兩尺弱此表邪不清也益脾泄乃宿疾吐血
乃表氣之鬱耳詢之果受風數日後而病作用炒黑
麻黃蘇葉前胡解表為君杏仁蘇子陳皮利氣為臣
桑皮片芩花粉石膏清熱為佐甘草桔梗散膈和中
為使二劑即微汗疹頓減去麻黃蘇葉石膏加白芍
茯苓二劑疹如失與丸方治其脾瀉人參白朮茯苓
為君白芍霞天麴為臣炙草乾薑砂仁為佐棗肉神
麴糊為丸以為使數旬而痊

陸祖愚治陳理刑因勞頓後頭疼鼻塞咳嗽胸膈不利
咽乾身熱行動即有微汗有疾不能咯出兩寸浮弦
而數左關弦緊右關弦滑兩尺平和先用疎解利氣
二劑斷加入蔘與二劑二三日間諸疹頓愈

薛立齋治一婦人素清苦勤于女工因感風邪自用表
散之劑反朝寒暮熱自汗盜汗形氣虛甚其脉或浮
洪或微細其面或清白或痿黃此邪去而氣血愈虛
也用十全大補湯三十餘劑漸愈又用加味逍遙散
兼治半載而痊

林觀子治一婦人浴後被風遂自汗出身熱然無頭痛
體痛惡風諸疹向日來祟治皆不效其胸以上瘡膈
漸至湯飲到喉而出脉之關以上微浮此瓜蒂散疹

也其人表虛與桔梗蘆一兩煎服到咽一吐悉涎濁
酸穢之物又與一服再得吐始快然熟遂除調理數
日而安

馬元儀治毛氏子傷風咳嗽頎以飲食起居失調遷延
轉劇診之面色枯白夢泄不禁飲食減少喘嗽發熱
兩脉虛微知其喘為真氣上脫熱為陽氣外散不與
陰氣純虛者同面色枯白脾肺氣虛而不榮也飲食
減少胃氣弱而不化也夢泄不禁腎藏氣衰而不固
也此皆本氣為病用人參二錢黃耆三錢肉桂五分
炙草五分茯苓一錢半麪一錢橘紅八分服之數劑
喘漸平熱漸退隨與大造膏調理飲食進而神旺如
初

朱翰文偶患風寒小疾或以麻黃大發其汗汗出不止
遂致語言短怯神氣不收面色枯白時有寒熱已瀕
危診其兩脉微濇而虛則氣少濇則陰傷此元氣津
液兩傷之候也傷風小疴何遽至此益以麻黃辛甘
氣溫為傷寒發汗重劑今則不當用而用之不特叔
其津液外亡并元氣亦因之內脫矣治法宜陰陽兩
補用人參製首烏茯苓丹皮甘艸廣皮半麪等
三劑脉象有神諸疴漸已漸加耆朮而安

劉雲密曰丁酉臘人病頭痛惡風鼻出清涕兼以咳嗽痰甚一時多患此用冬時傷風之劑而愈者固多然殊治者亦不少蓋是年君火在泉終之氣乃君火客氣為主氣寒水所勝經曰主勝客者逆夫火乃氣之主故雖不同于傷寒之即入經然寒氣以逆而上行反居火位火氣不得達矣所以雖同于風投以風劑如羌活葛則反劇蓋耗氣而火愈虛也至如桂枝湯之有白芍固不得當即桂枝僅泄表寒不能如麻黃能透水中之真陽以出也故愚先治其標用乾薑理中湯佐五苓散退寒痰寒水之上逆乃治其本用麻黃湯去杏仁佐以乾薑人參川芎半夏微汗取汗守此方因病進退而稍加減之皆未脫麻黃但有補劑但有句模糊不取汗矣病者乃得霍然

聶久吾曰一友以醫自負稟性素熱憤服涼藥在京朝覲因傷風火嗽求方于余曰咳因風寒必先除寒邪而後可以清熱先用桑杏麻黃防風等彼自是已見以為素不用燥藥卑用厄荅花粉等涼劑服多一日聲啞不出復求治乃戒之曰公能任吾意用藥勿參己見則聲可立出若必自用不敢語聞彼不得已而聽予因與加味三拗湯一劑未畢而聲出矣杏仁

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

二錢五分麻黃二錢生甘艸五分羌活桔梗各八分
防風一錢生薑三錢水煎帶熱服
孫敢夫女十歲許冬月感冒微嗽喘科與發散太過反
致長熱不退更醫投六君子加炮薑五味一劑熱退
矣而咳嗽轉甚下利頻併裡急後重中有白濃醫以
熱退為藥對症再與之則面赤口燥惡食不眠余適
診其大父因求視脉之虛而駛曰四劑可愈然必少
衄血與生熟地杞子各四錢天冬冬萎仁各錢半乃
詫曰令病已洩瀉又從而滑利之則宜不增劇余笑
曰弟服之病自減乃姑進半鍾覺咳利稍瘥遂連進

二劑果愈四五再以前方加酒芩酒芍各一錢二劑
衄血小盞全安或問故曰兒稟素弱所病即俗名火
傷風也不治亦愈乃以荊防廣半芎蘇前桔諸燥竈
鼓動其三焦之火至陽擾而熱盛後醫謂虛是矣宜
以甘寒潤澤之則疫自平乃用六君燥補加之以炮
薑之辛溫五味之酸斂雖藉人參之力而熱退其內
熘之火盡入于肺若傷寒傳裡然肺熱甚則下迫大
腸而為利矣其中白膿乃燥金壅熱所化與痢疾正
同奈但餐其榮氣潤燥清熱病自愈也又問何以知
其當衄曰初時下利則火從下泄利止鮮熱反走諸

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

暑

許叔微治一人頭痛心熱煩燥渴診其脉大而虛授以白虎湯數服愈仲景云脉虛身熱得之傷暑又曰其脉弦細芤遲何也素問曰寒傷形熱傷氣蓋傷氣不傷形則氣消而脉虛弱所謂弦細芤遲者皆虛脉也仲景以弦為陰朱龐亦云中暑脉微弱則虛可知

醫案當以許公為古今第一

絡而上溢否則灼鬱五味之性何由消釋其亟也亦猶傷寒陽明熱邪得紅汗而解耳

國立國會圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

張子和治小鄭年十五田中暑頭痛困卧不起張以雙解散汗之又以米醋調湯投之未解薄晚又以三花神祐丸大下之遂愈

張叟年七十一暑月田中因飢困傷暑食飲不進時時嘔吐口中常流痰水腹脇作痛醫者概用平胃散理中丸導氣丸不效又加針灸皆云胃冷乃問張曰疾屬胃熱不收故流痰水以公年高不敢上涌乃使一筋探之不藥而吐去痰涎一升次用黃連清心散導飲丸玉露散以調之飲食加進惟大便秘以生薑大棗煎調胃承氣湯一兩奪之而愈

萬案齋治熙丞李天泉六月中暑腹痛渠有婢妾醫謂
病寒進理中湯一劑痛止乃發熱一身骨節盡痛又
進十神湯發汗熱退身不痛矣萬候之李稱病愈觀
其面色帶赤知病未解請脉之洪滑而數已脉相對絰曰
大則病進今汗後脉猶洪數病方進也而彼自稱愈
萬去未食頃而病作矣滿腹急痛狀如奔豚上下左
右衆手按摩亟萬至曰汝先診脉不言而去知我病
也幸急救我萬曰無傷乃進建中湯一服而痛定次
日有省察官萬朴來問疾朴善醫診之且驗且頌李
亦起懼萬診之謂朴曰汝怪其脉之促止乎蓋心下

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

悸忡故脉如是耳李即應曰我心下跳亂不寧即命
取藥方用人參麥冬甘艸白芍生地五味猪心煮
湯煎一服心跳至脈不促矣蓋心惡熱用熱遠熱向
服理中十神皆犯時禁故病復作也
李少華知醫六月得暑病服九味羌活湯一劑汗出不
解謂葯劑小發汗不透復作大劑服之汗大泄而熱
轉甚連進三劑病益亟如癡如狂舌強語言塞澁手
足掣動小便不利莖中痛以手捏之纔下一二點不
能飲惟飲水萬脉之微弱而遲或問病可治否曰壞
病也醫之過耳心惡熱壯火食氣方盛夏火氣正

壯而重發其汗亦之過多則傷心亦藏神如狂如癡者神氣亂也（非畜血）舌內應乎心汗多則血虛不能榮舌故強不能言也手中掣動者汗多筋惕肉瞤也（非中風）渴飲水者汗多津液枯（非陽明發渴）小便不利者心移熱于小腸小腸移熱于膀胱津液少而氣不化故莖中痛而溺不出也（非水畜淋秘）乃用人參以補元氣當歸生地以養心血麥冬助人參以利竅使溺得行助生地以入心安神炙甘艸以瀉火生甘艸梢以去莖中之痛連服五劑而愈汪懷江中暑復傷食一醫用五積散發其汗熱轉甚一醫用大柴胡下之熱既不退利又不止且後重萬診之其脉浮數而滑外症喜裸體而卧膚燥無汗兩足冷曰前醫之誤汗不出反增反熱後醫之誤下之輕下未盡而利為挾熱急則治其標用黃芩甘艸白芍作湯一服而利止復診其脉浮滑而數未改也蓋此病屬陽明原無汗症因誤汗而成可汗之症而有下法因輕下而立再下之法方今盛夏氣熱乃用五積散燥熱之劑陽氣外散陰津內竭陰弱陽強故皮膚燥而無汗當先養其陰以制其陽使汗出而表和遂以涼膈散去大黃芒硝加知母淡豉石膏竹葉一服

國立國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

微汗出而身潤矣方議下之又一醫至稱是陰虛火
動不可下也用四物湯加炒乾薑鼈甲動陽明之火齒
縫出血足冷成陽厥矣乃復作涼膈散服之利三行
而病殆

龔子才治一婦人暑月因厨房熱極遂出當風處脫衣
乘涼即頭痛發熱惡寒身痛醫誤為傷寒用附子理
中湯一服下咽立時不語口中無氣唇口青紫心頭
微温診之六脉洪大而數此熱疫誤用熱藥令以燒
酒噴其胸前將鏡撲之（外治妙法）更以新汲水入蜜用雞
翎沃入其口數次少頃患人即伸舌探水以益元湯
灌下即活

李士才治張邑尊令郎六月間未申時暈絶不知人更
餘未甦此得之生冷太過也皂角末吹鼻中無嚏舉
家驚惶教以皂角灰存性新汲水灌之更取沉檀焚
之俾香氣滿室以達其竅及子後方甦服十味香薷
飲而安

吳孚先治一人奔馳烈日下忽患頭痛身熱或時煩躁
汗大出大渴引飲喘急之氣服香薷飲尤甚此暑症
也然受暑有陽有陰道途勞碌之人所受者炎暑名
曰陽暑停館安逸之人所受者寒涼名曰陰暑所謂

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

動而浔之為中熱靜而浔之為中暑也香薷飲只宜于陰暑若陽暑服之反為害矣與人參白虎湯而愈董仲仲當暑天納凉飲冷忽頭痛發熱霍亂吐瀉煩躁口渴舌胎白滑此陰暑也浔之過于寒凉致周身陽氣為陰邪所逼宜香薷之辛熱發越陽氣散水和脾四劑而愈

一婦姜婦夏月貪凉飲冷胸前如有一團之火冷水凉茶入咽覺從火團上分流而下目則羞明畏火口臭閒瀕出火氣診之六脈俱陰舌苔青紫而滑吳曰此寒格反見熱化也與乾薑肉桂温散少加黃連為向導移時覺胸中之火氣頓化清凉而愈

張文桓治弟淑南額痛遍身疼口燥舌苔黃厚左脈浮大六部俱數時當仲秋初旬以小柴胡合白虎湯加羌活熱不退下午用六神通解散以葱湯調服三錢熱稍退至半夜後又復熱額痛顛頂尤甚舌根黃且焦黑小水赤痛煩躁不睡遍身又痛此三陽合病暑疫也次日以小柴胡大加石膏為君藥本白芷竹葉粳米生薑大棗少頃汗出至足必至足乃為正汗熱始盡退猶煩躁不睡仍以小柴胡湯加桂枝山厄竹茹竹葉飲下遂愈

張路玉治內兄頎九壬大暑中患胸痞顫漲脉浮虛大而濡氣口獨顯滑象此濕熱泛濫于膈上也與清暑益氣二劑顫漲止而胸痞不除與半夏瀉心湯減炮薑去大棗加枳實一服而愈

范文學孫振麟于大暑中患病厥冷自利六脈弦細乳遲拗之欲絕舌色淡白中心黑潤無胎口臭氣息微冷陽縮入腹精滑如水問所起之由因卧地晝寢受寒是夜連走精二度忽覺顫漲如山坐起暈倒四肢厥逆腹痛自利胸中元氣欲吐口中喃喃妄言與濕溫之症不殊醫者誤為傷食感冒與發散消導一劑

服後胸前頭項汗出如流背上愈加畏寒下體如冰一日昏憒數次此陰寒挾暑入中手足少陽之候緣腎中真陽虛極所以不能發熱遂擬四逆加人參湯方用人參一兩熱附三錢炮薑二錢炙甘艸二錢晝夜兼進三日中連進六劑決定第四日寅刻回陽是日悉屏薑附改用保元方用人參五錢黃耆三錢炙甘草二錢加麥冬二錢五味子一錢清肅膈上虛陽四劑食進改用生料六味加麥冬五味子十錢每服用熟地八錢以(救)下焦將竭之水使陰平陽秘精神乃治申玆祐觸熱過梁溪歸而晾暈麻瞀發熱便秘服黃連

香薷不應用涼膈散便通或時昏晾不省或時四肢清冷而晡時為甚診之脈弦細而乳此暑傷心也陽氣鬱伏所以有似陰寒也與生脈合保元清理肺胃則包絡自寧矣

紫嶼青治陳忍之患病醫以溫散之藥投之遂至徹夜不能合眼時見鬼物兩脈沈伏疝屬受暑用加減清暑益氣湯去人參一劑勢減六脈俱現洪大再服六一散數劑而病退惟夜間尚不能熟睡遂以滋補安神之劑調理而安

壬戌夏五營繕朱載常早間入署與中暍吐昏憒遺尿醫以中風治開附子理中湯加殭蠶後又兩脈以數指危篤也極參附尚少恐難挽回柴曰此暑風也脈無死象力保無事伊同寓水部錢築岩不信急煎前藥將進幸柴中朱汝能進以六一散一服神氣稍定錢雖不知醫固知六一散之興理中湯冰炭因停前藥次日遂以黃連香薷飲加羌活治之調理數日而康

陸祖愚治一人七月間因構訟事腹中飢食冷粥數椀少頃即吐出自此茶飲皆吐頭痛身熱咽喉不利昏冒口中常流痰涎醫知為中暑用冷香薷飲投之隨

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

吐又井水調益元散投之亦吐昏沉益甚脉之陽部洪数無倫陰部沉微無力此邪在上焦在上者因而越之此宜吐者也蓋飢餓之時胃中空虚暑熱之氣乘虚而入于胃胃熱極而以寒冷之水飲投之冷熱相反所以水入即吐即吐即口中流涎亦胃熱上溢之故也因用沸湯入鹽少許麄汁數匙乘熱灌之至二三杭不吐至一時許方大吐水飲與痰涎同出約盆許即以生脉散投之人事清爽諸症頓減又合四物調理而安

張紹浦治一人暑月患頭痛身熱昏睡大渴引飲衆以感冒治不效診之脈大而虚曰此暑疫也即令撒慢開窓前後左右各置涼水頓覺清爽仍令二童舁以西瓜取其便連飲四五鍾即愈

張鳳達為諸生時萬歷戊子夏患暑疫勢極氣索昏然自憤庸醫以為內傷或以為勞役中折不堪自持徽醫汪韞玉適在旁感然曰心煩面垢此暑疫也何多揣聞者皆駭其名予于昏中微解依之服益元散二劑而蘇仍調以香薷飲數劑而愈

李無垢治朱竹垞夫人病熱七日不汗後七日又不汗踰二旬矣諸醫皆云傷寒不可治請辦喪具朱乃要

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

李徒步登閣診視無垢笑曰君夫人所居之閣四面俱以木圍之木生大觸暑木脉伏耳臟腑無他恙也亟以甘瓜井水投之可不藥愈從其言越宿而鋪廉再宿主中饋如故（曝書亭集）

薛立齋治文選姚海山中暑頭痛發熱氣高而喘肢體倦怠兩手麻木謂熱傷元氣用人參益氣湯加麥冬五味而瘥

昔有人暑月深藏不出因客至坐于窻下忽以倦怠力疲自作補湯服之反劇醫問其由連進香薷飲兩服而安（萬密齋養生四要）

馬元儀治陸太史時值秋暑偶發熱頭疼診得脈大而虛謂中氣太虛非補不克彼云傷暑小恙況飲食不甚減起居不甚衰何虛之有但清暑調中去邪即已何用補為乃勉與清暑益氣而別明晨復診之脈大者變為虛微發熱如故曰今日不惟用補更當用溫宜亟服之遲則生變矣遂用理中湯服下少頃汗出如涌泉午後復診兩脈虛微特甚汗如貫珠乃連進人參四兩附子兩許兩日夜約用人參十兩附子四兩汗止精藏漸調而愈

任邱裴在澗棄家逃禪持戒茹素遍遊五岳足跡幾遍

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

天下偶客金壇寫西禪寺僧舍酷暑中坐卧小樓日持準提咒三千念佛號三萬未是俊物忽患頭痛如斧劈身熱發燥口乾日飲冷水斗餘渴猶未解自分必死莊斂之憐其旅病時過視疾一日急走倉頭召斂之永訣以所携書画玩器盡授斂之泣而言曰未嘗得道兄其為我收藏吾死後切勿用世俗禮塟我惟以兩缸盛吾尸其中以三尺地埋之耳斂之第泗填胸束手無策余此時遊梁溪陽羨間斂之命余僕克勤相追歸視其脉知係受暑為疏竹葉石膏湯方斂之如方製藥躬為煎服不二劑熱渴俱止幾十劑病始退旋加健脾藥十餘帖而安

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

廣筆記

鋪排點綴其實與醫案無調姑仍其舊以見後人之陋○

來天培治蔡氏女病經六七日時七月初旬發熱頭痛腰疼胸滿煩渴目閉神昏時有獨語脉浮細而數按之膜糊問魯手足抽掣乎曰然曰此俗所謂暑風傷寒也用香薷青蒿羌防枳桔秦艽鉤藤葛蒲夏麴囊香柴胡黃連一劑疙瘩減神漸清脉略和前方去羌活葛蒲枳桔香薷加廣皮厚朴花粉丹皮一劑漸安惟熱未盡退此津液不生之故耳改用生地麥冬茯苓花粉黃芩石斛廣皮穀芽夏麴又二劑全痊

沈明生治王明甫長夏神昏不語伏枕信宿午前往視
曰脉虛身熱此中暑耳非風也昌不用參其長君曰
早間一友因用參而轉增煩懣問用幾何曰五分曰
宜其轉甚也當四倍之乃克有濟耳乃瞑眙不信因
曉之曰凡參多用則宣通少用則壅滯今病正合東
垣避暑于深堂大廈浔之者屬陰且古人用清暑益
氣人參白虎生脉散等方皆中暑門中要劑俱有人
參又何慮之有乃殊不信復理喻再三乃終不信欲
辭去而阻于暴雨强留午餐因再謂昌不就此時如
議進藥脫有不安不用法立解也于是勉從以進猶

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

惴〻焉惟恐增脹既而殊寂靜逾時神思少清間吐
一二語始用參不超調治浃旬竟得痊愈（語殊可笑然非是不能使之決意）
陳子佩治一婦人八月間發熱譫語不食又不大便諸
醫皆以為傷寒始而表繼而下俱不應延至五十餘
日投以人參熱稍減參少則復熱于是益超其虛也
峻補之然不便不熱食如故診之六脉平和絕無死
狀將謂傷寒無五十餘日不便不食而不死之理閘
病者夏月治癘往來奔走必是中暑無超誤以傷寒
治之又投以人參補劑暑浔補而愈不解故至此耳

當與六一散以涼水調服病者欲之雖多與不妨服
已即睡二即便二即後思食數日愈沈致曾抄本録之

吳楠治吳鴻臚妻年三十形故肥當暑而餐如常詰朝
不起啓視之瞑目慟憒口舌唇吻皆深黑色痰如鼓
韝有聲勺飲不能下咽即千金藥無所用逆楠至六
脈浮濡謂鴻臚曰是本風痰兼中暑故耳即以厚香
薷飲灌牛黃丸輒能下痰聲漸爾更進少選墨色退
而為黯薄暮色如羊肝詰朝微紫耳出入前方加補
劑五日始張目能言逾月如故太函集

章巖賜病扶日者再矣始而發熱甚而發斑太甚則揩

濕

薛立齋治一婦人肥胖頭目眩暈肢體麻木腿足痿軟
自汗身重其脉滑數按之沈緩此濕熱乘虛也用清
燥羌活二湯漸更佐以加味逍遙散全安

趙養葵治一人宦游京師病腿腫發熱不能履地衆以
為腿癱趙視之扶掖而出趙曰非癱也以補中益氣

湯加羌活防風各一錢此開鬼門例一服如失次日乘馬來謝

趙養葵自病患陰丸一枚腫如鴨卵以濕症治之不效細思之數日前從它海小船回有濕布風帆在座下此工岸始覺以意逆之此感寒濕在腎丸也乃用六味地黃此潔淨府例加柴胡吳萸肉桂各一錢獨活五分此妙味一服熱退再服腫消後有患偏墜者此方亦效亦惟寒濕者宜之若厥陰燥火鬱結者不宜服之

孫文垣治沈大宮左膝腫痛不能起止者半年大便日瀉三次脉之弦緊曰此脾虛血熱凝于經絡流于下部也腫屬濕痛屬火用蒼朮黃柏苡仁為君澤瀉猪苓五加皮為臣炙甘草防風桂枝為佐木通為使四帖痛減腫消泄瀉亦止改用蒼耳子五加皮苡仁當歸枸杞杜仲丹參黃柏烏藥葉酒糊為丸調理月餘步履如故

吳孚先治一人風濕骨節掣痛不能屈伸遍身俱腫醫以麻黃湯發汗二次出而腫不退吳曰前方未嘗謬也但宜微汗之令濕去而風自除今過汗風去而濕未除故不愈也仲景桂枝湯疏與胃苓湯二帖而瘳吳案宜細審之其說似本諸素問附會而成未必真自其出從內經及難經傷寒論

張子和治李文卿兩膝腫屈伸有聲剥剥然或以為骨鳴張曰非也骨不覺焉能鳴此筋濕也溼則筋急（燥則急濕則緩今云濕則筋急殊未得解）有獨緩者緩者不鳴急者鳴也若用藥一涌一瀉工下去其水水去則自無聲矣從其言既而果愈

朱丹溪治朱秀才久坐受濕能飲酒下血以苦澁藥兜之遂成腫疾而肚足皆腫口渴中滿無力少汗脈澁而短乃血為濕氣所傷法當行濕順氣清熱化積用滑石一錢五分白术（本）通七分厚朴五分乾葛五分蒼术五分蘇葉七片水煎次第下保和丸（與點丸溫中丸各五十丸）馮宦人因內有濕積兼時令濕熱右腿少陽分發爛瘡如掌大痒甚兩手脉洪緩略數面目手足俱虛腫膈中午前痞悶午後腫到兩足則膈寬茯苓木通蒼术厚朴各五分陳皮連翹白术各一錢甘草二分加薑汁煎服

朱恕八哥肚腫因濕氣起自五月能飲酒左脇有塊兩足時腫白术三錢稜酯炒木通陳皮赤茯苓海金砂厚朴各五分甘草二分肉桂三分煎湯下保和丸三十丸溫中丸三十丸加青丸十丸

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

張三錫治一人體厚自覺遍身沉重難于轉側兩膝時痛腫不紅不硬六脈濡弱天陰更甚因作濕鬱治加減羌活勝濕湯不十劑愈

許叔微治王彥龍季夏時病胸膈多汗兩足逆冷譫語醫者不曉稟進以甸日診之脈關前濡關後數曰當作濕溫治之（蓋先受暑後受濕暑濕相搏是名曰濕溫）先以白虎加人參湯次以白虎加蒼朮湯頭痛漸退足漸温汗漸止三日愈此名賊邪恐用藥有死之理有人難曰何名賊邪曰難經有五邪從所不勝來者為賊邪假令心病中暑為正邪中濕為之為賊邪心先受暑而濕邪乘之水剋火從所不勝斯謂之賊邪五邪中之最逆也（又右關見弦脈乃木乘土位亦謂賊邪也以此類推諸部皆然）又曰濕溫之脈陽濡而弱陰小而急濡弱見于陽部濕氣搏暑也小急見于陰部暑氣蒸濕也故曰暑濕相搏名曰濕溫是謂濕邪也（不特此也予素有停飲之疾每至暑月汗出不當乾每服此藥二三盞即愈者未當不服此藥二三盞即愈）立齋治張縣丞年逾五十兩腿腫脹或生瘡癰小便頻而少聲如瓮出服五皮等散不應掌醫院銀臺李先生裁為瘡毒令請薛治診其脈右關沈緩此脾氣虛濕氣流注而然非瘡毒也河間云諸濕腫滿皆屬于土按之不起皆屬于濕遂投以五稜散加木香蒼朮

白朮亦不應意至陰之地關節之間濕氣凝滯且水性下流胼氣既虛安能運散若非辛溫之藥開通奏理行經活血則邪氣不能散遂以五積散二劑勢退大半更以六君子湯加木香升麻柴胡苡仁兩月餘而愈設使前藥不應更投峻劑虛之誤不免矣

高兵部連日飯酒陰挺并囊濕痒服滋陰等藥不應謂前陰者肝經絡脈也陰氣縱挺而出素有濕熱合于下焦而然也經云下焦如瀆又云在下者引而竭之遂以龍膽瀉肝湯及清震湯治之而愈若服此藥不應宜補肝湯或四生散治之

趙大同兩臂腫痛服托裏藥日甚謂腫屬濕痛屬火此濕熱流注經絡也以人參敗毒散加威靈仙酒芩南星數劑漸愈更以四物湯加蒼朮黃柏浔便二十餘劑而消又一婦下體腫痛亦與人參敗毒散加威靈仙川柏蒼朮數服痛減更以四物湯加川柏紅花防己蒼朮澤瀉三十餘劑亦消

葉巡檢兩腿作痛每痛即以濕布搦之少愈月餘痛甚夜痛尤劇丹溪云血受熱已自沸騰或涉冷或就濕取涼熱血得汗寒汙濁凝澁所以作痛夜痛甚行于陰也苟痛以冷折之即前所謂取涼之症也以五積

散二劑頭愈更以四物湯加川柏蒼术牛膝木瓜三十餘劑而消夫濕痰濁血注于僻道若非行經流濕推陳致新不能瘳也如藥蒸罨或用冷藥敷貼或用寒藥降火反成敗疽矣

一男子腿痛筋攣遍身痠軟一道人與痰藥及托裡藥期三日可痊皆不應此未瘡毒大筋軟短小筋弛長此濕熱為患也以人參敗毒散加蒼术川柏栀椰木瓜治之少愈更以清燥湯二十帖而痊夫內有濕熱外有風寒當泄不當補反以甘温之劑必不效矣

張意田治一人時診已二十餘日涼解不愈大便自利不欲飲食舌赤燥硬神清肌削日晡寒熱如瘧無汗診之六脉不浮不沉惟大而緩脇骨邊有痛處按之在肝位此濕温病不解結于肝部故寒熱如瘧胃中津液耗涸則舌燥而赤是邪熱留于心腹胃也用玉女煎加犀角蒼术通一服舌生津液脇痛未減即于原方加柴胡數服漸瘳更以補陰全愈

王宇泰曰昔人治濕温通身皆潤足冷至膝下腹滿不省人事六脉皆小弱而急問所服藥陰病藥也此非受病重藥能重病耳以五苓合白虎十餘劑少甦更與清燥湯調理而安

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

端州太守吳松岩疾幾四十日吳延診告以初時惡心倦怠食減便溏既而夜不寐躁而數起晨必喔痰數升或以為暑而用香薷六一或以為濕而用蕓薤五苓或以為癉而用平胃或以為痰而用二陳遍嘗無效漸加煩渴引飲小便頻數及起不行至坐又欲便或謂將成消渴與腎氣丸及生脈飲服之轉劇脈之濡而緩右關為甚據脈與症濕熱無疑何諸治罔效因思病人素喜肥甘又飲酒貪麪其脾胃如土在雨中沾漬既久值夏令乃蒸鬱而發故非滲利分清可愈亦非風行燥散可瘳唯聖术煎一味白术重兩許酒煎後而治之必應令如法服之再以免絲子五錢煎飲代茶服至一旬漸瘥半月全愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

續名醫類案卷七

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷八

錢塘魏之琇玉横撰

熱病

滕雲恭豫昌南昌人也年五歲母楊氏患熱病思食寒瓜土俗所不產雲恭歷訪不能得俄遇一桑門問其故雲恭具以告桑門曰我有兩瓜分一相遺還以與母疾亦尋愈舉家驚異尋訪桑門莫知所在南史

唐武宗有心熱病百醫不効青城山邢道人以紫花梨

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

絞汁而進帝疾遂愈後復求之苦無此梨常山忽有一株因絨實以進帝多食之解煩躁殊効醫說續編

張子和治常仲明之妻每遇冬寒兩手熱痛曰四肢者諸陽之本也當夏時散越而不痛及乎秋冬收斂則痛要言不煩以三花神祐丸大下之熱遂去

李東垣治節使趙君年幾七旬病身體熱麻股膝無力飲食有汗妄喜笑善饑痰涎不利舌強難言聲嗄不鳴診得左寸脉洪大而有力是邪熱客於經絡之中也兩臂外有數瘢問其故對以然香所致曰君之病皆由此也夫人之十二經灌溉通身終而復始蓋手之三陽從手表上行于頭加之以火邪陽併於陽勢甚熾焉故邪熱妄行流散於周身而為熱麻胃熱則蟲動蟲動則廉泉開故涎下熱傷元氣而為況重無力飲食入胃慄悍之氣不循常度故多汗心火盛則妄喜笑脾胃熱則消穀善饑肺金衰則聲嗄不鳴仲景云微數之脉慎不可灸焦骨傷筋血難復也君奉養以膏粱之味無故而加以火熾之毒熱傷筋絡而為此病明矣內經云熱形所勝治以苦寒佐以苦甘以甘瀉之以酸收之當以黃柏知母之苦寒為君以瀉火邪壯筋骨腎欲堅急食苦以堅之黃耆生甘草

之甘寒瀉熱實表（據此者草可云甘寒）五味子味酸止汗補肺氣之不足以為臣炙甘草當歸之甘辛和血潤燥升麻柴胡之苦平行少陽陽明二經自地升天以苦發之者也以為佐吹咀同煎清汁服之更繆刺四肢以瀉諸陽之本使十二經相接而瀉火邪不旬日良愈遂名其方曰清神補氣湯（試効方）

張子和曰余向日從軍於江淮上一舟子病余診之乃五實也余自幼讀醫經嘗記此五實之疾竟未之遇也既見其人竊私料之此不可以常法治乃大作劑而下之殊不動搖計竭智窮無如之何忽憶桃花蓼丸頓下七八十丸連瀉二百餘行與前藥相兼而下其人昏困數日方已蓋大疾已去自然卧憩不如此則病氣無由衰也（五實者脈盛皮熱腹脹前後不通瞥悶也）徐以調和胃氣之藥饘粥日加自爾平復也

蔣仲芳治蕭氏婦年二十餘素虛弱患熱病將一月一夕忽死視之脉雖重無按尚存心口微温曰似有生機即用竹瀝生薑燈心湯灌之下咽少頃微動細察之腹痛甚問其大便云二十日不食亦不行矣以大黄一兩芒硝五錢桃仁當歸各三錢與之衆駭曰素有弱症且病久何能堪此曰更有法在強與之遂去

黑物半桶即用人參五錢煎湯補之蓋因素弱急下後不得不峻補也調理月餘而愈今連生三子此諸醫因其虛而不治其實之候也

極密副使鄔律斜彭妻有沉疴易數醫不能治鄔律敞魯視之曰心有畜熱非藥石所及當以意療因其瞶睹之使狂用泄其毒則可于是令大擊鉦鼓于前翌日果狂叫呼怒罵力極而止遂愈（遼史見說儲）

上洋劉公遠至洞庭治病病者已氣絶劉曰無恐當即活也但某今夜必欲觀劇又所演必劇武者從之遂令以氈褥裹病人置場上已而鉦鼓喧沸則病者欠伸復甦矣（張氏鹿言觀其治法與前案頗同則為病亦必仿佛）

萬密齋治胡應龍五月患熱病治半月未愈脉弦數鼻衄三四日一作左脇痛不能側卧先以炒山庖一个婦人髮同燒存性吹入鼻中而衄止再以當歸龍薈丸方作湯一劑而脇痛止再診其脉弦去而浮數曰當以汗解蓋衛氣不共營氣諧和者當用桂枝湯以治其陽榮乃營氣不共衛氣諧和則得汗而愈也毒湯合白虎以治其陰使營衛和則得汗而愈也乃以二湯合煎飲之先告之曰當戰汗勿驚也連進二劑果汗而愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

胡龍嘉六月病熱身壯熱自汗出大渴喜裸體診其脉弦大而虛萬為制一方小柴胡內摘柴胡人參白虎湯內摘知母甘草庶子豉湯內摘淡豆豉共五味淡竹葉煎名三合湯一劑而愈

繆仲淳治辛衡陽銓部患熱病病在陽明頭痛壯熱渴甚且嘔鼻乾燥不能眠診其脉洪大而實仲淳故問醫師醫師曰陽明症也曰然問投何藥曰葛根湯仲淳曰非也曰葛根湯非陽明經藥乎曰陽明之藥表劑有二一為葛根一為白虎不嘔吐而解表用葛根湯今吐甚是陽明之氣逆升也葛根升散故用之不宜宜白虎湯加麥冬竹葉名竹葉石膏湯石膏辛能解肌鎮墜能下胃家痰熱肌解熱散則不嘔而煩躁壯熱皆解矣遂用大劑與之且戒其仲君曰虜荊非六十萬人不可孥信二十萬則奔還矣又囑曰斯時投藥五鼓瘥天明投藥朝餐瘥已而果然或謂嘔甚不用半夏何也仲淳曰半夏有三禁渴家汗家血家是也病人渴甚而嘔是陽明熱邪熾甚劫去津液故渴邪火升故嘔半夏辛苦溫而燥且有毒定非所宜又疑其不用甘草曰嘔家忌甘仲景法也此案為陽明熱病用

王節齋治一婦人夏間病熱初用平調氣血兼清熱和解之劑二三服不應熱愈甚舌上焦黑腹間有火嗽水不嚥（腹有火而不能飲冷則非實大可知）診之兩手皆虛微而右手微甚六七日內譫語撮空循衣摸牀（皆虛熱所致）惡症俱見後用四物湯加黃耆人參白朮陳皮麥冬知母熱附子服之一二時汗出熱退次日復熱再服仍退又次日復發知其虛劇也遂連進十服皆加附子而安喻嘉言治王原昔年感症治之不善一身津液盡為邪熱所鑠究竟十年餘熱未能去右耳之竅常閉今夏復病感纏綿五十多日面足浮腫臥寐不寧耳閒氣往外觸蓋新熱與舊熱相合狼狽為患是以難于去體醫者不察其情治之茫不中竅延至秋深金寒水冷病方自退然淺者可退深者未由遽退也喻曰面足浮腫者肺金之氣為熱所壅失其清肅下行之權也（面腫可云足腫則未然是陰虛血不配氣耳）臥寐不寧者胃中之津液乾枯不能內榮其魂魄也（語殊牽強亦由陰虛肝火浮入脈絡也）耳閒大氣撞出者久閉之竅氣來不覺今病體虛羸中無阻隔氣逆上衝始知之也（總不外陰虛二字）外病雖愈而飲食藥餌之內調者尚居其半特挈二事大意為凡病感者明善後之法焉蓋人當感後身中之元氣已虛

身中之邪熱未退於此而補虛則熱不可除于此而
清熱則虛不能任即一半補一半清熱終屬糢糊不
得要領然舍補虛清熱外更無別法當細審之補虛
有二法一補脾一補胃如瘧痢後飲食不能運化宜
補其脾如傷寒後胃中津液久耗新者未生宜補其
人參梨汁竹瀝之屬皆為合法仲景每用天水散以
清虛熱正取滑石甘草一甘一寒之義也設誤投參

琇按寓意草中多有發前人所未發處至於支離牽強處亦復不少如此案諸感症後以甘寒清熱最得有緊然以補脾補胃立論便爾模餬但當云氣虛者宜補氣血虛者宜補血凡瘡痢後飲食不運多氣虛宜氣分藥如參耆芩朮之類凡感症後津液不充多血虛宜地冬梨竹之屬以感症多餘熱未清也何等明快然猶未免於偏常見痢以下多而亡陰瘧以汗多而耗精飲食難運多由相火盛而真氣衰非大劑二冬二地投之多見其纏綿不已也至其論畏足浮腫臥寐不寧尤屬隔靴搔

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

痒

陸養愚治凌比部藻泉暑月築歸煩勞過度夜間頭病如破肉熱如火不寐汗多小水短赤舌上黃胎右脇脹痛有謂頭痛身熱宜散者有謂煩勞之後宜補者診之見其身熱喘急語言閒氣乏不足以息脉浮數按之不甚有力曰此熱傷元氣也乃以河閒桂苓甘露飲加人參一錢服之片時汗止熱減喘定能言再與一劑昏倦思睡次早脉浮按已平沉按弦而有力此浮熱已除內熱未盡故脇腹尚微痛也與當歸龍薈丸一錢五分空腹服之而後進粥至夏午便通而

色黑痛即減復以參麥散調理而安

陸肖愚治史洞庭室四月間患頭痛發熱脉洪數見于氣口用清解藥二劑大約柴葛庖苓之類一醫謂頭痛身熱乃太陽症而遽用柴葛不引邪入陽明少陽乎汗未得而遽用庖苓寒涼之品表邪何由而解不將傳裡乎（以正傷寒論未嘗不是）用大青龍湯二劑病家止服一劑夜間遍身如煆口渴咽乾已有譫語矣明日又以非傷寒乃痛風也（觀前說其人亦頗閱書而臨症必鹵莽不堪造福薄而氣浮歟）（柳識淺而意易移歟）用羌獨活首烏牛膝等二劑乃登高而歌棄衣而走罵詈不避親疎再求診乃令數婦人繫之

謂庭洞曰此陽症也擾之益劇當以言寬諭之果如言而止因先用糖水法灌之勢便緩隨以白虎加元明粉芩連蒌仁犀角數劑而罵詈止時或妄言知大便久不去也以潤字丸三錢投之夜出燥矢約二十枚然譫語猶未全止仍進前湯又以丸藥二錢投之出燥矢數枚溏便少許又三日方思粥飲以清氣養榮湯調理之

呂東莊治吳華厓館童夏月隨役湖上感熱症下痢膿血身如燔炭（因是熱症否則下身熱為不治矣）曰此陽明病也不當作痢治視其舌必黑而燥夜必多譫語果如所言診

之則脉已散亂忽有忽無狀類蝦浮不可治也吳強之不得已用熟地一兩生地麥冬當歸白芍甘草枸杞佐之戒之曰汗至乃活夜來熱不減譫語益狂悖但血痢不下再服藥後見微汗少頃即止診之脉已接續分明洪數鼓指曰今生矣仍前方去生地加棗仁山藥丹皮山萸（加減無當甚）連服六帖其家以昏熱甚每日求更方令姑忍定以活人還汝再診脉始斂而圓乃曰今當為汝去之用四順清涼飲子加熟地一兩大黃五錢下黑矢數十枚諸症頓愈越二日薄暮忽復發狂譫發熱喘急口渴此欲回陽作汗也與白

朮一兩黃耆一兩乾薑三錢甘草一錢歸芍各三錢盡劑汗如注酣臥至曉病霍然也（後有發明節去以其說在諸案多有）琇按先補而下再補而汗治法固善然此症在初時數劑能與天水濕心並行定不致如許決張楊乘六族弟患熱症六七日不解口渴便秘發狂踰墻上屋赤身馳驟譫妄罵詈不避親疎覆蓋盡去不欲進衣如是者五日矣時楊以歲試自苕上歸尚未抵岸病人曰救人星至矣問是誰曰雲峯大凡回來也頃之楊果至家人咸以為奇視之良久見其面若無神兩目瞪視其言動甚壯勁有力意以胃中熱甚上

乘于心心為熱冒故神昏而狂妄耳不然何口渴便秘白虎涼膈等症悉具那及診其脈豁大無倫重按則空驗其舌黃上加黑刺而滋潤不燥乃知其症由陰甚於內逼陽於外雖壯勁有力乃外假熱而內真寒也其陽氣大虧神不守舍元神飛越故先遇人于未至之前遂以養榮湯加附子倍棗仁五味白芍濃煎與之一劑狂妄悉除神疲力倦熟睡週時方寤渴止食進而便通矣繼用補中益氣加白芍五味而痊

瑭按傷寒門張令韶治一婦讝妄發狂以聲重耳長斷為實熱下之而愈此案亦壯勁有力斷為虛寒補之而愈弟張案則脈伏全無為熱厥也此則脈空豁無倫為陽越也故臨症者尤不可執一端以為準的也

朱湘波母病熱症痰甚喘急煩燥口渴喉中如烟火上攻兩唇焦裂足心如烙小便頻數董安予擬用十全大補煎送八味丸未以時方盛暑又係火症不敢服招楊商之切其脈洪大而數無倫按之虛軟而色浮紅舌上生刺則旦欲束如荔枝曰此腎虛火不歸經脈從而病反者也當舍時舍症從脈以治之方用八味飲合生脈散倍加參地附子朱見方論與董合乃出

所擬方示楊楊曰天熱症熱非有灼見何敢用此無庸疑也乃濃煎探冷與飲而愈

李氏婦年六十餘患熱症胸痛悶神昏沈氣粗便秘發散消導增甚脉之滑數重按有力面色壯熱通紅滿舌黃胎中間焦黑此食滯中宮貫門壅塞太陰之氣阻而不運陽明之氣抑而不伸鬱而為火也以大劑疎肝益腎湯倍熱地與之當晚下黑矢數十塊諸症大減次日再診脉見浮洪舌上焦燥黃胎盡脫而其色反黑如炭悶曰症減而舌反黑何也曰向者食滯便秘上下竅不通火悶不舒其厥不能上達今以純陰之劑便得通則壅塞之火隨便泄去而餘火未盡者復炎而上行所以舌反黑耳（與傷寒實熱下後反發吧為餘火上衝之義同）前方加棗仁當歸山庶以滋水清肝舌黑退再以生金滋水及六君子加歸芍全愈

朱氏媼熱症痞悶眼赤羞明遍身瘡腫大便燥結小水痛澁聞聲則惕然而驚醫與解毒清火尊赤十餘劑火益甚不食不眠脉之浮分鼓指沈則緩大兩關洪軟而遲知其外症惡假火也與參附養榮湯不敢服楊曰此症本為憂慮所傷致三陰虧損又為寒涼所迫致虛火浮行衝于上則兩目赤澁流于下則二便

艱難乘於外則遍身瘡腫塞於中則胸膈痞悶虛大為患大率如此不獨此症為然故其標則似實熱其本則甚虛寒也若果係實熱何以聞響則驚寒涼頻進而反甚耶藥下咽即卧至五更大叫餓甚自寅及巳連進粥三次大便潤而小水長諸症悉退原方去附子十餘劑全瘳

張飛疇治一婦寡居五月間忽壯熱多汗煩渴耳聾脇痛醫用柴葛桂枝等劑其熱彌甚汗出不止胸滿昏沉時時噫氣診之右脉數大左脉少神舌胎微黑此伏氣自少陽發出故耳聾脇痛法當用白虎清解（合小柴胡更妙）反行發表升越其邪是以熱渴轉甚汗出多故左脉無神胃液耗故昏悶胸滿其噫氣者平素多鬱之故今元氣已虛伏邪未解與涼膈去硝黃易瓜蔞根丹皮竹葉一服熱減得睡但汗不止倦難轉側或時欲嘔此虛也以生脉加棗仁茯神白芍扶元斂陰兼進粥飲以扶胃氣渴止汗斂而脉轉虛微欲絕此正氣得補而虛火漸息之真脉也復與四君歸地為

瘧

柴嶼青治陳勾山輿人梁大發疹身熱譫語口渴遺尿服藥增劇求治兩脉沈伏意其疹尚未透擬用消毒飲予不信勢已瀕危復求診脉尚如故探其舌燥裂

生刺且面垢唇焦始信為伏暑即伏氣也發于陽明故現以上諸症熱之症急投白虎湯二劑病解而脈始洪矣故臨症者脈既難憑尤當察其舌也

王節齋常治一僕人病熱口渴唇乾譫語診其脈細而遲用四君子湯加黃耆當歸白芍熟附子進一服熱愈甚狂言狂走或曰附子差矣診其脈如舊仍增附子進一大服遂汗出而熱退脈還四至矣

陳三農治一人身大熱兩目出火口舌乾燥手足欲以水浸不避親疎脈緊大服黃連解毒湯益甚此心脾胃而心氣耗散故耳遂用炒黑甘薑一兩人參三錢白朮一錢不用甘草者恐生者瀉心火炙者緩中致脾胃中火邪不得發散也三味煎服不逾時引被自蓋戰汗出而愈夫乾薑微炒溫中炒黑涼腎止瀉

張路玉治童姓者伏氣發於盛暑診時大發躁擾脈皆洪盛而躁其婦云大渴索水二日不敢與飲故發狂亂因令速與速進二盞稍寧少頃復索又與一大盞放盞通身大汗安睡熱除不煩湯藥而愈同時有西客二人亦患此症皆與水而安

薛立齋治一男子盛暑發熱胸背作痛飲湯自汗用發表之藥咨憤譫語大便不實吐痰甚多用十全大補

一劑頓退又用補中益氣加炮薑二劑而愈

王宵堂治余雲衢太史形氣充壯飲啖兼人辛卯夏六月患熱病肢體不甚熱而悶煩手擲足如躁擾狀昏憒不知人事時發一二語不了了而非譫語也脈微細如欲絕有謂是陰症宜温者有謂當下者時座師陸葵日先生與曾植齋馮琢菴二太史皆取決于王謂是陽病見陰脈法在不治然素稟如此又值酷暑外熾酒炙內炎宜狂熱如焚脈洪數有力而此何為者豈熱氣拂鬱不得伸而然耶且不大便七日矣姑以大柴胡湯下之時用熟大黃二錢而太醫王雷菴力爭以為太少不若用大承氣王曰如此脈症豈宜峻下待大柴胡不應而後用調胃承氣再不應後用小承氣以及大承氣未晚也服藥大便即行脈已出手足温矣乃謂雷菴曰設用大承氣寧免噬臍之悔哉繼以黃連解毒湯數劑而平七月初遂與陸先生同典試南京不復發矣明年王請告歸里偶得劉河間傷寒直格論讀之中有云畜熱內甚脈須疾數以其極熱畜甚而脈道不利反致脈沉細欲絕俗未明造化之理反謂傳為寒極陰毒者或始得之陽熱暴甚而便有此症候者或兩感熱甚者通宜解毒加

大承氣湯下之下後熱少退而未愈者黃連解毒湯調之或微熱未除者涼膈散調之或失下熱極以致身冷脉微而昏胃將死者若急下之則殘陰暴疾而死蓋陽氣後竭而然也不下亦死宜涼膈散或黃連解毒湯養陰退陽積熱漸以宣散則心胸再暖脉漸以生然後撫卷而嘆曰古人先得我心矣余太史所患正失下熱極以致身冷熱微而昏胃欲絕也下與不下大下與微下生死在呼吸間不容髮嗚呼可不慎哉宜表而出之以為世鑒

馬元儀治馮太史因客邸無聊挾妓為樂值內虛之際

又苦暑熱因而晝夜發熱煩渴引飲焦躁不寧脉之細數而急尺帶弦神氣不清此房勞過度真陰受虧陽往乘之也且煩渴身熱神昏火邪內擾外淫已極當此盛夏火炎土燥垂絕之陰其足以供燔灼者幾何若不急救其陰大事去矣用生首烏二兩為君以救肝腎之陰（以首烏代地黃馬君創始）佐以黃連知母柴胡黃芩枳殼半夏麴橘紅杏仁清熱化痰之品一劑而神氣清再劑而大便解熱減大半再與人參製首烏鱉甲丹皮白芍甘草調和陰陽之劑而熱退又以人參逍遥散而安

張意田治甫江焦姓人七月間患壯熱舌赤少腹滿悶小便自利目赤發狂已三十餘日初服解散繼則攻下俱得微應而病終不解診之脉至沉微重按急疾夫表症仍在脉反沈微者邪隔入于陰也重按急疾者陰不勝其陽則脉流薄疾并乃狂矣此隨經瘀血結于少陰也宜服抵當湯乃自為製蠐螬水蛭加桃仁大黃煎服服後下血無算隨用熟地一味搗爛煎汁時時飲之以救陰液候其通暢即用人參附子炙甘草漸漸服之以固真元共服熟地二斤餘人參半斤附子四兩漸得平復

施笠澤治孝廉唐後坡長公病寒熱面赤頭齒大痛診之脉洪而數此熱症也當用白虎湯每劑石膏一兩一劑而頭及齒痛俱已寒熱亦除但脉尚搏指曰須仍前再進一劑不然兩日後定發斑矣乃疑而謀之崙科曰是何斗膽也石藥豈堪重劑乎置不服半月後復求治云兩日後果發斑二十日不解解後身猶灼熱曰曲突徙薪其有功乎投柴苓芍藥湯一劑而熱退後用參朮調理而瘥

友人章深之病心經熱口燥唇乾百藥不効有教以犀角磨服者如其言飲兩椀許疾頓除宋張世南游宦紀聞

淩表姪年二十餘丙子患熱症初愈醫即與四君乾薑巴戟諸氣分溫補藥久之益覺憔瘦狀若顛狂當食而怒則嚙盞折筋不可抑遏所服丸藥則人參養榮也沈綿年許其母問予予曰此餘熱未清遽投溫補所致與甘露飲方令服十餘劑遂痊甲申夏復患熱症嘔惡不眠至七日擬用白虎湯以先日服犀角地黃而吐疑為寒不敢服延一盧醫至診其脉伏按其腹痛謂此疝症非外感也脉已全無危險甚矣姑與回陽得脉復乃佳所用胡盧巴吳茱萸肉桂乾薑木香小茴香丁香青皮橘核等約重三兩餘令急煎服蓋是日夜半當戰汗故脉伏而厥痛彼不審以為寒疝也乃用此方黃昏服下即躁擾煩渴揚手擲足譫語無倫汗竟不出蓋陰液為燥熱所劫不能蒸發矣侵晨再亟診脉已出且洪數而目大眥及年壽間皆迸出血珠鼻煤唇焦舌漸黑小便絕無令以鮮地黃四兩搗汁一茶盃與之飲下即熟睡片時醒仍躁擾再與白虎湯加鮮地黃二兩煎服熱漸退神漸清次日漸進粥二白睛赤如鳩目繼而口鼻大發瘡瘍攻與大劑甘露飲二十餘日始便黑糞甚夥猶晝時煩擾服前方至五十餘日急大汗自頂至足汗極臭自

是全瘳

燥

凡燥病多兼症又諸家罕重此門不知近時病燥者十居其九茲特選數案或見于外或見于內及論燥藥之害以備鑒焉

張子和治陽夏胡家婦手足風裂其兩目昏漫張口厥陰所至為噩又曰鳴条啟坼皆風之用風屬木木鬱者達之達謂吐也先令涌之繼以調胃承氣湯加當歸瀉之立效

喻嘉言治葉茂卿子出痘未大成漿其殼甚薄兩月後尚有著肉不脫者一夕腹痛大叫而絕令取梨汁入溫湯灌之少甦頃復痛絕灌之又甦遂以黃芩二兩煎湯和梨汁與服痛止令製膏子藥頻服不聽其後忽肚大無倫一夕痛叫小腸突出臍外五寸交紐各二寸半如竹節盡頂狀莖物絞摺長八九寸明亮如燈籠此實未經開見以阿膠黃芩二味日進十餘劑三日後始得小水五日後水道清利臍收腫縮而愈

門人駭問答曰夫人一身之氣全關于肺肺清則氣行肺濁則氣壅肺主皮毛痘不成漿肺熱而津不行也殼著于肉名曰甲錯甲錯者多生肺癰癰者壅也豈非肺氣壅而然歟腹痛叫絕者壅之甚也壅甚則并水道亦閉是以其氣橫行于臍中而小腸且為突

出至于外腎弛長尤其剩事耳用黃芩阿膠清肺之熱潤肺之燥治其源也氣行而變自通源清而流自清矣緣病已極中之極惟单味多用可以下行取効故立方甚平而奏功甚捷耳試以格物之學為子廣之凡禽畜之類有肺者有尿無肺者無尿故水道不利而成腫滿以清肺為急（肺主通調水道又水出高原故謂之化源）此義前人闡發不到後之以五苓五皮八正等方治水者總之未悟此旨至于車水放塘種種刼奪膀胱之劑則殺人之事矣可不審哉

趙我完次子秋月肺氣不能下行兩足腫潰而小水全無（肺氣敗者多此二症）臍中之痛不可名狀以手揉左則攻于右揉右則痛攻于左當臍揉熨則滿臍俱痛叫喊不絕利水之藥服數十劑不効用敷臍法及單服琥珀末兩許亦不効診時須畱已極無可救藥矣傷哉

呂東莊治嚴人江仲璉冒寒發熱（大為寒邪所鬱）兩頷擁腫如升子大（狀類雷頭風俗名豬頭風）臂膊磊落無數不食不便狂躁發渴診其脉浮數無序醫作傷寒發毒治呂曰誤矣此燥逐風生也用大劑踈肝益腎湯熟地加至二兩五劑而腫退便解十劑而熱除食進再用補中益氣湯加麥冬五味而痊

陸肖愚治李安和姪年十三大腸燥結不時脫肛鼻中結塊不時出血平日喜讀書病由辛苦而得每勞則發久治不効診之骨瘦如柴面紅身熱其脈細數曰此天稟燥火之症若破身後即成勞怯矣急宜治之戒厚味節誦讀庶可療也用天麥冬各一斛生地半斛人參四兩即加減三才膏也服一料其發甚稀至三料將一年全愈

萬密齋治一女子年十四歲病驚風後右手大指次指屈而不能伸或用羌活防風天麻全蝎僵蠶蟬蛻諸風藥治之病益甚曰手足不隨血虛也伸而不能屈者筋弛長也屈而不能伸者筋短縮也皆血虛不能養筋之症也手大指者太陰肺經之所主也次指者陽明大腸之所主皆屬燥金此血燥之病也一切風藥助風生燥致血轉虛而病轉盛用黃耆人參天麥冬生熟地黃當歸各等分官桂減半為引經橫行手指之端共為末蜜丸芡實大每一丸食後湯化服

馬元儀治周君開病經一月口燥咽乾胸滿不能飲食二便俱閉診其脈虛而且澁此少陰客熱腎經虛燥也腎閉竅于二陰腎陰既虧竅不滑澤所以二便俱閉少陰之脈循喉嚨挾舌本腎熱則經絡亦熱所以

口燥咽乾腎者胃之關也鬧門不利胃氣亦為之阻所以胸滿不能飲食當用仲景豬膚湯治之夫豬水畜也其氣先入腎虛膚味甘寒能解少陰客熱故以為君加白蜜以潤燥除煩白粉以補虛益氣二劑熱去燥除便調食進而愈

薛立齋治周上舍脾胃虛服養胃湯枳朮丸初有効而久反虛口舌生瘡勞則愈盛服敗毒藥則嘔吐此中氣虛寒也以理中湯治之少愈更以補中益氣湯加半夏茯苓月餘而平夫養胃湯香燥之劑也若飲食停滯或寒滯中州服則燥開胃氣宿滯消化少為近理使久服則津液愈燥胃氣愈虛況胃氣本虛而用之豈不反甚其病哉此非燥病而論燥故入此

一男子兩掌每至秋分皮厚皴裂起白屑內熱體倦此肝脾血燥故秋金用事之時而作用加味逍遙散加川芎熟地三十餘劑而愈再用六味丸加五味麥冬服散之半載後手足指縫臂腿腕皮厚色白搔之則木屑

一婦人素晡熱月經不調先手心赤痒至秋兩掌皮厚皴裂時起白皮此皆肝脾血燥用加味逍遙散加劑芥鈎籐鈎川芎熟地五十餘劑又用歸脾湯二十餘

劑乃服六味丸而不再發

蔣仲芳治表弟婦韓貞女幼年守節勤孝清苦茹素誦經以故氣血素少而色不榮乙巳春忍胃風寒胸腹填脹入夏則胸脇刺痛背如負石百治無效至秋末冬初則覺腸細如綫粒米入胃左盤右旋其行如飛穿漉異常痛苦難狀過節氣則病劇診之右脈疾左脈濇曰疾者氣燥濕者血虛血虛則津液乾而腸胃收小宜其穿漉也氣燥則其行速速則米粒不安宜其如飛也遂用當歸五錢酒炒白芍二錢川芎一錢以補血為君惟其緊寬以七分腹皮惟其濕利以一錢滑石惟其乾潤以二錢蘇子惟其疾緩以二分甘草四劑后諸病漸減至五六十劑榮氣始通膏子丸藥調養年餘方有起色（不用二冬二地何也）

火

易思蘭治一婦人患譫身倦怠呵欠口乾飲冷一月不食強之數粒而已有以血氣虛治之者有以氣弱治之者有知為火而不知火之原者用藥襍亂愈治愈病自夏至冬覺微瘧次年夏諸病復作甚于前肌消骨露診得三焦脈洪大侵上脾肺二脈沈微餘皆和

平曰此肺火病也以庀子湯飲之進二服即知飢喜食自曰氣體充實如常後因久病不孕衆皆以為血虛而用參耆為君大補之劑胸膈飽脹飲食頓減至三月經始通下黑穢不堪或行或止不得通利治以順氣養榮湯十數劑一月內即有孕夫大與元氣不兩立倦怠者火耗其精神也呵欠者火鬱而不伸也口乾飲冷者火熾于上也飲食不進者火格于中也肌消骨露者火氣消燥也至經水過期而多其色紅紫肝脈有力乃氣滯血實也非順氣調經清火氣血何由而平妊娠何由而得哉

孫文垣治從孫君錫頭痛胸背脹飲食下嚥即吐（諸逆衛上皆屬于火）咳嗽不住口痰洪大（皆金受火尅之候）以二陳湯加竹茹消石石膏黃連麥冬連進四劑夜與益元散兼服（益元能清六腑之火然不宜于大便燥結之人）嗽吐俱止惟痰濁如膿大便燥結脈之右寸獨濁如膿色且腥氣觸人此將作肺癰改用丹皮麥冬山庶甘草貝母枳殼桑白皮紫菀知母當歸生地桔梗服四劑全安

易思蘭治一士人素耽詩文夜分忘寢勞神過度忽身熱煩渴自汗惡寒四肢微冷飲食少進初以為外感先發散次和解不應又用補中益氣湯加參二錢踰

月諸症仍前一日午後發熱忽耳聾不知人恍惚譫語或謂少陽症也宜小柴胡湯和之易診之六脉皆洪大無力曰非少陽症乃勞神過度虛火症也不信遂以小柴胡去半夏加花粉知母易謂服此必熱愈甚當有如狂症作已而胸如火炙刀刺發狂欲走飲凉水一盞始定復求治以人乳并人參湯與之（方好）當日進四服濃睡四五時病減半次日又進四服六脈歸經沉細有力終夜安寢諸症悉除或曰是症人謂傷寒今作虛火何也曰傷寒自表達裡六日傳遍經絡復傳至二十一日外雖有餘症亦從襍病論今病已二月豈可以傷寒論乎况少陽之脉弦長有力今浮洪滿指而無力豈少陽脈耶蓋平日勞神過分心血久虧肝脾亦損陽氣獨盛氣即火也經云壯火食氣火與元氣不同立于是水涸火勝之病作矣傷寒云乎哉夫小柴胡乃治少陽實症今陰虛病而以此瀉之則元氣愈虧陰火愈熾故知其當發狂也又補中益氣湯補陽者也陰虛而補陽陽愈盛則陰愈虛所以不効今用人乳者以真血補真水又以人參導引散于諸經以濟其火與他藥不同故見効尤速也

龔子才治管藩相夫人每至夜半不睡口乾煩渴吐粘

當歸草堂鈔本

痰必欲茶水漱口舌上赤黑皮厚胸痞嘈𥡴飲食少思脉之兩寸洪數兩尺空虛右氣口盛此上盛下虛血虛氣鬱而有火也以四物湯加生地黃連麥冬知母貝母花粉元參巵子桔梗枳實青皮（三味母扁贅入）甘草數劑奏功又以六味丸加生地麥冬知母元參花粉貝母五味黃連一料全安（鬱火補瀉兼行）

陳三農治一士人素行滋補之劑久之致口乾舌燥膈後作痛神思不爽飲食減少食肉則瀉六脉實大作實火治以知柏連巵赤芍甘草一劑而胸次爽豁痛瀉俱止再劑飲食倍加精神頓長諸症悉愈書此以為無病好補之戒（實火）

陸養愚治董龍山妾每小腹氣上衝則熱壅頭面卧不能寐身似戰慄日中發熱無常至四鼓五鼓其熱更甚熱時腹中有塊升起經期參前而淋漓數日飲食過于平時而肌肉消瘦或作陰虛發熱治之數月不効脉之數而弦左關尺為甚曰此肝膽病也膽主決斷謀慮不決則木氣鬱而成火故于少陽初動之時其熱更甚也因胆之氣既鬱而成火則肝之血亦滯而成瘕瘕非血不聚非火不升今塊之上升熱之上壅即經所謂諸逆衝上皆屬于火也第初疾止在無

當歸草堂鈔本

形之氣但調其氣而火自息今兼在有形之血必先去瘀令有形消而後無形可調也適在經行之際乃以女金丹連服去瘀塊甚多後以達氣養營湯盡其舊以生其新數劑諸症漸愈再以橫柳加人參數劑而肌肉漸長矣

鬱火

張

張路玉治張太史虛火症脉之右關氣口獨顯弦象右尺微數餘皆微細搏指蓋陰火內伏也緣勞心太過精氣滑脫加以怵惕恐懼怔忡驚悸醫峻用人參桂附初稍可交春後劇如前仍用參附導火歸元固斂精氣之藥轉劇（凡陰虛病初服附桂有小効久服則陰竭而脫余目擊者百十人矣）稍用心則心系牽引掣痛痛連脊骨對心處或時痛引膺脇或時顛頂如掀或時臂股爪甲皆隱隱作痛怔忡之狀如碓杵如牽繩如簸物如繃絹如以竹擊空控引頭中如失腦髓夢寐不寧達旦倦怠睡去便欲失精精去則神䰟如飛越觀其氣色鮮澤言談亹亹總屬真元下脫虛陽上擾之候（其人本病三陰虛損悞以參附熱補遂至變症蠭起）細推脉症其初雖屬陽氣虛脫（著此一語便于此道未徹）而過餌辛溫之劑致陽亢而返耗真陰當此急宜轉關以救垂絕之陰庶可挽回前過為疏二方煎用保元合四君丸用六味合生脉（此時却宜二地二冬沙參杞子少加川連萎仁養陰）

兼解鬱之法俟元氣大復然後議補乃為合法六味生脉留為後勁若保元四君則仍魯衛之政耳服及兩月諸症稍平但倦怠力微因自檢方書得補中益氣湯為夏月當用之劑於中加入桂附二味一啜即候痛聲喑用補中益氣湯者最宜著服復邀診見其面顏精采聲音忽瘖莫解其故詢之知為升柴桂附擾動虛陽所致即以前方倍生脉服之半月後聲音漸復日漸向安但衣被過暖便咽乾痰結稍涼則背微惡寒或熱飲則大汗時怔忡走精此皆宿昔過用附附內伏之熱所致也適石門董某謂其伏火未清非芩連不能解散自仲春至初夏純服苦寒亦大忌初甚覺爽朗至是反覺精神散亂氣不收攝後仍采六味合生脉經歲服之以化桂附餘毒云大內內

內翰孟端士之母虛火不時上升自汗不止心神恍惚欲食不能食欲卧不能卧口苦小便難溺則洒淅頭暈凡醫每用一藥輒增一病用白朮則室寒脹滿用橘皮則喘息怔忡用遠志則煩擾閉熱用木香則腹熱咽乾用黃耆則迷悶不食用枳殼則喘咳氣乏用門冬則小便不禁用肉桂則顱脹欲逆用補骨脂則後重燥結用知柏則小腹枯癟用芩連則臍下引急用香薷則耳鳴目眩時時欲人扶腋而走用大黃則

臍下築築少腹愈覺收引遂致畏藥如蠍惟日用人參錢許入粥飲和服聊藉支撐交春虛火倍劇火氣一升則周身大汗神氣駸駸欲脫惟倦極少寐則不出而神氣稍寧覺後少頃火氣復升汗亦隨至較之盜汗迥殊診之其脈微數而左尺與右寸倍于他部氣口按之似有似無既云右寸倍于他部又云氣口似有似無曰此本平時思慮傷脾脾陰受困而厥陽之火盡歸於心擾其百脈致病病名百合此症惟仲景金匱言之甚詳原云諸藥不能治所以每服一藥輒增一病惟百合地黃湯為之耑藥奈病久中氣虧乏復經藥誤而成

壞病姑用生脈散加百合伏神龍齒以安其神稍兼茱連以折其勢數劑少安即令勿藥以養胃氣但令日用鮮百合煮湯服之交秋天氣下降火氣漸服可保無虞迨至仲秋果勿藥而愈虛火

喻嘉言治吳添官因母久疾初愈自患腹痛徹夜叫喊不絕小水全無知為火鬱之痛以茱連加元胡索投之始安又因傷食反復病至二十餘日飢肉瘦削眼眶下陷適遘家難症變壯熱目紅腮腫全似外感有餘之候知其為激動真火上焚語有病病令服六味加知柏二十餘劑其火始退後遍身瘡疿黃腫燥火反逆熱腹中急欲

思食不能少耐片頃鎮日哭煩臟燥者多哭泣慰之曰旬日後腹稍充氣稍困即愈矣服二冬膏而全瘳灸火

朱丹溪治一人小腹下常唧唧如蟹聲作陰火處治用敗龜板用酥炙鹽酒亦得灸火

芎酒製當歸酒製右各等分酒糊丸每服八十丸淡鹽湯送下鬱火

陸祖愚治陳符卿夫人素有痰火症每遇經行一日覺澁滯二日即洶湧三日大下如崩或昏暈幾絕嘗善怒發即咽喉乾燥氣出如火痰湧胸塞不能轉舒其平日辛燥之品如陳枳前朮及芎歸之類稍用即暈眩氣絕不足以息及寒涼稍過即大便作泄病作時日進粥數十椀不覺飽脉之左三部弦細而駛右脉數而稍充曰此血虛盛故狂火偏旺如此狂字鵲突而氣原非有餘也此時養血則血一時不能充補氣則浮火無由熄莫若分上下為治入人參于滋陰藥中為丸引陽入陽以扶生氣之原所以治其本也再用清涼以為煎劑助陰抑陽以制浮游之火所以治其標也煎丸間服而愈凡方人參二地二冬知柏阿膠杜仲煎方花粉元參二母苓苓地芍麥冬甘草隨症加減夫天地之間陽常有餘陰常不足人身之中氣常

有餘血常不足氣有餘便是火血不足則陰虛三十以前精神氣血日漸旺盛三十以後日漸衰微語曰陰陽水火猶權衡也一高則一下一盛則一衰又曰火與元氣不兩立故凡火盛之症必先陰虛而後元氣亦弱也（虛火）

朱丹溪治一人夜間發熱早晨退五心煩熱無休六脉沉數此鬱火也用升陽散火湯熱退後以四物加知柏佐以乾薑調理而安（大還 鬱火）

東垣治一人惡熱目赤煩渴引飲脉七八至（李萘必詳此太暑奈）何按之則散此無根之火也用薑附加人參服之愈

虛火

劉彥純治一人不能食而熱自汗氣短不食而熱脾陰弱也自汗氣短肺氣虛也以甘寒之劑補氣瀉火而安（虛火）

薛立齋治一婦人口苦脇脹此肝火之症也用以小柴胡加山梔黃連少愈更以四君子加白芍當歸柴胡調補脾胃而痊（虛中挾實 先瀉後補）

一婦人每怒口苦發熱晡熱此肝火盛而血傷也以小柴胡合四物湯二劑以清火而生血更以四物加柴胡白朮茯苓丹皮生血健脾而愈（補瀉兼行）

一婦人每怒則口苦兼辣胸痛脇脹乳內或時如刺此肝肺之火也用小柴胡加山梔青皮芎歸桑皮而安後又勞怒口復苦經水頓至此屬內火動血得熱而妄行用四物加炒芩炒梔膽草一劑而血止更以加味逍遙散而愈 仝上

張路玉治徐君玉素稟陰虛多火且有脾約便血症十月間患冬溫發熱咽痛里醫用麻杏橘半枳實之屬遂喘逆倚息不得卧聲颯如啞頭面赤熱手足逆冷右手寸關虛大微數此熱傷手太陰氣分也與萎蕤甘草等藥不應為製猪膚湯一甌方見燥症門馬元儀案命隔

湯頃熱不時挑服三日聲清終劑病如失 虛火

朱丹溪治施卜年四十因灸火太多病腸內下血糞肚痛今痛自止善嘔清水食不下宜清胃口之熱黃芩甘草茯苓各五分陳皮地黃各一錢連翹白朮各一錢五分生薑三片 外因及內傷兼行 補瀉

楊乘六治姚又曾病感症 二字在此案却不必泥 外涼內熱肢冷口渴痞悶昏沉語言譫妄不食不便 婦人產後血虛火盛者尤多此症不必有所感也 醫作肝經鬱火治用逍遙加生地薄荷兩劑益煩躁不安 即症候原屬肝火在立齋時原以逍遙加芎歸治之然在此時則迥別矣脈沉伏按至骨則細數有力面黑滯舌黃燥乃火遏

陽明胃陰不能充拓所以脈與症皆內顯陽徵外呈陰象也此等病原因肝火逆入胃絡兼犯心包而然楊因高曰是胃陰而襲其說皆失本原之論凡肝經陰虛陽盛者服逍遥則火愈上竄惟左歸集靈相宜蓋二方能滋養肝血也于胃何與或問症既火遏法宜疎散乃服前劑轉劇何也曰逍遥中榮胡薄荷風藥也單走肝膽若陽明病用之則火得風而益熾矣第用左歸欲去茯苓以滋胃陰加生地當歸以清胃火症自平耳如言病減數劑而痊後數年病復如前醫見身涼脈細用左歸飲加附子則神情昏憒狂擾不寧即前方去附子加花粉一劑而安乃去花粉數劑而愈虛火

龔子才治一人頭痛發熱眩暈喘急痰涎涌盛小便頻數口乾引飲遍舌生刺縮斂如荔枝下唇焦裂面目俱赤煩躁不寐或時譫妄如烟火上衝急飲涼茶少解已瀕于死脈洪大而無倫且有力㮮其身烙手此腎經虛火游行於外投以十全大補加山萸澤瀉丹皮山藥麥冬五味附子一鍾必須冷服熟睡良久脈症略減三四再以八味丸服之諸症悉退後畏冷物而痊

虛火

薛立齋治李閣老序庵有門生饋坎離丸喜而服之曰前丸乃黃柏知母恐非所宜服者內經有云壯火食

氣少火生氣令公之肝腎二脉數而無力宜滋化源不宜瀉火傷氣也不信服將兩月脾氣漸弱發熱愈甚小便澁滯兩拗腫痛公以為瘡毒曰此肝腎二經虧損虛火所致耳當滋補二經為善遂朝用補中益氣湯夕用六味地黃丸諸症悉愈嘗見脾胃虛弱肝腎陰虛而發熱者悉服十味固本丸與黃柏知母之類反泄真陽令人無子可不慎哉虛火

一男子口舌糜爛津液短少眼目赤小便數痰涎壅盛脚膝無力或冷或午後脚熱勞而愈盛數年不愈服加減八味丸而痊虛火

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

男子咳嗽喘急發熱煩躁面赤咽痛脉洪大用黃連解毒湯二劑少退更以巵子湯四劑而安實火

蔣仲芳治楚中一商性急而初嗜烟閱三日五心發熱咳嗽大作百藥不愈診之六脉俱洪火症也莫非烟毒乎其人亦悟曰吸烟則嗽愈甚遂以麥冬知母三巵花粉黃芩蘇子甘草蔞仁枇杷葉煎成去查入砂糖一兩和服四劑而痊沈效曾抄本

聶久吾曰予稟素弱神雖強而精甚弱脾腎兩虛即節慾猶然與感症門予平生少病相背二十前後常服參朮等補脾而僅免于病至三十後脾胃稍可頗覺上膈有熱時

盜痛口舌每服清上藥輟愈亦不為大害也至乙未春夏自察脉覺兩尺弱而寸關亦不能壯疑下虛水不能制火宜補下滋水以制之若但清上非治本也商之饒姓老醫亦以為然遂用當歸人參熟地茯苓五味石棗肉巴戟故紙肉蓯蓉鹿膠仙茅遠志棗仁天麥冬枸杞兔絲之類以山藥末酒和為丸服至兩三月上膈虛火盡除口齒等病不復作自後滋補丸藥服無虛日迄今二十餘年無虛火者滋水制火之功也可與虛門黃褒素案合參

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷九

錢塘魏之琇玉橫撰

惡寒

張子和治一婦身冷脈微食沸熱粥飯六月重衣以狐帽蒙其首猶覺寒泄注不止常服薑附硫黃燥熱之劑僅得平和稍用寒涼其病轉增三年不愈診其兩手脈皆如絇繩有力一息六七至脈訣曰六數七極熱生多以涼布捨心次以新汲水淋其病處婦乃叫

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

殺人不由病者令人持之復以冷水淋其三四十桶大戰汗出昏困一二日而向之所惡皆除此法華元化已曾用惜無知者（他案在寒熱門）

戴原禮治松江諸仲文盛夏畏寒常御重纊飲食必令極熱始下咽微温即嘔他醫投以胡椒煮伏雌之法日啖雞者三病更劇戴曰脈數而大且不弱劉守真之火極似水此之謂也椒發三陰之火雞能助痰祛益其病耳乃以大承氣湯下之晝夜行二十餘度頓減纊之半後以黄連導痰湯加竹瀝飲之竟瘳（兩浙名賢録）

李士材治吳文邃眩暈三載雖戰慄惡寒而不喜飲熱湯五月向火數爐擁居帷帳屢服薑桂不効脉浮之細小沉之堅搏是欝火内伏不得宣越也用金花湯加柴胡甘草生薑乘熱飲之移時而惡寒減再劑而撤火爐適月而起更以人參湯進六味丸兩月全安

張路玉治謝某七月間病瘧因服芩知石膏聿稍間數日後因小便精大泄遂腦痛如破惡寒振振欲擗地醫用八味六君子三倍參附而寒不除繼用大建中每服人參三錢熟附二錢其寒益盛至正月診之脈僅三至弦小而兩寸俱伏但舉指忽覺流利其症

雖五囊重裹大畏隊風如箭而不喜近火或時重時輕口臭氣息全冷胸中時覺上衝小腹堅滿塊壘如石大便堅硬欲了不了小便短數時白時黃陽道雖痿而緩緩不收氣息憔悴而不晦暗此症本屬陽虛因用參附過多壯火不能化陰遂鬱伏土中反致真陰耗竭法當升發其陽先與鬱火湯六服繼進升陽散火補中益氣肢體微汗口臭氣溫脈靜復五至後服六味丸生脈散異攻散調理全康

玉田隱者周貞字治衛立禮得寒病雖盛夏必裹重裘擁火坐密室中他醫投以烏附轉劇曰此熱極似寒非真寒也用硝黃大寒之劑而愈（醫說續編○九靈山房集）

抱一翁治一人泄瀉惡寒見風輒仆日臥密室坐火蒙氈出語咿嚶氣息以沉寒痼冷屢進薑附益甚診之脈濡弱而微數濡者溼也數者脾伏火也脾伏火邪溼熱下流非寒也法當升陽散火以逐其溼熱治以柴胡升麻羌活澤瀉等劑繼以神芎丸（消石大黃牽牛連芎薄四五劑而穀去次日遂安

薛立齋治一人雖盛暑喜擁大四肢常欲沸湯浸之喜食辛辣熱湯面赤吐痰一似實火吐甚則宿食亦出日入食反出是脾胃虛寒也用四君子加薑附而愈

一士人患惡寒右尺獨滑尺滑者澀熱下隔也惡寒者因積勞傷脾胃氣下隔穀氣不得升發無陽以護榮衛也用補中益氣湯加肉桂二劑而愈

龔子才治一婦人六月惡寒之極雖穿綿襖亦不覺熱此火極似水也六脉洪數小水赤少以皮硝五錢温水化服而愈

薛立齋治一婦人內熱作渴大便秘結畏惡風寒手足逆冷此內真熱而外假寒先用黃連解毒湯後用六味地黃丸而愈

朱丹溪治晉雲胡君錫年三十一形肥而大色蒼後家富而足專好口味兩年前得消渴病醫與寒涼藥得安有人教以病後須用滋補令其專用黃雌雞因此食至千餘隻漸有腸滿嘔吐之病醫者意為胃寒遂以附子沉香之藥百餘帖嘔病除（此謂劫之而愈反致重病世不知此以為治驗古今受其害者可勝數哉）月餘天氣大熱忽惡風冷足亦怕地氣遂堆糠尺許厚上鋪以簟糊以重紙方敢坐卧而兩手不能執筆口鼻皆無氣以呼吸欲言無力行十餘步便困倦脉皆浮大而虛僅得四至乃作內有淫痰因多服燥熱藥遂成氣耗血散當此夏令自合便死因其色之蒼厚神氣尚全可以安穀遂以人參

版權圖書, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

黃耆白朮熬膏煎淡五味子湯以竹瀝調飲之三日諸病皆愈令其頓絕肉味一月後康健如舊又以雞湯下飯一月後胸腹膨滿甚自煎二陳湯加附子豆蔻飲之頓安問調理藥教以勿藥并斷肉飲自愈

寒熱

汪石山治汪世昌形肥色紫年逾三十秋間病惡寒發熱頭痛自汗惡心咯痰惡食醫以瘧治診之脉浮濡而熱右寸畧弦曰非瘧也此必過勞傷酒所致飲以清暑益氣湯四五服而愈

易思蘭治一春元下第歸得寒熱病每日申酉二時初微繼作大熱而躁躁甚如狂過此二時平復無恙惟小便赤黃而澁往時有一心事夜即夢遺每日空心用鹽飲燒酒數杯醫皆以為病瘧用清脾飲柴苓湯并截藥俱不效六脉惟右尺浮中沉取之皆洪數有力餘部皆平曰此潮熱病也以加減補中益氣治之日進一服三日病漸退復用六味地黃丸兼前藥調理一月而安或問寒熱而不以瘧治何也曰此非瘧乃潮熱也潮者如水之潮依期而至八法流注云申酉二時屬膀胱與腎此病專屬二經二經水衰火旺

當申酉時火動于中故發熱而躁躁屬腎若瘧疾肝部必弦今不然惟左尺獨現大狀此因平日斲喪太過腎水虧損陰火妄熾加之鹽飲燒酒引入腎經故小便赤黃而澁也又曰此莫非陰虛大動乎曰陰虛之熱自午至亥發熱不間今惟申酉時熱熱止便涼與陰虛不同又曰或亦嘗用補中益氣而不効何也曰加減之法或未同耳予之去升柴加丹皮澤瀉黃柏者丹皮瀉膀胱火澤瀉瀉腎火黃柏為君以生腎水水旺則火衰而寒熱退矣用六味丸者亦取有丹澤瀉耳如不知此仍用升柴乃以肝脾之藥治腎所以不効

孫文垣治李坦渠子婦十月寒熱起一日一發咳嗽心痛腰亦痛次年正月望後始間日一發肌肉大減喉疼汗出如雨白帶如注飲食減少百治汗不出診之右手軟弱左手散亂此汗多而脈不斂病至此危矣經云火熱似瘧此之謂歟以黃耆二錢白芍一錢五分甘草阿膠各一錢鱉甲三錢桂皮五分烏梅一個水煎服其夜汗止再診脈已斂神氣亦回前方加何首烏石斛牡礪寒熱亦不發飲食稍加駸駸有幽谷回春之象

喻嘉言治吳吉長內新秋病洒淅惡寒寒已發熱漸生
咳嗽然病未甚也服表散藥不愈體日疲羸延至初
冬飲以參朮補劑轉覺厭厭欲絕食飲不思有咳無
聲瀉利不止危甚醫議以人參五錢附子三錢加入
薑桂白朮等作一劑服以止瀉補虛而收背水之捉
病家無措延喻診畢未及交語前醫至即令疏方愈
颯然而出蓋以渠見既訛難以言耳既去乃曰是症
總由悞藥所致始先皮毛間洒淅惡寒發熱肺金為
時令之燥所傷也用表散已為非法至用參朮補之
則肺氣閉錮而咳嗽之聲不揚胸腹飽脹不思飲食

肺中之熱無處可宣急奔大腸食入不待運化而直
出食不入則腸中之垢污亦隨氣奔而出是以瀉利
無休也今以潤肺之藥兼潤其腸則源流俱清寒熱
咳嗽泄瀉一齊俱止矣服四劑必安不足慮也方用
黃芩地骨皮甘草杏仁阿膠一劑瀉即少止四劑寒
熱俱除再數劑咳嗽亦愈設與若輩商之彼方執參
附為是能相從乎又鄉中王氏婦秋月亦病寒熱服
參朮後亦厭厭一息但無咳嗽十餘日不進粒米亦
無大便時時掌去不省人事其夫來寓詳述其症求
發補劑乃與大黃芒硝石膏甘草四味為粗末與之

彼不能辨歸而煎服其婦云此藥甚鹹夫喜曰鹹果
補藥遂將二劑連服頃之腹中努痛下結糞數塊絶
而復甦進粥二盞前病已如失矣來謝乃悉之凡此
素有定見于中始無炫惑書之為臨症者廣其識焉
高鼓峯治程氏子病瘧每日至辰時大寒午時大熱熱
柴胡南星半夏等勢轉劇復延診值醫者在詢之曰
此何症也而用前藥曰子不識乎此肝瘧也肝瘧令
以補脾之藥不即効延他醫用
即厥兩目直視不能出聲頰脫涎水從口角涌出日
流數升至丑時始汗解飲食不進昏冒欲絶診之皆
誅伐太過所致也投以補脾之藥不即効延他醫用

人色蒼蒼然太息其狀若死高笑曰據子述經言當
得通脈四逆矣何用前藥某誠不識此何病但知虛
甚耳請先救人然後治病何如曰子用何藥曰大劑
參附庶可挽回彼力爭參附不便乃漫應曰謹奉教
始洋洋色喜而別是夜用人參一兩黃耆二兩炮薑
三錢比曉熟地桂附並進次日辰時病不復發矣此
緣勞役過度寒熱往來醫認為瘧且時當秋令一味
發散寒涼重虛其虛展轉相因肝脾大敗非峻補氣
血何由得生夫病由人生人將死矣而乃妄牽經義
強合病情及至處方又乖成法自誤誤人至死不覺

悲夫

呂仲嘉內人在室十四歲時病寒熱往來迨後適仲嘉又十餘年寒熱如故或作瘧治或作虛治屢枯削幾于骨立高診之曰此非瘧非虛乃血氣症耳以五加皮散加熟地二兩每劑共藥五六兩許水二升濃煎一升每日晝一劑如是者二十劑而寒熱頓除

馮楚瞻治徐山公患似瘧非瘧醫以柴胡湯連進數劑漸至不省人事口禁僵卧咸謂無生理曰此陽虛作寒陰虛作熱誤當瘧治不死也以重劑熟地白朮五味牛膝麥冬製附子另煎人參一兩冲服三日而甦後用溫補而愈

吳孚先治小姨病寒熱如瘧語言譫妄如見鬼狀有指為熱入血室者然證與長沙所論三條了不相合診得右手浮滑知為風痰膠固肺藏故洒淅寒熱痰迷心竅故語言譫妄宜發表利氣自愈用二陳加蘇防前葛枳桔桑杏數劑微汗而痊

薛立齋治一婦人因夫久出經閉發熱月經旬日方止服降火涼血藥內熱益甚自汗盜汗月經頻數曰內熱自汗乃脾氣虛弱也月經頻數乃血不歸脾也用歸脾湯六味丸而愈

一室女久患寒熱月經失期以小柴胡湯加生地治之少愈更以生地黃丸而痊柴胡秦艽各半兩生地二兩酒浸杵膏赤芍一兩為末蜜丸每三十九烏梅湯下日三服

易思蘭治一男子病寒熱衆以瘧治年餘不愈又以為勞瘧虛瘧用鼈甲散補中益氣湯俱不効脈左右三部俱浮大無力形瘦色黑飲食不美知為陰虛發熱病也早進六味丸晚服補陰丸七日後飲食漸美寒熱減半又服一劑未一月全愈蓋此似瘧非瘧乃陰虛之候也凡正瘧則寒熱參差而有準今寒熱往來或一日一次二次汗兼之形瘦身黑且寒而不厥身熱如火熱退又無汗且瘧脈當弦（諸虛亦多弦）損脈發則弦而大退則弦而小今浮大無力早晚相同誠陰血不足陽火有餘火發于外則為熱火鬱于中則為寒形瘦者火之銷鑠也色黑者火極似水也悸忡不睡者心血虧損也（肝火浮入脫絡）多飲食不美口渴便秘者火熾于上下也但生腎水養血滋陰陰血充則火自降寒熱退而病瘳矣

立齋治一婦人久患寒熱服清脾飲之類胸膈脹飽飲食減少用調中益氣加茯苓半夏炮薑各一錢二劑

而瘥

朱丹溪治趙孺人夜間發寒後便熱丑寅時退起來口渴食少無味穀不化腹痛而泄倦怠或遇事則熱躁赤眼氣壅又不耐風寒亦惡熱白朮歸身二錢白芍陳皮一錢八分黃芩五分炒柏炙草炒芩丹皮木通縮砂三分煎下保和丸實腸丸各三十丸

呂十四孺人怒氣後寒熱咳嗽食少淋泄縮砂甘草三分人參五分白朮錢半連翹陳皮茯苓一錢薑二片

同煎

一婦人年五十餘形實喜作勞性急味厚喜火食夏却

患惡寒發熱更作無休時衣被雖厚常凜然兩脉皆澁朱作襍合邪治之遂以四物湯加陳皮以人參白朮為君生甘草黃柏為佐多入薑汁吞通神丸三十丸回金抑青各二十丸阿魏十丸煎三帖而得睡第五帖而身和第七帖通身微汗諸症皆去

華佗傳有婦人長病經年世謂寒熱注病者冬十一月中佗令坐石槽中平旦用寒水汲灌云當滿百始七八灌會戰欲死灌者懼欲止佗令滿數將至八十灌熱氣乃蒸出巖巖高二三尺滿百灌佗乃使燃火温牀厚覆良久汗洽出著衫汗燥便愈三國志

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

馬元儀治張某寒熱數日中痛嘔逆胸滿身疼左脉弦
澁關尺虛微此中氣虛寒胸中之陽不化而為滿胃中之陽不布而為嘔衛外之陽不固而為痛以四君子補脾胃之虛炮薑附子肉桂補陽氣而敵陰邪少加黃連以為引導一劑脉起再劑痛處移動得睡不數劑而霍然

顧允諧寒熱日作胸滿不舒自汗不止已數日或用柴胡黃芩兩解之法不愈診其脉右三部虛微左三部弦澁望其色枯白不澤脉微為陽微弦為虛風由正氣不足虛邪外襲而成寒熱治宜補益中氣即有胸滿亦是陽虛不布非氣實而然也況自汗者陽虛不能衛外為固也面色不華者氣血虧損無以上榮于面也遂與理中湯理其中氣加桂枝以祛虛邪後倍加參附不數劑而愈

唐氏子患寒熱彌月不瘥胸中有塊高突按之則痛時見厥逆兼多自汗診其脉右三部虛微按之如絲此症實脉虛邪實正衰之候也攻之則礙虛補之則助邪然用補則正氣旺而邪自去若任攻則邪氣去而正獨全者鮮矣用人參二錢扶元養正為主佐以炙甘草和中益氣以却虛邪炮薑黃連半夏以開痞而

散結肉桂以固其本桂枝以越其邪二劑寒熱減兩脈起倍人參以助中焦湯運化而痛漸平再用桂附理中湯調理而愈

一婦人患寒熱半月兩脈浮虛按之則豁然空兩尺倍甚曰脈見空豁寒熱不時面色不華者血氣不榮也語言錯亂者神明失養也與歸脾湯加黃連肉桂各七分令其心腎內交服後脈漸有神改用人參三兩黃耆三兩歸身一兩炙草二錢生地五錢遠志二錢棗仁三錢杞子五錢大劑補氣養榮數劑寒熱止神氣清令早服七味丸下午進歸脾大造膏百日而愈

朱丹溪治一人天明時發微寒便熱至晚病盛于陽兩腋汗出手足熱甚四肢為諸陽之本則胸滿拘急大便實而能食邪熱可知似勞怯病者虛損之甚亦作寒熱脈不數但弦細而沉此張仲和謂為有子之候詢知因怒氣而得但用大柴胡湯惟胸脅拘急不除後用二陳湯加羌活防風紅花黃芩治法

汪石山治一人形短蒼白平素善飯五月間忽發寒熱醫作寒治躁渴益甚時常咳梨嘔吐痰多每次或至椀許飲食少進頭暈昏悶大便不通小便如常或赤夜夢不安或一日連發二次或二日三日一發或連發二日平素兩關脈亦浮洪先令服獨參湯二三帖

嘔吐少止寒熱暫住三日他醫曰渴甚脉洪熱之極矣復用獨參以助其熱非殺之而何及往視脉皆浮洪近數曰此非麁而亦非熱也脉洪者陰虛陽無所附孤陽將欲飛越故脉見此其病屬虛非屬熱也渴甚者胃虛津少不上朝于口亦非熱也蓋年逾六十血氣已衰加以麁藥性皆燥烈又當壯火食氣之時老人何以堪此然則邪重劑輕非參所能獨治遂以參耆各七錢歸身麥冬各一錢陳皮七分甘草五分水煎每次温服一酒杯服至六七帖痰止疾除食進大便自餘不通導之以蜜仍合服三十餘帖以斷病根續後脉亦收斂而緩非復向之鼓擊而駛也

來天培治馬振昌室年約五旬夏間忽患寒熱頭痛每未申時起至寅卯時退頭暈胸胃嘈雜或作風暑治益甚不能飲食無汗氣急懶言診之六脉沉細兩關微弦此勞倦傷脾中氣不足外感寒邪內傷生冷清陽不升氣虛不能外達也與補中益氣湯加炮薑半夏一劑汗出熱短嘈雜漸已繼以歸脾湯加半夏桂枝白豆蔻仁寒熱除飲食進調理而痊

馬氏嫗年七旬八月忽病寒熱惡心頭疼身痛心跳不眠嘔吐不食展轉呻吟診之兩關弦而緊餘脉細小

以為脾氣虛寒肝氣上逆與薑附理中湯加白芍和肝二劑漸瘳

霍亂

張子和曰泰和閒余親見陳下廣濟禪院其主僧病霍亂一方士用附子一枚及兩者乾薑一兩炮水一椀同煎放冷服之服訖嘔血而死頃合流鎮李彥直中夜忽作吐嘔自取理中丸服之醫者至以為有食積以巴頭下之三五丸藥亦不動至明而死可不哀哉遂平李仲安攜一僕一佃客至郾城夜宿邵輔之書齋中是夜僕逃仲安覺其遠也騎馬與佃客往臨潁急追之時七月天大熱炎風如箭埃塵漫天至辰時而還曾不及三時往返百二十里既不獲其人復宿于邵氏齋中夜聞呻呼之聲但言救我不知其誰也執火尋之仍仲安之佃客也上吐下瀉目上視而不下胸膈痛不可動搖口欠而脫血四肢厥冷此正風溼喝三者俱合之症也其堉曾聞余言乃取六一散以新汲水對生薑調之頓服半升其人復吐乃再調半升令徐服之良久方息至明又飲數服遂得起調養三日平復

張甲僑居司徒蔡謨家遠出數宿謨晝眠夢甲云暴病心腹疼腹滿不得吐而死所病乾霍亂可治而人莫知其藥故死耳但以蜘蛛生斷其脚吞之則愈耳謨覺探之果死其後有乾霍亂者試用輒瘥客中閒集出幽明錄

孫文垣治程氏子先醉酒後御色次早四肢冷胃腕痛極脉僅四至或以攣大為治投以寒涼痛更甚三日前所食西瓜吐出未化乃翁以為陰症傷寒欲用附子理中湯不決進孫治之視其面色青慘叫痛而聲不揚坐卧煩亂此霍亂兼蚘厥症也先當止痛安蚘後理霍亂可免死也遲則誤事矣急用五靈脂醋炒三錢蒼朮一錢五分烏梅三个川椒炮薑桂心各五分水煎飲下痛減大半下午以大腹皮藿香半夏陳皮山查五靈脂茯苓兩帖全安

沈繼庵內人患發熱頭痛遍身痛乾嘔口渴胸膈脹悶坐卧不安醫與參蘇飲乾嘔愈甚又加煩躁孫診之右手洪大倍于左左浮數曰乾霍亂也以藿香正氣散去白朮桔梗加白扁豆香薷一帖吐止食進遍身痛除惟口渴額痛未愈以石膏香薷滑石各五錢橘紅藿香葛根各二錢檳榔木瓜各一錢甘草五分薑三斤一帖而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

柴嶼青治濕陽少宗伯諱德福夏月抽筋吐濕用六和湯而愈秋間過府署致謝再診其脉弦洪異常謂宜合丸劑調養彼謂病已可不信因謂京兆吳穎庵曰德公脉氣不佳又不信柴曰不預行服藥脉已先時而見明年春夏可慮至期暴脫著人相邀已無及矣

凡吐濁轉筋者其肝本平素有病也

陳三農治一婦暑月方飯後即飲水而睡睡中心腹痛極肢冷上過肘膝欲吐利而不得吐利絞痛垂死六脉俱伏此水寒鬱熱氣不得升降故也用鹽五六錢炒紅入薑五錢搗碎同炒煎湯吐之一吐減半再吐而安

陸祖愚治陳敬橋毋四旬外身體肥胖暑月多啖生冷夜半腹痛上不得吐下不得瀉或與藿香正氣散入口即吐不得下咽診之左三部沉緊而細右寸關沉實有力面色紫脹四肢厥冷昏不知人牙關緊閉此寒氣太重中焦氣滯不得剋化先用烏梅擦牙俟開即投抱一丸三釐腹中鳴響去垢穢若干四肢温暖面色如常然昏昏似醉懶于言語恐元氣太削遂用歸芍川芎茯苓豆仁木香陳皮木通等四劑全愈

王宇泰治一老人暑月霍亂昏冒不知人脉七八至洪

古籍醫學善本珍本

大無力頭熱如火足寒如冰半身不遂牙關緊急此
年高氣弱不任暑氣陽不維陰即濁陰不維陽即吐
陰陽不相維則既吐且濁也正值暑氣極盛之時非
甘辛大寒之劑不能泄其暑熱墜其陽燄而安神明
遂以甘露飲甘辛大寒濁熱補氣加茯苓以分陰陽
治一婦患吐濁十餘日水粒不入發熱煩躁欲去衣被
冰水調灌漸愈
六脈浮洪重按全無用六君子加藿香砂仁附子冷
服諸症悉愈
薛立齋治進士李通甫之內冬間開衣箱其內衣裳乃
夏月所晒者開時覺為暑氣所侵良久患霍亂足指
足跟多轉筋甚惡自分必死用香薷飲一劑急煎下
咽即愈
儀部李北川仲夏患腹痛吐濁兩手足拘之則熱按之
則冷其脈輕診則浮大重診則微細此陰寒症也急
服附子理中湯不應仍服至四劑而愈（附子理中猛劑也不應則不遂可知故可仍服也）
包瑞溪學憲傳繆仲淳傷暑霍亂神方絲瓜葉一片白
霜梅肉一枚并核中仁同研極爛新汲水調服入口
立瘦（廣筆記）

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

馬銘鞠傳霍亂方用粟米連殼搗碎煎湯温服下口入
愈屢試神効 今上

梁溪顧聖符傳治霍亂方取扁豆葉搗汁一椀飲之立
愈 今上

繆仲淳治高存之家僕婦患霍亂以砂仁一兩炒研鹽
一撮沸湯調吟定服一劑愈傷冷物者加吳茱萸四
錢 今上 錢字宜酌

瘴

陳三農治制府王姓感冒瘴氣寒熱胸膈飽悶頭疼眩
暈惡心脉數而洪用藿香正氣散加厚樸楝柳羌活
防風蘇葉一劑而寒熱退頭不痛減去羌蘇防風加
草豆蔻半夏枳殼惡心脹悶俱愈

梧州方姓脉弦而數頭疼身痛惡心飽悶發熱用羌防
芎蘇藿朴二陳蒼朮甘草楝柳二服而減因飽脹未
全退加草豆蔻草果方愈 此頭疼惡心飽脹所以異于感冒乃瘴氣也

端州李別駕鑲藍旗人年四十餘能騎射署雷州府時
善搏虎不避風雨寒暑涉溪陟嶺染瘴已深其所感
風寒暑溼不一而足矣且久客半載甫歸本署未暇
休息遂往省謝謁上臺可謂勞于公事忘于已躬其

如積邪所感猝然皆發醫者紛紜據云畧為解散已進補劑而邪氣大作寒熱神昏譫語脈空數無根神氣散亂補瀉兼施而議論紛然矣招陳往視而脈已如水上萍（仲景只作萍上油）刻刻欲脫寒熱間作蓋受病既深精氣兩虛邪氣正熾難以措手擬用五積散加附子人參去麻黃而易羌活已言明不治之症不忍坐視勉盡愚衷之意擬豆方有難色不欲下藥之語遂置不用越一宿復拉往視脈症殆甚因見案頭昨藥尚存遂堅辭而出後聞以陰癉陽虛而用金匱腎氣湯加參者有以為虛症似癉當用補中湯而加參附

者三劑而神昏氣喘虛汗如雨足冷而脫矣不知此症初實受瘴氣屢感屢深今則乘虛而發有云傷寒偏死下虛人況瘴氣而風寒暑溼倫感者乎

正紅旗孫兄粵東轉運使高公令親也高札云舍親孫某患不起之症非某不治亦作善之一端時因余創育嬰局于廣省故云然也往診其脈空豁恍恍不定重按無根神昏譫語寒熱大作加之咳嗽痰喘轉側不能盡夜惟伏几呻吟且胸膈脹悶足冷惡寒詢知夏秋積勞寒暑皆受一月以前初感頭疼身痛憎寒惡熱咳嗽或用桔梗杏仁乾葛羌蘇汗而不解復用

桑皮前胡蘇子半夏貝母知母黃芩亦不應寒熱更甚又用小柴胡加山庵元參薄荷咳嗽更甚不知此症夏秋暑溼風寒兼感而發尚未能汗何能解散遂用五積散二劑汗出如淋咳嗽亦減可伏枕矣惟寒熱未退病久元氣已虧氣上喘小便如油短數其火從下而上盛下虛用金匱腎氣二服氣平便順然潮熱如故時有囈語昏胃午後用參附六君湯朝與腎氣丸經月汗止神清凡用參附共劑許又服還少丹加河車桂附鹿膠及十全大補湯五十餘日元氣始復飲食如常此與李別駕同一病形脉雖少異一

以信藥而生一以不信藥而殞噫

戊寅十一月高醫使公子患似痢非痢紅多白少惡寒微熱脉滑而數詢知自夏秋以來由川北隨任之粵久積暑溼感冒而發用平胃加羌防蘇藿一劑而寒熱退再劑加茯苓香而瘳或問痢忌燥藥今用蒼朮而愈何也曰常人痢疾因暑令火熱之氣而得燥藥乃天時之忌是以不可擅用今以積溼之病發于隆冬外感乃得力要藥也所謂治病而搜其原者片

刀可瘳故醫無醫執方病無執藥云

梁溪碁師周西侯之弟開銅山於英德其山下有水人

浣水則垢膩皆去相與為奇以其近便炊爨皆用之未幾人皆黃胖身軟腹脹而無力飲食倍進寒熱間作善唉鷄豕諸肉則胃腹少安在廠同事斃者不一因求省求治用平胃正氣治其病後以益氣六君補其受毒水剋削之餘而安此即粵西太平柳州南寧毒水瘴之一班也

一時閒山同病還省數人有似瘧非瘧如驛官之戚陳某者醫以瘧視不及月餘而疾篤因勢急方求診脈已細緊而數飲食不進陳曰若欲治何不在一月之前病雖甚而元氣猶在今精神殆盡雖有婆心無藥可施奈之何哉

閱一載驛官復有甥陳姓亦以閒山病歸仍犯毒水所得似痢非痢寒熱間作醫以香連朴硝大黃行藥消導日益困羸易醫曰可以進補用白朮五分陳皮二分茯苓四分病無進退名陳診猶謂飲食尚可料不致大變脈之恍然不定重按已絕人將謝世而飲食猶能此所謂行屍之疾邪火浮載真精告竭矣辭之閱二日而卒

新安程聖林長子年十六精血克足飲食倍進丁丑春從父到廣年餘患似痢非痢足腫便赤此受暑溼瘴

熱之病半年前曾視其脈數適六至每言于其父此有積疾非壽徵也即欲急治已屬難能人皆以為謬未幾而發此疾醫用寒如大黃黃柏黃連黃芩朴硝消導如枳實梹榔厚朴山查草菓補如參耆八珍熱如桂薑茱萸投倫進時陳奉制府之掐留滯端州兩月歸而往視不可為矣噫

洞庭賀澤民按察雲南時分巡騰衝等處討賊因染瘴癘腰股發熱有監生殺犬煮餽之令空心恣食飲酒數杯即去溺溲少傾清利其脹漸退蓋犬肉能治瘴也 客座新聞

治瘴法宜温中固下升降陰陽及灸中脘氣海三里或灸大指及第五指皆能柳熱若用大柴胡湯及麻黃金沸草散青龍湯膠柱鼓瑟斷不敗矣又中瘴失語俗為中艸子移時血凝立死法當用針刺頭額及上唇仍以楮葉擦其舌令血出徐以藥解其內熱立効 居易錄

漳水界有一水號烏脚溪涉者足皆如墨數十里間水不可飲飲則病瘴梅龍圖儀嘗治牒至漳州素多病預憂瘴癘為害至烏脚溪使數人肩荷之以物蒙身恐為毒水所沾兢惕過甚盱睢瞿鑠忽墮水中至於

沒頂乃出之舉體黑如炭爺奴自此宿病盡除頓覺
康健說顧

江南閒有溪毒疾發時如重傷寒識之者取小筆管內
鼻中以拍彈之三五下即出黑血良久疾愈不然即
不救錄異記

行路時但見前後山閒有氣如虹或白即是瘴氣急以
身伏于地下用口合土俟其氣散乃起則無傷蓋其
氣浮空而過不著于地也若有梹榔及蒜服之亦可
漱石閒談

瘴疾吐下皆不可治之法惟灸中脘氣海三里三處
并灸大拍再用針多刺額及上唇令多出血又以楮
葉擦舌亦令出血然後用藥解楮葉之毒內熱既除
瘴毒自消矣粵擴

琇此則本赤雅與居易錄小異

友人言粵西某蒜瘴殊甚縣令赴任即死無逾三月者
一丞至任歷十餘年家口染疾死亡殆盡叫丞久無
恙然無他術獨嗜燒酒終日沉醉而已粵擴

周公謹云香附四兩去黑皮微炒片子薑黃湯浸一宿
洗淨二兩甘草一兩炒各細末入鹽點辟嵐瘴之氣
極妙志雅堂雜抄

王佥張衡馬均皆胃重霧行一人無恙一人病一人死問其故無恙人曰我飲酒病者食死者空腹博物志

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

錢塘魏之琇玉橫撰

嘔

杜壬治安業坊有閻家老婦人患嘔吐請石秀才醫曰胃冷而嘔下理中丸至百餘丸其病不愈石起之召杜至曰藥病正相投何必多起石曰何故藥相投而病不愈杜曰藥石未及更進五十丸必愈果如其言石于是師法于杜

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

王普侍郎病嘔飲食皆不得進名孫兆治數日亦不愈後復名杜公澥曰治嘔愈嘔此胃風也遂用川烏一兩淨洗去皮臍不去炙以漿一椀煮乾每个作兩片復用漿水一椀煮盡更作四片細嚼一片以少溫水下少頃嘔遂止痛既少息杜遂問曰尋常好噢何物曰好噢甘甜之物杜曰是甘甜乃膏粱之物積久成熱因而生風非一朝一夕之故也王服其說 全上

毛公弼有一女甯苦嘔吐求龐安常醫與之藥曰嘔吐疾易愈但此女子難不嫁則此病不作若有娠而嘔作不可為矣 公弼既而孕果以嘔疾死○曾達臣獨醒雜志

臧中立毘陵人客鄆崇寧中徽宗后病甚中立應詔以布衣麻屨見命之入診出問何疫中立對曰脾脈極虛殆嘔鴻之疾作楚和藥以進且曰服此得睡為効至宿半果思豬食不一月獲安賜歸詔出官幣予地築室南湖以居焉 寓簡 波府志

許學士政和中治一宗人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥石不下用丁香藿香滑石等藥下咽即吐許曰此正汗後餘熱留胃脘正宜竹茹湯用之即愈

薛立齋治府庫沈姬文母患脾虛中滿痰嗽發熱又食濕麪冷茶吞酸嘔吐絕食誤服參連青皮等藥益加

寒熱口乾流涎不收聞食則嘔數日矣迎治曰脾主
涎以脾虛不能約制也欲用人參安胃散感于衆論
以為胃經寒火宿食治之病日增劇忽思冬瓜食如
指甲一塊頓覺嘔吐酸水不止仍服前藥愈劇復邀
視之則神脫脈絕瀕死矣惟目睛尚動曰寒淫于內
治以辛熱然藥不能下矣急用鹽艾附子炒熱熨臍
腹以散寒回陽又以口氣補接母口之氣又以附子
作餅熱貼臍間時許神氣少甦以薑水附子為末仍
以是藥加陳皮煎膏為丸如粟米大入五七粒于口
隨津液嚥下即不嘔二日後加至十粒諸病少退甘

涎不止五日後漸服前劑一二貼胃氣少復乃思粥
飲後投以薑水等藥溫補脾胃五十餘劑而愈（婦人良方）

一人湯藥入口即吐出六脈洪大有力此因地道不通
故氣厥逆上行而食物難入耳不更衣已十餘日服
承氣等湯俱不納曰秘結日久涌逆氣盛故也止沸
莫若抽薪遂用蜜導去燥糞數升嘔吐即止調以養
血清火之劑而安

周慎齋治一人飲食如常每遇子時作吐大便秘結其
人必苦慮憂思脾氣鬱結幽門不通宜扶脾開竅為
主遂以薤白木以蒼术拌炒久甘草各一錢附子

烏藥煮三分水煎服愈醫通

一士鬱熱嘔吐用竹茹山尼各三錢陳皮茯苓各二錢甘艸一錢煎成加薑汁五匙熱服而愈大還

陸養愚治李飛廳因飯後勞攘下午飲酒數杯遂覺臍下小腹作痛升至胃脘即嘔訖痛止少頃又從下痛上復嘔訖痛緩自後痛嘔益頻自起中毒以淡鹽湯蘆汁探吐之一無所出醫投藿香正氣散不効其脈浮按細數稍重即伏沈按甚堅曰此飲食過飽急遽所至與潤字丸百十顆令淡薑湯服之少頃連瀉數行而愈

龔子才治梁太守女患頭暈嘔吐聞藥即嘔諸醫束手令以伏龍肝為末水丸塞兩鼻孔用保中湯以長流水入膠泥攪澀煎冷頓服而安萬病回春

信陵府桂臺殿下夫人善怒即嘔吐胸膈不利煩躁不寐腹痛便祕食下即吐已八日心慌喘急危甚診之六脈虛微此血虛胃弱氣鬱痰火也與二陳湯加薑連酒芩炒炟當歸酒芍香附竹茹白朮入薑汁竹瀝二服而安

張景岳治吳參軍因食蘑菇致大吐大瀉醫謂速宜解毒以黃連黑豆桔梗甘艸枳實之屬連進而病益甚

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

胸腹大脹氣喘水飲不食延張診之以人參白朮甘草乾薑附子茯苓之類彼疑曰腹脹氣急口乾如此安敢服此耶閱日愈劇再求治與藥如前且疑且畏含淚吞之一劑而嘔少止二劑而脹稍衰隨大加熟地以兼救其涸亡之陰前後凡二十餘劑復元如故蓋蘑菇之為物必產于深坑枯井或沈寒極陰之處其得陰氣最甚故肥白且嫩也今中其陰寒之毒而復解以黃連之寒其解毒之謂何茲用薑附以解其寒毒人蔘熟地以解其毒傷元氣此疾之所以愈也

金氏少婦素任性每多胸脇痛（肝火）及嘔吐等症隨調隨愈後于秋盡時前症復作而嘔吐更甚病及兩日甚至厥脫不省（肝火）眾謂湯飲不入無策可施一醫云唯用獨參湯庶幾萬一張診之其脈亂數且煩熱躁擾意非陽明之火何以急劇若此乃問其欲冷水彼否即點頭遂與以半鍾惟此不吐且猶有不足之狀乃復與一鍾稍覺安靜因以太清飲投之有謂此非傷寒又值秋盡能堪此乎不與辯及藥下咽即酣睡半日不復嘔矣後以滋陰輕清等劑調理而愈大都嘔吐多屬胃寒而復有火症若此者（此病火症極多張偏于溫補故有此多屬胃寒又是何說）經曰諸逆衝上皆屬于火即此是也自

後凡見噦吐其有聲勢湯猛脉見洪數疙多煩熱者皆以此法愈之（以多屬胃寒及自後二字觀之張生火上逆故暴急如此而曰以多屬胃寒誤亦不少矣蓋此疙良由肝洪陽明之火其孟浪可知）

張路玉治曾鮮弟婦患噦吐不食者月餘服寬膈理氣二十餘劑幾致絕粒而脉落脈異常診之脉得虛大而數按仲景脉法云大則為虛此胃中陽氣大虛而濁陰填塞于膈上也因取連理湯方用人參三錢服之四劑而脉正復進後與異攻散調理而康

孫紹有胸中寒疾每酒後苦噦服姜薤湯愈艸似竹根花葉陰乾昔華陀入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也（本草）

陳良甫曰胃寒噦吐者手足心熱政和中一宗人病傷寒得汗身涼數日忽噦吐藥與飲食俱不下醫者皆進丁香藿香滑石等藥下咽即吐予曰此疙汗後餘熱留胃脘猶此竹茹湯正相當爾亟治藥與之即時愈

有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脉息凡一日半與大承氣湯一劑至夜半漸得大便通脉漸生翌日乃安此關格之病極難治醫者當謹審也（垂死而活者惟一人而已）經曰關則吐逆格則小便不通如此亦有

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

不得大便者 衍義 醫說續編

張子和治柏亭王論夫本因傷子憂抑不思飲食醫者不察以為胃冷血寒之劑盡用病愛嘔逆而瘦求治于張一再涌泄而愈歸家忘其禁忌病復作大小便俱秘臍腹撮痛嘔吐不食十日大小便不通十三日復問張曰今先食葵羹菠薐菜猪羊血以潤燥開結次與導飲丸二百餘粒大下結糞又令恣意飲水數升繼投風丸桂苓白朮散以調之食後服導飲丸三十餘粒不數日前後皆通痛止嘔定張臨別又留潤腸丸以防復結又留滌腸散大便秘則用之凡服大黃牽牛四十餘日方瘳論夫因噎曰向使又服向日熱藥已非今日人矣一僧問張云腸者暢也不暢何以此一句儘多按子和之醫大抵此法行之耳丹溪云凡病人欲吐者切不可下之逆故也縱使二便復秘可行疎通亦中病而止然後養其氣血潤其腸胃庶乎標本之治乃贏眷之人服大黃牽牛四十餘日方瘳豈理也哉違聖人之法以欺後世恐非子和之筆也孟子謂盡信書不如無書學者詳之 醫學續編原評

薛立齋治一婦人食少作嘔口吐痰涎面黃腹痛月經

不調手足逆冷此內外俱傷之疝遂以六君加附子木香治之而愈

一男子食少胸滿手足逆冷飲食畏寒發熱吐痰時欲作嘔自用清氣化痰之劑胸腹呼吸不利吐痰嘔食小便淋瀝又用五苓散之頻小便不利諸疝益甚曰此脾土虛寒無火之疝故食入不消而反出非氣膈所致遂用八味丸補中益氣湯加半夏茯苓薑桂旬日乃愈

一婦人因勞役發熱倦怠吐痰欲嘔或以為火疝用清熱化痰等藥反大便不實無氣以動此寒涼復傷中氣形病俱虛用複煮木草麥冬五味陳皮附子治之而痊後復勞經水數日不止衆以為附子之熱所致用四物苓連槐花之屬涼而止之前疝愈甚更加胸膈痞滿飲食日少仍用前方去門冬更加茯苓半夏炮薑數劑漸愈又用當歸芍藥湯而經止但四肢通冷飲食難化不時大熱此命門真火衰脾土虛寒之假熱也用八味丸半載而愈又服六脉丸三載而生子

宋理宗嘔吐不止名楊老治之問何方用曰辛熱藥也帝曰服之不効吉老奏曰熱藥冷服藥成放井中良

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

久澄冷進服一啜而吐止 萬密齋幼科發揮

立齋治一婦婦惡心少食脈解毒藥愈嘔此胃氣虛也以六君子湯加生薑治之而安戴氏云元禮如惡心者無聲無物欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心非心經之病皆胃口工宜用生薑蓋能開胃豁痰也

施笠澤治鄒翁患嘔吐遍身疼不能轉側醫為療其嘔吐矣然眠食猶未安也診之曰風入于經其脈乃凝苗結不散寒痰中僻四末不掉三焦不行亟疏其風亟調其經氣和平血轉側自能先用蘇合丸以通其氣隨用導痰湯加桂枝沈香白芍一劑即熱睡覺而

屢轉自如再用六君子加沈香數劑而安

馬元儀治表某患小腹厥氣上衝即吐得飲則吐愈甚諸治不效診之兩脈虛濇右尺獨見弦急曰人身中清氣本乎上而反陷下則為泄濁氣本乎下而反逆上則為嘔為吐今病正在下而不在上也下焦之濁氣上騰則胸中之陽氣不布故飲入于胃有上壅而不下達耳經曰雲霧不清則上應白露不下非地道得通濁氣何由而降嘔吐何由而止以調胃承氣湯一劑下宿穢甚多繼培中氣而愈

張司馬子婦患胸中滿結作痛飲入則嘔涌出痰涎多

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

成五色已数月或主攻伐或主補虛卒無一效至七月病轉危迫診之兩關尺虛微少神體倦神煩胸中結痛按之愈甚此正氣內傷陰邪內結攻之則傷其正補之則滯其邪當以仲景臟結之法治之用黃連湯加桂枝甫一劑嘔吐頓徐除再劑胸中滿痛亦釋次用理中加桂湯数劑而安

張景岳曰沈姓者業醫年及四旬極勞碌因癲疝下墜欲提止升用鹽湯吐法遂吐不至湯水不受如此一日夜復大便下黑血一二枕脉微如毛欲絕此蓋吐傷胃氣脾虛之極兼以鹽湯走血脾土能攝從便而下令速用人參薑附等以回垂絕之陽忽一醫至曰諸迭衝工皆屬于火大便下血亦因火也尚堪參附乎宜速飲童便則吐可愈而血亦止矣病者然之及童便下咽即嘔極不堪而愈甚

琇按疝下墜本由肝木厥張乃復激之上騰致脾胃俱傷而下血不死何俟童便固非即參附亦未為是也

馮楚瞻治蔣公子精神素弱吐血陰虧調理初愈忽又夢遺大吐不已六脉沈微曰夢遺俗名走陽更傷矣大吐不止又亡陽矣急以附子理中湯去甘艸投之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

到口即吐又以白通湯調人尿與之亦吐衆所用方不出理中四逆逆白通之類然均不受沈困數日工不能入下不能出遷有進西洋藥酒一方神治關格吐逆之疴內皆辛熱純陽之藥能破格陽之陰又燒酒力猶辛烈直透丹田令照方備治飲之即不吐矣遂以參附峻補之藥陸續漸進調理而痊

琇按馮氏生平多尚温補如此疴吐血陰虛之德後夢遺而吐多由龍雷之火下迫工奔以辛熱治其標則可若守而不化則後患不可測也

盧復曰生平間銅腥臭即惡心入口鮮不吐者雖參湯與茶久在銅銚中煮亦然常思銅青固劇吐藥唯我何獨畏之甚久未晰此穀辛炙夏卧病聞銅臭而嘔忧自反為木形人色常青畏金故于銅臭為相忤因思子和吐論中原吐之藥四十有六種嘗讀而未能解也遂將以五形五色之人而施之若木形人畏金腥而吐則火形人畏鹹腐水類而吐矣然畏者必惡之因其惡以激其怒則用力少而成功多餘三形可以剏見噫豈唯吐藥為然而下而汗盜不可乎 沈抄

聶久吾曰庚寅季春別駕夏公至新興寺放飢穀予備酒飯款之正飲間忽然腹痛其痛從臍下小腹氣痛

吐

至胃脘即嘔：記痛止半時許又從下痛上復嘔：記痛止如是者數次醫作感寒治用藿香砂仁等藥不效至申刻予覺是內熱作痛熱氣上衝而嘔必須利之然煎劑不可服恐反增嘔急製犀牛大黃丸服至數錢利數次而脫然愈矣黑犀牛（四兩半炒半生磨取頭末一兩）大黃（酒炒一兩五錢）梹榔（六錢）枳實（炒六錢）厚朴（薑汁炒六錢）三稜（醋炒）莪术（醋炒各六錢）為末濃米湯為丸梧子大服三錢未利再服二錢俟二三時見效

鮑漱飲年二十餘以夏月肩輿返歙途次受熱臭穢盈盆愈後偶啖梨遂得吐症蓋肝火而非胃寒也百治無效聞道吐字則應聲而嘔以故家人咸戒之後至吳門就葉氏診以其脉沈細令服附子理中湯人參薑附俱用三錢服後出門行及半里覺頭重目眩急歸寓及門而朴幸其尊人雅諳藥性謂必中附毒亟煎甘草湯灌之良久甦醒後去附子仍服三劑吐轉劇再往診仍令服前方遂不敢試改就薛氏告以故薛用六君子湯服四劑無驗再求診遷薛宅往薛堺令照方加益智仁一錢再服亦不應又求診于孫某

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

其方用甘艸八錢下咽即吐因不復求治而返偶以
冬月送殯感寒增咳纏綿至夏余偶訪之則病劇詢
知為何患吐近復二便俱秘已七八日不食惟渴飲
茶水更醫數人或令以艾炙臍俱不應請診之見其
面色青悴脈弦伏而寸口溢謂此緣脾陰大虧木火
熾甚又因久嗽肺虛肝無所畏遂下乘脾而土傷胃
致成關格聿脉不數易已也宜先平其肝俾不土衝
而吐止斯肺詩下降而便行令以黃連肉桂各五分
隔湯蒸服飲下覺吐稍止即能食糕數塊然二便脹
不可支令以大田螺一枚獨蒜一枚搗爛罨于丹田

以物繫定不逾時二便俱行所下黑皆青色遂霍然
而愈時甲戌五月二十七日也後與六味加減入沙
參麥冬等咳嗽亦止向後常服養營之劑吐不作矣
葉太史古渠在工江學幕中患吐疴久不愈凡學使按
臨之弼必召其名醫診治兩年餘更醫十數病日甚
歲莫旋里或與二陳加左金吳萸川連俱用五六分
服下少頃吐血梳許脉之不數第兩寸俱上魚際左
尺微不應指彼欲言滿源及所服方藥余曰悉知之
吳弟服余方五十劑乃浔痊計熟地當用三斤許乃
訝然莫喻問所患究何病曰彼上江名醫不過謂病

痰欬耳所用方不過四君六君香砂六君已耳遂拍案笑曰一皆如是但非痰欬何以多酸苦涎沫令欬食日減何以反重用熟地曰此疟由于腎虛肝失養木燥生火上逆胃絡肺金亦衰欬食入胃不能散布通調致精液停畜脫中遇火上衝則吐而出也四君二陳香砂數皆香燥之品以之為治猶抱薪救火反助之然必滋水生木潤肺養金庶可獲効第陰藥性緩病既久非多劑不瘳也用熟地杞子沙參麥冬石斛等出入加減初服吐自若十劑外吐遞減食漸增果至五十劑而愈

倪首善年未二十稟賦甚弱早婚浔吐病或與二陳五香等劑轉甚有用桂附者服一劑覺不安乃止有教單食豬油者初頗效後亦不應脈之虛弦畧數與生熟地沙參麥冬川連姜仁四劑後去連又三十餘劑而瘥

高氏女七八歲時即病頭痛而喔或酸或苦百治不効其父詢余曰此肝火上逆耳與生地杞子沙參麥冬二三劑即愈後及笄于春盡病復作其父已歿乃兄延數醫治之所用皆二陳六鬱香砂丁桂之類經半年面殺青股無肉其母泣令延余仍前方每劑熟

地一兩二十餘劑乃愈

金氏婦患吐疝逾十餘年矣所服香燥不可勝計後左脇漸有塊經水不行脈滑數善怒延診辭不治強不已勉與六味加減服之頗有驗然一怒即發越半年而愈

福建羅二尹悔齋久病足疼于去年春嘗嘔而汗頭大出醫療無效乃不藥數月漸可隨于夏間又患不眠治亦無效至秋後乃痊今年春因公事寓杭求鍼科治足疾又為炙中臍氣海等穴十餘壯步稍良而嘔症大作入食即吐絕粒數日又不眠服薑附桂二

木二陳等覺有烟辣之氣工衝診之六脈大如鼓頭兩寸溢出魚際舌瘦小伸之極尖且顫中黃胎邊紅癮額色赭石臭色熏焦小便清白大便常五日一行謂之營氣大虧肝腎之火上逆胃絡則嘔吐浮入心胞則不眠與養清湯加川連牛膝米仁屬其驗小便黃則病退一劑則不嘔能食小便果黃色二劑得眠舌胎淡紅癮消唯兩股如有物動輒牽引加山甲川楝二劑左脅下之物即墜下又加枇杷葉熟地姜仁去山甲川楝川連牛膝二劑石腸之物亦墜下脈亦稍斂大便二日一行以行期甚迫屬其照方服至

舌不顧乃可或足疾再甚慎進風燥之劑所以云者知其鍼之得瀉而暫愈耳

反胃

常熟一富人病反胃往京口甘露寺設水陸泊舟岸下梦一僧持湯一杯與之飲罷覺胸快次早入寺乃梦中所見僧常以此湯待賓故易名曰甘露飲用乾餙糖六兩生薑四兩二味同擣作餅或焙或曬入炙甘艸末二兩鹽少許點湯服之予在臨汀療一小吏旋愈切勿忽之 總洪濟本草綱目

金山周禪師得正胃散方于異人用白水牛喉一條去兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠黑片收之臨時旋炙用米醋一盞浸之微火炙乾淬之再炙再淬醋盡為度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾每服一錢食前陳米飲調下輕者一服立效凡反胃吐食藥物不下結腸三五日至七八日大便不通如此者必死用此方十痊八九君子收之可濟人命也 普濟方本草綱目

天順間有周岐鳳者身兼百技溺意方術既死友人偶召乱周至運乱如飛頃刻數百言乃長詩也後一段

云朗吟堂前夜欲闌丹方爲興期平安菊莊老人此老病翻胃病寔由胃寒枇杷葉芎白豆蔻紫蘇子芎用莫謬良薑官桂用竪須厚朴陳皮看功奏半夏梹榔赤茯苓沈香丁皮皆用輕白芥蘿香吐聖藥杵頭糠子尋至誠三片生薑兩枚棗扣碎分明向君道人參乃是佐使者貪前一服沈痾好蓋菊莊患此病周示以方也第菊莊未知何許人餘詩不錄 祝子志怪

薛立齋治一婦人患反胃胸膈脹悶或小腹不利或時作痛小便澁滯曰此肝火血虛也當清肝火生肝血養脾土生肺金以薛言為迂別服利氣化痰等劑前疝益劇虛疝蠭起乃用加味逍遙散加味歸脾湯兼服尋愈

一婦人患反胃吐痰甚多手足常冷飲食少思曰此肝脾鬱怒兼命門火衰不信另服化痰利氣之劑胸腹愈脹又服峻利疎導之劑薛曰非其治也必變脾虛發腫之疝急服金匱加減腎氣丸恕有可救仍不信反服沈香化氣等丸果發腫而歿

汪石山治李一之年近四十病反食與近隣二人脉病頗同汪曰二人者皆急于名利惟一之心寬可治遂以八珍湯減地黃加薑香為末用蜜韭汁調服而愈其

一人逾年果殁

張路玉治湯伯乾子年及三旬患嘔吐經年每食後半日許吐出原物全不穢腐大便二三日一行仍不燥結渴不喜飲小便時白時黃屢用六君子附子理中六味丸皆罔效日漸干危診之兩尺弦細而咸兩寸皆濇而大此腎腸真陽大虧不能溫養脾土之故遂以崔氏八味丸與之或謂附子已服過二枚六味亦曾服過恐味未能奏效也張曰不然此疴本屬腎虛及以薑附白朮伐其腎水轉耗真陰至于六味雖曰補陰而陰藥性滯無陽則陰無以生必于水中補火斯為合法服之不終劑而愈

張三錫曰治反胃新汲水一大椀煎半椀將半椀水內細〻澆香油鋪滿水面然後將益元散一帖輕〻鋪滿香油面上須臾自然沈水底此即陰陽升降之道也用匙攪勻服却將所煎水半椀盪藥椀漱口令淨吐即止却進未予涼膈散通其二便未效再進一帖益元及涼膈即效也此方極驗

王叔權曰有人久患反胃予與鎮靈丹服更令服七氣湯遂能立食若加以炷艾尤佳有老婦患反胃飲食至晚即吐出見其氣縷臍而轉予為點水分氣海并

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

夾臍邊兩穴他醫只灸水分氣海即愈神效 資生經
浙省平章南征閩越還病反胃醫以為可治朱先生診
其脈告曰公之病不可言也即出獨告其左右曰此
病诗之驚後而使內火木之邪相挾氣傷液亡腸胃
枯損食雖入而不化食既不化五腸皆無所稟去此
十日死果如言 越游集
薛立齋治一婦人患反胃胸膈痞悶得去後或泄氣稍
寬此屬脾氣鬱結而虛弱也當調補為善不信乃別用
二陳枳實川連之類不應又用香燥破氣時師類多出此前
疟益甚形氣愈虛再歸皮湯調治半載而瘥 醫說續編

許學士治一婦人年四十餘久患反胃面目黃黑歷三
十餘年醫不能効脾俞諸穴燒灸交遍其病愈甚服
此藥頓然全愈服至一月遂去其根名附子散用附
子一枚極大者生于磚上四面著火漸漸逼熱焠入
生薑自然汁中再用火逼再焠約盡生薑汁半椀焙
乾入丁香二錢每服二錢水一盞粟米少許同煎七
分不過三服瘥

蕭萬輿曰崇禎戊寅歲客汴梁為一郡王宮人產後發
呃疟言及先王壯齡時患瘧痢反胃遍治不瘥自料
無生理一草醫亦精于脈者連投五劑用大黃七兩

始能食再投十餘劑計服大黃斤許前症漸愈後日服痰藥滾痰丸兩旬方浮全痊越年餘連生五子壽至九十三歲而處如此稟賦亦所不概見者

瀉

羅萬安分務廣陵苦脾瀉家人禱于后土祠是夕萬安曰此疾可治今以一方相與可取青木香肉豆蔻等分棗肉為丸米飲服下二十丸此藥太熱疾平即止如其言瘥 嵇神錄

宋高宗嘗以瀉疾召王繼先繼先至則奏曰臣瀉甚乞先宣賜瓜而後靜心診御工急召大官賜瓜繼先食之工既覺其食瓜甘美則問繼先朕可食此乎繼先曰臣死罪索瓜固將以啟陛下食此也詔進瓜工食甚適瀉亦隨止左右驚工亦疑問繼先曰此之何方也繼先曰工所患中暑故瀉瓜能消暑耳 四朝聞見錄 葉紹翁

王淀亦頗宗繼先術亦有奇驗然用藥多孟浪高宗居北宮苦脾疾淀誤用瀉藥竟至大漸孝宗欲劓之市朝憲聖以為恐自此醫者不肯進藥止命秋府杖其背黥海山淀先懷金箔以入既杖則以傳瘡若未當

受杖後放還天街猶揭于門曰四朝御醫王防禦遷居有輕薄子以小楮帖其旁云本家兼施瀉藥王慚甚全工○程史云高宗風賦克寔自少至老未嘗用温劑每小不怡輒進蠲毒丸數百一以莞花大戟大黄為主一日進鋸鉏覺胸膈欲壅王洼尤甚前藥既投而不支遂以大漸云云實材治一人患暴注因憂思傷脾也服金液丹霹靂湯不效蓋傷之深耳命灸二百壯小便始長服神仙神丹而愈

一女子因泄瀉發狂言六脈緊數乃胃中積熱也實詢其丈夫因吃胡椒生薑太多以致泄瀉五日後發狂言令服黄芩知母湯而愈擾此則實亦非概用熱補也

衍義治一人大腸寒清小便精出諸熱藥服及一斗二升未効後教服赤石脂乾薑各一兩胡椒半錢同為末醋糊為丸如桐子大空心及食前米飲下五七十丸終四劑遂愈醫學經目

張子和曰昔聞山東楊先生治府主洞泄不止楊初未對病人與衆人談日月星辰纏度及風雲雷雨之變自辰至未而病者聽之忘其圖楊嘗曰治洞泄不已之人先問其所愛之事好棋者與之棋好樂者與之望笛不勿輟脾主信又主思慮投其所好以移之則病自愈維揚府判趙顯之病虛羸泄瀉褐色乃洞陰泄寒中疝

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

也每閒大黃氣味即注泄張診之兩手脈沈而軟令灸分水穴一百餘壯次服桂苓甘露散胃風湯白朮丸等藥不數月而愈

趙明之耒載不消腹作雷鳴自五月至六月不愈諸醫以為脾受大寒故併與聖散子豆蔻丸雖止一二日藥力盡而復作諸醫不知藥之非反責明之不忌口張至而笑曰春傷于風夏必飧泄飧泄者米穀不化而直過下出也又曰米穀不化熱氣在下火風入中中者脾胃也風屬甲乙脾胃屬戊己甲乙能尅戊己腸中有風故鳴經曰歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄診其兩手脈皆浮數為病在表也可汗之直斷曰風隨汗出以火二盆暗置牀之下不令病人見火恐增其熱紿其入室使服涌劑以麻黃投之乃閉其戶從外鎖之汗出如洗待一時許開戶減火一半須臾汗止泄亦止喻嘉言治周信川用火之法追祖此○見痢門○凡熱極則生風觀杜壬治王善喔疙因多食甘甜而成胃風其理自見也

麻知幾妻當七月間病臟腑滑泄以降火之藥治之少愈後腹脹及乳痛吐如吹乳頭重壯熱面如渥丹寒熱往來嗌乾喔逆胸膈脇痛不能轉側耳鳴食不下又復瀉欲瀉其火臟腑已滑數日矣欲以温劑又

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

禁上焦已熱寒不得其法請張未至因檢劉河間方
惟益元散正對此症能降火解表止渴利小便宣利
安神以青黛薄荷未調二丼置之枕右使作數次服
之夜半遍身冷汗出如洗元覺足冷如冰至如足大
暖頭頂輕肌涼痛減嘔定利止及張至麻告之以解
張曰益元固宜此是少陽症也能使人寒熱偏劇它
經總有寒熱亦不至甚既熱而有利何不以黃連解
毒湯服之乃令診脈張曰娘子病來心常欲痛哭為
快否婦曰欲如此予亦不知所謂張曰少陽相火淩
爍肺金受屈制無所投告肺主悲但欲痛哭而為
快也麻曰脈初洪數有服益元散後又已平又聞張
之言使以當歸白芍以解毒湯味數服之大瘥矣
一僧病泄瀉數年丁香豆蔻乾薑附子官桂烏梅等燥
藥爐鍼燒臍滿腕(一作脫)無有缺者一日發昏不省張診
兩手脈沉而有力脈訣云下利微小者生脈浮大者
無瘥以瓜蒂散涌之出寒痰數升又以無憂散泄其
虛中之積及燥糞盈斗次以白术湯調中湯五苓散
益元散調理數日而起
劉德源病洞泄逾年食不化肌瘦力乏行步傾欹面色
黧黑凡治痢之藥遍用無効張乃出示內經洞泄之

說以曉之先以舟車丸無憂散下十餘行殊不困已頗喜食後數日更以苦瀋越之病漸愈以梹榔丸磨化其滯待數日病以大減又下五行後數日更以苦劑越之病漸愈而足上患一癰此裏邪去而之外病痊之候候凡病皆如是也子治余氏媳腸症將愈亦指上生癰

劉倉使大便少而頻日七八十次常于兩股間懸半枚瓠蘆如此十二年張見而笑曰病既頻欲通而不得通也何不大下之此通因通用也此一服藥之方乃與藥大下之三十餘行趙止

殿輔之父年六十餘暑月病泄瀉日五六十行喜飲而家輩人爭止之張曰夫暑月年老津液衰少豈可禁水但勸之少飲先令以菜豆雞蛋十餘枚同煮蛋熟取出令豆軟下沉陳粳米作稀粥攪令寒食雞卵以下之一二頓病減大半蓋粳米雞卵皆能斷利然後制抑火泛濕之藥與調順而愈

一男子病泄十餘年豆蔻阿膠龍骨訶子烏梅枯礬皆用之矣中脫臍下三里歲二灸之皮肉皺縮神昏足腫泄如泔水日夜無度張脉其兩手脉沈且微曰生也病人忽曰羊肝生可食乎曰羊肝止泄尤宜食病人悅食一小盞許以漿粥送之幾半升續又食羊肝

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

生一盞許次日泄減七分如此月餘而安夫胃為水穀之海不可虛怯虛怯則百邪皆入矣或思董奶雖與病相反亦令少食冨引漿粥此權變之道也若專以淡粥責之則病人不悅而食減火則病增損命世俗悞人甚矣惟傷寒初愈不可遽食

孫文垣治張懷赤每早晨腸鳴一二次晚間瀉一次年四十二旦未有子診之尺寸短弱右關滑大曰此蓋中焦有濕痰君相二火皆不足故有此症以六君子湯加破故紙桂心益智仁肉豆蔻煎服瀉遂減半前方加杜仲為丸服之愈次年生子

何洗心每飲食稍冷饘粥或稀作必脹瀉理脾之劑歷試不瘳孫診之左三部皆濡弱右寸亦然關滑尺沈微此下元虛寒所致法當温補以補骨脂杜仲吐絲各二錢山萸肉人參山藥各一錢茯苓澤瀉各八分肉果五分數劑愈

吳鶴州母年八十六歲素有痰火大便日三四行一夜兩起腸鳴臍腹膨脹脈三四至一止或七八至一止醫以苦藥入平胃散投之赶伐太過因致腹疼且年高而脈歇止是為凶兆辭不治孫診之曰脈緩而止曰結數而止曰促此乃結脈非凶脈也由寒湿之痰

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

凝滯呵致法當温補下元脾火得以生土呵謂虛則補其母是也吳問壽篆何如曰兩尺迫亡有神壽徵也以補骨脂白朮各三錢為君杜仲二錢為臣茯苓澤瀉陳皮甘艸各一錢為佐肉果益智仁各五分為使四帖大便寬惟腸鳴未止減肉果加炮薑五分而安壽至九十有八

薛立齋治侍御沈東江之內侍食腹痛作瀉以六君加木香炮薑而愈(後復)作傳為腎瀉用四神丸而安侍御徐南湖子室瀉腎經不信薛言專主澀瀉泄後遂致不起

一婦人年踰五十不食夜飯五更作瀉二十年矣後患痢午前用香連丸午後用二神丸各二服而痢止又以二神丸數服而食夜飯不月而形體如故

吳江史玄(母)年素有血疾殆將二紀平居泄瀉飲食少思面黃中滿夏月尤甚治血之藥無慮數百劑未嘗少減薛以為脾腎虛損用補中益氣湯送二神丸復用十全大補湯煎送前丸食進便寬病勢頓退若泥中滿忌服求疼痞忌熟地便泄忌當歸皆致誤事

薛立齋治沈大尹病瀉五更輒利此胃瀉也用五味子散數服而愈因起居不慎瀉復作年餘不瘥此命門

火虛不能生土法當補其母火者土之母也遂用八味丸瀉即止食漸進東垣云脾胃之氣盛則能食而肥虛則不能食而瘦全賴命門火為生化之源滋養之根也故用八味丸屢效只用六味丸亦可

龔子才治一人食下腹即響ㄟ即瀉至不敢食諸藥不効以生紅柿核紙包水濕灰火燒熟食之不三四个即止

許州黃太守患泄瀉二三年不愈每飲燒酒二三鍾則止二三日以為常畏藥不治龔診之六脈弦數先服此藥以解酒毒後服理氣健脾丸而愈宣黃連一兩生薑四兩以慢火炒令薑乾脫去薑取連搗末每服二錢空心臘茶湯下甚者不過二服專治久患脾瀉陳三農治一士喜食瓜果縱飲無度忽患大瀉先用分利不應再用燥濕反加沈困診其六脈浮因思經曰春傷于風夏生飧泄非汗不解以麻黃三錢參朮各二錢甘艸升麻各一錢與之泄瀉頓止以四君子調治而愈

一人脾胃素弱少有所傷即泄瀉此肝氣乘脾且久瀉濕熱在腎故也用白朮八兩紅棗去核四兩二物間襯煮至焦色擣餅烘乾入松花七錢白豆蔻五錢新

米糊為丸午前服愈

一人脚膝常麻飲食多則泄瀉此脾虛濕熱下流用補中益氣湯加防己川柏而愈

一人食物入口頃從大便出其脈洪數其大性急速也用川連消石木通澤瀉人參徐〻服二帖愈

楊起云余壯年患肚腹微〻作痛〻即瀉〻亦不多日夜數行兩月瘦怯尤甚用消食化氣藥俱不效一僧授方用蕎麥麪一味作飯連食三四次即愈簡便方本州

李時珍治魏刺史子久泄諸病不効垂殆李用骨碎補

（縮目）李時珍謂氣盛有濕熱者宜之虛寒人食則大脫元氣而落鬚眉也

為末入猪腰中煨熟與食頓愈蓋腎主大小腸便久泄屬腎虛不可專從脾胃也本州經目

一婦人年七十餘病瀉五年百藥不効李以感應丸五十丸投之大便二日不行再以平胃糁加椒紅茴香棗肉為丸與服遂瘳每因怒食舉發服之即止全上

一婦年六十餘病泄已五年肉食油物生冷犯之即作痛服調脾升提止瀉諸藥則轉甚診之脈沈而滑此乃脾胃久傷冷精凝滯所致王太僕所謂大寒凝火利溏泄綿歷歲年者法當以熱下之則寒去而利止遂用蠟匱巴豆丸五十粒與服二日大便反不行其

瀉愈遂自是每用治泄利積滯諸病相對耳前用皆
不瀉而愈病者近百人蓋妙在配合得宜藥病相對
耳苟用所不當用則犯輕用損陰之戒矣 全上
有人患內寒暴洩如注或令食煨栗二三十枚頓愈腎
主大便栗能通腎如此可驗 全上
易思蘭治瑞昌王妃患泄瀉屢用脾腎門消耗諸藥四
五年不能止一醫用補中益氣湯加人參三錢服一
月不泄忽一日胸膈脹滿腹響如雷大瀉若傾昏不
知人口氣手足俱冷渾身汗出如雨用人參五錢煎
湯灌甦如是者三病者服久自覺口中寒逆醫者以

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

為汗出過多元氣虛弱于前湯內加人參三錢棗仁
大附子薄桂各一錢昏厥尤甚肌膚如冰夏暑亦不
知熱二年計服過人參二十五斤桂附各二斤棗仁
七十斤至己巳冬飲食入口即時瀉出腹中即飢ㇾ
而食ㇾ即瀉日十數次 卿大不殺火性迫速愈盛而愈迫也
寒目畏燈 火熱明顯 初診之六脈全無久按來疾去緩有
力如石閘其聲尚雄壯此乃大鬱火症也以黃連四
錢入平胃散與之飲下少頃熟睡二時不索食不泄
瀉飲五日方知藥味甘苦既用通元二八丹與湯藥
間服一月飲食調和其病遂愈

吳孚先治俞用昭秋間水瀉腹痛異常右脈弦數洪寔知腸胃濕熱挾積用枳殼山查川連青皮槟榔木香一劑而滯見病人虛藥却氣方張非亟攻不能退邪退則正復攻即是補藥邪氣方張非亟攻不能退邪退則正復攻即是補也前方再服二劑愈矣設不早攻必致痢疾非一月不瘥

謝武功素患大便溏泄某病咳嗽用涼藥則咳減而瀉增用熱藥則瀉減而咳劇用補則喘瀉俱甚診之右尺軟如爛綿兩寸寔數搏指酌用肉果附子以温其下焦之寒麥冬川連以清心肺之火茯苓甘艸一以降氣一以和中甫四劑而疴頓減不加人參者緣肺家有鬱熱耳

喻嘉言治胡太夫人病偶然肚腹不宣瀉下數行醫以痢藥治之其痢轉多更引通因通用之法用九蒸大黃丸三錢下之遂攪動胃氣脹痛全不思食收如噤口診之六脈皆沈而伏應指糢糊曰此非痢疴乃誤治之疴也令但安其胃不必治痢而痢自止不必治脹痛而脹痛自除遂以四君子湯為主少加薑勲煖胃之藥二劑痢果不作但苦胃中脹痛不安必欲加入行氣之藥以冀脹消痛止而速浮雕進飲食固爭

白寇可緩于食不可急于藥蓋前因藥悞引動胃氣作楚若再加行氣則脹痛必無紀極即用橘皮須炒而又炒凡五日未得大便亦聽之痛止脹消食進便利共七日全安渾無見藥之功其寖為無功之功也

陸養愚治許默菴素有腸風疝常服寒涼之藥中年後腸風幸愈致傷脾胃因成泄瀉之疝初時服胃苓湯一帖便愈久之不効近来四肢浮腫而厥肚腹膨脹而鳴面色萎黃而帶青身體苦寒而帶熱診之左脈沈緩而遲右脈沈弱而弦曰諸緩為濕應瀉而浮腫諸遲為寒應厥而苦冷右弦為木乘土位應腹脹而面青沈者陽氣不升也弱者陰精不寖也脉色與疝悉相應用人參白朮黃耆炙甘艸為君以補其虛炮薑附子為臣以温其寒升麻防風為佐以升其陽茯苓澤瀉為使以勝其濕十劑而諸疝減又合八味丸間服而愈（超從薛案化出）

沈少西女年二十自小脾胃受傷不時作泄作嘔近則寒熱不時手足厥冷胸膈不舒脇脹噯氣左眠則氣不通暢右脇胃脘時痛時止渴而不欲飲小便短大便日二三行腹中雷鳴彈之如鼓搏之如水大約氣上壅則脹而痛氣下墜則泄而痛幸飲食不甚減常

服胃苓白术黃連及消導之藥或調氣補血之品不
應謂此症非參朮不能取効但今微有表邪先與小
柴胡加枳桔二三帖寒熱稍和（近時庸師得此訣）易以調中
益氣湯加黃柏加青皮以伐肝神麯以助脾炮薑以
温中四帖脹痛俱減大便稍寬改用加減歸脾湯數
劑更以六君子料加枳寔黃連神麯木香砂仁為丸
與煎劑間服月餘而安

陸祖愚治潘古臣母患脾泄久多啖水果瀉更甚嘗因
經水腹痛服攻瘀去血之劑致淋漓不止肌肉枯槁
身體發熱不能轉（側）不思飲食氣短口渴夜卧不安服

麥冬生地棗仁等藥瀉不止脉之兩寸關虛數兩尺
隱隱若無其下此元不足中氣虛寒虛火上炎之
症乃用人參炮薑白朮陳皮山查木香茯仁木通山
藥甘艸豆仁服之頗覺相宜又用肉（果）人參白朮炮薑
棗肉為丸日服兩次一月瀉止兩月肌肉漸（長）月事亦
調

黃履素曰乙巳之夏余患脘痛既而泄瀉偶過姑蘇
一名醫令診之驚曰脾胃久傷不治將滯下予體素
弱憚服攻劫之劑因此醫有盛名一時服之遂服朮
朮黃連厚朴山查木通等藥劑數又服朮朮丸一月

以致脾胃大傷是秋遂瀉泄不止遂覺飲食難化瀉
閒倒飽深自悔恨服參耆等藥及八味丸十餘年始
得愈然中氣終不如故苦不耐飢稍飢則中氣大虛
僅不可忍凡山藥消導之物入口即虛脾胃乏不可
妄攻如此方書極言枳朮丸之妙熟知白朮雖多不
能勝枳窒之迅利予友胡孝輔刺史亦誤服枳朮丸
而大病可見此丸斷非健脾之藥或飲食停滯偶一
二服則可耳。

又曰脾胃喜煖而畏寒脾虛必宜温煖之藥予內人少
患脾有冷痰時患嘔吐不止服藿朔遡源五氣丹數丸
遂不復發予近患脾不和不時瀉泄服參朮三月不
効服胡與辰金鉛一丸脾氣頓佳得兩三月安妥家
菴中一比丘尼患脾疾甚殆肛門不收穢水任出服
金鉛一丸肛門頓斂漸調而愈其神効有如此者故
知脾病之宜于温煖也

張路玉治陳總戎泄瀉腹脹作痛服黃芩白芍之類脹
急愈甚其脈洪盛而數按之則濡氣口大三倍于人
迎此濕熱腸脾胃之氣也與厚朴半夏生薑人參湯
二劑痛止脹減而瀉利未已與乾薑黃芩黃連人參
湯二劑瀉利止而飲食不思與半夏洗心湯二劑而

愈

柴嶼青治學士子崔泉痢後久瀉醫以人參川連為末日服遂致飲食不思每欲小便大便先出求治診其兩尺微細欵絕經曰腎主二便又曰腎司啓閉今腎氣不固是以大便不能自主況年逾六旬不必診脈已知其概而脈又如此更無起蓼遂用補中益氣湯加熟附一錢煨肉菓二錢送八味丸二劑後頗思飲食大便止瀉勃有生机乃忽慕時醫某以為一劑立效二劑而歿惜哉

馬次周令嗣于甲子場前身熱脾泄醫以外感治之屢藥不效診其人迎左尺平弱氣口微緩此屬肝腎脾胃不足用六君子湯加柴胡數劑身涼去柴胡再加歸芍調理而安是科獲雋

張三錫治一人瀉而口乾舌燥脉洪數與六一散一服知二服已又一人服不應用參連四參散效一老嫗久瀉服補劑不應以參苓白朮散加黃連肉豆蔻少許作丸服未半斤永不發

立齋治橫金陳子復面帶赤色吐痰口乾或時作瀉或用二陳川連枳實之類不應脉之左關弦急右關弦大此乃腎水挾肝水之勢而尅勝脾土也不信後交

夏屬（暴）患痢而已

樓全善治翁仲政久泄早必泄一二行泄後便輕快脉滑而少弱先與厚朴和中丸五十丸大下之後以白术為君枳壳半夏茯苓為臣厚朴炙甘草芩連川芎滑石為佐吳茱萸十餘（粒）為使生薑煎服十餘帖而愈

作食積在脾治

羅謙甫曰丁巳予從軍至開州夏月有千戶高國用謂予曰父親七十有三于去歲七月間因內傷飲食又值霖雨瀉痢暴下數行醫以藥止之不數日又傷又瀉止而復傷傷而又瀉至十月間肢體瘦弱四肢倦怠飲食減少腹痛腸鳴又以李醫治之處以養臟湯治之數日泄止後添嘔吐又易以王醫用丁香人參藿香橘紅甘草同為細末生薑煎數服而嘔吐止延至今正月間飲食不進扶而後起又數日不見大便問何以治之醫曰老人年過七旬血氣俱衰弱又況瀉利半載脾胃久虛津液耗少以麻仁丸潤之可也或謂馮村牛山人見證不疑有果決遂請治之診其脉問其病曰此是風結也以搜風丸百餘丸服之利數行而死悔之不已敢以為問予曰人以水穀為本今高年老人久瀉胃中津液耗少又重瀉之神將何

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

依靈樞經曰形氣不足病氣不足則陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯老者絕滅少者不復矣又曰工工平氣中工亂脉下工絕氣危生絕氣危生其牛山人之謂與

琇按是症牛山人固莫可云前李王二君唯知治虛悪陰立進香燥至腸癖枯竭而不知下多忘陰立進香燥至腸癖枯竭而工不納下不出其視牛亦魯衛之政也蓋當時此等症候即羅公生平亦未解用峻劑養營矧其它哉予有治宋復華兄母夫人一案可參閱

繆仲淳治梁溪一女人茹素患內熱每食腸鳴清晨水泄數服脾腎雙補丸立愈人參蓮肉吐絲五味黃肉山藥車前橘紅砂仁巴戟天補骨脂白芍扁豆蜜丸菉豆大每五錢空心飢時各一服如虛而有火：盛肺熱者去人參巴戟天補骨脂元有肉豆蔻無白芍扁豆廣筆記

開慶己未年七月間裕齋馬觀文夫人費氏病氣弱倦怠四肢厥冷惡寒自汗不進飲食一醫作伏暑治之投熱藥無効名僕診之六脉雖弱而兩關差甚裕齋問曰此何症也僕答曰以脉觀之六部雖弱而關獨甚此中焦寒也中焦者脾也

脾胃既寒非特但有是證必有腹痛吐泄之症今四肢厥冷屬脾是脾胃虛冷無可疑者答云未見有腹痛吐瀉之症今用何藥治之僕答云宜用附子理中湯未服藥間旋即腹痛而瀉莫不神之即治此藥一投而瘥 良方

陳良甫治趙府博興輈宜人病泄瀉不止如附子木香訶子肉豆蔻龍骨等藥及諸丹服之皆無効診之云是肝腎脉虛弱此肝腎虛也府博云其說現在何經曰諸方論泄瀉止是謂脾胃病不過謂風冷濕毒之所侵入及飲食傷滯遇腸虛則泄利而不知肝腎氣虛亦能為泄利古書所載甚明不可不辨經云泄瀉前後不止腎虛也又諸厥固泄皆屬于下謂下焦肝腎之氣分也門戶不要倉廩不藏也若病泄利其源或出于此而專以脾胃藥治之則謬固千里矣遂服木香散數服而愈

薛立齋治僉憲高如齋飲食難化腹痛泄瀉用六子湯加砂仁木香治之而瘥後復作完穀不化腹痛頭疼體重困倦以為脾虛受濕用芍藥防風湯而愈

甚曾傳有人年老而顏如童子者蓋每歲以鼠糞灸臍中神闕穴一壯故也予嘗患久瀉利一夕灸三七壯次日不如厠連數夕灸則數日不如厠足見經言主泄利不止之驗也又予年踰壯覺左手足無力偶灸此而愈

太僕楊舉元先為飲食停滯小腹重墜用六君子加升麻柴胡漸愈後飲食難化大便不爽裹急後重數至圊而不得便用升陽除濕防風湯而愈後心腹作痛飲食不甘用和中丸倍加益智仁而尋瘥

光祿楊立之元氣數弱飲食難化泄瀉不已小便短少洒淅惡寒體重節痛以為脾肺虛用升陽益胃湯而瘥大凡泄瀉服分利調補等劑不應者此肝木鬱于脾土必用升陽益胃之劑庶能保生

一儒者季夏患泄瀉腹中作痛飲食無味肢體倦怠用補中益氣湯八味地黃丸月餘而瘥後彼云每秋間必患痢今則無恙何也曰此閉藏之月不遠幃幙妄泄真陽而然前藥能補真火能生土脾氣生旺而免患也

憲副屠九峰先瀉而口渴尺脈數而無力恪用解酒毒利小便之劑不應曰此腎陰虧損虛火熾盛急宜壯水之主不然必發疽而不能收斂也不服信別服降火化痰之劑果患疽而殁

繆仲淳治無錫秦公安患中氣虛不能食亦難化時作泄胸膈不寬一醫誤投枳殼青皮等破氣藥下利完穀不化面色黧白乃用人參四錢白朮二錢橘紅

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

一錢乾薑七分甘灿炙一錢大棗肉豆蔻四五劑漸
愈後加參至兩許全愈三年後病寒熱不思食它醫
以前病因參浔愈勿投以參病轉劇仲瀉至曰此陰
虛症也不宜參乃用麥冬五味牛膝枸杞白芍茯苓
石斛棗仁黿甲十餘劑愈 廣筆記

從妹患泄後虛弱腹脹不食季父延諸醫療之予偶問
疾見其用二陳湯及枳虎山藥等味予曰請一看病
者見其向內卧眠兩手置一處不復動曰元氣虛甚
矣法宜理中湯恐食積未盡進以人參三錢橘紅二錢
加薑汁竹瀝數匙夜半思粥神思頓活季父大喜盡

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

謝諸醫再以六君子湯加山查砂仁麥冬調理之數
劑立起 公上

宋丹溪治一老人奉養太過飲食傷脾常泄瀉亦是
脾泄白朮二兩白芍神麯山查半夏各一兩黃芩五
錢右為末荷葉包飯燒為丸 平治會萃

聶久吾治廬陵尹之母素以善醫名患傷感泄利自治
不効脉之知其原感風寒未經發汗火則入裏鬱為
溫熱又內傷飲食脾胃不和是以作泄乃先與清解
滌其入裏之邪前胡甘灿麥冬連翹赤芍赤花參粉
廣皮山查厚朴黃芩乾葛川連枳殼生薑次日再診

知其熱鬱已去脾胃虛滑用補脾藥一劑而安

宋復華兄尊堂年七十體素肥長夏病泄瀉診之曰此肝木乘脾也宜養肝腎則愈勿治脾與數劑病已略減會復華以事入都家人另延醫投以蒼白朮補骨脂肉豆蔻丁桂香砂健遠扁豆之屬服至百餘日肌肉枯削動則忡惕眩暈食即入喉而下利益頻始謝去再延余但與重劑杞子地黃沙參麥冬朱仁山藥初加川連三分四劑隨減去加人參一錢四五劑亦減去後加肉蔻蒼朮錢四劑凡服藥一月而安類皆甘寒潤滑之品有泥景岳之說謂吐瀉皆屬脾胃虛寒者宜變通焉

復華令正亦患脾泄每五更黎明必行一二次醫亦以香燥辛熱健脾之劑與之治半年餘泄瀉轉加月事數月不至寒熱無時頭暈心忡四肢厥冷每下午則面赤口苦舌燥食則欲嘔寐則多驚辛脉未數亦與杞地沙參麥冬間入酒連諸症遞愈經水亦行再加山藥棗仁食增瀉止

褚某年二十四五新婚數月忽病泄瀉日五六次第食後即急欲如廁腹脹甚腰亦痛脉之兩手俱弦與生地杞子沙參麥冬朱仁川楝稍減旋復乃加杞子至

一兩入酒連四分二劑而愈

項秋子尊堂年五十餘火患泄瀉日常數行凡飲食稍熱即欲去後食漸減治數年無効已聽之偶昏莫于空房見黑影趕外孫也撫之無有因大恐失跌遂作寒熱左脇如錐刺徹夜不眠口苦眩暈或趕邪崇或趕瘀滯幸未服藥診之脉弦數興川連川楝朱仁沙參麥冬生地杞子萎仁纔下咽脇痛如失再劑則累年之泄瀉亦愈矣或問故曰此肝經血燥火旺乘脾之症經曰肝虛則目瞶〻無所見其見黑影者乃眩暈將作又因恐而失跌也夫向之泄瀉治冈驗者蓋時師見症治症所用必香燥參朮諸燥劑也火生于木禍發必克此陰符經之秘旨也醫者能擴而充之則世無難治之病矣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



續名醫類案卷十一

錢塘魏之琇玉橫撰

瘧

竇材治一人病瘧月餘發熱未退一醫用白虎湯熱愈甚竇曰公病脾氣大虛而服寒涼恐傷脾胃病人曰不服涼藥病何時得退竇曰內經云瘧之始發其寒也烈火不能止其熱也冰水不能遏當是時良工不能措其手且扶元氣待其自衰公元氣大虛服涼藥

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

退火吾恐熱未去而元氣脫矣因為之灸命關纔五七壯脇中有氣下降三十壯全愈

張子和曰有一書生瘧閱一日發將秋試及試之日乃瘧之期書生憂甚誤以葱蜜合食大吐涎數升瘧亦宿痰皆盡同室驚畏至來日入院瘧亦不發亦偶得吐法耳

子和治陳下一人病瘧三年不愈止服溫熱之劑漸至衰羸求張治張見其羸亦不敢便投寒涼之劑（張公原自細心）乃取肉經刺瘧論詳之曰諸瘧不已刺十指間出血正當發時令刺其十指出血乙止而寒熱立止咸驗其神

故息城一男子病瘧求治診之兩手脈皆沈伏而有力內有積也此是肥氣病者曰左脇下有肥氣腸中作痛積亦痛形如覆杯間發止今已三年祈禳避匿無所不至終不能療張曰此皆瘧也以三花神佑丸五七十丸以冷水送過五六行次以冷水止之冷主收斂故也濕水既盡一二日煎白虎湯作頓啜之瘧猶不愈候五六日吐之以常山散去冷痰涎水六七次若翻漿次用柴胡湯和之間用妙功丸磨之瘧悉除吳升內翰致和丁酉居金椒縣歲瘧大作遇寒多熱少

欲食不思者用高良薑麻油炒乾薑炮各一兩為漠
每服五錢用猪膽汁調成膏子臨發時熱酒調服以
膽汁和丸每服四十丸酒下亦佳凡救人以百計張
大亨病此甚效致仕亦服之而愈大抵寒發于胆用
猪膽引二薑入膽去寒而燥虔脾胃一寒一熱所以
効也 朱氏集驗方 本草綱目

野史云盧絳中病痞瘧疲瘵忽夢白衣婦人曰食蕉可
愈及旦買蕉數挺食之翌日疾愈 本草綱目

夔州潭遠病瘧半年故人竇藏叟授方用真阿魏好丹
砂各一兩研勻米糊丸皁子大每空心人葍湯化服
一丸即愈世人治瘧惟用常山砒礵毒物多有所
捐此方平易人所不知草窓周密云此方治瘧以無
根水下治痢以黃連木香湯下瘧痢多起于積滯故

耳王珧百一方 全上

碩實先善画陸溉病風瘧久不療實光嘗詣溉遂命筆
圖一獅子像于戶外云旦夕當有驗至夜聞窓窣之
聲明日視獅子口有血淋漓溉病遂愈 姑蘇志 亦厭勝一端

張守溎冬月患三瘧發一月延至王孝先診王搖首
曰更十日則不治矣必用葍附乃可小減其父瞿然
縮舌不敢應王力持前說服葍附各一錢乃至二錢

瘧相損六七明年初夏始愈 華談

孫文垣族子應章三陰瘧發于子午卯酉日昔人謂為少陰瘧已四越月矣每發于夜熱多寒少左脈微弦右關滑大以二陳湯加柴胡黃柏川芎當歸黃連兩帖熱少輕飲食不進四肢懶倦脾氣大虛以白朮何首烏各三錢鱉甲二錢青皮七分烏梅一个一帖而截

應章之弟十月發三陰瘧至次年仲春未止再發于辰戌丑未日昔人謂為太陰瘧午後寒多熱少夜有盜汗左脈軟弱右關尺強數有力用白芍當歸各一錢白朮二錢柴胡川芎甘艸砂仁桂枝酒芩各三分生薑三片水煎服再以首烏鱉甲白朮各三錢柴胡一錢青皮酒芩各五分烏梅一个生薑三片臨發五更服兩帖而止後半月下身大發瘡癤伏暑未盡方中久用黃連之故以東坡四神丹調理而愈

江省吾蕃秋患瘧三日一次發于夜次年仲春猶未止偏身疼痛背脊疼炙之僅止一日後仍發面青肌瘦此邪在足太陽經以遍身及脊疼也用麻黃一錢五分人蔘桂枝白芍甘艸知母各一錢陳皮貝母各七分薑棗煎服痛減半瘧未止以首烏白朮各五錢青蒿一錢烏梅一个陳皮二錢薑三片水煎臨發之日五更服

尋常以六君子加黃耆五味烏梅草果調理而愈

姪孫二水年三十體肥夏月常浸溪中卧松陰下至八月大發寒熱自己午至天明乃退飲食不進嘔吐黃苦胆汁胸膈脹悶舌上乾燥生芒刺沈香色強硬以冷水頻漱乃能語言惟唉生藕西瓜先發熱之日吐血一口今則大便下血且唉噦此溫瘧疫也由醫解散遽用黃耆以閉邪氣致成大困用柴胡知母各三錢石膏七錢葛根三錢橘紅竹茹各一錢五分酒芩枳實各二錢甘草貝母各五分三帖吐止改用二陳湯加柴胡枳實黃芩黃連花粉鱉甲白朮首烏調理而愈

喻嘉言治袁繼明素有房勞內傷偶因小感自煎薑葱湯表汗因而發熱三日變成瘧疾脈之豁大空虛且寒不成寒熱不成熱氣急神揚知為元陽衰脫之候因謂來日瘧發慮大汗不止難于救藥防危不以為意次日五鼓時病人精神更覺恍惚扣門請救及覓復至瘧已先發矣又恐人覆補住瘧邪雖急救無益也此語未善瘧未發時豈無邪也要之發時不當藥耳姑俟瘧勢稍退方與服之服時已汗出沾濡項背之果大汗不止昏不知人口流白沫灌藥難入直至日暮白沫轉涎大孔遺出乃

喜曰白沫下行可免恐矣但內虛腸滑獨參不能勝任急以附子理中湯連進四小劑人事方甦能言但對面談事不清門外有捉病客至渠忽先知家人驚以為崇曰此正神魂之離舍耳令以獨參及附子理中駟馬之力追之尚在半途未返之界以故能知宅外之事再與前藥二帖而安

裕民坊民家淘井得一瓦枕上有一符下有驅瘧二篆字相傳為諸葛武侯所製病瘧者枕之即愈彼此轉相借用遂為隣人所匿因訟于官亦不能得（續金陵事）

陸養愚治崔鹽院八月間患瘧日一發治療十日不愈崔曰此病或煎藥一二劑或丸藥一服未有不止者今服藥一二十劑而病發轉劇何醫之無良也醫者承風進診問曰前日內外之邪尚重未敢即截今邪已去可以截矣因進丸藥一服之嘔惡移時明日果愈但飲食無味口每苦乾甫三日而復作陸診時正值寒戰床帷俱動面赤戴陽（戴陽二字欠妥）汗泄不止身熱如火其脈洪數無倫沈按則鬆（瘧發時脈亦難憑）曰此熱瘧也與三黃石膏湯乃謂瘧門不載仍進前丸一服嘔吐不止至巳午時瘧發更甚（熱）竟日不退再召診因

思兩番之丸藥胃氣重傷且脉較前更弱不可純作
寔熱治矣以白虎湯合建中生脉之半投之一夜二
劑嘔穢即止明日瘧不發矣以清氣養榮丸調理而
安按面戴陽而脉無倫次則似理中疟矣乃作寔熱而與三黃石膏其說不無可議
朱遠齋醫名籍甚與陸莫逆交歸安令聞其名屢召不
赴借事繫之獄歎斃之杖下邑紳十餘輩為請竟不
釋其妻奔號求救陸亦無計可施遲按臺巡湖患瘧
醫治無効召陸診陸喜曰机在是矣視其脉兩寸闕
浮數微弦按之極弱兩尺沈按緊小其疟不發時亦
倦怠身常熱有汗飢而否悶不敢食小腹脹急大便
欵行不行者已七八日發時戰慄身極熱煩渴躁擾
且喘急甚前醫初與薤表後以否悶用二陳青皮草
果燥熱之品喘山亦私用而不應審其平日極喜尊
味病後禁絕惟日啖乾糕數枚大滋潤不進腸胃已
乾重以風熱燥劑之劑安得不否滿燥結乎因思此
疟乃腸寔內虛若以丸劑通其下結以煎劑補其中
虛可立已然必徐為之方可為遠齋地乃曰病無大
害第孰正猖獗必數日方可衰其半十日則全愈矣
促進藥曰此時病將發經云無刺熇：之熱無刺渾
渾之脉無刺漉：之汗為其病逆未可治也既定以

清氣養榮湯進之令以大肉進粥二椀大便未行以
蜜導出燥矢數枚次日瘧減十之三再進前湯二劑
已減十之六七因乘閒曰疾雖減而脈似未減此餘
邪未盡恐後時有變某有師兄朱如玉術高其百倍
若得此人醫治百無一失渠得罪縣尊現在監禁
按臺隨令捕官著歸安縣請來朱得免及進視論病
如見因用潤字丸三錢先服隨以前湯方加生脈散
是夜下宿垢極多明日瘧止矣

陸省愚治沈後菴年五十七月間患瘧日一發或兩發
服藥不効用丸藥截之嘔吐竟日次日瘧不作矣然
飲食日減倦怠嗜卧至八月中復發寒熱一二日仍
以丸藥截之遂嘔瀉數日不止飲食不進即湯水亦
盡吐出身熱戴陽語多譫忘醫尚擬用二陳五苓及
脉其脉浮而微細如絲乃謂曰疾亟矣兄藥寬緩恐
無濟今當用附子理中以冀萬一耳彼醫心不然之
又病家見用附子大駭陸遂辭去彼醫調治兩日而

妄截致害之鑒

陸祖愚治朱明宇因暑月多飲水又勞過度飲食失
節常徹夜不眠偶赴酌歸感寒頭痛身熱胸膈不快
自用蔥薑表汗轉成瘧疾間日一發醫用柴葛胡

草果青皮乾葛羌活之數投之嘔吐及瘧發呻吟煩燥益盛日久漸危脈之氣口沈窒有力膞之工下手不可按六七日不大便口乾煩渴極欲兩瓜冷水曰可立起也因投其所喜用嫩葉蘇嫩薄荷搗汁和勻井水中與飲吐止而有微汗甚覺爽利隨以順下丸四錢投之渴則以前水飲之薄暮沈睡至四鼓腹中響微〻作痛下燥矢七八枚後又連行三次去稠膩甚多是日微發熱懈怠乃用歸芍茯苓知母貝母前胡花粉人參甘草等味調理數日而安

吳却之少年稟弱多勞慮瘧間日一作醫峻以參朮大補家人又以參粥食之遂否悶發狂煩躁不寐脈之左三部弦細而數右寸關浮弦按之有力右尺似有似無其氣血固虛而風寒積滯則寔也用柴胡乾葛黃芩山查厚朴青皮陳皮半夏一劑胸膈畧舒數劑譫妄煩躁悉除瘧發于陽分矣其臭乾唇裂不眠腹中梗塊作痛皆陽明大腑未清也次用枳寔黃山查甘草加鉄鏽水一服即下宿垢十餘枚諸症頓減但真元衰弱瘧尤未已以當歸人參白朮茯苓甘艸柴胡麥冬二母數劑而愈

李士材治楊太史瘧發間日脈見弦緊兩發後苦不可

支且不能忌口便求截之曰邪未盡而強截之未必獲効即使截住必變他症不若治法得所一二劑間令其自止卅麻柴胡各二錢提陽氣上升使速于陰而寒可止黃芩知母各一錢五分引陰氣下降使速于陽而熱自已以生薑三錢却邪歸正甘卅五分和其陰陽一劑而減半再劑而竟止（與後張三錫引準繩一案略同）

程武脩患瘧每日一發自巳午時起直至次寅卯而熱退不逾一時卿又發矣已及一月困頓哀苦求速愈曰頭痛惡寒脈浮而大表症方張此非失汗必誤截也果服截瘧丸而增劇此邪未解而遽止之邪不能

伏教以八劑四日服盡決効矣石膏黃芩各三錢抑陽明之熱使其退就太陰白豆蔻三錢生薑五錢救太陰之寒使其退就陽明脾胃為夫妻使之和合則無陰陽舛亂之慮半夏柴胡各一錢五分去胸中之痰蘇葉二錢發越太陽之邪葛根一錢斷入陽明之路甫三劑而瘧止改用小柴胡倍人參服四劑補中益氣湯服十劑而愈

沈相國患瘧吐蚘悶不思食六脈沈細李曰瘧傷太陰中寒蚘動也用理中湯加烏梅三个黃連五分進四劑後胸中豁然寒熱亦減蚘亦不吐去黃連加黃耆

二錢生薑五錢五劑而瘧止蓋病人素有寒中之疾雖盛暑寒冷不敢沾脣故瘧發而虻動也

陳眉公三日瘧洩歲未瘥素畏藥餌尤不喜人參其脈浮之則濡沈之則弱營衛俱衰故遷延不已因固請曰素不服參天畀之豐也今不可缺者病魔之欤先服人參錢許口有津生腹無煩滿遂以人參一兩何首烏一兩煎成入童汁鍾許一劑勢減七八再劑瘧遂截（與景岳何人欽意同）

一士人病瘧久不愈求道士來以棗一枚按病人口工咒曰我從東方來路逢一池水內一尊龍九頭士八尾問它喫甚麼連喫瘧疾鬼太乙老君急〻如律令勅連咒三遍將棗納病人口中令嚼食之遂愈（二酉雜俎一曰七遍又云棗也）

馮楚瞻治徐六御患瘧不已熱時惡心胸脹倍甚醫用柴胡湯加砂仁豆蔻意其痰食為患耳乃徐素有臭蚯之疫今當壯熱之時忽遇辛熱之藥迫血妄行潰洶數斗昏暈不醒冷汗如珠四肢皆冷脈微欲絕令以獨參兩餘煎汁半鍾灌之始能吞嚥再煎再灌次日稍甦但咽逆不止乃以溫補之劑重用人參冲服諸疫漸平但人參畧少咽逆便甚八服十全早晚服兩

月全愈（誤服辛熱之鑒）

韓老夫人患瘧甚重壯熱無汗六脈洪大而空鴻曰汗生于陰腎主五液今六脈有陽無陰豈可更汗以促其孤陽亡越乎以八味加牛膝五味子每劑納熟地二兩煎梳餘浩飲之滋水即所以發汗也果大汗而愈（蓄營作汗法凡治傷寒感症均宜達此不惟瘧疾為然必用于誤表之後斯為合法）

趙某形甚肥壯而中氣甚虛下元不足夏月患瘧醫以發散和解不愈復以補中益氣調之亦不應發時寒熱大作喉如鵝鼻臉紅喘促出多入少脈之寸關豁大兩尺甚微勢甚危困讀云少不可弱老不可瘧老年氣血衰微大寒大熱非所堪也故常多出不意一時甚絕理宜大補真陰真陽仍佐下歸飲納封藏之劑如八味加五味牛膝為穩若補中益氣恐益令孤陽上浮陽亡于上陰絕于下便有不測之患（觀此則知補中益氣不可用也）況以陰虧陽損之軀而犯陰浮陽竭之病復當陽浮陰耗之時外浮之藥斷非所宜柔病家與醫者均以熱天熱病畏投桂附補中益氣先哲良方必欲進之果喘促愈加夜半而逝

徐氏婦七十餘患瘧工則噦嗽吐血下則泄瀉粒米不進人事不省胸膈脹悶脈則兩寸細數左關弦大石

關甚微兩尺重按不起勢甚危萬知為陰虛內熱外寒肝無血養而強脾無氣充而弱血無所統而吐衄無可運而瀉氣無所納而脹患屬本源為病用重劑熟地白朮麥冬五味牛膝製附子參湯沖服瘧止神清既而病人自謂胸膈有停滯不肯用補乃詭以八味丸為消食丸參湯送下諸症悉痊

謝登之年七十餘偶遘中暍兩疾趨而歸繼發瘧疾甚危每發輒大便二必昏暈欲絕醫以疏散勢愈劇瀉曰胃兩受寒疏散宜矣獨不思經曰驚而奪汗精出于心持重遠行汗出于腎疾走恐懇汗出于肝搖體勞苦汗出于脾皆傷臟也凡入者為寒出者為虛大便出而昏暈元氣欲脫矣尚可以既散之微寒為重而垂絕之元氣為輕邪急以附子理中湯加五味投之而愈

黃履素曰立齋云大凡久瘧乃屬元氣虛寒蓋氣虛則寒氣虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐涎不食泄瀉手足厥冷寒戰如慄若誤投以清脾截瘧二飲多致不起挾山瘧久不止者多成壞症想不遵此治法而醫藥亂投之故予表兄沈鴻生孝廉精神素王自閩游歸患山瘧幾一載元

氣虛耗後瘧雖止而面黑眼黃見者驚異如是有二載卒以臟脹亡先生指久瘧為元氣虛寒信為確論

余少時曾患此雖不敢服清脾截瘧等藥而所進皆柴胡黃芩之劑十四五伐方得止亦甚狠狽矣此病最忌生冷肇腥使滋味淡泊邪氣自衰予病時守戒甚嚴止後姑素者半年月饑極乃肇是以脾胃損關飲食較未病時倍增精神始王

黃之侄倩孫培之得胡興辰金鉛丸有一比丘患山瘧久不止與一丸服之減半盖山瘧屬元氣虛寒金鉛丸能助陽氣故兩丸而竟愈也

張路玉治張怡泉恒服參附鹿角膠等陽藥而真陰向耗年七十五七月病瘧誤進常山截瘧一劑遂人事不省六脈止歇按之則二至一止舉之則三五至一止惟在寒熱之際診之則不止熱退則如前此真氣衰微不能貫通于脈及寒熱時邪氣衝激經脈反得開通此虛中伏邪之象為製方用常山一錢酒拌同人參五錢焙乾去常山但用人參以助胸中大氣而祛逐之因常山傷犯中氣而變劇故仍用之為嚮導耳晝夜連進二服遂得安寢但寒熱不止脈止如前乃令日進人參一兩二次服并與稀粥助其胃氣數

日寒熱止脉惟續而安

顧玉書瘧發即昏睡譫語痞脹嘔逆切其氣口獨見短滑乃有宿滯之氣象與涼膈散易人中黃加果仁一劑而霍然

金氏子八月間患瘧發于辰戌丑未至春子午卯酉每增小寒熱直至初夏診其六脉如絲面青唇白乃與六君子加桂附四服不應每服加人參至一兩桂附各三錢而辰戌丑未之寒熱頓止子午卯酉之寒熱更甚此中土有權而邪併至陰也仍與前藥四服面色榮食進寒熱悉除後與獨參湯送八味丸調治而

安

顧文學年過八旬初秋時患瘴瘧昏熱譫語喘乏遺溺或以為傷寒讞語或以為中風遺溺危殆莫定張曰無慮此三陽合病目不仁而面垢仲景暑疫中原有是例遂以白虎加人參三啜而安同時顧文學夫人朔客衖連山皆患是疫一者黃風用白虎加桂枝一者黃濕用白虎加蒼朮俱隨手而瘥

張飛疇治沈子嘉孚昔夏間臍一著扇則(風)腹痛且不時作瀉六脉俱微數此腎臟本寒閉藏不密易于招風也下寒則虛火上僭故脉數與之六味去澤瀉加肉

桂肉果五味白蒺藜作丸服由是膟不畏風脾胃亦實明秋患瘧醫用白虎竹葉石膏等瘧寒甚而不甚熱青面足冷六脉弦細而數用八味丸三倍附桂作湯更以四君合保元早暮間進二日瘧退調理而愈

高鼓峯治曾獻宸室人十一月病瘧發則頭痛腰痛寒從背起頃之壯熱烙手汗出不止曰此太陽經脉也用大青龍湯曾曰病來五六日委頓甚矣且病者稟素怯弱又他醫言有汗要無汗帶補為主今汗如此而復用此藥恐不能當高咲曰第服此其病自除當晩汗猶未止進一大劑即熱睡次日不發逾日以補中益氣調理而痊

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

徐方虎病三陰瘧已四年矣所治皆武林名醫幸服藥得法不致清敗（剝薄而善步）用人參幾十餘斤然年久病深至自遂不能支形肉盡脫飲食不進每覺有氣從左脇上沖即煩亂欲脫奄奄幾殆乃重用桂附白芍地黃加以耆榮逐醫之藥冬至日正發期是日逐不至（余從姪藻明業醫患此治不効偶端午大咲黃魚竟愈又數人患此過朔日亦瘧）

周生何首烏五錢陳皮二錢青皮三錢酒一椀河水一椀煎至一椀溫服治瘧不論久近即愈（居易錄）

張三錫治翁氏婦久瘧食少汗多用六君子加川連枳

寒月餘不應因悟連枳之過純用補劑又令粥多于藥而食進再加附子三分半一服而痊

張三錫云準繩載一孺人夏患瘧用柴胡升麻葛梗羌活防風之甘辛氣清以升陽氣使離于陰而寒自已以知母石膏黃芩之苦甘寒引陰氣下降使離于陽而熱自已以豬苓之淡滲分利陰陽使不得交併以穿山甲引之以甘艸和之一劑而止

有人患久瘧諸藥不効或教之以灸脾俞即愈更一人亦久患瘧聞之亦灸此穴而愈蓋瘧多因飲食得之故灸脾俞即効 資生經

陸祖愚治朱襟湖六旬外肩上忽生癰毒因褪衣專藥致感胃成瘧 要知節毒本由伏暑又因過寒遂發瘧耳 其脉浮虛乃于補氣血藥中加疏表之味數劑後濃潰而精神愈憊遂加參耆兩許六七日後瘧雖輕而未止有人謂斬鬼丹之妙不可勝言次早水吞一服少頃寒熱愈熾嘔吐不止昏暈異常喘氣不定乃用甘艸為君川連為臣佐以金銀花藿香解毒開胃暈吐止乃用大劑人參何首烏數服瘧止再用養血補托收斂生肌腫毒消而全愈

陳雅初四月初過仙霞嶺陡遇狂風驟雨：具徒旋遍

身俱濕宿疒店又無火烘兼長途勞頓水土不服飲食失宜遂患瘧閩醫用藥與浙迥殊即柴胡一味惟以前胡代之名曰香柴胡陳君之療發散為主浔汗而病轉甚陸遶在閩診之面色黧而黑自汗神昏懶于言語疲憊已極此風去而濕存之候其脈左手弦細而滑氣口緩弱知其勞頓之後重加發散乃與養血健脾寬中和解之劑去病猶反掌云

嚴力闇余之至友也以在閩病瘧數月歸及兩旬而殁因錄是案不覺惘然天即人即時己丑長至後一日

薛立齋治大尹賈時用患瘧寒熱用截止之劑反發熱惡寒飲食少思神思甚倦其脈或浮洪或微細此陽氣虛寒用補中益氣內參者歸朮各加三錢甘草一錢五分加炮薑附子各一錢一劑而寒熱止數劑而元氣復又治東洞庭馬志卿與此同但去附子加炮薑一錢

一婦人勞役停食患瘧或用消導止截飲食少思體瘦腹脹以補中益氣倍參者朮草當歸加茯苓半夏各一錢五分炮薑五錢一劑頓安前藥炮薑用一錢不數劑愈

一男子患瘧火而腹脹脉不數而微弦重取則來不滑利輕又昏無力遂與三和湯索氏者三倍加白朮入薑汁服之數服而小便利一二行腹稍減隨又小便短少作血氣兩虛于前藥中入人參牛膝當歸身作大劑服四十餘帖而愈

一人火瘧先間日後一日一來早晚不定此腎不納氣故也用人參茯苓半夏各一錢丁香五味子各五分益智甘艸各三分薑水煎服

王宇泰治蔣先生患瘧衆醫因身疼寒甚欲用桂附曰溽暑未衰明係熱邪安可温也經曰陽併于陰則陰寔而陽虛陽明虛則寒慄鼓領巨陽虛則腰背頭項疼三陽俱陰則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生于内則中外皆寒此寒乃陰陽交爭非真寒也遂以柴胡羌活防風升麻葛根以升接三陽以桃仁紅花引入陰分而取陽以出還于陽分以猪苓分隔之使不復下一服而愈

又治劉令尹患瘧而洞泄不止以交加飲子一劑而愈

一人患三日瘧火而不愈飲食不貪口不知味熱多寒少用人參黄耆柴胡半夏茯苓當歸各一錢黄芩七分甘艸青皮各五分薑棗煎服

又治一老嫗患瘧因年高思其再發欲截曰一劑而已亦甚易焉用截為遂以羌防柴葛升麻升陽氣使離于陰知母石膏黃芩引陰氣下降使離于陽以猪苓之淡滲分利陰陽勿使交并以山甲引之甘草和之一劑而愈此與李士材治楊太史一方大同小異

治一老婦夜瘧二作時大小便俱下血飲食不進危甚邪熱在于血分故夜發血得熱而妄行故便血以桂枝桃仁湯去血中之邪一劑而愈

薛立齋治一婦人因怒舉發無期久而不已胸腹不利飲食少思吞酸吐痰用六君子加柴胡山尼二十餘劑尋愈但晡熱少食又四用君子加柴胡升麻為主佐以逍遙散而痊

馮楚瞻治張子芳年將六旬無發熱頭疼等候但飲食日少大便甚細而便難小便甚赤而澀凡間三日則夜必氣逆工壅欲死通夕不寐形容枯槁神氣漸瘦六脉洪數惟石關尺稍緩無力此陰道虧極孤陽無根但三日一甚此兼脾主信而為病也凡病之難名者患由本氣但從根本治之自無可藏匿而外見矣

此千古不傳之秘乃以熟地一兩六錢麥冬三錢炒白术六錢牛膝三錢五味附子各一錢參湯冲服數劑後每

至期則寒熱如三瘧收此邪外達也照方再服十餘劑諸症全安

立齋治洞庭馬志卿母瘧後形體骨立發熱惡寒自汗盜汗胸膈痞滿日飲米飲盞許服參耆藥益脹卧床半年矣以為陽氣虛寒用大劑補中益氣加附子一錢二劑諸症漸退飲食漸進又二劑而愈（即前曺時用集之尾而前云去附子加炮薑此云加附子）

一婦久瘧寒熱服清脾飲之類胸膈飽脹飲食減少用補中益氣湯加茶炭半夏炮薑各一錢而痊（亦與曺次集同）

朱丹溪治姜一婬婦瘧疾初安因衝風又發腰痛白濁已與參朮柴柳半夏補方（治瘧）又教以煆牡蠣一錢木通五分炒柏三分（治濁）入菊薢杜仲枸杞根治腰痛粗末同煎

馬元儀治宋祈臣年四十患瘧寒則戰慄熱則燥煩脈之兩關尺空大按之豁然（若在熱發時見此未可便斷為參附症也）所服不過汗下溫和之劑曰此症浮之內虛所感其受傷在少陽陰腎之一經也與風暑疾熱發瘧者（有）天淵之別法宜大振陽氣以敵虛邪時一醫極力排阻言之不入因思此診症一誤不堪再誤乃謂所親曰病勢甚危今晚可煮煎人參一兩附子三錢與服庶可逆

挽如言服之便得大睡寒熱頓止再劑而安一月後復見嘔吐徹夜不眠兩脈空大詢其故有穿窬者至因恐而得夫恐則傷腎火隨上逆況大病後元氣初復虛陽易于上越遂投以真武湯一劑而安

母舅沈青城自金陵歸途中忽染瘧疾三發困甚診之兩脈浮弦滑（一作遲）得之風暑痰滯表裡俱邃陰陽俱病也脈證有餘可任攻達以柴胡三分以祛少陽之邪黃芩二錢以清少陽之熱乾薑二錢白芷一錢以越陽明之表知母二錢石膏五錢以清陽明之裏蘇葉三錢生薑五錢以散太陽之寒白豆蔻學朴橘紅半夏檳榔各二錢以疏太陰之滯二劑寒熱大減三日而安

黃氏姑患三日瘧發陰分用何首烏一兩牛膝一兩當歸五錢鱉甲醋炙一兩橘紅三錢水三鍾煎一鍾空心服立愈虛極者加人參一兩（廣筆記）

于中父病三日瘧初服人參一兩生薑皮五錢水煎空心服不効仲淳堅持此方加參至三兩生薑皮至一兩五錢二服即愈（全上）

繆仲淳年十七時為瘧所苦（丸）湯液丸飲並祝靡不備嘗終無株于病偏檢方書遍知瘧之為病暑邪所致經

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

曰夏傷于暑秋必疾瘧遂泛暑治不旬日瘳後數以意消息散邪之外當養胃氣疾多者消疾氣虛者補氣血虛者補血又分藏府經絡各泛其類以施嚮導即經年不愈者竟霍然起矣 全工

沈少卿中丞請告時苦瘧仲淳往診之憶甚曰再一發死矣先生何方立止之仲淳曰何言之易也疏三方作五劑一日夜飲盡次早瘧止先二劑清暑用大劑竹葉石膏湯加桂枝以其渴而多汗也次二劑健脾去積滯用橘紅白豆蔻白朮茯苓穀蘗烏梅扁豆山查麥芽最後一劑人參一兩生薑皮一兩水煎露一宿五更温服盡劑而瘧不復作 全工

顧伯欽患瘧仲淳之門人疏方以白虎湯加人參一兩一劑工云豈有用參至兩數者予改用清脾飲二十餘劑而瘧不止體尪弱仲淳至咲曰此虛甚非參不可吾徒不謬也投以大劑參耆一劑而瘧人參一兩黃耆炙一兩知母炙五錢陳皮二錢乾葛二錢甘州八分石膏五錢 全工

莊敏之妾患瘧寒少熱甚汗少頭痛不嗜飲食余為診脈洪數而實用柴冬五錢知母三錢五分石膏一兩五錢竹葉六十片粳米一撮橘紅二錢牛膝一兩乾

葛茯苓扁豆各三錢三劑不應忽一日凡寒熱者再昏迷沈困不省人事勢甚危急欲之過余云恐是虛瘧前方石膏知母竹葉似近寒涼非其治也余心亦疑為去石膏（等）加人參二錢已別矣余追想前服的非屬虛急令人往囑令其將參煎好勿輕與服待按脈加斟酌焉次早往視其脈洪數如初急止人參勿服惟仍用前方而加石膏至二兩又加何首烏五錢令其日進二劑瘧遂止（公正）

莊歛之前患瘧妾越一載忽頭痛如裂心內襍亂不清喉作痛失音舌破喎啾有痰胸膈飽脹惡心不思飲食如此者四日矣日漸增劇陡發寒熱如瘧狀寒少熱多熱後頻出汗方解平時有心口痛疙瘩下元無力如脚氣狀歛之起為傷寒余曰此受暑之疙即前年所患瘧而勢加劇目法當先去其標令以石膏二兩麥冬牛膝各五錢知母貝母花粉各三錢橘紅二錢半鱉甲四錢竹葉一百五十片河水煎服三四劑心內清頭痛喉痛失音舌破飽脹寒熱俱愈但惡心不思食如故而心口痛下元無力不減為去石膏知母竹葉鱉甲貝母花粉而加延胡煮木瓜竹茹各二錢五靈脂七分生蒲黃錢半炙仁八錢石斛扁豆

白芍各三錢枇杷葉三片灸艸四分幾十劑而愈全上
高存之甥女嫁後患胎癉久不止仲瀉云病在陰分以
人參五錢牛膝一兩兼健脾清暑一劑而止全上
竜衛陽子室患癉後失音寒熱愈甚告急仲瀉仲瀉云
此必癉時不遇明眼人妄投半夏故也投以大劑麥
冬茯苓炙甘艸鱉甲知母貝母數劑療全上
来天培治潘康侯季秋患癉惡寒發熱頭疼身痛嘔吐
無汗腰重腿疼問日而發脈之沈而弦此寒邪閉伏
募原不能外解也以葉葛解肌羌芎止頭痛藿香廣
半止嘔吐枳桔利肺氣白豆仁温胃桂枝達募原領

邪外出不使復入茯苓淡滲利竅加薑棗和營衛一
劑諸症已瘳
沈明生治丁又銘會後動怒復受風邪惡寒發熱連日
委頓咸謂停食感冒曰寒以時而來熱得汗而解
脉弦且數雖素未患癉：泛出聞已而果然與清脾
飲加減寒熱漸輕但荎卵日縮有類陽癉甚憂曰無
慮也此非傷寒厥陰危症亦非陽衰者比乃陽明熱極
不潤宗筋所謂諸癉生于肺熱：極反無寒化也若
謂虛而補之誤矣乃用茶梔等劑太而荎卵如故癉
亦止惟便秘日久然不脹不痛此癉時多汗：多則

津液燥而腸胃枯涸俟飲食漸進參朮滋補氣血充而便自行勿亟也或診之謂邪氣方入安得用補及今下之尚可為也與承氣湯服半日許便不行而葦縮再延診仍與調補數日進參二兩餘去宿垢甚多而全愈禹于是診得三益焉于其初也可驗癮于受邪之始于其中也知痿不盡由陽事之虛（王節齋言之詳矣○禹者梅公燮沈之高第也其沈案皆梅所述予于此特存禹名）其未也知便秘有服參朮乃通不可遽然攻下若下之不當雖硝黃亦不能蕩滌徒令真元耗損在經固有明訓而世但知堅者削之未詳塞因塞用之法耳

錢國賓治大同右營把總張道患癮七年奄奄一息診之六脉弦長尚有胃氣乃足太陰脾經痰結腹右名癮母也且久病血凝經絡不攻痰血病不愈也內經曰癮之間日作者邪氣深入內薄于陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作先以四物湯加桃仁紅花牛膝人參蒼朮服十餘帖經絡方活癮轉陽分又以八珍湯加黃耆一錢何首烏一兩服十餘帖補養正氣癮清漸早又以常山三錢酒炒七次陳皮甘州各一錢五分葱三段薑五片煎露空心熱服癮止又以雞蛋去黃透一孔用簪攪勻清黃入香朮

鱉一个真麝四厘紙封頭飯工蒸熟去殼去木鱉不
用熱酒喫蚤日二空心一个月餘瘧毋消盡凡遇久
瘧不如此法不起也
施涣之予至交也夏秋間自都至吳門就婚橫塘初冬
以弥月親戚會飲二散而病寒熱頭疼自服芎藭飲
一劑不愈即進理中湯轉甚蓋以新婚故自疑為陰
病也自是所延醫咸以温補進日益困亟使詣杭招
予比至已十餘日矣入門見煮藥未進診之脉沈弦
而數且六七至舌強胎黑而燥自言服温補後寒熱
已退惟大便不行小便頻數者内熱下迫也夜間尤
甚幾五六十次鬲間時有冷氣上衝日惟進粥飯許
奄奄危殆未審何症曰此伏氣為瘧也小便頻數者
内熱下迫也其出必澁黙其色必赤濁驗之果然至
冷氣上沖乃熱鬱中宫猶火鼓之上必有冷氣也其
大便不行則内熱而燥結不待言矣夫邪伏既深其
發乃遲何得遽用温補幸壯年臟陰未竭急投涼解
得寒熱再作乃可無虞即所煎藥則人參白朮薑附
桂茱萸仁五味等云昨已服一劑病勢不減令參用
三錢桂附俱用錢半及考前方皆二陳丁桂薑茱之
屬曰今日再進參朮桂附則不可為矣以小柴胡小

脇胸合白虎作一劑與之其友堉惶惑無措堅不肯
沒蓋洞庭醫者主于其家就中為難耳曰既不相信
請即原舟告辭雖誼屬至友來為治病非送殮也涣
之聞乃懇留治乃令以葯具相付親與調煎服後小
便遂不頻數次日粥加進再與前方則寒熱大作而
舌黑漸退神氣漸爽又去白虎二劑寒熱減小便長
又二日大便去黑燥甚多改用甘露飲加減數劑而
安

許民懷年近三十患胎癆遷永中名醫寓杭延視見其
舌胎如爛鉄之剉鉄有胎處則淡黃無胎處則深紫
如猪腰三四發困憊不堪杖而後起飲食驟減日啜
薄粥兩甌遂不敢與藥診之脉虛數而弦左寸鼓而
上溢右尺微弱曰此手足兩少陰素虛因受暑邪入
包絡經云暑傷心手心之竅故見症如是初與黃
連香薷飲一劑即思食繼與導赤散合益元散舌漸
退再與人參小柴胡寒熱愈甚後乃告曰其戚友同
于是日發癆者共三人又皆胎癆其二人死矣一葉
姓一周姓也

痢

陳良甫治一婦人病痢疾越四十日久病服諸藥不愈召診之六脈沈弱大凡下痢之脈宜沈宜弱但服十全大補湯薑棗煎成加白蜜半匙再煎數沸服之愈良方

醫說續編

一婦人泄瀉不止似痢非痢似血非血其色如濁酒仍由濕熱為病診之則六脈沈絕衆醫用熱藥及丹藥服之則發煩悶乃先用敗毒散加陳米煎次用胃風湯加粟米煎愈泊宅編云姚祐自殿監遷八座母夫人病痢諸藥不効令李昂筮軌草有真人指靈草之語一日登對上訝其色萃具以寔奏詔賜一散子數服而愈仍喻只炒椿子熟末之飲下

薛立齋治司馬王荊山患痢後重服枳殼梔柳之類後重益甚食少腹痛此脾胃傷而虛寒也用六君子加木香炮薑而愈

祠部李宜散患血痢胸腹膨脹大便欲去不去肢體殊倦以為脾氣虛弱不能攝血歸源用補中益氣湯加茯苓半夏治之漸愈後因怒前症復作左關脈弦浮按之惟弱此肝氣虛不能藏血用六味丸治之而愈

朱丹溪治一老人年七十面白脈弦數獨胃脈沈滑因飲白酒作痢下血淡水濃後腹痛小便不利裏急後

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

重參朮為君甘艸滑石栀柳木香蒼朮最少下保和丸二十五丸次日前症俱減獨小便不利以益元散服平治會粹

宓皇患痢名曾醫不記名入視曾診御單方病奏症未有呵處慈明立御榻後有旨呼曾防禦官家喫浔感應丸否曾連稱喫浔喫浔慈明又諭須是多把與官家曾承教旨對以須進二百丸遂止曾時坐韓黨被譴上亦遂于元降秩六更增三秩後宓皇不豫大謂左右曰惟曾某知我性急名入診訖嗚咽不勝上曰想是脈兒不好也曾出自診其脉謂家人曰我脈亦不好先宓皇一夕而逝四朝聞見錄

實材治一人休息痢已半年元氣將脫六脉將絶十分危篤為灸命關三百壯關元三百壯六脉已平痢已止兩脇刺痛再服神丹霹靂湯方愈後一月大便二日一次矣

一人患休息痢實令灸命關二百壯病愈二日變注下一時五七次令服霹靂湯二服立止後四肢浮腫乃脾虛欲成水脹也又灸關元二百壯服金液丹十兩一月而愈

曾魯公痢血百餘日國醫不能療陳應之用鹽水梅肉一

枚研爛合臘茶入酸服之一啜大要
血應之用烏梅川連灶下土等分為末以茶調服亦
効蓋血得酸則斂得寒則止得苦則澀故也醫說本草綱目

宋張叔潛知劍州時其閭下病血痢一醫用平胃散一
兩入川連末二錢水煎服即愈紹興壬子會稽時行
痢疾叔潛之子以方傳人往往有驗小兒痢疾尤効
本草綱目

劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下諸藥服遍久不瘥惟久
痢故可用後方轉為白膿令孤將軍傳此方用訶黎勒三枚

兩炮一生並取皮末之以沸漿水一合服之若止水
痢加一錢七甘草末謂加甘草末一錢也若微膿血及血多加
三七亦加甘草本草綱目

胡大卿一僕患痢五色已半年遇杭州一道人教用大
熟瓜姜一个煅存性出火毒為末作一服溫酒服之
遂愈本事方全上

張子和曰一男子病膿血惡痢痛不可忍有寒熱之毒忽見
水浸甜瓜心酷喜之連皮食數枚膿血皆已人言下
痢無形正是何言也止知痢是虛冷溫之澀之截之此
外無術矣豈知風暑火濕燥寒六者皆為痢此冰蜜

甜瓜所以効也

潘埙曰予孼孫年二一日内外熱如火頭眩醫以為外感汗之不解既而腹痛小水不行又以為内傷下之不愈後四五日變赤痢晝夜無度小水黙澁腹連膀胱脹悶醫乃尚用痢藥而病益劇心切憂之詢之家人曾食何物以曾飲冰水告予曰病坐此矣醫投四苓六一不應予曰陰氣結于工陽氣鬱于下膀胱有工口無下口氣不能化而出也須用膀胱本經藥温以散之外以舉之衆醫不敢予用温六丸仆散主天水散加乾薑茴香叶柴煎服一二帖小便行三帖痢止而愈 楮記空

李時珍治華老年五十餘痛下痢腹痛垂死已備棺木用延和索三錢為末米飲服之病即減十之五調理而安 本草綱目

薛立齋治一人利後嘔噦脉洪大按之虛細作渴引飲諸藥到口不納作脾胃虛寒不能司納以參朮炮薑等分飯丸米飲下時送下服之三兩閒藥不嘔以六君子加炮薑調治而安 重見嘔門當入噦門

王嶼如治一人痢如豆汁日夜百餘次羣醫投以清涼下墜之藥愈危六脉沈弱此脾虛受濕也以補中益

氣湯加羌防蒼朮二三劑愈

王又逸治一人利後脚軟難行曰久痢傷氣下多亡陰氣血俱虛不能榮養其筋骨也用八珍湯加牛膝杜仲木瓜薏仁而愈

陳三農治一婦患痢呵服皆清涼赶伐之藥致脾胃虛弱血無所統日下數升遇有所觸其下益盛欲補血恐脾愈寒欲引歸經血去殆盡遂用陽生陰長之義以益氣湯溫養中氣而漸安

一士人勤于舉業夏未患裏急泄白膿衆以痢治曰非也此積勞傷脾氣下陷即東垣所謂飲食不節起居不時上升精華之氣反下陷云云也用補中益氣湯二劑而安

龔子才治劉司寇年近七十患痢膿血腹痛諸醫勿効診之六脈微數此肥甘太過內有積熱當服酒蒸大黃一兩清利之劉曰吾衰老恐不勝惟滋補平和乃可因再四引喻始勉從之逾日而愈 此方

一人年老久痢不止肌瘦如柴晝夜苦楚命已垂危用人參一兩水煎服之臭有微汗而甦後用十全大補湯調理而愈 此方亦治傷寒時疫壞疝

一人下痢小腹急痛大便欲去不去以脾胃氣虛而下

腦也用補中益氣送八味丸二劑而愈此等症候因
利藥致損元氣肢體腫脹而死者不可枚舉
立齋治一人患痢後重自知醫用黃芩芍藥湯後重益
甚飲食少思腹寒肢冷龔以為脾胃虧損用六君子
湯加木香炮薑二劑而愈
趙養葵治四明徐陽泰體素豐多火善渴雖盛寒床頭
必置茗椀或一夕飲數甌又時苦喘急質之趙丶言
此屬鬱火疝常令服茱連丸無恙也丁巳夏徐避暑
檀州酷甚朝夕坐冰盤間或飲冷香薷湯自負清暑
良劑孟秋痢大作始三晝夜下百許次紅白相襍絕

無積滯腹脹悶絞痛不可言或謂宜下以大黃芍藥勿
須也竟用參朮薑桂漸愈猶白積不止服感應丸而
痊惟少嘗蟹螯復瀉下委頓仍服八味湯及補中重
加薑桂而愈夫一人之身歷一歲之間再黃連苦若
不輟口而令病以純熱寒向投若大黃下之不知何
狀又病室孕時喘逆不眠用逍遙立安又患便血不
止服補中黑薑立斷不再劑
喻嘉言治張仲儀初得痢疾三五行即診之行動如常
然浮肉傷之脈而挾少陰之邪曰此疟也一表一裏
但表中多用人參裏藥中多用附子方可無患如若

用痢疾門諸藥必危之道也張以平日深信徑取前藥不起然病勢尚未著也及日西忽發大熱身重如巨石頭在枕上兩人始能扶動人事沈困急服完表裡二劑次早診時即能起身出房再與參附二帖全安若不辨疫用藥利疾門中幾曾有此等治法乎

周信川年七十三羊素體堅秋月病利久而不愈至冬月成休息痢一日夜十餘行面目浮腫肌膚晦黑脈之沈數有力謂曰此陽邪陷入于陰也吾以法治之可愈以人參敗毒散煎好以厚被圍椅上嚴密門窗置火其下更以布條搭成鵝蛋妝置椅褥上嚴密肛門使內氣不得下走前藥滾熱與服良久又進前藥遂覺皮間有津津微潤再泝以滾湯教令努力忍便此卻有理不得移身如此約二時之久皮間津潤捻未乾病者心躁畏熱恩不可忍始令連被即于床上是晚止下利二次後用補中益氣湯一日夜止三次不旬日全愈蓋內陷之邪欲提之轉從表出不以急舟流挽舟之法施之其趨下之勢何所底哉聞王昱寧患久痢諸藥不効蘇鼈老醫進以人參敗毒散其勢差減大有生机但少此一段幹旋之法竟無成功故凡遇陽邪陷入陰分

如火瘧火痢火熱等症皆當識此意使其緩ㇾ火ㇾ透出表外方為合法若急而速則恐纔出又入徒傷其正耳

按休息痢多緣誤治而成或兼濕太早或有表症而驟下之古人多以感應丸為治法至良也茲以人參敗毒治其內以火蒸其外既之滾湯以助其汗亦法之變而得其理者至以布蓋殿其肛門謂內氣不下走亦好奇之太過也

朱孔陽年二十五形體清瘦素享安逸夏月因搆訟奔走日中暑濕合內熱之火而成痢疾日夜一二百次不能起床以粗帛鋪茵工頻ㇾ易置但飲水而不進食其痛甚屬肛門如火烙揚手擲足躁擾無奈脉之弦勁緊急不為指撓曰此症一團毒火鬱結腸胃其勢如焚救焚須在頃刻若二三日外腸胃朽腐矣乃用大黃四兩川連甘艸各二兩入大砂鍋內煎隨滾隨服ㇾ下人事少寧片時少頃仍前躁擾一日夜服至二十餘椀大黃俱已煎化川連甘艸俱至無汁次日脉勢稍和知病可愈但用急法不用急劑政用參生地棗冬各四兩另研生汁以花粉丹皮赤芍甘艸各一兩煎成和汁大椀嚥之以其來勢暴烈一身津

液泛之奔竭待利止生津則枯槁難為矣今脈既減則火邪已退不治痢而痢自止豈可泥滯之劑而不急用乎服之果痢止但遺些少氣味畧進腐漿米汁調養旬餘始能消穀亦見胃氣之存留一綫者不可少此焦頭爛額之客也

浦君執病痢初起有表邪未散誤用參朮固表使邪氣深入又誤服黃連涼解大黃推蕩始終月餘胃氣不運下痢日夜百餘行一夕嘔出逆前黃連藥汁三五杯嘔至二三次後腸與胃遂成一家內中幽門闌門洞開無阻不但粥飲直出即參濃膏纔吞入喉已泄泻下用大劑四君子湯煎調赤石脂禹餘粮二末連服二後勢少衰但腹中痛不可忍浦曰前此痢雖多然尚不痛服此藥而痛增未可服矣喻曰此正所謂通則不痛不通之說也不痛則危痛則安何樂而不痛也仍以前藥再進俟勢已大減纔用四君子倍茯苓十餘劑全安

李士材治孫瀟湘夫人下痢四十日口乾發熱飲食不進腹中脹悶完穀不化尚有謂邪熱不殺穀者計服香連枳壳豆蔻厚朴等三十餘劑絕粒五日命在須臾胷之脈大而數按之豁然詢得腹痛而喜手按小

便清利此火衰不能生土內真寒而外假熱也亟煎附子理中湯冰冷與服一劑而痛止六劑而熱退食進兼服八味丸二十餘日霍然起矣（與陳三農葉大同）

許罷庚女痢疾腹痛脈微而軟李曰此氣虛不能運化精微其窘迫後重者乃下陷耳用升陽散火湯二劑繼用補中益氣湯十劑而愈

一婦人痢疾一月諸藥無功李診之曰氣血兩虛但當大補痢門爲品一切停廢以十全大補連投十劑而安

進補中益氣加薑桂二十餘劑而安

張兵尊秋間患痢凡香連枳朴等劑用之兩月而病不衰李脈之滑而有力失下故也用香連歸芍加大黃三錢下穢物頗多診其脈尚有力仍用前方出積滯如魚腸者約數梳調理十餘日而痊

毛撫軍痢如魚腦腸鳴切痛閒食即嘔所服皆芩連木香葛蒲霍香橘紅芍藥而已後有進四君子湯者趕而未果診得脈雖洪大按之無力候至左尺（左當是右）倍覺濡軟此命門火衰不能生土亟須參附可以回陽

因問但用參朮可得愈否李曰若無桂附雖進參朮無益于病且脾土大虛之則補母非補火乎遂用人參五錢熟附一錢五分炮薑一錢白朮三錢連進三

劑吐止食粥再以補中益氣加薑附四劑後即能視事

吳又可治張德甫年二十患噤口痢晝夜無度肢體僅有皮骨痢雖減毫不進穀食以人參二錢煎湯入口不一時身忽浮腫如吹氣球（此陽氣驟復陰血未能相配也）自後飲食漸進浮腫漸消腫間已生肌肉矣（馬元儀一藥用參亦肌脹不可忍謂氣達表也）

高鼓峰治朱殿臣病痢日逾百餘次身發熱飲食不進所用皆檳榔大黃之屬高曰此破氣利血藥也治滯下當調氣不當破氣當和血不當利血以當歸白芍生地黃芩木香等數大劑飲之三日而愈

馮楚瞻治王姓人久患重痢延診時當六月自腹至陰囊皆重綿專裹稍薄則痛甚其兩足心又覺甚（熱）必重扇始可飲食不思甚危困脉之寸強鬪尺並弱曰此中氣久虛氣不升降陰陽阻隔似痢非痢誤用香連苦寒之劑以致卻逼陽氣于九地之下而中宮藏陽納氣之所反以空虛且久痢陰陽兩亡故足心之熱陰虛所至腹中之寒陽虛所由中宮之陽宜溫而補下腦之陽宜清而升理難並行令但先去其寒中之阻隔則欝逼下極之火自能上升大用附子理中湯

加五味子以斂之二三劑後腹寒足熱俱減六七乃以歸脾湯加肉桂五味煎湯送八味丸而愈

陳秀才患白痢甚劇診之兩寸畧洪兩尺左關甚弱舌有黑胎此肝不能疎洩腎不能閉藏宜痢之重劇矣且真陰虧極于下真津燥槁于上水乘火位故赤舌變黑也若服川連遒增其害乃果有以香連進者服後痢更無度復延馮以八味湯大料用人參冲服漸得輕可調理月餘而安

楊秉六治沈某病痢裡急後重日夜百餘次發熱口渴體倦懶言跼卧少食小便不利或用痢門清熱消滯套劑數劑轉甚脉大緩無力面色嫩白舌胎微黃此扶虛感寒不可以劑疾正治之也乃用補中益氣湯加白芍炮薑一劑而愈急重漸緩痛痢隨減再劑身涼食進諸症悉愈

蔡某病痢臍腹絞疼裡急後重日夜無度自知醫所服皆培腎燥脾之劑（補濕太早遂成休息）幸不誤事但病根不斷每週時或五七次遷延三載形肉俱脫力不能支楊診之脉附骨而緊左尺尤甚面晃白舌淡嫩且胖且滑此寒積大腸之底諸藥不能到故經年累月痢無止息也今脾腎大虧須服養榮八味各數十帖待其

中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

氣血元足然後蠟丸巴豆一枚大如龍眼空腹以熱水送之則藥積所乃化其積自除矣如法治之果不再發

姚某病疾腹痛後重膿血並見日夜無度或用利氣涼血清火解毒一切消尅之劑病不減而解出斷腸一段長半尺許延楊疤醫迷病情用藥次第并詢斷腸之故思之良久曰決無此事夫腸者起自胃之下口歷幽門闌門以至肛門大小相連若中既斷矣何能自出肛門耶且腸既出于昨日則上下斷絕已久何至今日便中膿血仍相續不絕也蓋腸中滑膩稠粘如

腊如膏粘貼腸上之一層其形外圓中空有似乎腸而實非腸也試撥之必腐矣果然診其脉細數而弦按之勒指吞如鐵而面無神此木氣太甚胃氣將絕無救矣數日果殁

易思蘭治省亭殿下七月病痢始服清　次行和解又次滋補月餘轉甚每日行數次肚腹絞痛但泄氣而便不多起則腰疼屈曲難伸胸膈脹滿若有物礙噯氣連聲四肢厥逆喘息不定診之兩寸沈大右寸更有力石關沈緊左關弦長而洪喜兩尺沈微來去一樣曰此神勞氣滯之病也以暢中湯進之製香附八

分蒼朮一錢神麴三錢五分撫芎七分黃芩八分枳
殼三分藁梗五分甘州三分薑一片棗二个服後兀
欠欲吐冷氣上升暖氣數十口即大便去穢汚頗多
胸次舒暢腹中覺飢自午至酉止去一次四肢不厥
肩背輕快六脈不和至復但心內怔忡頭目昏暗飲
食無味用六君子湯加香附砂仁二劑胃氣漸復眩暈
怔忡作止作又以補中益氣加蔓荊子茯神棗仁
黃柏半月乃全愈

張路玉治項鳴先尊堂下痢血色如覓汁服消導苦寒
芩連大黃之類愈甚不時發熱痞悶六脈俱伏虛大
而顯弦象按之則芤此氣虛不能統血之候與補
中益氣湯加炮薑肉桂四帖而安

劉日夜數十次兼帶下如崩誤服
川連大黃十餘劑遂腸塞不通口噤不食半月餘至
夜必大發熱躁渴六脈弦細而疾此足三陰俱虛之
候與理中加桂苓木香烏梅以調其胃次與加減八
味湯導其陰火而全安

某刑部高年火痢色如蔥汁服參連白芍之類二十日
餘劑漸加啘逆六脈弦細如絲與理中加丁香肉桂
疑不服仍啜前藥數日病愈甚驟然索粥諸醫皆以

能食為慶張再診則脈至如循刀双真脈也職此中氣苦竭求救于食除中疟也與傷寒之例同不可為矣

褚某尊堂深秋久痢口噤不食者半月餘但飲開水及瓜汁嗽後必哽脹腸鳴絞痛不已煩渴悶亂至夜轉劇所下皆濃血日夜百餘次小水涓滴不通六脈皆弦細乏力驗其積沫皆瘀淡色晦詢其所服皆參連梹朴之類所見諸症俱逆幸久痢脈弱尚宜温補用理中加桂參縈芪調之服後小便即通得稍寐數日糜粥漸進痢亦漸減更與理中倍參伏龍肝湯泛丸調理而痊

陳進士提歸抵家即患河魚腹疾半月來攻尅不効噤口粒米不食且困都門久食煤火肩背發長不赤不疼腦伏不起發呃神昏診之六脈弦細欲絶面有戴陽之色所下疼晦如爛魚腸腦疟雖危幸脈無旺氣無喘但體無躁擾可進温補但得補而癒腫燉發便可無慮遂疎保元湯每服人參三錢黄耆二錢甘草肉桂各一錢伏龍肝湯代水煎服一啜而稀糜稍進兩啜而後重稍輕三啜而癒毒墳起瘍醫敷治其外屬守前方十餘劑而安

韓晋度春提患腹痛泄瀉下血或用香連丸遂飲

食艱進少腹急結雖小便癃閉而不喜湯飲面色痿黃日夜去血五十餘度診之氣口沈細而緊所下之血瘀晦如覓汁與理中湯加肉桂錢一劑而溺通小腹即寬再劑血減食進四劑泄瀉止三四次去後微有白膿與補中益氣加炮薑四劑而康

張飛疇治朱元臣子患五色痢二十餘日胸膈脹滿粥飲不進服藥不効另延二醫一用大黃一用人蔘不能決求診之曰用大黃者因其脹滿脈大也用人蔘者因其利久不食也利久不食大黃斷之難施膈滿休脹人蔘亦難遽投擬伏龍肝為君專温土藏用以濃煎代水煎薑朮炭炙甘草廣藿木香炒黑梅甘草一劑利減食進再劑而止遂不為調治而安

柴嶼青治解元周讓谷在安撫張西銘京寓時半年久痢不止或用參者赤苓栗殼肉果不効夜起六七次日間不計其數膿血稠下已瀕于殆始求治以久痢七陰不宜再用赤苓利水亦非兇治之所能止且久痢寒積在腸大底現今兩脈帶緊欲用蠟豆丸衆皆不敢不得已勉用補中益氣加吳茱萸製川附一劑而減後兼用八味丸而愈

張三錫治一人患痢發寒熱頭痛左脈浮緊而石脈滑

大乃內傷挾外感也先用敗毒散加薑葱一服表症悉除但中脘作脹悶後重不已以平胃散加枳殼木香檳榔山查二服脹悶移于小腹投木香檳榔丸三錢下粘硬之物而愈

一婦病痢自投承氣湯二服不應診之石脉浮而帶弦右三部俱沈關脉畧滑必欝悶中食所致病家云素惱怒遂以導朴蒼术香附撫芎舒鬱山茶檳榔橘皮木香理氣白芍調中三服愈

一人痢初愈遂飲燒酒雜進肉麪口脹遽發寒熱左脉弦滑倍常知飲食酒毒為患也病後中風未復火邪尚存多食自難傳化燒酒復助其毒勢在不拯令食填胸中得吐乃有生命經云在上者因而越之是也不信自服巴豆丸藥下咽去血升許而殂

一人夏月遠行飲酒致下痢皆純血日夜無度心下脹不食脉三部俱弦滑而數先與山查枳實檳榔橘紅香連以和其中次與木香檳榔丸以導其滯脹悶已除下血愈甚遂以四物用生地條芩茱連丹皮二劑血止一半再加地榆三服已

一人痢脹痛自服大黃丸一時痛轉甚手足俱冷脉沈伏知寒涼用早也投炮薑理中湯加厚朴山查蒼术

一服外用炒鹽慰之下膈通時即定後用香連白芍
厚朴枳壳等調理而痊

一人患痢二月不愈穢汙在床六脉弦而弱投補中益
氣加酒炒白芍六帖始止二十帖而愈

一人病利日久不止四肢俱腫而脉細小尚可救與參
苓白朮散加肉豆蔻少許作湯服愈

一婦病久痢食時身熱左脉浮數右脉滑數詢其飲食
雖病未減至劇始不能食與倉廩湯先去其熱後以
枳朮人參陳皮查麴又二服腹中漸寬後重不止乃
以調中益氣湯下木香槟榔丸二服下穢物梳許痊

陸養愚治一人因路途感冒頭微痛身微熱飲食如故
數日後患水泄小便赤澁自服胃苓湯二劑泄不止
而反見積又服參連白芍木香槟榔輩二劑亦不効
診之兩手浮弦沈按濇數此因表氣不舒致令裡氣
不順偶值脾胃不調而作泄也乃以五積散微加白
豆仁木香二劑大汗而諸症悉痊

董潯陽素有酒積因而患痢雖奉養豐而稟賦厚而清
涼消導過多今利已少瘥而大便猶滯小便短數黃
赤身體時熱上壅頭面臭塞耳聾眼昏口燥脉之浮
大而數按之而駛或云參連滑石但可清下焦之火

當以涼膈散清上焦以佐之且謂脈尚洪盛未可議補陸曰公卒日脈頂按損洪盛以今日較之已弱極矣凡九竅不利由于陽氣上盛而躍則當清瀉若由于腸胃之所生則當補斂今瀉利久數用清涼消導之劑腸胃有不虛乎夫中焦氣血不足多致虛火上炎下廹用人參白朮補氣為君當歸白芍養血為佐五味麥冬棗仁斂耗散之氣以為臣甘艸茯苓緩以滲之以為使待工焦既清而後提其下腦之陽則便溲溺清而通暢矣二劑後再以補中益氣湯加減服之兩全愈

陸肖愚治吳南丘八月間醉飽後使內明日患痢晝夜百餘次赤白相間牀褥如爛肉腹中温二作痛四肢厥冷脈之緩大無力兩尺尤弱謂此症即宜補塞先書人參肉果二味其子大驗云無積不成痢豈有一二日即用補塞者不得已姑與調氣養榮湯無進退改與補塞又力爭仍以前湯加人參彼不加參服之亦無進退更醫投以參連梹榔木香等藥腹痛如劇足厥如冰冷汗氣促食入即泛大便而出色尚未變再延旬餘身體不能轉側大便如流韋脈與神氣未絕因用大料人參附子理中湯加肉桂肉果一劑痛減數

劑足温泄少止後用人參至二斤始起鬚髮盡落

鞫二府九月間患赤痢腹痛裡急後重或用參連梹朴白芍滑石一劑痛覺增二劑痛更甚乃謂醫曰通則不痛汝為我用大黄下之醫唯唯幸其公子力爭不可診之面赤戴陽唇若塗硃舌白滑無胎所下有泥血如豆大者數十枚餘淡黄而溏其脉浮按之微數而大沈按遲而無力曰此痛乃寒也當以温熱解之蓋脉大為熱大而無力者為虚寒痢亦為熱色晦而便溏者為虚寒用白芍五錢酽酒炒數次董灰二錢炙甘艸桂附各一錢木香五分棗二枚一劑痛減能御

卧二劑痛止改加升麻參耆數劑而後重瀉痢並除矣

朱丹溪治青田人肚痢紅紫血下墜逼迫不渴不熱用白术白芍各一兩陳皮枳殼歸身滑石各半兩甘草炙二錢桃仁三十六个分八帖下寬腸丸三十粒

許叔微曰陳侍郎經中庫戍秋過傷真求診初不覺有疾及診視肝脉沈弦附骨取則牢予曰病在左脇有血積必發痛陳曰誠如是前某守九江被召冒暑涉長江暨抵行朝血痢已數日矣急欲登對醫者以劑燥之雖得止數日臍下一塊大如杯旬日如椀大

痛發則不可忍故急請宮祠以歸日柔何子曰積痰
不可強止故積血結于臍脇下非抵當丸不可渠穀
而不肯服次年竟以此終
陸祖愚治吳翺京年近七旬秋初患痢起于醉飽房勞
診之容顏黯滯六脈弦緊此形症不足脈候有餘明
是陽亢陰微須用參附挽回否則不出三日滿座鬨
然醫者逆而和之乃投以鴨粞之藥燒熱艸頭令病
人聞吸以開胃氣次早痢果減六七漸進薄粥誅咲
吟詩大有起色閱二日而訃音至矣
鄭奠一治江南巢司多公患噤口痢粒米不進令服牛

乳久之而瘥本草備要
陳三農治一婦久痢不止口乾發熱飲食不進猶服香
連等藥完穀不化尚謂邪熱不殺穀欲進參連數日
不食熱正危迫診之脈大而數按之極微詢之小便
仍利腹痛喜手按此火衰不能生土內真寒而外假
熱也小便利則不熱可知腹喜按則虛寒立辨亟進
附子理中湯待冷與服一劑而痛止連服數劑而愈
撫州銅客病痢甚危懸五十金酬醫太學生倪士奎授一
方用當歸末阿魏丸之白湯送下三服而愈續金陵
國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

胡竹亭授一治痢方揉黃花地丁艸擣取自然汁一酒杯加蜂蜜少許服之神驗余亡

薛立齋治崔司空年逾六旬患痢赤白裡急後重此濕熱壅滯用芍藥湯內加大黃二錢一劑減半又劑全愈惟急重未止此脾氣下陷用補中益氣送香連丸而愈

馬元儀治一人年逾古稀下利膿血調治半年不愈脈之左見弦澀右關尺微濡按之則幾微欲絕此脾腎俱勞之候也脾主轉輸腎主二陰二藏不治將何特為健運蟄藏之本也病久年高所喜發言清越神氣明爽雖危可治用人參三兩熟附三錢服後三四時許覺周身肌肉脹不可忍起為之過急合診則石關尺俱透按之有根曰脈透者氣充于內也肌脹者氣達于表也前方少減附子連投五劑利減半糞微溏再服患減七八但小便如泉矣再以補中益氣調理兩月而安

凌伯尹患痢兩月不止百治益甚診之石關尺虛而結滯胸中有塊突起如拳水漿不得下咽是噤口痢曰此症屢經誤治邪未得除而胃氣以傷客邪乘虛結于心下與痰飲相搏而痞水不得下咽者土虛不能勝水

且以寒飲內格而不入也與半夏洗心湯二劑結塊漸平再劑而痞減七八漸進粥飲蓋外邪挾予內飲相結其留連膠固有非一表一理所能盡者攻之則正愈傷補之則痞益甚然舍此而治法何從而施乃用人參大棗以安胃氣之虛而加炮薑半夏黃芩黃連以滌痰治邪而成傾瀉之用正如良吏治民威惠並著而治成功矣

包瑞溪學憲傳治血痢痛甚方白芍酒炒五錢此一味仲酒加入枳殼槐花同炒去槐花五錢升麻醋炒七分真川連薑汁炒五錢酒石未三錢乳香沒藥各七分半山查肉三分甘草五分試之神効 廣筆記

黃聚川年兄太夫人年八十餘偶患痢胸膈脹絕粒數日予以升麻人參川連蓮肉方授之參至一兩諸子駭甚再問予曰遲則不救矣一劑啜粥再劑腹中響一泄先痢後瀉乃腎傳脾為欲愈也痢即止今年九十餘尚健也 全上

陳赤石督學因校士過勞感暑遂滯下純血醫皆難之陳刺史曰此非繆仲淳莫能療也使者旁午浔之矣門一日夜馳至武林診浔其所由遂用人參五錢升麻七分炙甘草紅麴各錢半烏梅二枚川黃連三錢

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN.GOV.TW

白芍二錢蓮肉四十粒煎調滑石末五錢二劑而愈督學曰痢止矣心搖搖不能閱卷奈何仲淳曰此勞心太過暑因客之故耳加竹葉乾葛棗仁一劑遂平仝上

庚子秋華氏妹歸宜忽痢日夜幾百行身熱發嘔一嘔數十聲不絕矣醫爭欲下之且曰補即死矣時仲淳以先王母病留湖濱憐其促治後事甚亟曰既以知危何不以藥試之服如金丸（一味黃連薑汁和丸）因思飲予固守仲淳前方以人參炒白芍扁豆升麻滑石炙甘草橘紅煎下如金丸一劑勢稍定更數服愈華水部至今感服仝上

一少年貴介暑月中出外飲食失宜兼以暑熱遂患滯下途次無藥病偶自止歸家腹痛不已遍嘗諸醫之藥藥入口痛愈甚亦不思食仲淳視之曰此濕熱耳其父曰醫亦以濕熱治之而轉劇問投何藥曰蒼朮黃連厚朴枳殼陳皮等仲淳曰誤也朮性溫而燥善閉氣故滯下家忌之郎君陰虛人也尤所非宜更以滑石一兩為細末丹皮汁煮之別以白芍酒炒五錢炙甘草二錢炒黑乾薑五分水煎調滑石末服之須臾小便如注痛立止仝上

秦公藩病痺醫誤投瀉藥一劑痺止濕熱無自而出遍
攻肢體骨節間以致項強目赤肩髒腕膝足脛俱發
腫痛甚不能轉側仲湯疏方寄之用白芍石斛牛膝
木瓜黃柏苡仁炙草車前茯苓痛雖止尚不能轉側
更用蒺藜菊花首烏胡麻川柏炙艸復逾年愈其始
病時一醫稍投參朮痛極歌死此係本疝陰虛有火
又加濕熱暑濕交攻故致故視此疝名痺風陰虛火多故
不受補又不宜燥惟微寒清平之劑調之火之自愈

立齋治一老人患痺驟用瀉藥致大腸經分作痛此濕

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

毒流于隧道而然以四物湯加桃仁酒炙紅花升麻
枳殼陳皮甘草治之漸愈因年高胃弱竟至不起又
一患者亦用瀉藥環跳穴作痛與前藥去升麻陳皮
甘草加蒼朮川柏柴胡青皮生薑十餘劑稍可更刺
委中出黑血而愈如手蘸熱水拍腿上有泡起去之
亦可不若刺穴尤速効也（委中在膕中央橫紋中動脈便是）

韓戶部左髀患一紫泡根盤赤腫大腸脈乳謂乳主失
血或積血韓曰血痺未瘳以芍藥湯二劑更以人參
敗毒散二劑瘡痺並愈

沈明生治吳君一媳患痺四十餘日少倦怠原醫以為

日久困憊當從補治無復可疑延診謂染患以來膏
粱一日未嘗去口則舊積雖除新積復起旋去旋生
形雖虛而疵固寔也日雖久而積固新也治法因與
初疵同先進導治丸一服嗣用補消兼進仍噙其清
虛調養後果全愈由此觀之初中末三法有難盡拘
而望聞切之外不可廢問且吳俗有飽不死痢疾之
一語恣嗽肥甘唯恐弗及何異藉寇兵而資盜粮耶
蔓延日久馴致証實形虛欲補形則碍其証欲攻寔
則慮其虛始也求其多食而終至于不能食良可憫
也因患之以戒夫世之患痢而不慎口腹者

童素文母秋間患滯下脈與疵本皆輕淺乃過于慎重
泥高年必不可寒涼之說更醫至再亦惟將順主人
之情致令綿延不已最後延診力殫前非竟以黃連
主治得瘥時有童鳴佩童石交也亦久痢亟以沈薦
且言治此患者莫過于沈而沈之善用亦莫過于黃
連一味耳既診即告曰是疵非附子勿瘥童訝之謂
童利下之色與夫作痛濈濈日期近遠頗與前疵相
類何用藥水火如是曰辨疵不在多岐但須一矢破
的童之滯下兼證皆似乎熱而詢其每欲圊時必先
腰痛一語而得病根矣夫腰為腎府腎主二便乃謂

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

家北門鎖鑰之司也虛則不能閉藏是以每欲更衣輒先作痛非與腹部之痛隨利減者可同日而語何皆用寒涼蕩滌主治疾何由平于是先以理中補中相合為劑嗣以八味丸益火之原果得奏績嗟乎疒同治異執謂可概施一法也哉

吳有聲云壬寅秋予病痢而劇羣治逾月氣息奄奄色毀骨脫望者却走明生先生至診視之則曰是何中暑之深也家人愕之謂予安坐書巡足不出戶奚暑之乘先生決之于指斷之于心遂投以涼劑一服即有効不數日間而乃全愈蓋予夏間嘗製地黃以酒漬之每日必出諸酒而曝之烈日之中至夕仍返而漬之于酒如是者幾一月予愚甚以為地黃之精神盡在酒也取而飲之而不知炎威之毒漸蓄于酒者早已入余之肺腸此家人所不知即予亦未晤迫病愈而推之使得而先生獨知其中暑之深則其視病可不謂神焉者哉

嗣火吾曰痢為險惡之疒生死攸關然右今治法多罕十全予以經驗既多病机漸晤乃自製此方所向輒効遂刊布廣施全活甚衆黃芩服者藥須道地尤不得任意加減耳川黃連條參生白芍山查肉各一錢二分陳枳

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

殼炒檳榔厚朴薑汁炒青皮各八分當歸甘草地榆各五分
紅花酒洗三分南木香二分桃仁泥一錢水二碗煎一碗空心
溫服查再煎此方或紅或白或紅白相兼裡急後重
身熱腹痛者俱可服其有便純血便楊塵水大孔如
竹筒等惡症古謂不治者急服此亦可救但遲緩毒
壞腸臟為難救耳其有噤口者毒在胃口也此藥煎
一劑分五六次緩緩服之使胃口毒氣漸開服完一
劑後不惟藥可進而飲食亦漸可進矣不必另用他
藥也單白無紅者去地榆桃仁加去白陳皮四分木
香用三分滯澀甚者加酒炒大黃二錢服一二劑仍

除之此方用之于三五日神効旬日內外亦効惟半
月外則當減加如後
黃連條芩白芍三味生用各四分酒炒各六分查肉一錢厚朴陳皮青
皮檳榔各四分甘草生熟各二分半地榆醋炒當歸各五分桃仁泥
六分紅花三分木香二分如延至月餘覺脾胃虛滑者用酒炒
芩連白芍各六分陳皮厚朴木香各三分醋炒地榆
四分紅花二分當歸人參白术熟甘草各五分
以上方法用無不効間有不効者必其初投參朮等
補劑太早補塞邪熱在內久而正氣已虛邪氣猶盛
欲補而澀之則助邪欲清而疎之則愈滑遂致不救

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

予當治一公子一仕官督早投温補不可挽回故表而出之以戒後

張龍文年三十来九月患痢至十二月未瘥已無腹痛後重服補中益氣則不及至圊且下轉數延予治與熟地杞子白芍棗仁米仁参苡初甚逆腸脹而利且五色幸彼能守藥勿更張再進而利遍減矣泊歲莫已向愈脉之兩鬚滑大重按則弦戒之曰藥未可停恐立春之後病再發已而果然其隣醫就予方加補骨脂砂仁木香廣皮之類與之了不應且昏睡而多汗至四月中再求診則以前方加沙參冬冬萎仁黄參未二十劑而瘥後環跳穴及趾腫疼痛流注無定所狀如痢後風仍前方加知柏川連数劑而安

濮氏子住湧金門外甚貧窘患久利脫肛諸治不効乃入城就予診雖相去二三里途中必数登厠肛既不收行步殊苦與補中益氣湯加熟地一兩炮薑一錢服二劑竟愈

范秀才年近七旬戊子二月患寒熱原有疝病至是胸脇少腹無不痛楚下痢紅白一名醫治之有年其邀余診蓋乘便耳其脉弦数所喜者滑詢其小便短赤此純屬肝火下迫似痢而非痢也必多服香窠又值

君火司天少陽當令于是乘其所勝而侮其所不勝所下皆太陰血津陽明腦膏也與生地女貞沙參麥冬川連萎仁一劑已愈其半而名醫曰七十之年可服黃連之苦寒萎仁之滑泄乎今下利而不與調氣健脾而反用滋陰潤肺此何治耶范乃拘儒復聽之治又一月將斃矣再延診仍前方加杞子白芍甘艸數劑痢止痛除而愈

瘧痢

李易安金石錄後序言其夫趙明誠因途中奔馳冒暑至行在旅邸病疝子聞信驚怛念渠儒性素怠病疝患熱必服寒涼藥疾可憂遂解舟一日夜行三百里果此至果大胾柴胡黃芩瘧且痢遂以不起（紫菀）

（自是少陽藥用之不當便能為患然藥不對病雖甘艸茯苓亦足殺人也）

萬密齋治汪氏媳病瘧且利用小柴胡合桂枝湯加當歸陳皮二十餘劑瘧愈隨以黃芩芍藥湯加人參治痢不効再思之悟曰此病得之內傷名為白蠹乃用升陽勝濕防風湯一劑而安

陸肖愚治王笠雲八月間患瘧服藥已愈後復飲食不調大便瀉而變痢一日夜約一二十行皆積滯無糞

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

腹痛後重自熱夜不安卧醫以參連木香楝等藥
投之益甚脈之左手浮弦而弱石手沈數而微曰此
瘧之餘邪也當清解經絡中邪熱則大便自固乃以
機要防風芍藥黃芩湯數劑而精神如故
孫文垣治董潯老家馬厨七月初旬患病二十餘日勢
轉劇詢其症曰大發寒熱寒至不悸入竈熱至不悸
入井痢黃紅白日夜八十餘行腹痛惡心汗多神氣
倦甚問其脈曰脈不吉下利脈洪大者死細微者生
今洪大逆也孫曰痢固忌洪大寒熱亦非細微所宜
其中必有過有故往診其脈察其症果如所言面色微

紅汗淋下究病所由起謂客來衆厨問噪熱食瓜
果羹藕過多晚又過飲接內寢于簷下次日即寒熱
腹痛因而下痢與人參白术石膏滑石各五錢知母
炮薑各三錢大附子炙甘艸各二錢大劑煎之飲訖
即瞑或問曰服後何狀為佳曰偶得一睡則陰陽和
和則汗可斂寒熱嘔惡可止也夜來痢減半汗吐全
無脈亦斂矣再用人參石膏白术白芍滑石各三錢
炮薑肉桂知母各二錢炙甘草附子各一錢服後瘧
止痢又減半飲食漸進神氣漸復改用酒芍五錢人
參白术滑石各二錢甘草陳皮炮薑肉桂各一錢三

劑痢全止而瘧或問寒熱均投此何症而劑何名也
咲曰此滑公所謂混沌湯也經云夏傷于暑秋必瘧
痢白虎湯益元散之劑仍果寒涼傷其中氣酒後御
內損其下元附子理中湯正所以温中補下者經又
云賢者邪氣入也故以白虎益元應之虛者正氣虛
也故以理中應之若以寒熱均用為疑則仲景附子
甘艸瀉心湯既用大黃黃川連又用乾薑附子此何說
哉蓋假對假真對真也

臧茗泉胤左弦數右寸弱關大重按則滑右尺微弱以
瘧後復傷飲食大便瀉而變痢一日夜至五六行皆
積滯無裹腹痛後重難堪午未後發熱天明始退此
夏傷于暑咊成瘧痢也其熱仍瘧之餘邪當先解散
然後以補劑投之則痢自愈矣與神授香連丸一服
腹中腸鳴須臾大便行較前更多且有糞下改以白
芍四錢澤瀉黃連各一錢滑石二錢甘艸桂皮各四
分山查七分兩日後瘧與補中益氣湯加木香川連白
芍調理半月而瘥（亦與前陸氏遇治玉雲案大同小異）

張路玉治故友子觸疫瘧之氣染患月餘不止左右之
人失于調理致愈而復發加以五液注下瘧痢兼并
冰穀不入者半月餘乃携歸壑中日與補中益氣兼

理中六君芪桂之屬將養半月而痊

李士材治一士胃暑勞苦患血痢危甚用黃連當歸烏梅滑石各五錢香薷三錢甘艸一錢而愈（疒治大遲此案可鼓）

陸祖愚治姚可儀祖母年七十精力過人勤勞不倦忽于夏後怒後感胃風涼兼之飲食頭痛骨疼寒熱大作寒則重衾熱則冷飲或以其年高病重攻伐兼施遂腹痛讝語煩燥脈之洪弦而緊謂高年而脈乃如是病正進也須雙解表裡之邪遂用紫蔔二陳枳桔查朴荅蕪加生薑二劑表疤稍減腹仍痛下利紅白裡急後重日夜去積三十餘次六脈未減乃用潤字丸一錢香連丸一錢和服日夜三服兩日後痢減半惟臍之上下痞滿又用枳橘青皮木香澤瀉木通荅連滑石之類五六劑方得燥矢與積同去病又減二三仍用香連丸二錢日進二服數日積除痢止改投大補氣血之劑調理月餘而安

韓延年長子初患咳嗽已久至七月患瘧後變痢仍未止或以尺脈短濇投養陰清補之劑診之擬加參附前醫亦以為然後更數醫仍不外溫補止塞出入加減服參及四斤病雖減而元氣猶未如故

高麗醫人治疾用藥只一味兩味至三味則極多矣未

有至四味者蓋藥性專則達二則濟三則調四則參與制再多則相牽而不能奏功矣偶傳癆痢二方甚簡而驗今錄于此治痢止二味色白者患寒其未是說用生薑一兩細茶五錢色赤者患熱用細茶一兩生薑五錢赤白雜者薑茶各五錢河水二椀煎至一椀温服即愈李日華六研齋三筆

汪紹先室人年五十餘新秋患淋秘小愈即勿藥初冬先自汗兩日遂寒熱成胎癆醫畧與消散不効將半月復增滯下腹痛後重日一二十行因見其脉如蛛絲聲微氣之短屬虛寒乃用二陳香砂蒼朴温胃燥脾之劑十餘日舌胎盡黑多汗不眠遂辭去診之脉果沈微語殊輕怯然小便熱短胸膈痞悶癆則熱多于寒痢則紅少于白此伏氣所發陳莖鬱積大腑為病也在金匱法宜下之但其稟賦甚弱三陰素虧不可峻治且前所服類皆温燥故令積滯不行宜以潤滑甘寒之品導之用生地杞子麥冬萎仁當歸木通白芍黄芩枳殼桔梗數劑覺去宿垢甚多又數劑而痢止癆仍間日一作加痰嗽甚頻此腸胃既通餘熱扶虚

火工竈也前方去枳桔當歸木通加沙參熟地二骨皮何首烏之屬十餘劑黑胎始盡而寒熱除又數劑痰嗽亦止後因勞瘧復作用補中益氣去人參內熱地一兩一劑而愈二後左關尺仍細弱向若峻下必生變矣當病甚時一崇科與木香白朮炮薑補骨脂等亦幸而未服

痢後風

孫文垣治程氏子年十五夏月患痢醫弥月痢止而筋骨腫痛二處發熱晝輕而夜重肌肉消飲食少有作

白虎歷節風治者有作痛膝鼓槌風治者病愈甚診之脈皆細濇曰此痢後風也蓋由治痢不善以致寒濕穢瘀凝滯經絡日久氣血為痛所傷此症虛二實極難認處方亦不易欲補虛則腫愈劇欲疏通則痛愈甚惟局方大防風湯可用防風熟地黃耆人參白芍當歸杜仲各一錢白朮一錢五分羌活牛膝甘草回陽各五分川芎七分加生薑三片服三十帖而全愈

陳三農治一士痢後腰腿攣痛不能俛仰此腎虛風寒濕乘也用獨活寄生湯二劑愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷十二

錢塘魏之琇玉橫撰

飲食傷

實材治一人慵懶飲食即臥致宿食結于中焦不能飲食四肢倦怠令灸中脘五十壯服分氣丸丁香丸即愈

一人飲冷酒食生菜成泄瀉服寒涼藥反傷脾氣致腹脹命灸關元三百壯當日小便長有下氣又服保元

丹半斤十日即愈再服全真丹永不發矣

一人脾氣虛好食冷物不消常覺口中出敗卵臭服草神丹即愈若服全真金液亦効 原注脾胃既為食所傷不可再施消耗唯治以溫化則自健運矣 愚謂胃為水穀之海為食所傷又而液涸津枯香燥大非所宜

一人暑月飲食冷物傷肺氣致咳嗽胸隔不利先服金液丹百粒泄去一行痛減三分又服五膈散而安但覺常發後五年復大發灸中府穴五百壯方有極臭下氣難聞自後永不再發 原注世醫不審病目動云暑月熱氣傷肺一派寒涼致水氣不消變成大病

人以冷水自漬至膝可頃刻數十枚瓜漬至腰刻轉多至頭可刻百餘枚可漬水皆作瓜氣味此事未試人中酒不解治之以湯自漬即愈湯亦作酒氣味 博物志

汪頴曰一人好食燒鵝炙煿日常不缺人咸防其生癰疽後卒不病訪知其人每夜必啜涼茶一椀乃知茶能解炙煿之毒也 本草綱目

龔子才治一人房勞後嗽紅柿十數枚又飲涼水數椀少頃又食熱麵數椀遂心腹大痛診之六脉沈微氣口稍大此寒熱相搏所致以附子乾薑肉桂枳實山查神麴莪朮香附一服立止後渾身發熱又以小柴胡一劑而安

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一人臘月賭喫羊肉數斤被羊肉冷油凝結堵塞胸膈不下脹悶而死諸醫束手診之六脈俱有乃用黃酒一大罈煮熱入大缸內令患人坐其中衆手輕輕亂拍胸腹背心令二人吹其耳乃將熱燒酒灌之次服萬億丸遂得吐瀉而愈按此仍是吐瀉之功

陶節菴治一人患病因食羊肉涉水結于胸中其門人請曰此病下之不能吐之不出當用何法陶曰宜食砒一錢門人未之信也乃以它藥試之百計不効卒依陶語一服而吐遂愈門人問曰砒性殺人何能治病陶曰羊血大能解砒毒羊肉得砒而吐而砒得羊肉則不能殺人是以知其可愈杭州府志曾子和以砒治一人案在喉門

唐守元治一婦人食羊肉發淹及兩年唐曰此必胸有宿物家人曰兩年不食矣曰試以我藥投之既而大吐出痰塊中裹羊肉一臠遂即痊愈平湖縣志

王海藏治秦生好服三生茶一作天生茶及冷物成積而痼寒脉非浮非沈上下內外按舉極有力堅而不柔觸指突出膚表往來不可以至數名縱橫不可以巨細狀此陰症鼓擊脉也一身流行之火萃于胸中寒氣逼之故搏大有力與真武四逆理中等湯丸佐以白

芍尚香使不僭於上每日香服十百丸夜服八十丸
至夜汗出而瘥立愈
孫文垣治董潯陽年六十七有脾胃疾以過啖瓜果胸
膈脹痛諸醫不愈脉之寸關弦緊曰病傷瓜果而為
寒濕淫勝經云寒淫所勝治以辛溫然瓜果非麝香
肉桂不能消以高良薑香附各一兩為君肉桂五錢
為臣麝香一錢為佐每服二錢酒調下藥下咽胸次
便覺寬再服知餓三服而巾櫛交接賓客如未病者
馬二尹迪菴年五十五以過食鰻肉卷餅心腹脹痛醫
不知吐發遽以硝黃下之大便不行脹痛愈甚又用
木香檳榔丸繼又有以大小承氣者十餘日病益加
便既不行食亦不進小水僅點滴又服白餅子五日
備急丸三日脹痛遂不可當又服甘遂芫花大戟孛
牛之屬三日并小便之點滴亦無矣又灸中脘三十
餘壯亦無驗此公腸肚幾是鐵甕城矣孫至視其色蒼黑神藏
不露聲音亮惟腹大如箕不能反側脉之兩手皆滑
大尺猶有力曰此病初時食在上脘法當用吐素問
云在上者因而越之是也乃誤下傷脾失其健運是
以愈下愈脹又以峻利益下之致展轉增劇令先用
六君子湯以醒其脾木香砂仁助其運動再用吐法

吐出前藥弗應大便不行獨處行之不止百計所服藥硝黃五斤巴豆白餅五兩又加諸慓悍之劑幸而藥性未行否則瓶水底脫傾瀉無餘矣今傷在上中二焦下元未損故兩尺尚有神色蒼氣固根本未動尚可為也服藥後腹中大痛知藥力已至改用人參蘆防風蘆升麻桔梗各三錢煎服少頃用鵞翎探之涌出前藥約十餘椀病者曰目前光矣時已刻謂酉時大便必行宜預備人參數斤以待至午刻進至寶丹一帖以溫中氣未申間腹中濁氣下注覺少寬至晚大便行一次小水畧通即用參朮各五錢炮薑三分茯苓二錢木香甘草各五分陳皮一錢煎服四鼓又行一次小水亦行次日連瀉十餘次以理中為丸與煎劑並服脹全消食漸進凡瀉七十二日服參二斤餘乃愈

吴九宜每早晨腹痛洩瀉者半年糞色青腹膨脹咸謂脾腎瀉為灸關元三十壯服補脾腎之藥皆不効自亦知醫謂尺寸俱無脈惟兩關沈滑大以為憂疑乂瀉六脈將絕也孫診之曰無恐此中焦食積痰瀉也積膠于中故尺寸隱伏不見法當下反用補悞矣以丹溪保和丸二錢加備急丸三粒五更服之下稠積

半桶脹痛隨愈次日六脈齊見再以東垣木香化滯
湯調理而安
汪氏婦腹大如箕堅如石時或作痛禜治月餘轉脹急
小水不通或用溫補下元之劑則脹急欲裂自經求
盡脉之兩關洪滑鼓指按之不下乃有餘之候也疾
雖重可生其致病之由母家常令女奴袖熟雞牛舌
之類私授之因數食冷物積成脹滿誤作虛治宜增
劇也乃用積塊丸三下之而脹消積去以保和丸調
理一月而愈
黃履素曰予在臨江時誤服厚朴傷中氣之後偶食犬
肉一塊遂覺停滯時中氣正虛不敢加山查等藥考
本草食犬肉不消煮蘆根汁飲之可消如法煎飲覺
右脇下微痛次日大痛殊不可解自是日甚一日坐
卧皆妨反側痛如刀刺右脇下按之有物如雞子方
書言右脇痛屬食積痰積有謂須攻治者有謂不宜
攻必須助正以消邪者時有醫主攻治謂不治將成
痞塊予以為不然確守助正之說當痛極時不敢服
藥靜以守之俟痛小定氣雖痞即用六君子加木香
等行氣之藥以漸調之竟得痊可若誤信攻伐不知
死所矣

張景岳治一上舍年及三旬因午刻食水煮麪角將至
初更食及小腹下至右角間遂停積不行而堅突如
拳大鵝卵其痛之劇莫可名狀察其明係麪積顯而
無疑然計其已入大腸此正通則不痛之症也乃與
木香檳榔丸其痛如故因疑藥力之緩猶未及病更
投以神授丸瀉之仍又不効因謂此藥性皆寒故滯
而不行也再投備急丸雖連得大瀉而堅痛毫不為
減斯時也張計窮矣因潛思其由不過因麪豈無所
以制之今既逐之不及使非借氣以行之不可也且
計麪毒非大蒜不能殺氣滯非木香不行又其滯深

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

道遠非精銳之嚮導不能達乃用火酒磨木香令其
嚼生蒜一大瓣而以香酒送之一服後覺痛稍減三
四服後痛漸止而食漸進但小腹之塊仍在後至半
年許始得消盡由是知欲消食滯即大黃巴豆猶有
所不能及而推宜行氣為先也且知飲食下行之道
乃必由小腹下右角間而後出于廣腸此自古無人
言及於斯道者

琇案就此觀之景岳平生臨症遺憾多矣夫麪角
由胃入腸已至少腹之角豈能作痛如是而又如
拳如卵耶必其人素有疝病偶因麪食之濕熱發

之或煞當日之房勞遂乃決張如是故推蕩之亦
不應得木香火酒一派辛熱香竄而痛止耳至謂
食由小腹下右角而後出廣腸謂自右無言及者
更堪捧腹經謂大小腸皆盤屈十六曲則左旋右
轉可知豈如筒如袋而直下乎嘻
張路玉治葉某停食感冒兩寸關俱濇數糢糊兩尺皆
沈弦按之益堅雖其人尚能行走而脈少冲和此必
向有陳氣在少腹詢之果患寒疝數年因婉辭不用
藥是夜腹暴滿而逝或問此人小恙何以知其必死
曰凡人胃滿則腸虛腸滿則胃虛更實更虛其氣乃
居今胸有碍腹有積上下俱困能保其不交攻為患
乎當知厥痛入腹脚氣沖心等疾皆是陰邪搏結鬱
積既久則挾陰火之勢而上升若胸中元氣有權則
邪下伏今既為宿食填塞逆則上下俱滿正氣無容
身之地往往有暴絶之虞所以不便用藥實未知其
即死也（傷寒論病人素有痞積及病傳入三陰則死謂之臟結蓋新邪與舊邪合併也）
幼科汪五符夏月傷食嘔吐發熱顱脹自利黃水遍體
肌肉捫之如刺六脈糢糊指下似有如無足脛不温
自認陰寒服五積散一劑熱愈熾昏卧不省第三日
利不止時譫語至夜尤甚或以為傷暑與香薷飲遂

頭面汗出如蒸喘促不寧足冷下逆或以為大寒而脈息糢糊按之殊不可得以為陽脫之候欲猛進覆附或以為陰症斷無汗出如蒸之理脈雖虛而症大熱當用人覆白虎爭持未決張診之曰六脈如此而心下按之大痛舌上灰刺如芒乃食填中宮不能鼓運其脈往往多此當與凉膈散下之一劑神思頓清脈亦頓起倘以參附投之其寧免乎

癸卯元夕周徐二子過石頑齋頭縱飲次日皆病酒不能起欲得葛花湯解醒張曰此湯雖為傷酒專劑然人稟各有不同周子縱飲則面熱多渴此酒氣行陽明肌肉之分多渴知熱傷胃氣豈可重令開瀉以耗津液與四君子湯去甘草加藿香木香煨葛根澤瀉下咽即愈徐子久患精滑飲則面色愈青此素常肝膽用事腎氣亦傷酒氣皆行筋骨所以不上潮于面葛花胃藥用之何益與五苓散加人參倍肉桂服後食頃溲便如皂角汁而安

柴嶼青治中翰陳雯山壯熱神昏為時醫所誤者累日勢甚危篤診得神迎脈緩自無外感惟氣口洪實舌胎甚厚重按其胃皺眉呼痛此胃中停食屢進發表相去逕庭無怪乎增劇也用小承氣湯連下二次即

神清熱退而安

張飛疇治謝元海夏月常飲火酒致善食易飢半月後腹漸脹滿大便艱濇食亦日減醫用刻削清火俱不効左脈細數右脈澀滯此始為火助胃強而善食繼為火灼胃液而艱運艱運則食滯而脹滿脹滿則食減今宜斷食辛熱乘元氣未漓祛其滯而回其液日久則費調理也用枳實導滯湯去黃連白朮加葛根一服大便通利而滯行又用健脾理氣三日後以小劑生脈加葛根半月而愈

張三錫治一人發熱頭痛七日不止診之左脈平和右寸關俱弦急有力乃內傷宿食為患也以二陳加枳實厚朴查麴柴胡三劑再加黃芩頭痛除但熱不淨投枳實導滯丸百粒更衣而愈

一婦人每夜分即發熱天明暫止自投四物湯反加嘔惡診得左關微急而右寸關俱弦數有力詢之經後食梨午後遂熱起正丹溪所謂胃虛過食冷物抑遏陽氣于脾土之中此病多因血虛而得者遂以升陽散火湯一服熱已後用四物去地黃加枳朮陳皮健脾養血調理而愈

張三錫曰余初識繆仲淳時見袖中出彈丸咀嚼問之

怡蘭堂鈔本

曰此得之秘傳飢者服之即飽飽者服之即飢因疏其方名資生丸余大善之而頗不信其消食之功已于醉飽後頓服二丸徑投枕卧夙興了無停滯始信此方之神也

許學士云有人全不思食補脾罔效授二神丹服之頓能進食此即補母法黄魯直用兔絲子淘淨酒浸日捵數匙下之十日外飲啖如湯沃雪亦此理也治法彙

張三錫治一人夏食羊肉太多作渴煩躁自謂受暑用涼水調一元散躁渴愈甚診之脈雖滑不鼓隨以鹽湯吐之得生肉椀許乃以二陳加草果肉桂厚朴山查調理而安若用涼藥作暑治立見其斃

一人飲茶過度且多憤懣腹中常漉漉有聲秋來寒熱似瘧以十棗湯料黑豆煮曬乾研末棗肉和丸芥子大以棗湯下之初服五分不動又服五分無何腹痛甚以大棗湯飲大便五六行時蓋日晡也夜半乃大下數升積水而疾平當其下時瞑眩特甚手足厥冷絶而復甦舉家號泣咸咎藥峻嗟乎藥可輕哉

一人過食瓜果時值夏月大瀉不止中脘大痛煩渴引飲自服天水散及香薷飲脈之右關寸俱沈伏因作停冷治香砂六君子湯加炮薑厚朴一服痛渴俱止

只以胃苓調理而安

龔子才治徐通府因酷好燒酒及五香藥酒過度患吐血唾痰氣喘咳嗽或與參蘇飲敗毒散滋陰降火湯俱不効診之六脈急數此酒毒積熱入于骨髓不受滋補以黃連解毒湯加知母貝母石膏連翹元參花粉葛根瓜蒌桔梗酒蒸大黃早晚服至百日外以六味丸加解毒湯在內與前湯藥並進又百日始瘳後歸田逾年仍為酒困而卒

陸肖愚治吳武祖之母少寡長齋稟賦極薄因正啖糯米粉食人誤報武祖不入泮不覺驚而且悶遂成內傷或與消導過多而中滿更甚脈之兩手斷續不勻洞瀉口開頭汗如洗元氣將脫胸中仍不可案脈不足而症有餘宜先補後攻急用附子理中二劑汗止瀉減脈稍有根以枳實理中湯進之其積漸覺移動脈亦有神後以潤字丸每服五分以煎劑送之積去身和調理而愈

徐小園子新昏多唉脾已受傷又外感遂往來寒熱項強背痛頭疼表裡具在或謂瘧疾遽用截藥因而口渴多食生冷變為吐瀉與柴苓湯不効診之四肢厥逆不省人事面色青黃乃用參附理中加枳實厚朴

山查等三劑脈起而內傷之症纔現身大熱舌焦芒刺臍上下手不可按四肢濈然汗出下症悉具第用枳朴熟黃少許加錢鏞水導之去燥矢三四塊勢未減又與枳朴查連小柴胡加人葍少許間四五日進潤字丸五分大便去一次如是八十餘日裏症去六脈有神尚晡時潮熱胃氣不開口乾腹滿前方去參四劑勢又大減或謂傷寒三七不解謂之壞病經云安穀者昌絕穀者亡今將百日粒食不進焉有生理況身不熱舌無胎縱晡時微熱亦是陰虛之故急宜滋陰養血開胃健脾自愈遂服藥一劑又強飲粥湯半盞及龍眼湯一杯是夜仍身體大熱心口作痛異常煩躁舌上有胎再診右關尺沈實仍用枳實黃連卷舒麥芽查朴送潤字丸一錢五分去後極暢諸症頓除改用六君方知飢飽計百三十餘日頭髮落盡年餘未得出門戶（參附理中得無罪）

瑣披如此治病時醫之說信哉

陳益昭新正赴館偶開別室見一柩心中怦然是晚夢遺次日勉強行文薄莫噎肉麪遂頭疼身熱右脇有塊如椀疼痛寒熱疑為腫毒診之謂內傷燕感不信瘍醫視之外用數藥內服解毒之劑不効或與投補

遂昏冒煩躁譫語如狂再延診脈洪數無倫此誤補故也仍作內傷飲食治之用青陳皮枳實厚朴山查黃連等又以麩皮炒熨稍甦再用潤字丸五分數服宿垢去而痛減改用參朮歸芍麥冬陳皮茯苓甘草之類調理月餘而安

沈振宇病愈未幾因食饅頭羊肉等物遂胸腹脹滿否塞不通服藥旬餘不効口渴煩躁晡時更甚凡硝黃枳朴梹查麻仁青皮紅花歸地芩連遍服而大便不通陸曰大病須以大方治之若拘拘一二錢力量輕薄安能奏捷如元明粉梹榔必用五錢枳實生地當歸黃芩必用一兩紅花必用三錢另以山查四五兩煎湯代水煎藥臨服必加錢鏽水半酒杯其垢自行矣如言一劑果腹中運動響聲不絕兩時許下宿垢半桶頓覺爽利調理而痊

昔有婆羅門僧東來見食麪者云此大熱何以食之又見食中有蘆菔云賴有此以解其性自此相傳食麥麪必啖蘆菔又小說云人有中麥麪毒者夢紅裳娘子悲歌有一丸蘆菔火五吾宮之句 醫說續編 本草

扁鵲云酒飲過腐腸爛胃潰髓蒸筋傷神損壽有客訪周顗顗出美酒二石顗飲石二客飲八斗次明顗無

所苦酒量慣也客已死矣觀之客脇穿腸出豈非量過而犯扁鵲之戒與 全上

薛立齋治一人食粽煩悶熱渴大便欲去不去用消導藥不應以白酒麴炒為末溫酒調服二錢俄傾腹鳴粽下而安一人食水晶團子過多肚腹脹痛亦治以此方而愈

一人食魚鮓腹痛患痢諸藥不効用陳皮白朮等分為末陳米湯下數服而愈一人每食蟹即腹痛用紫蘇濃煎湯一服而安

一婦人停食飽悶或用人葍養胃湯木香檳榔丸而泄瀉吐痰腹中成塊又與二陳黃連厚朴反加腹脹不食此胃氣虛不能消磨用補中益氣加茯苓半夏五十餘劑脾胃健而諸症痊

實材治一人因暑月食冷物以致胸腹脹悶欲死服金液丹百丸少頃加全真丹百丸即有氣下降而愈

一人每飯後飲酒傷其肺氣致胸膈作脹氣促欲死服鍾乳粉五膈散而愈若重者灸中府穴亦好服凉藥則成中滿難治矣

一人嗜茶成癖一方士令以新鞭盛茶令滿任意食盡再盛一鞭如此三度自不嗜也男用女鞭女用男鞭

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

用之果愈集簡方本草綱目

立齋治一男子夏月入房食冰果腹痛用附子理中湯而愈有同患此者不信別用芩連二陳之類而死即上

舍徐民則

林觀子治一人房慾後遠涉飢渴飲新吸泉水而歸病作醫以解表消中藥與之遂冷逾膝肘外熱躁擾不定掀衣擲被謾語無倫脈寸如蛛絲餘無急以人參薑附入葱白生薑大劑浸冷連灌之得睡躁定去葱白生薑服數帖得汗脈亦漸復加別藥調理而安

朱丹溪治一大夫因酒多下血肚疼後重成痢滑石半兩連翹黃芩木通白芍枳殼白朮各二錢甘草五分桃仁二十一枚分四帖服

有人因憂愁中傷食結積在腸胃欲發吐利自冬後至暑月積傷發暴下數日不止玉函云下痢至隔年月日應期而發者此為有積宜下之止用溫脾湯尤佳如難下可佐以乾薑丸乾薑巴豆大黃人參各等分後服白朮白朮木香附子人參各等分右細末每二錢水一盞薑三片棗一个煎六分溫服

一丈夫酒多病泄久不愈又自進附椒等食不進洩愈多滑石黃芩各半兩乾薑黃連樗皮粥為丸每服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

百丸十之立愈

許學士治宋室趙彦材下血面如蠟不進食蓋酒病也授紫金丹方服之終劑血止面鮮潤食亦倍常新安一士人亦如是與三百粒作一服立愈膽礬三錢黃蠟二兩大棗五十枚右以砂鍋或銀石罐內用好醋三升先下礬棗慢火熬半日取出棗去皮核次下蠟再慢火熬一二時如膏好入蠟茶二兩同和丸如桐子大每服二三十丸茶酒任下

孫兆治館職學士張居易嗜酒散誕不為名利拘束忽發熱頭痛俾翰林醫官治之十日愈甚諸學士共議召孫至脈之曰餘人皆曰傷寒故作此疾也張學士好酒多啖食所傷也今疾非傷寒而右手脈甚數左手脈平和此必傷酒食而作頭痛宜啖食藥五七丸俟之半日進退決矣孫遂用食藥經食久腸漸寬頭痛遂減再飲利腸藥遂獲安大凡陽邪頭痛經十日豈得不變發熱而狂亂故知非傷寒乃食病之過也

朱丹溪治胡獹人因嗜冷粉與肉頭痛自汗腸痔小便赤用白朮二錢半陳皮一錢半水通川芎黃芩各半錢薑水煎熟吞送草豆蔻丸阿魏丸保和丸各五十粒而下諸症悉除

羅謙甫曰丁巳冬余從軍回至汴梁有伶人孛人愛謂
余曰大兒自今歲七月間因勞後渴飲涼茶及食冷
飯覺心下痞醫投藥一服下利兩行症遂減不數日
又傷冷物心腹復痞滿嘔吐惡心飲食無味且不飲
食四肢困倦懶于言語復請前醫診視曰此病易為
更利幾行即快矣遂以無憂散對加韋牛末白湯服
至夕腹中雷鳴而作陣痛少焉既吐又瀉煩渴不止
飲無度不復能禁時發昏憒再命前醫視之診其
脈不能措手而退頃之冷汗如洗口鼻氣漸冷而卒
矣小人悔恨無及敢以為問予曰未嘗親見不知所

以然既去或曰予親之果藥之罪歟而非歟予曰此
非藥之罪而失其約量之過也夫藥之無據反為氣
賊內經云約方猶約囊也囊滿勿約則輸泄方成勿
約則神氣勿俱故仲景以桂枝治外傷風邪則曰若
一服汗出病瘥停後服不必盡劑大承氣湯下大實
大滿則曰得更衣止後服不必盡劑其慎如此此為
大戒蓋得聖人約囊之旨也治病必求其本益孛人
愛以褓劇為戲勞神損氣而其中痛因時暑熱渴飲
涼茶脾胃氣弱不能運化而作痞滿以藥下之是重
困也加以不慎又損其陽虛而復傷傷而復下陰爭

于內陽擾于外魄汗未藏四逆內起仲景所謂一逆尚引日再逆促命期如是則非失約量之過而何故內經戒云上工平氣中工亂脈下工絕氣不可不慎也

張子和治一緇侶好茶成癖積在左脇曰此與肥氣頗同然痰瘧不作便非肥氣雖病十年不勞一日況兩手脈沈細有積故然吾治無鍼灸之苦但小惱一餉可享壽盡期先以茶調散吐出宿茶水數升再以水如意擲之又涌數升皆作茶也次以三花神祐丸九十餘粒是夜瀉二十餘行膿水相兼燥糞瘀血穢然而下明日以除濕之劑使服十餘日諸苦悉蠲神色

清瑩醫說續編

浙東監憲全公每晨先飲阿剌吉十餘杯然後飲常酒至六月大發熱張爽之治用冰攤心腹上冰消復增內飲以藥三日乃愈全上

一富家子廿餘歲四月間病發熱求趙以德治之脈浮沈無力而虛熱又往來潮熱作無時脈間有力又洪數隨熱進退因知非外感之熱必是飲酒留毒在內今乘房勞氣血之虛而病作問之果在正月間每晨飲阿剌吉噢狗肉一月既得其情遂用補氣藥加葛根以散酒毒一貼微汗反懈怠熱如故因知是氣血

皆虛不禁葛根之散而然也必得雞距則方可解其
毒偶得乾者少許加于藥中其熱即愈（藥要或問全上）
唐生者病因飲酪水及食生物下利紫黑血十餘行脾
胃受寒濕毒與六神平胃散半兩加白朮三錢以利
腰臍間血一服愈（醫說續編）
周子固治王經歷患身輕飄飄若行空虛中易醫凡七
十人皆以為風虛與熱劑轉加周曰此酒毒也即以
寒涼之劑驅之隨愈（九靈山房集）
張子和一酒病人頭痛身熱惡寒狀類傷寒診其脉兩
手俱洪大三兩日不圖以防風通聖散約一兩水一
中椀生薑二十餘片葱二十莖豆豉一大撮同煎三
五沸去柤稍熱分作二服（服一服多半）先飲大半劑須臾以釵股
探引咽中吐出宿酒香味尚然約一兩餘頭上汗出
如洗次服少半劑立愈內經曰火鬱發之發謂汗之
令其疎散也
朱丹溪治一飲酒人胸大滿發熱夜譫語類傷寒右脉
不如左大與補中益氣柴胡升麻加半夏
以黃耆補氣柴胡升麻之升故去之服後病愈因食
涼物心痛于前藥中加草豆蔻數粒愈（治法）
立齋治曹銓因飲法酒肛門腫痛便秘脉實服荊防敗

毒散不應用黃連內疎湯而愈

沈明生治蘇郡丞秦水心初有中氣虛寒之症燕以案牘甚勝應酬紛擾遂致疲倦食少肌表微熱不能治事名診始而用温繼而用補其後每劑加參至兩許附至三錢然後飲食大進精神煥發復因湯液久而苦口則更製丸劑常服大抵不外抉陽抑陰之義忽一日諸症復發視前較甚加之自汗頭暈嬾于語言亟延診首訊昔日大劑温補煎方蓋謂丸劑緩而無濟也診畢曰證即前日之症藥非前日之藥是殆勞神動怒之後復為飲食所傷致令當納受者不納受當運化者不運化實熱滯于太陰陽明兩經此王安道所謂飲食勞倦之中仍有有餘不足今非昔比參附斷斷不可沾脣惟宜清導消熱耳詢之果然遂如法治之而愈所以知秦之病者其脈左關獨大而氣口緊盛倍常左關獨大者肝主勞與怒也氣口緊盛非食而何藉若膠柱前方實實之咎其何能免

顧開一內人以傷食飽悶求治診其脈氣口初非緊盛而反得虛微察其症雖若胸次有物而神氣殊短正符東垣飲食勞倦之說宜補正以祛邪即用六君子健脾佐以薑桂等味助中焦熟腐水穀一二劑後腹

消

脹寬舒忽又以脾瀉告沈曰服補得瀉此元氣勝而滯氣消君子進而小人退之機也改用補中益氣數劑脾瀉即止飲食如常

聶久吾曰一侍婢停食腹痛先用消導畧加發散藥一劑其痛未減因用炒鹽湯二椀吐之其痛減半又用發散為主加消導一劑其痛立止因悟寒邪停食作痛散其寒氣則食自消而痛自止自後以此施治無不神効

張子和曰初虞世言凡渴疾未發瘡瘍便用大黃寒藥利其勢使大困大虛自勝如發瘡瘍膿血流漓而殮此真俗言也故巴郡太守奏三黃丸能治消渴余嘗以隔數年不愈者減去朴硝加黃連一斤作兩劑以長流千里水煎五七沸放冷日呷之數百次以桂苓甘露散白虎湯生藕節汁淡竹瀝生地黃汁相間服之大作劑料以代飲水不日而痊故消渴一症調之而不下則小潤小濡固不能殺炎上之勢下之而不調亦旋飲旋消終不能沃焦膜之乾下之調之而不減滋味不戒嗜慾不節喜怒病已而復作能從此三

者消渴亦不足憂矣

昔有消渴者日飲數斗劉完素以生薑自然汁一盆置之密室中具罌杓于其間使人入室從而鑠其門病人渴甚不得已而飲盡渴減得內經辛以潤之之旨又內經治渴以蘭除其陳氣亦辛平之劑也劉完素之劑雖用此一味亦必有倚藥助之也

秦運副云有人消渴飲引無度或令食韭苗其渴遂止法要日喫三五兩或炒或作羹無入鹽極効但喫得十斤即佳過清明勿喫食醬無効 本草

苦楝根取新白皮一握切培入麝少許水二椀煎至一椀空心飲之雖困頓不妨自後下蟲三四條狀如蚘蟲其色真紅而渴頓止乃知消渴一症有蟲耗其津液者 醫說續編

鄂渚章祐之患消渴九年服藥止而復作蘇朴教以白芍甘草即戊已湯等分為末每用一錢水煎服七日頓愈古人處方殆不可曉不可以平易而忽之也 陳日華經驗方

本草綱目

有仕宦病消渴醫謂不過三十日必死亟棄官歸途過一醫令致北梨二擔食盡則瘥宦如其斷言食及五六十枚而病即愈 泊宅編

朱丹溪治徐兄年四十歲口乾小便數春末得之夏來求治診其兩手左澀右畧數而不強重取似大而稍有力左稍沈畧弱而不弦然濇却多於右喜兩尺皆不甚起此由飲食味厚生熱謂之痰熱禁其厚味宜降火以清金抑肝以補脾用三消丸十粒左金阿魏丸各五粒以薑湯吞下一日六次又以四物湯加參朮陳皮生甘草五味麥冬煎服一日三次與丸藥間服一二日自覺清快小便減三之二口亦不乾止渴未除頭暈眼花坐則腰疼遂以摩膏膏治腰疼仍以四物湯用參耆減川芎加牛膝五味炒柏麥冬煎飲

調六一散服及覺便多遂去六一散令仍服丸藥而漸安痊

薛立齋治一貴人病疽未安而渴作一日飲水數升教服加減六味丸方諸醫大笑云此藥能止渴我輩當不復業醫矣皆用木瓜紫蘇烏梅人參茯苓百藥煎等生津液之藥止之數劑而渴愈甚不得已用前方服三劑渴止因相信久服不特渴疾不作氣血亦壯飲食加倍强健過于少壯之年薛氏家藏此方屢用有驗

實材治一人頻飲水而渴不止曰君病是消渴也乃脾

肺氣虛非內熱也其人曰前服涼藥六劑熱雖退而渴不止覺胸脇氣痞而喘實曰前症止傷脾肺因涼藥復損元氣故不能健運而水停心下也急灸闕元氣海各三百壯服四神丹六十日津液復生方書皆作三焦猛熱下以涼藥殺人甚於刀劒慎之（與薛案及子和引初虞世之說參閱）

楊貴孯鄱陽人傅羣書精脈理每心計造方有患飢者諸醫以火症治孯又思之未得頃見堂上木欖自朴乃為濕氣所蒸致朽忽悟水能消物不獨屬火此濕消耳遂投熱劑而愈（江西通志）

孫文垣治一書辨年過五十沈綿酒色忽患下消之症一日夜小便二十餘度清白而長味且甜少頃凝結如脂色有油光治半年無効腰膝以下軟弱載身不起飲食減半神色大瘁脈之六部大而無力經云脈至而從按之不鼓諸陽皆然法當溫補下焦以熟地黃六兩為君鹿角霜山萸肉各四兩桑螵蛸鹿角膠人蔆白茯苓枸杞子遠志菟絲山藥各四兩為臣益智仁一兩為佐大附子桂心各七錢為使煉蜜為丸梧桐子大每早晚淡鹽湯送下七八十丸不終劑而愈或曰凡消者皆熱症也今以溫補成功何故曰病

由下元不足無氣升騰于上故渴而多飲以飲多小便亦多也今大補下元使陽氣充盛熏蒸于上口自不乾譬之釜蓋釜雖有水必釜底有火然後水氣升騰蓋乃潤而不乾也

龔子才治一人消中日夜溺七八升鹿角燒令焦為末以酒調服五分日三服漸加至方寸匕

一人不時發熱日飲冰水數椀寒藥二劑熱渴益甚形體日瘦尺脈洪大而數時或無力王太僕曰熱之不熱責其無火又云脩熱往來是無火也時作時止是無水也法當補腎用加減八味丸不月而愈

張路玉治趙雪訪消中善食日進膏粱數次不能敵其飢勢丙夜必進二餐食過即昏昏嗜卧或時作酸作甜或時夢交精泄或時經日不飲或時引飲不輟自言省試勞心所致前所服皆安神補心滋陰清火之劑不應察其聲音濁而多滯其形雖肥盛色蒼而肌肉綿輭其脈六部皆洪滑而數惟右關特甚兩尺亦洪滑而按之少神此腎氣不充痰濕挾陰火泛溢於中之象遂與加味導痰加蘭香數服其勢大減次以六君子合左金枳實湯泛丸服後以六味丸去地黃加鰾膠蒺藜平調兩月而愈

朔客白小樓中消善食脾約便艱察其形瘦而質堅診其脈數而有力時喜飲冷氣酒此酒之濕熱內蘊為患遂以調胃承氣三下破其蘊熱次與滋腎丸數服滌其餘火遂全安

粵客李之藩上消引飲時當三伏觸熱到吳初時自汗發熱煩渴引飲漸至溲便頻數飲即氣喘飲過即渴脈之右寸浮數動滑知為熱傷肺氣之候因以小劑白虎加人參服三服熱減次與生脈散調理數日而痊

薛廉夫子強中下消飲一溲二因新娶繼室真陰灼爍虛陽用事陽強不倒恣肆益甚乃至氣息不續精滑不收背曲肩隨腰膀疼軟足膝痿弱寸步艱難糜粥到口即厭惟喜膏粱方物其脈或數大少力或弦細數疾此陰陽離決中空不能主持而隨虛火輒內輒外也與八味腎氣保元獨複調補經年更與六味地黃久服而痊

邵某仲夏與婢通因客至驚恐精氣大脫即凜凜畏寒翕翕發熱畏食畏飲小便淋瀝不禁診之六脈弦細如絲責如循刀亦此腎中真陽大虧之候令服生料六味加桂附以通陽氣咸謂夏暑不宜桂附另延醫峻用人參附子月餘飲食大進猶謂參附得力恣

餌不輟遂至日食豚蹄雞鴨七八餐至夜預治熟食飽啖二次如此兩月餘形體豐滿倍常但苦時時嘈雜易飢常見青衣羣鬼圍繞其側再邀診其脈滑數有力而右倍于左察其形色多滯且多言多笑而語無倫次此味痰壅塞于中復加辛熱助其搖火始本陰虛（何以前言真陽大脫未傳消中之患也不急祛滌必為狂癡之患為製涌吐之劑遲疑不進未幾忽大叫發狂妄言妄見始信言之非謬也（宜入鷺門）

許學士云一卒病渴日飲水斗許不食者三月心中煩悶時已十月余謂心經有伏熱與火府丹數服越二日來謝云當日三服渴止又三服飲食如故此本治淋用以治渴可謂通變也生地水通黃芩（見婦人良方）

陸養愚治兩廣制府陳公年近古稀而多寵婢且嗜酒忽患口渴茶飲輒而喜熱惡涼小便極多夜尤甚大便祕結必用蜜導日數次或一塊或一二塊下身軟弱食減肌削所服不過生津潤燥清涼而已脈之浮按數大而虛沈按更無力曰症當溫補不當清涼問消本熱症而用溫補何也曰經謂脈至而從按之不鼓諸陽皆然今脈數大無力正所謂從而不鼓無陽脈也以症論之口渴而喜熱飲便祕而溺偏多皆無

陽症也曰將用理中參附乎曰某所謂溫補在下焦而非上中二焦也經曰陽者從陰而亟起也又曰腎為生氣之原今恙由於腎水衰竭絕其生化之原陽不生則陰不長津液無所蒸以出故上渴而多飲下燥而不潤前無以約束而頻多下無以轉輸而艱秘食減肌削皆下元不足故也曰予未病時陽已瘥病後從不近女色腎未必衰竭曰腎竭于未病之前瘥是腎竭明驗既瘥之後雖欲竭而無從矣彼雖不悅而心折其言遂委治之乃以八味丸料加益智仁煎人參膏糊丸每服五錢白湯送下日進三服數日溺覺少十日溺竟如常大便尚燥每日一次不用蜜導矣弟口渴不減食尚無味以升麻一錢人參黃耆各二錢煎湯送丸藥數服口渴頓止食亦有味又十日諸症全安（與孫文垣案仿此）

陸祖愚治李悅吾年五十餘患消渴症茶飲不能輟口小便多而數殊不欲食及食後即飢病將一載精神困怠肌膚枯澀自分必死脈之沈濡而濇曰病尚可藥凡人一身之津液以火而燥然必以氣化而生前醫純用清涼滋潤之品所以不效潔古云能食而渴者白虎倍加人參大作湯劑多服之不能食而渴者

及食即飢當合二方加升麻佐葛根以升清陽之氣少用桂附以合從治之法每味數兩大砂鍋濃煎禁湯飲以此代之此病仲景謂春夏劇秋冬差今當盛夏病雖不減亦不劇若依法治之無絕厚味戒嗔怒閉關靜養秋冬自愈幸其能守戒忌交秋即瘥秋末全愈

薛立齋曰一男子作渴日飲水數椀冬月亦然彼用加減八味丸去肉桂服之不應一男子患此欲治以前丸彼謂肉桂性熱乃服知柏等藥渴不止背發疽而歿一男子亦患此症漸消瘦與前丸數服渴減半一劑而痊再劑形體復壯夫肉桂腎經藥也前症乃腎經虛火炎上無制為患用肉桂導引諸藥以補之及引虛火歸原故効一男子脚面發疽愈而作渴以前丸治之而愈一富商稟賦頗厚素作渴日飲水數椀面發一毒用消毒藥潰而難愈尺脈尚數渴亦不止時盈秋謂以火旺水涸之脈也須服加減八味丸以通腎水制心火庶免疽毒之患彼不信至夏果脚背發疽脈數按之則澀而無力足竟黑腐而死一男子稟頗實之嗣服附子等藥致作渴左足大指患疽色紫不痛脈亦數而澀亦死大抵發背腦

疽脫疽腫痛色赤水衰火旺之色尚可治若黑紫
火極似水之象也乃腎水已竭精氣固涸決不治外
科精要云凡病疽疾之人多有既安之後忽發渴疾
而不救者十有八九疽疾將安而渴疾已作宜服加
減八味丸既安之後而渴疾未見宜先服之以防其
未然薛兜時聞其父云一士夫病渴疾諸醫皆用渴
藥累載不痊有一名醫教服加減八味丸半載而愈
一老人冬月口舌生瘡作渴心脈大而實尺脈大而虛
此下消症也患在腎須加減八味丸補之否則後發
疽難療不信仍服三黃等藥降火次年夏果患疽而
殁東垣曰膈消者以白虎加人參湯治之中消者善
食而瘦自汗大便硬小便數脉訣云口乾饒飲水多
食亦飢虛成消中者調胃承氣湯三黃丸治之下消
者煩躁引飲耳輪焦乾小便如膏　又云焦煩水易
虧此腎消也六味地黃丸治之總錄所謂末傳能食
者必發腦疽背瘡不能食者必傳中滿鼓脹皆謂不
治之症潔古老人分而治之能食而渴者白虎加人
參湯不能食而渴者錢氏白朮散倍加葛根治之上
中既平不復傳下消矣前人用藥嚴有旨哉或曰末
傳瘡疽者何也此火邪盛也其瘡痛甚而不潰或赤

水者是也經云有形而不痛陽之類也急攻其陽無攻其陰治在下焦元氣得強者生失強者死

一婦人面患毒瘍痛發熱作渴脈數按之則實以涼膈散二劑少愈以消毒藥二劑而平（以下五案仍宜入外科）

一男子肩患疽作渴脈數有力以黃連解毒湯三劑而止更以仙方活命飲四劑而愈

一男子潰而煩渴不安以聖愈湯二劑而寧以人參黃芪當歸地黃四劑渴止以八珍湯二十劑而愈大抵潰後有此症屬氣血不足須用參芪以補氣歸地以養血若用苦寒之劑必致有誤

一男子患毒作渴右關脈數以竹葉黃芪湯治之而愈更以補中益氣湯加黃芩而痊

一男子潰後口乾遇勞益甚以補中益氣湯加五味麥冬治之而愈更以黃芪六一湯而斂（芪六一草）

繆仲淳治湖州庠友張時泰正月間驟發齒痛十餘日而愈四月間焦勞過多齒痛大作醫用石膏知母等藥不効用刀去齒間紫血滿口齒痛不可忍齒俱搖動矣至六七月間飲食益多小便如注狀如膏肌肉盡削至十一月身不能起冬末用黃芪地黃等藥稍能起立然善食易飢如故小便如膏亦如故今年二

三月愈甚亦不服藥齒痛如故當門二齒脫落復加口渴晝夜不止此中下二消症也為立方未數劑而瘳麥冬蘆根各五兩五味黃連各三錢黃芪五錢生地六錢天冬一兩用繰絲湯十椀煎二椀不拘時服九方于前方中加黃柏三兩牛膝五兩沙參六兩枸杞四兩五味六兩蜜丸常服遂不復發

張景岳治省中周公山左人也年逾四旬因案牘積勞致成羸疾神困食減時多恐懼自冬徂夏通夕不寐者半年有餘而上焦無渴不嗜湯水或有所飲則沃而不行然每夜必去溺二三升莫知其所從來其半

皆膏濁液厪羸至極自分必死診之脈猶帶緩肉亦未脫知其胃氣尚存慰以無慮乃用歸脾湯去木香及大補元氣之屬一以養陰一以養神出入間用至三百餘劑計人參二十觔乃得全愈此神消于上精消于下之症也可見消有陰陽不得盡言為火

喻嘉言曰友人病消渴後渴少止反加燥急足膝痿弱予主是九（白茯苓九）加犀角有醫曰腎病而以黃連犀角治心無乃倒乎予曰腎者胃之關也胃熱下傳于腎則關門大開心之陽火得以直降于腎心火灼腎燥不能需予用犀角黃連對治其下降之陽光寧為倒

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

乎服之果然即効又用六味地黃丸加犀角服之而肌澤病起矣 沈效曾抄本

胡天叙年五旬素憂飲而多思慮自弱冠後即善病近則兩足及臂常時痺痛甚則肝腎之氣上逆或致暈厥汗出不寐齒痛齦露夜卧陽事暴舉時時夢遺面有油光揩去復仝脈之兩手俱豁大關前尤搏指據症脉乃二陽之病發心脾今已傳為風消矣詢其小便云頗清白令以器貯逾時觀之果變稠漿面結腐皮遂恐甚告以平昔洪飲縱欲勞神數十年來所服桂附純陽之藥不可勝計未知尚能愈否曰幸未至息責但能斷飲絶欲多服養榮之劑尚可為也今病但有春夏而無秋冬非熱清肅之治不可乃與生熟地杞子麥冬沙參地骨知母黃柏黃連石膏出入增減十餘劑諸症漸平唯齒痛轉甚自製玉帶膏貼之而愈次年因診其媳產病告以前方出入常服計用石膏不下四五斤此則初為寒中後為熱中之作變症也然初之桂附未為癰疽豈非天幸乎哉

黃疸

黃疸之病當以十八日為期治之

十日以上重症最多劇為難治

實材治一人遍身皆黃小便赤色而濇灸食實穴五十

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

壯服薑附湯全真丹而愈

沈以潛葛可久俱神醫也一日有老嫗患黃疸詣沈求治曰吾固未知能薦于葛葛延沈飲以針針其左右乳下而與沈飲者頃刻時出欬左針而左半身肉色瑩然欬右針而右半身肉色如左 漱石閒談

張子和治一男子作贅偶病疸善食而瘦四肢不舉面黃無力其婦翁欲棄之其女子不肯曰我已生二子矣更適它乎翁本農者名壻意欲作勞見其病甚每日辱詬人教之餌膽礬丸三稜丸了不關涉針灸祈禳百無一濟張見之不診而療使服涌劑去積痰宿水一斗又以瀉水丸一通經散下四五十行不止命以冰水一盂飲之立止服平胃散等間服梹榔丸五七日黃退力生益脾疸之症濕熱與宿穀相搏故也俗謂之金勞黃

周黃劉三家各有僕病黃疸張曰僕役之職飲食寒熱風暑濕寒尋常觸冒恐難調攝虛費治功其二家留僕于張所從其飲餌一僕不離主人執役三人同服苦散以涌之又服三花神祐丸下之五日之間果二僕愈一僕不愈如其言

一女病黃遍身浮腫面如金色困乏無力不思食餌惟

喜食生物泥煤之屬先以苦劑蒸餅為丸涌痰一椀
又以舟車散通經散下五七行如墨汁更以導引丸
磨散氣不數日肌肉如初
趙君玉病發偏身黃往問醫者醫曰君乃陽明症公等
與麻知幾皆受訓于張戴人是商議喫大黃者難與
論病君玉不悅歸自揣無別病乃取三花神祐丸八
十粒服之不効乃悟曰予之濕熱盛矣此藥尚不能
動以舟車丸濃川散作劑大下一斗糞多結者一夕
黃退君玉由此益信戴人之言
朱丹溪治一婦人年二十八歲發黃脈澀經水自來不

行身體倦怠未曾生子用陳皮白朮木通各一兩黃
芩歸頭丹皮各半兩甘草一錢分作十二帖水煎食
前熱服
一人年二十歲因勞又冒雨得疸症腳痠心悸口苦力
弱尿黃脈浮而數病在表宜解外黃者三錢白朮蒼
朮各一錢陳皮蘇葉木通各五分山梔炒二分甘草
稍些白水煎服下保和十五丸與點抑青一十丸溫
中二十丸而愈
一婦人年三十面黃脚痠弱口苦喜茶月經不勻且多
倦怠用黃芪甘草各三錢人參當歸白芍各一錢木

通陳皮各五分白朮一分炒柏秦艽各二分

一婦人年六十面黃倦甚足痠口苦脈散而大此濕傷氣也白朮半兩陳皮四錢蒼朮木通黃芩各三錢人參川芎各二錢黃柏炒一錢甘草炙五分分六帖水煎食前服

王官人痞後面黃脚痠弱倦怠食飽氣急頭旋黃芪甘草木通各二分白朮一錢半厚朴陳皮蒼朮各一錢黃柏炒三分水煎服

成庚五官面黃脚痠無力食不化脈虛而少弦口苦肚脹宜補之人複木通各三分白朮一錢五分當歸白芍川芎陳皮蒼朮各五分甘草二分水煎下保和丸四十九

孫文垣治一人因冒雨勞力汗出又以冷水澡浴因發熱口渴心與背脹痛小水長而赤舌胎黃不眠目如金皮膚盡黃或謂年高不敢與治診得左脈浮數熱右濡弱濕皆七至濕熱相併此濕熱發黃症也病雖重年雖高猶可為以柴胡三錢太重否酒芩葛根青蒿香薷花粉各一錢人參七分甘草五分連進二劑得微汗即能睡次早熱退其半舌稍淡潤身黃未退胸膈餘熱作煩以竹茹青蒿根各一錢人參麥冬花粉知

母各八分白芍六分二帖熱退食進精神陡長後與補中益氣湯加青蒿麥冬花粉十帖黃瘕愈

一人患酒疸遍身皆黃尿如柏汁目如金汗出沾衣如染胸膈痞悶口不知味四肢痠軟脉濡而數以四苓散加厚朴陳皮山查麥芽葛根倍青蒿水煎臨服加萱草根自然汁一小杯四帖瘕愈

一人病後身面俱黃吐血成盆（熱鬱陽明）諸藥不効用螺十个水漂去泥擣爛露一夜五更取清服二三次血止黃愈（小山怪症方本草綱目）

外臺秘要治三十六黃急捄方用雞子一顆連殼燒灰研酢一合和之溫服鼻中蟲出為効身體黃者不過三枚神効

柴嶼青治覺羅諱瑪德夫人病疸醫投茵蔯五苓散未効又合末藥服之肌膚白眼皆如金色轉致不思飲食右關緩弱特甚柴曰胃為水穀之海脾為倉廩之官府藏失職濕熱滋甚今惟有調其脾胃土能健運濕熱自去不必治疸而疸自愈矣用六君子湯加厚朴炮薑以溫中神麴麥芽以助戊已之化不數劑而全愈

東坦曰戊申春一婦人六十歲病振寒戰慄（太陽寒水客也）呵

欠噴嚏（足少陽溢也）口乏津液（足陽明不足也）心下急痛而痞（手少陰受寒也故急痛足太陰血滯為痞）身熱近火（熱在皮表寒在骨髓以拒寒戰慄也）膕下惡寒（丹田有寒也）渾身黃而白睛黃（寒濕也以餘症推之知其寒也）溺黃赤而黑頗數（寒濕勝也）自病來身重如山便著床枕（至陰濕盛也）其脈診得左右關并尺命門中得弦而急極細濇之以洪而極緩（弦急為寒加之以細細者北方寒水濇以緩甚者濕勝出黃色也又洪大者心火受制也）左滑按之至骨舉止來實者（壬癸俱旺也）六脈按之俱空虛者（下焦無陽也）先以輕劑去其中焦寒濕蒸退其洪大脈理中湯加茯苓是也水煎冰之令寒服之謂之熱因寒用假寒以對足太陽之假熱也以乾薑之辛熱以瀉真寒也故曰真對真假對假若不愈當以求附湯冰之令寒以補下焦元氣也（試效方醫說續編）

陸祖愚治潘巨源食量頗高恣肆大嚼因勞役失飢傷飽每患脾胃之症或嘔或瀉恬不介意後成黃疸用茵蔯五苓散治之而疸仍前飲食不節疸症復作人傳一方以苦藥葫蘆盧酒煮服之即效試之果然仍力疾生理後試之至再至三周身熏黃肚腹如鼓而卒

薛立齋治大司徒李蒲汀南吏部少宰時患黃疸當用淡滲之劑公尚無嗣猶豫不決曰有是病而用是藥以茵蔯五苓散加苓連山卮二劑而愈至辛卯得子

應天王治中遍身發黃妄言如狂苦于胸痛手不可近此中焦畜血為患用桃仁承氣湯一劑下瘀血而愈

又太守朱陽山弟下部畜血發狂用抵當湯而愈

馬元儀治沈王格患疸症一身及面目悉黃微見黑滯煩渴腹滿脈之左弦數右空大此內傷發黃為厥陰肝木太陰脾土二藏交傷之候也夫肝鬱則生熱脾鬱則生濕濕熱交爭而煩渴腹滿發黃之症生矣至黑色兼見于面則并傷其腎汗之下之非其治也宜平肝之亢扶土之虛兼解鬱熱以清氣道除濕蒸而和中氣用人參三錢白朮二錢白芍一錢黃連山卮

七分歸身丹皮茵蔯各一錢柴胡七分炙艸五分半麴一錢服三十劑而疸

顧奉常務遠目黃脾氣弱仲淳疏方用茵蔯三錢人參三錢薏仁三錢蓮肉焙三錢木通八分黃連酒炒一錢山梔炒八分白朮土炒一錢石解酒蒸三錢皆治疸之劑以事冗未服既而身目皆黃小便亦赤乃服仲淳先見飲前藥稍愈一按摩者投以草汁藥酒脾敗遂不起臨沒下瘀血數升亦畜血症也以其年邁不絕慾故尒前方尚有茯苓二錢

施靈修乃兄七年前曾患疸症服草藥愈後復發坐多

氣多勞故草藥不効服田螺發脹一日夜大作寒熱因發渴小便如油眼目黃且赤手足黃紫仲淳以關血發黃服後藥大小便通黃及渴俱減橘紅一錢五分紅麴炒研二錢山查五錢鬱金汁十五匙薏苡六錢木瓜三錢牛膝五錢五分麥冬五錢車前二錢五分赤苓三錢通草五分白芍酒炒四錢竹茹二錢河水二鍾煎八分飢時服三日後加人葍三錢 全上

徐環嶽年三十餘病疸服山卮茵蔯五苓六一之劑將兩月不効脉之弦細而駛面目爪甲俱淡黃語言遲倦謂之曰君以黃疸求治此其餘症耳今病成勞損矣乃竦然曰誠有之近來夜卧不寧晚即發熱黎明始退咳嗽痰稀胃脘疼痛然治之當柰何曰病緣陰虛火盛肝熱又鬱移其所勝故食少便溏發為黃症與酒穀諸疸為濕熱重蒸者不同乃服苦寒滲利重傷其陰至成勞損今宜峻養肝腎俾嗽止熱退食進便調而黃自消矣與集靈膏加減十餘劑諸症漸瘳黃亦愈矣

金魯瞻年四十餘館于時醫湯靜公宅病疸諸治不効已歷數醫踵後一人與草頭方四味中有六月雪餘忘之矣服之增劇脉之軟弱無神畧數外症目黃如

橘面額則黃而黑黯腹大臍凸便溏食少動則氣促知為脾腎兩虧近乎女勞一症乃疸中最難治者也與熟地山藥各一兩杞子棗仁米仁各五錢彼疑太補持以問湯湯老醫也謂曰方極是第吾輩素不用此姑試之一劑減二劑又減再診脈漸起仍前方八劑全愈

朱天一年二十餘喜食糖及燥炙糕餅忽發黃面目如金脈之兩關數實有力尺滑大便六七日不行小便黃澀此敦阜太過燥熱所鬱如素甕覆火其色必黃非濕症也與小承氣湯加當歸白芍一劑便行而瘥

赤丹

又名風癗又名赤游風又名赤癗

孫思邈曰貞觀七年三月予在內江縣飲多至夜覺四體骨肉疼痛至曉頭痛額角有丹如彈丸腫痛至午通腫目不能開經日幾斃予思本草芸薹治風遊丹腫遂取葉擣搏隨手即消其驗如神亦可擣汁服之更妙（一云無葉用子研代之本草）

張子和治黃氏小兒面赤腫兩目不開以鈹鍼刺輕砭之除兩目火外亂刺數十針出血乃愈此法人多不肎從必欲治病不可不謹護

朱丹溪治一中年男子癰潰後發熱乾嘔背發丹熛用諸般敷貼丹熛藥及用刀于个个丹頭出血皆不退後以半陳即二陳也生薑加補劑治嘔不効遂純用參半兩歸朮各一錢五分濃煎一帖嘔止二三帖丹漸緩熱漸減約五十餘帖熱始除神氣方復

鮑允中年五十歲風丹痒甚腹微痛咽不利面身微腫五六日不退兩寸脈滑大實右浮大左浮弦小以炒苓炒連四物桔草泰粘甘葳各一錢防風黃芪各半錢凡五六帖而安

黃師文治一婦人苦風丹每酒沾脣則風丹重迭而起痒剌骨殆不可活令服五積散約數服以杯酒試之如其言飲酒已丹不作德昭一婢亦苦風丹亦似此聞其說遂服五積散亦瘥又師文用五積散治産瀉有奇功

薛立齋治一婦人素清苦因鬱怒患游風晡熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥此鬱氣傷脾乃以歸脾湯數劑諸症稍退後兼逍遥散五十餘劑而愈

一婦人患此性躁寒熱口苦脇痛耳鳴腹脹溷濇乃肝脾血虛火旺也用六君加柴胡山卮龍膽數劑更與逍遥散兼服漸愈又與六味丸逍遥散七十餘劑諸

症悉退

一婦人患前症誤用大麻風藥破而出水煩渴頭暈誠類風症六脈洪數心脾為甚曰風自火出此因怒火脾胃受邪血燥而作非真風症也與逍遥散六味丸以清肝火滋脾血生腎水而愈

一婦人患前症久不愈食少體倦此肝皮虧損陰虛發熱也先用補中益氣湯加川芎炒卮元氣漸復更以逍遥散而瘡漸愈

一婦人患赤游風晡熱痒甚用清肝養血之劑不信乃服大麻風藥臂痛筋攣又服化痰順氣之劑四肢瘓弱又一婦患前症數用風藥煎湯泡洗致腹脹並殁

一女子十五歲患瘡遍身發赤暈形氣倦怠此肝火血虛所致用加味逍遥散而赤暈愈用益氣湯六味地黄丸而瘡癒消

一婦人身如丹毒搔破膿水淋漓熱渴頭暈日晡益甚用加味逍遥散而愈

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

續名醫類案卷十二

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷十三

錢塘魏之琇玉横撰

癥瘕

陳自明治毘陵一貴宦妻患小便不通臍腹脹痛不可忍衆醫皆作淋治如八正散之類俱不得通陳診之曰此血瘕也非暝眩藥不可去與桃仁煎更初服至日午大痛不可忍遂臥少頃下血塊如拳者數枚小便如黑豆汁一二升痛止得愈此藥治病的切然猛

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

烈太峻氣虛血弱者宜斟酌之桃仁大黃朴硝各一
兩虻蟲半兩炒黑共為末醋煉丸梧子大五更初溫
酒吞下五丸原注此方不可妄用良方
杜壬治尚書媳婦馬氏年三十二腹中血塊作疼經五
六年形已骨立衆皆曰不可為柰其未死何家甚貧
而大小慇之一日召杜至告杜曰但以濟物為懷則
可業已請召明公非所言也遂以少物帛贈杜杜不
受曰但服某藥必獲安無以為疑遂示方用沒藥牛
膝乾漆當歸各半兩硇砂木香水蛭炒紅娘子炒紅
花丹皮硃砂各一分海馬一个斑猫去翅足炒十四
个為末酒醋各半升熬為膏每日天明用一皂子大
酒醋化下一月病退六十日漸安
陳藏器曰昔有患瘧癖者夢人教每日食大蒜三顆初
食遂致瞑眩吐逆下部如火後有人教取數瓣合皮
截却兩頭吞之名曰肉灸果獲大効本草綱目
張子和治汴梁曾大使女年既笄病血瘕數年太醫宜
企賢以破血等藥治之不愈企賢曰除得陳州張戴
人方愈一日戴人至汴京曾乃邀問焉戴人曰小腸
遺熱于大腸為伏瘕故結硬如塊面黃不月乃用涌
泄之法數年之疾不再旬而效

柴嶼青乾隆己未寓潘陽京兆署兵房吏王某患癥疾教以蒸臍法治之無服加減五積散而愈其妻毋同患是症王即照方遺之亦痊

孫文垣治汪氏婦經水久不止內有紫黑血塊胃脘腹皆痛玉戶且腫手足皆冷不知飢餓腹下有一塊堅如石脈左數右沈證此血瘕症用糖球子五錢元胡索五靈脂香附麥芽青皮各一錢水煎服痛減半手足漸溫加當歸丹參蒲黃益母川芎四帖痛止玉戶亦消又四帖而經水調

永康應童嬰腹疾恒病婁行久不伸松陽周漢卿解裳視之氣衝起腹間者二其大如辟漢卿刺其一瞤然鳴又刺其一亦如之稍按摩之氣即盡解而平趨無留行焉 續文粹

張子和治一童子入門狀如鞠躬而行張曰此瘧氣也令解衣揣之二道如臂其家求療先刺其左如刺重紙剝然有聲而斷令按摩之立軟其右亦然觀者嗟異或問之曰石關穴也

武叔卿曰夫瘧癖癥瘕血氣塊硬發歇刺痛甚則欲死究而言之皆血之所為僕嘗治一婦人血氣刺痛極不可忍甚而死一二日方省醫巫併治數年不愈僕

以葱白散烏雞丸遂安

陳良甫治一婦人血氣作楚如一小盤樣走注刺痛要一人扶定方少止亦用此二藥而愈尋常小小血氣用此二藥亦有奇功（濟陰綱目方在疝癖門內）

陳宜人病血氣作楚痛不可忍服諸藥無効召診之兩關脈弱沈為肝脉沈差緊此血氣漸成疝癖也只以前二方治之而愈又四明馬朝奉後院亦病此用二方治之亦愈（全上）

宋孝武路太后病衆醫不識徐文伯診之曰此石博小腸耳乃為水劑消石湯病即愈（南史此即石瘕病也）

董舍妾腹內生一瘕始如彈丸五六年後大類鵝卵中似有一窟往來動移或痛或止百藥罔効久之復遍體發腫內作水聲日夕呻吟死而復甦者再諸醫束手無策皆云此名水鼓病已成不可復瘥矣章文學旭字東生名醫也善治奇疾邀之曰此非水症乃積聚所致不半日可愈但所用藥性猛利轉鬥而下驅水甚捷試問病人願服與否病者曰我已垂殆苟一綫可抶死無憾也於是取紅丸十粒如菜豆大以柹椰柹實等五六味煎湯下之初覺喉中響聲可畏勢將不支頃之胸膈間如刀刃亂刺哀號轉擲痛不可狀

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

又頃之下水斗許頭面腫退不逾時又下數升腹背腫退病人曰我今覺胸背頓寬遂熟睡片刻時章君猶在坐也曰此番不獨水去痞亦當漸散矣留補劑二日明後日可連服之遂辭去至晚又下水四五升手足腫全退不三日病全愈既而忽痞勢搖動下紅黑痢三晝夜痞亦不見衆醫驚服往叩其故章笑曰此名腸覃在內經水脹論中君輩自坐不讀書耳皆寒氣客於腸外與胃氣相搏癖而慚而退按岐伯曰寒氣相搏癖而內著瘕肉乃生始如雞卵至其成若懷子之狀按之則堅推之則移月事以時下（腸覃生于腸外故也）又有一種名石瘕生于（脫中故也）皆婦人之疾因內有積聚可導而下似水脹而非水脹也（臨症之工大宜分別）此疾若非章君又作泉下之鬼矣是信名醫之不謬哉（今人能感激如是者鮮矣）

一男子腸鳴食少臍下有塊耕動若得下氣多乃已已則復鳴屢用疎氣降火藥半年不愈乃以理中湯為君佐芩連枳實一服腸鳴止又每服吞厚朴紅豆蔻丸其氣耕亦平矣

薛立齋治一婦月經不調兩拘腫脹小便澀滯腹中一塊作痛或上攻脇腹或下攻小腹發熱晡熱惡寒肌

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

膚消瘦飲食無味殊類瘵症久而不愈此肝脾血氣虧損用八珍湯逍遙散歸脾湯隨症互服而瘥愈

一婦人性多鬱怒勤于女工小腹內結一塊或作痛或痞悶月經不調恪服伐肝之劑（今人受此害者尤多）內熱寒熱胃膈不利飲食不甘形體日瘦牙齦蝕爛此脾土不能生肺金肺金不能生腎水腎水不能生肝木當滋化源用補中益氣六味地黃至仲春而愈（必舉仲春者以肝木司令時也）

松江太守何恭人性善怒腹結一塊年餘上腭蝕透血氣虛極時季冬肝脈洪數按之弦緊餘脈微弱或用伐肝木清胃火之藥薛曰真氣虛而邪氣實也恐伐肝木至春不能發生耳用八珍湯以生氣血用地黃丸以滋腎水肝脈頓退因大怒耳內出血肝脈仍大煩熱作渴此無根之火也仍以前藥加肉桂二劑脈即飲而熱退復因大怒鼎然卒于季冬之辛巳日是乃金尅於木之故也

一婦人耳下腫赤寒熱口苦月經不調小腹內一塊此肝火氣滯而血凝也用小柴胡加山甲川芎丹皮治之諸症悉皆退除

潤州某公補劑中多用敗龜版垂十年頗健晚患蠱脹

乃謁白飛霞飛霞診視良久曰此瘕也公豈餌龜版藥耶今滿腹皆龜吾藥能逐之其骨節縫理者非吾藥所能也乃與赤丸數粒服之下龜如菽大者升餘得稍寬不數月死易簀時驗小遺悉有細蟲彷彿龜形物得氣而傳如此可不慎哉 周櫟園書影

黃山畢公服溫胞臍初頗有驗久之得沙淋疾沙皆作犬形頭尾畧具 仝上

陳自明治一婦人腹內結塊久而不消與神仙追毒丸一粒服下而疾即瘥 方見蠱門

陳自明云予族子婦病腹中有大塊如杯每痛不可忍時予婦已貴京下善醫者悉常服有藥莫愈予應之曰此血瘕也投黑神丸盡三丸塊氣盡消終身不患其復作且病痊神氣亦即歸原 良方 醫說續編

孫俟居比部病腹中若有癥瘕不食不眠煩懣身熱仲淳投以人參白苓茯苓麥冬木通棗仁石斛方甫具史鶴亭太史至見方中有大劑人參駭曰向因投參至劇此得無謬乎仲淳曰病勢先後不同當時邪未退滯未消故不宜令病久飽脹煩懣者氣不歸元也不食者脾元虛也不眠而煩者內熱津液少也今宜亟用此藥矣四劑而瘳後復病仲淳診之曰此陰虛

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

也非前症矣更以麥冬白芍枸杞五味生地車前各等分煎服而熱遂退即占痊愈 廣筆記

立齋治黃恭人腹內一塊不時作痛痛則人事不知良久方蘇諸藥不應診其脈沈細則非瘡毒河間云失笑散 五靈脂蒲黃炒等分為末醋湯調每服二錢 治疝氣及婦人血氣痛欲死並効與一服痛去六七再服而疼即平此藥如治產後心腹絞痛及兒枕痛尤為神妙

錢國賓治陳小山妻年三十二乂瘡成形狀如鯽魚長五寸濶寸許頭尾口牙悉具漸漸游行穿腸透膜上近喉邊下近穀道飲血咬肝聲呼痛楚形神狼狽其脈弦牢尚有胃氣可治先以古方五味紫金錠磨服止痛次以蝦刀豆殼一兩為君以此豆能殺瘡也乳香沒藥定痛活血射香通竅木香順氣調以砂糖作餌瘡受毒藥旬日內伏不動月餘而化便出如蜆肉一塊以四物加參朮枸杞香附調理百日全安

瘡

張文潛藥戒云張子病瘡積于中者伏而不能下自外至者捍而不能納從醫而問之曰非下之不可歸而飲其藥既飲而暴下不終日而向之伏者散而無餘

向之捍者柔而不支焦膈導達呼吸開利快然若未
有疾者不數日痞復作投以故藥其快然也亦如初
自是逾月而痞五作五下每下輒愈然張子之氣一
語而三引體不勞而汗股不步而慄膚革無所耗於
外而其中爾然莫知其所來聞楚之南有良醫焉往
而問之醫歎曰子無歎是爾然者也天下之理其甚
快于余心者其末必有傷求無傷于終者則初無望
快于吾心痞橫乎胷中其累大矣擊而去之不須臾
而除甚大之累和平之物不能為也必將擊搏震撓
而後可其功未成而和氣已病則子之痞凡一快者

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

子之和一傷矣不終月而快者五則和平之氣不既
索乎且將去子之痞而無害于和乎子歸燕居三月
而後予之藥可為也張子歸三月而復請之醫曰子
之氣少全矣取藥而授之曰服之三日而疾少平又
三日而少康終年而復常且飲藥不得亟進張子歸
而行其說其初使人懣然遑之蓋三投其藥而三反
之也然曰不見其所攻又較則月異而時不同蓋終
歲而疾卒然脫體安痊復初 容齋五筆

張子和治息城司候聞父死于賊大悲哭之罷便覺心
痛日增不已月餘成塊狀若覆杯大痛不住藥皆無

功議用熸針灶艾病人惡之乃求于張張至適亞者在其旁乃學亞者襍以狂言以謔病者至是大笑不忍回面向壁一二日心下結塊皆散張曰內經言憂則氣結喜則百脉舒和又云喜勝悲內經自有此法治之不知何用針灸哉適足增其痛苦耳

劉子平妻腹中有塊如瓢十八年矣經水斷絶諸法無措張令一月之內涌四次下六次所去痰約一二桶其中不化之物有如葵菜者爛魚腸之狀涌時以木如意揃之覺病積如刮漸漸而平及積之盡塊痕反窪如臼畧無所損至是面童色經水既行若當年少

可以有子

張主簿妻病肥氣初如酒杯大發寒熱十五餘年後因性急悲感病益甚惟心下三指許無病滿腹如石片不能坐卧針灸亞徒勞力耳張曰此肥氣也得之季夏戊巳日在左脅下如覆杯久不愈令人發瘧瘧者寒熱也以瓜蒂散吐之魚腥黃涎約一二缶至夜繼用丹車丸通經散投之五更黃涎膿水相半五六行凡有積處皆覺痛後用白朮散當歸散和血流經之藥如斯涌泄凡三四次方愈

山東顏先生有積二十年目視物不真細字不覩當心

如頑石每發痛不可忍食減肉消黑黔滿面腰不能
直因遇張令涌寒痰一大盆如片粉夜以舟車丸通
經散下爛魚腸葵菜汁七八行病十去三四以熱漿
粥投之復去痰一盆次日又以舟車丸通經散前後
約一百餘行畧無所困不五六日面紅黔去食進目
明心空曠遂失頑石所在旬日外來謝
杜弓匠子婦年三十有孕已歲半矣每發痛則召侍媪
待之以為將產也一二日復故凡數次張診其脈澀
而小斷之曰塊病也非孕也脈訣所謂澀脈如刀刮
竹形主丈夫傷精女人敗血治法有病當泄之先以

舟車丸百餘粒後以調胃承氣湯加當歸桃仁用河
水煎乘熱投之三兩日又以舟車丸桃仁承氣湯瀉
黃膿血穢然而下每更衣以手向下推之揉之則出
後三二日又用舟車丸以豬腎散佐之一二日又以
舟車丸通經散如前數服病去十九俟晴明當未食
時以針瀉三陰交穴不再旬症已全消而愈矣
孫主簿季述之母患胸中痞急不得喘息按之則痛脈
數且澀曰胸痺也因與仲景三物小陷胸湯一劑和
二劑諸苦頓失即占痊愈醫學綱目
龔子才治吳仰泉室年五旬患腹中積塊如盤大年餘

漸卧不倒腹響如雷噯氣不透口乾吐白沫下氣通則少寬五心煩熱不思飲食肌瘦如柴屢治無効診之六脈濇數氣口緊盛知為寒凉尅伐之過使真氣不運而瘀血不行與八珍湯加半夏陳皮木香厚朴萊菔子大腹皮海金沙三劑小便下血如雞肝狀至十二劑下黑血塊盆許腹中仍有數塊原以八珍湯加枳實香附五劑而愈

一婦人年近三十患腹左有一大塊堅硬如石有時作痛肚腹膨脹經水不調白帶頻下夜熱脈急數以千金化鐵丸一料塊消脹除經調帶止且即孕生一女

予矣此方疑龔杜撰四物之外一派破血行氣而已矣壽世保元

李河山患腹左一塊數年不愈後食柿餅過多腹脹滿悶診之六脈洪數氣口緊盛以藿香正氣散加山查神麴二劑而愈逾月又因飲食失節腹脹如初用前藥勿効與行濕補氣養血湯二十餘劑始安因囑曰病雖愈體未復元務宜謹守勿犯禁忌後數月過龔曰凡有病皆天與也不在服藥謹守若顛子亞聖豈不能保養何短命死矣我今保養半年未見何如從可知也龔不能對遂復恣縱無忌未旬日忽患痢赤白裡急後重痛不可忍日夜無度乃自制大黃一劑

數下弗効復求診六脈洪數先與調中益氣湯二劑
又以補中益氣湯加白芍黃連微効彼欲速愈易醫
不審其素有痞滿之病復下之不愈又易一醫再與
下藥遂疰門下脫痛如刀割腹脹如鼓此元氣下陷
也當大補升提而反瀉之不亡何待

陸養愚治茅鹿門三夫人經期參前腹中有塊升動有
時作痛作脹大便不實脾胃不和其脈人迎大于氣
口二倍（以此斷為血有餘）茅問曰此症屢服消導及養血之
藥輕則枳實枳殼木香豆仁重則梹榔稜莪俱以養
血佐之藥頗中和而病反增劇何也曰據脈左盛於

右氣不足而血有餘今所服不惟誅伐無過且損不
足而益有餘欲其病之不劇得乎用人參白朮陳皮
乾薑大棗以益其氣用消痞丸以去其血之瘀其方
用香附醋炒四兩元胡索醋炒一兩五錢歸尾二兩
川芎紅花桃仁海石瓦楞子火煅醋淬各一兩醋打
麵糊為丸與煎劑相間服未半料而塊已失大便結
實經水如期諸疾悉去而痞復若舊矣

李士材治于郡守在白下時每酒後腹痛漸至堅硬得
食輒痛（得食反痛實症無疑）脈之浮大而長脾有大積矣然兩
尺按之軟不可峻攻令服四君子湯七日投以自製

攻積丸三錢但微下更以四錢服之下積十餘次皆黑而穢者察其形不倦又進四錢于是腹大痛而所下甚多服四君子湯十日又進丸藥四錢去積三次又進二錢而積下遂至六七桶許脉大而虛按至關部窘如矣乃以補中益氣調補一月全愈攻補互施法

王工部鬱成痞形堅而痛甚攻下太多遂泄瀉不止一晝夜計下二百餘次一月之間肌體骨立神氣昏亂舌不能言已治木待斃李診之曰在症雖無活理在脉猶有生機以真臟脉不見也大虛之候法當大溫大補一面用枯礬龍骨粟殼樗根之類以固其腸一面用人葍二兩熟附五錢以救其氣三日之間服葍半斤進附二兩瀉遂減半舌轉能言更以補中益氣加生附子乾薑併五帖為一劑一日飲盡就進藥而論則胃能納受可知如是者一百日精旺食進瀉減十九然每日夜猶下四五行兩足痿廢用仙茅巴戟丁附等為丸葍附湯並進計一百四十日而步履如常痞瀉悉愈

姚氏婦又患痞積兩年之間攻擊之劑無遺用矣而積未盡除形體厄羸李曰積消其半不可伐矣但用補劑元氣一復病自祛耳遂作補丸服畢而痞果全消踰三年調理失宜胸腹痛甚醫以痛無補法用理氣

化痰之劑痛不減脈之大而無力此氣虛也投以歸脾湯加人蔘二錢其痛立止痞亦痊除（治法與吳孚先一案同）

喻嘉言治袁聚東年二十歲生瘡塊卧床數月日進化堅削磨之藥漸至毛瘁肉脫面黧髮卷殊無生理其塊自少腹膀旁分為三歧皆硬如石按之痛不可忍脈只兩尺洪盛餘俱微細謂初時塊必不堅以峻猛之藥攻至真氣內亂轉護邪氣為害其實全是空氣聚成非如女子月經凝而不行即成血塊之比觀兩尺洪盛明是腎氣傳于膀胱誤施攻擊其氣不運結為堅塊故按之則愈痛也（虛痞亦有按之而痛者）姑用補中藥一劑以通中下之氣然後用大劑藥內收腎散外散膀胱之氣約三劑可全愈矣先以理中湯加附子五分一劑塊減十之三再用桂附一大劑腸中氣響甚喧頃之三塊一時頓沒再服一劑果全愈更用補腎藥加桂附多用河車為丸以善於後

馮楚瞻治戚氏婦腹中有塊作痛發則攻心欲死上則不進飲食下則泄瀉無度醫藥三百餘劑不効脈之六部沈細已極右關尺似有似無明係火衰土弱腎家虛氣上凌于心脾土不能按納奔豚之氣非溫補不可用炒乾熟地八錢補水以滋土炒黃白朮六錢

補土以固中炮薑熟附各二錢補火以生土更入五味子一錢以斂之俾祖氣有歸臟得其藏而胃乃納而不出也數劑而安一月全愈

琇按馮公此案發前人所未發字字如良玉精金後賢宜三復之

吳孚先治一人患痞前醫用攻藥已去六七適前醫他往吳與湯丸俱係參朮補劑病者云去疾莫如盡柰何而留之吳曰正所以盡去其疾也經曰大積大聚衰其半而止此前醫之用攻也又曰補正則邪自除此余之用補也若必盡攻則痞去而鼓脹成是欲盡

去其疾而反益其疾矣乃遵服不閒而諸症漸即痊愈矣（此症可與李士材所治於姚氏婦之案內互相參視）

張路玉曰顧晉封室患痞在脇下或令用膏藥加阿魏一分麝香半分貼之五六日間遂下鮮血血塊甚多二三日方止是後每歲當貼膏時必發近隣嫗亦用阿魏膏貼痞下血如前世以阿魏麝香為痞塊必用之藥外用為患若此況服食乎因為拈出以為虛人湯用攻擊之戒

韓貽豐治昝中翰如頴病數月二旬不食矣已治木韓視之氣色如灰聲低喉澀瞳神黯然無光私語其子

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

曰此疾甚難治矣使病者覺之乃哀泣而懇曰吾年今已六十又矣即死亦不為夭但遇神針不為我一灸而斃死不瞑目我生平好酒而不好色幸乞為我一鍼乎是乃勉為用鍼令卧床坦腹拊其臍下有一痞周圍徑七寸堅硬若石乃以梅花針法重重針之又針其三腕再鍼其百勞百會每皆二十一針鍼畢令飲醞酒一杯乃搖其手曰惡聞酒之氣味已及兩月之又強勉而飲初則攢眉既則滿飲如初細按敘致甚佳楊乘六治朱氏婦病胸膈痞悶羞寒熱往来口乾作渴飲食不進服寬利清解藥益甚脈之右關弦數而沈

面色帶紅舌乾微黃乃與益陰地黃湯或曰胸滿不食累月矣二陳枳殼尚不能通地黃山藥五味萸肉俱酸濇陰滯之物其可投乎曰此症本因肝胆燥火閉伏胃中其原則由于腎水之不足蓋腎者胃之關也水不足則火旺熏蒸而胃陰虧胃與肝膽相並且為其所勝又腎既不足則肝膽之水無水以養而燥火獨熾于是乘其所勝之虛而入之且冲于上則口乾咽燥流于下則二便秘結塞于中則為胸膈痞悶故服香燥徒令陰益虧而痞益甚耳第服此則腎水旺而胃陰生火自清痞自除胃自開也一服次早即

進粥椀許胸次爽然連服四劑寒熱悉退高愈
瑣按是症先由腎水不足不能滋肝木燥生火上
逆胃絡而衝咽故口乾胸滿不能食膽附肝葉為
府藏病府亦病故寒熱往來誤服香燥則愈損其
陰多成勞膈之症唯峻養肝腎其病立愈楊君治
法甚當而言不達意雖加刪節尤覺強拖沓如此
陸肯愚治梅先之年二十五右脇間患一塊用稜莪等
峻攻年餘遂飲食半減且飧泄潮熱盜汗而塊反日
大脈之左浮而數右沈而弦曰浮數者血虛有火也
應熱與汗沈弦者木氣乘脾也應泄與塊先之欲急
去其塊曰塊又未嘗為患因峻攻正氣致虛邪氣反
盛今宜先培元氣俟泄止汗收食進次養血以退熱
血氣既充後議消導若攻補兼施未必獲效至純用
攻伐必無幸矣用參者苓朮棗仁炙甘豆仁木香白
芍薑棗數劑瀉減胃開二十劑大便亦實盜汗潮熱
已減改用清氣養榮湯加人參白朮之半二十劑後
間投消痞丸三月而塊始消大半遂與純養氣血之
劑半年載之又方得全瘳所謂大積大聚衰其半而止也
費臺簡母年五十餘因多產欠調而善病今患胸膈痞
滿飲食少思心下有塊如桃按之微痛頭面四肢浮

腫痰出稠粘所喜不發熱不作泄夜卧常安小水猶利耳其脈左手浮弦而關更甚右手沈細而關則帶滑此肝木有餘脾血不足之候也與疎肝助胃調氣養血則火降鬱開而痰自消矣用調氣養榮湯加陳皮前胡佐茯苓消痰止嗽青皮香附佐豆仁白芍疎肝寬膈總之氣得川流則血自津潤數劑後用潤字丸間服每次五分十日症通輕減改用六君子加養血調氣之藥蓋邪之所湊其氣必虛壯者氣行則愈弱者即著而成病也後須以純補之藥間用調氣治嗽之品五旬始痊

陳三農治一少年體薄弱且咳血左邊一塊不時上攻作痛左金蘆薈俱不應診其脉三部雖平而細濇不流利因作陰虛治四物加知柏元參丹皮鱉甲數劑服下頓占痊愈

盧絳中去聲痞疾忽夢一白衣婦人謂之曰如食蕨即安愈詰朝見鬻蕨絳揣囊中且之一錙惟有唐山一冊遂詣易之曰吾乃負販者將安用此哀君欲之遂貽數梃絳喜而食之至旦痞患悉愈 野史

琇按本草蕨能治蚘蚘能令人痞脹盧病治是蚘作楚耳故食蕨而疾即愈

張子和治顯慶寺應公有沈積數年雖不卧床枕每于四更後心頭悶硬不能安卧須起行寺中習以為常人莫知為何病以藥請于張張令涌出膠涎一二升如黑礬水繼出綠水又下膿血數升自尒胸中如失因出飲餌無算安眠至曉

朱丹溪治一婦小腹中有塊其脈濇服攻藥後脈見大以四物湯倍白朮陳皮甘草為佐俟脈充實間與硝石丸服至兩月腹塊消盡而瘥 先補後消法

至正二十五年夏六月里人周伯安病積氣右脇下喘且脹者五閱月醫來類補以温熱之劑病日劇幾殆吳陸君祥往視之曰是息賁也法當大下內經所謂留者攻之土欝奪之者也積氣賁門大邪未去其可補乎從之不終日而愈 強齋集 以上三案俱醫說續編

汪石山治一人年逾三十形瘦蒼白病食則胸膈痞悶汗多手肘汗出尤甚多四肢倦怠或麻晚食若遲來早必泄初取其脈浮軟近駃兩脈洪乃略大曰此脾虛不足也彼曰嘗服參朮膏胸膈亦覺痞悶恐病不宜于補者曰膏則稠粘難以行散故也改用湯劑痞或愈乎用補者各二錢白朮錢半歸身八分枳實甘草各五分麥冬二錢煎服一貼上覺胸痞下覺失氣

彼疑參者使然曰非也若參者使然則當胸痞不當失氣恐由脾胃過虛莫當枳朴之耗也（前藥中無厚朴疑失叙）宜除枳朴加陳皮六分再服一帖頓覺胸痞寬失氣除精神爽塏脈皆軟緩不大亦不駛矣可見脾胃虛者枳朴須散用為佐使況有參者歸朮為之君尚不復不食如此自分必死仍用前藥數劑而即痊安

錢國賓治王元直父腹左一痞形如鏡大視之乃鏡痞也生于皮肉上可治以三品膏巴豆草麻子肉各四兩杏仁一兩黃丹八兩香油一斤二兩熬膏藥貼二十日一日一換出膿一二椀內服參者托裏月餘收口而愈

蔣仲芳治陳氏婦年二十六歲生癖堀已十年在臍上月事先期夜則五心發熱火嘈膨悶忽一日癖作聲上行至心下則悶痛欲絕為針上脘癖下而痛定然臍旁動氣不息復針天樞穴動氣少止遂用當歸五錢白芍白朮延胡丹皮川芎條芩各一錢枳實官桂檳榔木香各三分醋炙鱉甲二錢水煎空心服至三

十劑而愈

聶久吾治劉氏妹稟氣怯弱性情沈鬱年三十病晚間發熱天明復止飲食少進煩躁不安肉削骨露醫藥不効診其脈歇至因其躁煩發熱頗用芩連知柏等涼劑雖無効亦不覺寒涼第恐多服傷胃則無生機矣因細問其熱從何處起云自右脅一團先熱遂致遍身乃悟此必氣鬱痰結而成痞堀胸膈壅滯遂燥熱氣結而脈亦結此脈與症合不足憂也當先攻痞以除其根則諸症自愈因用磨痞丸每日服三次服至三四兩而堀痞消半熱漸退至七八兩堀熱盡除不數月全安矣當其痰凝氣滯痞結右脇不惟醫者不知而病者亦不覺也非詧其病根而拔去之何能取効耶三棱莪朮皆醋炒花粉大黃酒炒製香附各八錢檳榔黃連姜汁炒黃芩酒炒枳實炒貝母連翹各六錢山巵前胡青皮醋炒延胡索各五錢廣皮四錢南木香二錢鬱金三錢為末先用竹瀝洒潤次用粘米粉攪硬糊丸菉豆大每服一百丸

按此案與痰門陸養愚治董潯陽夫人脈症俱同而方異大凡陸案乃剽襲耳今以此按入痞門者俾知

續名醫類案卷十三

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷十四

錢塘魏之琇玉橫撰

國立國會圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

鬱

實材治一人年十五歲因大憂大惱却轉脾虛庸醫所用五苓散及青皮枳殼等藥遂致飲食不進胸中作悶乃命灸命關二百壯灸關元五百壯服薑附湯一二劑又服金液丹二斤方愈方書混作勞損治之用溫平小藥誤人不少悲夫

一人功名不遂神思不樂飲食漸少日夜昏默已半年矣諸治不效此病藥不能治令灸巨闕百壯闕元二百壯病即滅十壹其半又令服醋酒一日三度一月全安（原注失志不遂者之病非能排遣其性情不可散以灸法操其要酔其酒以陶其情此法之妙極矣）

張子和治項鬬令之妻病飢不欲食物惟常好叫呼怒罵欲殺左右惡言不輟衆醫診治半載無效張視之曰此難以藥治取功乃使二娼各塗丹粉作花伶人之狀其婦大笑次日又令作角觝又復大笑其旁常令兩个能食之婦誇其食味之美其婦亦索其食而為一嘗之不數日怒減食增不藥而瘥矣後得一子

夫醫貴有才識苟無才識何得應變而無窮乎

羅太無治一病者黃瘦倦怠詢其病因乃蜀人出家時其母在堂及遊浙右經七年忽一日念母之心不可遏欲歸無腰纏徒仝朝夕望西而泣以得是病時僧二十五歲羅令其隔壁泊宿每日以牛肉猪肚甘肥等煮糜爛與之（太監替和尚開葷）凡經半月餘且時慰諭之又曰我與鈔十錠作路費我不望報但欲拔汝之死命耳察其形稍甦與桃仁承氣一日三貼下之皆是血塊痰積方止次日與熟乾菜稀粥將息又半月其人遂復如故又半月果與鈔十錠為川遂行格致餘論

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

孫文垣治丁耀文母年四十四常患胃腕痛（肝木悔胃孀）居十五年日茹蔬素七月因怒吐血椀許不數日平矣九月又怒吐血如前加腹痛（肝木乘脾）次年二月（木旺之時）忽裡急後重肛門大疼（肝火後迫）小便短澀惟點滴痛不可言（肝火前迫）腰與少腹熱如湯沸（三陰火熾）日惟仰卧不能側側則左胯并腿作痛兩胯原痛二陰之痛前甚則後減後甚則前減（諸痛屬火）至不能坐遇驚恐則下愈加墜疼（驚則火動恐則水傷）經不行者兩月向經行腰腹必痛下紫黑血塊甚多今又白帶如注口渴不寐不思飲食面與手足虛浮喉中梗梗有痰肌肉消半診之脈僅四至兩寸軟弱右關滑左關弦兩尺濇據脈上焦氣血不足中焦有痰下焦氣凝血滯鬱而為火蓋下焦肝腎所攝腰胯肝之所經二便腎之所主也據症面與手足虛浮則脾氣甚弱飲食不思則胃氣不克不寐由過于憂愁思慮而心血不足總為七情所傷故尒經曰二陽之病發心脾女子得之不月此病近之所幸脈不數聲音清亮當先為開鬱清熱調達肝氣保過夏令（欠通）後再峻補陰血必戒惱怒使血得循經乃可愈初投當歸龍薈丸以徹下焦之熱繼以四物湯龍膽知母柴胡澤蘭煎吞滋腎丸連服四日腰與少

腹之熱漸退後以香薷石韋龍膽桃仁滑石杜仲牛膝甘草梢軟柴胡煎吞滋腎丸二陰痛全減

韓約齋子婦每怒動則夜卧不安如見鬼魅小水淋瀝今又大便秘結腹中疼痛腰胯脹墜如生產狀坐卧不安因痛而脈多不應指孫曰此肝經鬱火所致法當通利以杏仁桃仁各三錢枳樹根皮山巵青皮各一錢檳榔五分枳殼八分水煎服之少頃大便即通疼痛立止連脹墜亦除一劑之功諸症均釋已矣

琇按此亦係治標非以滋水生肝其病何能而已一婦因夫荒於酒色不事生產多憂多鬱左胯及環跳穴疼痛過膝肝火下鬱于經隧大小便頻數肝火下迫于二陰臍腹脹疼口乾脈之右手弱左手數近又發熱惡寒汗因痛出時刻不寧此食積痰飲瘀血流于下部足厥陰經扶鬱火而痛恐成腸癰與神效瓜蔞散一帖痛減半汗止數脈稍退小腹堅如石按之且痛再與前藥小腹稍軟餘無進退再進之每帖大瓜蔞二枚加丹皮莪朮五靈脂金銀花等味諸症而悉平愈矣

亮卿內人頭痛鼻遍身亦痛挾暑前後心乳皆脹玉户撮急肛門逼迫皆肝火為患大便三日未行口乾因大拂意事而起下午發熱侶瘧惡心煩躁不寧而時當盛暑

乃怒氣傷肝挾暑熱而然以石膏三錢青皮柴胡枳
殼各一錢半夏麴黃芩各八分甘草桔梗各五分夜
與當歸龍薈丸下之大便小便均即利矣熱亦退除
諸症悉減惟畧惡心與青皮飲兩帖而全安愈

程湘內人鼻衄後眩暈嘈噦嘔吐清水夜卧不安腹中
飢而食不下膈孫謂由脾虛肝膽有鬱火也以人葍
黃連白朮扁豆甘草陳皮半夏竹茹茯苓石膏甘水
煎服數劑下之諸症皆平而愈矣

黃履素曰予少年患鬱火之症面時赤而熱手足不温
復覺咽乾口燥體中微熱夜更甚就醫吳門粗工投
以黃連黃芩黃柏等藥方服二劑忽覺手足甚冷漸
漸過腕過膝鼻間突出冷氣神魂如從高橋墜下深
溪陰陰不能自止幾登鬼籙迎名醫張蓮水治之張
云症雖誤服寒藥又不可驟以熱藥激之但服八珍
湯加薑及天麻乂當自愈如法調之雖漸安而元氣
則大減矣後簡方書有云鬱症不可折以寒劑誤治
致死然則予之不死幸也夫記之以為鑒戒耳

潘埙曰予稟氣素偏于火晚年多難懷抱鬱鬱因而肝
氣不平上衝心肺水火不能既濟殊無應病之藥乃
自製一方名曰蕪制丸以柴胡龍膽青皮各五錢平

肝歸身一兩養肝生地一兩生甘草五錢瀉南方黃
柏一兩知母五錢補北方蒼朮八錢燥濕黃連各六
錢清心肺桂心二錢引經加白朮防風陳皮茯苓蜜
和為丸每服八十粒常服得取功効楮記室

琇按合黃潘二說觀之皆鬱火症也一服苦寒幾
斃一服苦寒有効要之人之稟賦各殊陰陽亦異
故凡醫之臨症者不可執著也

龔子才治何進士夫人患經行胃口作痛增寒發熱一
醫以四物湯加官桂香附等味服之即吐血而痛轍
前更甚診之六脈洪數乃知鬱火所致也以山卮二
兩薑汁炒黑色一服而立安愈

馮楚瞻治一壯年作宦客失意退居林下抑鬱而成疾
病即經所謂常貴後賤名曰脫營常富後貧名曰失
精其候氣血日消神不外揚六脈弦細而澀飲食入
胃盡化為痰必得咳吐盡出乃能卧寢故津液內耗
肌表外疎所以惡寒而瘦削以東垣麻黃桂枝湯加
白朮薑棗二三劑服下脈氣漸充有神痰涎咳吐俱
愈繼以十全大補丸及歸脾養榮湯加減調服全瘳
呂東莊治吳弁玉偶患寒熱旋至常熱不退胸中作惡
診之曰此肝鬱而致感也用加減小柴胡湯一劑減

半次進柴胡地黃飲子呂適它往留數方與之次日仍用地黃飲子後日用六君子湯加黃芩丹後日用補中益氣湯加黃芩且戒之曰明日若尚有微熱在內則後日須再用地黃飲子一帖而後用六君子此後皆有次第不可亂也因服地黃飲子覺熱已退盡遂竟用補中益氣湯一帖是夜即煩熱不安乃知次第果不可紊仍用地黃飲子即安然後依次服至第三日再用補中益氣湯泰然得力矣第覺病後煩怒易動體時虛劣自改用歸脾湯呂歸診之曰今脈已無病但夜寐不著曰正苦此柰何曰當用加味歸脾湯曰今已服此方而未効曰君且試我服斯湯下自能占愈甫始煎服一劑而果安睡（遽去遠志木香而入地黃麥冬白芍）珙按此等病予惟以地黃飲子令服五七劑永無它患今必用六君補中歸脾以至紛紛此何故耶未免呆守立齋之成法過至是耳

沈氏婦夏月發寒熱醫以為瘧也時月事適下遂淋漓不斷又以為熱入血室用藥數帖寒熱益厲月事益下色紫黑或如敗醬醫且云服此藥勢當更甚乃得微愈耳乃疑其說請呂診之委頓不能起坐脈細數甚按之欲絕問其寒熱則必起未申而終于子亥曰

鬱火虛症耳檢前藥則小柴胡湯彼意以治寒熱往來兼治熱入血室也又加香薷一大握則又疑暑毒作瘧也乃笑曰所謂熱入血室者乃經水方至遇熱不行故用清涼以解之今下且不止少腹疠痛與此症何與而進黃芩等藥乎即灼知熱入血室矣當加逐瘀通經之味香薷一握又何為者乃用肉桂二錢白朮四錢炮薑二錢當歸白芍各三錢人蔘三錢陳皮甘草各四分一服而痛止經斷寒熱不至五服而能起惟足心時作痛此去血過多肝腎傷也投都氣飲子加肉桂牛膝一錢而全愈使卒進寒涼重陰下逼天僵地折生氣不內水泉氷潰不七日焉死矣乃云更甚方愈夫誰欺哉庸妄之巧于脫卸而悍于誅伐者有如是夫

朱綺厓多憤鬱又以內病憂勞百感致疾初發寒熱（少陽症也）漸進不解時方隆夏醫進九味羌活湯不効易醫大進發表消中之藥凡狠悍之味悉備褦亂不成方三劑勢劇又進大黃利下等物下黑水數升遂大發狂昏憒暈絕湯水入口即吐其家無措試以葍湯與之遂受垂絕更甦次日呂至尚憒亂不省人事承靈（在顛頂通天穴兩旁）正營（在承靈穴兩旁）及長強（在尻骨上腰俞穴下）俱發腫毒

時時躁亂診其脈數而大曰幸不內陷可生也遂重用復者歸朮加熟地一兩許時村醫在坐欲進連翹角刺等敗毒藥且力言熟地不可用其家從呂言進藥是夜得卧次早神情頓清謂曰吾前竟不解何故卧此今乃知病如夢始覺也又次日脈數漸退煩躁亦平但胃口未開腫毒礙事旬日未便令守服此諸症悉治因留方及加減法且囑之曰毋用破氣藥以開胃苦寒藥以降火通利藥以啟後敗毒藥以消腫有一于此不可為也出邑遇友人問其病狀曰七情內傷而外感乘之傷厥陰而感少陽從其類也乃不

問經絡而混表之三陽俱傚矣然邪猶未入府也轉用枳實厚朴山查瓜蔞之屬而邪入二陽矣然陰猶未受病也用大黃元明粉而傷及三陰矣究竟原感分野之邪不得外泄展轉內逼中寒拒逆幸得參扶胃邪鼓邪出外其發于承靈正營者乃本經未達鬱拂之火也其發于腰俞長强者乃下陽至陰凝沍而成也蓋毒得發者復之功也今毒之麻木平塌將來正費調理者前藥之害也其家如言守方服之而愈

張路玉治江禮科次媳春初患發熱頭疼腹痛欬逆無痰十指皆紫黑而痛或用發表順氣不効診之脈來

弦細而數右大于左曰此懷抱不舒肝火鬱于脾土而發熱熱蒸于肺故欬因肺本燥故無痰脾受木尅故腹痛陽氣不得發越故頭疼四肢為諸陽之本陽氣不行氣凝血滯故十指疼紫其脈弦者肝也數者火也細者火鬱于血分也遂以加味逍遙散加桂枝

徐孝廉室不得寐不能食心神恍惚四肢微寒手心熱汗至晚則喉間熱結有痰兩耳時塞屢治不効診之六脈縈縈如珠絲畧無弦數此中氣乏鬱不舒虛火上炎之候也本用歸脾湯以補心脾之虛柰素有虛

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

痰陰火不勝耆圓之滯木香之燥用歸脾之法遂以五味異攻散畧加歸芍肉桂以和其陰導其火不數服而飲食即進寢卧亦寧諸症釋然而痊復若舊矣

張飛疇治一婦平昔虛火易于上升因有怒氣不得越致中滿食減作酸噯氣頭面手足時冷時熱少腹不時痠痛經不行者半載餘其脈糢糊駛而無力服諸破氣降氣行血藥不愈此蘊怒傷肝肝火乘虛而尅脾土脾受尅則胸中之大氣不布隨肝火散湯肢體當知氣從濕騰濕由火燥惟本陽當空則陰霾自散真火行令則鬱蒸之氣自伏又釜底得火則能腐熟

水穀水穀運則脾胃有權大氣得歸而諸症可愈矣
用生料八味倍桂附十日而頭面手足之冷熱除間
用異攻而中寬食進調理兩月經行而愈
葉嶼青治潼川守諱八十三在瀋陽禮部時聞伊母在
京病甚忽身熱吐痰妄言昏憒衆醫俱主發表病勢
日增始求治悲淚哀號自分必死診其右關沈澀微
滑曰此思慮傷脾更兼鬱結痰涎壅盛脾不能運也
自熱昏憒清陽不升脾氣傷也先用二陳瓜篓治其
標繼以歸脾加神麴半夏升柴調治數日而痊向使
誤服表劑豈不蹈昔人虛虛之戒耶

山陰林素臣偶患時氣為醫所誤身熱嘔吐綠水轉側
不寧柴以為肝鬱所致用逍遙散加吳茱萸川黃連
各五分一服吐即止定而身熱亦轉為溫和二劑全
愈又服調理藥數劑而安
陸養愚治沈立川內人胷膈不舒咽嗌不利中脘少腹
常疼大便溏經水淋瀝腰膝無力倦怠頭眩得食少
可食後則異常不快半年間順氣清熱開鬱化痰消
食之藥服將百劑脈之左手沈數而細右手沈弦而
微此肝脾燥熱忽鬱積久所致始屬有餘今為不足
宜用補劑沈曰前用人參五分且有開氣之藥極疼

滿恐補不能投曰參少而開氣所以痞滿也乃用八物湯加人參一錢服之而腹脹大作乃加參二錢脹即減少增至三錢竟不脹矣又為合大劑六味丸空心服之調理二月而疾痊愈

一婦鬱怒憂思胸腹脹痛痛甚則四肢厥冷口噤冷汗用二陳湯加芎歸烏藥青皮枳殼香附厚朴蘇葉一劑痛脹即愈後去蘇葉加薑炒黃連再服而安

一婦鬱怒不發又之噫聲甚高言談不知終始饋襁易飢經曰心病為噫此因憂鬱于心胸也用桃仁承氣湯大黃桃仁桂枝芒硝甘草下畜血數升而安經曰血畜在上則喜忘在中則喜狂也

一中年人因鬱悒心下作痛一塊不移日漸羸瘦與桃仁承氣湯一服下黑物并痰椀許永不再發

薛立齋治一婦人身顫振口妄言諸藥不効薛以為鬱怒所致詢其故蓋為素嫌其夫而舍怒久矣投以小柴胡湯稍可又用加味歸脾湯而愈

一婦人年六十有四又鬱怒頭痛寒熱春間乳內時痛服流氣飲之類益甚不時有血如經行又因大驚恐飲食不進夜寐不寧此因高年去血過多至春無以生發肝木血虛火燥所以至晚陰旺則發赤經云肝

蔵魂竈無所附故不能寐先以逍遥散加酒炒黑龍膽草一錢山尼一錢五分二劑腫痛頓退又二劑而全消再用歸脾湯加炒尼貝母諸症悉愈

一婦人因喪子懷抱不舒腹脹少寐飲食素少痰涎上涌月經頻來曰脾充血而主涎此鬱悶傷脾不能攝血制涎歸源用補中益氣濟生歸脾二湯而愈又用八珍湯調理而痊

秀才楊君爵年將五十胸痞少食吐痰體倦肌肉消瘦所服方藥皆耗氣破血化痰降火曰此氣鬱所傷陽氣不能升越屬脾經血虛之症當用歸脾湯解鬱結生脾血用補中益氣壯脾氣生發諸經否則必為中滿氣膈之患不信乃服前藥後果患前症而歿

羅謙甫曰疏過五論云常貴後賤雖不中邪病從內生名曰脫營鎮陽一士人軀幹魁梧而意氣豪雄喜交遊而有四方之志年踰三旬已入仕至五品出入騎從塞途姬侍滿前飲食起居無不如意不三年以事罷去心思鬱結憂慮不已以致飲食無味精神日減肌膚漸致瘦弱無如之何遂眈嗜于酒久而中滿姑求醫醫不審得病之情輒以丸藥五粒溫水送下二十餘行時值初秋暑熱猶盛因而煩渴飲冷過多遂

成腸鳴腹痛而為痢疾有如魚膾以致困篤命予治之診其脈乍大乍小其症反覆悶亂兀兀欲吐嘆息不絕予料曰此病難治啓元子云神屈故也以其貴之尊榮賤之屈辱心懷慕戀志結憂惶雖不中邪病從內生血脈虛減名曰脫營或曰願聞其理黃帝針經有云宗氣之道內貫為主貫入于胃乃傳入于脈流溢于中布散于外精專者行于經隧周而復始常營無已是為天地之紀故五十營備得盡天地之壽矣今病者始藥後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀阻暴喜傷陽暴怒傷陰喜怒不能自節蓋心為君主神明出焉肺為輔相主行營衛制節由之主貪人欲天理不明則十二官相使各失所司使道閉塞而不通由是則經營之氣脫去不能灌溉周身百脈失其天度形乃大傷以此養生則殃何疑之有

馬元儀治洪聲遠惡寒發熱倦怠懶言神氣怯弱兩脈弦虛此甲木內鬱生氣不榮而陽明受病也蓋甲木乃少陽初生之氣勾萌始圻其脈柔脆一有拂鬱即萎軟抑遏而不上升反下克脾土而為病矣由是樞機不利虛邪入之而與陰爭則寒頃之既出而與陽爭則熱倦怠者胃病而約束之機關不利也神怯者

木病而心蔵之神明失養也是皆木鬱土衰之故木氣既鬱惟和風可以達之陰雨可以滋之柴胡風劑之平者能入少陽升發清陽而行春氣當歸白芍味辛而潤辛以養其氣潤以養其陰白朮茯苓陳皮炙草以和中氣而益脾土兩劑脈象神四劑寒熱已再以補中益氣升發生陽之令而康

朱氏子場屋不利鬱鬱而歸遂神識不清胸滿譫語上不得入下不得出已半月診之兩脈虛濇蕪結此因鬱所傷肺金清肅之氣不能下行而反上壅由是木寡于畏水絶其源邪火内擾而津液乾枯胸中滿結者氣不得下也神昏譫語者火亂于上也上不入下不得出者氣化不清而現晦塞之象也但通其肺氣諸症自已用紫菀五錢宣太陰以清氣化乾葛二錢透陽明以散火鬱桔枳各一錢散胷中之結杏仁蘇子各二錢導肺中之痰一劑而脈轉神清再劑而諸症悉退改用歸脾湯調理而痊

顧霖蒼婦寒熱如瘧便血不已左脇有塊攻逆作楚神氣昏憒診之兩脈弦數蕪濇弦則為風數則為熱濇則氣結此肝脾之氣悒鬱不宣胃中陽和鬱而成火故神明不精肝之應為風肝氣動則風旋之故表見

寒熱也人身左半肝腎主之肝氣逆故左脇攻楚有塊也肝為藏血之地肝傷則血不守風搖熱勝益為亡血之由也用生首烏一兩滋燥而兼搜風黃連一錢治兼以解鬱柴胡以疎其表黃芩知母以清其理枳實厚朴以和其中一劑服下脈象即起神氣亦清再劑煎服步履便適熱亦解退諸無所苦痊復如舊繆仲淳曰甲申夏舊婦因鬱火痰喘身熱手拳目張半月不眠食按其胃口不痛諸醫疑其虛也或云中暑百藥試之痰喘滋急以皂角末噦鼻通竅痰上逆如沸延楊石林診視請亟吐之先夫夫曰病火矣虛甚可柰何石林曰經云上部無脈下部有脈其人當吐不吐即死當以鹽湯吞之去白痰數椀喘定先大夫曰何以藥之石林曰吐即藥也待其熟寢勿服藥以養胃氣夜半啜粥二椀詰旦投六君子湯數劑而起石林者里中博雅士不行術而精於醫者也 廣筆記

張漣水姑蘇人治紀華山雅自負數奇更無子悒悒不快漸至痞脹四乘肌肉削盡自分死矣張診而戲之曰公那須藥一第當霍然以當歸六錢韭菜子一兩香附童子便炒八錢下之紀有難色不得已減其半張曰作二劑耶一服夜夢遺舉家慟哭張拍案曰吾

正欲其通耳乃以前半劑進胃脘間若猛士勇力一擁解黑糞數升啜粥二椀至明日即能巾櫛而起見賓客矣逾年生一子即表弟汝占也 全上

張意田治柯姓人病劇診得脈浮大而空左關沈候有微弦之象左尺沈候有一絲之根面目皆紅鼻青耳聾眼瞪神昏自語不休舌燥赤大脣紫齒燥只此數端便非戴陽症明矣初病發熱咳嗽已七八日所服乃傷風散解之藥昨日早間連大便三四次即臥床不省人事今日忽然發昏或謂戴陽症用熟地附子等未服張思外症雖類戴陽然症起無因察其所言皆平日之事則侶少陰之獨語至鼻現青色時在秋令之際則肺氣已絕矣然面有光亮為表氣不知脣色深紫宜有鬱火且左尺有根脈非無治左關微弦則別有致病之故詢之乃昨早失手自碎粥罐因而怒氣不止即大便昏迷知為鬱火所傷肝火上逆故此諸症蜂起經所謂怒則氣上是也與戴陽症大相懸遠矣用逍遙散去白朮加地黃丹皮炒厄之屬而愈太疫病每多隱微敝醫之臨症必加察審倘不慎詳誤斯衆矣一宦素謹言語一日會堂屬官筵中有蘿蔔頗大客羨之主曰尚有大如人者客皆笑以為無主則悔恨自

咎曰人未有見如此之大者而吾以是語之宜以吾言為妄也已此笑耳因而遂致疾病諸藥罔効其子讀書達理思其父素不輕言因愧赧而成必須實所言遂可解釋矣即遣人至家取蘿蔔如人大者至官所復會堂屬强父扶病而陪酒至數巡以車載蘿蔔至席前客皆驚訝其父大喜厥旦疾愈石山醫案或是韓飛霞一女與母相愛既嫁母喪女因思母成疾精神短少倦怠嗜卧胷膈煩悶日常懨懨諸藥不應予視之曰此病自思非藥可愈彼俗酷信女巫巫托降神言禍福謂之卜童因令其夫賄囑之托母降言女與我前世有寃汝故托生于我一以害我是以汝之生命尅我我死皆汝之故今在陰司欲報汝仇汝病懨懨實我所為生則為母女死則為寃仇夫乃語其婦曰汝病如此我宅往可請巫婦卜之何如婦諾之遂請卜一如夫所言女聞大怒詬曰我因母病母反害我耶我何思之乎遂不思病果愈此乃以怒勝思也 全上

蕭萬輿治一婦人年及四旬懷抱鬱結嘔痰食少胷腹脹疼雖值盛暑猶須著棉衣診之六脈浮結或時煩渴不寐此命門火衰元氣虛寒之故也以六君子加薑桂及八味丸等劑調養未及兩月而痊安矣

內傷

萬密齋治董氏子年十七歲患病請治診其脈浮大無力問其症無惡寒頭痛但身熱口渴四肢倦怠曰似白虎症而脈虛也乃由飢渴勞力而得之用黃耆炙當歸陳酒洗各一兩作湯服之而即痊健矣

陳正夫萬之母舅也病三日後胸中痞脹小便少大便不通適萬聞之而往問疾時近城延一醫診治欲以大柴胡湯下之察脈症不可下乃內傷中氣不運故上竅閉而下竅不通也丹溪云二陳湯加蒼朮白朮升麻柴胡則大便潤而小便長矣與之一服而安

龔子才治劉太府曰勞役太過發熱增寒頭疼身痛口乾發渴嘔惡心煩或以羌活湯或以藿香正氣散服之反為愈甚手足無處著落心慌神亂坐卧不安湯水不入聞藥亦吐（皆由風燥之劑鼓動其火而然）診之六脈洪數氣口緊盛此內傷元氣也以補中益氣湯加遠志棗仁竹茹麥冬等味一劑即熟睡再進一服痊悉全安

陳三農治一老人頭痛惡寒骨節疼痛無汗譫語自服參蘇飲取汗脈洪數而左甚此胃虛作勞陽明雖受寒氣不可攻當大補其虛俟胃氣充足必自汗而解

以耆參歸朮陳皮炙草加熟附子四五劑諸症雖減但口乾發熱未除遂去附子加白芍漸思食出汗（退）而痊

陸養愚治叢邑宰煩勞忿怒飲食不思已數月矣初春患左脇痛不能向左眠又感冒遂咳嗽喘促汗出惡風嘔惡飲冷胃脘痞塞煩躁泄瀉耳鳴手指肉瞤振搖不已脈之兩寸微浮而濇關尺微虛不固曰凡靠左不得眠者肝脹靠右不得眠者肺脹及咳嗽自汗喘促下泄俱難治況濇脈見於春時金來尅木亦可畏幸神氣尚未乏兩寸帶浮尚有微陽小便稠黃而猶長面色焦黑而微有黃氣猶可療也仲景云脈虛微弱下無陽又云微虛相攝乃為短氣又云微浮傷客熱東垣云陰先亡陽欲得去乃見熱壅口鼻謂之假熱之症此益得之七情傷陰煩勞傷陽風寒乘虛入客胸膈痞塞因邪在半表半裡又為冷水停凝症似支結合之諸症俱屬正氣已傷宜調養氣血使邪自散用順氣養榮湯加桂枝甘草二劑諸症頓減易以補中益氣少佐小青龍湯二劑自汗喘嘔已除更以六君子倍半夏陳皮豆仁木香胸痞脇痛亦止又與四神丸實脾腎氣丸固本調治月餘而痊

朱少湖仲冬夜間忽頭項微强身體微痛疑是傷寒連

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

夜用紫蘇二大把生薑十片濃煎熱服厚覆大汗之
身體覺輕自謂已愈矣至次日之夜復覺拘急反增
沈重復如前取汗不解身體如石煩躁口乾睡卧不
安天明延一醫診視謂脈極浮數冬月傷寒非麻桂
不解薑蘇輕劑豈能療大病乎擬用大青龍湯病家
疑而卜之不吉復延陸同議診之脈浮數而微細如
蛛絲按之欲絶曰此陽虛症也原不宜汗況經謂冬
三月閉藏之令無擾乎陽無泄皮膚使氣亟奪一之
為甚其可再乎彼醫曰仲景云陰盛陽虛汗之即愈
既曰陽虛何為不可汗況麻桂青龍正為冬時傷寒

而設如拘閉藏之令不宜汗則仲景此等湯劑必待
春夏傷寒而後用乎陸不能辨但徐曰議論甚高第
恐此脈不相應耳病家問當用何藥曰惟三建生脈
酌而用之彼醫謂邪在表而補斂之不死何待陸曰
汗之而愈則補誤補之而愈則汗誤原不兩是也病
家不能决卜之謂補吉汗凶乃以建中生脈合投之
煩躁仍劇噫氣不絶足脛逆冷身不能轉側彼醫謂
斃可立而俟也陸曰誤汗者再藥輕病重故未效耳
仍以前方之味藥減加人參附子濃煎冷服少頃煩
躁頓定再服數劑諸症悉除時及月餘屢出虛汗憊

不能起復用人參數兩服之始獲安愈

喻嘉言治劉筠之七旬御女不輟此先天素厚也然以房中之術數擾其陽又值夏月陽氣在外陰氣在內偶不快飲食起居如常醫者以壯年傷暑之藥香薷黃柏石膏知母滑石車前木通投之即刻不支診時則身僵頸硬舌強喉啞無生理矣曰此症雖危然因誤藥所致甫隔一晚尚可以藥速追急以大附子乾薑人參白朮各五錢甘草三錢大劑煎服可解此危衆議不決姑以前方四分之一服之安貼再煎未遲灌下寸香之久大嘔一聲醒而能言呼諸子乳名云

適纔見州官回詢其所由開目視之不語轉問醫者何人曰江西喻嘉言遂擡手一拱又云門縫有風來塞之喻促煎所存之藥續進而姻族雜至商以肩輿送其回寓另進他藥啞瞶如前越二日而逝（老人孤陽又傷于慾則三陰不可問矣又值夏令其陰不支故不爽利盲者以暑治之誤矣至謂陽虛而投以薑附亦未為得也）

李士材治程幼安食少腹悶食粥者又之偶食蒸餅遂發熱作渴頭痛嘔逆或以傷寒治之或以化食破氣之藥投之俱不效勢甚危診之曰脈無停滯之象按之軟且濇是脾土大虛之症也法當以參朮理之衆皆不然李曰病勢已亟豈容再誤者遂以四君子湯

加沈香炮薑與之數劑服之而減一月而安愈矣
倪文學累勞積鬱胸膈飽悶不能飲食服消食理氣行
痰開鬱清火凡百餘劑不效病勢日增李診之脈大
而軟喘然歎曰明是火衰不能生土反以伐氣寒涼
投之何異入井而又下石乎遂以六君子湯加乾薑
肉桂益智仁各一錢十劑少愈然食甚少也遂加附
子一錢兼用八味丸調補百餘日而痊
盧不遠治戴養吾夫人體常困倦眩暈不食胸膈痞滿
脈之寸關不透寸關不透之脈于今以為肝脾之氣絕少臨症者宜知之
不伸用八珍加升麻柴胡而愈後每病用前方即安

若稍為加減便不獲效凡十五年皆倚恃焉蓋夫人
性靜體厚起居安適是以氣血不振而消沮故於補
氣血藥中加開提之劑得其性情故可久服耳
何介甫病脾數年飲食少而精神粹就診兩關軟弱不
透寸用參苓歸芍陳皮防風甘草數十劑後遂善啖
肥濃數年之疾脫然問曰余疾有年補脾補腎法非
不詳而末之效君何從平治得之曰君疾在肝非脾
腎病也凡診病者當窮其源無為症惑如飲食少雖
關脾胃其所以致脾胃病者何故此自當審者今君
兩關脈弱不透于寸右固脾虛明矣左則何謂此蓋

脾體不足而脾用不行也蓋脾之用肝也星家取尅我者為用神脾體無肝木為之用則氣血便不條暢運化遲鈍而脾轉轉困矣且秋來金肅肝更不伸乃為補助肝木之氣使之揚溢則脾土伸舒精神油然外發雖不治脾實所以治也安用奇特之法哉（議論極精）（當至所用老方仍是肝脾並治又引星家之說以立言更覺皮離寡當矣）

馮楚瞻治王慎瞻平日過勞偶遠行途中食冷麵羊肉及歸胸中疼脹不堪醫所用無非查朴殼朴之類服之益甚漸至心如壓扁昏暈悶絕少減則甦曰食乃有形之物惟入腸胃滯則為脹為疼著而不移豈非卄降于胃次乎蓋胃為心肺之部止受無形之氣不能藏有形之物也且六脈弦細而數身不熱語言無力皆非傷食之候乃積勞所傷無根之氣上逆于心以致脹痛不堪耳當用塞因塞用之法乃以棗仁硃砂乳香為細末新剖猪心血為丸用人參五六錢煎濃湯送服少頃以蓮子煮白米粥壓之令忍脹强吞半椀如是數日疼脹漸減繼而胸膈自覺甚空雖多食不飽而大便所出者無幾蓋勞役太過臟腑脂膏耗竭狀如中消食物入腹銷鑠無餘故入多出少也談銓部病熱數日醫以為傷寒投以發散禁其飲食日

漸危篤脈之弦緩無力乃勞傷發熱先以濃煎粥湯半椀進之覺香美甚甘飲後目頓清亮遂與歸脾湯令以薄粥繼之三四日後神氣頓然復舊而愈矣

徐主政夫人年逾七旬江行驚恐早晚積勞到家未幾壯熱頭疼醫作傷寒發散數劑漸至面赤煩躁神昏不語頭與手足移動日夜無寧刻脈之細數無倫重取無力此勞竭發熱熱者乃元陽浮越于表也更發散之陰陽將竭矣非重劑挽之無及熟地一兩六錢炒麥冬炒白朮各三錢牛膝二錢五味子八分製附子一錢二分另用人參六錢濃汁冲服二三劑後熱

減神清後用八味歸脾二湯加減全愈

洪氏子因勞傷發熱頭疼咳嗽脇痛醫謂傷寒大用發散一劑汗大出熱更甚神昏見鬼躁渴舌黑身重足冷徹夜不寐困頓欲絕脈之細數無倫胃脈微極此勞傷中氣發熱東垣補中益氣湯為此等病而設令陰陽氣和自能汗出而解今更虛其虛陽氣發泄殆盡所以身愈熱而神愈昏陰陽既脫自爾目盲見鬼津液既亡所以舌黑足冷至於身重異常此尤足少陰極虛之症蓋腎主骨有氣以舉則輕否則重也與熟地二兩麥冬四錢乳炒白朮五錢牛膝三錢五味

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

子一錢製附子二錢濃煎人參一兩煎汁冲服口渴另用熟地二兩麥冬五錢人參八錢濃煎代茶三四劑汗收熱退舌潤神清咳止食進後用生脈飲送十補丸四五錢再以歸脾加減煎膏成丸如彈子大以圓眼湯調化服之自然全愈而痊安如舊矣

劉君鄉試入都長途冒暑氣已傷矣復日夜課誦未幾壯熱頭疼咳嗽乾嘔不寐神疲脈之兩寸俱洪兩尺俱弱右關沈取則無此犯無胃氣之症矣非溫補脾腎無濟也而以暑天熱病堅不肯服乃坐視數日熱益甚復延診其脈轉燥躁急無力此又熱陰陽愈傷也與大劑熟地人參白朮麥冬五味製附子牛膝二劑諸症漸愈惟嗽聲聞作胃脈不起猶不喜食乃早以生脈飲送八味丸去丹皮澤瀉加鹿茸五味子牛膝晚以歸脾湯去木香甘草加五味肉桂一補先天一補後天全愈○同時彭公子亦患是病身熱兩月服補中益氣加減已數十劑不知此方乃為虛人發散而設不宜久服且時當夏月陽氣上浮致令陰陽離決精氣乃絕面青浮腫肚腹脹硬心下痞膈咳嗽咽痛口多甜涎壯熱畏寒五心燥熱口乾不渴足脛常冷脈則兩寸乍洪乍數兩關無力兩尺更微上盛下

虛已極以前方重劑另煎人參一兩冲服旬餘漸愈
復感旁言再用發散消痰及補中六君加減遂不起
太親家高年且患足疾初愈偶途中遇雨疾趨而回遂
身熱自汗頭疼咳嗽繼而吐血飲食不思精神狼狽
脈之兩寸皆洪大而數右關兩尺甚弱此勞傷中氣
脾不統血也咳嗽者火爍于肺也身熱者元陽浮越
也自汗者氣虛不能攝液也頭疼者血虛火冒也與
熟地一兩麥冬四錢炒白朮六錢牛膝三錢五味子
一錢製附子一錢二分另煎人參湯冲服數劑咳嗽
吐血俱止早晨生脈飲送加減腎氣丸午後加減歸

脾湯服之而即全愈

高鼓峯治呂用晦病熱症造榻與語察其神氣內傷症
也詢其致病之由曰偶夜半從卧室出庭外與人語
移時就枕次日便不爽快漸次發熱飲食俱廢不更
衣者數日矣服藥無效曰粗工皆以為風露所傷故
重用辛散飲食不進便曰停食妄用消導孰知邪之
所湊其氣必虛若投以補中益氣湯則汗至便通熱
自退矣用晦欣然輒命取藥立煎飲之旁觀者皆以
熱甚又兼飽悶遽投補藥必致禍慰之曰無庸驚擾
即便矣頃之下燥矢數十塊覺胸膈通泰旁觀者始

當歸草堂鈔本

賀是晚熟寐至五鼓熱退進粥連服前方而愈矣

范中行感冒風寒又過於房勞發熱昏悶醫以為傷寒也羌活柴胡投之不應又以為陰症也肉桂木香投之又不應且愈甚飲食俱廢舌黑如炭八日不便醫正議下診之脈細數而沈曰陰厥甚矣胃氣將絕矣非用温和甘潤之劑弗能救也急以左歸及滋水清肝等藥重加參者服之他醫以為不大便柰何議補高曰予以為承氣症耶誤矣第服藥自得便至第四日果下黑矢升許熱退舌亦紅潤但尚未進食病家猶以用補為嫌尉之曰本內傷症一補中益氣療之足矣無柰粗工雜投胃氣轉傷不能即復今以藥補之以稀粥調之不過數日自然知味不信另延一醫重用承氣湯服至二劑不便（必反謂前藥補住）病轉劇無顏再延高仕承中延薛楚玉至聞述病情及用藥次第曰既用熟地而便效可知矣何至舉將收之功而棄之耶今無能為矣踰數日果殁病家目楚玉為黨究不之信嗟乎舉天下學問之人而盡目之為黨為彼之醫不亦難乎者抑亦其壽數之應終耶

呂東莊治友人董兩舟夏月搗膏藥勞力致感頭痛發熱服解表之藥不效其長君方白來問呂曰子不觀

東垣脾胃論乎服補中益氣加五味麥冬自愈矣如言服之頓安復起勞勞仍發熱頭痛別用清解藥增甚因同葉御生往診之四肢微冷胸腹熱甚煩悶腰隆下少腹脹痛不能小便時旁風者謂重感風邪所致力主發散呂曰虛邪內鬱正以勞倦傷中真氣不足不能托之使盡出又遇清涼其火下逼膀胱責及臟十故然安可攻也請以滋腎飲子合生脈散與之何如御生論與呂合竟投之得睡醒熱解小便通矣留方補之而別翌日方白至曰內熱時作煩悶頭痛亦間發不盡曰餘火未散熱移上也用軟柴胡人參白朮黃連丹皮甘草茯神等藥服之而即全愈矣

楊乘六治徐氏妾勞倦發熱時作微寒倦怠嗜卧下午更甚醫用發散兩劑咳嗽不絕脇痛如錐更用清金瀉火泄利不止不食不寐者旬日脈之浮分細軟沉則緩大面色晃白眼光散大舌胖嫩淡白而滑兩手厥冷而振此勞力傷脾氣虛發熱初時若用補中益氣一二劑即愈乃誤藥致咳嗽痛利胃陰被劫于前中氣重傷于後乃擬人參熟地白朮各一兩附子炮薑各三錢赤石脂禹餘糧炙甘草各五錢濃煎大椀徐服至大半即睡去巳刻至戌分始寤咳利俱除脇

痛如失能進粥飲服訖前藥胃氣漸開再以調中益氣生金滋水之藥調服數劑而症悉愈

簡某病感症壯熱時微寒嗜卧嬾言日輕夜重或與羌防發散燥渴譫妄不食脈浮數無序重按虛大無力舌胎嫩黃中間焦燥此內傷似外感症誤表以刼胃陰津枯液涸火無所畏而變生燥症也與左歸飲加生地當歸白芍兩劑便解熱退再診浮數俱除虛大仍在繼起之病已退初時之病未除蓋初因中氣素虛而來後病因胃陰暴傷而致若不先救其陰而即補其氣是為無制之陽邪樹幟而將垂絕之真陰下

石矣今陽火既退陰汁漸充則初起之症可立除也遂以補中益氣湯合生脈服下四劑而即愈矣

薛立齋云余素性愛坐觀書久則倦怠必服補中益氣加麥門五味酒炒黑黃柏少許方覺精神清爽否則夜間少寐足內酸熱若再良久不寐腿亦然之甚至筋絡似覺抽縮之意蓋且左右腿足頻移展轉不安必至倦極方寐此勞傷元氣陰火乘虛下注丁酉五十一歲齒縫中有如物塞作脹不安甚則口舌如有瘡然日晡益甚若睡良久或服前藥始安至辛丑時年五十有五晝閒齒縫中作脹服補中益氣一劑夜

間得寐至壬寅有内艱之變日間雖服前劑夜間齒縫亦脹每至午前諸齒并肢體方得稍健午後仍復脹滿如是觀之可知氣血日衰治法不同

琇按立齋生平善用補中益氣據此病先下盛服之原相宜矣後既上盛而猶服之豈不惑哉

柴嶼青治瀋陽少司寇覺羅諱吳拜延診曰數日前因感冒風寒至今未愈其脈或兩至一歇三至一歇遲而見代竝非外感乃虛寒凝結氣血耳用人參養榮湯吳云無力用參以玉竹代之此十月廿一日也至次日告云昨服藥後腰發板轉動必以人必需人參購覓可也遂用參一錢廿三早診之脈氣稍轉仍用原方午後因膝硬强自令人以熱麩熨之忽至發迷再促診而醫者數人俱云風寒方用大表散并欲下大黃及諸人去後吳云伊等如何可信仍服公藥但再為斟酌之乃于方内加參一錢迨服至冬至方斷煎劑即以原方配合為丸調理而康健如初矣向使吳公如信任之不篤必致難于保全耳

夏大兄年友禾中陳雖嗜身熱譫語不甚辨人太守茗溪陸視三因赴補在京邀柴診視其脈大而無力此陽虛發熱擬用人參陸驚而咋舌以為斷不可用乃

力任方從一劑後身和三劑熱全退調理月餘而痊

少司馬諱雅爾圖隨　駕打圍至德州抱病給假回京

醫投小陷胸湯一劑頓即仰卧神昏不語又一醫進

參三錢神氣稍甦言語恍惚惡食不寐延診雅云素

有肝病遂述前方按左關脈和平惟心部空大此心

傷肺飢飽勞役則傷脾此內傷所致擬用人參以償

貴為難遂用扁鵲六君子加炮薑大棗數劑而愈

太史張希周丁卯場前勞倦外感身熱委頓兩足無力

欲用發表之劑未決求治右脈軟弱人迎不緊外感

輕而內傷重以補中益氣湯治之後用異攻散數劑

病痊遂聯捷

觀察沈椒園在侍御時家人某新從山左回京身熱不

食沈以熟地等滋陰大劑進遂嘔吐增劇求治于柴

柴曰此有傷乎胃氣所致也非以陰藥之相宜用須

服香砂六君子湯調治數劑即占痊愈

主政蔡修持令郎發熱口渴胸悶舌純黑胎譫語延醫

無效已二十餘日矣診之脈氣平弱竝無外邪投以

滋陰之藥二劑服下全然不應即改用六君子加炮薑一服尚未見效後戴廷傳加製附一錢吳茱萸五分一劑汗出胸稍快再劑大汗胸次豁然調理痊愈

夫醫之治症毋粗忽也即以視此病之類可知謹戒

陸養愚治朱少湖病已半年先因房勞汗出又傷食用消導藥後乃夢遺頭暈自服人參少安遂每日五錢或一兩服至數斤其病自汗身熱咳血痰逆胸膈不舒心口如物窒碍手足時厥頭常眩運眼或昏暗不見人大便已六日不行每頭運時服參湯則稍止脈之氣口及關似滑而有力左寸關浮弦似虛尺濡弱

此由肝有怫熱重以思慮房勞致虛參雖中病單服多服益陽太過因而化為熱火與積痰膠固脾胃遂致熱結幽門火逆上行而動血向以惡寒汗泄重幃厚褥帕裹綿裝至是悉令徹去以潤字丸服三錢外用蜜導法去宿沿盆許再用人參七分歸身遠志棗仁各一錢山茹茯神白芍各一錢三分香附二錢生甘草三分入竹瀝一鍾一劑即胸次豁然舒暢得寐每日以前方之藥兼并用潤字丸數十粒即便潤汗止咳嗽痰血亦已漸減再服十帖而全安矣

陸祖愚治潘洪宇以過勞傷脾脾虛而肺臟亦損咳嗽

痰喘微寒微熱或與清涼滋補健脾消導月餘飲食
頓減精神愈衰僅奄奄一息耳診之遍身瘡癬六脈
如絲言語輕微夜苦無寐大便則向來艱澁乃用人
參白朮貝母棗仁麥冬生地另以人參麥冬五味為
丸五更吞下每日服參約四五錢數日之間漸吉瘳
叠再以歸芍生地連翹地榆等味煎湯揉洗肚腹大
便即行通潤又服調理劑百餘日而安健如常
陸祖愚治本府添設曾向緣中氣不足宜服參耆一日
午飯未幾啖楊梅過多胸中不快身熱頭眩吐痰口
渴不思飲食三日不更衣或用查枳芩連厚朴二陳

之類服下三四劑行大便一次去燥矢數枚而症仍
復如故又用歸芍知麥查芩等類而腹滿作嘔脈之
左三部浮微而弱右三部浮大虛數曰脾胃虛弱氣
不能運故胸膈不舒非有積滯也況素常不能服苦
寒豈可再用芩連諸藥之類經云但治其虛安問其
餘乃用六君子湯再加白豆仁煨薑大棗服二劑症
即頓減又與服補中益氣湯數劑調治遂霍然矣
李東垣治一人憂思不已飲食失節傷脾面色黧黑環
口尤甚心懸如饑又不欲食呼吸短促曰此脾氣受
傷也憂思不已則脾氣結而不行飲食失節則脾氣

耗而不足陰氣上入陽中則面色黧黑土衰水侮故唇口尤甚此陰陽相反病之逆也經曰陽明脈衰面始焦故知陽明之氣不足也遂以參耆白芷升麻葛根白芍蒼朮甘草薑棗助陽明生發之氣而即愈

朱丹溪治一人勞倦發熱醫以小柴胡湯黃連解毒湯芩連屑柏白虎湯等劑反加痰氣上涌狂言目不識人目赤上視身如烈火六脈洪數七八至按之豁然左畧弦而乱此乃中氣不足之過又兼內傷寒涼之物致內發熱又與服苦寒之藥太多為陰盛隔陽之症矣現與補中益氣湯再加人薑附大棗服二劑而愈

陳三農治一友飲食不均遠行勞倦發熱煩悶症類傷寒醫者禁食不與診之言語輕微手背不熱六脈數而兼軟此真氣不足之過實非有外邪也故力勉其進粥稍接精神然後與甘溫大補之劑熱退而安

陳三農治夏夫人年已八旬憂思不已偶因暑浴遂患發熱頭痛醫者以為傷寒禁其食而肆行解散越三日氣高而喘汗出如洗昏冒發厥診其脈大而無力乃為之辨曰外感發熱手背為甚內傷發熱手心為盛外感頭痛常痛不休內傷頭痛時作時止訣宜熟玩今頭痛時休而手背不熱是為虛也遂用參耆

各討五錢白朮半夏各重二錢橘紅一錢甘草六分
一劑煎服症即減半後劑倍用參朮諸苦悉退而痊
龔子才治一人年近四旬發潮熱口乾喜飲冷水或以
涼藥之劑與其投治竟屬罔效至四五日之後渾身
沈重不能動止四肢強硬僵直目眼閉耳聾妄語譫
言謂之六脈浮大無力此乃氣血虧損之極須以十
全大補湯去白芍地黃加熟附子一服鼾睡痰響咸
謂以服之參耆桂附之誤曰此藥病交攻不必憂疑又
進一服過一時許即能轉身動止次後又進數劑則
諸病潛瘳矣此係從脈不從症之治法也

李時珍治一人素飲酒因寒月哭母受冷遂病寒中食
無薑蒜不能一啜至夏酷暑又多飲水蕪懷怫鬱因
病右腰一點脹痛牽引右脇上至胸口則必欲卧發
則大便裡急後重頻欲登圊小便長而數或吞酸或
吐水或作瀉或陽痿或厥逆或得酒少止但受寒食
寒或勞役或入房或怒或飢即時舉發一止則諸泯
然如無病人甚則日發數次服溫脾勝濕滋補消導
諸藥皆微止隨發此乃飢飽勞逸內傷元氣清陽陷
遏不能上升所致也遂用升麻葛根湯合四君子湯
加柴胡蒼朮黃耆煎飲服後仍飲酒一二杯助之其

藥入腹即覺清氣上行胸膈爽快手足和暖頭目精明神采迅發諸症如掃每發一服即止神驗無比若減升麻葛根或不飲酒則效便遲大抵降多升少稟受弱而有前諸症者並宜此藥活法治之 本草綱目

薛立齋治一府庠生王以道元氣素本單弱丙午丁未兩年以科場歲考圍積勞致疾至十二月間其病盛作大熱淚出隨凝目赤面黯揚手露胸氣息沈沈幾絕脈洪大鼓指按之如無舌乾捫之如刺此內真寒而外假熱也 即戴陽症 遂先服十全大補湯曰既服此湯其脈當收斂為善少頃熟睡覺而惡寒增衣脈頓微細如絲此虛寒真象也以人參一兩加用熟附三錢水煎頓服而安夜間脈復脫以人參二兩熟附五錢仍愈後以大劑參朮歸身炙草等藥調理而安

一男子發熱煩渴頭痛誤行發汗喘急腹痛自汗譫語用十全大補再加附子煎服竟至治之熟睡喚而不醒及待卧甦諸症頓退再服數劑安健如初

黃武選飲食勞倦發熱惡寒乃誤用解表之劑即神思昏憒胸次滿發赤斑診之脈洪數而無力此係內傷元氣非外邪也急用溫補之劑奈病者不從後果殁王宵堂治外兄虞文華病發熱一醫審無身痛等症知

非外感用平胃散加人參五分投之熱愈甚用平胃亦無謂
又一醫至診之曰此人參之過也急汗之汗而不解
又一醫至診之曰邪入裏矣宜涼膈散下之煎成欲
服王適至急止之診得六脈皆洪大搏指舉按有力
笑曰此醫之所以誤也用茯苓補心湯加人參六錢
麥冬三錢棗仁一錢五分時不卧九日矣服藥即鼾
睡良久而甦病已退診之脈頓微弱為治方每劑用
人參四錢棗仁茯神歸朮耆麥冬川芎之類令其多
服不輟遂別去數日以小便不利來扣令服導赤散
明日熱復作舌黑如墨復延診脈復洪大因連日所
服藥皆減參三分之二而導赤散中又加花粉山庖
黃芩等藥故病復作亟令用人參六錢合前諸藥大
劑投之舌色始淡熱亦退除而小便亦皆清利倘進
涼膈之劑必不能治矣安可妄投其藥者哉
馬元儀治江德初素積勞鬱近復失恃過哀因而發熱
惡寒飢逆煩渴面赤如粧診其兩脈沈微無力知非
實火內熽乃虛陽上越得之悲哀勞倦內傷也悲哀
則傷肺勞倦則傷脾脾虛無以生肺肺虛無以生腎
所以封藏不固致虛陽上越升降失常致濁氣上行
由是氣逆于胃則為飢逆火游于上則為煩渴也法

宜以温補之劑而黏滯從其性而歸之于下則諸症自平矣易與人參加桂理中湯五劑而霍然愈矣

吳洪先病經七日寒熱似瘧手足麻木汗出如注心悸恍惚診其寸脈空大關尺虛澁曰此症人多謂風寒外感不知為勞倦內傷也寸大關尺澁乃脾肺之氣受虧心腎之陰亦涸氣虛不能升達陰往乘之則寒陰虛不能內養陽復乘之則熱心悸恍惚者陰不主事而陽內擾也汗出如注者陽不主事而陰外亡也手足麻木者陰陽兩虧氣血俱不得榮也以當歸補血湯為主加人參二錢以補脾肺之陽肉桂黃連各七分俾坎離內交廣皮炙草以補胃而和中一劑便得鼾睡再劑汗止再以補中益氣湯升發陽氣加穿山甲以祛內邪寒熱遂止脈亦和但重按少力微見餒逆用大劑附桂理中湯加丁香半夏數劑而痊

王亦林患勞倦發熱神昏倦怠已半月皆作外感治不愈診得兩脈浮虛右脈倍甚此飲食失節勞役過度脾虛則胃氣亦虛氣不上行于陽反下陷于陰而發熱也夫內傷脾胃之症與外感風寒者不同東垣言之詳矣外感風寒乃傷其形為有餘之症內傷脾胃乃傷其氣為不足之症有餘當瀉汗之吐之下之尅

之是也不足當補溫之和之調之補之是也經云勞者温之損者温之又云上氣不足者推之揚之脾不足者以甘補之當以辛甘温之劑補其中而升其陽則愈矣乃用補中益氣湯服後得微汗然非發汗也乃陰陽氣和而汗自出也一劑服之熱即退除再劑而神氣清朗又服數劑而康復倍常矣

朱丹溪治一人本内傷汗下後譫語初能認人後三五日語後便妄言此神不守舍慎勿攻戰脈多細數戰當是伐不得安睡足冷氣促面褐青色必乾燥用補中益氣湯加附人參半兩竹葉三十片煎服而效 治法

繆仲淳治一人年三十三歲因努力即發心腹飽滿疼痛直至臍下皆板兩脇空鬆不可言腹寒即欲就火火至稍睡痛止大便不通小便短縮似宿茶日夜不卧至五週時飲食漸加時常舉發大約性嗜酒善怒勞碌所致方用當歸五錢牛膝四錢麥冬五錢酒芍五錢炙草七分五味一錢橘紅二錢茅根一錢五分生地三錢宜多食韭菜童便胡桃肉等物 廣筆記

于仲父患目珠痛如欲墮此肝火上冲也胸脇及背如槌碎狀此怒而血瘀也晝夜咳嗽此悲傷肺也眠食俱廢自分不起繆令日進童便三大椀七日下黑血無數痛除咳熱如故

母以二冬貝母蘇子橘紅白芍鱉甲青蒿桑皮五味
百部枇杷葉竹瀝童便乂之未痊病家疑其虛促欲
用參耆繆不可乃陰以黃耆二錢入前藥嘗之竟夕
悶熱目不交瞪始信不謬固守前方煮服噙化丸勿
輟逾月平益仲父病起于哀傷過甚更觸惱怒所致
非虛也肺熱而實肝火上沖故不宜用參耆耳

立齋治一人因勞倦耳下瘃腫惡寒發熱頭疼作渴右
手脈大而輭此不足症也當服補中益氣湯彼反用
發表藥遂致嘔吐始悟以六君子湯治之更服補中
益氣湯而愈大抵內傷者榮衛失守皮膚間無氣以
養則不能任風寒胃氣下陷則陰火上沖氣喘發熱
頭痛發渴而脈大此乃不足之症也大抵飲食失節
勞役過度則多成內傷不足之症若誤以為外感表
實而反瀉之豈不致虛虛之禍哉東垣曰凡內傷為
飲食勞役所傷則右手脈大于左手外感風寒則左
手脈大于右手當以此而辨之 亦未全是

倪仲賢治林仲因勞發熱熱隨日出入為進退食飲漸
減倪切之曰此得之內傷故陽氣不升陰火漸熾溫
則進涼則退是其徵也投以治內傷之劑其疾如失
耳故醫之臨症必須詳慎對病服藥方無誤耶 原機啟微

張意田治鍾姓人因舉重用力畧有脇痛數日後發熱身疼甚至胸脇痞硬服大小陷胷更劇診之左脈弦硬而數右脈寸尺浮而闊沈滯胸脇拒按四肢厥逆症似結胸然服陷胸不應必有他故察其臂上筋肉微黃咳出痰色如橘合症與脈知為用力太過脇肋受傷瘀血為患欲發黃也所謂瘀血類傷寒者此耳治宜桃仁承氣湯下之但瘀滯日久雜用攻散陰氣大損當兼重養陰血為是用生地二兩當歸八錢丹參四錢桃仁三錢大黃三錢枳實二錢芒硝二錢甘艸八分服後下瘀血紫塊二次熱退胸平惟神氣欠清脈氣弦軟此傷陰絡而神虛故也服補陰舒絡之劑而症患除愎復如初後無重作之患

沈明生治徐來一外有下帷之勞內忘祛席之戒偶于夏月縱啖生冷致患脹滿不食腹中漉漉有聲且復喜嘔水道秘濇凡疎解清涼之劑遍嘗妄效診之即主溫補而座間競持他說乃索筆書云積滯雖令中滿獨不思中氣不作則腹為之善脹腸為之善鳴乎諸逆衝上雖多屬火獨不思胃寒不化亦令人吐乎小便黃赤雖為內熱之徵獨不思氣不施化溺因色變乎捻之症在疑似惟憑切脈今脈來沈弱右關更

微恙之喜暖畏涼其為虛寒症明矣遂先用六君子
益以炮薑益智仁之屬繼投八味丸出入于參耆桂
附之間旬日良已嗣后依方調理不特病體痊愈而
且精神倍健并亦連占夢熊

吳橋治陳龍年八十而病溺濁不禁則隱几而日夜坐
不復近衾褥之卧診之六脈沈沈垂絶矣叟乃命孫
扶起曲踞而告曰老夫春秋高子孫僅立門户死其
時也吾從姪繼鸞年四十病瘵且危家極貧舉室五
口嗷嗷待哺公肉其骨即龍死賢于生就而診之卧
無完席室中僅二缶作炊然左脈平右脈虛而數大
曰此憂思傷脾之故爾亟宜以補脾抑肝之法治之
此金匱法也叟聞瘵者可生則大喜過望其病一再劑而
愈踰月瘵者無恙則夫歸卹諸幼子羅拜謝之太函集

王某膏粱子也年弱冠好角力因舉石井闌致勞傷乆
而晡熱咳嗽脇痛面青白目下脘青紫諸治不效診
之脈弦畧數左尺弱薦濡曰腎為作強之官因勞而
傷肺為腎母曰子病而耗及母氣肝為腎子母病而
子失其養乃金不生水水不滋木木燥則生火上侮
金而下乘土故目脘青紫咳嗽諸症作也與生熟地
杞子沙參麥冬地骨女貞等四劑忽盜汗如雨疑藥

之誤曰此佳兆也夫火燥為患津液又虧得純陰之劑以濡之猶釜中有水熏蒸而蓋潤也由是鬱熱除而血脈復矣問可斂乎曰不可若斂之則火仍內伏第再養金水使陰平陽閟則汗自止而病自瘳矣如言而治之諸疾自然痊愈矣決無他慮耶

江氏姊年五十餘因子病傷寒二十餘日焦勞過甚及子愈而已病作寒熱頭痛面赤滿口舌發疱目不交瞚者數日夜一老醫謂少陽陽明熱症與小柴胡合竹葉石膏湯脈之豁大無倫乃力斷為勞傷虛火上浮戴陽假熱之症若誤藥立見危殆乃與熟地一兩

肉桂一錢炙甘草一錢麥冬二錢歸身三錢一劑即熟睡比覺口舌之疱盡消遂霍然矣當是時余初臨症由今思之則但與養青湯為至當也後六旬外復患虛症誤服黃耆煮棗單方月餘忽遍身浮腫動即氣急服熟地數觔乃愈

國立中醫藥研究所圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷十四

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷十五

錢塘魏之琇玉横撰

虛損

張子和治東茂之病虛勞寢汗面有青黃色自膝以下冷痛無汗腹中燥熱醫以薑附補之五晦朔不令飲水又禁梳頭作寒治之張曰子之病不難愈難于將護恐陰道愈後轉茂子必不慎束曰不敢乃先以丹砂丸濃川散下五七行心火下降覺渴與冰水飲之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

又令澡浴數日間面紅而澤後以河水煮粥溫養脾胃又以活血當歸丸人參柴胡散五苓散木香白朮散調之病大瘥汗止足暖食進張曰此本肺癉當以涼劑益水之一物在目為涼在皮為汗在下為小溲若禁飲水則內竭而燥熱生焉人若不渴與水亦不宵飲之矣束既愈果忘其戒病復作張已去乃殂

竇材治一婦人傷寒瘥後轉成虛勞乃前醫下冷藥損其元氣故也病人發熱咳嗽吐血少食為灸關元二百壯服金液保命四神鍾乳粉一月而全愈

一人身長五尺因傷酒色肌肉消瘦醫令灸其關元三百壯服保元丹一觔自後大便漸滑小便漸長飲食漸加肌肉漸生半年如故此案係附骨縮病愈後胡念菴謂是有缺文

弘治乙丑歲五蘇儒學聞教諭恭邁贏疾吳醫治之率用三白湯無奇効一日謁張養正求治亦用三白湯家人曰前醫用之多矣養正正色曰子勿嘵嘵吾用湯使不同遂投之熟附三兩片煎俾服即瘥續醫說

王時勉治常熟徐氏中氣不足脈曰此症宜補劑當用參耆譬如築基造基不可以時日計其成緒須服藥百裹乃可望愈一至于十病不少減更謀一醫病勢增劇復請于王王脈之曰爾信道不篤又更別藥以

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

致增劇徐莫諱乃曰曾服利氣之劑王曰必如吾言則生否則非吾所能也從之果及期而愈宵堂嘗見格致餘論載浦江鄭君仲夏患痢丹溪煎人參膏與服至五觔而痢止十觔而病安今人輕身重財不顧體之强弱病之輕重亟于求効況謀利嗜賄之徒動輒便施剛峻劫劑至于輕病變重重病至危往往有之古人有言曰不死于病而死于醫可不慎歟 全上

孫文垣治吳肖峰室董潯陽次女而龍山之妹也患咳嗽體倦多汗腹痛呻吟不絕口者半月諸治愈加脈之左手三五不調右手沈弦面色青息甚微腹中漉漉有聲問上年夏月曾病否曰曾頭痛體倦多汗但不咳嗽不腹痛今五月初病如上年醫謂傷寒用參蘇飲表之始咳嗽與治嗽則加腹痛又謂通則不痛以沈香滾痰丸下之遂憊不可支曰此乃注夏病仲景謂春夏劇秋冬瘥者是也問注夏何以咳嗽曰汗多用參蘇重發其汗肺金受傷故燥而咳何以腹痛曰因治嗽寒其中氣故也況又服滾痰之劑以重傷之益五月六陽之氣皆散于外汗而又汗汗多則亡陽夏至一陰將萌腹中尚虛虛而復下下多則亡陰陰陽俱亡不憊何待乃用酒炒白芍五錢甘草黃耆

各三錢桂枝二錢大棗二枚水煎臨服加飴糖一合
飲訖而睡自巳至申不醒咸謂夏不用桂伐天和也
諸痛不用補助邪氣也不可為矣龍山以其言告曰所
喜者睡睡則陰氣生汗可飲痛可止也問所投之劑
何名曰此仲景小建中湯也夫腹痛如縛帶脈急縮
也面青脈弦肝木盛而脾土受剋也故以白芍和之
桂枝伐之甘草緩之黃耆大棗飴糖以補之自虛回
汗斂而痛止矣語未竟病者醒而索粥粥後又睡至
天明腹全不痛惟稍咳嗽加五味子麥冬兼治注夏
而全瘳矣臨別語龍山曰令妹之病剋伐太過今雖

愈而脈仍弦不退不用滋水生木弦安得退所謂知其一未知其二也猶為可
慮宜戒惱怒節飲食謝去人事恬淡頤養安可責之婦人庶
可永年也否則亥月陰極陽生恐不能保無患也後
至期與良人齟齬致怒而絕藥不服果以凶聞
張文學子心二尹可泉長君也弱冠病醫作瘵治久不
効自分必死督家人治含斂脈之左寸短弱右關略
弦餘皆洪大咳嗽下午熱從足心起漸至頭面夜半
乃退面色青形羸氣促多夢遺卧床奄奄已絕粒斷
藥二日謂可治可泉曰醫僉謂火起九泉者死大肉
盡削者死咳嗽加汗者死脈不為汗衰者死此感症則然

又當火令之時恐肺金將絕乃謂可治者何也曰症雖危兩顴未赤心火尚未焚也且聲音不啞肺金尚未痿也耳輪不焦腎水尚未涸也夫面青者恐憂疑不決左寸短者係心神不足關略弦者謀為不遂症與色脈皆非瘵也良由志願不遂始心病非腎病也故謂可治蓋病人因星士許發解既而落第故悒悒寢疾也為立方名調肝益神湯以人參棗仁龍骨為君丹參石斛貝母麥冬五味為臣山扈香附為佐服二十劑而病即起九方則熟地龜板枸杞人參麥冬五味茯苓蜜和為丸服之三月而全安矣

薛立齋治沈察年二十六所稟虛弱兼之勞心癸巳春發熱吐痰甲午冬為甚其熱時起于小腹吐痰無定時或謂脾經溼痰鬱火用芩連枳實二陳或專主心火用三黃丸之類至乙未冬其熱多起足心亦無定時吐痰不絕或遍身如芒刺或又以為陰火生痰用四物二陳知柏之類俱無驗丙申夏痰熱愈甚盜汗作渴曰此乃腎經虧損火不歸經當壯水之主以鎮陽光其脈尺洪大餘却虛浮遂用補中益氣及六味地黃而愈後不守禁其脈復作謂火令可憂當慎調攝會試且緩但彼忽略至戊戌夏果殁于京

龔子才治周侍御患虛損目不敢閉閉則神魂飄散無所知覺且不敢言言即氣虛微此元氣衰弱心神虛憊也先與硃砂安神丸一劑服之少安後以補中益氣湯倍用參耆再加遠志茯神棗仁白芍生地麥冬等味連進數劑全瘳

劉氏子年十八患虛勞熱咳痰喘面赤自汗旬餘不能就枕勢危劇診之六脈微數乃陰虛火動也令五更時以壯盛婦人乳一鍾重湯煮溫作三四十口呷之天明煎河車地黃丸一服少頃將大小米入山藥連肉紅棗胡桃仁數介煮稀粥食之半晌又煎清離滋坎湯二劑加麥門冬竹瀝童便薑汁少許頻頻服之至午又進前粥椀許再加白雪糕食之過半晌又進前藥二劑惟夜間卧睡則藥止醒則即服如此三晝夜不住口火乃漸息方能枕席後減藥之半半月病減六七服湯藥一劑調理而愈此症若以尋常之法施治日進一二劑則是一杯之水豈能救車薪之火哉

陸祖愚治金伯遠婦年未四旬生育已多且數小產致病怯弱不時眩暈惡心胸膈否滿飲食不思頭面四肢浮腫晡時潮熱大便時瀉時燥夜間恍惚不眠診得左手寸脈浮澁右手寸脈浮滑兩關脈俱弦細兩

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

尺脈初取覺洪大既而重按則少神知其心脾腎三經受病而前醫純以清涼為治之非也以陳皮貝母前胡蘇子木通苡仁當歸白芍天麻為煎劑已午未三時服黎明用熟地人參製附子杜仲麥冬山藥知母白朮五味為丸淡鹽湯送下黃昏服安神丸如此分為三治初服便覺有頭緒調理兩月諸症如失一人于春末患傷寒醫與汗下症已愈矣然精神嘗覺恍惚肌肉未能充實至秋時發熱微咳食減肌削且精滑便溏醫謂陰虛服六味加減幾百劑至冬甚惡寒不能出戶診其脈浮之損小沈之損小其色晄白不澤曰此陽虛症也非參不可凡陰虛之熱蒸蒸內出骨甚于肉肉甚于皮陰分必劇今輕捫則熱甚重捫則熱不甚此明顯乎外熱內不熱也且發熱無常是陽氣虛時盈虧也（語未安）陰虛火旺之嗽口口相續口渴咽乾痰涎稠濁（此未近風症）氣之不能上升也（亦未安）即精滑者亦因陽氣不足故陰精不能固也至大便不實與畏寒其為陽虛又顯然矣總由傷寒汗下之後元氣未復而強力作勞以虛僞實用加減八味丸五更時將淡鹽湯送下又用四君子湯加減作煎劑間用補中益氣湯兩月而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

黃履素曰予少患下元氣虛不能多言稍不戒所得病不可狀丹田若無物者甚則夜半陰極之時陽氣欲脫手足厥冷汗大洩一交子丑氣乃漸復此係腎陽衰弱之候常服溫腎之藥于滋陰科中多用鬼絲子枸杞子肉蓯蓉五味子鹿茸紫河車之屬遂得漸愈前症因目病誤服黃連丸頓劇要知陽衰之症寒所最忌如知母黃柏之屬最傷胃中生發之氣即平人亦不宜多服矣又本草云升麻川芎係下虛人所忌服也予服四物湯川芎稍多服補中益氣湯失加人參皆頓覺下虛前病陡然發作藥之響應如此

李士材治何邑宰之子虛損遺精盜汗瘦骨柴立已瀕于危簡其所服以四物知柏為主芩連二冬為加減診其脈大而數按重極軟（猶有胃氣故可治也）曰中氣大寒反為藥苦矣乃以歸脾湯入肉桂一錢人參五錢當晚得熟睡居十日而汗止精藏更以還少丹進服兼與補中益氣之味並治一月之間調養而安愈

顧宗伯患發熱困倦目昏耳鳴脚軟不能行大便燥結手足麻痺腰胯疼痛李診之曰腎虛不能上交心虛不能下濟用八味丸十全大補湯加龍眼肉三十枚五十餘日精神漸旺肌肉漸充一日多飲虎骨酒大

便仍結醫者皆云八味丸非久服之藥十全大補宜去肉桂反用知母元參佐之服之數月遂致不起

琇按是症八味十全元參知母其失正均惟集靈膏一方真聖劑也

李翰林勞而無度醉而使內汗出多痰服寬膈化痰之藥轉覺悶滯之極診視其脈乃沈而澁惟兩尺尤甚曰痰得澁脈一時難愈況又尺中澁甚精傷之象也在法不治乞投劑勉用補中益氣加入半夏茯苓五味服兩帖有小効衆皆喜悅李曰濡象不減脈至無根死期近矣果越十有餘日而殁矣據脈症藥亦大左矣

盧不遠治吳叔顯三月間生瘡藥治瘡已合而喘急甚十日不能就枕往診之先用開肺發瘡次用降氣補腎斷其次日當瘡發五日當足腫六日當出水十日可喘定就睡嗣後足生二毒三月完復次年七月偶以傷風微熱左三部脈唯隱隱見以大劑人參歸地甘草十帖方起二十帖如常十月再感左脈更不如秋但微熱起居如故三日就枕七日頭痛如破因告其兄以秋病之危今若昏沈決無生理彼尚疑其言九日果微昏錯語十二日不識人再七日死或問曰某昨歲垂危君言變症歷歷如響幸全生焉今冬微

恙君言不起果應其因為一為兩曰其人骨氣天弱
腎精不全其瘡亦從腎發也不知而用發散元氣轉
耗瘡毒內逆于肺而喘因用四逆散使太陰氣開瘡
遂外出用六味丸料使少陰納氣息遂內勻清升濁
降足腫生癰病俱外去是以生也今秋左脈不起是
為元氣內索不堪左旋矣比起而再戕賊之病發于
骨所以腦痛因之遂作昏亂是係內關之症氣獨內
絕因以致死必然之勢也其病根本皆由于腎經所
起至於是一非兩豈以評於症之輕重為異同也
馮楚瞻治余侍講數年參藥久服或時氣逆上攻或時
氣墜下迫二陰皆重失氣甚頻大便溏而不暢脈則
細數無力向服補中益氣殊不知愈升則氣愈降況
無陳皮辛散反泄元氣豈未聞塞因塞用之說乎乃
以八味加鹿茸補骨脂五味子為丸參湯吞服于空
心以嫩防風三兩酒煮取汁拌炒黃耆一觔炒黃白
朮觔半熟附子四兩三味煎汁去渣熬膏以人參六
兩研為末收成細丸日中食遠白湯吞服四錢者能
升託朮能固中參能補理附能回陽四味共為十劑
收功何慮即虛陽者不為振作發生也遂安愈
胡春坊年六旬病九月餘寒熱攻補襍進症隨藥變虛

虛實實之間幾莫能辨診之六脈洪大有力非陽虛也乃時當夏暑汗出惡風痰多鼻塞飲食如故却精神日疲此陰虧不能斂陽以致陽浮陰散清濁不分邪火消穀生痰不生血也但為養陰則陽有依投以六味加鹽水煮橘紅麥冬五味子等不三劑而愈

趙宦病面赤如粧不省人事口多譫語手足躁動六脈洪大搏指所服乃柴芩廣半之類以其劑小不能為害不知真陰失守虛陽上浮神氣欲脫補救尚虞不及敢以清利速其死耶以人參八錢熟地麥冬丹參白芍茯苓遠志牛膝薑炭每日服二劑不數日愈

高鼓峰治吳弁玉發熱多汗便閉數日不行醫曰此停食傷寒也不宜與食待熱退始可以進稀粥湯飲之病勢轉甚延治問曰肚中飢否曰飢索其日所用藥則芩連枳殼花粉厚朴之屬笑曰但抱噢飯之病即可除矣無庸此等藥也病者喜甚曰吾本無食醫言有食故耐此數日餓耳然便閉云何曰致新即推陳吳園胃中又無穀氣故前物積而不下運且子之發熱多汗乃一味虛症耳宜用參朮等味調理而痊

立齋治州同劉禹功素不慎起居七情以致飲食不甘胸膈不利用消導順氣肚腹痞悶吐痰氣逆用化痰

降火食少泄瀉小便作脹用分利降火小便濇滯氣喘痰涌服清氣化痰丸小便愈滯大便愈瀉肚腹脹大肚臍突出不能寢卧六脈微細左寸虛甚右寸短促此乃命門火衰脾腎虛寒之危症也先用金匱加減腎氣丸料內加肉桂錢半附子一錢半二劑服之下瘀穢甚多又以補中益氣送二神丸二劑諸症悉退五六又用前藥數劑并附子之類貼腰臍及涌泉穴寸脈漸安復後因怒腹悶惑于人言服沈香化氣丸大便下血諸症悉至此陰絡傷也辭不能治果歿

吳孚先治薛氏子吐血止後忽患心跳振衣或時驚恐用熟地一兩山藥五錢女貞山萸枸杞各用三錢服二十餘帖即本方加元武膠為丸症即頓減間藥一日即跳偶一醫用二陳六君子加補心鎮心之品症復增吳曰此非心跳實乃虛里之動也經曰胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出于左乳下其動應衣宗氣泄也凡患腎虛勞怯之症者多見此症腎屬水而肺主氣氣為水母腎虛不納故宗氣上泄而腎水愈竭于下欲納氣歸元惟有補陰配陽之法為是耳

琇按凡治小兒不論諸病宜先揣此穴若跳動甚者不可攻伐以其先天不足故也幼科能遵吾言

造福無涯矣此千古未洩之秘訣也珍之貴之

高鼓峯診楊在公六脈動甚因語之曰脈緊而弦不出一月危病至矣定方而別斯時無甚病至十月中忽患咳嗽醫作風寒治數以羌活發散與十餘日遂大吼喘痰湧如潮作鼾聲不得坐臥一人于牀以額俯靠其背稍擡頭即喘急欲死走人邀診曰以前日脈推之病根固深然不宜困敗如此之速也此殆攻伐之藥逼成之耳無救矣病家只哀求定喘曰定喘不難無如脈色皆去縱喘定之後仍虛脫而死耳遂朝用參耆歸芍暮用加減八味三日而能臥飲食倍進其家喜甚以為得生高曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危今出入升降俱廢息矣縱挽回何施茲不過暫接命門一絲未斷之氣逾十日必至死矣已而果然向使病未見之先即已見之後醫能以大劑填補峻補之藥與投之即不能如舊尚可稍延歲月不至若是之促此可為妄肆攻伐之戒哉

徐次鏐病咳嗽高細診其脈六部皆動因問徐嗜酒乎曰然服天冬冬知貝母生地等類乎曰服逾觔許矣高曰君病與此等藥相反可禁勿服寫歸脾湯六味丸兩方與之高歸語友人曰次鏐病即素問所謂二

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

陽之病發心脾也其人必勞心過度又嗜酒多慾急
救三陰乃為良法醫以陰寒逼之火無所洩其怒遂
成燎原之勢今六脈純是陰火有出無入不踰年死
矣或謂次鏐無恙不過患傷風耳何遽至是曰脈法
當如是耳八月中高適寓孤山徐邀之天竺曰聞子
善太素脈乞為我診辛丑可得第否高曰太素兩字
出在三墳後人竊之以欺天下之耳目且造為歌訣
妄言禍福軒岐無是也但素問自有一種榮枯壽夭
貧富貴賤其道甚微然我能約畧言之診畢語之曰
辛丑固好然不若甲辰更得當也云云者因知其將死欲阻其北上耳

次問於壽數曰子年甫壹三十之餘不必問及壽矣
察審其意惟以科名不及為急然病情難已直言因
與其尊人甚厚急返石門告曰令郎脈氣不佳倘如
北上恐其不能返乎曷阻之曰予固阻之弗能也因
為製大料參膏令戒其不絕服之庶可冀其還家如
惑以火不清不宜補始矣到京後果有閩人以前說
進者次竟信之用發散寒涼之味十一劑吐血而絕
張路玉治顏氏女虛羸寒熱腹痛裡急自汗喘嗽三月
餘屢更醫不愈忽然吐血數口脈之氣口虛澁不調
左皆弦微而尺微尤甚令與黃耆建中加當歸細辛

或曰虛勞失血曷不用滋陰降火反行辛燥乎曰不然虛勞之成未必皆本虛也多由誤藥所致今乘其根蒂未固急以辛溫之藥提出陽分庶幾挽回前失若仍用陰藥則陰愈亢（亢字未妥）而血愈逆上矣從古治勞莫若金匱諸法如虛勞裡急諸不足用黃耆建中即腹痛悸衄亦不出此加當歸以和營血細辛以利肺氣毋慮辛燥傷血也遂與數貼血止次以桂人參湯數服腹痛寒熱頓除後用六味丸以棗仁易萸肉或時間進保元異攻當歸補血之類隨症調理而安胡念菴治王在庭之室病虛勞十餘載喘促吐沫嘔血不食形體骨立諸醫束手診之見其平日之方皆滋陰潤肺溫平之劑曰以如是之病用如是之藥自然日趨鬼趣焉望生機仲景云咳者則劇數吐涎沫以脾虛也又昔賢云腎家生陽不能上交于肺則喘又云脾虛而肺失生化之原則喘今脾腎敗脫用藥如此安望其生乃重投參耆薑附等二劑而喘定緣泄瀉更甚再加萸蔻十餘而病減十七又灸關元穴因畏痛只灸五十壯迄今十有餘年形體大健（醫林指月）

一董姓者雍正三年初冬來求診脈其脈或二動一止或七動一止或十二動或十七動一止此心絕脈也

仲冬水旺其何能生姑定參耆茸附河車臍帶桂心
棗仁等方與之服下至十劑脈之不過歇止之間稍
有參差不似前之有定數也又十劑而歇止漸少矣
再十劑六脈調和復如常矣噫不可謂藥之無功也
且知治早雖不用於丹艾之劑亦有可生全者矣（全上）

昔蜀中一道人童顏漆髮眉宇疎秀自歌曰尾閭不禁
滄海竭九轉神丹都漫說惟有斑龍頂上珠能補玉
堂關下穴按斑龍珠之一物乃鹿角也鹿之精血結
而為角性且屬溫故大補精血元陽相火虛者宜之
或加于六味地黃之中亦為生精助血之妙（張三錫治法彙）

張三錫治一人咳嗽已成勞極用四物知柏之味不愈
乃以秦艽鼈甲散加用二母二冬服十數劑頓瘥

陸祖愚診傅小泉之室高年患濕痰症暑月或與香燥
過多反增頭暈口渴眼花不寐飲食少進骨節疫疼
診得左寸洪數關尺細澁右寸滑浮關尺沈細且九
至一止曰此血虛痰火也論症尚有治法獨是右關
尺歇至有常數便不可為矣凡血虛症即是肝病大
都庚日篤而辛日死況立秋在邇乎或聞而非之乃
與養血清火消痰順氣等治之劑果覺有驗十劑後
竟可步至中堂料理家務每日約進粥十餘椀人皆

謂此症可能起死回生矣忽一日少腹驟然作痛冷汗不出不止及至夜半不知人事次日酉時竟至死吳小泉不忘陸之前言檢歷視之果是辛日也

陳三農弟昏倦發熱頭痛惡風因中氣大虛元氣下陷陽氣不克而頭痛形氣衰少而內熱用調中益氣湯加葛根一劑服之即安更製脾腎丸服逾月而復舊

治一貴婦咳嗽泄瀉咳嗽甚則泄瀉少愈泄瀉甚則咳嗽略可午前微寒午後微熱此皆脾胃虛弱之過痰涎隨虛火上潮則咳甚而泄稍止痰涎隨虛火下注則泄甚而咳略止不必治其諸症但補養胃氣自愈

用保元湯加炒松花乾薑五味破故紙八劑而咳嗽寒熱皆除又服八劑而泄瀉止大還

薛立齋治一婦人發熱晡熱盜汗自汗殊畏風寒飲食少思或腹脹吞酸或大便不實此脾胃不足諸經虧損朝用補中益氣夕用八珍湯倍用參苓白朮各二十餘劑諸症漸愈因喪母哀傷患盜汗便血用加味歸脾湯數劑而止仍用前二藥又五十餘劑尋愈月經兩月而至適因怒去血過多發熱作渴肢體痠倦頭目暈痛用消遙散加味歸脾湯二藥調補而痊

一婦人飲食少思胸膈不利或胸中作痛或大便作瀉

或小便不利用逍遙散加山屐茯神遠志木香而愈
後因怒寒熱往來倦怠煩熱以前藥加炒黑黃連三分頓愈用八珍湯調理後因怒吐血躁渴用人參五錢苓朮當歸各三錢陳皮甘草各一錢治之而愈
一婦人內熱口乾頭暈吐痰帶下體倦飲食少思此脾氣虛弱之過以致不能生肺金須用補中益氣湯加茯苓半夏二味服之脾氣漸復且飲食亦稍漸進諸症減退再用加味逍遙散治之而尋愈復舊
一婦人日晡熱甚月水不調飲食少思大便不實魚之胸膈痞滿頭目不清肢體倦怠發熱煩躁此乃七情肝脾虧損之症治法當用濟生歸脾湯加味逍遙散補中益氣湯三方調服元氣漸復症退而愈
一婦人胸脇膨滿小腹悶墜內熱晡熱飲食不甘體倦面黃日晡則赤洒淅惡寒此脾肺氣虛先用六君子加芎歸諸症漸愈又用補中益氣加茯苓半夏諸疾悉安後因飲食失節勞怒惡寒發熱不食用加味小柴胡二劑熱退用逍遙散歸脾湯調理而康泰復初
一婦人月經不調飲食少思日晡熱甚此肝脾氣血俱虛用十全大補再加山茱山藥丹皮麥冬五味而愈次年秋寒熱如瘧仍以前藥進服數劑而愈矣

沈大方室趙氏初患痰喘熱渴或以降火散氣治之肌日削而氣日索延至甲辰木旺痰盛身熱口腐腹脹神昏絕食此乃虛熱無火薛投壯水生土之劑隨愈至戊申夏初坐則頭墜不能起視卧則背冷透體煩熱暈眩咳嘔痰涌手足麻冷勢危殆薛曰此內真寒外假熱也遂與大補薑附之劑服三四帖下痊即漸安仍復用前藥加減數味服之而全安矣（此乃沈公自述之案）

胡念庵治一中年婦人夜熱咳嗽本係小疾耳因為張李二醫誤用滋陰退熱之藥（應是苦寒之劑）月餘致面青脈急喘促吐血嘔沫日約數升飲食不能進二醫束手而無法救治胡至乃為重用參附與服十餘劑而安此非其本原受虧係藥誤所致故易收功也（醫林指月）

立齋治一儒者每逢春夏口乾發熱勞則頭痛服清涼化痰之藥瀉喘煩躁用香薷飲神思昏憒脈大而虛此因閉藏之際（冬月）不遠幃幕為患名曰注夏（凡稟賦薄弱即小兒亦多此病也）更用補中益氣湯去升麻柴胡加五味麥冬炮薑一劑服下脈象益甚乃仍用前藥再加肉桂五分服之即時蘇甦更進六味丸調治而痊

司空何燕泉忽患小便赤短形體倦怠飲食減少缺盆痛此係脾肺虛弱不能生發腎水所致當滋化本源

宜用補中益氣六味丸加入五味服之而安

庶吉士黃伯隣發熱吐痰口乾體倦自用補中益氣湯不應薛謂此金水俱虛之症兼服地黃丸而愈後背患一癰煩痛寒熱彼嘗偕視郭主政背疽郭不經意決其殞于金旺之日果然已而郭氏妻孥感其毒皆患惡瘡黃所患與郭同心甚恐曰此小瘡也憎寒等症皆陰虛舊症果是瘡毒亦當補氣血乃以地黃丸料煎與服之即睡良久各症頓退自後常有頭面耳目口舌作痛或吐痰眩暈之類如服前藥即安愈

少司空何瀟川患足熱口乾吐痰頭暈與服四物黃連黃柏等味一劑下之飲食即減痰熱益甚改用十全大補再加麥冬五味山藥山茱萸之劑而占瘥安

薛甥凌雲霄年十五歲壬寅夏間見其面赤唇燥形體消瘦曰子病即將進矣癸卯冬季復見之曰子病愈深矣至甲辰夏令胃經部分有青色此本乘土也始求治先以六君加周柴胡白芍山栀蕪荑炒黑黃連煎服數劑又用四味肥兒六味地黃二丸及參苓白朮歸芍山栀麥冬五味炙甘草連服三十餘劑肝火方始漸退前方更加膽草柴胡復進三十劑乃去芍加肉桂又服三十餘劑及加減八味丸始漸安愈

一儒者因屢婚脚腿軟痛面黑足腫惡寒痰喘小腹脹痛上氣(疾喘)便急飲食減少此乃少陰虧損陽氣虛寒之症也宜用八味丸之料濃煎服下諸症可冀頓除然(又)後調服丸散半載之(藥)又元氣漸克形體復故而安

一男子年逾二十早于斲喪夢遺精滑睡中盜汗唾痰喊叫乃如其法調補服之數劑之功諸症霍然患退頭顱亦即漸飲安然勿藥

一儒者口乾發熱小便頻濁大便秘結卧出盜汗(盛)夢遺精遂致廢寢宜用當歸六黃湯二劑服之盜汗頓止又進(用)六味地黃丸數次二便即行調和通利再用十全大補湯(并)合(丸)前丸兼服調養月餘諸症悉愈(及)

朱丹溪治王廿四患發熱脇痛咳嗽紅痰口渴倦怠大便秘塞診之(候色)脈稍數而虛詢之乃發熱時曾飲冷水一椀(盹)因飲食不節已成積滯是乃傷胃成虛傷肺成痰之症宜用人參一錢白朮錢半陳皮川芎各一錢白芍茯苓桔梗炙甘草各五分作二帖(取)煎成八分入竹瀝二分(再)復煎沸熱飲下龍(會)丸廿粒(丸)如咳(嗽)三十丸立齋治一婦人素來勤苦冬初患咳嗽發熱又而吐血

夜發盜汗經水兩三月一至遍身作痛或用化痰降火反致口噤筋攣此本血虛而藥益增損耳遂用加減八味丸及補中益氣加五味山藥麥冬年餘調愈

呂東莊治一長姓者好學深思士也年十八冬杪得齒衄及手足心熱恍惚不寧合目愈甚盜汗胸前出如油間或夢遺或不夢而遺伊叔錄脈症求方呂曰脈不敢憑據所示症乃三焦脬絡火遊行也試用後方治之連翹黃芩麥冬生地丹皮丹參茯苓石斛滑石辰砂甘草白豆蔻等七劑而愈及明年用功急迫至夏其症復作或云皆不足症用溫補腎經澁精等劑服之日劇又進溫補腎經丸料觔許愈劇至不能立立則足腕乏下刺痛咸謂為弱症矣乃求診呂曰體雖胜羸而面色憔悴之中精神猶在問所服藥出示方曰生藥鋪矣何得不亟且少年人朴實何必用溫補曰手足心熱柰何曰勞心人大抵如是曰夢泄奈何曰夢泄人人各殊此乃心腎不交所致與夫盜汗恍惚等症皆三焦包絡之火遊行而然藥宜清涼遂仍用前方去滑石豆仁辰砂加升麻五味燈草十有餘劑服之又用麥冬生地滑石石斛茯苓白芍丹參神麴辰砂共研蒿末蜜和成丸守服而痊愈矣

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

柳公度言吾養生無他術但不使元氣佐喜怒使氣海常溫耳今人既不能不以元氣佐喜怒矣若能時炙氣海使溫亦其次也予舊多病常苦氣短醫者教炙氣海之穴氣遂不至促急也自是每歲必須以一二次炙之倘若不炙體莫適遂斯由氣怯之故也（以 資生經）

羅謙甫云丙辰秋楚邱縣貢君次子二十七歲病四肢困倦躁熱自汗氣短飲食減少咳嗽痰涎胸膈不利大便閉結形容羸削一歲間更請數醫不愈或曰名醫不如福醫某處某醫雖不精方書不明脈候看症極多治無不效人目之曰福醫診曰餓你讀得王叔和不如我見過病症多頗有可信試命治之醫至診其脈曰此病予飽諳矣治之必效于肺俞各炙三七壯以蠲飲枳實丸消痰導滯不數服大便溏泄無度加腹痛食不進愈添困篤其子謂父曰病久瘦弱不任其藥病劇遂卒冬予從軍回其父以告予予曰內經云形氣不足病氣不足此陰陽皆不足瀉之則重不足此陰陽俱竭血氣皆盡五藏空虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣故曰不足此其理也令嗣久病羸瘦乃形不足氣短促乃氣不足病潮作時嗜卧四肢困倦懶言語乃氣血皆不足也補之惟恐不及反

以小毒之劑瀉之虛之愈虛損之又損不死何待貫
君歎息而去予感其事略陳其理夫高醫愈疾先審
歲時太過不及之運察人之血食布衣勞怯之殊病
有淺深在經在藏之別藥有君臣佐使大小奇偶之
制治有緩急因用引用返正之則孫真人云凡為太
醫必須諳甲乙素問黃帝針經明堂流注十二經三
部九候五臟六腑表裡孔穴本草藥對仲景叔和諸
部經方又須妙解五行陰陽精熟周易如此方可為
太醫不爾則如無目夜游動致顛殞正五音者必取
師曠之律呂而後五音得以正為方圓者必取公輸

之規矩而後方圓得以成五音方圓特末技耳尚取
精于其事者況醫者人之司命列於四科非五音方
圓可比不精于醫不通于脈不觀諸經本草倖以運
通命達而號為福醫病家遂委命于庸人之手豈不
痛者哉噫醫者之福福於渠者也夫渠之福安能消
病者之患焉何世人不明此理而委命于福醫邑至
於傷生喪命苟終不能悟是實被惑之甚者也悲夫
薛立齋云辛丑年余在嘉興屠漸山第有林二守不時
昏憒請治之譫語不絕脈按之如無此陽虛之症也
當用參附湯治之有原醫者陽喜而迎曰先得我心

同然也遂服之即靜睡覺而進食午後再劑神思如
故其脈頓飲余返後又詐云為用附子太多矣吾故
以黃連解之實於陰地仍用參附湯竊觀仲景先生
治傷寒云桂枝下咽陽盛即斃硝黃入胃陰盛乃亡
不辨而自明矣吾恐前言致誤患者故表而出之

薛甥居宏年十四而娶至二十形體豐厚發熱作渴面
赤作腫或外為砭血內用降火肢體倦怠痰涎愈多
脈洪數鼓指用六味丸及大補湯加麥冬五味而瘥
馬元儀治汪周扳子患弱症經年諸治不效診其脈兩
寸浮大而虛關尺虛小咳嗽夢泄面色枯白不任風

寒曰兩寸浮虛為衛外之真陽不固兩尺虛溢為腎
中之真陽又弱較於陰虛咳嗽之症不啻天淵也急
擬用玉屏風散多加人參庶可以益真氣充腠理不
數劑咳嗽已漸止矣而進七味丸以養腎氣而主蟄藏復令並服大造歸脾
丸以補心脾而充血氣如是之調補兩月而安

何繼武痛患寒熱躁煩足冷如冰汗出如注兩脈虛微
形氣病氣俱屬不足責之脾腎虧損虛寒內伏雖見
寒熱有似表邪而躁煩自汗足冷之象已兆是係虛
陽欲脫之機況值兩脈虛微尤非表邪可散之比也

若行表散之劑是乃速其陽之亡也茲惟用大温大補和養中州生發陽氣之法治之方可圖愈因與附子理中湯二大劑汗止足温寒熱漸止數劑霍然

沈氏僕惡寒發熱時時躁煩兩脈空大自覺氣從耳鼻衝出洞然若無關閘此脾肺虧損陰火内動也凡人受天之氣必先入肺乃行于下其别氣走于耳宗氣出于鼻示從胸中注于肺以行于上是肺實居氣之要路以行治節肺藏虧損則氣之出入皆失其常法當補脾斂肺而氣自治矣黄耆白朮各五錢炙草防風各一錢二劑脈稍斂熱稍減四劑而煩躁已耳鼻

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

間氣治如常再以七味地黄丸湯補養水藏而痊

王維春年三十攜妓縱恣月餘内虚之下不耐煩暑當夜露坐明日遂寒熱躁煩自汗不止面赤如粧兩脈虚微此陰虚陽暴絶也非夏月傷暑脈虚身熱自汗之比若行表散氣浮不返矣用人參一兩附子二錢回陽返本服後汗止神清躁煩俱息明日診之兩脈轉為洪數但重按少力此脈症轉可無慮矣但陰虚之極恐陽氣無偶終亦散亡治法不可救陽而賊陰但當養陰以懷陽使得其平而已宜用生首烏人參甘草橘紅黄芩知母等味服四劑寒熱即退而愈

張子和曰嘗過鳴鹿邸中聞有人呻吟聲息瘦削瘝然無力余視之乃五虛症也余急以聖散子二服作一服此症非三錢二錢可塞也續以胃風湯五苓散等藥各作大劑使頓服注瀉方止而漿粥入胃不數日而其人起矣故五虛之人不加峻塞不可得而實也彼庸工治症草草補瀉如一杯水救一車薪之火竟無成功也反曰虛者不可補實者不可瀉此何語也吁不虛者強補不實者強攻自是庸工不識虛實之罪豈有虛者不可補實者不可瀉哉五虛者脈細皮寒氣少泄利前後飲食不入也

繆仲淳治陸祚先乃正咳嗽飽脹痰喘水火不通眠食俱廢有庸人參白芍為君枇杷葉三大片蘇子炒研極細茯苓五味為佐二服得眠大小便通啖粥廣筆記湖廣張仲虎客邸眈于青樓且多拂意之事至冬底發大寒熱咳嗽吳中醫者皆以外感治之發表和解無不遍試適毛子晉拉視之見其神色消耗脈氣虛數中時復一結咳嗽有血卧不貼席繆謂子晉曰此陰虛內傷症也陰精虧竭故脈見虛數內有瘀血故結脈時見肺肝葉損所以卧不能下此不治之症況誤認外感多服發散復搖虛虛之戒耶不數日而殁

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

太學許韜美形體單弱神氣短少且素眩酒色時嘗齒
衄辛未春偶患左乳傍及肩背作痛異常手不可近
捫之如火日夜不眠醫以內傷治之服桃仁紅花乳
沒延胡靈脂等藥二十餘劑不效診之六脈虛數肝
腎為甚斷為陰虛火旺之症當滋養陰血扶持脾胃
俾陰血漸生虛火降下則痛不求止而止矣如必以
和傷治痛為急則徒敗胃氣尅削真元非所宜也用
生地丹皮白芍牛膝枸杞續斷石斛甘草桑枝麥冬
蘇子囑其服十劑方有効以陰無驟補之法也八劑
後復診之其脈氣漸和精神漸旺雖痛未盡除而生
機躍然矣惜其欲速太過惑于羣小復以前藥襍而
進至一月之後胃氣果敗嘔逆陰血愈耗復發潮熱
腹中脹滿半月之久竟致不起而逝

顧季昭患陰虛內熱仲淳曰法當用甘寒之味不宜用
苦寒之劑然此症非服百有餘帖不可愈愼勿更改
吾方即欲加減使吾徒略加增損可也果服百劑而
安愈有周車前桑皮貝母枇杷葉天冬白芍蘇子
等味各二錢地骨皮鼈甲各三錢五味子一錢煎服

姚公遠之內人患病延請仲淳入診其繼母乘便亦求
診仲淳語伯道曰婦病不足為慮嫂疾不球矣聞

者駭甚曰吳方新婚亡大恙何至於是耶予私叩之仲淳曰脈弦數真氣弱症也不及半歲夜即發熱咳嗽漸劇倉皇延仲淳至疏方與之曰此藥盡吾心耳病必不起吳逾年醫家百藥襍試無効而天（竟）（廣筆記）

矍元立夫人素清癯不耐煩勞一日謂仲淳曰弟婦未生子而弱煩兄為診其故次日仲淳往診得其脈弦細無神趙文肅公問曰兄從元立許來診其嫂得何脈曰今雖無恙必不久矣文肅頓足曰有是事哉天胡厄善人甚耶此丙戌四月事也至秋夫人歿（全上）

祝氏婦年五十餘患中滿腹脹兼崩漏下虛清上則下虛殲甚實下則上脹殫甚仲淳為其擬立二方用以蘇子石斛陳皮貝母元參人參白芍等味治其上以地榆阿膠木瓜牛膝杜仲茜根椿皮等味治其下各為丸散分於（人良）前後十方（全愈）服不可總食症自安好（全上）

來天培治周殿先室年近古稀每病胸中痞塞背寒或時氣逆嘔吐有塊在脇下飲食不思數日稍痊或用山卮黃連木香吳萸香附等藥弗効診之六脈浮細而軟曰此肝腎氣虛上逆之症宜滋肝益腎養血扶脾引火歸源之劑用牛膝澤瀉歸芍枸杞茯苓山藥（即）萸肉沈香肉桂二劑諸症霍然後又復作服此而痊

有十士人憤於觀書忘其飲食忽有紫衣人立於前曰公不可以久思久思則我死矣士問曰汝何人也曰我穀神也于是絕思而食如故（醫說續編）

吳橋治方生年二十五內而早起栝腹而服勞無何發熱頭痛醫為內熱乃劑清涼三日汗流昏憒欲絕橋診之六脈皆不應指甚則微若蛛絲語其父曰即君甚危此癉乃虛脫也急宜重劑溫補即稍緩無及矣父唯唯煎服一劑而愈約及十月（近）全安（乃）（太函集）

方勉孝丁年病孱面生赤食與肌遞減矣即內即遺皆不害或病作日三四溺亦如常第多一行則自項領以上凡在頭顱面目髮膚忽若崩頹昏眩不支嗒焉欲喪遽進補劑久而無功逆橋診之心腎微數無力曰病得之既內而臨小溲忽受驚恐法當分治病者俛首唯唯於是早劑補腎晚劑補心旬月而愈（全上）

勞瘵

江陰萬融病勞四體如焚（骨蒸）寒熱煩躁一夜夢一人腹癢一月光明使人心寒及寤而孫元規使人遺藥至即服之遂平叩之則明月丹也乃悟所夢方用兎矢四十九粒硇砂如兎矢大四十九粒為末蜜丸梧子大（生）

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

望前以水浸甘草一夜五更初取汁送下七丸有蟲下急鉗入油鍋內煎殺三日不下再服（沈存中良方本草綱目）

一貴婦病瘵得神傳膏方乃剪草一味每用一觔淨洗洒乾為末入生蜜二觔和為膏以器盛之忌銕一日一蒸九蒸九曝乃止病人五更起面東坐不得語言以是抄藥四是服之良久以稀粟米飲壓之藥只冷服米飲亦勿太熱或吐或否不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常嗽血妄行每服一是可也既而九日藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥次日將服藥屋上土墜器中不可用合成將服為藉覆器又不得食再合未就而夫人卒矣夫藥之異如此（有）若小小血妄行只一啜而愈也是（此）藥絕妙惜（而）世失傳哉（惜）（全上）

阿魏散治骨蒸傳尸勞寒熱羸弱喘嗽方仍載續夷堅志阿魏三錢研青蒿一握細切向東桃枝一握細剉甘草如病人中指許大男左女右童便二升半先以童便隔夜浸藥明早煎一大升空心溫服服時分為三次次服調檳榔末三錢如人行十里許時再一服丈夫病用婦人煎婦人病丈夫煎合藥時忌孝子孕婦病人及腥穢之物勿令雞犬見服藥後忌油膩澁麪諸冷硬物服一二次即吐出蟲或泄瀉更不須服

餘藥若未吐利即當盡服之或吐或利出蟲皆如人髮馬尾之狀病即瘥吐利後虛羸魂魄不安以茯苓湯補之茯苓茯神各一錢人參三錢遠志去心三錢龍骨二錢防風二錢甘草二錢麥冬去心四錢犀角五錢剉為末生乾地黃四錢大棗七枚水二大升煎八分分三服溫下如人行五里許時更一服謹避風寒若未安隔日再作一劑以上二方須連服之（居易錄）

水邱先生歌訣水邱道人年一百煉得龍精并虎魄流傳此法在人間聊向三天助陰德扶危起死莫蹉跎此藥于人有効多不問陰陽與冷熱先將脾胃與安和脾經虛冷易生寒最是難將冷藥攻閉却大便并上氣為多厚朴與蒺藜此法精關兩道方病人入口便知良但須仔細看形候莫向陰中錯用陽涕唾稠粘小便赤乾枯四體無筋力烏龍膏子二十圓便似焦枯得甘滴遺精夢泄腹膨高咳嗽陰疼為患勞此病是陰須識認便當急下玉龍膏嗽裡痰涎仰卧難陰陽交併候多端却須兼服訶黎散治取根源病自安數調乃治脈之準繩安能玩忽而違其規者（準繩）

薛立齋治一婦人素勤苦因喪子飲食少思忽吐血甚多而自止此後每勞則吐數日瘵症已具形體甚倦

午前以補中益氣午後以歸脾湯送地黃丸而愈

一女子患前症反其唇視有白點此蟲蝕肺也薛云急尋獺肝治之不信果咳膿而歿後聞其兄弟三人皆天于此症大凡欠嗽當視其兩唇若上唇有點蟲蝕於上部如下唇有點乃蟲蝕於下部也

陳自明云昔有一女病勞瘵為尸蟲所噬服神仙追毒丸一粒吐下小蟲甚衆更服蘇合香丸遂愈（方見蟲症門）

陳又云一家患傳屍勞兄弟五人已死者三人有方士令服神仙太乙丹（全上）遂各進一錠一下惡物如膿狀一下死蟲如蛾形俱獲生其人即以此藥廣濟屍症

無不驗者余常用治一切禍病及瘡疽等毒未成膿者甚効其已成膿者亦能殺其大勢考其藥品雖不言補令贏瘦之人服之並効誠神劑也然以價計之用銀三錢藥有七十錠可救七十人有力之家當合之以濟人近人製此往往加以硃砂雄黃考之諸方並無此說禍入恐反亂其真也識者當自知之（方見蟲門）

孫文垣治程道吾婦夜為夢魘所驚時常暈厥精神恍惚一日三五發咳嗽面色青不思穀食日唯啖牛肉脯數塊屢治無効或謂寒痰作厥與附子肉桂厥益甚診之左脈弦右脈滑兩寸稍短道吾先娶二妻皆

卒于瘵知其為傳屍瘵症也不易治乃權以壯神補養之劑消息調理俟胃氣轉始可用正治之法人參茯苓柏子仁石菖蒲遠志丹參當歸石斛以補養神氣陳皮貝母甘草紫菀化痰治嗽服半月無進退乃為製太上渾元丹用紫河車一具辰砂鱉甲犀角各一兩鹿角膠紫石英石斛各八錢沉香乳香安息香茯苓紫菀牛膝人參各五錢麝香五分煉蜜為丸赤豆大每早晚鹽湯或酒送下三十六丸又製霹靂出獵丹用牛黄狗寶阿魏安息各一錢虎頭骨五錢啄木鳥一隻獺爪一枚敗鼓心破皮三錢麝香五分天靈蓋一个煉蜜為丸雄黃三錢為衣每五更空心葱白湯送下五分三五日服一次與太上渾元丹相兼服纔及半月精神頓異不似前時恍惚矣但小腹左邊一點疼即將前服方藥加用白芍一錢服之一月精神大好暈厥不作且至次年生一女子

張路玉曰胡又曾患虛勞吐血一夕吐出如守宮狀者一條頭足宛然俱備色如櫻桃不崇朝而即斃矣

柴嶼青治宗室某子十五歲咳嗽吐痰兩脈數細陰虧已極辭不治强開一方後屢邀請以為漸愈飲食加增勉為再往而脈氣如故決其必不能起後果然

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

勞損病已不可為服藥得法往往得驗驗乃虛陽暫伏也數服後症皆仍舊矣臨症者不可不知

張三錫曰常見氣弱者往往生子多羸或母病陰虛稟來已弱加以過勞及鑿竅太早斲喪天真遂成陰虛咳嗽吐血骨蒸非染也曾見一家五人患病此已殞其三家中競覓屍蟲之藥予以丹溪法治用大補氣血使陽旺生陰繼以大造丸進之二人俱保無恙

貴公在蜀作宣撫甚寶秘此法以膏肓之疾藥不能及熏之即効此方治咳嗽發熱骨蒸不已好雄黃三錢茜草二錢款冬花二錢烏元參三錢百部三錢艾葉

一錢雌黃五分雷丸厚朴作末以香爐有蓋者盛之用紙封固止留一小孔出烟令病人將紙塞鼻以口吸其烟久則少進清米飲日三次蟲死嗽愈一方加百部蕪荑仁蘇木熔黃蠟和攤紙上（鈐方醫說續編）

一人病傳尸勞疰遇異人授一神授九方用紅色真川椒去子及合口者以黃草紙二重隔之炒取存地砂盆蓋定火灰密遮四旁一時許去殼為末以老酒浸白糕和丸桐子大食前鹽湯服四十九至二勫吐一蟲如蛇而此與范氏製法各異特錄之耳（沈氏良方）

葉餘慶字元善平江人自云嘗病瘵疾其居對橋而行

不能度有僧為之灸膏肓穴得百壯後二日即能行數里登降皆不倦自是康强其取穴法並足垂手正身直立勿令俯仰取第四椎下兩旁同身寸各三寸灸時以軟物枕頭覆面卧垂手附身或臨時置身取安便而已葉轉為人灸亦用此法云爾（針灸四書全上）

有人傳屍勞瘵寒熱交攻乆嗽咯血日見羸瘦先以三拗湯及蓮心散工方煎服萬無失一（治法全上）

昔人嘗與勞病婦人交婦人死遂得疾遇異人云此乃勞氣已入藏中急令服神授散二觔其病定去即如其言服之幾盡便出一蟲狀若蛇遂安續有人服之獲安濟者衆矣此散甚善用川椒二觔擇去子并合口者炒出汗石藥為末每服三錢須待空心用米湯調和送下必暈悶少頃如或不能自禁即以此藥將酒糊為丸粒如梧桐子大空心服三五十丸（危氏方全上）

李士材診許氏女吐血痰嗽六月診之兩尺如爛綿兩寸大而數曰金以火為仇肺不浮溢反得洪大賊脈見矣秋令可憂八月五日復診之肺之洪者變為細數腎之軟者變為疾勁曰歲在戊午少陰司天兩尺不應今尺當不應而反大寸當浮而反沈細尺寸反者死肺至懸絕十二日死（據經謂肺至懸絕十二日死今于八月五日診得其

脈故作如是斷又安知其脈
果于八月五日始變乎否計其期當死于十六日
然能食者過期況十六十七兩日皆金未遽及也十
八日交寒露又值火日經曰太陰氣絕丙日篤丁日
死言火日也以天干言十六十七皆金則十八為水
以地支言十六十七為金則十八日為土又云丙篤丁死則十六十七為金
庚辛當至二十三四日為丙丁也寅時乃血氣注肺
之時不能主則絕必死于十八日寅時矣病家以其
能於進食不肯信其所言果至十八日未晚而終
徐書記有一室女患病似勞求醫治之乃延一僧人發
靖診之曰二寸脈微伏是憂思膈氣而勞請示病實
庶治之免無誤矣徐曰女子夢吞蛇漸成此病靖謂

有蛇在腹用藥轉下小蛇其疾遂即痊愈靖密言非
蛇病也因夢蛇憂過感疾當治其意而不治病其蛇
亦非臟腑中所出此吾亦與其轉藥也名醫錄醫說續編著
傅青素博脈道主醫甚神時有丁父抱患勞瘵之疾求
為診治傅公教之以運氣未及三日果愈劉紹攽九畹古文
晉平有病求醫于秦秦伯使醫和視之曰疾不可為是
謂近女室疾如蠱非鬼非食或以喪志良死將死天
命不佑公曰女不可近乎對曰節之淫生六疾六氣
曰陰陽風雨晦明也分為四時序為五節過則為災
陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾

明淫心疾女陰物而晦時淫則生內熱惑蠱之疾今
君不節不時能無不患及此瘥之累者哉
蔡仍子因之妻九院王家女也忽患瘵疾沉綿數年既
死已就小斂時乃上皇宮中聞之曰惜其不早以陽
冰丹賜之今雖已死姑令此丹試救之因命中使馳
賜一粒時係氣息已絕乃強而灌之須臾遂活數日
後而安但齒皆焦落後十五年方殁 張邦基墨莊漫錄
吳洋治汪伯玉父妾病瘵汗淫淫而渴骨蒸蒸而內爍
其肌膚洋以人參白虎湯飲之病減半曰此胃爍也
急治其標自今宜主補中毋以悍劑歲至乃可刈其
根爾越二載中氣復乃出驅蟲藥下二蛸蛸黝而殷
長尺有咫 太函集
吳橋治吳氏婦瘵三年隣家有事庖厨相去百步必先
言食品乃求食其母憐之日餽一雞餉之橋曰此傳
尸蟲下之便家人曰凡死于是者七人矣願除之飲
藥三日腹痛甚下二蛸尺有咫大如箸赤首黝背頼
腹狀如玳瑁然七日乃下七蛸其後者差小爾蛸既
下婦不復求食母餉之雞則以餉諸御人其母叱御
人攘吾女而自啖也卒強之食遂作瀉而終然其家
故病傳尸迄今無患矣 全上

方大漱故病瘵且成賴橋而治既病食痺疑癉幾殆亦復賴橋會橋出彊其人不戒而病作虛火中否日恃粥而啜二三陰火上騰自涌泉起喉喑欬血盜汗夢遺舉身潮熱而羸泄瀉不止橋歸復診之六脈沈數而弦蟲內蝕爾下之得羣蟯形皆異狀并又去其瘕瘕便即尋愈而安 仝上

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷十六

錢塘魏之琇玉橫撰

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

吐血

孫文垣治程兩峯與乃姪有芥蒂偶飲姪家歸覺腹中脹滿嘔噦不寧次日面目皆黃此瘀血發黃也惡寒發熱醫作瘧治五心皆熱下午潮熱煩躁且鼻衄腹痛大便黑如墨吐黑血如爛猪肺者椀許狀如中蠱心疑乃姪毒之再召醫率見其目珠如金面若熏橘腹大有

塊如楪堅硬兩手浮腫四肢冷小水赤飲食不思皆辭不藥舉家號泣欲爭鬨診之其脈左濇右滑滑主痰飲濇主瘀血所吐下者皆瘀之驗實非蠱也彼謂生平頗謹疾是瘀自何而致曰怒則傷肝甚則嘔血不嘔則瘀於經隧滿而溢也彼乃始悟用當歸尾三錢赤芍丹皮川芎各一錢五分元胡索五靈脂桃仁各一錢滑石茜根各二錢煎飲下黑物甚多惟腹中仍痛堅塊未軟前方加用青皮山查酒蒸大黃服之大便三次所去皆瘀與瘀自此腹減塊消黃退足尚腫改用六君子加炮薑茜根滑石青蒿服而全愈

蕭萬興之表姪媳脾胃素熱兼因感冒風邪目澁鼻乾自用薑湯服之連接三晨咯血數口復又恣飲藕湯益增煩脹夫所謂外感者係由外而入亦必令其從外而出薑湯獨力既難奏效藕湯涼澁復閉外邪用解表劑加入芩連花粉等味煎服一劑而愈

姜子社少婦潮熱喘咳經水溢少每鬱則膈脹拒食偶啖辛熱咯血口乾脈弦滑微數蓋專甫及笄陰血未克五火易動因循不治亦能成瘵以六味丸加黃芩炙草知母麥冬阿膠為丸服至月餘諸症如失

孫文垣治汪希明年弱冠性躁素有痰火舊曾吐紅醫

用收澁之劑太早致痰瘀留滯經絡且為炙肺俞膏肓咳不能睡又誤作風邪投發散之劑不思火盛得風其勢愈熾血從口鼻噴出勢如泉湧診之六脈洪數身熱而煩又時當三伏內外之火夾攻非釜底抽薪之法難奪其上涌之勢乃以三製大黃三錢石膏五錢黃連茜根滑石各二錢丹皮一錢急煎飲之大便微行二次血來少緩即用石膏滑石冬青子各三錢旱蓮草茜根各二錢黃連山巵貝母各一錢茅根五錢煎服血乃止後遇大便燥結進當歸龍薈丸咳嗽血則與二冬二母瓜簍白芍黃芩黃連茅根茜艸

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之類痲全瘡矣夫病有六不灸火盛者不灸此由誤灸幾殞於命故特書之以為好灸者戒耳

臟六老上吐血下瀉血胸脇背心皆脹原因惱怒又傷食犬肉故發熱而渴醫者皆作陰虛火動為滋陰降火治之病愈甚甚診之兩關俱洪滑有力曰此肝脾二經有餘症也經曰怒傷肝甚則嘔血并下洩胸背脹痛瘀血使然脾為犬肉所傷故不能統血令誤用滋陰苦寒之劑是以脾益傷而上焦瘀血愈滯下惟調氣健脾兼之消導則萬全矣六老曰人皆謂勞怯故發熱吐紅血上吐陽絡傷也血下行陰絡傷也陰

陽俱傷法當不治今謂非陰虛何也曰脈數無力者為陰虛今洪滑有力凡陰虛之熱發于申酉間夜半而退如潮汎然謂之潮熱今熱不分晝夜安得謂之陰虛乃與山查香附枳實調氣消導為君丹參丹皮桃仁滑石茅根化瘀為臣黃連蘆根解犬肉之熱為佐薤服四帖胸背寬血吐止惟腹中不舒仍以前藥並同丹溪保和丸與之四帖下黑穢半桶而安愈

陸養愚治少司馬陸北川原有痰火因感冒後復觸大怒夜熱嗽咳見紅先服童便數鍾血止咳亦不甚清晨復吐血甚多而嗽亦頻醫謂年高濃于房事投滋陰降火犀角地黃湯及六味加知柏之類已五日喘急倚息不眠畏寒特甚脈之兩寸關浮洪而滑兩尺稍沈數曰此感冒未經解散今將入裡蓋初以童便陰涼遏之致外感內鬱二火皆無所洩逆而衝上也然脈實症實終屬有餘之邪今尚畏寒表症猶在而喘急衝逆陽明之逆熱尤甚因用乾葛石膏為君桑皮前胡杏仁蘇子為臣薄荷黃芩為佐甘草木通為使二劑減十之七寸關已平尺尚洪數乃以前劑加用元明粉三錢服一劑出稠穢甚多諸症全愈矣

陸肖愚治妻兄費光宇七月間薄暮歸家飲酒數杯心

口便覺不快隨吐出吐後出痰沫盆許繼之以血椀
餘頭旋眼黑遍身汗出如雨漸熱但可靜卧稍動即
吐吐即有血口極渴而湯飲不敢進或與藥亦吐而
血隨涌出脈之數大無倫按之則虛面如烟塵（汗多口渴）
（面垢非暑而何可入暑門）曰此勞心而兼傷暑熱也血由吐出吐
因動發令無動以井水調辰砂益元散徐飲之約水
一礶藥計八九錢遂睡半日方醒人事清爽熱退吐
止但只倦甚以生脈散而調理數日（而愈）痊安
鍾鳴宇苦志螢窗忽吐血椀許醫以芩連扈柏生地白
芍輩投之一帖而止後數日喉中復有血腥似有洶
涌之意又投前劑亦一帖而止漸發熱咳嗽痰紅又
以吐血咳嗽為陰虛火旺故以滋陰清火療之逾兩
月不減而大便不實面黃帶青喘促聲啞不能倒卧
胸膈痛應于背脈之兩寸不起兩關尺沉遲曰寸脈
不起上焦有瘀也關尺沉遲中下有寒也（此寒要是多服苦寒所致）用元胡索紅花茅根蘇木丹皮紫菀桑皮貝母枳
杷葉大料濃煎徐徐服之又以白朮乾薑茯苓澤
瀉陳米為丸日三服煎藥僅二劑而喘痛減又服二
劑而聲音稍為清爽再進丸藥約於二兩瀉亦漸止（而）
事於十日諸症俱瘳以補氣養榮湯調理之

閔巽峰性煩急素有痰火三月間患吐血醫以濇藥止之血止而喉間常有腥氣至六月醫令乘伏天灸之自永不發矣灸後半月忽一日血從口鼻噴出勢如泉涌脈之六部洪數身熱煩渴乃用芩連石膏丹皮紅花犀角等藥連進二劑不甚減以潤字料合桃仁泥丸之頓服五錢少頃又進三錢連數行出稠痰瘀血缶許身涼血止稍得安睡以前湯加生地數劑服之後又去犀角紅花加用天冬花粉便結則用前丸進之調理五十日血全止矣半年又始復故

潘碧泉女年十八經行有拂意事致悲極一月後患吐血每吐椀許日晡潮熱飲食不思醫以犀角地黃湯投之心下痞塞嘔吐或痰或血或酸水脇肋亦時時脹痛診脈洪大而弦此有瘀血也舊者凝滯則新者漸積故溢而妄行法當通其瘀則血自歸經矣以潤字丸配桃仁紅花合丸之日進三服另以調氣養榮湯間投之去瘀垢甚多熱退經行而吐血亦即止

喻嘉言治黃湛侯素有失血症一日晨起至書房陡爆一口傾血一盆喉間氣涌神思飄蕩壯熱如蒸頸筋粗勁診其脈尺中甚亂曰此昨晚大犯房勞自不用命也因出驗血見色如太陽之紅其僕云此血如穿

猪後半之血其來甚遠不謂痂人有此確喻也再至寢卧之室謂曰少陰之脈縈舌本少陰者腎也今腎中之血洶涌而出舌本已硬無法可以救急因諦思良久則曰只有一法不得已用丸藥一服隆實元氣若能得氣轉回丹田尚可緩圖因煎人參濃湯下黑鉛丹三十粒喉間汩汩有聲漸下入腹少頃舌柔能於言語但聲不能出再亟用潤下之劑以繼前藥遂以阿膠一味重用兩許溶化分為三次乘熱飲服既以熱湯半日服盡身熱漸退頸筋漸消能進薄粥再與補腎藥連服五日聲出喉清人事向安但每日尚出深紅之血盛許又因時令太熱遵內經熱淫血溢治以鹹寒之旨多加秋石服之遂愈

劉筠枝長男病失血歲發二三次其後所出漸多咳嗽發熱食減肌消寒熱如瘧每夜達曙得微汗始解後更下利服參朮胸膈迷悶喉音窒塞服茯苓山藥收製紅鉛末下黑血塊數升胸膈頓舒面容轉乃翁神之以為得竹破竹補之法也即用桂附二劑于是下痢晝夜十數行飲食難入神識不清診之脾脈大而空腎脈小而亂肺脈沉而伏命疏方并問何症曰此症患在亡陰乃用峻熱之劑行期在立冬後三日以

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

今計之不過信宿無以方為也經云暴病非陽火病非陰則數年失血其為陽盛陰虛無疑況食減而血不生漸至肌消而血日槁虛者益虛盛者益盛勢必陰火大熾上炎而傷肺金咳嗽生痰清肅下行之令盡失由是腎水無母氣生無以蔭養百骸柴柵瘦損每申酉時洒淅惡寒轉而熱至天明微汗始退政如夏日炎蒸非雨不解身中之象明明有春夏無秋冬治宜亟使金寒水冷以殺其勢乃因下利而用參朮不知肺熱已極止有從皮毛透出一路今補而不宣勢必移于大腸傳為腸澼矣至服紅鉛下黑血者蓋陽分之血隨清氣行至胸中為膜原所蔽又瘀膈間者得經水陰分下出之血引之而走下竅聲應氣求之妙也又積暫寬而色稍轉言笑稍適者得其下之之力非得其補之之力也乃平日預畜此藥必為方士之所惑見為真陽大藥遂可放膽加用桂附致盡劫其陰惜此時未得止之今則兩尺脈亂火燔而泉竭脾胃脈浮下多陰亡陽無所附肺脈沉伏金氣縮斂不行神識不清魄已先喪之矣勢已迫然安能挽回其癒者哉

張景岳治倪孝廉年逾四旬素以思慮傷脾時有嘔吐

之症過勞即發服理陰溫胃之屬煎飲即愈近于暑
末時因連日交際致勞心脾遂上為吐血下為瀉血
俱大如手片或紫或紅其多可畏醫謂因勞而火起
心脾兼之暑令二火相劑所以致此乃與犀角地黃
童便知母之屬兩劑其吐愈甚脈益緊數困憊垂危
乃云脈症俱逆不可為也診之則形勢俱劇用人參
熟地乾薑甘草四味大劑與之初服如舊次服覺嘔
惡稍止脈亦畧有生意再加炮薑附子各二錢人參
熟地各一兩白朮四錢炙甘草一錢茯苓二錢黃昏
與服大睡覺而血嘔皆止遂以溫補調理旬日復健

如故此症係由勞傷脾而氣虛不能攝血且又時
當火令而症實非火也誤用寒涼脾敗而死矣後有
史姓等數人皆同此症悉以六味回陽飲活之也
李士材治張鳴之吐血兩年面色癀黃潮熱咳嗽隔有
微痛脈數而沈且搏痛不可按而甚于夜分是堅血
畜積非大下之不可又以久病未敢峻攻用鬱金降
真歸地山甲蓬朮人參下血如漆者數次而痛減月
餘復痛此藥輕而病重也乃以大黃乾漆蓬朮鬱金
山甲肉桂歸尾桃仁蟲蟲為丸每日服參者之劑午
後服丸藥錢許十日血積大下數次而愈此案出於醫通

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

章氏子吐血發熱遺精盜汗形肉衰削先有醫戒之勿服人參若誤服無藥可救治之勿効延李診曰此脾肺氣虛之候非大劑參耆不可病家曰前醫戒之甚嚴而君用之甚多何相懸也李曰此醫能任決効否曰不能也李曰請易參五觔毋掣其肘期于三月可以報績也彼竟信而從法治之遂用六君間以補中益氣及七味丸等盛療之日輕一日果如所約而愈

須尚寶林下多鬱且有暴怒吐血甚多倦怠異常李以六君予納參一兩熟乾薑一錢木香八分四日而血止後因陡暴怒氣血病又復大作再延李至診治先以平肝繼當大補然而夏令見於秋脈即所謂早見非時之脈當其時不能再見矣果如期而歿矣

董元宰少妾吐血蒸嗽先用清火繼用補中俱不効李脈之兩尺沈實因曰少腹按之必痛果然此怒後畜血經年不行乃為蒸熱熱甚而吐血陰傷之甚也乃與四物湯加鬱金桃仁穿山甲大黃少許下黑血升餘少腹痛仍在更以前藥加大黃三錢煎服又下黑血塊及如桃膠蜆肉者三四升腹痛乃止虛倦異常乃與獨味參湯服之連飲三日而熱減書十之六七再與服十全大補湯計有十百餘劑而痊愈如初

唐主政勞心太過因食河鮮吐血有痰喉間如哽日晡煩熱喜其六脈不數惟左寸濇而細右關大而軟思慮傷於心脾也以歸脾湯料加丹參麥冬生地等味服二十劑症減六七兼服六味丸三月遂不復發

馮氏女發熱咳嗽已半年十月間吐血甚多一日之內不過食粥一盞大肉消陷大便溏泄惟沉困卧牀脈來七至李曰法在不治人所共知若能惟余是聽不為旁撓可救十中之一每帖須用人參五錢桂附各一錢耆朮三錢歸芍二錢陳皮一錢日投三帖進七帖及壯水丸三觔而後起又三月飲食如常矣

此三案當接抄在潘碩甫案後尚書言案上

陸祖愚治俞姓人素性急躁善怒一日忽吐血七八梡自熱氣喘腹脹滿終夜不寐飲食不進自用滋陰止血藥而愈甚脈之六部俱如彈石將及七至右關更勁腹上一捺血即噴出此有餘之症也乃與小陷胸湯二劑加鐵鏽水明日症減半第大便七八日不行必下之方愈以潤字丸加桃仁合丸之書其帖曰止血丸服之夜下瘀血宿垢半桶而吐血頓止矣

吳以實子年十六患吐血面色瘦黃形容憔悴泄瀉肢腫向有夢遺近來更甚六脈虛數或與清涼之劑紅減而發熱作嘔腫瀉更甚誠所謂以寒涼治百無一

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

生也乃與開胃温中健脾養血之劑月餘便實腫消熱退食進後用六味丸加知栢杜仲枸杞牡礪麥冬五更吞服又與煎藥五十餘劑諸症脫然

滁州趙使君云其族姊為尼住新淦一寺忽苦暴吐血發寒熱欲作勞氣而未成醫者不肯治偶一士大夫說用童子便調下花蕊石散花蕊石一觔上色硫黄四兩右和勻先用紙泥封固瓦礶一个入二藥仍封固陰乾如急用以焙籠內炙乾用炭煅赤去火次日取細研每服一錢童便熱酒下并治胎衣不下及瘀血內積致大小便不通如神良方不數日而愈此後亦多有人服得效是齋方 醫說續編

盧不遠云千金方用藥動輒數觔習見吾儕不過兩許令人不敢動手看立齋案又進一步庚子孫孝廉吐血十日夜危坐不敢交睫不敢傾側否則血奔射出以六味丸全料加用安魂之藥煎服而愈此條火象也以潤下劑平之病熱熾烈豈能杯水可救倘有識見者放膽用藥則多多益善矣 芷園臆草

盧不遠臈月十七圍爐坐大半夜次日爪甲盡折先自十月間暴怒頓足叫呼氣喘食頃茲復火為寒鬱漸覺神思昏瞀至二十七夜困房後惡寒泄瀉平旦且止至暮復作明日又止至開正五日意為腎瀉服四

神丸一大劑瀉痛竟止初肛左有核其疼漸近尾閭不可反側以熊膽水化塗之立覺涼氣直上肺左疼漸緩（火毒悉內竄矣）中夜吐痰痰內見血一二點辰時痔出白膿竟可起坐十一日方話頃血從咳至作意忍定煎六味丸料服夜半睡覺血即上涌如潮喘聲如鋸乃進童便及六味煎藥氣稍定纔聞薑湯氣血即涌平旦始緩晝夜再發如前寐即背心蒸熱醒即血來咽喉如截斷至十三早議下莫敢應至晚勢急似無生理乃用瀉心配血藥下之不應時方寒沍用水調大黃末服轉欲去衣被啜芩連苦寒如甘旨至五更强進清米飲藥力忽轉即解黑糞瘀穢人不可近凡三次血來少平至十五日寅時立春與進建蓮濃煎呷之甚美少間足心汗出次及手心背心暮又吐鮮血數口以赤小豆連翹合瀉心方法服之覺上身氣即開後大便如青泥次下如錢彈者二三枚血方淨盡溯病之由以火鬱誤認腎虛服四神丸致禍幾死良醫自病猶爾矧其他耶（此正諺有云盧醫不自醫）

馮楚瞻治楊某吐血之後大渴不止兩寸脈洪關尺甚弱此陰血暴亡臟腑失養津液燥槁陰火上炎名為血渴也以熟地三兩麥冬五錢五味子一錢附子二

錢濃煎二椀代茶飲之日三劑渴止而寸脈和平若作胃火妄用石膏屈子芩連反激陰火上炎益增煩渴躁喘之患矣喻嘉言曰津液結則病津液竭則死故凡治病而不知救津液者真庸醫也

吳孚先治何氏女患吐血咳嗽食減便溏六脈兼數左部尤甚醫用四物湯加黃芩知母吳曰歸芍辛窩吐血在所不宜芩母苦寒傷脾在所禁用乃與米仁玉竹白芍枸杞麥冬沙參川斷建蓮百合等丸味共煎與服二十劑脈氣稍緩至五十劑即全瘳矣

林西仲春間患吐血醫用苦寒過劑胃口不開大便不實脈之左關沈弦右關弦弱得之勞神傷脾而後鬱怒也宜歸脾湯合逍遙散加蓮實為丸補脾開鬱乃愈

王監司妾吐血既久猶進苦寒脈乳帶數不思飲食大便微溏此傷服涼劑太過已致陰陽兩受損也宜用人參蓮肉山藥麥冬五味白芍兼左歸丸而愈

汪氏婦飲食觸怒嘔血數口胸膈遂致脹痛兩脇尤為劇甚左右二關弦緊倍常用芍歸枳朴青皮山厄丹皮藕節降香紅麴山查香附等味兼服左金丸而瘥

張卿子治月塘沈文學咯血為處一方退謂其友曰當小愈再發則不可治矣易他醫果愈閱數月死友駭

之請玉其何過曰一日咯血遂牀蓐卧此不獨心肺傷即五臟亦皆損矣得稍延者年壯參力勝也仁和縣志張路玉治湯刑部年逾八十有二歲忽患痰中見血服諸寇（寇）嗽止血之藥皆無應動脈得氣口乱大兩尺微緊面色槁白屢咳痰不得出咳甚方有黃色粘痰此精氣神三者並虧又煞傷于熱耗其津液因欲動肺胃兩經之血也其平時多火不受溫補遂以六味丸合生脈散加用葳蕤煎膏服之取金水相生源流俱澤不必用滿痰止知血之藥而咳血自能除退也錢曙昭父患咳吐血四五日不止不時鬧熱面赤或時成盆成椀或時吐粉紅色痰夜熱自汗一夕吐出一團與魚腸無異襍于鮮血中薄暮驟涌不已神昏欲脫灌童便亦不止因思瘀結於肉之物既已吐出正宜峻補遂與進獨參湯稍定緣脈數疾無力畧加肉桂炮薑童便等少許因勢利導以飲虛陽之逆一夜盡參二兩明晨勢稍定血亦不來糜粥漸進脈息漸和改用六味丸作湯調補真陰半月平愈而愈

張飛疇治蘇氏子新昏後暴吐血數升命煎人參五錢入童便與服明日醫謂人參補截瘀血難以輕用議進生地山茹牛膝等味張曰六脈虛微而數無瘀可

知血脫益氣先聖成法若謂人參補瘀獨不思血得寒則凝反無後患耶今神鬼無主轉側昏暈非峻用人參何以固其元氣之脫乎遂進參一兩二服頓安次與四君保元六味間服後以烏雞丸調理而痊

楊乘六治汪聞遠病血症午後發熱倦怠嗜卧四肢痠軟五心煩熱或用涼血清火之劑兩月餘益劇更醫曰弱症已成不可為矣診之察其面黃而瘦舌黃而滑右寸關大而緩左寸關細而緊兩尺俱洪而旺據症合色與脈乃脾肺氣虛下陷不能攝血歸經也其胸中必惡心漾漾其血色必鮮紅而散（立齋治星士以血散為勞傷肺氣）詢之曰然遂以補中益氣倍參耆朮草加白芍五味炮薑與之曰弟服此藥血自可止身自可涼諸症亦自可退矣服至四劑果如所言繼用養榮加附子作為丸早晚兩次每服五錢兩月而安健

孫丙章患吐血咳嗽發熱飲食不思怔忡不寐健忘驚悸肌肉漸減肚臍右側有塊作痛或用消瘀理血滋陰清肺等劑俱不應病轉劇其家疑成怯症脈之左寸犯大右關結滯兩尺洪盛面色白中泛紅舌色淡黃不燥不滑症乃思鬱傷脾不能統血歸經致血虛發熱血燥作痛其塊必不潤而長而橫而豎形若鐮

刀非瘀亦非痞也乃脾也而居胃旁者也血盈則潤而軟血少則燥而痛凡鬱怒甚與思慮重者類多患此內經所謂二陽之病發心脾男子則隱曲不利女子則月事不來正此病也其傳為風消為息賁者不治今肌肉雖減氣猶未急亟救三陰病尚可痊乃用歸脾湯去木香加白芍五味送都氣丸兩月而愈

柴嶼青治甘州太守高棠溪在藩陽工部時忽吐血醫教用涼血止血之藥及診其脈皆安靜曰君教讀心勞偶動相火血隨而升若服止血藥則遺患不淺力勸其勿服此藥之為是也次日口吐淡血三日之後血即止矣然後調理進藥數劑可杜永不復發也

丁酉春諱法海少女患痰嗽四十餘日不能卧卧即兩腔發脹惟背擁枕蓦跌坐而已且吐血成椀醫與消痰止血藥不効診之兩脈浮滑曰此肺脹也弗止血當活血遂用四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝因藩陽無竹改用瓜蔞服下即血止安睡調理數月而瘥

戶部正郎李紫垣咳嗽身熱吐血不止屢治增劇檢其方均止血補血重劑脈之兩手尚和緩惟右寸關洪大乃脾胃風熱為藥所閉以致發熱卧牀遂用清理肺胃之劑數日後身涼勢減調養一月而安大凡諸

見血症脈貴沉細設見洪大後必難治前症洪大乃
因補藥壅瘀而然原非本脈故得收功總之血症初
起別無外邪者先應消血佐以潤下之劑使敗血下
行後用止血藥以杜其根服補血以復其元庶無後
患倘因內傷暴吐不止或勞力過度其血妄行出於
泉湧口鼻皆流須臾不救則死是又不拘前例急用
人參一二兩為細末入飛羅麪一錢新汲水調如稀
糊不拘時啜服或獨參湯亦可蓋有形之血不能速
生無形之氣所當亟固若真陰失守虛陽泛上亦大
吐血須用八味六味湯固其真陰則又不可早用人

參也嘗見患此症者甚多若不辨別六經脈症任意
混治貽害不淺故不憚瑣瑣而詳於載之者

呂東莊治從子園丁忽咯血求診視其血鮮紅中間有
紫小塊脈之濡濇色白問胸中作惡否曰然時頗作
痛直映至背曰知之矣用桃仁泥三錢紅花三錢合
理中湯加桂一錢戒之曰頻服之必有黑血大至待
黑盡而鮮者來乃再來告丁如言吐痰積數升胸痛
即平復來求診則脈圖實矣與以理胃養胃之劑復
又用填補命門丸子一料煎而進服即時全愈

立齋治一男子鰥居數年素苦勞則吐血發熱煩躁服

犀角地黃湯氣高而喘前病益甚更遺精白濁形體倦怠飲食少思診之其脈洪大舉按有力議服十全大補加用麥冬五味山茱萸山藥等味煎飲而愈

儒者楊啟元素勤苦吐血發痙不知人事此脾胃虛損所致宜以十全大補湯及加減八味丸與其薰服痙即愈矣再用歸脾湯進之血止全安

一男子咳嗽吐血熱渴痰盛盜汗遺精用地黃丸料加麥冬五味治之而愈後因勞怒忽吐紫血塊先用花蕊石散又用獨參湯漸愈後勞則咳嗽吐血一二口脾肺腎三部皆洪數用補中益氣六味地黃全愈

辛丑夏薛在嘉與屠內翰第遇星士張東谷談命特出中庭吐血一二口云又有此症遇勞即作余意此勞傷肺氣其血必散視之果然與補中益氣加麥冬五味山藥熟地茯神遠志服之而愈翌早請見云每服四物黃連山巵之類血益多而倦益甚得公一匕血頓止神思如故何也曰脾統血肺主氣此勞傷脾肺已致血妄行也故用前藥已健脾肺之氣庶幾噓而得以歸於源本耳

一婦人素勤苦冬初咳嗽吐痰發熱又而吐血盜汗經水兩月或三月一至通身作痛或有醫用清熱化痰

等藥服下口噤筋攣乃為用加減八味丸及補中益氣加入門冬五味山藥等與其服治年餘而瘥

李東垣治鄭仲本年二十三歲因心痛服丹附等藥得上氣病膈兩脇急迫脹觸不快便時嗽咯出血病形漸瘦大便燥而難脈象弦數夜間畧發微熱飲食稍減因與燈籠草和節麻黃細末以白朮桔梗木通甘艸湯調服十有餘劑病即減去其半再用通聖散去石膏為丸以桃仁湯下之症占安愈

朱丹溪治一婦人年五十六歲盛夏忽患吐紅痰有一二聲嗽用人參陳皮茯苓各一錢白朮一錢五分防

風桔梗各五分乾薑三分甘草一分煎二之一再入藕汁二大蛤再煎帶熱下三黃丸

吳丞相冲卿忽吐血孫兆用水澄蚌粉研細入辰砂少許米飲調下二錢日三服遂安兆秘此方吳以術得之韓子功方用朱砂一錢真蚌粉半錢（醫說續編）

張子和治岳八郎常日嗜酒偶大飲醉吐血近一年（年疑斗之訛）身黃如橘昏憒發作數日不省漿粥不下強直如厥兩手脈皆沉細張曰脈沈細者病在裡也中有積聚用舟車丸百餘粒瀟川散五六錢大下十餘行狀如葵菜汁中燥糞氣穢異常忽開兩目伸挽問左

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

右曰我緣何至此左右曰你吐血後數日不醒張治之乃醒自是五六日必瀉凡四五次其血方止但時咳一二聲潮熱未退以涼膈散加桔梗當歸各秤二兩用水一大盂加老竹葉入蜜少許同煎去滓時時呷之間與人參白虎湯下之不一月痊愈復故

李氏範初病嗽血以調胃湯一兩加當歸使服之不動再以舟車丸五六十粒過三四行又嘔血一椀若庸工則必疑不再宿又與舟車丸百餘粒通經散三四錢大下之過十餘行已痊愈過半仍以黃連解毒湯加入當歸煎服之次以草莖鼻中出血半升許臨晚又以益腎散與服遂不利數行症即退除而乃愈

何伯庸治郤某者吐血數升而仆於地氣已絕矣何見其血色曰知其未死也即以獨參湯灌之而愈雲南通志

朱丹溪治一男子家貧而多勞十一月間得一寒病時吐三兩口血六脈緊澁一日食減中醫投溫膽湯枳桔湯三日後發微熱口乾不渴口中有痰此感寒也中寒內傷詢之云因十日前霜中曾三四次渡溪水心下有悲泣事腹亦飢餓遂以小建中湯去白芍加桔梗陳皮半夏等味服四貼即痊安而

秀州進士陸寧忽得吐疾吐血不止氣促驚顫狂躁跳

躍雙目直視及至深夜欲扳戶而外出如是者兩夜
吳醫士遍用吉方極治不能瘳舉家哀訴所奉觀音
夢間授賜一方可以當除根本用益智一兩生米二
錢青皮半兩調服陸覺筆記之明日療治病愈辛志
薛立齋治一婦人素性急患肝風之症常服搜風順氣
丸秦艽湯之類後大怒吐血唇口牽縮小便頻數或
時自遺此肝火旺而血妄行遂用小柴胡湯加山巵
丹皮漸愈五年之後又大怒吐血誤服降火祛風化
痰之劑大便頻數胸滿少食用清氣化痰之劑嘔而
不食頭運口乾不時吐痰用導痰降火之類痰出如

涌四肢常冷薛曰嘔而不食胃氣弱也頭運口乾中
氣不能上升也痰出如涌脾氣不能攝涎也四肢逆
冷脾氣不能運行也用補中益氣加茯苓半夏等味
治之諸症漸愈又用加味歸脾湯兼與進服而安
一老婦每吐血先飲食不進或胸膈不利或中脘作痛
或大便作瀉或小便不利此肝脾之症用逍遙散加
山巵茯神遠志木香而愈後鬱結吐紫血每作先倦
怠煩熱以前藥加用炒黑黃連三分吳茱萸二分服
之頓痊復因怒氣又吐赤血甚多燥渴垂死此血脫
也法當補氣為是乃用人參一兩茯苓當歸各三錢

陳皮炒黑乾薑各二錢炙甘草木香各一錢服一劑下頓止又用加味歸脾湯進之調理而痊愈

一女子懷抱素有鬱結胸閒滿悶飲食少進吐血面赤用六味丸及歸脾加入山卮貝母白芍而愈

一婦人為哭母起患吐血咳嗽發熱盜汗經水不行此因悲傷肺思傷脾所致也宜朝服補中益氣加用桔梗貝母知母夕用歸脾湯送六味丸下之安愈

陳良甫治一婦人月經不利忽安行嘔血察其形脈如常用四生丸即安復（此四生丸之方用生荷葉生艾葉生柏葉生地黃四味共研末和丸如雞子之大每服一丸用水煎服）一男子飽食負重而吐血用前湯及青餅子而愈（此以下發明上言似立齋兩言之意也）世治吐血並用竹茹地黃藕汁亦不可拘泥如陽乘于陰血得熱則流散經水沸溢理宜涼解大黃犀角之類如陰乘于陽所謂天寒地凍水凝成冰須溫散乾薑肉桂之類

陳日華云先公紹興初嘗遊福清靈石寺主僧留飯食將竟侍者赴堂齋罷來侍立見桌子上不穩急罄折極之舉首即嘔血蓋食飽拗破肺也明年再到寺問去年嘔血者無恙否主僧言服得四生丸遂愈自得此方救人有効者衆皆薛意前症乃內熱暴患用之故有効也若知人病既久本元不足須補脾以滋化

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

源否則虛火上炎金反受剋獲生者鮮矣

一婦人苦于吐血之症百藥不効後用童便及酒調花蕊石散進之不數服而即安復如故（方已附後斯事載也）

僕嘗治一人吐血診其脈肝部弦氣口濡此因怒極而得之也遂用蘇合香丸和雞蘇丸服之即効（良方）

易思蘭治吳大司馬甲戌季春卧病兩月發熱咳嗽痰喘氣急胸膈痞滿手足面目俱浮腫衆惟清金寧嗽又以脾胃爻虛發腫用利水兼補劑其病益甚診其脈左寸浮而無力左關弦長推之于外內見洪大而乳侵過寸部一分左尺沈弱無力右寸沈而帶乳氣口脈按之緊而且牢時或一駛右關中和無力右尺隱隱不動夫心乃一身之主腎為性命之原二脈不病雖危不妨唯以右寸并氣口斷之寸口沈而乳非痰乃血也書云弦駛而緊沉細而牢六部見之皆為積聚今氣口緊而駛此血在肺胃間壅滯其氣氣滯則血凝乃積血症也時值季春地氣上升因用越法治之進以暢胃豁痰湯蘇梗桔梗蒼朮各四分香附貝母各五分連翹三分前胡撫芎赤芍各六分辰時服藥至午未時氣急小便全無（氣隨藥升也）將暮吐紫黑血二三升臭不可聞症頓減八九六脈豁然曰半夜

時當有汗（氣因陽動也）可預防之無令太過至期果然次日脈氣和平惟咳嗽常有二三聲以枳桔二陳湯加香附歸尾茜根茅根童便調治三日上部之疾全愈但脾腎之脈無力飲食少味四肢倦怠再用六味丸早晚百丸午以補中益氣湯加麥冬酒連調其中半月後氣體充實而痊血凡在肝脾當用血藥血在肺胃宜用氣藥開提其氣解散其鬱以引經藥導之血隨氣升自然越出而安矣次年冬總漕河閘新隄步行數十里勞神過度汗透重裘衣溼身涼飲薑汁熱酒十餘杯當見頭眩目昏胸滿燥渴大吐鮮血四五日一老醫以敨藥止之三日後胸膈氣滿左脇悶痛飲食漸少午後燥熱咳嗽連聲半月後面目手足腫脹有進滋陰降火之藥者有進補脾消食之劑者左脇益痛難以轉側此益前病復作也但昔之積在肺胃今之積在乎左脇昔病在春地氣上升當用吐法今乃寒冬天氣收藏豈敢輕伐天和須先以疎導之劑通其經絡後以蕩滌之藥遂血下行徐徐調和榮衛可也面目浮腫非水腫也乃血病氣無所附氣浮于外耳只須去其血積則氣自能歸經而腫亦旋即消矣若如不信乃日服去水消腫之劑泄去真陰

小便全無虛煩作躁氣喘痰塞不月而歿殮時口中涌出紫血數升衆始駭服謂所言不誣也

瑞昌王孫鎮國將軍女患腹痛諸藥不効飲燒酒數杯頃止時孟夏診其脈左手沉大有力左關弦大而堅時或一駛左尺沉弱無力此積血症也不信至仲冬其疾大作面紅目碧眼脬浮腫神亂氣促腹痛飲燒酒亦不止其脈與初診無異惟人迎氣口洪滑侵上知其有欲吐之意投以鹽湯一盞遂大吐吐出血餅大如杯者如棗栗者各數十兼有白飯清水又穌如筆管者二三條吐訖胸中寬快仍不服藥次日黎明口鼻氣塞四肢厥冷昏不知人心胸間微熱而已復診之幸兩尺猶存根本尚在急以燈火暴曲池虎口中脘氣海病者畧知痛即令人挾坐勿令睡倒隨進獨參湯二服手足微温繼用人參五錢附子二錢作理中湯與飲之六脈微見過七日方開眼識人小便始通即以補中益氣湯又用六味地黃丸兼服半月而瘥安然是症蓋血有餘而氣不足不能運血而成積故宜用人參助氣白朮健脾附子助陽乾薑暖血甘草和中開通經絡流行血氣也

馬元儀治表姪婦胸滿不舒蓋得之悒鬱而傷陰致清

陽不化醫不察遽投大劑辛香開痞之藥遂致吐血盈盆三日不止已瀕危或與涼血滋陰之品連進無功脈之右關尺搏擊礙指此症非受病魔乃受藥魔夫積鬱之體津液素傷又藥熱與胃熱相合為虛血得熱則妄行但圖涼血滋陰何能濟也經云熱淫于內治以苦寒苦寒能勝辛熱所謂不重醫病而重醫藥者是也急煎九製大黃與之症頓平而愈

戴叔能曰予之得血病服藥者經年朱碧山視之曰此陰虛證也徐補之則愈急止則大害從之用其法不二月而愈 九靈山房集

陸晦庵曰昔余患吐血暴涌如潮七八日不能止諸醫莫救之法適有雲閒沈四雅寓於吳中延治之慨然擔當方用人參三兩附子一兩肉桂一錢舉家驚惶未敢輕用越二日其血益甚更請診視求其改用稍緩之方彼云病勢較前更劇前方正宜改定始克有濟更加人參至五兩附子至二兩家人愈驚彼云喘嘔脫血數日不止且頭面閧熱下體厥冷正陽欲脫亡之兆命在呼吸若今日不進來日即不可為矣家人懇裁參附堅執不允諭以放膽煎服當坐候成功家人見其如此料可無虞遂依方求服彼欣出熟附

二十餘塊授咀面秤二兩同參五兩煎成和入童便
地黃汁一大椀調肉桂末冷服下少頃下體至足微
汗便得熟睡睡覺血止喘定周身柔和漸可轉側因
餓十二金求其收功不受加至二十金始受一醫見
其一劑收功心甚疑駭病人居恒常服參兩許今者
雖屬五兩止煎數沸猶可當之至云血症禁用附子
至二兩者從古所未聞也乃因密貽其製藥者云慣
用附子汁收入甘草其附已經煎過十餘次雖用二
兩不抵未煎者二三錢始知方士之術如此出張氏醫通

立齋治一婦人性急躁瘧癒後吐血發熱兩脇脹痛日
晡為甚以為怒氣傷肝氣血俱虛遂朝中逍遙散倍
加炒黑山梔黃柏貝母桔梗麥冬五味夕以歸脾湯
送地黃丸日漸進服諸症悉退而愈

繆仲淳治王司丞遜之患吐血診之云多服童便自愈
別去貽書門人張選卿曰遜之旋已勿藥矣但相公
年尊右手脈弱甚此非細故可致意遜之預為計時
文肅公尚無恙不兩月而遜之疾瘳文肅一病不起

蕭萬輿治陳克輝英年氣盛連宵痛飲復啖炙煿數日
胃口嘈囃嘔血椀許六脈洪緩有神無別症投以犀
角地黃湯入芩連花粉三劑仍令恣飲藕湯而愈

馮思才內子年五旬偶因忤意怒火激血上越日吐數
盆脈洪緩投逍遙散去朮加黃連山巵丹皮服愈
連蜚天素孱弱攻苦便赤夢遺燈宵競逐觸事忤意遂
患吐血痰嗽甚多初服降火清金之劑不瘥至廿一
日診之其脈兩寸洪大虛濶關尺均浮緩而無力曰
血症本非難治但元氣虛脫上浮肝腎皆得剋脈幸
不數亟須久服參耆之劑方得平復若用苦寒必致
不起用加減八珍湯彼疑參難療血及廿四日增劇
投以前劑四帖血止經旬潮熱亦退惟脈未復每多
言痰嗽不止少勞夢遺頻作此心腎不交陰陽虛極
計服丸劑七觔有餘又進湯藥八十餘劑而愈
陳子珍亦患前症治數月不瘥診之脈與蜚天病源同
議投參朮熟地彼謂血無補法熟地性溫參朮助火
仍服苦寒清金之劑經年漸篤至次夏忽嘔血不止
又用止塞之劑故致腸結脹痛逾旬延瘍十醫令其
小刀刺於肛門潰膿數盃而即歿
沈明生治孫子南媳賦質瘦薄脈息遲微春末患吐紅
以為脾虛不能攝血投歸脾數劑而止慮復作索丸
方調理仍以歸脾料大造丸中數味與之服四五日
後偶值一知醫者談及乃駭曰諸見血為熱惡可用

參者河車溫補耶血雖已止不日當復來矣延診因
亟令停服進以花粉知母之屬五六劑後血忽大來
勢甚危篤此友遂斂手不治以為熱毒已深噬臍無
及予南晨詣溫形于色咎以輕用河車而戚稱此友
先識初不言曾服涼藥且欲責効于師必愈乃已沈
自訟曰既係熱症何前之溫補如鼓應桴今秖增河
車一味豈遂為厲如是且觔許藥中乾河車僅用五
錢其中地黃龜板滋陰之品反居大半纔服四五朝
每朝三錢積而計之河車不過錢許耳遂不復置辨
往診其脈較前轉微乃笑曰無傷也仍當大補耳其
家咸以為怪然以為繫鈴解鈴姑聽之因以歸脾料
倍用參者一劑而熟寐再劑而紅止于是始悟血之
復從來者皆由于寒涼之所促也因歎曰醫道日難
矣某固不敢以自居識者然舍症而從脈得之先哲
格言血脫益氣亦非妄逞臆見今人胸中每持一勝
算見前人用涼輒曰此寒症也宜用熱劑見前人用
熱則曰此火症也應用涼劑因攻之不靈從而投補
因補者不効隨復用攻立意翻新初無一定之識見
安得主人病人一一皆精於醫理者也而不為簧鼓
動搖哉在前人蒙謗之害固甚微在病家受禍之害

實甚鉅此張景岳不失人情論之所由作也

聶久吾曰一友春間考試多飲燒酒咳嗽吐痰每晨去痰血一二十口求診已定方雖用清涼而皆製炒又兼滋補適一醫至見其火盛用桃仁承氣湯下之又用涼藥二劑乃生苓連扈柏之屬彼求速効欲用其方有疑之者持問予予曰驟下之若誤恐不可為無已姑用其涼劑試之彼竟以二劑一日服之至夜分咳吐不止吐紅滿地予是用予方四十餘劑又每日用雪梨汁一甌頓温服逾兩旬而咳與紅悉愈矣夫清涼一也或服之而轉劇或服之而漸瘳何也蓋火性急疾亟攻之則其勢愈炎緩治之則其邪漸息此理之常而庸庸者不審也其方二冬二母知柏苓連丹皮生地花粉元參前胡桔梗香附枳實側柏葉生甘艸生薑一片水一椀煎減八分溫服諸藥炒製亦與衆同

闕太孺人年七十七多患脇痛左半不能臥食少不眠五更去後十月間忽吐血數甌數進童便不應或與小劑生地山扈茅根茜草之類亦不應或謂有瘀用方與前相仿診之右關弦晷數左右寸俱鼓指曰凡吐血屬瘀者多褐紫黑成塊今所去皆散漫不凝蓋由肝木失養燥而生火值亥月木生之時不能藏蟄

反騰而上衝激胃絡致陽明之血泛溢而非也雖在寒月必少加黃連于養營之劑以抑之使其下降潛伏自無湧沸之患矣用生熟地沙參麥冬山藥杞子入連三个酒炒焦數服血止食進又十劑全愈弟此症屬在年高病久非大劑兩儀膏真元不易竟復也

徐宇治一人年未三十先患舌瘡數年不愈後至仲秋忽然嘔血每日或一椀或一杯或十數口不定脈之兩手皆豁大狀如慈葱重按則溢而畧數此木性火橫遇金旺之時抑不得遂故季脇痛而有塊其少腹之氣上沖而作咳嗽咽痛者龍挾雷火以仇金也其手足常冷者土受木侮而作厥也究其源良由水不足而又遇燥令非生金滋水何以馴而擾之也用生地杞子沙參麥冬元參蕎仁等味七八劑服下脈漸斂症亦漸瘳又內熟地一兩數劑并舌瘡亦愈矣

陸祖愚治俞姓人素性急躁善怒一日忽吐血七八椀自熱氣喘腹脹滿終夜不寐飲食不進自用滋陰止血藥愈甚脈之六部俱如彈石將及七至右關更勁腹上一捺血即噴出此有餘之症也乃與小陷胸湯二劑加銕繡水明日症即減半弟大便七八日不行必下之方愈以潤字丸加桃仁合丸之書其帖曰止

血丸服之夜半下瘀血宿垢半桶而吐血頓止矣

濮某年未四十虬然一鬚素有血症立夏前忽嘔數盃面色青慘寒熱往來夜熱尤甚咳嗽連聲而臺肩倚息顛頂左半有筋抽掣痛不可忍此厥陰怒火上衝胃絡也胃為多氣多血之府也且其人本多鬚則血尤為盛也故而暴去如許而脈不躁大也茲與生地杞子各用一兩又沙參五錢麥冬三錢薏仁二錢數帖諸症悉愈愈後面青不減謂肝木久經受傷宜多服前劑以滋養之否則根荄枯悴無以發生也不聽後至亥月木生之候病果作反謂前者服重補將病補住故復發也即更醫數人至次年雨水而果殁

吳以寶子年十六患吐血面色痿黃形容憔悴泄瀉肢腫向有夢遺近來更甚六脈虛數或與清涼之劑紅減而發熱作嘔腫瀉倍甚於前誠所謂以寒涼治百無一生也乃與開胃溫中健脾養血之劑月餘便實腫消熱退食進後用六味丸加知柏杜仲枸杞牡蠣麥冬等五更吞服又與煎藥五十餘劑諸症脫然

滁州趙使君云其族姊為尼住新塗一寺忽苦暴吐血發寒熱欲作勞氣而未成醫不肯治偶一士大夫說用童子便調下花蓋石散花蓋石一劒上色硫黃四兩和勻先用紙泥封固入

衄血

竇材治一人患腦衄日夜有數升諸藥不効竇為針關元穴入二寸留二十呼問病人曰針灸下之曾覺熱否曰熱知之矣乃令吸於氣而出其針其血立止一法治鼻衄與腦衄之神方也係用赤金打成一戒子帶於左手無名指之上倘如其症發作之際只須將戒指揑緊箍住則衄自可即止之矣（醫林指月）

趙汝隆治一官宦病齒衄之症日流鮮血數升諸醫束手無法治之隆摘苦蒿令其細嚼症立痊愈（雲南通志）

李嗣立治趙季修赴龍泉知縣單騎速行時值盛暑未幾患鼻衄日出血升許李教服藕汁生地黃膏方趙云某往年因赴銓曹聽選省前急走數回心緒不寧感熱驟得鼻衄之症尋扣臨安一名醫服藥遂痊謝以五萬錢臨別時醫再三囑云恐後時疾作萬勿輕信醫者服生地黃藕汁之藥冰冷脾胃無復可生半月易醫不効李乃就此方隱其藥味俾服之三日疾

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

愈趙問曰藥如是靈驗得非與前次臨安醫者所用之藥相同歟乎李為笑曰即前者所獻之方也趙歎曰前醫設為譎謀幾誤性命非君治吾其鬼矣（續醫說）龔子才治一人年近五旬素稟怯弱患衄血長流五晝夜百藥不止脈洪數無力此去血過多虛損之極以八物湯加熟附子又加真茜草五錢水煎頻服連進二劑其血遂止又依前方去茜艸調理十數劑而瘥李時珍治一婦人患衄血一晝夜不止諸治不能効令其將大蒜搗爛傳於足底心上可以即時遂愈

汪石山治陳鋭面黑形瘦年二十餘患鼻衄發熱惡寒消穀善飢疲倦或自汗嘔吐汪診之脈細且數約有六至曰丹溪論瘦黑者鼻衄者脈數者參者皆所當禁固也然不可執為定論脈經云數脈所主其邪為熱其症為虛宜人參三錢黃耆二錢生甘草陳皮黃柏白朮歸身生地山屈生白芍遞為佐使服之果安

張路玉治朱聖卿鼻衄如崩三日不止較往時所發最劇服犀角地黃知柏石膏山屈之屬轉盛第四日邀診脈弦急如循刀及此陰火上乘載血于上得寒涼之藥轉傷胃中清陽之氣所以脈變弦緊與生料六味加五味子作湯另用肉桂三錢飛雞蛋糊分三丸

用煎藥調下甫始入咽其血頓止少頃口鼻去血塊數枚而衄愈自此數年之患絶不再發矣

楊乘六治施鳴玉鼻衄如注三日半不止凡止衄方法並無一應氣息欲絶脈之虛大而緩面色痿黃舌嫩黃而胖知其四肢痠軟渾身倦怠懶于言語動輒嗜卧者匪朝伊夕詢之果然而衄起之故緣自鍾溪歸家一路逆風操舟儘力不及達岸即衄至今第四日矣曰病人中氣大虧本不足以攝血後因勞力太過重傷胃絡胃絡者陽絡也陽絡傷則血出上竅胃脈絡鼻所以血出鼻孔也乃用補中益氣湯加炒黑乾薑一劑而衄止去乾薑加白芍五味子數劑服下而從前諸患之漸退除而安復如故矣

王執中母氏忽患鼻衄急取藥服凡平昔與人服有効者皆不効因閱集効方云口鼻出血不止名腦衄灸上星五十壯尚疑頭上不宜多灸只灸七壯而止次日復作再灸十四壯而愈有人鼻常出膿血執中教灸顱會亦愈則知顱會上星皆治鼻衄云（資生經）

薛立齋治一婦人經素不調因怒衄血此肝火熾盛用加味小柴胡加紅花二劑血止又用加味逍遥散八珍湯兼服三十餘劑經行如期衄亦痊愈

一婦人鬱結而患前症用加味歸脾湯其血漸止飲食漸進用加味逍遙散元氣漸復寒熱漸止後因怒仍衄寒熱往來用小柴胡湯加芍歸丹皮而安愈

一婦人因勞衄血服涼血之劑更致便血或以血下為順仍用治血藥下隘而血從之當升補脾氣庶使血歸其經不信果血益甚乃朝用補中益氣湯夕用加味歸脾湯而愈此症若果投用寒涼止血之味不補脾肺兩經必致斃命者實多也

馬元儀治陸太史母患衄血及便血不已兩脈浮大而數重按無神面赤躁煩口乾發熱心悸恍惚羣作陽明火熱陰虛內動之症治旬日轉甚此因憂思鬱悒致傷陽氣陽氣既傷陰血無主上逆則衄下奪則便當作中虛挾寒之法而治宜用附子理中湯內益人參至三兩衆沮之明日復診之脈象散失較之數象更為天淵乃謂衆曰症既非實則以補養為主然氣血俱要而補氣在補血之先陰陽並需而養陽在滋陰之上是非助火而益水不如是不能得其平也令(進)前方加進之不得已減至人參二兩服至第九日衄血便血俱愚止後以歸脾湯調理而愈愈

謹知閻熙載壬子年病衄血用燈盞數枚以百沸湯煮

逐枚漉出乘熱安頂上冷即易之果愈百乙方妙方

蘇韜光云其母令人嘗衄血盈盆百藥不効用好麻油紙撚絙鼻中頃之打噦即愈也此方甚為奇之仝上

楊子縣吏陳某當臘月鼻衄至正月凡十三日始定其脈實而數治當下導與桃仁承氣湯去積瘀次服既濟湯而瘥愈蓋此人過食煎炙之過且恣飲醞酒皆醞邃漸積熱所致者也白雲集

醫旨緒餘曰有姪女十歲因毀齒動搖以苧蘇摘之血出不止一日夜積十一盆用藥末止之少頃復從口出診其脈皆洪大有力以三製大黃末二錢枳殼湯少加童便調下去黑糞數枚其血頓止而安

一男子每齒根出血盈盆一月一發百藥不効知其飲酒過度已至如斯乃以前藥與投一服而安是知此疾多由陽明熱甚所致緣衝任二脈皆附陽明而陽明一經氣血俱多故一發如潮涌急則治其標也投以釜底抽薪之法澤瀉之應手而愈

竇漢卿曰一人齒齦邊津津血不能止乃用苦竹茹四兩醋煮含漱吐之而愈

一人舌上忽然出血有穴如簪孔大乃用赤小豆一升杵碎水三碗和搗取汁每服一盞不拘時候隨可服

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之再用槐花末糝上而愈此方實良無不取効但用槐花末糝者名曰舌衄也

沈明生治給練妾如農長君勉中患衄不已去血盈斗一月後患囊癰六脈如絲精神困憊始猶健飯漸至饘粥不入後先醫友但云虛而當補莫測病根所在于是參耆不効桂附隨之愈補而形愈虛愈温而氣愈冷最後沈至時届冬至矣據脈與症亦謂大虛獨念桂附太熱姑用補中益氣嘗之毫無進退忽猛省曰吾亦踵爾等而誤矣食雖不入而大便秘結証類虛寒而口渴喜飲蓋衄血之來本因邪火上熾乃遽用血脫益氣之法衄雖止而熱移于下發為

癰癰既潰瘍科又泥寒藥不能收口之誡亦務温補周旋左右者目擊病人厄羸又聞衆口稱虛强令進食以父卧床褥之體恣啗肥甘不為運動是以藥食並壅内熱外寒此病中之病初非衄與癰所致宜其愈補而愈不靈也先哲云脈伏者穀不化又云大實有羸狀誤補益疾其斯之謂歟遂力主清潤疎解以硝黄為前矛而大便立通以芩芍為後勁而飲食漸進如絲之脈一綫添長久冷之軀一陽來復不惟衄血不作且令瘡口易收孰謂從脈可以舍症不思而得病情哉向非翻然易轍轉敗為功人惟知補之

不効而已又安知効之不在補也此事難知如此

吳橋治文學子學易舉孝廉病衄其衄汩汩然七晝夜不絕甚則急如涌泉衆醫劑以寒涼不効急以大承氣湯下之亦不行橋曰孝廉故以酒豪積熱在胃投以石膏半劑服之而吉愈衆醫請問其故曰積熱宜寒則吾儕所擬寒之者已極至矣均之効驗不卜公之何獨得之於石膏橋曰治病必分經合是經乃宜是藥石膏陽明胃經藥也故取効豈能襍施得愈哉太函集

聶久吾治葉氏子年十五患衄諸治不効詢其症自九歲起其初每年不過五七次每次流數茶甌至十一歲則每月一次每次流半酒甌十二歲則兩月三次每次流一杯許十三歲則每月二次流半茶鍾十四歲則每月二次流大半碗今十五歲則八九日一次每次流盈椀矣瘦削骨立夜間身熱危困極矣諸醫所用皆清熱涼血之劑或十灰藕節韭汁等止血之味而已蓋久患漸深雖兒童其血已虛安可單涼單止為制清潤兼補之劑十劑衄減一二二十劑減四五三十劑減七八四十劑則兩月一次每次不過數點長間五十劑即全安愈而肌肉亦豐肥矣後或有時少作以前方一劑服之立瘥方用地芍芎歸二冬

知柏芩連首烏花粉丹皮香附甘草龍眼肉水煎調
好髮灰五分食遠服聶醫處方用藥極輕每品不過
楊氏子二十餘歲病鼻衄如涌有令以黑山扈末吹者
有令以溼草紙熨腦門者有令以熬酒浸脚者憧憧
擾擾一日夜不得止令覓有乳婦人以乳對鼻孔擤
乳射入必止止後俟鼻血乾燥宜於去之如法立愈
郭氏兒七歲病咳嗽夜熱時時鼻衄衄之盛常在半夜
兒醫喬與疎散涼解食減則又與香燥消運日益就
儳延診見其面目畧腫年壽環口隱起青氣按其乳
旁期門虛里之間突突跳築謂此稟賦柔弱頑要過

勞傷其肝腎木上海金故其衄多由于左邊鼻孔而
流出者也此乃內傷所致非外感也與養青湯數帖
服之少減再加用熟地地骨皮蕒仁四帖而全愈

下血

張子和曰藥彥剛病下血醫者以藥下之默默而死其
子企見張而問之曰吾父之死竟無人知是何症也
張曰病剉其心也心主行血故被剉則血不禁若血
溫身熱者死火數七死必七日治不當下下之不滿
數企曰四日死何謂病剉心張曰智不足而强謀力

不足而强與心安得不剉也藥初與邢爭屋不勝遂得此病企由是大拜服其高論遂投門下而學醫

王礪恒治張大復腸血下注不可忍胸腹滯悶痛極血濡縷著褌襠間嗄嗄有聲曰此脫也然色鮮當不害亟取貝母一兩令細研為末分作十劑酒少許嚥下三舐而注者減色昏黑又三舐之息矣後作寒熱十日而愈復後隔數年重又復發血止則左脇腫痛有聲汩汩然達于腹又數日聲稍上達于背閒乃用沉香將酒磨之飲下未及三日即減退矣 筆談

汪龍溪手札云去年得下血疾半年有餘今春誤食胡桃以為能下血豈知其疾當忌胡桃者也 珊瑚網

龔子才治一人患血痢及下血不能止以六味丸加用地榆阿膠炒黃連黃芩生地數味服之而即安復

孫文垣治董龍山夫人年三十五歲病便血日二三次腹不疼諸醫治三年不効診之左脈沉濇右脈漏出關外診不應病謂血既又下且當益其氣而升提之以探以病乃用補中益氣加阿膠地榆側柏葉服八劑血不下者半月偶因勞血復下再索前藥乃謂之曰夫人之病必有瘀血積于經隧前藥因脈難憑故以升提兼補兼濇者以探虛實耳今得病情法當下

除其根董曰便血三年雖二三下而月汎不爽且至五日如此尚有停畜耶曰以此而知其必有瘀經曰不塞不流不行不止（當考正恐不如是解）今之瘀實由塞之行也不可再塞古人治痢必先下之亦此意也用桃仁承氣湯加丹參五靈脂荷葉蒂水煎夜服之五更下黑瘀半桶復需下藥曰姑以理脾藥養之病根已動俟五日再下未晚至期復用下劑又去黑瘀如前者半繼以補中益氣湯參苓白朮散調理全愈

吳孚先治賴思誠大便下血已十有六月諸醫無功診得右寸實數大便如常是實熱在肺傳于大腸與黃芩花粉山巵麥冬桔梗（樓）根等味以清其肺熱不數服其病如失前治不見効者俱係就于腸中消息故耳

李士材治學憲黃貞父下血甚多面色癯黃發熱倦怠盜汗遺精診之曰脾虛不能統血腎虛不能閉藏法當以補中益氣五帖并（書）而進之十日汗即止矣至二十日血亦止矣再以六味丸間服一月而安

陸養愚治姚天池室素有腸紅症服山巵丹皮芩連涼血之劑即止近因惱怒飲食遂患痞滿按之急痛大便不行醫以丸藥下之大便已通按之不痛而胸膈仍不舒飲食不進再以行氣投之痞脹不減而便血

大作三四日不止又以涼血投之血不止而反增嘔惡身體微熱旬日間肌肉削其半脈之人迎沈而濇氣口弦而急夫沉濇者血失也弦急者肝盛也肝盛則脾虛而痞滿下血之症並作矣用參朮歸芍者卅枯薑阿膠數劑服之血止脹寬飲食漸可進四後去而枯薑加用熟地調理十月有餘瘥安如初

呂東莊治孫子川父患下血夏末忽滯下口渴不飲食繼而體熱脈洪數曰若論滯下則諸症皆死候也今在下血之後則不可盡責之滯下當變法治之先用白朮茯苓山藥神麴苡仁陳皮甘草等藥强其中以

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

統血次用黃連澤瀉黃芩丹皮等藥以解鬱積之熱後用熟地歸芍等藥以復其陰次第進之乃瘥

薛立齋治一婦人瘧患下血不已面色痿黃四肢畏冷此中氣下陷用補中益氣湯送四神丸數服而愈

光禄張淑人患下血之病煩躁作渴大便重墜後去稍緩用三黃湯加用大黃至四兩方應後又用三黃湯二十餘劑服之而愈此等元氣百中一二

韓地官之內脾胃素弱因飲食停滯服尅伐之劑自汗身冷氣短喘急腹痛便血或用諸補劑皆不應乃用人參炮附子各討五錢服于二劑而下稍得應却用

六君子每劑加入炮附子三錢投飲四帖漸得安復
又用前湯每加附子一錢數劑調治乃全愈
一婦人因怒患胸痞飲食少思投服消導和氣之藥痰
喘胸滿大便下血用補中益氣加茯苓半夏炮薑等
服四劑諸症頓愈又用八珍加柴胡炒卮全愈
通府薛允摅痲下血服犀角地黃湯等藥其血愈多形
體消瘦發熱少食裏急後重此乃脾氣下陷所致宜
用補中益氣加炮薑一味共煎服一劑而愈
一男子便血過勞益甚飲食無味以六君子湯加黃耆
地黃地榆三味煎投治之而痊

一男子患便血每逢春令尤為甚劇且兼腹痛宜以除
溼和血湯連劑治之而安愈
一男子素有溼熱患便血之痾以槐花散治之而愈
一婦人糞後下血面色痿黃耳鳴嗜卧飲食不甘服涼
血藥愈甚診之右關脈浮而弱以加味四君子湯加
升麻柴胡數劑脾氣已醒兼進黃連丸數劑而愈大
凡下血服涼血藥不應必因中氣虛不能攝血非補
中升陽之藥不能愈也切忌寒涼之劑投之亦有傷
濕熱之食成腸癖而下膿血者宜苦寒之劑以內疎
之脈弦絕澁者難治滑大柔和者為易治也

一男子患糞後下血諸藥久治不愈反致危甚診之乃濕熱所起用黃連丸二服投治頓止再數丸(服而)全瘥

一男子糞後下血久不瘥愈中氣不足以補中益氣湯數劑更以黃連丸數劑血止又服前湯月餘不再作

馬元儀治汪氏婦患便血症時適澡浴忽下血不已遂汗出躁煩心悸恍惚轉側不安診得兩脈虛濇虛為氣虛濇為陰傷人身陽根于陰陰附于陽兩相維倚者也今陰血暴亡虛陽無偶勢必外越陽越則陰愈無主其能內固乎當急固其氣氣克則不治血而血自守矣先以參附理中湯繼以歸脾湯及大造丸三

方兼而投之使其血氣漸漸平補(血氣而)痊能安泰矣

蔣氏婦便血久不愈右脈虛微左弦搏此鬱結傷肝肝病傳脾二臟營血不守以人參逍遥散和肝益脾二劑右脈稍透症減一二欲速愈請用苦寒曰肝脾二經為相勝之藏木旺則土虛苦寒之劑則重損其脾惟此方益土之元可以柔木養肝之陰可以安土遂(右疹)守服前方調治至三十餘劑症悉霍然安愈矣

陸氏續集驗方治下血不止量臍心與脊骨平于脊骨上灸七壯即止如再發即再灸七壯永除根目覩數人有効余嘗用此灸人腸風皆除根神効無比然亦

須按其骨突處瘡疼方炙之不疼則不炙也但便血本因腸風腸風即腸痔也不可分為三種切宜戒之倘若分為三而治之非妙法也慎之慎之 醫說續編

盧州郭醫云趙俊臣帥合肥日其壻司馬機宜患酒毒下血多至升斗服四物湯每料加炒焦槐花二兩如常法而煎之與病者投服即占安愈 醫說續編 全上

王嗣康為蔡昭先處厚朴煎治積年下血韓縣尉云乃尊左藏服之作効右用厚朴五兩用生薑五兩同搗器內亦可微炒白朮一兩大麥蘗神麴二味各兩或右開于銀器內至紫色方好用玉錢同炒亦須紫色為佳右為細末白水麪和為丸如梧桐子大疾作空心米飲送下一百丸如平時三五十丸嗣康云腸胃本無血緣氣虛腸薄自榮衛滲入今用厚朴厚腸胃神麴麥蘗消酒食白朮導水血自不作也 醫說續編

立齋治張刑部德弘便血數年舌下筋紫午後唇下赤胃肺脈洪謂大腸之脈散舌下大腸有熱故舌下筋紫又便血蓋胃脈環口繞承漿唇下即承漿下午後陰火旺故承漿發赤蓋胃為本肺為標乃標本有熱也遂以防風通聖散為丸治之而愈後每睡忽驚跳而起不自知其故如是者歲餘腦發一毒煩痛左尺脈數此膀胱積熱而然以黃連逍毒散數劑少愈次

以金銀花瓜蔞甘草節當歸服十月有餘而症平

南昌鄧思齋傳便紅或因酒毒發者先用川黃連去鬚切片酒炒細末一服三錢空心白酒調下忌葷腥一日服連末後必腹痛去血愈多復用白芍一兩白朮五錢甘草三錢同炒揀開先用白芍煎湯服腹痛自止後以白朮甘草同煎服遂愈又一法以粳米三分糯米七分煮粥空心服遂愈此無他補胃氣則陽明自能調所以便血可以自除而古愈也 廣筆記

蕭萬輿治陳昌元年二十歲元氣虛寒面青白肢體頻冷嘔痰飲脹小便清利大便下血症經數月不能瘥脈兼沉伏如無重按著骨方見蠕動曰脈症相符此乃藏氣虛寒血脫也以十全大補湯去川芎加熟附子炮薑再少佐升麻服至四劑便血頓止若以此屬熱之症妄投寒劑治之必無生理者也

朱孝廉明社面色青黃初為感寒過飲薑湯患內熱脫血服芩連寒劑即愈後因勞復發再服不納惟靜養兩旬方瘥近因驚仍作倦怠增劇脈之六部皆沉緩濡弱曰始受辛熱投以苦寒宜乎即愈但熱氣既消而廣腸血竅尚未斂合故遇勞即發夫勞則傷脾脾傷則不能統血致下陷循故竅而出此因于勞非由

于熱也今屢發而元氣愈虛惟至靜固中之劑庶可
耳以熟地為君參耆歸朮為臣丹皮炙甘知母茯苓
阿膠為佐引用升柴為九與服再以加減歸脾湯令
其兼進一月有餘無間藥劑諸症如失而安痊
彭予白病脫血之症久治莫能痊愈此由積勞所致也
蕭以為勞傷脾肺即腎家伎巧亦為之竭矣問曰得
無遇事過時而火熱升燎首面乎曰政苦此耳屢服
芩連清火之劑漫不應脈之六部沈緩與進六味加
用肉桂人參五味九服不數月沈痾頓痊
乙丑歲蕭寓楚中時適有僕婦患便血之疾每逢作
時即以臟連丸與之隨服隨愈
劉友善屬文病便血服香連丸經歲不痊飲食如常抵
冬娶婦輟藥却愈次夏患痢且能健啖起居不倦投
香連丸四劑至夜發厥而死此症全屬肝火于此可見大都此積
服寒涼脾氣漸傷及娶親後精血日耗元氣不支故
遇厥即朴理可知矣禍亦非於旦夕之間久由來也
錢國賓治戴思雲妻得病年餘大便下血如腐或紫或
黑身體昏暈久病虛且損矣其脈沈伏滑滯脾部更
甚細思血脈病久當見乳虛數濇此痰脈也以治痰
湯每加九製大黃與進二三服下之愈

蔣仲芳治徐萬壽年二十餘歲七月中旬忽病下血不止遍治不効至十月初屢次昏暈事急吳診之左寸獨得洪數是必實熱在肺傳于大腸也乃用麥冬花粉桔梗元參黃芩山梔五味沙參服之數劑而愈

近見一症寒熱微渴胸滿微煩小便利大便稀而少狀如雞糞其色黑蔣謂大便黑者血之瘀稀者中之寒血瘀兼寒積在下焦不得不下遂用當歸活血湯再加入熟大黃於內溫而行之使內之黑物垢穢一切下盡方可取愈蓋瘀血在下兼熱者多兼寒者少也故古人未有陳案此症又出於古法之外者也

吳橋治婺源令君入城府乃病溲晝夜凡百行溲皆純血欬逆絕食且昏沉醫者以為新痢也請宣之姚令君曰毋然公止中道宿就近召吳醫乃可橋暮至六脈沈微乃曰明府下元極虛薰又誤下遲不救矣甲夜與進溫補一劑熟寐至夜分竟乃啜粥湯病去十之七八病者覺而驚詢曰何速試再診之醫曰明府毋憂脈已歸也再劑下之可即起矣三劑得旋（太函集）程氏兄弟並溲血兄瘥弟劇則以弟逆橋入中庭必由兄室見兄在室煩亂其言支離戶外徐視之（卽氣黯）黯弟婦速橋入則弟自卧內號咷橋坐而歎曰異哉

兩君子俱死矣然瘥者顧急則予望而知之劇者顧緩則予聞而知之長君色有死徵次君聲有死徵故也既而診之凡脈將絕病得之內重以誤下亡陰家人以為然病者始病而內以故裡急後重乘之旋為之下急重乃通今絕水漿四肢逆冷法曰下痢炊躁者死語言錯亂者死四肢厥冷者死水漿不入者死四端皆在不治中夜兄死診其弟病視乃兄為輕或當小愈弟多啫多怒亦必不終旬日矣溲血平尋以過飽搖怒傷脾未幾而卒也 太函集 全上

聶久吾表姪年三十初咳紅服滋養清涼而愈忽大便下血曰血在下為順勿遽止之半月以後乃用新製臟連丸服之乃愈再用川連為末將酒拌入猪大腸韭菜蓋蒸爛搗勻晒乾仍為細末每連一兩入側柏葉炒當歸末各用二錢和勻米糊為丸如梧桐子大空心時溫酒送下或用白湯下亦可每下二錢五分

趙正為室人年近四旬便血面黃肢腫凡補氣補血及氣血兩補升提固澁涼血溫中之劑莫不備嘗而所服則歸脾為多均罕驗方書謂糞前血其來近糞後血其來遠今則二者皆有脈之關前盛關後弦且數曰此非脾不統血也乃肝木挾火上乘于胃血

因之上逆以病人肺氣强不為嘔血反倒溢入于大腸而為便血故有時血先注渣滓後注則便前有血有時渣滓先注血後注則便後有血有時渣滓前後血俱注則便前後俱有血蓋陽明為多氣多血之腑血去雖多而不甚困也第峻養其肝使不挾火上逆血自止矣即與生熟地熟地炭白芍棗仁杞子各五錢炙甘草酒黃芩五分川楝肉一錢服八劑全安

溺血

薛立齋治一婦人小便出血服四物湯黃之類更加發熱吐痰加用芩連之類愈致飲食少思虛症蜂起肝脈弦而數脾脈弦而緩此因肝經風熱為沈陰之劑脾傷不能統攝其血發生諸臟而然者也宜用補中益氣湯加六味地黃丸兼與進服而即痊

陸養吾治費右塘室性執多怒初夏忽患小水不利陰中腫痛且又溺血發熱時疫症盛行醫與解肌發表之劑投之不効脈之左關沉弦而數右寸浮數而短曰此由心火過旺時又火令肺金受傷失降下之權故小水不利足厥陰肝脈合篡間繞篡後陰器而肝經所絡之地水氣有餘而寡於畏故壅腫而痛用人

參麥冬知母五味滋肺金而還其輸布之職黃連此
胡白芍滑石青皮丹皮青黛瀉肝經之火以去其壅
滯之氣煎數劑而與進服諸症悉痊

張路玉治徐中翰夫人溺血兩月不止平時勞心善怒
有時惱怒則膈塞氣壅諸治罔効又飲香薷飲一服
診之兩手關尺皆弦細少力兩寸稍大而虛遂疏異
攻散之方令其久而服之可保無虞若有惱怒間進
沉香降氣散一切涼血滋陰之味咸宜遠之別後旁
更一醫究不出參朮收功者耳

一徽商夏月過飲燒酒溺血或用辰砂益元散不効服
六味湯亦不効張用導赤散三啜而愈有文學宋孝
先年七十餘溺血點滴澆痛諸藥不効服生料六味
亦不應據云自壯年鰥居絕慾太早之故或令以菜
豆浸溼搗絞取汁微溫日服一椀煮熟即不應也

內弟顧元叔溺血溺孔不時痠疼溺則週身麻木頭旋
眼黑兩手足心經脈絀急痠麻尤甚脈來弦細而數
兩手搏堅酌與生料六味或加用牛膝或加麥冬服
之輒効但不時有舉發之患與六味合生脈用河車
熬膏代蜜和成丸粒與其服之而即痊愈

薛立齋治一婦人因怒尿血內熱作渴寒熱往來胸

間作脹飲食少思肝脈弦弱此肝經血虛而熱也因
加味逍遥散六味地黃丸兼服漸愈又月八今加
柴胡丹皮山茹等味數劑下之而安痊
馬元儀治顧邏昭患溺血已三月或屢與升補不應診
其右脈虛澁無神左關獨弦弱莖中作痛下多血塊形
色憔悴又多噯氣此肝脾積熱之候也肝熱則陰火
不安而陰血自動以血為肝藏所藏而三焦之火又
寄養于肝也致溺血莖中作痛等症作矣脾熱則瀉
氣內壅而生氣不伸以脾為溼土之化而三焦之氣
又運行于脾也故時時噯氣形色憔悴之候生矣法
當益肝之陰則火自息利脾之溼則氣自和用生地
白芍熟黃萸薤丹皮甘草車前等味清熱利溼之劑
服之左關漸平改用人參逍遙散佐以萸薤車前
味進之調理半載痛定濁止而安愈
陳總領云余頃在章貢時年二十六忽小便後出血數
點不勝驚駭旋卻不疼如是一月若不飲酒則血少
終不能止偶有鄉兵告以市醫張康者常療之遂即
呼之來供一器藥云是艸藥添少蜜解以水解一
服而愈既厚酬之遂詢其藥名乃鏡面草一名豕麼
草其色像屬青翠所生在於階級縫中處處有之

王執中云人有患小便出血者教用酒與水煎苦蕒菜
根服之無有不即愈者也
立齋治一男子患尿血陰莖作痛服清心連子飲不見
應効更服八正散反致愈盛以髮灰醋湯調服少愈
再以班龍丸進之而平安無恙矣
錢國賓治廣靈王初右足拇外患毒長八寸橫四寸潰
血如婦人之經二月一來自長流至黙滴約兩銅盆
日夜方止昏迷卧床薑湯灌醒半月始坐病已二載
歷治罔効每臨溺期府中怖甚脈沈細無力右手少
强經云男子欠病右手脈盛者可治因立法內服升

提藥盞榮行脈中衛行脈外氣引血行自歸經絡而
止外用雄黃兒茶乳香没藥血竭各三錢麝香五分
硃砂二錢百草霜一錢共末以真蘄艾做條安
綿紙上散藥一錢搓成撚子長八寸以麻油蘸透在
無風處側卧患處朝上燃撚離瘡尺二許覺熱遠些
如冷近些日熏二次一撚作三次用內外分治溺血
竟止其瘡四月亦痊

續名醫類案卷十六

續名醫類案卷第十七

錢塘魏之琇玉橫撰

癩瘋

寶材治一人病半身不遂先炙闕元五百壯一日二服八仙丹五日一服換骨丹覺患處汗出來日病減四分一月全愈再服延壽丹半劑保元丹一劑五十年病不作千金等方不炙闕元不服丹藥惟以

一人患左半身不遂六脈沉細無力實曰此必服燥利之藥損其眞氣故脈沉細病者云前月肌[illegible]吐涎二升此後稍輕但未全愈耳實歎曰中風本因元氣虛損今服吐劑反傷元氣目下雖減不數日再作不復救矣不十日果大反復求治雖服丹藥竟不能起

余嘗行衡州道中遇醴陵尉自衡陽方回以病歸問其得疾之由曰某食豬肉入山既深無肉可以食偶從者食穿山甲肉因嘗數臠舊有風疾至是復作今左手足廢矣因以禦中風藥遺之後半月聞其人頓愈及至永州觀圖經曰穿山甲不可殺于隄岸土則隄岸不可復塞蓋能透地脈也如此尉因誤食致病而旬日痼疾盡愈亦可怪也今人用以通婦人脈甚驗 醫說

萬鎰家貧折字度日得末疾以帛絡臂于項左手執杖而行服藥不効一日遇呂純陽謂曰汝少饒今濡怒盛于肝以致生火其如雷擊風旋二氣不合是以火不生土而土焦土不生金而金鑠金不尅火火反尅之子孫拂意方致汝蹶血氣停滯於脈絡乃至此仙人之言自與塵世迥別火當是木因以手捫腰臂曰瘦乎曰不又再

捫至膝曰疫矣曰此乃環跳穴所在汝既知疫他日將棄此杖矣又見鐵手有懸帛又將手向下捫者三曰幸瘦可愈汝五臟俱火乃嘗謂中風非風中風也不意吕公先得我心不必餌藥惟武夷茶能解之茶以東南枝者佳採得烹以澗泉則茶堅立若以井水則橫還居數日忽不知手舉足步矣（續金陵瑣事）

李時珍治一人偏風手足不舉用蓖麻油同羊腩（即穿山甲）等藥煎作靡膏日摩數次一月餘漸復兼服搜風化痰養血之劑三月而愈又一人病手臂一塊腫痛亦用蓖麻搗膏貼之一夜而愈（本草綱目）

薛立齋治一婦人性善怒常自汗月經先期以為肝火血熱不信乃泛用降火之劑反致月經過期復因勞怒口噤呻吟肢體不遂六脈洪大面目赤色用八珍湯冬五味山茝丹皮數劑漸愈兼用逍遥散六味丸各三十餘劑全愈（薛公治病神妙然每症多者半年少者數月或數旬其故何哉認症眞確而用方多失肯綮也如肝病不出逍遥脾病不出歸脾六君脾肺不出補中大虛不出十全血虛不出四物有火不出四物知柏及腎虛至極之症則與六味與今時人之病多所不合何則今時之病無論男女大小除傷寒時疫外一切癆瘵及傷風中暑之後無非肝腎為病其病皆陽有餘而陰不足凡薛公之治于今時不惟無益且為害矣學者審之）

一婦人因怒患痰厥而甦左手臂不能伸手指麻木口

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

喎眼邪痰氣上攻兩腿骨熱或骨中痠痛服烏藥順氣散之類諸症益甚不時昏憒更加內熱口燥小肝經血虛內熱生風前藥復耗肝血虛火熾盛而益甚也先以柴胡疝子散調養肝經氣血數日後用八珍湯加鉤藤鉤散諸症稍愈又用加減八味丸料少加酒炒黃柏知母黑色者數劑諸症頓退乃服八珍柴胡疝子散半載而痊後勞役即有復作之意服柴胡疝子散遂安

至正十二年某月括蒼葉仲剛氏居天台郡為府史且二歲一日病肢體不隨衆醫皆以為洞風謂風洞徹四肢也療之不能愈請于施敬仲敬仲診其脈曰病積于身有日矣為大劑飲之不旬日遂愈人咸神異其故敬仲曰某所以知仲剛病者切其脈大而來徐是積熱盤鬱于內久不得發卒與風遇其病當作吾以脈法治之而愈何神異焉白雲集醫說續編

王肯堂治一人右手足偏廢不起牀二年矣又服順氣行痰之藥不効至夜神志輒昏度不可支服十全大補即覺清明數日能扶策而起無何能舍策而步矣經云邪之所湊其氣必虛但治其虛不理其邪而邪自去也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

李東垣治陝帥郭巨濟病偏枯二指著足底不能伸知
先師治之以長針刺委中深至骨而不知痛出血一
二升其色如墨又且僇刺之如是者六七次服藥三
月病良愈試效方

琇曰閱此則醫真難矣哉孫思邈所謂能處藥而
不針灸者非良也信哉言乎

馮楚瞻治于某患偏枯症右臂浮腫或麻或痛艱于步
履或者謂痰謂火謂風多與清涼消剋發散之劑一
日忽昏迷不省痰喘潰汗脈之六部沉微此中氣火
虛不為峻補反肆剋伐非重劑無以挽回乃用人參

六兩炒黃白朮四兩生附子一枚去皮薑汁炒水煎
一椀灌之汗漸收脈漸起痰喘定而神清調補一月
而愈

吳孚先治王季衡患左半身不遂或作痛風與發散或
作痰治與滾痰丸下數行精神困憊左部沉細而弱
此非溼痰死血乃血虛也左屬血然非氣以通之則
不流法當從陽引陰上午用四君子湯加黃耆桂枝
首烏製附下午用四物湯加秦艽續斷炮薑并加新
纓少許取絲有綿綿不絕之形絳有入心之義
也治左半身不遂尤宜用之四十帖手能運動倍之

足能履步如初

韓貽豐治孔學使尚先患半身不遂步履艱難言蹇澁音含糊氣斷續為針環跳風市三里各二十一針即下床自走不煩扶掖筋舒血活無復病楚意惟語言聲音如舊翌日又為針天突膻中十四針遂吐音措詞琅然條貫矣

穆大司農和倫先是左手患木風指不能屈伸此半身不遂之兆也名韓治為用七針指即伸縮無恙逾兩月復患腿疾必恃杖而行因力辭乞休已而韓為針疾環跳風市三里針數次而疾頓瘳遂視事如故

喻嘉言治季蘅翁將七旬半身不遂已二載病發左半口往右喎昏厥遺尿初服參耆頗當感于左半屬血不宜補氣之說幾至大壞雲間施笠澤以參療之稍安然概從溫補未盡病情也脈之軟滑中時帶勁疾蓋痰與風襍合之症痰為主風為標也又熱與寒襍合之症熱為主寒為標也平時手冷如冰故痰動易厥厥已復甦嘔去痰眠食自若冬月頗能耐寒可知寒為外顯之假寒熱為內蘊之真熱熱蒸為痰阻塞竅隧故衛氣不周外風易入加以房帷不節肝風內虛與風相召是以襍合而成是症耳今欲大理右半

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

脾胃之氣以運出左半之熱痰虛風要非溫補一切所能盡也夫治祲合之病必須用祲合之藥兩時令以盡無窮之變如冬月嚴寒身內之熱為寒所束不得從皮膚外泄勢必深入筋骨為害矣故用薑附暫以精徹外寒而內勢反得宣洩若時令之熱與內蘊之熱相合復助以薑附三熱交煽有灼筋腐肉而已凡治一偏之病法宜從陰引陽從陽引陰從左引右從右引左以參朮為君臣以羚羊柴胡知母石膏為佐使而春夏秋三時可無熱病之累然宜刺手足四末以泄榮血而通氣恐熱痰虛風又而成癱也

朱丹溪治一肥人憂思氣鬱右手癱口喎與補中益氣湯有痰加半夏竹瀝薑汁煎服

程雲來曰里中一老醫右手足廢不能起于床者二年矣忽遇諸塗詢之曰吾之病幾危始服順氣行痰之劑了無應薄暮則神志輒昏度不可支令家人煎進十全大補湯即覺清明遂日服之浹數月能杖而起無何則又能舍杖而步矣經云邪之所湊其氣必虛吾治其虛不理其邪而邪自去吾所以獲全也未曰有是哉使進順氣疎風之劑不輟者墓木拱矣然此

猶拘于成方不能因病變通隨時消息故奏功稍遲使吾為之當不止是也（程雲來醫貫按言）據程說只用大劑人參有痰者宜竹瀝少加薑汁佐之其用四物二陳膽星天麻者大謬

痿

米南宮五世孫巨秀亦善醫嘗診史相脈未發史謂之曰可服紅丸子否米對以正欲用此亦即愈史病手足不能舉朝謁遂廢樞中要務運之帷榻米謂必得天地丹（天地丹諒不可考）而後可丹頭偶失去歷年莫可尋訪史病甚名米於常州至北關登舟買飯偶見有售拳石于肆者頗異米即而玩之即天地丹頭也（史當未死鬼神相之猶）問售者爾自何致此曰去年有人家一妳子以售米因問厥值售者漫索錢萬米以三千酧值持歸調劑以供史史未敢嘗有閣者亦疾瘥試服即能起坐又以起步司田帥之疾史始信而餌身即輕遂內引及史疾再殆天地丹已盡遂薨于賜第（葉紹翁四朝聞見錄）

張子和治武弁宋子玉因駐軍息城五六月間暑雨寒疾病腰胯兩足皆不任用躄而不行求治于張張察其

脈俱滑而有力張憑內經火淫于內治以鹹寒以鹹
水越其膈間寒熱宿痰新者為熱舊者為寒或宿食
宿飲在上脫者皆可涌之宿痰既盡因而下之節次
數十行覺神志日清飲食日美兩足漸舉脚膝漸伸
心降腎升便繼以黃連解毒湯加當歸等藥及瀉心
湯涼膈散柴胡飲子大作劑煎時時呷之而愈直斷
曰瘧病無寒多發五六七月若悞作痺與脚氣治之
用烏附乳沒自然銅威靈仙之類熁針艾火湯煮袋
蒸瘧弱轉加如此而死者豈亦天乎
李成章治一人病瘧李察諸方與治法合而不効疑之
忽悟曰藥有新陳則効有遲速此病在表而深非小
劑能愈乃熬藥二鍋傾寒缸內稍冷令病者坐其中
以藥澆之踰時汗大出立愈 明史 李明玉
龔子才治一人兩足瘧弱不能動止以鹿茸人參各五
錢右剉一劑水煎空心溫服連進數服而愈
孫文垣治徐氏子年弱冠肌肉瘦削尻膝腫大手肘肩
顒皆腫腫處痛熱或作風與溼痰及鶴膝鼓槌風治
病轉甚診之六部皆弦其色青而白飲食少時當長
至曰此筋瘧也諸瘧皆不可作風治病轉甚者以前
藥皆風劑耳風能傷血血枯則筋愈失養況弦脈乃

肝木所主攬前而至是肝有餘而脾土受剋脾傷則
飲食少而肌肉削也經曰治獨取陽明陽明者胃與
胃也法當滋補腸胃俾飲食日加臟腑有所稟受營
衛流行氣煦血濡調養至春君火主事之時宗筋潤
而機關可利也以五加皮茯仁甘草蒼耳子枸杞回
陽人參杜仲黃柏黃耆防風服二十劑而精神壯腰
脊健飲食加惟間夢遺去杜仲加遠志當歸三十帖
全愈

易思蘭治一婦人年十九稟賦怯弱庚辰春因患瘧疾
卧榻年餘首不能舉形瘦如柴髮結若鑪起便皆賴
人扶一粒不嘗者五月惟日啖甘蔗汁而已服滋陰
降火藥百帖不効有用人參一二錢者輒喘脹不安
其脈六部俱軟弱無力知其脾困久矣以補中益氣
湯加減之而人參更加倍焉服二劑遂進粥二盞雞
蛋二枚後以强筋健體之藥調理數月飲食步履如
常全愈

陸養愚治王庶陽中年後患手足拘攣屈伸不利以風
溼治不効脉之左手細數重按則駛右手稍和重按
亦弱告曰始偶不謹而冒寒便發寒熱口苦筋骨疼
痛服發散藥寒熱除而口苦疼痛不減至月餘先左

足拘攣難以屈伸漸至右足亦然又漸至兩手亦然
手更振掉不息醫數十人不外疎風順氣和行氣行
血而已數月前少能移動而振動疼痛不可忍今雖
不能移動幸不振掉疼痛曰若不疼痛大事去矣曰
不移動則不痛若移動極其痠痛曰幸尚可藥此筋
痿症也必少年房帷間曾有所思慕而不得遂否曰
早年一婢其色頗丑因昵之拙荊覺而私黜他方後
極想念半年間慾事反縱嘗患遺精白濁今陽事又
不起矣曰內經痿論肝氣熱則膽泄口苦筋膜乾筋
膜乾則筋急而攣發為筋痿由思想無窮所願不得
意淫于外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫
又曰筋痿者生于疾使內也蓋願念不遂遇陰必慾
風寒乘虛襲之不覺中年後血氣既衰寒變為熱風
變為火消精爍髓而病作醫又以風熱之藥治之重
耗其血筋無養不能束骨而利機關而病轉劇所幸
飲食未減大便猶實蓋痿症獨取陽明陽明盛則能
生氣生血用當歸地黃參耆白朮丹皮黃柏青蒿山
萸枸杞牛膝少加秦艽桂枝羌活獨活煎服又以紫
河車鹿角龜板虎脛骨熬膏酒服兩許調治一月而
起

李士材治朱太學八年痿廢屢治無功診之六脈有力飲食如常此實熱內蒸心陽獨亢症名脈痿用承氣湯下六七行左足便能伸縮再用大承氣又下十餘行手中可以持物更用黃連黃芩各一觔酒蒸大黃八兩蜜丸日服四錢以人參湯送一月之內去積滯不可勝數四肢皆能展舒曰今積滯盡矣煎三才膏十觔與之服畢而愈

倪文學四年不能起于牀李治之簡其平日所服寒涼者十六補肝腎者十三診其脈大而無力此營衛交虛以十全大補加秦艽熟附各一錢朝服之夕用八味丸加牛膝杜仲遠志萆薢虎骨龜板黃柏溫酒送下七錢凡三月而機關利

高兵尊患兩足痠軟神氣不足向服安神壯骨之藥不効改服滋腎牛膝苡仁二妙散之屬又不効純用血藥脾胃不實診之脈皆沖和按之亦不甚虛惟脾部重取之澁而無力此上虛下陷不能制水則溼氣墜于下焦故膝脛為患耳進補中益氣倍用升麻數日即愈夫脾虛下陷之症若誤用牛膝等下行之劑下愈陷此前藥之所以無功也

喻嘉言治徐嶽生軀盛體充昔年食指因傷見血冷水

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

灌之血凝不散腫潰出膿數升小筋脫出三節指廢不伸後兩足至秋畏冷重綿蔽之外拘乃熱內搐覺寒近從踵至膝後筋痛不便遠行醫令服八味丸深中其意及診自云平素脈難摸索乃肝肺二部反見洪大大為病進時在冬月木落金寒尤為不宜八味丸之桂附未可輕服也益筋者肝之合也附筋之血既經食指外傷不能榮養筋脈加以忿怒數動肝火傳熱于筋足跗之大筋得熱而短是以牽強不便於行也然肝木所畏者肺金故必肺氣先清周身氣乃下行今肺脈大則為心主所傷而壅窒是以氣不下達而足寒也其實肝燥生火反來乘金與心主何與所患雖微已犯三逆平素脈細而今大一逆也肝脈大而熱下傳二逆也肺脈大而氣上壅三逆也設以桂附治之壅熱愈甚即成瘂瘖矣故治此患先以清金為第一義清金又以清胃為第一義胃不清則飲酒之熱氣厚味之濁氣咸輸于肺矣藥力幾何能勝清金之任哉金不清如大敵在前主將懦弱已不能望其成功況舍清金而更加以助火鑠金倒行逆施以為治耶必不得之數矣原注後徐仍服八味一月餘竟成瘂瘖臥床一載聞最後陽道盡縮小水全無乃肺金之氣先絕于上所以致此

錢叔爺形體清瘦平素多火少痰邇來內蘊之熱蒸濕為痰夏秋間溼熱交勝時忽患右足麻木冷如冰石蓋熱極似寒誤以牛膝木瓜防己加皮羌獨之屬溫之甚且認為下元虛憊誤用桂附河車之屬補之以火濟火以熱益熱由是腫潰出濃水浸淫數月足背趾踵廢而不用（可立假寒假熱兩總門實為瘵之變症）果寒痰下墜不過堅凝不散止耳甚者不過瘵痺不仁止耳何至腫而且潰黃水淋漓腐肉穿筋耶蓋此與傷寒壞症熱邪深入經絡而生流注同也所用參膏但可專理元氣而無清解溼熱之藥以佐之是以

元老之官而理繇劇也若與竹瀝同事人參固其經竹瀝通其絡則甘寒氣味相得益彰矣徐某服人參以治虛風誤以附子佐之迄今筋脈短縮不便行持亦由不識甘寒可通經絡也今用參膏後脾亦大旺乃日食而外加以夜食（喜食亦必桂附為祟）是以所生之脾氣不用之運痰運熱只用之運食誠可惜也近者食亦不易運以助長而反得衰乃至痰飲膠結胸中為飽為悶為頻咳而痰不應（予常見肺熱之人雖產婦服參亦多此症）總為脾失其健不為胃行津液而飲食反以生痰漸漬充滿肺竅咳不易出（嗇由內熱之故雖與脾卻無與）雖以治痰為急然治

痰之藥大率耗氣動虛恐痰未出而風先入也惟是確以甘寒之藥杜風消熱潤燥補虛豁痰乃為合法至于辛熱之藥斷斷不可再誤矣醫者明明見此輒用桂附無算想必因膿水易乾認為辛熱之功而極力以催之結局耳可勝誅哉

按此症實為肝經燥火鬱于脾土而成世罕知者即喻君亦以膿水浸淫認為溼熱予有治黃澹翁案附後

盧不遠治織造劉監病瘵一年欲求速効人亦以旦暮効藥應之二月診之六脈細弱血氣大虛而其性則忌言虛以已為內家也然多手閹近侍之美者（此即內經所謂思想無窮所願不得意淫于外及為白淫是也）乃直謂之曰尊體極虛非復人參百劑不復能愈若所云旦暮効者是欺也不敢附和遂用十全大補湯四劑後乃陽為不用參而陰用之至四月參且及觔藥將百帖而能起矣次年七月疾作欲再用前法加參不信因斷其至冬仍瘵立春必死果然

馮楚瞻治李主政足病疼痛不堪步履又廢醫用脚氣祛風燥溼之劑久服不効飲食不甘精神益憊脈之兩寸洪大而數兩關更弱兩尺更微擾脈乃上熱中

虛下寒也再用祛風燥溼則氣血更受傷矣夫治痿獨取陽明而脾主四肢肝主筋腎主骨則足三陰宜並重焉羽翼軒岐誠在此等餘子紛紛不足數也乃與重劑熟地麥冬牛膝五味製附子炒黃白朮加杜仲另煎參湯冲服十餘劑漸愈再用生脈飲送八味丸加牛膝杜仲鹿茸丸及歸脾湯全瘳

孫文垣治一文學兩足不疲不痛每行動或狃于左而又墜于右或狃于右而又墜于左之宮而行不能正步此由筋軟不能束骨所致夫筋者肝之所主肝屬木木縱不收宜益金以制之用人參黃芪白芍以補肺金苡仁虎骨龜板杜仲以壯筋骨以銕華粉崙制肝木蜜丸早晚服之竟愈（然則此亦筋痿病也）

邱太守姪丁年患兩手筋攣指掉不能屈伸臂肉肉削體瘠面白寢食大減脈之六部俱弦重按稍駛自去冬偶發寒熱筋骨疼痛至仲春寒熱退而筋骨之疼不減藥無虛日甚則日進三四劑謂是風而治不効孫謂此筋痿症也乃少年多慾且受風溼邪氣乘虛而入醫者不察天時不分經絡緊行汗之仲景治風濕之法但使津津微汗則風溼盡去若汗大出則風去而濕存由是氣血俱虛經云陽氣者精則養神柔

則養筋虛則筋無所養漸成瘂弱乃不足之病古人皆謂諸瘂不可作風治誤則成痼疾曰服風藥已二百劑矣顧今柰何曰幸青年猶可圖也法當大補氣血經云氣主煦之血主濡之血氣旺則筋柔軟筋柔軟則可以束骨而利機關又何攣掉之有以五加皮故仁紅花人參鹿角膠龜板虎骨當歸丹皮地黃骨碎補蒼耳子之類服兩月肌肉漸生飲食大進兩手攣掉亦瘳

黃履素曰余已酉夏應試南都與姊丈吳公甫聯社課藝見公甫步履微有不便云苦腿痛精神固無恙也

聽庸醫之言以為風濕專服祛風燥溼之劑形容日槁八月間見咯血之症肌肉盡削至冬而歿即此驗之則腿足疲瘁不可概作風治也益明矣腿足皆是三陰部位多係肝腎陰虛法宜滋補顧反服風藥以耗之寧不速其死

張三錫治一蒼瘦人每坐輒不能起左脈微弱右關寸獨弦急方無因酒色太過所致用丹溪加味四物湯不二十劑愈後服鹿角膠調理

一人體厚二足行履不便時作眩暈以大劑二陳加南星二朮黃柏黃芩入竹瀝薑汁數劑頓愈作瘂治

一人自覺兩足熱如火炙自足踝上下衝腿膝且痿弱軟痛脈濡而數乃溼熱挾虛也以蒼朮黃柏為君四兩牛膝二兩龜板虎脛骨漢防已各一兩當歸二兩人參二兩山藥糊丸桐子大每服一百丸空心鹽湯下古方加附子

一老人痰厥用虎潛丸不應後于虎潛丸加附子遂愈蓋附反佐之功也

一人兩足沉重不能舉六脈沈數詢之平居痛飲遂作溼熱治乃以四苓二妙加牛膝木通防已數服漸減用健步丸調理而安

薛立齋治舉人于尚之素腎虛積勞足痿不能步履後舌瘡不能言面色黧黑謂此腎氣虛寒不能運及所發用地黃飲子治之而愈後不慎調攝而復作或用牛黃清心丸之類小便秘濇口舌乾燥仍用前飲及加減八味丸漸愈又用補中益氣湯而痊

冢宰劉蒸岩因勞下體軟痛發熱痰盛用清燥湯入竹瀝薑汁服之熱痛減半再劑而全愈

張路玉治勞俊卿年高孿廢或用木瓜獨活防已威靈仙蒼朮之類半年餘致跬步不能移動或令服八味丸亦不應脈之尺中微浮而細時當九夏自膝至足

皆寒冷如從水中出知為腎虛風雨所犯而成是疾遂與安腎丸方終劑能步履連服二料絶無痿弱之患矣

陸養愚治施鳳岡母年五旬患四肢削而微腫腕膝指節間腫更甚筋外露而青向來月事後必煩燥一二日因而吐血或便血一二日服涼血藥丹皮生地芩連之類三劑方止若不服藥則去血必多近來天癸既絶血症亦減而肢節之症作矣史國公藥酒服之無効數年間蒼朮烏附羌活茅蒼及活絡諸湯驅寒勝溼之劑皆遍服今且飲食便溏動輒須人攣痛尤不可忍脈之六部微澁兩尺緩弱尤甚曰始因過用寒涼損其肝氣繼則多用風燥耗其肝血肝主筋今氣血俱虛筋失其養故腫露而持行俱廢也用人參當歸川芎首烏少佐肉桂秦艽為煎劑以虎潛丸料倍鹿角膠為丸服月餘而減三月而行持如故半年全瘳

朱丹溪治鄭安人年六十虛而有痰脈緩足弱與半夏天麻白朮湯下酒芩丸飲食如常惟言一士夫因脚弱求診兩手俱浮洪稍鼓飲食如常惟言問不答肌上起白屑如麩片時在冬月作極虛處治

詢其弟乃知半年前曾于背臂腿三處自夏至秋冬節次生疽率用五香連翹湯十宣散與之今結痂久矣為作參耆白朮當歸膏以二陳湯化飲之三日後盡藥壹劑白膚沒者大半病者自喜呼吸有力補藥應効以漸而病家反怨藥不速應自作風病論治煉青礞石二錢半以青州白丸作料煎飲子頓服之阻之不聽因致不救書以為警云瘧盛作風治多死

薛立齋治一婦人患血痔兼腿痠痛似痺此陰血虛不能養于筋而然也宜先養血為主遂以加味四斤丸治之愈

一老人筋攣骨痛兩腿無力不能步履以三因勝駿丸治之而愈

一婦人筋聳痺縱兩腿無力不能步履以局方換腿丸治之而瘥河間云脚氣由腎虛而生然婦人亦有病脚氣者乃因血海虛而七情所感遂成斯疾今婦人病此亦衆則知婦人以血海虛而得之與男子腎虛類也男女用藥固無異更當兼治七情無不効也（因虛而成故以入瘵）

姚僧垣治金州刺史伊婁穆自腰至臍似有三縛兩脚緩縱不復自持僧垣為診脈處湯三劑穆初服一劑

上縛即解次服一劑中縛復解又服一劑三縛悉除而兩脚疼痺猶自攣弱更為合散一劑稍得屈伸僧垣曰終待霜降此患當愈及至九月遂能起行周書

琇按此即春夏劑秋冬差之癒症也

張子和曰宛邱軍校三人皆病癒積年不癒腰以下腫痛不舉遍身瘡疥兩目昏暗唇乾舌燥求治于張張欲投瀉劑二人不從為他醫溫補之藥所惑皆死其同病有宋子玉者俄省曰彼以熱死我其改之竟從治之而愈張曰諸癒獨取陽明陽明者胃與大腸也此言不止謂針也針與藥同也

王執中曰列子載偃師造倡云屢其腎則足不能行人患此益腎有病也當灸腎俞或一再灸而不効宜灸環跳風市犢鼻膝關陽陵泉陰陵泉三里絕骨等穴但按略痠痛處即是受病處灸之無不効也資生經

施靈修有一里人善酒臥牀褥者三年靈修憐而索方于仲淳仲淳親診之知其酒病也夫酒濕熱之物多飲者溼熱之邪貫于陽明溼熱勝則下客于腎而為骨癒昔人治癒病取陽明以五味子為君黃連為臣麥冬乾葛扁豆為佐服之愈廣筆記

立齋治一人年逾五十筋骨軟癒臥床五年遍身瘙痒

午後尤甚以生血藥治之痒漸愈瘥少可更以加味四斤丸治之調理謹守年餘而瘥河間云熱淫于內而用溫補藥何也蓋陰血衰弱不能養筋筋緩不能自持陽燥熱淫于內宜養陽滋陰陰實則水升火降矣

錢國賓治龍泉沈士彥平生無病肝氣不平過五八腿無故而軟由軟至癱由癱至攣卧床不起矣遍寫病狀與知識求醫荅之曰能直不能屈者其病在骨能屈不能直者其病在筋筋舒則無病矣內經云心生血肝藏血公平生肝薄多怒血不能養筋筋不能束骨耳又則冷痺而攣彼聞此論遣使求方用臍帶紫河車為君人參枸杞何首烏為臣芎歸地芍牛膝紅花為佐使血旺則養筋筋和則束骨此藥作丸服矣外取童便數升盛大缽內以腿放缽上缽放腿下另置炭火一爐用新瓦三四片每片打二三塊燒紅淬童便內更易不論次數口取熱氣熏筋約一時止之次日再如此半月筋舒一月能步二月能走矣童便味鹹寒鹹能軟堅又能走血消瘀經云血不足者補之以氣謂陰生于陽也又經火氣熱散筋骨冷痺藉瓦引導筋骨之分治法深奥得竅者知之

張玉書子年近三十忽寒熱頭痛時師謂傷寒也蠻治月餘後竟不知為何病唯晝夜喊叫痛極延診問何遲曰人皆謂先生崇用補渠係傷寒故不敢請領之入視見病人尸臥在牀髮長覆額面垢鼻煤皮枯肉腊狀如奇鬼脈之弦而堅左關尺殊濇數詢其痛處起自臀側下連趾踵肩背頭腦亦時抽痛僵直莫能動動則欲死乃謂其父曰此筋骨兼瘵之候也若早補何至此極此由少年不慎接內之後即遠行勞役三陰受傷令痛自環跳穴下連大敦隱白涌泉盜三穴為肝脾腎所主至至連肩背頭腦皆掣痛督脈亦傷矣其母私問之果以內後因事疾走江干歸而疾發其父曰洵如是已誤治許時今柰何曰幸少年氣血易復第需服藥百劑否則雖愈必跛也與肉蓯蓉生熟地杞子米仁當歸牛膝紅花丹皮萸仁麥冬之屬十劑能起坐又十劑可杖而行其父素慳吝見病已起遂勿藥後果一足筋短一二寸至今行路傾欹

吳太宜人年六旬外病筋絡抽掣上連顛頂肩項下至腰腹腸脇莫不牽痛背脹頭暈口燥心忡便數食減兩手極熱常欲冷水浸之診得脈弦急而疾曰症即多端均由肝火盛而血液虧筋燥失養又之則成瘵

矣但濡以潤之可立愈也與養青湯加米仁薏仁當歸女貞等十劑而瘥

痛痺

方勺云一人遍體作痛殆不可忍都下醫或云中風或云中濕或云脚氣藥悉不効周言亨言是氣血凝滯所致用元胡索當歸桂心等分為末溫酒服三四錢隨量頻進以止為度遂痛止蓋元胡索能活血化氣第一品藥也其後趙待制霆因導引失節肢體拘攣亦用此數服而愈（宅編本草綱目）

汶陽錢仲暘為宋之一代名醫自患周痺每取茯苓其大逾斗者以法啖之閱月乃盡由此雖偏廢而氣骨堅悍如無疾者壽八十二而終（宋史翼續編）

張子和治一衲子因陰雨臥濕地一半手足皆不隨若遇陰雨其病轉加諸醫皆作中風偏枯治之用當歸白芍乳香沒藥之類久反大便濇風燥生經歲不已張以舟車丸下之三十餘行去青黃沫水五升次以淡劑滲泄之數日手足皆舉張曰夫風溼寒之氣合而成痺水痺得寒而浮畜于皮腠之間久而不去內舍六府曰用去水之藥可也水濕者人身中之寒物

也寒去則血行血行則氣和氣和則愈矣

邊校白公以隆暑時飲酒覺極熱于涼水池中漬足便其冷也為溼所中股膕沉痛又因醉臥濕地其痛轉加意欲以酒解痛遂連朝而飲反成赤痛發閒止且六七年往往斷其寒濕脚氣以辛熱治之不効或使劑涌之次以舟車丸百餘粒濬川散四五錢微一兩服神芎丸數服痛微減他日復飲疾作如前睾囊痒濕腫硬臍下似有物難于行張曰予亦斷為寒濕但寒則陽火不行故為痛濕則經隧有滯故腫先以苦行張曰如激劑尚不能攻況於熱藥補之乎異日又用神祐丸百三十丸通經散三四錢又來日以神祐八十丸投之續見一二行又次日服益腎散四錢舟車丸百餘粒約下七八行已覺膝睾寒者暖硬者軟重者輕也腫者赤退飲食加進又以涌之其病全瘥

疏疎風丸方與之此不肯妄服辛熱故可治也

梁賈人年六十餘忽曉起梳髮覺左指麻斯須半臂麻又一臂麻斯須頭一半麻比及梳畢從脇至足皆麻大便二三日不通醫皆云風也或藥或針皆不効左手三部脈皆伏比右手小三倍此枯澇痺也不可純歸之風亦有火燥相兼乃命一涌一泄一汗其麻立

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

已後以辛涼之劑調之潤燥之劑濡之惟小指次指尚麻張曰病根已去此餘烈也方可針谿谷谿谷者骨空也一日晴和往針之用靈樞中雞足法向上臥針三進三引訖復卓針起向下卧針送入指間皆然手熱如火其麻全去劉河間作原病式常以麻與濇同歸燥門中真知病機者也

琇按燥為六氣之一其為病至夥而烈然皆病成而變者為多故皆散入諸症不能耑立一門

一貧人病遷痰腫痛經年不能行遇乞食道人授一方用菴蕳艸水紅花蘿蔔纓白金鳳花水龍骨花椒槐條甘艸蒼朮金銀花共十味煎水蒸患處水稍溫即洗之此方已醫好數人（續金陵瑣事）

周漢卿治諸暨黃生背曲須杖行他醫皆以風治之漢卿曰血濇也刺兩足崑崙穴頃之投杖去（明史）

朱丹溪治何縣長年四十餘形瘦性急因作勞背痛臂疼骨節疼足心發熱可與四物湯帶熱下大補丸保和丸共六十粒食前服

許知可在歙川有一貴家婦人遍身走注疼痛至夜則發如蟲嚙其肌多作鬼邪治許曰此正歷節症也以麝香丸（大川烏三个去皮尖生用全蝎二十一个黑豆二十一粒地龍去土五錢麝香一字為末）

米糊丸菉豆大每服十丸溫酒下三服愈此藥專治白虎歷節風疼痛遊走無定狀如蟲行晝靜夜劇本事方醫說續編

陳良甫治一婦人先自兩足踝骨痛不可忍次日流上于膝一二日流於髀骨甚至流於肩肩流於肘肘流于後谿或如鎚鍛或如蟲嚙痛不可忍晝靜夜劇服諸藥無效名僕診之六脈緊曰此真歷節症也非解散之藥不能愈但用小續命湯一劑而效　鄧安人夏月亦病歷節痛不可忍諸藥不効良甫診之人迎與心脈虛此因中暑而得之合先服酒蒸黃連丸衆醫莫不笑用此藥一服即愈自後與人良驗良方

龔子才治張太僕每天陰即遍身痛如錐刺已經數年左脈微數右脈洪數乃血虛有濕熱也以當歸拈痛湯加生地白芍黃柏去人參數劑而瘳

張子和治麻先生妻病伐拈痛不可忍酒調通經散一錢半夜大吐吐畢而減減因歎曰向見陳五曾病此醫以為小蟲傷或以草上有毒物目觸之遷延數月膿盡方已今日觀之可以大笑

孫真人云予以貞觀五年七月十五日夜以左手中拈背解著庭木至曉痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色常聞長者之論有此方遂依治之

手下即愈痛亦除瘡亦即瘥未十日而平復楊炎南行方著其効云其方取蒲公艸搗傅上千金方序

瑣按上二症即世俗所謂木蛇咬也張說似不然之

虞天民治一男子四十歲因感風溼得白虎歷節風症遍身抽掣疼痛足不能履地者三年百方不効身體羸瘦骨立自分於死一日夢與木通湯服愈遂以四物湯加木通服不効後以木通二兩剉細長流水煎汁頓服服後一時許遍身痒甚上體發紅丹如小豆大粒舉家驚惶隨手没去出汗至腰而止上體不痛矣次日又如前煎服下體又發紅丹方出汗至足底汗乾後通身舒暢而無痛矣一月後人壯氣復步履如初後以此法治數人皆驗

潘塤曰予少時讀書郡學夏月跣足風溼搏于右足外踝注痛十餘年足跟不仁宦遊北方少愈歸老又發前後幾四十年沉痼之疾也嘉靖丁未右臂亦遭此患牽連上下手腕及指將成偏痺用藥宣通驅逐數貼攻禦百不効蓋風邪入于骨藥力莫能達也予思骨必有竅喘息呼吸百骸相通邪氣因乘虛而入亦可引之而出又思手居上體出路頗近先從手臂試

之乃澄心靜慮每夜側卧右臂向上伸手平躡以意從肩井骨竅中步步存想而下直至指尖復徐徐引氣而上過兩腕直至肩井旁分一路穿頸入喉出口細細吐之每夜如是行者往復十數遍倦則止行之二三夜意熟路通又四五夜覺骨竅中有一綫氣隨意想上行微微牽痛至十數夜覺肩井紅腫生小瘡而腹亦微痛蓋惡氣上衝肩井旁一路由喉下墜入腹不能盡從口中吐出也乃用拔毒膏貼肩井瘡潰而成膿腹自利二三遍痛止而右臂豁然通矣因思足外踝歲雖久而病根新發道路雖遠而骨竅相通亦如前法側臥伸足以意存想以漸引氣過膝穿腿入腹則惡氣注腹而大痛口不及引之而出也忽一日大瀉四五遍臭味極惡而足病亦瘳此殆神啓愚衷獨得靈異之訣至妙至妙者歟而昔人未之有行也（楮記室）

琇按此與景岳之父導痰飲之法頗同宜參閱張案在飲門

孫文垣治姚画老夫人年幾七十右手疼不能上頭醫者皆以中風治不効益加口渴煩躁診之右脈浮數左平曰此溼痰生熱熱生風也治宜化痰清熱兼流

動經絡乃瘳也二陳湯倍加威靈仙酒芩白僵蠶秦艽四劑病去如失

宋青龍中司徒顏奮女苦風痰一髀偏痛有人令穿地作坑取雞矢荊葉然之安膕入坑中熏之有長蟲出遂愈也范注方本草綱目

吳少溪有酒積常患胃腕痛近又腰眼足跟肢節皆痛孫曰此由濕熱傷筋脾肺痰火所致法宜清肅中宮消痰去濕俾經絡流通筋骨自不疼矣切不可作風痛而用風劑以二陳湯加威靈仙蒼朮黃柏五加皮杞實葛根山巵進之肢節痛減改用清氣化痰丸加

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

瓦楞子蒼朮杞實薑黃竹瀝神麴打糊為丸調理而安

李妓體素肥患痛風自二月起至仲冬諸治不効六脈大而無力手足肢節腫痛兩膀亦痛不能起止肌肉消半日僅進粥二椀月汎兩月一行曰此行痺也以人參白朮茯仁各三錢當歸杞杜仲龜板蒼耳子各二錢晚蠶沙秦艽防風各一錢附子甘草桂枝黃柏各五分十帖痛止腫消改用歸芍六君子加茯仁丹參紅花石斛紫荊皮三十帖全愈業中孫鬚為友人泥此妓無力

贖之孫乃力肩治愈設法卒歸其人為良家婦茲以文繇節之

崔百原年餘四十為南勳部郎患右脇痛右手足筋骨俱痛艱于舉動者三月醫作偏風治之不効孫視其色蒼神困性多躁急脈左弦數右滑數時當仲秋曰此溼痰風熱為痺也脈之滑為痰弦為風數為熱蓋溼生痰痰生熱熱壅經絡傷其營衛變為風也非假歲月不能愈與二陳湯加鉤藤蒼耳子苡仁紅花五加皮秦艽威靈仙黃芩竹瀝薑汁飲之數日手足之痛漸減脇痛如舊再加鬱金川芎白芥子病俱稍安囑其慎怒內觀以需藥力遂假歸調養半年而愈

夏益吾肢節腫痛手足攣腫痛尤甚不能動止凡腫處皆紅熱先起于左手右足五日後又傳于左足右手此行痺症也且喘咳氣湧不能睡脈之左浮數中按弦右滑數乃溼熱風痰壅遏經絡而然以蒼朮薑黃苡仁威靈仙秦艽知母桑皮黃柏酒芩麻黃服下右手腫消痛減夜服七制化痰丸而嗽止得睡再劑兩足消半左手經渠列缺穴邊腫痛殊甚用苡仁蒼朮秦艽甘草花粉五加皮石斛前胡枳殼威靈仙當歸旋服旋愈

一婦人年五十餘向來小水短少今則右臂腫起骨邊一點痛夜尤甚已半月治不効且右邊手肢節皆脹

痛筋皆暴起肌肉上生紅點子脈兩手皆滑數右尺軟弱乃溼熱傷筋而成痛痺以東垣舒筋湯為主兩帖而愈

族孫壯年患筋骨疼痛肢節腫痛處處如虎嚙如火燎非三五人不能起居呻吟不食醫投疎風之劑不應又以乳香沒藥活血止痛亦不應診之六脈浮緊而數曰此周痺也俗名白虎歷節風乃濕熱所致丹溪云腫屬溼痛屬火火性速故痛暴而猛以生地紅花酒芩酒連酒柏秦艽防風羌活獨活海桐皮威靈仙甘艸四帖痛減大半再加赤芍當歸蒼耳芡仁去獨活秦艽又八帖全愈

陸養愚治孫監司體肥畏熱平時澡浴每以扇代拭後因喪子悲哀不思粥飯惟恣飲自解忽脊背似脹漸及肘膝痠痛醫謂脈氣虛弱骨節痠痛乃血虛火鬱也用四物湯加丹皮山巵香附等十劑不効改用牛膝首烏枸杞輩又十劑亦不効再用鹿膠虎骨河車病如故舉止甚艱時令人熱手拊摩初則輕按如刺良久雖重亦不痛矣脈極浮極滑診畢以飲症對問出何書曰仲景要略云飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出名曰溢飲今聞澡浴不拭是外之水濕

浸入於皮膚矣又悲憂飲酒內經謂悲哀傷肺肺傷則分布之令失且又過飲則內之水溼能不溢於經絡乎其特甚于陽分部位者外濕不拭陰處熱而易乾陽處冷而難乾又酒性屬陽故其濕亦并溢于陽分也治法溢飲者當發其汗時天氣頗寒令搆一密室四圍生火熱湯置浴桶中令乘腹飽時浴之良久投藥一劑用防風五錢蒼朮三錢麻黃蘇葉羌活獨活威靈仙甘草各一錢煎一二沸熱服一滿椀頻添熱湯浴至汗透方止逾時便覺身體寬暢夜間甚安閒三日又為之如是五次遍體輕快病全去矣

邵南橋子壯年患遍身筋骨疼痛肢節腫脹痛處熱如火煆食飲不進呻吟不已其脈浮之而數沉之而澁曰此似白虎歷節症而其因總不出於血虛有火若誤以為風氣投表散燥熱之藥病必增劇用生地當歸白芍紅花酒芩秦艽花粉連翹數劑減半十劑全瘳

李士材治陸文學兩足麻木自服活血之劑不効改服攻痰之劑又不効半載後手亦麻左脇下有尺許不知痛痒曰此經所謂著痺也六脈大而無力氣血皆損用神効黃耆湯加茯苓白朮當歸地黃十劑後有

小効更用十全大補五十餘劑始安

王孝廉久患流火靡藥弗嘗病勢日迫李曰經年之病痛傷元氣非大補氣血不可彼曰數日前曾服參少許痛大作故不敢用李曰病有新久之不同今大虛矣而日從事于散風清火清火則脾必敗散風則肺必傷言之甚力竟不能決遂不起

一人遍體疼痛尻髀皆腫足膝攣急李曰此寒傷榮血筋脈為之引急內經所謂痛痺也用烏藥順氣散七劑而減更加白朮桂枝二月而愈

馮楚瞻治李相國諱之勞當耿逆之變勤勞軍旅左臂強硬作痛上不能至頭下不能撫背醫與驅風活絡不効且大便圓如彈子以書有糞如羊矢者不治深以為憂診之六脈大而遲緩無神知為中氣久虛榮衛不能遍及支末乃有偏枯之象至其大便亦由中氣不足命門火衰以致運行不健轉輸遲滯糟粕不能連接直下猶蜣螂之轉丸故圓而且大非若鬭格之病津液燥槁腸胃窄細致黑小如羊糞者然宜空心服八味加牛膝杜仲以培其本食遠以加減歸脾加甜薄桂以壯其標元陽得旺則運行健而大便自調氣血既充則肢節和而臂強自愈矣如法而痊精

更倍

盧不遠治張二如病脊膂痛艱于起拜形傴僂楚甚脈之以為精虛須龜鹿四仙膏一大劑服三月方可愈也彼不信越三年再求治用四仙膏一料佐以透冰丹二十粒全愈或問故曰此房後風入髓中骨氣不精故屈伸不利也用透冰以祛腎風用四仙以填骨髓病去精滿百體從令矣廣渠三年之中未嘗不服補精血祛風邪之藥不知藥不可僅恃而用必使之填髓入骨中透風自骨出斯為合法耳

孫文垣治程參軍年六十四向以痲脅服下元藥太多

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

冬月單袴立溪邊督工受寒致筋骨疼痛肩井缺盆脚膝跟踝及骨節動處皆紅腫而痛卧床三年或認為虛為寒為風為溼百治不効腿間大肉盡消惟骨節各處腫大而痛脈之弦濇有力知為溼熱痰火被寒氣凝滯固濇經絡也所喜目中精神尚在胃氣未全損其小便在罷少頃則澄結為砂色紅而濁兩膝下及脚指皆生大瘡瘡靡如靴釘狀皆由向服春方所致為先逐經絡凝滯然後健脾消痰俾新痰不生血氣日長後以補劑收功斯得矣以新取威靈仙一觔裝新竹筒中入燒酒二觔塞筒口刮去青皮重湯

煮三炷官香為度取出晒乾為末用竹瀝打糊為丸桐子大早晚酒送一錢日服二次五日後大便去稠黏痰積半桶腫痛減大半改以人參石斛蒼朮黃柏苡仁蒼耳子牛膝烏藥葉龜板紅花犀角木通煎服二十帖又用前末藥服三日又下痰積如前之半仍以前藥服半月又服末藥三日腹中痰漸少乃以虎骨晚蠶沙蒼朮黃柏丹參杜仲牛膝薤葉苡仁紅花五加皮蒼耳子龜板酒打糊丸梧子大每空心服七八十丸外以丹溪保和丸食後服半年全愈

孫質菴患痛風兩手自肩髃（巨骨下臂臑上）及曲池（肘彎處三里上）兩足自膝及跟尻腫痛更甚痛處熱（火流注也）飲食少伏蓐者三年脈之皆弦細而數面青（肝色）肌瘦（火多）大小腿肉皆瘦削（三陰虛損）曰此得之稟氣弱下虛多內以傷其陰也治當養血舒筋使經絡通暢待痛止即以大補陰血之劑實其下元與五加皮蒼朮黃柏蒼耳子當歸紅花苡仁羌活防風秦艽紫荊皮二十劑筋漸舒腫漸消痛減大半更以生地龜板牛膝蒼朮黃柏晚蠶沙蒼耳子苡仁海桐皮當歸秦艽三十劑腫痛全減戒之曰難足而易敗者陰也須痛絕酒色以固根本斯刀圭可恃乃用仙茅為君杞子牛膝鹿膠虎骨

人參為臣熟地黃柏晚蠶沙茯苓蒼耳子為佐桂心秦艽澤瀉為使蜜丸服百日腿肉長完精神復舊

薛立齋治一男子先腿痛後四肢皆痛遊走不定至夜益甚服除溼敗毒之劑不應診其脈滑而濇此溼痰濁血為患以二陳湯加蒼朮羌活桃仁紅花牛膝草烏治之而愈凡溼痰溼熱或死血流注關節非辛溫之劑開發腠理流通隧道使氣行血和焉能得愈

一男子肢節腫痛脈遲而數此溼熱之症以荆防敗毒散加麻黃二劑痛減半以檳榔敗毒散四劑腫亦消更加四物湯加二朮牛膝木瓜數劑而愈

一婦人兩腿作痛時或走痛氣短自汗諸藥不應診之尺脈弦緩此寒濕流注于腎經也以附子六物湯治之而愈但人謂附子有毒多不肯服若用童便炮製何毒之有況不常服何足為慮薛中氣不足以補中益氣湯加附子服之三年何見其毒也經云有是病用是藥

馮楚瞻治唐某患左足左手骨節疼痛勢如刀割旦夕呼號既而移至右手右足皆遍矣或用祛風活絡之劑不効見其口燥咽乾誤作流火投以涼劑幸而吐出神氣疲困六脈洪弦此氣血久虛筋骨失養將成

癱瘓之候惟宜大用熟地當歸白芍養血為君銀花
秦艽少借風勢以達藥力于筋骨為臣牛膝續斷杜
仲以調筋骨為佐更用桂枝松節以鼓舞藥性橫行
于兩臂為引再加參朮以固中培元調理半月漸瘳
後以生脈飲送八味丸之加牛膝杜仲鹿茸五味子
者四五錢日中仍服前劑始能步履更以大補氣血
強筋壯骨之藥以收全功　未幾其室人因日夜憂
勞亦患是症六脈沈微右手足疼痛既而不流于左
而竟攻于裡之胸脘痞悶惡心疼痛欲絶知為內傷
日久寒邪不為外達直中陰分宜急溫之以人參白
朮各五錢肉桂附子各二錢濃煎徐徐溫服次日脈
少起胸中痛悶大減身有微熱左亦畧疼此陽氣還
表寒邪欲外散之機也照方再服內症漸平惟手足
之痛尚在然亦不甚以參朮補中為君歸芍養血為
臣杜仲續斷牛膝秦艽桂枝舒經活絡為佐全愈夫
痛風止有五痺皮痺脈痺肌痺骨痺筋痺未聞有臟
腑之痺也然經曰寒氣勝者為痛痺又曰其留連筋
骨間者疼又其留皮膚間者易已其入臟者死可不
慎歟

薛立齋治一婦人肢節作痛不能轉側惡見風寒自汗

盜汗小便短少雖夏亦不去衣其脈浮緊此風寒客于太陽經用甘草附子湯一劑而痊

一婦人月經不調且素有痛風遇勞必作用衆手重按稍止此氣血俱虛用十全大補加獨活而痛痊用六味丸逍遙散而經調

一婦人肢體作痛面色痿黃時或赤白發熱惡寒吐瀉食少腹痛脇脹月經不時或如崩漏或痰盛喘咳頭目眩痛或五心煩熱口渴飲湯或健忘驚悸盜汗無寐等症卧牀年許悉屬肝脾虧損氣血不足所致用十全大補加味歸脾兼服月餘諸症悉痊

張仲景治婦人六十二種風及腹中血氣刺痛以紅藍花酒主之紅花一味以酒一大椀煎減半頓服一半頃之再服

喻嘉言治張令施弟傷寒壞症兩腰僂廢徹夜痛叫百治不効脈亦平順無患其痛則比前大減曰病非死症但恐成廢人矣此症之可以轉移處全在痛如刀刺尚有邪正互爭之象若全不痛則邪正混爲一家相安于無事矣今痛覺大減實可可慮病者曰此身既廢命安從活不如速死欲爲救全而無治法諦思良久謂熱邪深入兩腰血脈久閉不能復出止有攻

散一法而邪入既久正氣全虛攻之人不應乃以桃仁承氣湯多加肉桂附子二大劑與服服後即能强起再仿前意為丸服至旬餘全安此非昔人之已試乃一時之權宜也然有自來矣仲景于結胸症有附子瀉心湯一法原是附子與大黃同用但在上之症氣多故以此法瀉心然在下之症血多獨不可仿其意而合桃仁肉桂以散腰間之血結乎後江古生乃弟傷寒兩腰攣廢痛楚不勞思索徑用此法二劑而愈

陳洪章治沈沃田年六十餘左臂及指拘攣不能伸舒食減神憊或謂老人虛弱用補劑以致日甚陳診之曰此由風溼邪鬱胸脾波及四肢用二陳湯加芒硝砂仁以薏苡仁三兩煎汁煎藥連服四劑病去大半去硝仍用二陳又服六劑而全愈沃田手札

立齋治一婦人肢節腫痛腿足尤甚時或自汗或頭痛此太陽經溼熱所致用麻黃左經湯二劑而愈

昔有人患足瘴者趣舟見舟中一袋以足倚之比及登岸足已善步矣詢袋中何物乃木瓜也本草備要

王執中云有貴人手中指攣已而無名指亦攣醫為灸肩顒曲池支溝而愈支溝在腕後三寸或灸風疾多

有不炙支溝只炙合谷云

李景渠中丞傳筋骨疼痛如夾板狀痛不可忍者將驟子修下蹄爪燒灰存性研末或酒白湯調服立愈廣筆記

馬元儀治陳氏婦患痛痺手足癒瘂周身盡痛不能轉側口乾煩躁脈之弦數兼澁此陽明津液不足則生熱熱勝則生風手足癒瘂者風淫末疾也口乾煩躁者火邪內熾也惟專滋陽明不治風而風自息不治痛而痛自除矣用生首烏一兩生地五錢黃連黃芩秦艽半麴枳殼枳梗各一錢四劑症減六七又數劑而愈

張氏子周身掣痛頭不可轉手不能握足不能運如是者半月矣診之兩脈浮虛浮雖風象而內虛者脈亦浮而無力以脈參症當是勞傷中陽明不治之候也陽明者五藏六府之海主束筋骨而利機關不治則氣血不榮十二經脈無所稟受而不用矣衛中空虛營行不利故相搏而痛也法當大補陽明氣血不與風寒溼成痺者同用人參二錢黃耆當歸各三錢炙甘桂枝紅花各五分秦艽一錢兩劑脈和能轉側去桂枝加白朮肉桂杞子熟地等調理半月而安夫

病有虛實不同治法因之而異風寒溼所致者氣滯于內而為痺邪踞于表而為痛病之實者也陽明中虛所致者血不養筋而為痛氣虛于內而不運病之虛者也其實者急在邪氣去之不速留則生變也其虛者急在正氣補之不早愈又愈劇也凡病皆然不獨此也書之以為見病治病者鑒

袁某患痛痺身及手足掣痛徹夜不得安臥發熱口燥胸滿中痛兩脈弦右關獨大此胃熱壅閉為陽明內實症也陽明之氣不能克灌周身十二經脈不得流利故肢體不能自如以調胃承氣加黃連秦艽一劑大便得通再劑症減六七改用清胃和中之劑調理而愈

吳漢章痛風發熱神昏妄言見鬼手足瘛瘲大便不行此腎水傷而肝木生火內熾則便閉神昏外攻則發熱身痛也法當滋其內則火自息風自除痛自止矣用生首烏蕒仁黃連知母枳殼桔梗桂枝秦艽一劑漸減但心神不安如在舟車雲霧中不能自主改用人參炙艸生地麥冬遠志棗仁茯神貝母橘紅羚羊角三劑再與歸脾湯調理數日而愈

杜漢飛患周身流走作腫手不能握足不能履已三月

脈之浮大而數發熱口乾此陰虛生內熱熱勝則生風風性善行傷于筋脈則縱緩不收逆于肉理則攻腫為楚也用生地五錢酒炒芩連各一錢羌活一錢紅花五分蓋苦以勝熱辛以散風也二劑得酣睡數劑而諸苦若失

治臂腿之間忽一兩點痛著骨不可忍芫花根研為細末米醋調隨大小傅之立効醫云此陶成一醫者方曾以治一婦人產後得此疾者良驗但敷貼不住須以紙花覆其上用絹帛札定也（百七方可入產後痺）

立齋治徐工部宜人先兩膝後至遍身骨節皆痛脈遲緩投羌活勝溼湯及荊防敗毒散加滲溼藥不應次以附子八物湯一劑惡退再服而愈若脈洪數而痛者宜服人參敗毒散

張子和治一稅官病風寒溼痺腰脚沈重浮腫夜則痛甚兩足惡寒經五六月間猶綿脛靴足腰膝皮膚少有跌露則冷風襲之流入經絡其痛轉劇走注上下往來無定其痛極處便臃急而腫起肉色不變腠理開如蟲行每遇風冷病必轉增飲食轉減肢體瘦乏須人扶掖猶能行立所服者烏附薑桂種種燥熱燔針著灸莫知其數前後三年不愈一日命張脈之其

兩手皆沈滑有力先以導水丸通經散各一服是夜瀉二十餘行痛減過半漸服赤茯苓湯川芎湯防風湯此三方在宣明論中治痺方是也日三服煎七八錢熬熬然汗出又作玲瓏竈法熏蒸若血熱病反劇諸汗法古方亦多有之惟以吐發汗者世罕知之故常仲明病溼痺五七年矣張令上涌之後可瀉五七次其藥則舟車瀋川通經神祐益腎自春及秋必十餘次方能愈公之疾不必針灸與令嗣皆宜涌但膶月非其時也欲俟春時恐余東邁令姑屏病之大勢至春和時人氣在上可再涌之以去其根卒如所論而愈

繆仲淳治高存之長郎兩年腹痛愈後又患臂痛每發一處輒于手臂指屈伸之間腫痛不可忍三四日方愈痛時在手即不能動曰此即前病之餘虛火移走為害也立丸方凡四五更定服至此方全愈生地丹皮薤肉茯苓山藥澤瀉天冬麥冬五味牛膝黃柏枸杞砂仁甘菊花何首烏虎前脛骨蒺藜兎絲蠶丸每五錢空心白湯下

一婦人臂痛筋攣不能伸屈遇寒則劇脈緊細正陳良

甫所謂肝氣虛為風寒流于血脈經絡搏于筋筋不
榮則乾急而痛先以舒筋湯更以四物湯加丹皮澤
蘭白朮治之而痊亦有臂痛不能舉或轉左右作痛
由中脘伏痰脾氣滯而不行宜茯苓丸或控涎丹而
治之

胡縣丞遍身走痛兩月後左脚面結腫未幾腿股又患
一塊脈輕診則浮重診遲緩此氣血不足腠理不密
寒邪襲虛而然以加減小續命湯四劑及獨活寄生
湯數劑疼痛頓去更以托裡藥倍加參耆歸朮百貼
而愈

施沛然治許户部贊勿患痛痺不能步履者浹旬矣徧
治無効診之曰病得之暮不收拒數見風露立而使
內擾其筋骨（骨字作上聲更妙）許曰然未有語其因者疇
昔之夏祝融肆虐竹簟几床如焚如炙移榻露處涼
颸拂拂越女揮扇齊姬薦席行立坐臥匪朝伊夕豈
以斯故乃嬰厥疾曰無難也當為起之乃飲以丹參
虎骨酒葯解蠲痺湯不一月而疾若失步履如常矣

蔣仲芳治張時官年十九春末遍身筋骨疼痛漸生小
骨火藥不効視其身纍纍如龍眼蓋筋而非骨也因
邪氣入筋縮結而然譬之頸瘿結梗而硬豈真骨乎

遂針委中大椎以治其後內關三里治其前內服當
歸生地白朮秦艽桂枝桑枝威靈仙羌活米仁牛膝
生薑入酒三分以助藥力數日其骨漸小一月盡消
劉雲密治一女子年十三外病冬月怯寒並頭痛背重
隧而痛下引腰腿及腿肚痛甚右臂痛不能舉醫以
五積散為主加羌活烏藥以散凝寒而行滯似亦近
之然但除怯寒與腰痛而頭腿腿肚及右臂之痛只
小愈耳至背之重隧而痛毫未減蓋止知散寒而不
知達陽止知行胃腎之氣而不知達胸中之陽也夫
陽受氣于胸中而背固胸之府也因簡方書有以薑
黃為君而羌活白朮甘艸四之一乃加入附子三分
服頭飲則諸痛去其三再如前劑用其三之一與前
查同煎服竟而諸症霍然此以薑黃達上焦之陽為
其能不混于治血且不等于治氣之味也

續名醫類案卷第十七終

續名醫類案卷第十八

錢塘魏之琇玉横撰

腫脹

竇材嘗因路過衢州野店見一婦人遍身浮腫露地而坐竇曰何不在門內坐婦曰昨日蒙土地告我明日有扁鵲過此可求治病我故於此候之竇曰汝若能聽我我當救汝婦曰汝非醫人安能治病竇曰我雖非醫然得扁鵲真傳有奇方故神預告汝遂與保命

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

延壽丹服之夜間小便約去二升五更覺飢二次又
服十五粒點左右命關穴灸二百壯大便下白膿五
七塊半月全安婦人曰真扁鵲再生也
琇按材為紹興間人著有扁鵲心書曾進呈且有
達天青詞謂其書得傳可以濟人而非妄也此案
在書中為首則故表其為扁鵲之名如此材曾為
巡檢官
一人病四肢皆腫氣促食則脹悶止喫稀粥今日服金
液丹百粒至四日覺大便滑再二日令喫麪食亦不
妨蓋治之早也

一婦人病面脚皆腫飲食減少世醫皆作血虛治之不
効竇曰非血病乃脾胃虛也今日服延壽丹十粒全
真丹五十粒至十日覺大便滑病愈
張子和治張小一初病疥醫爬搔變而成腫喘不能食張
斷為風水水得風而暴腫故遍身皆腫先令浴之乘
腠理開豁就燠室中用酸苦之劑如全蝎一枚吐之
節次用藥末至三錢許出痰約數升汗隨涌出腫去
八九分隔一日臨臥向一更來又下神祐丸七十餘
粒三次瀉之至夜半動一行又續下水煮桃紅丸六
十丸以麝香湯下又利三四行後二三日再以舟車

丸通經散及白朮散以調之愈

張子明之母極肥偶得水腫四肢不舉張令上涌汗而下泄之去水三四斗初下藥時以草貯布囊高支兩足而卧其藥之行自腰以上水覺下行自足以上水覺上行水行之狀如蛇走墜（墜疑隧）如綫聲四肢森然涼寒會于臍下而出不旬日間病大減餘邪未盡張更欲用藥竟不能從其言

張承應年幾五十腹如孕婦面黃食減欲作水氣或令服黃耆建中湯及溫補之劑小溲涸閉張曰建中湯攻表之藥也古方用之攻裡已誤矣今更以此取積

兩重誤也先以涌劑吐之置火于其旁大汗之次與豬腎散四錢以舟車丸引之下六缶殊不困續下兩次約三十餘行腹中軟健啖如昔常仲明曰向聞人言瀉五六缶人豈能任及問張承應渠云誠然乃知養生與攻痾本自不同今人以補劑治病宜乎不効

（此與葛某之論同因謂子和書非其手撰乃出自丹溪大不然之常說出自麻知幾等）

元時名醫宋會之治水蠱法用去絲瓜一枚去皮及子剪碎與巴豆二七粒同炒視巴豆褐色為度去巴豆存絲瓜又用黃米如絲瓜之數同炒視米褐色去絲瓜存米研末清水和為丸梧桐子大每服百丸白湯

下盡水盡從大便中出而疾除矣其言曰巴豆逐水者也而患其迅藉絲瓜取其氣絲瓜有筋象人身脈絡得引巴豆之氣達諸脈絡而仍用米者投其胃氣也仍去絲瓜者畏其受巴豆之氣太甚也鮮于樞為之記如此（閩擴水良法逐）

峨眉僧治一人肚腹四肢腫脹用乾雞矢一升炒黃以酒醅三椀煮一椀濾汁飲之名韋牛酒少頃腹中氣大轉動利下即腳下皮皺消也未盡隔日再作仍以田嬴二枚滾酒淪食白粥調理而愈其人韋牛來謝故以名方（本草綱目）

魏秀才妻病腹大如斛四肢骨立不能貼席惟衣被懸臥穀食不下者數日矣忽思鶉食如法進之遂運劑少頃雨汗莫能言但有更衣狀扶而圊小便突出白液凝如鷺脂如此數處次下盡遂起蓋中焦溼熱積久所致也（董炳集驗方金上）

李時珍治一人妻自腰以下附腫面目亦腫喘急欲死不能伏枕大便溏泄小便短少服藥罔效其脈沈而大沈主水大主虛乃病後胃風所致是名風水也用千金神秘湯加麻黃一服喘定十之五再以胃苓湯吞深師薯蕷丸二日小便長腫消十之七調理數日

全安本草綱目

邱汝誠友人朱升患酒積舉身黃腫無能治者邱視之曰可救也出囊中赤藥丈丸以酒下之須臾下黃水滿器腹即消其半再以五丸遂愈（揮麈新譚）

陳三農治一人患腹脹滿服補中六君其脹減十之七八悞服行積丸遂致食減復脹甚脈細數以補中湯加乾薑肉桂各五分附子丈分吳茱萸一分薑水煎飲愈

一人腹脹時吐小便利則大便不通大便利則小便不通用炒乾薑三錢升麻一錢五分吳茱萸微炒五分煎服愈（原注此寒邪痞塞于膀胱也時吐者寒迫火上也）

一人患單腹脹將愈因惱怒復脹而痛口乾身熱食減胆或（疑腹）膻中近右作痛按之則止用人參乾薑炒半夏各七分白朮茯苓蒼朮各二錢陳皮神麴各五分甘草肉桂各二分吳茱萸丈釐服愈

一人頭面四肢浮腫帶黃色行動脚軟此脾胃虛弱只宜健脾固中氣為主用人參白朮茯苓陳皮甘草漸愈

孫文垣治陳光祿松巒常五更胸脇脹疼遍治無効診之右寸軟弱左平兩尺亦弱曰此肺腎二經之不足

國立國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

也補而斂之可無恙矣以補骨脂煎肉人參各三兩鹿角膠鹿角霜各五兩杜仲巴戟白茯苓車前子各一兩五錢山藥二兩鹿角膠酒化為丸空心淡鹽湯送下又以御米殼去筋膜蜜水炒三兩訶子麪煨去核一兩陳皮一兩半煉蜜為丸五更枕上白湯送下一錢服一月病愈

溧水令吳涌瀾夫人每五更倒飽必瀉一次腹常作脹閭亦痛脈之兩手寸關洪滑兩尺沈伏曰此腸胃中有食積積痰飲也乃與總管丸三錢生薑湯送下大便雖行不甚快利又以神授香連丸和之外用滑石甘草木香枳殼山查陳皮白芍酒連調理而安

熊成八官江右南昌人早起行路忽見邪火二團滾滾而來大驚駭次日腹中膨懣漸成脹滿面白皮薄兩手瘦削兩足皆有浮氣按之宿然不起（瀅也）行動氣促形神俱弱醫謂神弱氣促胸腹青筋縷縷如貫索小水清長形症如此脾虛所致以參苓白朮散投之十日堵然如鼓中有一塊纍然突出堅若鐵石臍已平滿勺粒不入醫與決曰若疾法在不治盍早歸母作異鄉鬼也孫脈之沈弦有力曰非氣虛中滿候前補太驟適助長耳顧今雷雨途遥（瀅熱病值瀅熱時）即歸未能

時刻可到且治非良手則大事去矣予有一藥尚可冀生也以琥珀調中丸日二進之一進甚甘再進稱快十日腹漸寬塊漸鎔半月盡消去青筋俱欲改以平胃散加蘿蔔子薑黃苡仁炒仁木香調養一月飲食大加兩足之浮亦愈（利水消積法）

喻嘉言治劉泰來年三十二歲面白體豐夏月用冷水灌汗坐卧當風新秋病瘧三五發後用藥截住遂覺胸腹脹滿不旬日外腹大胸高上氣喘急二便全無食飲不入能坐不能卧能俯不能仰勢頗危急醫以二便不通下之不應商用大黃二兩作一劑喻駭曰此名何病而敢放膽殺人耶醫曰傷寒腸結下而不通唯有大下一法何謂放膽喻曰世有不發熱之傷寒乎傷寒因發熱故津液枯槁腸胃燥結可用下藥以開其結然有不轉矢氣者不可攻之戒正恐悞治大陰經之腹脹也此病因腹中之氣散亂不收故水液隨氣橫溢成脹全是太陰脾氣不能統攝所致一散一結相去天淵再用大黃猛劑若不脹宛定須腹破吳醫唯唯辭去病家仍欲服之喻乃擲去其藥另與理中湯畏不敢服欲俟來日喻曰腹中真氣漸散今夜子丑二時陰陽交剥之界必大汗眩暈難為力

矣不得已令煎就以待既而果發暈即服下得睡片時次日略覺減可遂以三劑作一服加人參至三錢服後又進一大劑少加黃連脹已大減謂大便未通不敢進食但飲米湯喻曰腹中原是大黃推蕩之泄糞以膀胱脹大撐拄大腸不得出耳于是以五苓散與之藥纔下咽即覺圊小便先出大便隨之泄下半桶而愈一月後小患傷風取藥四劑與葷酒襍進及傷風未止并謂治脹亦屬偶然（溫補法）

吳聖符單腹脹腹大如箕堅硬如石胃中時生酸水吞吐皆然經年罔効蓋由醫輩不察病之所起與病成而變之理耳唯腎氣丸一方猶是前人成法但此病用之譬適燕而南其指也夫腎氣丸為腫脹之聖藥者以能收攝腎氣使水不泛溢耳今小水晝夜六七行水無泛溢之虞也且謂益火之原以消陰翳耳今酸味皆從火化尚可更益其火乎又有指腹脹為食積用局方峻攻不足論矣原是疾起于脾氣不宣鬱而成火使初時用火鬱發之法病霍然矣迨至鬱久愈湮漸為脹滿則身中之氣一如天地不交而成否塞病成而變矣獨進檳榔厚朴萊菔之類以耗氣助火于是病轉入胃胃中之熱有如麴蘗俟穀飲一

入頃刻釀成酢味夫新穀芳甘胃所喜也（吞酸）舊穀酸腐胃所惡也（吐酸）故有時新入而舊出矣人身天真之氣全在胃口（似是而非之語節之不盡）土曰稼穡作甘者也木曰曲直作酸者也甘反作酸木來侮土（喻君但知腫脹由木鬱也）至春木旺則難治矣今欲反酸為甘但有（知此病原為脾氣不宣耳）剛藥一法以氣味俱雄能變胃而不受胃變也慮其過剛則可用剛中兼柔若八味不中與惟連理湯丸剛有柔濟可收去酸之績矣酸去而後治脹破竹之勢乃成（原注善後多年聞用黃柏知母之屬始得全愈更奇何奇之有）

李士材治何太學夏月好飲水一日候文宗發放自晨抵暮為炎威所逼飲水計十餘椀歸寓便脹悶不能食越旬日腹如抱甕氣高而喘診之皮薄而光水停不化也且六脈堅實其病暴成法當利之遂以車舟丸每服三錢香薷湯送再劑二便涌快如泉復進一錢五分腹減如故用六君子十帖而愈（潔淨府法）

方太和大怒後復太醉至明日目下如卧蠶（脾受水溼）居七日肢體皆腫不能轉側二便不通煩悶欲絕診之脈沈且堅當逐其水用疏鑿飲子一服二便快再服四肢寬更以五皮飲三日隨愈

錢嘗之酒色無度秋初腹脹冬杪遍體腫急臍背平在

法不治乃與大劑腎氣丸料煎服兼進理中湯服五日無効李欲辭歸彼自知必死堅求再治即不起無怨也勉用人參一兩生附子三錢牛膝茯苓各五錢二日之間去小便約四十餘椀腹有皺紋計服人參四觔附子薑桂各一觔半載而瘥（極虛大補法）

李都憲積勞多鬱肢體脹滿以自知醫輒用胃苓湯加枳殼三月以來轉加痞悶脈之沈濇而軟視其色黃白而枯此虛症也宜大溫大補始猶不信爭之甚力僅用參二錢稍覺寬舒欲加桂附執不肯從李曰症坐虛寒喜行攻伐已見既執良言不納雖有扁倉豈能救耶兩月果歿

徐錦衣稟稚素壯病餘肥甘過度腹脹氣粗診之脈盛而滑按之不甚虛宜以利氣之劑少佐參朮惑于旁議旦暮更醫李復診曰即畏參不用攻擊之劑決不可投也後與他醫商之仍用理脾疎氣之劑而安（消補兼行法）

吳孚先治一人患腫脹腹皮綳急脈之係脾腎虛用二陳去甘草加人參乾薑肉桂木香茯苓大腹皮薑皮車前十帖腹有皺紋復與金匱腎氣丸一料全愈（先理脾後補腎法）

張路玉治王庸若水腫嘔逆溲便涓滴不通或用五苓八正不應六脈沈細如絲因與金液丹十五丸溺如泉涌而勢頓平後以濟生腎氣培養而安（與張抱赤症治同）

顧文學鼓脹喘滿晝夜不得寢食者二旬醫用大黃三下不除更醫先與發散次用消導二十餘劑少腹至心下遂堅滿如石腰脇與肋中皆疼痛如折診之脈弦大而革按之漸小舉指復大大便八九日不通小便雖少清白如常此因削剋太過中氣受傷濁氣上逆與生料六味地黃丸加肉桂三錢沉香三分下黑錫丹二錢導其濁陰是夜即脹減六七胸中覺飢進粥但腰胯疼軟如失兩腎之狀再劑胸腹全寬少腹反覺微硬不時攻動此大勢欲行津液耗竭不能即去故也診其脈僅存一絲改用獨參湯加當歸枳殼大便略去結塊痛稍可少腹遂和又與六味地黃仍加肉桂沈香調理而安（收殘救敗法）

盧不遠治瞿婦婁周婦馬皆少年水腫肢體洪盛臚腹膨脹水道不通飲食絕口有以為疽者為鼓者為氣者診之以藥不克濟乃針足上出水皆石餘次日脹小減三日太減足尚腫又針之服以八味丸溫腎期年皆孕婁調護善子母兩全馬失調護子母俱斃此

蓋腎中陽氣不足陰氣有餘遂聚水而病作飲食湯藥用水而不能導之轉轉助長乃致于此非針去水則菀陳之瘀何從而泄水去腎衰非溫補之則濁凝之陰必致復聚腎中之火大復然周身之陽氣有蒂天癸自行生育可必如流離之後所宜愛養則生聚否則待斃耳

楊乘六治汪司農年近六旬春仲病腹脹兼作痛飲食不進羣醫不應且增甚診之六脈洪大滑盛重按益加有力如年壯氣實人面色則晃白而帶瘡黃舌色則青黃而兼胖滑簡閱前方則皆香附烏藥厚朴木香山查神麴半夏陳皮藿香元胡枳殼桔梗萊菔子大腹皮等一派消導寬快之屬曰若但據脈症則諸方殊得當也第面色白上加黃且晃而瘡舌色黃裡見青且胖而滑則症之脹痛與脈之洪盛皆非實候也（能合色脈乃為萬全）此由心境不舒思慮鬱怒虧損肝脾致兩經虛而臟寒生滿且作痛耳乃擬養榮湯倍人參加附子與之彼以切中病情立煎飲之一劑減再劑

瘧

胡念庵治俞翰林母七旬餘平日患嗽喘痰紅常服滋陰涼潤之劑秋月忽患水腫喘急難卧日漸腫脹飲

食少進進則氣急欲死諸治無効診之六脈弦大而急按之益勁而空曰此三焦火氣虛熄不能歸根而浮于外水隨氣奔致克鄂鄂而溢皮膚必須重溫以化否則不救彼云吾素内熱不服溫補片薑入口痰即帶紅今所論固是第恐熱藥不相宜也曰有是病服是藥成見難執且六脈緊大陽已無根無根即脫矣此皆平日火服寒涼所致若再舍溫補不用恐無生理乃以桂附薑萸十味人參三錢不三劑腹有皺紋八劑全消飲食如故又二劑全愈痰喘吐紅竟不發矣

一婦因子遠出饔飧不給憂愁成病變為水腫喘急粥飲不入者月餘矣診之六脈欲絕臍突腰圓喘難著席脾腎之敗不可為矣因處十味方令服四劑喘微定而腫漸消覺思飲食復診其脈略有起色又四劑腫消食進

壬子秋余應試北雍有孝廉張抱赤久荒于色腹滿如斗以參湯吞金匱丸小便差利滿亦差減閱旬日而滿復如故肢體厥逆仍投前藥竟無裨也舉家哀號惟治終事抱赤泣告曰若可救我當終身父事之余曰能餌金液丹數十粒雖不敢謂萬全或有生理乃

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

連服百粒小便遄行滿消食進更以補中八味並用
遂獲全安本草通元見扁鵲心書
陳以探子壯年漁色一日腹膨如鼓喘不能卧或
與消導溫補五苓八味丁無微効以探令吞生硫
每服三分以腐皮裹咽日數服不三日其脹如失
此予所目擊者
柴嶼青治侍御葛述齋夫人單腹脹兼脾瀉下血食後
愈脹必槌腹少安衆醫皆主攻伐診之知肝木乘脾
脾家受傷不能統血力排衆議之非並持薛案及醫
統正脈中論說與看彼尚疑信參半先服加減逍遥

湯二劑血止即繼以異攻加腹皮一錢厚朴八分連
進十餘劑其勢漸殺後重用參朮調理而愈肝脾調治法
沈濤祖母年七十餘自上年患腹脹滿醫以鼓脹治之
服沉香鬱金香附等藥數十劑病轉劇脾泄腿腫食
減診之兩關弦洪右關弦軟此肝木乘脾之象也先
用逍遥散加川連吳茱萸連進三劑脹減泄止飯食
頓加復用歸芍六味調理而痊肝腎調治法脈症治法語有疵病
太史汪舒懷令弟脹大脹滿醫以鼓脹治屢不効診其
右關空大而帶濡餘脈如常此乃脾胃不和無有水
氣故不思食而食且不化與胃苓湯數劑頓安若果

係鼓脹亦理應補脾次養肺金以制肝木使脾無賊邪之患更滋腎水以治火使肺得清化却厚味遠房幃無有不安倘喜行快利不審元氣而槩用峻劑攻之暫時得寬其復轉甚病邪既盛真氣愈傷遂不可救司命者其慎旃

治脾澄法

張子和曰一男子目下腫如臥蠶狀曰目之下陰也水亦陰也腎以為水之主其腫至于目下故也此由房室交接之時勞汗遇風風入皮膝得寒則閉風不能出與水俱行故病如是不禁房室則死

凡腹脹經久忽瀉數升晝夜不止服藥不驗乃為氣脫用益智子煎濃湯服立愈

危氏方

喻嘉言治郭台尹年來似有勞怯意胸腹不舒治之罔効茫不識病之所在也聞喻治病先議後藥姑請治焉見其精神言動俱如平人但面色痿黃有蟹爪紋似傷食而得五虛脈應之因詰之曰多怒乎善忘乎口燥乎便秘乎胸膈乎脇脹乎腹疼乎荅曰種種皆然此何症也曰外症未顯內形已具將來血蠱之候也曰何以知之曰合色與脈而知之也夫血之充周於身也榮華先見于面今色黯不華既無舊恙又匪新疴其所以憔悴不榮者何在且壯盛之年而見脈細

損宜一損皮毛二損肌肉三損筋骨不起於床矣乃皮毛肌肉步履如故其所以微弱不健者又何居用是斷為血蟲腹雖未大而如瓜瓠然其日趨於長也易耳曰血蟲乃婦人之疾男子亦有之乎曰男子病此者甚多而東方沿海一帶比他處尤多醫者漫用治水治氣之法嘗試夭枉無算總緣不究病情耳所以然者東海擅魚鹽之饒魚者甘美之味多食使人熱中鹽者鹹苦之味其性偏于走血血為陰象（象字不妥）初與熱合不覺其病日久月增中焦沖和之氣亦積漸而化為熱矣氣熱則結而始不流矣于是氣居血中血裹氣外（語多欠安）一似婦人受孕者然至彌月時腹如把甕矣但孕系胞中如果熟自落蟲蟠腹內如附贅難療又可不同語也究而論之豈但東方之水土致然凡五方之因膏粱味厚椒薑桂醑成熱中者除癰疽消渴等症不常見外至脹滿一症人人無不有之但微則旋脹旋消甚則脹大不消而成蠱耳要知人之有身執中央以運四旁者也今反竭四旁以奉其餌尚有菁華發現於色脈間乎此所以脈細皮寒少食多汗厥羸之狀不一而足也言當不謬請自揆之竟不能用半載而逝

瘡拔是症多由醉飽入房大傷真陰絕其帶脈水虧木燥乘其所不勝之脾致成脹耳魚鹽之論恐未必然

一人血蠱服藥百日後大腹全消左脇始露病根一條如小枕狀以法激之嘔出黑汗血斗許餘從大便泄去始消（是宗子和涌泄之法矣）每思蠱脹不談氣血水痰總必自開一宇如蛔盜蟲據必依山傍險方可久聚內經論五臟之積皆有定所何獨于六府之積久為患如鼓脹等類者遂謂漫無根柢區界乎（張氏醫通載此謂是喻嘉言業已出）

楊乘六治孫氏女年十九病鼓症先自頭面腫起漸次手足浮腫又次肚腹腫脹小水不利醫襍用枳實厚朴蒼朮陳皮三稜莪朮半夏黃芩等并利水藥腫脹益甚更加痰喘詢其起病之由知為寒水侮土因治不如法致水勢衝中而土崩防潰也以大劑補中益氣加木瓜乾薑送金匱腎氣丸月餘而愈（與立齋治素性急婦人同法）

三原氏荀氏婦者病蠱脹諸醫束手氣已絕矣逾二鼓忽甦家人驚喜問之曰適已出門若將遠行者途遇一老人云吾以延孫思邈真人醫汝速返也及入門

見真人已先在年可三十許以連環針針心竅上又之遂醒不知身之已死也視之果有上下二孔七日始合又十一年而終三原醫士王文之說池北偶談

王損庵治嘉定沈氏子年十八患胸腹身面俱脹醫治半月不効診其脈六部皆不出也於是用紫蘇桔梗之類煎服一盞胸有微汗再服則身盡汗其六部和平之脈皆出一二日其症悉平又見醫說續編謂出趙氏或問

一男子三十餘胸腹脹大發煩躁渴面赤不得卧而足冷王以其人素飲酒必酒後入內奪于所用精氣溢下邪氣因從之上逆逆則陰氣在上故為膜脹其上焦之陽因下逆之邪所迫壅塞于上故發煩躁此因邪從下而上盛于上者也于是用吳茱萸附子人參中頓爽少時腹中氣轉如牛吼泄氣五七次明日其症愈矣治法彙全上

張隱庵在苕溪治一水腫者腹大膚腫久服八正散五子五皮之類小便仍淋漓痛苦曰此雖虛症然水不行則腫不消正氣焉能平復時夏月欲用麻黃恐陽脫而汗漏不止以蘇葉防風杏仁三味各等分令煎湯溫服覆取微汗而水即利矣治法與趙氏或問略同次日至

病者之室若翻水數盆牀幃被褥無不溼透告以服藥後不待取汗即小水如注不及至圊就床上坐溺天明不意小水復來不及下床是以沾濡若此今腹脹痛楚悉除矣曰未也此急則治標耳病由火土傷敗以致水泛乃久虛之症必待脾元復乃保萬全與六君子去甘草加蒼朴薑附令每日溫服後即以此方為丸半載後來謝已全愈矣張曰如此症水雖行而正氣不復後仍腫脹而死者多矣至不知發汗行水之法徒事滲利久之正氣日消邪氣日甚而死者亦多矣可不慎哉

陸養愚治吳體原婦患腹脹每于鷄鳴時發至午即寬或與調氣治之不効後于半夜即發至兩月漸于薄暮即發矣夜不能卧飲食亦減肌體日瘦脈之沈微而遲曰若論症日寬夜急血不足也當養血論脈沈弱而遲氣不足也當補氣乃以補中益氣湯倍當歸加豆仁木香數劑而愈（亦勦聶抄見後毛司理婦）

朱丹溪治一人患脚跌腫漸上膝足不能踐地大水頭面遍身腫脹滿用苦瓠瓤實稔如豆大以麪裹煮一沸空心服七枚至午當出水一斗三日水自出不止大瘦乃瘥（苦瓠須擇無靨翳細理緊淨者不爾有毒與徐文江妻用葫

蘆治法略同

張子和曰涿郡周敬之自京師歸鹿邑道中渴飲水過多漸成腫滿或用三花神祐丸憚其太峻或用五苓散分利水道又太緩淹延數月終無一効蓋粗工之技止于此耳後手足與腎皆腫大小便皆秘託常仲明求治于張張令仲明付藥比至已歿矣張曰病水之人其勢如長川泛溢欲以杯杓取之難矣必以神禹決水之法斯愈矣（合陳三農案觀之則潔淨府一法當用宜速用也）薛立齋治一婦人面目浮腫月經不通此水分也朝用導滯丸夕用歸脾湯漸愈更用人參丸兼服而全愈

鴻補兼行法

一婦人素性急先因飲食難化月水不調或用理氣化痰藥反肚腹膨脹大便泄瀉又加烏藥蓬朮肚腹腫脹小便不利加豬苓澤瀉痰喘氣急手足厥冷頭面肢體腫脹指按成窟脈沉細右寸尤甚此脾肺虛冷不能通調水道下輸膀胱滲泄之令不行生化之氣不運東垣云水飲留積若土在雨中則為泥矣得和氣暖日水溼去而陽化自然萬物生長喜脈相應遂與金匱加減腎氣丸料服之小便即通數劑腫脹消半四肢漸溫自能轉側又與六君加木香肉桂炮薑

治之全愈後不戒七情不調飲食頓作泄瀉仍用前藥加附子五分而安（慎消用補法）

孫兆治一女子心腹脹痛色不變經曰三焦脹者氣滿皮膚硜硜然石堅遂以仲景厚朴生薑半夏人參甘草湯下保和丸漸愈

丹溪治一婦氣血俱虛患單腹脹因氣餒不能運化瀕死腫脹氣尚行陽分猶可治遂以參朮芎歸白芍以斂脹消石腹皮以斂氣蘇梗蔔子陳皮以泄滿海金沙木通利水木香運氣而愈（補瀉兼行法）

薛立齋治一婦人胸膈不利飲食少思腹脹吞酸或用疎利之劑反致中滿不食此脾土虛而肝木勝用補中益氣湯加砂仁香附煨薑又以六君子加芎歸梗枳香附煨薑又（如此等宜另立脾胃門）

吳江史玄年母久病之後遇意事拂意忽胸腹脹滿面目微腫兩腿重滯氣逆上升言語喘促所服皆清氣之劑不効薛曰此脾肺虛寒也先用六君子湯一劑病勢頓減後用補中益氣加茯苓半夏乾薑二劑形體頓安後以七情失調夜間腹脹乃以十全大補加木香而瘥

太倉陸中舍以腎虛不能攝水肚腹脹大用黑丸子（又名當歸草烏劍本）

碑記丸 未數服而没于京今之專門治蠱者即此方也用之無不速亡病家不可不知此

機房蔡一素不慎起居患症同前更加手足逆冷惡寒飲食用補中益氣湯加附子一錢先回其陽至數劑諸症漸愈薛因他往或用峻利之劑下鮮血甚多亦致不起

紹興術士朱裳衣名甫苦水蠱腹脹醫者只令服嘉禾散久之不効葛烝相授以此法即安右取嘉禾散四柱散細末各等分合和令勻依法煎服百乙方

王尚之提刑傳云武義縣方治數人甚妙用黃顙魚一个菉豆一合許右煮淡羹頓食紹興張醫升之云以商陸根煮菉豆令熟去商陸取菉豆任意食之亦妙

王氏博濟方第三卷逐氣散與此藥大同小異全上

有病蠱者夢一道人示頌云似犬非犬似猫非猫烹而食之其病自消偶有狐入其室殺而爛煮食之腹自

消夷堅志

按白氏六帖云青邱狐食之令人不蠱又本草孟詵云狐補虛又主五臟邪氣蠱毒發寒熱原注

丹溪治一婦夜間發熱面先腫次及肚足渴思冷水用麻黃葛根川芎蒼白朮木通腹皮梔子甘草愈此開鬼門

法

一人秋冬患腫午前上甚午後下甚口渴乏力脈溢弱食減此氣怯汗不能自出鬱而為痰遂炙肺俞大椎合谷分水用葛根蘇葉白朮木通海金沙大腹皮茯苓皮厚朴陳皮黃芩甘草漸愈（全上散利兼行法）

陳三農治一人年甫三旬怒後發腫飲水過多旦日肢體俱腫腹脹異常年方壯而病發于驟脈方實而藥不厭攻若不急于疎適久必成大患以胃苓散加牛膝車前三進而不為少動是病深藥淺也更以舟車神祐丹進而小便泉涌肢體漸收仍與胃苓湯加白朮椒仁十五日而愈（此子和所謂治水必以神禹決水之法斯愈也此潔淨府法）

喻嘉言治顧鳴仲有腹疾近三十年朝寬暮急每大發腹脹十餘日方減食溼麵及房勞其應如響腹左隱隱微高鼓呼吸觸之汩汩有聲以痞治之內攻外貼無効診之曰人身五積六聚之症心肝脾肺腎之邪結于腹之上下左右及臍之當中者皆高如覆盂者也膽胃大小腸膀胱命門之邪各積于本位不甚形見者也此症乃腎臟之陰氣聚於膀胱之陽經有似瘕塊耳蓋腎有兩竅左腎之竅從前通膀胱右腎之竅從後通命門邪結于左畔即左腎與膀胱為之主

也六府惟膽無輸泄其五府受五臟濁氣傳入不能久留即為輸泄者也今腎邪傳于膀胱膀胱溺其輸泄之職舊邪未行新邪踵至（邪字欠分曉）勢必以漸透入募原（膜原在隔間去膀胱甚遠如何透入）如革囊裹物者然經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣然則腎氣又聚不出豈非膀胱之失其運化乎夫人一圍之腹大小腸膀胱俱居其中（豈獨此即而）而脫又居膀胱之中（膀胱即脬）也昔人有辨之者惟其不久留輸泄是以寬乎若有餘地今腎之氣不自收攝悉輸膀胱膀胱之氣畜而不泄有同膽腑之清淨無為（據云則是其人竟無小便耶）其能理乎宜其脹也經曰腎病者善脹尸以代踵脊以代頭滿膀胱能司其輸泄何致若此之劇耶又曰巨陽引精者三日太陽膀胱經吸引精氣者其脹止于三日此之為脹且數年之久其吸引之權安在哉治法補腎水而致充足則精氣深藏而膀胱之脹自消（只此數句是此症肯綮）補膀胱而令氣旺則腎邪不畜而輸化之機自裕所以然者以腎不補不能藏膀胱不補不能瀉然補腎易而補膀胱則難以本草諸藥多瀉少補也經于膀胱之予不足者斷以死期後人莫解其故吾試揣之豈非以膀胱愈不足則愈脹脹極勢必逆傳于腎腎

脹極勢必逆傳于小腸小腸脹極勢必逆傳于脾乃至通身之氣散漫而無統耶醫者于未傳之先蚤見而預圖之能事殫矣

琇按是症崇屬肝腎二經與膀胱毫無干涉乃舍肝而强入膀胱便覺支離滿紙

萬密齋治萬邦瑞女二十七歲病腫甚異寅後午前上半身腫午後丑前下半身腫上下盡消惟牝戶腫小便難諸醫不能治經云身半以上天之陽也宜發其汗使清陽出上竅也身半以下地之陰也宜利小便使濁陰出下竅也正上下分消以去湿之法惟半夜陰戶腫不得小便此又當從肝經求之蓋厥陰肝經之脈丑時起于足上環陰器又肝病者則大小便難用胃苓五皮湯發汗利小便也內有茯苓所以伐肝腎之邪木得桂而枯又以辛散其肝經之水以温腎之真寒濕也連服十一劑而腫盡消

朱丹溪治赤岸馮令八宮素飲食不知飽但食肉必泄忽遍身發腫頭面加多致目亦不可開膈滿如築兩足麻至膝而止渾身不可見風陰器挺長其脈左沉而重取不應右三部雖短小却有和滑氣象脈有胃氣故病易已遂令單煮白朮湯飲早晨空心探而去之食後白

朮二錢麻黃五分川芎半錢防風三分作湯下保和丸五十丸如此者二日因吐中得汗通體上截為多遂得腫寬而眼開氣順而食進却于前方中去麻黃防風加白朮三錢木通通草各半錢下保和丸五十丸如此者五日而安（此即開鬼門之法也）

羅謙甫治許魯齋仲平年五十有八于至元戊寅五月間積雨霖淫面目肢體浮腫大便溏多腹脹腸鳴時痛飲食減少脈得弦細而緩自云年壯時多服羣牛大黃藥面目四肢時有浮腫今因陰雨故大發曰營運之氣出自中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣榮養臟腑經絡皮毛故氣行而溢為浮腫大便溏多而腹脹腸鳴皆溼氣勝也四時五臟皆以胃氣為本有胃氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動滋養則五臟脈不和平本臟之氣盛者其脈獨見（此盛字當活看）輕則病過甚則必死故經曰真臟之脈弦無胃氣則死（此亦木乘土也故虛病宜着意滋養肝木）今疾幸而未至于甚尚可補調人知服羣牛大黃為一時之快不知其為終身之害也遂以平胃散加白朮茯苓草豆蔻仁數服諸症皆愈飲食進惟四肢猶腫以導滯通經湯主之良愈

馬元儀治華氏子患腹脹已三月形色憔悴兩脈沈微治者但謂邪氣盛不知其正氣虛也靈樞曰脈之應于寸口其大堅以澁者脹也素問曰徵其脈與色俱奪者此久病也今兩脈微弱無神面色不華肢體倦怠其初亦邪正相搏而成治者但責其實而忘其虛攻伐過多（始）則邪氣當乘之繼乃轉傷元氣運化失職升降不利熱者變為寒實者變為虛而病機遷矣經曰足太陰之別公孫虛則鼓脹又胃中寒則脹滿可見中藏虛寒亦能成脹不獨實病為然也治法但用溫補之劑健脾胃輔三焦然須積久成功不可欲速所謂新病可急治久病宜緩調也遂恪服加桂理中湯三十餘劑脹漸消脈漸轉兩月後全安

莊季裕云予自許昌遭金狄之難憂勞艱危衝冒寒暑避地東方丁未八月抵泗濱感瘧瘧既至琴川為醫妄治榮衛衰耗明年春末尚苦肘腫腹脹氣促不能食而大便利身重足瘺杖而後起得陳了翁家傳為灸膏肓俞丁亥至癸巳積三百壯灸之次日即朐中氣平腫脹俱損利止而食進甲午已能肩輿出謁後再報之仍得百壯自是痰症頓減以至康寧時親舊間見此殊功後灸者數人宿痾皆除孫真人謂若

能用心方便求得其穴而灸之無疾不愈信不虛也

（針灸四書）

王執中曰有里醫為李生治水腫以藥飲之不効以受其延待之勤一日忽為灸水分與氣海穴翌早觀其面如削矣信乎水分之能治水腫也明堂故云若是水病灸大良蓋以此穴能分水不使妄行云耳但不知明堂又云針回方者豈治其他病當針四分者耶水腫惟得針水溝若針餘穴水盡即死此明堂銅人所戒也庸醫多為人針水分殺人多矣若其他穴亦有針得瘥者特為幸焉耳不可為法也或用藥則病餘糧丸為第一予屢見人服驗故書于此然灸水分則最為要穴也（資生經）

姚增垣治大將軍襄樂公賀蘭隆光有氣疾加以水腫喘息奔急坐臥不安或有勸其服決命大散者其家疑未能決乃問增垣增垣曰意謂此患不與大散相當若欲自服不煩賜問因而委去其子殷勤拜請曰多時抑屈今日始來竟不可治意實未盡增垣知其可差即為處方勸使急服便即氣通更服一劑諸患悉愈（周書）

黃司寇葵峰中年病蠱得異方乃真茅山蒼朮末也

因溼者宜之每清晨米飲調三錢服不數月强健如故終身止服朮七十餘斤停疾作矣 廣筆記

徐文江夫人病蠱脹張漣水治之百藥不効張曰計窮矣記昔年西山有一嫗患此意其必宛後過復見之云遇一方上人得生徐如言訪嫗果在也問其方以陳葫蘆一枚去頂入酒以竹筋鬆其子仍用頂封固重湯煮數沸去子飲酒盡一吐幾宛吐後腹漸寬調理漸愈蓋元氣有餘而有痰飲者也若腎虛脾弱者宜用金匱腎氣丸十全大補湯去當歸加車前子肉桂 全上

通血香一錢取小葫蘆一个不去子膜入香在內再入煮酒仍以所開之蓋合縫封之以酒入鍋懸葫蘆酒中俟定不可傾側蓋鍋密煮以三炷線香為率煮時其香透達墻屋外煮完取葫蘆內子膜并藥烘乾共為細末每服一錢空心酒送下間五日服一錢服盡葫蘆內藥約有五六錢之數病已釋然矣通血香陝西羊賊客人帶來蘇杭有 全上

沈孝通觀察中年無子患中滿蠱脹勢孔棘靜養郭外小園中翛然獨坐獨宿食淡五年歸脾湯六味地黃丸朝暮間服不輟連舉二子 全上

汪石山治一婦五十七歲五月間因勞夜卧天熱開窗
醒來遍身脹痛疑是沙症刮背起紫疙瘩因而胸膈
脹痛磨木香服之致小腹作痛咳嗽氣壅不能伏枕
吐痰腥臭每次一二椀或亦作瀉肛門脹急皆由肺熱下迫
自汗不止身表浮腫亦由熱盛蒸鬱而成醫作傷寒而用發散
或作肺癰而用寒涼綿延一月醫皆辭去其子來召
汪汪曰弟未知得何脈耳告曰醫謂脈洪數也曰牙
逾五十血氣已衰又加小勞當酷熱之時又不免壯
火食氣且鮮乃熱傷元氣而然非熱脈也所可慮者
脈不為汗衰為泄減耳彼曰用生脈散湯人參一錢
麥冬二錢五味二錢病似覺甚曰邪重劑輕宜黃耆
五錢固表人參五錢養內白朮三錢茯苓錢半滲濕
散腫陳皮七分炙甘草五分以和之麥冬一錢以救肺依法煎服十餘貼後雖
稍安脈與病相反終不救或入熱病門

琇按是症終挾熱邪初時或宜涼膈白虎為是
蕭萬輿曰魯氏婦年四旬素鬱怒娶居十載神思為病
忽一日因行經暴怒血上溢兼致臟脹或投散氣藥
不効且漸篤曰此臟病得之數年今始顯發丹溪鼓
脹論可鑒也脈已洪短與病相符峻補脾元不半載

而愈議用六君加薑桂倍人參白朮彼懼不敢服因
改投金匱腎氣丸服一月血逆已止脹雖如故未見
增劇為藥力未到須寧耐耳不信另延一醫恃有神
丹（即立齋所云黑丸子之類也）謂旦夕可愈果投一劑下咽半晌
而即脹消便泄進食靜睡精神爽快舉家欽以神願
擲百金酬謝而尤剌余之迂緩也及察前方乃阿魏
薑黃甘遂甲片葶藶牽牛元胡之屬越數日症仍作
投前藥亦隨手而應獨氣困怠耳不三日朝夕喘滿
不堪再投不應日甚一日不及旬而歿
蕭從舅曾六海長子亦因素鬱患前症曰此病治本稱
難治但廣費珍藥又非舌耕清儒所能辦當奈何未
幾有進草藥者彼悅捷法信服之飯許大號數聲而
斃嗚呼病從何生藥從何治如此盲妄矜功頃刻殺
人轉盼誰之咎歟
吳橋治王英妻年三十所病脹滿劑以補中氣利小水
者皆無功又之喘急而汗沾衣嘔逆不能下昏亂殊
死橋切之浮取弦數沉取溢滯則以為畜血下之宜
或以亾多亾陽亟下則速之斃橋曰否病繇血滯故
氣壅壅則騰騰上蒸而汗出焉遂進桃仁承氣湯薄
暮始進嘔者半之中夜下敗血三升喘即定乃酣寢

脇

詰朝腹脹平 太函集

聶久吾治司理毛具次夫人病兩月餘初時每至五鼓胸腹脹氣上沖不能卧起坐方安已而漸至四鼓又漸至三鼓即脹今則二鼓起而終夜不能卧矣初以為氣血不調與調氣二劑不應因思其病作于夜間而日間不脹必血虛故改用四物等補血數劑病減半因延診之其脈弱不惟血虛氣亦虛也改用八物湯加二陳十餘劑全安 此案亦平平 陸氏亦勦之

張子和治遂平李官人妻咽中如物塞食不下中滿他醫治之不効診其脈曰此瘕脇也內經曰三陽結為脇王啟玄又曰格陽云陽盛之極故食格拒而不入先以通經散越其一半後以舟車丸下之凡三次食已下又以瓜蒂散再越之健啖如昔日矣

王思中治鹽院某行部至常州病脇症不起諸太醫麇集皆技窮王至曰此是關而非脇可治也乃以半夏麴一兩為君製劑與服不半月動履如常 吳江縣志

章良玉老年得關格症醫藥不効殊無起色偶道人過門索食其子食之頃曰汝家何事奔皇乃爾語之故

且延視之道人曰勿慮而翁今日可不死矣令人從
我去其子即偕至三山門外小茅菴中道人出囊中
藥草一束悉以付之曰此通腸接骨草也四月發芽
百日枯多生于觀音山早向陽晚受陰狀以益母梗
方而四綠葉如芸採得汁一盞便活一人此則去年
所收乾者可將若干放砂礶內用一大盂水煎歸如
法治以進父服三椀果神効及走謝已行矣此草尚
有半又轉以活上河一徐姓者考本草無所謂通腸
接骨草也續金陵瑣事

一貧叟病噎膈食入即吐胸中刺痛或令取韭汁入鹽
梅鹵汁少許細呷得入漸加忽吐稠涎數升而愈此
亦仲景治胸痺用薤白皆取其辛温能散胃脘痰飲
惡血之義也本草綱目

薛立齋治一婦人患膈症胸膈痞悶曰此屬脾經血虛
遂用四君芎歸調補脾氣尋愈又因怒兼兩協痞悶
頭目不清月經旬餘未潟用加味逍遥散加鉤藤治
之復瘥

一婦人患膈病胸膈作痛面青目劄小便頻數或時寒
熱此肝氣滯而血凝先用失笑散二服痛止又用加
味逍遥散而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

陳三農治一老人患膈氣飲食不下大便乾燥六脈浮大而硬用烏藥四分小茴香一錢研末肉湯調下二錢飲食即進三服後用烏藥三分陳皮蘇梗杏仁各五分苡仁錢半煎服而愈

一中年婦患梅核氣用二陳加芎歸梔連枳實烏藥瓜蔞旋覆花香附桔梗十數劑而愈

山氏患咽喉噎塞如梅核時時噯氣足冷如冰用散結化痰湯十數劑罔効細思此陰火也三陰至項而還陰虛火炎故噯氣咽塞足冷耳用滋陰清膈飲數劑諸症悉愈

一士膈噎嘔吐或與清火或與疏通或與化痰散鬱之藥半載愈甚陳曰氣口無力兩尺遲難脾腎交虛之也脾虛則升降失職而痰起中焦腎虛則真火衰微食難運化與白朮五錢炒焦色半夏二錢炮薑二錢沉香一錢二劑而痊

孫文垣治張溪亭乃眷喉中梗梗有肉如炙臠吞之不下吐之不出鼻塞頭運耳常啾啾不安汗出如雨心驚膽怯不敢出聲稍見寒則遍身疼（火盛而鬱者多畏風畏寒）小腹時痛小水淋澁而疼（皆肝火為患）脈兩寸皆短兩關滑大右關尤搏指孫曰此梅核氣症也以半夏四錢厚

當歸草堂鈔本

朴一錢蘇葉一錢五分茯苓一錢三分薑三片水煎
食後服每用此湯調理多効

按梅核症乃鬱怒憂思七情大傷乃成此病案中
所叙無非木燥火炎之候乃以燥剋之劑成功合
前陳三農案大同小異或當時病人質厚故耳

臟少庚年五十每飲食胸膈不順利覺喉管中哽哽宛
轉難下大便燥結內熱肌肉漸瘦醫與五香連翹湯
五劑丁香散不効孫診之其色蒼黑兩目炯炯不眠
可治惟氣促骨立其脈左弦大右滑大曰據脈乃謀而
不決氣鬱成火脾志不舒致成痰涎因而血少便燥
內熱肌消張雖舉有言膈乃神思間病即是推之當
減思慮斷色慾薄滋味絕妄想俾神思清淨然後服
藥有功以桂府滑石六兩甘草一兩真北白芥子離
荳子射干連翹各一兩半辰砂五錢以竹茹四兩煎
湯打饅頭糊為丸菉豆大每食後及夜用燈心湯送
下一錢半日三服終劑而愈

易思蘭治一人患膈滿其症胸膈胃脘飽悶臍下空虛
如飢不可忍腰腿痠疼坐立戰搖大便燥結每日雖
進清粥一二鍾食下嘔酸吐水醋心衆作膈治二年
不効診得左右寸關俱沈大有力兩尺自浮至沈三

候俱緊按之無力搖擺之狀此氣膈病也須開導其上滋補其下兼而行之可也遂以暢胃舒中湯投之

製香附蒼朮貝母各八分蘇梗連翹各五分撫芎六分神麴沙參各一錢桔梗四分南木香半分大劑煎徐徐呷之每日空心服八味丸百粒服二日噯氣連聲後亦出濁氣五日可以坐立啖飯二椀服至二七動履如常

喻嘉言治倪慶雲病膈氣十四日粒米不入始吐清水次吐綠水次吐黑水次吐臭水呼吸將及醫已歇手喻適診之許以可救遍渠家不信曰儘今一晝夜先服

理中湯六劑不令其絕來早轉方一劑全安渠家曰今已滴水不入安能服藥六劑乎曰但得此等甘溫入口必喜而再服也遍渠諸子或庠或弁頗識理會曰既有妙方何不即投必先與理中此何意也曰金匱云病人噫氣不除者旋覆代赭石湯主之吾於此病分別用之者有二道一者以黑水為胃底之水臭水為腸中之水此水且出則胃中之津液久已不存不敢用半夏以燥其胃也一者已將絕之氣止存一絲以代赭墜之恐其立斷必先以理中分理陰陽俾氣易於降下然後代赭得以建奇奏績一時之深心即

同千古之已試也及簡仲景方見方中只用煨薑而不用乾薑又謂乾薑比半夏更燥而不敢用曰今所噫者下焦之氣也所嘔者腸中之水也陰乘陽位加以日久不食諸多蚘蟲必上居高間非乾薑之辣則蚘不下轉而上氣亦必不下轉妙處正在此君曷可泥哉服之果再索藥三劑後能言云內氣稍接但恐太急俟天明再服後旦轉方為妥次早旁議交沮後三劑不宵服矣乃持前藥一盞勉令服之曰立地轉方頃刻見効何如乃用旋覆花一味煎湯調代赭石末二匙與之纔入口病者曰好藥吾氣已轉入丹田矣因觸冷氣復嘔與前藥立止思粥令食半盞飢竟食二盞少頃已食六七盞復嘔與前藥立止又因動怒以物擊婢復嘔與前藥立止以後不復嘔但困倦極服補藥二十劑丸藥一觔將息二月始能出門方悔從前少服理中二劑耳

李士材治張邑宰婦憂怒之餘得食輒噎胸中隱隱痛診之脈緊且滑曰痰在上脘用二陳加薑汁竹瀝或曰半夏燥乎曰溫痰滿中非此不治遂用四劑病尚不減改大半夏湯服四帖胸痛乃止又四帖而噎亦減服二十劑而安若泥半夏為燥而以他藥代之豈

能愈乎惟疾不盛形不肥者不宜與服也凡用半夏者宜審之
方春和年近五旬多慾善怒患噎三月日進粉飲一鍾
腐漿半鍾且吐其半六脈細軟此虛寒之候也用理
中湯加人乳薑汁白蜜半夏一劑便減十劑而進糜
粥更以十全大補加竹瀝薑汁四十帖諸症皆愈
一人膈噎不通查質之物不能下咽惟用人乳醇酒數
杯吐沫不已李曰口吐白沫法在不治脈猶未敗姑
冀萬一用人參黃耆當歸白朮陳皮桃仁牛乳白蜜
薑汁連進十劑白沫漸少倍用參朮三月全安
一人二十五歲以鼓盆之戚悲哀過度不能食飯又十
餘日粥亦不能食隨食隨吐二便閉塞自謂必死診
之脈按有力（凡膈病細澁脈不可治）非死症也以酒蒸大黃加
桃仁當歸砂仁陳皮蜜丸與服凡五服下燥矢乾血
甚多病若失矣數日之間能食倍常
張孟端夫人憂憤交乘食下輒噎胸中隱隱痛陽脈滑
而陰脈搏疾血互凝之象以二陳湯加歸尾桃仁鼈
金五靈脂四劑未効因思人參與五靈同用善于濬
血即以前劑入人參三錢倍用五靈脂再劑血從大
便而出十劑噎止彌月而愈（人參與五靈脂並用非明于奇變者不可）
金元之內患噎膈胸腹奇痛經阻醫認瘀血察其脈

細為氣衰沈為寒痼況自下及上處處皆痛明非血
矣用參耆白朮木香薑桂煎成和醇酒進之甫入口
便快服理中湯半月而瘥（以上二案醫通抄入）
張路玉治朱彥真酒膈嘔逆不入每日惟痛飲熱酒一
二觥少頃即作酸嘔出膈間大痛祼治經年不効良
由平昔好飲熱酒所致即丹溪所謂好飲熱酒死血
留胃口之候授以人參散方用人參一兩煎成加麝
香半分冰片三釐三劑便能進食蓋片麝善散胃口
之痰與瘀血耳十劑後改服柏子仁湯半月而安二
方出自雲岐（綱目有雲字冠者）人多未知每以予為尚異何

可為之辨也
沈錫蕃平昔大便燥結近患噎膈不能安穀者月餘雖
素稟豐腴近來面色皎白大非往昔時方穀雨正此
症危殆之際診得六脈沈澁按久則衰幸舉指則應
為疏六君子湯下一味狗寶作散調服甫十劑嘔止
食進再十劑穀肉漸安更十劑起居如故惟大便尚
難以六味丸去澤瀉加歸芍首烏作湯月餘便溺自
如秋深更服八味丸而康大抵噎膈之人體肥痰逆
者可治枯瘠津衰者不可治同道王公峻患此稟氣
病氣與沈相類誤信方士專力委之致不起顧人月

亦患此自謂脹急不當用參日服仙人對坐草而斃瘦人亦間有可療者秦伯源患此形神枯槁神志抑鬱且湯藥無資予門人鄒恒友令其用啄木鳥入麝熬膏時嗅其氣以通結內服逍遙散加香砂以散鬱不數劑頓瘳後陳君用亦用此法而愈又一農人噎膈不食時嘔清涎如赤豆沙水此屬血瘀可知誤用消尅破氣藥致絕粒不食用桂苓飲加當歸桃仁丹皮牛膝用熬枯黑糖和䗪蟲漿調服溏黑如汚泥者甚多

張路玉曰王御九仲君因驚恐受病時方晚膳即兀兀欲吐而不得出遂絕粒不食而起居自如向後醇酒膏粱略無阻礙惟穀氣毫不可犯犯之輒吐醫不知為何病補瀉襍陳牛黃狗寶虎肚貓胞總無一驗數月來溼麪亦得相安延及八月偶遇一人謂言此病非藥可除合用生鵞血乘熱飲之一服便安此雖未見方書（生鵞血能化堅癖見江案心脾痛門）揆之于理諒無妨礙一陽之夜遂宰一鵝取血熱飲下咽汩汩有聲忍之再三少頃嘔出瘀血升許中有血塊數枚是夜小試稀糜竟不吐其後漸能用飯從少至多不藉湯藥而安（此即血膈症）

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

朱丹溪治一人飲熱酒食物梗塞胸痛蓋有死血而然
白朮貝母麥芽香附一兩瓜蔞仁桃仁杏仁丹皮生
甘草乾葛山甲黃芩紅花蓽澄茄右或丸或散任意
服之
吳橋治應梅就橋問藥橋曰何病梅言飽食則膈稍
覺不舒診之兩寸俱溢尺中沉數曰君脈病矣是為
陰火上衝春至肝將凌脾噎矣橋饋君藥固當歸罪
于橋謹謝不敏梅愕然曰吾年始壯遽至此乎居無
何梅患中膈不利復就診橋固謝如初諸醫則以為
無難不旬月而死（太函集）

黃濡富倾郡年逾父病胸膈不寬族醫或以降火而劑
寒涼病滋甚又或以過傷而劑辛熱病益深而形神
如故（高如是病皆橋曰脈兩寸並溢餘皆弦數而躁兩尺
特甚病由陰火炎上盛怒傷肝此血膈也法當不治
黃不懌乃謝橋踰月即嘔血如橋言醫庸治無効後
吐敗血如腐肝乃卒（全上）

蔣鑾年六十體故厚飲食起居如常惟胸鬲稍稍不寬
直自以為痰火耳又治無効橋診之曰寸口脈溢非
痰火也此為血膈頃之必有死血出焉勿謂無傷法
當不治聞者大駭然疑半之又曰公病之來且速亟

問良醫如稍遲將咎橋發之晚也其後嘔紫血塊如
指大者數十百枚嘔後竟胸鬲頗寬橋曰不然此鬱
怒傷肝而不藏血血隨氣逆行宿血去而新血繼之
猶之汲也緩治則緩死速攻則速死後更數醫月餘
死

陳二尹溶上家吳門年近五旬平日準頰微赤體略肥
日喜火酒數杯昔在都與余甚相得近授廬陵丞乘
便過訪因荅候見服膏子藥問何恙曰近頗眩暈由
痰飲所致耳請脈之乃笑曰君近亦能醫乎曰第略
曉診得兩寸搏脯左關弦尺弱六部畧數此陰不足
陽有餘症屬燥火非痰飲也語之故但唯唯索其方
則二陳白朮香附遠志益智菖蒲諸辛燥芳香之品
告以藥非對症久服恐生他變亦唯唯別去以五月
抵任至九月忽歸寓湖上則以病也延往告以才到
官即頭汗出眩暈益甚食漸減每飯入停鬲中難下
良久仍吐出後只進粥粥又不受乃進麪麪亦不受
兩月來唯食啖饅頭一枚必自晨細嚥至暮畧急則
嘔矣大便八九日始一行堅黑如彈凡更醫數人服
藥數十劑用參亦數兩欲檢方相示曰無庸知所用
必皆前膏子方中諸品耳乃果然此病由燥火又誤

服香燥之藥却其津液致兩陽明枯槁今已成關格
幸大便未如羊矢則下焦之陰猶未告竭急欲潤劑
猶可為也遂與生熟地天麥冬肉蓯蓉北沙參當歸
牛膝等四帖大便略潤可飲粥一甌矣又四帖粥漸
加乃用麻油拌飯進一甌無礙再四帖大便調飲食
如舊則以前方加減令服百帖及還蘇只服其半
後三年病復作急至杭求診就前方加減令服五十
帖遂至今無恙

余孝廉香圃母夫人年七十七膈間不調已二年矣春
盡食愈減至仲秋漸嘔不能食或作脾胃虛寒與二
陳二朮補骨脂吳茱萸薑桂諸辛香燥熱幾數十劑
遂致湯飲不下勉進益盡則嘔必倍之所出皆黃涎
而挾腥氣已絕意醫藥勉名診兩手俱無脈足冷漸
過膝手亦冷過肘舌白胎而地則紫惟神氣頗清起
居尚能自主斷為老年三陰血少相火上逆之症四
肢冷者誤藥而熱盛作厥也兩手無脈者營氣衰不
能載衛上朝寸舌也舌胎白而地紫者肝火上乘肺
金不下降也與生地枸子沙參麥冬蓮仁牛膝米仁
川楝或問衆作寒治而君謂火何以驗之曰弟詢病
人小便可也既而曰黙滴而已又問昔人謂下有熱

則為關上有寒則為格君但主熟得無偏乎曰若然則前方薑桂何以不効乃進藥遂不嘔數劑後忽掌心手背綻出青筋纍纍蓋肝主筋木得養而驟舒也入川連三分四肢漸暖小便漸長青筋亦隱再加熟地五七錢十餘劑全愈後指端生一癬問故曰其辛香燥熱之釀乎然得此可無後患矣

吾宗德吾翁年七十五多鬱而喜飲夏間時嘔隨愈初秋感寒復作服辛燥少愈季秋復感寒遂大作凡食即嘔日嘔涎沫數盆湯飲不下者幾十日前醫一以二陳薑桂轉服轉劇計所嘔不下擔石矣脈之洪大搏指面額作赭石色經曰諸逆冲上皆屬于火又火性急速故食入即嘔也與重劑杞地沙參麥冬米仁入川連三四分一劑知二劑減問荸薺可食否曰可頓入觔許又減遂不服藥半月後復作尚輕令前方重內熟地而瘥或問老人陽氣衰微君常與黃連得毋過乎曰老人陽虛出自何說乃默然

胡氏婦年五十來常患脇痛有塊時當心而痛甚則嘔其子醫也以二陳加左金鬱金香附初稍愈後不應一老醫與丁香肉桂延胡索小茴香之類初亦應再發再與則嘔增劇延診則已七日不食將成膈矣幸

大便不秘且溏小便則短澁口苦而燥脈左關尺弦小而數兩寸鼓與生地杞子沙參麥冬酒連數劑而愈

方天壺翁年近七十嘗患心脇痛一老醫與二陳加人參薑附經年累月遂致食不內滿口似糜非糜晝夜不眠唯聞鼓吹謳歌之聲則稍寐延診六脈已無胃氣曰此血膈也始於肝燥急致多暴怒血隨氣上逆於腕中會陽剛之藥劫其津液令大絡枯澁血遂凝而不下胃中熱而有瘀故不納食而喜聞歌吹也今真陰已竭陽氣獨留不可為矣勉索方與熟地一兩杞子五錢沙參三錢麥冬二錢每飲一劑則恬睡二三時與聞吹唱同于膈病則無與也其後嘔出死血數甌而死

關格

馬元儀治王客六旬外患關格上不得食下不得便口燥胸滿已一月診其兩脈俱虛而澁此因肺胃之氣鬱而不宣鬱久成火消爍津液升降失常上下不交而成痞塞治法宜宣通肺鬱則清肅下行而燥火可除滋養胃源則精液四布而升降自如矣用紫菀五

錢薑仁五錢枳殼桔梗杏仁蘇子半麴鬱金二劑兩脈起四劑胸滿釋後去鬱金加生首烏五錢四劑大便通脈和惟進飲不納蓋肺金鬱結之氣乍舒而胃土沖和之氣未復也令服人參倉廩湯一月而食進再服加味歸脾膏二月全愈 又有治張嘉鳴一案大同小異

許君廣川年四十六性樂洪飲膏粱炙煿左脇痛痞時侵胃絡肝腸已傷宜滋水木南京醫者其識頗俗二陳五香六君六鬱香砂左金逍遥越鞠出入加減惟此數方治之半載不見其良予與令坦相得始彰語以是症血膈須防既而秋仲飲食漸妨因念余說厥理孔長乃相延診視與藥勿嘗歲忽云暮嘔血如甌再延診之症猶可救養陰之劑僉以為謬及春詣蘇求治于繆繆與之方芝麻黑豆絳繒桑葉希延其壽豈知膏肓其績莫奏關格遂成湯飲不受長此告終芒種時候

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷第十八

終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷十九

錢塘魏之琇玉橫撰

諸氣

鄧安人年五十忽然氣痛投神保丸愈不一二日再痛再服神保丸六七十粒大腑不通其疾轉甚亦有要用沈香木香薑桂等藥而未敢投痛甚則藥心藥背築定兩脇似有兩柴十字插定心脇叫聲徹天召良甫診之六脈沈伏乍來乍去衆問診脉吉凶何如答

曰夫九痛之脈不可準也但以症辨用藥觀其人質肥偉問其大腑數日不通曰實痛也其腹必脹但以人按之痛甚手不可向近此大實也經曰大滿大實者可下之用替針九五六百粒是夜即愈（俱醫說續編）

羅謙甫治趙運使夫人年五十八歲於至元甲戌三月中旬病臍腹冷疼相引脇下痛不可忍反復悶亂不得安卧乃以當歸四逆湯主之再灸中庭（全上）

朱丹溪治一婦氣自小腹丹田冲上遂吐清水火氣上逆此由丹田虛寒之故也乃用白朮二兩白豆蔻五錢研為細末早飯後以白湯送下白朮補脾豆蔻溫肺此藥服之則金水自能相生其病必愈若此病在於男子純陰無陽是則成為不治之症矣

陳三農治一人怒氣感寒小腹有塊氣逆上行喘息不安衆用散氣降氣藥益甚曰此因汗下過多傷其胃氣胃虛為衝脈所逆并脇下少陽脈二道而反行病名厥逆以調中益氣湯加炒黃柏炒青皮一劑愈

一老人大怒氣自臍下上攻兩脇作痛喘息不卧此怒動厥陽之火也兩脇肝膽部分怒氣傷肝而動龍雷之火故逆上作痛耳乃用伏龍湯下左金丸而愈

一貴人氣從小腹上攻胸脇頭項遍身急脹而痛已諸

治罔效曰此督脉為病令人逆氣而裡急以四物加用炒黑黃柏醋炒青皮一劑愈

朱丹溪治鄭仲游年二十三高有一點相引痛吸氣覺急滑石枳殼炒各一兩桃仁黃連炒各半兩炙甘草二錢研為細末每服一錢五分以蘿蔔自然汁研煎乘熱飲之以一日須服五六次為妙也作於汚血之法治之

鄭仲本年二十七因喫熱補藥又妄自學吐納以致氣亂血熱嗽血消瘦遂與行倒倉法今嗽血消瘦已除因喫炒豆米膈間有一點氣梗痛似有一條絲垂映在腰與小腹亦痛大率偏在左邊此肝部有惡血行未盡也乃用滑石枳殼各一兩柴胡黃連各五錢桃仁二兩黃丹三錢甘草二錢紅花一錢服法同前

繆仲淳治高存之增浦生氣上逆每飯下一二口輒噯氣數十口再飯再噯食頃三四作曰此氣不歸元中焦不運也每劑須人參二錢不信服快氣藥愈甚愈二三月曰今須服人參四錢不信又逾二三月曰今須參六錢矣又不信復逾月飲食不下每嘔冷氣如團而出上下氣不屬分必死存之坐其家迫令服繆藥服首劑不動再煎不動然亦不如他湯藥輒嘔也服畢三煎忽心口下如爆一聲上則噯氣下則小遺

無算上下洞然即索粥頓食三四椀不上逆矣服五六劑減參二錢噯逆隨行復作乃仍用六錢而安一月後方減參二錢服至半年全愈方用人參六錢麥冬三錢五味二錢橘紅一錢砂仁一錢白芍二錢沈香五分益智仁一錢五分薏肉三錢蘇子二錢枇杷葉三大片水煎臨服加沈香汁十五匙逆水蘆根汁一大盞又十倍為末山藥糊丸空心白湯吞 廣筆記

梁溪一婦人喉間如一物上下作梗前後板痛服仲淳方二十劑全愈降香通草蘇子橘紅枇杷葉人參炙卅石葛蒲麥冬甘菊白芍遠志白豆仁木瓜石斛加蘆根汁一鍾同煎至八分再入薑汁二匙 全上

哮

丹溪治一人患哮十日一發此疾係痰在上焦不得汗洩所致正當十月之時遂以麻黃黃芩各用二錢加入薑汁同煎而服臨臥之時再進小胃丹二十粒安

聖濟治一人始因飲醋嗆喉遂患喘哮不止乃用粉甘草二兩去皮破開再以猪膽六七枚取汁浸三日炙乾碾為末將蜜和丸清茶下三四十粒即愈漸愈

王宇泰治一人鹽哮用白麪二錢沙糖搜和以糖餅灰

汁揑作餅子放在爐內煽熟剉出切作四塊再以輕粉四錢另炒糝在餅內食之吐痰而愈（以上俱大還）

龔子才治一人患哮喘十數年發則上氣喘促咳嗽吐痰自汗四肢厥冷六脉沈細此由氣虛脾弱所致乃與六君子加黃耆五味二冬杏仁薑棗煎服而愈

一人自幼年抱患哮喘之症每遇寒際必然發作發則喘急咳嗽痰涎上涌久不瘥安已成痼疾乃與甘桔苓連瓜蔞貝母二冬等味已清其肺再合六味補腎為方名清上補下丸令其進服一料而即痊愈

孫文垣治查少川夙有哮喘疾每發則遍身如燎上氣短促喉中痰聲響若湯沸每經七晝夜汗出漸平（七日來復之義）居恒嗜飲縱慾不避風寒有教以石膏麻黃杏仁枳殼細茶各一兩作大劑飲之名曰五虎湯喘至即以此禦之隨飲隨止屢發屢進應若桴鼓凡三年飲五虎湯無算因而腹大如覆簸兩腿光腫如柱內外臁瘡清水不竭腥氣逼人不能枕者五閱月診時脈長至後一日也氣高而喘身熱而煩覆以綿被足納火箱環列火盆絨帽貂裘束之以帕鼻亦絨套籠之坐重幔中猶凜凜畏寒今已十日其脈浮大無力其色白中隱青（此皆新病）益舊病由於氣虛中滿新病由

寒邪在表而然合先散之以紫蘇馬蹄草炙甘草防風白豆仁蒼朮陳皮人參羌活生薑一帖得微汗畏寒之狀已去獨鼻尚寒用防風黃耆二兩煎湯令熏其鼻飯頃而止日凡三熏次日亦愈嘔惡不止乃用人參温膽湯加丁香進之一帖旋已因欲利水自食鯉魚數觔夜間脹極以平胃散入橄欖肉一兩能解魚毒兩劑而定獨腹脹小水不利不能伏枕為苦即以附子理中湯加砂仁補骨脂赤小豆桂心等連與進四帖小水略長繼以尊重丸日三服之每服五丸五日後小水通利可以卧矣守此調理脹消患退而平

李士材治顧文學十年哮喘百藥無功診其兩寸數而濇曰濇者痰火風寒久久盤踞根深蒂固矣須補養月餘然後行吐下之法凡至半年之間必要吐下十之數復以補劑投之須服百有餘帖可占安愈更以補中益氣湯為丸如雞子秋石服年許更不再發

施沛然治阮二華之室抱患哮喘過用涼劑故痰上壅面目浮黃而腫每昏暈則形靜若死甦則齁舲之聲聞于外庭醫者望而却走診其六脈沈滑而弱兼緊病得之冬傷于寒經云形寒飲冷則傷肺古人治此症必用麻黃等味為輕清辛散之劑若投以寒涼則

邪氣閉痼而不得泄痰日膠結上焦之氣壅而不宣乃用通關散涌其痰涎凡三涌而痰氣始清喘息始定後以三拗湯兼導痰湯出入調理月餘而安

錢國賓治金陵青衿趙灩瀕毋年六旬得痰症晝夜吼鋸嘔痰數椀初尚能行後漸不起幸胃不病飲食如常多醫罔效脈之六部浮滑右寸關更甚浮主肺氣虛弱滑主脾經積痰乃痰吼症也用導痰湯加杏仁麻黃艾劑病勢不減辭去又更二醫反重復求治曰吾伎盡矣容思之忽悟吼痰屬太陰肺經之症肺乃清虛之臟六葉兩耳四垂如蓋今膠痰固于肺縫中故呼吸而作吼鋸之聲且胃主於納受脾主於運化今胃納而脾不運停飲作痰涌出非是取劑不可也乃以三白丸方示彼用白礬三分煆黃貝母桔梗各三分以飯搗和為丸如黍米大以冷茶吞下七丸服至七次而見功效痰止吼定再以理脾清肺之藥與其服之乃占全痊大抵病勢殆危至此若不用於容取之味弗知七方十劑之意者也但古人之學力乃深今人之學力乃淺再思能用狼虎取奪之劑學力方到若迎奪取伏神兵奇正當並用也奚王道可以盡岐黃之伎哉如果見真取劑亦不妨暫用也耶

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

喘

金陵一鋪治哮喘白果定喘湯服之無不効者其人以此起家方用白果二十一个炒黃麻黃三錢蘇子二錢欵冬花法製半夏桑白皮蜜炙各二錢杏仁去皮尖黃芩微炒各一錢半甘草一錢數味用水三鍾煎至二鍾隨時分作二次而服不用薑也（攝生之方。本草綱目）琇按此方惟風寒外感者宜用若上盛下虛氣不歸元者服之立斃如不問虛實蓋行與之雖起家而殺人多矣然今之時師執方遇病繆為知脈其人亦未嘗不起家而其罪則又更加等矣

濾東治一人季秋病發熱惡寒喘急脈洪大而似實象作傷寒治勿効此火盛之脈非真實也止視其短氣不足以息即作虛治（亦有痰食阻滯而聲微脈促與虛症相似不可不為細審之也）以補中益氣加麥冬五味子熟附子三分六劑愈（大還）

陳三農治一人或遇勞怒即喘急吐痰不卧衆以降火化痰理氣清肺之劑不効脉浮數而虛澁此陰虛火動其痰也用補陰平肺飲下咽喘即定而愈（此案全上）

薛立齋治一婦人病患傷感風寒作喘或用表散之劑投治乃愈而復患再仍用前藥其症益加增劇飲食

少思胸腹不利此因脾肺氣虛所起者也茲宜先用六君子湯加桔梗漸愈後又用補中益氣湯全愈

侍御譚希曾病患喘咳吐痰之症或手足時冷此由中氣虛寒而起乃用補中益氣湯加炮薑服之而安痊

一婦人抱病喘咳與前症相同是屬命門火虛不能生脾土乃用補中益氣湯加八味丸服之痊而復患其喘益甚仍以前藥不應遂用黑錫丹二服喘止復用前二藥而諸症痊凡屬邪氣有餘者其症易識治効亦速其屬元氣不足者變症非一効豈旦夕可期也

龔子才治定西侯蔣公乃患上氣喘急之恙診之其脉寸口洪滑此係痰滯於胸膈間也令先以稀涎散二錢服下其次更以熱水頻頻飲之則溢而吐（是乃代探之法用之殊妙）其痰如膠內有一長條裹韮葉一根遂愈

一路姓者年近五旬身體肥大飲食倍常抱病月餘每逢行動即時喘急診之六脉微而且濇曰此乃必逝之症可毋醫治彙不信以為妄後逾月而果卒

孫文垣治程菊泉暑月患喘急嗽咳則連聲濃痰滾滾行動即喘促不寧夜分口渴胸膈脹悶脉之兩寸滑數兩關弦此係肺有宿痰膽有鬱火經云火鬱發之又風寒外束者可發用蘇子半夏麴杏仁各一錢

石膏二錢款冬花桑皮各八分桔梗枳殼各五分麻
黃三分病不減改以杏仁陳皮人參貝母款冬花麥
冬各七分苡仁一錢半桔梗知母各五分五味子十
一粒桑皮一錢陳皮六分痰減大半胸膈未舒口乾
脚熱前方減去款冬五味加枳殼薑蔥兩帖全愈
陸祖愚治唐鳴和平時本有火症因試事不遂心腹如
舒致成痰火咳嗽日夜吐黃色之痰二三椀氣逆喘
急飲食不進乃服枳桔二陳之劑反為益甚改用參
苓連花粒元參枳殼等兩加牛黃竹瀝服二三劑胸
寬氣緩七八劑痰乃白色去牛黃三十餘劑而安
黃履素曰予家有一庖丁王姓者生平多慾年近四旬
忽患脚痛予往針治謂此足係三陰虛針無益也虛症
針無益令有此針托命者豈能阻之勿針數年後患痰喘胸痛晝夜不眠
予謂此腎虛氣不歸源峻補其下則氣自降適名醫
陳月坡來診其持論與予略同奈病者服陳藥嫌其
作悶別尋粗工治之大服降氣寬中之劑服後覺覺
寬後復發病者尚以暫寬為效信服之以至于死良
可歎也大凡此等病服藥初覺悶又當漸寬漸愈愚
者嫌悶而別尋寬藥死者比比而是醫者病家兩宜熟悉如脾

虛者亦然初服朮必作悶又則自寬破氣消導之藥服之覺寬又乃愈悶以至不可救病者不可不知

李士材治一人病患發熱乾咳呼吸喘急始用蘇子降氣之味不應乃服八味丸喘益甚診之見其兩顴俱赤六脈數大此肺肝鬱熱也以逍遥散用牡丹皮一兩茂仁五錢蘭葉三錢連進兩劑喘吸頓止以地黃丸料用麥冬五味煎膏及龜膠為丸服十觔而康

朱太學抱喘急多痰之症可以坐而不可以卧可以俛而不可以仰惶急求治李曰兩尺獨大而軟為上盛下虛遂以地黃丸二兩加用桔梗三錢枳殼二錢甘草一錢半夏一錢煎湯送下不數劑而安

黃給諫中氣大虛發熱自汗喘急診之脈大而數按之如無此內有真寒外見假熱當以理中湯冷飲舉家無主不能信從惟用清氣化痰之劑服之遂至不起

葉方伯夫人喘急痞悶肌膚如灼汗出如洗目不得瞑診之六脈皆空所謂汗出如油喘而不休絶症見矣辭之曰此可勿藥決不起也即告退逾三日果歿

宋氏女中氣素虛食少神倦春初忽然喘急悶絶不知人事手足俱冷咸謂斃矣惟李曰此係氣虛極而不清肅不能下行所致若非投大劑溫補之味決無生

理遂以人參一兩乾薑三錢熟附子三錢白朮五錢煎服而甦後服人參七觔餘薑附二觔許始全愈

孫氏女久嗽而喘凡順氣化痰清金降火之劑幾于遍嘗絕不見効一日喘甚煩躁予視其目則脹出鼻則鼓扇診之其脈浮而且大此乃肺脹無疑矣遂以越婢加半夏湯投之一劑而減再劑而愈曰今雖愈未可恃也當以參朮補之助養金氣使清肅下行竟因循月餘終不調補後又復發遂至莫能挽救也

馮楚瞻治司文選素患痰喘發則飲食不進旦夕不寐調治數月不効脈之兩寸少洪餘皆沉弱其右關尺微細更甚乃因命門之火衰極無根虛陽巳致上浮且久服剋削脾元虧損由是痰涎益甚虛氣愈逆乃以炒黃白朮八錢固中氣為君炒燥麥冬三錢清肺引氣降下為臣炮薑二錢溫中導火牛膝二錢下趨接引五味子一錢斂納收藏並以為佐製附子一錢五分承上藥力直達丹田為使煎服數劑痰退喘止食進神強再令久服八味丸而安永不再發者也

吳孚先治趙太學患水氣咳嗽而喘誤作傷風概投風藥面目盡腫喘逆愈甚曰風起則水涌藥之誤也以真武湯溫中鎮水與其進服數劑下之諸症悉平

李成槐之室藁地氣喘呼吸促急提不能升噎不能降氣道喧塞痰勢危篤或作痰逆氣滯欲用牛黃蘇合二丸驟而不決未敢遽服脈之兩尺微細無神此肝胃敗損子午不交氣脫症也用人參一兩熟地二兩當歸五錢甘草二錢一帖稍定二帖喘平凡氣短似喘人謂其病在上不知元海無根病實其下也誤治立危予遇此等症重投熟地外無力之家不能備參者以棗仁一兩杞子一兩代之如椶鼓亦應

張飛疇治韓順溪內子患喘症月餘服破氣寬胸豁痰清火等藥不効發表利水亦不應其疾轉急稍動則喘難以休息診之六脈細數而面赤戴陽用大劑六味地黃作湯加青鉛兩許一服而緩三服而安

柴嶼青治程別駕之尊人高年忽患痰喘之症不進飲食乃延柴治即往診視其脈有根決無意外之事也遂用四磨湯內加入參一兩甫服一劑而即愈

王觀察在太史時方酷暑令媳面紅唇燥發喘不止足冷至膀危甚兩脈鼓指撥之微細必過服苦寒所致詢之果然曰此戴陽症也內真寒而外假熱急以人參三錢熟附子一錢五分投之喘定又加肉桂一錢五分半夜尚發躁煩足冷未愈遂以六味湯內加桂附各用一錢五分六劑並煎冰冷頻飲之而愈

少宗伯鄒小山春月之際忽患喘嗽吐痰痾勢甚劇予
延診視按其諸脉和平惟肺部沈洪明有伏邪此小
疾也緣醫謂風寒凝結為用桂溫散徹夜不寐憊甚
不支是由藥誤而然者也茲實以清理藥投之而愈
張三錫云綱目載一男子年五十餘病傷寒咳嗽喉中
聲如鞠乃與獨參湯一服而鼾聲除至二三帖咳嗽
亦漸退服二三劑痊始痊不佞亦屢用有驗但可與
知者道爾今人因右寸脉大不知分別有力無力遽
認為實枳桔桑杏芩厄等妄投死亦不悔者多矣
薛立齋曾治一儒者之病體本豐肥季仲夏間忽患痰
喘用二陳芩連桔梗服之痰喘益甚又加桑皮杏
仁瓜蔞更增盜汗氣促再加貝母枳殼不時發熱飲
食漸減診之脉大無力是為脾肺虛寒也宜用八味
地黃丸以補土母再用補中益氣湯以接中氣而愈
一婦人早間吐痰甚多夜間喘急不寐夫早間多痰者
乃由脾經虛弱飲食所化而為也夜間喘急者乃因
肺虛陰火上衝用補中益氣加麥冬五味而愈
王叔權治一貴人久患喘病夜卧不能而帷起行夏月
亦衲衣夾背心之類明知此病見入膏肓也令灸膏
肓而愈亦有暴喘者知是痰為梗令細剉厚朴七

八錢重以薑七片水小椀煎七八分服滓再煎服不過數帖可愈（服方宜酌用）若不因痰而喘者當灸肺俞凡有喘與嗽者為按肺俞無不痠疼皆為繆刺肺俞又令久而愈亦有只謬刺而不灸愈者此病有淺深也

舍弟登山為雨所搏一夕氣悶幾乎不能救之凡見昆季必泣有欲離別之意疑其心悲為刺百會不見効驗按其肺俞云疼如錐刺以火針微刺之即愈因此與人治嗽喘只謬刺肺俞不刺他穴惟按肺俞痠疼者然後點其他穴非是（兼資生經）

滁陽高司法名中之每於苦寒喘疾發甚時非此藥不能治方名五味子湯用橘皮（三兩去白）甘草（一兩半炙）麻黃（四兩去根節用）五味子（二兩）杏仁（二兩去皮尖用）等味共為細末用水一盛半將藥末二錢煎至七分去其渣取汁通口服之不拘時候如喘甚者再加藥末添入馬兜鈴桑白皮二味同煎飲服如逢夏月減用麻黃一兩（醫方集成醫說續編）

陳三農治一人之病極言痰氣作楚喘急而不能食遍體作痛乃服清氣化痰之劑無異服水何也曰豈止無益反受害矣然肥人氣居于表中氣必虛脾弱不能勝溼氣虛不能健運是以多痰而喘也乃以四君子加南星半夏佐以薑汁令服數劑而疾愈

劉默生治汪去塵脾虛水逆傷肺喘嗽不食小水不通
脈虛不勝補瀉乃用茯苓五錢澤瀉一錢橘紅一錢
五分防風五分肉桂五分熟附五分等味令服二劑
即漸水去後又加用人參調理而占全安（張氏醫通）
立齋治職方王用之抱病喘嗽作渴面赤鼻乾為脾肺
有痰之症乃以二陳加用芩連山庖桔梗麥冬數味
令其煎服不及數劑而安愈矣（此案舊選亦有一玉公在嗽門症治不全）
一武職體魁梧素不圍爐不喜熱食行則喘促自謂氣
實老痰服礞石丸攻伐之（又名黑丸子也）診其脈洪數重按
全無謂命門火衰脾肺虛寒與八味丸一服痰喘稍

止數服全定遂能親火喜熱飲食益碑記丸出自西
域況方外人所製者經云西域水土剛強其民不衣
而褐薦其民不華色而脂肥故邪不能傷其形體其
病生于內其治宜毒藥由此觀之恐不可槩用也
太守錢東圩先患肩疽屬足三陰虛火不歸源用壯水
之主以制陽光而愈曰瘡疾雖愈當屏去侍女恐相
火一動其精暗流金水竭必致變症也後果喘嗽痰
出如湧面目赤色小便淋瀝又誤認為外感風寒之
症乃用麻黃湯表散汗出不止迎視其脈已脫惟太
沖未絕曰此由脾虛不能攝涎腎虛不能生水肺虛

不能攝氣水泛為痰虛寒之症是也為以難治之而醉謝焉因以懇為處方勉為益火之源以消陰翳而愈繼又勞傷神思外邪乘之仍汗出忘陽以致不起朱丹溪治七三嬸喘遇冬令則必發之此寒包於熱者也宜解表之則熱自除矣乃以枳殼三錢炒麻黃防風黃芩桔梗各用二錢木通一錢五分通利九竅治肺雖甚當紫蘇五葉分四帖煎之取小半盞乘熱飲之可愈

立齋治一男子喘咳脈緊數以小青龍湯一劑表症已解之矣更以葶藶大棗湯喘止乃以桔梗湯而愈

馬元儀治朱千秋患喘嗽自夏及秋羣治不愈自謂已成陰虛症矣曰陰虛者宜補陰以制火也陽虛者宜補氣以散邪也今脈兩脈浮濡浮為虛風濡為氣弱病在陰而補陰故邪留而不愈也參不信又一月食減喘增寒熱自汗身重不能轉側復來求治診之脈轉空大急疾此中氣大虧虛陽不外固也治法先宜固衛外之陽次補內守之陰則真氣內振而虛風可熄矣遂與大劑玉屏風散加用貝母杏仁蘇子桔梗令服一劑而脈症漸和再加人參三錢二劑諸症漸平惟咳嗽未已以六味湯加人參調理一月而安

顧芝岩夫人喘嗽半載臥不著枕舌燥無津屢治不應

診之右關尺虛澁無神此標在肺而本在腎也肺為出氣之路腎為納氣之府今腎氣虧乏吸不歸根三焦之氣出多入少所以氣聚于上而為喘嗽口乾不得安卧中藏經云陰病不能吸者此也法當清氣于上納氣于下使肺得其清肅腎復其蟄藏則氣自納而喘嗽平矣（凡腎不納氣而喘兼見乾燥之症斷不可妄投桂附今此症之暫愈皆仗參力後復作者桂附之傷陰也）用蘇子降氣湯加人參五錢肉桂一錢連進三劑症漸平改用金匱腎氣湯加人參五錢二十餘劑可以安枕後因調護失宜前症復作乃委之庸手純用破氣鎮逆之藥劑極詆人參為不可用病者自覺不支求少參不與遂致氣敗而死矣傷哉

邱友患痰喘發熱口乾胸滿身如被杖時畸惡寒或與驅風化痰不見功効診之脈乃弦數且濇此乃情志鬱結而肺燥也今之醫者但知散風清熱治痰風劑則辛寒劑則苦痰劑則燥辛能耗液苦能傷氣燥能動火是適助長而已今欲治痰書必先清其氣清氣必先滋其燥使氣得清肅下行又何痰喘之有哉（用蔞仁半夏枳殼秦艽杏仁蘇子少加柴胡桂枝二劑症減大半再加生首烏以滋陰燥大便通而全愈）

繆仲淳治臧儀部靜滋病患氣喘自汗晝夜不眠食諸

醫咸以為外感治之複繆臺為診之曰此腎虛氣不
歸元故火上浮已致喘汗交作脾虛故不思食亟以
麥冬五味杞子滋陰斂肺以蘇子橘紅降氣消痰以
白芍棗仁茯苓補脾斂汗令服不數劑全瘳矣
葉都督患痰喘諸醫作胃虛治之不愈後以導水丸與
其服之即利行五六次所患漸退而愈安平治會萃此薛氏叢
蔣仲芳曰周忠介夫人年六十有餘患痰喘之症已
五六年矣醫藥無效士材先師診之曰右寸浮洪肺
有實邪也須用麻黃石膏半夏防風細茶生薑等件
令煎服藥雖峻而病當之無畏也投之果愈但麻黃
不可多用只宜可用二三分足重服後兼須避風耳
吳橋治程參軍汶年已近耆故病患痰喘秋冬遞作春夏
浸平頃歸自留都痰喘如昔一醫以為熱也劑以石
膏再服而痰喘不除加以泄瀉一醫以為攻損而虛
也乃以人參峻補一服而痰喘大作喉壅塞不能言
瞑而惽惽橋至診之寸口浮大弦數搏指然不任按
病得之鬱怒而傷肝氣法當緩治而二醫以燥急乘
之故甚脈雖九死猶可覬一生乃以導痰湯為劑加
人苓連麥冬一服而唾結痰有間稍寤未盡二服結
痰越出喉吻間不能唾則脫醫入口而銜引之纍纍

連綿去如敗絮者盈二缶乃少定瞑而憯憯如前偃
卧如尸七日乃寤寤則呻吟出息目微開始進勺飲
閱日一劑踰月而安或以叅軍方趙簡子云太函集
劉清江曰先君嘗施喘藥蓋用麻黄三兩不去根節湯
浴過訶子二兩去核用肉二味為麤末每服三大匕
水二盞煎減一半入臘茶一錢再煎作八分熱服無
不驗者後于彭子壽侍郎傳示一方所用之味略新
羅參一兩研作細末以生雞子清調和為丸如梧桐
子大陰地乾燥每服十丸以温臘茶清下一服
立止嘗見知臨江葉守端向言其祖石林翁此喘服

大黄而愈其尊人亦苦此疾乃純用附子至某則非
麻黄不可然則又觀其所禀如何且自謂其女幼年
已喘傳至四世而用藥皆不同劉昌詩字與伯號清江○此叅蘆浦筆記
朱武章年三十八客姚江仲冬左頰患疔七八日微喘
疔潰後大喘疔愈喘益甚坐不能卧醫者處方與服
降氣清金之劑不効已二旬矣歸而渡江比到岸
兩脚赤腫如燈籠不能扱履矣舁負至家一月間更
七醫其寬胸者重劑厚朴瀉肺者峻用葶藶有謂表
邪未清者有謂水腫入腹者有謂疔毒入肺者祖治
之腫漸及囊一醫謂虚也與八味反增譫語診之兩

關模糊左尺不應餘部微數而洪而有紅光倚息不寐小便濃濁掌心熱炙臀起映瘡以久坐也其舌左邊赤紫四沿凸凹而左為甚鼻孔乾燥能俛不能仰曰此乃肝腎大傷之症候也初時所患之疠亦係肝火熾甚而作但治法若得其宜即數劑可愈朴蘇既非桂附亦誤今兼治之藥必三十劑乃可與生熟地天麥冬沙參杞子蔞仁米仁四劑腫漸消讝亦止十劑便清腫退可卧矣唯仰卧及側向右則喘嗽不安又十劑已能應酬賓客但卧仍宜向左乃加熟地至一兩入五味三分蛤蚧一具一劑而安四劑全愈

吳性全幼即病喘兒醫與枳桔橘半桑杏前蘇之屬傷其肺氣遂成痼疾每發必沈綿床第淹旬浹月年今十七余往診之令服重劑肝腎藥加沙參蔞仁麥冬之類自是發則漸輕或一月一次仍以前方加減不過數劑即霍然近則終年罕作余治喘亦多矣皆以此法取効蓋患虛喘者十之九實喘者十之一也

金太孺人年交四旬外抱患喘症乃以攻伐之過坐致痼疾已將七旬日之久忽一醫與三子湯加葶藶服下脇痛厥逆欲脫余以大劑杞子地黃入川楝一枚乃得瘥瘳後蘭亭係孺人之四少君也亦病喘疾

面色皖白發必數日卧床莫起與以滋水生肝養金之劑後發漸少而輕自言得狗寶服之而愈此症凡遇高天白皮急痰腥穢而小便點滴者不可治蓋症非肺癰而肺葉壞也肺為水源既敗則小便必少耳

張司閫年已六十之餘嗜飲病喘吐痰無算動則齁鮯臺肩倚息或與杏仁杷殼蘇子前胡之類服十餘劑喘益甚腫如鬼辭不治矣適余往診乃與二地二冬米仁蕎仁沙參杷子杞棋子女貞子等八劑服之全愈戒其勿飲初稍節又仍縱恣年餘復作左脈如拗琴瑟弦此真臟見也不與方藥月餘而沒

皖逆

朱丹溪治超越陳氏二十餘歲因飽後奔走數里遂患噦病但食物則連噦百餘聲半日不止飲酒與湯則不作至晚乃發熱如是者已及兩月矣脈濇數以血入氣中治法宜用桃仁承氣湯加紅花煎服下污血數次即減再用木香和中丸加丁香服之十日而愈

一人病後呃逆不止聲聞隣家或令取刀豆子燒存性以白湯調和二錢服下漸即瘥妙法乃引下氣歸元而逆自然定止故以此而能取於功効也

此紫摘錄本草綱目

遂昌治一人傷寒陽明內實地道不通發呃診其脈長而且實為以大承氣湯下之而呃一人病傷寒七日之後熱退而發呃聲不絕口六脈沈細無力倦甚以補中益氣湯加附子日服三劑而安一人因酒色過傷而病醫以誤作外感而治發汗過多絕食日久致氣血兩虛相火沖上因是呃逆五六日不止遂為治之宜以半夏黃連以瀉逆氣歸芍生地知母以養陰炒柏以瀉沖火與其進服二三劑而愈陳三農治一人患溫熱病十餘日後身熱面紅舌燥黑欬逆日夜不止者已三日矣衆醫以脈微遲無力欲用丁香附子回陽熱劑陳以手按其胸腹痛不可近曰脈微遲非元氣虛也為由邪熱內實壅滯其脈而然也為用解毒承氣湯入甘遂末三分下咽躁熱片時凡患實熱症者為用承氣湯治之必先有躁熱遂時而後下猶如嵩炭火中乍燒冷水必先有熱氣上騰而後熄也當去黑糞三升餘熱即退呃亦止而安一人患溫熱病大便不通為用下藥糞雖去而呃大作衆尤以為下藥之過曰此燥糞在腸胃遏氣于下糞去而鬱氣暴升故奔迫而作呃以枳殼飲之而安一人患呃逆連聲脈來有力因事相爭致肝木受邪自思金能剋木為用錢二觔燒紅水淬之為飲即愈也

一婦患時疫飲水過多[illegible]
心下[illegible]
悸氣短氣不[illegible]
不下諸藥罔効[illegible]
飲治之[illegible]以五苓散
一劑而安[illegible]

盧不遠治陳孟杼之室人因怒而發呃症已及三日夜矣名診以來進意甚不懌脈之乃曰來雖固進而取効極其速也乃處方令服果一劑而愈此蓋肝鬱盛怒弗暢氣將入胃而不能故呃疾由斯而發也今不治呃用柴胡條達木鬱鬱解即止暴病氣全故易愈

吳孚先治袁氏女陡發呃症有用丁香柿蒂者有補之瀉之者有吳之者俱不効乃與柴胡桔梗等味開提之令服不及三劑而愈良由鬱怒肝木不舒上乘于胃故作呃症經曰木鬱則達之此之謂也與盧之說如一人也

喻嘉言治王岵翁素有脾約症得潤劑即解冬盡偶飽食當風而吐胃氣大傷微發熱左關脈甚大木燥火盛之人風寒閉之即上冲而嘔吐故左半為甚也自云中脘不舒氣覺攻左初飲梨汁不投今服蔗汁稍定喻曰此虛風之候也以胃中空虛若谷風自內生左投肝木而從其類是以氣攻左而左脈即為大且勁經云風淫于內治以甘寒然梨蔗皆甘寒而一効一不効者乃胃中氣虛已極不奈梨性之達下而喜蔗性之和平也遂以甘寒定方人參竹瀝麥冬生地之屬衆議除參不用服後腹內呱呱有聲嘔出黃痰少許胸中遂快次早大便亦通症似向安然本胃經受病而胃脈反和惟心腎肝

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

肺之脈不安其故（原非胃病不安亦混）口中味淡湯飲不宵下行此中央氣弱不能四運轉達也宜急用四君子湯以理胃氣不信另呂二醫一謂中風一謂傷寒微用表劑即汗出沾濡氣高神蕩呃逆不休矣再投黃連一劑則脈亂如沸羹頻轉頻歇神昏身強年壽黑滯氣出順而入必噦晝夜萬三千五百息即噦亦如之二醫卸禍謂喻前所議四君今始可用喻曰氣已出而不入再加參朮之膩阻立斷矣惟仲景旋覆代赭一方可收神功于百一進一劑而噦勢稍減二劑加代赭至五錢噦遂大減連連進粥神清色亮脈復體

輕再用參苓木瓜甘草麥冬平調二日康復如初

張三錫治一老人內傷飲食消導未減或悞與潤腸丸二服下清水脹痛轉甚或復投巴豆丸二服致飢逆不止用大劑六君子湯二帖至五帖全止補養而愈

一老人深秋患痢發飢逆嘔吐用黃柏炒燥研末陳米飯為丸小豌豆大每服三十丸人參白朮茯苓三味濃煎湯下連服三劑即愈切不可下丁香等熱藥

陳良甫治一人痢疾飢逆不止六脈沈弱諸醫用藥灼艾皆無効乃投退陰散兩服愈又嘗治許主簿痢疾效逆不止諸藥無効久期門穴不三壯而愈（地良方）

王叔權治一男子忽患氣出不絕聲病已數日矣以手按其竇中而應微以冷針頻頻刺之而即瘥愈初不知灸之有如是之神功也 資生經

陳霞山治一人欬逆上氣體腫氣短脹滿坐不得臥常作水雞聲用白前湯白前二兩紫菀半夏各三兩大戟一兩水一斗煮三升分三次服之自安愈 水腫大實之治

薛立齋治一婦人痢後嘔噦 即飲逆也 服降火化痰等劑愈甚診之脈弦洪大按之虛細作渴飲湯藥到口即嘔此脾胃虛寒不能司納為以參朮炮薑末各一錢以飯作丸米飲不時送三五粒下之服至三兩許聞

藥不嘔乃以六君子加炮薑服三十餘劑而即愈

一婦人患症同前飲食少思胸腹膨脹大便不實所見之症悉屬虛寒假熱遂朝用補中益氣湯加炮薑木香烏味夕用六君子送四神丸令其照服漸即瘥愈又用八味丸料煎送四神丸而安復如舊矣

一婦人因怒嘔噦時或昏憒口噤或時舉體肉動其面色或青或赤不一而定此肝火熾盛脾土受侮之過也宜用小柴胡湯加山巵鉤藤二味令服又用加味歸脾逍遙二藥與其續進調理諸患漸退而安復

繆仲淳治高存之隣人賣腐者傷寒發噦兩日夜不省

人事其子乞方問之曰汝父當時曾頭疼身熱乎曰然曰曾服汗藥乎曰未也曾吐下乎曰未也因索傷寒書檢之其方類用乾薑柿蒂丁香及附子等溫熱之藥（檢方云云者蓋示人以病係陽明熱嚩以上諸藥均不可用非臨陣看兵書也）末條僅載白虎湯一方繆思之曰傷寒頭疼身熱口渴本屬陽明熱邪傳裡故致身涼發嚩者也（傳裡身涼亦是金針）未經汗吐下是其邪何從而出但其人年老且多作勞故于白虎湯中加用人參三錢二劑服下立起痊矣

馬元儀治葛懷年六旬外下利餕逆兩足徹冷或以利治之轉劇診之兩脉虛微此中氣挾寒下利當大劑溫補以恢復元氣時有言下利多由溼熱在胃不行清理而反溫補恐未合法（所言亦是）曰溼熱傷者其脈必實其腹結痛且無餕逆足冷之症（二者亦儘多實熱症據脈虛微而不結痛則當作虛寒矣）此由年高氣弱火衰于下土虛于中因之升降失常而輸泄無度溫補之非治利也陽回則利自止耳若必俟於痢止而後補之則已晚矣遂與人參四兩合附桂理中湯連投四大劑諸症悉瘥矣

陸聖修年逾六旬餕逆泄瀉面赤如粧足冷如冰兩脈沈微曰人身之中賴元氣以充養今因泄瀉而氣衰于下復因呃逆而氣傷于上上下交征年高氣弱何

以當此所幸者猶未喘與汗尚可挽也與附子理中湯大培火土加丁香以暖胃止餲蓋一法而升降之道備焉降者以腎中陽旺則氣不上僭而下收崇土之功升者以脾中陽旺則氣不下陷而中守運行之職則飲食自然變化精液而泄瀉安有不愈者乎

朱氏于未第時患腹脹食少倦怠自汗餲逆口乾脈之左得弦急右見虛微此中虛肝盛得之煩勞且怒也煩勞則陽氣分馳而脾胃損鬱怒則肝木橫肆而脾胃傷由是汗出不止者脾虛而腠理不固也口中乾燥者脾虛而津液不升也腹脹者氣虛而滯傳化失常也食少者胃陽不化健運失職也餲逆者五陽不布陰氣用事也當用附桂理中湯大培中土以旺則不受制于木且能生肺以制木也服四劑脈漸起脹漸平因停藥數日腹脹如故又與大劑桂附理中湯加沈香以和胃氣兼可以行肝氣矣其依服調理一月之久諸症退除而安愈病本多項因餲逆為病之最故入老僕王忠之婦脘患嘔逆餲氣幾無寧刻脈之右寸獨大餘脈虛微此為中州土敗水氣不行五陽不布濁陰上逆也邀與五苓散一劑服後約將時許吐逆頓止再與附桂理中湯連服之明日兩脈向和餲逆亦

止微覺倦怠復與加桂理中湯四五劑服之而安
張意田治董友之母年將七旬病已八日脈之軟緩而
遲滯發熱日晡益甚舌胎黃厚大便不行便知非丁香柿蒂症畏寒呃逆閱諸方咸以老年正虛乃用丁香柿蒂與補陰劑之劑夫脈來遲滯畏寒陽邪入裡也舌胎黃厚日晡熱盛陽明實也此乃表症未解而陷裏之勢急致氣機逆窒而發呃也茲擬治法宜當下之毋以年高為慮也即與小承氣湯服後大便轉矢氣兼有心煩不寧之狀再與一劑即令續服臨晚下黑屎數枚至二更戰栗壯熱四更大汗天明又便黑矢然後

呃止神清而得安睡此係實症之呃也宜細審之
朱丹溪治一中年婦人病噦以四物湯加和白陳皮留
夾桃仁生甘草酒紅花等味其為濃煎再入驢尿飲
以防其或生蟲也與服數十帖而呃逆即除矣
婁全善治其兄九月得滯下每夜五十餘行嘔逆食不
下五六日後加呃逆與丁香一粒嚼之立止但少時
又至遂用黃連瀉心湯加竹瀝飲之呃雖少止滯下
未安若此者十餘日瀰又故可用滋遂空心用粳米殼些少
益其滑日間用參朮陳皮之類補其虛自服粳米殼
之後呃聲漸遠即輕除滯下亦漸收止而安愈也

沈明生治唐玉如夏間患血淋數日淋止發餒舉體振
動聲大且長或與開胃消痰益劇勺粒不入已兩日
夕又欲進丁香柿蒂且加薑桂參耆診之乃陰哀火
炎痰症也益勞役而兼房幃時際炎歊水不制火血
耗而氣上沖是以脹滿不食餒逆不已今六脈洪數
顏如煤炲大便六七日不行小水滴瀝不快經云諸
逆衝上皆屬于火先哲云餒滿須看前後部腎虛不
能納氣歸原故呃聲長大從丹田出丁香柿蒂可妄
投耶乃先用膽導得垢數枚覺兩足微煖此逆氣下
達也即以六味湯料稍減山藥更肉入黃連屘子車
前牛膝薄暮煎服不爨夜分呃已全愈矣明晨進粥滯
色漸清夫呃症有寒熱之分餒聲有上下之別今以
勞劇之體血淋后見之是不由于胃而由于腎也六
脈洪數二便不利是不由于寒而由于熱也真水耗
于平日火症萃于一時虛則肝腎不能納氣自下焦
上逆為聲非中焦實邪之比其腰痠顏黑俱屬可慮
幸得便而足溫得補而喘止乃壯水制陽明之明驗
亦像坎離既濟之佳徵也依方調理半月間全瘳

婁東吳夫令梅邨先生弟也丁未夏歸自燕臺炎風烈
日不無感受萑苻出沒不無驚恐舟中蒸有當夕者

至中途疲薾殊甚疾棹抵吳門或謂憔悴之體竟應投補沈見脈數未平氣口獨盛以為虛中有實初用薑苓等劑遡其源也繼用疎利等味導其流也宿垢既除旋培元氣元氣漸復行且勿藥矣因設酬勞之宴勞憊甚其夕神昏肢倦俄而發呃沈曰勞復發呃當施温補無疑第虛氣上逆其勢方張恐湯藥下時未能即降須艾臍佐之計為妙策一友于期門穴處一壯即緩之至三壯全除矣再復調治痊愛若初也

祖姓人年近七旬素有胃痛病于二月間忽發飢日夜不絶聲者十餘日胃亦痛食入即嘔或與二陳湯加丁香藿香等味服之病反轉劇脈之兩手皆洪數兩寸溢而鼓時見歇至乃厥陰之火上衝而然宜與杞子米仁各用一兩沙參五錢麥冬三錢酒連四分二劑服之痊由安愈後半年病復作以貧乏無力再藥而死此貧為六不治之一也良可哀哉

汗

實材治一人額上時時汗出乃腎氣虛也若不即治則成癆瘵先灸臍下百壯再服金液丹而即愈愈一人抱患夜多虛汗此症亦由腎氣虛弱而起也宜與

金真丹又用黃耆建中湯令其二藥兼進可即愈
一人每日四五遍出汗乃炙關元穴亦不能止乃因房
事後飲冷傷脾氣復為灸右命關百壯而宣痊
常東軒挺晚苦陰汗有教之用牡蠣粉撲之者始雖少
減久之至成潰腐見其單丸焉豈非別殺以他藥乎
宋懷州知州李治與一武臣同官恠其年七十餘而輕
健面如渥丹能飲食叩其術則服何首烏丸也乃傳

其方後治得病感暑中半體無汗已二年竊自憂之
造丸服至年餘汗遂浹體其治血治風之功大有補
益方用赤白何首烏各半觔米泔浸三夜竹刀刮去
皮切焙石臼為末煉蜜和丸如梧桐子之大每服須
空心肚以溫酒送下五十丸如服末亦可耳本草綱目
滑伯人治一人暑月病患身冷自汗口乾煩躁坐卧欲
於泥水中脈浮而數按之豁然虛散曰脈至而從按
之不鼓諸陽皆然此為陰盛格陽得之飲食生冷坐
卧當風所致也乃以真武湯附子炙芍冷飲一進之汗即
止再進之躁亦去至三服下之而諸症悉除

琇按江紫暑門渭治一人汗出如雨身熱煩躁醫
誤用朮附乃以黃連人參白虎三進愈之宜衆看
薛立齋治一婦盜汗不止遂致廢寢神思疲甚口乾引
飲作血虛有熱用當歸補血湯代茶灸者一兩當歸
三錢又以六黃湯加用人參五味子服二劑而愈
陳三農治一人病患感寒之症乃用麻黃發汗汗遂不
止又用建中湯與服汗出更甚於前痰喘有聲此傷
寒損血兼用藥之過陰虛而陽無所附遂用川芎三
分白芍生地各二錢當歸一錢元胡索香附各三分
共煎令服三劑下之所患皆除而安（四物是矣加香附元胡是不解）

一少年人汗出三年不愈乃用棉花子炒黑入湯一滾
服四五日脚腿能立後以歸脾補中等湯而安
楊乘六治朱氏子年二十外勞倦發熱上半身自汗如
雨三日夜不止一切斂汗方法無驗脈之浮細沉洪
軟弱無力面白無神舌胖而嫩且白滑意此必肺氣
大虛而腠理不固也以黃耆湯加五味附子各二錢
自子至卯連進三劑其汗如故思之良久乃用蜜灸
黃耆二兩人參五錢白朮一兩蜜灸升麻柴胡陳皮
各一錢歸身炙炒黑乾薑各二錢白芍五味附子
各三錢大棗五枚一劑而斂此症本以勞力傷其脾

肺中藏之陽陷而不升衛外之陽虛而不固以致陰氣不宵下降乘虛外溢故特用升麻以升提下陷之氣為用薑炒黑以收固衛外之陽使在外而為陰之衛在內而為陽之守也後用清金滋水等劑而愈

薛立齋治一婦人自汗兼盜汗遍身瘡疹五心發熱夜間益甚或嗽咳咽乾月經兩三月一至初用加味逍遙散六味地黃丸兼服臨臥又服陳朮丸陳皮白朮三月有餘諸症悉愈其經乃兩月一至又服兩月而全瘥

一婦人患前症食少倦怠肌肉消瘦日晡發熱至夜益甚月水過期漸至不通猶奪汗者多而無血也時發渴躁汗津液涸誤用通經之劑熱倦愈重飲食愈少乃用八珍加升麻丹皮山屐柴胡治之熱始漸退復又用八珍丹皮軟柴胡等味令其依服調治而瘥安如舊矣

羅謙父曰齋大凡因感寒邪頭項强身體痛自用酒服靈砂丹四五粒遂大汗出汗後身輕至夜前病復來以前藥復汗其病不愈復以通聖散發汗病添身體沉重足脛冷而惡寒是日方命醫醫者不究前治又以五積散汗之翌日身重如石不能反側足脛如冰冷及腰背頭上如貫珠出而不流心胸躁熱煩亂不安喜飲西瓜梨柿冰水之物常置左右病至于此命

診之六脈如蛛絲微微欲絶乃以死決之主家曰得汗多矣焉能為害曰夫寒邪中人者陽氣不足之所致也而感之有輕重治之者豈可失其宜哉仲景云陰盛陽虛汗之則愈汗者助陽退陰之意也且寒邪不能自汗必待陽氣泄乃能出也今以時月論之大法夏月宜汗然亦以太過為戒況冬三月閉藏之時無擾乎陽無泄皮膚使氣亟奪為養藏之道也逆之則少陰不藏此冬氣之應也凡有觸冒宜微汗之以平為期邪退乃已急當衣煖衣居密室服實表補衛氣之劑雖有寒邪弗能為害此從權之治也今非其時而大發其汗乃謂之逆仲景有云一逆尚引日再逆促命期今本傷而并汗汗而復傷傷而復汗汗出數四使氣亟奪衛氣無守陽泄于外陰乘于內故經云獨陽不生獨陰不長不死何待雖盧扁亦不能活也是日至夜將半項强身體不仁手足搐急爪甲青而死矣金匱要略云不當汗而妄汗之者奪其津液枯槁而死也今當汗之一過中亦絶其命而況於不當汗之而强以汗之者乎噫不可不慎也耶

華佗傳縣吏尹世苦四肢煩躁口乾不欲聞人聲小便不利佗曰試作熱食若能得汗乃可占愈如不汗者

後三日而死也即作熱食而不汗出佗曰藏氣已絕于內當啼泣而絕果如佗言之耳此亦藏氣傷燥之病也。三國志

馬元儀治沈康生夫人病經一月而脈浮虛自汗惡風此衛虛而陽弱也與黃耆建中湯一劑汗遂止夫人身之表衛氣主之凡所以溫分肉肥腠理司開闔者皆此衛氣之用故內經曰陽者衛外而為固也今衛氣一虛則分肉不溫腠理不密周身毛竅有開無闔由是風之外入汗之內出其孰從而拒之故用黃耆建中湯以建立中氣而溫衛實表也越一日病者又手自胃心間脈之虛濡特甚此汗出過多而心陽受傷所致者也仲景云如發汗過多病人又手自胃心心下悸者乃用桂枝甘草湯主之與服一劑良已

丁庠生頭汗火升食少心悸恍惚不寧或議用滋陰脈之兩寸獨鼓兩關尺虛微少神此脾腎交虧真陽欲脫之候也與人參桂附理中湯大培火土以復虛陽彼以平生不任熱劑為辭曰若謂頭汗火升為火邪上熾耶不知此乃真氣上越也且謂心悸恍惚為陰氣內虧也不知此乃真元無主也遂與人參四兩白朮五錢附子肉桂各三錢乾薑二錢炙草一錢連進四劑脈始和症始退再溫養元氣一月之功而安

羅謙甫治刑部侍郎王立甫之壻年二十五仲冬因勞役憂思煩惱飲食失節而病時發躁熱肢體困倦盜汗溼透其衾不思飲食氣不足以息面色青黃不澤診其脈浮數而短澁兩寸極小曰此危症也治雖粗安至春必死當令親家知之夫人不以為然遂易醫至正月躁熱而卒他日王謂羅曰吾壻果如君言願聞其理曰此非難知也內經曰主勝逆客勝從天之道也蓋時令為客人身為主冬三月人皆懼寒獨渠躁熱盜汗是令不固其陽時不勝其熱天地時令尚不能制藥何能為冬乃閉藏之月陽氣當伏於九泉之下至春發為雷動為風鼓坼萬物此乃奉生之道也著如冬藏不固春生不茂又有疫癘之災且人身陽氣亦當潛伏于內不敢妄擾無泄皮膚使氣血奪此冬藏之所應者也然令壻汗出于閉藏之月腎水已涸至春令何以發生於水陽氣內絕無所滋榮豈有不死此病症之已現於外者也乃歎息而去醫說續編

施笠澤治一人服參耆數日後每將昏發熱至夜得盜汗而解為曰此陰虛不勝其陽者也參耆雖能補陽助陰而陰血未易驟生乃用六味丸料加參歸陳皮一劑而熱退汗止後以六味丸參苓白朮散全愈

庠友張君牙患寒熱咸作瘧治服解表之劑乃盜汗潮熱肢節頸項强痛夜卧則汗出如沐溼透重衾二旬餘目不交睫診得左寸微細欲絶右尺浮大無力此自汗多亡陽症也與加味歸脾湯不効自加麥冬更服二劑胸膈滿悶飲食不進遂疑參朮不可服一僧欲進大劑苦參湯施曰診法陰盛陽衰者不可以柔藥助陰陽氣益衰陰氣益著實實虛虛之禍其能免乎今君相二火俱虧非急進歸脾湯加桂心五味不可豈前藥有陳誤或焙製失宜耶令別取藥一劑服之是安即安汗亦漸止間進八味丸一月而瘳

庠生施爾祁患病脉之曰陰虛火動也故發熱盜汗肢節作楚正合丹溪滋陰降火之方劑即令服之三日後又與虎潛丸進之病去全愈所以知爾祁之病者切其脉虛而數經云脉虛血虛腎水之真陰不足而虛火因是妄動也先有一醫謂此歷節風飲以風藥即支節浮腫痿弱不能行汗出如沐經云足受血而能步又云奪血者無汗奪汗者無血蓋風能生火又能燥血血虛則內熱益甚支熱則腫肺熱則汗痿矣

錢國賓治荆州李山人年四旬餘凡飲食頭上汗多氣如煙霧必頻抹乃止寸關浮洪兩尺沉實胃脉倍盛

而數此乃胃熱所致名為蒸籠頭是也飲食入胃遇熱上熏心肺心主汗液火性上騰肺主皮毛腠理不密故而頭上汗出如蒸籠之氣相似又因煎迫而如烟霧也乃以三黃石膏湯與服數劑以清胃熱而愈

詹渭豐母年六旬外素有肝病因患瘧自五月至九月瘧愈而他症鋒起自汗如洗徹夜不眠食少便溏脇痛齒疼口澹惡心惡風畏寒頭頂皮帽身襲皮衣重幃夾幔猶懔慄不勝診時先以止汗為屬脈之弦小急疾知為陰虛火盛瘧邪未清誤作陽虛多與補氣歛汗之劑而然叩之果服歸脾五味子麻黃節浮麥

龍骨甚夥乃與生地杞子地骨釵斛首烏鼈甲黃連蔞仁渭豐曰諸醫咸謂頭為諸陽之首惡寒若此又自汗而喜熱飲明屬陽虛之症今方中唯與養陰又口澹便溏惡心皆屬脾胃虛寒黃連蔞仁安可用至瘧疾已愈何必用首烏鼈甲再所重在汗多而又全不治汗其故何也曰此症乃火鬱之極內真熱而外假寒也瘧本膽腑之邪因肝虛而腑傳臟故寒熱止而變為諸症故以生地杞子地骨釵斛以養肝治其本黃連清伏其暑蔞仁散鬱熱以治標首烏鼈甲入肝而去瘧邪葢肝火熾盛逆入胃絡上蒸則為汗下

迫則為漓若見汗則收斂見漓則固澁一藥肆人足
吳醫云乎哉乃病者如方服之不數劑而即全安吳
何某年七旬吳偶于冬間苦盜汗乃水衰肝火內熾當
閉藏之候反蒸鬱而為汗也或教以黃耆煮黑棗服
之四五日汗果止而咳嗽作或以為傷風與前胡桔
梗杏仁蘇子秦艽防風之類或以為痰火與二陳薑
汁竹瀝或以為血虛與四物知母黃柏咸不効已半
年診其脈則弦數而促其症則痰多食少天柱已傾
雙足浮腫投以生地麥冬杞子地骨沙參女貞四劑
無進退已名畫工傳真矣告曰某本籍越中今病已
膏肓量不可起治任欲歸第乞疏一方俾可服多劑
者以希萬一耳仍前方加熟地萸仁與之後二年偶
遇之客座彼前致謝甚殷余茫然叩其故曰某何姓
昔患咳嗽幾斃蒙惠方渡江後服廿餘劑竟獲全愈
此再造之恩德也視其容貌克肖非疇曩其病之
痊殊意外矣書此以為輕信單方并見汗治汗之戒
楊元植年四旬之外神氣早衰鬚髮盡白素患肝腎病
客於吳門病瘧瘧愈而汗出不止凡生脈飲六黃湯
牡蠣龍骨五味黑豆一切斂汗之劑莫不嘗之吳醫
伎窮乃遄歸就予診脈但虛數乃與熟地一兩杞子

五錢棗仁五錢麥冬二錢薏仁一錢胡黃連四分地
骨皮三錢令服一劑瘥即漸減二劑續進全安
趙坤維令正病自首至胸汗出如珠動則尤甚頗能食
然食入則滿面淋漓衣領盡透醫與玉屏風散當歸
六黃湯如不服延診右關寸數大問面浮及齒痛否
曰然也曰此乃少陰之火上逆于胃絡者也遂
與重劑玉女煎入杞子五錢川連少許二帖而瘳
楊兆成年二十許病瘧瘧愈大汗如雨一日夜約斗許
醫者乃盡力與其固表收濇反而較投麻黃羌活之
為甚延診脈洪數有力日啖粥十數甌猶覺飢餓益

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

因病瘧之際多服半夏豆蔻蒼朮厚朴藿香橘皮等
諸燥烈之劑擾動胃火而然也若與六黃湯則汗止
而瘧必更作乃用生地一兩石膏五錢黃連八分麥
冬三錢薏仁錢半一服減二服全瘳瘧亦不更作也
張玉書年近六旬素患陰虛火盛兩手脈常溢入掌心
夏月偶不快就混堂澡浴以圖汗解歸而寒熱大作
頭痛兩耳後瘍腫上連承靈下至天牖急延余視余
適他出別延外科謂當成耳枕癰勢甚危篤投以搜
風敗毒之劑腦後肩胛筋絡益抽掣急絆煩渴躁悶
小便淋瀝如火迫余至已困憊不能支矣脈之洪數

異常知其中熱邪在陽明少陽以陰虛過汗火驟升上又為風藥所鼓而便然不可與柴胡乃以黃芩石膏為君以鮮地黃乾地黃為臣以滑石生甘草為佐以連翹木通為使大劑煎之令其飲服次日腫痛即減惟腫處尚赤色再以前方入菉豆一合腫痛全消再與導赤散合六一散令服而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷二十

錢塘魏之琇玉橫撰

咳嗽

徽宗寵妃苦痰嗽終夕不寐面浮如盤詔內醫李防禦用藥令供狀三日不効當誅李憂撓技窮與妻對泣忽聞外間叫云咳嗽藥一文一帖喫了今夜得睡李使人市藥十帖其色淺碧用淡薑水滴麻油數點調服李疑藥性獷或使藏腑滑泄併三為一先自試之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

既而無他于是取三帖合為一攜入禁庭授妃請分兩服以餌是夕嗽止比曉面腫亦消上喜賜金帛直萬緡李念病即安倘索方無以為對令僕俟前賣藥人過邀飲以百金賂其方乃蚌粉一物新瓦炒令通紅拌青黛少許耳扣其所從來曰壯而從軍老而停汰頭見主帥有此故剽得之以其易辦姑藉以度餘生無他長也李乃給之終身（楛庵小乘）

潘塤曰予夏秋之交火嗽月餘晝夜不輟聲不能伏枕幾殆羣醫皆主故嘗曰西方金司令肺氣盛耳當瀉或曰又嗽肺虛當補或曰飲之愈予曰金初司令稱金也火尚未伏壯火也壯火能爍耗金瀉肺則金愈弱火愈熾此嗽所以不能止也經曰無違時無伐化又曰無伐生生之氣金氣初生而瀉之伐化也殆于不可況五火相煽肺失清化之令補之恐反助火欲之恐不能散火請更思之醫不聽各主所見饋藥予不敢嘗日飲解毒涼膈散去硝黃加白朮以助胃氣晨服童便不時服梨汁瓜漿各十數杯醫乃暗投人參五味煎與予飲而予不知也飲之則愈嗽加喘乃專主已見飲前藥數日火退嗽止而病瘳矣（楮記堂）

漢陽庫兵黃六病痰嗽并喘百藥治之不能見效為朽

岳陽偶遇一道人教用五味子白礬二樣各等分研為末每服討約三錢以生猪肺炙熟蘸其末藥細嚼之以白湯送下兩服病遂不復發也（又病者乃可服此本草綱目）

張子和治東門高三郎病嗽一年半矣耳鳴已亥三月嗽膿血面多黑點身表俱熱喉中不能發聲曰嗽之源心火之勝也秋傷于溼冬生咳嗽冬水既旺水溼相接隔絶于心火火不下降反而炎上肺金被爍發嗽金嘏既久聲反不發醫補肺腎皆非也今先倫西瓜冰雪等物與其食之其次再用涌泄之法更又令服去濕之藥其病自然高日已也

劉氏一男子年二十餘病勞嗽咯血吐唾粘臭不可聞秋冬少緩春夏則甚寒熱往來日晡發作狀如瘧寢汗如水累服麻黄根敗蒲扇止汗汗若也又服寧神散寧肺散止嗽嗽自若也張先以獨聖散涌其痰狀如雞黄色汗亦隨涌兩出昏憒三日不省人事時時飲以凉水後始精神稍開飲食加進又與人參半夏丸桂苓甘露散兼令服之不數日乃愛愈

趙君玉妻病嗽時已十月矣張為處方用當歸陳皮甘州白朮枳殼桔梗等味趙以其不類嗽藥張笑曰君怪無烏梅罌粟囊乎夫冬嗽乃秋之溼也溼土逆而

為嗽也此方皆像散氣除溼解急和經三服而愈

實材治一人病咳嗽盜汗發熱困倦減食四肢逆冷六脈弦緊乃腎氣虛也先灸關元五百壯服保命延壽丹二十丸鍾乳粉二錢間日服金丹百丸一月全安

一人病咳嗽脈症像與上條相同但病人忌怕於灸止服延壽丹五十粒金液丹百粒鍾乳粉二兩至五日減可十日脈沉緩此乃真氣復也仍服前藥一月全安蓋此病早治不灸亦可遲必加灸否則難治

凌漢章治里人病咳嗽絕食五日衆投以補劑益甚凌曰此乃寒溼所積者也穴在頂必針之針則必暈絕

國立中國醫藥研究所圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY OF CHINESE MEDICINE

逾時始蘇即命四人分牽其髮勿可使其傾側乃下針之果然暈絕家人戚驚而哭(皆)獨惟凌醫言笑自如頃之氣漸蘇復加補始出針嘔積痰斗許病即除(明史)

一婦人(中洋)乾咳寸脈滑動似豆狀餘皆散大不浮左大於右每至五更心中躁熱有汗但恕氣則甚與桔梗不開諸藥不見效遂以石膏香附為君荅連青黛門冬瓜蔞仁陳皮炒柏歸梗為臣五味砂仁川芎紫菀為佐甘草煎與進荅服二十餘帖勿使間日而即安(醫學綱目)

崔某療父嗽熏法每旦取款冬花如雞子少許蜜拌花使潤納一升銕器鐺中又用一瓦椀鑽一孔內安小

竹筒或筆管亦得其筒稍長置檐椀相合及插筒處
麪糊塗之勿令泄氣鐺下著炭火少時歛冬烟自竹
管出以口含筒吸取咽之如胸中稍悶須舉頭即將
指頭捻竹筒頭勿使漏烟氣出及烟盡止凡如是五日
為一為之至六日則飽食羊肉餛飩一頓永瘥此法何用
如此之調斬也不須鐺椀只用有嘴瓦瓶燒之瓶藥
於內將蓋住瓶口却以口于瓶嘴吸烟咽之尤捷耳
侍御譚希曾咳嗽吐痰手足時冷醫至脈之此痰係為
脾肺虛寒勿用補中益氣加炮薑而愈實材以肢冷為腎氣虛也
一婦人患咳嗽脇痛發熱日晡益甚用加味逍遥散熱
地治之而愈後隔年餘因怒氣勞役前症仍作又無

太陽作痛或寒熱往來或咳嗽遺尿此由肺氣虛肝
火盛而尿脬失制也勿用前散及地黃丸月餘而瘥
表弟婦咳嗽發熱嘔吐痰涎日夜約五六椀喘咳不安
胸痞燥渴飲食不進崩血如涌此命門火衰脾土虛
寒之症勿用八味丸及附子理中湯加減治之而愈
一婦人久咳嗽面色瘦黃或時眩白肢體倦怠飲食少
思稍多則瀉此脾土虛而不能生肺金勿朝用補中
益氣湯夕用六君子湯為主間佐以八珍湯連續投
之三月餘漸瘥愈後復感寒邪喘嗽胸腹作脹飲
食不入四肢逆冷此中氣尚虛不能克皮毛肥腠理

司開闔之所致也遂以六君子加生薑桔梗而愈

一婦人抱患勞嗽之痾晡熱內熱寒熱往來作渴盜汗小便頻數其經兩三月一行此固肝脾氣血虛損所致乃用八珍湯六味丸各進六十餘劑諸症漸愈其經尚須兩月一行仍再前服二藥間以加味逍遙散各又服三十餘劑後固恚怒適值經行去血過多諸症悉至飲食少思腹脹氣促乃用十全大補湯令服數劑漸愈仍用前藥調補復因喪子胸腹不利食少內熱盜汗便血無寐用加味歸脾湯仍兼前藥而愈

一婦人患勞嗽不時發熱或時寒熱或用清熱之劑其熱益甚盜汗口渴兩足如炙遍身皆熱昏憒如醉良久熱止方甦或晡熱至旦方止此由陰血虛而陽氣弱也乃朝用六味丸料夕用十全大補湯薰服月餘諸症稍愈更與補中益氣湯續進調治兩月餘而愈

嘉興周上舍每至夏患咳嗽服降火化痰之劑咳嗽益甚脾肺腎脈皆浮而洪按之微細此脾土虛不能生發肺金肺金不生發腎水而虛火上炎也朝用補中益氣湯夕用六味地黃丸而痊後至夏遂不再發

一婦人不得於姑患咳嗽胸膈不利飲食無味此係脾肺俱傷痰鬱於中先用歸脾湯加山扈撫芎貝母

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

桔梗諸症漸愈後以六君加芎歸桔梗間服全愈矣
一婦人咳嗽脇痛或用清氣化痰降火等劑久不愈更
加内熱晡熱若兩脇或小腹内熱其嗽益甚小便自
遺此屬肝經血虛火動用六味丸加五味子滋腎水
以生肝血用補中益氣以生脾土以滋肺金而尋愈
上舍陳道復長子虧損腎經又患咳嗽午後益甚薛曰
當補脾土滋化源使金水自能相生時益春不信乃
服黃柏知母之類至夏吐痰引飲小便頻數面目如
緋薛以白朮當歸茯苓陳皮麥冬五味丹皮澤瀉四
劑乃以參耆熟地山茱為丸俾服之諸症頓退復請

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

視以為信遂與前藥如常與之仍泥不服卒致不起
陸養愚治吳氏妾寡居夜熱以煩勞感冒乾咳無痰醫
與疎風藥反增嘔惡更以二陳症不減而夜不能寐
若失神志煩亂不安脈之沈弦而數曰乾欬乃火鬱
之甚最為難治況寡居多年其鬱可知雖有風寒但
于調氣養血開鬱清熱中微加疎散若竟發其表升
動陰火則病反重以二陳之燥宜其煩亂不寐神志如
失也（于今醫時師無方無此二味實所以不解耆也）用清氣養榮湯加黃芩
前胡薄荷杏仁蘇葉二服咳吐煩悶俱減弟睡未安
脉微浮而數去蘇葉前胡加杏仁加貝母知母山庶秦

仁竹茹大棗二劑諸症俱愈但四肢懈怠氣之不足以息脉浮數而弱此虛火已平真氣衰之之候仍用前湯加貝母棗仁更加人參一錢五分數劑而愈

陳曙倉室咳嗽或時純血或時純痰或時痰血相半夜熱頭眩胸膈不舒脚膝無力服滋陰降火藥已半年矣飲食漸少精神漸羸脈之兩寸關沈數有力兩尺濇弱微浮此動上盛下虛之症也上盛者心肺間有留飲瘀血也下虛者肝腎之氣不足也乃用人參固本丸令空心腹服之日中用貝母蘇子山查丹皮桃仁紅花小薊以茅根煎汁入藥同煎十劑痰清血止以清氣養榮湯與固本丸兼服三月後病痊而孕

陸肖愚治吳遜齋患咳嗽身熱脇痛日輕夜重寢食俱廢咸以年高病重為慮脈之左手浮弦右手弦滑曰此病極輕何必如此憂疑也特內有食積痰飲外感風邪所致也少與消導疎散之劑投之即可愈矣乃用蘇葉柴胡以解其表青皮白芥以治其脇桑皮前胡杏仁以治其嗽嗽陳皮半夏以消其痰山查枳實以消其食如此治之可即占安服二劑減四劑脫然陸祖愚治費表母生平酒飲多而穀食少釀成痰火每至五鼓則疾作喘嗽頻併氣逆息粗不能伏枕由來

又吳年近七旬其疾大發日夜昏暈數次四肢厥冷自汗如洗形容瘦削六脈如絲或與清火清痰毫不應乃用附子理中料千杵蜜丸淡鹽湯服以助下元另以知母貝母桑皮葦煎湯徐徐含嚥清其上膈數劑嗽稀喘止肢溫汗斂再用十全大補湯料丸服數十年之又痼疾從此遂瘳無復作之患耳

陳三農之室遇夜嗽甚多痰作陰虛火動以四物換生地加用知母貝母蔞仁杏仁麥冬五味服二劑而愈

孫文垣婦喉中掀痒咳嗽紅痰兩寸關洪大內熱生瘡山庖小劑生地丹皮滑石青皮麥冬甘草黃連蔞仁水煎服血止嗽除後遇勞心即咳嗽喉中血腥總由上焦熱盛而然以枇杷葉山庖生地白芍甘草丹皮地動蜂天花粉滑石紫菀常服三五劑兩月而安

溫天衢冬月病目醫與發散太過至春間吐血椀餘及夏下午潮熱咳嗽胸膈脹疼早晨冷汗淋漓大便溏濕一日兩行飲食減少肌肉消瘦十中之七診之脈數據症脈而視法在不治奈因衆懇不能辭勉為下藥乃用瀉白散加入五味白芍貝母馬兜鈴等數味煎服其夜即帖然而卧不嗽惟大便尚溏仍前藥加扁豆山藥茯苓汁漸止復與瀉白散加石斛馬兜鈴

貝母陳皮苡仁白芍山藥五味桔梗調理三月而瘥
琇按此與孫治吳肖峰內人注夏誤服參蘇飲成
咳嗽同為發散所傷世俗謂傷風不醒變成勞者
也不知此等皆為市醫不分虛實恣用疎散輕病
變重而病者至死猶曰傷風不醒哀哉吳紫見瘧門
李士材治一人咳而上氣凡清火潤肺化痰理氣之劑
幾無遺用而病不少衰診其腎脉大而且軟此乃
氣虛火不能歸元之故也擬用人參三錢煎湯香送
八味丸五錢一服而病減後於補中益氣湯加桂一
錢附子八分凡服五十劑復香八味丸二觔而瘥

一人經年咳嗽不瘥更醫數十人藥不絕口而病反劇
增劇自謂必成虛勞之症李曰不然脈不數不虛惟
右寸浮大而滑多服酸收故又而彌甚用麻黃杏仁
半夏前胡桔梗甘草橘紅蘇子五劑知十劑已也
馮楚瞻治李孝廉患咳嗽甚頻視其身長肥白頰色常
紅知為表有餘而內不足也上假熱而下真寒病必
當劇勸以重服藥餌時有通譜新貴甚精醫藥乃託
其治所用係山庖黃芩花粉橘紅貝母蘇子杏仁之
類止之勿聽數劑後咳轉甚頻躁喜冷倍常益信寒
涼為對症倍用之轉劇再進頻躁更甚粒不下咽飲

水無度更以為實熱以三黃丸下之利行不多漸促喘舟禮夜半喘急大作有出無入遍身麻木潰汗如雨神昏目直口噤不言委頓極矣亟馮診兩寸左關僅存時當六月欲與四逆理中主人畏改以人參一兩麥冬二錢五味六分肉桂錢許始允急煎服之喘減片刻奈病大藥小頃復大作乃不咎寒涼之誤反以參桂為罪矣因思盡吾之力尚可以活若狗彼之見必死而已乃堅定一方勒令服之用炒白朮三兩人參二兩炮薑三錢五味子一錢五分製附子三錢煎濃汁灌之下咽後病人張口大聲云心中如火烙欲死此不與冷服故傍觀疑怨交起不為動頃之又大聲曰臍間更疼更熱我必死矣乃竊喜其陽能下達未即至絕命也果少焉喘定汗收手足溫和而神始清語言反甚無力此方求多參少者係因中宮又困寒涼若如不先為理中則陽氣終難下達症亦莫愈

呂東莊治徐鸞和內病咳嗽醫以傷風治之益甚邀診之此則中虛脈也曰鼻塞垂涕爽急皆係傷風實症何得云虛曰此虛實真假在脈所辨庸醫昧此誤人多矣彼不知脈請即以症辨之其人必晡時潮熱至夜半漸清至晨稍安然否曰然也然則中虛何疑乎

所可喜者正此鼻塞垂涕耳乃投以人參白朮當歸
黃耆白芍各計三錢軟柴胡升麻各一錢陳皮甘草
五味各六分三劑而咳嗽立止再診謂之曰上症已
去唯帶下殊甚近崩中耳驚應曰然即前方重用人
參加補骨脂阿膠各二錢數劑兼服六味丸而愈
柴嶼青治陳氏甥女咳嗽吐痰夜間發熱衆醫以為痨
勢必成勞症診其脈雖稍洪尚有根柢並非細數何
至不治純用滋陰之藥調養半年而始安愈
同學蔡為章患痰咳夜難就寢身不勝衣卧床不能轉
側診其六脈微弱氣血兩虧擬用參耆補劑蔡以痰

咳不宜進用補劑疑慮莫決乃力任之先用六君子
湯加炮薑桂附等味與服數劑而咳即減繼以養榮
湯令服十餘劑始能下床行動調理月餘而症愈矣
張惕中咳嗽吐痰醫誤認風寒服藥十數劑病增劇身
熱喘嗽夜不能卧胸膈痞塞困于牀第小便短縮診
得人迎脉緩絕非外感氣口空大左寸弱甚兩尺沈
微此心腎不足的係內傷之症其小便不利者三焦
之氣化不能達于州都者也從東垣治內傷條師其
意而變通之旬日之間其症悉退而安復如初
左中丞夫人年六十餘形體瘦弱痰咳息粗夜不能寐

醫者頻與消痰理肺愈加委頓診其脈甚微細此氣虛也仲景云氣虛有痰順氣丸補而逐之遂用六味湯加麥冬五味治之而愈惟夜間尚未熟睡再用養榮湯加茯神棗仁十數劑即加餐安睡漸得復元

丙寅新正同鄉諱伊喇齋長即賀節至寓云咳嗽求方診其兩脈細數右寸鬱結斷其難以收功勉用麻黃湯伊斷斷不可曰我子陰虧他醫用熟地人參服過數兩柴曰陰虧誠然但風邪閉塞肺氣補劑又從而壅遏之非此不能去邪力爭不信早決其不起果然

琇按凡損症脈見右寸厥厥然如豆按之梗指其

國立中醫藥圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

病原屬不起因以肺金敗之過也今若以右寸鬱結斷為風邪閉塞然必有見鼻塞聲重或頭痛或痰濃或咳嗽等疾連續而現之方是其症候也

王宵堂治一婦人咳嗽不已服諸藥不效漸成癆瘵診之六脈濡弱此血弱又因憂感太過而成斯疾合用當歸等藥治之庶幾可占全愈遂先以古今錄驗橘皮湯空心服蘇子降氣湯然後徐用金釵煎熟地黃丸又當歸丸與其進服調養而症漸始瘳愈

張路玉治吳江郭邑侯喘咳氣逆診之兩尺左關弦數兩寸右關澁數弦者腎之虛澁者肺之燥夏暑內伏

肺絡遇秋燥收之令發為咳嗽也自云每歲交秋連發四載屢咳痰不得出則喘至夜不能卧咳劇則大便枯燥有血曾服越婢湯嗽即稍可張曰公腎氣素强因水虧火旺陰火上爍肺金金爍不能生水欲甚則便燥有血者肺移熱于火腸也（賴有此耳）合用千金麥門冬湯除去半夏生薑之辛燥易以葳蕤白蜜之甘潤藉麻黃以鼓舞麥冬生地之力與越婢湯中麻黃石膏分解互結之燥熱同一義也郭曰諸醫咸詆麻黃為發汗重劑不可輕試僅用杏仁蘇子甘桔前等藥服之其咳轉甚何也曰麻黃雖云主表今在麥門冬湯中不過借以開發肺氣原非發汗之謂麻黃在大青龍湯麻黃湯麻杏甘石湯其力便峻以其方中皆有杏仁也杏仁雖舉世視為治嗽通藥虛實混用然辛溫走於肺經最不純良耗氣動血莫有過此之為甚熬黑入大陷胸丸佐甘遂等搜逐結垢性味可知者也（此論麻杏非惟濯得其竅者也）遂用前方連進二劑下之是夜便得安睡脈弦雖尚未退按之稍耎兩氣口則虛濡乏力再與薤六味生脈加葳蕤白蜜作湯四服嗽嗽頓減即以此方製為丸恒服至秋庶無復咳之虞何督學媳素常咳嗽不已痰中間有血點恒服童真丸

不徹以父殁哀痛迫切咳逆倍常痰中襍見鮮血因
與瑞金丹四服仍以童真丸烏骨雞丸調補而安
勞太夫人年交五旬之餘稟賦素本虛弱且多痰涎數
日來抱患風熱咳逆嗽甚則厄厄即欲吐且宿有崩
淋近幸尚安法當先治其咳遂以桔梗湯加用葳蕤
白薇丹皮橘皮密煎生薑令服四劑撤其標症次與
六君子仍加葳蕤以安胃氣繼又進服烏骨雞丸方
療其固疾以父不茹葷不忍傷殘物命改用大溫經
湯加用麋茸角腮等味作丸藥雖異而功則一也
陳三農治一婦咳嗽痰喘飽脹水火不通眠食俱廢以

人參白芍為君蘇子炒研細為佐枇杷葉三大片白
茯苓佐之令服二劑即得安眠大小便亦通矣
東坡云蓋公堂記始吾居鄉有病寒而欬者問諸醫醫
以為蠱不治且殺人取其百金而治之飲以蠱藥攻
伐其腎腸燒灼其體膚禁切其飲食之美者期月而
百疾作內熱惡寒而渴不已纍然真蠱者也又求于
醫醫以為熱授之以寒旦夕吐之莫夜下之於是始
不能食懼而反之則鍾乳烏喙襍然並進而漂疽癰
疥眩瞀之狀無所不至凡三易醫而病更甚里老父
教之曰是醫之罪藥之過也子何疾之有人之生也

以氣為主食為輔今予終日藥不釋口臭味亂于外而百毒戰于內勞其主隔其輔是以病也予退而休之謝醫却藥而進所嗜氣全而食美矣可以一飲而効也如是從之所教期月之間而病果默已耳（容齋五筆）

立齋治薛甥范允迪咳嗽痰盛胸腹不利飲食少思肢體倦怠脈之浮大按之微弱服二陳枳殼等藥愈盛曰脾肺腎虛也乃用補中益氣湯兼進六味丸而愈

萬密齋治監生胡篤庵咳久不止汗之不可下之不可因表裡之邪俱盛也為製一方用蘇葉桑白皮薄荷葉杏仁霜瓜蔞霜桔梗甘草等分為末虛者加阿膠蜜丸白湯下或口中噙化五日而安後此以治人多効

立齋治一癆婦咳而無痰日晡發熱脉浮數先以甘桔湯投之（愈）後以續進地骨皮散而熱退少安愈更以腎氣丸及八珍湯加柴胡丹皮地骨皮而愈丹溪云咳而無痰者此為火鬱之症也及痰鬱火邪在中須用苦梗開之下用補陰降火之劑不已則成勞嗽此症不得志者多有之又原病式曰人瘦者腠理疎通而多汗血液衰少而為燥是故咸於勞嗽之疾也耶

一男子咳嗽氣急胸膈脹滿睡卧不安以葶藶散二服與其投之少而要愈更以桔梗湯參其續服而瘥

一男子患咳嗽十餘年項強氣促診之脉象浮而且緊
即以參蘇飲二劑少愈更以桔梗湯四劑而瘥十餘年
馬元儀治楊戚時咳嗽多痰氣逆作喘自汗不食已及
兩月之久診之脉乃虛微無神此由勞倦致傷脾肺
也經云勞則氣耗氣與陰火勢不兩立氣衰則火自
勝土虛既不能生金陰火又從而剋之故喘咳自汗
而作矣若行疎泄以定喘止嗽是係重耗其氣者也
故用人參二錢黃耆五錢炙草五分貝母一錢杏仁
蘇子各用二錢紫菀桔梗防風以佐之再兼進服七
味丸以培土毋歸脾大造膏以實脾肺而瘥始愈

來天培治一婦年三旬餘季夏酷熱乃患咳嗽頭疼發
熱胸膈不舒或以蘇杏前貝生地黃芩等味治之轉
劇視其色浮腫懶言氣怯欲嗽聲微胸膈脹滿飲食
不下六脉微弱此由風寒內伏裡虛致感也始治宜
以參蘇飲倍薑棗一二劑可已今增虛矣非投薑附
不能瘳也乃以補中益氣湯去升柴加川芎炮薑附
子一劑汗出遍身腫脹漸消再劑熱退改用八珍加
薑附二劑而咳嗽除終以歸脾加熟地炮薑四劑聲
高食進矣彼云舊有風症兩手不能舉動今服此藥
乃能舉于頭矣夫治病必當求其本其斯之謂歟

沈明生治金斐文夏患咳嗽清痰續續不絕時風熱嗽甚多金謂所投之劑非疎風化痰即清金滌熱及診曰是非溫補不痊金駭愕問故曰君以外感甚行之際必無內因者耶初得之症必無虛者耶是則時有一定之方症有一定之藥人皆可以為醫矣夫嗽屬外因必肺氣脹滿喘嗽相屬或頭疼鼻塞涕唾稠濃聲壯氣壅脈象浮數有力或人迎脈大此為外因今脈不浮而沈非風也不數而緩非熱也按之不鼓非有餘也嗽雖頻而氣短不續痰雖多而清薄不濃若疎解則徒耗肺家之金清涼則轉瘠中州之土是欲去其病而反以重其病也宜以補中益氣與六君子參合為複方藉參苓朮以補肺之母使痰無由而生藉橘半升柴以升其清而降其濁則嗽可不作矣乃依法而治之即投斷議之方一二劑嗽減再劑愈吳橋治鄱陽王令領邑甫及春病咳嗽唾痰稠黏而臭且襍以血又之潮熱失聲食少肉削閉户踰月將乞骸骨歸幸橋至為診之橋獨任其無害令諤諤固且問橋橋曰此肝氣凌脾治者謬以為陰虛火動劑涼則脾益滯津液不通肝愈熾而無所制矣法當扶脾抑肝三劑如脫七劑而出視事

續名醫類案卷二十

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷第二十一

錢塘鞿之 琇玉 橫撰

瘰

洞虛子曰瘰之為病或偏頭風或雷頭風或太陽頭痛眩暈如坐舟車精神恍惚或眼皮瞤動或眉稜耳輪俱痒或頷腮四肢游風腫硬似疼非疼或渾身燥痒搔之則隱疹隨出皮毛烘熱色如錦斑或齒頰似痒似痛而疼無定所滿口牙浮痛痒不一或噯氣吞酸

當歸草堂鈔本

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

鼻聞焦臭喉閒豆腥氣心煩鼻塞咽嗌不利咯之不出嚥之不下或因嘖噦而出或因舉動而唾其痰如墨又如破絮或如桃膠或如蜆肉或心下如停冰鉄閉滯妨悶噯噦連聲狀如膈氣或寢夢刑戮刀兵叱叫戰或夢入人家四壁圍繞暫得一竇百計得出則不知何所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣撲鼻無路可出或不因觸發忽悲啼雨淚而寤或時郊行忽見天邊兩月交輝或見金光數道回頭無有或足膝瘈軟或骨節腰臀疼痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊戳不起作止竝無常所或不時手臂麻疼狀如風溼或臥如著刺不安或如毛蟲所螫或四肢不舉或手足重滯或眼如薑蜇膠粘痒澁開闔甚難或陰晴交變之時胸痞氣結閉而不發則齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲初則涕唾稠粘次則清水如注或眼前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼瞤肉惕治之者或曰上盛下虛或曰虛或曰寒或曰發邪惟洞虛子備此疾苦乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣交糾噎塞煩鬱有如煙火上沖頭面烘熱眼花耳鳴痰涎涌淚並從肺胃間涌起凜然毛豎噴嚏千百然後遍身

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

頃躁則去衣凍體稍止片時或春秋乍涼之時多加衣衾亦得暫緩若頃飲氷水而定或痛飲一醉而寧終不能逐去病根乃得神秘沉香丸屢獲大効愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱語括之詩曰甄裏翻身甲帶金于今頭戴草堂深相逢二八求勛正硝煆

青蒙倍若沉十七兩中沈半兩水丸梧子意須斟驅除怪病安心志水瀉雙身却不任大黃蒸八兩黃芩八兩青礞石一兩硝煆如金色沉香半兩卽礞石滾痰丸

猴兆治綵帛舖劉員外患傷寒六七日晝夜不得眠方眠卽起方起卽倒未嘗少息看待厭倦召猴猴曰若

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

言是氣心作 今無此症非氣也時復身上汗出尺寸脈皆沈鬬中亦沉重診之鼓擊于指下此痰積寒聚于胸中也遂用陳皮半夏乾薑三物各一兩爲飲薑半兩搥碎以水兩碗煎七分去查分二服服藥經時遂睡經一晝夜不甦既覺下痰塊如雞子大其疾遂愈凡痰皆有冷汗其症明矣

張子和治一婦人心臍上結硬如斗按之如石人皆作病胎針灸毒藥禱祈無數如捕風然一日張見之曰此寒痰診其兩手寸關皆沈非寒痰而何以瓜蒂散吐之連吐六七升其塊立消過半候數日後再吐之

其涎沫類雞黃腥臭特殊約二三升凡如此者三後以人參調中湯五苓散調服已平安矣

朱丹溪治白雲許先生始因飲食作痰成脾疼後累因觸冒風雪腿骨作疼衆皆以脾疼骨疼為寒雜進黃芽穢丹等藥雜治十餘年間艾灸數萬計或似有效及至病再作反覺加重至五十一歲時又冒雪乘船而病愈加至坐不能起扶起亦不能行兩胯骨不能開合若脾疼作時則兩胯骨痛處似覺稍輕若飲食甘美脾疼不作則胯骨重痛增諸老神手計無所出朱謂此初因中脘有食積痰雜以胃寒澀抑遏經絡血氣津液不行能痰飲注入骨節往來如潮其涌而上則為脾疼降而下則為胯痛非涌泄之法不作以治之時七月二十四日遂以甘遂末一錢入猪腰子內喂以食之連瀉七行至次日兩足便能行步至八月初三日嘔吐忽大作不能起牀顆粒不食但時煩躁氣弱不能言語諸老皆歸罪於七月之瀉而又知累年熱補之悞皆不敢用藥朱嘗記金匱云病人無寒熱而氣短不足以息者此實也其病多年鬱結一旦以刀圭之劑泄之徒動猖狂之勢他未有制御之藥所以如此仍以吐劑達其上焦以次第治及中下二

焦於初三日用厥蒂吐不透初六日用厥子又吐不
透初九日用附子兴三枚和漿水與之始得大吐其
嘔噦終止前後所吐共得膏痰沫液一大水桶初十
日遂以朴硝滑石黃芩石膏連翹等涼藥攻咀一劑
蒸煎濃汁放井水中極冷飲之十一日十二日十三
時刻平匀如舊朱曰卯酉為手足陰陽之應此大腸
與胃有積滯不行所致當速瀉之爭論不已至十八
日遂作紫雪半劑十九日早紫雪成每用一匙頭以
新汲井水化下至二十日天未明已服紫雪五兩神
思少安腹滿亦減遂收起紫雪不與二十一日大為
小便閉作痛所苦遂以飲蘿蔔子汁半茶鍾隨手痛
止小便立通廿二日小腹滿痛不可捫摸神思不佳
遂以大黃牽牛作丸服至三百丸至廿三日巳時下
大便併通如爛魚腸三碗許息惡可畏是日神思稍
安診其脈不歇至矣廿四日腹大絞痛殆不能勝者
約一時許腰膀沉重且墜兩時不出聲不能言瀉下
穢物如柏油條者一尺餘肚中如燒炭時方定至廿

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

五日神思漸安夜間得睡廿六日漸能出聲言語自
初二日至此並顆粒不曾入口語言不出聲至廿七
日方啜半盞稀粥者四次自有生意至次月初四日
方平安自嘔吐至病安日皆平常弦大之脈惟
有中間數日歇至少異耳至次年四月復行倒倉法

徐東皐治匡掌科夫人年三十餘病胃脘連胸脇痛日
軽夜重兩寸關脈短滑有力諸醫以積滯凝寒用發
散及攻下藥繼用鉄刷散四磨飲等方俱不效後用
湯水皆吐而不納經月不食痛且益甚徐謂其為痰

欝明矣但痛久弱甚不敢行吐法奈何偶有一醫謂
五靈脂末藥素用有效衆皆哂之曰此藥用之多矣
徐謂再用亦何妨何哂之有彼用酒調病者到口便
吐隨吐緑痰兩碗許痛即止遂納飲食此蓋痰在膈
上攻下之不亦去必得吐法而後愈經曰有故無殞
此之謂歟（全書）

孟望湖淮安人耳中聞人聲悉是祖考談其家事擾擾
不休邀劉春齋醫治診之曰暴病之謂火怪病之謂
痰用滾痰丸下之而痊（續金陵瑣事）

薛立齋治一男子吐痰胸膈不利飲食少思服海石瓜

國立中央圖書館藏 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

薑之類不應曰此脾氣虛弱不能消導而為痰當健脾為主彼不信又服驅逐之劑其痰如湧四肢浮腫小腹腫脹小便濇滯曰此復損脾胃所致也先用金匱加減腎氣丸補中益氣湯治之諸症漸減又用八味丸煎前湯而愈

一男子素吐痰遇怒其痰益甚胃脘痞滿此肝木制脾土也用六君加木香治之而癒

一婦人吐痰頭暈帶下青白用四七湯送白丸子小柴胡加白朮茯苓治之而安

舊僚錢可久素善飲面赤痰盛大便不實薛以為腸胃

溼痰壅治用二陳湯苓連山梔枳實乾葛澤瀉升麻一劑吐痰甚多大便始實此後日以黃連三錢泡湯飲之而安

一婦咳嗽其痰上壅日去五六碗作氣虛水泛為痰用六味丸料及四君子各一劑而愈

陳三農治一人痰出盈盆不止脈割大無力此內傷不足之症用人參附子各五錢乾薑蓽撥檀榔枳殼一劑而愈

一人滿口痰珠至舌共則成大泡綿綿不絕此火熱在胃大寒在肺也用參附湯保定肺氣後以辰砂益元

散瀉胃火而安

一人痰涎壅盛汗出不止此脾虛不能攝痰而肺失所養切不可作痰治只補脾胃為主用參朮煨薑各二錢半夏一錢煎服愈

陸養愚治董潯陽夫人稟氣怯弱性情沉鬱年三十餘晚間發熱天明始止得此病飲食漸減煩躁不安初服補血養陰年餘轉羸瘦又服參耆補氣亦不効醫謂脈已敗至恐不能久診之右手果然左手但微弱而數詢其月事則先期而少曰先期是血熱應左脈之數少是血虛應左脈之微脈症相應右手歇至此必鬱痰伏在氣分故脈結不至非死脈也第發熱必有所起之處今詢之則曰右脇一團熱起漸延遍身再問熱起處必有成形者按之果有柔塊如碗狀曰不足憂也攻去其塊諸症自愈矣為製一方香附一兩同炒至巴豆黑色去之醋打麵糊為丸梧子大米飲下五十丸日三服又用四物湯加山甲貝母豆仁木香薑棗煎日一帖半月塊消肌肉漸長一月精神爽健矣此案與痞門聶久吾治劉氏妹同

陸肖愚治李安吾正室不生育及納妾則俱孕生子出痘正者死而妾者生悲愁彌月遂胸脇脹痛每臥必

令人背上摋之良久方能就枕片時臥不能仰仰則氣涌而喘食減肌消月事數月不行脈之寸沉而數關沉而滑尺沉而弱脈與病應此鬱火成痰之症也用調氣養榮湯加白芥子倍霞天麴數劑胸脇少寬可仰臥矣第大便五日不行小便脹急與滾丸二錢又慮元氣不足改用補氣養榮湯二劑大便去燥矣數枚後出皆痰積脹痛減後與補藥間服月餘而安

吳遜齋體肥素有酒積胃脘作疼近又肢節痛而下體更甚或以爲風用史國公藥酒療之時作時止改用虎潛河車等丸則痛處且腫脈之六部皆緩滑滑主痰而關稍帶弦此溼痰流注關節而痛非風亦虛也治法宜先用丸劑清中宮之積痰繼用煎劑疎筋絡之壅治則肢節之痛除而胃脘之疼亦愈矣依法服之果然丸方霞天麴山查橘紅白朮茯苓枳實神麴竹瀝打糊為丸食遠白湯送下煎方蒼朮茆仁半夏南星白芥子威靈仙秦艽炙甘草青木香煎成入酒一小杯半飽時服

潘元石怒後縱飲遂患吐逆飲食半留半出甚則嘔物如褐色胸脇脹痛徹背或以翻胃治之反潮熱煩躁又以肺癰治之飲食減而嘔脹益甚或見吐出之物

謂肺爛矣診之見其肌肉未削聲音不改兩寸滑數
右關弦石關滑兩尺平曰此非肺壞也第為鬱怒所
至耳怒則血菀于上與痰膠結濁陰不降而膜脹生
焉法當涌之用常山五錢紅花五錢酒二碗煎一碗
方妙甚令通口服之一涌而出初見褐色痰塊後多紫
黑約有盆許胸膈頓寬背亦不痛不作嘔矣再以清
氣養榮湯調理之
陸祖愚治沈振宇妾患鬱痰鬱火症醫咸謂不起矣診
之形容枯槁咳咯涎沫六脈沈滯隱隱似有似無重
按至骨或有力或無根或遲或數已飲食不進似胃
氣將絕者但自能起坐聲音響亮知為痰涎壅隔血
氣凝濇故脈亦不流通耳用二陳加豆仁蘇子黃連
白芥子貝母石菖蒲等味一劑未効再診聞病人喜
聞爆竹硝硫之氣遂于前方加薑汁竹瀝每劑入半
盞半分調服症脈漸起再與加減五六日後進蘇合
一丸能進糊飲再與六君子加減調理月餘而安
李江州因下第歸飲食不思精神困倦醫謂遠歸久曠
投以補劑胸膈痞塞大便艱難不寐又與養血安神
頓躁而小腹脹滿診之見其面容昏滯六脈沉滑乃
以枳實黃連瓜蔞陳皮貝母檳榔元明粉兼服潤字

丸三錢半日未應又以前丸二錢催之良久腹中鳴轉下矢氣去稠粘臭穢五色錯雜約半桶頓快繼以前湯丸少少與之兩三日間糞色微黃改用參朮歸芍健脾養血調理而安

費表嫂患胃之下脘之上温温作痛可揉可按凡中温消導清火歷試不效診之六脈沉弦而滑以痰治之數劑而痛止精神未復而勞於女工且患血崩食入不化遷延數日胸腹脹滿其熱如火湯藥雜投致呻吟不絶人事不省脈之寸關沉伏不見兩尺尚沉滑有神曰此仍痰之為祟也元氣雖弱痰結不得不通用滾痰丸徐徐投之至半夜胃前隱隱有聲五更下稠痰盆許神氣頓穠胃腑少利再以養榮湯合二陳調理半月而愈

張宇清少時體豐多病專主温補病愈而火症時發乃滋水制火其疾如失六味之力也迨壯年肥盛溼痰醞釀於中仍滋陰不徹六旬外痰症陡發復用六味加二母歸芍麥冬服後痰涎壅塞四肢厥冷口開眼合人事昏沉診之六脈洪滑而數遂用加味導痰湯繼之蘇合丸兩劑纔覺神清問用何藥以前方告乃怒曰我生平最忌燥劑豈可服此今後斷不可用

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

乃郎心知父言之非每日以地黃湯一劑與驗過暗
煎導痰之藥以進病愈後洞悉前情不勝歎仄
陸祖愚治孫景陽室年近五旬向患痰火發則頭空眩
暈飲食減少旋發旋愈蓋有年矣近發轉甚將及月
餘診之六脉洪滑而數按之有力肢冷面赤肌肉黃
瘦不時眩暈甚則昏不知人水穀不進其症似不可
攻然而脉來有神當棄症憑脉乃用枳實瓜蔞膽星
貝母荅連橘紅牙皂入薑汁竹瀝服之吐痰數碗四
肢漸温再用川黃半五分配以蠟丸頓服三丸徐徐
頻飲竹瀝催之腹中鳴響後服潤字丸三錢便垢穢

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

若干病頓減後以清火消痰健脾養血調理而安
吳淑止室軀體壯盛自來有痰初出口時稀白澄清唾
地良久反極稠膩遇勞則暈眩昏冒近則兩三日一
發始則吐號既而昏憒角弓反張食頃乃甦四肢厥
冷胸腹滿硬六脉如絲細而且濇以為寒痰凝滯中
焦用二陳導(痰)湯半夏與四五錢(燥劣之品放膽重用末免盂浪服下
後一夜不安痰壅愈甚口舌燥渴因想脉症不同此
當棄脉從症改用貝母荅連枳桔花粉前胡膽星瓜
蔞竹瀝薑汁煎湯吞潤字丸五分六數服後胸膈漸
軟昏暈已除大便數日不行用滾痰丸三錢不應又

以潤字丸三四錢催之始得更衣症減半兩旬後逐
晡熱唇紅面赤乾咳無痰胸隔不暢竟似弱症乃清
晨吼服丸藥生地麥冬銀柴胡胡黃連知柏鱉甲秋
石歸芍杜仲食後服煎藥貝母黃連查橘枳术前胡
花粉豆仁如是出入增損養血順氣清火消痰兩月
全愈

滕文垣治李古愚每食後即大便腹皮稍脹急胃脘飽
悶服參朮則痞悶愈甚小水清長脈之左手寸濡右
寸滑按之如黃豆大且鼓指關尺皆弦小左尺迫迫
有神據脈乃積痰鬱于肺莫能出以致大便之氣不
固也與肺熱而爲泄瀉則下迫當劾丹溪治乃叔用吐法吐去
上焦痰積大便自調實先用苦梗蘿蔔子各三錢白
豆仁橘紅山屐各一錢川芎五分生薑三片葱三根
水煎服之取吐服半時許吐出清痰惡心未已乃痰
積膠固不易出也又以蘿蔔子一合擂漿水加蜂蜜
與半碗飲之始吐膠痰二碗餘吐膠痰平日每小水
則大便並行吐後小水始能單去連行三四次胸腹
寬舒初亦以吐爲懼至是豁然稱快大便五日一行
再以二陳加白朮旋覆花麥芽調理而愈

李士材治章給諫暑月心中大痛醫與香薷飲痛轉增

曰寸口弦急痰食交結也服香砂二陳二帖痛雖畧減困苦煩悶更以胃苓湯加半夏二錢大黃三錢下黑矢數枚痛減三四仍以前湯用大黃四錢下膠痰十數碗始安

徐主政勞且怒後神氣昏倦汗出如浴語言錯亂危困之極脈之大且滑且軟此氣虛有痰也用補中益氣湯料併四貼爲一劑用參至一兩加熟附子一錢熟半夏三錢四日稍更甦更以六君加薑汁一鍾服數日薦進八味丸兩月而安

王罷倦患痰嗽輒服清氣化痰丸漸至氣促不能食李

曰高年脾土不足故有是症若服前丸則脾土益虛矣投以六君子湯加煨薑三錢益智仁一錢五分十劑而痰清更以前方煉蜜爲丸約服一劑飲食乃進

朱文學遍體如蟲蟄口舌糜爛朝起必見二鬼執盤食以獻(怪病之為痰)向李泣曰某年未三十高堂有垂白之親二鬼旦暮相侵必無生理診其寸脈乍大乍小意為鬼祟細察兩關弦滑且大遂斷以為痰投滾痰丸三錢雖微有所下而病患如舊更以小胃丹二錢與之復下痰積及水十餘碗遍體之痛減半至明早鬼亦不見矣更以人參三錢白朮二錢煎湯服小胃丹

三錢大瀉十餘行約二十碗許病若失矣乃以六君子爲丸服四劑而愈

張路玉治一燕人體肥痰盛善肉善飯患痰鳴喘咳數年食傷恒發發則六脈遲滑時見歇至止聲如拽鋸遍地皆痰每歲或一二發或三五發深秋初冬尤甚遂用倒倉法自言肢體皆輕症遂愈二年後因不禁牛肉復發然其勢較前不過十一是亦不慎口腹所致耳

郭邑倢夫人素有敗痰失道左右兩脇俱有結塊大如覆杯發則咳嗽喘逆腹脇掣痛六脈止促按之少力用六君子湯加膽星枳實香附沈香二劑服之大吐稠痰結垢一二升因嘔勢太甚促往診之至則嘔止嗽寧脈息調勻不必更藥矣

吳剔駕夫人患痞眩嘔逆向因下體畏寒肢體麻木久服八味參附不徹六脈弦滑按之則濡此中焦素蘊痰濕陽氣不能周于四末之象得桂附辛熱之力有時雖可暫用究非真陽之虛且有地黃之滯所以痞暈漫無止期遂與局方七氣湯加沈香一服豁然再劑神爽而安食進

黃履素曰立齋治痰每言督虛水泛爲痰法當補腎予

壬申秋咳嗽多痰自知因于色遭先生法格服六味丸更不治痰嗽月餘竟愈時師治痰最忌熱地以為臟膈是烏知个中妙理哉

龔子才治周藩海陽王患痰嗽喘熱左足腫痛日輕夜重每年十發一二次已三十年遍治弗效診之左微數右弦數此血虛有溼痰也以四物湯加蒼朮黃柏木瓜檳榔木通澤瀉空心服以治下元茯苓補心湯臨臥服以治上焦各三服而愈後以神仙飛步丸空心服清氣化痰丸臨臥服各一料全瘳

張錫三治一中羊婦每夜發熱天明方止症兼惡心不食肢倦且云體素肥今漸消瘦因憶古人有言昔肥而今瘦者痰也痰滯中宮阻礙升降宜乎不食且作惡心痞悶血無所滋因而不足故夜熱乃以二陳治痰參朮補中氣枳實麥芽麪中香附炒扈子清火柴胡退熱凡二十劑間服橘半枳朮丸一月愈後進人參湯體漸復舊

一人素肥盛半年漸瘦兩膝與背至痛兩尺沈滑古人有言昔肥而今瘦者痰也遂以加減豁痰湯連進數服一日食後或作惡心乃以瓜蒂散一錢投之吐稠痰半升而愈

朱丹溪治一人項强痛不可忍不可以回顧作痰客太陽經治之用二陳湯加酒苓羌活紅花服後二日而愈治法彙

薛立齋治一儒者脾腎素虛而有痰或用導痰之法痰甚作渴頭暈煩熱謂中氣虛弱而變症用補中益氣湯而愈後勞役發熱此氣虛不能上升也用前湯加蔓荊子而愈後又勞神畏見風寒四肢通冷口沃痰涎此脾氣虛寒之真病以六君子加炮薑肉桂而愈一男子素腎虛而咳痰亦用導痰之法虛症悉具痰涎上涌小便頻數謂足三陰虛而復損也朝用補脾氣養湯培養脾肺之氣夕用六味丸加五味子收斂耗散之精而愈

大尹陳克明導痰後痰益多大便不實喜極熱飲食手足逆冷謂命門火衰而脾肺虛寒不能攝涎歸源用八味丸而愈

進士張禹功飲食停滯胸滿吐痰或用藥導之痰涎上涌眩暈熱渴大便閉結喜冷飲食手足發熱謂腎水虛弱津液難降敗液為痰用六味丸而愈

儒者楊文魁素唾痰諸藥不應服牛黃清心丸吐痰甚多或頭暈或熱從脇起左脈洪大有力右脈浮大而

無力薛曰此足三陰虧損火不能歸源用補中益氣
加麥冬五味及加減八味丸補其化源而愈
秋官張碧崖面赤作渴痰盛頭暈此腎氣水泛為痰用
地黃丸而愈
儀制賀朝卿吞酸胸滿痰盛作瀉飲食少思用清氣化
痰等藥前症益甚兩膝漸腫寒熱往來謂脾胃虛濕
熱下注用補中益氣倍參朮加茯苓半夏炮薑而愈
考功楊朴庵嘔吐痰涎胸腹腫脹飲食少思左關脈弦
長按之微弱此木剋土用六君子加柴胡山庖木香
而愈

二守陳子忠飲食少思吐痰口乾常服二陳枳實黃連
之類脾胃受傷乃問於薛薛述東垣先生云脾胃之
症實則枳實黃連瀉之虛則白朮陳皮補之彼遂以
二味等分為丸常服由是多服而不傷過時而不飢
趙以德云予近治一男子眉并後腫痛身熱且嗽其腫
按之不堅此乃酒痰流結者遂用南星半夏瓜蔞葛
根芩連竹瀝作煎飲燒葱根嚼腫上另用芥子白礬
作小丸就煎藥吞二十丸須臾痰隨嗽出半日約出
三四碗病即愈（醫說續編）
羅成之既得丹溪之學歸隱崇明三沙張太尉士誠患

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

痰氣怔忡諸省醫治療不効迎成之診之主以倒倉
法張宰用其方諸病除悉賜勞甚厚（醫史說續編 醫）
薛立齋治一男子素厚味胸滿痰盛此膏粱之人內多
積熱與法製清氣化痰丸而愈彼為有驗修合餽送
脾胃虛者無不受害
一婦人元氣素弱痰氣時作或咽間不利或胸痞等症
以為鬱結傷脾加味歸脾湯治之而愈後遇恚怒前
症仍作惑于衆言以為痰飲妄用祛痰之劑吐瀉數
次變諸異症口噤不醒以為脾胃復傷日用六君子
一劑米飲濃煎常服甚許至四日漸進粥食乃服前
藥間以歸脾湯喜其善調養兩月餘諸症悉愈
傳青主治一老人患痰湧喉間氣不得出入其家具棺
待殮先生診之曰不死令搗蒜汁灌之吐痰數升而
甦（劉綿頌九晚古文）
王肯堂曰余初喜嗽痰愈唾愈多已而戒之唯間梗梗
不可耐輒呷白礬湯數口咯入口中用舌攪研令碎
因而漱之百餘津液滿口即從鼻中吸氣嚥下以意
送至丹田默存少頃咽間清泰如未清再漱再嚥以
化盡為度方咯出時其味甚鹹漱久則甘世人乃謂
痰濁之物無澄而復清之理何其謬哉吾嘗渡河見

當歸草堂刻本
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

舟人攪濁流而入之甕甚糝入礬末數分即時澄清此可悟治痰之法也

丹陽賀魯庵年七十餘膈間有不快飲食少思初無大害就醫京口投以越鞠丸清氣化痰丸胸次少寬日日吞之遂不輟口年餘困頓不堪儻舟來訪問脈于王則大肉已脫兩手脈如游絲太谿絶不至宍見王有難色因曰吾亦自問必死但膈滿太甚大便秘結不通殊以爲苦但得少寬即瞑目無憾也因强王疏方以至親難辭教用人參白朮之類大劑進之少頃如厠下積痰幷餘留膈少寬更數日而歿蓋二丸乃

時師常用之物本欲舒鬱適增其痞本欲清痰適速其斃豈不悖哉

立齋治一人胃弱痰甚盛口舌生瘡彼服滾痰丸愈甚反瀉不止惡食怠倦此胃氣被傷也以香砂六君子湯數劑少可再以補中益氣湯加茯苓半夏二十餘劑而愈夫胃氣不足飲食不化亦能爲痰補中益氣乃治痰之法也苟虛症而用峻利之劑鮮不危哉

施沛然治莫進士公謨患痰嗽日多吐痰數盂刑體瘦削食曰火哉純用柔劑診之此肝木乘脾也脈浮而關弦面黃而鼻青補之則瘦瀉之則劇用六君子加

炒芍薑汁製連二劑不信仍用山卮黃柏之類更教
以神首𩲡曰神[illegible]今云神首未詳佐饔飧施曰三日後大瀉絕粒
奈何經云陰劑柔勝積若凝氷爲洞泄寒中之屬則
真火微而衛散至三日果大瀉脈脫鼻息如氷口不
能言彼醫曰脈脫矣大勢其在今日乎急投附子或
可救也曰無庸昨卮柏而今烏附何氷炭反掌耶寒
凉過劑脾氣大傷食復[illegible]之按之作楚先取山查作
液少服旋進獨參湯病雖劇無慮也用異攻散出入
調理而痊

沈明生治玉峯李誠侯苦志士也病萌于已亥夏風鶴
之驚至九月間困怠夜讀忽覺神思昏沉中心若墜
嗣後怔忡不已一友見其素禀清弱勸子鉛槧虛症
昭然令勸服參建兩月困怠轉加眩暈特甚則以為
參少力薄故益至五錢一劑約用三四兩後見病日
深輟參弗服歷叩醫或以為陰火亢盛當成勞瘵者
或謂其冬得春脈當其時不能再見者或斷之終至
癲癇者醫更藥雜歲將暮延診曰從前所議皆不悞
也所以不即愈者未治痰也今當專事豁痰徐議其
虛可耳遂用二陳湯加鈎籐菖蒲等味暫進煎劑書
一案云思慮傷神痰乘包絡以致虛靈之宰不獲自

持時覺心繞千絲時覺心空無物獨處則萬念紛紜
臨事則五色眩瞀痰上逆也痰為火擾夜臥難寐痰
助陽明多食不飽流于精道則夢失見之脈候則滑
弦治宜先標後本驅其壅閉俾神明之官仍安厥位繼
以補血養心庶之潤之品不能泥膈而餘疴不治自瘳
矣歸製寧神至寶丹一料送服入春全愈

錢國賓治無錫劉元女咳嗽吐痰氣短經閉骨瘦如柴
但不夜熱以新壻不相顧病益劇延劉診以決死生
六脈結滯或五七至中一止十餘至中一止兩關更
實凡勞症脈當芤細弦牢短促今見痰脈非勞病也
以導痰湯枳實半夏膽星蒼朮茯苓陳皮白芥子各
一錢甘草三分加熟大黃二錢二三帖下痰升許身
體困極以獨參湯調理漸安令服八珍湯而別

劉雲密曰愚于戊戌歲冬深終之氣主氣寒水既與司
天相合而客氣濕土又與在泉相合更加于主氣寒
水之上其病于陽氣甚矣氣乃肺主之故肺易受寒
邪既病于主氣之肺則陽氣益不得施化而水中之
陽化更微致濕淫滋患故濕痰生聚于胃而不行是
濕痰愈覆其陽則肺之鬱熱遂口舌為燥而肺所治
之上焦亦俱不爽且移于所合之大腸而化風矣治

之者宜麻黄杏仁輩以散寒炒乾薑製白术以除溼第所鬱之熱驟以薑术投之適益其勢耳乃散寒以麻杏而除濕暫用二陳加南星乃入蛤粉于中以歸陰借而散陽鬱其疫漸化而熱亦行徐以乾薑白术枳實輩理中乃得全愈

飲

孫兆治俞伯道忽患微熱心下滿頭有汗不能解衆醫以為温病用表藥有謂食在膈者治之皆不愈召孫至曰用半夏茯苓湯遂瘥衆問故曰頭有汗心下滿非溼症乃水結胃脇也水既去其病乃愈且如溼氣心下滿自當遍身汗若有食心滿頭豈得有汗若言是表身又不疼不惡寒表症何在故凡水納胸脇頭必有汗耳

張子和曰有一婦人年三十餘病滑泄經年皆云虛中有積以無憂散五七日一服至二十服不效又服纏積丹軟金丸諸藥皆不效其人服藥愈速病勢愈甚食飲日減人或謂曰此休息痢也宜灸中脘及左右穴臍下氣海及膀胱穴以三里引之每年當冬至日夏至日灸之前後計萬餘壯忽門外或者曰此病我

屢識蓋大傷飲之故即日桃花正開候其落時以長
棘針刺之得數十莖勿犯人手以白麪和作餅子支
武火燒令熟嚼爛以米飲湯下之病人如言服之不
一二時瀉如傾前後六七日計數百行昏困無所知
覺惟索冷水徐徐而飲至六七日少省爾後食日進
神日昌氣血日和不數年生二子
于和治郭敬之留飲四日浮腫不能食脚腫連腎囊痛
先以苦劑涌之後以舟車丸濬川散瀉之病去如拾
遺又一田叟姓楊其病嘔酸水十餘年本留飲諸醫
皆以燥劑燥之則中脘膈脇以火艾熸針刺之瘡未
嘗合張以苦劑越之其涎如膠乃出二三升詼笑而
愈
李七老病涌水症面黃而喘兩足皆腫按之陷而復起
行則濯濯有聲常欲飲水不能睡臥張令上涌去痰
而汗之次以舟車丸濬川散下之以益腎散復下之
以分陰陽利水道之劑下之水盡瘥
一婦從少年時因大哭罷飲氷水困臥水停心下漸發
痛悶咸以為冷積治以溫熱劑及禁食冷物一閒茶
氣輒內作如此數年燎針燒艾瘡孔數千餘年後小
便赤黃大便秘悶兩目加昏積水轉甚流於兩脇世

謂水癖或謂支飲咽漆稜茂攻磨之藥竟施之美食日衰積日茂上至鳩尾旁至兩脇及臍下但發之時按之如水聲心腹結硬手不可近者月發五次甚則欲死已二十餘年張診其脈寸口獨沈而遲此胸中有痰先以瓜蒂散涌痰五七升不數日再越痰水及斗數日上涌出數升凡三涌三下汗如水者亦三其積皆去以流濕飲調之月餘大瘥

中丞常子正苦痰飲每食飽或陰晴節變率同十日一發頭痛背寒嘔吐酸汁即數日伏枕不食服藥罔效宣和初為順昌司錄于太守荃達道席上得吳仙丹方服之遂不再作每遇飲食過多腹滿服五七十丸便已少頃小便作茅蒐氣酒飲皆隨小水而去前後痰藥甚眾無及此者用吳茱萸湯泡七次茯苓等分為末煉蜜丸梧子大每熟水下五十丸 朱氏驗方集本草綱目

陸養愚治施南石二十九歲患哺熱至天明方解夜熱尤甚咳嗽無痰咳則痛亦甚初服芎蘇散喘急殊甚易以前胡杏仁桑皮蘇子輩亦不效後以陰虛治之二冬二母服數月飲食漸減肌肉羸瘦咸謂勞瘵已成不可療矣最後一醫診得脈弦數左關尤甚此肝火也用柴胡青皮

黃連赤芍山巵白芥子數劑亦無驗于是苦於藥餌不延醫者已二月診之六脈沈數而滑右關尺更有力其脇痛若從右而應乎左因思仲景云飲在脇下咳則引痛謂之懸飲今咳則痛明是其症第十棗湯非常用之方且病人狼狽已極亦必不肯也乃以潤字丸料加入甘遂和丸令二分一服日二服每日加一分加至五分一服便出稠痰椀許中有一塊半軟半硬如雞卵大脇痛如失熱嗽減十之六七又用人參白朮歸芍茯苓貝母甘草作煎劑與丸藥間服丸藥仍日減一分直待便中無痰始止丸藥用前煎藥

日一帖調月餘全安

陳三農治一婦患眩運腰痛過寅卯二時則日夜昏迷不省人事身如浮雲中脈細數弦滑細爲濕數爲熱駐爲飲濕熱痰飲留滯胃膈隨氣升降上涌則爲眩運下墜則爲腰痛沃心包致竅不通故昏不省人事至巳午時心火助其濕熱鼓擊痰涎故昏癡益甚也此必痛飲所致叩之果然遂以稀涎散涌酸臭痰數升仍以舟車丸泄如屋漏水者五六次諸症頓愈繼以醒醒湯數服而愈

一貴婦患溢飲遍身虛腫用金沸艸散一劑汗出腫減

繼以澤瀉湯加枳實青皮旋覆花前胡四劑安

一婦時疫飲水過多胸膈堅痞咳逆倚息短氣不臥湯飲入而吐出諸藥罔效作停飲治以五苓散一劑愈

一婦人患霍亂飲陰陽水左腹堅硬痛極作留飲治以半夏旋覆花各三錢澤瀉枳實青皮白朮乾薑各一錢吳茱萸二分一劑愈

李士材治秦景明素有痰飲每歲必四五發發即嘔吐不能食此病久結成窠囊非大涌之弗愈也須先進補中益氣十日後以瓜蒂散頻投涌如赤豆沙者數升已而復得水晶色者升許如是者七補之七涌之百日而窠囊始盡而服六君八味丸經年不輟

吳孚先治西商王某氣體甚厚病留飲得利反快心下續堅滿鼻色鮮明脈沉此留飲欲去而不能盡去也用甘遂甘草半夏白芍加白蜜五匙頓服前症悉痊或問甘遂與甘草其性相反用之無害而反奏效何也曰正取其性之相反使自相攻擊以成疏瀹決排之功西人賦厚尤當用此

張景岳尊人早年善飲後及四旬遂得痰飲之疾嘔酸脹滿飲食日減眩暈不支驚惕恍惚疾瘧等症相繼迭出百方治疾無效因慕張子和吐法之妙遵而用

常[illegible]鈔本

之初用獨聖丹茶調散及虀汁之類一吐稍效再吐再效自此屢用不止雖諸痰漸退而元氣弗復也如此年餘漸覺純熟忽悟其理遂全不用藥但於五鼓睡醒時仰臥用嗳提氣氣有不充則嚥氣為嗳隨嚥隨提痰涎必隨氣而至雖最深之痰無不可取其最後出者形色臭味紫黑酸惡不堪言狀每吐後或至唇腫咽痛但以涼水一二口漱嚥解之吐畢早膳悉屏五味用薄粥一二碗以養胃氣自四旬後絕不用酒行吐法四十餘年自六旬外則一月或半月必行一次凡吐後神氣必倍王陽道必勃然子和之說信不誣也一切內傷外感無不盡却蓋道家用督此則用任所用不同所歸一也不惟却病延年而且後至八旬外猶能登山及登山下抄錄古書無病而卒與潘塤一案合參

張三錫治一人肩背與膝相引而痛寸脈弦知痰飲為患也投小胃丹一服吐痰半升間日再進一服瀉痰水有如膠者一升許病良已

張子和治一人病留飲者數十年不愈診之左手脈三部皆微而小右手脈三部皆滑而大微小為寒滑大燥為以瓜蒂散湧其寒痰數升汗出如沃次以導水禹功去腸中燥垢亦數升其人半愈然後以淡劑流

其餘蘊以降火之劑開其胃口不踰月而瘥

朱丹溪治一人素躭于酒患遍身關節腫痛此愈彼劇胸膈不寬此酒溼疫飲在胃流注經絡即流飲症也用二陳湯加酒用芩蒼朮羌活威靈仙澤瀉倍葛根而愈

許叔微自患飲澼三十年始因少年夜坐寫文左向伏几是以飲食多墜左邊中夜必飲酒數杯又向左臥壯時不覺三四五年後覺酒止從左下有聲脇痛日減嘈囋飲酒半盞即止十數日必嘔酸水數升暑月止右邊有汗左邊絕無遍訪名醫及海上方間或中病止得月餘復作其補如天雄附子礬石利如犁牛甘遂大戟備嘗之矣自揣必有澼囊如水之有科向不盈科不行但清者可行濁者而停滯無路以決之故積至五七日必嘔而去脾土惡水則流溢莫若燥脾以去濕崇土以填科向乃製蒼朮丸服三月而疾除蒼朮一觔去皮切未之用白芝麻半觔水二盞研濾取汁大棗十五枚爛煮去皮核以麻汁勻研成稀膏搜和入向熟杵丸如桐子大乾之每日空腹溫湯吞下五十丸加至一百丸忌桃李雀鴿初服時必腸微燥耳以茅朮制覺燥甚再進山巵散一服久之不

燥也山厄散用山厄一味乾之爲末沸湯點服

馬元儀治沈表姪因悲哀勞役面色黃枯白形體憔悴右脇有塊凝結作痛痛甚則嘔手足厥逆飲食不思大便時溏時結吐出痰飲動輒盈盆或一日一發或間日一發苦楚萬狀診其脉左三部弦而勁急右三部虛微無力方用桂枝理中加桂湯稍安越三日又發與前方不應乃倍加附子甚安後復發前方又不應因思仲景傷寒治法有用眞武湯一法者原以眞陽飛越水氣上逆故用此以復陽收陰坐鎮少陰北方之位究其功用全在行水醒脾之妙今因勞鬱所傷中氣損甚由是所勝之木乘脾所不勝之水侮之而上逆木橫則痞結作嘔水逆則痰飲泛溢若非眞武何以攝元陽而鎮陰邪耶遂用此方倍加分兩多用人參連進三十餘劑嘔漸已痰漸少令早服八味丸晚服附桂理中丸調理諸症悉平惟結塊不除則以久積陰寒難解恐成痼疾也

繆仲淳治丹陽葛文學字十內人因作家勞鬱惠飲症每發吐嘔不已腸如欲出所吐俱清水動以盆桶計日夜不止不思飲食就醫金壇諸醫以健脾行氣理鬱清痰藥投之愈劇困頓待斃計無復之矣繆視脈

蓄症知爲飲無疑乃半夏廣皮茯苓猪苓澤瀉旋覆花厚朴白朮枳實川連木香加人參三錢一劑吐止再劑霍然隨啖粥糜脾氣漸復至今每病作檢方服之即平

雲間康孟修患寒熱不食久之勢甚危以治寒熱劑投不應徧檢方書與王宇泰議投五飲丸立瘥蓋飲症原有作寒熱之條故治飲病自去矣（廣筆記）

吳橋治汪鏞始壯輒患嘔逆胸高痛諸醫悉以瞞治骨立而羸久之垂絕而汗如流水漿不能入口診其脈即浮濡不任按無他證端曰此停酒飲爾誤以瞞治病

羅鍊年近壯病中脘痛連背脇及心間吐清水久之痛甚如剜及再信宿昏倫醫投劑謂六脈俱絕吳橋後至則脈伏非絕也遂以溫補之劑投之一服而脈見再服而愈（全上）

者心悸則澼乳于胸中血從氣行氣沮則血亦沮矣此攻原標也第先屏二缶然後治之瘀血當下病者憮然爲間曰敬如公言遂修行氣一劑飲之飲未畢而痛止徐下黑糞瘀血畢行乃平（太函集）

程氏有少婦病小腹痛吐痰多嘔清水發熱泄瀉肌削而屏饗飧乃遜橋六脈沉細弦數曰此積飲也法當發其積而病可除第病久而羸（羸毋伐）太過劑以補中去濕小腹大痛而愒既則嘔水盈盤沈沈皆綠色衆異曰何為有此橋曰吾因以為濕熱也地下濕則苔生其綠同尋無恙（全上）

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

吞酸

潘塤曰余昔年脾胃受傷每日申未時飯至二鼓食消方寢夜半睡醒噯氣吞酸糟粕乘氣浮上起坐摩挲久之復寢漫服枳朮平胃散或分消或疏導久不效自思年六旬外恐脾胃弱不能運化却去晚餐凡粘硬果物及溼熱酒麪一切不入口不知何以致此因讀東垣脾胃論乃知陽氣下陷陰火上衝脾胃不實故耳得一方曰補脾胃瀉陰火升陽湯藥品主佐在本方并服藥時日所宜所忌切中病情又讀至調理脾胃治驗謂不可用淡滲湯之劑抑遏陽氣反助陰邪必加升陽風藥以羌獨活升麻防風炙甘草根截入前藥水煎服乃依方服之片時許陽氣騰騰而上不數日陰火漸伏脾胃實而愈（楮記室）

高鼓峯治杭人沈孟嘉妻患吞酸膈痛屢年矣肌肉枯削幾於絕粒診之六脉細數此肝木乘脾土也先投六君子湯加炮薑十餘劑覺吞酸減半繼用補中益氣湯加半夏炮薑十餘劑而吞酸盡去膈痛亦除次用歸脾湯倍木香加炮薑吞八味丸而愈

薛立齋治一婦人飲食後或腹脹或吞酸自服枳朮丸

飲食日少胃脘痞滿腿肉痠痛畏見風寒或用養胃
湯腿痛浮腫益甚月經不行此鬱結所傷脾虛濕熱
下注侵用四君子芎歸二陳午後以前湯送越鞠丸
諸症漸愈又用歸脾八珍二湯兼服兩月餘而經行
一婦人胸滿少食或腹脹吞酸或經候不調此中氣虛
不能施化也用補中益氣加砂仁香附炮薑而飲食
進更以六君歸芎貝母桔梗而經自調
一婦人飲食少思胸中嘈雜頭暈吐痰此中氣虛而有
熱用六君子湯加黑山梔桔梗而愈後因勞碌頭暈
發熱吐痰不食用補中益氣加半夏茯苓天麻而痊

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一婦人中脘嘈雜口中辛辣或咳嗽吐痰發喘面色或
白或赤此脾氣虛而肺中伏火也用六君子加山梔
桔梗柴胡及炒黑片芩治之尋愈
一婦人嘈雜吞酸飲食少思大便不實此脾氣虛寒而
下陷用補中益氣湯加茯苓半夏炮薑漸愈又常服
人參理中丸則安
一婦人飲食後嘈雜吞酸此食鬱為疾用六君子湯送
越鞠丸漸愈又用加味歸脾湯而痊後因怒兩脇脹
痛中脘作酸用四君子湯送左金丸漸安仍用六君
子湯送越鞠丸而痊

朱丹溪治一人因濕熱病嘔吐酸水如醋用二陳湯加薑炒芩連蒼朮白朮厄子藿香香附砂仁而愈

陳三農治一婦每食止椀許稍加非大便泄瀉即噎腐吞酸腹脹痞悶此脾胃虛寒不能化也用六君子加茱萸連藿香香附砂仁神麴煨薑而愈

立齋治一婦人飲食每用椀許稍加非大便不實必吞酸噯腐或以為胃火用二陳黃連枳實加內熱作嘔曰此未傳寒中故噯氣吞酸脹滿痞悶不信仍作火治虛症並至月經不止始信以六君子加炮薑木香數劑元氣漸復飲食漸進又以補中益氣加炮薑木香茯苓半夏數劑全愈後因飲食勞倦兼之怒氣飲食頓少元氣頓怯用前藥更加發熱誠似實火洪大按之而虛兩尺如無此命門火衰用補中益氣加薑桂及八味丸兼服兩月餘諸症悉愈此症若因中氣虛弱者用人參理中湯或六君子加木香炮薑不應用左金丸或越鞠丸虛寒者加附子或附子理中湯無有不愈

一男子素弱惡寒食雖熱食亦少作脹吞酸日消瘦服參苓等藥及灸脾俞等穴不應用八味丸治之而愈此眞氣不足不能生土虛火上炎之症也

一婦人年二十餘飲食後每因怒氣吞酸噯腐或魚腥根煅服趙鞫丸等藥不應此脾氣虛濕氣下注而然以六君子湯香附砂仁藿香炮薑數劑少愈更以六君子湯數劑而愈

一男子瘵癒已愈患吞酸服參朮藥不應彼謂餘毒薛治以附子理中丸而愈

張景岳曰予向在都中治一縉紳病吞酸告以為寒彼執爲熱堅持造酒之說以相問難莫能與辨竟爲荐連之屬所斃此見理不真而固執以致釀成大害者

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

續名醫類案卷第二十一

續名醫類案卷第二十二

錢塘魏之琇玉橫撰

頭

有人三代不壽問彭祖觀其寢處果有一穴當其腦戶令塞之遂得壽蓋隙風入耳吹腦則陽氣散頭者諸陽所聚以主生也 延壽書

竇材治一人起居如常但時發頭痛此宿食在胃脘也服丁香丸十粒而愈陽明食積頭痛

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

張子和治南鄉陳君將赴秋試頭項遍腫連目一狀若半盞其脈洪大張出視內經面腫者風此風乘陽明經也陽明氣血俱多風腫宜汗乃與通聖散入生薑蔥根豆豉同煎一大盞服之微汗次日以草蔴擂鼻中大出血立消（陽明熱頭明風痛）

王定國病風頭痛至都梁求明醫楊介治之連進三丸即時病失懇求其方則用香白芷一味洗洒為末煉蜜丸彈子大每嚼一丸以茶或荊芥湯化遂名都梁丸其藥治頭風眩暈女人胎前產後傷風頭痛血風頭痛皆効（百一選方惟陽明風熱宜之餘不可服按此陽明風熱不可用之有驗）

張大復曰偏頭風之苦病者莫能自言方亦多岐而罕效戊申予忽病此症悶鬱時周叔明以餅法見寄未服也五月五日顧民服貽二餅貼太陽上一夕良已法用南星半夏白芷三味等末爛搗生薑蔥頭為餅不服不吹不熏視諸方更簡便也（筆談○風疫用之有驗）

姚應鳳治嚴州施盛宇三載患頭痛不可忍姚曰法當取首中骨今八月時收斂難猝治期以明歲春乃割額探去其骨出瘀血數升頃（錢唐縣志○與腦中石蟹畧同）

龔子才治杜侍御患頭痛如刀劈不敢移動懼風怕語言耳鳴目中潘火六脈緊數有力與酒九蒸九晒大

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

黃為末三錢茶調服一劑而愈此亦陽明畜熱為病
黃必用如是製法
在至高之地故大
薛立齋治譚侍御但頭痛即吐清水不拘冬夏吃薑便
止已三年矣作中氣虛寒用六君子加當歸黃耆木
香煨薑而瘥陽明挾厥陰病
孫文垣治荃樂川內人患頭痛如破髮根少動而痛
連滿頭暈倒不省人事踰半時乃甦遍身亦作疼胸
膈飽悶飲湯水停膈間不下先一日因怒吐水數次
蚘蟲三條今或惡風或惡熱口或渴或不渴大便秘脈
則六部皆滑大有力此痰厥頭痛也因怒而吐水吐
蚘乃肝火上逆

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

當治痰而不知養肝必貽後患先以藿香正氣散止其吐繼以半黃
黑虎丹清其人事頭仍痛甚又以天麻藁本各三錢
半夏二錢陳皮白芷薄荷麻黃生薑蔥白煎服得少
汗而頭痛少止至晚再服之五更痛止大半人事未
全清此蓋中州痰盛非下不可乃用半夏五錢巴霜
一分麵糊為丸每服三十丸生薑湯送下下午大便
行三次皆稠粘痰積也飲食少進餘症差可惟遍身
疼未能去改用二陳湯加前胡石膏藁本薄荷枳
殼黃芩石菖蒲調理而安
朱丹溪治一人因浴冷水發熱頭痛脈緊此有寒濕也

宜温藥汗之蒼朮麻黃乾葛甘草陳皮川芎二貼得
汗後知病退又與下補藥白芍陳皮半夏白朮蒼朮
人參木通甘草四帖薑水煎服濕熱
一婦人頭痛發熱而渴白朮陳皮川芎乾葛木通甘草
水煎温服陽明病
樓全善治一老婦人頭痛歲久不已因視其手足有血
絡皆紫黑遂用三棱針盡剌出其血如墨汁者數盞
後視其受病之經灸剌之而得全愈即經所謂大痺
為惡及頭痛久痺不去身視其血絡盡出其血是也
三陽風熱

李時珍治一人病氣鬱偏頭痛用莵麻子同乳香食鹽
搗貼一夜痛止治標
李士材治蔣少宰頭痛如破昏重不寧風藥血藥痰藥
久治無功脈之尺微寸滑腎虛水泛爲也地黃四錢
山藥丹皮澤瀉各一錢茯苓三錢沈香八分日服四
帖兩日輒減六七更以七味丸人參湯送五日其痛
若失近時上盛之病最多觀此可悟一切
吳孚先治一人患頭痛痛不可禁脈短而澁吳曰頭爲
諸陽之首若外邪所乘脈當浮緊而弦今反短澁短
則陽脫於上澁則陰衰於下更加手足厥冷名為眞
少陰病

頭痛與眞心痛無異法在不治惟猛進參附或冀挽回萬一如法治之果愈

李成章官六安衛千戶善針灸或病頭痛不可忍雖雷不聞李診之曰此蟲咬腦也合殺蟲諸藥為末吹鼻中二三日蟲悉從眼耳口鼻出即愈明史

一人素病黃忽苦頭痛不已發散降火歷試無効診得脈大而緩且一身盡痛又兼鼻塞乃濕家頭痛也投瓜蒂散一匕內鼻中黃水去大杯而愈大還濕熱

張三錫屢見苦頭痛百法不應詢之曾生過楊梅瘡用土茯苓四兩白鮮皮苦參金銀花各三錢黃柏一錢

皂角子三十粒苡仁木通防風各二錢氣虛加參耆血虛加四物大獲其驗身痛亦效治法兼濕毒

一人頭痛脈滑而數乃痰火上攻也二陳荊芥羌活酒芩不應加石膏二劑稍可終未盡除前方加熟大黃三錢食遠煎服病去如脫左上陽明痰火

一人苦頭痛眾作外感治診得右手寸口脈大四倍於左兩尺洪盛乃內傷氣虛頭痛也外兼自汗倦怠以補中益氣湯加炒黃柏一劑知二劑已氣虛

一人頭痛而面色黎黑身體羸瘦左寸關俱不應指兩尺獨洪盛因作陰虛治用滋陰四物加黃柏知母元

參二服減半十日痊（血虛）

一婦苦頭痛悞爲外感治發散三黃白虎硝黃愈投愈甚診之氣口急大而數按之即濡右脈亦虛大詢之先不熱服後始熱藥曰風寒必先發熱在一二日間豈有先不熱而後熱者此氣虛頭痛也觀其氣短不足以息餘皆可知今發散過度復耗其氣又復下之復損其血氣兩傷血宜乎虛火獨熾而身反熱也非大補詎能挽回遂以補中益氣湯大劑加熱附子一片為嚮導服下熟睡覺而痛止第人事不清復加筋惕肉瞤振振不寧彼歸咎於補劑曰虛極所致復更

一醫用柴胡表藥致一身之火游行于外變為斑爛彼益信爲傷寒失化斑承氣日進遂不救（仝上）

一人頭痛身形拘急惡寒便秘惡心作食鬱治不應診得氣口脈平和獨尺數而細且行步艱難乃脚氣欲動也從脚氣治而愈（仝上）

一人頭痛作外感治不應左脈平和氣口獨盛症兼飽悶惡心乃食鬱也消導而愈（仝上○陽明病）

一人牙與頭角互痛乃少陽陽明二經火盛之故清胃散對小柴胡去半夏人參加薄荷石膏二劑瘳（仝上）

一老嫗頭痛連額發散降火備用不效面上皆出小紅

紅泡有微水不甚潰一月後痛悉移於左右眼胞上
紅腫且嬾于言動飲食不甜用辛凉愈甚六脈濡弱
如蛛絲初按少弦因作氣虛治六君倍黃耆加蔓荊
子三服後漸安心跳不眠愈急乃以調中益氣湯加
茯神元參棗仁柏子仁連進數服頓愈 全上

東垣嘗病頭痛發時兩頰青黃班暈目不欲開嬾言身
體沉重元氣欲吐潔古曰此厥陰太陰合病名曰風
痰以局方玉壺丸治之炙俠谿即愈是知方者體也
法者用也徒執體而不知用者奚體用不失可謂上
工矣 秘藏說續編 醫

湖南押衙顏思退治頭風制挈痛用蠟二觔鹽半觔相和
于錫鑼中熔令相入揑作一兜鍪勢可合腦量大小
搭頭至額頭痛立止 經驗全方 上

王叔藘云予年踰壯寒夜觀書每覺腦冷飲酒過量腦
亦疼甚後因灸顖會穴而愈有兵士患鼻衄不已予
教令灸此穴即愈有人久患頭風亦令灸此穴即愈
但銅人明堂經只云主鼻塞不聞香臭等疾而已故
予書此以補其治療之缺然以腦戶不宜針觀之顖
會亦不宜針鍼經只云八鍼以下不宜鍼恐未盡也
叔權母氏隨叔權赴任為江風所吹身體頭裡動如在

舟車上乃如半年乃大吐疫徧服疫藥并灸頭風諸穴方愈

有士人患腦熱疼甚則自牀投下以腦拄地或得冷水粗得減而疼終不已服諸藥不效人教灸顖會而愈熱疼且可灸況冷疼乎凡腦痛腦旋腦瀉先宜灸顖會而強間等穴蓋其次也以上並資生經全上

薛立齋治一儒者酒色過度頭腦兩脇作痛以為腎虛而肝病用六味地黃料加柴胡當歸一劑而頓安

商儀部勞則頭痛作陽虛不能上升以補中益氣湯加蔓荊子而痊

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

王肯堂治一人寒月往返燕京感受風寒遂得頭痛數月不愈一切頭風藥無所不服厥陰愈甚肢體瘦削因思此症明是外邪緣何不解語云治風先治血血行風自滅本因血虛而風寒入之今又疎泄不已烏能愈哉又云痛則不通通則不痛乃用當歸生血活血木通通利關竅血鮓其人能酒用酒一斗入二藥其中浸三晝夜重湯煮熟乘熱飲之致醉則去枕而臥矣然有火鬱于上而痛者宜酒蓉石膏之類治之又方用歸芎熟地連翹各二錢以薄荷二錢放椀內將滾藥冲下鼻吸其氣候温即服之立愈然亦爲

血虛者設耳

馬元儀治一友患頭痛年經不愈早則人事明了自午至亥神氣昏憒不寧作風火治無效診之兩脈俱沉且滑此太陰陽明痰厥頭痛也用礞石滾丸痰開服導痰湯以蕩滌之次以六君子加秦艽全蝎調理而安

張樹滋妹患頭痛累月診之陽脈大陰脈澁曰此陰衰于下陽亢于上上盛下虛之候也法宜六味地黃湯加青鉛五錢俾(清)濁定位斯不治痛而痛自止矣所以然者以陽氣居上體本虛也而濁氣干之則實陰氣居下體本實也而氣反上逆則虛頭為清陽之位而受濁陰之邪陰陽混亂天地否塞而成病矣治之者不察其脈案以頭痛屬風火專行透解之劑有不益虛其虛者乎

朱某患頭痛累月苦不忍咸用散風清火之劑診其脈浮虛不鼓語言不嬾惰肢體惡寒此勞倦中傷清陽之氣不升濁陰氣之不降也故汗之及虛其表清之益傷其中其惡寒乃氣虛不能上榮而外固也況脈象浮虛體倦語怯尤為中虛氣弱之驗與補中益氣湯升清降濁加蔓荊為使令至高令顛一劑知二劑而

一人頭風畏冷首裹重綿三十年不愈以蕎麥粉二升水調作二餅更互合頭上微汗即愈李樓怪症奇方王幣存曰此方先裴溪伯曾治族祖經驗

繆仲淳治梁溪一女子頭痛作嘔米飲不能下曰因于血熱血虛火上炎也逐用麥冬五錢橘紅木瓜茯苓各二錢白芍三錢枳杷葉三大片蘇子錢半甘菊錢半烏梅二个竹瀝一杯蘆根汁半碗二劑嘔止頭尚痛加天冬二錢頭痛少止加土茯苓二兩小黑豆一撮全愈廣筆記

沈觀頤中丞傳自一道人頭風神方予僕婦患此痛甚欲自縊服二劑數年不發土茯苓四兩忌鉄金銀花三錢蔓荊子酒炒風明天麻各一錢元參八分辛夷川芎各五分黑豆四十九粒燈心二十莖芽茶五錢河水井水各鍾半煎一鍾服廣筆記

廣筆記治半邊頭痛屬火症者用之大黃末三分黃芩末一錢二味和生白酒一碗頓熱調勻服之即愈

立齋治一婦人腦左腫痛左鼻出膿年餘不愈時或掉眩如舟車正許叔微所謂肝虛風邪襲之而然也以川芎一兩當歸三錢羌活旋覆花細辛蔓荊子防風石膏藁本荊芥穗半夏麴乾地黃甘草各半兩乃製

一料每服一兩薑水煎服而愈

劉雲密曰一婦季冬受寒甚至仲春巔頂並左後腦痛是原病於足太陽寒水寒久化熱鬱熱上行以病于手太陽因風升之化不達而病亦在足厥陰也經謂過在巨陽厥陰者誠然診者云手太陽熱甚於風足厥陰熱勝于濕更謂脾肺亦有鬱熱心有微熱余止治手太陽而微兼肺以上焦合而營諸陽歸于手太陽之氣化在肺主氣者也並治足厥陰以風升之化達而手太陽之氣化乃暢更微利小腸以通血脈而和（真）氣並心經之熱亦去故不必多治他經也按此亦

亦治巔頂之一因見寒者温治之未盡耳酒芩二分半蔓荊子二分半蒼朮三分藁本三分升麻二分半防風分半黄連二分半柴胡三分半木通四分半川芎二分酒黄柏三分當歸三分水煎一劑愈

嘉祐初仁宗寢疾藥未驗間草澤名醫始用針自腦後刺入針方出開眼曰好惺惺翌日聖體良已自爾以穴目為惺惺穴針經初無此名或曰即風府也宋張（舜民畫墁録）

吳橋治方簡妻病五年恃醴不盡一器至夜則頭岑岑遞絶遞甦達旦乃定橋至曰少食久卧肌宜朘今且腹而脈不數奚病為或婦當震大損血於頭審是治

二年可受胎復產男而起矣蓋婦當妊哭姑髮根有疣如豆大出血數升匿勿令人知尋免男弗育也治不補氣專補血果二年而舉子命之曰去病遂如常

太函集

髭髮

李林甫婿鄭平為省郎林甫見其鬚髮斑白因曰上明日當賜甘露羹鄭郎食之能烏髮豈日食之一夕兩鬢如鬒

瑯琊代醉編

李卿換白髮方云刮生老薑皮一大升於鐺中以文武火煎之不得令過沸其鐺惟得多油膩者尤佳更不須洗刮便以薑皮置鐺中密封固濟勿令通氣令一精細人守之地色未分明黎明也便須煎之緩緩不得令火急如其人稍疲即換人看火一伏時即成置於磁鉢中研極細李方雖云一伏時若火候勻至日西即成藥也使時以箸腳蘸取如麻子大先于白髮下點藥訖然後梭之再點以手指熟撚之令入肉第四日當有黑者生神效

梅師治年少髮白梭去者白以白礬塗毛孔中即生黑髮不生取桐子鴉汁塗上必生黑者

千金療髮黃熊脂塗髮梳之散頭入牀底伏地一食頃即出便盡黑不一升脂驗

薛立齋治一男子因大怒發熱眉髮鬚落蓋髮屬腎而眉屬肝此肝腎素虛為怒陰火愈甚盛銷鑠精血而然也用六味丸料加柴胡山梔黃柏數劑漸生又二十餘劑而完

一男子染時瘡服撚肌散之類眉毛鬚脫遍身作痒或時赤暈乃燥藥損其陰血陽氣偏旺而然朝用四物湯倍熟地加茯苓白朮丹皮山梔甘草夕用六味丸料加當歸黃耆治之瘡症既愈眉髮亦生

一男子素不慎房勞其髮忽落或發熱惡寒或吐瀉頭暈或口乾作渴或小便如淋兩足發熱或冷至脛屬足三陰虧損而陰火內熾朝用十全大補夕用六味丸料加炒黑黃柏枸杞治之諸症悉退而髮漸生

一男子遍身瘙痒服祛風辛燥之劑眉髮脫落此前藥復傷肝腎精血虛而火內熾所致朝八珍湯用加麥冬五味子夕用六味丸料加當歸黃耆治之風熱退而眉髮生矣

一儒者遍身作痒搔破膿水淋漓眉毛脫落如癩風症久服祛風等藥致元氣虧損用補中益氣湯加茯苓

而愈後失調理日晡熱甚用八珍加五味麥冬十五
餘劑而痊

面

孫兆治樊樓店家劉叁一日滿面皆黑色相有者斷云
不過月餘死既逾月且安適孫入店與客飲酒遂拜
孫述說其病狀孫診之曰非病也乃為鼻氣所熏織
氣畜于面部不散故有此色問劉汝一月前聞甚一
陣非常臭氣不能避耶劉曰一日登溷其廁臭氣不
可聞隱忍良久下廁明日遂有此疾孫曰去至臭無
過至香我家有南人將至售香可用沉檀二香各一
兩碎擘焚于爐中安帳內以熏絹被蓋定勿令香氣
散可端坐香邊瞑目靜坐候香氣散方可出帳明日
引鑑照之劉依其言面色漸變旬日如故

樓全善曰腎臭屬水腐脾臭香屬土廁臭者腐臭
也故聞之則入腎而面黑沈香者香臭也故熏之
則脾土勝腎水而色還也

蘇子由面有瘡高安丐者趙生謂子由曰君好道而不
得要陽不降陰不升故肉多而浮面赤而瘡吾將教
君梳水以灌溉子骸經旬諸疾可去子由用其說信

然惟怠不能久故不能極其妙龍川志畧

治面部生瘡或鼻臉赤風粉刺用盡藥不效者惟有此藥可治神妙不可言每以少許臨臥時洗面令淨如面油用之近眼處勿塗數日間瘡處自平赤亦消如風刺粉刺一夕見效閔提點方用生硫黃半錢香白芷半錢芫青七个去翅足全蝎一个洗炒瓜蔞半錢膩粉半錢蟬腿五个洗去泥右為細末麻油黃蠟約度如合面油多少熬熔取下離火入諸藥在內每用少許塗面上醫說續編

趙君猷樵幹所傳云有貳卿趙再可知湖州時與一詩僧相厚而僧患酒齇鼻端生赤贅數枚大者如橘小者如梅李下垂過口飲食言語皆所妨廢良自厭苦之郡有一小兵事刀鑷人但聞其善取齇痣不知其能治酒齇也一旦自言于僧請醫此疾即以藥傳之凡半月餘每日取惡物如膿血自皮膚出者甚多其贅後悉成痂落去鼻面瑩然遂以十千為謝且語貳卿俾直齋閣而求得其方以傳秀邸治人良驗用黃丹五文餅藥五十文著大礶子盛碙砂三十文研極細用巴豆十个去殼膜紙裹壓去其油右件同入餅藥礶子中慢火熬三兩沸取下續入研細生礦灰三錢酒齇鼻用鵝毛掃在紅處一日一次上藥以追出毒物病退即止雀子斑用小竹棒

兒挑藥點患處纔覺微腫即便洗去恐力太猛竝集成

全上

陳三農治隣婦面上一熱通身躁熱而汗隨之日夜六七次百治不愈細思之經曰面熱者足陽明病此脾陰不足而胃火有餘也以山藥爲君歸芍地黃爲臣以補脾陰之不足用石膏生甘草以瀉胃火黃耆麥冬五味以固腠理加竹葉以去煩熱二劑愈

朱丹溪治一婦人面頰兩顴熱腫此膈壅之病也乾葛桔梗各錢半升麻一錢蘇葉錢半薄荷一錢炙甘草七分薑一片水煎食後服

王荼遺孔休玉休不受荼曰君面有疵美玉可以滅瘢休猶不受荼曰君嫌其價重乎遂椎碎進休休方受之

薛立齋治吳黃門瞻之顯赤腫痛此胃經風熱上攻所致以酒芎升麻湯二劑而平又姜大理患此前湯為人所惑謂湯內白附子性溫而不服另用荊防敗毒散愈甚後雖用此湯去白附子亦不應後用前方三劑而愈本草云白附子味甘辛氣溫無毒主面上百病及一切風瘡乃風熱之主藥內經曰有是病用是藥苟不用主病之藥病焉得而愈哉

吾進士面患瘡已滿作渴自服托裏藥及降火藥不應
診其脈浮而弱丹溪云潰瘍作渴屬氣血俱虛況
脉浮弱投以參耆各三錢歸朮熟地各二錢數服渴
止又以八珍湯加黃耆數劑脈斂而愈或入渴門

韓氏子年十四早喪天真紅面紅腫如風狀不時舉作
或誤用瘟風藥內虛發熱口燥煩渴此內傷不足陰
火上炎而類赤遊風症也藥宜滋其陰火自退用則
加參耆四十劑又用作此丸服餉許不兩月

瘡瘍機要

而瘥

許學士治王檢正患鼻頰間痛或麻痺不仁如是數年
忽一日連口唇頰車髮際皆痛不開口難言語飲食
亦妨在額與頰上常如糊手觸之則作痛足陽明經
絡受風毒傳入血凝滯而不行故有此症或者以排
風小續命透髓丹之類與之皆不効乃製犀角升麻
湯贈之數日而愈犀角升麻防風羌活川芎白附白
芷黃芩甘草右粗末每服四大錢水煎日三四服陽明
經絡環唇挾唇起于鼻合頰中循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱今所患皆一經絡也

老母年七十餘累患頰車痛每多言傷氣不寐傷神則
大發上連頭下至喉內及牙齦骨如針刺火炙手不
可犯乃至口不得開言語飲食並廢自覺火光如閃

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

電尋常涎唾稠黏如絲不斷每勞與飢則甚得臥與食則稍安知其虛也始以清胃散犀角地黃湯人參白虎湯羌活勝濕湯加黃芩甘桔皆不効後改用參耆朮草芎歸芍柴桔梗之類稍佐黃芩山皀牛蒡連翹空腹進之而食遠則服加減甘露飲始漸安然老人性多躁而不耐閉勞與多言時有之不能除去病根然發亦稀少即發亦不如往歲之劇矣

從子語因喪子鬱結復多餌鹿角膠諸種子藥或于食後臨臥輒進之以至成積于胃遂患面痛如老母之症服清胃散甘露飲重加石膏太過而見虛症又服參耆等補藥而復見火症門人施生以越鞠丸加山皀連翹貝母橘紅之屬開其鬱結而始安然如舊日矣連上一條俱自來選抄入不知誰案

目

孫兆治國婆婆患眼冷淚眼科醫科二三年醫官治不效上召孫孫至曰臣非眼科但有藥耳容進方用石決明一兩赤小豆一兩半半夏五錢生斑猫二十一粒炒去頭足木賊五錢爲末薑汁丸如桐子大每服二十丸薑湯下方進聖旨下眼科詳定奏曰此方於

眼科甚不相涉斑猫有毒恐傷臟腑不敢用合再取
聖旨國婆婆聞之曰眼科醫官不惟不能亦不愿使
我治也但合此藥總傷無怨上聞之孫自進藥服經
十餘日愈八分二十日全愈時眼科並降兩官孫賞
錢三十萬

竇材治家中女婢忽二目失明視之又無暈翳細思此
女年少精氣未衰何緣得此症良由性急多怒有傷
肝臟故經脈不調而致逐與密蒙花散一料如舊光
明矣

張子和治女僮目忽暴盲不見物此相火也太陽陽明
血氣俱盛乃刺其鼻中攢竹穴與頂前五穴大出血
目立明

李民範曰常赤至戊子年火運君火司天其年病目者
往往暴盲運火炎烈故也李是年目大發張以瓜蒂
散涌之赤立消不數日又大發其病之來也先以左
目內眥赤發牽睛狀如鋪麻左之右次鋭眥發亦左
之石赤貫瞳子再涌之又退凡五次亦五次皆涌
之又刺其手中出血及頭上鼻中皆出血上下中外
皆奪方能戰退然不敢觀書及見日張云當候秋涼
再攻則愈火方旺而在皮膚雖攻其裡無益也秋涼

則熱漸入裏方可擒也惟宜暗處閉目以養其神水暗與靜屬水明與動屬火所以不宜見日也蓋孛因初愈後曾冒暑出門故痛連發不愈如此涌洩之後不可常攻使服瓜蒂散子以退醫方在別集中

趙君王目暴赤腫點洗不退偶思張語曰凡病在上者皆宜吐乃以茶調散涌之一涌赤腫消散君玉歎曰法之妙其迅如此乃知法不遠人人自遠法耳

王之子十餘歲目赤多淚衆工無效張曰此兒病目翳當得之母腹中被驚其父曰妊娠時在臨清被圍乃令服瓜蒂散加蠶金上涌而下泄各去涎沫數升人皆笑之其母亦曰兒腹中無病何吐瀉如此至明日其目耀然爽明其日又與頭上出血及眥上鼻中皆出血吐時次用通經散二錢舟車丸七十粒自吐却少半又以通經散一錢投之明日又以舟車丸三十粒投之下十八行病更不作

士人趙仲温赴試病兩目赤腫睛翳不能識路大痛不任欲自尋死一日與同儕釋悶坐於茗肆中忽鉤窗脫鉤其下正中温額上髮際裂長三四寸紫血流數升血止目快能通路而歸衆日能辨屋脊次見瓦溝不數日復故此不藥不針誤出血而愈夫出血者乃發

汗之一端也亦偶合出血法耳

一小兒名德孫眼發赤其母買銅碌欲洗兒目煎成家人誤與兒飲之須臾大吐吐訖立開

樓全善男目珠至夜疼連眉棱骨及頭半邊腫痛用黃連膏點之及甚諸藥不效灸厥陰少陽疼隨止半日又作月餘以夏枯草二兩香附二兩甘草四錢爲末每服一錢半清茶調下咽疼減半四五服良愈

一男子所患與前症皆同但黑睛有白翳二點諸藥不效亦以此藥與東垣選奇湯加四物及黃連煎間服并灸厥陰少陽而安

王海藏妻姪女形肥笄年時得目疾每月或二月一發發則紅腫難開如此者三年服除風散熱等劑左目反有頑翳從銳眥遮瞳人右目亦有翳從下而上經云從內走外者少陽病從下上者陽明病此少陽陽明二經有積滯也脈短滑而實鼓晨則似短濇潔古云短爲積滯遏抑臟腑宜下之遂用溫白丸減以川芎附子之二多加龍膽草黃連如東垣五積法從二丸加起每日加一丸如至大利然後減丸二從二丸減起忽一日於利中下黑血塊若干如黑豆大而堅硬從此漸痊而翳盡去 以上三則皆醫學綱目

廬州知縣彭大翰在臨安暴得赤眼後生翳一僧用蘭香子本名羅勒又名香菜又名翳草子洗晒每納一粒入皆內閉目少頃連膜而出也一方為末點之李時珍嘗取子試之水中亦脹大蓋此子得濕即脹故能梁惹眵淚浮膜耳然目中不可著一塵此子可納三五粒亦不妨礙亦一異也本草綱目

張大復云予目初眇有教服三花五子丸者或云緩甚寧益於用乎遂止揚州張斗嶽謂予淮僧某者久眇皆然問之則服三花五子丸也此古本所載耳而修合之法稍異則效不效應焉北歸請以相與予病久且老無事於方然願得之以濟同病者張信士通劍術其言多不妄筆談

張三丰真人治目疾碧雲膏臘月取羯羊膽十餘枚以窯裝滿紙套籠住懸簷下待霜出埽下點之神效即百味花草膏另一製法

兗州朱秀才忽不見物朝夕拜天因夢神傳方用好皷硝一兩銅罌鎔化入飛過黃丹二分片腦二分銅匙急抄入罐內收之每點少許即愈張三丰仙方○本草綱目

宋丞相言黃典史病外障翳夢神傳一方用太陰玄精石陰陽火煅石決明各一兩蕤仁黃連各二兩羊子

肝七个竹刀切晒為末粟米飯丸梧子大每臥時茶
服二十丸服至七日烙頂心以助力一月而愈朱氏集驗
方

魏仝家富母忽然失明王子貞大之曰明年三月一日
有從東來衣青者療之必愈至時候見人一著青綢
襦遂邀為重設飲食其人曰僕不解醫但解作犁耳
為主人作之乃持斧就舍求犁轅見桑曲枝臨井上
遂斫下其母兩眼煥然見物此曲枝葉蓋井之所致
也朝野僉載

王璽集要詩云赤眼之餘醫翳忽生草中鷓不食為名蒟
于鼻內頻頻換三日之間復舊明又傳德原惟機啟
徵方用鷓不食草本名石胡荽晒乾二錢青黛川芎各一
錢為細末噙水一口每以米許嗑入鼻內泪出為度
一方去青黛本草綱目

經驗方治目障翳以熊膽少許淨水略調開盡去筋膜
塵土入冰片一二或淚痒則加生薑汁些少時以銅
筋點之絶奇赤眼用可余家二老婢俱以此效熊膽
善辟塵試之之法淨一器塵其上投膽一粒許則凝
塵豁然而開仝上

朱丹溪治飛絲入目紅腫如眯痛澁不開臭流清涕用

京墨濃磨以新筆塗入目中閉目少時以手張開其
絲自成一塊看在眼白上却用綿輕輕拭出則愈如
未盡再治又飛絲入目中即出神効
又睞目鹽與豉置水中浸之視水其查立出本草綱目
龔子才治一人兩眼角出烟霧此肝火也以柴胡黃連
等分大劑水煎臨臥頻頻服之數劑乃瘥仍宜入血藥為妥
周漢卿治鄉人蔣仲良左目為馬所踶睛突出如桃他
他醫謂係絡已損不可治漢卿封以神膏越三日復
故明史
華州陳明遠醫十年漢卿視之曰可針也為翻睛刮翳

歙然辨五色
上
福建按察使沈文敏其母隨養時雙目失明延一醫療
之云障翳已重藥不能效乃先藥之使不知痛尋以
物撥轉眼睛向內一面向外封閉三日而開視物無
一不見云眼睛惟兩角有筋係之故可撥轉然非削
鼻墜手不能也菽園稗記
京師法雲寺僧律師失明數年夢中有人授一方治內
外障但水神在者皆可療焉二兩蔓菁子枸杞蒺藜
甘菊荊芥穗各一兩當歸地黃川芎赤芍防風各一
兩半十味末之水麪糊丸桐子大空腹食前溫水下

三二十丸僧服之目復明因稱曰夢霖丸元遺山續夷堅志

白彦良壯歲常赤目道人曰但能不赤頭則不病此彦良記之七十餘更無目疾延壽書

有人年八十餘眸子瞠然夜讀蠅頭字云別無服藥但自小不食畜獸肝人以本草羊肝明目疑之余曰羊肝明目性也以食百草故他肝不然畜獸臨宰之時忿氣聚於肝肝主血不宜於目明矣全上

陳坡次女痘後餘毒上攻遂成內障遍試諸藥半月不驗後得老醫一方用蛇脫一具淨洗焙燥又天花粉等分細末之以羊子肝破開入藥在內麻皮縛定用泔水煮熟切食之凡旬餘而愈其後程甥亦用此取效此案已從居易錄入痘門今以其詳細再錄之錄入痘門今移小來

萬密齋治孫撫軍淮海患目疾因患學政時多閱卷而得今每閱文案則眼珠脹痛用八珍湯為主人參茯苓甘草酒洗當歸酒炒白芍酒炒生地去白术以其燥也川芎以其竄也加麥冬五味子柏子仁枣仁黃連減半共十一味孫曰何不用菊花蔓荊子曰凡疾目有外因內因由風熱得之為外因宜發散所謂火鬱則發之也由久視傷血得之為內因宜以養血為主所謂目得血而能視也服十數劑全愈

孫文垣治吳小峯與弟小川俱病目專科治之益甚其目始紅腫次加太陽痛繼以星翳豐出脈之小峯濡緩而大兩目血纏直貫瞳人薄慕則痛虛小川則洪大鼓指黑珠有浮翳瘼隱湮難開大小便皆不利實故於小峯用補先以清肝散與之夏枯草五錢香附四錢甘草一錢五分細茶五分以撮其痛標藥兩進而痛止方法與前樓繼用人參茯苓熟地杞子桂心牛膝破故紙白蒺藜丹皮治本○桂紙蒺藜當歸用於小川用瀉內用瀉肝湯及當歸龍薈丸外用象牙水片等末點之凡點眼藥研須極細七日全愈經云實者正治虛者從治小之症唯厥陰肝火熾盛肝常有餘有餘者瀉之正治也小峯則下虛又為怒所激怒則火起於肝肝為藏血之地故血絲貫瞳人而薄暮作痛故先用清肝散以去其痛再以甘溫補下元之虛俾火得歸原原此從治也若用苦寒降火之劑恐血凝而痛加耳火激而愈熾矣

姪孫眼紅腫脹或以苦寒治時疾之劑與之眼愈腫且增兩太陽痛再加石膏病不減且遍身脹悶寢食俱廢脈之弦大無力乃用蔓荊子桑白皮柴胡香附夏枯草甘草茅茶一帖痛定兩帖腫消四帖全愈

孫氏婦年過四旬眼赤腫太陽痛大便三日不行經水四日未至諸治不效右目內眥突生一白泡垂與鼻齊大二寸餘耑科見而卻走以為奇疾時眩暈不能少動動則嘔吐益劇孫脉之兩寸關俱滑大有力兩尺沉微此中焦有痰肝膽有火為怒所觸而然經云諸風掉眩皆屬於肝諸逆衝上皆屬於火蓋無痰不作暈也卻未然其白泡乃火性急速怒氣加之氣乘於絡上而不下故暴脹垂下也古壯士一怒目眥裂與此理同治當抑肝木鎮痰火先用薑汁益元丸以壓火止吐再以二陳湯加酒連酒芩天麻滑石吳茱竹茹枳實一帖吐止稍能運動仍以二陳湯加芩連之類赤腫消白泡斂縮止而愈

吳東莊治吳綺崖弟患左目連腦痛醫以頭風治之不解初時發寒熱後發壯熱不止呂診之曰火伏於內風燥泉涸木乃折矣非得汗不解也或曰汗須用發表藥獨非風燥乎且發汗藥須擁被悶臥乃得身熱甚若此柰何難缺得呂曰庸醫發汗皆屬強逼故須擁被悶臥然而汗不可得也說破此輩伎倆正是救人苦心今藥非此類雖薄衾蔽體時雨自至豈能消遏哉語久圓活乃用龍腦白朮飲子必遺無疑逞夜分大汗淋漓次日頭目爽然矣

當歸草堂鈔本

龍腦白朮子飲無從考核有謂即趙氏加減逍遥散未知是否原注

吳孚先治一人目痛取竹葉一片刺鼻之迎香穴出血而痊鼻內迎香穴乃手足陽明交經也治法本張子和

王宗蒼目珠紅赤驚悸腸鳴色天不澤左寸浮空右關重尺按無力吳曰此肝腎交虛不能制遊行之火非肺家實火也朝服加味歸脾湯夕服八味丸不一月白珠紅退脈漸沖和矣

楊責亭治一貴人內患障性暴躁時時持鏡自照計日責動數醫不愈召楊診曰公目疾自愈第服藥過多毒已流入左股旦夕間當發毒竊公憂之既去貴人日夕視左股撫摩惟恐其毒發也久之目漸愈而毒不作貴人以楊言不驗名詰之對曰醫者意也公性躁欲速每持鏡自照心之所屬無時不在於目則火上炎目何由愈故說言令公凝神於足則火自降目自愈矣兵行說道惟醫亦然貴人曰良醫也厚禮而遣之（筠齋漫錄通誌載此太署江西）

范武子嘗患目痛就張處度求方處因嘲之曰古方宋陽里子少得其術以授魯東門伯魯東門伯以授左邱明及漢杜子夏鄭康成魏高堂隆晉左太沖凡此諸賢並有目疾相傳此方云用損讀書一滅思慮二

專內視三簡外觀四旦晚起一夜早眠六凡六物熬
以神火下以氣篩蘊於胸中然後納諸方寸修之一
時近能數其目睫遠視尺箠之餘長服不已洞見牆
壁之外非但明目乃亦延年全
上
黃履素曰予少時神氣不足患目每用目少過輒酸澁
無光者累日博考方書多云六味地黃丸可治目予
連服二三料目疾轉甚改用別方補腎養血之藥始
得少愈後讀醫學鉤元有目疾不宜服六味丸辨謂
澤瀉茯苓滲水山茱萸不宜於目山萸味酸肝閉竅於目經云肝病者
毋多食酸凡肝腎病皆
不宜此三味不惟目也言之甚詳以予驗之此論
良是然從今思之目病有屬血虛亦有屬氣虛者予
血固不足氣屬尤虛薛立齋治兩目緊澁不能瞻視
以為元氣下陷用補中益氣湯倍加參耆而愈予悔
往時不多服前湯而專事於補腎養血致久不痊迨
四十後以指麻多服前藥原無意於治目而目亦漸
克始信往時之悞予幼時患風弦爛眼甚受其累百
藥罔效遇一陳姓醫士於長安邸授予白末藥令敷
於眼皆患處隨敷隨愈取效如神不肯傳方予略訪
之云有吐蚘在內吐蚘者小兒口中吐出蚘蟲收乾
候用想其中更有製就蘆甘石配之者眞奇方也按風

木爲病善生蟲爛弦有蟲治以吐蛔乃以蟲殺蟲也凡吐蛔病多由厥陰風木上乘亦肝火爲病故名蛔厥厥者厥陰也今用蛔以治目疾之蟲即經所云衰之以其類也

張三錫治一人病目久不能視涼藥盡試不應診之兩手微弱命服八珍加麥冬一月如舊乃知飲食不運腸胃枯澁髮落皮皺噎膈淋閉等症目昏耳聾悉由氣液血脈榮衛衰少不能升降出入虛火阻滯而然故元府閉濁小火炎上則視昏花隔簾視物之象也丹溪東垣治昏用參耆補養氣血久靡不獲效以氣血旺則元府得利升降清明乃復方古羊肝丸用羊肝引黃連等入肝解肝經諸鬱蓋主目肝肝中鬱解則元府通利而明矣故黃連之類解有餘之火鬱也椒目之類解溼鬱也茺蔚之類解氣鬱也荊防羌芷辛之類解經鬱也磁石之類解頭目鬱墜邪氣使下降也蔓菁下氣通中皆治氣血鬱結目昏有餘之法

一人目赤黑珠傍暗赤成瘡耳中痒作腎氣臟風治用四生散每作二三服即愈時稱爲聖散聖惠方

一人拳毛倒睫用木鼈子一个去殼爲末綿裹塞鼻中左塞右右塞左一二夜其睫自分治法彙

陸肖愚治孫憲副夫人因怒氣患兩目赤痛兩太陽亦痛治及半月赤痛益劇且腫大如桃經行數日不止大便數日不行飲食不進頭眩吐逆脈之左弦右滑上下俱有陽分有餘曰相火寄位于肝膽怒氣觸之

其發如龍雷不可遏折（所用多苦寒非遏折而何）病雖上劇而下緩然實因下而遏於上也用醋炒柴胡青皮吳茱萸炒黃連鹽水炒黃柏酒炒黃芩白芍丹皮青黛竹茹為煎劑以柳青丸合龍薈丸一日夜煎丸各三服遂減大半第大便未行經血未止煎劑仍前以柳青丸合潤字丸投之便行極溢進粥安睡明日諸症俱愈後以清氣養榮湯調理之

一老人年八十四夜能細書詢之云得一奇方每年九月二十三日桑葉洗目一次永絕昏暗（宜五月五日六月六日立冬日採者佳）

倪新溪母陶氏哭子喪明已十一年忽一人踵門曰吾能療瞽時其孫上成均宗黨會錢具在其人曰諸君但少留此視之發囊出針針其目兩眥目頓能見物撫其孫頂曰吾久不覩汝今成人矣新溪德之手百金謝其人不受而去衆以為神（雲間雜誌）

九江有夫毆其婦致雙睛突出適有兵過其門令勿動取手中水浸盛睛旋轉使其系不亂然後納入即以浸巾裹住令三日勿開其婦性急閉二日遂解巾眼好如故但遇風寒常發痛云解早之故也吳誠有設奇疾方（王帶存抄輯）

晉顧含養嫂失明嘗藥視膳不冠不食嫂目疾須用蚺蛇膽含計盡不得有童子以一合授含開乃蚺蛇膽也童子出門化為青鳥而去嫂目遂瘥晉書

王叔龢曰即孰予也中遊學會稽絕早觀書晨牌方食久之患目澁倦游而歸同舍遺以鹽精數次揩目而疾除鹽精且爾則青鹽之治目固也古方用青鹽之揩牙因掬在手洗目而目明鹽精乃鹽倉地下之精英資生經

唐丞相李恭公扈從在蜀中日患眼或澁或生翳膜或即疼痛或見黑花如豆大累數十累不斷或見如飛蟲翅羽百方治之不效僧智深云相公此病緣受風毒夫五臟實則瀉其子虛則補其母母能令子實子能令母虛腎是肝之母今腎受風毒故令肝虛肝虛則目中恍惚五臟亦然脚氣消中消渴諸風等皆由腎虛也此僧深得經旨雖未能暢發所以終是唐人高手諸說紛紛徒亂人意耳

王之用生地黃熟地黃各一觔石　防風皆去蘆枳殼麩炒去穰牛膝酒浸杏仁去皮尖各四兩右爲細末不犯鉄器煉蜜丸如桐子大空心以豆淋酒下五十丸豆淋酒法黑豆半升淨揀簸炒令煙出以酒三斗浸之不用黑豆用此酒煮獨活即是紫湯也

淋酒方見此　百乙方豆

陸景淵之子患爛弦風兩眼皆皆痛淚漬兩頰皆即成瘡百藥不效因理故書得此方試點之須臾藥淚俱下循瘡中流出其間有小蟲自此遂愈甚妙連一兩淡竹葉一兩柏樹皮乾用一兩半濕用二兩右三味㕮咀以水二升煎至五合稍冷用滴目兩眥及洗爛處日三四用（仝上）

咒偷針眼已結赤腫未成膿者神驗取患人衣衫角以手緊撚定於所患眼如此一氣念七遍大眥上搵之每一搵即念一聲移其底移搬眼如此一氣念七遍搵七遍訖即隨身就手撚令緊打一結結定自然便退直候眼安方解切在志誠不須令病人知語咒或欲自咒自移亦甚可（仝上）

朱丹溪治一人病眼至春夏便發當作鬱治用黃芩（酒浸）南星（薑製）香附蒼朮（俱童便浸）連翹各二錢山巵（炒一兩）川芎（童便浸一兩半）陳皮（酒浸）草龍膽（酒蒸）蘿蔔子青黛（各半兩）柴胡（三錢）為末神麯糊丸服之旬月而愈（治法）

華川陳明遠患瞽十齡百藥屢嘗而不見效自分為殘人松陽周漢卿視之曰是翳雖在內尚可治用針從眥入精眥捲其翳下之目欻然辨五色陳以為神（續文粹）

趙良仁云丹溪先生嘗用參膏治一老人目暴不明昏暗如夜正乃露樞謂氣脫者目不明是也余亦曾治一人士患頭風連左目壅痛從戴人法於百會上星出血皆不效遂在頭偏左之足太陽所過第二行與上星對平按之痛甚處出血立愈由是而言針之與藥必切中病所藥與邪對然後可愈蓋前人之方不過立規矩耳藥要或問

繆仲淳從父病後眼花服此立愈蓋肝膽兩經虛也真甘枸杞一斛去蒂真懷生地黃一斛極肥大者酒洗淨河水炒鍋內熬膏以無味為度去查重湯煮滴水成珠便成膏也每膏一斛入煉蜜六兩空心白湯化下廣筆記

黃學諭潛白患風淚眼每出則流淚盈頰繆仲淳疏一方寄之穀精草為君蒺藜蓁和枸杞之屬佐之羊肝為丸不終劑愈全上

薛立齋治一男子眼赤痒痛時或羞明下淚耳內作痒服諸藥不效氣血日虛飲食日減而痒愈盛此肝腎風熱上攻也以四生散白附子黃耆獨活沙苑蒺藜酒調四服而愈又一人頭目昏眩皮膚搔癢搔破成瘡以八風散治之亦愈

立齋曰世傳眼胬初生小胞視其胬上即有細紅點如

瘡以針刺破眼時即瘥故名偷針實解太陽經結熱
此人每試之有驗
張子顏少卿晚年常目光閃閃然中有白衣人如佛相
者顏子信之彌謹乃不食肉不飲酒然體瘡而多病
矣一日從汪壽卿求診卿一見大驚不復言但投以
大丸數十小丸千餘粒囑曰此十日內服之當盡却
以示報既如期視所見白衣人變黃而光無所見矣
乃欲得肉食又思飲酒又明日黃亦不見覺氣象異
他日矣乃詣壽卿以告卿曰吾固知矣公脾初受病
爲肺所乘心脾之母也公既多疑心氣不固自然有

所覩吾以大丸實其脾小丸補其心肺為脾之子既
不能勝其母而病自愈矣 道山清話

沈存中云予為河北察訪使時病目赤四千餘日黑睛
傍黯赤成瘡晝夜作楚百治不效即官邸革相見問
予病目如此曾耳中痒否若耳中痒即是腎家風有
四生散療腎風每作二三服即瘥閭里號為聖散子
予傳其方合服之午時一服臨臥一服目反大痛至
二更乃能眠及覺目赤稍散不復痛矣更進三四服
遂平安如舊是時孫和甫學士帥鎮陽聞予說大喜
曰吾固知所以治目矣向久病目嘗見呂吉甫參政

曰頃目病久不差服透水丹乃瘥如其言修合一劑
試服了二三十服目遂愈乃知透水丹亦可以療瞽
風耳

聾子才治一人兩目作痛服降火祛風之藥兩日如綁
孰倦殊甚用十全大補湯數劑諸症悉退後服補中
一人目赤不瞤服祛風散熱藥反畏明重聽脈大而虛
此因勞心過度飲食失節以補中益氣湯加茯神棗
仁山藥五味頓愈又勞役復甚用十全大補兼前藥
而瘥

前日與歐陽叔弼晁無咎張文潛同在戚壇予病目昏
將以熱水洗之文潛曰目忌熱洗目有病當存之醫
有病當勞之不可同也又記魯直語云治目當如治
民治齒當如治軍治軍當參之治齊治軍當如曹參之
商鞅之治秦頗有理故追錄之東坡志林

相公崔公慎由蕪察浙西左目瞖生贅如息肉欲藏瞳
人視物極礙諸醫方無驗譚簡見曰此立可去但能
安神不撓獨斷于中則必效矣崔公曰如約雖妻子
心不使知譚又曰須用九日晴明亭午於靜廳之處
若其日果能遂心無憂矣是時月初也至六七日間
忽陰雨日甚譚生極有憂色至八九大開霽問崔公

飲酒多少崔公曰戶雖至小亦可引滿譚大喜是日
于使宅北樓請飲酒數杯端坐無思俄而譚以手微
捫所患曰殊小事耳初覺似挼之雖痛亦忍又聞動
剪刀聲乃白崔曰此地稍暗請移往中庭坐既定聞
欻然有聲先是譚請好綿數兩染絳至是以絳綿拭
病處兼傳以藥遂不甚痛請開眼看所贅肉大如小
指堅如乾筋遂命投之江中後數日詔徵入秉鈞 因話錄唐
趙璘

金封翁年近七旬病暈厥即類風也小愈後眼花不良
于步或教以一味白蒺藜水法爲丸每早晚服四錢
既可祛風又能明目且價廉而工省纔服數日覺口
咽苦燥再服遂健然失明重以鬱怒暈厥復作目閉
不語汗出如珠延診服已散亂姑以熟地二兩杞子
一兩煎服一時醫至不敢主方欲就申加附子一錢
謂重劑純陰宜少入陽藥余曰此症外間多用參附
湯有致筋枯皮黑人未死而半身先死者以衰微之
陰被刼也今症屬三陰虧五志之火上炎故卒然
暈厥且病人以誤服白蒺藜之燥失明而病作寧可
再服附子耶乃默然去二味服下神氣漸甦乃減半
入沙參麥冬沙苑蒺藜而愈令常服之兩年許能辨

磁罌花色矣後復更醫不知何病而卒

盧玉川年六旬外久病脇痛凡一切香竄古方莫不遍嘗後一醫與丸方以胡盧巴為君餘多代肝之品服之脇痛果暫愈既而一日失明猶不謂藥之誤也再服則兩目俱損近脇痛轉甚延診以大劑生熟地杞子女貞沙參麥冬蔓仁與之一服即愈悟始向藥之非然目中黑水神光枯竭已久不能復矣

一人年二十左右求診無他病唯日入則兩目無所見此即諺語所謂雀盲是也其脈唯左關大左尺極微語之曰君得毋得新婚乎曰然與生地杞子牛膝甘菊沙參麥冬女貞四劑而愈因戒其房幃撙節否則再發成廢人矣

方懋德內人患瘧荊防二味為時師治瘧所不可缺者服四劑不慮其芳香燥烈竟能致兩目赤腫眵淚成障也已逾月漸次失明診之兩寸上溢且弦數令以前方加當歸白芍數服而愈其姪亦同此患時已瞳人迸出不及藥矣

耳

許叔微治一男子年二十歲因瘡毒後腎經熱右耳聽

事不真每心中拂意則覺轉重虛鳴鳴疼痛地黃湯
生地枳殼羌活桑白皮磁石甘草防風黃芩木通石
爲粗末每服四錢水煎日二三服不拘時候網目
朱丹溪治馮官人左耳鳴此勞得之法當補陰而鎮墜
之黃耆人參當歸陳皮茯苓升麻酒柏防風甘草白
芍食前熱服飲了去眠一覺仝其方則似補氣而升
上舉之非補陰鎮墜也
薛立齋治一人耳內不時作痛痛時欲死痛止如故六
脈皆安非瘡也詰閔忽作度其有蟲令即取猫尿滴
耳果出一臭蟲遂不復痛或用麻油滴之則蟲死難
出或用妙芝麻枕之蟲亦出但不及猫尿之速也取猫

尿法用生薑擦猫鼻其尿自出

疳門

趙養葵治小兒患耳膿醫以藥治之經年累月無效殊
不知此腎疳也用六味丸加桑螵蛸服之而愈或入小兒
吳孚先治張司馬素有火症兩耳腫痛係少陽風熱勸
延針灸科剌聽會合谷臨泣尋愈
柴嶼青治汪謹堂夫人兩耳蟬鳴昕夕不歇服過人參
熟地數兩無少效柴曰腎開竅於耳心亦寄竅於耳
治耳必責之腎固矣但診得兩寸尚屬有神決非腎
虛左寸亦平緩無病惟右寸關洪大此肺胃兩部風

熱所壅而致遂不治病而治脈用清解之劑不數服而右耳已愈再服數劑兩耳全愈因思耳目口鼻雖於五臟各有分屬而內實相通治病惟以切脈爲憑夫固有治在此而效在彼者全在一心之圓機活法也

李元淳尚書在河陽日蚰蜒入耳無計可為腦悶有聲至以頭擊門柱奏狀危困御醫療之不驗忽有人獻方用胡麻油作餅枕臥須臾自出乃愈圖經。本草綱目

江湖紀聞云有人壁虱蟲入耳頭痛不可忍百藥不效用稻稈灰煎汁灌入即死而出也又萬苣搗汁滴入亦能出百蟲入耳本草綱目

薛立齋治一婦人耳內或耳後頂側作痛寒熱口苦月經不調此肝膽經火兼傷脾胃用四君加柴胡升麻黃耆白芍而愈後因勞役怒氣嘔吐脇脹用六君子湯加山屐柴胡而安

一婦人耳內外腫痛胸脇不利寒熱往來小便不調此肝火傷血先用龍膽瀉肝湯四劑諸症頓退又用加味逍遙散而愈又因怒復作用小柴胡湯而痊

一婦人經行後因勞怒發寒熱耳作痛以經行為血虛用八珍湯加柴胡怒氣為肝火用加味逍遙散勞役

為氣傷用補中益氣湯加山卮而愈

一婦人素鬱怒耳內作痛腫燉寒熱面色青黃經行則變赤用加味歸脾湯加味逍遙散而愈

一婦人懷抱素鬱因怒耳作痛耳腫經行不止寒熱發熱面色青赤肝脈弦數此久鬱傷脾暴怒傷肝先用加味小柴胡湯隨用加味逍遙散而痊

一婦人因怒發熱每經行兩耳出膿兩太陽作痛胃脇乳房脹痛或寒熱往來或小便頻數或小腹脹悶皆屬肝火血虛先用龍膽瀉肝湯二劑又用加味逍遙散數劑諸症悉退乃以補中益氣而痊

一婦人耳內腫痛出水寒熱口苦嘅連頸項飲食少思此肝火甚也用小柴胡湯加山卮丹皮稍愈用加味逍遙散漸愈用八珍湯加柴胡丹皮山卮調補肝脾全愈

一婦人耳內腫痛胸脇不利寒熱往來小便不調此肝經濕熱也用龍膽瀉肝湯四劑諸症頓退用加味逍遙散而愈全又因怒復作用柴胡清肝散而痊

一婦人耳內不時脹痛內熱口肝乾勞則頭暈吐痰下帶此肝脾氣虛也朝用補中益氣夕用加味逍遙散而痊

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

一婦耳內外作痛不時寒熱軀上魚際此血盛之際用小柴胡加生地以抑其血而愈又項間結核如貫珠寒熱晡熱用加味歸脾湯加味逍遙散調補肝脾而愈

一婦人耳內外或作痛或赤腫或寒熱月經旬日而止潮熱內熱自汗盜汗此肝脾氣血俱虛而有熱用歸脾湯六味丸而愈

一婦人性急或耳內作痛或耳外赤腫發熱脇脹日晡益甚此怒氣傷肝氣血俱虛朝用加味逍遙散加黃柏桔梗夕用歸脾湯送地黃丸而愈

一孀婦耳內外作痛或項側結核內熱晡熱月經不調吐痰少食胸膈不利此鬱怒傷肝朝用歸脾湯以解脾鬱生脾氣夕用加味逍遙散以清肝火生血肝而愈

一女子耳下腫赤寒熱口苦月經不調小腹內結一塊此肝火氣滯而血凝也先用小柴胡加山甲川芎丹皮又用柴胡清肝散而愈

一婦人耳下腫痛發寒熱與荊防敗毒散四劑表症悉退以散腫潰堅湯數劑腫消大半再以神效瓜蔞散四劑而平

鼻

一男子肝經風熱耳下腫痛發瘰脈浮數以薄荷丹治之而愈薄荷皂角連翹三稜首烏蔓荊豆豉荊芥

一男子每怒耳下腫痛發熱作以小柴胡湯加青皮木香紅花桃仁四劑而愈

一婦人耳鳴內熱經行不調肢體倦怠飲食無味以爲肝脾虛熱用四君柴胡山茄丹皮甘草而愈

一男子耳內出膿或痛或癢服聰耳益氣湯不應服防風通聖散愈甚以補腎丸治之而愈

予叔病疽三年矣百藥不效令予檢方圖書集成得一方用雄黃研細和豬脂飯上蒸臨臥時點入鼻中次早疽癒而愈亦神矣哉記

張子和治常明仲嘗於炎暑時風快處披露肌風爲風所賊三日鼻窒雖坐於暖處少通終不大解使服通聖散入生薑葱根豆豉同煎三兩服大發汗鼻立通○此由傷風而得矣宜入傷風有人鼻中有瘜肉垂出鼻外不聞香臭用瓜蒂細辛等分爲細末以臙色好如豆許塞鼻中須臾鼻即通瘜肉化爲黃水點滴至盡三四日又聖惠方用陳瓜蒂以羊脂和傳上日三四效（醫學綱目百九方）

薛立齋治一男子面白鼻流清涕不聞香臭三年矣此氣虛也用補中益氣湯加山茄麥冬而愈

陳都憲夫人患鼻疳爛通鼻孔用鹿角一兩白礬一兩
瓦上煆過人頭髮五錢燈火上燒過為末用花椒湯
洗淨糝藥疳上四五次即愈如不收口瓦松燒灰存
性研末乾糝之即收

一人酒齄鼻紅赤用金花丸晚服茶連皂柏大黃桔梗
用六味地黃丸全料加當歸兩苦參四兩空心服不
兩月而愈

孫文垣治吳儀制尚卿弱冠時病鼻塞不能歙者四年
且畏寒月更甚口渴咽喉邊疫核脈之右寸關洪滑
此肺經痰火症也與前胡秦艽葛根薄荷石膏天花
粉元參貝母山皀甘草白藥子桔梗丹皮四帖而畏
止夜與牛黃三清丸數粒噙之鼻氣即通利能嗅噙
未旬日全愈

一婦人方妙齡表虛易感風寒致成鼻淵流清涕不止
便覺頭暈兩太陽常痛耳多噴嚏脈之兩寸洪大用
秦艽酒芩桑白皮馬兜鈴各八分白芍一錢滑石石
膏各二錢枳殼蔓荊子各五分甘草三分四帖而愈

病鼻赤者乃陽明胃經火上攻一方只食鹽一味研細
每晨起撮少許擦齒噙水蕩漱旋吐掌中擩以洗面
行之月餘而鼻色復舊且有益于齒鮓
說

吳孚先治一人患鼻淵十載乃脾肺氣虛下陷須用補中益氣湯百劑方愈不信用白芷防風川芎辛夷等味病轉甚復求與前方百帖而瘥

丹溪治一中年人右鼻管流濁且臭脈弦小右寸滑左寸濇灸上星三里合谷次以酒芩二兩蒼耳半夏各一兩辛夷川芎白芷石膏人參葛根各半兩分七帖服之全愈乃痰鬱火熱之症也大還

一人鼻中流臭黃水腦亦痛名控腦沙有蟲食腦中用絲瓜籐近根三五尺許燒存性為細末酒調服即愈又灸法顬會在鼻中直上入髮際一寸兩旁各一容豆是穴通天在顬會穴一寸兩旁各一

寸灸七壯隨臭左右灸常見灸後去臭肉一塊從鼻中出臭不可言而愈

有人卒食物後鼻中縮入腦中介介痛不得出以牛脂或羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸入須臾脂消物逐脂出也治法

孫文垣治從姪中叔以暑月赴南雍一日假出索茶飲之趣從左鼻通流而出入腹者十之三治幾一月即粥飯亦多鼻出矣再藥漸加惡心頭暈肌削四支無力診畢詢醫作何症投何劑曰僉謂此疾書所不載治法無稽或云胃火或云諸逆上衝皆屬于火所用

非黃連解毒即三黃石膏及諸苦寒之劑自以多飲火因酒動理或為然然竟無效曰治病貴辨經絡之貫通與臟腑之出納豈拘拘徒守方書而已哉經云咽喉者水穀之道路氣之所以上下者也頑鼽者分氣之所洩也人之涕出不收者頑鼽不開也此症亦類是耳頑鼽不開故氣上而不下會厭弱而不能捺其氣喉夫鼻與氣喉相通惟不捺故飲食遂從鼻竅而出不見常人偶氣逆則飲食從噴嚏乎今右脈緩弱無力氣虛明矣是病蓋因暑熱傷氣而成初只生脈散一劑可愈經云形寒飲冷則傷肺脾胃喜温而惡寒因多服寒涼所以惡心頭暈肌消也蓋肺屬金而主氣金氣旺則收斂下降氣下降則飲食自不逆矣以六君子湯加辛夷桑白皮苡仁沉香一進而勢緩三進而止大半七劑全安

王執中母氏久病鼻乾有冷氣問諸醫醫者亦不曉但云病去自愈既而病去亦不愈也後因絕骨灸而漸愈執中亦嘗患此偶絕骨微疼而著艾乾亦失去初不知是灸絕骨之力後閱金千方有此症始知鼻乾之去因絕骨也若鼻涕多宜灸顖會前頂大人小兒之病初無異焉

許知可自停飲食已必噦服棗膏丸而愈本事方

孫氏姑鼻不聞香臭有年矣後因他病友人繆仲淳爲處方每服用桑皮至七八錢服久而鼻塞忽然通矣

入來選

鼻淵

沈晉培年三十許患鼻淵黃濁如膿時醫以爲風熱上淫于腦與薄荷芎藭辛夷川芎蒼耳白芷蔓荊古方治之不效反增左邊頭痛所下涕亦唯左鼻多就診曰此肝火上炎爲病耳與生熟地杞子沙參麥冬十餘劑而愈是症由傷風用力去涕而得者易愈若因火盛而成必由水虧而致蓋肝脈上絡顛頂與督脈會腦爲髓海爲龍雷之窟蒸故濃濁腥羶源源而下有若淵然久之督脈之髓亦隨輸泄致成勞損者有之醫學自立齋以前宋元明初諸公未詳肝腎之治至 國朝諸老亦漸講明然多雜耆朮桂附惟集露膏一方最善治法彙載之但云吳中一醫用之所向神效是亦知其然而未知其所以然也故守兎園一冊其覆餗多矣

一瞽者徐姓年三十來鼻淵年餘醫亦與辛散服之覺反甚遂堅守不藥之戒此瞽人心靜自能消息病情

故不為庸手所誤後遇予服教集霧膏十餘帖而愈
一費氏年二十餘亦患此時師與辛夷蒼耳芎芷荊
薄之屬至百二十劑後就診于予兩手脈神氣索然
告以不可治矣果月餘而歿

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

錢塘魏之琇玉橫撰

口

張子和治相臺監酒岳成之病瘧滑泄日夜不止腸鳴而口瘡俗呼爲心勞口瘡三年不愈令以長流水同薑棗煎五苓散五七錢空心使服之以治其下以宣黃連與白茯苓去皮二味各等分爲末以白麪糊爲丸食後温水下三五十丸以治其上百日而愈作濕火治

版權所有 國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一男子病口瘡數年至上口中至咽嗌下至胃脘皆痛不敢食熱物一涌一泄一汗去其九次服黃連解毒湯不旬日皆釋作實火治

一男子年二十餘病口中氣出臭如發廁雖親戚莫肯與對語張曰肺金本主腥爲金爲火所煉火主焦臭故如是也久則成腐腐者腎也此極熱則反黑化水也病在上宜涌之先以茶調散涌之去其七分夜用舟車丸濬川散下五七行比旦而臭斷鴟呼人有病口臭而終其老者世說以爲肺系偏而與胃相通故臭妄論也

立齋治廷評曲濟爲口內如無皮狀或咽喉作痛喜熱飲食此中氣真寒而外虛熱也用加減八味丸而愈虛寒

一人胃弱痰盛口舌生瘡被服滾痰丸愈甚反瀉不止惡食倦怠此胃氣被傷也與香砂六君子湯數劑少可再以補中益氣湯加半夏茯苓而愈

立齋治一男子口臭牙齦赤爛腿膝痿軟或用黃柏等藥益甚時或口鹹此腎經虛熱以六味丸悉愈虛熱

孫文垣治汪東之手談過勞口中生瘡凡進大苦大寒之劑十餘日瘡益甚延及於喉藥食難進脈之六部

俱豁大無力有當利敷口瘡藥令以荊芥湯洗而引之攪出稠涎一二碗傾於地偶二雞爭啄之立斃其毒如此亦症之奇者當是荊芥爲雞所忌耳乃嘱其用藥只可吹入喉中必俟喉全好然後敷舌好再敷口唇毋得槩敷令毒無出路反攻入喉則誤事矣謂其父曰此虛陽口瘡也非附子理中湯不可救曰瘡乃熱症況上身已熱又天時酷暑大熱之劑其敢進乎曰此陰盛格陽之症悞服寒凉激之試探兩足必冷果然遂與人參白朮各三錢大附子炮薑炙甘草各一錢水煎冷服服後即酣睡達旦次早能食粥半盞足膝漸暖藥仍如舊適散步午歸見舉家號慟曰本熱痛誤服熱藥今舌腫大塞滿口中不能言語不可為矣駭其驟變再診之則六脈數而有神面色亦和獨舌脹大心知爲寒涼數藥所致也乃詰之曰今日可用敷藥否曰已二次矣令急取官桂研末五錢以生薑自然汁調塗舌上塗訖則涕淚流出口內涎垂舌頽消去即令取粥與食使壓之庶虛火不再升蓋舌脹滿者乃數藥寒涼閉其毒氣毒無從出故耳以桂調薑汁塗之辛散之義也

黃師文父病口瘡師文治之不愈心訝之乃密訪諸婢

果其父嘗晝同一婢子寢明日創作詩文師即詳其
時節明日即用其父所寢時令其父淨濯足以某
藥貼腳心瘡不外吳茱萸　北窗炙輭生附子等藥
盧不遠治李某口舌生瘡幾三年矣脈浮細急數按之
空虛而尺尤甚用立齋虛火不歸經法以加減八味
丸料二劑即愈
柴嶼青治吳顏庵少廷尉甥年三十口舌生瘡下部
泄瀉脈尺弱而無力寸關鬆大此陰盛於下逼陽于
上若用涼藥清火則有礙於脾用燥藥治脾則有礙
於舌惟有引火歸源之法竟用附子理中湯冷飲送八

味丸三錢兩服頓愈
光祿卿李瀚少夫患口瘡醫屢投清火寒涼之劑無
效更無泄瀉飲食少思始求治按其右關微弱知係
胃虛穀少復爲寒涼損傷致脾胃虛衰之火被逼上
炎則爲口瘡元藏虛寒則爲泄瀉也惟補其火散其
寒則火得所助接引而退舍矣方用人參白朮附子
炮薑炙甘草李君畏不敢與服逾巡數日勢益困勉
用前方連進數劑即安蓋口瘡非止一端有上焦實
熱中焦虛寒下焦陰火各經傳變所致必須分別治
之不可執也

陸養愚治姚明水天稟素弱脾腎兩虛幸能節養蕈服温補之劑中年頗健啖無因子置妾遂患口舌齒痛初以涼膈散數錢服之即愈自後常發常服至半年許滿口爛腐飲食少進軀之兩寸浮數而微關尺沈弱而澁謂形雖有餘精仍不足當嚴守禁忌服滋補藥涼劑不可再投矣用八物湯倍地黃以峻補腎水加桂附各一分引火歸原經謂折之不去求其屬以衰之是也煎就涼服十劑其患如失

薛立齋治儒者劉允功形體魁偉冬日飲水自喜壯實薛曰此陰虛也不信一日口舌生瘡或用寒涼之劑肢體倦怠發熱惡寒乃與六味地黃補中益氣而愈王肯堂始常熱嚴養節相公春高而求助于厚味補藥以致胃火久而益熾服清散不散加山梔苓連而益甚以爲涼之非也疑其當補聞王善用人參因延診而決之纔及門則口中穢氣達于四室向之欲嘔此正清胃散症也獨其熱甚當用從治而既失之今且欲從而不可矣當求其屬而衰之用天冬麥冬生地熟地石斛升麻犀角藍香之類大劑投之數日而具已止矣經云諸病寒之而熱者取之陰所謂求其屬也火衰于戌故峻補其陰而熱自已後因不屏肉食

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

胃火復作大便不利目翳耳鳴不能自忍雜進寒涼時或利之遂致不起嗟乎苟知其熱涼之而已則塗之人皆可以爲盧扁何事醫乎醫岡齋筆麈

邑侯許少微患口糜王謂非乾薑不能愈許猶疑之後竟從王言而愈從子懋錄亦患此甚危急熱甚惟欲飲冷水王用人參白朮乾薑各二錢茯苓甘草一錢煎成冷服日數服乃愈噫此豈可與拘方者道也

口瘡無論新舊遇夜臥時將自己兩睪丸以手握緊左右以手揉之三五十遍每夜睡覺輒行之愈於服藥

蘇談

立齋治一男子口舌生瘡飲食不甘勞而愈甚亦與前湯頓愈

又一男子口舌生瘡飲食不甘勞而愈甚亦與前湯頓愈

一男子口舌糜爛服涼藥愈甚脈數而無力以四物加酒炒知柏元參一劑頓退四劑而痊

一男子口舌生瘡脈浮而緩飲補中益氣湯加炮薑更以桂末含之即愈

一男子患之勞而愈甚以前藥加附子三片二劑即愈

丹溪云口瘡服涼藥不愈者此中焦氣不足虛火泛

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

上無制用理中湯甚則加附子

一婦人常口舌糜爛頰赤唇乾眼瘡作渴脈數按之則濇此心肺壅熱傷于氣血爲患名熱勞症也當多服滋陰養血藥彼欲速效用敗毒寒劑攻之後變瘵症而歿婦人良方云婦人熱勞者由心肺壅熱傷于氣血氣血不調臟腑壅滯熱毒內積不得通之所致也其候心神煩躁頰赤頭痛眼赤瘡昏乾四肢壯熱煩渴不止口舌生瘡神思沈昏嗜臥少寐飲食無味舉體瘦瘁或時心怔或時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也

焦秀才病口苦羅謙父制袁龍膽瀉肝湯治之得效內經云有病口苦名曰膽癉乃肝主謀慮膽主決斷盛汁三合爲清淨之府肝取決於胆胆或不決爲之恚怒怒則氣逆膽汁上溢故口苦或熱盛使然也實鑑

羅謙甫治梁濟民膏粱多飲因勞心過度肺金有傷以致氣出腥臭涕唾稠黏咽嗌不利口舌乾燥以加減瀉白湯散主之難經云心主五臭入肺爲腥臭此其一也因大飲大熱之際氣所傷從心火刑於肺金以桑皮地骨皮苦微寒降肺中伏火而補氣爲君以黃芩知母苦寒治氣腥臭清利肺氣爲臣肺欲收急食

酸以收之五味子酸溫以收肺氣麥冬甘寒治涕唾稠黏口苦乾燥爲佐桔梗辛溫體輕浮治痰逆利咽膈爲使服數劑而愈

唇

李大富而極鄙吝唇生肉贅一尺長痛不可忍或云用刀或云用藥鄰有金先生者曰我能治須講定謝金方醫衆親友講以十兩為謝金用末藥一匕鑪中燒烟熏之即落去一寸袖手索謝李先付一兩五日已好及請完前約乃堅不與矣金笑曰適知其然也明年必發即百金不用藥後果發遂死焉扁鵲謂重財者為六不治之一 續金陵瑣事

晉魏詠之生而兎缺有善相者謂之曰卿當富貴年十八聞荊州刺史殷仲堪帳下有名醫能療之貧無行裝謂家人曰殘醜如此用活何爲遂齎數斛米西上以投仲堪既至造門自通仲堪與語嘉其盛意召醫視之醫曰可割而補之但須百日進粥不得笑語詠之曰半生不語而有半生亦當療之況百日耶仲堪於是處之別室令醫善療之遂閉口不語惟食薄粥百日而瘥槎庵小乘

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

薛立齋治一婦人懷抱久鬱患瘰癧治消痰降火虛症悉具盜汗如雨此氣血虛而有熱也用當歸六黃湯內黃芩連柏俱炒黑二劑而盜汗頓止仍用歸脾湯八珍散參服元氣漸復更以逍遙散加歸脾湯加

間服百餘劑唇亦瘥

一婦人唇裂內熱二年矣每作服寒涼之劑時出血水益增他症此胃火傷血而藥傷元氣也用加味清胃散而愈後因怒唇口腫脹寒熱作嘔此屬肝木乘脾土用小柴胡加山巵茯苓桔梗諸症頓愈以加味逍遙散調補元氣而愈

一婦人生育多胎月經不調兩足發熱至年餘而身亦熱勞則足腿痠疼又年餘唇腫裂痛又半年唇裂出血形體瘦倦飲食無味月水不通唇下腫如黑棗此肝脾血虛火症也彼不信用通經藥而歿

一婦人忿怒而唇腫或用消毒之藥唇脹出血年餘矣此肝木剋脾土而血傷也須養脾胃滋化源爲主彼執用前藥反追蝕狀如翻花瘤而歿

一婦人懷抱久鬱或時胃口嘈辣胸膈不利月水不調晡熱食少體倦唇腫已年餘矣此脾經鬱火傷血用歸脾湯加薑汁炒黃連山巵少佐吳茱萸嘈辣頓去

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

飲食少進乃去黃連加貝母遠志胸膈通利飲食如常又用加味逍遙散歸脾湯間服百餘劑月水調而唇腫愈

州守劉克新患齦唇時出血水內熱口乾吐痰體瘦腎虛之症惡具用濟陰地黃丸年許而愈

一儒者因勞役感暑唇生瘡或用四物湯加知柏之類而愈後復作彼仍用前藥益甚腹中陰冷乃用補中益氣湯加茯苓半夏治之而愈

一男子素善怒唇腫脹服清胃等藥時出血水形體骨立用補中益氣湯加半夏茯苓桔梗甘草數劑而痊

元氣漸復又以四物加柴胡妙厄丹皮丹麻甘草數劑乃去疱加參朮而痊

一男子內熱作渴咳唾疲涎大便乾濇自喜壯實此脾腎陰虧膀胱陽旺之症當壯水之主不信自服二陳芩連之類次年下唇漸腫小便赤濇執守前藥唇出血水大便黑塊小便淋瀝再求治曰大便結黑小便淋瀝肝腎敗也唇口腫白脾氣敗也辭不赴竟歿

齒

元亨在聖中結道友登嶽頂至明星館故址得斷碑數

行彷彿有古文洗滌之得歌一首曰猪牙皂角及西生薑西國外麻蜀地黃木律旱蓮梳角子細辛荷葉要相當青鹽等分同燒煆研細將來使最良揩齒固牙髭髮黑誰知世上有仙方荷葉下注云剪荷葉心子也因錄以歸朝之名卿巨公皆依之修用其效譽

應皇朝類苑

朱端章云余被檄任淮西幕府時牙痛大作一刀鑷人以草藥一撚湯泡少時以手蘸湯挹痛處即定因求其方用之治人多效乃皺面地菘草也俗人訛爲地蔥沈存中筆談專辨地菘其子名鶴虱正此物也錢

季誠方用鶴虱一枚擺置齒中高監方以鶴虱煎水醋漱口或用防風鶴虱煎水嗽漱乃研草塞痛處皆有效本草綱目

周密志雅堂雜抄治齒痛腫云用黑豆以酒煮汁漱之立愈王修竹云其閤中嘗用驗

仙人鄭思遠常騎虎故人許隱齒痛求治鄭曰虎鬚及熱揷齒間即愈拔數莖與之醫說

澤卅李繼之忽病牙痛皺眉不語欒景先見之曰何不藥也曰牙痛藥曰曾記載人云陽明經熱有餘也宜大下之乃付車丹丸七十粒服畢遇數知交留飲強

飲熱酒數盃藥爲熱所酒發盡吐之吐畢而痛止李大笑曰戴人神仙也不三五日又痛再服前藥百餘粒大下數行乃愈儒門事親

姚應鳳視一人唇有紅痣無他病苦謂之曰此蓋齒也三年必死其人怒不應三年齒潰詣求救謝曰君天譴也不能過期矣果歿錢塘縣志

龔子才治一人齒浮作痛耳面黧色口乾作渴日晡則劇此脾虛弱也用補中益氣湯加減八味丸而痊

一男子每作足發熱牙即浮腫此足三陰虛大用加減八味丸而不復作

李小園患滿口牙齒疼痛潰爛動搖飲食不下乃牙疳也諸醫不效忽遇道人傳一方用川椒炒一錢五分銅青一錢硼砂一錢三味爲末每少許擦患處流涎立瘥

易思蘭治一人患齒病每有房勞齒即俱長痛不可忍涼湯涼水俱不得入凡有惱怒痛亦如之十年前尚輕十年後殊甚每發必三五日呻吟極楚竟絕慾服補腎丸清胃飲俱不效一日疾作七日不飲食診其脈上二部俱得本體惟二尺洪大數有力此腎經火邪太盛也以滋腎陰飲之劑且漱且嚥下二盞隨覺

丹田熱氣上升自咽而出復進二盞其痛頓止齒即可叩永不再作其方黃柏三錢青鹽一錢升麻一錢水五椀煎湯頻頻漱之嚥下

呂東莊治許開壑病齒上齦從耳根痛起便苦楚不可耐醫用平胃降火藥日增劇診之關滯而尺衰授方以熟地爲君杜仲枸杞女貞甘草黃柏山藥山萸爲佐其尊人青臣舉以問醫曰此方何如醫云大謬不可服問其謬狀曰齒病爲陽明之火與腎何干而俱用補藥耶(腎)青臣曰果爾則吾知此方之妙矣乃更邀往視呂曰病見於上而治當從下起此有步驟不可責速效也仍用前藥數劑繼用人參白朮茯苓甘草白芍遠志棗仁當歸白芍黃耆丹皮數劑痛已減而未去也診其兩尺已應右關以上皆平和惟左關尚鬱塞曰今當爲君立除之遂用補中益氣湯加龍胆草即愈後小發復加減前方愈之因囑之曰此雖小疾而其根在下當謹調攝毋使頻發也

孫文垣治昆池內人患牙痛一晚暈厥三次次日兩腮紅腫痛不可支且洒淅惡寒寢食以廢與清胃湯加石膏爲君白芷爲臣連翹爲佐北細辛爲使服之痛如失外以明礬爲末大五倍子一枚入礬滿之炭火

炙以礬紅枯為末不時擦牙痛處立止此方多效

孫襄齋因食鷄嚼骨迸碎其齒出血至暈自後遇雞鳴時輒痛不可忍餘時則否凡燕會遇雞湯羹則痛發即不染指痛亦然如是數年其家禁不畜雞親舊欲招之者必先戒厨人弗用也後有人教食苗鼠狼家人乃設法捕得一頭烹而進又之猶以其物異心惡強飲湯數呷爾後遇鷄輒咬如常了無所苦矣新紫

又潞公方治牙齒風熱上攻腫痛獨活地黃各三兩為末每服三錢水一盞煎和滓温服卧時再用本草

薛立齋治毛宗伯齒痛胃脘無力用補中益氣加生地丹皮治之而愈

楊考功齒動作渴屬脾胃虛弱陰火熾甚用補中益氣加妙黑黃柏四劑又服加減八味丸諸症頓愈

王侍御齒搖齦露喜冷飲食此胃經溼熱先用承氣湯以退其火又用清胃散以調理而齒固繼用六味丸以補腎而痊

一男子晡熱内熱牙痛齦潰常取小蟲此足三陰虛火足陽明經溼熱先用桃仁承氣湯二劑又用六味丸而愈

茯苓石膏龍骨各一兩寒水石二兩半白芷半兩石燕

子大者一枚小者一雙末之早晚指牙纇峙王文漢
卿得此方于麟撫折守折守得于國初洛陽帥李成
析年適年九十牙齒都不疎豁亦無風蟲王公今亦
九十食肉尚能齒決之信此方之神也續夷堅志

薛立齋治一婦人因怒齒痛寒熱作嘔用清胃等藥益
甚此肝火傷胃寒藥復傷故也用六君子加白芍柴
胡山梔而愈

一婦人發熱齒痛日晡益甚月水不調此脾經血虛用
逍遙散加升麻尋愈後因怒復痛仍以前藥加川芎
而瘥

一婦人胃中嘈辣甚則熱痛後患齒疼此胃中痰火也
用二陳加芩連下越鞠丸而瘳

一婦人因怒牙疼寒熱此肝火侮脾土用小柴胡加芎
歸芩朮山梔而疼痛止用加味逍遙散而寒熱退

一婦人每產後齒齦皆動踰日乃止此氣血虛而火動
也後復懷妊臨月與十全大補湯二劑令產後煎服
其齒不動如故

延尉張中梁齒動搖用安腎丸考功楊仲玉齒動用補
中益氣湯侍御王濟川齒搖齦露用承氣湯文選鄭
伯興齒腦痛用羌活附子湯顏僉憲齒痛用涼膈散

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

郭職方過飲用清胃散黨吏部風熱用犀角升麻湯
朱工部血氣虛用十全大補湯沈大尹頭腦齒痛頸
重手足厥冷此風寒入腦用麻黃附子細辛湯並愈
一男子齒痛脈數實而便秘用防風通聖散即愈
一男子齒痛胃脈數而有力以清胃散加石膏荊防二
劑而瘥
一男子齒痛甚胃脈數實以承氣湯一劑即止
一男子齒痛脈浮無力以補中益氣湯加黃連生地石
膏治之不復作
一老人齒痛午後即發至晚尤甚胃脉數而實以涼膈
散加荊防石膏一劑而瘳
王教授云有老婦人舊患牙疼人教將兩手掌交叉以
中指頭盡處爲穴灸七壯永不疼恐是外關穴也穴
本手少陽去腕後二寸隔中泉州一稍子妻舊亦苦
牙疼人爲灸手外踝穴近前些子遂永不疼但不知
千金所謂足外踝耶手外踝耶識外者當辨之百七方
辛卯舊患傷寒方愈食青梅既而牙疼甚有道人爲之
灸屈手大指本節後隔中灸三壯初灸覺病牙痒再
灸覺牙有聲三壯疼止今二十年矣恐陽谿穴也銅
人云此穴治齒痛手陽明脈入齒縫中左疼灸右右

疼灸左効 公上

昔有爲樂清主簿者蛀牙疼不可忍號呼之聲徹于四鄰用藥不效有巧者獻一方用之即安以漢椒爲末及巴豆一粒同研成膏飯爲丸如蓼豆大以綿裹安在蛀牙孔處立效 公上

馬敘叔說一村媼苦牙痛百藥不效用絲瓜兜俗呼爲香白芷太平州道地者不以多少硃砂十分白芷並另研右爲細末入硃砂磨蘿燒灰存性爲細末擦痛處立止 公上

拌勻煉窠如櫻桃大每用一丸擦痛立止廬州郭醫傳云渠親曾累取效盡賸他藥此藥乃濠梁一村婦人以醫治卹母夫人者倉卒不用硃砂及窠亦可其功只在香白芷耳趙從簡府判所用只白芷細辛二味等分亦每作效 公上

李莫安撫女子退齒踰年不生甚以挽爲因過平江會李亮卿語之李云予有一方已經試驗用之一月齒遂生用雌烏雞雄烏雞糞以二雞各畜之收舊鞋底麻底尤佳右三物等分燒灰存性研細入麝香少許同研傳于齒齦 公上

立齋治亮吏部頰腫腫極熱上攻也以犀升麻湯治之而消

郭職方齒腫熯至頰顋素善飲治以清胃散數劑而愈
一男子患齒痛服清胃散不應服涼膈散而愈盛予用
補腎丸治之而愈
來天培治一婦年五旬患齒痛連腦兩頰赤腫惡寒發
熱脈細而澁此肝脾鬱熱爲患治以逍遥散加熟地
石膏荊穗杞子一兩劑而腫痛減再劑而諸症釋然

脫齗

羅太無治一人伸欠頰車蹉但開不能合以酒飲之令
大醉睡中吹皂角末搐其鼻嚏透即自正矣醫學綱目

龔子才治一人因一人怒氣大吐下頰脫落任掇不上
衆莫措手令以烏梅槌餅塞於兩頤至牙盡頭控處
張口流涎須臾隨手掇上

張三錫治一婦常錯下頷古謂脫金鉤兩手脈弱用八
珍湯加升柴遂全愈先用手法拏上正骨科當知

舌

張子和南鄰朱老翁年六十餘歲身熱數日不已舌根
腫起和舌尖亦腫腫至滿口吐元舌大二倍一外科
以燔針刺其舌兩旁下薰泉穴病勢轉凶將至顛巔

張曰血熱者宜決之以鍉針磨令鋒及極尖輕砭之日砭八九次出血約一二盞如此者三次漸而血少痛減腫消夫舌者心之外候也心主血故血出則愈又曰諸痛痒瘡瘍皆屬火熥針艾火是何義也

元順帝之長公主駙馬剛哈剌咱慶王因墜馬得一奇疾兩眼黑睛俱無而舌出至胸諸醫罔知所措廣惠司卿聶只兒乃也里可温人也嘗識此症遂剪去之頃間復生一舌亦剪之又於真舌兩邊各去一指許都却塗以藥而愈轍畔録時元統癸酉也廣惠司者回回之醫者錄焉

宋度宗欲賞花一夜忽舌腫滿口蔡御醫用蒲黃乾薑末等分乾搽而愈蓋舌乃心之外候而手厥陰相火乃心之臣使蒲黃活血涼血得乾薑是陰陽相濟也

從隱方○本草綱目

仙傳外科云有人偶含刀在口割舌已垂未斷一人用鷄子白皮袋之糝止血藥於舌根以蠟化蜜調冲和膏敷鷄子皮上三日接住乃去皮用只蜜蠟勤敷七日全安若無速效以金創藥恭治之用鷄子白皮但取其柔軟而薄護舌而透藥也本草綱目

凌漢章治一男子病後舌吐凌兄亦吐知醫謂曰此病

後近女色太早也舌者心之苗腎水竭不能制心火
病在陰虛其穴在左股太陽是當以陽攻陰凌曰然
如其穴針之舌吐如故凌曰此知瀉而不知補也補
數劑舌漸復故明史
何伯庸治前鋒賴將軍舌本腫出不能縮何曰心氣亟
熱也久則飲食不下死矣受銀器內之腫消再投以
湯劑立愈雲南通志
龔子才治一人舌腫舒出口外舌者心之苗又脾之經
絡連舌本散舌下其勢當責諸心脾二經經所謂熱
勝則腫也用萆麻子去殼紙裹槌出油透紙作撚燒

烟熏之內服清利心脾之劑而愈不外益元合道赤
一人舌青黑有刺乃熱劇也欲以舌貼土壁上稍可良
由思慮過度怒氣所得爲製一方名心散服之即可清
効赤茯苓棗仁麥冬胡麻仁黃連各一錢遠志五分
木通連翹各八分甘草三分清水煎
一膏粱之人患舌腫數服皆消腫之藥舌腫勢急與刺
舌尖及兩旁出紫血數杯許腫消一二更服犀角地
黃湯二劑翌早復腫脹仍刺出紫血杯許亦消一二
仍服前湯良久舌大腫又刺出黑血二杯許腫漸消
忽寒熱作嘔頭痛作暈脈浮洪而數此邪雖去而真

氣愈傷與補中益氣倍參耆歸朮四劑而安又數劑而愈

鄭秋官過飲舌本强腫語言不清此脾虛濕熱用補中益氣加神麯麥芽乾葛澤瀉而愈

柴嶼青治滿少司農諱兆惠內閣侍讀時同在軍機處值宿患重舌腫痛問曰勇曾服通聖散瀉火而病不瘥除何也答曰火有諸經豈可混治誅伐無過幸汝少年未至大害診其右關洪實胃火特甚時已薄暮用清胃散一服而次早霍然

薛立齋治一婦人善怒舌痛煩熱或用降火化痰藥前症益甚兩脇作脹又服流氣飲肚腹亦脹經行不止此肝虛不能藏血脾虛不能攝血而前藥復傷也用加味歸脾湯加五味子而愈

學士吳壯川過飲瘦壅舌本强硬服降火化痰藥痰氣益甚肢體不遂薛作脾虛濕熱治之而愈

二守韓宗器不慎起居舌脹如菌瘦涌便秘服苓連二陳之類脈浮而數欲針出血薛謂此足三陰虧損之症且有形而不痛者陽之類也法當峻補其陰毋損其血況虛浮之脈乎遂朝補脾肺夕滋肝腎而愈後因大勞面目俱赤遍身搔痒時已仲冬曰大熱而甚

寒之不寒是無水也乃用制火壯水之劑而愈

摇城金允文舌脹吐痰反服降火化痰針刺出血便秘痰甚診之左尺關洪數右寸關弦數用滋腎水生肝血益脾胃之劑諸症少愈因近火頰面赤身痒六脈弦數薛謂此水竭火升之象難免于春二月矣於次年清明節日果卒

大尹王汝隣兩足發熱吐痰如涌左尺數而無力此足三陰虛彼反服四物二陳知柏之類喉舌作痛又服清熱敗毒之劑其舌如赤桃脈洪數而無力此脾肺復傷腎經虧甚虛火上炎水泛而爲痰也當滋化源以生腎水遂用補中益氣湯六味地黃丸而愈

李莫安撫內子夜半忽不能言燭之乃舌下生一舌急取外臺檢得一方用新真蒲黃羅細末數之如此五七次即愈須吐去再傳百乙方

有人自行被攔穿斷舌心血出不止以米醋用雞翎刷所斷處其血即止仍用真蒲黃杏仁去皮尖去皮鵬砂少許研爲細末煉蜜調藥稀稠得所噙化而安得效方

馮楚瞻治李工部一日忽發熱牙牀腫爛舌起大泡白甚胎厚疼痛難忍或用清解之藥口舌腫爛益甚數夜不寐精神恍惚狼狽不堪其脈兩關尺甚微惟兩

寸稍洪耳曰龍雷之火亦能焚熯草木豈必實熱方
使口舌生瘡孚蓋脾元中氣衰弱不能攝納下熯陰
火得以上乘奔潰腫爛若一清胃中氣愈衰陰火愈
熾急為温中下二焦使火有所接而退舍矣乃用白
朮八錢炮薑三錢温中爲君炒麥冬三錢清上爲臣
牛膝三錢五味一錢下降斂納爲佐附子一錢五分
直煖丹田爲使如是數劑精神漸復腫者消而潰者
愈矣來選入

一人無故舌縮不能言用荞菜子研末醋調敷頸項下
即能言服清脾降火等湯再用紫雪冰片散吹之而

安

錢國寶治板橋李氏僕劉二與租房之婦私年餘不收
其租一日主人算帳無底劉二坐逼婦恨戲將劉舌
咬下二寸延視舌根腫滿湯水不下製金瘡藥用敗
龜板燒銀帶包（黑）一兩血竭一錢冰片三錢分末糝
上血痛俱止腫尚未消其人昏昏不省夢鬬帝示以
半紅半白雞豆大藥一粒用無根水吞汝即生矣驚
覺難言討筆書出衆人方知自是其腫漸消可灌飲
湯至于薄粥其舌長完比前短小日服參耆歸朮湯
愈

蔣仲芳治一同學年二十餘患腮腫醫以清涼散火之劑不效一夜舌忽腫塞口命在須臾叩門求救診其脈微細而數大便四五日不行矣微數雖屬虛火而便結又以屬實乃用百草霜吹舌上內用酒蒸大黃五錢肉桂一錢引火下行一劑而愈

喉吷

李王公主患喉癰數日腫痛飲食不下纔合到醫官言須針刀開方得潰破公主聞用針刀哭不肯治痛逼水穀不入忽有一草澤醫曰某不使刀針只用筆頭蘸藥癰上霎時便潰公主喜遂令名之方兩次上藥遂潰出膿血一盞餘便覺兩日瘡無事令傳其方醫云乃以對繫筆心中輕輕劃破乃潰散耳名醫錄

此與舊案范九思法同元喉病當用針者此法甚妙故首錄之

元祐五年自春至秋蘄黃二郡人患急喉痺十死八九連者半日一日而死黃州推官潘昌言得黑龍膏方救活數千人其方治九種喉痺用大皁角四十挺切水三斗浸一夜煎至一斗半入人參末半兩甘草末一兩煎至五升去查入無灰酒一升釜煤二匕煎如餳入瓶封埋地中一夜取出温化酒下一匙或掃入喉

內取惡涎盡爲度後喻甘草片本草綱目

孫兆治丈潞公一日喉腫翰林咽喉科治之經三日愈甚上召孫治之孫曰病得相公書判筆一管去筆頭水沾筆管點藥入喉便愈孫隨手便刺蓋藏針于管也相公昏仆不省人事左右皆驚愕流汗孫乃笑曰非我不能救相公須臾嘔出膿血升餘旬日乃平復如故見上上喜曰孫兆良醫甚有手段即前草澤医針法

孫押班治都知潘元從喉閉孫以藥半錢吹入喉中少頃吐出膿血立愈潘詣孫謝曰大急之患非公不能救救人之急非藥不能療贈金伯兩願求方以濟非常之急孫曰用猪牙皂角白礬黃連各等分置新瓦上焙乾爲末即授以方不受所贈萬病回春。其方已見舊案

竇材治一人患喉痺痰氣上攻咽喉壅塞灸天突穴五十壯即可進粥服薑附湯一劑即愈此治肺也

一人患喉痺腫頤頷粗腫粥藥不下四肢逆冷六脈沈細急灸關元穴二百壯四肢方暖六脈漸生但咽喉尚腫仍令服黃藥子散吐出稠痰一合乃愈此治腎也

一人患喉痺六脈細爲灸關元二百壯六脈漸生醫曰此乃熱症復以火攻是抱薪救火也遂進涼藥一劑六脈復沈咽中更腫醫計窮用尖刀于腫處刺之

出血一升而愈蓋此症忌用涼藥痰見寒則凝故用刀出其肺血而腫亦隨消也

張子和治一婦人病咽喉腫塞漿粥不下數日腫不退藥既難下針亦無功以當歸荊芥甘草煎使熱漱之以冷水挼其兩手不及五六日痛減腫消飲食如故咽喉之病甚急不可妄下針藥

樓全善治一男子喉痺於大溪(疑即大谿)穴刺出黑血半盞而愈由是而言之喉痺以惡血不散故也凡治此疾暴者必先發散散不愈次取疫取疫不愈次去活血也

薛立齋治一婦人咽間作痛旬餘突腫如赤楊梅狀兩日後始潰而不飲遍身筋骨亦痛諸藥不應此時行楊梅瘡也先以土茯苓黃耆二十餘劑諸症悉愈

薛立齋治莆田史侍御患喉閉以防風通聖散投之腫不能嚥此症須針乃可牽牙關已閉遂刺少商穴出血口即開更以膿瘡吹患處吐痰一二椀許仍投前藥而愈嘗見患此疾者畏針不刺多斃(此筆頭藏針之法爲至妙也)

薛立齋治于縣尹喉閉腫痛寒熱脉洪數此少陰心火

少陽相火二經爲病其症最惡惟刺患處出血爲上因彼畏針先以涼膈散服之藥從鼻出急乃願刺則牙關已緊不可針遂刺少商二穴以手勤去黑血口即開乃刺喉間治以前藥及金鎖匙吹之頰退又以人參敗毒散加荅連元參牛蒡四劑而平經曰火鬱發之謂發汗出血乃發汗之一端也

廷評張汝翰患喉痛日晡益甚此氣血虛而有熱用八珍湯而愈後每入房發熱頭痛用補中益氣湯加麥冬五味及六味丸常服後不復作

一儒者三場畢忽咽喉腫閉不省人事喘促痰湧汗出如水肢體痿軟脈浮大而數此飲食勞役無根虛火上炎用補中益氣加肉桂一劑頰甦（上盛下虛者此方未可輕用）

李通判咽喉腫痛口舌生瘡此上焦風熱先用荊防敗毒散二劑喉痛漸愈又以元參升麻湯口舌遂愈

孫文垣姪治婦下午喉痛近來痰多暈厥一日二三發頭痛面赤素未生育左脈弦大右寸關滑大有力以荊芥薄荷甘草桔梗元參僵蠶柴胡枳殼竹茹貝母水煎連進二帖其夜得睡惟背脹怔忡疲猶不清爽多熱用黃芩枳殼甘草桑白皮地骨皮天花粉元參前胡半夏麴橘紅山屐調養而平

張景岳治王蓬崔年出三旬患喉痺十餘日頭面浮大喉頸粗極氣急聲啞咽腫口瘡痛楚甚一婢倚背坐而不臥者累日矣察其脉則細數微弱之甚問其言則聲微似不能振者所服皆芩連庖柏之類此蓋傷陰而起復為寒涼所逼致寒盛於下格陽於上水飲難入而尤畏煩熱乃曰危哉少遲半日必不救矣遂與鎮陰煎以涼水頓冷徐徐使嚥之一服頭頸腫痛盡消繼用五福飲之類數劑而起

又來宅婦年近三旬因患虛損兼喉瘡疼痛多醫罔效脉數而無力大便溏瀉所服皆退熱清火之劑而喉愈痛知其本非實火多用寒涼致肚腹不實亦隔陽之類也以理陰煎及大補元煎之類出入間用不半月而喉痛減不半年而病全愈

景岳在燕都嘗見一女子年及笄於仲秋時無病而喉竅緊濇息難出入不半日緊濇愈甚診其脉無火也問其喉無腫無痛而青目瞪不能語其聲之細如針息之窘如綫仲頸掙命不堪之狀甚可憐也據症候絶故以温補一劑而愈

馮楚瞻治何太學咽喉口舌腐爛而不疼胸膈脹悶不寐不食脉之左寸關弦洪搏指右寸關沈微欲脱乃

平時勞心惱怒以致內傷身熱醫悞發散乃見紅點認爲麻疹更用疎解清托遂困倦益甚頰內腫甚硬疑爲疹毒更用清涼解毒于是脹悶不堪疼痛欲絕蓋勞傷發熱原係中氣不足誤發散而榮氣逆行乃爲斑點復誤清解致陰火上浮齒頰浮爲腫又謂疼毒脾胃愈虛元氣愈損于是咽嗌腐潰成穴而不疼如物失天日照臨易爲腐壞故名陰爛非若陽火衝擊爲腫爲痛也以熟地一兩二錢炒白朮四錢麥冬二錢五味八分製附子一錢五分二劑脹減睡安改用人參三錢棗仁二錢熟地四錢當歸一錢五分牛膝麥冬各二錢五味六分肉桂八分薑棗煎二劑神爽思食咽喉知痛此陽和已轉如凍解而水活故知疼也外用銅青三錢煆人中白二錢牛黃一分冰片二分麝香一分研極細少許吹之不得其解意謂風邪閉流不日而愈。

非外感能以左歸合生脈投之尚可生也心疑之

塞喉竅非辛温不能解散遂以二陳湯加生薑（此處落一句）俗云意用獨參湯以救其肺然見其勢危若此恐滋謗怨終亦未敢下手他醫見之亦束手而已（此輩寧可做耶）竟一日夜而歿後又一人亦如此而歿若此二人

者至今莫識所以病此終身之疑實殊自媿也然意其必肺氣竭絶而然倘再值此恐非獨參湯決不能救筆之以俟後之君子

按丹溪云咽喉腫痛有陰虛陽氣飛越痰結在上者脉必浮大重取必澁去死爲近宜人參一味濃煎細細飲之如作實症治之禍如反掌觀此則丹溪之學何可薄哉傳忠録之言九原有知宜滋媿矣

楊乘六治房氏子年近三十病咳嗽午後稍安醫作傷風連進芎蘇十神等劑咽喉腫痛疫涎上涌更醫則以為喉痺也猛用芩連苦寒之劑熱甚益喉益閉氣喘如鋸不寐不食危症悉具脉之輕按滿指兩尺更覺有力其面游紅其舌枯黑其唇焦燥生皮其氣自臍下衝上此腎水不足六味症也乃不壯之水主以鎮陽光反用風燥以耗其陰煽其火致疫涌咽閉復用苦寒以傷之病劇而危又何怪乎遂與都氣飲一劑喘息定而熟睡醒則腫痛已減疫涎悉退飲食漸加繼用六味合生脉歸脾加白芍間服月餘咳嗽亦愈

吳氏婦兩目赤腫痛上連太陽下及肩胛雜用荆防辛

芷之屬赤障如膜目痛轉甚口燥唇乾喉中如烟火上沖窒塞不利重以苦寒之劑生冷之物遂至咽喉腫閉點水難吞勢危急脈之兩尺沉而軟兩寸洪而旺兩關細而緊舌見紫色上加微黃而胖診之間聞一嘔云昨日尚喫火柿數枚今水不能下咽縱有仙丹奈嚨喉作壞何得此數語益悉其腫閉之故爲想一進藥之法即令老嫗取磚一塊投火煆熱夾布數層慰於氣海妙法可師頃之覺滿腹溫和試以米湯可嚥矣遂與附子養榮湯服後即睡至曉腫閉如失蓋此症本由肝脾虛火上沖妄用發散火得風而愈熾重以苦寒之劑生冷之物下焦益寒火不敢下歸壅逼於上而爲腫閉

吳孚先治柯子寧患咽喉齒痛脈沈細足冷大便泄瀉此腎虛龍火飛騰欲用金匱腎氣彼疑火症恐桂附不合或以石膏連翹苦寒進之其痛尤甚復求治用前方一劑減二劑痊

凡咽喉初覺壅塞一時無藥以紙絞鼻中探或嗅皁角末噴嚏數次可散熱毒仍以李樹近根皮磨水塗喉外良愈敖園雜記

金陵黃泥巷楊馬軍治咽喉拏法以中指蘸藥少許于

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

喉中用力一捻腫處出血并痰涎隨即能下湯水絶
妙即前用針刺之意藥恐僞也治法彙

陸祖愚曰郁仲開室人壬子年忽患咽喉阻塞湯水不
下六脈平和身無寒熱但氣逆喘滿晝夜不眠予與
諸君俱作痰治藥到即吐强嚥一口面色紫脹氣窒
睛突躁亂靡寧狀如發狂嘔盡藥汁則畧可投牛黄
丸亦不納疑受暑與新汲水亦如之又與淡薑湯蘇
合丸重擦內關俱無一效經七八日或云脈不病而
症如是乃關格也今藥不下咽雖靈丹亦無如之何
矣兩日後驀然鼻聞鰕香遂作湯與之甫吞半錢嘔
出紫血數塊胸膈頓寬即飲米湯漸進稀粥守之數
日不藥而愈可謂奇症書之以俟教

薛立齋治一婦人產後喉痛服清熱等劑益甚此膀胱
經虛熱也蓋膀胱之內脈上行至喉而還用八珍湯
加丹皮柴胡酒炒黑黄柏二劑而愈

豫真人曰咽中帖帖如有聲欠肉吐之不出吞之不下
噙生薑片五十日愈以意逆之當是寒傷經絡氣血不
和浮于咽中婦人血分受寒多積冷氣故有此症予
用破棺丹噙化頻咽之曾治數人多效蓋候者候也
喉出天氣咽者嚥也咽出地氣故喉爲呼吸之門咽

乃水穀之路其或憂思內結風冷外侵痰氣隔塞通于喉嚨妨碍飲食久之而成翻胃噎膈者有矣

葉吉林女科

樓善全曰洪武戊辰春鄉村病喉痺者甚衆蓋年前終之氣及當年初之氣二火之邪也予累用甘桔湯加黃連半夏僵蠶牛蒡等劑裁之挾虛者加參耆歸輩水漿不入者先用解毒雄黃丸醋磨化之灌喉痰出更用生薑汁灌之却用上項藥無不神驗若用胆磨礬等酸寒黙過者皆不治蓋邪熱欝不出故也

陳自明治一男子喉閉水漿難下。一男子纏喉風痰涎湧盛與神仙追毒丸一粒並痊方見蠱門

立齋治一男子咽痛而脈數以荊防敗毒散加荅連二劑而愈

劑少愈乃去荅連二劑而愈

一男子咽喉腫閉牙關緊急針不能入先刺少商穴二出黑血口即開更針患處飲清咽利膈散一劑而愈

大抵吐痰針刺皆有發散之意故効此症不用針刺多致不救

一婦人咽喉腫痛大小便秘以防風通聖散一劑諸症悉退又荊防敗毒散三劑而安此症輕則荊防敗毒散吹喉散重則金鑰匙及刺患處出血最效否則不

救針少商二穴亦可不若刺患處之神速耳

一男子咽喉腫痛脈數而實以涼膈散一劑而痛止以荊防敗毒散加牛蒡二劑而腫退以荊防敗毒散二劑又以甘桔荊防元參牛蒡四劑而平

一男子咽喉腫閉痰涎湧甚以胆礬吹咽中吐出痰碗許更以清咽利膈湯四劑而安

一男子咽喉腫痛藥不能下針患處出紫血少愈以破棺丹噙之更以清咽消毒散服之而愈

一男子咽喉乾燥而痛以四物湯加知柏元參四劑少愈更以人參固本丸一劑不再發

一男子咽痛午後益甚脉數無力以四物湯加知柏荊防四劑而愈仍以前藥去荊防加元參甘桔數劑全安

一弱人咽痛服涼藥或遇勞愈甚此中氣虛熱以補中益氣湯加芩連四劑而愈乃去芩連又數劑不再發

常治午後痛去芩連加知母黃柏元參亦效

一男子乳蛾腫痛浮數(脈)尚未成膿針去惡血飲荊防敗毒散二劑而消

一男子乳蛾腫痛飲食不入瘡色白其膿已成針之膿出而安

一男子嗌癰腫痛脉浮數更沈實飲防風通聖散一劑瀉一次勢頓退又劑防敗毒散二劑而消

一男子咽喉腫痛欲針之以泄其毒彼畏針止服藥然藥既熟已不能下矣始急針患處出毒血更飲清咽消毒藥而愈。一患者其氣已絕心頭尚温急針患處出黑血即甦如斃符卿喬侍御素有此症每患皆以針刺血即愈大抵皆因火爲患其害甚速須分緩急及膿成否若腫閉及壅塞者死在反掌之間宜用金鑰匙吹患處吐出痰涎氣得通即甦若吐後仍閉乃是惡血或膿毒爲患須急針患處否則不治前人云治喉閉之火與救火同不容少待又云走馬看喉閉信夫治喉之方固多惟用針有回生之功

一男子咽喉作痛痰涎上壅欲飲治以荆防敗毒散加連翹山甲元參牛蒡彼自服甘寒降火之藥反加發熱咽愈腫痛急刺少商二穴仍以前藥加麻黄汗之諸症並退惟咽間一紫處仍痛此欲作膿以前藥麻黄減去煎服一劑而愈濃潰凡咽痛之疾治之早或勞輕者宜用荆防敗毒散以散之遲或勢重者須刺少商穴瘀血已結必刺患處亦有刺少商咽雖利而未全消者必成膿也然膿去即安若有大便秘結雖

針刺血必當以防風通聖散攻之甘寒之劑非虛火不宜用

一婦咽間如一核所纏噦吐不出倦怠發熱先以四七湯治之而咽利更以逍遙散。一婦所患同前兼胸膈不利肚腹膨脹飲食少思睡臥不安用分心氣飲竝愈

秋官葉素陰虛因怒忽喉腫寒熱頭痛項強目直小便自出此皆肝火之症肝主筋膜火主腫脹火旺則血涸筋攣目係緊急頸項如拔陰挺痿痺則小便遺遂刺患處出毒血用四物柴胡山屐元參甘草而甦

再用六味丸料以生肝血滋腎水諸症悉愈

太守葉咽喉腫痛疫涎不利手足發熱喜冷飲食用清咽利膈湯二劑不應刺少商穴喉稍寬疫從鼻出如膠患處出紫血稍寬至七日咳出穢膿而愈

義士顧克明咽喉作痛至夜發熱此肝腎陰虛之熱用四物加酒炒黑知柏麥冬五味治之而愈後因勞咽喉腫閉刺患處出血用桔梗湯吐疫而消至仲夏乾咳聲嘶作渴欵熱日晡足熱用滋腎丸加減八味丸間服三月餘喜其年富謹疾得愈

通府李朝用咽喉腫痛口舌生瘡此上焦風熱先用荊

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

防敗毒散二劑喉痛漸愈又以元參升麻湯口舌遂愈

地官黃北盤喉痛作渴飲冷大便不通此上下表裏實熱用防風通聖散治之頓愈

地官胡誠甫咽喉燥痛此腎經膀胱虛熱四物加知柏元參四劑少愈更以人參固本丸一劑不復發

職方盧柳齋咽喉腫痛兩目朦昧小便赤澁此膀胱濕熱用四苓散加知柏黃連茵陳防己治之頓愈又用六味地黃丸而痊

儒者王文遠咽喉腫痛口舌生瘡勞則愈甚此脾肺氣虛膀胱濕去知柏加黃山藥乃痊

一儒者腳發熱則咽喉作痛內熱口乾疲涎上涌此腎經虧損火不歸經用補中益氣加麥冬五味及加減八味丸而全愈

一老人咽喉痛小便數而赤日晡尤甚此膀胱陰虛當滋化源以補中益氣加酒炒黑知柏四劑咽痛稍可乃去知柏加黃山藥麥冬五味頓愈

一男子善飲咽喉作痛內熱作渴小便不利飲食如常此膀胱積熱用四苓散加茵陳大黃四劑諸症漸退

又用清心蓮子飲而安

一星士勞而入房喉痛漸閉痰涎上涌四肢乍熱此陰虛陽氣飛揚用補中益氣加附子煎灌而愈

憲副姜時川癸卯冬就診右寸浮數有力口中有瘡曰此火傳于肺也當薄滋味慎起居甲辰秋復就診尺脈洪數而無力曰此肺金不能生腎水宜靜養以滋化源彼云今喉間及耳內不時燥痛肢體不時發熱若無根之火殊無疑矣謂劉古峽云立齋謂我之病可疑至乙巳孟春古峽謂薛曰姜公之病已如萬料遂同往視喉果腫潰脉愈洪大或用瀉火之藥反速其殁

雲間吳上舍年逾五十咽喉腫痛或針出血神思雖清尺脈洪數而無倫次按之微細如無曰有形而無痛陽之類也當峻補其陰今反傷陰血必死已而果殁

蓋此症乃腎氣虧損無根之火炎上為患惟加減八味丸料煎服使火歸源庶幾可救

馬元儀治任采之咽喉痛三年不愈診其脈虛中兼濇此因勞攻傷中氣偏虛者火偏盛也火性上炎必傷其肺肺既不受脾中生化之氣反為壯火所熏灼其津液不能下灌靈根可知則下焦陰火不能蟄藏并

可知矣壯火虛兩合爲虐故延久不愈治法當先解鬱熱于上次納浮火于下病雖久可愈也用紫菀(鼻)杏仁蘇子前胡桔梗甘草兩劑而脉已透再用人參石斛炙草半夏橘紅黃連肉桂等四劑而咽痛頓除再以人參七味丸治之全愈

一沈氏婦體豐而多勞鬱時覺喉痒如蟲行皮中經五六載不愈兩脉浮虛而沈澁此陽明氣血不榮火動生風之候也陽明之脉起于鼻交額中下循鼻外挾口環唇循頰車上耳前其支者從大迎前下入迎循喉嚨入缺盆今者血虛風熾是諸脉不為血養而為風所淫矣風勝則乾風行則動然治法不當治風而當治血蓋血足則風自息也用生地黃製首烏天冬爲君以滋陽明之血秦艽白蒺藜甘菊爲臣以清陽明之風佐以藁根汁蔗漿甘草甘寒氣味以滋燥養陰調理二月而愈

周子固治趙鶴皐妻病咽乾水漿不能下衆醫盡愕周叩以平生所最嗜獨鸜鵒澈即命烹餼進之授以匕箸入口無所苦已而進飲食病如失(九靈山房集)

李襲興稱武德中鎮出潞州許人甄(薳)以新撰明堂示予時有刺史成君綽忽腮領腫大如升喉中閉塞水粒

不下三日矣予屈權救之鍼其右手次指之端如食頃氣息即通明日飲啖如故千金翼　按銅人云少商穴在手大指端內側去爪甲角如韭葉今成君綽腮領腫大如升甄權針之立愈病狀少異功效實同李云次指端銅人云大指端未知孰是果針少商當在大指端也姑兩存之以俟識者　資生經

鄭惟康主簿嘗苦喉閉雖水亦不能下咽灸三里穴而愈　醫說續編

吳內翰備急方云余嘗苦咽喉腫痛用白僵蠶直者不拘多少炒爲末以生薑自然汁調服一錢匕甚效葛

彥恢提舉閩中曾患喉痺五八主簿用此方治之即安一方調下二錢未通半時許再服立通吐出頑痰別將大黃一塊慢火炮熱打撲盡灰如一米厚切片以兩指大一片口內含汁嚥之一食頃再換一片或患人語不得及自嚥不下即扶起靠斜仰坐令人呷藥在口以筆管注入鼻中男左女右注藥訖隨即扶令正坐須臾吐涎不即扶起恐吐自鼻中出也吐了含嚥大黃如前百乙方

治急喉閉開口不得者右以黃蠟紙裹巴豆一个如患人鼻孔大小中心切破急以塞鼻氣衝入喉中自破

已覺通利即除去濠守王亞夫方巴豆去殼拍碎以
綿裹隨左右納鼻中即吐出惡物後有鼻中或生少
瘡亦無害全上

治咽痛至危困以手用力拔項心髮立通無髮者撮頂
心皮劉大夫得此方未試忽一卒苦咽痛不能言亟
去其巾乃患酒禿即以意令人用力撮頂心皮遂安
是齋方

繆仲淳治纏喉風即喉痺試過有驗方明礬三錢巴豆去殼
七粒溶礬入巴豆燒至礬枯去巴豆研細吹入喉中
流出熱涎即開廣筆記

馬銘鞠治傴仲昭患喉癬遍治喉漸漸腐去飲食用粉
麪之爛者必仰口而咽每咽泣數行下曰此非風火
毒也若少年曾患徽瘡乎曰未也父母曾患徽瘡乎
曰然愈三年而得我得乃謂此必誤服昇藥之故凡
患此瘡者中寒涼輕粉之毒毒發于愈後所生子女毒深者且延及于孫若甥倘不
以治結毒之法治之必死以甘桔湯爲君少入山豆
根草龍膽射干每劑用土茯苓半斤濃煎送下牛黃
二分半月而瘥竟不用吹藥既而云父母病時果服
丸藥而瘥瘥後曾以口碎非昇藥而何今醫家恬然用

不之曉其中毒之深故特明其說廣筆記

立齋治杜舉人咽喉腫痛口舌生瘡先以清咽消毒散二服更以元參升麻湯而愈

一男子年三十餘口舌常破如無皮狀或咽喉作痛服清咽利膈散愈甚以理中湯治之而愈

一婦人肥甚暑熱咽痛腫甚痰涎上壅語聲不出甚危先用針刺毒血次以金鑰匙吐去稠痰五六碗以清咽利膈湯一服腫痛少減去硝黃又服而安外科正宗

蕭萬輿治王氏婦喜啖辛辣季夏病胃熱咽痛脈洪滑微數以甘桔湯加芩連瓜蔞元參兩劑即痊

都閫連擎天之內季秋患肺經風熱咽痛脈浮洪有力以金沸草湯加牛蒡倍甘草一劑而痊

庠友鄭能仁孟冬患風疫上壅咽痛初治數劑增劇察其六脈浮弦無力以補中益氣加湯胆星肉桂兩劑頓愈痰壅如失

王氏少婦季春患肝經鬱火上升咽痛畧治不瘥以逍遙散加牛蒡桔梗黃芩香附二劑而痊

王洪緒治一壯年新昏百日妻歸寧匝月方回值酷暑房後多扇取涼五鼓時咽喉痛氣逆寒熱交作問之則曰前三日唯聞畧有微痛今則脹痛腫甚視其小舌

腫如胖人母指知爲心腎虛火幷慈後經風風火兩閉之候若用發表虛上加虛若投寒涼風火被逼乃以前胡蘇子連翹元參赤芍漸貝甘桔煎服立愈（全上）

無錫卹婦年可三旬五月望日下午腹飢正取飧食將舉筯忽喉痛難咽一醫以射干赤芍翹苓花粉牛蒡等煎服即痰湧聲鼾詢知驟起因服涼藥增劇此陰寒無疑也但痰塞滿口難以進藥即取鵝翎探咽出痰升許以肉桂炮薑生甘草各五分入碗內以滾水沖浸仍頡湯中以匙抄嚥一口病者即云好了連呷三四口即起說飢問飯可喫否

曰食粥最宜（全上）

蔣仲芳治一友始而牙痛既而咽腫醫投涼藥痛轉甚診其脈沉細大便一日二三次曰浮火上升也其足必冷察之果然以金匱腎氣料作湯與之服完即睡覺來病如失

劉雲密治一女子年五旬素因血虛生熱血熱化風患喉痺其勢暴盛喉中陡似搔癢作噯氣上而嗆血泡纍纍上腭一泡大如雞卵口塞不能合氣湧上更急少頃泡盡破血射如注其泡皮盡脫落喉咽皆潰爛

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

紅腫異常痛不可忍且滿口痰涎如羹如糊蓋熱壅于上而大陽陰氣也用養陰退陽活血祛風兼以止痛之劑緣湯藥難吞爲末或吹或點諸症漸退然潰處肌未生痛未止因皮破致時時作嘰而血隨出乃于吹藥中入白及磨漿合丸如芡實大日夜嚥化之遂全愈

瘖

盛用敬診道士顧本初病失音醫皆以厥陰傷寒治之盛至曰內傷外感無可為者某日當汗某日死既而果然人問其故曰肺主金屬聲肺敗則失音且面黧黑腎氣竭矣某日屬火火乘金位真陽是陰陽當既奪不死何待吳江縣志

孫文垣治徐檢菴以正月內食新蒜炒肉又冒風寒因咳嗽喉疼聲啞此原有痰火又爲外邪所束不得發越所致當潤肺化痰調氣以祛其本兼散邪解表以治其標庶痛可除而聲可復矣先與瓜蔞仁犳紅桔梗薄荷貝母桑皮地骨皮葛根前胡甘草四帖復以滾痰丸同七製化痰丸兩帖夜服諸症除而聲音亮矣此金底抽薪之法也

張路玉治一西客觸寒來蘇忽然喘逆聲瘖咽喉腫痛察其形體豐盛飲啖如常切其脈象浮耎按之益勁此必寒包熱邪傷犯肺絡也遂以麻杏甘石湯加半夏細辛大劑二服喘止聲出但呼吸尚有微瘖更與二陳加枳桔葳蕤之類調理而安

王惟一數年前雖有血症而年壯力強四月間忽患咳嗽服發散藥後疾中見血數口繼服滋陰藥過多遂聲颯而啞時覺胸中氣塞遷延月餘診之脈雖沉澁按之益力舉之應指且體豐色澤絕非陰虛之候蓋此之聲啞是金實不鳴非金破不鳴之比因與導痰湯加人中黃澤瀉方專一滌痰爲務四劑後疾中見紫黑血數塊其聲漸出而颯未除更以秋石燕人中黃棗肉丸服經月而聲音清朗始終未嘗用清理肺氣調養榮血藥也

張飛疇治郭代工午日少食前忝倦怠作瀉曾用消剋不效因圖跌仆即昏迷不省數日後邀診之六脈虛微欲脫右臂不能轉動聲瘖無聞時有用大黃之劑者急止之曰此脾肺虛備安能任此惟粥飲參湯庶爲合宜所謂漿粥入胃則虛者活依言調之瀉止神寧聲音漸出而飲能食後亦惟獨參湯調理不藥而

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

愈

艾珪字廷肅治一婦娠八月臥不語衆醫歛手珪曰此內經所謂瘖也十月當不藥自愈（嘉善縣志）

萬歷時京口名醫何繼亮世業也方成童猶在家塾遘鎮江道有幼子忽噤不能言召其父診視值父遠出召者不及待令繼亮往（一作迓）診之曰公子無病勿藥也但多令婦人以氣呵入口中耳遂更迭呵之半晌時後果能言人問故曰頃見衙內多婦人而公子貌甚美諸婦人愛其美也摟抱之時必多吸其口令少陽之氣乍奪第令呵以還之耳其匪夷所思類若此（張氏危言）

陸肖愚治范肖麓令郎厚味奉養而酒量極高性尤偏嗜沈酣多怒初患吐血服犀角地黃等湯月餘不愈更增溺血咳嗽一日忽聲啞然肌肉如故飲食不減羣作瘵治無一效脉之左關洪大而弦右關滑大而數乃有餘之火症非不足之瘵症也因厚味生疾醇酒助火火炎痰湧瘵于肺中所以聲啞其血上下行者怒則傷肝肝脉挾舌本而絡陰器龍雷之火一動血隨之而上逆下洩矣法宜清熱降氣化痰導血歸原十日可愈若認爲瘵而以地黃二冬投之則左矣用真霞天麴山查理胃家濕痰爲君杏仁橘紅利肺

竅桃仁麝金行肝滯爲臣山屘生甘草清上焦爲佐
滑石車前清下焦爲使又用茅根煎湯煮藥數劑而
血止聲清不十日諸症如失
薛立齋治一膏粱之人素不慎起居忽失音不語神思昏
潰痰涎上涌此腎經虛寒氣厥不能上接清陽之氣
故也須用地黃飲子不則後必噤舌經曰少陰氣至
則噤舌少陽氣至則噤頰不信仍用風藥後果噤舌
急用前湯而安
一婦人忽然不語半年矣諸藥不應兩尺浮數先用六
味丸料加肉桂數劑稍愈乃以地黃飲子三十餘劑

而痊男子多有此症亦用此方治之
一婦人因怒仆地痰涌不語灌牛黃清心丸稍甦用神
仙解語湯加山屘柴胡桔梗漸愈又用六君柴胡山
屘枳殼而痊神仙解語丹白附子石菖蒲遠志天麻
全蝎羌活南星木香惟木香半兩餘皆一兩
貴溪湖山夏公明道貳邑(縣)訪虛文靖公(伯生)于山中道
臨川(句有訛)童伯明之醫云其子嘗忽瘖不能言而無他苦
群醫環視莫究其端難於用藥伯明視之曰此熱症
也徐解之則愈投熱劑則大害從之不半日而愈又
其僕人得寒熱一醫治以常用之藥伯明視之曰法

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

當宛令夕夏公使人舁還其家僕起拜辭謝登輿而去行未至家果及夕而斃歸田稿 醫說續編

嚴銕橋天姿英邁人也豪於詩酒自首夏忽患失音咳嗽時作守不藥之戒至八月初余偶過齋頭談次有小青衣持藥甌至余曰君謂不藥今乃藥乎第醫作何治所用何藥出方驗之乃前胡桔梗蘇子杏仁等傷風劑也曰君病豈宜服此世安有傷風至百日者乎肝腎久病相火刑金惟集靈歸六味而對症耳幸勿誤聞言即起泛之再就二人診則皆勸服六味後服至三四十劑忽發肛痔痔發而音復蓋肺藏之病傳大腸府也是爲佳兆唯痔痛甚劇宛轉牀第月餘亦以服藥太遲且六味不宜依古方也病愈數年豪飲如故後登乙酉賢書明年遠舘于閩患瘧疾既數月始得歸已成損症遂不起自失音至是凡十年年三十七惜哉 力闢天才英邁為詩文操筆立就工書善畫皆不學而能與柳洲為詩友今遺稿存朱介史根石家

宋耀章翁年六十餘素亦豪飲咳嗽失音醫作傷風治轉劇余與生熟地麥冬沙參蔞仁杞子服二十餘劑亦發肛痔而咳嗽失音皆愈後數年以事入都于山左遇大水上没至腹行水中數里初病愈其痔遇勞

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

則發否亦有時膿水至是痔忽損愈而咳嗽失音復作抵都治療不瘳歸而延診其脈弦澁而數語之曰初病以發痔而愈藏傳府也為順今痔病復發則府傳藏矣為逆遍數月而終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

續名醫類案卷二十四

錢塘魏之琇玉橫撰

心胃痛

張子和治一將軍病心痛不可忍張曰此非心痛乃胃脘當心痛也（二語為此症點睛然予更有一轉語曰非胃脘痛也乃肝木上乘于胃也）內經曰歲木太過風氣流行民病胃脘當心而痛（風木為病）非肝而何乃與神祐丸一百餘粒病不減或問曰此胃脘有寒宜温補將軍素知張明了復求藥乃復與神祐

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

丸二百餘粒作一次服大下六七行立愈矣治法則非今人所宜

一婦病心痛數年不愈一醫用人言半分茶末一分白湯調下吐瘀血一堆而愈若非神手未許輕用李樓奇方

王執中久患心脾疼服醒脾藥及脹用耆域所載蓬莪朮麵裹煨熟研末以水與酒醋煎服立愈蓋此藥能破氣中之血也本草綱目王執中資生經

一婦年三十病心血疼音統又音朽痛用小疑水子薤花為末熱酒服二錢立效又法用水各半煎女用醋水各半

李時珍治荊穆王妃胡氏因食蕎麥粥著怒遂病胃脘當心痛不可忍醫用吐下行氣化滯諸藥皆入口即吐不能奏功大便三日不通因思雷公炮炙論云心痛欲死速覓延胡索末三錢溫酒調下即痛遂止

納食少頃大便行而痛遂瘥瀕死其徒亦友人言于武昌見一老僧患胃脘痛痛發瀕死其徒亦患之師死遺命必剖視吾心務去其疾果於胃間得細骨一條長七八寸形如箸其徒以揷瓶中供師前已數年矣有貴客來寓菴中偶殺鵝喉未斷其僮取瓶中骨挑鵝喉凡染鵝血處即化矣徒因悟此理飲鵝血數日胃疾竟愈

薛立齋治一婦人久患心痛飲食少思諸藥到口即吐薛以為脾土虛弱用白术一味同黃土炒去土每服一兩以米泔煎濃徐服少許數日後自能大飲用三斤餘而安

上舍陳履學長子室素怯弱產後患疥瘡年餘不愈因執喪旬月每欲眩仆一日感氣忽患心脾高腫作疼手不可按而嘔吐不止六脉微細或見其形實誤認諸痛不可補氣乃用青皮木香五味異菜萸等藥而愈繼復患瘧且墮胎又投理氣行血之藥病雖去元氣轉脫病家無識舉世皆然再投參着補劑不應矣六脉如絲欲絕迎薛至診之曰形雖實而虛極反用理氣之劑損其真氣故也連投參耆歸朮附子薑桂二劑間用八味丸五日寢食漸甘六脉全復此症若心脾疼痛時即服此等藥瘧亦不作矣

龔子才治一人心胃刺痛手足稍冷出汗指甲青百藥不效以當歸三錢煎湯用水磨沈香木香烏藥積殼調服乃立止

一教諭年五十一因酒食過飽胃脘作痛每食後其氣自兩肩下及胸次及胃口痛不可忍令人將手重按痛處移時忽響動一聲痛遂止如是八年肌瘦如柴

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

診之六脈微數氣口稍大有力以神祐丸一服下之其痛如失後以參苓白术散調理復元

程沙隨在泰興時有一乳娘因食冷肉心脾脹痛不可忍錢受之以陳茱萸五六十粒水一大盞煎取汁去查入官局平胃散三錢再煎熱服一服痛止再服無他云高宗嘗以此賜近臣愈疾甚多真奇方也（糕庵小乘）

孫文垣治張二尹近川始以內傷外感過服發散消導之劑致胃脘當心而痛手不可近疑有瘀血使然延而數之白芍五錢炙甘草三錢桂枝五分壹錢香附一錢大棗三枚飴糖一合（小建中加香附）煎服一劑而瘳

族弟應章胃脘當心而痛手不可近疑有瘀血使然延胡索五靈脂丹皮滑石川芎當歸甘草桃仁桔梗香附（臨服加韭菜汁一小酒杯）其夜痛止得睡飲食亦進惟大便下墜逼迫不安此瘀血已動欲下行也前劑去韭菜汁一帖全安

吳鶴洲如夫人病胃脘痛醫有認爲蟲者認為大者又有認為疫爲氣為食爲血為寒者百治不効猶診之兩手大而無力皆六至曰肝脾相勝之症耳（胃脘何以云脾）

東垣治例腹痛（胃脘亦非腹）以白芍為君惡熱而痛加黃柏效此法則萬全矣白芍四錢一半生一半炒伐肝

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

補脾爲君甘草二錢一半生一半炙緩肝養脾爲臣
山查爲佐黑山厄五靈脂各一錢止痛爲使三帖而
愈

吳仰元患胃脘痛痛則徹於背以手重按之少止痛時
冷汗如雨脈濇猝曰此氣虛而痛也脈濇乃血虛
小建中湯加御米殼而愈仍是肝病
李士材治宋敬夫心腹大痛傴僂不能仰自服行氣和
血藥罔效其脈左滑而急其氣不能以息偶一咳攢
眉欲絕為心疝無疑以生薑飲粥取小茴香川楝子
青木香廣木香吳茱萸炒黃木通延胡索歸身青皮一服
而病減五日而安醫通

李士材吳門舟次忽發胃脘痛用順氣化食之劑弗效
李診之曰脈沉而遲客寒犯胃也以參蘇飲加草豆
蔻三錢煎就加生薑自然汁半碗一服而減半服而
痊

一人將應試八月初五心口痛甚至不能飲食李診之
寸口濇而軟與大劑歸脾湯加人參三錢官桂一錢
彼云痛而驟補實所不敢得毋與塲期礙乎李曰第
能信而服之可以無礙若投破氣之藥其礙也必矣
遂服之不逾時而痛減更進一劑連飲獨參湯塲事

獲竣

喻嘉言治一人病後胃中隱隱作痛有時得食則已有時得食轉加大便甚難小水不暢蓋因脾中津液為火所爍津液未充火勢內蘊易於上燎所以得食以壓其火而安若食飲稍過則氣不能轉運其食而痛亦增蓋火不除則氣不復氣不復則胃中清濁混淆不宵下行而痛終不免也（論症洞如觀火）為訂降火生津下氣止痛方為常用之藥務先收攝腎氣不使外出然後濁氣之源清而膀胱得吸引上中二焦之氣以下行矣（喻君實有發前人所未發之本領唯久峻養肝腎一著然此案未行已駁駁手得之矣）

高鼓峰治一婦人胃痛勺水不入寒熱往來或從火治用芩連屢柏或從寒治用薑桂茱萸展轉月餘形體羸瘦六脈弦數幾於斃矣高曰此肝痛也非胃脘也其病起於鬱結生火陰血受傷肝腎枯乾燥迫成痛（色慾之人尤多此病）醫復投以苦寒辛熱之劑胃脘重傷其能瘳乎急以滋腎生肝飲與之一晝夜盡三大劑五鼓熟寐次日痛定再用加味歸脾湯加麥冬五味十餘劑而愈

按此病外間多用四磨五香六鬱逍遥新病亦效

久服則殺人。又用肉桂亦效以木得桂而枯也

屢發屢服則肝血燥竭少壯者多成勞衰弱者多發厥而死不可知

呂東莊治吳維師內患胃脘痛叫號幾絕體中忽熱忽止覺有氣逆左脇上嘔吐酸水飲食俱出或疑停滯或疑感邪或疑寒凝或疑痰積脈之弦數重按則濡蓋火鬱肝血燥耳與之當歸白芍地黃柴胡棗仁山藥山萸丹皮茯苓澤瀉頭妥唯胃口猶覺劣劣用加味歸脾及滋肝補腎丸而愈

高呂二案持論畧同而俱用滋水生肝飲予早年亦嘗用此卻不甚應乃自創一方名一貫煎用北沙參麥冬地黃當歸杞子川楝六味出入加減投之應如桴鼓口苦燥者加酒連尤捷可統治脇痛吞酸吐酸疝瘕一切肝病

薛立齋治一婦人心腹作痛久而不愈此肝火傷脾氣也用炒山茝一兩生薑五片煎服而痛止更以二陳加山茝桔梗乃不發

孫文垣治周蘆汀乃春患胃脘痛嘔吐不食者四日晝夜號呼不絕脈則兩手俱滑數故作實治曰當以清熱止痛為先乃先與末子藥二錢令服之不一飯頃痛止

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

而睡家人喜曰未也此大漸息耳其中痰積甚固不
乘時下之勢必再作因與總管丸三錢服下腹中微
痛再服二錢又睡至天明乃寤腹痛亦止大便下痰
積甚多次日以二陳湯加枳實薑黃香附山甲黃連
與之服後胃痛全止惟小腹畧脹蓋痰積未盡也再
與總管丸三錢天明又行一次痰之下如前胃脘之
痛遂不發

薛立齋治陳湖陸小村母久患心腹痛疼每作必胸滿
嘔吐手足俱冷面赤唇麻咽乾舌燥寒熱不時月餘
竟夕不安其脉洪大衆以痰火治之屢作屢止迨乙
已春發頻而甚仍用前藥反劇此寒涼損真之故內
真寒而外假熱也且脉息洪弦而有怪狀乃脾氣虧
損肝木乘之而然當温補胃氣遂用補中益氣湯加
半夏茯苓吳茱萸黃木香一服熟寐徹曉洪脉頓斂怪
脉頓除諸症釋然

陸養愚治陸前川素患腸風便燥冬天喜食益柿致胃
脘當心而痛醫以温中行氣藥療其心痛未減而
腸紅如注以寒涼潤燥之劑療其血便未通而心痛
如刺脉之上部沈弱而遲下部洪滑而數此胃中冷
而腸中熱也大腸屬金原喜清而惡熱喜潤而惡燥

況素有腸風燥結之症因心痛而投以辛香燥之劑能不劇乎脾胃原喜温而惡寒喜燥而惡濕況新得客寒犯胃之症因下血而投以苦寒濕潤之品能不甚乎今大便不行已數日矣乃用潤字丸三錢以沈香末三分衣其外濃煎薑湯送下二錢半日許又送一錢至夜半大便行極堅而不甚痛血減平日十之六七少頃又一次微痛而血亦少清晨又便溏一次微見血而竟不痛矣惟心痛未舒與臟連丸亦用沈香爲衣薑湯送之以清下熱焦而潤其燥又以附子理中料爲散飴糖拌吞之使戀膈而不速下不終劑而兩症並痊矣

王肯堂治韓敬堂患胸膈痛脈洪大而澁用山庶赤芍通草麥芽香附歸芎煎湯加薑汁韭汁童便之類飲之而止一日勞倦忽肌痛大發亟邀王至火房問曰晨起痛甚不能待公服家兄藥下咽如刀割其痛不可忍此何意也曰得非二陳平胃紫蘇之屬乎曰然曰是則何怪乎其增病也夫勞餓而發鬲逆則止知其虛也飲以十全大補湯一劑而胸痛止

張三錫治一婦苦胃脘痛每發輒大吐多方不應以鹽湯探吐出積痰碗許痛良愈後常作惡心知胃中有

痰也以橘半枳朮加香附川芎白螺殼南星海粉神麴打糊為丸白湯下錢半未及一半病去如脫

一老嫗性急胃痛已六日諸辛藥歷試無驗診得左關弦急而右寸更甚其痛一來即不可當少選稍定口乾面時赤知肝氣有餘成火也乃以越鞠加吳茱萸炒黃連薑汁炮子二劑頓愈

一婦胃痛幾一月右關寸俱弦而滑乃飲食不節所致投滾痰丸一服下痰及宿食三椀許節食數日調理而愈

一嫗胃痛久諸藥不應六脉微小按之痛稍定知中氣虛而火鬱為患也投理中湯一服隨愈

一中年人因怒鬱悒心下作痛一塊不移日漸羸瘦與桃仁承氣湯一服下黑物并痰椀許永不再發

一人中脘大痛脉弦而滑右為甚乃食鬱也二陳平胃加山查草豆蔻木香砂仁一服頓愈

一人中脘至小腹痛不可忍已十三日香燥歷試且不得臥臥則痛挂上每痛急則脉不見詢之因入房後過食肉食而致遂以為陰而投薑附因思其飲食自倍中氣損矣況在房室之後宜宿物之不能運化又加燥劑太多消耗津液致成燥矢鬱滯不通所以不

得卧而痛也古云胃不和則臥不安遂以枳實導滯丸三錢去黑矢椀許小腹痛減矣又與黃連枳實瓜蔞麥芽厚朴山查萊菔子二服痛復移于小腹乃更與潤腸丸二服更衣痛除第軟倦不支投補中益氣湯調理半月而起

王叔權曰荊婦舊侍親疾累日不食因得心脾疼發則攻心腹後心痛亦應之至不可忍則與兒女別以藥飲之疼反甚若炙則遍身不勝炙矣不免令兒女各以火針微刺之不拘心腹須臾痛定即欲起矣神哉叔權舊患心脾發則疼不可忍急用瓦片實炭火中燒令通紅取出投米醋中漉出以紙三二重裹之置疼處稍止冷即再易煮舊所傳也後閱千金方有云凡心腹冷痛熬鹽一升熨或熬砂燒磚石蒸熨取其裡温暖止或蒸土亦大佳始知予家所用蓋出千金方也他日心痛甚急炙中脘數壯覺小腹兩邊有冷氣自下而上至炙處即散此炙之功也本事方載王思和論心忪也胃之大絡名曰建里絡胃腸及兩乳間虛而有痰則動更須臾發一陣是其症也審若是又當炙建里矣不但若中脘為要穴云

左傳巫臣以夏姬之故怨子反曰余必使汝疲于奔命

兩建字當是虛字原稿

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

以死于是子反一歲七奔命遂遇心疾而卒則又因用心而成疾矣然則如之何平居當養其心使之和平疾自不作其次則當服鎮心丹之類以補養之可也若疾將作而針灸抑亦可以為次矣　資生經

繆仲淳治高存之夫人患心口痛一日忽大發胃中有一物上升沖心三婦人用力揉之不下叫號欲絕存之曾預求繆立此方是日急煎服之沖上者立墮下腹中作痛不升矣再服腹中痛亦消二日後以病愈起洗浴又忽作嘔頭痛如劈存之曰此即前症也煎前藥服之立安白芍炙草吳茱萸茯苓延胡索蘇子橘紅後加半夏旋覆花木通竹茹廣筆記

李季虬曰予婦令春忽患心痛連下腹如有物上下撞痛不可忍急以手重按之痛稍定按者稍鬆即叫號仲淳曰此必血虛也脈之果然急投以白芍五錢炙草七分橘紅三錢砂仁三錢炒鹽五分二劑稍定已又以牛黃蘇合丸疏其氣噯氣數次痛徐解予問故仲淳曰白芍甘草治血虛之聖藥也因久鬱氣逆故減甘草之半仲景甲己化土之論詳矣諸醫不解耳炒鹽者何心虛以炒鹽補之即水火既濟之意也予懼俗師蓋以疾大食積療心腹之痛故疏其詳如左

昔年予過曲河遠王宇泰夫人病心口痛甚日夜不眠手摸之如火予問用何藥曰以大劑參歸補之稍定今尚未除也曰得無有火或氣乎宇泰曰下陳皮及涼藥少許即脹悶欲死非主人精醫未有不誤者予又存此公案以告世之不識虛實而輕執方者仝上

劉雲密治一女子值暑月夜間甚涼患心痛從右肋下起至心前岐骨膈處并兩乳下俱痛復連背痛腰及兩膊俱骨縫脹疼唯右肋并心疼獨甚時作惡心且嘔疑夜眠受涼寒邪鬱遏氣不流暢所致用散寒行氣藥不效又疑寒滯中有鬱火加散鬱之品亦不効

服加味煮黃丸乃頓覺愈薑黃三錢五分雄黃三分乳香三分去油淨巴霜八分共為細末醋糊為丸如黍米大虛者七丸實者十一丸薑湯送下經云邪氣盛則實此婦人體氣素虧而受寒邪甚則為實唯此辛熱之劑可以導之前所用藥雖亦散寒而不能及病也其用薑黃乳香亦有深意蓋寒能傷血故耳此時珍所謂配合得宜則罔不奏功也

脇痛

實材治一人脾氣虛致積氣蕃於脇下兩肋常如流水

多服草神丹而愈原批脾虛致積當用溫行水流脇下當行溫化

王海藏治一婦人先病惡寒手足冷全不發熱服八至兩脇微痛治者便作少陽治之陽在內伏於骨髓陰在外致使發寒治當不從內外從乎中治也宜以小柴胡調之倍加薑棗宜入惡寒門

許學士云沈存中良方項在建陽醫者王琪言諸氣唯膀胱脇下痛最難治謂神保丸能治之熙寧中病項骨筋痛諸醫皆作風治之數月不瘥乃流入于背膂又臂牽痛甚苦憶琪語有證乃合服之一服而瘥再發有一服立效方用木香胡椒各二錢五分巴豆十枚去皮心膜研乾蝎七枚右四味共為末湯浸蒸餅為丸如麻子大用硃砂為衣每服五丸視諸經痛用引送下心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑湯下血痛炒薑醋湯下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調栟榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒任下

朱丹溪治一婦人脾疼帶脇痛口微乾悶已多年時尚秋用二陳湯加川芎乾葛青皮木通下蘆薈丸二十粒

董宅張郎氣痛自右脇時作時止脉沉而弦小便時有

赤色吞酸喜嘔出食此濕痰在脾肺間所以肝乘之
小柴胡湯去黃芩加川芎白朮木通白芍滑石生薑
煎湯下保和丸三十五粒
一婦人氣暈兩脇胸背皆痛口乾用青皮半夏各五錢
白朮黃芩川芎各三錢木通二錢五分陳皮桔梗二
錢炙甘草五分右分六貼煎熱服又脇下有食積一
條扛起加吳茱萸炒黃黃連
猻文垣治徐三泉子每下午發熱直至天明夜熱更甚
右脇脹痛咳嗽則弔疼坐臥俱疼醫以瘧治罔效已
二十餘日後醫謂虛投以參朮痛益增診之左强大
右滑大搏指經云左右者陰陽之道路也據脈肝膽
之火爲痰所凝必勉强作文過思不決木火之性不
得通達鬱而爲痛夜甚者肝邪實也初治當通調肝
氣一劑可瘳誤以爲瘧燥動其火補以參朮開塞其
氣語云體若燔炭汗出而散今汗不出舌胎已沈香
色熱鬱極矣不急救立見凶危以仲景小陷胸湯爲
主大瓜蔞一兩黃連三錢半夏麴二錢前胡青皮各
一錢水煎服夜服當歸龍薈丸微下之醫猶爭曰病
久食不進精神狼狽若此寧可下乎曰病屬有餘有
餘者瀉之已誤於補豈容再誤哉服後夜半痛止熱

退兩貼全安

虛山內人胃脇脹痛五更嘈囃則痛更甚左寸關脈洪滑孫謂此肝胆有鬱大胃中有膠痰乃有餘之疾經云木鬱則達之又云通則不痛與以當歸龍薈丸一錢半大便行一次痛隨止惟聲不開（却是何故）以陳皮柴胡貝母茯苓甘草白芍酒芩香附杏仁桔梗調之而安學士徐檢老體豐厚善飲致有腸風計下血不下數桶因而委頓已卯仲冬右脇極疼痛上至耳後夜分尤甚左右不能轉動動則痛甚飲食減而色青汗出如雨濕透衣被故不敢合睫而睡熟醫皆投以香附青皮及辛散之劑痛愈甚汗愈多而愈青通予診之兩寸短弱左關弦而搏指右關沉滑六脉皆近七至予曰據痛在少陽經必（而）上衝耳後（而）皆痛也夜痛甚者蓋夜屬肝氣用事內經云司疎洩者肝也邪在肝膽故合目汗即大出中焦原有濕痰（此語凡案必關入而前後並不照應）法當調肝清熱解毒為主（毒字鶻突之至蓋有心注後）兼利小便（語亦無因）不可遽止汗使邪無出路通其木火之性不惟痛加且將發腫毒而害非淺矣內經云膏粱之變足生大疔當預防之（亦非此症）真諦公曰何爲歟劑而謂不宜予曰當歸六黃湯內有

即盛用散也啟東之子此人載邑志原標

地黃當歸黃耆皆滯痰閉氣之味桔梗亦非所宜書曰下虛者及怒氣上升者皆不可用故當慎也（且將發腫以下皆有心穿揷）因以柴胡黃連爲君白芍甘草天花粉為臣紅花連翹為佐龍胆草為使服後汗雖仍舊痛即減三之一不妨睡矣仍用前藥痛又減半第三日又服左右轉動如常飲食亦加予未至公已先迎姑蘇盛氏盛公幼時窗友也家世授醫公初不急予曰引頸期盛到可刈桔劑朽也盛至診畢遂詰曾用何劑公出予發劑示盛盛大叫稱謬謂當隆冬之候汗多如此陽氣大洩何敢以柴胡為君喉中痰既未清又何不用桔梗當歸六黃湯前賢已試之藥置而不用是舍紀律而務野戰也即取六黃湯加桔梗以進（據此孫君真是神仙）公雅信盛仍傾心以從速煎服之未逾時而舊病隨作色色加惡（四字枝甚）左右復不能轉動自戌至子丑苦不能支有內侍語之曰服孫君藥雖未全可亦已去泰去甚彼曾言二藥不可用何為輕犯而受此苦宜急取孫君藥煎飲飲下即伏枕鼾鼾達旦始寤（柳或未必）命始使速予至而扣予曰人言隆冬汗出不當用柴胡而公用爲君何旨予曰胆與肝為表裡肝胆之火鬱而不發故痛痛極而汗汗出而痛減者是火

從汗出蓋汗乃邪出之門也予故曰汗不可歛本草云柴胡瀉肝胆火而以黃連佐之內經云木欝則達火欝則發言當順其性而利導之勢則易克古人治火之法輕則正治重則從其性而升之者以此益醫貴變通如陰虛火動而汗出者內無有餘邪故以六黃湯歛而隆之常治法也今內有有餘邪未出遽歛隆之邪無從出勢必成毒故變常而從治者使邪有出路木火之性不逆則毒不成而痛可減也公曰善哉孫君之劑奇正相生不下孫武子兵法何輕以無紀律議之願投劑而奏凱也予曰公數日後瘡瘍大發兩胯且有興塊作痛此毒出之徵公於時無恐改用柴胡白芍甘草丹參苦參茯苓瞿麥車前黃柏金銀花連翹服三日而痛全減汗全收左右不難轉動矣逾日公謂肌膚痒甚藟藟然似癮疹豈瘡出歟欲以藥治之予曰可再三日兩胯果發興塊如棋子大者數枚且痛予業已製蠟礬丸以待至是授服之瘡果遍身大發兩腿為甚一月餘而瘳公始信予防毒之言不謬披愫交歡且作序識勝（何勝之有）期與終身不替云（未必）

是案孫君生平得意必也筆然治法非奇行文頗

謬盈篇猥語滿紙忮心本不入選顧集中收彼案
徵多加節畧獨於此仍其原本以見一班第亦偶
然非有心吹索前人之短也

劉默生治諸葛子立脇痛連脊不能轉側必因閃挫與推
杜仲繽斷不效或者以為不能轉側必因閃挫與推
氣散轉劇劉診之曰脈得弦細乏力虛寒可知與生
料八味加茴香四劑而安 醫通

李士材治一人受暑脇痛皮黃發泡清肝破血之劑俱
不效用大瓜蔞一個搗爛加粉草紅花少許入藥而
痛隨止 病機沙篆

薛立齋治一婦人性急吐血發熱兩脇脹痛日晡益甚
此怒氣傷肝氣血俱虛也朝用逍遙散倍加炒黑山
梔黃柏貝母桔梗麥冬夕以歸脾湯送地黃丸而愈
龔子才治一婦人口苦脇脹此肝火也用小柴胡加黃
連梔子少愈以四君子湯加當歸白芍柴胡調理脾
胃而癒

吳孚先治蔣氏善怒兩脇作脹歷有年所醫用補脾伐
肝勿應脈之左關細澁右脈無痾此肝勝則剋脾敗
則自困補尚嫌緩何以伐為乃與四物湯加阿膠玉
竹棗仁枸杞令服三十劑脹減七八丸服全瘳

柴嶼青治侍御范諱弘賓太夫人吐痰脇痛飲食無味告以肝病一二十年矣率服平肝之藥凡香附鬱金等各服過數斤此二味為治肝病要藥然用之氣病則可矣用之血病則與干將莫邪無異也慎之今為我理肝氣可也柴曰肝脈已虛理無再用伐肝況腎肝同治乙癸同源自應滋腎養肝為主先服加服味逍遥散二劑即以八仙長壽丸方進太夫人曰熟地膩膈宽胖恐勿堪用柴曰此方熟地直走腎家斷無膩膈且風以煦之必需雨以潤之服後果驗調理數月而康

按二地膩膈之說不知始自何人致令數百年來人皆畏之如虎俾舉世陰虛火盛之病之死而不敢一嘗迨已濒危始進三數錢許已無及矣

朱丹溪治楊淳三哥舊有腎氣上引乳邊及右脇痛多痰有時膈上痞塞大腑秘結平時少汗脈弦甚與保和温中各二十丸研桃仁郁李仁吞之而愈綱目

陳三農治一人右脇痛引背口乾舌燥上身發熱腰以下俱冷右關尺不起此虛血氣無所附宜用温藥行動其氣使氣有所歸水升火自降矣用乾薑肉桂各五分當歸一錢吳茱萸半分鹽水煮煎服上身熱退下體温暖陽氣漸回但食難消化此元氣未復耳理

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

脾胃為主養血次之胃氣一轉諸病自愈用參苓歸朮各一錢董桂各五分神麴六分陳皮四分炙甘草三分漸愈

一人遇勞與飢則脇痛用八珍加牛膝木瓜山藥石斛故仁棗仁柏子仁桃仁數服頓愈一人同此醫投平肝藥痛甚而殞謹錄之以爲世戒

一人痛引腰脇脉弦數有力知肝火鬱結也投龍薈丸五十粒頓愈

立齋治一男子脾胃不和服香燥行氣之劑飲食少思兩脇脹悶服行氣破血之藥致飲食不入右脇脹痛喜手按之虛症可知曰乃肝木剋脾土而脾土不能生肺金也用滋化源之藥四劑諸症頓退又曰火令在通當補脾土以養肺金不信後復作吐膿而歿

王肯堂治雲中秦文山掌教平湖因勞患兩脇滿痛清晨并飢時尤甚書來求方知其肝虛當母子兼補令用黃耆白朮當歸熟地川芎山萸山藥柏子仁之類佐以防風細辛各少許薑棗煎服不數劑而愈王客長安時聞魏崑溟吏部之變因投謁忍飢歸而脇痛無他苦也而粗工以青皮枳殼之類雜投之遂致糾纏不痊可不監哉

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

丹溪治壽四郎右脇痛小便赤少脈少弦不數此內有
陳久積痰飲因外感風寒所遏不能宣散所以作痛
與龍薈丸三十五粒保和丸三十粒細嚼薑片以熱
湯下服後脇痛已安小便尚赤少再與白朮三錢陳
皮白芍各二錢木通一錢半條芩一錢甘草五分薑
三片煎熱飲之
方提領年五十六因飲酒後受怒氣于左脇下與臍平
作痛自此以後漸成小塊或起或不起起則痛痛止
則伏面黃口乾無力食少嘔此物便噯此味轉惡風
寒脈之左大于右弦濇而長大率左甚重取則全弦

此得熱散太多以致胃氣太傷陰血下衰且與和胃
湯以補胃氣滋養陰血并下保和丸助其化粕伺胃
實陰血稍充却用消堀和胃方人參三錢白朮錢半
陳皮一錢白芍歸身各五分乾薑三分紅花甘藥二豆大
錢炙作一帖下保和丸廿五粒龍薈丸十五粒
琇按此症全屬肝傷木反剋土其塊隱現不常乃
虛氣也時師多以香燥辛熱治之促人年壽余治
此不下數十人悉用一烏湯加川楝米仁薑仁等
不過三五劑其病如失若立齋多用加味逍遙散
鼓峰雲峯輩多用滋水生肝飲皆不及余法之善

藥字疑草

立齋治崑庠馬進伯母左脾連脇作痛遣人索治意此鬱怒腸肝脾用六君子加桔梗枳殼柴胡升麻彼別用瘡藥益甚始請治其脈右關弦長按之軟弱左關弦洪按之濇滯乃脾土不及肝木太過因飲食之毒七情之火也遂用前藥四劑脉症悉退再加芎歸愈此等症誤用敗毒行氣破血導瘀以致不起者多矣

一男子因怒脇下作痛以小柴胡湯對四物加青皮桔梗枳殼治之而愈

內翰李蒲汀太夫人左脇內作痛牽引胸前此肝氣不和尚未成瘡用小柴胡湯加青皮枳殼四劑少可再

芎歸治之而愈

張景岳治一姻家年力正壯素飲酒常失飢傷飽偶飯後脇肋大痛自服行氣化滯等復用吐法盡出飲食吐後逆氣上升脇痛雖止而上壅胸膈脹痛更甚且加嘔吐張用行滯破氣等愚哉嘔痛漸止而左乳胃肋之下結聚一塊脹實拒按臍腹隔閉不能下達每戌亥子丑之時脹不可當因嘔吐既已可用下愚哉允大黃芒硝稜莪巴豆等及蘿蔔子朴硝及大蒜麝等法毫不應愈攻愈脹勢所必然因疑其脾氣受傷用補尤覺不便痛極湯水不入者二十餘日無計可施只得用手

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

探按其處覺肋下一點按著則痛連胸腹細爲揣摩正在章門穴章門爲脾之募爲臟之會且乳下肋間正屬虛里大絡乃胃氣所出之道路而氣實通于章門因悟其日輕夜重本非有形之積而按此連彼則病在氣分無疑猶屬肝病乃用神香散令日服三四次煎用艾炙章門穴十四壯以逐散其結滯之胃氣到底未知爲不三日脹果漸平飲食漸進始得保全幸矣

綉按張君生平於藥氏諸書似未曾寓目至脇痛由于肝木為病至死未知良可哀也此症之愈全在一灸與餌逆病諸治不效灸虛里立止正同

黃古潭治一人六月途行受熱過勞性且躁暴忽左脇痛皮膚上一片紅如椀大發水泡瘡三五點脉七至而弦夜重于晝醫作肝經鬱火治以黃連青皮香附川芎柴胡之類進一服其夜痛極且增熱次早視之皮膚上紅大如盤水泡瘡又加至三十餘粒醫教以水調白礬末數仍以前藥加青黛龍膽草進之夜痛更甚脇中如鉤摘之狀次早視之紅已半身水泡增至百數乃載以詢黃為訂一方以大瓜蔞一枚重一二兩者連皮搗爛加粉甘草二錢紅花五分進藥少頃即得睡比覺已不痛矣蓋病勢已急而時醫執

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

尋常瀉肝之劑（近治）又多苦寒益資其燥故病轉增遠水
泡瘡發于外者肝欝既久不得發越乃侮所不勝故
皮膚為之潰也瓜蔞味甘寒經云泄其肝者緩其中
且有為物柔而滑潤於欝不逆甘緩潤下又如油之
洗物未嘗不潔此其所以奏效之捷也歟

閘發瓜蔞之功此案爲最然猶未盡其蘊

吳橋治陳景中年兩脇極痛楚冷汗淋漓伏枕惛惛嘔
逆絕勺飲者六日已治木橋診之曰無傷此畜血爾
家人曰固也昔者嘔血數升即有畜耳盡矣曰畜未
盡爾盡則當瘥日暮乃投補中行血一劑飲之僅內

其半中夜尸寢家人升屋而號橋曰子之半陽當回
故寢以需來復復則敗血行矣第具人參湯待之雞
鳴而甦大汗大吐大下下則垂垂滿器如腐肝敗則
臂乃進參湯大汗漸止又七日乃復初或問畜血而
腹不鼓何也曰昔嘔血數升其後何畜之多也曰病
得之怒而傷肝或以蹶而畜血傷肝則血不納畜血
則道不通猶之溝瀆壅塞流則新故皆壅矣故多也（本面集）

汪雲程年近七情甸患胸脇痛轉側茲甚寒熱交作喘
欬煩燥再信不能伏枕醫下之而病益深橋枕之曰
六脈浮滑大而搏指曰病得之過飲且內故火上炎

以清涼一服而愈太孺人病已六七年更醫既屢轉益羸瘠范康侯年弱冠患腸痛已食少而氣餒言嬾而神疲稍遠行則心下怦怦然遇勞則膈間如裂就予診告以初時但腹脇痛醫與逍遥散暫愈再發再服不應矣更醫投四磨飲亦暫愈再發再投亦不應矣又更醫用五香散越鞠丸則愈而即發自是腹中忽有塊再更醫以為痞積進青皮厚朴五靈脂延胡索之類塊益多時隱時現上下左右約五七枚如拳如掌往來牽痛近有老醫謂為虛也用當歸白芍香附欝金之類服之了無進退予曰似君之疾遍宇內矣誤治而斃者可勝道哉蓋古來方書于此症殊無肯綮無異乎世之夢夢也原其誤人之始只肝無補法四字遂使千萬生靈含冤泉壤或以疎散成勞或以香燥成膈或以攻伐成鼓或以辛熱成癱其餘變症筆難述盡幸子青年稟賦厚而未昏僅若此否則不可言矣今據脈已細數弦濇臟氣全虧幸不數耳無咳嗽夜熱猶可為第服余劑只可希遠效而不可求近功耳與生熟地沙參麥冬杞子棗仁等數劑畧安至數十劑塊漸減遂以方為丸服數年益就痊可今已娶第能樽節庶無後患也蓋此

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

症唯兩儀膏最妙然有力者始能用之

方某年三十餘因析箭鬬牆病脇痛左肋下有塊如盤按之堅硬食下則脹痛甚不能側臥百治莫應枯瘁如柴矣偶于藥肆遇人謂之曰此病惟淳佑橘魏某能治因就診脉之弦且急曰此肝鬱症也肝葉左三右四血足則潤而下垂今怒傷火陰其葉燥硬則支故舉而不下也經曰肝病則迫胃逆咽故左葉張則支葉而不可側臥右葉張則侵脫而不能容食昧者不知投以香散則如火上添油耳與生熟地沙參麥冬蔞仁杞子川楝十餘劑其病如失

詹渭豐母六十餘九月間瘧後自汗余已愈之至十一月脇痛大作醫以加味黑逍遥治之未爲悞也服一劑至夜分忽暈厥欲脫蓋柴胡白术皆非陰虛火盛之人所宜進也黎明急余治脉之兩關俱伏兩尺極微足冷過膝面如紙灰云初起左脇痛服藥後忽移于右遂發厥厥雖止而痛劇不可轉側痛處不可按察其舌燥硬如乾荔已危矣姑與生熟地杞子各五錢沙參麥冬各三錢服下痛止幾畧減前方加倍再入米仁五錢蔞仁二錢其痛乃復歸左脇能轉動矣仍服前方數劑而愈余嘗治數貧人感症後不能起

坐不能進食宛如百合外病壞脈之或弦或澁按其
脇或左或右或堰無堰皆曰痛甚檢方諸燥散外有
服柴胡至二三兩者一二兩者察其舌或中倍或枯
燥或紫赤是皆誅伐無過傷其肝腎之害也悉以前
方相其傷之輕重為劑之大小數服而愈又趙氏子
全氏女年均十六七其家皆素封病脇痛服逍遥倶散
五十餘劑病益困以前方去熟地與之皆不服乃更
從香燥而沒蓋地黃杞子舉世咸畏之如虎緣本草
謂地黃膩而杞子熟也其殺人亦多矣言醫藥者可
不慎哉

陳理壹母年六旬外久病脇痛每發必伏枕經旬醫所
與皆香附鬱金青皮木香小茴香延胡索五靈脂龍
胆草之類或配六鬱加左金而已近發則腰背脹痛
嘔逆便秘口燥不眠脈則兩寸搏指兩關弦而之韻
此將成關格之候投以滋水木養肺金之劑或入川
楝或入川連只一二劑即愈戒以多服以杜其漸然
性甚畏藥愈即止矣關格之患其將來乎此與脇痛門吳氏婦同

腋氣

盛覺民教授治腋氣大妙方大田螺一枚水中養之俟

開以剝淨巴豆一個先用杖子或針刮著纔開即放
在內取出拭乾仰頓在盞中夏月一宿冬月五七宿
即自然成水取出用搽永絕根本也又用熱蒸餅一
枚擘作兩片糝蜜陀僧細末一錢許急夾在腋下畧
睡少時候冷棄之如一腋有病只用一半葉元方平
生苦此疾來紹興偶得此方用一次遂絕根本廣筆記

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

錢塘魏之琇玉横撰

腹痛

周漢卿治永康人腹疾病僂行漢卿解衣視之氣衝起腹間者二其大如臂刺其一嗇然鳴又刺其一亦如之加以按摩疾遂愈 明史

薛立齋治一婦人小腹脹痛小水不利或胸乳痛或脇肋作脹或氣逆心吻薛以為肝火而血傷脾用四物

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

柴胡青皮元胡索木香而愈

一婦人久患腹痛去瘀血方止而復大痛諸藥不納薛以脾胃之氣虛寒用參朮炮薑凡如泰每用數粒津嚥下後以二味濃煎漸呷而愈

通府張益威云其妹小腹痛服附子理中湯附子服過八十餘枚此乃沈寒痼冷之甚不多有者

壬午仲冬金臺一男子患腹痛誤用乾薑理中丸即時口鼻出血燥煩燥發狂入井而死 二條俱見薛按

龔子才治一婦人臍腹疼痛不省人事只一劑立止人不知者云是心痛氣痛誤矣方用白芍五靈脂木通去皮三味等分每服五錢水醋各半煎至七分去查溫服此瘕痛也

李北川仲夏患腹痛吐瀉兩手足捫之則熱按之則冷外假熱內真寒之證其脉輕診則浮大重診則微細外假熱內真寒之脉此陰寒之症也急服附子理中湯不應仍服至四劑而愈是薛案以薛案中有此人也 薛案

汪石山治大坑方細彤瘦年三十餘忽患腹痛磊塊起落如波浪然晝輕夜重病在血分可知醫用木香沉香磨服反服六君子湯皆不驗診其脉浮緩弦小重按似濇曰此血病也前藥作氣治謬矣彼謂血則有形發時

雖有塊磊痛減則消而無迹非氣而何此難亦不可少蓋不知有形者血積也無形者血滯也滯視積畧輕耳安得作氣論耶若然則前藥胡以為不驗遂用四物湯加三稜蓬朮乳香服沒藥服之其痛遂脫然本傳

孫文垣治嚴印老長媳患腹痛有小塊畾畾然腹覺冷甚兩寸關皆滑數兩尺沈微此脾氣弱而飲食不消又當秋令溼淫之候不利亦瀉宜預防與白朮蒼朮茯苓甘草白豆仁木香半夏陳皮澤瀉煎服其夜果瀉一度次早又瀉一度小腹仍痛疼且裡急後重蓋其稟賦素虛當補中兼消兼利白芍三錢桂心一錢甘草人參茯苓澤瀉陳皮白朮各八分升麻葛根各六分服後脉皆軟弱不滑畾塊亦消改以人參黃耆白朮白芍各二錢炙甘草陳皮澤瀉葛根柴胡茯苓各一錢調理而安

張道南內人以飲食忤於氣因腹痛不飲食五日矣兩寸關弦尺滑孫曰此上焦氣虛下有鬱滯也以薑黃青皮為君山查梹榔當歸杏仁烏藥枳殼為臣柴胡木香為佐吳茱萸為使服後氣稍順然後用葱二觔煎湯浴洗腰腹即將熟葱擦摩使氣通透（鬱滯外治法）洗畢即安卧少頃其夜大便通先下皆黑硬結塊後皆

清水此積滯行而正氣虛也以建中湯加山查茯苓
澤瀉柴胡香附薑連和瘥調理而瘥

李士材治一人鬱怒之餘胸腹脹痛先服消疾疎氣化
食之劑不效更以人參補之亦不效診之六脉弦而
數此內有鬱熱為寒涼飲食壅之而痛用黃連三錢
梔子一錢五分橘紅白豆蔻各二錢鉤藤木香各八
分官桂二錢加薑汁半鍾二劑痛止四劑後加乾薑
人參而霍然

焦太史當臍切痛作氣食療之無功李診之曰當臍者
少陰腎之部位也況脉沈而弱與氣食何干非徒無

益反害真元以八味丸料煎飲不十日而瘥

胡京卿少腹作痛連於兩脇服疎肝之劑一月以來日
甚一日李診之左關尺俱沉遲治以理中湯加吳茱
萸一劑知十劑起矣

柴嶼青治廣撫諱蘇昌將赴瀋陽京兆任時伊嫂腹
痛吐酸日夜轉側呼號已治木求一診以決之其脉
微緊受寒所至並非危症何用驚惶若此蘊云昨復
藥稍定以方就政并屬定方柴見前方係附子理中
湯頗合是症遂不另立

王海藏治姬提領因疾服涼劑數日遂病臍腹下大痛

幾至於死與薑附等劑雖稍甦痛不已隨本方內倍白芍服之愈綱目

陸肖愚治尤少溪年近六十性急多怒因食冷粽四枚遂患腹痛幷脇亦痛醫用平胃散加枳實黃連不效彼亦知某家潤字凡方以五錢分三服令一日內服之大便已瀉而痛仍未止謂通則不痛今通而仍痛藥力淺而積未盡也再以五錢令一日服之大便數十行皆清水而痛反增劇號吽不已飲食不進面色青脹勢極危陸脉之弦細沈弱右關弦而有力曰虛中有實消則元氣即脫補則腹痛尚劇因用理中湯料五錢配枳實五錢一日二劑始下堅積尺許是夜痛大減明日減枳實之半又二劑而腹痛全愈第脇間尚微痛去枳實加青皮吳茱萸數劑而痊後以調氣養榮湯理之

張三錫治一人腰痛而瀉口積面時赤乃食積也與木香梹榔丸一服去硬物愈

一酒客每日腹痛瀉黃沫知積熱也投苓連厚朴炒梔子末通澤瀉赤苓二劑少可復以酒蒸大黃為丸酒下二錢凡三服遂永發

一婦人小腹塊痛醫作陰治投熱劑不應又作燥矢治

者硝黃潤腸凡等藥屢用不減詢之七日前作寒熱
起遂腹痛左三部皆絕小無力右寸關俱弦滑必起
於外感內傷挾氣下早故食滯不下每痛則下黃水
止作無時下傷津液故作渴遂以炒白芍茯苓保脾
木香青皮疏氣炒山卮清堀中之火當歸潤燥陳皮
甘草和中小水不利加澤瀉升麻車前二劑黃水雖
少痛塊不減隨用蔥豉熨法復投二劑二便大去而
安

朱丹溪治一婦上腹大痛連及兩脇以香附末湯調探
吐而安

陳良甫治家提幹內人病心腹脹痛衆投木香檳榔大
腹白芍薑桂之類病益甚診之六脉弦緊而和不似
病脉但診時兩手如火以此知其熱痛也衆問治法
曰大凡心腹刺痛不可便作虛冷治之或曰非冷而
何熱即生風冷生氣是也曰不然難經云虛則痒實
則痛又仲景曰腹痛者桂枝加芍藥湯痛甚者桂枝
加大黃湯家云荊布素來質弱曰有可辨處遇痛時
使一婢按之若痛止是虛寒症也若按之轉甚手不
可近此實症也即令一婢按之手不可近叫喚異常
曰此實熱無疑可疑者當用大柴胡湯治之衆皆不

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

許乃與責狀而授之八服愈良方

羅謙甫治副使覃郎中年四十九歲至正丙寅春病臍腹冷疼完穀不化足脛寒而逆皮膚不仁精神困弱診其脉沈細而微遂投以大熱甘辛之劑及灸氣海百壯三里二穴各三七壯陽輔各二七壯三日後以慈熨灸瘡皆不發復灸前穴依前壯數亦不發十日後瘡亦更不作濃瘡口皆乾癸丗歲（前云丙寅此云癸丗蓋追述學針之時也後戊辰乃丙寅用灸之後一年）余隨朝承應冬屯于瓜忽都魯地面學針於竇子聲先生因詢穴腧曰九用針者氣不至而不效灸之亦不發大抵本氣空虛不能作膿失其所養故也更加不慎邪氣加之病必不退異日因語針科忽教授亦以為然戊辰春副使除益州府判到任未幾時風疾半身麻木自汗惡風妄喜笑又多健忘語言微澁醫以續命湯復發其汗津液重竭其症愈甚因求醫還家日久神氣昏憒形容羸瘦飲食無味便溺遺失扶而後起屢易醫藥皆不能效因思內經云陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰今因此病而知于聲先生之言矣或曰副使肥甘足于口輕暖足于體使令足于前所言無不如意君言失其所養何也余曰汝言所養養口體者也予論所養

養性命者也且覃氏壯年得志不知所養之正務快于心精神耗散血氣空虛因此致疾靈樞云人年十歲五臟始定血氣已通其氣在下故好走二十歲血氣始盛肥肉方長故好趨三十歲五臟大定肥肉堅血氣盛滿故好步四十歲五臟六府十二經脉皆大盛以平定腠理始疎華容頽落髮頗斑白平盛不搖故好坐五十歲肝氣始衰肝葉始薄胆汁始減目始不明六十歲心氣始衰善憂悲血氣懈惰故好臥七十歲脾氣始衰皮膚已枯八十歲肺氣衰魂魄散離故言善悞九十歲腎氣燋藏枯經脉空虛百歲五臟皆虛神氣皆去形骸獨居而終矣蓋精神有限嗜慾無窮輕喪性命一失難復其覃氏之謂歟（若嫌文煩經語可以人自十歲至百歲盛少而衰多）

朱丹溪治一人痛當臍綿緜不已脉弦伏無力因作挾陰治理中湯加肉桂八分附子三分煎冷服隨愈

薛立齋治羅給事小腹急痛大便欲去不去此脾腎氣虛而下陷也用補中益氣送八味丸二劑而愈此等症候因利藥致損元氣肢體腫脹而死者不可枚舉

副郎李孟卿常患腹痛每治以補中益氣湯加山庖即愈一日因怒腹痛脉弦緊以前湯吞左金丸三十粒

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

而愈

一婦人心腹痛諸藥不應用炒黑山庶桔梗治之而愈

傳青主治一婦妬恐夫有所昵忽患腹痛展轉地上不可忍其夫求先生令持散瓦釜置婦牀前搗千杵服之立止劉紹攽九畹古文所搗何物豈即瓦釜耶瓦釜當可服也似有誤

一婦人少腹痛百藥不效一醫用杉木節童便煎服下血而愈醫學綱目

汪訒菴嘗病腹中啾唧經兩月有友人見招飲以蘆稷燒酒一醉而積痾暢然蘆稷最能和中煎湯温服治瀉亂如神

華佗傳有人病腹中半切痛十餘日中鬢眉墮落佗曰是脾半腐可割腹養治也使飲藥令卧或即麻沸散也破腹就視脾果半腐壞以刀斷之刮去惡肉以膏傅瘡飲之以藥百日平復三國志

薛立齋云壬午仲冬金臺一男子腹痛服乾薑理中丸即時口鼻出血煩燥發狂入井而死外科心法

趙從先治保義郎頓公苦冷疾時方盛暑俾就屋開三天窓于日光下射處使頓仰卧揉艾遍鋪腹上約數斤移時日光透臍腹不可忍俄而腹中雷鳴下瀉口鼻間皆濃艾氣乃止明日復為之如是一月疾良已乃令滿百二十日宿痾如洗壯健如少年時趙曰此

猶真人秘訣也世人但知灼艾而不知點穴又不審虛實徒受痛楚損耗氣力日者太陽真火艾既遍腹徐徐照射入腹之功極大五六七月若秋冬間當以厚艾鋪腹蒙以綿衣熨斗盛灰火慢熨之以聞濃艾氣為度亦其次也處堅志○查舊案

繆仲淳治高存之長郎患腹痛問曰按之痛更甚否曰按之則痛緩曰此虛症也即以人參等藥飲之數劑不愈但藥入口則痛止其痛每以卯時發得藥漸安至午痛復發又進再煎而安近晚再發又進三劑而安睡則不復痛矣如是者月餘存之疑之更他醫藥則痛愈甚藥入痛不止矣以是服繆方不疑一年後漸愈服藥六百劑全瘳人參白芍甘草麥冬當歸橘紅木瓜茯肉黃柏黃芩甲或去當歸黃柏加牛膝秦艽棗仁石斛延胡索廣筆記

包海亭夫人患腹痛連少腹上支心日夜靡間百藥不效診其脉兩寸闕俱伏獨兩尺實大按之愈甚詢知其起於暴怒風木鬱于地中投以芍藥上柴胡中升麻下下咽噯氣數十聲痛立已已而作喘曰是升之太驟也以四磨湯與之遂平全上

蔣仲芳治吳氏母年六十餘患腹痛日瀉四五行已三

四年矣遍治不效診之二尺沈緊曰內有沈積也用熟大黃三錢入本病藥中煎服一劑而病如失（沈抄本）

示吉曰毛方來忽患真寒症腹痛自汗四肢厥冷脈絕諸醫束手予用回陽急救而瘥吳石虹曰此症暫愈後必下膿血則危矣數日後果下痢如魚腦全無臭氣投參附不應忽思三物桃花湯仲景法也為丸與之三四服愈（沈效曾抄本）

腰痛

陶弘景曰相傳有人患腰腳弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生啖若服餌則宜蒸曝之

按蘇子由詩曰老去自添腰腳病山翁服栗舊傳方客來為說晨興晚三咽徐數白玉漿此得食栗之訣也（本草綱目）

實材治一老人腰腳痛不能行步令灸闕元三百壯更服金液丹強健如前

張仲文傳神仙灸法療腰重痛不可轉側起坐艱難及冷痺腳筋牽急不可屈伸灸曲踦兩文頭左右腳四處各三壯每灸一腳二火齊下艾炷燒至肉初覺疼便用二人兩邊齊吹至火滅午時著灸至人定以

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

來臟腑自動一二行或轉動如雷聲其疾立愈此法
神效卒不可量也綱目

張子和治趙進道病腰痛歲餘不除診其兩手脉沈實
有力以通經散下五七行次以杜仲去粗皮細切炒
斷絲為細末每服三錢猪腰子一枚薄批五七片先
以椒薑淹去腥水糝藥在內裹以荷葉外以濕紙數
重封以文武火燒熟臨臥細嚼温酒送下每旦以無
比山藥丸一服遂數日而愈

子和女僮冬間自途來面赤如火至灞陽病腰胯大痛
裡急後重痛則見鬼神張曰此少陽經也在身側為
相火使服舟車丸通經散瀉至數盆病猶未瘥人皆
怪之以為有祟張大怒曰驢鬼也復令調胃承氣湯
二兩加犀牛頭末一兩同煎服之太過數十行約一
二缶方捨其杖策但發渴恣其飲水西瓜梨柿等張
曰凡治火莫如冰水天地之至陰也約飲水一二桶
猶覺微痛乃刺其陽陵穴以伸其滯足少陽膽經之
穴也自是方甯女僮自言此病每一歲須瀉五七次
今年不曾瀉故如是也常仲明悟其言以身有溼熱
病故一歲亦瀉十餘行病始已此可與智者言難與
愚者論也凡世瀉火症極多

一人病六十餘病腰尻脊胯俱痛數載不愈晝靜夜躁大痛往來痛作必令人以手搥擊至五更鷄鳴則漸減向曙則痛止左右及病者皆作鬼神陰譴百方禱祝無驗淹延歲月肉瘦皮枯飲食減少暴怒日增惟候一死張診其兩手脈皆沈滯堅勁力如張絃謂之曰病雖瘦難於食然腰尻脊胯皆痛者必大便堅燥其左右曰有五七日或八九日見燥糞一兩塊如彈丸結硬不可言曾令人剔取之僵下一兩塊渾身燥痒皮膚皴裂搐枯澁如魚麩片既得病之虛實隨用大承氣湯以薑棗煎之加牽牛頭末二錢不敢言是瀉劑劑蓋病者聞暖則悅聞寒則懼說補則從說瀉則逆此醫非一日也而況一瘠人傳之衆楚人咻之乎及煎成使稍熱嚥之從少至多累至三日天且晚臟腑下瀉四五行約半盆以燈視之皆燥糞燥痺塊及瘀血穢臟穢不可近須臾痛減九分昏睡如常人至明日日將夕始覺飢而索粥温涼與之又困睡一二日其痛盡去次令飲食調養日服導飲九甘露散滑利便溺之藥四十餘日乃復蓋虛結與閉雖久猶可解而決去腰脊胯痛者足太陽膀胱經也胯痛足少陽膽經之所過也難經曰諸痛為實又痛隨利減不

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

舊按與此有同異去留再商
元標

利則痛何由去故凡燥症皆三陽病也病者既瘡壽乃八十歲其治法及論症迥非東垣丹溪所能企及息終日此症不能奏效後讀此案不禁太

衛德新曰之析津冬月飲寒則冷痛病腰常直不能屈伸兩足沈重難於行步途中以牀舁遞程程問醫皆云腎虛用蒺藜巴戟附子鹿茸大便反秘潮熱工周將經歲矣乃乞拯張張曰此十日之效耳衛曰一月亦非遲張曰足太陽經血多病則腰似折膕如結腨如裂太陽所致為風伸不利況腰者腎之腑也身中之大關節今既强直而不利宜鹹以軟之頻服則和

筞矣難經曰强力入房則腎傷而髓枯枯則高骨乃壞而不用此與用疑訛同今君之症太陽為寒所遏血下滯腰間也（原缺五字）必有積血非腎脫虛也節次以藥下可數百行去血一二斗次以九曲玲瓏竈蒸之汗出三五次而愈初蒸時至五日問曰腹中鳴否曰未也至六日覺鳴七日而起已能揖人張曰病有熱者勿蒸蒸則損人目也

饒之城中某病腎虛腰痛沙隨先生以其尊人所傳宋誼叔方用杜仲酒浸透炙乾搗羅為末無灰酒調下如方制之三服而愈槎庵小衆

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

薛立齋治一婦人腰痛三年矣每痛必面青頭暈目瞀
薛以為肝脾氣虛用補肝散而愈三年後因勞役患
頭痛兼惡心用補中益氣湯加茯苓半夏蔓荊子而
愈
一婦人苦腰痛數年不愈
薛用白朮一味大劑服不三
月而痊乃胃氣虛閉之症故用白朮也
一婦人先腰胯作痛後兩腿亦痛
薛以為足三陰虛寒
外邪所傷用小續命湯及獨活寄生湯或作或止所
用飲食極熱腹中方快
薛曰邪氣去而元氣虛寒也
診其脉果沈細用養腎散漸愈又用十補丸而痊

一婦人所患同前但發熱作渴喜冷飲食脉洪數按之
遲濇
薛以為血虛有熱用羚羊角散去桃椰加白朮
茯苓數劑更用加味消遙散而瘥
一婦人患前症時或腿膝作痛脉浮數按之遲緩此元
氣虛而風濕所乘用獨活寄生湯頓愈又用八珍湯
而安
一婦人因怒患前症寒熱往來口苦不食晡熱內熱
以為肝火血虛先用小柴胡山屯頓愈又用加味逍
遥而瘳
一婦人患前症寒熱頭痛殊類傷寒此寒邪之症用桃

蘇敗毒散而安又用補中益氣調補而愈

龔子才治一人跌後腰痛用定痛等藥不效氣血日衰而耳黎色龔曰腰為腎之府雖曰閃傷實腎經虛弱所致也遂用杜仲補骨脂五味子山萸蓯蓉山藥空心服又以六君當歸白朮神麴各二錢以加神麴何首烏入食遠服不月而瘥

張路玉治沈雲步媳常有腰疼帶下之疾或時勞動則日晡便有微熱診其兩尺皆弦而右寸關虛濡少力此手足太陰氣衰敷化之令不及也合用異功散加當歸丹皮調補中胃中營氣無杜仲以壯關節澤瀉以利州都則腰疼帶下受其益矣

江蘇總藩張公嚴冬腰腹疼重甲夜延診候脈得洗滑而駛遂與導痰無五苓之製一劑而腹痛止三啜而腰胯弛縱自如未嘗用腰腹痛之藥洗為在裡滑為痰駛為熱故消導分利而愈

盧不遠治陳孟抒父六月中受寒尚淹淹未甚也至次年二月忽小腹與腰急痛即令人緊挽外腎稍鬆便溺不詳

黃柏蒼朮牛膝萆薢茯苓肉桂等劑令刮委中痛止而足軟至五月天熱身發紫斑有汗至足乃愈此小腸腑病也經曰小腸病者腰脊控睾而痛以羌活入太陽小腸故痛隨愈其足軟未瘳者原以寒邪鬱火故

蘇敗毒散而安又用補中益氣調補而愈

龔子才治一人跌後腰痛用定痛等藥不效氣血日衰而耳黎色龔曰腰為腎之府雖曰閃傷實腎經虛弱所致也遂用杜仲補骨脂五味子山萸蓯蓉山藥茯苓當歸白朮神麯各二錢以加何首烏入食遠服不月而瘥

張路玉治沈雲步媳常有腰疼帶下之疾或時勞動則日晡便有微熱診其兩尺皆弦而右寸闕虛濡少力此手足太陰氣衰數化之令不及也合用異功散加當歸丹皮調補中營氣無杜仲以壯闕節澤瀉以利州都則腰疼帶下受其益矣

江蘇總藩張公嚴冬腰腹疼重甲夜延診候脈得沈滑而駛遂與導痰無五苓之製一劑而腹痛止三啜而腰胯弛縱自如未嘗用腰腹痛之藥沈為在裡滑為痰駛為熱故消導分利而愈

盧不遠治陳孟抒父六月中受寒尚淹淹未甚也至次年二月忽小腹與腰急痛即令人緊挽外腎稍鬆便欲死與羌活黃柏茯苓肉桂等劑令刮婁中痛止而足軟至五月天熱身發紫斑有汗至足乃愈此小腸腑病也經曰小腸病者腰脊控睾而痛以羌活入太陽小腸故痛隨愈其足軟未瘳者原以寒邪鬱火故

濡夏時則火力全而血脈之邪始去所以斑出足汗
百骸暢美寒淨而火遂融通也

吳孚先治尹瑞之腰痛異常從目出內皆進藥而愈或
問之曰是乃精明穴也在目內皆紅肉中上行足太
陽經于腰背下應足少陰通於心腹故心腹腰背之
痛從精明進藥良有奇驗古來神聖有從耳進藥者
病愈而耳聾針之則愈矣

蘇頌治一女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰間切
痛連脊問如刀錐所刺不可忍衆醫不別謂是鬼症
妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當即用
積雪草其藥夏五月正放花時即采曝乾搗篩為糝
每服二方寸匕和好醋二小合平旦空腹頓服之每
疑當作止

知為度 天寶單行方 ○本草綱目

知

張三錫治一人瘦弱性復嗜酒致腰及兩脛痛不可忍
作腎虛治不應診之左脈濡細而數乃血虛受熱也
應作至十劑乃已

易生地加知柏牛杜肉桂少許二劑知十劑已

一人因太勞又過飲酒致瀝熱乘虛入客于經腰痛夜
更甚不得偃仰脈濡而弱先與拈痛去參术二帖稍
愈遂改用四物加杜仲牛膝獨活肉桂頓瘳

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

需夏時則火力全而血脈之邪始去所以斑出足汗
百骸暢美寒淨而火遂融通也

吳孚先治尹瑞之腰痛異常從目出內皆進藥而愈或
問之曰是乃精明穴也在目內皆紅肉中上行足太
陽經于腰背下應是少陰通於心腹故心腹腰背之
痛從精明進藥良有奇驗古來神聖有從耳進藥者
病愈而耳聾針之則愈矣

蘇頌治一女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰間切
痛連脊問如刀錐所刺不可忍衆醫不別謂是鬼症
妄服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當即用
積雪草其藥夏五月正放花時即采曝乾搗篩為糝
每服二方寸匕和好醋二小合平旦空腹頓服之每
旦一服以知為度（天寶單行方。本草綱目）

張三錫治一人瘦弱性復嗜酒致腰及兩脛痛不可忍
作腎虛治不應診之左脈濡細而數乃血虛受熱也
遂以四物易生地加知柏牛杜肉桂少許二劑知十
劑已

一人因太勞又過飲酒致瀝熱乘虛入客于經腰痛夜
更甚不得俛仰脈濡而弱先與拈痛去參术二帖稍
愈遂改用四物加杜仲牛膝獨活肉桂頓瘳

一人脈症同工服拈痛漸減一人改用桂附遂攻出一
癰出膿大補消
一人肥盛而肢節痛腰更甚脈沈濡而滑知濕痰也與
二陳加南星二术二活參芎防風十劑愈
一人因墜馬後腰痛不止日輕夜重瘀血諦矣與四物
去地加肉桂桃仁泥蘇木四服大便下黑而痊
王叔權曰舍弟腰疼出入甚艱余用火針微微頻刺腎
俞則行履如故初不灸也屢有人腰背傴僂來覓點
灸余意其是筋病使然為點陽陵泉令歸灸即愈筋
會陽陵泉也然則腰疼又不可專泥腎命不灸其他
穴也
陳三農治一士精神倦怠腰膝異痛不可忍咸謂腎主
腰膝乃用桂附之劑延兩月覺四肢痿軟腰膝寒冷
遂恣服熱藥了無疑懼診之脈伏于下及重按之振
指有力此陽盛格陰乃火熱過極反見勝己之化以
黃柏三錢膽草二錢參連卮子各一錢五分加生薑
七片為之向導乘熱頓飲移時便覺腰間暢快三劑
而痛若失
一婦人患腰痛脚弱弛長不能動履以參人參敗毒散
加蒼术黃柏澤瀉而愈

一人體厚腰間常冷與腎著湯加星半蒼术三服全愈

朱鶴山老年久患腰痛用茯苓三錢枸杞一兩生地二錢、棗冬五錢人參二錢陳皮三錢白术三錢河水二鍾煎八分日服一劑強健再生子八十未艾廣筆記

繆仲淳治錢晉吾文學腰痛甚診之氣鬱無有傷瘀血停滯投以牛膝五錢當歸二錢五分炙甘草一錢藕梗一錢五分加皮三錢橘紅二錢製香附二錢續斷二錢水二鍾煎八分飢時加童便一大杯服二劑愈

公上

繆之外祖李思塘少年患腰痛至不能坐立諸醫以補腎藥療之不效朱遠齋者湖明醫也用潤字號丸藥下之去黑糞數升蓋濕痰來虛流入腎中作苦痰去方以補藥滋腎不逾月起惜其方傳者不真(朱與陸養愚友善陸氏常用潤字九療病。公上)

李季虬曰先安人因亡女忽患腰痛轉側艱苦至不能張口受食投以鹿角膠不愈以濕痰療之亦不效遍走使延仲淳曰此非腎虛也如腎虛不能延至今日矣用白芍製香附各三錢橘紅白芷肉桂各二錢炙草一錢乳香沒藥各七分半燈心同研細臨服下之一劑腰脫然覺痛體疼仲淳曰愈矣再煎(淳)服立止起

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

余駭問故仲淳曰此在素問木鬱則達之顧諸君不識耳廣筆記

薛治一男子年四十餘患腰痛服流氣飲寄生湯不應以熱手熨之少可蓋脈沈弦腎虛所致以補腎丸愈之

張景岳治董翁年六旬資稟素壯因嗜火酒致濕熱聚于太陽小腸膀胱忽病腰痛不可忍至求自盡診之六脈甚洪滑且小水不通而臍旁脹急遂以大分清飲倍加黃柏龍膽艸一劑小便頓行腰痛如失

劉宏璧曰一友病腰痛醫以杜仲補骨脂等治之不效診其脈浮細緩止知為風傷血脈耳與當歸四逆湯劑盡痛除次日前醫來深詆此湯之謬復進杜仲等藥腰痛如故怪而問之曰子或又服他藥耶友以實對令其再當服當歸四逆湯一帖即已

錢國賓治榆林張參戎體厚力大素善騎射壯時縱慾水敗火虧腰胯如折其脈寸關浮大兩尺若有若無不可以揖非人扶不起已三年筋骨皆冷以六味丸加河車膏龜鹿膠琴歸桂附補其真元腎命半餘方能步又五年卒

陸茂才父年七十素有肝疾偶于春分日盲王山頂燒

香育王之高為湖工衆山之最晨而往晡而歸足力可云健矣至夜忽腰大痛不可轉側或以為勞傷兼感冒宜先表散與羌活秦艽等一劑痛益劇脉之弦硬參伍不調二便俱秘面黯囊縮日夜不得眠曰此肝腎大傷疎洩已廢症瀕危矣豈可再投風藥以養青湯加牛膝當歸痛畧減二便仍秘且嘔惡發飢此地氣不得下行而反上攻也前方重內熟地外以田螺獨蒜搗爛繫臍下二便既行嘔飢隨止痛忽移入少腹控引睾丸前方加杞子至一兩再入白芍甘草數劑漸瘥乃素性畏藥停數日覺復甚又與數劑而

安

前陰

朱丹溪治吳江王氏子年三十歲忽陰挺長腫而痛脈數而實用朴硝荊芥湯浸洗又用三一承氣湯大下之愈 本草綱目

姚蒙字以正巡撫鄖來學嘗使視脈蒙既叙病源因曰公根器別有一竅出汗水來學大驚曰此隱疾何由知蒙曰以脉得之左關滑而緩肝第四葉有漏洞下相通來學改容謝江南通志

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

薛立齋治一婦人陰中腫悶小便澁滯兩脇作痛內熱晡熱月經不調時或寒熱此因肝脾鬱怒元氣下陷濕熱壅滯朝用歸脾湯加柴胡升麻解鬱結補脾氣升元氣夕用加味逍遙散清肝火生肝血除瀉熱各數劑諸症悉愈又用四君芎歸丹皮調補肝脾而經水如期

一婦人陰中寒冷小便黃澁內熱寒熱口苦脇脹此因肝經瀉熱用龍膽瀉肝湯祛利瀉熱用加味逍遙散調補血氣而安矣

一婦人所患同前更寒熱嘔吐兩股腫痛先用小柴胡加山梔一劑寒熱嘔吐頓止次用龍膽瀉肝湯一劑腫痛頓消

一婦人陰中寒冷小便澄清腹中亦冷飲食少思大便不實下元虛寒治以八味丸月餘飲食漸加大便漸實又月餘諸症悉愈

一婦人陰腫下墜悶痛出水胸腹不利小便頻數內熱晡熱口苦耳鳴此肝脾火症用小柴胡加車前膽草芩术升麻二劑少愈又用加味逍遙加升麻數劑漸愈乃以加味歸脾加升麻柴胡并補中益氣加山屁數劑頓愈仍用加味逍遙加味歸脾二藥調理全愈

此案在陳三農一案前

陳三農治一婦陰中有一物如石塞之狀痛不可當此石瘕也治以大黃肉桂三稜檳榔桃仁血竭元胡索澤瀉而愈此症宜入瘕門因病者不知于此門考之故入餘多倣此

一婦人患前症熱痛或用寒涼敗毒藥飲食不入時欲作嘔小腹重墜此脾胃損復損元氣下陷先用補中益氣加炮薑二劑重墜頓愈又加茯苓半夏二十餘劑而愈乃以歸脾湯少加柴胡升麻并六味地黃丸而康

孫文垣治一婦當暑月小便不利而痛玉戶腫又便血發熱左脈弦數右寸短弱此肺氣不足肝火太熾蓋肝為血海又主疏洩二便玉戶為肝經所絡之地治當疏決肝經壅滯脾俾氣暢則新血得以歸經熱解則小水可不痛而腫亦可消矣以滑石三錢桃仁當歸白芍各一錢柴胡黃連人參各八分川芎六分甘草桂桂枝白芷各三分四劑而瘳

馬鳳林內子有隱疾每月汛行子戶傍輙生一腫毒脹而不痛過三五日以銀簪燒紅針破出白膿盞許而消不必膏藥亦無疤痕初用針刺近則以指掐之膿即出但汛行即發上下左右無定所第不離子戶于今八年內外科歷治不效且致不孕孫曰此中焦溼

疾隨經水下流蟄于子戶也經去而疾疑則化為膿本來非毒故不痛（怪病之謂）疾用白螺蜌殼火煅存性為君南星半夏為臣榮胡甘草為佐麵糊為丸令早晚服之未終劑而汛行不腫次年生女

一婦有隱疾其夫三造門而不言繼至欲言而面赭孫開喻之乃俛首曰言之無任主臣先生長者諒無哂山妻于戶中突生一物初長可三寸今則五寸許矣狀如堅筋色赤大可拱把脹而且痛不便起止增寒壯熱寢食俱減赧于言欲求自盡逡巡百日矣孫曰乃陰挺症也厥陰肝經之脈女子下系庭孔濕熱則陰挺猶木有涇熱而生蕈也（畢竟熱則挺縱不以為是）與以龍膽瀉肝湯及蜌皮散當歸黃芩牡蠣蜌皮赤芍為末每用二錢空心米飲調下去後數月來報云前癢症茲為汛期一月不至敢問曰此有身也彼疑疾甫愈未必能孕謂曰前恙乃肝經有餘之症肝為血海女子血盛則懷胎榱血盛當先期今汛逾期實孕耳非病也後果足月生子

尚某言昔在粵東與都司李某交善後李沒其妻售濠畔街宅與尚仍分院而居兩家往來如親串然一日李妻私語尚夫人以告尚曰與李君風交好言之何

傷李妻乃言女初患腹痛久之溲溺甚艱溲內有物能游泳或二或三似有鱗鬣者取視之乃比目魚半體也身微黑止具一目其背白置水中果如所云試診之乃肝氣久鬱所致投以疎肝之劑而愈李河南人居易錄

有寡婦患陰中痒不可告人漸至委頓此婦平日虔奉大士忽有尼僧來與藥一包曰以此洗之數洗而愈其藥乃蛇牀子吳茱萸苦參也 採蘭襍志

何首烏本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州南河縣人祖能嗣本名田兒生而閹弱年五十八無妻

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

竽醉臥野中見田中藤兩本異生苗蔓相交久而解解合三四田兒心異之掘根持問鄉人無能識者遂曝乾搗末酒服七日而思人道百日而舊疾皆愈十年而生數男後改名能嗣又與子庭服皆壽一百六十歲首烏服藥亦百三十歲唐元和七年曾文象遇茅山老人遂傳其事李翺因著方錄云 甘泉叢殘錄

富家子唐靖瘡發於陰至爛道人周守真曰病得之欲泄而不可泄也 治法宜內服龍胆瀉肝湯外以甘草末粉之。延壽書

有人陰冷漸漸入陰囊腫滿晝夜疼悶不已用上好川椒為末帛包裹囊如不覺熱烘熱更妙內煎大蔥湯

汗服妙陰冷雨丸如冰出汗雨脚痿弱宜補肝湯千金方

王節齋曰男子陰痿不起古方多云命門火衰祖氣虛冷固有之矣然亦有鬱火盛而致痿者經云肚火食氣鬱如人在夏暑而倦總遇冬寒而堅強予常親見腎經鬱火而有此症令服黃柏知母清火堅腎之藥而效故須審察不可徧認為火衰症也

薛立齋治一婦人吐痰發熱遍身作痛小便頻數陰中作痒日晡熱甚曰此肝脾血虛氣滯而然遂用加味逍遙散加車前子而愈

馬元儀治尤悔翁姪患陰挺作痛痛甚而憒遂昏迷不醒幾閱月診其兩脈浮虛而澁浮為氣虛澁為精傷陰陽兩虛之候得之憂思勞鬱而傷中也經云陽明主潤宗筋又陽氣者精則養神柔則養筋今悒鬱勞倦氣血兩傷故令作痛以當歸補血湯加人參炙草榮養氣血桂心秦艽紅花宣通血脈一劑而痛止復診兩脈沈微連進大劑參附諸症已平惟徹夜不寐用歸脾湯調理而安

有人陰腫醫以赤土塗之令服八味丸而愈一兒陰腫醫亦以赤土塗之愈若久病而陰腫病已不可救宜

速灸水分穴蓋水分能分水穀水穀不分故陰腫不特陰腫他處亦腫也尤宜急服禹餘糧丸云既效方

陳良甫家婢患陰蝕就瘡家療不差蝕處作兩瘡深半寸良甫于涓子方中撿得甘草湯方仍以自處蚘蛇膽散不經七日瘡乃平復甚效凡救十八人手下即活遇斯疾者請流布而傳之

葛氏云比見人患莖頭腫攻下瘡欲斷者以猪肉湯漬洗之并用黃連黃柏末塗之又方蜜煎甘草末塗之

千金方

薛立齋治一婦人陰內膿水淋漓或痒或痛狀似虫行

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

診之少陰脈滑數此陰中有瘡也名曰蟲由心神煩鬱胃氣虛弱氣血凝滯所致與升麻白芷黃連木通當歸川芎白朮茯苓柴胡煎服用搗腫湯熏洗更搽蒲黃水銀兩月餘而愈或有胞絡虛風邪乘陰血氣相搏令氣否塞致陰腫痛當以菖蒲散治之更以枳實炒熱帛裹熨之冷則再炒或有乎臟虛冷氣下衝致陰脫出謂之下脫或因產努力而脫者以當歸散治之久不愈者以補中益氣湯倍加升麻柴胡升舉之

靳閣老子陰莖腫痛服五苓散等藥不應診其脉左關

弦数此肝經積熱而成以小柴胡湯送蘆薈丸一服
勢去三四再服頓愈

一婦人陰器腫痛小水澀滯遇晚寒熱交作此肝經濕熱為患以龍膽瀉肝湯二服小水通利又以四物湯兼小柴胡加花粉木通山卮服之而愈（外科正宗以下共六案未選入）

一婦人無故發熱月餘忽陰中突出一物如鷄冠一片此肝脾鬱脾虛所致以補中益氣湯加青皮卮苓柴胡甘草外以白芷蒼术柴蘇煎湯每日熏洗十餘日其患漸小仍用前湯倍參术月餘而安

一婦人陰中作痒遇夜五心煩熱作渴不寐此思慮太過致心腎不交以四物湯加龍膽草山卮知母黄連以銀杏散納入陰中二日其痒漸止又朝以八味丸午用歸脾湯加銀柴胡茵陳月餘而愈

一婦人陰器半邊腫痛身發熱寒熱口乾便秘脈實有力以內疎黄連湯一劑大便通利口乾乃止惟腫痛尤甚此溼毒結聚欲為濃也以四物湯加角針澤瀉二劑膿熟脹痛又以透膿散一服出臭膿鍾許痛止以八珍湯加丹皮澤瀉十餘劑而安

一婦人肝經風濕下流陰器浮腫痒甚至抓出血不痛

以消風散加苦參膽草澤瀉木通山甲外以蛇床子湯熏洗搽擦銀杏散十餘日痒止腫消而愈

一婦人婾居十餘日載陰器作痒生虫含忍不言後陰器蝕爛已蝕內臟疽贏發熱作渴脈洪而數詢其痒痛日久陰器黑腐小水不禁內臟已壞不可用藥彼苦求治曰痒者虫也痛者損也先用鯽魚數枚以香料糁炙魚熟以綿裹納入陰中夾之良久取出紅虫長者一寸短者五六分細如絲線約二十餘條置温湯中搖擺片時方死彼家懽悅以為可治曰再取再有生化無窮强投養血清肝藥終竟不應而死

錢國寶曰浙湖戴氏女年五歲胎生雙陰溺從上出下戶亦流因母病延診以私語言及余曰此女天生雙陰也不聞楞嚴經云五種不男之人即此類也長大經行生子如常以上竅為正從此勿疑撫養待配

鶴膝風

朱丹溪治一丈人年七十歲患脚膝疼稍腫此血虛而挾濕熱也用生地歸頭白芍蒼朮炒柏川芎桂木通水煎食前熱服 綱目

一男子年近三十滋味素厚性多焦怒秋間髀樞左右

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一點發痛延及膝骭晝靜夜劇痛處惡寒或渴或不渴或痞醫多用風藥無補血次年春其膝漸腫痛愈甚食減形羸至春末膝腫如椀不可屈伸診其脈左弦大頗實寸澁甚大率皆數知其小便必數而短遂作飲食積疾在太陰陽明治之炒柏一兩生甘草稍犀角屑蒼术鹽炒各三錢川芎二錢陳皮半膝痛漸輕去犀角加牛膝敗龜板半兩當歸半兩如前木通白芍各五錢遇暄熱加條芩三錢為細末每三錢重與生薑自然汁同研細多少以水溫起煎令沸帶熱食前飲之一晝夜四次與至半月後數脈漸減

前服又與半月腫漸減食漸進不惡寒唯脚膝疲軟未能久立久行去蒼术黃芩時當夏熱加炒柏至一兩半依本方內加牛膝春夏用蓮葉冬用根杵取汁用之效尤速須斷酒肉濕麵胡椒當仲夏加生地半兩冬加萊菔桂枝

鎮江外科史姓者曾治一人鶴膝風以蝦蟇用碗鋒畧破腹有縫不可穿縛置患處待動脇移時受毒輒死如前再易一枚不過二三枚愈戒菴漫筆○李詡

孫文垣治程紹溪中年患鶴膝風兩腿及腿肚內外膝肉盡削兩膝腫大乃酒後縱慾所致且四肢膿瘡淫

濕腌臢自分必死家人以病久醫藥破家不復求治矣孫以隣人之親往診左寸關浮數右寸短弱兩尺沈微曰此氣虛血熱之候法當大補壯其筋骨猶可冀生第非百日不見功蓋補血無速效必漸而濡之關節通利骨正筋柔腿肉自生初以龜版蚖仁各三錢蒼耳子五加皮頭二鹽沙節節香查各一錢當歸人參黃耆蒼朮杜仲黃柏各八分紅花五分十劑而瘡疥漸稀精神稍長再以苡仁五加皮龜版各二錢節節香蒼耳子地黃丹參蒼朮黃柏首烏各一錢人參當歸各八分紅花木通各五分三十帖可倚杖而行腿肉漸生瘡疥盡愈膝腫消去其六後以虎潛丸加鹿角膠首烏狗脊節節香牛膝用龜版膠為丸服三月腿肉復完而會愈

薛立齋治知州韓廷儀先患風症用疎風化痰養血之藥而瘓其腿膝骨肉俱消內發熱作痛服十味固本丸天麻丸益甚兩尺脈數而無力謂此腎水虛不能生肝木虛火內動而作非風邪所致也不信又服羌活愈風丹之類四肢痿軟偏身麻木痰涎上涌神思不清曰此皆脾氣虧損不能榮養周身又不能攝痰歸源先用六君子加芎歸木香數劑壯其脾氣以攝涎歸源

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

又以八珍湯數劑以助五臟生化之氣以榮養周身而諸症漸愈乃朝以補中益氣湯培養脾肺夕以六味丸滋補肝腎如此三月而安

一婦人久鬱怒膝腫胸脇不利內熱寒熱經候不調遍身痠痛此胃氣虧損先用補中益氣湯加半夏茯苓二十餘劑胃氣漸醒又用大防風湯與歸脾湯膝腫漸消用加味逍遙散大防風湯全消又用八珍湯加丹皮調理而安

一婦人患前症腫痛寒熱先用大防風湯一劑又用加味逍遙散四劑月餘腫痛漸退惑于速效另服祛風敗毒虛症蜂起仍用大防風為主佐以十全大補而消又服大補湯兩月餘而瘥

一婦人患前症兩拘中腿股筋牽作痛內熱寒熱此肝火氣滯之症先用加味小柴胡湯四劑後以加味逍遙散為主佐以大防風湯而消又患痢後兩膝腫痛寒熱往來用十全大補湯為主佐以大防風湯而仍

消

一婦人患之雖潰而腫不消朝寒暮熱飲食不思經水三四月一至此屬肝脾氣血俱虛也用補中益氣湯加味歸脾二湯各三十餘劑腫漸消而寒熱止又佐

以大防風月餘而能步履再月餘經行如期又服六味丸八珍湯三月而瘡斂

一男子腿筋弛長月餘兩膝腫痛此陰虛濕熱所乘也用六味丸為主佐以八珍湯加牛膝杜仲間以補中益氣湯三月餘而消

通府劉國威先筋攣骨痛右膝漫腫用化痰消毒之劑腫痛益甚食少體倦加祛風消毒等藥寒熱作嘔大便不實用二陳除濕之類腫起色赤內痛如錐診其脈滑而無力此膿已成元氣虛而不能潰也用十全大補湯四劑佐以大防風湯一劑而潰又百餘劑而

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

瘡

一男子腿痛膝腫脈浮按之弦緊此肝腎虛弱也用大防風湯二劑已退彼惑于附子有毒乃服治瘡之藥日漸消瘦虛症漸至復求治曰倦怠消瘦脾胃衰而不能營運也小便不禁膀胱虛而不能約制也燥熱虛痞胃氣弱而不能化也恍惚健忘精失而憒亂也惡症蜂集辭之後果歿（與下案畧同可刪其一）

一男子患腿痛膝微腫輕診則浮按之弦緊此鶴膝風也與大防風湯二劑已退二三彼謂附子有毒乃服敗毒藥日漸消瘦復求治薛謂今飲食不為肌膚水

穀不能運化精微灌溉臟腑周身百脈神將何依夫
氣短而促真氣損也怠惰嗜卧脾氣衰也小便不禁
膀胱不藏也時有躁熱心不虛痞胃氣不能上榮也
恍惚健忘神明亂也不治後果然此症多患于不足
之人故以加減小續命湯大防風二湯有效若用攻
毒藥必誤

一婦人膝腫痛遇寒痛益甚月餘不愈諸藥不應脉弦
緊此寒邪深伏於內也用大防風湯及大龍膏治之
而消大抵此症雖云腫有淺深感有輕重其所受皆
因真氣虛弱邪氣得以深襲若真氣壯實邪氣焉能
為患耶故附骨癰疽及鶴膝風症虛者多患之前人
用附子者以温補腎氣而又能行藥勢散寒邪也亦
有體虛之人秋夏露卧為冷氣所襲寒熱伏結多成
此症不能轉動乍寒乍熱而無汗按之痛應骨者是
也若經久不消極陰生陽寒化為熱而潰也若被賊
風所傷患處不甚熱而洒淅惡寒不時汗出熨之痛
止須大防風湯及大龍膏治之若失治為彎曲偏枯
有堅硬如石謂之石疽若熱緩積日不潰肉色赤紫
皮肉俱爛名緩疽其始末皆宜服前湯欲其驅散寒
邪以補虛托裏也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一人患鶴膝風五年數藥三日即愈王心涵傳乳香沒藥各一錢五分地骨皮三錢無名異五錢麝香一分各為末用車前草搗汁入老酒少許調敷患處廣筆記

薛立齋治一男子左膝腫大三月不潰謂體虛之人風邪襲於骨節使氣滯而不行故膝愈大而腿愈細名曰鶴膝遂風遂以大防風湯三十餘劑而消張工舍亦患此伏枕半載流膿三月彼云初服大防風湯去附子將潰服十宣散合用十全大補湯而去肉桂俱不應視其症甚弱乃以十全大補湯每貼加附子一錢服二十餘劑少愈乃去附子五分服至三十餘劑將愈乃去附子更以三十餘劑而痊蓋桂附當用而不用則無功也

王汝道膝腿腫筋骨痛服十宣散不應脈沈細以五積散二劑而痛止更以十宣散去桔梗加牛膝杜仲三十餘劑膿潰而愈此寒氣之腫入風之變也

脚

蘇頌曰水氣脚氣最為急症有人患此以袋盛赤小豆朝夕踐踏展轉之久久遂愈本草綱目○今人多誤赤豎而瞥小者耳其紅而大者不入藥為相思子其實即食豆

實材治一人患脚氣兩骭骨連腰日夜痛不可忍為灸
涌穴五十壯服金液丹五日全愈
一女人患脚氣忽手足遍身拘攣疼痛六脉沈大乃胃
氣盛也服宣風丸三十粒泄去而愈
張文定嘗苦脚疾無藥可療一日遊相國寺有賣藥者
得菉豆兩粒服之遂愈（瑯琊代醉編）
劉敬叔云禁陽鄭鮮之字道子為尚書左僕射女脚患
躄癖就王僕醫僕陽請水洗之餘洗庭中枯樹樹既
生女脚瘡（樵書初編）
鄱陽周順治一士人得脚弱病方書羅列積藥如山而
疾益甚令屏去但用杉木為桶濯足及令排樟腦于
兩股間以脚襯繫定月餘而安健如故南方多此疾
不可不知（遯齋閒覽）
六七叔婆血少氣多大便後脚痛而麻用當歸白芍白
朮青皮地黃川芎甘草桃仁煎服
薛立齋治一婦人兩脇赤痛寒熱口苦嘔吐懶食面色
青黃此肝木乘脾土用小柴胡湯加山庇升麻茯苓
二劑頓愈又用六君子湯加柴胡山庇全愈
一婦人飲食勞役兩腿焦腿疼痛或時寒熱薛以為脾
虛濕熱下陷用補中益氣湯加山庇茯苓半夏治之

而痊後復作用六君子湯加柴胡山梔全愈

一婦人經行後寒熱晡熱兩腿作痛此肝經血虛也用加味逍遙散加山梔治之而愈後因勞日晡內熱或用四物黃柏知母之類前症益甚更加食少作瀉薛以為元氣下陷前藥復傷先用六君子湯加補骨脂二劑調補脾胃而瀉止食進又用補中益氣湯升舉元氣而痊

一婦人年三十有七早孀居兩腿骨作痛晡熱體倦月經不調或發寒熱數年矣一日頸項兩側結核兩脇脹痛此係肝經鬱火而成也先用小柴胡湯合四物數劑肝症頓愈又用加味逍遙散加澤蘭乳香沒藥三十劑血症漸痊再用加味歸脾等藥年餘而安

一孀婦兩腿作痛或用除溼化痰等藥遍身作痛而無定處薛曰此血症也不信仍服流氣飲之類而歿

一放出宮人年四十餘髀腿內股作痛晡熱口乾月經不調此係肝經血少不能養絡經絡而然也宜用加味逍遙散加澤蘭葉五十餘劑諸症稍緩又以歸脾湯兼服二百餘劑而痊

一放出宮人髀腿腫痛內熱晡熱惡寒體倦咳嗽胸痞月經過期而少彼以為氣毒流注服清熱理氣之劑

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

益甚薛曰此乃肝經瘀血停留所致蓋肝經工貫兩
布脇肋循喉嚨下循腘內臁繞陰氣抵少腹主治之
法但當補其所不勝而制其所勝補者脾也制者肝
也經曰虛則補之實則瀉之此定法也彼不信仍服
前藥遂致不起

薛立齋治一儒者兩足發熱腳根作痛用六味丸及四
物湯加麥冬五味元參治之而愈後因勞役發熱惡
寒作渴煩躁用當歸補血湯而安

一婦人下體腫痛用人參敗毒散加蒼术黃柏威靈仙
痛減又以四物湯加蒼术黃柏防己紅花澤瀉而安

一人足熱口乾吐痰頭暈服四物湯加黃連黃柏飲食
即減痰熱益甚用十全大補湯加麥冬五味山藥山
萸而愈

吳孚先治褚仁甫病足腫虛軟無力頗能食醫與二妙
散加米仁木瓜牛膝防風之屬愈服愈憊此脾虛濕
熱下陷法當補脾升舉誤用下行之劑故愈下陷也
凡診是症須審右寸不數并能食否如數又不能食
則是痿症宜清肺熱不可不知即痿不可作痺治是也

張路玉治褚廷嘉患脚氣痼疾恒服腎氣丸不徹六七
年來宿患懇除之乃彙聚取术附桂附耆附參附等法

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

無采八風散中菊花鱉甲湯中鱉甲貝齒羚羊犀角
風引湯中獨活防已竹瀝湯中薑汁竹瀝為丸共襄
祛風逐濕之功服後必蒸蒸汗出不終劑而數年之
症頓愈

沈汝機子夏月兩膝脛至脚痛極僵挺不能屈者十餘
日或用敷治之法不效其脉輭大而數令拭去敷藥
與當歸拈痛湯二劑汁出而愈

陸養愚治邵完吾左臂尖腫痛引至膝膕行動不便眠
卧亦艱治療半年無效肌肉盡削診之沈弱似緩按
之遲遲兩尺沈數曰此由元氣虛弱寒溼乘之胃氣
不升陰火伏匿于下法當扶元升陽導濕清熱則痛
自止用補中益氣湯加蒼术黃柏猪苓澤瀉桂附少
許十劑其痛頓釋後去桂附五苓倍人參歸身月餘
肌肉漸生

張三錫治一人素有脚氣每發則引腰痛不可俛仰其
人雄飲明是濕熱脉濡而數投拈痛湯八劑漸減遂
以捉虎丹酒下二丸空心凡三服腿腕黑出黑汗永
不再發

陳三農治一人熱從脚起入腹視其形壯體實作濕鬱
成熱之候治之以潛行散加牛膝防已九服之而愈

一婦積勞病兩足如火燒即惡寒壯熱頭疼脘暈齒痛齒浮安卧片時少減日二三發此氣襯虛血俱虛虛火妄動所致以十全大補湯加五味四劑而愈

朱丹溪治一婦人脚疼怕冷夜劇日輕用生地白芍歸尾各五錢炒黃柏黃荅白朮右分四帖水煎帶熱服

一婦人脚乂骨痛用蒼朮白朮陳皮白芍各三錢木通二錢甘草五分二服送大補丸五十粒

儒者章立之左股作痛用清熱滲濕之藥色赤腫脹痛連腰脇腿足無力屻足三陰虛用補中益氣六味地黃兩月餘元氣漸復諸症漸退喜其慎疾年許而瘥

周都憲兩腿作痛形體清癯肝脉弦數却屬有餘之症用龍膽瀉肝湯治之而愈

一婦人兩腿作痛不能伸展脉弦緊按之則澁先以五積散二劑痛少止又一劑而止更以神應養真丸而能屈伸

一男子腿痛每痛則疾盛或作嘈雜脉滑而數以二陳湯加升麻二朮澤瀉羌活南星治之而安

一男子素有脚氣脇下作痛發熱頭暈嘔吐腿痺不仁服消毒護心等藥不應左關脉緊右關脉弦此亦脚氣也以半夏在左經湯治之而愈

一男子脚軟腫痛發熱飲冷大小便秘右關脉數乃足陽明經濕熱流注也以大黃左經湯治之而愈

一男子膿胜兼踝脚皆痠痛治以加味敗毒而愈

一男子兩腿腫痛脉滑而緩此濕痰所致也先以五苓散加蒼朮黃柏二劑少愈更以二陳二朮檳榔紫蘇羌活獨活牛膝黃柏而瘥夫濕痰之症必先以行氣利濕健中為主若中氣和則痰自消而濕亦無所容矣

一婦人兩腿痛脉濇而數此血虛兼濕熱先以蒼朮黃柏知母龍膽草茯苓防己羌活數劑腫痛漸愈又以四物湯加二朮黃柏牛膝木瓜月餘而愈

一婦人脚胜腫痛發寒熱脉浮數此三陽經濕熱下注為患尚在表用加味敗毒散治之不應乃瘀血凝結藥不能及也於患處砭去瘀血乃用前藥二劑頓退以當歸拈痛湯四劑而愈楊大受云脚氣是為壅疾治法宜宣通之使氣不能成壅也壅既成而甚者砭去惡血而去其重勢經云高則腫熱砭射之後以藥治之

一婦人兩腿痛遇寒則筋攣脉弦而緊此寒邪之症以五積散對四物湯數劑痛止更以四物湯數劑痛止更以四物湯加木瓜牛膝杜仲月餘而愈

版權所有 國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一男子腿腫筋攣不能動履以交加散二劑而愈

一婦人患腿痛不能伸屈遇風寒痛益甚諸藥不應甚苦先以活絡丹一九頓退又服而瘳次年復痛仍服一九亦退大半更以獨活寄生湯四劑而愈

一男子素有脚氣又患附骨疽作痛服活絡丹一九二

按此條宜於上條並瘡下空一格接落亦有痂不能愈

腿患有效而痂亦得愈矣夫病深伏在內非此藥莫能通達但近代始云此藥引風入麵如油入麵之說故後人多不肯服大抵有是病宜用是藥豈可泥于

民族圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

此以致難瘥

一男子素有腿痛飲酒過傷痛益甚倦怠脈弱以六君子湯加山查神麴蒼朮芍歸卅柴而愈

一老人素善飲腿常腫痛脈洪而緩先以當歸拈痛湯候濕熱少退後用六君子湯加蒼朮黃柏澤瀉治之而痊

一男子每飲食少過胸膈痞悶或吞酸兩腿作痛用導引丸二服頓愈更以六君子湯加神麴麥芽蒼朮二十餘劑遂不復作河間云若飲食自倍脾胃乃傷則胃氣不能施行脾氣不能四布故下流乘其肝腎之

一男子腿腫筋攣不能動履以交加散二劑而愈

一婦人患腿痛不能伸屈遇風寒痛益甚諸藥不應甚苦先以活絡丹一丸頃退又服而瘳次年復痛仍服一丸亦退大半更以獨活寄生湯四劑而愈

一男子素有脚氣又患附骨疽作痛服活絡丹一丸二

症並瘥

上舍俞魯用素有疝不能愈因患腿痛亦用一丸不惟腿患有效而疝亦得愈夫病深伏在內非此藥莫能通達但近代始云此藥引風入麵如油入麵之說故後人多不肯服大抵有是病宜用是藥豈可泥于此以致難瘥

一男子素有腿痛飲酒過傷痛益甚倦怠脈弱以六君子湯加山查神麴蒼术芎歸升柴而愈

一老人素善飲腿常腫痛脈洪而緩先以當歸拈痛湯候濕熱少退後用六君子湯加蒼术黃柏導瀉治之而瘥

一男子善飲食少過胸膈痞悶或吞酸兩腿作痛用導引九二服頓愈更以六君子湯加神麴麥芽蒼术二十餘劑遂不復作河間云若飲食自倍脾胃乃傷則胃氣不能施行脾氣不能四布故下流乘其肝腎之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

虛以致足腫加之房事不節陽虛陰盛遂成脚氣亦有內傷飲食脾胃之氣有虧不能上升則下注為脚氣者宜用東垣開結導引丸開導引水運化脾氣如脾氣虛濕氣壅遏不通致面目發腫或痛者宜用導滯通經湯以疎導之

一婦人患腿痛兼足脛攣痛服發散藥愈甚脈弦緊此肝腎虛弱風濕內侵也以獨活寄生湯治之痛止更以神應養真丹而弗攣矣神應養真丹熟四物加羌活天麻兔絲木瓜

王執中舊有脚氣疾遇春則足稍腫夏中尤甚至冬腫漸消偶夏間依素問註所說三里穴之所在以溫鍼微刺之翌日腫消其神效有如此者繆刺且爾況于灸乎有此疾者不可不知千金謂脚氣宜針灸藥三者並用○史載之謂不許其灸○措迷方云若覺悶熱不得灸之

凡灸脚氣三里絕骨為要而以愛護為第一王舊有此疾不履濕則數歲不作若履濕則頓作自後常忌履濕凡有水濕不敢著鞋踐之或立潤地亦不敢久須頻移足而後無患此亦愛護之第二義也有達官久患脚氣多服八味丸愈亦以脚氣衝心惟此藥能治之

有人舊患脚弱且瘦削後灸三里絶骨而脚如故益知黄君鍼灸圖所謂絶骨治脚疾神效信然也同官以脚腫灸承山一穴瘡即乾一穴數月不愈不曉所謂豈亦將攝失宜耶是未可知也

執中母氏常久病夏中脚忽腫舊傳夏不理足不敢著艾謾以針置火中令熱于三里穴刺之微見血凡數次其腫如失去執中素患脚腫見此奇效亦以火針刺之翌日腫亦消後常灸之凡治此當先三里而後陽蹻等穴也

王執中患脚氣指縫爛每以茶末糁之愈他日復腫而爛用茶末不效漸腫至脚背上以為脚氣使然竊憂之策杖而後敢行偶賣藥僧者見之云可取床薦下塵糁之如其言而愈此物不值一錢而能愈可憂之疾其可忽哉

一人筋動于足大指漸漸上來至大腿近腰結了奉養且厚曰酒食作此是熱傷血四物湯加酒黄芩紅花蒼术南星愈　治法○宜是丹溪

忠州太守陳逢原傳云渠前知坊州曰暑中取凉食瓜至秋忽然右腰腿間痠痛連及膝脛曲折不能經月右脚艱于舉動凡治腰脚藥服之無效兒子雲安刑

曹偶在商邑助教處得養腎散方服之繞一服移刻舉身麻癢不數刻間脚遂屈伸再一服即康寧又坊州監酒某年幾四十虛損兩脚不能行步試與此藥初進二錢大腿麻木遂能起立再服二錢大小指拇皆麻迤邐可行三服馳走如舊太室居士得此方乾道己丑歲在鄂州都幕府日宋判院審言久病脚膝緩弱不能行傳之數日來謝此疾經年無藥不服得方次日即合二服見效五服良愈今有力能拜起矣後數日又云舉遍身去諸皮如糊肌骨遂瑩其效如神其方用全蝎半兩天麻三錢蒼朮一兩去黑皮草烏頭二錢去皮臍生用黑附子二錢炮去皮臍右為細末拌勻加腎氣豆淋酒調一大錢豆用黑大豆能除去腰脚筋骨疼痛其效如神藥氣所至麻痺少時須臾疼痛隨藥氣頓愈

金山長老於張顯學甘露寺齋會上說此方渠嘗患脚氣嘗於天台一僧處傳方用木瓜蒸艾服之漸安後來住金山日日發動脚復痺重又一堂衆處得此方合服頗覺輕健勝前日方云破故紙炒一宿胡蘆巴炒牛膝酒浸一宿肉蓯蓉酒浸一宿川續斷揀淨杜仲去粗皮薑汁炒令絲斷黃色一畫夜用各四兩用為細末右用艾四兩去枝梗秤以大木瓜四箇切作合子去盡穰以

艾實之用麻綫札定蒸三次爛研和藥為丸如梧桐
子大每服五七十丸温酒鹽湯食後服
申屠府判傳脚氣流注四肢手指腫痛不可屈伸四物
湯去地黄加附子入薑煎服如常法遇疾作時服之
必愈
是齋云脚氣上攻流注四肢結成腫核不散赤熱燃痛
及治一切腫毒用甘遂為細末以水調傳腫處又濃
煎甘艸一味服之其腫即散二物本相及須兩人買
各處安頓切不可相和清流驪子韓詠苦此一服病
去七八耳服而愈云得之牛馬牙人醫者之意正取
其相及故以甘遂博其外而以甘艸引於內所以作
效如磁石引針之義也
並集成。三則
薛立齋治余舉人弟年及二十腿膝腫痛不能伸屈服
托裡藥及甚以人參敗毒散加枳橘木瓜紫胡紫蘇
蒼朮黄柏而愈
施沛然治張侗初足脛痛三年矣診之兩尺洮細而澁
此下焦元氣不足不能榮養筋骨宜用滋補舒筋之
劑不數服病少間會勞病旋作且甚再診則脈無浮
數元氣愈耗矣為製人參膏及河車天乙丸間服元

氣漸壯獨兩脛作楚不能除為製木萬靈膏去樟冰加韶粉蘇合油麝香以軟帛緊繫兩脛仍令飲甘草湯不頃刻而痛若失先是兩股傍亦覺痛用膏後并愈其方載本草綱目以意增損之後用黄耆建中湯加歸參滋養全瘳

吳橋治周千戶孫幼得軟脚疾治者以為痺也百治亡功橋診之六脈沈澀有力曰病由多服藥燥而傷脾氣脾氣不運故積濕痰氣下陷而痰從之故足重而軟耳劑以補中去濕加[艹]薢木瓜寄生半夏二劑減半四劑稿初

太函集

聶久吾甥年十九初患吐血用滋養清涼之劑而愈後曰體虛兩足感冒風寒徧身發熱初以為內熱也仍服清火化痰藥而未經發汗數日後遂成脚氣兩足腓及脚背腫痛又二日則兩膝痛甚不能屈伸曰而

遍身作熱絶似傷感且小便黃而大便澁予知其脚氣初發也用酒大黃二錢五分赤苓黃芩防己茵陳各一錢乾葛一錢二分枳殼炒製蒼术木瓜各七分厚朴前胡羌活防風牛膝各六分甘草二分水煎空心或飢時服

足跟瘡腫

府庠鍾之英兩腿生瘡色黯如錢似癬者三四痒痛相循膿水淋漓晡熱內熱口乾面黧此腎虛之症用加味六味丸數日而愈此等症候用祛風敗毒之劑以

致誤人多矣

一男子素遺精脚跟作痛口乾作渴大便乾燥午後熱甚用補中益氣加白芍元参及六味丸而愈

薛立齋治一婦人素血虚因大勞兩足發熱晡熱月經過期或用四物芩連飲食少思胸痞吐痰用二陳枳實黃連大便不實吐痰無度足跟作痛曰足熱晡熱月經過期肝脾血虚也胸痞吐痰飲食少思脾胃氣虚也蓋胃為五藏之根本胃氣一虚諸病悉至先用補中益氣加茯苓半夏脾氣漸健乃佐以六味丸補脾腎不兩月而痊

一婦人經候不調發熱晡熱胸膈不利飲食少思服清熱寛中消導之劑前症益甚更兼肢體痠痛服除濕化痰等藥經候兩三月一至服通經降火之劑足跟足趾作痛其熱如炙此足三陰虧損用補中益氣六味地黃兩月諸症漸退又用前湯并八珍湯兩月而康

一婦人勞則足跟熱痛作陰血虚用八珍而痊後遍身搔痒服風藥發熱抽搐肝脉洪數此肝家血虚火盛而生風以天竺膽星為丸用四物麥冬五味芩連炙草山梔柴胡煎送而愈

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

一婦人兩足發熱足跟作痛日晡熱甚此腎肝血虛用逍遥散六味丸五十餘劑諸症悉愈

朱丹溪治一人足跟痛痰有血熱用四物湯加黃柏知母牛膝之類治法

治脚汗用楊花著鞋中或如綿絮入在襪内尤佳百乙方

薛立齋治通府黃廷用飲食起居失宜兩足發熱口乾吐痰自用二陳四物益甚兩尺數而無力此腎虛之症也不信仍服前藥足跟熱痒以為瘡毒又服導濕之劑赤腫大熱外用敷藥破而出水久而不愈及用追毒丹瘡突如桃始信薛言滋其化源半載得瘥

一男子素不慎起居内熱引飲作渴體倦兩足發熱後足跟作痛或用清熱除濕之劑更加發腫又服敗毒之藥焮赤痛甚悋用祛毒清熱潰裂翻張狀如赤榴熱痛如雖内熱晡熱此因足三陰虧損朝用十全大補夕用加减八味丸外敷當歸膏兩月餘而愈其服消毒等藥而歿者不能枚舉

一膏粱之人兩脚發熱作渴左尺脈數而無力謂此足三陰虧損防患疽不信反服清熱化痰之藥更加晡熱頭暈又服四物知柏日晡熱甚飲食漸少而發疽乃用補中益氣六味地黃百餘服而愈其不信以致不

起者多矣

治遠行脚腫痛方用之可行千里輕便妙防風細辛艸烏等各為細末糝在鞋底內如著艸鞋即以水微濕過然後糝藥一法以蚯蚓塗腫處高閣起脚一夕即愈

醫說續編

薛立齋治楊錦衣脚跟生瘡如豆許痛甚狀似傷寒謂獵人被兔咬脚跟成瘡澡蝕為終身之疾若人脚跟患瘡亦終不愈因名兔囓也遂以還少丹內塞散治之少可次日納寵物痛反服攻毒藥致血氣愈弱腿膝癱軟而死蓋足跟乃二蹻發源之處腎經所由之地若瘡口不合則蹻氣不能發生腎氣由此而泄故為終身之疾況彼瘡先得于虛復不知戒雖大補氣血猶恐不及況服攻毒暴悍藥以戕賊之乎

王大國治南昌司理胡慎三左足患癰直穿脚底醫已數易日甚一日痛楚幾絕國至命急去數藥止服湯劑司理曰湯劑豈能生肌耶國曰願限半月全愈服至三四日瘡口漸合司理大喜纔二十日肌肉已滿

江西通志

柴嶼青治陳學士句山長男孝廉忽患兩足涌泉穴中俱有隱隱一青圈旋即破口出水疼痛異常延醫治

THE NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

之俱不識其症診之兩尺極微弱症屬少陰不足所
致遂定十全大補湯乃以年少畏服力勸之服二十
餘劑而愈

國家圖書館. NATIONAL CENTRAL LIBRARY. TAIWAN. R.O.C.

續名醫類案卷二十六

錢塘魏之琇玉橫撰

遺精

孫文垣治一人色慾過度夢遺精滑先服清相火之劑不效繼用固澁之劑亦無功求孫治與以玉蓂白丹濃煎人參湯送二錢兩服後稍固兼進六味地黃丸加蓮鬚芡實遠志五味子凡一月而愈玉華白丹鍾乳粉白石脂陽起石左顧牡蠣疑非孫案

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

李枝兩寸短澁兩尺洪滑闊弦孫診之問經可行否曰僅行一日亦黙滴耳曰此脈在良家主壽遺若不宜有也曰良然即御客時亦或遺遺則冷汗淋漓體倦不能支不與藥或問故曰金木相勝心神無主法在不治或謂人尚無恙何便至此曰弦為春令當金旺之時猶然猖獗設在卯月木旺火相則肺金枯瘦水之上源竭矣且腎脉洪滑枝以懲勝陰血既虧淋火愈熾陰虛則病陰絕則死今已咳嗽其兆見矣烏可治乎次年二月果死

薛立齋治朱工部勞則遺精齒牙即痛用補中益氣加半夏茯苓白芍并六味地黃丸更以十全大補加麥冬五味子而瘥

一男子白濁夢遺蕪脚作痛口乾作渴大便閉澁午後熱甚用補中益氣湯加白芍元參并加減八味丸而愈

龔子才治陳桂林秀才患夜夢遺精每月一二次或三五次遺後神思昏沈身體困倦診之六脈微濇無力此陰虛火動之症以辰砂既濟丸加紫河車龍骨服之數月奏效杳數患於不能謹守曰口占俚語一章以戒之曰培養精神貴節房更祛塵慮最為良食惟

半飽宜清淡酒止三分勿過傷藥餌隨時應勉進功名有分不須忙幾行俚語君能味便是長生不老方

黃履素曰余年三十外曾患遺精龜頭時有精微微流出晝夜常然初時驚懼特甚人身中幾許精血而堪此潛消不絕卒醫之高明者謂為無害但服牆藥緣病以服附子得之知是火症但涼補而勿熱補用六味丸加沙苑蒺藜兎絲子及炒黃柏少許等將藥此病付之度外莫實諸慽如常將理九兩年始全愈龍骨牡蠣等藥從未入口蓋人身中惟氣血周流斯快暢豈可澀之使滯雖得暫效為害實深患者審之

予初有懼心及兩年閱應酬如常絕無倦態豈此精與交媾之元精不同故無大害耶

張路玉治韓慕廬季子素稟清癯宿有精滑不禁之恙診之脈微弦而數尺中畧有不續之狀此不但腎氣不充抑且氣秘不調致不能司封藏之令與六味丸去澤瀉加鰾膠五味畧煎沉香於補中寓宣法雖如此但久滑竅疏難期速效耳

李士才治一人考試勞神患精滑小便後及夢寐間俱有遺失自服金櫻膏經月不驗李診之曰氣虛而神動非遠志丸不可服十日減半一月全愈

王叔權曰有士人年少覓炙夢遺為黙腎俞瘦瘵令其炙而愈不拘老少皆腎虛也古人云百病皆生于心又曰百病皆生于腎心勞生百病人皆知之腎虛亦生百病人未知也蓋天一生水地二生火腎水不上升則心火不下降茲病所由生也人不可不養心不愛護腎也資生經

平江譚醫云夫遺泄尋常只治心腎未有別治以素問仲景考之當治脾服之藥屢效用厚朴二兩薑製計羊脛一兩炭火煅過通紅取出研細如粉右二味白水麪糊為丸如梧桐子大每服百丸至百九米湯下集成○金上

陸祖愚治一人曰作夜深倚几而卧即夢遺明早吐血數口數日後復遺復吐自此或間日或連日或吐血或憂遺或與六味地黄湯幾百帖即加減亦不出滋陰清火而已數月不愈口乾微欬惡風惡寒懶于動作大便溏小便短赤脉之豁大無力沈按則駛曰此症非得之房室乃思慮太過損其心血心血虛則無以養其神而心神飛越曰有夢交之事神不守舍則志亦不固而腎精為之下遺腎虛則火益無制逼血妄行而吐上刑肺金而欬其畏風寒而懶動作者火為元氣之賊火旺則元氣自虛也其肌肉削而

大便溏者思慮損其心血即是傷其脾陰也與歸脾
湯二十劑遂吐遺減半又二十劑諸症俱痊百劑而
精神加倍矣

繆仲淳治婁東王官壽患遺精聞婦人聲即泄濬甚欲
死醫告術窮繆之門人以遠志為君蓮鬚石蓮子為
臣龍齒茯神沙苑蒺藜牡蠣為佐使九服稍止然終
不繼繆于前方加鰾膠一味不終劑即愈

趙景之太史未第時因肆業勞心太過患夢遺症已三
四年矣不數日一發發過則虛火上炎頭面烘熱手
足逆冷終夜不寐補心腎及澀精藥無不用過壬申
春偶因感冒來邀診視談及前症之苦為疏九方以
黃柏為君佐以地黃枸蓮鬚鰾膠黃肉五味車前後
天麥冬之類不終劑而瘳初景之疑黃柏太寒不欲
用謂尊恙之所以久而不愈者政未用此藥耳五藏
苦欲補瀉云腎欲堅急食苦以堅之黃柏是也腎得
堅則心經雖有火而精自固何夢遺之有哉向徒用
補蓋收澁而未及此故難取效

薛立齋治王上舍遺精勞苦愈甚坳中結核服清心蓮
子飲連翹消毒散不應以八珍湯加山藥萸肉遠志
十餘劑漸愈更以茯苓丸治之遂不復作葉巡檢患

此云諸藥不應盧丹谷與八味丸治之而愈

白濁

沈朗仲治王雨泉壯年氣弱溺後精水淋漓不斷服六味丸不應易八味丸反加澁痛兩尺脉數而氣口虛大此土虛不能隄水也與補中益氣加麥冬五味十劑而瘥 張氏醫通

薛立齋治一婦人善怒或小腹痞悶或寒熱往來或小便頻數時下白濁藥久不愈面青口苦此積憤而不能發散所致用龍膽瀉肝湯而愈用加味逍遙散八

珍湯間服而安 立齋為一代醫宗全由知得肝病其小柴胡及逍遙龍膽瀉肝從事其間亦多美未至處則未達乙癸同源之義惟以

一男子莖中痛出白濁小便閉時作痒用小柴胡加山卮澤瀉木通炒連膽草茯苓二劑頓愈又與六味地黃而瘥

司廳陳石鏡久患白濁發熱體倦用補中益氣加茯苓半夏四劑白濁稍止再用六味地黃丸與服諸症悉愈

少宰汪漚齋患頭暈白濁用補中益氣湯加茯苓半夏愈而復患腰痛用山藥山萸五味萆薢遠志頓愈又曰勞心盜汗白濁以歸脾湯加五味而愈後不時眩

暈用八味丸全愈

孫文垣治一人稟質素強縱飲無度忽小便畢有白精數點自以為有餘之疾不宜醫治經三月以來雖不小便時有精出覺頭目眩暈此上病多由下之證驗也醫者以固精澁脫之劑治之兩月略不見功診之六脉滑大此因酒味濕熱下注精藏遂以白朮茯苓橘紅甘艸乾葛白豆蔻加黃柏少許兩劑即效不十日全安

潘見所患白濁精滑遺下治三年不效孫診之兩寸短弱兩關滑兩尺洪滑曰疾易愈弟待來年春仲一劑可瘳問故曰素問云必先歲氣毋伐天和今所患為濕痰下流症也而脉洪大見於尺部為陽乘於陰法當從陰引陽令冬令為閉藏之候冬之閉藏實為來春發生根本天人一理若強升提之是逆天時而洩元氣也後醫者接踵竟無效至春分逆孫白螺螄殼火煅四兩消痰為君牡蠣二兩固澁為臣半夏消痰葛根升陽明之清氣黃芩燥濕各一兩為佐黃柏堅腎一兩為使麪糊為丸名端本丸令早晚服之不終劑而愈李士材治李郡侯白濁服五苓散數劑無功診之兩尺大而濇是龍火虛炎精瀉竅道用牛膝茯苓黃柏麥冬山藥遠志細生甘艸十劑而安

吳光祿閉精行房患白濁莖中痛如刀割自服瀉火疎利之劑不效改服補腎之劑又不效李診之曰精久畜已足為害況勞心之餘水火不交坎離頻用也有語病用蓮蘗分清飲加茯神遠志肉桂黃連四劑即效蕭服補中益氣一二劑而愈

陸祖愚治韓舜臣年近三旬夏月遠歸連宵多事臥當風涼致成瘧疾間日一發自以為虛而投參附凡用參二三錢及五錢者數十劑一醫用參一兩附三錢又八劑服參約及二斤其病寒輕而熱重偶于靜坐時覺陽道微濕以紙拭視如漿糊一點白而光亮訝為滑精漆漏若此無怪大劑補養無效決死無疑及診視正當悲哀之後面赤如妝六脈洪滑而數曰脈候無事不必張皇令將溺器滌淨次早診之脈罷和而仍滑大令傾溺器中有白膩稠粘約半椀許乃曰當此短夜去已如許之多則從朝至暮自當加倍此是白濁非滑精也試思少壯之時與交感輸洩之精能有幾何病者始大悟乃用蓮蘗分清飲川萆薢石菖蒲益智烏藥茯苓甘艸四劑其症減半又以二陳湯加升麻柴胡蒼朮白朮十餘劑濁淨而瘧亦止夫奇經之脈督行于背脊任行於腹外衝行於腹中溺

COLLECTION OF NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

出于前自膀胱而來精出出于後自俠脊腎藏而來
男濁女帶自胃家傍衝而下蓋衝為血海其脈起于
浮中脈起浮中則不得謂膀胱無與也丹溪曰胃中濁液下流滲入
膀胱上句極為有理下句恐未必然曾詢患濁者小
水或清或渾其濁或隨溲溜而下或不時淋瀝可見
與膀胱竟不相干又見患此症者經年累月飲食照
常起居如故非胃家濕熱而何此君加之以勞頓醉
飽陰虛貪涼而得故得補益甚丹溪曰二陳湯加艹
提能使大便潤而小便長前後二方昔賢所驗第後
人未知用耳按精與溺原分二道所云良是至謂濁
不由膀胱而出自胃傍衝而下然則湯

飲入胃獨不可傍衝而下乎不知帶濁之病多由肝
火熾盛上蒸胃而乘肺肺主氣氣弱不能散佈為津
液反曰火性迫速而下輸膀胱之州都本從氣化又
肝主疏泄反稟其令而行遂至淫淫不絕使惟胃家
濕熱無肝火為難則上為痿而下為濁耳古今醫案
于帶濁二門獨罕存者亦以未達其旨而施治無驗
也至單由濕熱而成一味涼燥雖葉肆工人亦能辨
此○其父肖愚一案治吳南印之子亦瘵且濁以二
妙散取效

薛立齋治光祿繁蒲菴因勞赤白濁如注用歸脾湯而愈

司廳張撿齋小腹不作痛葉出白濇用小柴胡加山梔龍膽艸山茱芍歸而愈

馬元儀治陳晉臣患濁症累月不止後因房勞痛益甚

濁愈頻有語以煎蘇葉湯澡洗者從之遂致精滑傾
盆躁擾不寧發熱煩渴兩手脈俱沈而微尺脈不應
曰此陰精大傷真陽無偶將脫不乘此時陰氣尚存
一綫以急救其陽而通其陰直至除盡而欲回陽竿
克有濟矣或曰既有陽無陰補陰猶恐不及尚堪純
陽之藥重竭其陰乎曰真陽以水為宅水足則凝然
不動水竭則不安其位甚而飛揚屑越熟能把握之
哉此時陰陽並離似宜兩補然陰氣易虧而難復若
救其陰恐陰未回而陽已絕矣宜急攝虛陽先歸窟
宅然後補陰以配陽此必然之次序也乃煎大劑白

通湯與服便得濃醲諸症漸已次服人參七味湯使
陰陽兩平而愈

蕭萬與治一健卒年甫三旬素善飲喜啖辛香病濁竅
痛以二陳湯加芩連膽艸赤芍車前二劑即止如實
症本不難治若緊施補必變生他症矣

潭庠林震伯素善飲因修造勞頓飢飽失時復冒暑病
白濁經年不瘥察前治非辛熱即涼濕或滋補壅塞
遂至小腹脹悶或氣喘拒食六脉滑數無力此中宮
虛熱津液下陷膀胱氣化不能分泌以歸脾湯去木
香加炒山庖半夏車前黃連七劑而濁止便清神思

清爽矣

施笠澤治公謨病小便黃濁醫欲用淡滲之劑施曰霸樞不云乎中氣不足溲便為之變但當服異攻散加黃柏一二分可也醫曰黃柏一二分遂足清利小便耶曰子不觀之漉酒者乎濁醪數斗以黃柏少許旋澄清徹底豈一淅不當之衆皆大噱用之果驗蕭施三條

皆采選入

蔣仲芳治梁敬州年六十餘病濁三年夫淡滲寒涼温補俱不效診之六脉俱微惟左寸帶數此曰心火不降致脾胃之氣不升濁物因而下滲法當養心升補若用本病藥無益也用丹參茯神遠志棗仁山萸山藥黃耆白朮升麻柴胡甘艸陳皮薑棗煎服三劑其濁倍至詢其體健否曰如故曰若使所出盡為津液其體必憊甚今濁增而體健知濁物積于其中為藥所迫而出耳清者既升濁者自降再服二劑而病如失矣投之果然使無定見耳易一方寧能愈乎

淋

又名癃閉

張子和治酒監房善良之子年十三病沙石淋已九年矣初因瘡疹餘毒不出作便血或告之令服太白散

稍止後又因積熱未退變成淋閟每發則見鬼神號
則驚隣張曰諸醫作腎與小腸病者非也靈樞言足
厥陰肝之經病遺溺閉癃閉謂小便不行癃謂淋瀝
也此乙木之病也木為所抑火來乘之故熱在脬中
下焦為之約結成沙石如湯瓶煎煉日久熬成湯鹼
今夫羊豕之脬吹氣令滿常不能透豈真有沙石而
能漏者邪以此知前人所說服五石散而致者恐未
盡然經曰木鬱則達之先以瓜蒂散越之次以八正
散加湯鹼等分頓啜之其沙石自化而下

張氏兒年十四病約 年半矣得之麥秋發則陽大痛
至握其峻跳躍旋轉號呼不已小溲數日不能下下
則成沙石大便秘澁肛門脫出一二寸諸醫莫能治
張曰今日治今日效時日在辰巳間矣以調胃承氣
僅一兩加牽牛末三錢汲河水煎之令作三五度嚥
之又服苦末丸如芥子許六十粒日加晡上涌下瀉
一時齊出有膿有血既定令飲新汲水一大盞小溲
已利一二次矣是夜凡飲新水二三十遍病去九分
止哭一次明日困臥如醉自晨至暮猛然起走索食
與母歌笑自得頓失所苦繼與太白散八正散等調
一日大瘥此下焦約也不吐不下則下焦何以開不

令飲水則小溲何以利大抵源清則流清者是也又
劉氏子年六歲病沙石淋張以苦劑三涌之以益腎
散三下之立愈
一人年二十三歲病膏淋三年矣醫不能效多作虛損
補以溫燥灼以針艾無少減張曰感蠱之疾也亦曰
白濁實由少腹窠熱非虛也可以涌以泄其人以時
暑憚其法峻不決者三日浮屠一僧曰予以有暑病
近覺頭痛張曰亦可涌願與君同之毋畏也于是涌
痰三升色如黑礬汁內有死血并黃綠水又瀉積穢
數行尋覺病去方其來時面無人色及治畢次日面

如醉慮其暑月路遠又處數方使歸以自備云
一男子病淋張令頓食鹹魚少頃大渴又令恣意飲水
然後以藥治淋立通淋者無水故澇也
王熱中曰一婦人患淋久諸藥不效其夫夜告余予按
既效方治諸淋用剪金花十餘葉煎湯遂令服之明
早來云病減八分夫再服而愈剪金花一名禁宮花
一名金盞銀臺一名王不留行（王執中資生經○本艸綱目）
葉朝議親人患血淋流下小便在盆內凝如菰蘿火而
有變如鼠形但無足耳百治不效一村醫用牛膝根
煎汁日飲五服名地髓湯雖未即愈而血色漸淡火

迺復舊後十年病又作服之又瘥按楊士瀛直指方云小便淋痛或尿血或沙石脹痛用川牛膝一兩水二盞煎一盞溫服一婦患此十年服之得效土牛膝亦可入麝香乳香尤良本艸綱目

薛立齋治一婦人患小便淋瀝內熱體倦以為肝火血少脾氣虛弱用八珍逍遙二散兼服月餘而小便利又用八珍湯而氣血復

一婦人素善怒小便淋瀝不利月經不調半載矣或兩脇脹悶或小腹作痛或寒熱往來或胸乳作痛或咽喉噎塞或兩腳筋攣或肢節結核面色青黃不澤形氣日瘦左關弦洪右關弦數此鬱怒傷肝脾血虛氣滯為患朝用加味歸脾湯以補脾氣解脾鬱祛肝火夕用滋腎丸生肝散滋腎水以生肝血抑肝火舒筋膜兼服月餘而愈

一婦人小便淋澀小腹脹悶胸滿喘急諸藥不應以為轉筋之症用八味丸一服小便如涌而安

孫文垣治杭芝岡酒後近內每行三峰採戰對景忘情之法致成血淋自仲夏至歲杪未愈便下或紅或紫中有塊如筋膜狀或如蘇木汁間有小黑子三五日一發或勞心力或久坐立亦發百治不瘥診之其色

白而青肌肉削甚脉左寸沈弱關尺弦細右寸畧滑此必肺經有濁痰肝經有瘀血良由酒後竭力縱慾濕火交煽精欲出而強忍之致凝滯經絡流於溺道新血阻塞而成此症也三五日一至者盈科滿溢故耳先與丹參加茅根濃煎服其小便在器中少頃即成金色黃沙乃用腎氣丸加琥珀海金沙黃柏以杜牛膝連葉搗汁熬膏為丸調理外以川芎三錢當歸七錢杜牛膝煎服臨發時以滑石甘艸梢桃仁海金沙麝香為末以韭菜汁調服去其凝精敗血則新血始得歸源而病根可除矣三月全愈

族姪善飲好內病血淋與滑石甘艸梢海金沙琥珀山庶青蒿茅根煎膏為丸梧子大每空心及食前燈心湯送三錢不終劑而愈後數年服補下元藥過多血淋又作小便痛極立不能出必蹲便乃得所出皆血塊每行必一二椀許已半月諸通利清熱之劑不應脈洪數以五靈脂蒲黃甘艸梢各二錢水煎空心服二帖痛減半改用瞿麥山庶甘艸各二錢茅根杜牛膝連葉車前艸各三錢生地葉胡木通黃柏各一錢四帖痛減血止惟小便了而不了以人參萄根青蒿白术茯苓甘艸牙麻黃柏知母而痊

康侯云治暑氣在內小便血淋用白虎湯加麥冬煎屢取其效此亦有理志雅堂雜抄○周密

李時珍治一男子病血淋痛脹祈死李以藕汁髮灰每服二錢服三日而血止痛除本艸綱目

深師療淋用葛上亭長折斷腹腹中有白子如小米三二分安白版上陰二三日收之若有人患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水如棗許著小杯中仍用研之當屈編見於水中仰面吞之勿令近牙齒間藥雖微下候自覺至下焦淋所有頃藥作大煩急不可堪飲乾麥飯汁則藥熱止也若無乾麥飯但

水亦可耳老小服三分之一當下淋疾如膿血連連耳去者或如指頭或青或黃不拘男女皆愈若藥不快淋不下以意節度更增服之此蟲五六月為亭長頭赤身黑七月為斑蟲九月為地膽隨時變耳全上

李士材治嚴邑宰患淋經年痛如刀錐凡清火疎利之劑計三百帖病勢日甚脉之兩尺數而無力是虛火也緣泥痛無補法愈疎通則愈虛愈虛則虛火愈熾遂以八味地黃料加車前沈香人參服八劑痛減一二而頻數猶故前醫復云淋症作痛定是實火若多溫補恐數日後必將悶絕不可救矣彼疑而問李李

曰若不宜溫補服藥後病勢必增今既減矣復可疑爭朝服補中益氣湯晚服八味丸逾月而疾去其九更倍用參耆十四日霍然矣

杜司寇夫人淋瀝兩載靡藥不嘗卒無少效診之兩尺沈數謂有瘀血停留法當攻下因年高不敢輕投但於補養氣血之中加琥珀牛膝此等緩劑須以數十劑收功而夫人躁急求效輒欲更端遂致痼疾

馮楚瞻治李恭領年將六旬患淋兩載有時頻利且速有時點滴難通急痛如割肥液如膏或成條縈血日夜不堪時欲自盡詢所服有醫立通利止濇二方遇頻利則用止濇遇秘塞則用通利 此輩仗倆原只如此乃服通利則頻數無度矣服止濇則結滯難通矣按其脈兩寸甚洪餘皆無力獨肝腎更甚曰肝主疎泄腎主開藏今肝腎俱病各廢乃職利則益虛其虛澁則愈增其滯惟調補肝腎自愈用八味加麥冬二錢升麻八分紅花四分重用人參煎服使清者升濁者降痛者化中氣既足肝腎既調開闔自然得所矣後以生脉飲送八味丸于空心以歸脾加減服于午後全安

一少年勞心色慾過度患小便淋瀝脹疼且二便澀痛

其脉兩寸沈微左關甚弱右關微滑兩尺弦譫乃心肺之氣不足下脇肝腎之氣又不足不能疎洩開藏清陽不升中宮鬱滯滲入膀胱乃以淋非淋二便澀痛如大痺泄也令早服六味加黃柏製附子使寒熱互為向導以去濕熱食遠用補中益氣去陳皮柴胡加茯苓防風酒炒其渣臨晚煎服探吐遂愈

張路玉治內閣文湛持夏月熱淋醫用香薷飲益元散五日不應淋譫轉甚反加心煩不寐診之見其唇齒燥多汗喘促不時引飲脉見左手虛數知為熱傷元氣之候與生脉散頻進代茶至夜稍安明日復苦溲便澀數然其脉已和仍用前方不時煎服調理而瘥

太史沈韓倬患膏淋小便頻數晝夜百餘次晝則滴瀝不通時如欲解夜雖頻進而所解倍常溲中如脂如漦者甚多服清熱利水藥半月餘其勢轉劇面色萎黃飲食薰退脉得弦細而數兩尺按之益堅而右關尤甚大少力此腎水素虧加以勞心思慮肝木乘脾所致法當先實中土使能隄水則陰火不致下溜清陽得以上升氣化通而瘥澀瘳矣或曰邪火亢極反用參耆補之得毋助長之患乎抑知陰火乘虛下陷非

關提清陽不應譬之水注塞其上孔傾之涓滴不出
所謂病在下取之上若清熱利水氣愈隘精愈脫而
溺愈不通矣遂與補中益氣湯用人參三錢服二劑
痛雖少減而病者求速效或進四苓散加知母門冬
沙參花粉甫一劑徹夜痛楚於是常服前方煎六味
丸用紫河車熬膏代蜜調理服至五十劑參盡斤餘
而安

陝客亢仁軒年壯色蒼體豐善啖患肥痺十餘年治吳
求治其脈夾大而濇濇不調不時蹲踏於地以手採
其葉囊則溲從穀道點滴而淡必以熱湯沃之始得
稍通窺則有時而遺其最苦者中有結塊如橘核外
裹紅絲內包黃水祥祭於腊臘之中此因濕飲不禁酒
濕乘虛入髓竅而為患因令堅戒炤炉火酒濕麪椒
蒜糟醋雞豚炙煿等味與半夏茯苓豬苓澤瀉蕈蘚
犀角竹茹作湯四劑不應則以不遵禁忌故乃令堅
守勿犯方與調治仍用前藥四劑勢減二三次與腎
瀝湯加蕈蘚數服水道遂通溲亦不痛但食不甘美
後以補中益氣加車前木通調之而安肥盛多濕故
先與清胃瀉
疾而後理
腎調脾

侍衛金漢光年逾花甲初夏誤飲新酒致病前則淋瀝

膚痛後則四肢腫突此陰虛熱陷膀胱也先與導赤散次進補中益氣勢漸向安惟孔中膚痛未除或令進益元散三服遂致遺溺不能自主投劑不應直至新秋脈漸爽弱因採腎瀝之義以羯羊腎製補骨脂羊脬製菟絲子濃煎桑根皮汁製螵蛸連進三日得閔少江年高體豐患胞痺十三年歷治罔效凡遇勞心嗔恚或飲食失宜則小便頻數滴瀝膚痛不已夜略交睫即滲漉而遺覺則阻滯如前服人參鹿茸紫河車無算然皆無礙獨犯丹皮白朮即脹痛不禁（香燥之藥誤投世罕知也）張診之曰病名胞痺（俗名尿哽病）惟見於內經由膏粱積熱於上作強傷精于下濕熱乘虛聚于膀胱胱素悶行胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃以湯膚于小便上為清涕詳其文則知膀胱胱虛滯不能上吸肺氣肺氣不清不能下通水道所以膚滯不利得湯熱之助則小便澀澀微通其氣循經蒸發肺氣一暫開則清涕得以上泄也因與腎瀝湯方服之其效頗捷原其寢則遺溺知肝虛火擾疎泄失宜所以服丹皮疎肝之葉則脹不勝氣之竄以擊動陰火也服白朮亦脹者不勝其味之濁以壅滯濕熱也（肝腎病不宜白

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

术服人參鹿茸河車無礙者虛能受熱但補而不切於治也更擬加減桑螵蛸散用羊腎湯送九庶有合于病情然八秩之年猶恃體豐不遠房室藥雖中窾難保其不復也與前陝客案症治畧同

黃元吉年六十餘因喪朋畜妾患小便淋瀝春間顛仆昏憒遺溺後遂時遺或發或止至一陽後其症大劇晝則苦于不通夜則苦于不禁其脈或時虛大或時細數而左關獨弦此腎氣大虧而為下脫之兆也乃與地黃飲子數服溺濇少可遺亦少間後與八味丸去丹皮澤瀉加鹿茸五味巴戟遠志調理而安

新安富室有男子淋溺不止者漸瘦黃諸醫束手孫卓三治之亦弗效偶隨几坐以手戲弄水潅後孔塞則前竅止開則通為膀後一穴灸火三炷立愈江西通志

王宵堂治外兄賀晉卿因有不如意事又當勞役之後忽小腹急痛欲溺溺中有白物如膿并血而下茎中急痛不可忍正如滯下後重之狀日夜十數行更數醫不效乃作污血治令以牛膝四兩浸一宿長流水酒十碗煎至八碗再入桃仁一兩去皮炒紅花二錢五分當歸梢一兩五錢木通一兩生甘艸梢二錢五分芎麻根二莖同煎至二碗去渣入琥珀末二錢麝香

少許分作四服一日夜飲盡勢減大半按素問奇病論云病有癰者一日數十溲此不足也今瘀血雖散宜用地黃丸加兎絲杜仲益智牛膝之屬補陰令不足以杜復至回循未及修治遂不得全愈或閉或通一夜數十起溺訖痛甚竟服丸及以補腎之藥入煎劑調理而安

從兄尒祝得淋疾日數十溲畧帶黃服五苓散稍愈曰腹中未快多服利藥三五日後忽見血星醫以八正散治之不應詢其便後時有物如膿小勞即發診得六脈俱沈細右尤甚此中氣不足也便後膿血精內敗也經云中氣不足則溲便為之變宜補中益氣湯加順氣之藥以滋其陽六味地黃丸疎內敗之精以補其陰更加五味子歛耗散牛膝通脈絡數劑而安

蕭萬輿治鄭友患淋經年屢治罔效曰淋症有虛實寒熱之殊今君年未三旬元氣充實因修造勞役飲食不調復喜火酒脾受濕氣時當炎令丁火司權丙火協應故心移熱小腸五火因而內灼上肺燥口渴下腎燥淋結前服八正五淋只專治淋而未知清水上源滋益肺金故不效以二陳小柴胡加龍膽艸知母木通麥冬一劑減數劑全癒

朱馬司六間年五旬艱嗣不慎酒色飲食起居失宜面目青黑怒則暈大便秘塞脫血小便淋血如割屢服清火通淋之劑反增劇脉沈遲兩尺無澁此腎水枯竭不能滋生肝血遂致虛火上炎移熱二腸迫血下行因而隧道澀枯紡礙升降故每欲便疼塞難堪須用甘温之品滋益化源補養肝木使陰血盛則津液充而淋秘自解夫以補中益氣湯去柴胡倍人參加牛膝少加肉桂及加減八味凡入人參薤蓉遠志服月餘漸愈

疝

杜壬治三十七太尉忽患小腸氣痛諸醫不效每一發幾死上召杜至進藥不數服無驗太尉曰我命不久致良醫不能治上召杜問所以杜對臣用古方皆不獲愈今日撰一方容進上遂合藥以進一服十愈八九再服全愈因名方曰救命通心散川烏頭一兩用青鹽一錢酒一盞浸一宿去皮尖焙乾川楝子一兩用巴豆二十一粒同炒候黑色去巴豆茴香半兩右燕一對土狗五枚芥子一錢六分為末每服三錢入

羊石子內濕紙煨香熟夜半時用好酒半升入鹽細嚼石子以酒嚥下不得作聲其病遂去（曹五家今秘此方○綱目）

辛稼軒初自北方還朝官建康忽得疝疾重墜大如杯有道人教以取葉珠（即薏苡仁）用東方壁土炒黃色然後小煮燥入砂盆內研成膏每用無灰酒調下二錢即消程沙隨病此稼軒授之亦效（宦遊紀聞）

張子和治殄寇鎮一夫病癪癧發渴痛飲寒漿劇傷冰水醫者莫知瀉去其濕反雜進薑附濕為燥熱所壅三焦閉溢水道不行陰道不興陰囊腫墜大於升斗張先以導水百餘丸少頃以猪腎散投之是夜瀉青赤水一斗遂失痛之所在又頹尾一夫病卒疝赤腫大痛數日不止諸藥如水投石張以導水一百五十丸令三次咽之次以通經散三錢空腹淡酒調下五更下臟腑壅積之物數行痛腫皆去不三日平復如故（查舊案癧濕二門）

李審言因勞役飲水坐濕地乃濕氣下行流入脬囊大腫痛不可忍以金鈴川楝子等藥不效求治於張曰可服泄水丸審言惑之又數日痛不可堪竟從張先以舟車丸濬川散下青綠沫十餘行痛止次服茴香丸五苓以調之（本下宜有散字）三日而腫退至老更不作夫

疝者乃肝經也下青沫者肝之色也

王敏之病寒疝臍下結聚如黃瓜每發繞臍急痛不能忍以舟車丸猪腎散即煨腎散下四五行覺藥繞病三五次而下其瀉皆水也猪腎甘遂皆苦寒經言以寒治寒萬舉萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食乾物以寒疝本是水故也即日病減八分食進一倍又教以舟車丸百餘粒通經散四五錢服之利下候三四日又服舟車丸七十粒猪腎散三錢乃健步如常矣

一僧病疝發作冷氣上攻腎齒下攻腎睾若繩挽兩睾時腫而冷兩手脈細而弱斷之曰秋脈也此因金氣在上下伐肝木木畏金抑而不伸故病如是肝氣礧磈薄不能下榮于睾丸故其寒實非寒也木受金制傳之胃土胃為陽明故上攻齒病非齒之病肝木者心火之母也母既不伸子亦屈伏故下冷而水化乘之經曰木鬱則達之土鬱則泄之令涌泄四次果覺氣和睾丸痒而暖此氣已入睾中也以茴香木茂之藥使常服之一月而愈

霍秀才之子年十二睾丸一旁腫脹見之曰此因驚恐得之驚之為病上行則為嘔血下則腎傷而為水腫以琥珀通經散一瀉而消散查新案○重腫脹門

朱丹溪治鄭子敬因喫酒後飲水與水果偏腎大時作蛙聲或作痛炒枳實一兩茴香鹽炒炒卮子各三錢研煎下保和丸兩字疑悞或作數服

諟兄年三十左腎核腫痛此飲食中濕墜下成熱以橘核即臭橘五枚桃仁七枚細研順流水一盞煎沸熱下保和丸

龔子才治一船家小腸疝氣腫痛不可忍又病兩眼腫痛貽淚隱濇兩寸脉洪數兩尺脉微此上盛下虛之症用涼藥治眼則疝痛愈增用熱藥治疝則眼痛愈盛百治不效與木香金鈴丸空心服以治下焦之虛寒以退血散卧時服以治上焦之風熱各三服均愈

趙雪山因房勞後五更起早感寒疝氣痛不可忍增寒戰慄六脉微而無力以五積散加茱萸小茴香又與蟠葱散俱不效後以艾灸之將患人兩脚掌相對以帶子綁住兩中指合縫處以艾炷麥粒大灸七壯完痛止神效按肝脉起足大指旁大敦穴子和治一人瀉大敦穴而愈此云灸足中指未詳其義

子才親家周少峰患疝氣偏墜腫痛不可忍遇秀才傳一方用黄土水和作乾泥柏作大餅子火上烘熱熨痛處冷則再易立愈

萬密齋治朱氏子病卵腫逾年不消成癩疝矣問萬萬

曰足厥陰肝經之脉環陰氣肝之病為怒小兒性急多哭者常有此病一名氣卵常見人病此者不廢生育與壽無干日有治法否曰有但勿求速效可也用川楝肉小茴香青皮山萸肉木香當歸川芎海藻三稜莪朮二味用黑犲牛囘炒去犲牛不用共為末神麴為丸溫酒下更炙臍旁穴而腫消矣

喻嘉言治胡翁常苦脾氣不旺通年小腹有疝形如雞卵數發後其形漸大而長從小腹墜入囊囊甚易逸位甚難下體稍受寒即發發時必俟塊中冷氣漸轉暖熱始得縮入不然則脹於隘口不能入也近來益

大如卧酒瓶於脅上半為小腹半在囊囊堅緊如石其勢迸入前後腰臍各道筋中同時俱脹上攻入胃則大吐上攻顛頂則戰慄畏寒喻診之知為地氣上攻亟以大劑參附薑桂投之一劑而愈以後但發悉用桂附速效若服十全大補則不應以半陰半陽之藥勿克勝病也凡陰邪為害不發則已其發必暴試觀天氣下降則清明地氣上升則晦塞醫遇直中陰經之病尚不知所措手況雜症乎茅薑桂性熱屢服則慮其僭上舊病未除新病必起乃先以薑桂附子為小丸曝令乾透然後以參朮厚為外廓俾喉胃間

國立中醫藥學院 鈔本

知有參朮不知有薑桂附子及達積塊之所猛烈始露于是病乃漸瘳

孫文垣姪患偏墜臍腹腰俞俱脹痛左關脈弦大躁指小茴香甘草蒼朮益智仁防風各五分荔核橘核山查柴胡各一錢山甲青皮各七分服後其痛如舊脉且轉數恐作囊癰急為解毒瓜蒌五錢當歸甘草節金銀花各一錢連翹柴胡青皮各七分煎服痛定腫消因食鱉魚臍腹復脹痛發熱不能眠脉復弦以山查瓜蒌各二錢金銀花連翹各八分甘草節黃連當歸各五分青皮七分二帖愈

李士材治尹文輝嗜火酒能飲五斤五月間入閩中溪水驟漲涉水至七里覺腹痛甚半月後右丸腫大漸如斗閩中醫者皆與肝經之劑久温熱之品半載無功歸就診李曰嗜火酒則濕熱滿中涉大水則濕熱外束今病左右正是脾肺之濕下注睾丸以胃苓湯加巵子枳殼黃柏茴香十劑畧減即以為丸服至十八斤全安

駱元賓十年患疝形容枯槁李視之左脇有形其大如箕以熱手按之瀝瀝有聲甚至上攻於心關絶良久以熱醋薰炙方醒李曰此經之所謂厥疝也用當歸

四逆湯一月積形裹小更以八味丸間服半載餘積
塊盡消不復患矣
盧不遠治湯某長病腹痛痛則繞臍有形甚則欲死皆
謂生氣獨絕于內慮不起診之關脉匹尺有滑附之
久痛氣羸顏色精彩因用枸杞為君白芍茯苓肉桂
吳雯法之六劑痛止服瑞竹堂方四製枸杞丸一料
竟愈夫臍疝疝當引陰原無斯症蓋疝者有形之痛
而有所止之處故字從山不必定引陰也疝本厥陰
肝疾其狀若死亦厥陰症故用温補肝腎藥而瘳
馮楚瞻治王刑部疝痛甚危脉之左三部弦洪而數乃
陰甚不足也右關尺洪大按有力此膏粱酒濕太過
房勞真水消亡水失所養筋無所榮濕熱內攻陰寒
外遏為疼為脹不可忍也以熟地二兩山萸山藥各
二錢滋其肝腎丹皮三錢茯苓二錢澤瀉一錢五分
滲其濕熱橘核三錢疎其水鬱製附一錢五分益酒
炒黃柏一錢二分使寒熱互為向導由是外寒散內
熱除真水生雷火息而瘳
張建東秘傳治一切疝氣神方於洗浴畢濕身坐門檻
上兩囊著水印一濕印即于濕印患左灸左患右灸
右俱患則左右俱灸須避四眼又一法午月午日午

時灸尤妙或小兒不須洗浴但用灰布門檻上令兒坐之亦就所印灸即愈 沈序皇甫聞錄

王叔權曰舍弟少戲舉重得偏墜之疾有客人為當關元兩旁相去各三寸青脉上灸七壯即愈王彥賓患小腸氣灸之亦愈 資生經 ○ 醫說續編

張子和治項關一男子病卒疝暴痛不任倒于街衢人莫能動呼張救之張引經證之邪氣客于足厥陰之絡令人卒疝故病陰丸痛也急瀉大敦二穴其痛立已夫大敦穴者乃足厥陰之二穴也

鄭亨老病疝灸之得效其法以淨艸一條茅及麥稈尤妙度病人兩口角為一則摺斷如此三則則摺成三角如△字樣以一角安臍中心兩角在臍之下兩傍夾盡處是穴若患在左即灸右在右即灸左兩邊俱患即兩穴皆灸艾炷如麥粒大灸十四壯或二十一壯即安也 醫說續編

奪命丹治遠年近日小腸疝氣偏墜搐疼臍下攪痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒抓成瘡患治之吳茱萸一斤去枝梗四兩酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童便浸各一宿同焙乾為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心食前鹽湯或酒下神妙不可具

述馮仲柔云頃年某舍使家傳回令局中合賣紿煦
壬子冬予親曾得效時苦奔犇寒氣攻衝小腹引痛
四日只一服臟府微動痛若失去遂安一方名星斗
丸湯浸者用塩水浸澤瀉用四兩切作粗片酒浸一
宿是齋方○仝上

一人病後飲水患左丸痛甚灸大敦遶摩腰膏內用烏
附丁麝者將以摩其囊上抵橫骨端灸後温帛覆之
痛即止一宿腫亦消矣藥要或問○仝上

薛立齋治一婦人小腹痞悶小便不利內熱體倦懶食
用八珍湯加柴胡山庶龍膽艸治之而安良方附疝痕門

王宵堂曰張仲景治寒疝腹中痛及脇痛裡急者當歸
生薑羊肉湯主之本艸衍義稱其無不應驗豈非補
肝之效乎余每治病甚氣上冲心危急者以八味丸
投之立應又補腎之明驗也

羅謙甫治漆匠韓提控疝氣每發痛不可忍則于榻兩
末各置一桃往來伏之以受如是三年不已與丁香
練實丸三劑良愈蓋男子七疝痛不可忍者婦人瘕
聚帶下皆任脉所主陰經也乃肝腎受病治法同歸
于一當歸附子川楝子茴香各一兩右剉碎以好酒
三升煮酒盡為度焙乾作細末每藥末一兩入丁香

水香各五分全蝎十三箇元胡索五錢同為細末拌勻酒糊為丸桐子大每服三十丸至百丸温酒空送下凡疝氣帶下皆屬于風全蝎治風之聖藥也川楝茴香皆入小腹經當歸元胡索和血止痛疝以寒邪積于小腸之間故以附子佐之丁香木香為引導也

王海藏云楊駙馬時患風氣衝心風氣即疝氣也羅謙甫云疝氣帶下皆屬于風飲食吐逆遍身枯瘦日服斈菀丸五丸至二十日瀉出肉塊如蝦蟇五六枚白膿二升愈才見癒

李靈患肥氣病肝積謂之肥氣與疝同類日服前丸五丸經一年瀉出肉鶩二枚愈

馬元儀治陳子芳患痰喘發熱胸滿身痛左邊睪丸不時逆上痛不可忍診之肝脉弦急肺脉獨大關尺虛小此肝肺受邪之候也肝為木藏其化風其生火風火合邪于本位則為熱為痛乘于肺金則為痰為喘以柴胡疎肝散治之表症稍安欲速愈別用沙參二兩煎服始若相安繼轉增劇再急診寸脉數數關脉急疾左丸引右丸痛甚曰關脉急疾木火自旺也寸脉數數火刑肺金也肺為嬌藏體燥氣肅火邪入之則氣化失常金愈困而木益張也法宜滋達肺金兼疎肝木以瓜蔞瞿五錢潤燥瑩菀三錢宣通半夏貝

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

毋清痰枳殼桔梗開鬱杏仁蘇子定喘柴胡以達之秦艽以舒之一劑減再劑安調補而愈（琇安用沙參原無大謬第單用旦重至二兩又無甘潤之佐則清降之力薄而速及致木火厥張◉耳）

薛立齋治一男子年逾四十陰囊腫痛以熱手熨之少緩服五苓等散不應尺脈遲輭此下虛寒邪所襲而然名曰寒疝非瘡毒也以蟠葱散治之少可更以葫蘆巴丸服之而平

杜舉人名京年逾三十陰囊濕痒莖出白物如膿舉則急痛此肝疝也用龍膽瀉肝湯而愈有陰莖腫或縮或挺或痒亦以此藥治之

施笠澤治錢元一患疝氣衝痛益有年矣每抑鬱則大作嘔吐痰涎不進飲食已未春病甚浹旬診得左關弦急而數右關尺俱浮大而無力此命門火衰不能生土肝木乘旺復來侮脾用葫蘆巴元胡索等疏肝之劑以治其標隨用八味丸益火之原以消陰翳間進參朮補脾之藥以治其本漸服漸安數載沈痾不

三月而愈 來氏選

錢國賓云黃州客陳思雲負貨行至德州仕館其人素疝氣忽然陰子漸大如斗半月臥床不起偶有道人化齋彼甚嗔怪道人曰爾病尚得我醫如何發怒遂

請進見坐問根由與艾實大紅藥一丸用無根涼水
送下供之而去約三日後再來看汝陳服藥腹中微
响若周身氣行之狀至三日消已大半道人又至仍
與前藥二丸三日一次服盡陰子如故謝銀一兩不
受討紫花布道袍一件而去陳求丸方曰此藥汝不
能合用紫金錠亦可以消斗大之陰子也余與同寓
親見其治九日而消斗大陰子真仙丹也

蔣仲芳一日治二疝一人升上作痛一人墜下作痛俱
悶痛欲絶升上者與故紙三兩炒黑丑一兩生硫黃
七錢俱為末鹽酒打餬麵為丸鹽酒送下墜下者與
補中益氣湯加杜仲故紙肉桂炮薑香附川芎二人
駭曰疝氣同也何方之不同若是曰姑試之至明日
而皆愈

潘惟　秋間患疝氣症服肉桂小茴荔核之類不應自
用生薑泡沙糖湯服一二日稍愈遂止飲沙糖湯而
愈（沈刻抄本）

吳橋治有濡父旦通以疝作逆橋橋以其人習飲醇第
以涼劑而清濕熱遂愈一日疝作遽橋他出乃逆方
生家人出橋舊方示之生按方而治不效頃之則小
溲浸短小腹浸堅復逆文學先生至注黃金二錠內

文學篋中文學力任之治再信而病益進短者枯堅
啫石矣既而橋至則病者通出錯言橋心異之此神
亂也既診曰殆矣有濡曰衆大人疝通作頼公一再
劑而瘳乃今兩君子亦仿故方何卒不效橋曰此刻
舟也今病得之內當在陰兩君復以陰藥投之嫌于
無陽也既以陰劑陽失其健而不能運則壅閼矣
家人偵其故則故女豎私爲橋辭歸旦中夜死文學
�篋歸金而去 太函集
江氏甥素有疝症發則腎囊如盛二升粟增寒壯熱或
與小茴香青皮蒟醬盧巴木香等服之囊赤而痛甚勢
將成癰次日仍與前藥診之脉數大無倫面赤顴亞
用熟地二兩杞子一兩川楝一枚一劑而愈後與人
鬨顛頂著棒悶絶而甦次日陰囊腫大如疝發時于
是顛痛甚則囊痛減囊痛甚顛痛減寒熱往來尚科
通治無效蓋厥陰肝脈下絡纂上行顛故上下相連
而其痛則互為消長也與前方數劑上下皆愈凡疝
治之失宜過服香辛燥烈之劑遂成勞損者夥矣
鮑二官六七歲時忽腹痛發熱夜則痛熱尤甚或謂風
寒發散之不效又謂生冷消導之不效診之面潔白
微有青氣按其虛里則築築然跳動問其痛云在少

小便秘

腹驗其囊則兩睾丸無有曰此疝痛也與生地甘杞沙參麥冬川楝米仁二劑全愈凡疝症雖有寒濕痰氣之殊余所愈多以此方提如桴鼓蓋症雖不一而病屬厥陰則一也要之肝木為病大抵燥火多而寒濕絕少也余鈺兒十歲時忽蹲地以捺住其腹宛轉不能語察其面青知疝發也亟以杞子一兩川楝一枚煎服下咽立愈

朱丹溪治馬參政父年八旬初患小便短澁曰服分利之藥太過遂致秘塞點滴不出謂其胃氣陷于下焦用補中益氣湯一服而通因前多用利藥損其腎氣遂致通後遺溺一夜不止急補其腎然後已凡醫之治是症者未有不用泄利之劑誰能顧其腎氣之虛哉（醫貫。藥要或問。出醫說續編。舊案無曰前以下）

盛用敬治文學姚汝明內傷新愈又病食傷他醫皆用下藥病益甚小便閉中滿腹堅如石（三陰受傷所致）盛診之曰此不可用分理藥也（理當作利）宜以參耆運其氣升柴提其氣氣升則水自下矣加以益腎之劑數服霍然（吳江志。與朱案症治畧同）

鍾大延治徐大理病小便秘腫脹面赤發喘衆醫皆從

熱症治愈甚大延診之曰是無火也急煮附子湯一服而愈（寧波府志）

錢塘有人小便秘百方通之不效有一道人錢宗元視之反下縮小便藥俄而遂通人皆怪之以問宗元曰以其秘故醫者驟通之則小便大至水道愈溢而小便愈不得通矣今吾縮之使水道稍寬此所以得流也此一治殊為特見（北窗炙輠）

黃氏小便不通陳雁麓用芒硝一錢研細龍眼肉包之細嚼咽下立愈（續金陵瑣事）

竹鎮有人病溺不下求于乩仙判云牛膝車前子三錢共五錢同剉為粗末將來白水煎空心服之果愈（居易錄）

龔子才治一人小便不通服涼藥過多脹滿幾死以附子理中湯加琥珀末調服立通（與鍾大延案同）

一人小便不通已經六八日遍身手足腫滿諸醫罔效以紫蘇煎湯入大盆內令病人坐上熏蒸冷則添滾湯外用鹽炒熱熨臍上遍身腫處良久便通腫消而愈

李士材治王郡守痰火喘唉正甚時忽然小便不通自服車前木通茯苓澤瀉等藥小腹脹悶點滴不出李

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

曰右寸數大是金燥不能生水之故惟用繭苑五錢
麥冬三錢五味十粒人參二錢一劑而小便涌出如
泉若淡滲之藥愈多則反致燥急之苦不可不察也
先兄念山以謫官鬱怒之餘又當盛夏小便不通氣高
而喘以自知醫服胃苓湯四帖不效李曰六脈見結
此氣滯也但用枳殼八錢生薑五片急火煎服一劑
稍通四劑霍然矣

俞孝廉脩府志勞神忽然如喪神守小便不通李診之
曰寸微而尺數是水涸而神傷也用地黃知母各二
錢人參丹參各三錢茯苓一錢五分黃柏一錢二劑
稍減十劑乃全安

馮楚瞻治王氏女年十三小便不通甚危初二三歲時
乳母恐其溺牀切戒之由是寤寐刻刻在心（二三歲時事安能記憶）數年以來日中七八次夜中七八次習以為常
漸有淋狀近來益甚或以導赤利水之劑投之初服
稍應久則增劇點滴不通脈之六部洪數久按無神
知為過于矜持勉強小便心腎久虛又服利水之劑
真陰益槁（槁）臟涸津枯氣何能化以八味湯加五味麥
冬取秋降白露生之意也每劑納熟地二兩連進兩
服使重濁以滋之為小便張本再以其渣探吐之上

竅既開下竅自利果愈繼以調養失宜一月後其症復發渠以前方二劑服之亦令探吐不唯不效初止少腹脹悶吐後胸脇亦脹悶難堪矣六脈洪大而空馮曰前者神氣未衰今則汗多心跳精力甚疲必補其中氣乃能升降運行仍令服前方二劑悶益甚則以人參一兩附子三錢濃煎温服少頃自胃次以至小腹漉漉有聲小便連行而愈信乎藥不執方也

吳孚先治曹庶常患小便不通多服分利之藥遺尿一夜不止既而仍復閉塞點滴不行此利藥太過腎氣虧極急用補中益氣湯送腎氣丸遂痊（與朱盛二案同）

黃履素曰予家有僕婦患小便不通之症時師藥以九節湯腹漸滿而終不通幾殆矣有艸澤醫人以白蘿蔔子炒香白湯吞下數錢小便立通此予親見之者

孫文垣治袁洪溪以衝暑性來經畧政事致發熱燥渴曰過食冰浸瓜菓遂成泄瀉小水短少醫與胃苓湯加利藥瀉止而大便燥結不堪乃用潤腸丸復瀉不止又進前藥瀉止而小水失其常度臍下脹急立溺則點滴不出卧則流滲不竭以頻取夜盡致通宵不寐治半月精神削寢食廢診之兩寸短弱關緩大兩尺洪大此餘暑未清素善飲濕熱流於下部也以益

元散三錢煎香蒿湯服之畧無進退脈亦如昨再思之此蓋尿竅不對也膀胱者脬之室也脬中濕熱下墜立便則竅不對小水因不得出卧則脬不下墜而滲出膀胱猶以竅不對涓涓流溢不能暢達故了而不了也膀胱内本無脬亦本無下竅蓋此症下陷二字盡之無端添一竅字支離可笑治惟提補上下二焦元氣兼清下焦濕熱斯得矣今氣虛下陷已久一兩劑未能收功安得伏枕而卧且此不寐非心血不足乃因著意防閑小便故也暫以物襯席上任其流出免取溺器致擾其神自然熟睡矣以補中益氣湯提補上下二焦元氣加黃柏知母祛下

焦濕熱使清陽升則濁陰自降脬無濕熱則不下墜竅可對而病可瘳矣如法治之果嗒然而覺早覩布亦不甚濕以久不闔目得此恬寢神氣頓回如未病者調理四日而安

張隱菴治一書吏患癃閉諸治無效以補中益氣投之一劑而愈或問曰此症人皆以降利治之不效今以升提治之而效其故何也曰君不見夫水注子乎閉其上而倒懸之點滴不能下矣去其上之閉而水自通流非其驗耶

薛立齋治一婦人患小便淋瀝不通面青脇脹諸藥不

應此肝經氣滯而血傷用山甲川芎煎服而愈

一婦人小便不利小腹并水道秘悶或時腹脇脹痛此肝火用加味逍遥散加龍膽艸四劑稍愈乃去膽草佐以八珍散加炒黑山甲煎服而愈

鄭奠一曰水瓜乃酸澁之品世用治水腫腹脹誤矣有大寮舟過金陵愛其芬馥購數百顆置之舟中舉舟人皆病溺不得出醫用通利藥罔效迎余視之聞四面皆水瓜香笑謂諸人曰撤去此物溺即出矣不必用藥也于是盡投江中傾之溺皆如舊本草備要

汪訒庵曰家母舅童時病溺塞服通淋藥罔效老醫黃

五聚視之曰此乃外皮竅小故溺時艱難非淋症也以牛骨作楔塞于皮端竅漸展開勿藥而愈使重服通利藥得不更變他症乎乃知醫理非一端也 仝上

一人燥熱傷下焦致小便不利當養陰當歸地黃知母黃柏牛膝茯苓生甘草白朮陳皮之類 治法

紹興劉駐泊汝翼云魏邸知明州時宅庫之妻患腹脹小便不通垂殆隨行御醫某人治此藥令服遂愈瓜蔞不拘多少焙乾碾為細末每服三錢重熱酒調下不能飲者米飲調下頻進數服以通為度 靈方

小便不禁 附頻數遺瀝

孫文垣治侄二南內人小水不禁一日二十餘起脈之右寸洪而有力左寸虛右尺沈微此心腎不交也以當歸遠志丹參丹皮桑螵蛸人參山萸肉益智仁黃柏知母為丸服之五日而安後凡遇辛苦則發以此服之立效

薛立齋治一婦人小便自遺有時不利日晡益甚此肝熱陰挺不能約制用六味丸料加白术酒炒黑黃柏七分知母五分數劑諸症悉愈若誤用分利之劑愈損真陰必致不起矣

一老婦患前症惡寒體倦四肢逆冷薛以為陽氣虛寒用補中益氣加附子三劑不應遂以參附湯四劑稍應仍以前藥而安附子計用四枚人參三斤許

李士材治張方伯夫人患飲食不進小便不禁李曰六脈沈遲水泉不藏是無火也投以八味丸料煎進六君子加益智仁肉桂二劑減數劑瘳

俞文學憂憤經旬忽然小便不禁醫皆以固脬補腎之劑投之凡一月轉甚李診之曰六脈舉之則軟按之則堅此肝腎之陰有伏熱也用丹皮茯苓各二錢甘艸梢六分黃連一錢煎成調黃雞腸與服六劑而安

吳遠有吳門醫者曰既愈當大補之數日後仍復不

禁再來求治李曰肝家素有鬱熱得温補而轉熾遂以龍膽瀉肝湯加黄連山巵一月而瘥

張三錫治一人病風狂服甘遂等利藥太過小水不禁服桑螵蛸散未終一料而安真桑螵蛸同桑皮炒遠志菖蒲龍骨人參茯苓當歸龜板醋炙巳上各一兩為末以參湯調下二錢舊案一條與此畧同

薛立齋治一婦人患小便頻數日晡熱甚此肝脾血虛氣滯而無濕熱也用加味逍遥散加車前子而愈

一婦人患前症發熱煩躁面目赤色脉洪大而虛此血虛發躁用當歸補血湯數劑而瘥

一婦人久患前症泥屬于火雜用寒涼之劑虛症悉具曰此脾胃虧損而諸經病也當補中氣為主遂以補中二湯兼服兩月餘而愈

劉大恭年逾六旬形氣瘦弱小便不禁或頻數內熱口乾或咳痰喘暈此腎氣虛用六味丸益氣湯以滋化源彼不信反服補陰降火滋精之劑陰竅作痛或小便不利仍服前藥不兩月而愈

王執中壯年寓學忽有遺瀝之患因閱方書見有用五倍子末酒調服者服之而愈藥石相投豈在多品而亦無事于灸也資生經