

山西醫改進研究會

中華民國十九年三月

中華郵政特准掛號
認爲新聞紙類

醫學雜誌

第五十四期

南京圖書館藏

中醫改進之良機

協和醫院——研究針灸銅人

（將俞穴圖徑譯爲德文）（轉載山西日報）

北平歷史博物館陳列品中有針灸銅人一具。高六尺。百體俱備。俞穴孔道。詳刻名稱。爲宋仁宗時醫官王惟一所創製。明英宗時所重鑄。雖屬傳世古物。尙有醫學價值。近聞協和醫院院長鄧錄普。偕同醫員數人。往前參觀。願以科學方法。詳細研究。該館以攸關人類幸福。業許其全都攝影。並予以時間上。及摹拓便利。俾資研討。假使獲有結果。其有裨益於醫學。自當遠勝於空言擁護國醫。又聞前年冬季。德醫蓋禮思。偕共和醫院院長張君。對於是項銅人。亦曾作長時期之研究。並將王惟一原著之針灸銅人俞穴圖徑。譯爲德文。惟內容有待整理。尙未發刊。又中醫前往研究者。尙有馬維離。王景福諸氏。該館亦均予以特別便利云。

醫學雜誌五十四期 目錄

附設醫院十九年^三四月中西醫診治

人數及比較表

專著部

靈素生理新論

楊如候

瘍科學 許半新論

邵家驩錄刊

病理學

時逸人

論說門

中醫與科學

蔣文芳

中醫如何使用科學方法

尤學周

中醫科學化之研究

喜復祖

纂述門

第五十四期 目錄

(生理類)

論全體生理

理事 時逸人

命門釋

傅曉丞

(衛生類)

澡堂衛生十二則

楊煥文

敬告病家四大關鍵

張汝偉

(病理類)

瘟疫之研究 一頁

前 人

疫痧病理之討論 一頁

徐召南

病與症

傅曉丞

(診治類)

治病序例 (續前) 一頁

治水腫的良方

胡效心



中西論癘原理各異

羅燮元

喉痺之研究

時逸人

(藥物類)

麥芽之研究

章次公

豬肝在醫學上之治療

前人

藥物學體裁之商榷

沈仲喜

滑石之研究

季愛人

苦杏仁……之毒質

名譽會員 秦國楨

(診斷類)

中西診斷之比較

石夢魯

中醫脈學大革命

仰導

(方劑類)

溫熱方劑篇

楊煥文

七方十二劑概說

傅曉丞

醫案門

食積悶痞案

周 鎮

嬰兒慢脾風案

劉蔚楚

醫案平議

張山雷

姚嘯崗醫案

張蘊石

通訊門

田桐君中華民族醫學說

王宇高君復衛生部呈文(完)

星期徵稿彙錄

葉氏謂溫邪上受首先犯肺透傳心

包吳鞠通指為溫熱之謂諸家皆

有異詞指責究竟此溫邪為溫熱

欬抑瘟疫欬

田爾康

問桂枝湯與桂枝加芍藥湯二方藥
味相同惟芍藥之分量不同似芍
藥之關係甚大比例而詳言之

聶士成

專著門

靈素生理新論 楊如侯先生著續五十三期

第十一章 外形篇九

第十五節 論腎足少陰經穴

腎足少陰經穴。曰湧泉。在足心陷中。屈足捲指。宛宛中。湧泉一名地衝跪取之。爲井。木也。曰然谷。一名然骨一名龍淵。在足內踝前。起大骨下。陷者中。乃內踝前直下一寸。爲榮。水也。曰太谿。在足內踝後五分。跟骨上動脈。陷者中。爲俞。土也。太谿一名呂細男子婦人病有此脈則生無此脈則死。曰大鐘。在足跟後衝中。足少陰絡。別走太陽也。類經圖翼云在足跟後衝中大骨上兩筋間水熱穴論註曰在足內踝後衝中。曰水泉。在太谿下一寸。足內踝下。足少陰郄也。曰照海。在足內踝尖下三寸。白肉際。陰蹻脈所發也。類經圖翼云照海在足內踝下一寸陷中容瓜甲一云在足內踝下四分微前高骨陷中前後有筋上有踝骨下有韌骨其穴居中神經曰在內踝直下白肉際是穴陰蹻所生。曰復溜。在足內踝骨外。上二寸陷中。爲經。金也。類經圖翼云復溜一名伏白一名昌陽在足內踝後上除踝二寸陷者中前榜骨是復溜後榜骨是交信二穴止隔一筋。曰交信。在足

內踝骨上二寸。少陰前。太陰後廉筋骨間。陰躡之郄也。曰築賓。在足內踝後。上踞

分。中陰維之郄也。曰陰谷。在膝下內輔骨之後。大筋之下。小筋之上。按之應手。屈

膝縫尖而得之。爲合水也。按盧子孫學古診別陰谷穴下有會陰一穴在大便之前小便之後兩陰間爲任脈別絡督脈衝脈之會也今移入任脈經曰橫骨。處腹

部二行。在大赫下一寸。乃陰上之橫骨中。宛曲如仰月中央是。在盲俞下五分去腹中行

一名下極。張景岳曰按少腹下尖自橫骨上行不可數用腹中分寸當以太陰之衝門起自橫骨兩端以至陽明之氣衝少陰之橫骨至中之曲骨穴通計折量始得其準凡上至腹中皆當以此類推曰大赫。處腹

部二行。在氣穴下一寸。屈骨端三寸。去腹中行正分足少陰衝脈之會也一名陰維一名陰維曰氣穴。處腹部二行。在

四滿下一寸。婦人則左二寸爲氣穴。右二寸爲子戶。一名胞門足少陰衝脈之會也曰四滿。處腹部

二行。在中注下一寸。去腹中行五分足少陰衝脈之會也一名臍府曰中注。處腹部二行。在盲俞下五分。曰在盲

去腹中行五分足少陰衝脈之會也曰盲俞。處腹部二行。在商曲下一寸。類經圖翼云當作二寸直臍旁。去臍各中五

分。足少陰衝脈之會也曰商曲。處腹部二行。在石關下一寸。去中行五分足少陰衝脈之會也曰石關。處腹部二行。

在陰都下一寸。去中行五分足少陰衝脈之會也曰陰都。處腹部二行。在通谷下一寸。夾中脘相去五分一名

也曰通谷。處腹部二行。在幽門下一寸。在幽門下一寸陷中夾上脘相去五分足少陰衝脈之會也曰幽門。處腹部二行。

在巨關旁半寸陷者中。幽門一名上門足少陰衝脈之會也曰步廊。處胸部二行。在神封下一寸六分。仰而取之。在中庭旁二寸陷中曰神封。處胸部二行。在靈墟下一寸六分。去中行二寸。仰而取之。曰靈墟。處胸部二行。在神藏下一寸六分。去中行二寸陷中。仰而取之。曰神藏。處胸部二行。在或中下一寸六分。陷中。去中行二寸。仰而取之。曰或中。處胸部二行。在兪府下。一寸六分。陷中。去中行二寸。仰而取之。曰兪府。處胸部二行。在巨骨下。夾璇璣旁。各二寸。陷中。仰而取之。以上計二十七穴。

足心湧泉穴。為腎脈極底。最忌瘡漏泄氣。然谷在內踝下前一寸。太谿在內踝後足跟上。此處有動脈。內經皆以為診。凡病且死。此脈不絕者。尚可救治。陰骨在膝下曲膝之間。又上股入小腹。絡膀胱。循臍旁一寸。名盲兪。謂盲膜之要會在此也。入屬腎上絡。心循喉嚨。挾舌本。雖不列穴名。而腎經之主化。在絡心。循喉。挾舌。處尤多。舌下廉泉。為腎液所出。猶津道之要也。

腎足少陰經穴

湧泉 在足之裏。試屈足趾拇趾。根部有膨隆處者。卽是也。爲外轉拇筋部。

乃內足蹠動脈。內足蹠神經分布之區域。

然谷 在然骨直下之陷凹部。然骨者足內踝前之高骨也。卽長屈拇筋之

附著部。爲後脛骨動脈。及脛骨神經分布之區域。

太谿 在內踝後五分。介於大鐘水泉之間。爲長總趾屈筋腱部。動脈神經

等同前。

大鐘 在內踝之後。距水泉上一寸。筋肉動脈神經同上。

水泉 在內踝後。太谿下一寸。爲長總趾屈腱部。有後脛骨動脈。脛骨神經。

照海 在內踝下一寸。爲外轉拇筋之上部。乃後脛骨動脈。及脛骨神經。分

布之區域。

復溜 在內顆上一寸。距交信後五分。爲後脛骨筋部。

交信 在內顆上二寸。爲長總趾屈筋部。分布後脛骨動脈。及脛骨神經。

築賓

在內上踝五寸為腓腸筋部。動脈神經同前。

陰谷

在膝內輔骨（內踝）之後。大筋之下。與委中（即膝膕窩）為下腿骨與大腿骨之關節部。即大股筋連附之部。有關節動脈及股神經。

橫骨

去大赫下一寸。去盲俞下五寸。去曲骨（即恥骨軟骨縫合部）旁五分。分布腸骨下腹神經。

大赫

去氣穴下一寸。為三稜腹節部。神經同上。

氣穴

去四滿下一寸。神經同前。

四滿

去中注下一寸。有下腹動脈。

中注

去盲俞下一寸。動脈同上。

盲俞

去臍旁五分。動脈同上。

商曲

去石關下一寸。餘見幽門穴。

石關

去陰都下一寸。餘見幽門穴。

陰都

在通谷下一寸。為小腸部。餘見幽門穴。

通谷

在幽門下一寸。為橫行結腸部。餘見幽門穴。

幽門

去巨闕旁各五分。去筋骨下一寸。為直腹筋部。左為胃府。右覆肝藏。分布上腹動脈。及第五至第十二肋間神經枝。胃部有胃動脈分布。迷走神經之胃叢。及交感神經。於肝。則分布交感神經。

步廊

下神封一寸六分。即心臟部也。為第五肋間部。餘見神封神藏二穴。

神封

下靈墟一寸六分。適當心臟部。心臟有迷走神經。及交感神經。故禁鍼。鍼則殊危險。惟距心臟部五分處。宜刺。餘見神藏穴。

靈墟

下神藏一寸六分。當第三肋間。餘見神藏穴。

神藏

下或中一寸六分。當第二肋間。為大胸筋部。中藏肺葉。分布肋間動脈。內乳動脈。及肋間神經。前胸神經。

或中

下俞府一寸。當第一筋間。為大胸筋部。分有筋間動脈。內乳動脈。及

肋間神經。前胸神經。

兪府

去璇璣旁二寸。當鎖骨下部。取正中線（胸骨中央之縱線）二寸。有大胸筋及鎖骨上筋。中藏肺葉。有鎖骨下動脈。分布前胸廓神經。於肺藏則分布迷走神經之肺臟叢。

第十六節 論膽足少陽經穴

膽足少陽經穴曰童子膠。一名太陽 一名前關處面部四行。在目外。去眥五分。手太陽手足少

陽三脈之會也。曰聽會。在耳前尖珠陷中。上關下一寸。動脈宛宛中。在耳珠下開口有 空一名聽池一名

後側臥張口取之。曰客主人。一名上關。處面部四行。在耳前上廉。起骨開口有空。

側臥張口取之。足陽明手足少陽三脈之會也。曰額厭。在耳前曲。周顛顛上廉。即

空之上也。顛日涉切音 囑顛音儒。顛顛骨也。手足少陽陽明之交會也。曰懸顛。在曲周上。顛顛之中。手足少陽陽 明之會也。

曰懸釐。在曲周上。顛顛下廉。手足少陽陽明四脈之交會也。曰曲髮。在耳上髮際

曲隅陷中。鼓頷有空。足少陽太陽之會也。曰率谷。在耳上入髮際寸半陷中。取之

足少陽太陽之會也。曰天衝。在耳後入髮際二寸。一曰在耳上如前三寸。足少陽太陽之會也。曰浮白。處頭上

三行。在耳後入髮際一寸。足少陽太陽之會也。曰竅陰。一名枕骨穴。處頭上三行。在完骨

上。枕骨下。動搖有空。足少陽太陽之會也。曰完骨。處頭上三行。在耳後入髮際四

分。足少陽太陽之會也。曰本神。處面部四行。俠曲差旁一寸半。一曰直耳上入髮

際四分。足少陽陽維之會也。曰陽白。處面部三行。在肩上一寸。直瞳子手足少陽

陽明陽維五脈之會也。甲乙經曰足少陽陽維之會氣府論。王氏註曰足陽明陰維二脈之會。曰臨泣。處頭部三行。在目上眥。

直上入髮際五分。陷者中。正時取之。足少陽太陽陽維三脈之會也。曰目窗。一名至榮。處頭

部三行。在臨泣後一寸。足少陽陽維之會也。曰正營。處頭部三行。在目窗後一寸。

足少陽陽維之會也。曰承靈。處頭部三行。在正營後一寸半。足少陽陽維之會也。

曰腦空。一名顛顛。處頭部三行。在承靈後一寸半。傍玉枕骨下陷中。氣府論王氏註曰。夾枕骨後枕骨上。足少

陽陽維之會也。曰風池。處頭部三行。在顛顛後髮際陷中。類經圖翼云風池在耳後顛顛後。腦空下髮際陷中按之引於耳中。

一云在耳後之髮際大筋外廉。足少陽陽維之會也。曰肩井。一名臑井。在肩上陷解中。缺盆上大骨前一寸。

半。以三指按取之。當中指下陷中是。手足少陽足陽明陽維之會也曰淵腋。一名泉腋在腋下三寸。宛宛中。

舉臂取之。毛攢中是。曰輒筋。在腋下三寸。復前行一寸。著脇也。足少陽太陽之會也曰日月。處

腹部四行。在第二肘端。期門下五分。上直兩乳。膽之募也。類經謂翼曰日月一名神光氣府論註云在第二筋端橫直心散骨

旁各同身寸之二寸五分足太陰少陽陽維之會也曰京門。在監骨腰中季脇。本俠脊。腎之募也。類經謂翼云京門一名氣

旁九寸半倒臥屈上足伸下足舉臂取之曰帶脈。在季脇下一寸八分陷中。類經謂翼曰帶脈云在臍旁八寸半肥人九寸瘦人八寸如帶繞身管束諸經足少陽帶脈

之會大成曰在季脇下一寸八分臍上二分兩旁各七寸半曰五樞。在帶脈下三寸。類經謂翼曰一云在水道旁一寸半陷中足少陽帶脈之會曰維道。在章門

下五寸三分。類經謂翼曰一云在中極旁八寸五分足少陽帶脈之會一名外樞曰章門。在大橫紋外。直季脇端也。章門穴又見足

曰居膠。在章門下五寸三分。監骨上。環跳上。一寸外陷中。足少陽陽蹻之會也。曰

環跳。在髀樞中骨罅內側。臥伸下足。屈上足。大骨尖後。一寸取之。大成云以右手摸穴左

陽之會也曰風市。在膝上五寸。垂手得之。中指盡處是。類經謂翼曰風市在膝上七寸外側兩筋取

是穴曰中瀆。在髀骨外膝上五寸。分肉間陷中。足少陽絡。別走厥陰者也。曰關陽。

在陽陵泉上三寸。橫鼻外陷中。曰陽陵泉。在膝下一寸。外廉陷中。類經謂翼曰陽陵泉在膝下一寸外廉陷中尖

醫經卷之四 靈樞生靈新論

十

骨前筋骨間取之經云筋會陽陵泉滑伯仁曰足少陽之筋結於膝外廉陽陵泉又與肝筋之合故為筋會

為合土也。曰陽交。在足外踝上七寸。

斜屬三陽分肉間。

一名別陽

曰外邱。在足外踝上六寸。足少陽鄰也。曰

光明。在足外踝上五寸。足少陽絡。別走厥陰者也。曰陽輔。在足外踝上除骨四寸

輔骨前絕骨端。如前三分計。去邱墟七寸。筋肉分間。氣血論註曰陽輔陽維脈氣所發也。一名分肉。為經火也。曰

懸鐘。在足外踝上三寸。動者中。為足三陽之大絡。按之足陽明脈絕。乃取之。對三

陰交也。類經圖翼曰懸鐘一名絕骨。在足外踝上三寸。當骨尖前動脈中。尋按取之。針尖骨者乃是絕骨。兩分間。難經曰髓會絕骨。滑伯仁曰絕骨一名陽輔。在足外踝上四寸。輔骨前絕骨端。如前三分計。諸髓皆屬於

骨故為髓會。以上諸書或以陽輔為絕骨。或以懸鐘為絕骨。蓋所謂絕骨者乃外踝上尖骨之名。猶之脛骨膝骨之稱也。陽輔懸鐘二穴皆在其地。故皆可以絕骨之名屬之。乃四明陳氏謂髓屬於腎。腎主骨。於足少陽無關。髓為髓海。腦有枕

骨則當是會。枕骨云會絕骨。誤也。而不知髓生骨中。髓味苦而主骨。安得謂其於少陽無關。人之脛弱者往往苦於紐秘。而脛強者則不懼。若說者曰由脛髓足於不足之故。故袁古益曰人能健步以髓會於絕骨也。正是此理。又觀猪羊脛骨

中髓皆滿實。與他處不同。即此驗之。髓會絕骨之說灼然無疑。者陳氏之說不可謂定論也。曰附陽。在足外踝上三寸。太陽前。少陽後。筋骨

間。陽蹻之鄰也。附陽穴舊時針灸書俱載。在足太陽經中飛揚之下。曰邱墟。在足外踝下。如前陷者中。骨之縫中針灸大成又曰夾谿穴中

骨前五寸去臨泣三寸。對商邱。為原土也。曰臨泣。在足小指次指本節後間。陷者中。

去俠谿一寸半。為兪木也。曰地五會。在足小指次指本節後陷中。去俠谿一寸。曰

俠谿。在足小指次指本節前歧骨間陷中。為榮水也。曰竅陰。在足小指次指外側。去爪甲如韭葉。為井金也。以上計四十六穴。

足少陽。起目銳眦。名童子髎穴。繞耳前陷中。名聽會穴。繞耳後髮際陷中。名風池穴。皆少陽風木所發洩處。下至肩上陷中。名肩井穴。循側旁。下至肝期門之下五分。名日月穴。膽脈實從肝膽出於此穴。然後上下行也。下行至股外。垂手中指盡處。名鳳市穴。膝下一寸。為陽陵穴。循外踝。至小指次指之間。竅陰穴而終。陽經根於陰穴。以見陰生於陽中也。

(未完)

瘍科學

許氏原本續五十三期

邵家驥錄存

天握隱痛大腸瀉。大便秘結右足屈。關元之痛是小腸。立足不伸小便澀。脉來遲緊未成膿。蕩滌為先。臍高脹。滿脉洪數。轉側水聲。內膿已成。若見隱器腐爛。污水頻流。噤乾身熱。煩燥不止。俱屬逆症。難治。胃中生瘡。中脫痛。右關沉細。章門疼。楚脾家瘡。腹滿脹難堪。肝瀉生巨闕。煩渴症。實難逢。京門腫痛腎瀉生。石門痛楚三

焦癰。肩中疽屬三焦。根堅平塌。肩前廉屬陽明。乾疽是命。後廉乃小腸所隸。過肩
 疽稱。肩尖是肩髃穴。上經是陽明。邪風襲骨縫。肩風毒痛楚難禁。肩後腋下兩歧
 骨縫之間。小腸經肩髃穴也。髒疽部分。肩前腋上。開合凹堂之中。手厥陰心包
 經也。樂疽爲患。臈瘡生臈部。週匝漫攻。紅腫外生。暈二險三凶。藕包毒。堅如鵝卵。
 亦臈部之瘍名也。內是三陰外是陽。魚肚發。生於臈後垂內處。乃心經之青靈穴
 也。陰多白色陽多赤。石榴疽。在肘尖之上。天井穴。乃少陽之經。肋癰繞肘中。心肺
 二經之邪。臂瘡赤而疽白。內外陰陽。腕瘡在手腕背面。乃三陽經共走之地。腕疽
 生手腕裡面。乃太陰經動脈之所。掌後橫紋上三寸。兩經陷中包絡經。穿骨疽生。
 骨蟻疽在臂外側。前廉大骨之後。經屬陽明。螻蛄串。生臂內中廉。連腫數塊。漸次
 破潰。疼痛如中流矢。經是心包。手發背。生於手背。三陽經。風火濕交凝。掌心毒。發
 在手掌。勞宮穴包絡經行。虎口疽生合谷穴。經屬陽明。手背屬三陽經。赤腫起埂
 如鰕。症名病鰕。手了發。生衆指歧骨縫間。脾中濕火。調疽生于手大指。肺經積熱

而成。脫節與脫疽同害。蛇頭疔。天蛇毒。手指頭尖。蛇眼疔。生於指甲兩旁。蛇背疔。發於指甲根後。中節繞指腫痛。蛙節疔。稱中節腫似魚肚。蛇腹疔。生更有一指通腫。色紫而狀若泥鰍。泥癩疽。稱代指。生指甲身內。瘍瘡生指掌之中。形類茱萸。兩手相對攢叢生。破津黃水。痛癢頻作甚疲頑。蓋由風濕襲於膚腠。蟻蠅蛙在手指骨節。色白腫堅如蟬肚。而屈伸不便。寒痰濕氣。體虛人必久潰成勞。狐尿刺。由螳螂精之毒染於諸物。人手足誤觸之則生。紫點紅斑。陡作。鵝掌風。掌心皮乾枯裂。楊梅毒。血燥生風致患。前後兩陰之間。部名曰纂。任經會陰穴是。此際生瘡懸癩。是名。症由三陰之虧損。又兼濕熱壅滯。漏膿而難生。穿襠發在會陰前。腎囊後。紅亮焮痛。濕熱純陽。稱易治。黑進紫硬。憂勞鬱火。實難醫。係皮囊之空處。破綻何堪。單丸痛而漏溺。補益徒施。跨馬癩。生於腎囊之旁。大腿根裡側。骨縫夾空中。肝腎兩經之濕熱也。便毒。生腹下腿根摺縫。腎肝精血留凝。左便毒。右魚口。古語有云。疔瘡諸症。名以形殊。下疳。生于馬口下。吐疳。在至莖上。腫脹外皮包裹者。袖口疳。

稱之極是。疔久偏腐，臘燭疔於焉可名。痛行單丸，鷄瞪疔陰囊腫墜，滲膿作癢，磁
 根疔馬口旁生，痛癢沿皮潰，形如爛杏之無皮。癰疔之証腐爛宛如田，症乃楊梅
 之遺毒。梅疔是矣。雖名多而形異，皆邪火以釀成。腎囊癰紅腫，焮痛腎肝濕熱居
 多。繡球風腎囊濕癢，肝家風濕襲成，尻尾骨尖鶴口疽，督脉經以形命名。少壯猶
 可治，老弱斷難療。坐馬癰，尻尾骨之略上，督脉之濕熱何疑。腎內厚處是腎癰，白
 腫不潰由陷凶。上馬下馬，腎內下摺紋之中。太陽濕熱須知，尻骨之前長強穴，屬
 督脉經之首穴也。涌泉疽狀如伏鼠，成冷漏老弱無。論藏毒即肛癰，有虛實之分。
 實可飲而虛成漏，實由陽明之濕熱，虛由肺腎之陰傷。咳嗽吐紅，終成勞瘵。痔瘡
 有內外，成愈無期。名有數十種，陰虛濕熱醫。腿根作癢如黍豆，感濕熱而成坐版
 之瘡。大腿外側是三陽，先痠痛而後白腫，釀成附骨之疽。內側屬三陰，筋骨痛而
 屈伸難，致生咬骨之疽。經雖分乎陰陽，病總由于寒濕。體虛慾後被寒侵，終成
 痼疾。沈寒陰冷膿清臭，必延壞症。股陰疽，股內合縫之下，位近陰囊。足厥陰經潰

後纏綿收斂非易。橫痃疽。股內合縫紋間。三陰經七情鬱滯。伏鬼疽。膝上六寸正中。胃經穴火毒而生。股陽有疽。股外側跨尖之後。環跳疽。患跨骨節環跳本穴。貳症皆白腫。風濕與寒凝。箕門癰。膀胱濕熱。股內近膝箕門是。脾經爲病。腿遊風。兩腿裏外忽赤腫。形似堆雲。焮熱疼。由營衛風熱相搏而成。青腿牙疔之症。腿腫色青。牙齦疔腐。蓋因陽火炎熾於上。陰寒閉鬱於下。既陰陽之乖變。非馬乳而莫療。若穿腮而破唇。腿腐而乾枯。縱治無功矣。膝癰生膝蓋。紅腫焮痛。疵疽亦膝蓋。色白堅硬。經云。肉之小會爲谿。谿者二肘二膝四腕也。凡脾病在谿。腎中邪。其氣流於兩膝。凡筋病皆屬於節。筋乃肝之餘。故又屬肝。是以谿會有病。皆從脾。腎肝三經邪氣乘之也。膝眼隱痛。膝眼風。下焦素虛。邪易湊。因於風也。痛走注而無定。因於寒也。痛如刺而難忍。因於濕也。形胖腫而作疼。伸不屈者。病在骨。屈不伸者。病在筋。動移不遂。况寒痼冷之候。左右相傳。是過膝風極險。鶴膝風。臏粗大。上下股腫枯細。三陰虛損。風濕寒侵。潰後必延損廢。下疳生於膝間。腫似雞卵硬如石。

皮色如常。不炊不熱難消潰。既潰難斂。綿延歲月最皮頑。身虛寒濕襲。瘀血結凝成。緩疽由外寒之深襲。血滯瘀凝。或生兩膝上。或生兩膝旁。腫硬如餛飩。常木痛。色情紫黯熱炊。癰疼。日久肌肉腐。爲累石疽。同。膝後曲處部爲癰。穴是委中紋陷中。委中毒經屬膀胱。上紅魚。生委中摺紋兩梢。腫如高墳。長若魚形。血熱遇外寒而稽滯。血瘀遂凝結而生此。三里發。生膝眼下三寸。外側前廉兩筋間。初形如牛眼。勞力致傷筋。腓膈發生小腿肚。腎虛。膀胱積熱凝。古方云不治。焮赤無妨。黃鱗瘡。在小腿癰腹之裏側。形長數寸。若泥鰍。微紅硬腫生疼楚。症屬肝脾濕熱凝。青蛇毒。又曰蛇便。小腿肚形長數寸。腫高塊紫而殭硬。壯熱憎寒痛不餐。由腎經之素虛。與膀胱之濕熱。其頭向下毒輕淺。向上須防內陷凶。脛足與足後跟相接處。疽名接骨發。膀胱濕熱也。內踝骨之上三寸。附陰疽也。三陰之交會。收斂故遲。兩踝生疽分內外。內名走緩外穿拐。內三陰。外三陽。分理無差。穿踝疔由脾經寒濕。先從裡踝串外踝。皮色如常腫痛多。有頭爲陽還易治。無頭悶腫屬陰難。濕毒流注。

腿腫上流行無定。繞脛起核。瓜籐纏身發易滋。潰水易於腐爛。腠理風濕交蒸。腎氣遊風之患。多生於腎虛之人。腿肚紅腫如雪片。遊行莫定。痛如火灼。受風邪。腎火薰蒸。臙瘡生脛廉內外。分究陰陽。鱗漏類濕瘡滋蔓。腿肚居多。痛癢津黃水。孔如鑽眼深。寒氣侵于瘡孔。以致口寒而肌冷也。兩腿脚灣如風癱。四灣風熱火交侵。腫骨曲凹。黃水淋漓搔癢極。風流血脉。風疽難愈得疽名。足發背。三陽受毒。胆胃居多。湧泉疽足底中心。腎經虛損。脫疽敦疽。足指多而手指少。脫爲絕症。若是敦疽猶可活。甲疽。甲旁齧肉高突。足跟疽。又名兔嘴。膀胱之申脉穴也。陽蹻脉發源之所。腎經所過之地。膿水淋漓。真元暗竭。牛程躑。或是足跟。或足掌。皮頑硬腫起。高埂血凝成。琉璃疽生足跟旁。腫亮如粟。行路傷。足跟有冷疔。紫匏形如棗。腐爛孔深。難禁徹骨之疼。濕寒凝結。更兼黑氣難醫。田螺匏多生足掌。悶脹硬痛如豆粒。傳度三五。連生數匏。皮厚既難自破。已破濕爛堪憎。脾經濕熱下注。外寒閉塞而生也。（未完）

病理學續五十三期

四 氣候

理事時逸人

新說於氣候之足以致病者。質言之。即吾國所謂地理病學是也。以寒帶熱帶爲比例。氣候之最中和者。厥爲溫帶。吾人體中之能力。抵抗寒冷之力較強。抵抗溫熱之力較弱。是以熱帶地方。一年之間。傳染病幾無虛日。其最著者。爲日射病。中暑症。黃疸。赤痢。肺炎。肺結核等是。居寒帶者。傳染病極不易發生。惟冬令呼吸器病。稍多而已。此其分別之大概。

按氣候之變易。由於地方風土之不同。即所謂地理病學。內經異法方宜論。謂東方之域。漁鹽之地。海濱傍水。其民食魚而嗜鹹。魚者。使人熱中。鹽者勝血。其病爲癰瘍。其治宜砭石。西方者。其民陵居而多風。不衣而褐薦。華食而脂肥。故邪不能傷其外。其病生於內。其治宜毒藥。南方者。其地下。水土弱。霧露之所聚也。其病孳痺。其治宜微針。北方者。地高陵居。風寒凜冽。其民樂野處而乳食。藏寒生滿病。其

治宜炙熇。中央者地。平而多濕。食雜而不勞。病多痿厥。治宜導引按蹻。所謂一病而治各不同者。因地勢使然。故曰。治不法天之紀。地之理。則災害至矣。仿此意而推究之。在中國以內。既有五方之殊。此上古狹義之地理病學。國以外。復有寒帶與熱帶之異。此廣義之病理學。必知此意。而後始可與言病理與氣候之關係。編者按。攷西醫病理學。此下爲四季。及時候。土地等。與中國之學理相同。而衣食住。職業。及習慣。動作等。皆指狹義而言。與病理原因。無甚關係。故從略云。

(五)化學之刺戟

凡化合性之物質。於身體上有損害者。謂之毒物。或接觸皮膚之一部分。爲局所組織變化物。或誤服入內。發生中毒之症狀。或侵害神經系。及心臟。或發生內分泌之異常。凡此種種。皆屬於化學之原因。

1 腐蝕劑

凡各種腐蝕劑。傷於人體之一部份。乃起局所組織之變化。在吾國醫學上。包括

於損範圍。

血液毒

凡侵入血中而起變化者。曰血液毒。此類之毒物甚多。大部份。有氣體及固體之別。氣體侵入。以呼吸器爲道路。被吸收而入於血中。固體侵入。以表皮之創傷。飲食中之雜質。皆能傳襲於內。成血液中毒症。至所起之變化。亦有二種。一爲血液中化學成分起變化。一爲血液有形成分起變化。

氣體如氧氣及酸化。炭素等。由呼吸器侵入血分。與赤血球血色素之結合甚堅。能妨害血液與養氣結合之生理機能。續發呼吸困難。終至心臟麻痺。

固體毒物。其種類甚多。例如塗大量嗎啡於表皮。而致全體神經。爲之麻痺。酸素加里。能使赤血球崩壞溶解。續發著明之循環障礙。

3 侵害神經念及心臟

由此類物質之中毒者。僅起心臟神經之官能障礙。無解剖上之變化。即有變化。

亦祇限於神經細胞而已。斯即麻醉劑是也。而阿片、酒精等物，往往誘起神經心臟各病。故凡酒醉煙迷，皆可屬之。

4 自家中毒

前此所述者，皆化學上物質。由體外侵入體內。故一名體外形成毒。欲為詳細明切之研究，當於毒藥物學中詳之。但病理上，所當注意者，為體內形成毒。即自家中毒。及內分泌障礙是。身體內部新陳代謝機能，所生有毒之物質，如產量太多，排泄之力不及，鬱滯在內，破壞固有之生理作用。於一定臟器，發生變化，甚或發全身之障礙。

(一) 吾人腸胃之內，有無數腐敗菌，營腐敗作用。賴脾液胆汁，以制止之。使制止之能力減少，則腸管內腐敗作用增盛，遂致毒物鬱積。由吸液管，吸入血分，遂起全身中毒症狀。為心煩譫妄，呼氣中亦有臭氣，神志昏狂，舌生黑膩厚苔，即為自家中毒之一種。

(二)當腎臟疾患時。排泄尿量減少。尿分鬱積於血中。故現中毒症狀。為頭痛嗜臥。昏睡癩癩等。以腦部症狀為最著。因身體內鹽化物鬱滯。刺戟血管運動神經中樞。使血管壁收縮。而起腦部貧血症。是以尿毒症。多發腦症也。

(三)當肝及胆道。有病變時。則胆汁之排泄障礙。吸收血分。發全身症狀。即為黃疸病。

(四)凡代謝產物。皆為毒物。而平常所以不中毒者。以有排泄機能故也。故排泄機能。苟生障礙。遂起中毒症狀。

(五)全身代謝產物異常時。為尿酸鹽酸之過多。往往沈着於關節間。可使局部組織變化。或生炎症。所謂痛風是也。

(六)妊婦發子癩。據西醫以實質之攷察。謂在解剖上所得。肝肺腦腎等部。毛細管中。每發見多數血塞。且有出血性之變化。又於肺中。屢見胎盤之脈絡膜組織片。是即融合巨大細胞構成之。以斯意研究。實因胎兒性。胎兒盤組織之融合。

巨大細胞侵入母體血管中而母體血液以反抗作用融解此種毒素遂有中毒症狀。斯卽子癩是也。

按孕婦之病子癩者百人而一耳。是必于孕婦體中排泄融解之機能發生變化。斯乃凝滯爲害。並非盡人如是。西醫所謂胎盤組織之巨大細胞。壅滯母體血液。失其排泄。究所以失其排泄者。在血熱內壅之故耳。中醫治此症。注重清熱。育陰。潛陽。鎮寧。諸法。多能獲效。西醫雖知其理。不得其治。實無益也。

(六) 寄生物

寄生物者。寄居於人體。及動物之微細有機體。因無獨立生活之能力。故曰寄生物。其寄生於表皮之外者。曰外部寄生物。其寄生於內臟之組織者。曰內部寄生物。

1 原始動物

爲形體不完全之下等動物。自單一細胞而成。其作用能分裂爲二。以滋生繁殖。

其形狀之種類。西說雖有多類之分別。然已經證明者。如大腸中阿米巴。於赤痢患者之糞中常見之。又古說以瘧疾感瘴氣而來。大麻風感厲風而發。今以精製顯微鏡檢查之。則此瘴氣與厲風中。均得發見形體不完備之微虫。此微虫。即單一細胞之原始動物也。

2 內臟虫

寄生於人體內臟之蛔虫等。新說雖分扁虫。條線虫。等類。然皆屬於內臟之變化。中國古說。以為物必先腐。而後虫生之。新說以自食物。傳入幼虫。或虫卵而成。間有生長死滅於人體內。不生病者。有中道發育。後仍排泄於體外者。有寄生於內。繁殖極速。發生重篤之病症者。

3 節足動物

多在人體外皮生活。如疥癬虫。毛囊虫。秋虫。木蝨。之類。以及虱。蚤。臭虫等。易為疾病傳染之媒介。

4 植物性寄生菌

各種傳染病之病原細菌。因屬植物性。故不稱虫而稱菌。以其與草木間之菌類相似。然此種細菌。非目力所能見。必藉千倍以上之顯微鏡。而後方可以知之。據新說菌種類分別法。(一)分裂菌。(二)發芽菌。(三)焦狀菌。而分裂菌之中。又別為球菌。桿菌。螺旋狀菌。三者之不同。分裂菌。為菌類中最小者。亦曰原始植物。淋菌。肺炎菌。腦脊髓膜菌。等皆屬於雙球菌。重全球菌之類。流行性感冒菌。為桿菌中之最小者。脾脫疽菌。為桿菌中之最大者。白喉。鼠疫。亦皆屬桿菌之類。霍亂菌。則屬於螺旋菌之狀態。

發芽菌。一名釀母菌。多屬於腐敗之作用。絲狀菌。亦能如分裂菌。由自體分裂而繁殖。寄生於人體。形狀不一。為單一或分歧線狀。或互相連合。構成關節。其能發生病症者。實居少數。大都營腐敗之作用。

(未完)

第五十四期 病科專



二十六

論說門

中醫與科學

(上海全國醫葯團體總聯合會來件)

蔣文芳

在這業務競爭劇烈的時代。各業的人們。爲着麵包問題。命地宣傳自己所營業務的長處。譬如開大菜館的館主。一定要說我所辦的材料。完全是頂上的來路貨。我烹調的方法。完全採取歐美。開洋服店的老闆。一定要說我所辦的材料。是揀選歐美頂上的出品。織成的式樣。全是巴黎紐約最時髦的翻興。像這樣的宣傳。我們用冷靜的眼光。把恕道來批評他。與其說他可笑。還是說他可憐。可是洋服店。和大菜館的主人。究竟是一種商人。並非知識階級。所以頭腦還很簡單。他們只知道做正面文章。沒有做過反面文章。說中菜館的酒菜粥飯。吃不飽肚子。甚而說他沒有營養料的。含有毒質的。中國衣舖。和裁縫店裏出賣。和做成的衣服。不合國際化。甚或說他沒有保護體溫的能力。穿了要凍死人的。的確我們

貴國裏。生長出來反對中國醫藥的西醫。是受過高等教育的西醫。他們的頭腦和手段。比較大菜館、洋服店的老闆。高明得多了。他們知道。自己缺少創造的能。力。倘若單做正面文章。說外國醫藥怎樣好到極點。似乎負着一種包銷外貨的嫌疑。就是飄洋過海。受過鍛煉的面皮上。恐怕也要發紅發熱。所以狼聰明地。狼乖覺地。掉轉筆頭。去做他的反面文章。說中國醫藥。怎樣不好。應該消滅。橫使人們終久免不了要生病。如果反面文章。發生效力。把中國醫藥消滅之後。逃不了要來請教西醫西藥的。他們更知道要說中國醫藥的壞處。終得加上他一個罪名才行。在十年之前。中醫重理論。西醫重實驗。這句話。麻醉了不少民衆。這件罪案確實足使中國醫藥。死有餘辜。那時我剛從學校裏。跨到中醫界來。開始讀幾部醫書。覺得中醫的學說。並不偏重理論。譬如內經裏說「熱如燔炭。汗出而散」。完全紀述實驗上病愈的經過。一點不參加理論。仲景傷寒論。開場就說。太陽之爲病。脉浮。頭項強痛而惡寒。發熱汗出。惡風脉緩者。名爲中風。桂枝湯主之。記述

病狀。病名。治法。絕無一句理論。夾在中間。後來根據了中國醫學書籍。實驗上的記載。去療治人們的疾苦。更復得到不少實驗上的結果。覺得加給中國醫藥的罪名。完全是虛構誣陷。所謂不平則鳴。到了現在。不但社會上的觀念。漸起變化。就是西醫也承認中國醫藥的發明。完全根據實驗了。

但是西醫生長在中國。而反對中國醫藥的西醫。畢竟是很聰明的。很乖覺的。受過高等教育的學者。決不會因為誣陷的失敗。就此灰心罷手。眼看中國醫藥在事實上繼續進取。而且治愈大多數人們。確實難以硬派他。只有理論說空話沒有實驗。不能治病。覺得理論實驗。兩個名詞。難不倒中國醫藥。麻醉性不能繼續的延長下去。而且這兩個名詞太質實。而容易折穿。於是乎搨出『科學』兩個字來。說中醫不合科學。不能立在科學時代。好在科學兩個字。牌頭十分紮硬。是天之嬌子。是金科玉律。說你不合科學。任你有十分成效。總覺得不合科學。就是違背了金科玉律。決不許你有立腳的餘地。更好在我們中國人。尤其是可憐的中


國醫藥界大多數還沒有曉得科學兩字。到底是甚麼東西，不合科學這件罪名。可以使中國醫藥界吃了官司。還沒有曉得到底自己的行為是否犯了。『不合科學的法。這啞謎兒。真也滑稽透頂了。我們中國醫藥界。雖然沒有曉得科學兩字。到底是甚麼一件東西。然而總覺得這種『不合科學』的罪名。確實可怕。在無法之中。想出一種對付的方法出來。說中醫是哲學的。希望卸脫罪名。減輕罪案。但是究竟甚麼叫做科學。甚麼叫做哲學呢。恐怕他們已經在旁邊拍手大笑。着了他們的道兒了。

甚麼叫做哲學。是我們自己第一要先明白的。Philosophy 弗羅莎弗。原是從希臘文裏出來的。我們中國人譯他叫做哲學。這個名詞。也可以說這種學問。發現在西歷四百年之後。距今大約要有一千五百多年。那時人類求知的欲念。漸漸亢進。希望從萬物的 Appearance 現像上。求到 Beauty 本體來。同時並感覺到上帝創造萬物的一句話。神學不可靠。豈起哲學的旗幟來。和神學宣戰。擺脫迷信的桎梏。

追求最後的真理。要想從現象上直見到真確的本體。除開宗教上的見解。窺見宇宙與人生的真面目。這是創立哲學的意義。後來哲學的責任。日漸嚴重。哲學的工作。日漸繁劇。治哲學者。基於分工的原理。把從天文界現象。尋求真理的工作。開成天文學。把研究物質變化和作用的。開為物理學。就此成立了分科的學問來。所以哲學打倒神學之後。把各種可以分科研究的學問。分科研究。而成立了科學。但是宇宙間的萬物。有非分科所能研究。就是科學能力。還不敢接受的。仍要用哲學來解決。同時對於各科學研究結果。不同和錯誤的地方。還是要用哲學來批評糾正。使他更為圓滿。所以哲學打倒神學。而科學打不倒哲學。因為哲學。既將能分的各種工作。分配給科學去研究。而科學仍將研究的結果。供給哲學的材料。是相互為用的。Dikrood 伯樂德。把哲學分為二大部分。一種叫 *Practical Philosophy* 实践的哲學。一種就叫 *Critical Philosophy* 批評的哲學。可是哲學的界說。太汎泛廣大了。治哲學的人。用最歸納的方法。把他別為三門。(1) *Theory of*


Knowledge 知識論。(1) heort of Being 實體論。(2) theory of conduct or Value 行為論。或價值論。除開用冥索的哲學。追求最澈底最後的真理外。還用批評的哲學。或是哲學內的學。(Hietale 亞里斯多得所謂 *Epistomē*) 研究任何科學不能單獨佔領的。包含數種科學的。科學方法不能盡的。及在各科學以外的各種問題。但在主張科學萬能。主張打倒哲學的人。以為哲學的存在。實在無俾實用。徒靠着幾個哲學上久懸的問題。什麼人生觀呀。宇宙觀呀。發表些 *Pentative* 嘗試的答案。什麼唯心論。唯物論。一元論。多元論。鬧得烏煙瘴氣。就是我國的莊老楊墨也無非在人生觀上。發表些嘗試的答案罷了。甚麼叫做科學。是我們現在。急須應當曉得的。根據前段文字上看來。科學是從哲學裏分析出來。希望更詳細地分科研究。但是依舊沒有澈底解決宇宙間萬物的一種學問。在英文裏 *Science* 賽音斯一個字。是從拉丁文產生出來的。他的意義。無非說知識。或是學。但是現在所稱的賽音斯。就是我國意譯的科學兩字。

概認為是有統系的分科的學問。Palkimoson 托摩生在他 Chi yntsoor - wctio in science 科學序論裏對於科學下了一個很簡括的定義說「科學是對於經驗上的事實用極簡括的法式作自圓的記述」我們看了托氏的定義科學到底是一甚麼東西大概也可以曉得了。Opa satri ek 派特里克把科學的工作列成一個明確的表式現在抄在下面。



更可以把科學的方法列表如下

科學的方法



學既有替代哲學。研究宇宙間萬物的奢望。依照第一表式。科學的工作職務是尋求到事實之後。記述起來。說明他。所以科學要給事實服務。並非事實及科學服務。依據第二表式。科學的方法。雖然有時借重技術。而技術方面。有一部有時要借重器械。然而大部分還是依靠名學。因為科學。究竟是人的科學。所以研

究科學的人。首先要觀察經驗上的現象。直觀上。所不能觀察到的。可以根據觀察到的推想他。再把觀察到的。推想到的。分類分析開來。比較他。未後歸納他。把歸納好的統計。並測量他的量數。放眼看看事實的沿革。然後演繹歸納。而定出方法。就是所謂科學方法。

中國醫藥。是否不合科學。根據托氏定義。先要問中國醫藥。是否有醫好病人。經驗上的事實。如果沒有醫好病人。經驗上的事實。然後可以說。中國醫藥。不合科學。第二要問中國醫學。是否有法式和記述。如果沒有法式和記述。可以說中國醫藥。不合科學。關於第一個問題。我們可以不必置答。每天。自有數千。數萬。請教我們的病人。替我們證明和答復。關於第二個問題。就要問我們自己。在行使業務替人治病的時候。是否不依記述。醫學書籍。不依法式。隨便治療。像扶亂般的。我可以負責代表中醫界說。我中醫界。並非天賦異秉。生而知之的聖人。莫有一個。不依靠記述經驗上事實的醫學書籍。可以行業的。同時可以負責說。沒有一

個中醫。有這樣的大胆。敢不依法式。隨便治療病人的。中國醫藥既有經驗上的事實。醫好病人而其行為上。又有一定的法式。學說上。又有圓滿的記述。對於科學兩字的定義。適相吻合。甚麼叫做「不合科學」呢。再進一步。從中國醫學書籍看去。把最古的來說。黃帝內經。他的內容。也無非尋求事實。記述事實。並說明事實。他的說明。雖然可以說他多少含一些哲學色彩。但要曉得黃帝。距今已有四千六百多年了。這是時代的關係。不能吹毛求疵的。因為那時。不要說英、美、法、德、日本。尙未開國。一般人民。還在度着那原始時代的生活。忙着拜太陽、拜火。就是希臘、羅馬。西方文明發源的地方。也正還在神學萌芽時代呢。我們的中國醫學。一到漢朝。已經完全在科學上立足了。試看仲景的學說。他幹的完全是科學工作。用的完全是科學方法。一部傷寒論。把內科學。說得極有統系。綱舉目張。可以列爲表式。而且一點沒有神學或哲學的氣味。完全根據技術上的實驗。觀察推想。分門別類。把各種病症治法。分析和比較。歸納起來。用個統計的方法。分配開

來。演繹成功。一部名著中國醫學的正宗。再試看外科學者華陀。他也担任科學工作。用科學方法。展施他高超的技術。中國醫學。在二千年前已經穩穩地在科學上立足。到了現在。反有甚麼不合科學的謠言呢。倘若武斷說一句。外國來的東西。必合科學。中國自己的東西。必不合科學。因為「科學」兩字。是外國創立的緣故。那麼也可以說。吃麪包。是合科學。吃饅饅。不合科學。吃白米飯。更不合科學。以武斷中醫不合科學。是欺人之談。是提倡外國醫藥的反面文章。目的在消滅中醫。推行西醫西藥。希望同業。要覺悟這一點。而且還希望把這一點。來覺悟一般社會。我在這裏。否認中醫不合科學。同時自認近時中國醫學的進步。比較上確嫌遲緩。大部分的原因。雖在歷來的政府。不加提倡。但究竟是我們自己的責任。所以希望同業。勿因「不合科學」一語的誣陷。自暴自棄。還是要打疊起精神來。努力的求進。

中醫知何使用科學方法

尤學周

令之排斥中醫者。每藉科學二字。以指摘之。科學之是否萬能。非吾所知。且不在本篇範圍之內。惟其方法之精密周詳。非憑空結構者可比。中醫不欲改革則已。如欲改革。不可不從事於科學方法。所謂科學方法。非有何等之祕奇。惟組織較為完密。理由較為真實耳。

科學之方法。凡三。為比較法。歸納法。演繹法。由特件以推論。至特件時所用者。為比較法。由特件以為推論。至通則時所用者。為歸納法。由通則以推論。至特件時所用者。為演繹法。

(一) 演繹法。演繹法。僅能用於既有通則之後。若通則不完全。或未能成立時。雖用此法。無甚效著。例如內經之寒者熱之。此可認謂通則。因病之寒者。或服熱藥。或覆被取汗。或用倏法。必溫之而能解。為完全而能成立者也。如冬不藏精。春必病溫。此則不可認為通則。以不藏精而受病者。未必限於冬。冬不藏精之人。未必至春病溫。而病春溫者。多半非冬不藏精之人。此種學說。未得完全。不能成立。

今舉其已成立者數例。試用爲演繹法。如通則謂寒者熱之。特件謂白通湯除厥逆。何以故。因白通湯中之藥性皆辛熱。如通則謂陽明之爲病。胃家實是也。特件謂傷寒吐後。腹脹滿者。屬陽明病。何以故。因胃家實也。又如通則謂脈浮者。病在表。可發汗。特件謂少陰病。脈微。不可發汗。何以故。以脈不浮也。吾人平常所引之內經曰傷寒論云等。亦爲所認。爲彼通則之一。所以證明言之適當與否者。諸如此類。在論理學上。分大前提。小前提。斷案。三段。以表明之。如

大前提。寒者熱之。

小前提。白通湯爲熱藥。

斷案。故白通湯治厥逆。

大前提。陽明之爲病。胃家實是也。

小前提。傷寒吐後。腹脹滿者。屬陽明病。

斷案。故傷寒吐後。腹脹滿。爲胃家實。

大前提。脈浮者。病在表。可發汗。

小前提。少陰病。脈微。不可發汗。

斷案。以脈不浮故也。

前二爲者肯認大前提爲建設的。後者否認大前提爲破壞的。雖有破壞性。而其大前提之價值。終不變。苟有搖動。則不能認爲通則。至此。而作結論曰。所謂演繹法者。爲根據事實之已知者。及假定爲已知者之通則。推及此事物之變體。或屬體是否合於此通則之方法。

(二)歸納法 演繹法由通則以推論。至特件歸納法。由特件以推論至通則。凡科學上所用之種種方法。皆由歸納法造成。其法有完全不完全二種。有就許多現象或事實。求得其公共之點。而總括之。爲一彙者。集五種傷寒之列。入傷寒論中。即其一例。有以某地某時爲限。搜許多實例。及通計限內所有。而求其平均數者。例如就上海一隅。每診治之病人。而統計之。有若干。或若干爲患傷寒者。若干

爲患溫病者前者爲概。括後者爲統計。二者皆不能推論新知識。屬於不完全者。完全之歸納法其道有五。

(子)類同法。以二例或二例以上。而知研究之現象。在某一公共之點。無往不相符合。則此公共之點可據爲通則之一。如胃家實。用三承氣湯。脾約。用麻仁丸。身黃。小便不利。腹微滿。用茵陳蒿湯。少陽陽明合病。用大柴胡湯。心下痞。按之濡。用大黃黃連瀉心湯。數證。皆心下痞滿。而爲胃實之證。方中皆有大黃。則知大黃所以除心下痞滿者。

(丑)差異法。有某種現象。即用其種方法。反是則不用。在二例之中。其現象除某種現象不同外。餘皆相同。則某種方法。爲用於某種現象之一通則。如太陽病。醫反下之。腹滿時痛者。桂枝加芍藥湯主之。大實痛者。桂枝加大黃湯主之。二證之差。在時痛與大實。痛上。時痛爲裏氣不和。大實痛爲胃實。一加芍藥。一加大黃。則知大黃爲除胃實之藥矣。

(寅)類用差異兼用法。有此現象之二例數例。其間惟一公共之狀態。而無此現象之二例或數例。除無此狀態外。餘無公共之點。則知此狀態。即其現象之通則。例如數人同患腹滿痛。大便燥實之陽明病。服大黃者。瀉去積穢而病除。其有不服者。病仍如故。知則所以使其瀉去積穢者。在於大黃之力無疑。

(卯)共變法。前述三法。為歸納法之初步。及其進也。更必研究現象之程度分量。及其程度分量。對於因果之關係。有用一種差異法。而由現象之數量。以明其因果關係者。曰共變法。若一種方法變化時。其現象亦隨之變化。則此相隨變化之現象。其通則。即為某種方法。如同以大柴胡湯。治同樣之少陽陽明合病。其滿減之多少。恰與所用大黃分量之多少。為正比例。則知去積之力。在於大黃一味。

(辰)賸餘法。用某種方法。即起某種現象。設於某種方法中。少去一部分。則其所起之某種現象。亦少一部分之變態。今除去此部分。則知所餘之方法。可以推論。所餘現象之通則。如已知茵陳蒿治濕熱。梔子利小便。今傷寒七八日。身黃如橘。

子色。小便不利。腹微滿者。茵陳蒿湯主之。茵陳蒿、梔子、大黃三約除。去身黃如橘。子色。用茵陳蒿。小便不利。用梔子而大黃之治腹微滿。白可知矣。

由以上各法。而推論其結似可認為通則。然自他面觀之。則所得仍為臆說。故必藉察觀及實驗之助。以覘吾所謂通則。究與一切現象。是否符合。又與其他通則。是否貫通。必俟證據充足。其說乃能成立。是又兼用演繹法。時至今日。吾輩對於歸納法。應有一普通概念。姑以歸納法。而名以歸納法之定義曰。觀察事物之形性。而比較其異同。因以求得共同於此類事物間之通則者。歸納法是也。

(未完)

袁復初

中醫科學化之研究

二十年前。在校肄業。酷嗜數理之學。後執教鞭。主數理講座者九年。於數理理化。學頗思有所貢獻。其時家中多患病者。醫藥之費。年耗一二百金。民十一春。次兒以誤藥亡。乃動究醫念。皆自勵曰。中醫模糊影響。殺人無算。余必發其秘密。而使

之科學化。於是廣購中西醫籍課餘從事閱覽。

民十一秋。母病垂危。自製方劑。桂枝用輒四錢。吾邑醫者揚言曰。某必殺其母矣。未幾病竟獲痊。是年冬。內子患溫甚劇。治以葉法。並用體溫表驗體溫。詳錄臨床筆記。葉香巖外感溫熱篇。實驗過半。病乃得痊。內子自來歸後。恒與藥爐爲伍。至是宿病亦瘳。乃悟前此多病。非病病也。實病藥耳。於是乃致力中醫之研究。

民十二年。醫學士友人。某設醫院於桐廬。其所習者。爲德日派。余知內分泌。白此始。一日余友胃痛甚劇。服藥水無效。注射亦無效。余爲處方。越一時許即愈。於是余友。乃中藥有研究之價值。惟於陰陽五行說力斥其謬。余亦以爲此種玄談。似與醫藥無關。病理藥性。悉仿西法分類。

民十四夏。自病家歸。途經山野。見植物之嫩葉。忽悟陰爲吸引力。陽爲福射波。五行乃能力之循環。於是博考羣籍。用科學研究法。苦思力索。積稿至數十冊。始悟陰之原。在原子之電。核九數由此而生。數者。質量也。陽之原。在原子之電子。九氣

由此而生。氣者。能力也。自然界之現象。無非質與能之變化。五行者。萬物之電磁場也。陽極（北極）之吸引力曰水。陰極（南極）之輻射波曰火。電力（陽電）自左而右曰木。磁力（陰電）自右而左曰金。重力或化學力曰土。大而至於天體。小而至於分子。無物不具陰陽五行。乃信我國醫學。確有科學化之可能。

大凡學說。能合自然界真理者。必無消滅之日。故欲使中醫科學化。須以病人為研究之對象。即以病人為溝通中西之媒介。等是病也。中醫觀察研究之結果。則成中醫學說。西醫觀察研究之結果。則成西醫學說。學說雖異。真理則一。莊生有言。得魚忘筌。中醫學說。其表筌也。其裏魚也。倒如有患脊髓炎者。中醫謂為肝病。用四物湯加味治之而愈。（治驗案。見漢方醫藥之新研究。）世醫妄謂肝即消化器之肝臟。抑知肝主春而屬木。乃人生之電場。非血肉之肝臟。內經所謂肝主筋者。蓋言電力流行。運動神經系也。故四物湯證之脊髓炎屬之。

民十五年。研究金匱溫筋湯方。發見經方藥味。有一定之順序。進而求之。於是發

見金匱之原理與系統。於是發見傷寒之原理與系統。於是發見內經難經之原理與系統。至此始悟內經、難經、本經、傷寒、金匱、外加重重祕鑰。非古文學手眼。無由啟也。金匱以人體物質之變化為對象。專論奇經為病。即依九數之理而作。傷寒以人身能力之變化為對象。專論六經為病。即依九氣之理而作。九氣為磁場之變化。九數為電場之變化。內經難經所論蓋即人身電磁場之變化。所謂九九制會是也。由此言之。我國醫學。實以理化學為基礎。治哲學科學為一爐。世界各國猶未發明。本此原理以治萬病。乃能應用無窮。若夫侈談藥效。小家技耳。非中醫精華也。

九九制會之理。實發現於民十六年歲首。其時南北軍鏖戰於吾鄉。大礮聲震山谷。乃悟九九制會為生活之原則。並悟人之生理現象變化無窮。而其公式不外八十一種。素問、靈樞、難經。乃就每公式之各面立說。今之醫者。謂內經為空論。謂本經為實驗。抑知本經之說。即是內經之說。不懂內經。當然

不懂本經。不懂傷寒金匱。閱者疑吾言乎。試問內經百病二字。作何解釋。病由何氣。病在何處。苟不知此。則本經朴消箇桂之主百病。吾知非曲加解說。必目爲太籠統也。又如不明內經邪氣二字之定義。則本經芍藥百合之主邪氣。或且視爲迷信之談也。

曩著奇經與內分泌。以明金匱系統。仲景係依伏羲八卦。乾兌離震巽坎艮坤順序。而作。曾載三三醫報。今承逸人先生惠贈山西醫學雜誌。第五十期。內言月前中國醫學大會。開四次會議於北平。西醫腺科專家。張允中氏。提中西醫學融會案。謂西醫最新學術之腺科。與中醫奇經八脈說。頗多相合。中醫腺之發見。乃在數千年前。實爲可驚云云。誰知中醫學之可驚。在醫學之原理。而不在此等處也。

民十六年發見四診法之原理。欲明四診一貫之理。必先知內經。人身兩字之定義。內經曰。言人身之陰陽。則背爲陽。腹爲陰。人身者。自銅人圖三焦至十四焦之

軀幹部也。電流環行不已。乃成人身。五行。其上端爲陰極。亦曰南極。南極陽也。故背爲陽。磁力（陰電）自此下行。故心火爲人身陽中之陽。而肺金爲陽中之陰。其下端爲陽極。亦曰北極。北極陰也。故腹爲陰。電力（陽電）自此上行。故腎水爲人身陰中之陰。而肝木爲陰中之陽。其中和力。或化學力。即脾土也。人身之電磁場。反應地球之電磁場。是爲生理現象。電磁流行失道。是爲病理現象。磁流自右而左。蓋以五爲週期。故內經曰。色以應日。電流自左而右。蓋以六爲週期。故內經曰。脈以應月。聞聲所以察人身電磁場。南極之變化。故難經曰。問其所欲五味。以知其病所起在。是故望問聞切。皆所以察知人身電磁場之變化。由今驗之。寸口反射中樞。心臟鼓動中樞。迷走舌咽神經之內臟叢中樞。皆在頸胸髓間。當三焦之肺俞。此即切脈之原理也。智能中樞。軀幹肌中樞。皆在大腦前額葉。此即問證之原理也。電磁場以北極爲本。當人身之腰部。故內經曰。常求其要。則其要也。又曰。知其要者。一言而終。要者。腰也。知此始可與言中國醫學。

東方文庫第五十八種記思想之機械有云。用思而生能力。已爲千真萬確。又由能力而生化學變化。亦已千真萬確。此說可作問證原理之一證。又心理測驗法云。心中作何感想。手掌之電流量。即起變化。此說可作切脈原理之一證。

民十六年。正擬着手編輯中醫診斷學。而地方職務。乃重疊加諸身。勞人草草。不得不暫擱筆。近來中醫受西醫之影響。以爲除中藥有研究價值外。內難之說。應在屏棄之列。陰陽五行。尤非翦闢不可。其所倡者。爲見證治病說。抑知此種對症療法。爲學者所羞道。爲世醫所憂爲。頭痛川芎。腰痛杜仲。一般俗醫。搖筆即來。須知人身病式。本屬無多。而其證狀。則不可以數計。例如阿片癮之反應。據近世醫生研究。有七千餘種證狀。然其病式。不過麻醉大腦機能。(瀉腸)亢進脊髓反射(固腎)而已。又如桂枝湯之證狀。指不勝屈。然其病式。不過榮弱衛強而已。總之。湯藥治病原則。在利用消化系之調節機。化病理式爲生理式。故欲使中醫科學

化。應作下列之研究。

- (一) 闡中西調和說。以除中醫科學化之障礙。
- (二) 使陰陽五行科學化。以明中醫之原理。
- (三) 使九氣九數科學化。以明中醫之系統。
- (四) 博採中西會診之驗案。以供中醫科學化之參證。
- (五) 採用醫固有術語用能力分類法。編輯中醫各科課本。

纂述門

生理類

論全體生理(已未年舊稿)

理事時 港人

人體之內。一天然之機器也。在外有皮膚統系、肌肉統系、筋骨統系、及五官器之分。在內有神經統系、及呼吸器、循環器、消化器、泌尿器、生殖器、新陳代謝機之別。但共具一體之內。決不能各自為用。譬夫空際大氣之出入。必互相因也。譬夫機器運動之環轉。必交相用也。人為萬物之靈。有知覺運動之能。有思慮技作之巧。奈之何。無統一之主統。便能一氣貫通而周流活潑耶。汪氏曰。萬事皆起於心。五臟六腑。皆擊於心。心者。君主之官。在天以日為主。在人以心為主。故以心為全體生理之主宰。然而非矣。心之功用。據解剖學家言。即循環器中。射注血液者為一赤肉團。決非全體之主宰。西人曰。是腦筋主之。大腦主知覺。小腦主運動。腦橋主

運血。延髓主呼吸。行於顏面之十二對腦筋。俾五官器各司其用。行於脊髓之三十一對腦筋。使全體得以靈明。腦筋雖無所不包。猶機器之總軸而已。必有主乎腦者。而腦之功用始著。不觀夫地球乎。得大氣以包舉之。乃能麗於空虛。而化生萬物。不觀乎機器乎。得蒸氣以鼓動之。乃能運動不息。是惟無形能統有形。亦惟無形能有生形。無形者何。氣化是也。故嘉言氏曰。天積氣耳。地積形耳。人氣以成形耳。惟氣以成形。故氣聚則形存。氣散則形亡。氣之關於形也。豈不巨哉。然而人身之中。有營氣。有衛氣。有經絡之氣。有呼吸之氣。有臟腑之氣。各有區分。其所以統攝營衛。經絡。呼吸。臟腑。而令充周無間。環流不息。通體節節皆靈者。賴胸中大氣。爲之主持。此以大氣爲全體生理之一證也。洵溪氏曰。人之生死。視元氣以爲衡。夫所謂元氣者。視之不見。求之不得。附於氣血之內。宰乎氣血之先。陰陽開闔存乎此。呼吸出入係乎此。無火而能令百體皆溫。無水而能令五臟皆潤。此中一線未絕。則生氣一線未亡。是以元氣爲全體生理之又一證也。修養家謂爲祖氣。

即天地生生之氣。素問生氣通天論曰。蒼天之氣清淨。則志意治。順之則陽氣固。又曰。服天氣而通神明。凡若此者。皆以無形之氣。爲全體生理之主宰。而無可疑慮者。且徵之於氣機一衰。則出入廢。升降息。神機化滅。氣立孤微。及涕唾、津、精、汗、血、液、七般靈物。皆成死質。味者尙取血肉有情。爲煉石補天之具。不知全體生理之主氣。既存若而若亡。則此塊然者。亦成朽物。何反恃血肉朽物。欲其却病延年。不亦惑乎。是故治形必先治氣。氣乃形之主宰。治氣必先治神。神實氣之本源。先天之植此形者。惟氣。後天之率此氣者。惟神。神維何。卽靈性是也。不誠主宰全體之生理哉。故曰。研究生理。宜存哲學之觀念焉。

命門釋

名譽傳曉丞
會員

命門者生命之門也。卽元氣之所在。吾人得以生存競爭于此世界中。肌骨之能運動。腦筋之有知覺。心脈之循環。胸肺之呼吸。脾胃之消化。二便之排洩。毛竅之張縮。津液之分泌。罔非受此扶搖磅礴之元氣所驅使。氣盛則體強。氣衰則體弱。

氣熄則體僵。大矣哉。元氣也。危矣哉。亦元氣也。然自昔對於命門之爲物。言人人殊。數千年醫籍中。幾不知命門之所以爲命門也。秦越人云。左腎爲腎。右腎爲命門。唐宗海云。命門。即腎系爲三焦膜油發源之所。陳修園曰。命門不是右腎。亦非兩腎中間。更非督脈十四椎下。命門之俞穴。攷之由經。太陽根于至陰。結于命門。命門者。目也。又曰。凡人受生之初。先天精氣。聚于膝下。當關元氣海之間。其在女者。可以手捫而得。俗名產門。其在男者。于泄精時。自有關蘭知覺。由前之說（指秦越人）乃懷疑于五臟各一。腎獨有兩之一點。即以右腎爲命門。而不知肺亦有兩葉。肝亦有兩葉。設有問者。又將何以名右肝右肺耶。由後之說（指陳修園）亦不過臆度之談。至以產門爲命門。猶爲可笑。凡人身神經分布之處。無不有知覺。又豈獨一產門哉。惟唐容川之說。最爲精當。故後世新舊醫學家。舉不能出其樊圃。蓋人之胚胎。先生兩腎。而載此兩腎者。厥爲腎系。腎系之于兩腎。猶瓜之蒂。木之根。木之能繁榮滋茂。瓜之能碩大成長。全繫于根與蒂之穩固。亦猶人之能

康強葆健。實賴于先天之腎系也。准是而論。以腎系爲元氣之策源地。以腎系爲元氣之儲藏寶。固其宜也。心之包絡。脾之散膏。肝之胆囊。猶之腎之命門。包絡之附于心上。散膏之發于脾側。膽囊之繫于肝下。猶之命門之生于腎系。又查西說。無命門。而有腎門。其稱腎門之功用。則爲腎動脈及腎靜脈出入之部分。恰與命門之功用相恍惚。其部位亦與命門之部位相吻合。西說之腎門。其殆中說之命門歟。

衛生類

澡堂衛生十二則

理事楊煥文

一要用砂濾水

普通的河水井中。往往混有各種病菌。病蟲。雜質。污物。若取來就用。雖說洗身。亦有危險。澡堂裏以用水爲大宗。原爲使身體清潔的。所以無自來水的地方。要設一個砂濾缸。將水濾過再用。化錢既不甚多。而所得益處極大。因爲用砂濾水。可

以去濾泥土。並減少細菌。比用白礬使水澄清。強得多了。

二要洗拭澡盆

澡堂裏澡盆。若不常加洗拭。盆裏必積起污物。非但不雅觀。且易發生臭氣。使顧客生厭。並有傳染疾病的危險。所以每個客人使用之後。應當用沸水洗滌乾淨。

三要池塘開窗

舊式的池塘。往往全沒窗戶。即有之。亦是僅僅兩個。小玻璃天窗。並不透氣。以致空中的水氣凝聚成霧。對面不能見人。又兼溫度太高。氣味難聞。不但使洗澡的人難受。且與衛生大有妨碍。心身衰弱的人。可以暈倒。發生危險。所以池塘要多開窗戶。使空氣流通。雖多費點火力。亦是應該的。

四要常煮手巾

公用手巾。是傳染疾病的媒介。如肺癆梅毒淋病。都可以由公用手巾傳染的。尤其是痧眼。或別的眼病。我國人患痧眼的最多。查其原因。多由於使用公共手巾。

的緣故。所以澡堂裏的手巾。務必潔淨。每個客人使用之後。應用沸水。泡洗一次。若能煮沸一次更好。務使手巾上附着的病毒完全殺死。方可免傳染疾病的危險。

五要勤換圍巾

澡堂裏的圍巾。是和身體接觸的。有病的人用過。常沾染病污物。為傳染病毒的媒介。尤其是皮膚病。像癬瘡。疥瘡。所以每一個顧客用過之後。要用熱水。胰子洗淨。每一個客人。要更換一次。以免傳染疾病的危險。

六要煮沸飲水

河水井水中。混有病菌雜質甚多。前面已經說過。要用砂缸濾過。方合飲用。但濾過的水。有時仍不免混有病菌。所以必須煮沸。才靠得住。因為水經煮沸。熱度增高。一切病菌。就都要殺死了。並且適合泡茶之用。我國從來講究衛生的人。非開水不喝。實在亦是一個預防疾病的好習慣。

七要洗淨茶杯

澡堂裏的茶杯。的是供大眾飲用的。接觸手指和口的部分。往往附着病菌。和污物。爲傳染病毒的媒介。所以每次應用之後。要用沸水洗滌乾淨。因爲沸水有殺菌的效力。

八要設置痰盂

癆病人。和患其他呼吸器病的人。所咯出的痰中。常含有病菌。若任其吐在地上。不但很是污穢。且乾燥後。飛揚於空際。健康者。呼吸此空氣。染了病菌。就發生同樣的病。澡堂中。往來顧客很多。患此種病的人。是所在不免的。所以更要設置痰盂。加石灰乳。以便吐痰。而免病毒傳播的危險。

九要用紗張窗

蠶蠅蚊子。和別種飛蟲。不但擾人。污染物件。並且可以傳疾病。（如痢疾、傷寒、霍亂、瘧疾）若全仗撲滅驅逐。有時勞而無功。所以最好。是將窗戶。和門。用細紗。或

銅鐵紗張住。使他不能進屋。廚房食堂。更爲要緊。

十要夫役潔淨

澡堂裏的夫役。是常與茶杯手巾和顧客接觸的。務必要潔淨整齊。方爲雅觀。並可免傳染疾病。所以應當遵守下列各點。(一)手指要洗刷乾淨。(二)便溺或抓癢後。務要洗手。(三)指爪要常修剪。(四)圍巾衣服用白色。並要常洗換。(五)擦澡人不得赤身。(六)患傳染性皮膚病。和傳染病的。如癩病等的。應暫停服務。並不准浴室內。僱用扞脚夫役。代人放血。致碍衛生。

十一要洒掃清潔

塵屑。污泥。穢水。糞溺等。骯髒的東西。若不動加掃除。妥爲處置。不但有害清潔。且爲蚊蠅的根據地。傳染病菌的培養所。澡堂是供給民衆潔身的地方。尤宜灑掃清潔。椅床地板。常使水刷洗。使顧客心目清爽。不但對於公共衛生。有大益處。而且生意也要一天天的發達起來。

十二要禁止小販

澡堂裏。每每有賣食品香煙的小販。來往叫賣。不但對於赤身洗澡的人討厭。且所賣的東西。多不潔淨。吃了容易生病。可以澡堂裏的掌櫃。應當加以禁止。

敬告病家四大關鍵

名譽理事 張汝偉

疾病人所不能免。有病不能不治。而古有不服藥爲中醫。則又何說。蓋指與其託命于庸妄之醫。不如暫守不服藥之旨。使病勢自退。爲得其中。雖然。爲醫者。具濟世之心。孰不望病家之求我。使其一劑知。二劑已。覆校而瘳。以顯其能手。得病家之感謝爲榮。若醫生正在盡心用力之際。而病者僞心意驕恣。不聽醫言。一不治也。或詐疾試醫。輕命重財。二不治也。或衣食不周。侍護不良。三不治也。或生成藏氣不足。必責醫家以幹旋。四不治也。或中西雜投。朝更暮改。五不治也。或信巫不信醫。及至臨危。暫請醫士診脈。亦不治也。此六者。爲病家之致命傷。若不改革。而病不治者。非醫之罪。病家自取之也。

病家無此六病。更當審明三辨。三辨者何。即辨醫之庸妄良耳。人云亦云。疲藥寒責。敷衍模稜者。庸醫也。高談闊論。睥睨一切。口若懸河。顛倒是非。見富貴之家。則謹慎足恭。諾諾連聲。入貧賤之家。則驕恣傲慢。咄嗟從事。方藥喜怪僻者。妄醫也。庸醫之禍。隱而微。遷延時日。坐成不救。妄醫之禍。烈而顯。僥倖貪功。以人試藥。危在頃刻。若其人對於病家。溫和謙讓。所說病理。確能根本導出原委。曲盡生理。病理藥物之學說。又能透切。而近人情。通權達變者。方得謂之良醫。然病固有步驟。非崇朝可以建功。所以擇醫既定。至少請三四次。方可斷定。切勿朝更暮改。雜藥亂投。以速其死。再有一種病家所最迷信者。是會診。殊不知衆醫會診。是有害無益者。如所請是同派。則同流合污。會如未會。如異派者。則意見各一。結果仍是隔靴搔痒耳。且生涯式微。與負時望者會診。必隱曲遷就。所以會診無甚益處。病家所須知也。

擇醫既定。方藥不謬。然醫生爲治病之根本。藥是直接去病之利器。亦宜慎重。攷

察。所以三辨之外。更有三知。(一)病家撮藥歸後。宜逐一檢點。于方上所載。是否相符。或有少一味者。或一味重包者。或以假亂真者。如蕭草代麻黃之類。對于輕藥。猶無大害。若桂附苓連等。投劑起人沉疴。誤則變生頃刻。不可委之僕人。宜自審慎。此宜此者一。(二)點藥之時。醫方載有同打同炒者。尤宜注意。務必親督藥肆。照方施行。不可隨便。因同打同炒之間。俱能變化原質。另有妙用。辛甘合而爲陽。酸甘合而化陰。錫盡貯酒。日久雖不貯酒。亦能醉人。此中國的化學法。此宜知者二。(三)煎藥之時。氣分表藥。宜一沸便飲。全其氣也。滋陰之劑。所取在味。貴乎沉浸濃郁。鑛質之類。非久煎不能出味。所以醫方上。有先煎、後入、研沖、另煎、絹包、諸法者。均宜謹謹遵守。此宜知者三。

謀貴出于萬全。慮宜深于周密。三大關鍵。既已明告。然意外之事。不可不防。蓋病家對于三者。能避免遵守。而親戚朋友。假有省病之名。行熱心之舉。在人情方面。非不可感。然或溺于迷信。或一知半解。攙雜其中。則亂方仙丹。單方秘藥。雜藥亂

投。或僭改方藥。擅易分兩。去重就輕。或互薦醫生。各開意見。使病家中道而廢。功虧一簣。際此時也。病家急宜遵守擇醫之法。破除迷信。不守拘執。對于仙方等。如藥之平淡者。泡湯少服。以領盛意。對于寒熱相反者。則可得籤書焚化。泡湯服之。一以安病人之心。一以平舉薦之意。對于互開意見者。則宜婉言謝絕。以示決心。庶幾病無不治。治無不愈矣。汝偉掬誠奉告。願病家勿河漢視云。

(病理類)

瘟疫病理之研究

理事時逸人

(四)病理

戴北山論傷寒與瘟疫之異同辨。頗爲扼要。其言曰。溫疫傳經與風寒不同。風寒從表入裡。故必從太陽而陽明。而少陽。若溫疫。則邪從口鼻吸入。而出表入裡。惟視人何經本氣之強弱爲傳變。故吳又可以疫邪。有先表後裏者。有先裏後表者。有但表不裏者。有但裏不表者。有表勝于裏者。有裏勝于表者。有表而再表者。有

裏而再裏者。有表裏分傳者。此爲九傳。愚按所謂表者。發熱惡寒。頭痛目眩。項強背痛。腰疼。腿膝足脛酸痛。自汗無汗。及頭腫面腫。耳目赤腫。項腫。發斑。發疹。皆是。所謂裏者。渴嘔。胸滿。腹滿。腹痛。脇滿。脇痛。大便不通。大便泄瀉。小便不通。小便黃赤。瀉痛。及煩躁譫。妄。沉昏。舌燥。舌捲。舌長。口烟。赤爛。皆是在風寒從表入裏。裏症必待漸次閉鬱而成。故見表症。不必兼見裏症。且入裏之後。表多自解。故見裏証之後。不必復見表証。若瘟疫本從中道而出表。故見表症時。未有不兼一二裏症者。且未有不兼見一二半表裏之少陽証者。仲景所云。陽明少陽合病。必自下利。三陽合病。脉浮大。但欲睡眠。目合則汗。以及腹滿身重。難以轉側。口不仁。面垢。譫語遺尿。皆指瘟疫言。非指風寒言也。且瘟疫屬蒸氣。出表入裏。原自不常。有入裏下之。而餘邪不盡。仍可出表者。常見譫妄。沉昏等症。經下奪通泄之後。病愈數日。復見頭痛發熱等症。仍從汗解者。此所謂先裏後表。風寒必無是也。更有下症全具。用承氣湯後。裏氣通而表亦達。頭痛發熱。得自汗而解。移時復見舌黑胸滿。腹

痛譫妄。仍待大下而後愈者。此所謂裏而再裏。風寒必無是也。若夫表裏分傳之症。風寒十無一二。疫症十有六七。但據傳經症候專難以辨之。一經而見一經症者。多風寒。一經雜見二三經症者。多疫症。日久漸轉屬者。多風寒。一日驟傳一二經。或二三經者。多疫症。則雖病有變態。而風寒不混于疫症。疫症不混于風寒。施治自無訛誤。

(五) 診斷

(1) 劉河間曰。疫癘之別。脉不浮者。傳染也。忌以熱葯解表。夫脉既不浮。自非外感。其云傳染。即病氣相傳。葛雍所謂近穢氣觸真氣者。又戴氏北山云。風寒從外而入。故脉未有不浮者。惟或多兼緊緩洪滑等。殆傳入于裏。始不見浮脉。瘟疫從中道而傳變外出。故脉多沉伏。或沉弱。或沉遲。乃邪在于裏之象。(編者按瘟疫之脉。多沉弱。或沉遲者。乃疫毒侵犯心臟。使血行之力遲緩。故脉波無力。餘詳鼠疫條。)

(2) 苔之色。瘟疫多白膩如積粉。或黃燥乾厚。與傷寒病之由白轉黃。由黃轉燥者不同。初起時宜清透宣達。或解毒導濁。方為合拍。不能通用治傷寒解表之法。

(3) 大抵一經受病。而神情異常。即為瘟疫之徵兆。如心煩懊懣。讖言妄語。神志昏沉。如痴如醉等是。因疫癘之邪。傳襲于內。使循環系。神經系。陡生絕大變化。即血球崩壞。血液變其成分。致精神昏憤。讖妄。與溫病之熱邪薰腦者不同。與傷寒陽明承氣症之讖語。亦有分別。故彼宜清導下奪。此宜解疫化濁。

(4) 疫症之發。其現于氣色者。以面色多垢滯。如油膩。如烟薰。身中有腐臭穢濁之氣。方為染疫之鐵証。若面色細急。或光澤。身無腐臭之氣。乃寒溫之重症。不可誤認為疫。(未完)

疫痧病理之討論(續)

名譽理事 徐召南

(五) 診斷

(一)宜察其喉也。發病之有疫無疫。別于喉爛喉不爛。疫毒輕重。亦以喉爛之輕重別之。其爛零星。其色鮮潤。疎達之而痧透腫消。是疫輕者。其腐爛滿佈。其色乾黃。其痧隱約不達。或雖達而爛更盛。是疫重者。病起身熱。脉微弦。喉兩旁爛。疎達之。而痧漸透。爛漸減。不延及喉底小舌。并無穢氣者。其症漸髮。若延至喉底小舌。痧點一見即縮。是疫已內陷。神雖清亦險。若神昏氣喘。鼻擱直視。必不可救。痧點雲密尖高。神清熱減。而喉底小舌腐爛甚者。是疫火極盛。其症危險。用大劑清化。以冀挽回百一。總之。痧症輕者。喉不至腐。而悶痧惡症。亦有不爛喉者。

(二)宜視其痧也。痧之發。宜辨其表邪之透與未透。痧之沒。宜辨其早沒與正沒。何謂透表。痧點分科。而有觸手之質。是透表也。透表之後。或起毒泡。或仍見喉爛舌絳等象。是疫火之盛。宜用大劑清化。清化之後。喉爛減。神氣清。則症勢髮。反是者險。若身熱見痧點隱約成片。毫不分料。雖無泡發于上。却有毒火內鬱。所謂不透表也。若見喉爛神昏者。難治。發熱之後。痧點一現即無。謂之早沒。早沒者。痧

縮毒陷。痧縮之後。喉爛鼻塌。氣促呃逆。神昏者。其症不治。正沒者。痧點與喉爛之勢并退。透表二三日。痧點漸退。喉爛漸減。神清脉和。乃爲正沒。

至痧點之形。宜尖疎。痧點之色。宜紅潤。若身乍熱。痧即隱約成片。不分顆粒。其色紫滯乾枯而無汗。脉脫神昏喉爛。火毒內陷。最爲險症。若兼脉軟細無神者。難治。宜清散並用。亦有痧形扁闊。始而三五散布。繼而雲密焮腫。邪火雖重。猶能透表。所謂時痧。非真疫痧。若咳嗽神清。脉弦有力。而喉不爛。先達繼清。自得漸鬆。（編者按）先達繼清。爲時痧之治法。非治疫痧。宜注意焉。）再發痧部位。自頭至足者順。自足至頭者不順。先胸背而後四肢者順。先四肢而後胸背者不順。陽部多順。陰部多不順。陽部。頭項背也。陰部。脇胸腰也。石頑之說如是。而余觀疫痧。無所謂部位。總以透表爲順。隱約爲不順。痧透表而喉爛減。神氣清者。部位雖不順。猶順也。痧隱縮而喉爛盛。神氣呆者。部位雖順。猶不順也。（未完）

病與症

名譽傳曉丞
理事

病症二字。世人每混合稱之。習焉不察。從來已遠。夫病爲症之集體。症乃病之現象。譬之商店。有鉛筆書冊之陳列。則名爲文具館。有金石書畫之儲藏。斯稱之古董家。病症之釋義。亦何莫不然。故傷寒病名也。而所以昭示此病之現象。則有發熱。惡寒。頭痛。項強之症狀。霍亂病名也。而所以昭示此病之現象。則有腹痛。胸滿。上吐。下瀉之症狀。病有兼病。如太陽與陽明合病。瘧與痢俱發之類。症有兼症。如咳嗽而兼腹痛。下利清穀。而兼四肢疼重之類。病者。生理上所起之特異變態。症者。病理上所起之特異變態。因見症而推求受病之原因。因發病而研究症之情狀。循名責實。若合符節。則病雖有在藏府。在經絡。在肌骨。在皮膚之不同。症雖有爲風寒。爲暑濕。爲燥火。爲傳染之各別。綜其緒而攷之。亦易易矣。

(診治類)

治病序例 續前

第五十四期 病與症

第五十四期 治病序例

七十

崩中。屬氣血兩虛。有熱。

忌破氣 行血 降 溫熱 辛燥 苦寒 諸藥俱見前 宜補氣血 兼

清熱 甘溫 甘寒 酸飲 如人參、黃耆、生地、熟地、地榆、芍藥、鹿角膠、阿膠、

香附、續斷、甘草、麥冬、山茱萸、杜仲、五味子、白茅根、蒲黃、炒桑耳灰、側柏葉、艾葉、

木耳灰之類。

熱入血室。類傷寒。或經事適來。忽往。或屆期不行。忽發大熱。口渴。或厥。但不頭疼。為異於傷寒耳。

忌補氣 溫燥 辛燥 收斂 下泄 大熱 升發 諸藥俱見前 宜行

血清熱 甘寒 鹹寒 苦寒 如生地、牡丹皮、蒲黃、蘇木、牛膝、延胡索、麥冬

犀角、白芍、黃芩、童便、荆芥穗 如便閉。加大黃。

種子 內分男女氣虛血虛精寒 血熱火熾精滑因證選用

忌破氣 破血 燥 過用辛熱 諸藥俱見前 宜調氣補血 男子宜固

妊娠惡阻

第五十四期 治病序例

精

桑螵蛸 溫平治男
子精滑

海狗腎 鹹熱治男
子精寒

陽起石 熱治男
子精寒

車前子 鹹寒治男
子火熾

補骨脂 辛溫治男
子精寒陰弱

鹿角膠 溫平治男
子氣血虛精寒

人參 微溫治男
子氣血虛精寒

山茱萸 酸溫治男
子精滑精寒

蓮肉 甘平治男
子胃弱精滑

紫石英 溫
女

柏實 甘溫治男
子精滑精寒

魚膠 平治男
子精滑

覆盆子 甘溫治男
子精滑

鹿茸 溫鹹治男
子精寒

沙苑蒺藜 甘平治男
子精寒益血

肉蓯蓉 溫酸治男
子氣血虛精寒

五味子 酸溫治男
子精滑精寒

天冬 苦寒治男
子火熾

熟地黃 甘寒治男
子益血生精

艾草 溫
女

蓮鬚 甘溫治男
子精滑

巴戟天 溫治男
子精寒

何首烏 苦溫治男
子氣血

牛膝 苦平治男
子血虛陰痿

黃蘗 苦寒治男
子火熾

麥冬 甘寒治男
子血熱

白薇 溫平
女

白芍 酸寒
女

當歸 辛溫
女

忌破氣 升散 燥熱 苦寒 滑腸 膩膈 諸藥俱見前 宜順氣 甘寒 酸寒 如蘇子、橘紅、枇杷葉、茯苓、麥冬、蘆根、竹茹、木瓜、白芍、竹葉、人參、縮砂、烏梅之類。

安胎

忌破氣 破血升散 辛熱 辛燥 諸藥俱見前 八月以後。及胎前滯下者。方可用枳殼。氣虛者不用。三月以前宜養脾胃。四月以後宜壯腰腎。補血益陰。順氣。總宜清熱。如茯苓、麥冬、山藥、人參、芍藥、白朮、橘紅、炙甘草。縮砂、艾葉、杜仲、生地、益母草、鹿角膠、阿膠、續斷、黃芩、枸杞子、青蒿子、桑寄生、鯉魚、烏雌雞、葱白之類。

胎漏屬氣血虛有熱

忌宜俱同安胎條。

難產

忌破氣 破血 收斂 諸藥俱見前 宜補氣血 滑利 潤 如人參柞
樹枝魚膠冬葵子白芷梢牛膝挂心當歸川芎益母草百草霜麻油豬脂油生
鷄子兔頭滑石麝香之類

預防血暈。在腹痛坐草時。即用蘇木。有菊花心者。一兩。生地一兩。降香末二錢。水
三盃。煎一盃。加童便半盃。兒墮地。即飲之。永無惡血衝心之患。房中常打醋炭。萬
一血暈。亦須此藥。更以家寶丹一丸。灌下神效。 凡婦人氣弱者。無氣力送子出
產門。須服人參。此藥能兼治橫生倒產。世醫不知也。 凡臨產交骨不開。惟濃煮
柞木湯飲之。則自開。柞木俗名。一葉一刺。其木枝幹直上。每一葉下。必發一刺。
胞衣不下。用乳香。沒藥末。各七分五厘。麝香一分。芒硝一錢五分。研細。以酒調服。
立下。飲熱童便。以滋藥力更妙。 (未完)

治水腫脹的良方

名譽胡效心
會員

中國醫學。已傳數千年了。必須經過無量數的人命。試驗出來。方有把握。確有藥

到病除的效驗。但至於今日習西醫者。說中醫夢說陰陽五行生尅。而無器械之精巧。又無手術之良能。咄咄逼人。竭力破壞。若是者。勢必使中醫盡亡而後已。故現在軍政學各界。莫不以西醫西藥爲主體。以致每年數萬萬之醫藥費。被外人載而去。中國之貧弱。亦是一個原因。即如信仰西醫的人。亦未必請西醫。吃西藥。包定病醫得好。現今中國人病水腫脹者。至西醫院。西醫用手術穿刺。放出水液。得一時暫安。皆不勝驚奇。嘆服手術之良。不知屢放屢脹。西醫斷定病根深。不能治了。由此觀之。西醫除用手術外。別無他法。內服之藥最少。且無效驗。今考歷代中醫說水腫脹原因。由於水氣。初起目窠上微腫。如新臥起之狀。時欬。陰股間寒。足脛腫。腹乃膨大。小便不利。其水腫脹已成。研究其病理。此爲脾、肺、腎、三臟之病。蓋水爲至陰。其本在腎。水化爲氣。其標在肺。水惟畏土。其制在脾。若肺虛則氣不化。脾虛則土不制水。腎虛則無所主而妄行。水不歸經則逆而上泛。故傳入於脾。則肌肉浮腫。傳入於肺。則欬逆喘急。分而言之。各有所主。合而言之。則總由

陰火衰微。腎之氣不能化。故水道不通。溢而爲腫。治宜先導其水。以殺其勢。後補其火。以壯其腎。清肺以利氣機。和腸胃以暢消化。通膀胱以行水泉。真氣既和。機關自順。至於身有熱者。肌膚痛者。上腫者。皆汗之。身無熱者。尿赤澀者。下腫者。皆利之。此歷代中醫治水腫脹之大綱。惜乎中國古無生理解剖學。總欠明曉。故再研究生理解剖學。水腫脹原理。凡人飲水入胃。胃之四面皆有微絲血管。將水吸出。散走膈膜。俗所謂網油是也。人之周身皆有膈膜。古名三焦。稱爲決瀆之官。水道出焉。此水由胃吸出。隨動靜脈循環灌注全體。從皮膚出汗。從肺呼出排洩。炭酸氣外。其餘皆入腎濾清之。腎之生理。腎二枚。靠脊而生。左右各一。有膏油遮掩。薄膜包裹。此膜發於腎系。乃三焦之源。腎平扁。形似蠶豆。色赤褐。內側有凸坎。名曰腎門。與腎動脈腎靜脈。及輸尿管相通連。血液由心噴射。而通行大動脈。經腎動脈。而入左右腎。然後由腎靜脈。而流注大靜脈。仍歸於心。血液之廢質。被腎濾去。故腎靜脈之血。再爲純清。而腎所濾漏之廢質。曰尿。尿者清澄琥珀色之體。

液氣味臭惡。反應酸性。量重於水。一千分中九百五十分。水五十。內有固形物。包括尿素、尿酸、及無機鹽類最多。故尿之味鹹。輸尿管有二條。沿脊柱二側。細且長。上頭到腎門。形如漏斗。謂之腎盂。腎盂內成圓錐狀。用顯微鏡檢視構造。有無數細尿管。接受尿之處。下頭終膀胱管壁。爲筋肉纖維所生成。故能蠕動。使尿出於腎。經輸尿管以滲入膀胱。由尿道以排出也。腎者。實爲人體內。水分殘餘廢質之總排泄機關。今確定小便不利。爲水腫脹症。小便利者。爲氣臌脹症。醫者必須分清。不可誤治。因尿體內。無機鹽類過多。超過五十分之外。即無機鹽類淤積。細尿管阻塞不通。失於功用。腎所濾出之尿。不能由輸尿管至膀胱。因無出路。四面妄行。即成水腫脹症。治法。西醫用手術放出。水液不從尿道而出。故屢出屢脹。總要從尿道排洩而出。方保無後患。余治愈多人。經驗如下。有陳某者。年三十四歲。體強壯。因夏秋間農事忙迫。勞力過度。得水腫脹病。經過醫治不效。并且加劇。命在朝夕。肩輿來舍。使余診治。以決死生。聽其時刻氣息喘急。知其水氣侵襲肺氣管。

枝。望面色淡白灰黑。全身腫大而腹更大。用二手合抱。腹皮就要破裂。腎囊大如蒲襲。時時流出水液。看其腹皮。靜脈出現。診左右脉微細。飲食減少。大便秘。小便不利。症實危險。達於極點。今水勢滔天。急先導其水。以殺水勢。方可挽救。方用洩水至神湯。白朮二兩。大麥鬚二兩。茯苓一兩。赤小豆三錢。加地膚子三錢。水煎服。下一小時。腹中雷鳴。頃刻間。小便如注。腹脹退去了一半。腎囊收縮。無水流出。好似用手術放出水液一樣。原方又服二帖。腹脹完全退去。但頭面手足。尚有浮腫。未全數退去。須禁忌食鹽類之物。一百二十日。若誤入口。水腫脹立刻復發。勢難挽回。因體內鹽類最多。淤積細尿管。阻塞不通。故必要禁忌食鹽之物。方中所用藥味。皆平淡利小便。又能健脾胃。不傷正氣。功效能直入至細尿管。淤積鹽類之處。能消化他鹽類之物。細尿管處無阻塞。即小便自利。今頭面手足。有餘腫不退。改用茯苓導水湯。掃除之。茯苓白朮澤瀉各五錢。陳皮大腹皮桑白皮木瓜檳榔各三錢。砂仁木香各二錢。蘇葉一錢。每日服一帖。即逐日腫退。兼服金匱腎氣丸。

第五十四期 中西論瘧原理各異

七十八

不過月餘。陳某險危之症。恢復原狀康健。以上三方。治水腫脹的聖藥。諸藥能利小便。退腫脹。補火壯腎。面面周到。余以治愈多人。因此佈告在雜誌上。請諸同道長指正。

中西論瘧原理各異

第五十三期

羅燮元

自唐氏此解一出。實不啻爲國醫開一新紀元。爲先聖放一大異彩。誠不可多得之論。蓋在昔諸賢。研求經旨。大都高談學理。未常求實。以致流爲今日空疎詬病。今觀唐氏。乃將臟腑部位。生理組織。氣化病機。出入遊行。寸寸從經旨指出。毫無牽強。方以西醫學理。以未見有如此之確切。其繼往開來之功。當不讓哈斐古弗。專美於前也。唐氏誠醫林先進之革新者。所惜邪之由皮毛而入於腠膜。何以不即爲病。其腠膜。又何以便能容邪。使人不覺。此則唐氏尙未說明。不無缺點。乃見中醫雜誌廿三期專著一頁。載有皖南周之徵。讀醫隨筆選。伏邪在膜原論一節。頗爲精確。可作錯鏡。

周之徵曰。膜原者。夾縫之處也。人之一身。皮裏肉外。皮與肉之交際。有隙焉。即原也。膜託腹裏。膜與腹之交際。有隙焉。即原也。腸胃之體。皆夾層。夾層層之中。即原也。臟腑之系。形如脂膜。夾層中空。即原也。膈盲之體。橫隔中。焦夾層中空。莫非原也。原者。平原廣大之謂。故能邪伏其中。不礙大氣之往來。古書所謂皮中淫淫如蟲行。及行痺周痺。左右上下相移者。皆在皮肉夾縫之中。藥力亦復不能直達其處。何者。藥力不過鼓正氣以攻邪。今氣道寬大。中雖有邪。而正氣仍綽有可行之道。即不必與邪氣值矣。

此將皮裏內外。臟系脂膜。凡是輕鬆處。俱指爲膜原之地。與唐氏之論。可謂相得益彰。及淮南子注。訓騰爲肉不滿之義。亦合。至謂邪伏膜原。不礙大氣往來。亦甚有據。蓋至虛之處。便是最易容邪之處。此亦自然之趨勢。殊不足怪。但不礙大氣之往來。只就其邪之初入者言之。若夫邪之內蘊已久。瀰漫膜原。障礙氣機。亦屬不免之事故。瘧論曰。邪中於頭項者。氣至頭項而病。中於背者。氣至背而病。障礙

流行。於此可見。據此觀察。是症之原則。由於伏邪居多。均為中西所公認。即有一二時感亦屬例外。近人謂感而即發者為時感其所處之地。西曰是在血液。中曰是在腠膜。或舍於營。但營乃血液之所主。腠膜亦氣血取決之道路。彼此觀察。尙不懸疎。其歧異者。彼謂由蚊之輸送孢子。虫於血液。此則謂由六淫之邪外襲。潛伏於肌腠。聚訟焦點。莫此為甚。然而理有一定。事無兩非。究屬由於蚊之輸送乎。抑屬六淫之邪襲於肌腠乎。抑亦尙有他道可入乎。敢請以告。曰是不難。此在素問陰陽應象大論。已有圓滿之答覆。茲再舉而申論之。以破其惑。

(一) 天之邪氣。感則害人五臟。

(二) 水穀之寒熱。感則害於六腑。

(三) 地之濕氣。感則害皮肉筋骨。

據此三點觀察。是知邪之外入。不襲於口鼻。則襲於皮膚。亦勢所必至。理有固然。無可避免者。天氣通於鼻。地氣通於嗑。而人居此自然界中。其口鼻皮膚各竅。無

時不與此氣。息息相通。其氣之清者。固能養人。而氣之濁者。亦爲人害。故金匱曰。風氣雖能生萬物。亦能害萬物。當時已知空間實含有此清濁二氣體而足以生殺人。先聖早見及此。示人有所防範。但氣之濁者。亦由空氣與腐敗物質蘊釀而成。論見首章即蚊爲化生。亦即暑溼合化。先聖非不知。蓋追其源也。其別有二。吾先聖乃又爲之說。一曰賊風虛邪。一曰癘風疫氣。是隱然已具有西說微生物炭氣之鑿別。不過但從形上立論。而略其質也。說見二章待其感人。則又藉其風之傳播。或從呼吸而入肺。或從毛竅而入肌膚。或則附寄於飲食而入胃腸。久則隨氣之流動。以傳播於各經。侵蝕五臟而爲病。故曰。感則害人臟腑。是先聖已將邪之所入路徑。明明分別指出。吾人可得而知。又何疑焉。雖然邪之外客。其由皮毛入者。方始中於表。必發寒熱。由呼吸入者。其始中於肺。必發咳嗽。中於胃者。必發嘔滿。凡此諸狀。乃於感邪初起均屬必有之現象。夫同感是氣。何以有即發不即發之理。其不即發者。仍不外此三道而入。何以未經此等病型。而遽入於膜原。其邪又從何處

而越入耶。此中疑竇。大有人在。敢問吾子。又將何解。曰。邪之感於人體。雖有共同之病能。然因生理之特殊。或因老壯之差別。或因體工有強弱。因而共同之點。則生歧異。所以同一寢境。同一起居。感邪各有輕重。發有遲速。蓋由此也。故朱丹溪曰。瘧發於四氣之初。弱者即病。胃氣強者。伏而不動。至於再感。胃氣重傷。其病乃作。此真閱歷之言。蓋體工弱者。因衛氣不充。皮膚不密。毛竅易啟。偶爾感邪。即不勝任。而見鼻塞清涕。頭痛寒熱之不遑。又安能必待他時而發。即有之。亦屬例外。惟其強者。血氣壯。飢肉充。皮膚緻。腠理郤。邪不易襲。然雖不易襲。而襲入。亦不易出。蓋體工強者。每多自恃。或因勞動而腠理開張。或因盛暑而迎風取快。或因惡熱之故。而浴以冷水。毛竅乍爲寒逼。汗液因而不能暢。遂夾其邪。而留連飢腠。其不病者。以氣機雖窒。表氣尙有時疏泄。且以體工之強。營衛尙得流通。故能忍耐。不覺爲病。然邪既未外泄。勢必內入。因人體惟腠膜輕鬆。便易容邪。於是侵潤漸漬於腠膜之間。伏而不動。其從口鼻入者。乃由腸胃乳糜管。吸收達於各組織之內。

亦然。苟調攝有方。久之真氣內充。亦必潛移默化。從汗腺而出。不覺自解。近人謂之潛發汗設仍不慎風寒。或飲食不節。至於再感正氣重傷。內蘊之邪。乃乍然而暴發也。故每見強壯之軀。平時凌風冒雪而不畏。恣情縱慾而無傷。內部已虛。尙賈餘勇。所以不發則已。一發便成燎原。較之弱者尤甚。故曰冬傷於寒。春必病溫。冬不藏精。春必春溫。非謂初由強而伏病。終由弱而發病耶。當其未動。邪正相避。無從探索。待其既動。或從膜原透胃府。與陽明燥氣化合而成溫。或入脾臟。與太陰溼氣化合而成溼熱。症狀既彰。名從症立。而後乃謂之曰溫。曰溼。按症施治。自無不愈。故難經謂溫病之脈。行在諸經。不知何經之動也。各隨其所在而取之。殆即指伏邪之傳變無定也。若夫瘧也。病因雖同。其傳則與溫異。因溫邪即透出於膜原。或傳表。或傳裏。則一往而不返。此則因邪伏於膜原。與本身津液搏結化爲痰涎。窒塞氣機。營衛之行。日有常度。一旦阻而不行。則不能衛外。而失其抵抗外界之可能性。遂作嚴寒。故雖有湯火不能溫。但衛既失其衛外職權。勢必凝隼反抗。不由意

志命令急欲掙扎而出。掙扎不勝。則全身所有。均不由志意命令。繼續奔集於此。以為援助。久之邪不能勝。一戰透出。乍湧於表。體溫遂逾其常度。則成壯熱。故雖有冰水不能寒。此時體熱驟增。有疏泄之必要。則玄府亦開。汗液得泄。衛氣流通。則復歸於平。然此時之平。非真平也。其邪不過暫屈。仍伏於此。故值衛氣再周於身。而瘧又作也。是同一伏邪。乃因傳變之或殊。而症狀以異。如溫病溫瘧均得於冬令之類瘧之有休息。職是故耳。三焦之生理氣化。關於伏邪之傳變。有如此者。

(待續)

喉痺之研究

理事時逸人

(釋名)喉中閉塞不通也。故名。

(原因)一陰一陽結。謂之喉痺。

「講解」一陰者。少陰也。一陽者。少陽也。少陰主君火。少陽主相火。總而言之。無非火邪入內。血熱上亢而已。非各有名詞之不同。然實際仍無背謬。正不必因此齟齬。至內經以少陽相火司天。客勝則病喉痺。太陰之勝。火氣內鬱。甚則熱

格喉痺。古醫以病之發也。完全由空氣之變化。至空氣所以變化之原理。乃以五運六氣。爲推測惟一之工具。後世理化細菌之說進。則以前之說。等諸大輅。椎輪早處於無用之地。茲爲節錄之者。一以中國最古之病理學。即能言及喉脾之病源。由空氣中乾燥炎熱。火熱太過。吾人口鼻。既經吸受乾燥炎蒸之空氣。內蘊之溼濁血熱。無從排泄。內外合邪。而喉痺成矣。古人雖知此理。而言之不暢。乃以少陰少陽大陰等。專門空套之名詞。解釋之。其結果。令人如入五里霧中。英名其旨。今特略其詞。而取其意。無害於科學進化之原理。庶亦保存先覺偉識之微意。聖濟總錄。謂此證。肝肺火盛。復感風寒。無論其爲傷寒。熱病瘟病。天行。大頭。及雜症。溼痰鬱火等。而爲內火亢害則一。於此可見。古今學理之相符也。

(病狀)咽喉腫痛。面赤腮腫。甚則項外漫腫。喉中有塊如拳。湯水難嚥。語言難出。第一期。惡寒發熱。頭項強痛。週身拘急作痛。咽喉腫痛。脈浮緊。面兩寸沉。或伏

者。皆邪邪伏遏之象。宜以風寒例治之。若脉弦洪滑大者。口渴舌乾。則爲溫燥之邪。宜從風溫例治之。

第二期。風熱痰結。咽喉腫脹作痛。胸滿悶。不惡寒。但發熱。或有不熱。咽喉腫處。色不甚紅。或渴或不渴。苔色白膩。脈左寸大滑實者。

第三期。卒然如啞。吞吐不利。甚者水漿不入。言語難出。或有腫發項外。作膿腫脹者。宜透其膿。使其外潰。其因天行疫癘者。且有傳染性。

(類症鑒別法)喉痺一症於古書中分別風熱喉痺。風毒喉痺。酒毒喉痺。陰毒喉痺。氣壅喉痺。走馬喉痺。傷寒喉痺。寒伏喉痺。白色喉痺。爛喉痺。單喉痺。雙喉痺之各異。凡咽喉腫痛。延及面頰。身發寒熱。牙關緊強。言語難出者。古醫名此爲風毒喉痺。咽喉腫痛。其色鮮紅。或紫艷。脈洪數者。古醫名此爲風熱喉痺。其喉爲痺。實相同也。即使因風寒風熱之不同。不過病因有異。不當另立名目。且風毒之名。似亦欠妥。至喉痺之急者。俗有走馬之稱。迨因其內外皆腫。易於阻塞。

耳。或疑與纏喉相類。不知纏喉。以腫處紅絲纏繞爲斷。此則無也。纏喉。喉。纏。則痰聲如拽鋸。此則不過腫脹而已。餘若飲酒成癖者。則發酒毒。氣滯痰壅者。則名氣壅。冬令嚴寒而發者。則名陰毒。與風寒喉痺。實無差別。是一病二名者。寒伏喉痺。亦同此類。如是之繁葛不清。可見古書之難讀。其白色者。名曰喉痺。潰爛者。名爛喉痺。生半側者。名單喉痺。兩邊皆生者。名雙喉痺。名稱太多。實屬煩而無當。

診斷及經過傳變 凡喉痺發生。喉內腫大如拳者重。小如果核者稍輕。脈絃洪滑。大有力爲順。沉細軟弱無力者爲難治。大抵脈沉而鬱遏不舒者。皆有表邪之象。滑爲有痰。數爲有熱。細數而浮爲虛火。沉細無力爲虛寒。舌苔白膩乃溼蘊痰滯之象。焦黃乾燥又爲實熱之徵。但黃滑色苔而津液如常者。非爲實熱。不可攻下。宜用清宣。達之劑。此症經過之時期最多。速效不易。如非氣絕喉痺。走馬喉痺。係皆豫後佳良。但非少數時間。所能奏效。其傳變爲音啞者。須察

其初期中期大抵初期音啞。多風寒外閉。中期音啞。多為痰熱內閉。末期音啞。有肺氣虛弱。有虛上炎。治之非易。其寒發於外。宜治其表。其神志沉困嗜睡。顛音者。為正氣無鼓動之力。傷寒論所謂之少陰病是也。宜分別其虛熱寒熱而治之。但現此種症狀。多不易治。此經過轉變之大概。

治法 喉痺之症。虛實寒熱。外感內傷皆能為病。故治之之法。決非簡單方劑所能奏效。治疫喉之法。前分疎達。清泄。下奪。消化。救液。和中。為六項。茲謂治喉痺之法亦然。但方藥以前所備載者。概下列入。以免混淆。

(一) 疎散外邪法 治病之法。輕重先後。緩急所當。首先注重。裡急救裡。表急救表。仲景已開先例。故喉症之治亦然。譬如喉痺之病。內壅雖甚。而表症仍急者。當先治其表。不可早用清理之劑。及致引邪內陷。又宜用清泄。不可誤投滋膩。致生喉脹痰塞之患。宜用攻下。不可投以清宣。揚湯止沸。反致誤事。此治法先後之次序。所當分別。其初起惡寒發熱。頭項強痛。週身拘急。咽喉腫痛。脈浮緊。

而兩寸沉或伏者。宜用加味甘桔湯。其脈絃滑而數。口渴舌乾。宜用辛涼發散之法。加減桑菊治之。其四時外邪所發之喉痺。仍當參用治四時病症之法。

加味甘桔湯 (宜散表邪法) 傷寒方加味

生草 八分 秦艽 錢五 象貝 三錢 川至金 錢五 山豆根 一錢 桔更 錢五
豆豉 三錢 大力子 錢五 赤茯苓 三錢 薄荷 錢五

加減法惡寒甚而無汗者加葱白二支防風 二錢 甚者加麻黃 五分 咽喉腫甚者加赤芍 二錢 射干 五錢 小便不利者加通草 八分 滑石 三錢 大便不暢加郁李仁 二錢 知母 二錢

(主治) 外邪鬱遏。未經疎達。惡寒發熱無汗。咽喉腫痛。

(方解) 外邪鬱遏。未經疎達。風寒之感冒。衛陽之不宣。薄荷秦艽豆豉散風達表。以解其外。其甚者。汗不透達。惡寒不解。故必加葱白防風。以透達之。或加麻黃以發之。甘桔緩咽喉而止痛。象貝牛蒡。玉金。化痰順氣。以疎血氣之壅。赤苓山

豆根。清熱利水。以解咽喉之結。二便不通利者。故導之於下。咽腫阻於上者。則清熱降逆。消之於內。此為喉痺初起之治法。

加味桑菊湯 辛涼解肌法 葉氏方加味

桑葉 二錢 玄參 錢五 知母 二錢 赤苓 三錢 菊花 二錢 豆豉 三錢 赤白芍 各錢五

生草 八分 丹皮 錢五 山梔 錢五

(主治)脈絃滑大而數。舌乾口渴。微覺惡寒。神煩壯熱。咽喉腫痛脹大。或並無寒熱或不寒但發熱者。

(方解)喉痺已腫脹疼痛。其身發寒熱者。但治其寒熱。佐以化痰清熱消腫之品。使外邪解除。則喉間之腫硬。自能逐漸消化。惟身無寒熱。知其病不在表。口渴舌乾。神煩壯熱。知其病在血份之熱極。但得自汗出者。乃白虎及玉女之的証。無汗當用辛涼清透法。以釋其外邪。若涼遏法即不能適用。桑菊、豆豉、於清熱之中。寓宣達之意。丹皮、山梔。清血熱之壅。解咽喉之結。玄參、知母。清熱生津。赤

白芍。清熱降洩活血。赤苓化溼濁。生草緩咽喉之急。合於清熱宣透之劑

(未完)

(藥物類)

麥芽之研究

名譽 章次公
理事

張石頑曰。素問云。麥屬火。心之穀也。鄭立云。麥有孚甲。屬木。許慎云。麥屬金。金旺而生火旺而死。三說各異。而別錄云。麥養肝氣。與鄭說合。孫思邈云。麥養心氣。與素問合。參考其功。除煩。止渴。收汗。利溼。止血。皆心之病。當以素問為準。蘇恭曰。小麥作湯。不令皮圻。圻則性溫。不能消熱止渴也。可知方中用麥。皆取外麩之力。仍取性溫內存。以輔助之。愚按穀食中。惟麥得春升之氣最早。故為五谷之長。察其性之優劣。則南北地土。所產之不同。北麥性溫。食之益氣添力。南麥性熱。食之助濕生痰。故北人以之代飯。大能益人。養肝氣。去客熱。止煩渴。利小便。止漏血。唾血。令婦人得孕。南方氣卑地濕。久食令人發熱。鄉土不同故也。干麵益胃強肝。濕麵

生痰助濕。初夏新者尤甚。新麥性柔。亦助濕熱。而收穫時遇雨。色變者。食之令人作嘔。能傷胃氣。

郭受天曰。麥芽在吾國藥物學上。亦頗有極大之價值。本草云。其鹹溫。能助胃氣上行。而資健運。和中下氣。消食除脹。散結祛痰。化一切米麵果食積。可見自古以來。即見麥芽為消化之良藥。至近世西洋醫學之論麥芽適應症。亦與吾國本草所云功用相等。其言曰。吾人胃內之澱粉變化。常受唾液基亞斯達在之變化。攷唾液基亞斯達在之減少。或變性者。常以麥芽。基亞斯達在補之。次之二例其適應也。

(一) 急速食事之人。唾液量之不全。 唾液混和。與食塊滯留于口腔內之時間。為此例。

(二) 分泌過多症之唾液性不全。 胃內之鹽酸過剩。則減損唾液酵素之作用。或破壞之。故西洋藥物學云。基亞斯達在。于澱粉。不消化之胃病有卓效。因米

飯之胃病。投以本品。無不立止。單用者稀。常與百布聖等配伍用之。按百布聖爲胃液腺所分泌之胃液。治病後續發之消化不良。及常人消化機之衰弱。與吾國本草之論麥芽。所謂久服消腎氣者。大致相同。李時珍曰。無積而服之。消入元氣。與白朮諸藥。消補兼施。則可無害。按白朮爲補益脾胃虛弱之要品。與西洋基亞斯達在之配伍百布聖者。用意相同。執此以觀。中西二大醫學。雖遠隔數萬里之遙。而用藥之大意。猶能如出一轍。誠匪夷所思。

麥芽含有亞基斯達在之成分。爲消化不良之聖藥。郭君言之詳矣。此外有爲吾人亟當知之者。即大麥、小麥、麥芽麩。都含有多量的維他命。且所含維他命之種類。殊不一致。茲特列表如下。

維他命	A B C	維他命	A B C
大麥	十廿一	穀芽	廿卅、
麥麩麵包	十廿、	小麥粉	

——到——

第五十四號 豬肝在醫學上之治療

九十四

綠色麥芽 十P 卅 小麥粉 十P 卅

表中符號計分五種。十表示食物中含有某種活力素。卅表明此食物所含之活力素比較為多。卅卅是活力素最多的表示。一卅是表示極微量的符號。有「P」的是表示活力素的有無。還是一個疑問。

豬肝在醫學上之治療

前人

按西醫丁惠康君云。肝藏之治貧血病。以肝富有維他命之故。吾乃恍然古代目疾食肝之原理。夫維他命之種類。大別凡三。其影響于人身康健。亦各不同。人體苟缺乏維他命A。在童年發育。必發生障礙。成人微菌抵抗力。亦極薄弱。更有普遍疾患。則為各種目疾。如晴衣炎。火眼。干性眼炎等是。此種目疾之特徵。為眼皮紅腫。睛皮發炎。同時分泌一種粘質。甚或流血。若不醫治。能使目盲。目疾而外。其他疾患。或且追蹤而至。大概肺與胃都是衰弱現相。偶遇外界侵襲。痢疾。肺勞等病。在所不免。目疾食肝。在今日民衆。已成普通常識。抑知于科學上之新發明。極

端相合。先民經驗宏富。有足當吾人之感念者。又按缺乏維他命A。使人抵抗力薄弱。肺勞等。乃易於發生。吾又想及聖惠方。以豬肝療治日晚寒熱。驚悸煩渴。此八字。是肺勞現相。一為增加維他命之作用。更從聖惠方。而推及肘後癩肝散。之治鬼症。亦不外具有維他命耳。前人論癩肝。之主治傳屍勞瘵。為殺虫之用。今乃知其不然。吾知讀者諸君。或且疑吾神經過敏。水中之癩。與陸上之豕。何能相提并論。雖然。吾之為此言。亦有所本。龐澤民先生。曾為吾言。普通動物之肝。大致相同。所合之成分。故吾有此揣測之詞。况魚肝油。含維他命A。既極多。又安知癩肝不如此哉。

藏器。以本品主脚氣。此亦有理可言。蓋脚氣之成因。西人有說缺乏維他命_B所致。豬肝療治脚氣。吾人從理想上推測。則知本品除含有A種維他命外。亦必含有B種。

使用本品。一及一般動物之肝。一煮沸不可過久。因各種維他命。熱到攝氏一百

度。經過十二小時。必完全失其功效。

藥物學體裁之商榷

名譽沈仲圭
理事

中醫之長。在方劑之靈驗。中醫之短。在學理之悠泛。此為多數學者之公論。處今日中西過渡時代。而言改進中醫。厥惟一方搜集效方。纂輯成書。以供全國醫士之實驗。而定為藥局方。一方研究新理。整理古籍。使玄妙之空言。嚴為確切之定論。如是病理超乎正軌。治療不致分歧。初學者得門而入矣。特是方劑為藥品所組成。欲編訂效方。應先厘定藥物。蓋諸家本草。侈言功用。幾至一藥可治數十症。究竟何病有效。何病無效。使讀者如墮五里霧中。又有一藥之主治。古今異說者。如遠志古云治欬逆。今祇用以交心腎。龜甲古云破癥瘕。今祇用以養陰血是也。一藥之功用。自相矛盾者。如葶藶既能除胃冷。又謂散浮熱。訶子既能斂肺瀉腸。又謂泄氣消痰是也。凡此之類。苟不博攷羣書。參以經驗。將每品效用切實指出。奚足以言改進耶。不慧嘗執教鞭於上海醫專。承乏藥物一科。該校原取本草便

讀爲教本。不慧以其鮮精采。爰爲每品另編講義。以作參攷。一管之明。未敢自信。附錄一品。就質方家。尙乞不吝珠璣而辱教之。

金櫻子（又名山石榴山雞頭子）收斂劑

（釋名）金櫻當作金罌。因其形如小石榴而色黃赤。恍如口小腹大之瓶。故名金櫻。石榴雞頭皆象形也。

（產地）南中州都多有。而以江西劍南嶺所產者爲勝。

（製法）未全熟時。取汁熬膏。（沈存中云金櫻子止遺泄。取其溫且澇也。世人待紅熟時。取汁熬膏。未甘不澇。全失本性。大誤。當取半黃者。日乾搗末用之。）

（性質）酸澇而溫。

（功用）收斂精管。

（主治）蜀本草。治脾泄下痢。止小便利澇精氣。世醫借用以澇精止遺。（用量及配合）一錢至二錢半。同黃實、蓮子、菟絲子、茯苓。治久痢體弱。

(方劑)水陸二仙丹止遺精。芡實爲末。以金櫻子膏和丸。

(圭按)芡實金櫻。性俱收瀉。功在因精。與金鎖固精丸(沙苑蒺藜龍骨牡

蠣芡實蓮鬚共爲末。以蓮子粉和丸。)相髣髴。祇宜於滑精之症。

(禁忌)泄瀉由于火熱暴注者。遺精因於陰虛火熾者。皆不宜用。

(編者意見)本品與龍骨牡蠣蓮鬚芡實五味雖同爲瀉精之品而效用各不相

侔。龍骨性最粘濇爲吐血良藥。(內服能止吐衄二便之血。外敷能止金創

仆損之血。)牡蠣性涼能清虛勞煩熱。內含沃度。善消瘰癧結核。五味在下

斂腎。在上斂肺。故療咳喘。連鬚能烏鬚黑髮。芡實祇堪補脾瀉腸。

滑石之研究

名譽 李愛人
理事

(產地)本品以沂州產者爲佳。今泰甯產者亦佳。川產者力薄性劣。不堪入藥。若

以興化之白土製成者。有弊無利。採無時。

(性狀)本品爲色白質重。天然之石質物。浸於水中不散不燥。味淡。性涼。無毒。

(生理作用)

(一) 利水。本品有增加水量及排除血內雜質。故爲利小便之主藥。

(二) 清熱。本品味淡性涼。其清熱力甚微。方書云。其能止渴退熱者。乃濕去熱除之意。

(醫治作用)

(一) 通小便。小便不通。則濕熱壅滯。誘起水腫、黃疸、脚氣、淋閉、

口渴、身熱、嘔吐等症。因本品有利尿作用。則小便暢而諸疾除矣。

(二) 治瘡毒。諸瘡腫毒。由於濕滯熱壅者。用之頗效。

(三) 止泄瀉。膀胱排洩力弱。致成便泄。利小便。則泄自止。

(四) 本品外用於小兒陰部及肛門之糜爛擦傷。或皮脂漏。天泡瘡等。爲無

害性之蓋覆藥。

(用量) 內服每次二錢。至六錢。外用粉末不一。

(禁忌) (一) 無濕。(二) 脾虛下陷。(三) 精滑。(四) 當汗之症。

(處方) 本品六錢。生甘草一錢。名六一散。研末包煎。善治受暑及熱痢。暑多夾濕。

第五十四期 苦杏仁柏子桃油之毒質

一〇〇

故宜。若兼修者。宜本品石羔各半。台甘草。方為得體。

(修治)本品有白綠烏黃等種。惟白色如方解石於石上。書有白膩文者為佳。以刀刮如粉。(或在鐵船中研碎)以牡丹皮同煎一伏時。去丹皮。再用水飛。日中晒乾用。

未完

苦杏仁柏子仁桃仁油之毒質

秦國楨

敬告病家注意

須知去油淨盡

醫家開方。常用苦杏仁霜。柏子仁霜。瓜蠶仁霜。蘇子霜等。意在去油用質。免致敗胃滑腸。殊不知仁中之油。有含毒質者。有不合毒質者。關係甚重。不可不分別言之。若瓜蠶蘇子等。不含毒質。去油不去油。介乎可否之間。惟苦杏仁一味。放在銅器內。一瓦槌。用簿紙在面上熨之。有一層如琥珀色者。謂之杏仁自散油。二兩苦杏仁。熨得四釐。每四釐能毒死一田雞。每二三分。能毒死一人。桃仁中亦含此油。其毒較烈。本草謂雙仁者殺人。亦因雙仁者力厚。含自散油質太重故耳。古人格

物之理甚精。特措詞太簡。每言其當然。而不言其所以然。不若新學家之反覆詳明。而暢言之。甜杏仁亦有散油。無毒。不殺人。栝子仁。含此質更重。故栝子仁。苦杏仁。桃仁。三品。不可不熨出其油中之毒。而專用霜。若云防敗胃滑腸。而去油質。猶其小焉者也。其衝鼻之氣。卽其毒質之霧。

(診斷類)

中西診斷學之比較


石夢魯

診斷學者。診其脉。察其證。以求病之所在。斷定其爲何病。國醫之診斷有四。曰望、聞、問、切。望者。望其部位之色。以知病之所在。望其唇舌之色。以辨其病之表裏虛實寒熱。聞者。聞其聲音之低響。以別虛實。嗽之爽悶。以定升降。問者。問其情由。則知病之來歷。問其近狀。則知病之淺深。簡而言之。望聞問。以知其外。切脉。以知其內。知內證外。則病情確切。於是斷定爲何症。西醫之診斷。曰打、曰聽、曰觸、曰視、曰脉搏、曰檢溫、曰顯微鏡檢查。曰愛克司光檢照。一若無微不至。究竟聽診與打診。

均是檢查身體內部各種音響。以辨常變而定病否。與國醫之聞診大致略同。然臟腑之中。有體有用。有靜有動。用而動者。固可得而聞。體而靜者。不可得而聞。臟腑之中。心司血液之流行。肺司呼吸之升降。均屬動而有聲。聞而易得。其餘則多屬靜而無聲。聞而難知。是則聞症機之功用。亦極簡單。視診與國醫之望診。同一審察各部之形色。則其用意。亦增差不遠。至於觸診。則國醫雖無其名。然國醫則有按診。按其發症之部位。或痛或不痛。或拒按。或喜按。以辨其有無滯積不通。及虛實氣血之殊。亦與觸診鬚鬚相似。至於檢溫表。在西醫用以探其溫度之高下。以定火勢之盛衰。不知此乃呆板死物。僅得探其熱度之高下。而不能辨其虛熱與實熱。真寒假熱。與真熱假寒。據此檢溫表。以定熱病則實熱之症。檢溫表。升至壹百零五度。為極熱。西醫治法。內服瀉火退炎之藥。外壓冰霜。與國醫之投白虎承氣等湯。犀角黃蓮等藥。固屬相近。惟虛熱之症。腎陰虧損。水虧火盛。水不制火。龍雷之火上奔。國醫治以大劑補陰。納虛滋水。經所謂壯水之主。以制陽光。而

西醫則以壹百零五度爲極熱，亦認爲與實熱之症。同一施治，亦內服瀉火外壓冰霜。一經開手，其危立至。余見多矣。更有寒極似熱，陰極變陽，名曰類白虎症。又曰戴陽病。此孤陽上越，無根失守之火也。外雖極熱，內實極寒。以檢溫表探之，亦升至壹百零五度。在西醫必視同爲實熱之症。治以前法，而大施瀉火退炎之劑。其藥入口，死亡隨之。國醫則用引火歸原之法，施以四逆湯，或附子理中湯，加桂效如桴鼓。古所謂甘溫能除大熱，亦所謂熱因熱用。以上三種熱症，其熱雖同，而實熱虛熱，陰虛作熱，陽虛作熱，則相去霄壤。且其治法，亦冰炭懸殊。偶一錯施，無不立歸冥籍。更有熱極似寒，陽極變陰者。經所謂熱深厥亦深，熱極厥亦極。外雖極寒，內實極熱。此陳修園所謂直中三陰之熱症。用檢溫表探之，則如平人玖拾捌度。毫不稍爲增加。國醫用極寒涼之藥，以瀉其內伏之火。經所謂寒因寒用也。而西醫則憑此檢溫表爲標準，必認爲無火，而用和平之品，致緩不濟急而死者，在在皆是。甚或見其四肢厥冷，汗流脉伏，誤認爲正氣虛脫，而投壯心劑，或打強

心針者，諸如此類，何異火上添油。是直促其速危耳。以上數者，特舉其熱症之大端。其餘如血虛發熱，濕蒸作熱，春溫秋燥之熱，皆能令檢溫表升至壹百零五度，均非實熱之症。宜探本窮源，因症施治。若以檢溫表之極度，便認作實熱施治，萬無一生。至切脈一道，國醫則有浮、沉、遲、數、虛、實、滑、瀉，八大綱。蓋浮沉以辨病之在表在裏，遲數以辨病之屬寒屬熱，虛實以別正氣之盛衰，滑瀉以驗氣血之通滯。其餘尚有弦、芤、緊、洪、緩、伏、濡、弱、長、短、微、細、促、結、牢、革、代、諸脈。外如斷定死症之七怪脈：曰雀啄連來三五啄，屋漏半日一點落，魚翔似有又無，蝦遊靜中忽一躍，彈石硬來尋即去，搭指散亂如解索。更有釜沸湧如羹，且占夕死不須治。復有所謂真臟脈者，經曰：脈見真臟者，死不治。蓋言其脈但見弦硬，毫無和緩，是胃氣已絕之兆，故不治。國醫之論脈，既詳且盡，且脈診之應驗，效如桴鼓。所斷死生，毫釐不爽。而西醫僅以時辰表定脈持之多少，以辨熱度之高下，脈持有力無力，以別正氣之強弱，節單粗淺，較之國醫之神明變化，活潑地者，誠不可同日而語矣。至



原件短缺

P 105 — 106

(二)原文曰。(尺內兩旁。則季脇也。尺外以候腎。尺裡以候腹。)蓋節首冠尺內的一句。明明是視人身。若取個立正姿勢。那兩個尺膚的內面。自是軀幹的兩旁。軀幹的兩旁。正與尺膚相對處。則是季脇無疑了。這種解法。何等直截了當。而且天然的註脚呢。註家偏妄語(尺內)是尺部的動脈。(兩旁)是動脈的兩旁。(則季脇也)是說尺脈的兩旁側。却能候人身的兩季脇了。試問何等牽強。何等悖謬呢。其實因遷就他。三部分分配的見地。故不得不再拿關部兩旁。可候兩脇。寸部兩旁。可候兩腋的兩句。來作陪趁呀。所以他開口便錯。以致後文。生出無限葛藤來。例如下兩句。是說兩尺膚。要附近了軀幹自來有個裏側與外側的。那裏側就是季脇的前方。外側自是季脇的後方啦。按季脇的後方外面。即是腰眼。腰眼的內面。正當兩腎所構的位置了。當然此處發生痛痒寒熱。或其他病况。醫家就此。須要診候他。是否與腎藏有無關係呢。這是(尺外以候腎)的意思。譬如病者腹部痺痛。或堅滿。醫家須向季脇的前方。去施行診候法。究竟看那腹部是寒是熱。

是在內在外。即但審其喜按拒按。亦可知病况的虛實治法的要領了。這不是（尺裡以候腹）的意思嗎。所以解釋本文甚簡單。而註家偏要拉拉雜雜的。分配一切。好像兩尺的動脈裡。能把腹內的各藏器。通可隨便診候的。反弄的繁而失當了。

未完

（方劑類）

溫熱方劑編


理事楊煥文

第二章 陽明經方劑

第一節 三陽合病方劑

梔豉湯。陸九芝選定傷寒論陽明病。脉浮而緊。咽燥口苦。腹滿而喘。發熱汗出。不惡寒。反惡熱。身重。若發汗則躁。反譫語。若加溫鍼。必怵惕煩躁不得眠。若下之。則胃中空虛。客氣動。膈心中懊憹。舌上胎。梔子豉湯主之。

陸九芝曰。此言其人陽明證具。即當用清法。以去其熱。而當時治法。所少者。獨清



原件短缺

P 109—110

水。衝鋒陷陣。斬關直入。譬若冠臨城下。非賈勇先登。曷克圖存。倘其因循苟簡。標本不明。又烏足以應變。

(奇方)奇爲單數。奇方單方也。爲獨參湯之回陽救急。一物瓜蒂之嘔吐。三才丸之補虛。五苓散之利水。七味白朮之調中。九味羌活之除邪。神而明之。變而通之。所謂出奇制勝。克奏膚功。

(偶方)偶爲複數。別於單方而言也。如桂枝麻黃各半湯。桂枝加葛根湯之類。是聲應氣求。並行不悖。又如麻黃湯之麻桂同用。四逆湯之姜附同用。腎氣丸之桂附同用。大承氣之硝黃同用。相維相繫。治效彰彰。天地生成之德。陰陽消長之機。舉於此可悟其理焉。

(複方)何言其複。如傷寒論之桂枝二麻黃一湯。桂枝二越婢一湯。白虎加桂枝湯。通脈四逆加豬胆汁湯之類。蓋兩證並見。則兩方合用。數証並見。則數方合用。譬若一路敵來。則以一軍當之。數路敵來。則以數軍當之。所謂兼籌並

第五十四期 七方十二劑說

一一三

顧計策萬全。倘其病雜藥微。則前拒後進。差之毫釐。失之千里矣。
要而論之。大方宜重症。小方宜輕症。緩方宜本病。急方宜標病。奇偶二方。則分隸于大小緩急四者之間。各盡所長。以爲用。複方則治繁雜之病。通其常。達其變。比例化裁。舉一反三。則醫之能事畢矣。茲且進言十二劑。

(未完)

醫 案 門

食積悶瘡案

周鎮

病者 錢桂桐之姪。童年住壩橋。甲子清和診。

病名 食積悶瘡。

病因 伏溫發瘡。因食糯米麵食。內鬱而不出透。至九日始延診。

症候 身熱七日。始見癩點。不出表。頭面極少。手足冷。按其腹作痛。疹毒內攻。全

夜不寐。氣喘燥煩。發狂起坐。揚手鄭足。

診斷 脈濡滯不起。舌絳苔浮黃如糜。唇紫此即癩疹闡註。所謂食閉兼火閉證也。

療法 宜治其積。其火方洩。痧立外透。用自製陸氏潤字丸。先通裏積。以治食閉。

遵繆仲醇清透。參入溫宣法。以治火閉。

處方 陸氏潤字丸一錢。先用開水送服。

牛蒡子三錢 蟬衣一錢半 連翹三錢 玉泉散七錢 (浮萍一錢同包)

萊菔纒三錢 蘇薄荷一錢 片礬金三錢 西河柳一錢 鮮竹葉念片

蘆尖五個 芋根(去心)二兩

外治方。以西河柳、櫻桃核、艾葉、姜煎水放盆薰足。後以吳萸生礬末、鷄子白、燒酒搗敷足底。引火下趨。以治足厥。

復診 詢知潤字丸僅服十粒。大便仍閉。全夜不寐。發狂起坐。氣喘煩燥。揚手擲足。脈細如伏。苔變深黃。目封。痧點似回。積橫於中。裏氣不通。痧火不從外達。毒即內攻。有犯心逆肺之險。再用清透法以達邪。通血法以消積。先與潤字丸二錢。督令研碎開水服畢。方與開方。

牛蒡子三錢 片礬金三錢 蟬衣一錢 地枯體五錢 枯黃芩二錢

薄荷葉一錢 丹參三錢 連翹三錢 生雅連七分 鮮竹葉三十斤

黑山梔三錢 赤芍二錢 玉泉散九錢 (浮萍草錢半同包) 木通一錢

(辰砂拌) 蘆茅根各二兩

另玳瑁七分。西藏紅花三分。研細。如霜。燈心湯下。代茶。鮮茅根。一兩。鮮芫荽一錢。鮮西河柳五錢。

效果 服後大便通解。痧疹齊透。佈滿一身。壞象如掃而痊。

(說明) 但以大黃起瘡。如方內開出。無論貧富。萬不肯服。故必自製携用。乃方便之一術。

嬰兒慢脾風久受受熱補案

劉蔚楚

病者 姪女妹姑。年週歲。住廣東香山。

病名 慢脾風。

原因 仲夏夜半。有叩門聲。納入。則堂弟婦楊氏。使人請診。其女之病。女僅週歲。弟婦抱坐於床。

第五十四期 嬰兒慢脾風久受受熱補案

症候

面色紙白。口鼻氣冷。睛露口開。手足時微抽掣。詢得前月感風。中西醫治。吐瀉漸頻。遂現此狀。

診斷

余以一指按脈。手冷而脈如絲。察其指紋隱伏。全症脾腎虛寒。睛露口開。脾陽失守也。手足時微抽掣。腎陽越而虛焰衝腦。腦筋引動也。據此已知爲慢脾風症。世說急慢驚未辨。可試飲以胡椒湯。察其納否。例以中風昏厥。目張口開。手握爲實。目閉口張。手撒爲虛。例以陽盛格陰。脈雖微。久按愈見。面色純赤。小便短。大便或秘或瀉。爲真熱假寒。例以陰盛格陽。脈雖大。身雖冷。重按則微。面色淡紅如桃花。便溺滑利清長。雖唇破舌黑。血流煩渴。苟舌底非甚乾焦。便是真寒假熱。再試以茶水。甘飲者爲熱。少飲即止。或提頭變氣者爲寒。更有舌光絳。如剝皮者。陽回宜兼顧陰。細辨自然明瞭。莊公在田。謂急驚多先發。熱乃驚搐。甚則角弓反張。是陽症。慢驚多由吐瀉。或誤藥。攻散寒涼太過。非猝致者。是陰症。總序辛熱溫補二方。補

療法

前賢所未備。救無限。誤斃之嬰孩。福幼名篇。洵無愧色。余先用逐寒蕩驚湯。繼以附桂理中湯。

處方

胡椒炮姜各一錢。丁香十粒。布包灶心土三兩。煮水澄清。煎藥頻灌。能少啜乳。再進一劑。

接方

高麗參二錢。白朮三錢。乾姜錢半。炙草六分。附子二錢。煎成。泡玉桂心八分多灌。

結果

至一星期漸效。而身軟如棉。效似太緩。堂弟憤與港商游商。再薦西醫接診。距三日。危狀如前。乃邀余以前法救治。甫見效。又荐西醫善後。則未三日。呼吸垂危。小桐棺已備矣。弟婦固求。余姑以北京同仁堂黑錫丹五十粒。研細。分多次以姜湯開灌。連用二日。進以附桂理中湯。十日後。再用其二。理中地黃湯。一照莊公。隨時加減。最後以香砂六君加減。共三月餘始痊。昔澳門葡國副提督之公子。患此。西醫均決定不能過六小時。余友駱

第五十四期 嬰兒體質久受寒熱補案

二一八

君秀石。專用溫補半月治愈。中醫此等治驗。實有經驗獨到之處。余但以一嬰兒。服辛溫重補。過百餘劑。且三月內。方稍輕。藥偶歇。病已立變。必經久。乃置諸安痊。見得勿負氣爲進德之基。不忍棄爲仁人之語已耳。醫事然。凡事何莫不然歟。

醫案評議

(續)

張山雷

張氏醫通 王公峻子。四月間。感冒。昏熱喘脹便秘。腹中雷鳴。服硝黃不應。圖治於石頭。其脉氣口弦滑。按之則乳。其腹脹滿。按之則濡。此痰濕挾瘀濁陰固閉之候。與黃龍湯去芒硝。易桂苓半夏木香。下瘀垢甚多。因宿有五更咳嗽。更以小劑異攻。加細辛潤之。大抵腹中奔響之證。雖有內實當下。必無燥結。所以不用芒硝。而用木香苓半也。用人參者。借以資助胃氣。行其葯力。則大黃輩得以振破敵之功。非謂虛而兼補也。當知黃龍湯用參。則硝黃之力愈銳。用者不可不慎。

(平議)此確是脹滿便秘可下之證。但右脉滑而按之乳。腹脹滿而按之軟。

自不能逕投承氣。參之腹鳴而無矢氣。則腸中有滯。而尚不堅燥。斷爲痰濕挾瘀。濁陰固蔽。識力最真。且能決其不燥。此飲閱歷功深者。不能作此語。黃龍湯去硝。而加蒼桂木香半夏。選葯極允。頤謂此濕痰食滯。化熱而尙未成燥。其舌苔當黃厚而潤。可加茅朮藿香。青皮大腹。以醒脾行氣。惟謂黃龍湯用參以助硝黃。非以補虛。立說甚奇。似非正理。又謂五更咳嗽以細辛潤之。亦未免好爲奇僻。非篤論也。

又倭順所素有內傷。因勞力感寒。發熱頭痛。表散數劑。胸隔痞悶不安。以大黃下之。痞悶益甚。更一醫用消尅破氣葯。過傷胃氣。遂厥逆昏憤。勢漸危。石頑診之。脉六部縈縈如珠絲。舌上焦黑。燥涸異常。此熱傷陰血。不急下之。真陰立槁。救無及矣。因以生地黃黃連湯。去黃芩防風。加人中黃。麥冬。酒大黃。另以生地黃一兩。酒浸搗汁和服。半夜下燥矢六七枚。天明復下一次。乃與生脉散二帖。以後竟不服葯。日進糜粥調養。而大便數日不行。魄門迸迫如火。令用導法通之。更與異功散。

調理而安。

(平議)其人素有內傷。則本是孱弱之軀。縱有感邪。即當解表通裡。亦必在在胥知顧忌。乃既汗且下。此三不已。雖有健者。亦難勝任。何論柔脆。乃脉則微細難尋。舌則焦黑燥涸。陰已竭而陽愈張。抑且明有燥結在裏。不除山險。邪熱終有所憑藉。而病何能解。石頑於養陰清熱解毒之中。參以下泄。即從黃龍湯變化得來。是亦可備臨症時緩急之一助。附錄生地黃黃連湯。即四物換生地赤芍。加芩連。山梔。防風。

又、陳瑞足七月間患時疫。初發獨熱無寒。或連熱二三日。或暫可一日半日。熱時煩渴無汗。熱止則汗出如灑。自言房勞後乘涼所致。服過十味香齋。九味羌活柴胡枳桔等十餘劑。煩渴壯熱愈甚。石頑診之。六脉皆洪盛搏指。舌苔焦枯。唇口剝裂。大便五六日不通。雖云病起於陰。實則熱邪亢極。胃府剝極之象。急與涼隔加黃連、石膏、人中黃。得下三次。熱勢頓減。明晚復發熱煩渴。與白虎。加人中黃、黃

連。熱渴俱止。兩日後頰發頤。一晷時即平。而氣悶神昏。此元氣下陷之故。仍與白虎。加人參、犀角、連翹。頤後嫩發。與犀角、連翹、升柴、甘桔、牛蒡、馬勃、二服。右頤又發一毒。高腫赤亮。另延瘍醫爲治其外。調理四十日而安。同時患此者頗多。由市醫不明。此爲濕土之邪。初起失於攻下。概用發散和解。引邪泛濫。而發頤毒。多有腫發綿延。以及膺脇肘臂。如流注潰腐者。縱用攻下解毒。皆不可救。不可以發頤爲小證而忽之。

（平議）病起有熱無寒。則雖往來似瘧。亦當以瘧瘧論治。熱時煩渴。熱止汗多。此當清解而不當發表。復何待言。乃正以病人自述房後乘涼四字。遂大表特表。溫升燥烈。提動其炎炎之火。盡浮於上。試問果因房後陰傷。亦復何能堪此。醫學之暗。古今同慨。石頑能識是實熱亢極。而投是藥。本是應有之義。初非奇特。其下後熱減。而異日復然者。正以溫升之藥。服之已多。浮燄何能遽息。更方投白虎。而仍含解毒。極合分寸。而其後之發頤。仍是從前溫升之餘燄。乃一日

而瘍且內陷。實是毒重勢熾。聚而內攻。其勢孔急。其情亦甚可畏。非元氣不支之下陷可比。石頑所論。尙非其解。所用人參白虎。犀角連翹。仍是清熱解毒重劑。故能清其裏而復達外。不可謂人參補託之力。如果下陷。則犀膏火寒。且有流弊。奚能桴應。然既復起。仍當清泄解毒。方可以解此日長炎炎之勢。奈用襲用尋常外感風熱治法。升柴馬勃。益張其燄。致令自左而右。紅腫高突。不可消散。絕不悟及前此溫升之禍。石頑縱非瘍科能手。不能辨別是症之外因內因。（外因發頤。是風熱在表。可用辛涼。輕疎肌表。然亦不當重用柴葛。助紂爲虐。而此是內因之火毒上攻。且即因於前用升提太多所致。又安可復事升柴。爲火附翼。）獨不思此症一路變遷。當亦知前車可鑒。溫升之不復。可以妄試。况自亦謂發散和解。引邪泛濫。然用藥則仍是升柴。何其明於責人。暗於責己。至於此極。蓋以內外分科。非其素習。遂不免有張皇失檢之弊。此頤所以恒謂內外女幼四科。理本相因。法無二致。必不當強分界限。以自域於小家伎倆者也。

姚嘯崗醫案

張蘊石

先生諱大奎。號嘯崗。常熟人。世居湖巢。工岐黃術。有清中葉。名蜚一時。四方求治者。踵相接。蓋先生之治病也。澄心靜慮。一以經訓爲歸。投劑輒效。世人稱之曰姚一帖。第以求診者衆。鮮暇著作。即臨證醫案。亦復散落人間。鳳毛麟角。不可或得。每聆父老言先生當日治病之神。心嚮往之。其姪孫新竹先生。余束髮時問字師也。藏有先生醫案一卷。顧不肯輕易示人。余忝列門墻。因得假歸。抄錄一過。觀其論病用藥。如絲入扣。洵可頡頏前賢。津梁後學。雖寥寥數十頁。而吉光片羽。彌足珍貴。不敢自秘。爰即略加校勘。公諸同好。用作診餘一助。書已成。聊誌數言弁其首。

民國十四年歲次乙丑長夏後學張蘊石謹識

溫病

王左 少年血氣雖盛。新婚腎液先虛。因時感引動伏熱。化火食氣傷津。壯熱煩

冤唇紅舌絳。前醫瀉南補北。已進數劑。三焦之實火雖熄。營中之餘燄尚存。胃津告竭。腎液不克支持。以致牙齦紫腫而衄。舌光乾剝而縮。法擬甘寒救水。以驅營中之餘焰。

原金斛四錢另煎 花粉三錢 白茅根八錢 粉甘草五分 烏元參三錢 炒丹皮錢半 陳阿

膠三錢 乾地黃五錢 東白芍錢半 天麥冬各錢半去心辰拌 銀花露三匙 青橄欖四枚 另

二診 用甘寒之藥。連旨四劑。營中之津液來復。舌已轉潤。牙齦未淨。病根仍在也。還當慎之。

原方加玉泉散三錢

三診 溫病後餘邪留戀。夾雜胃熱。木火上薰。發生齒衄。服藥後止而又來。半關

本元。所以弦數脉按之則軟。宜標本同治。

細生地四錢 玉泉散三錢 懷牛膝錢半鹽水炒 骨碎補錢半鹽水炒 粉丹皮錢半鹽

水炒 建澤瀉三錢鹽水炒 赤芍藥錢半 茅蘆根各五錢去心節 茯苓各三錢 肥知母

三錢鹽水炒 川黃柏三錢鹽水炒 石決明一兩打先煎

陳切 表熱蒸蒸渴飲頻頻脉數異常舌乾色絳鼻無涕目無淚神晦如呆熱入

心營之險症也

牛黃丸一粒 烏犀尖三分 生石羔八錢 冬桑叶錢半 鮮石斛四錢

焦山梔三錢 大連翹三錢 蜜竹叶三十片

二診 溫邪上受首先犯肺質弱氣陰不足舌津劫神志呆欲動風矣昨晚急投
斬關直入之將如鑰開鎖神呆漸清哭泣涕淚均有且兼微欬肺邪仍還諸
肺也脉數稍衰舌乾稍潤渴飲略減惟小溲不行此胃汁傷而不能上承肺
氣弱而不能下降今治其肺

鮮沙參 鮮石斛 紫蛤殼 白通草 淡竹叶 鮮竹茹 大杏仁

川貝母 玉蘇至 冬桑叶 帶心翹 玉桔梗

三診 病愈陰傷火旺煩躁不寐

中生地 磁硃丸 杭白芍 青龍齒 珍珠母 穉豆衣 辰芹神 熟
 棗仁 左牡蠣 辰燈心 夜交藤 淡天冬去心辰拌 竹茹 霍石斛 鷄
 子黃

龔左 壯熱煩躁氣急聲嘶。欬嗽重濁而無痰。音啞無汗而鼻衄。風火相煽。喉關

甚痛。丹癍色紫。大渴思冰。脉洪弦數。舌絳無津。伏邪化火。消耗通體之液。熱
 毒閉塞。熬煉臟內之津。火極似水。反見形寒之象。絳絳熱洩。壯火食氣之因。
 命在危途。藥力難挽。姑擬一方。以盡人事。速候名家定奪。

烏犀角三分磨冲 生石膏一兩 鮮鐵斛八錢 大青叶三錢 帶心翹三錢 鮮沙參

八錢薄荷五分打 鮮生地一兩川連三分打 酒黃芩錢半 丹皮二錢灸 白茅根一兩去心焦

山梔三錢 銀花露三匙冲 鮮萊菔汁二匙冲 青菓五枚去核打汁冲

另地栗甘蔗二味搗汁頻頻飲之

二診 大渴思冰飲不能解。三陽之火勢猖狂。五臟之陰津涸竭。昨進大劑甘寒

助水。舌津回。氣亦平。似已効驗。未必為功。仍錄前方再服。觀其轉變再商。

烏犀尖三分磨沖 生石膏八錢 鮮石斛五錢 鮮生地五錢 鮮沙參五錢

紫草茸二錢 焦山梔三錢 連翹殼三錢 黃芩錢半 天麥冬各二錢去心

茅根肉六錢 萊菔汁三匙沖 銀花露三匙沖

另地栗絞汁代茶

三診 壯火已熄。舌絳減淡。津液已回。飲能解渴。三焦之實火雖熄。爐中之餘焰

尙存。仍以瀉南補北。冀其水壯乃佳。

前方加全瓜簞五錢

陳幼 溫熱蘊肺。欬嗽痰稠。熱注大腸而下洩。灼燂津液而唇干。顯係冬溫內受。

復觸時氣而發。以清肅治之。

南沙參三錢 杜蘇子三錢 京川貝三錢 冬桑叶錢半 杏仁衣錢半 大連喬三錢

白茅根五錢 冬瓜子三錢 抗菊花錢半 益元散三錢

第五十四期 桃鳴崗醫案

一三八

孫左

病延一月。熱入營陰。舌絳而干。驚惕不寐。腎水既虧而陽旺。肝陰虛乏而風生。生發之氣既損。豈容苦寒再損。藥宜甘酸化陰。助其生氣乃佳。

陳阿膠三錢給粉炒 天麥冬各錢半辰拌去心 白芍藥三錢 甘草五分打 龜甲心四

錢麻灸 抱木辰神四錢 青龍齒五錢 左牡蠣一兩 鷄子黃二枚 蓮心七粒 南

棗二枚 霍石斛四錢 棗仁三錢川連一分打炒

二診 昨進甘酸化陰之品。得藥而夜寐安然。舌津稍潤。惟中仍干。倘獲病人思食。可少少與之。

生洋參 霍石斛 陳阿膠 東白芍 龜甲 天麥冬 乾地黃

抱木辰神 灸甘草 蓮心 炒棗仁 香殼芳 蜜餞雙梅二枚去核打沖

三診 舌津潤。臥已安。胃漸納。神乃振矣。

生洋參 元參心 乾地黃 辰茯神 肥知母 霍金斛 天麥冬

東白芍 蜜雙梅

徐左 溫邪身熱。第七日。紅疹乍發。即見神昏。瘳厥。口噤不語。兩寸脉數大無倫。舌質絳。尖邊愈甚。氣粗頭汗。乃直入心營之險候也。

犀角尖 元參心 連翹心 飛青黛 麥冬心 竹捲心 細生地 湘蓮蕊 石菖蒲 丹皮 赤芍 另牛黃丸一粒竹瀝送

二診 神識已清。身熱微發。惟汗大出口。大渴。右脉洪數。舌絳津乾。是心營之邪熱。仍返之於陽明也。白虎加地黃湯主之。

生石膏 鮮生地 肥知母 鮮石斛 連翹心 元參心 粉丹皮 連心麥冬 粉甘草 銀花露冲 葦根汁冲

三診 汗少渴減。熱退脉靜。邪盡解矣。清陽明之餘熱。則津液自生。戢少陽之陰火。則小便自通。切忌苦寒。尤戒滲洩。

玉泉散 原金斛 黛燈心 生甘草 元參心 麥冬肉 南沙參 鮮薑根

第五十四期 桃噴崗醫案

一三〇

黃左溫病。今日正交一候。灼熱無汗。紅疹隱約不透。脉躡數。苔黃質絳。語言無序。邪尚未達。氣液已傷。所慮陷入厥陽。風動變幻。

淡豆豉 細生地 焦山梔 粉丹皮 冬桑葉 帶心翹 廣玉金 鷄

蘇散 淡竹叶 茅蘆根 辰神苓

二診 得汗。紅疹隨之外達。脉數。左寸關獨甚。苔灰黃。兩目俱赤。氣分之邪未解。反有轉入營分之勢。昏蒙須防。

淡豆豉 細生地 淡黃芩 西赤芍 粉丹皮 冬桑汁 香連翹 杭

菊花 茅蘆根 小川蓮

三診 紅疹續佈。熱不退發。是病進之象。耳聾。間有囁語。足見肝腎之陰不充。溫邪扶胃熱蒸心營。多有內陷之險。急清其熱。以保其陰。

玉泉散 犀角尖 細生地 粉丹皮 西赤芍 西洋參 烏元參 大
麥冬 連翹心 菖蒲汁 石決明

四診 身熱已發紅疹漸泡白瘡。出是虛象也。脉轉細數。灰黃苔化薄。始到昨夜半後。大便連更二次。溫邪積滯。從茲化解。心營之熱得清。神識清慧。但耳尚無聞。陰傷不能遽復。

龜甲心 烏元參 麥冬肉 炙鱉甲 西洋參 生地黃 東白芍 吸

鐵石 石決明 粉甘草 生牡蠣 辰伏神 荷葉邊

李 溫病第十一日。斑點滿佈。壯熱神識昏糊。時有譫語。大便經旬未解。脉滑數。苔焦黃。舌質深紅。三焦邪火。挾滯蘊結不解。最易發狂奔走。

酒大黃 犀角尖 生石膏 鮮生地 元參心 粉丹皮 飛青黛 甘

中黃 石菖蒲 西赤芍 酒川連 酒黃芩 活水蘆根煎湯代水

二診 大便已通。神識漸清。惟斑色依然紫紅。表熱依然壯盛。脉尚滑數。苔尚未化。在內之邪與滯。互相交結不解。再主原方。以觀動靜。何可輕言移易。若畏虛而補之。則非愚所知也。

第五十四期 姚鳴崗醫案

一三三

原方去元參。加大青叶。以海螵地栗煎湯代水。

三診 大便連通。黑如膠漆。可想見其邪毒何如。今日神志清而不昏。斑色漸淡。

表熱大退。焦黃苔化去。脉尚數。餘熱仍逗留於胃。胃熱上薰。齒縫出血。原方略為變更。不可進食。食則必復。

犀角尖 鮮生地 西赤芍 粉丹皮 生石羔 京元參 肥知母 粉

甘草 銀花炭 川黃柏 焦山梔

四診 大便又更黃黑相兼。身熱已微。齒血已止。脉小數。苔化糙。爐火雖熄。餘焰尚留。欲望風波不起。最要飲食當心。

淨銀花 粉丹皮 京元參 粉甘草 大生地 金石斛 茯赤苓 焦

山梔 南花粉 大木通

五診 一場大病幾殆。幸得絕處逢生。刻診內熱漸清。眠食兩安。但有時心蕩頭昏。陰傷火旺故也。

青龍齒 左牡蠣 茯神 生洋參 麥冬肉 辰燈蕊 塊硃砂 活磁石 神袖 原金斛

姚左初起咽喉微痛。繼即身熱口渴。此係伏氣為病。過服表散。津傷液奪。少寐煩躁。陰不戀陽也。一逆尚引日。再逆促命期。醫生用藥亟宜留意。

炙甘草 生白芍 陳阿膠 乾地黃 麥冬肉 熟棗仁 原金斛
大紅棗 京元參 辰茯神 青龍齒 左牡蠣

金左 溫病初起。誤服表散。汗多渴飲。煩躁不寐。兩進加減復脈湯。病熱依然。脉右關弦滑。左寸弦數。舌光紅。尖乾有膚紋。唇焦齒垢。手指震動。神識少清。驟視之似屬邪陷下焦之象。其實陽明發熱。與少陰君火。被滋膩之藥。膠固鬱結。氣不流通所致。法宜輕靈。

犀角尖 生川連 黛蛤散 京川貝 冬瓜子 宋半夏 姜陳皮
赤白朮 小枳實 青竹茹 青蘆管 生甘草 一大地栗 陳海螵

二味代水

二診 刻診神志已清，煩渴俱蠲。且昨夜得寐極酣，苔色光紅，轉為薄白。顯是痰火蒙蔽，非邪陷下焦之比。今再化其痰洩其火，大約兩候關頭，可以結束。

青蘆管 海蛤散 冬瓜子 川貝母 淡竹茹 白杏水 紅山梔
 連心翹 法半夏 赤白苓 枇杷汁 鮮來卜 大地栗 陳海螵

三味代水

按溫病多本痰火，誤投陰葯膠住不化，往往燦津液，轉成虛陷之象。昧者不察，猶大劑而猛進之，以為陽虛若是，舍此末由挽救，其然豈其然乎。悲夫。

暑病

馮右 暑熱外逼，肺胃津液灼傷，求救於水，渴飲頻頻，日中則心煩焦躁，面赤火升，脈虛大，兩尺細數，上焦之邪有波及下焦之勢。是以近兩日內，小溲數迫，苔色薄白，轉為光紅。下缺

宋右

生洋參 帶心麥冬 大白芍 粉甘草 辰翹心 元參心 竹捲蕊
 生牡蠣 黛燈心 山梔心 西瓜衣
 酷暑外蒸汗洩過多。心液大耗。邪即乘虛襲入。陡然神識昏糊。詰語不休。脉左寸細數。右寸關亦細數。苔尖紅中剝。陽明之陰。素所不充。肝風為動。恐再有痙厥之險。

紫雪丹一錢 川雅連 大木通 二味煎湯送服

二診

神識已清。詰語亦止。小洩色紅如血。暑熱下洩也。虛體過利不宜。急當養正。正氣一復。雖有餘邪。亦默化矣。

南沙參 元參心 鮮石斛 玉泉散 麥天冬 細生地 竹捲蕊

肥知母 京川貝 白通草 石決明

孫左

汗出當風而臥。暑邪乘襲。閉塞支府。熱甚無汗。煩躁渴飲。小洩不利。脉鬱數。苔白尖絳。肺氣失宣。仍須汗出則解。

第五十四期 姚嘯崗醫案

一三六

陳香齋 川雅連 製朴花 扁豆花 淡豆豉 焦山梔 益元散

白通草 福澤瀉 茯苓 帶心翹

蔣左 暑邪由口鼻而入於肺。蒸動脾濕。阻遏氣機。身熱不揚。小溲短赤。頭重如

蒙。胸膈痞悶。脉濡數。苔黃舌絳。濕居熱上。熱居濕下。交阻而不能達。必冀三

焦宣暢。決瀆流通。則濕化熱解矣。

大杏仁 淡豆豉 焦山梔 白苡仁 製半夏 塊滑石 薄荷葉仁三味 同研荷葉包 製

朴花 淡竹茹 白通草 乾菖蒲 蘇梗 赤猪苓

(未完)

通訊門

田桐君中華民族醫學說

孫公之言曰。五族共和。分裂之言也。謬妄之言也。既謂之中華民國。其亦包含之。種族甚多。當然謂之中華民族。試以中華民族之醫藥論。夫民族之生活狀態。何所見。第一步見之於食。第二步見之於衣。第三步見之於住。第四步見之於醫與藥。醫藥者。隨文明之進步而與之俱長。即次於衣食。而爲人類生命之所必需者也。均是人也。甲民族與乙民族之生理不同。其衛生也亦自不同。均一民族也。上古之生理。與今日生理不同。其衛生也亦自不同。衛生不同。斯醫藥亦異。凡有蹄之動物。茹素。有爪之動物。茹葷。人之爲人。非具有蹄。乃具有爪耳。有生以來。乃與豺狼虎豹。喜食動物者。無以有異。惟繁殖既速。逐漸而游獵矣。又逐漸而游牧矣。又逐漸而大農矣。又逐漸而小農矣。殘殺之性。日以減輕。一至農業繁盛之民。其

茹素之日極多。茹葷之日蓋寡。此四期中。生理不同。衛生不同。其醫藥不同。夫何待問。不但時代有異。即同一時代。而四者亦並出焉。今之巴比滯人。婆羅洲之沙越人。斯里伯人。台灣生蕃。皆習游獵者也。哥撒克蒙古。皆習游牧者也。今之美國西部。東三省北部。皆習大農者也。俄國此次革命。其最大原因。不外由大農化爲小農之爭也。中國腹地。純爲小農。已經五千年於茲。此四者外。惟英國現象稍有不同。謂之游牧不可。謂之大農更不可。乃牧而不游。名之曰坐牧。斯爲當也。何也。英國之地。除工廠而外。各以其所有者。圈之以爲圃。牧牛與羊而飼之。徧國中無耕者。名之坐牧。不亦當乎。職是之故。生活狀況不同。遂影響於生理衛生醫藥。今之言曰。今日之世界。科學世界也。中國醫理。不合於科學之體。中國醫學。不合於科學之用。非根本廢除中國之醫藥。不足以謀進化。而適合於科學。噫。爲此言者。殆不知進化爲何物。又不知科學爲何物。科學云者。物與物相值。有特別徵候。智者見之。而加以修明。以貢獻於社會者之謂也。簡單言之。則曰碰彩。吾友馬君武

恆道之。譬之瓦特發明蒸氣。以病中見爐火煎水而起。牛董發明吸力。無意見蘋果落地勢作弧形。華人發明火葯。乃入廁中。以石擊壁爲樂。得暴裂徵候。因思取確。諸凡此類。不可勝計。豈在歐人碰彩。則謂之科學。在華人碰彩。則不得謂之科學。歐人之歷史短。則其碰彩之時間短。歐人之國家小。則其碰彩之範圍亦小。歐人之人數少。則其碰彩之人亦少。且科學之發明。有已經定論者。有未經定論者。蒸氣之發明。已經明効大驗矣。至於吸力之說。西方學者。方經羣起而疑之。不但此也。昔時歐人以喜馬拉雅山爲世界之最高峯。近日有云。喜馬拉雅山非最高峯。當居世界之第四位。第一高峯。在赤道南斯里伯。昔時歐人以龍之爲物爲中國人之理想神話。自巴拿馬開運河以來。發見龍骨。狀似華人之言。學者遂定斷龍爲古時動物。如在中國。則漢時曾開渠發見龍骨。渠以得名。無俟今日也。昔時以地球爲橢圓形。近日又復疑之。昔時以龍之騰雲致雨爲荒誕之言。自近日德人乘飛機。見有動物在空中盤繞吐霧。及取機關槍射之。而人亡機折。乃疑空中

有吐霧之物。昔時美國人以華僑食醬油乳腐。望而畏之。驗之。果有衛生。禁止入口。近日復見華人食之無病。驗之。始斷定此微生物。非害人微生物。乃益人微生物。復弛其禁。然則科學云者。有已經確定者。有未經確定者。不能以科學二字。即可震而驚之。奉爲金科玉律也。且進一般科學。而言醫葯科學。一般科學。適於所用之謂也。醫葯科學。適於療病之謂也。不但文明人有科學。野蠻人亦有之。苗人善放蠱。亦苗人能治蠱。苗人善製毒箭。亦苗人能治毒箭。不但野蠻人有科學。獸類亦有之。鹿性好淫。當春夏之交。牡鹿尤縱慾。因之奄奄欲斃。牝鹿含草葯以療之。見人奪之。則自吞。不但獸類有科學。蟲類亦有之。恆見蜘蛛張網於屋角。蜂過則羅而捕之。迨蜂反抗。蛛亦受傷。徐徐而退。至於屋頂。尋囓瓦松。以自療。人以瓦松治蜂傷。亦効。適用爲科學。適病亦爲科學。不能以野蠻人之科學。獸之科學。蟲之科學。而鄙夷不用。而坐以待斃也。况中國文明古國。其良法多多耶。余弱冠負笈海外。即信西葯。中葯不入口者二十餘年。好食瀉丸。年少能支。無大害。及

民國二年亡命。復走日本。以過食糕團。腹痛而瀉。入胃腸病院。瀉後復結。醫者以皮管貫腸。豁然而通。通後復結。結後復貫。終成腹痛之病。民國五年。到北京開會。冬日左脚漸冷。年甚一年。至十四年而劇。十五年回漢。兩足俱麻而木。臥不能起。情中醫金針家魏廷蘭治之。兼旬膝下較熱而起。然未能健也。十六年來滬。遇王秀峯。大食附子而身輕能步履。至太原復以此法治之。今則步履如壯年矣。不但余爲然也。老友曾錫三。五十五六時。卽患麻木。至癱臥年餘。厥後單食附子一味。每服自五錢至二兩餘。至今已能步履矣。且西醫不治之症。華醫能治者。亦多多也。吾友蕭萱字秋緝。娶日婦林氏。當民國七八年間。在滬舉一女後。生乳癰。乳房紅腫而硬。旁有小孔流膿。赴日醫篠崎醫院。日醫曰。非速割不可。林氏難之。緝秋檢閱傅青主產後篇。瓜囊散古方。方開瓜囊一個。連皮搗。生甘草五分。當歸三錢。乳香五分。燈心炒。沒藥五分。燈心炒。金銀花三錢。白芷一錢。青皮一錢。二服而愈。而乳漿復源源來也。篠崎以爲奇事。林氏遂變中國無醫之觀念。而轉信華醫。案

記此方。次年舉一男。復紅腫作痛。林氏以原方購服。一劑而愈。以後皆如之。余家小兒乳母十五年亦患此症。舍弟不信中醫。遂往申江醫院劉之綱治之不愈。余告之曰。非余治不可。當以醒消丸五錢。分二次。用熱酒服。參以瓜蒌散治之而愈。此後凡遇癰疽之症。余以醒消丸及仙方活命飲參服。三年以來。無不効者。民國十一年。余自廣州回滬時。神州女學校長張默君之母。患腹痛遍延西國各醫治之。皆曰此盲腸炎也。非速割不過三日矣。母難之。有舉中華新報小說家。譚善吾治之。善吾至。母已手足俱冷。惟心中尚有餘熱。投以中藥而愈。工部局索方化驗。終無所得。又見多年不愈之淋症。西醫治之罔効。服山西太谷縣北沈村。吳會龍之龜齡集一兩而全愈。此後元氣亦復。此藥並治頭暈。家母年老頭暈。服之甚効。西醫不善糖尿病。華醫陸仲安重用黃芪而治。美國襲其法。製黃芪精。口外黃芪。近年因以大貴。中醫以冰片治痛。冰片之中。重用樟腦。以其善散也。西人亦襲此法。故其止痛諸藥。無不如此。大元帥府參軍長林修梅患牙痛。中國視為小症。廣

州法國韜美醫院主拔之。拔之血流不止。一夕而逝。國民軍主將胡景翼。肘生癰。中國亦視爲小症。開封德醫主割。一割未愈。將再割。重用麻藥。一麻不起。中國藥主草木。治之不効。不致重其病。西醫主礦物治之不効。必致重其病。中國人力主廢止中醫中藥。外國人方徧求中醫中藥之法。余在山西口外。見輸出藥材。逐年增長。吾邑明代李時珍。以四十年之功。著本草綱目。非徒空言。乃自經費實驗者也。近日德人。大爲尊重而譯之。清人吳其濬著植物名實圖考。山西官書局刊行之。歐美日本人赴太原者。每人或購十部。二三十部。不等。中國人以當歸川芎爲血藥。西人近來亦何嘗不於此求之。中國人知種痘。西人亦效之。中國人以升藥治楊梅。西人亦效之。且上古之民族生理。與今日之民族生理不同。上古強。今日弱。中國民族生理。與歐州民族生理不同。歐州強。中國弱。何以故。去火化愈近者。愈強。去火化愈遠者。愈弱。火化久。雖弱。雖自然解毒之法。亦在其中。故中國人口自然繁榮也。攷漢末華佗爲關羽治箭傷。關羽屹能不動。今人能堪之耶。西人發

熱壓以冰帽而無傷。友人徐璧原在日本杏仁堂就醫。醫者以冰帽退熱。壓頭及腦。無何熱雖退。而人亦與冰俱冷。以終古矣。古人之所堪者。今人不必能堪之。歐人之所能堪。華人不必要堪之。我之發明。已久為社會應用之業。離出學校研究範圍。我則輕視。而不以科學視之。西人恆以為奇事。乞人弄蛇。知蛇性。理蛇傷。在不知者。不能不以為奇。制豆腐。小藝也。歐人以為奇。學之久而不能精。扇猪。扇狗之類。賤藝也。德人學之六年。自試猪狗皆死。渠塘養魚。華人不學而能。德國則屬之大學科。江湖跌打損傷。非有深奧之學也。所治奇症。較醫院為妙。大凡科學之過程。分三大時期。第一時期為思想發動時期。何由發動。即碰彩也。碰彩之中。分有心碰彩。與無心碰彩。神農嘗百草。有心之碰也。硝能制火藥。無心之碰也。第二時期。為衆人研究時期。此時期。亦為矜誇時期。成功失敗。尙未為定。惟研究者。必故神其說。信其藝者。亦旁加附會。第三時期。為應用時期。脫離研究範圍。人人不學而能者。如農業。如豆腐。如養魚。如扇猪扇狗之類。惟其不學而能。遂輕視其已。

往之科學。不但不矜誇。而且卑賤之也。夫中國醫藥。與西方不同。西方科學也。中國始於科學。成於哲學。終於混合應用學。科學規矩也。哲學神明也。中國醫藥之至精者。神明於規矩。而不離其宗旨也。西方之治病也。有一病。則一次治之。有二病三病。則二三次治之。四病五病。則四五次治之。中國不問其有若干病。皆以一次治之。且病愈而人亦健。謂之神明於規矩。夫何待言。西方視病爲多元。中國視病爲一元。日本人漸明此理。余當留學時代。日本方廢漢醫。行西醫。十年以來。又大唱漢法復興。研究者甚夥。外人尙謀行之。而我反謀廢耶。且中國醫藥。四民皆有關。醫師。士也。藥工。工也。藥商。商也。種藥者。農也。爲國家謀建設。所以安民也。如廢醫藥。四民失業者。其數不知凡幾。將何業代之乎。如曰。中國有庸醫。誠有之矣。行政者設法取締。何患無方。醫師之不善。不能遷怒於醫理。况普行西醫之國。如英。如法。如意。每年人口有減少之傾向。中國人口。則逐年增加。是天然衛生。天然醫藥。適合人類生存之道。可爲左證矣。獎之不暇。而况廢之乎。

第五十四期 王宇高君復衛生部呈文

一四六

王宇高君復衛生部呈文（續前）

（四）即退一步講。將鈞部此次通令「中醫之用中西醫名稱者」與浙江民政廳「挂名中西醫籍資號召之中醫」二句。暫置不論。凡是挂名中西醫者。不管其原為中醫。或西醫。概行禁止。此則表面似乎發生効力。然於事實。究有何關。彼挂名中西醫者。本係看風施舵。見貌辨色。極狡滑之蝙蝠。見騎牆之干犯禁令也。遂將中西醫之招牌毀棄不用。又見鈞部之偏袒西醫也。遂另豎一西醫招牌。以圖避免。不知鈞部將如何對付之。是鈞部此次通令之効力。充其極。亦不過禁止外表之中西醫而已。其實際向之挂名中西醫。以危害生命者。依然幹其危害工作。究於名稱何擇也。乃鈞部竟偏聽素與余雲岫汪企張為伍。處心積慮。必欲打倒中醫。而後始快於心。如胡定安之言。為之通令全國。此職會同人。所疑惑不解者四也。

（五）即在退一步——退百步講。挂名中西醫之狡滑醫生。遯而避入西醫界裏。

迄夫醫師領證。辦理完成後。彼輩終難免水落石出。真相畢露。然鈞所部規定。醫師登記條例。非正式醫校畢業。不得領醫師執照者。已聞有多數西醫。不肯服。從。旨見紛紛呈請鈞部大寬其格。果鈞部允其所請。網開三面。則彼輩曾稱中西醫之狡滑醫生。亦何難設法領證。一變而為堂堂之正式醫師也。不知鈞部於此。將用何法以救其弊。是鈞部此次通令。根本不生效力。乃竟繼信胡局長意。存壓迫中醫之詞。有此一舉。此職會同人。所疑惑不解者五也。

(六)若就中西醫之原則上言之。有志之士。有心並行。精研中西醫學。既得有中醫之學識與經驗。又入西醫學校。研究西醫。鈞部將不許乎。研究學術。為國民之自由。政府亦豈能限制之耶。研究中西。既不能限制。則學貫中西。亦當然所有之事實。信哉如胡局長所謂。學貫中西。事誠有之者也。既有學貫中西醫學之實在人材。彼要稱為中西醫士。則鈞部亦將不許。而禁止之乎。如其亦要禁止。則不究其實。而徒驚其名。竊恐非鈞部之所願為也。是鈞部此次通令。禁止

中西醫名稱者。於原則上。殊屬說不過去。乃竟不顧事實之根本。而儼然爲之。此職會同人所疑惑不解者六也。

(七)況且醫學以治愈疾病爲目的。於生理、病理、診斷、治療。無論生龍活虎。若何詳明。苟其不能治愈疾病。亦屬枉費。且不達目的之方法。與不合事實之理想。何異既不能治愈疾病。又安知其詳而且明之生理、病理、診斷、治療。果不誤也。試平心思之。西醫之特效藥物。究有幾何。中醫之愈病成績。誰謂毫無。總之現代之醫學。勿無中西。各有所短。亦各有所長。事實使然。安能勉強。所以若日本人。在北京協和醫院者。常常研究中醫。將中醫所用。已著成效之藥物。如麻黃、烏頭、巴豆、生薑、薤白、使君子、木鼈子等。皆化製爲藥粉藥汁。以供注射。或飲服之用。彼自號爲新藥。實則中醫之舊而又舊之經驗也。所以有識之士。皆望我中醫。研究世界科學。以採取其所長。而補我所短。是於醫學前途之趨勢。鈞部應獎勵中西醫互相研究貫通之不暇。復何爲壓迫而阻止之哉。不然。必

欲使中西醫界若鴻溝。則爲醫者。無論中西固亦無大關係。其如患病者之生命。何鈞部職司全國之衛生。乃不於國民之疾病生命。從根本上著想。此職會同人。所疑惑不解者七也。

(八)所謂學理既不明白。藥性又屬罔知。無意識之聽聞。竟不知其用意何在者。胡局長此言。就個人理想所得。抑亦有所根據。若有根據。究不知其用若何方法。而考察未嘗明示。若只以一句「夷攷其實。一無所長」之想當然。武斷一切。竊恐非目今國民政府之長官之所取也。須知我中醫界。大有人悉心研究西醫。凡西醫之組織。解剖。生理。病理。診斷。治療。藥物。等等。皆各有專書。講誦之。既久且多。有聘請由西醫大學畢業。或留學外國之醫博士學士。爲之面命指導。更有就西醫院。而實地研究者。豈僅僅明白學理。知識藥性而已哉。其于西醫之診斷。器注射法。固早已應用日久。而且甚有經驗。胡局長何得藐視一切。敢謂秦無人哉。雖然。胡局長固已發表意見。宣布各報。必欲打倒中醫。而後方

第五十四期 王字高君復術生部呈文

一五〇

可以快其私意。乃鈞部竟亦聽此偏語。此職會同人所疑惑不解者八也。

(九)外國人既採取中醫之經驗。化製中醫之藥物。孜孜兀兀。日進不已。未聞鈞部有設法阻止之。乃獨於我中醫之研究。西醫採取一個聽症筒。而亦不許聽筒。不過聽聽心臟與肺部之聲音韻律如何。胡局長亦已言之。為診察疾病之助而已。既已為助。並非唯一之主要診法。西醫之所為助者。我中醫亦借一助。有何不可。乃偏偏於此。不過一助之聽筒。亦靳我不許。嗚呼。獨許西人之採取中醫。而不許中醫之借用一區區聽筒。何尊貴外人。而壓迫中醫。一至於此之甚哉。此職會同人所疑惑不解者九也。

(十)世界為進化之世界。社會為進化之社會。乃全世界。全社會。人士所公認。而無異言者。若以醫學論。試一查西洋醫學史。亦何莫非由進化程度。而漸漸至現代之西醫。豈西醫一起。使用聽筒與注射器哉。當其初用聽筒與注射器也。亦何莫非由研究而試用。我中醫自岐黃至今。試考查歷代醫籍。亦大有進化

之歷程可見。雖於器械上之借用。未能如彼西醫之迅速。但此亦關於中國科學之不發達。非可獨責我中醫也。乃我中國政府。既自知其科學不及外人。於是派遣學子。紛紛出洋留學。致有今日中國人之西醫。固有自知之明。而得自補其缺憾也。何獨於我中醫。欲採西械之補其缺。而竟不許學術之進化。隨世界進化而並進。我中醫處科學之世界。亦欲自求進化。故特採取科學。此屬潮流所趨。非任何權力所能強阻。乃鈞部竟通令禁止。豈不許我中醫進化。而必欲置之於絕路死地哉。鈞部爲全國衛生總機關。西醫屬之。我中醫亦屬之。同爲鈞部所管轄。亦同爲鈞部所宜指導扶植。而使之日有進化。鈞部既不許我中醫採用西法。則我中醫求進化之方向。與手續如何。務請早爲規定。以便遵行。如以我中醫。辦醫校設醫院整理固有之方針。早爲規定。何鈞部對於我中醫。或宜保守。或宜進化。兩不相管也。若以此次通令觀之。似乎既不許中醫保守。又不許中醫進化。簡直是欲殺我中醫。滅我中醫。而不容我中醫復生存於

第五十四期 王宇高君撰衛生部呈文

一五二

中國者也。此因胡定安之私心。乃鈞部竟亦與之同化。此職會同人。所疑惑不解者十也。

由此十大疑點觀之。則鈞部此次通令。非止窒礙難行。且行而無功。更是行而有害。職會同人。本匹夫有責之心。不知則已。既已知之。不得不竭誠奉聞。心切愛護。語多冒犯。還望鈞部大其度量。恕我愚直。對於職會。所提出十大疑點。而爲之逐條解釋。明以指示。實爲公便。(已完)

星期徵稿選刊

葉氏謂溫邪上受首先犯肺逆傳心包吳鞠通指爲溫熱之溫諸家皆有異詞指責究竟此溫邪爲溫熱歟抑瘟疫歟

田爾康

溫爲熱之漸。熱爲溫之極。鞠通所指固不爲非。然竊有疑焉。葉氏既曰上受。註者已指爲自口鼻而入。不知溫熱之氣。豈僅由一局所之口鼻。而始能入哉。譬之置身於烈日之下。奔走於炎熱之途。熱氣蒸騰。汗出淋漓。此獨口鼻感受其熱乎。抑亦全體感受其熱乎。吳氏之謬。不辨而知。鄙意謂葉氏此論。爲瘟疫之邪。則於理論上。可以通過事實上。亦所必有。何則。往昔醫家。不知菌毒。故謂瘟疫。乃天地疠癘旱潦之雜氣。而非六淫之正氣。穢濁受自口鼻。先達肺胃等論。實則爲散漫空氣中之病菌。隨人之呼吸。藉人之飲食。而由口鼻潛入。或犯肺胃。或侵膜原。怪症

百出。老少相似。此症瘟疫之邪。亦受上受之理也。但溫字未改爲瘟。卷內文義。多係溫熱。則與上受之理不通。觀吳氏又列溫毒一門。並訾又可之非。可知二公於溫瘟。未能明晰。欲以一人之見。推翻一切。此誠不可爲諱者也。余推葉氏之本意。未必爲指瘟疫之邪自上受。蓋當人身中炭濁充斥。熱度亢進。血熱內壅。散溫機能失職之際。身中之調節與抵抗。藉肺臟之咳嗽。氣促。以力求生理上之恢復。葉氏見之。疑爲上受。是誠非也。諸家指責。允稱卓識。余故曰。上受之邪。則爲瘟疫。指爲溫病。則非也。若談溫而言上受。則理論更不可通。雷少逸之溫瘟不同辨。可以明矣。余嘗草有寒溫瘟痧辨。以求四者之明白精詳。不致含混。惟望醫林巨子。辨其謬。正其誤。庶能理論通過。事實行到則善矣。

問桂枝湯與桂枝加芍藥湯二方藥味相同。惟芍藥之分量不同。似芍藥之關係甚大。試比例詳而言之。聶士成

藥無善惡。對症則良。方無定法。準病以施。非其病而用其藥。參苓卽是毒物。是其

病而用其藥。鳩砒亦爲仙丹。藥物之用如此。處方之法亦然。有斯病則用斯藥。無斯病則去斯品。出入加減。要不外隨病情之變化而已。夫桂枝湯者。和營衛。開肌腠之藥也。去芍藥。則爲治太陽病誤下。脈促胸滿之要方。加芍藥。則爲治太陽病誤下。腹滿時痛之主劑。是則芍藥一味之去取。關係誠非淺鮮。芍藥氣平味苦。其性屬陰。病之屬陰邪者。去之。以免助紂爲虐。故于太陽病誤下。因陽虛陰逆。以脈促胸滿者。去之也。病之屬陽邪者。加之以殺其勢。故于太陽病誤下。因標陽內陷。以致腹滿時痛者。加之也。由是以觀。則芍藥之關係雖大。寔由病情之變化使然。若舍病而言藥。則藥無所謂功用矣。

第五十四期 星期徵稿選刊

一五六

中華民國十九年三月三十日出版

編 輯 兼 發 行 所 實 信

山西太原省城精營東二道街北首門牌第一號
中 醫 改 進 研 究 會

進 取 愛 羣

注 意 一

本雜誌每兩月一冊全年六冊如承訂閱請寄現款郵票代價九五折扣以四分以下者為限但郵票必須間以蠟紙如無蠟紙致不能揭開者不收

表 零 售	價 目	
	半 年	全 年
一 冊	三 冊	六 冊
大洋一角五	大洋四角	大洋八角
費郵	費郵	費郵
一分半	四分半	九分

注 意 二

本雜誌為提倡醫藥學起見凡有著名醫家及經驗良好藥品願登廣告者列表於下

目 價	廣 告		價 目
	半 頁	全 頁	
四 分 之 一	大 洋 二 元	大 洋 四 元	兩 月 一 期
大 洋 一 元	大 洋 五 元	大 洋 十 元	半 年 三 期
大 洋 二 元	大 洋 八 元	大 洋 十 八 元	全 年 六 期