

大德重校聖濟總錄卷第六十一

黃病門

黃汗

三十六黃

胸痹門

胸痺

胸痺噎塞

胸痹心下堅痞急

胸痺短氣

胸痛



黃病門

黃汗

論曰黃汗者汗出如藥汁沾衣黃色故謂之黃汗由脾胃有濕瘀熱伏留熏發肌肉散而為汗其證使人身體虛浮骨節疼痛發熱汗出而不渴者是也

治黃汗身體腫發熱汗出而不渴狀如風水汗沾衣色黃如藥汁脉自沉此由汗出水入汗孔水從外入而得之黃者苦酒湯方

黃者兩 剉伍

芍藥

桂去麤皮
各參兩

右三味剉如麻豆大每服五錢匕苦酒一盞半同煎

取七分去滓溫服服之當心煩苦酒阻故也

治黃汗兩脛冷又從腰以上汗出腰膈弛痛如蟲行皮中不能食身疼重煩躁小便不利者名曰黃汗桂枝加

黃耆湯方

桂主

芍藥各

甘草

黃耆兩

右四味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半

分切大棗二枚擘破同煎取七分去滓溫服覆取微汗須臾不汗者食稀熱粥以助湯力

治黃汗身腫發熱汗出而不渴狀如風水汗出著衣皆

黃吳藍湯方

吳藍人

芍藥

麥門冬

又桑根白皮剉

防已

白鮮皮

去粗梔子

各壹兩半

右七味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至八分去

滓空心溫服未効再服

治黃汗身體重汗出不渴汗沾衣黃如藥染黃者湯方

黃耆

赤芍藥

茵陳蒿

石黃

兩

麥門冬

各壹兩

芍藥

右六味剉如麻豆每服半兩水一盞半入竹葉十四

片煎至八分去滓溫服日四五服

治黃汗身體熱不退大小便不利茵陳蒿湯方

茵陳蒿

赤芍藥

甘草

木通

赤茯苓

黃耆

辛大黃

右七味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分

去滓溫服如人行十里再服以大小便通利為度

又方

梔子人

栝樓

苦參

右三味搗羅為末醋漬雞子全用二枚丸如栝桐子

次每服三十九溫水下日四五服

治黃汗汗出如藥汁沾衣身體虛浮蔓菁子散方

蔓菁子

右一味搗羅為散每服二錢匕井華水調下空心食

前日三服

三十

論曰黃病有三十六種所載名數雖同而證候各異皆

非黃疸之比求之於經無所稽考然此病中原之人未

曾識惟東南方往往有之其狀與熱病相似俚俗能辨

之先看其口中血脉即知是黃乃施點烙鍼灸多致瘡

安者大抵東南之域其地濕其氣蒸濕熱相蒸易成瘴
毒人感其邪有此黃病瘵不及時則傷害至速灸烙防
治不可緩也

論曰心黃第二十六

病人面赤口張氣喘多驚饒睡手脚煩疼舌上瘡生心
下急悶不欲飲食舌縮口乾七八日內必發狂走卽是
心黃先烙上管穴次烙關元及灸寸八壯若不差再灸
七壯次烙背心下廉及天窻如不差者宜服此胡湯方

此胡湯法枳殼法升麻法

大黃連去須各麻黃去根節甘草炙

病人知母切知母切梔子人各參黑土參黃

右八味麻搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後溫服日三後飲少熱粥以助藥力汗出爲度

同肝黃第三去華對人輪了論中合對白食前影

病人齒黃目如丹赤口燥熱渴氣力虛劣身體青黃卽

是肝黃眼中血出氣息急者不堪醫先灸肝俞次烙心

俞及上顛灸下廉次烙臍下三寸次烙中脘陽明二穴

若不差灸天窻及心俞各百壯又不差卽作土漿服之

又不差宜服知母湯及灸烙百會土漿方

人糞中用新汲水參升調人地黃代合

青膏汁壹合如無汁乾者搗末貳錢匕生薑汁合

右三味和勻頓服不拘時白會土漿衣

治肝黃知母湯方

知母焙半兩 芫胡去苗三升六 茵陳蒿割四二穴

甘草炙對 常山炒 龍甲去各參分

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入豉一百粒

同煎至七分去滓投入鍊了豬脂半合攪勻食前溫

服吐利為度

本脾黃第三治黃疸

病人兩頰生青脉起目黃齒斷皆青脣黑生瘡通身黃

色鼻中煤生心腹脹滿不下飲食大便不通即是脾黃

先烙頰上青脉次烙脾俞及胃脘陰都穴不差灸脾俞

百壯宜服豬苓湯方

豬苓去黑皮 黃芩去黑心 大黃剉

梔子人 朴消各壹兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓空心溫服

治脾黃脹滿氣衝胸膈大腸不通宜用鹽蜜煎方

鹽搗末半兩 蜜貳合 皂莢搗末壹分

右三味先將鹽入銚子內次下蜜皂莢末慢火煎可

丸候冷丸如棗核大以膩粉裹為衣內下部中良久大便通利

肺黃第四

病人口乾舌縮目赤鼻血出先烙足心次烙心俞百會天窻裏廉肺俞丹田等穴若不差即灸肺俞期門氣海穴百壯若煩渴欲得飲水及大便不利宜服黃消湯方

大黃炒

消石碎各半兩

右二味和勻用水二盞煎至一盞去滓空心分溫二服

腎黃第五

病人脚冷面目俱青身上冷臍下結鞭氣急衝心先烙腎俞次烙期門氣海足陽明兩手心天窻百會等穴若不差灸氣海期門下廉腎俞百壯候之如語聲重呼吸勻即堪醫若氣連呼三聲吸氣不入者不堪醫也即宜灸兩乳下三七壯不差宜服雞參飲方六更灸二小指

雞子去殼壹枚

人參壹兩

蜜壹合

生薑汁合半

朴消

壹分與雞子同研勻

右五味先將人參薑蜜用水一升煎至七合去滓入雞子朴消攪和更煎五七沸空心頓服慈心土治病人手足拘急眼臥艱難芸薑飲方

芸薹子

高苴子各壹兩

右二味同研如泥入新汲水一盞攪和後以生絹濾取汁頓服之

鬼黃第六

病人汗不出漸加困重愒氣心脹脣黑徧身黃妄見鬼物道得古人名字此是鬼黃宜烙中脘穴更灸二七壯次烙背心及灸上顛一七壯又烙心俞肝俞腎俞如差即徧身赤色汗流如雨喘氣調勻此為可治如身體青脉息漸微胃脉絕者此不堪治也如無此候宜服龍齒湯方

龍齒

去心

麥門冬

去心

野人參

各壹兩

各壹兩

遠志

去心

甘草

炙

壹分

右五味羸搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後溫服

疔黃第七

病人向明臥多愛索鞋擬起身體全冷肉色蒼黑睡中啼泣或狂言妄語此是疔黃先烙手心次烙第三指間又灸十七壯次烙氣海上脘人中神庭等穴不差灸背心上廉穴百壯候之如心腫脚腫驚回窺人者不堪醫也如無此候宜服扶神湯方

茯神

木去

酸棗人

炒

人參

各壹兩

附子

炮裂去臍皮半兩

乾薑

炮壹分

入香不碎

右五味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至七

分去滓食前溫服

血黃第八

病人三日鼻中出血大小便亦下血心間煩悶腹中有

塊痛如蟲咬吐逆喘麤此是血黃先烙丹田穴次烙後

心上顙如不差者宜服續隨湯方

續隨子

拾肆粒細研

右一味用水一盞煎至六分去滓放冷頓服當吐瀉

愈看鼻衄及下血其血鮮者堪醫如齒及鼻黑髮直

者死

冷血黃頭悶心中痛結塊心煩吐逆茅根湯方

生茅根

剉壹握

生地黄

拍碎壹兩

刺薊

剉半兩

右三味以水三盞煎至一盞半去滓食後分溫二服

大黃第九

病人面青掩口惡聞人聲或似顛狂此是人黃急宜灸

烙先烙承漿穴次烙第三椎次烙下腕次烙期門不差

灸肺俞後心百壯若脉息動止當共鬼語此不堪治若

無此證宜服赤箭散方

赤箭壹兩

天竺黃兩半

牛黃分壹

鉛白霜錢壹

右四味各搗研為散和勻每服一錢匕食後煎金銀湯調下

髓黃第十

病人四肢疼痛無力好眠冷地身體徧黃次便青綠色起脣齒俱白眼帶微腫宜灸下廉及兩手陽明穴百會等每處各三五十壯若身體赤色宜服黃者散方

黃者剉

黃連去須

甘草生剉各半兩

黃芩去黑心壹兩

右四味搗羅為散每服三錢匕粳米泔調下不拘時

癘黃十一

病人色青次却色赤或經下後頭髮自落喫食漸少吐逆心煩睡則夢與鬼交氣力虛乏或食物難消宜灸臍下百壯得力者肉色漸變如是小便赤澁鼻中煤生齒焦眼黑不堪醫也若無此候宜服桑螵蛸湯方

更參桑螵蛸剉 苦參剉 白朮剉 天麻剉 黃耆剉 宜用知鼻

赤茯苓去黑皮 人參各壹兩 甘草炙半兩 杏仁剉 杏仁剉

右六味搗篩每服五錢匕水調盡半入生薑一棗

大拍碎同煎至七分去滓食前溫服

大急黃十二至十八去毒會兩為最

病人心腹急悶煩躁身熱五日之間便發狂走體如金色起臥不安此是急黃先烙百會次烙下廉次烙肝俞更灸三十壯不差灸神庭天窻後心百壯次宜用吹鼻方煎黑不狀醫也其無此則宜煎桑葉煎飲之

瓜帶染枝搗末亂髮灰燒小頭水煎鼻中熱去

右二味同研令勻每用少許吹鼻中或煎飲宜灸神

又方白青六味也赤地羅子煎煎藥自蒸與食漸少也

惡實壹兩黃芩去黑心半兩

右二味搗篩用水一盞半煎至一盞去滓入馬通

汁一合攪勻更煎一兩沸食前分溫三服若是齒如熟豆色憊氣心頭鞭者不可活也

氣黃十三兩水煎服

病人初得先從兩脚黃腫大小便難心中戰悸面目虛黃不能食宜服葫蘆飲方大飲土油黃門二穴灸二十

苦葫蘆多不拘

右一味以水研服少許須臾吐差

癩黃十四

病人身如金色不多言語四肢無力好眠卧口吐黏涎者宜服茵陳湯方

茵陳蒿

白鮮皮 各壹兩

石二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓
食前溫服日三

白黃十五

病人顏色乾枯目下赤口乾舌縮心中恍惚四肢煩重
此是白黃先烙舌上青脉次烙上脘臍門二穴灸二十
壯不差灸百會氣海百壯及宜服地黃當歸湯方日盡

地黃汁

伍合如無用生乾地黃
參兩水漬研汁代之 蜜合

當歸

細

白朮

細剉各壹兩

右四味先將當歸白朮用水二盞煎至一盞去滓下

煎地黃汁并蜜和勻分作三服相繼服盡若患人言語
錯亂者十死不治也

陰黃十六

病人寒熱并十指疼痛鼻中煤生此是陰黃先烙上脘
穴更灸二十壯次烙氣海下脘內乳等穴不差灸氣海
天窻百壯更宜服麻黃梔子湯若人中反者不可治也

麻黃

去根節
半兩

梔子

半兩

甘草

一分

右三味各細剉用水二盞煎至一盞去滓食後分溫

服

麻黃十七

病人體上黃綠色胸中氣滿或嘔不下飲食此是膽黃
先烙膽俞下脘穴次烙手足心并十指次烙心俞百會
神庭風門穴不差灸膽俞并後心百壯及宜服黃芩湯

方

天_{黃芩} 去黑心 芍藥 壹兩 人中_{黃芩} 壹兩 四_{黃芩} 壹兩

穴右二味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後溫服日三

驚黃十八

病人面青身黃心中煩亂起卧不安脣裏瘡生目視眈
眈此是驚黃先烙上脘次烙風池心俞下廉穴如不差

灸後心兩傍一寸半各二十壯宜服牡荊湯方

牡荊子

白木 各半

芒消 壹分 餅 成下

右三味二味細剉用水二盞煎至一盞去滓下芒消
攪勻食後溫服如病人望之色青近之色白身體涼
冷言語帶邪氣急衝心汗出不多此是死候也

風黃十九

病人愛笑腰背急手足強口乾舌上生瘡三部脉亂此
是風黃先烙肺俞次烙第三椎風門兩傍相去各三寸
又烙手心及足陽明氣海陰都百會下廉腎俞不差更
灸神庭天窻氣海後心下百壯及服麻黃湯方

麻黃

去根節

葛根

剉

白朮

各壹

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後溫服

走精黃二十

病人昏昏饒睡四肢疼痛面目俱黃舌上紫色甚則舌面拆裂及加黑色此是走精黃宜用藥烙之

牛脂兩壹

豉兩

右二味煎過牛脂以綿裹作包子於舌上烙去一重黑皮濃煎豉湯一盞飲之不差者灸上顛穴百會穴後心氣海百壯若爪甲黑者不可治若得睡喘息勻

變者生... 酒黃二十... 病人五藏積熱面赤言語帶邪昏沉錯亂目中黃色此

是酒黃灸後心百會三下廉處百壯若悞氣上喘脉如

屋漏此候不治如只大便下血宜服澤瀉散方

澤瀉

黃芩去黑心

白鮮皮

豈若茵陳蒿... 阿膠炒燥... 甘草炙剉

宜右六味搗羅為散每服一錢半匕空心米飲調下日

... 難黃二十一... 向... 不... 日... 日...

病人面目俱青好向暗處眠臥不欲見明手皁衣服狀如鬼神望見黃花生者此是難黃六日堪醫七日難治宜先烙大椎次烙風府及手心更灸後心天憲百壯即差若脚冷腰疼搐掣左足眼睛忽陷不可治也如無此狀宜服地黃飲方

聖藥地黃

半斤肥嫩者洗淨碎

黃雌雞

壹隻去皮毛腸胃細剉

是右三味用水一斗煮至三升去滓一日內徐徐服盡

詩人蚰蜒黃

二十三日

病人身體涼冷舌上黑脉及兩頰有青脉起目黃時時變異腦如鍼刺頭旋欲倒者是蚰蜒黃宜先烙青脉令

斷次烙舌上黑脉及舌根兩傍更烙章門百會不差即灸氣海下廉百壯宜服驢乳方

右宜取驢乳一二升頓服若舌上更有黑黃色鼻乾不得睡面帶青色不可治也

火黃二十四

病人先體熱身赤午後却涼徧身有赤點起宜烙脚心背心手心百會下廉即差如生黑點不可療也如無黑點宜服紫草湯方

紫草

苗

吳藍

各壹兩

木香

黃連

去須各半兩

右四味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後溫服

走馬黃二十五

病人眼黃面赤狂言罵詈努目高聲起卧不安發即狂走先烙髮際次烙風門上腕及關元又烙下廉并兩手足心即差更宜服竹葉湯方

竹葉

細切青厘

小麥貳

生薑兩

白馬通

新者絞取汁青合湯成下

右四味用水三盞先煮麥取二盞去麥下竹葉生薑煎至一盞半去滓入白馬通汁一合和勻分溫二服

房黃二十六

病人身體沉重狀似著熱不得睡臥小便黃色眼赤如朱心下塊起狀若癡人如此證候十無一生先烙上腕及心俞次烙舌上灸關元下廉百壯宜服燒衣灰方
右取婦人內衣燒灰細研每服二錢匕溫酒調下

黑黃二十七

病人身面黑黃口脣兩頰上有青脉起出於口角者中無一生亦有脉息沉細喫食不妨身如土色宜先烙口中黑脉次烙百會穴又烙玉泉足陽明穴章門心俞下廉不差宜服後鬼白汁方

生鬼白兩

右一味搗絞取汁一小盞服之即差如無生鬼白即用乾者搗羅為末每服二錢匕新汲水調下不拘時

厭黃二十八

病人四肢煩疼手足無力吐逆不下飲食漸漸瘦弱先烙玉泉及灸三十壯次烙口中黑脉并曲池灸裏廉後心百壯如未差宜服大黃湯方

大黃剉

木香

枳殼去殼炒

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食前溫服

水黃二十九

水黃之狀面目俱青狂言妄語語聲不出先烙關元次烙下廉百會髮際不差灸後心氣海百壯及宜服大黃

甘草湯方

大黃剉

甘草炙各半兩

右二味剉如麻豆大分為二服每服水一盞煎至六分去滓食後溫服

又方

乾木瓜壹兩

芥子合

陳橘皮湯浸去白切炒半兩

右三味剉如麻豆大分作三服每服水一盞半煎至

八分去滓食前溫服

瓜黃三十

瓜黃之病口苦舌乾身體急強面目俱黃行履不得言語狂亂四肢疼痛發即便走宜先烙後心次烙氣海足陽明及烙百會灸五心穴各二七壯如未差宜服瓜帶散方

瓜帶壹兩

右一味搗羅為細末每服半錢匕新汲水調下不拘時以吐利為度
腸黃三十一

治腸黃心中悶絕腸內疼痛狀如刀刺先烙大腸俞次

烙小腸俞次烙氣海如未差宜服四味黃芩湯方

黃芩去黑心

當歸各壹兩

黑豆半合

茅根半兩

右四味各細剉分作三服每服水一盞半煎至八分去滓食前溫服日三

犢黃三十二

治犢黃舌兩邊先從後起次生向前兩傍有赤脉狀如蚯蚓宜急烙斷毒氣貫舌其狀紫色次灸兩口角及人中并承漿各二十壯

氣黃二十三

治氣黃先從脚膝浮腫大小便難心寒顫掉宜烙百會及兩口角次灸中脘穴二七壯此黃亦令病人多笑七日堪治八日病過不可治也

豬黃二十四

治豬黃口靨沫從口角出九日可治十日疾勢已過宜急灸兩牙關二七壯次灸承漿二七壯

土黃二十五

治土黃身體冷面色青宜灸太衝及百會後心鬢際百壯若面目及十指俱青不治也

蝦蟆黃三十六

治蝦蟆黃舌上青脉起七日盛九日病過急烙大椎即効此病晝夜不睡宜服豉梔湯方

豉合

梔子人柴枚

右二味麤搗篩用水一盞半煎至七分去滓頓服其

胸痺統論

論曰虛極之人為寒邪所客氣上奔迫痺而不通故為胸痺其證堅滿痞急或胸中幅幅如噎塞或胸背皆痛或胸滿短氣欬唾引痛煩悶白汗出或心痛徹背或肌痺皮痛是皆閉塞而不通也夫脉當取太過與不及陽

微陰弦則胸痺而痛又曰胸痺之病喘息欬唾背痛短氣寸口脉沉而遲關上小緊數是也

胸痹

論曰胸痹之病其脉陽微而陰弦陽虛則知在上焦陰弦故令胸痺心痛古方用理中湯取緩其中氣則可也然背者胸之府或築或悸或渴或腹痛或寒或腹滿其候不一治當隨宜加損也

治胸痺理中湯方

人參

甘草炙

白朮

乾薑炮各壹兩半

右四味麤搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓溫服空心日午臨卧各一若築者此為腎氣動也去朮加桂二兩臍上築吐多者去朮加生薑一兩半下多者復用朮悸者加伏苓一兩渴者加朮二兩一分腹中痛者加人參二兩一分寒者加乾薑二兩一分腹滿者去朮加附子一枚服湯後食久以稀粥投之衣覆取微汗

治胸痺栝樓湯方

栝樓實

壹枚并瓢用

枳實

去瓤炒伍枚

半夏

湯洗去滑肆兩

右三味剉如麻豆每服五錢匕白朮漿二盞薤白一

握切生薑一分拍破同煎至一盞去滓溫服空心日
午臨臥各一

治胸痹枳實湯方

枳實

去瓢麩
炒半兩

栝樓實

壹枚并
剉用

厚朴

去蘊皮生薑
汁炙參兩

右三味剉如麻豆每服五錢匕水二盞煎至一盞去
滓溫服空心日晚各一

治胸痹枳實湯方

枳實

去瓢麩
炒肆枚

厚朴

去蘊皮生薑
汁炙參兩

右二味麤搗篩每服五錢匕水二盞入薤白一握切
煎至一盞去滓溫服空心日晚各一

治胸痹麝香散方

麝香

研壹
兩

牛黃

研半
兩

犀角

鎊壹
分

右三味搗研爲散每服二錢匕溫酒調下空心日午
臨臥各一

治胸痺心下堅痞急痛徹背短氣煩悶白汗出半夏湯

方

半夏

湯洗柒徧切
焙貳兩中

栝樓實

壹
枚

薤白

切貳
斤

右三味剉如麻豆每服五錢匕水二盞入生薑一分
切碎煎至一盞去滓溫服日三

又方

枳殼去瓢炒
參拾枚

右一味搗羅為散食前米飲調下方寸匕日三夜一

又方加桂等分

治胸痺切痛梔子湯方

梔子人兩附子炮裂去皮
臍壹兩

右二味咬咀每服三錢匕水一盞薤白三寸同煎至

五分去滓溫服

胸痺噎塞

論曰胸痺之病以胸中痞結不通故有噎塞之證蓋寒

氣客於五藏六府因虛而發上衝胸間則氣痹而不通

甚則為噎塞也

治心胸氣悶喉中噎塞昆布丸方一盞煎至一盞去滓

昆布洗去鹹 赤茯苓去黑 枳實炒

木香半生 訶梨勒煨取皮 甘草炙

乾薑炮各 檳榔半生半 藜蘆炒

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸溫酒下

治胸痺連心氣悶喉中塞滿赤茯苓湯方

赤茯苓去黑 反細辛去苗葉 橘皮湯浸去白

枳殼

去瓢麩壹兩

栝樓實

壹枚

桂

去麩皮壹分

右六味麩搗篩每服三錢匕水一盞半生薑一分拍

破同煎至七分去滓空心服如人行五六里再服

治胸痺連心氣悶喉中塞不通陳橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白焙壹分

赤茯苓

去黑皮

枳殼

去瓢麩炒各半兩

栝樓實

壹枚去皮

桂皮

甘草

壹分

右六味麩搗篩每服五錢匕水二盞煎至一盞去滓

空心溫服日午臨臥各一

治胸滿氣噎通氣湯方

半夏

湯洗去滑柒福蠟肆兩

桂

去麩皮兩半

吳茱萸

湯洗去涎柒乾炒半兩

右三味麩搗篩每服五錢匕水二盞入生薑一分拍

破同煎至七分去滓溫服空心臨臥各一盞去滓

治胸中幅幅如滿噎塞唾沫橘皮枳實湯方

陳橘皮

湯浸去白壹兩

枳實

燒炒壹兩半

右三味麩搗篩每服五錢匕水二盞入生薑一分拍

破同煎至一盞去滓溫服日三空心日午臨臥各一

治胸中氣塞茯苓湯方

赤茯苓

去黑皮壹兩

甘草

壹兩

杏人伍拾枚湯浸去

皮尖雙火炒

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服空心日午臨臥各一錢

治心胸噎塞壅悶食不下半夏丸方善人主黃一食併

半夏湯洗柒

宿去滑桔梗各貳

桂去蘊皮

壹兩

木香

枳殼去麩炒

壹兩

右五味搗羅爲末生薑汁煮糊和泥如梧桐子大每

服二十九木瓜湯下五錢

治心胸噎塞壅悶食不下昆布湯方

昆布湯洗去

鹹焙桔梗剉

半夏湯洗柒

宿去滑

枇杷葉去毛

枳殼去麩炒

桂去蘊皮

壹兩

人參各參

赤茯苓去皮

木香壹兩

射干各半

右一十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑五片煎

取七分去滓溫服不拘時候

胸痺心下堅痞急

論曰體虛之人寒氣客之氣結在胸鬱而不散故爲胸

痺其證心下堅滿痞急甚者疔痛搶心如刺手不得犯

治之稍緩便致危殆不可忽也

治胸痺心下堅痞枳實湯方

枳實肆枚 剉炒

桂壹兩 去麤皮

厚朴去麤皮生薑汁炙肆兩

栝樓實壹枚 去皮煨

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半薤白五寸切

煎至八分去滓溫服空心日午臨臥各一劑

治心胸氣急刺痛不可俛仰氣促欬唾不下食陳橘湯

方

陳橘皮湯浸去白焙

芍藥

當歸切各半兩

木香壹分

桔梗炒叁分

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑五片煎

至八分去滓溫服

治胸痺心下氣堅痞刺不可俛仰氣促欬唾引痛不能

食枳實桔梗湯方

枳實肆枚 剉炒

陳橘皮湯浸去白焙

桔梗炒各半兩

甘草壹分

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大

拍破薤白五寸切煎至八分去滓溫服

治胸痺痞急薤苳散方

薤苳人

拾伍粒

附子

大者伍枚炮裂去皮臍

右二味搗羅為散每服半錢匕溫酒調下空心日午

臨臥各一服未差稍增之

治胸中隱然而痛桂薑丸方

桂去麤皮

乾薑炮

烏頭炮裂去皮

人參兩

細辛去苗葉

山茱萸

貝母去心炒

右七味搗羅為末鍊蜜丸如小豆大每服二十九溫

酒下稍加之粥飲亦得

治寒氣客在胸中鬱而不散堅滿痞急病名胸痺四溫

散方

附子炮裂去皮臍

蓬莪茂煨剉各壹兩

胡椒

枳實熬炒各半兩

右四味搗羅為散每服三錢七熱酒調下

治胸痺心下堅痞五味丸方

桂去麤皮

訶梨勒皮

檳榔剉各壹兩

附子炮裂去皮臍

乾薑炮各參分

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九

溫酒或薑湯下

治胸痺心下堅痞豆蔻湯方

白豆蔻去皮

桂去麤皮

木香

人參各半兩

陳麴

京三稜煨剉各壹兩

陳橘皮湯浸去白

大麥蘗炒各參分

乾薑炮

甘草炙劉各

右六十味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片鹽

少許煎至七分去滓食前溫服

木香

治寒氣結為胸痺心下堅痞木香丸方

木香

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘皮

湯浸去白焙

羌活

去蘆

半夏

湯洗米泔水浸

檳榔

劉

桔梗

去蘆

枳實

製炒黃

厚朴

去蘆皮

白朮

甘草

各半兩

炙黃

右一十味搗羅為細末鍊蜜為丸如梧桐子大每

服生薑湯下三十九日三

胸痺短氣

論曰胸痺短氣者由藏腑虛弱陰陽不和風冷邪氣攻注胸中其脉太過與不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者極虛故也陽微主胸痹陰弦主腹痛又肺主於氣肺虛則人短氣平人無寒熱短氣若不足以息者體實也實則氣盛盛則氣逆逆則不通故亦短氣凡脉沉遲小緊者皆是胸痺短氣候也

治上氣心胸滿不下食桑白皮散方

桑根白皮

壹兩大腹皮

壹兩陳皮

壹兩湯浸

甘草

參分桂心

赤茯苓

壹兩去

水通壹兩

紫蘇子貳兩
微炒

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞生薑一分拍破
同煎至一盞去滓溫服空心日午臨臥各一

治胸痺短氣半夏湯方

半夏

湯洗柒飯

赤茯苓去黑

人參

前胡

去苗各

甘草炙剉

桂去藥皮
參分

芫胡去苗

右七味麤搗篩每服五錢匕水二盞生薑五片棗三
枚擘破同煎至一盞去滓溫服不拘時候

治胸中氣滿塞短氣前胡湯方

前胡

去苗壹兩

赤茯苓去黑皮

甘草炙剉

杏仁

貳柒枚湯浸

去頭

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

空心溫服

治胸痺連背痛短氣細辛散方

細辛

去苗壹兩

熟乾地黄兩半

甘草炙剉壹兩

桂

去藥皮

赤茯苓去黑皮

枳實炒

白朮

剉壹兩

乾薑炮壹兩

栝樓實去皮壹兩

右九味搗羅爲散每服二錢匕溫酒調下空心日午

臨臥各一

治胸痺胸脇短氣妨悶不下食木香丸方

木香兩 蕪荑參 青橘皮湯浸去白

萊菔子微炒 訶梨勒微煨去核

麴微炒 大麥蘖炒

右七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸生薑湯下空心日晚各一

治胸痺短氣橘皮湯方

陳橘皮湯浸去白 枳實炙

右二味剉如麻豆大每服五錢七水一盞半入生薑

五片煎至八分去滓溫服日再

胸膈痛

論曰胸痛者胸痺痛之類也此由體虛挾風又遇寒氣

加之則胸膈兩乳間刺痛甚則引背胛或徹背脊欬唾

引痛是也

治胸膈痛桔梗黃耆湯方

桔梗炒 黃耆細 沉香剉

當歸切焙各 芎藭 人參

甘草炙 紫蘇葉各

右八味麤搗篩每服三錢七水一盞煎至七分去滓

溫服不計時

治兩肋連心及肩痛乍發乍止紫苑丸方

紫苑去土

桔梗炒壹兩

木香貳兩

當歸焙乾壹兩

郁李人湯浸去皮尖雙入炒

桂去麤皮各壹兩半

白朮兩

右七味搗羅爲細末鍊蜜和丸梧桐子大每服空心
饋榔湯下二十九日晚再服老幼臨時加減

治胸痛枳實散方

枳實去麤皮兩

桂去麤皮壹兩

右二味搗羅爲細散每服二錢匕溫酒調下空心日

午臨臥各一服

治胸痛白朮枳實散方

枳實去麤皮炒

陳麩微炒

白朮各壹兩

右三味搗羅爲細散每服二錢匕溫酒調下空心日

午臨臥各一服

治胸痛柏實散方

柏實

桂去麤皮對等分

右二味搗羅爲細散每服二錢匕米飲調下日三服

治卒苦煩攻胸痛薏苡根飲方

薏苡根

右一味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至

一盞去滓溫服

大德重校聖濟總錄卷第六十一

一盞去滓溫服

白木香

一盞去滓溫服

一盞去滓溫服

一盞去滓溫服

白木香

大德重校聖濟總錄卷第六十一

大德重校聖濟總錄卷第六十二

膈氣門

五種膈氣

膈氣咽喉噎塞

膈氣嘔逆不下食

膈氣痰結

膈氣宿食不消

膈氣統論

論曰胸中者氣之府呼吸升降之道也陰陽升降順理則氣道通調胸中乃治善怒寒熱不調則氣聚於胸而爲膈氣夫膈氣有五憂膈悲膈氣膈寒膈熱膈是也憂膈之病胸中氣結煩悶津液不通飲食不下羸瘦無力悲膈之病心下苦實滿噫輒醋心食不消心下否澀積結在於胃中大小便不利氣膈之病胸脇逆滿咽塞不通噫聞食臭寒膈之病心腹脹滿欬逆膈上苦冷臍腹雷鳴食不生肌熱膈之病藏有熱氣五心中熱口爛生瘡骨煩四肢重唇口乾燥身體頭面手足或熱腰背疼

痛胸痺引背水穀不消不能多食羸瘦少氣此五膈爲病之證也蓋人之和氣憂思恚怒寒熱食飲悉能傷之致陰陽不和府藏生病氣否於胸府之間故曰膈氣諸方之論不一又有十膈證各不同大抵其發之原不越於此也

五種膈氣

論曰人之胸膈升降出入無所滯礙命曰平人若寒溫失節憂恚不時飲食乖宜思慮不已則陰陽阻隔胸脘否塞故名膈氣曰憂曰恚曰氣曰寒曰熱五種雖殊其爲膈病則一

治陰陽氣不升降否氣膈氣心痛腹痛咽喉噎悶氣道不勻嘔吐痰沫飲食不下大便秘利不定或裏急後重腹痛不可忍此藥養氣消痰溫中散滯緩氣九方

木香兩

桂枝兩

人參兩

白朮兩

吳茱萸兩

厚朴兩

訶梨勒皮兩

附子兩

右九味搗羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每服三十

丸溫熱水下不計時候

治五膈氣胸中煩滿痞塞不通心腹虛脹心下結實飲

食不下訶梨勒湯方

訶梨勒煨去核 木香各壹

人參

青橘皮湯浸去白焙各半兩

厚朴去鹽皮生薑汁炙壹兩

沉香剉

益智去

桂去鹽皮

檳榔剉

枇杷葉炙去毛

鞞澄茄

赤茯苓去黑皮

高良薑

白豆蔻去皮

白木各半兩

前胡去蘆頭

甘草炙剉

右一十七味麻搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三

片同煎至七分去滓熱服不以時候

治男子婦人五種膈氣及一切氣不思飲食建中丸方

白豆蔻去皮壹兩

胡椒分壹

藿香子炒

高良薑各壹

甘草炙

陳橘皮湯浸去白焙各壹兩

蒟醬

人參

紅豆蔻去皮

乾薑炮

芎藭

藿香葉各半兩

右一十二味搗羅爲末鍊蜜和丸如雞頭大每服二

丸溫酒或生薑湯嚥下不計時候

治五種膈氣豆蔻散方

肉豆蔻去皮

木香

厚朴去鹽皮

人參

赤茯苓去黑皮

桂去鹽皮

甘草炙

青橘皮湯浸去白焙各壹兩

訶梨勒去核 檳榔剉

右一十味搗羅為散每服二錢匕如茶點服若入薑棗同煎亦佳能治氣補勞通血脈益脾胃治五種膈氣通膈散方

枳殼去炒

桂去麩

甘草剉

陳麴炒

訶梨勒皮

白朮

陳橘皮

湯浸去白

赤茯苓去黑皮

人參

乾薑炮

京三稜剉

草豆蔻皮

檳榔半生

五味子炒

厚朴去麩皮生薑汁炙

半夏

湯洗了用生薑同搗如泥却攤在新瓦上用文武火焙令黃色

木香

郁李人

湯浸去皮麩炒黃各壹兩

右一十八味搗羅為散每服三錢匕入鹽少許如茶

點服不計時候

治霍亂吐瀉氣逆結胸膈氣刺痛不思飲食備急沉香散方

沉香錯

丁香半生

乾薑炮

京三稜剉

蓬莪茂煨剉各

藿香用葉

木香

肉豆蔻去皮

桂去麩

人參

赤茯苓去黑皮

高良薑

胡椒

甘草炮各壹分

右一十四味搗羅為散瓷合盛每服二錢匕入鹽少

許如茶點服不計時候

治五膈氣痞心胸噎塞漸致羸瘦五膈散方

人參

赤茯苓去黑皮

厚朴去麩皮薑汁炙

枳殼去麩炒

桂去麩皮

甘草炙

陳麴炒

訶梨勒皮

白朮

陳橘皮湯浸去白焙

乾薑炮

京三稜煨剉各壹兩

檳榔剉

木香各壹分

右一十四味搗羅爲散每服二錢匕入鹽點服如脾氣腹脹心胸滿悶每服三錢用水一盞入生薑一塊切棗二枚擘破鹽少許同煎至八分不計時候和滓

熱服

治五膈氣痞悶腹脹滿豆蔻丸方青餅又白餅去

肉豆蔻人

京三稜炮

蓬莪茂炮

青橘皮湯浸去白焙

陳橘皮湯浸去白焙

牽牛子肆兩半生半熟取末

檳榔剉

木香各半兩

兩

右九味搗羅爲末以棗肉和丸如梧桐子大每服二

十九食後生薑湯下

治五膈氣喘促腹脇脹滿胸膈不快疾逆惡心不思飲

食萊菔木香散方

萊服子兩

粟米壹兩

陳橘皮湯浸去白

巴豆

肥大者參拾枚去皮於瓦石器內與上思煎
香味同炒候藥焦黑色揀去巴豆不用

木香壹分

右五味搗羅為散用煮萊蕪湯調下二錢匕或以生

薑汁煮麩糊和丸如梧桐子大萊蕪湯下十五丸亦

得

治五種膈氣利胸膈散積滯消腹脹進飲食京三稜丸

方

京三稜

濕紙裏煨碎到

沉香各半兩

青橘皮

湯浸去白燂

籠甲

去裙襖醋炙

檳榔到各壹分

巴豆

伍枚去油為霜

右六味搗羅為末水漬白麩糊和丸如菜豆大每服

五丸食後溫熱水下

治五種膈氣胸腹脹悶不能飲食礪砂枳殼煎丸方

礪砂

無石者別研參分

枳殼

湯浸去瓤切作片焙乾取四兩

烏頭

炮裂去皮尖為末

大黃

生為末各壹兩同參味末一處拌勻用醋肆升銀器內慢

火熟成膏入後藥末

桂皮

蓬莪茂

剉

五靈脂

乾漆

炒煙

蓬莪茂

剉

當歸

切焙

芍藥

剉

牽牛子

炒取末

右一十一味除前膏外搗羅為末入礪砂等膏中於

臼內搗一千下和丸如梧桐子大每服二十丸生薑

湯下婦人血氣醋湯下不嚼不計時服二十次半薑

治一切膈氣妨悶不下食木香訶梨勒湯方善胃中飲

木香 訶梨勒核去 陳橘皮湯浸去白 焙各壹兩

五味子 半夏湯洗去沫 徧去 人參炒

桂去蟲 赤茯苓去黑 蘆根

枳殼去穢炒 各參分

右一十味剉如麻豆每服五錢七水一盞半入生薑

一棗大切煎取八分去滓溫服

治膈氣心腹痞滿全不思食草撥飲方

草撥 沉香剉 草豆蔻去大冷

青橘皮去白 丁香 桃人炒去皮尖

大腹剉 生薑切炒各壹兩 訶梨勒皮兩

甘草炙 枳殼去穢炒 各半兩

右一十一味蠶搏篩每服三錢七水一盞煎至七分

去滓溫服不拘時

治五膈氣噎滿悶不下食五膈丸方

白木炒 木香炮 訶梨勒炮去核

陳橘皮去白 焙 昆布洗去鹹水 桃人炒各參分 去皮尖 雙入

芡黃剉 桂去蟲 皮 半夏湯洗去 徧

檳榔剉 枳實去穢 炒 五味子各半 兩

琥珀研壹分

右一十二味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心生薑棗湯下

治膈氣紫金丹方

桂去蠟皮

訶梨勒慢去核壹兩昆布洗去鹹

桃人湯浸去皮尖雙炒各膏兩半

木香

琥珀研

陳橘皮去白焙各壹分

沉香

雞舌香各半 丹砂別研壹分

木瓜根對壹兩

右一十二味搗研爲末再同研勻鍊蜜和丸如櫻桃

大每服一丸含化嚥津或欲作小丸如梧桐子大每服二十九溫酒下

膈氣咽喉噎塞

論曰膈氣噎塞者由憂思過甚氣結不通肺胃虛弱氣留育膜則結滯於胸膈故升降不塞蓋喉嚨者氣之所以上下若氣塞不通則咽喉噎悶狀若梅核嚥納有妨故謂之膈氣咽喉噎塞也况肺氣上通於喉嚨胃脉外連於咽喉若使上下升降肺胃和平則陰陽調順膈氣自散矣

治諸膈氣心胸煩結噎塞不通飲食日減檳榔湯方

檳榔剉

訶梨勒皮炒

草澄茄

赤茯苓去黑皮

人參

青橘皮湯浸去白焙

甘草炙

沉香剉

麥蘗炒

厚朴去蘗皮生薑汁炙

京三稜炮

白朮等分

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片

大棗二枚擘煎取七分去滓溫服日三夜

治膈氣咽喉噎塞欬嗽上氣痰盛喘滿氣道否滯不得

升降乾嘔妙功丸方

鵬砂研抄末

丹砂研抄末

硃砂飛研抄末

硃砂飛研抄末

大巴豆霜抄末

桂末

益智人末

各等分

右六味拌和令勻用糯米粥和丸如麻子大每服一

丸或兩粒食後臨寢乾嘔

治膈氣咽塞憂結不散人參湯方

人參

赤茯苓去黑皮

白朮

桂皮去蘗

訶梨勒皮炒

京三稜剉

陳橘皮湯浸去白焙

枳殼去瓤炒

甘草炙

檳榔剉各兩

木香半兩

草豆蔻去皮半兩

右一十二味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓溫服日二夜

治諸膈氣冷熱不調喜怒無度胸中咽塞不思飲食或

憂思過甚不足之氣蘊積心臆日漸消瘦大腹湯方

犬腹皮

切

檳榔

剉

木通

剉

防已

青橘皮

湯浸去白焙

紫蘇莖葉

剉

桑根白皮

甘草

炙

枳殼

去穢炒

草豆蔻

去

丁香皮

大黃

剉

朱香

分

右一十三味廬掃每服三錢匕水一盞生薑二片

大棗一枚擘同煎七分去滓溫服日三夜一

治膈氣咽喉噎塞萬靈木香丸方

木香

分

附子

炮裂去皮

檳榔

剉

縮沙

去

乾薑

炮

桂皮

去

陳橘皮

湯浸去白焙

肉豆蔻

去殼

藿香子

炒各半兩

右九味搗羅爲末醋煮麩糊丸如梧桐子大丹砂爲

衣每服二十九生薑湯下茶酒亦得不計時候

治膈氣咽喉噎塞不下飲食丁香丸方

丁香

剉

木香

剉

檳榔

剉

青橘皮

去白醋浸半日控乾

京三稜

剉

芫花

醋浸壹宿控乾炒

五靈脂

剉

香墨

燒令煙盡候通赤放冷秤壹錢

右八味同搗羅爲末再羅過肥巴豆七粒去皮心膜

細研如膏塗於新瓦上出油令盡細研與前來藥末同研拌令極勻用水煮白麩糊和劑鞭輒得所九如大麻子伏令乾每服五九至七九生薑湯下不計時

治膈氣咽喉噎塞心煩嘔逆不進飲食人參九方

人參去黃白 薑去白 厚朴去鹽 蘇合生 批把葉去毛

不橫擲到各六分 半夏淡漿水煮參 枳殼碎半兩

有五味搗羅為末麩糊為丸如梧桐子大每服五十

丸生薑湯下不拘時服

治膈氣咽喉噎塞煩悶嘔吐心胸痞滿腹膨脹可思

飲食安息香煎丸方

安息香別研半兩 木香別研 沉香各壹兩

訶梨勒皮兩 桂去粗皮 白茯苓去黑皮

肉豆蔻人 縮砂人 芍藥

華澄茄 檀香子去皮 益智去皮 調劑食

五味子微炒 白豆蔻人 芎藭

當歸焙切 丁香皮剉 蓬莪茂剉

京三稜剉 莎草根去毛 檳榔剉各壹兩半

礞石別研半兩 阿魏豐分細研用白麩少許和作餅子炙令香熟

右二十三味除別研外搗羅為末再同研勻用蜜三

十兩鍊熟和爲丸如雞頭大每服一丸細嚼溫酒或
生薑鹽湯下不拘時

治膈氣噎塞不入飲食瀉氣散方

虎頭王字骨酥炙草撥燒

人參

厚朴去鹽皮生薑汁炙羚羊角屑

右五味等分搗羅爲散每服二錢匕溫水調臨臥食
後服

治膈氣噎塞脾胃虛冷瘦劣不下食京三稜丸方

京三稜炮

訶梨勒煨去核

木瓜焙

籠甲醋炙去穢爛

瑤瑁銹各參分

桃人湯浸去皮尖雙人炒

板實去穢炒

乾薑炮

白朮去鹽炙去皂

昆布湯浸去鹹焙

赤茯苓去黑皮

木香各半

右一十二味搗羅爲末陳麴糊和丸如梧桐子大每
服二十九煨生薑木瓜鹽湯下

治膈氣咽喉噎塞胸膈填滿不思飲食通氣湯方同前

半夏湯洗柒細去滑爲末生薑細研和半夏作餅曝乾各壹兩半

陳橘皮湯浸去白焙桂去腸皮各參分

右四味搗篩每服五錢匕水一盞入生薑五片
煎至八分去滓溫服

治膈氣噎塞不下飲食撞氣丸方

雌黃研

附子炮裂去

丹砂研

木香

寒水石研

入中白研各半兩

麝香研壹錢

右七味先以雌黃入銚子却將寒水石蓋雌黃用油

紙燭十二箇燒盡為度次將衆藥為末和令勻以粟

米飯和丸如雞頭大每服一丸用生薑一二寸同嚼

溫酒下婦人以富歸菜豆酒下

治膈氣噎塞不思飲食附子丸方

附子大者生去皮臍切破生薑汁煮透焙壹兩

丁香半兩

右二味搗羅為末細研納砂少許糝棗內蒸熟去皮

核和藥丸如梧桐子大每服十五丸溫米飲下食前

服

治膈氣噎食物不下昆布丸方

昆布洗去鹹焙末壹兩 春杵頭細搗壹合

右二味用老牛涎一合生百合汁一合二味慢火煎

入蜜攪成膏按前藥和丸如雞頭大含化嚥津

膈氣嘔逆不下食

論曰膈氣嘔逆不下飲食者由胃氣不足風冷乘之或

憂悲氣結不得宣通故令膈脘吞滿氣塞胸中縱能食

而卒不下或入胃中多致不消與留飲相擊則變為嘔

逆也

治膈氣嘔逆不下食惡心小腹疼痛及脾積氣飲食進退面黃腹脹怠惰藏府不調水穀不化磨癥瘕積聚沉香煎方

沉香

丁香

阿魏

火炙半兩

木香

胡椒

沒藥

丹砂

高良薑

縮砂

檳榔

礞砂

各壹兩

吳茱萸

巴豆

青橘皮

硫黃

右一十五味搗研為末鍊蜜丸如菉豆大每服三九

至五丸食前臨臥溫生薑橘皮湯下如暴傷生冷嘔

逆惡心小腹疼痛量加丸數

治膈氣嘔逆不下食壅悶惡心丁香丸方

丁香

木瓜

木香

肉豆蔻

檳榔

半夏

青橘皮

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸

生薑湯下

治膈氣嘔逆不下食無比丸方

乾薑炮

附子炮裂去

澤瀉剉

桂去麝皮

巴豆貳柒粒去

右五味搗羅爲末和勻鍊蜜丸如梧桐子大每服三

丸至五丸溫酒下早晚各一服

治膈氣吐逆不下食檳榔散方

檳榔生

京三稜煨

蓬莪茂煨

甘草炙

懷香子炒

益智子去皮

青橘皮去白

乾薑炮各

右八味搗羅爲散每服二錢匕沸湯調下日二

治膈氣痞悶痰飲惡心嘔逆不下飲食木香丸方

木香炮半

莎草根炒

京三稜煨

白朮各壹

沉香剉

礞砂研

好茶末

益智子去皮炒

丁香炒各

烏梅肉炒壹

巴豆貳柒粒去

肉豆蔻去殼

右一十三味除巴豆外搗羅爲末醋煮麩糊丸如棗

豆大每服三丸至五丸食後生薑湯下

治膈氣痞悶嘔逆惡心不下飲食臘茶丸方

臘茶末

丁香炒

檳榔剉

青橘皮去白切炒

木香炮

精沙去皮炒

巴豆去皮心膜研出油參柴粒

烏梅肉炒貳兩

右八味除巴豆外搗羅爲末再同研勻醋煮麩糊丸

如菘豆大每服三九至五九溫生薑湯下早晚食後

服

治膈氣嘔逆不下食心胸痞悶噎塞不通化氣丸方

木香炮

檳榔生剉各貳兩

硃砂別研壹兩

大黃炮參分

丹砂別研半兩

右五味搗研爲末酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服

十九至二十九不拘時候生薑湯下

治膈氣嘔逆不下食分氣丸方

白朮剉麥炒

木香炮

蓬莪皮煨

乾薑炮

陳橘皮湯浸去白切炒去麩

甘草炙

縮砂人炒去皮

藿香子炒

乾木瓜切

益智子炒各貳兩

胡椒兩

阿魏醋化白麩和作餅炙壹分

右一十三味搗羅爲末浸蒸餅丸如雞頭實大每服

一丸鹽湯嚥下不計時候

治膈氣嘔逆不下食噎塞腹肚膨脹安息香丸方

安息香酒化

赤茯苓去黑皮

桂去麩

檳榔生剉

白朮剉

甘草炙

訶梨勒皮

厚朴去麤皮生剉 陳橘皮湯浸去白

乾薑炮半兩

右一十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十

丸生薑湯下不計時候

治膈氣嘔逆飲食不下心胸痞滿沉香煮散方

沉香剉

懷香子炒

青榆皮湯浸去白

胡椒

草澄茄

棟實剉

陳橘皮湯浸去白

右七味搗羅為散患者但心頭氣未斷皆可服之每

服二錢匕葱白五寸拍破酒并童子小便各半盞同

煎至六分放溫和滓服重者不過三服

治胸膈氣痛不思食食即嘔逆木香散方

木香

丁香

檳榔剉

訶梨勒皮

桂皮去麤

茹香剉

枳殼去瓢

大黃剉

乾木瓜切碎

右九味搗羅為散再同研勻每服二錢匕炒生薑鹽

湯調下

治膈氣嘔逆不下飲食或憂悲氣結不得宣通參苓丸

方

人參

赤茯苓去黑皮

乾薑炮

桂皮去麩

甘草炙

細辛去苗葉

芍藥

枳殼生熟麩炒

訶梨勒皮炒

檳榔剉各壹兩半

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空心溫

酒下二十丸如覺有物在喉中卽丸三五丸如彈子

大每一丸含化嚥津

治膈氣壅逆心胸痞滿食飲不下氣實丸方

藜香子

揀淨銀石器內
紙觀炒貳兩

陳橘皮湯浸去白焙

檳榔剉各壹兩

木香壹分
辟味同
枳羅爲末

黑牽牛

揀淨碎肆兩用吳茱萸貳兩慢火同炒
菜萸焦只取牽牛子壹兩向枳取末貳兩

右五味同拌勻鍊蜜和劑爲丸如梧桐子大每服十

丸至十五丸米飲或木香湯下有痰卽用檳榔末半

錢水半盞煎數沸放溫下欲微疎利加至三十九至

四十丸看虛實腹稍空服之

治胃氣素弱因於憂患膈氣嘔逆不思飲食五膈丸方

蜀椒

附子炮裂去皮

遠志去心

蜀椒

乾薑炮

細辛去苗葉

桂皮去麩

甘草炙

麥門冬去心焙

右九味搗羅爲末鍊蜜和丸如彈子大食後含化胸

中熱即三服

膈氣痰結

論曰膈氣痰結者謂結痰在胸膈之上喉間噎塞欬唾稠濁氣滿胸中妨害飲食蓋緣脾肺久虛氣道否滯不能升降水飲停結聚而為痰久不差則變虛勞上喘之病

治膈氣痰結不思飲食訶梨勒湯方

訶梨勒煨去核壹兩半夏貳兩湯洗采福附子貳兩木香壹兩

甘草貳兩草豆蔻壹兩丁香壹兩

青橘皮湯浸去白增各壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片煎

至七分去滓熱服不拘時候

治膈氣痰結不入飲食肉豆蔻丸方

肉豆蔻去殼木香去麤皮梔子去殼華澄茄

沉香去麤皮益智子去殼附子炮裂去皮

胡椒去麤皮青橘皮湯浸去白附子炮裂去皮

右九味搗羅為末用木瓜一枚切蓋去子內廂砂一

兩飛過者飯上蒸熟研如膏後拌諸藥如韮更入鍊

蜜和丸如梧桐子大空心臨臥溫酒下十五丸

治膈氣痰結嘔吐酸水木香丸方

木香

青橘皮湯浸去桂去麩皮

白木

益智子去皮肉豆蔻去殼各

細辛去苗

吳茱萸湯洗焙乾炒乾薑炮裂各

右九味搗羅爲末以酒煮麩糊丸如菉豆大每服十

五丸食後生薑湯下

治膈氣痰結和胃氣進飲食半夏五香丸方

半夏湯洗去泥去滑搗羅爲末

丁香

沉香剉各麝香研

龍腦研

丹砂研各藿香葉南

檳榔尖者貳顆剉

木香剉甘草炙各

右一十味搗研爲末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸

空心食前生薑鹽酒嚥下

治膈氣痰結嘔逆減食丁香勻氣丸方

丁香

木香剉沉香剉

肉豆蔻去殼

桂皮去麩京三稜煨先搗取末

當歸洗切

陳橘皮湯浸去檳榔剉

葶澄茄

附子炮裂去安息香酒化

乳香細包湯內攪

硃砂飛

丹砂研各

巴豆貳拾壹粒去皮熱

右一十六味搗羅爲末與安息香等一處拌和研勻

酒煮麩糊和再搗三二百下丸如麻子大每服五七
丸溫生薑湯下

治膈氣痰結不止藿香湯方

藿香去梗
貳錢

草豆蔻去皮
壹分

阿魏鹽鑊焙乾

木香壹分

人參

陳橘皮湯浸去白
焙各半兩

桔梗炒壹分

乾薑炮裂
壹錢

甘草炙

訶梨勒炮去核
各壹分

右一十味麩搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片

同煎至八分去滓空心服

治膈氣痰結上焦冷氣吞酸吐沫嘔逆不食乾薑丸方

乾薑炮壹分

半夏湯浸去滑
貳兩 丁香半兩

右三味搗羅爲末以生薑自然汁煮麩糊爲丸如梧

桐子大每服十五丸煎木瓜鹽湯下不計時候

治膈氣痰結嘔逆吐食妙紅散方

紅麴炒

丁香

藿香葉

人參

白茯苓去黑皮
各半兩

右五味搗羅爲散每服二錢匕米飲調下食前服

治膈氣痰結通中消飲去積冷止腹痛茯苓湯方

茯苓去黑皮

人參

麥蘖炒

陳橘皮湯浸去
白炒

陳麴炒

半夏薑汁浸貳宿
切焙乾各壹

兩 草豆蔻去皮 青橘皮湯浸去白

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同

煎至六分去滓食前溫服

治膈氣痰逆胸中痛不思食前胡湯方

前胡去蘆 芍藥炒 半夏湯洗去

人參 百合各參 赤茯苓皮

枳殼去瓢 枇杷葉炙刷 木香

檳榔煨 白茅根各半

右一十一味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓不拘時溫服

治膈氣痰結胸中不利五膈丸方

桑根白皮切 紫蘇葉微 赤茯苓去黑

陳橘皮湯浸去白 檳榔剉

生薑切焙 厚朴去鹽皮生薑汁

旋復花壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大空心米飲

下二十九漸加至三十九

膈氣宿食不消

論曰飲食入於胃而化於脾脾胃和調則水穀易腐若脾胃虛寒即傳化不時新陳蘊積况膈氣之人氣道么

澁是致噫氣酸臭否滿噎塞而苦宿食不消也

治膈氣宿食不消痰毒虛氣飲食無味壯熱憎寒霍亂

吐逆人參茯苓湯方

人參和

赤茯苓去黑皮附子炮裂去

黃耆

白朮

乾薑炮

前胡去蘆

甘草炙

訶梨勒皮

枇杷葉拭去

陳橘皮湯浸去麻黃去根

桂枝去皮

益智子去皮各

右一十四味搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚擘破同煎至七分去滓溫服如脾泄氣痢及

傷寒三日外要出汗併三服衣被蓋出汗不計陰陽

二毒食毒傷寒并能療之

治膈氣宿食不消胸膈痞滿心腹脹痛建中湯方

草豆蔻去皮

陳麴炒

麥蘖炒

厚朴去蘆皮生

陳橘皮湯浸去

白朮

乾薑炮各

檀香子炒

木香各半

右九味搗篩每服三錢匕入生薑三片棗二枚擘

破水一盞同煎至七分去滓溫服不拘時

治膈氣宿食不消溫脾胃除積冷磨脾散方

木香

人參

附子炮裂去

甘草

赤茯苓

去黑皮各貳兩

草豆蔻

乾薑

炮各壹分

陳麴

炒

麥蘗

炒各兩

右九味搗羅爲散每服二錢匕入鹽點服不拘時

治膈氣宿食不消草豆蔻散方

草豆蔻

皮去

高良薑

炮

陳麴

炒

麥蘗

炒

木香

各壹兩

訶梨勒

炮去核

陳橘皮

湯浸去白焙

桂

去麤皮

烏梅肉

炒

甘草

炙各半兩

右一十味搗羅爲散每服二錢匕入鹽點服空心食

前

治膈氣宿食不消氣攻兩脇痛口內唾痰心胸不快參

麴散方

人參

白茯苓

去黑皮

厚朴

去麤皮塗生薑汁炙熟

枳殼

去瓤炒

桂

去麤皮

甘草

炙

陳麴

炒

訶梨勒皮

白朮

乾薑

炮

京三稜

煨

白檳榔

剉

木香

各壹分

右一十三味搗羅爲散每服二錢匕入鹽點服空心

食前

治膈氣宿食不消散寒邪溫脾胃附子丸方

附子炮裂去皮臍

丹砂各壹兩研細如粉留壹半為衣

檳榔剉碎半兩

丁香壹錢

杏仁貳拾捌以去皮尖雙入別

研成膏

右五味搗研極細和勻鍊蜜為丸梧桐子大丹砂為衣每服三丸至五丸先嚼棗一枚裹藥丸乾嚥後以少生薑湯下不拘時候

治膈氣宿食不消養胃丸方

厚朴去麤皮剉作小塊壹斤

丁香半斤

生薑伍斤取自然汁於銀石器內同厚朴文火煮盡薑汁炒令乾

白朮壹拾兩

人參壹拾兩

右五味搗羅為末以煮棗肉和丸如梧桐子大每服三十九米飲下空心食前

治膈氣宿食不消消積滯進飲食砂礪丸方

礪砂壹兩研碎以漿水壹大盞化去沙石入礪子內熱盡漿水却入好酒半升重煮如膏

山芋兩

木香壹兩 肉豆蔻壹兩

檳榔半兩

白朮壹兩

右五味搗羅為細末以礪砂膏投和令勻却以好酒半盞煮麵糊丸如梧桐子大每服十丸至十五丸食後良久溫酒下

治膈氣宿食不消麥麩散方

白朮

麥蘖料兩 芍藥各兩

白芷

檀香子炒

烏藥各壹兩半

莎草根炒去毛

桔梗炒

縮沙去大母 陳橘皮湯浸去白 枳實炒

紅豆炒

蓬莖茂炒 桂皮去 白木多

厚朴去

薑汁炙熟 人參各壹兩

白木多

木香炒

訶梨勒皮兩

蒼朮米泔浸壹宿 炒參兩

右一十八味搗羅為散每服二錢匕陳米飲或鹽湯

調下不計時候

治膈氣宿食不消厚朴湯方

厚朴去

薑汁去 薑皮剉壹兩半生

草豆蔻去 大發開

桂去

高良薑

五味子各半兩

青橘皮湯浸去白

陳橘皮湯浸去白 甘草炙

麥蘖炒

苡胡去苗

人參

麻黃去根節煮

陳麴炒

訶梨勒炮去核 各壹兩

益智炒去

烏頭炮裂去皮 乾薑炮壹兩

右一十七味搗篩每服三錢匕水一盞薑三片棗

二枚擘破同煎至七分去滓稍熱服不拘時候