

東
醫
寶
鑑
卷
七

省中醫藥學會藏書

編號 11-189-14
16

訂正東醫寶鑑外形篇卷之四

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君 臣許茂奉 教撰

手

手部度數 肩至肘長一尺七寸 肘至腕長一尺二寸半 腕至

手領 肩 肘 腕 掌 上 名曰 臂 臂 有 二 骨 骨 下 掌 上 節 處 曰 腕 腕 又 曰 掌 後 曰 腕 腕 即 肘 節 也 肘 下

以趨上者
也(靈樞)

手五指有名 一曰大指 二曰巽指 三曰長指

四指為諸陽之本 內經曰 四肢者 諸陽之本也 陽成則

手掌以候胃 靈樞曰 掌中熱者 腹中熱 掌中寒者 腹中寒 魚上白肉有青血脉者 胃中有寒 銅人 胃

寒熱氣也(銅人) 大指本節後白肉際名曰魚 以其形似魚也 有穴名魚際(銅人) 傷

四肢熱 黃帝曰 人有四肢熱 逢風寒 如受於火者 何也 岐伯曰 是陰氣虛 陽氣盛 四肢者 陽也 兩陽相

是人當肉燥
也(內經)

四肢不用 脾病不能為胃行其津液 四肢不用 何也 岐伯對曰 四肢皆稟氣於胃 而不得至經 必因於脾 乃得稟也 今

用焉(內經) 四肢解墮者 脾精之不行也(內經) 帝曰 人之脾者 何氣使然 岐伯曰 胃不嘗則諸

脾與胃以膜相連而能為之行其津液 何也 岐伯曰 足太陰者 脾也 為行氣於三陰 陽明者 胃也 亦為

之行氣於三陽 藏府各因其經而受氣於陽 明故為胃行其津液也(內經) 脾實則四肢不舉 內經

曰 脾太過則令人四肢不舉 是也 此謂黃梁之疾 其治宜瀉三化湯(方見風門) 調胃承氣湯(方見寒

消痰茯苓丸

治痰飲流注臂痛不能舉時復轉移脈沈細半夏二兩赤茯苓一兩枳殼五錢朴硝二錢半右為末薑汁糊和丸梧子大薑湯下三五丸無朴硝則以煨硝代之。○有人為痰飲所苦

兩手戰掉痛不能舉
服此即愈(得效)

加減茯苓丸

治痰飲壅滯絡不通兩臂作痛不能梳洗半夏三兩以白礬皂角生薑各一兩煎湯浸七日取用陳皮鹽水炒白芍藥酒炒黃耆鹽水炒各二兩白茯苓一兩半朴硝一兩三錢海桐

皮酒洗薑黃木瓜各一兩薄桂甘草各五錢右為末薑汁竹瀝糊和丸梧子大白湯下百丸(醫聖堂)

芎活湯

治水飲停注經絡發為臂痛川芎半夏赤茯苓獨活陳皮枳殼各一錢白朮甘州各五分右剉作一貼薑五片水煎服(得效)

半夏苓朮湯

治痰飲臂痛不能舉半夏各一錢半片芎活酒炒白朮南星炮香附子各七分陳皮赤茯苓各五分威靈仙甘草各三分右剉作一貼薑五片水煎服(正傳)

臂痛有六道經絡

當以兩手伸直其臂貼身垂下大指居前小指居後而定之則其臂膊之前廉痛屬陽明經後廉痛屬太陽經外廉痛屬少陽經內廉痛屬厥陰經內前廉痛屬太陰經內後廉痛

屬少陰經視其何經而用針藥治之也(東垣)

風淫末疾

詳見風門

結陽證

詳見浮腫

十指麻木

詳見皮膚

肩臂骨脫白

兩肩頭冷疼尤不可忽屢見將中風人臂骨脫白不與肩相連接多有治不愈者要之總覺肩

上冷疼必先灸肩髃等穴毋使至於此極可也(資生)○留飲之證四肢應節痛氣短脈沈久則令人骨節蹉跌宜導痰湯(方見痰門)加減用之(八門)

手循衣撮空摸床

傷寒熱病之極手循衣撮空摸床者山產後血脫亦有此證(綱目)○病人手尋衣領及亂搶物者肝熱也手撮眉目鼻而者肺熱也(綱目)○傷寒熱病尋衣撮空許學士說作

肝熱風淫末疾此論雖然若斷之為肺熱似為愈矣其人必謔言妄語經曰肺邪入心為譫語象上焦有疾肺必主之手經者上焦也此肺之體肝之用肝主血血者陰物也陰不能自動蓋肺主氣為氣

所鼓舞故靜者得動一者說肝之用一者說肺之體此天地互為體用也(東垣)

心虛手振 心虛手振見神門
酒客手振見內傷

手爪占病 內經曰肝之合筋也其榮爪也。○肝熱者色蒼而爪枯（東垣）○病人爪甲白者不治。○病人爪甲青者死。○病人手足爪甲下肉黑者八日死。○病人手掌腫無文者死（扁鵲）

代指 代指者指頭先腫焮熱刺痛然後於爪甲邊結濃潰破甚者爪甲俱脫（入門）○代指亦謂之天蛇頭（綱目）○天蛇頭瘡開口腫痛以雄黃入雞子內以患指浸其中一宿次早更以蜈蚣燒烟更病指

（一二次即消（入門）○治代指蒲公英與蒼耳草等分為末好醋濃煎浸洗即愈（丹心）○蒲公英搗細水和去滓服之滓愈處累效（丹心）○手指忽腫痛名為代指焮焮煎湯淋洗之又取烏梅核中

仁為末醋調成膏入指痛之自愈（本門）○又豬脂和蚯蚓搗爛付之又田蠶生搗碎付之（本草）○生雞卵開一孔將指浸之三個即愈（綱目）○手足觸木惡刺及狐尿刺腫痛蒲公英搗取白汁多塗

立差（入門）

手足皸裂 冬月手足皸裂作痛宜用黃蠟膏臘膏（方見雜方）○手足皸裂取生薑汁紅糟白鹽臘猪脂同研爛炒熱擦入燂內一時雖痛少頃即安（綱目）○冬月冒涉凌凍面目手足皸裂血出作痛

猪腦髓者熱酒中以洗之差（本草）又免腦髓生塗之雀腦髓亦可（本草）○又百沸湯洗後油髮灰付之即安白芨末水調塗之亦效（丹心）

黃蠟膏 治冬月手足皸裂作痛清油五錢慢火煎沸入黃蠟一塊再煎候熔入胡粉五倍子末各少許熬令紫色為度先以熱湯洗患處火上烘乾用藥付上以紙貼之其痛立止入水亦不落（得效）

單方凡十

羌活 治肢節痛煎湯服之（東垣）

防風 治四肢拘攣煎湯服或丸服（本草十）

細辛 治手足拘急或煎服或末服皆佳（本草）

蒼耳子 主四肢拘攣痛取三兩炒碎末水一升半煎至半去滓呷服（本草）

天麻 主四肢拘攣水煎服或煎食或生食並佳（本草）

淫羊藿 治四肢不仁水煎服或浸酒服並佳（本草）

地膚草 主手足煩癢水煎服日三（本草）

桑枝茶 療臂痛可常飲之有人瘰癧臂痛百藥不效服此即愈（綱目）

五倍子 治手足皸裂搗為末調牛腦髓填封即愈（得效）

松脂 療代指入燂熔化候溫以籠指頭即差（本草）

醬清 治手指掣痛和蜜溫漬之即愈（本草）

鹿髓脂 主四肢不隨和酒服之佳（本草）

馬糞 治毒熱攻手足腫痛欲脫水煎馬糞取汁溫漬之（本草）

虎骨酒

治臂脛痛不計深淺皆效虎脛骨熬黃搗末二兩於羊角屑一兩白芍藥剉二兩右以好酒五升浸之春夏七日秋冬倍之每日空腹飲一盃冬月欲速服銀器或置爐中三日即可服(本草)

針灸法

治臂曰手陽明之脈病肩前腫痛大指次指痛不用○手太陽之脈病肩似拔腕似折○手少陽之脈病肩臑肘臂外皆痛小指次指不用○手厥陰之脈病手心熱肘臂急脈腫○手太陰之脈病臑臂內前廉痛臑掌中熱○手少陰之脈病臑臂內後廉痛臑掌中熱痛隨其經針灸之臑肩臑條兩

手之安否(青生)五指尚舉取三間前谷(綱目)○五指皆痛取陽池外關合谷(綱目)○兩手舉急

偏枯取大陵(綱目)○肘臂筋急取尺澤(綱目)○肩不可動臂不可舉取肩髃巨骨清冷淵闕衝(東垣)○臂肘痛麻痺取肩○手三里外關肩井曲池手上廉合谷(綱目)○肘痛不可屈伸取天井

尺澤(綱目)○肘臂腕痛取前谷液門中渚(綱目)○臂痿變取肘髃闕陰尺澤前谷後谿(綱目)○腕痛取陽谿曲池腕骨(綱目)○兩脚痛取肩井支溝(綱目)

足

足部度數

靈樞曰橫骨上廉以下至內輔之上廉長一尺八寸內輔之上廉以下至下廉長三寸半內輔下廉下至內踝長一尺三寸內踝以下至地長三寸膝以下至外踝長一尺六寸外踝以下至京骨長三寸○髌樞以下至膝中長一尺九寸膝以下至外踝長一尺二寸廣四寸半(綱目)

長三寸○京骨以下至地長一寸○兩髌之間廣六寸半足長一尺二寸廣四寸半(綱目)

足領髌股膝臑脛腕

膝上曰髌膝上骨曰髌骨髌骨與髌骨接處曰髌樞(穴名也)髌內曰股髌外曰脛胫下腰上接處曰膝膝之蓋骨曰膕膝下曰脛一名曰胫膝下之骨曰胫骨胫骨之

外骨曰輔骨脛之後魚腹曰膕一云足肚曰脛脛下跗上接處曰腕腕骨曰腕(綱目)○足通謂之脚脚者却也以具坐時却在後也(回春)

脈法

脚氣之脈其狀有四浮沉為風濡弱溼氣遲滯因寒洪數熱鬱(脈訣)○微滑者虛牢堅者實(正傳)為熱(三因)○脾脈緩甚為痿痺(內經)○尺脈虛弱緩滑而緊病為足痛或是痿

病(脈訣)○痿脈多浮而大(子和)○誇人痿痺其脈虛者生繫急疾者死(脈經)

厥有寒熱

王太僕云厥者氣逆上也世謂傳為脚氣內經曰寒厥者手足寒也熱厥者手足熱也蓋陽衰於下則為寒厥陰衰於下則為熱厥陰陽之氣不相接續則為厥(綱目)○厥證多以不勝乘其所

勝如腎移寒於脾則為寒厥心移熱於腎則為熱厥(入門)○厥論寒熱皆由腎之精氣內竭而成也(綱目)

寒厥

黃帝曰寒厥之為寒也必從五指而上於膝者何也岐伯對曰陰氣起於五指之裏集於膝下而聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒也不從外皆從內也(內經)○帝曰寒厥何為而然也

岐伯曰前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也春夏則陽氣多而陰氣少秋冬則陰氣盛而陽氣衰此人者以秋冬奪於所用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因從而上之也氣因於中陽氣衰不能滲

營其經路陽氣日損陰氣獨作故手足為之寒也(內經)○內經曰腎虛則清厥意不樂又曰下虛則
厥○寒厥脈沈數實為熱東垣治一人脚膝尻臂皆冷沈數有力用滋腎丸(方見小經)再服而愈又
治一人上熱下寒用既濟解毒湯良愈則寒厥用藥不可不審(綱目)○寒
厥宜十全大補湯(方見虛勞)加附子或當歸四逆湯(方見寒門)(八門)

熱厥

於足心故陽氣勝則足下熱也(內經)○帝曰熱厥何如而然也岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脈者集於足下而聚
脈虛脾土為胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不營
其四肢也此人必數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散酒氣與穀氣相搏熱盛於中故熱通於身內
熱而尿赤也夫酒氣或而慄悍腎氣日衰陽氣獨勝故手足為之熱也(內經)○熱厥宜
升陽散火湯火鬱湯(方並見火門)○厥論寒熱皆由腎之精氣內竭而成也(綱目)

腳氣異名

腳氣古謂之緩風又謂之厥者是古今之異名也有乾溼之分其脚腫者
名濕脚氣不腫者名乾脚氣漸而至於足脛腫大如瓜者有之(醫聖)

腳氣病因

腳氣之疾實水濕之所為也其為病有證無名脚氣之稱自蘇敬始關中河朔無有也惟南方地
下水寒其清濕之氣中之於人必自足始故經曰清濕襲虛則病起於下是也(綱目)○南方者其
(東垣)○水性潤下氣不能响故下注於足脛積久而作腫痛此飲食下流之所致也內經曰太陰之
勝火氣內鬱流散於外足脛腫脹發於中肘腫於下加之房事不節陰虛陽虛遂成痼疾捺真人云
古人少有此疾自永嘉南渡衣冠士人多有之亦此意也(東垣)○凡脚氣之病始起甚微多不令人
識也食飲嬉戲氣力如故惟卒起脚屈伸不能動為異耳(千金)○內經曰傷於濕者下先受之蓋足
居于下而多受其濕濕鬱生熱濕熱相搏其病乃作東南卑濕之地比比皆是西北高燥之地鮮有之
古方名為緩風宋元以來呼為脚氣雖有外
感內傷之殊其濕熱之患則一也(正傳)

腳氣病證

靈樞曰脾有邪其氣流于兩股一作脾腎有邪其氣流于兩脚○趾跛寒風濕之病也(內經)
○脚氣外證全類傷寒但初起脚膝軟弱頑痺轉筋赤腫為異耳(八門)○脚氣為病雖起於足
實周乎身或壯熱頭痛或百節拘攣或十指注注或轉筋急痛或小腹不仁以至胸滿喘急煩悶怔忡
昏憤羞明腹痛下利嘔噦痰涎惡聞食氣大便小使多是秘瀉自腫至膝自腫及踝屈弱頑痺急痛
痰或燥不燥或腫不腫皆其候也其傳足六經外證如傷寒類類但卒然脚痛為異耳(直指)○人黑
瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白者不耐風溼瘦人肉硬肥人肉軟肉軟則受病難
愈(千金)

腳氣治法

脚氣是為瘵疾治以宣通之劑使氣不能成瘵瘵既成而試者疑惡血而去其重勢經曰蓄則腫
熱反射之從以藥治之(綱目)○脚氣之疾自古皆尚疎下為疾瘵故也然不可太過太過則損

傷脾胃又不可不及不及則使壅氣不能消散(東垣)○脚氣之疾皆由氣貫而死終無一人以服藥
致虛而阻故其病皆不得大補亦不可大瀉縱甚虛羸亦須微瀉亦宜時取汗也(千金)○治法
大要疎導大使使毒氣得泄而後愈其補湯淋洗皆醫家之大戒也(直指)○脚痛意在風溼風則用
烏藥順氣散(方見風門)溼則不換金正氣散(方見寒門)如赤茯苓乾薑(直指)○治法用蒼朮
白朮以治溼黃芩黃柏知母以治熱當歸芍藥地黃以調血木瓜檳榔以調氣羌活獨活以利關節而
散風溼兼用木通防己牛膝引諸藥下行此為治之法清熱瀉濕湯亦可(醫鑿)○溼熱在三陽則宜
神和左經湯在太陽則宜麻黃左經湯在少陽則宜半夏左經湯在陽明則宜大黃左經湯或加味敗
毒散通宜檳榔散(入門)○溼熱在三陰則宜羌活導滯湯陰溼丹(方見溼門)三花神祐丸(方見
下門)搜風丸枳實大黃湯關結導引丸當歸止痛湯(入門)○氣血虛者宜獨活寄生湯羌活續斷
湯(入門)○寒溼厥則宜勝駿丸捉虎丹○病久者宜卷柏散熱甚者宜二炒蒼柏散加味蒼柏散腫
甚宜腸溼餅
子桑白皮散

清熱瀉溼湯

治溼熱脚氣腫痛諸證蒼朮黃柏鹽酒炒各一錢紫蘇葉赤芍藥木瓜澤瀉木通防己檳榔
枳殼香附子羌活甘草各七分右剉作一貼水煎服痛加木香腰加大腹皮熱加黃連大黃

傳正

神和左經湯

治風寒暑溼流注足二陽經脚膝拘攣腫痛麻黃桂心黃芩枳殼柴胡赤茯苓半夏羌活防
風厚朴白薑小麥門冬麥門冬乾葛細辛甘草各五分右剉作一貼薑三棗二煎服(得效)

麻黃左經湯

治四氣流注足太陽經腰脚攣重痛增寒發熱無汗惡寒或自汗頭疼眩暈羌活一錢
麻黃乾葛白朮細辛赤茯苓防己桂心防風甘草各七分右剉作一貼煎法同上(三因)

半夏左經湯

治足少陽經為四氣流注發熱腫痛腰脚引痛柴胡一錢半乾葛半夏赤茯苓白朮
細辛麥門冬桂心防風白薑黃芩小麥甘草各五分右剉作一貼煎法同上(三因)

大黃左經湯

治四氣流注足陽明經腰脚赤腫痛不可行大小便秘瀉大黃一錢羌活茯苓
細辛前胡枳殼厚朴黃芩杏仁甘竹各七分右剉作一貼煎法同上(三因)

加味敗毒散

治三陽經脚氣流注脚膝焮熱赤腫寒熱自汗即人參敗毒散(方見寒門)
一方加大黃蒼朮各一錢右剉作一貼入薑三片薄荷七葉同煎服(得效)

檳榔散

治風溼脚氣腫痛拘攣用此疎通氣道蒼朮一錢香附子紫蘇葉陳皮木瓜檳榔
羌活牛膝各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三片葱白三莖同煎服(十三方)

羌活導滯湯

治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便尿阻隔先以此導之後用當歸拈痛湯除之大黃酒
煨二錢四分獨活羌活各一錢二分防己當歸尾各七分枳實五分右剉作一貼水煎服權利

即止
(東垣)

當歸拈痛湯

治濕熱脚氣腫痛羌活茵陳酒炒黃芩酒炒甘草各一錢知母澤瀉赤茯苓白虎附已各六分人參苦參升麻乾葛當歸蒼朮各四分右剉作一貼水二盞浸藥少時煎至一盞空心服時各一服(寶鑑)○一相公領兵至南方忽得脚氣遍身癢腫其痛手不可近足脛尤甚肉經云飲於中肘腫於下又云諸痛為實血實宜決之以三稜針數刺腫上血突出高二尺餘漸漸如線其色黑紫項時腫消痛減以當歸拈痛湯服之是夜得睡明日再服而愈(寶鑑)

搜風丸

治脚氣腫痛黑黍牛子生取頭末二兩大黃額柳枳實各五錢右為末糊丸梧子大末飲下三五十九(丹心)

枳實大黃湯

治濕脚氣腫痛大黃酒浸三錢羌活一錢半當歸一錢枳實五分右作一貼水煎空心服(寶鑑)○廉平章體肥得脚氣微腫皆赤色足腫腫痛不可忍手不敢近投以當歸拈痛湯

一點其痛減半再服腫痛悉除又以三稜針刺爪甲端多出黑血赤腫全去數日因食粥獲痛再以枳實大黃湯治之(寶鑑)

開結導引丸

治脚氣因食積流注心下痞悶陳皮白朮澤瀉茯苓神麩麥芽半夏薑梨各一兩枳實青皮乾薑各五錢巴豆霜一錢半右為末蒸餅和丸梧子大溫水下五七十九(寶鑑)○一名開

整導飲丸

獨活寄生湯

治肝腎虛弱筋掣骨痛脚膝偏枯痿弱冷痺獨活當歸白芍藥桑寄生各七分熟地黃川芎人參白茯苓牛膝杜仲秦艽細辛防風肉桂各五分甘草三分右剉作一貼薑三片水煎空

心服

羌活續斷湯

治脚氣肝腎虛弱筋掣骨痛羌活防風白芷細辛杜仲牛膝秦艽續斷熟地黃當歸人參白芍藥赤茯苓桂心川芎各五分右剉作一貼薑三片水煎服○獨活寄生湯桑寄生無真者

世以他寄生代之為害不少故今去寄生代

騰駿丸

治脚氣拘攣疼痛行步不隨去一切足弱病木瓜四兩當歸酒浸天麻酒浸牛膝酒浸酸棗仁炒熟地黃酒浸防風各二兩全蝎去毒一兩附子一枚炮去皮膽乳香沒藥羌活木香甘草各五錢

鹿香二錢右為末生地黃二斤洗淨杵爛如泥好酒四升同煮如膏和前藥搗令堅每一兩作十九每取一九臨睡細嚼酒下或丸如梧子酒下五十九亦可服至半月行步如飛故名曰騰駿(三因)○冬

月不用地黃只煉蜜作丸(八門)

捉虎丹

治脚氣走注疼痛不可忍五靈脂白膠香草烏黑豆同煮去豆木鼈子蛇龍各一兩半乳香沒藥當歸各七錢半骨香松烟墨娘各二錢半右為末糯米糊和丸艾實大每一丸空心溫酒化下建

到脚面赤腫不散再服一丸起至脚心中出黑汗乃除根(八門)○一名一粒金丹(丹心)

卷柏散

治遠年脚氣難治此方特效卷柏東向者佳先以鹽水煮半日即甘冷水煮半日焙乾黑牽牛子頭末甘遂檳榔右各為末不得相雜每服每伴各取一錢惟檳榔二錢五更初濃煎蔥白湯調下

至辰巳時取下惡物如魚凍虛人減半服隨吃

淡粥更服湯藥如清熱瀉瀉湯調之(得效)

二妙蒼柏散

治溼熱脚氣令足膝痛或赤腫脚骨間作熱痛雖一點能令步履艱苦令人痿痺百用百效蒼朮泔洗一日夜鹽炒黃柏酒浸一日夜焦炒各四兩右對五錢水煎服或水丸服亦可

(八門)○一名蒼朮散
得效○作九名二妙丸

加味蒼柏散

治溼熱脚氣癢變蒼朮一錢白朮八分知母黃柏黃芩各六分當歸芍藥生地黃各四分木瓜檳榔羌活獨活木通防己牛膝各三分甘草一分右對作一貼薑三片水煎服(八門)

勝濕餅子

治遠年脚氣足脛腫如瓜瓠者黑丑二兩取頭末五錢白丑二兩取頭末五錢甘遂五錢右為極細末用蕎麥麩一兩半調水和藥捏為餅子如折三錢大放飯上蒸熟每一餅空心茶清嚼

下以利為度(正傳)

桑白皮散

治脚氣浮腫尿溢氣急腹滿赤茯苓二錢木香防己大腹子各一錢二分桑白皮一錢李仁各一錢葉麻木通檳榔青皮各七分右對作一貼薑三片煎服(活人)

脚氣危證

凡脚氣覺病候有異即須急治之稍緩則氣上肩息胸膈逆滿急者死不旋踵寬者數日必死不可不急治也但見心下急氣喘不停或有汗出或乍熱乍寒其脈促短而數嘔吐不止者死(千金)○上氣脈數不得卧者亦死(千金)○脚氣之病其小腹頑痺不仁者多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐名曰脚氣入心死在朝夕(千金)○脚氣脈浮大而紫結此最惡脈也若細而脈同

是惡脈(千金)○脚氣入心則恍惚譫妄嘔吐不食左寸脈乍大乍小乍有乍無者死宜杉節湯三服或三和散(方見氣門)加烏藥救之(綱目)○入腎則腰脚腫小便不通氣上喘急目與額昏黑左

尺脈絕者死宜八味丸去山藥救之蓋少陰腎經脚氣入腹上氣喘急此證最急以腎秉心水尅火死不旋踵此藥救之又四物湯加炒黃柏煎服外以附子末津唾調付涌泉穴以艾灸之引熱下行(丹

心)○脚氣入腹喘急欲死宜水煎湯救之(八門)

節湯三將單丸烏藥平氣湯救之(八門)

杉節湯

治脚氣入腹衝心危急欲絕以此救之杉木節四兩大腹皮一兩檳榔七個青橘葉四十九片無

石不消人有人傳此方服之半食頃大下三次氣通

塊散而更其法童便三升煮取一升分二服(綱目)

三腕散

治脚氣衝心發悶使尿澀滯獨活白朮木瓜大腹皮紫蘇葉各一錢檳榔麝香煨末陳皮沈香木香川芎各七分甘草炙五分右羅羅末每三錢水煎服取利為效(活人)

黃湯

治脚氣入腹喘悶欲死木瓜檳榔各二錢半吳茱萸一錢半右剉作一貼水煎服(入門)

三將軍丸

治脚氣衝心大便不通吳茱萸木瓜大黃各等分右末麥糊和丸梧子大枳殼湯下五七十九(得效)

烏藥平氣湯

治脚氣上攻昏眩喘促烏藥一錢葎神人參白朮川芎當歸木瓜白芷五味子紫蘇葉各七分甘草三分右剉作一貼薑五片棗二枚煎服(三五)

脚氣禁忌法

第一忌噴噴則煩煩則喘喘則汗發動又不得露足當風入水以冷水洗脚雖夏月常須著綿襪至冬寒倍令兩腰溫煖得微汗為佳常令按摩數勞動關節令氣血通暢此養生之要拒風溼之法也(外臺)○每至且寅日割手足甲剉下侵肉去氣(外臺)○凡飲食之極宜緩行二三百步疲倦即止如此則不能成瘳也(東垣)○每朝早飯任意飽食午飯少食晚飯

不食偏佳夜食則血氣壅滯而愈增腫痛矣(寶鑑)○凡飲食酒肉澆醢勿使過度過度則脚氣發怒不可緩嗜慾多則脚氣亦發(東垣)○脚氣之病極忌房室勿食牛羊魚肉蔥蒜韭菘菜酒醢酥油猪

雞鴨鴨惟食稷粟當或薑椒及生果子犯禁者病不差(千金)○最忌熱藥蒸池恐通邪入裡為也(入門)

脚氣按摩法 涌泉穴在足心溼氣皆從此入日夕之間常以兩足赤肉更次用一手握指一手摩擦數自多時覺足心熱即將脚指鳴動轉倦則少歇或令人摩之亦得終不若自摩為佳脚力強健無

痿病之因

內經曰肺者藏之長也為心之蓋也有所失亡所求不得則發肺鳴則肺熱葉焦故曰五藏因肺熱肺焦發為痿此之謂也○陽明者五藏六府之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也陽

明虛則宗筋縱弛不引故足痿不用也(養老)○心氣熱為脈痿則肢體懈而不任地肝氣熱為筋痿則筋急而掌脾氣熱為肉痿則胃乾而渴肌肉不仁腎氣熱為骨痿則腰脊不舉骨枯而體減(養老)

痿病之因

猶秋金旺則草木萎落病之象也痿猶萎也(河間)○痿之作也皆五月六月七月之時午者少陰君

火之位未者溼土庚金伏火之地中者少陽相火之分故病痿之人其脈浮大(子和)

痿病治法 肺金體燥而居上主氣畏火者也脾土性溼而居中主四肢畏木者也火性炎上若嗜慾無節則

水失所養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一鼻脾傷則四肢不能為用而諸痿之病作矣濟南方則肺

痿病治法

金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束

所勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一鼻脾傷則四肢不能為用而諸痿之病作矣濟南方則肺金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能束

骨而利機關矣治痿之法無出於此(丹心)○東垣取黃柏為君黃耆等輔佐以治諸痿與一定之方有兼痰積者有溼多者有熱多者有溼熱相半者有扶氣者臨病製方莫善於治痿者乎雖然若辨理切不可作風治用風藥(丹心)○蒼朮黃柏治痿之要藥也(正傳)○肝腎俱虛筋骨痿弱宜加味四斤丸五獸三厘丸鹿角膠丸養血壯筋健步丸○溼熱痿弱宜神龜滋陰丸三妙丸加味二妙丸加味四物湯滋血養筋湯○長夏溼熱成痿宜健步丸四製蒼柏丸二妙蒼柏散(方見上)清燥湯○兼溼痰二陳湯(方見痰門)加蒼朮黃柏黃芩白朮竹瀝

加味四斤丸

治肝腎俱虛脚膝痠疼痿弱或受風寒濕氣以致脚痛牛膝酒浸一兩半川烏虎骨肉桂

湯下七十丸(濟生)

五獸三厘丸

治肝腎不足兩脚痠軟鹿茸酥炙血竭虎脰骨酥炙牛膝酒浸金毛狗脊燻去毛各一兩為末即五獸也另用附子一個去皮剉去中心入長砂細末一兩填滿又用木瓜一枚去皮剉

去中心入附子於內以附子末蓋口即三厘也却以三厘正坐於磁缸內重湯蒸至極爛取出和五獸末精丸艾實大木瓜酒化下血竭一名麒麟竭(澄寧)

鹿角膠丸

治兩足痠軟久卧不起神效鹿角膠一斤鹿角霜熟地黃各八兩當歸身四兩牛膝白茯苓

子大薑鹽湯吞
下百丸(正傳)

養血壯筋健步丸

治氣血兩虛兩脚痠軟不能行動熟地黃四兩牛膝酒浸杜仲薑汁炒當歸酒洗蒼朮

參朮杞子兔絲子白朮炒虎脰骨龜版並酥炙各一兩防風六錢防己酒洗五錢
羌活酒洗三錢右為末猪脊髓七條入煉蜜和丸梧子大鹽湯下百丸(醫鑿)

神龜滋陰丸

治骨蒸之人溼熱傷腎脚膝痿弱無力龜版酥炙四兩黃柏知母並鹽水炒各二兩枸

三妙丸

治濕熱下流兩脚麻木痿弱或如火烙之熱蒼朮酒浸六兩黃柏酒炒

加味三妙丸

治兩足如火烙從足跗熱起漸至腰膝麻痺軟弱皆是溼熱為病蒼朮酒浸四兩黃柏酒浸

湯下百丸
(正傳)

加味四物湯 治濕熱兩脚痿軟無力熱地黃二錢當歸身麥門冬黃柏蒼朮各一錢白芍藥川芎杜仲各七分人參黃連各五分知母牛膝各三分五味子九粒右剉作一貼水煎空心服(正傳)

滋血養筋湯 治氣血兩虛兩足痿軟不能行動熱地黃一錢半白芍藥當歸麥門冬黃柏酒炒牛膝酒浸杜仲酒炒蒼朮蒼朮仁各八分人參川芎防風知母各五分羌活甘草各三分五味子九粒右剉作一貼入薑三

健步丸 治溼熱感脚膝無力不能屈伸腰膝沈重行步艱難防己一兩羌活柴胡滑石瓜蒌根酒洗甘草炙各五錢澤瀉防風各三錢苦參川烏各一錢肉桂五分右為末酒糊和丸梧子大以蔥白剉芥煎湯下七十丸(丹心)

四製蒼柏丸 治溼熱感脚膝痿弱能滋陰降火黃柏二斤以乳汁童使米泔各浸八兩酥炙八兩浸炙各宜十三次蒼朮八兩用川椒砲故紙五味子川芎各炒二兩揀去炒藥只取柏朮為末蜜丸梧子大早酒午茶晚白湯吞下三五十九(入門)

清燥湯 治長夏濕熱感兩脚痿軟癱瘓黃耆白朮各一錢半蒼朮一錢陳皮澤瀉各七分赤茯苓人參升麻各五分生地黃當歸猪苓麥門冬神勳甘草各三分黃連黃柏柴胡各二分五味子九粒右剉作一貼水煎(東垣)

熱厥成痿 一人自誤以下常覺熱冬不可加綿於上常自言曰我稟質壯不怕冷予曰足三陰虛宜斷慾事以補養陰血庶乎可免彼笑而不答年近五十患痿半年而死(丹心)○一相公兩脚痿弱膝下尻陰皆冷精滑不固服鹿茸丸不效東垣診其脈沈數而有力告曰飲醇酒食膏粱滋火才內通陰於外醫不知此投以熱劑反瀉其陰而補其陽真所謂實實虛虛也遠處以滋腎丸再服而愈或問其故答曰是病相火熾感以乘陰位故用此去寒之劑以瀉相火而復真陰復其位則皮裏之寒自消矣(東垣)

鶴膝風 患兩膝脚痛痿弱不能行履名曰痲風或兩膝腫大痛斲脛枯腊但存皮骨如鶴膝之節拘攣險卧不能屈伸大防風湯主之(局方)○鶴膝風乃足三陰虛損風邪乘之痛者五積散(方見寒門)加松節久煎或手足腫者或磨筋痛者乃餘痰不散宜大防風湯或獨活寄生湯(方見上)脚細者蒼龜丸(入門)○鶴膝風腫痛宜醃醃二防散(正傳)○又四物湯加人參黃耆白朮附子牛膝杜仲防

大防風湯 治鶴膝風熱地黃一錢半白芍防風當歸白朮藥杜仲黃耆各一錢附子川芎牛膝羌活風羌活甘草(局方)

風羌活甘草(局方)

蒼龜丸

治癩後脚的新補蒼龜丸。白芍藥各二兩半黃柏鹽酒炒五錢。右為末粥丸梧子大以四物湯加陳皮甘草煎下五七十丸（入門）

經驗二防飲

治癩後脚痛如刀割虎咬之狀。藤膠腫大不能行。步名曰鶴膝風。熱地黃人參各一錢。白朮黃耆當歸川芎白芍藥杜仲草薢各七分。防風防己羌活牛膝甘草各五分。附子重便。浸三日。炮七分。冬則一錢。右剉作一貼。薑三棗二水煎服（正傳）

貼薑三棗二水煎服（正傳）

脚病凶證

脚氣衝心恍惚氣急脈乍大乍小者死（入門）○骨痛不能起於床者死（入門）○病人足跗上腫膝大如手者十日死（扁鵲）

甲疽瘡

一名嵌甲或肉割甲傷肌遂成癰腫。復轉窄靴。研指四邊腫。嫩黃水出。浸淫相染。五指俱爛。漸引上脚。跌線。醫五錢。火煨候冷。研為末。先以鹽湯洗。盡拭乾。付礬末。軟帛裹定。一日一易。自然差矣（本草）○一方枯礬五錢。蘆花一錢。手磨香少許。和用。如上法。无鈔（入門）○又方陳皮濃煎湯。浸良久。甲肉自相離。開。輕手剪去。肉中爪甲外用蛇涎。燒灰。為末。搽之。又細茶嚼爛。付之（入門）

久甲肉自相離。開。輕手剪去。肉中爪甲外用蛇涎。燒灰。為末。搽之。又細茶嚼爛。付之（入門）

指間溼爛。或指甲角入肉。使刺作瘡。不可著履。乾枯白。三錢。黃丹五分。為末。搽之。食惡肉。生好肉。細細割去。甲角使差。又搗掌黃皮。燒灰。為末。搽之。又細茶嚼爛。付之（入門）

肉刺

生指間。碍痛。不得着履。觀此。因穿窄靴。而生黑虱。多取。搗付之。即根出（本草）○又法取黃岩根。繫視帶上。感應永不痛（本草）○又法擇實。實細搗。貼之。即脫去（俗方）○又大棗去核。付貼。候爛。割去（俗方）

俗方

單方

凡二十三種

牛膝

治脚膝痛。痿弱不可屈伸。煎服丸服。或浸酒服。並佳。腰腿之疾。必用藥也（本草）

石斛

治脚膝冷。的煎服丸服。並佳（本草）

薏苡仁

去乾濕脚氣。大驗。和郁李仁作粥常服。良（本草）

威靈仙

一人足病。不能行。數十年。一僧教服此。為末。每二錢。酒調服。數日。能步履（本草）

何首烏

治骨軟。風腰膝痛。何首烏一斤。牛膝半斤。黑豆三升。煮取汁。拌藥。三

草麻葉

主脚氣腫痛。取葉。煮

牽牛子

治脚氣腫滿。取頭末。蜜丸。小豆大。每五丸。薑湯下。小便利。即止（本草）

松節

主脚弱。痺痛。煮取汁。釀酒。取清飲之。良（本草）

五加皮

瘧疾。覺脚弱。釀酒。服或水煎。如茶飲之（本草）

桑枝茶

治脚氣。久服之。佳（本草）

川椒

治寒溼脚氣。川椒或陳布袋中。置椒。火上。既足。踏椒。囊。寒溼。散去。即效（入門）

上海校經山房石印

上海校經山房石印

檳榔 治脚氣衝心氣急難心檳榔末二錢以童便薑汁溫酒各半盞調服(本草)

蠶魚及鱧魚 並主脚氣作瘡常食脚魚膾亦佳(本草)

田螺 主脚氣上衝取螺煮食之殼內亦佳(本草)

生粟 治脚氣及脚弱無力袋盛風乾每日空心食十餘枚(本草)

木瓜 治脚氣及脚氣上衝取一類煮煎湯飲之(本草)

黑豆 治脚氣衝心取豆濃煎汁飲之(本草)

針灸法 取風市中清陽關懸鐘(綱目)○腿膝疼痛或枯黑取風市陽陵泉曲泉(綱目)○膝痛足瘦取環跳懸鐘(綱目)○膝外廉痛取伏兔陽關陽陵泉(綱目)○足腕痛取崑崙崑崙大髀申脈丘墟高丘照海(綱目)○膝內廉痛取膝關大

衝中封(綱目)○脚氣一病最宜針有熱者不可灸(資生)○脚氣初發先失風市次服伏兔次膺鼻次三里次上廉次下廉次絕骨日日報灸以百壯為要(資生)○濕熱脚氣紅腫生瘡取中封陽關風市絕骨(資生)○脚氣取足十指端名曰氣端去指毒一分日灸三壯神效(資生)○膝中痛肝膈鼻(綱目)○膝腫以火針刺三里其腫如失又取行間(資生)○脚氣連灸風市三里以瀉毒氣(資生)○脚弱瘦剛取三里絕骨絕骨治脚疾神效(資生)

烏牛尿 治脚氣水腫取雄牛新尿飲一升小便利則漸消黃牛亦可(本草)

鹿蹄肉 治脚膝痛不得踐地取蹄四雙治如食法著五味煮熟食之(本草)

紫蘇 治脚氣取蘇煮湯如茶飲之又取子二兩研取汁入棗栗薑椒醬煮粥食之(本草)

赤小豆 甚治脚氣水腫和理魚煮食甚佳(本草)

髮屬腎 內經曰腎主髮又曰腎之合骨也其榮髮也

髮者血之餘 血盛則髮理血衰則髮衰血熱則髮黃血敗則髮白(入門)

十二經毛髮多少 靈樞曰美眉者太陽多血通鬢極髯者少陽多血美鬚者陽明多血○足陽明之上血氣盛則下血氣衰則下血氣少則無鬚○足少陽之下血氣盛則通鬢美長血氣皆少則無鬚○足少陽之下血氣盛則脛毛長血氣皆少則脛無毛○足太陽之上血氣盛則美眉眉有毫毛(毛之長者曰毫)細多

少則無毛雖有則稀枯痺○足少陽之上血氣盛則通鬢美長血氣皆少則無鬚○足少陽之下血氣盛則脛毛長血氣皆少則脛無毛○足太陽之上血氣盛則美眉眉有毫毛(毛之長者曰毫)細多

氣少則惡眉。手陽明之上血氣盛則鬢美血氣皆少則無鬢。手陽明之下血氣盛則

髮眉鬚髭各異

在頰曰髮髮者拔也拔擢而出也。在目曰眉眉者插也有故媚也。頰下曰鬚鬚者秀也。物成乃秀人成而鬚生也。在頰曰髭口動搖髭鬚然也。口上曰髭髭者姿也。為

妻容之美也(回春)

髮眉鬚各有所屬

髮屬心故上生髮火氣也。眉屬肝故橫生髮木氣也。鬚屬腎故下生髮水氣也(醫貫說)。

白者藏氣有所偏故也。男子腎氣外行上為鬚下為髮故女子宜入無鬚則亦無鬚而眉髮無異於男子則知不屬腎也。明矣(醫鑑)

婦人無鬚

貴帝曰婦人無鬚者無血氣乎岐伯對曰衝脈任脈皆起於胞中上循腹裏為經絡之海其浮而外者循腹右上行會於咽喉別而絡唇中血氣盛則充膚熱肉血獨盛則澹沫皮膚生毫毛今婦

人之生有餘於氣不足於血以其數脫血也。衝任之脈不榮口唇故鬚不生焉(靈樞)

宦官無鬚

貴帝曰士人有傷於陰陰氣絕而不起陰不用其鬚不去何也。宦者獨去何也。岐伯對曰宦者去其宗筋傷其衝脈血氣不復皮膚內結唇口不榮故鬚不生焉。帝曰具有天宦者未嘗被傷不

脫於血然其鬚不生何也。岐伯曰此天之所不足也。其衝任不盛宗筋不成有氣無血唇口不榮故鬚不生也(靈樞)

鬚髮榮枯

內經曰女子七歲齒更髮長五七而始焦髮始落六七而焦髮白丈夫八歲齒更髮長五八髮墮齒枯六八而焦髮白。鬚髮頰面皆督脈所絡陽精感注於外則鬚髮榮茂而體光潤(八門)。

肥榮在鬚鬚華在髮精氣上升則鬚潤而黑六八以後精華不能上升秋冬令行金刑肺枯以致鬚髮焦枯如灰白色養生者宜預服補精血藥以防之。漆樞亦非上策(八門)。

御草還丹延年益壽不老丹(方見真形)四物坎離丸并金丹還元秋石丸神仙烏雲丹却老烏髮健陽丹七仙丹五老還童丹(方見真形)如味蒼朮膏一醉不老丹中山蓮童酒烏鬚酒二方

張天師草還丹

此藥久服則身輕隨風而去如列子之乘虛若髮白者從根而黑如未白者永不白有不信者將藥拌飯與白貓吃一月即黑地骨皮生地黃石菖蒲牛膝遠志羌活子酒煮右等

分為細末蜜丸梧子大每三五十九丸空心溫酒服。照湯送下修製忌鐵器及婦人雞犬見(海藏)

四物坎離丸

善烏鬚髮魚地黃三兩生地黃一兩半同酒浸炒黃芩一兩半同酒炒當歸二兩白芍藥一兩半同酒炒知母一兩黃柏二兩同鹽酒浸炒則柏葉槐子各一兩同炒連起六錢右為末蜜丸梧子大咸燉

盆內放地上七日曬乾收之每五六十九丸或溫酒或白湯下(八門)

秤金丹

又名一秤金丹久服髮黑延老還童熟地黃一兩地骨皮蓮花蕊槐角子俱用酒浸夏一日春秋三日冬六日取出晒乾薄荷各三兩沒石子一兩人參木香各五錢右為末蜜丸芡實大每一丸

喻化溫酒送下
日三服(入門)

還元秋石丸

治因房室損精髮早白秋石一斤白茯苓一斤天門冬麥門冬生地黃熟地黃人參地骨皮人乳粉各四兩右為末蜜丸梧子大白湯或酒下三五十九丸(入門)

神仙烏雲丹

烏鬚黑髮返老還童神效無比何首烏八兩入砂鍋內黑豆同蒸半日去豆用好酒浸七日晒乾如此蒸七次破故紙四兩酒洗砂鍋內炒黃早蓮汁二兩槐角二兩為末胡桐淚一兩

為末右細末粟肉二斤胡桃仁半斤搗為丸梧子大空心鹽湯下五七十九丸三月勿輟(醫鑑)

却老烏鬚健陽丹

能變白鬚髮令黑赤何首烏白何首烏各一斤牛膝八兩以黑豆汁拌蒸二次赤茯苓右為末蜜丸彈子大每服一丸白茯苓用人乳汁五升各以文武火煮乾各一斤兔絲子破故紙各八兩

次或生地黃各一斤加入尤妙(入門)

七仙丹

補心腎駐容顏黑鬚髮之聖藥何首烏九蒸九晒四兩人參生乾地黃酒洗熟地黃麥門冬天門冬白茯苓茵香炒各二兩右為末蜜丸彈子大每一丸細嚼好酒送下鹽湯亦可或凡如梧子每

五七十九丸空心酒下忌食
三白及犯房事(丹心)

加味蒼朮膏

久服精滿氣賦髮白變黑齒落更生蒼朮十斤搗如泥入大鍋內用水二桶以文武火煮至十餘碗煎透取汁入磁罐內以人參生地黃黃柏遠志杜仲川芎胡槐肉川椒熟地黃破故

紙當歸薑汁各四兩青鹽二兩朱砂一兩早蓮草汁二碗白蜜二斤各藥為末入麝香內封固大鍋水煮官香二炷為度取出埋土中七日每取二三兩空心酒湯任下日二次養精養氣養神(入門)

一醉不老丹

專養血烏鬚黑髮蓬花蕊生地黃槐角子五加皮各二兩沒石子六個右以木石臼搗碎以生絹袋盛藥同好清酒十斤入淨罇內春冬浸一月秋二十日夏十日緊封罇口浸滿日最

任意飲之以醉為度須連日服令盡酒盡而精
髮白者自黑矣若不黑再製服之神效(醫鑑)

中山還童酒

歌曰中山還童酒人間處處有善緣得遇者便是蓬萊叟○馬蘭子一升埋土三日取出馬蘭根洗切片一升用黃米二斗水煮成糜陳麴二塊為末釀酒于二碗并前馬蘭子共和一

處做酒待熟另用馬蘭子并根一升用水煮十沸入酒內三日每日攪勻去渣隨量飲醉其酒飲盡鬚髮盡黑其酒之色如漆之黑(回春)

經驗烏鬚酒

能變白為黑身輕體健功不可述每年冬十月士癸日面東採橘紅肥大枸杞子二升搗破同好無反酒二斗同成於磁罇內浸二十一日足開封添生地黃汁三升攪勻各以紙三層

封其口俱至立春前三十日開瓶空心燒飲
一盃至立春後髮鬚都黑勿食三白(回春)

烏鬚酒

能變白髮
方見身形

鬚髮黃落

虛損之疾一損損於肺皮聚而毛落宜入物湯(方見虛勞)(保命)○脈強氣弱皮毛枯槁黃者
連中湯(方見虛勞)四物湯亦主之(東垣)○老來髮落鬚長常也少壯有髮落或鬚亦落者大

矣血燥故也宜服地黃酒天門冬膏(方並見身形)○髮燥者胆有怒火也胆合膀胱上榮毛髮風氣
感則使燥汁竭則枯也(入門)○初生兒胎髮或童男女髮洗淨鹽泥固濟火煨為末空心酒下二三

分或入補藥服尤妙(入門)○髮黃落宜榮散三聖膏菊花散匪雲散二仙丸生禿烏雲油金主綠
雲油有一男年少頭髮盡脫用六味地黃丸不久髮生許兩月復舊(回春)○一婦年少髮盡脫不

留一莖脈微強而滑此由厚味成熱濕痰在膈上而熏蒸髮根之血漸枯而脫用防風通聖散去芒硝
惟大黃三度酒炒兼以四物湯酒製合和作小劑煎以服兩月溼熱漸解停藥淡食調養一年而復舊

(丹心)

(丹心)

滋榮散

長毛髮髮落最宜生薑焙乾入參各一兩右細
末生薑切片煎藥髮落處擦之日二次(瑞竹)

三聖膏

治髮髮落脫能令再生附子剉子柏子仁各五錢右為末烏雞脂和
勻搗乾薑凡合內封固百日取出塗落處三五日即生新髮(湖目)

菊花散

治髮髮黃燥能令黑潤甘菊剉子側柏葉川芎白芷細辛桑白皮早蓮
根並花葉各一兩右剉每二兩漿水三椀煎至二椀去滓洗鬚髮(丹心)

平雲散

治鬚髮黃白一兩右剉每二兩漿水三椀煎至二椀去滓洗鬚髮(丹心)
細辛各等分右為末蜜和如饅大常於木炭內培養勿令離皮用時以熱酒化開塗之(丹心)

二仙丸

治髮脫落神效側柏葉焙乾八兩當歸全身四兩右不犯鐵
為末水糊和丸梧子大酒或鹽湯下五七十九日再(醫鑑)

生禿烏雲油

能生鬚髮川椒白芷川芎各一兩蔓荊子零陵香附子各五錢右麝末
入絹袋浸香油一斤中過二十一日取油擦頭工即生新髮(類聚)

金主綠雲油

能生髮蔓荊子沒石子踴躑躅花訶子皮白芷洗香附子防風麝盆子生地黃零陵香芒硝早
蓮草丁香各一錢半桑椹三錢右剉袋成浸清油八兩中封過七日取擦頭上日三(類聚)

染白烏鬚髮

宜秘傳烏鬚髮方早蓮膏
烏雲膏烏鬚髮方早蓮膏

秘傳烏鬚方

五倍子不拘多少槌碎去灰入砂鍋內炒烟盡為度以青布巾打濕扭乾布裹腳踏成餅為
末每用一錢半○烏黑鬚即炒黃好細鈎四兩當歸尾一兩為末白芨末一兩三味攪勻每

用一分半。○紅銅末不拘多少。火內燒極紅。投入水碗中。取出再燒。再投。取水內自然之末。用水淘淨。醋煮數沸。至乾。隨炒黑色。每用一分半。○明白礬末一分半。青鹽一分。二釐。浸石子二釐。半。訂子肉二釐。半。二味俱用。麝香入砂鍋內。將桑炭同拌炒。至焦。乾石為末。用濃茶調勻。以酒盞成貯。用藥杵注水。煮如糊。先將兒角水洗淨。鬚髮然後塗。簪包裏一夜。次早洗去。以胡桃油塗之。令潤。(醫鑿)

外染烏雲膏

五倍子製五錢。銅末製二錢。白礬白鹽各一錢。半。浸石子二個。鈔炒黃色。右為末。濃茶調重湯煮。見黑色。如上法用。即黑。(種杏)

染鬚方

大烏龜一個。破一二日。將飯與肉骨。果子燻火之。食飼之。三五月後。夜間以漆盞取之。用竹片置盂口。令通氣。外放燈一盞。盂內熱龜自撒尿。急則只麻油。烟更鼻。亦即尿。先用五倍子末。放醋如膠。若龜尿得一小鍾。入五倍醋。半鍾。入磁器。收一滾角。雖收貯。以新筆略蘸。搽鬚。多用而黑。(八門)

烏鬚髮方

大水蛭二個。放磁椀中。餓一七日。取烏骨。雄雞血。以松烟墨。濃磨汁。傾入。猪尿胞內。任水蛭吮飽。將針刺。蛭流出血。汁塗鬚髮。留根二分。其汁浸漬入肉。鬚髮一年。茂黑。且柔軟。極妙。(丹心)

早蓮膏

烏精黑髮。如神。早蓮草十六斤。六月下半月。七月上半月。採取。不許水洗。扭乾。取汁。對日晒。過午。日空心好酒一鍾。藥一匙。調服。午後又一服。至二十一日。將白者。搗去。即生黑者。(醫鑑)

髮宜多柳

髮是血之餘。一日一次梳。(新聚) 髮多梳。則至二十一日。將白者。搗去。百二十為數。(延壽)

髮占凶證

病人髮直如麻者。十五日死。○病人髮如乾麻。善怒者死。○病人髮與肩衝氣者死。(病鶴)

單方

凡十

針砂

染白髮。今黑。取二錢。醋浸七日。取晒乾。炒黑。入浸石子一個。為末。搽如上法。(本草)

地黃

就熟二種。皆黑精。髮良藥丸。服或釀酒服之。並佳。(本草)

牛膝

止髮白。直服或釀酒服之。佳。(本草)

旱蓮草

長精。髮令變白。為黑。六月採。取汁入薑汁。蜜熬為膏。每一匙。酒服。(本草)

半夏

治眉髮落。不生。先用生薑搗三次。後半夏生。為末。麻油調塗之。即生。(八門)

竹瀝

男女粘髮。或因油膏而粘。滯者。取竹瀝塗之。即解。和少鹽。无抄。(野語)

何首烏

黑鬚髮末。或丸服。或釀酒服。皆佳。(本草)

芭蕉油

長髮。令人髮落。塗之。長髮令黑。(本草)

槐實

久服。令鬚髮不白。服法詳見身形。(本草)

母丁香

以生薑汁研。搗去白。髮塗孔中。即生黑髮。又白。髮塗孔中。亦生黑者。(本草)

黑桑椹 變白髮 醱酒服之佳 又取一斤和科斗一升 瓶風封口

胡桃 外青皮和科斗為泥 染白髮 髭黑如漆 (本草)

白鴿粉 治頭上白禿 齋取真為末 以酸油洗了香油調付 (本草)

胡麻 生取油塗頭 生禿髮 又烏麻 九蒸九曝 為末 糞膏丸服 令白髮 運黑 又取葉煎湯 沐頭 長髮 (本草)

蔓菁子 壓取油塗頭 能變髮 今人呼斑髮為斑髮 (本草)

羊糞 治髮落 燒灰 淋汁 沐頭 令易生 而黑 又髮落 落黃和腐膏 付三宿 即生 (本草)

熊脂 主頭禿 生白禿 齋髮落 常塗之 令生髮 且長黑 (髮落能腦 勳作油塗之) 髮黃落 熊脂亦常塗之 (本草)

猪鬃膏 主髮落 取臘月者 火上烱化 塗之 即生髮 薄不生亦宜 (本草)

前陰

前陰屬宗筋 內經曰 前陰者 宗筋之所聚 太陰陽明之所合也 註曰 宗筋 挾臍下 合於陰器 太陰脾 脈陽明胃脈皆輔近宗筋 故云今也 ○宗筋謂陰毛中橫骨上下之豎筋也 (內經)

前陰諸疾 前陰諸疾 皆由足厥陰與督脈經曰 足厥陰之脈入毛中 過陰器 抵小腹 是肝脈所過也 又曰 腎脈者 起於小腹 以下骨中央 女子入繫挺 孔循陰器 男子循莖下 至臬與女子等 是督脈所過也

任脈起於中極之下 以上毛際 循腹裏 至咽喉 任脈為病 男子內結 七疝 女子帶下 瘕聚 (靈樞) ○陰

腫陰 痿陰 瘰陰 挺陰 諸本腎陰 蝕瘡 腎藏風 皆前陰之疾也

疝病之因 內經曰 疝在小腹 腹痛 不得大小便 病名曰疝 得之寒 ○疝者 寒氣結聚之所為也 (靈樞) 一病者 疝九連 小腹急痛也 (舉陰丸也) 一有痛在臬丸者 有五樞穴 邊者 皆足厥陰之經也 或有形

或無形 或有形如蛙 有形如瓜 瓜素問以下 皆以為寒理 固然也 子思之 此病始於溼熱 在經鬱而久 又感寒氣 外束 所以作痛 若只作寒論 恐為未備 人有踢冰 涉水 終身不病 此者 無熱故也 蓋大怒

則火起於肝 醉飽則火起於胃 房勞則火起於腎 火積之久 母能生子 虛溼氣便 感厥陰屬木 係於肝 為將軍之官 其性急速 火性又暴 為寒所束 宜其痛之太暴也 有以烏頭 梔子 作湯 服之 其效亦敏 然

溼熱 又須分多少 而治溼者 腫多 積病是也 (丹心)

脈法

內經皆以滑脈為病 (八門) ○心脈得滑急 為心疝 肺脈沈搏 為肺疝 腎脈肝脈大急 沈皆為疝 (內經) ○肝脈滑甚 為積疝 心脈微滑 為心疝 腎肝滑甚 為瘕疝 (內經) ○腎脈大甚 為陰瘕 (綱目)

脈急者曰痲瘋小腹痛(內經)○三陽急為痲三陰急為痲註曰太陽受寒血聚為痲太陰受寒氣聚為痲(內經)○腎脈小急肝脈小急心脈不鼓皆為痲註曰小急為寒甚不鼓則血不流故血內凝而為痲(內經)○痲脈強急積聚在裏字急者生弱急者死沈遲浮溢痲寒痲痛甚則伏或細或動(脈訣)○寸口脈強而緊強相搏則為寒痲(正傳)○婦人少陰脈滑而數者陰中生惡少陰脈浮而動浮則為虛動則為痛婦人則陰脫下(脈經)

痲瘋

痲瘋主肝 痲瘋主肝經與腎經絕不相干(丹心)○痲痛屬足厥陰肝經也小腹痛亦肝經也故痲痛與小腹痛同治法(綱目)○局方多以小腸氣勝既氣腎氣者亦自其標本而言其實主於肝也蓋肝脈環陰器而上入小腸又肝腎皆屬於下與衝任督脈相附腎與膀胱為歲府其氣相通運為外腎至於丸此三經相連相會然肝主筋丸雖名外腎非厥陰環而引之則與玉莖無由伸縮在女子則為巢戶(陰門也)靈樞云邪在小腸連等系屬於非貫肝肺絡心系氣感厥逆上衝腸胃熏肝散於背結於臍惟取厥陰以下之亦以厥陰為主也(入門)

痲病有七

痲病有七 痲名雖七寒痲即痲之總名也水痲即痲之屬氣痲即痲之屬血痲即痲之屬惟痲痲字見之蓋下疔瘡之屬也(綱目)○七痲者寒痲水痲筋痲血痲氣痲痲痲痲是也(子和)曰痲曰奔豚曰小腸氣曰膀胱氣通謂之腎氣(直指)○痲有四種曰腸痲曰卵痲曰氣痲曰水痲(千金)○痲之中有木腎者有漏墜者(入門)○陰痲屬肝系宗筋胃陽明養之世多不識謂之外腎非也(三因)○又有七痲一曰痲痲二曰痲痲三曰寒痲四曰氣痲五曰壘痲六曰附痲七曰痲痲(聖惠方無證)○戴氏曰痲本屬厥陰一經俗說小腸膀胱腎氣者妄言也(丹心)

寒痲

寒痲 凡囊冷結硬如石陰莖不舉或控舉丸而痛得之生時溼地或寒月涉水或值雨雪或生卧風冷使內過房宜以溫劑下之久而無子(子和)

水痲

水痲 凡腎囊腫脹陰汗出或囊腫狀如水晶或毒毒出黃水或小腹按之作水聲得之於飲水醇酒使內也勞汗出而遇風寒溼之氣聚於囊中故如冰冷令人為卒痲宜以逐水之劑下之(子和)

筋痲

筋痲 凡陰莖腫脹或瀉而為膿或急筋痛或莖中作痛痛極則癢或挺縱不收或出白物如精隨洩而下得之於房室勞傷及邪術所使宜以降心火之劑下之(子和)

血痲

血痲 凡狀如黃瓜在小腹兩傍橫骨兩端約紋中俗名便癩得之於重感春夏大燥勞於使內氣血流溢滲入膠囊留而不去結成癰腫膿少血多或值情慾當泄不泄亦成此疾宜以和血之劑下之(子和)

氣痲

氣痲 其狀上連腎俞下及陰囊多得於驚突忿怒氣鬱而脈脫哭怒罷即氣散者是也有一治法以針出病陰囊精法強力入房因而有子稟胎病也此證難治惟藥漬一穴灸之而愈者(子和)

狐疝

其狀如仰瓦卧則入小腹行立則出小腹入囊中如狐晝出穴而尿夜入穴而不尿此疝出入往來上下正與狐同類也與氣病大同小異宜以逐氣流煙之劑下之(子和)○狐疝卧則入腹立則出腹偏入囊中者是也狐夜伏而晝見以病處厥陰之分即人之陰囊隱奧之所覆下而夜上故以俗名焉(綱目)

瘻疝

其狀陰囊大如升斗不痛者是也得之於地氣卑溼故江淮之間多有之宜以去濕之劑下之如升(斗者)是也(綱目)○瘻疝腫痛硬如石婦人陰門挺出亦稱瘻疝小兒生來有此者乃胎中宿疾也(三因)○瘻有兩種腸疝疝痛甚則陰縮服冷囊上生瘡二證出水不止者死○氣瘻素有溼熱墜腫癢○卵瘻玉莖腫硬引腸絞痛甚則陰縮服冷囊上生瘡二證出水不止者死○氣瘻素有溼熱因起溼火昏眩手搖面黑等丸能左右相連○水瘻外腎腫大如升如斗不痛不癢俗呼膀胱氣也(入門)○疝下疝痛連腰背控引凡而痛者謂之小腸氣○小瘻瘻瘻痛者名曰瘻(入門)

疝病證候

內經曰小腹控引腰脊上衝心唾出清水及為噦嗝邪在小腸也○靈樞曰腎脈生病從小腹上衝心而痛不得前後為衝疝○小腹痛有三肝病小腹引脇痛小腸病小腹引疝引腰脊痛膀胱病小腹引腰脊痛不得小便(綱目)○疝之為病外腎小腹作痛或攻刺腰脇或遊走背脊或冷氣搶心或手足展冷有壯熱惡寒者有洒淅惡寒者有不得大小便者有下泄者有自汗者有積聚如莖如臂如桃李如盤大其於陰間則卵有大小而上下不常量有腫脹痛歇無定挾冷觸熱則塊物上衝心胸心平氣和則塊物歸入囊中(直指)

諸疝治法

疝痛屬溼熱痰積流下作病因寒鬱而發也(丹心)○疝痛之證古方用辛溫之劑以散之是治其標也丹溪以為痰飲食積死血流注歸於厥陰肝經用辛平之藥以豁痰消積破血是治其本也夫疝痛有定處是有形之積也非痰飲與食積死血相聚而何哉若是無形之氣作痛則走注滿腹而流散於遍身矣(方廣)○治法大要以使大小府秘而通邪氣入腹衝心危殆必矣(直指)○凡若不遂去病根病何由愈倘或姑息補住使大小府秘而通邪氣入腹衝心危殆必矣(直指)○凡疝痛走注無形者屬氣也痛有常處而有形乃濕痰食積瘀血也(入門)○此疾雖因虛而得不可以虛藥稱經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病即實故必先瀉去所蓄之邪然後補之諸藥多備已虛氣者蓋為此也(本事)○疝有扶虛而發者其脈不甚沈緊而豁大無力者是也其痛亦輕惟覺重雙牽引耳當以參朮為君疎導藥佐之疏導即桃仁山查枳實梔子茱萸川椒玄胡

寒疝藥

宜萬功散(方見下門)加末五苓散下青木香丸蠟蔥散當歸四逆湯羊肉湯烏頭桂枝湯三因蔥白散四神丸

加味五苓散

治寒疝本方(方見寒門)加木香茴香川椒子楝椒黑丑

青木香丸

治寒疝及膀胱疝氣黑丑頭末三兩破故紙華澄茄檳榔各二兩青木香一兩右為末水丸梧子大空心鹽湯下五十九丸（入門）○一法青木香丸二百粒斑斑七個同炒令微香以磁

罌蓋之候冷去貓每五十九丸尚香酒吞下蓋疝屬肝故備貓以治風（入門）

蟠蔥散

治脾胃虛冷心腹攻刺連胸膈膀胱小腸腎氣作痛蒼朮甘草各一錢三棱蓬朮白茯苓青皮各七分縮砂丁香皮檳榔各五分玄胡索肉桂乾薑各三分右為末作一貼蔥白一莖煎服（入門）

當歸四逆湯

治寒疝臍下冷痛當歸一錢二分附子肉桂茴香各一錢白芍藥柴胡各九分玄胡索川椒子茯苓各七分澤瀉五分右剉作一貼水煎空心服（綱目）

羊肉湯

治寒疝臍腹脹痛手不近羊肉一斤生薑五兩當歸三兩右水八升煮取三升每服七合日三服○一婦冬月解產寒入產門臍腹脹痛手不近服此湯二服即愈（仲景）

烏頭桂枝湯

治風寒疝氣入腹刺痛陰縮手足逆冷大川烏一個用蜜一盞同煎減半取出細切肉桂白芍藥各三錢三分甘草二錢半右剉分二貼入薑三棗二及煎前蜜半合同煎服（入門）

去烏頭代附子名為蜜附湯（得效）

三因蔥白散

治寒冷氣入膀胱作痛川芎當歸熟地黃白芍藥枳殼厚朴蓬朮三棱赤茯苓肉桂乾薑人參川椒肉神麩麥芽青皮茴香木香各五分右剉作一貼蔥白二莖鹽一匙煎服（三因）

四神丸

治冷疝脹痛吳茱萸一半酒浸一半醋浸焙乾華澄茄青木香各五錢大香附一兩右為末糊丸梧子大鹽下七八十九丸（丹心）

水疝藥

宜禹功散三花神祐丸（方並見下門）腰子散秘傳茱萸內消丸（方並見下門）腰

腰子散

治水疝腫痛黑丑白芨等分並炒取頭末右末三錢取猪腰子一個薄批入川椒五十粒茴香百粒以牽牛末遍炒之溼紙包裹以線扎定煨令香熟取出空心溫酒嚼下取下惡物使愈（直指）

秘傳茱萸內消丸

治疝氣及陰腫偏大或生瘡出水黃水吳茱萸半酒半醋浸一宿焙乾山茱萸馬蘭花醋浸焙川椒肉桂黑丑頭末茴香鹽炒玄胡索炒陳皮青皮並去白海藻洗去鹹焙挑

仁炒白茱萸炒木香各五錢右為末酒糊和丸梧子大鹽湯或溫酒下五七十九丸（直指）

牡礬丹

治陰囊生瘡出水其瘰甚苦按之無足後必自痛牡蠣粉黃丹各二兩枯白礬四兩為末遇夜用手捏藥於瘰處擦之連擦三四次自斂平復（入門）

筋疝藥

宜瀉心湯（方見五藏）加減柴苓湯清心蓮子散（方見消渴）龍膽瀉肝湯

龍膽瀉肝湯

治肝熱瀉熱男子陰挺腫脹婦人陰挺瘡癢或陰莖溼癢出膿水此因酒得之龍胆草柴胡澤瀉各一錢木通車前子赤茯苓生地黃當歸並酒拌山桅仁黃芩甘草各五分右剉作一

貼水煎空心
服(入門)

加減柴苓湯

治諸症因濕熱腫痛出水柴胡澤瀉各一錢半夏赤茯苓白朮猪苓山查
梔子荔枝核各七分右剉作一貼水煎服無荔枝核則代橘核(入門)

血痢藥

宜玉燭散(方見胞門)桃仁承氣湯(方見寒
門)復元通氣散(方見氣門)神聖代針散

神聖代針散

治血積疝痛及諸症刺痛服之神效乳香沒藥當歸白芷川芎羌青製各一錢右為末每
服一字甚者五分先點好茶一盞次將藥末在茶上不得吹攪立地細細呷之(正傳)

氣痢藥

宜蕩痢丸蟠蔥散(方見上)

蕩痢丸

治氣痢黑丑頭末破故紙炒茴香炒川練子炒各一兩蓬朮木香各四錢
青皮陳皮各三錢右為末酒糊和丸梧子大空心酒下五七十丸(醫鑑)

氣痢飲

治氣痢黃連以吳茱萸煎水浸炒二錢人參白朮各一錢白芍
藥陳皮各七分甘艸三分右剉作一貼薑三片水煎服(入門)

三茱丸

治氣痢腫痛山茱萸吳茱萸食茱萸各二兩破故紙炒一兩七錢川練肉一兩斑貓十四個同炒
赤去貓黑丑頭末炒一兩青鹽青皮茴香炒各三錢右為末醋糊和丸梧子大先嚼桃仁十五
粒以溫酒或鹹湯下

三五十九丸(丹心)

聚香飲子

治七情所傷遂成疝氣乳香沈香白檀香木香藿香丁香各八分玄胡索
薑黃烏藥桔梗桂心甘草各四分右剉作一貼薑三葉二水煎服(入門)

狐疝藥

寒濕下注于囊中名為狐疝亦屬疝病二陳湯(方見痰飲)加青皮香附蒼朮(入門)
宜服二香丸又丁香陳寶丸四妙川練丸茴香陳寶丸皆可通用(三方見下)

二香丸

治疝疝上下出入作痛或疝痛作則腹內塊痛止痛止痛止則腹內塊痛復作本香附子各三兩
山查肉二兩三稜蓬朮並醋煮神補薑黃南星各一兩黃連與吳茱萸同炒蘿蔔子桃仁梔子仁
橘核炒各五錢右為末薑汁浸蒸研和

丸梧子大白湯下五七十丸(丹心)

癰疽藥

大抵癰疽屬濕多(辨日)○癰有四種一曰腸疔一名小腸氣宜天台烏藥散救命通心散去鈴丸
加味通心散瀉痛丸消疝丸立效散○二曰卵疔即水疝之類藥亦同○三曰氣疔即氣疝藥亦同

○四曰水疔即膀胱氣宜青木香丸(方見上)三花神祐丸(方見下門)神保丸治膀胱氣腫下疝最
妙(方見氣門)三白散四味茴香散菜芡內消丸楊氏麝香丸金鈴散三疝湯○疝瘻中有偏隆有木

腎別立條○瘻病通
用橘核丸橘核散

天台烏藥散

治小腸氣川椒子十個巴豆十四粒同炒黑色去豆殼不用烏藥木香茴香炒
良薑青皮各五錢檳榔三錢右細末每一錢溫酒調下痛甚炒薑熟酒下(東垣)

救命通心散

治小腸氣痛川烏一兩以青鹽一錢酒一盞浸一宿去皮尖焙乾川椒子肉一兩以巴豆肉
二十一粒同炒黑色去豆茴香五錢石熱一對火煨醋淬土狗五枚芥子一錢六分右為末

每三錢入羊石子內酒煎熟夜半時好酒半升入鹽細嚼
嚼石子以酒煎下不得作聲小便大利其病即去(綱目)

去鈴丸

大治小腸氣茴香一片以生薑一斤取自熟汁浸一宿約薑汁盡入茴香然後入青鹽二兩同
炒赤取焙燥為末酒糊丸梧子大每服五十丸溫酒米飲任下此藥全實脾胃且有鹽能引入

下部有薑汁專一發散而無
疎導之害服之累效(入門)

加味通心散

治小腸氣熱痛小便不通瞿麥木通梔子黃芩連翹枳殼川椒子
甘草各一錢右剉作一貼燈心二十莖車前草五葉同煎服(得效)

蠲痛丸

治小腸膀胱氣痛玄胡索一兩川棘肉茴香炒各五錢白芷頭末炒當歸良薑青皮木香烏藥
各二錢半全蝎焙七個右為末薑汁浸蒸餅和丸梧子大燒罇反調酒送下三五丸(直指)

消疝丸

治小腸氣氣蒼朮一斤泔浸切片蔥白一斤切和鹽一兩同炒黃去蔥川椒微炒
白茯苓茴香炒各四兩右為末酒糊和丸梧子大空心溫酒下五七十九(集略)

立效散

治小腸氣痛全蝎七個縮砂三七枚茴香一錢
右為末分三貼熱酒調下空心即效(資生)

茱萸內消丸

治膀胱腎虛結成寒症偏墜引痛及小腸奔豚癰等證山茱萸川椒子吳茱萸馬蘭花茵
香青皮陳皮山藥肉桂各二兩木香一兩右為末酒糊和丸梧子大酒下五十丸(入門)

楊氏麝香丸

能尋諸處痛凡膀胱氣痛下痛最難治此藥主之木香胡椒各一兩全蝎炒巴豆霜各四錢
麝香一錢右為末蒸餅和丸麻子大朱砂為衣熟水下五七丸(直指)神保丸同無麝香

金鈴散

治膀胱小腸氣腫痛大川椒子三十枚取肉切片巴豆肉三十粒作片同炒色焦去巴豆右以茴
香炒與川棘肉等分并入木香二錢半右為末每二錢水酒各半煎蔥白湯調下空心(直指)

三疝湯

治膀胱氣腫痛車前子二錢四分茴香一錢六分蔥
白一錢二分沙參八分右剉作一貼水煎服(集效)

橘核丸

治四種疝疝卵核腫脹偏有大小或硬如石或小腹絞痛甚則囊腫潰爛出黃水橘核炒海藻鹹
酒炒昆布鹽酒炒海帶鹽水洗桃仁炒川椒子炒各一兩玄胡索炒厚朴枳實柱心木香木通

各五錢右為末酒糊和丸梧子大溫酒或鹽湯下六
七十九(入門)久不消加醋煮砂二錢(得效)

橘核散

治四種疝久者用橘核丸新者用橘核散橘核一錢半桃仁十五枚梔子仁一錢川烏炮吳茱
萸各五分右各炒為麝末作一貼水煎服(丹心)橘核單止痛烏頭散寒對山梔除濕熱又引

烏頭運下不令胃中停

留用之甚捷(入門)

三白散

治膽脹氣盛熱陰囊腫脹大小便不通白且頭末一兩桑白皮白朮木通陳皮各二錢半右為末每二錢薑湯或蔥白湯調下(得效)

四味茴香散

治囊莖抽痛不可忍俗名小腸氣烏藥酒浸一宿焙良薑茴香青皮各一兩右為末每二錢發時熱酒調下(入門)

陰卵偏墜

陰卵一邊腫大偏墜牽引或痛古方謂之卵疝宜金鈴子丸菜萸內消丸馬蘭丸茴香安腎湯加茴香芥散○偏左多瘀血怒火偏右多溼痰食積(入門)

金鈴子丸

治疝氣偏墜痛不可忍川楝子肉五兩剉作五分一用斑貓十個同炒去貓二用茴香三錢鹽半錢同炒去鹽留茴香三用黑丑三錢同炒去黑丑四用破故紙三錢同炒留故紙五用蘿蔔子一錢同炒去蘿蔔子右為末酒糊和

丸梧子大溫酒下三五十丸(瘡瘻)

菜萸內消丸

治陰疝偏大瘻囊腫脹或生瘡瘍時出黃水川楝肉一兩半大腹皮五味子玄胡索海藥各一兩二錢半桔梗青皮山菜萸各一兩木香七錢茴香桂心川烏炮吳茱萸食茱萸桃仁各

五錢右為末酒糊和丸梧子大溫酒下三五十丸(得效)

馬蘭花丸

治疝症偏墜及婦人陰疝小兒偏墜無有不效即上橘核丸加馬蘭花一兩檳榔五錢也服法亦同(正傳)

茴香安腎湯

治左邊偏墜丸如雞鴨子大人穿白朮白茯苓茴香破故紙檳榔烏藥使香附縮砂荔枝核各八分黃柏澤瀉各六分木香玄胡索各四分升麻甘草各二分右剉作一貼煎服(醫鑿)

加減香苓散

治偏墜氣初起壯熱增寒乃發表分利藥也一服而愈枳殼陳皮香附子蒼朮麻黃猪苓澤瀉木通滑石車前子三錢連虎川楝子玄胡索甘草各七分右剉作一貼入生薑三片蔥白

二莖水煎服(醫鑿)

木腎

木腎之證脹大作痛頑痲結硬治法當溫散溫利以內消之又有墜墜跌傷驚氣與敗血交攻亦有木強脈痛之證治法更為之消療宜川楝散(直指)○木腎者陰莖堅硬頑痲不痛乃心火不降腎水不

溫宜四製菜萸丸四炒川楝丸(二方見下)散血攻入者當消瘀血(入門)○木腎不痛宜活腎丸(入門)○清渴木腎一名強中無治法 詳見清渴

川練散

治外腎腫大痲木痛硬謂之木腎又治奔豚疝氣偏墜川楝子四十九個先切七個取肉以茴香二錢半同炒併留又切七個以破故紙二錢半同炒併留又切七個以黑丑二錢半同炒併留又

切七個以鹽一錢同炒併留又切七個以狂狗十四個同炒去貓又切七個以巴豆肉十四個同炒去巴又切七個以蘿蔔子二錢半同炒去蘿蔔子乃入下藥茴香炒木香各五錢辣桂二錢半右為末酒糊

糊和丸梧子大空心鹽酒下三五十丸○瘰癧木腎以前方
加玄胡索五錢略炒刺之以沒藥末和溫酒吞下(直指)

活腎丸

治木腎不痛蒼朮鹽炒一兩黃柏酒洗枳實滑石各七錢南星炮半夏製山查肉神鶴炒白芷各五錢昆布吳茱萸各三錢右為末酒糊和丸梧子大鹽湯下七十九一方無枳實有枸杞子(入門)

門)

奔豚疝氣

積因傷寒之邪衝突下焦致其發動如江豚之奔衝也大抵真氣內虛水結不散氣與之搏即發奔豚雖有發表攻裏之強汗之下之皆不可也理中湯(方見寒門)加肉桂及赤茯苓去白朮主之蓋桂能泄奔豚茯苓能伐腎邪故也白朮助土尅水燥腎閉氣是以去之(丹心)○奔豚氣衝心宜奪命

丹胡蘆巴丸

一搜金散

奪命丹

治奔豚疝氣上衝小腹引痛神效吳茱萸一斤內四兩酒浸四兩醋浸四兩白湯浸四兩童便浸並焙乾澤瀉二兩右為末酒糊和丸梧子大空心鹽湯下五七十九(局方)○入門一名四製

丸 茱萸

胡蘆巴丸

治奔豚疝氣上衝痛不可忍茴香炒三兩白丑頭末二兩川烏炮巴戟吳茱萸各一兩半川楝子胡蘆巴各一兩右為末酒糊和丸梧子大空心酒下二三十丸(直指)

一搜金散

治奔豚疝氣上衝及小腸氣腫脹大瀉玄胡索川楝肉全蝎炒茴香炒右為末每二錢熱酒調下神驗(正傳)

陰縱陰縮

受寒入腹內也經曰足厥陰之筋傷於內則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收是也(綱目)○陰囊垂縮有寒有熱夫熱在外寒在內則囊垂此九夏之氣也寒在外熱在內則囊縮此三冬之氣也以不病人論之夏暑大熱囊卵垂垂冬天大寒急縮收上蓋冬天陽氣在內陰氣在外故寒

在外則皮急皮急則囊縮夏月陰氣在內陽氣在外故熱在外則皮緩皮緩則囊垂此痛病之象至於傷及熱病熱入厥陰則囊卵縮者熱傷筋筋急故也凡火灼則筋急亦其類也(綱目)○陰縮在女子

則陰戶急痛引小腹疼(入門)○男子陰挺腫脹陰垂諸疾通用龍膽瀉肝湯(方見上)○陰囊縮詳見傷寒門及霍亂門可參考○一少年玉莖挺長腫而痿皮塌常潤磨股難行兩脇氣逆上手足倦弱

先以小柴胡湯(方見寒門)加黃連大劑行其溼熱少加黃柏降其逆上之氣腫漸收以綠瓜汁調五倍子末付之而愈(丹心)

其逆上之氣腫漸收以綠瓜汁調五倍子末付之而愈(丹心)

脫陽證

詳見救急

陰痿

陰痿昏耗散過度傷于肝筋所致。經云足厥陰之經其病傷于內則不起是也。(綱目)○陰痿乃七傷之疾。虛勞門參考。○陰痿宜還少丹五精丸上丹。歸納補天丸固本健陽丹。(方見婦人)九仙靈應散。

還少丹

治下部脈微細陰痿不起。熟地黃枸杞子各一兩。半山藥牛膝遠志山茱萸巴戟白茯苓五味子。石菖蒲肉蓯蓉楮實子杜仲茴香。右為末。蜜和。東肉為丸。梧子大空心溫酒或鹽湯下。三五十丸。

(集略)○亦有鬱火甚而致痿者。非還少丹所能起。當服黃柏知母清火堅腎之藥。(節齋)

五精丸

治腎虛陰痿。秋石鹿角霜白茯苓陽起石山藥各等分。右為末。酒糊和。丸。梧子大。每服五十丸。常近火氣使乾。燥服之。無惡膈之患。(丹心)

上丹

治勞傷虛損。男子絕陽。庶事不興。五味子八兩。蛇床子兔絲子百部根杜仲白茯苓防風巴戟肉蓯蓉山藥遠志。枸杞子柏子仁各二兩。右為末。蜜丸。梧子大空心溫酒或鹽湯下。五七十丸。(局方)

歸納補天丸

治虛損陰痿。胡桃仁參白茯苓枸杞子當歸川芎茴香各一兩。半木香茯神甘草蜜炙各一兩。沈香五錢。右為末。用歸納製酒煮稠。糊和丸。如梧子大。空心溫酒或鹽湯下。五七十丸。(入門)

九仙靈應散

治男子陰溼陽痿。每逢不舉。附子炮蛇床子紫梢花遠志石菖蒲海螵蛸丁香木藍子各二錢。小腦一錢。半右。蠶末每五錢。水三椀。煎至一椀。半溫酒洗。溼處并陰囊。日二次。留水再溫洗。

多洗尤好。
(回春)

陰冷

下部陽虛。陰冷如冰。宜八味丸。(方見五藏)加減內固丸。十補丸。吳茱萸湯。清魂湯。回春散。助陽散。○一層病。氣冷。氣上貫齒。下貫腎。繫若繩。挽兩。墨時。癰而冷。戴人診兩手脈細而弱。斷之曰秋。肺也。此因

金氣在上下。伐肝木。木畏金。抑而不伸。故病如是。肝氣壅滯。不能下榮於辜。丸故其寒實非寒也。木受金制。傳之胃土。胃為陽明。故上貫齒。肝木者。心火之母也。母既不伸。子亦屈伏。故下冷而水化乘之。經

曰木鬱則達之。土鬱則泄之。令瀉泄。四次。果覺氣和。等丸。痿而燥。戴人曰。氣已入。中矣。以茴香。蓬朮之藥。使服之一月而愈。(子和)

加減內固丸

治命門火衰。腎寒。陰痿。元陽虛。德巴戟肉。菴蓉。山茱萸。兔絲子。各三兩。破故紙。二兩。半。石斛。胡蘆。巴各二兩。茴香。一兩。附子。五錢。右為末。蜜丸。梧子大。溫酒或鹽湯下。五七十丸。(入門)

入門

十補丸

治寒疝。陰冷。及小腸。膀胱。奔豚。等證。附子一兩。防風一兩。刺如豆。大鹽四兩。黑豆一合同。炒。附子。製去。諸藥。只取。附子。胡蘆。巴。木香。巴。戟。川。棘。肉。肉。桂。玄。胡。索。華。澄。茄。茴。香。炒。破。故。紙。炒。各。一。兩。右

為末。糯米粉。酒。打。糊。和。丸。梧子大。朱砂。為。衣。酒。下。五。七。十。丸。(丹心)

吳茱萸湯 治厥症上逆陰冷囊寒川烏細辛各七分半吳茱萸五分
良薑當歸乾薑肉桂二分半右剉作一貼水煎服(正傳)

清魂湯 治外腎冷前陰痠陰囊溼癢柴胡酒黃柏甘草各一錢升麻澤瀉各七分半當歸梢羌活
麻黃根防己龍胆草赤茯苓各五分紅花一分五味子九粒右剉作一貼水煎服(東垣)

回春散 治陰冷如神○歌曰一錢白薑八分丹(黃丹也)二分胡椒細細研煨確一分共四味好醋調和
手內攤○又歌曰男左女右合陰處摩身是汗溼衣衫此方用者如神效不羨之人不可傳(醫

鑿一)

助陽散 治急陰冷乾薑牡蠣各一兩右為末以燒酒調
細搽手上用雙手揉外腎婦人揉兩乳(醫鑿)

陰腫 陰囊腫大或不痛即水積之類新發者宜三白散核散久者宜橘核丸(三方見上)○陰腫偏大或痛壯癩根粉
散(方見寒門)合三疝湯(方見一)乾薑炮末一兩水調如糊塗病處即愈(本草)○陰腫宜用蠲退散○小兒外腎腫大壅滯通明牡蠣

粉津唾調塗又地龍黃薄荷汁調塗蔥白汁甘草汁皆可(本草)○大人小兒陰腫硬痛地龍不去土
為末蚯蚓糞等分以雞子清調付患處燒
巾包裹登時縮上即洗去如神(檀杏)

蟬退散 治陰囊忽腫大多因生地觸風溼或蟲蟻吹着蟬蛻五錢
水洗腫處再三次服五苓散合三疝湯如上法(得效)

囊癰 詳見
癰疽

陰囊濕癢 陰囊溼癢調之腎藏風人之精血不足內為嗜慾所耗外為風冷所乘風溼毒氣從虛而入囊下
溼癢或生瘡皮脫下注則兩脚生癢癩或耳鳴眼昏宜活血驅風散痰藥散四生散乳香龍骨散

烏頭丸粉
散(直指)

活血驅風散 治腎藏風囊下溼癢脚生瘡癩白蒺藜炒當歸川芎白芷細莘桃仁半夏槐潤白芍藥五靈
脂甘草生各六分蒼朮杜仲桂皮薑汶仁天麻橘紅檳榔厚朴枳殼各三分右剉作一貼薑

五葉二水煎入乳香末少許空心服之
乳香以佐心氣使心腎相交也(直指)

蒺藜散 治癩風上攻耳鳴目眩下注陰濕瘡癩草烏水浸三日逐日換水去皮晒乾白蒺藜炒各五錢
白芷白附子生蒼朮炒荆芥穗各二錢半右為末末糊和丸梧子大鹽酒下三五十九(直指)

四生散 治腎藏風脚生瘡癩或兩耳鳴癢白蒺藜黃耆獨活白附子各等分右為末每二錢薄荷酒
調下○或以猪腰子批開入藥末二錢合定裏煨香熟空心細嚼以鹽酒送下即差(局方)

乳香龍骨散

治外腎濕癢淫爛如龜龍骨石膏生五倍子各二錢半白芨乳香黃丹各一錢二分半麝香少許右為末先以苦參大腹皮紫蘇葉煎湯溫洗後將付(東垣)

烏龍丸

治腎藏風下注生癰癩川烏草烏各一兩以黑豆半升煮透軟去皮臍切晒乾入白附子天麻地龍各五錢右為末酒糊和丸梧子大空心鹽湯吞下三五十九(本事)

板粉散

治陰囊淫癢麻黃根二錢黑狗脊(即貫眾也)蛇床子各一錢川椒當歸梢猪苓各六分斑貓四枚輕粉紅花各少許右為末乾穆避風冷(東垣)

疝痛劫藥

寒疝入腹刺痛及小腸膀胱氣痛劇宜拖附湯○劫疝痛藥烏頭梔子並切炒搗細曬流水入薑汁調服梔子以降溼熱烏頭以破寒鬱昏下焦之藥而烏頭為梔子所引其性急速不容胃中停留也(正傳)○又方桂枝山梔炒川烏細切炒右為末薑汁糊和丸薑湯下三四十丸大能剗痛(綱目)

梔附湯

能剗疝止痛山梔四十九枚燒半過大附子一個炮熟右剗取二錢水一盞酒半盞煮至七分去滓入鹽一撮溫服蓋川烏治外束之寒梔子治內鬱之熱也(綱目)○一名倉卒散

神聖代針散

治諸疝極痛不可忍服之神效(方見上)

諸疝通治

以和心與小腸白朮利腰臍間溼與死血茯苓利膀胱水木得桂則枯故用以伐肝木(入門)○通治宜胡蘆巴丸(方見上)又治小腹有形如卵上下痛不可忍○馬蘭花丸(方見上)茱萸內消丸(方見上)復元通氣散(方見氣門)○通治宜茴香煉膏丸木香金鈴丸丁香煉膏丸四妙川煉丸五

妙川煉丸

烏附通氣湯十味蒼柏散神消散

茴香練實丸

治男子七疝婦人帶下癰聚痛不可忍皆任脈所主治法同馬川練子炒茴香山茱萸吳茱萸茯苓莢青皮陳皮馬齒花芫花各一兩右為末醋糊和丸梧子大溫酒下五十九(丹心)

木香金鈴丸

治諸般疝氣及外腎腫脹痛一服立應乳香沒藥木香附子炮茴香鹽炒川煉丸(醫鑿)

丁香練實丸

治男子七疝女子癰聚帶下當歸附子炮川煉肉茴香各一兩右剗好酒三升煮酒盡為度焙作細末每藥末一兩凡疝氣帶下皆積寒邪於小腸之間故以附子佐之丁香木香為引導也有人患

勻酒糊和丸

梧子大空心酒下兩丸凡疝氣帶下皆積寒邪於小腸之間故以附子佐之丁香木香為引導也有人患

當歸玄胡索和血止痛

疝氣帶下皆積寒邪於小腸之間故以附子佐之丁香木香為引導也有人患

疝痛三年服此三劑

疝痛三年服此三劑

四妙川練丸

治一切疝氣腫痛痛小久服斷根川練肉一斤作四分一分用鉄一合斑貓四十九枚同炒一分用鉄一合巴戟一兩同炒一分用鉄一合巴豆四十九枚同炒一分用鹽一兩茴香一

合同炒並以鼓黃色為度揀去同炒藥只取川練肉再加木香破故紙
炒各一兩為末酒糊和丸梧子大每五十九丸鹽湯下日三服(入門)

五炒川練丸

治諸痲川練肉五兩將一兩研細三個同炒一兩茴香三錢鹽五分同炒一兩破故紙三錢
同炒一兩黑丑三錢同炒一兩蘿蔔子一錢同炒揀去同炒藥只留茴香破故紙川練肉為

末酒糊和丸梧子大溫
酒下五十九丸(入門)

烏附通氣湯

治新久痲病四氣七情痲皆效烏藥香附子當歸白芍藥山查肉橘皮各一錢白虎
七分赤茯苓澤瀉各五分猪苓木香甘草各三分右剉作一貼水煎空心服(入門)

十味蒼柏散

通治溼熱痲痛蒼朮黃柏香附子各一錢青皮玄胡索益智仁桃仁各
十分茴香炒附子炮甘草各五分右剉作一貼空心水煎服(入門)

神消散

治諸般痲氣外腎脹痛山梔仁鹽水炒黑楮核炒茴香鹽水炒各一兩荔枝核八錢益智仁
炒七錢楮榔五錢青皮油炒三錢右為末每二錢燒酒調空心服不飲酒鹽湯服(醫彙)

痲病危證

流瀉史不救(丹心)○痲病虛甚上為嘔吐下有遺精者危(入門)○惟是逆氣長噎中腕停酸
躁悶擾擾甚而至於嘔吐最為惡候蓋脾土不濟腎水上乘必為酸汁或為痰涎連成

暴吐大小二便關格閉溢而腎汁胃汁皆自其口出也如此者大抵不救矣(直指)

痲病禁忌

凡痲病非痛斷房事與
厚味不可用藥(丹心)

陰囊病死候

靈樞曰悲哀動中則傷魂魂傷則陰縮而擊○傷寒及熱病肝氣絕則舌卷卵上縮而終矣蓋
肝者筋之合也筋者聚于陰器而脉結于舌本故如是也(丹心)○病人陰囊並俱腫者死(

扁鵲)

導引法

坐舒兩脚以兩手捉大拇指使足上頭下極挽
五息止引腹中氣遍行身體去痲癩病(類聚)

陰蝕瘡下疳瘡

詳見
諸瘡

婦人陰門諸疾

有陰挺陰脫陰腫陰冷
陰痿陰疝交接出血

陰挺陰脫

瘡痲在婦人則為股戶突出名曰陰疝宜馬通花丸(方見上)(正傳)○陰中突出如茵如雞冠
四圍腫痛乃肝鬱脾虛下陷先以補中益氣湯(方見內傷)加梔子茯苓車前子青皮清肝火升

脾氣更以歸脾湯(方見神門)加梔子茯苓川芎調理外塗茶蘆膏(入門)○陰挺出一條尺許痛墜
尿澀朝服補中益氣湯晚服龍胆瀉肝湯(方見上)外塗茶蘆膏(入門)○陰中生一物漸大牽引臍

腹痛此因多服熱藥或犯非理房事兼意法不遂名曰陰挺洗心散(方見火門)末每二錢生地黃
以酒帶上貫挺上先煎後洗立效(得效)○陰挺宜服一捻金丸○陰挺
突出有熱小柴胡湯合四物加龍胆青皮(入門)○陰挺(詳見婦人)

陰腫陰癢陰瘡陰冷交接出血

陰腫痛極便秘欲死枳殼製之四物湯加柴胡梔子牡丹皮龍胆草煎服(方見火門)○婦人陰戶生瘡乃七情鬱火損傷肝脾滯熱下注也(入門)○陰內下疳瘡因
月後便行房致成濕濁伏流陰道遂生疔瘡與男子如精瘡略同黃丹枯白礬高著薑本各一兩硫黃
蛇床子荆芥各五錢蛇蛻一條燒灰右為末別以荆芥蛇床子煎湯溫洗拭乾以清油調藥末搽之(得效)○婦人陰腫宜用洗濁湯煎澀散(得效)○陰中生瘡瘡毒如小蛆乃熱毒滯也宜服
硫黃丸外用生艾汁調雄黃末燒烟熏之更用雄黃散(方見後陰)納陰中(入門)○陰中生蠱蟲
癢不可忍蝕人藏府即死令人發寒熱先以蛇床子煎湯洗淨拭乾銅綠散搽之(入門)○淫癢出水
痛者憂思過傷所致歸脾湯(方見神門)加柴胡梔子牡丹皮赤芍藥煎服潰爛者宜加味逍遙散(入門)○婦人陰腫生瘡以涼血散(方見婦人)加凌霄花少許煎空心服(得效)○陰冷宜服香丸
(方見神門)補中益氣湯(方見內傷)外用熟艾綿裹入陰中亂髮香皮燒灰為末搽之(入門)

一捻金丸

治婦人陰挺諸藥不效玄胡索茴香吳茱萸川辣子木香各二兩右為末粳米糊和丸梧
子大空心木通湯下三五丸仍用片腦五分鐵孕粉一錢水調刷付陰挺上(得效)

藜蘆膏

治諸勞肉如菌突出藜蘆為末猪脂調
和塗之一日易努肉自入(入門)

枳橘熨法

治婦人陰腫如石痛不可忍二便不利欲死橘皮枳實各四兩炒令香熟以絹袋盛分兩
包過身從上至下及陰腫處頻熨之冷則換溫者直至喉中有枳實氣即效(入門)

洗濁湯

治婦人陰腫癢癩甲五兩黃芩乾地黃當歸芍藥各二兩乾漆甘草各一兩右剉水七升
煎取一半去滓以綿帛蘸湯以濕處日二度濕後拭乾取疔濕散粉付瘡上(得效)

疔澀散

治同上五月五日蝦蟆木香硫黃鐵精等
分為末入麝香少許糝付患處(得效)

硫鯉丸

治陰門內疔瘡生處下如柿汁臭穢難近大鯉魚一個去頭皮硫黃一兩入魚肚
中澀紙裏黃泥固濟火煨烟盡為末未糊和丸梧子大空心酒下三十丸(入門)

銅綠散

治男女陰濕瘡癩蝕瘡五倍子五錢白礬一錢乳香銅綠
各五分輕粉二分半右為末先以藥水洗後搽之(入門)

麝香丸

治婦人陰中久冷無子或下白帶蛇床子龍骨各五錢吳茱萸枯白朮木香各三錢不反木白芷
各二錢半零陸香藿香各二錢丁香小腦各一錢半麝香二分半右為末蜜和兩作三十九丸每取

一丸綿裹納
陰中(丹心)

單方凡三十八種有
如殊散野馬丸

白礬 治陰生癩白礬麻仁等分為末槐白皮煎湯洗瘡
豬脂調付○陰癬白礬蛇床子煎水淋洗(本草)

硫黃 治女人陰癬硫黃為末日三付○瘡癬不可忍硫
黃白礬煎湯洗之杏仁燒反油調塗之(本草)

甘爛水 治奔豚殊勝煎
藥用之(本草)

蛇床子 溫陰之主藥煎湯浴男女陰去風冷益陽事去
陰汗又為末和米粉綿裹納陰中即溫(本草)

地膚子 治跳躍舉重卒得陰癬地膚子二兩半白朮
一兩半桂心五錢右為末酒下二錢(千金)

淫羊藿 主陰痿此興陽之劑也取一斤酒
浸服之或作丸久服亦佳(本草)

茴香 治小腸疝痛不省人事茴香鹽炒枳殼各一兩沒藥五錢為末酒下二
錢○卒疝痛欲死茴香葉葉搗取汁一合和熱酒一合服之(本草)

玄胡索 治小腸疝痛玄胡索鹽炒五錢全蝎一錢為末
酒下一錢或與乾薑等分末服亦佳(入門)

狼牙 婦人陰癬瘡潰爛臭穢狼牙煎取濃汁浸洗患
處或歸蟻子煎汁滴入陰戶日四五次(得效)

桂皮 寒濕痛四肢逆冷桂心末一錢熱酒調下○外腎腫痛桂心末和酒塗之桂能泄奔豚故效(本草)
○治偏墜大者桂心乾薑各一兩為末綿一兩水三椀同煮晒乾又浸煮又晒水盡為度用錦包陰

丸汗出數次便愈亦
治瘡病不痛(綱目)

楮木葉 治木腎取楮木葉曬乾為末酒和糊丸梧子大
空心鹽酒下三十九粒無膏者雄也(綱目)

川椒 凡腎氣痛須用川椒水煎服○陰冷腫痛生椒布裹着囊丸熱氣通即差○奔豚
氣及內外腎牽痛椒椒和艾及蔥白同研爛以醋湯拌罌砂 本草秦椒亦可

川練子 治疝氣大小便不通痛不可忍川練子肉四十九箇巴豆肉四十九箇同
炒以練子黃色為度去巴豆只取練子為末每二錢溫酒調下(得效)

亂髮反治下疳瘡及微頭瘡先以藥水洗取髮反付之乾則油調付仍以未飲調灰空心服(直指)

枳實主婦人陰腫痛積實多取炒合熱布裏熨之冷即易(本草)

烏賊魚骨主陰蝕瘡為末付之○又治小戶嫁痛燒為末酒服二錢(本草)

原蠶蛾壯陽起陰痿令交接不燥焙為末酒服一錢或丸服亦佳(本草)

鰻鱺魚起陽取魚和五味煮粥空心食甚補益婦人陰蝕瘡取油塗或燒烟熏(本草)

覆盆子主除痿能令堅長作丸久服良(本草)

地龍糞治小兒陰囊腫痛取糞甘草汁調付薄荷汁尤好○乾地龍為末蔥椒湯洗後吐調付(綱目)

蜘蛛主大人小兒瘡及孤疔上下作痛蜘蛛撒主之蜘蛛十四枚熬肉桂五錢為末大人一錢小兒五分酒下空心或蜜丸服之亦佳(本草)

桃葉主女人陰瘡如蟲咬癢痛生桃葉搗爛綿裹納陰中日三易○又桃枝五七枚打頭使散以棉纏之煎空硫黃末燒烟熏陰中○婦人陰腫小兒瘡杵桃仁付之(本草)

雀肉壯陽強陰取肉以蛇床子整骨和丸服謂之驛馬丸○雀卵和天雄兔絲子丸服令陰強威(本草)

牡狗陰莖主陰痿令強熱大生子焙乾為末和酒服黃狗肉壯陽道和五味煮熱空心食(本草)

牛外腎治疝痛牛陰莖灸就作末溫酒調服(俗方)○婦人陰痿痛問牛肝或猪肝灸熱納陰中盡盡出(本草)

貂鼠四足主卒疝痛燒為反酒調服青鼠足黃鼠足亦同(俗方)

弱陽諸物水銀不可近陰令陰消無氣(本草)○兔肉弱陽不可食(本草)○蓼蕞葢俱弱陽勿食(本草)

針灸法諸病取關元灸三七壯大敦灸七壯(得效)○大敦主七疝痛(綱目)○諸疝大法取大敦行間大衝中封蠶溝關門關元水道三陰交足三里(綱目)○卒疝牽腫暴痛取蠶溝大敦陰市照海下巨虛小腸俞(綱目)○陰蝕瘡灸中封(資生)○孤疝取大衝高丘大敦蠶溝(綱目)○婦人疝痛與孤疝同取天井肘火氣海中極(綱目)○膀胱氣取委中委陽(綱目)○小腸氣灸風市氣海又灸獨

鼈甲治陰蝕瘡及陰頭癩取甲燒為末雞子白調付之(本草)

橘核治膀胱腎氣痛微炒去殼為末酒調下一錢(本草)

杏仁治婦人陰蝕瘡不可忍燒研如泥綿裹納陰中能殺蟲(本草)

蔥白治奔豚氣痛濃煎湯飲之○又瘡疝小腹痛細切和鹽炒熨之(本草)

鹿腎壯陽氣作酒及煮粥服○鹿頭骨髓和蜜煮服壯陽令有子(本草)

溫內腎主陰痿助陽氣治疝冷麻灸為末用酒空心酒下一錢或丸服之(本草)

陰取大衝又灸臍左右各去一寸半兩穴各七壯立效名曰外陵穴(得效)○諸病上衝氣欬逆灸獨陰神效(得效)○疝氣偏墜取大巨地機中極中封交信涌泉(綱目)○又法以秤量患人口兩角為一指斷如此則三摺成三角如△樣以一角當臍心兩角在臍之下兩傍盡處是穴左偏灸右右偏灸左右左右亦無害灸四十壯神效(得效)○氣衝專主癰(資生)○水腫偏墜取關元(綱目)○小兒胎疝卵偏墜囊腫後十字紋上灸三壯春灸夏差夏灸冬差(綱目)○舉重物得癰灸關元兩傍相去各三寸青脈上灸七壯即愈(資生)○木腎大如升不痛取大敦三陰交木腎紅腫痛取然谷關門(綱目)○腎藏風濕癰瘡取血都三陰交(綱目)○內經刺癰疽一節靈樞所謂針取聖藥中水波是也此法今人亦多能之靈大如斗者中藏微液必有數升信知此法出於古也(綱目)

後陰

肛門重數靈樞曰肛門重十二兩大八寸經二寸大半長二尺八寸受穀九升三合八分合之一

肛門別名曰魄門也肛者言其處似車缸形也(入門)○內經曰魄門亦為五藏使水穀不得久留主出而不納以傳送也(入門)

痔病之因小腸有熱必痔大腸有熱必使血(仲景)○內經曰因而飽食筋脈橫解腸痔為痔又曰飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五藏入五藏則脾滿閉塞下為瘕泄久為腸痔○腸痔者大便下血即腸風藏毒也痔者腸間積水也(類聚)○益飽食則脾不能運食積停聚大腸脾土一虛肺金失養則肝木寡畏風邪乘虛下流輕則腸風下血重則變為痔漏或醉飽入房精氣脫泄熱毒乘虛下注或淫極入房致傷膀胱與腎肝筋脈蓋膀胱筋脈抵腰為腎貴腎走肝環前後二陰故痔乃筋脈病也(入門)○痔非外邪乃藏內溼熱風燥四氣相合而成其腸頭成塊者瘻也腸頭墜腫者溼兼熱也大便血水者熱勝血也作大痛者火熱也痔者風熱也大便社者燥熱也小便澀者肝藏溼熱也(入門)

痔者時也內經曰腸痔為痔如大澤中有小山突出為時人於九竅中凡有小肉突出皆曰痔不特於肛門邊者有鼻痔眼痔牙痔等類其狀不一(三因)○漢避呂后諱號痔疾為野雞病類聚

脈法靈樞曰陰其脈虛小者生紫急者死(脈經)○凡痔脈沈小實者易治浮洪而軟弱者難愈(正傳)○便血則扎數則赤黃實脈極閉熱在膀胱(醫鑿)

諸痔名目方書有五種一曰牡痔二曰牝痔三曰脈痔四曰腸痔五曰氣痔又有酒痔血痔瘻痔(三因)○凡痔毒甚者如雞冠蓮花核桃毒淺者小如松子牛乳雞心鼠乳櫻桃雞種種不同皆三陰虛也(入門)○凡痔因酒色風氣食五事過度而變成二十四證歌曰痔瘻分三八憑君子細看莫教年

月久見者胆心寒菱角看形怪蓮花不可觀穿腸并鼠於酒色兩甜干菓願翻花怨峰窠亦不寬難除

同氣血于母及腸盤玄珠尤可怪鉤腸痛若錯核挑與流氣見者便心酸乘子於中大難心在外安珊
瑚形可惡即更脫肛難內痔紅不出搭腸裏內端垂珠更難治日久有雞冠切莫經刀火令君性命殘
用功無半月主病更除根(醫鑑)○痔之名曰牛於曰鼠於曰雞心曰雞冠曰蓮花曰翻花曰蜂窠曰
穿腸曰外痔曰內痔為狀不一而其因則同焉(正傳)○五痔宜五痔散神應散槐角丸神應黑玉丹

痔有內外 脈痔腸痔氣痔血痔酒痔
屬內壯痔北痔建痔屬外

脈痔 腸口類頭發痛且痛且癢宜槐角丸腸
丸神應黑玉丹神應散逐瘀湯(綱目)

腸痔 肛內結核寒熱往來登瀛脫
肛即下脫肛條同治(三因)

氣痔 憂恐毒怒適臨乎前立見腫痛氣散
則愈宜加味香蘇散橘皮湯(綱目)

血痔 每遇大便清血隨下而不止
與下腸風散毒同治(綱目)

酒痔 每遇飲酒輒發腫痛或
下血宜乾葛湯(綱目)

牡痔 肛邊發露肉球狀如鼠餘時時滴清膿
血宜加味槐角丸秦艽蒼朮湯(綱目)

牝痔 肛邊生瘡腫突出一日數枚
膿潰且散治藥同上(綱目)

瘰痔 浸淫爛爛積月累蟲生其間蝕
腸穿穴與下痔漏同治法(綱目)

五痔散 治五痔及諸痔緒左懸蹄甲(治腸痔)鼈甲(治牡痔)猬皮(治北痔)露蜂房(治脈痔)蛇退(各等分)

(丹心)

神應散 治五痔黃牛角膠一枚旋碎蛇蛻皮一條猪牙皂角七個穿山甲七片猬皮一兩劍右各細刺入
缸內黃泥固濟火煨通紅候冷細研為末臨臥時細嚼胡桃仁一個如糊用好酒一盞送下便睡

至五更時以溫酒調下藥末三錢至晨時
更進一服雖久病不過三服立效(綱目)

槐角丸 治五痔及諸痔槐角四兩地榆黃芩防風當歸枳殼各二兩
右為末酒糊和丸梧子大空心米飲下五七十丸(局方)

散柏葉湯 斷紅丸 ○ 蘇毒宜解毒湯 槐花散 枳殼散 綠瓜散 ○ 腸風益毒通
用玉屑丸 剪紅丸 芎歸丸 槐黃丸 槐花散 鵬風散 槐黃湯 清漿槐花飲

黃連湯 治大便下血 腹不痛 黃連當歸各二錢
甘草一錢 右剉作一貼 水煎服 (易老)

芍藥黃連湯 治大便下血 腹痛 白芍藥 黃連當歸各二錢 甘草一錢
大黃五分 桂心二分 半右剉作一貼 水煎服 (易老)

涼血地黃湯 治腸痔射血 知母 黃柏各一錢 半 熟地 黃當歸
槐花炒青皮各七分 右剉一貼 水煎服 (東垣)

當歸和血散 治腸風射血 及溼毒下血 當歸升麻各一錢 半 槐花炒青皮 荆芥 白朮 熟地
黃各七分 川芎五分 右為末 每二錢 空心未飲調下 ○ 一名槐花散 (拔粹)

升陽除溼和血湯 治腸痔下血 作派其血 唧出有力 而遠射四散 如篩腹中大痛 白芍藥一錢 半 黃耆甘
草炙各一錢 陳皮升麻各七分 生地黃 牡丹皮 生甘草 各五分 當歸 熟地 黃耆 朮 秦 朮

肉桂各三分 右剉作一
貼 水煎空心服 (東垣)

升陽補胃湯 治腸痔下血 唧出遠散 如篩色紫 黑腥腹沈重 名曰溼毒 腸痔白芍藥一錢 半 升麻 羌活 黃
耆各一錢 生地黃 獨活 柴胡 防風 熟地 黃 牡丹皮 甘草 炙各五分 當歸 葛根 各三分 肉桂二

分 右剉作一貼
水煎服 (東垣)

益智和中湯 治腸痔下血色紫 黑腹瀉 惡寒 右關脈按之無力 喜熱 物製之內 寒明矣 白芍藥一錢 半 當
歸 黃耆 升麻 炙甘草 各一錢 牡丹皮 柴胡 葛根 益智 半夏 各五分 桂枝 四分 肉桂 乾薑 炮各

二分 右剉作一貼
水煎服 (東垣)

香殼丸 治因飽食 發為腸痔 及諸疔 瘰癧 黃連一兩 枳殼 厚朴 各五錢 當歸 四錢 荆芥 穗 木香 黃柏 各三錢
粗皮一個 煨 灰 右為末 糊和丸 梧子 大溫 水下五七十九丸 日二 (宣明) ○ 一名加味連殼丸

香附散 治腸風 香附子炒一兩 枳殼七錢 半 當歸 川芎 各五錢 槐花炒
甘草各二錢 半 右羅末 每三錢 薑三片 東二枚 水煎服 (本事)

止血散 治腸風 在黃前為近 肝腎血也 胡桃仁 破故紙 炒 槐花
炒各三兩 半 皂角刺 煨 灰 二兩 右為末 飲或溫酒調下 二錢 空心 (御院)

柏葉湯 治腸風 側拘葉 當歸 生地 黃 連 荆芥 穗 枳殼 槐花 炒 地榆 各
一錢 甘草 炙 五分 右剉作一貼 薑三片 烏梅一個 同煎服 (回春)

斷紅丸 治腸風 獨皮 燒 黃 連 炒 秦 朮 槐 子 各一兩 當歸 椿 榔 皂 角 仁 燒 黃 柏 荆 芥 穗 枳 殼 各五錢 大 黃
煨 桃 仁 泥 各三錢 右為末 糊和丸 梧子 大白湯下 五十九丸 血多加 棕 攪 蓮 房 灰 各五錢 (正傳)

解毒湯 治藏毒黃連黃芩黃柏梔子連翹槐花炒各一錢細辛甘草各五分右到作一貼水煎服一名八寶湯(回春)

槐花散 治藏毒當歸地榆各一錢槐花炒枳殼阿膠珠各八分生地黃白芍藥各五分防風剉柏葉各五分右到作一貼空心水煎服(回春)

枳殼散 治瀉毒枳殼二兩黃連白芍藥各一兩槐花炒地榆各五錢甘草二錢半右到每一兩空心水煎服(醫鑿)

絲瓜散 治腸風藏毒痔漏脫肛絲瓜根經霜一二次收採洗淨夜露十餘宿懸當風處陰乾每服三錢到散水煎熟去滓滴香油如錢大空心溫服忌雜指燒酒一服即效(醫鑿)

槐花散 治腸風藏毒槐花炒柏葉焙荆芥枳殼各等分右為末每二錢空心飲調下(本事)

腸風黑散 治腸風藏毒並治之荆芥穗二兩覆皮一兩半亂髮槐花角各一兩同入罐內鹽泥固濟燒存性出火毒再入甘草炒枳殼炒各一兩右為末每二錢空心水飲或溫酒調下(得效)

清榮槐花散 治腸風藏毒當歸白芍藥生地黃槐花炒各一錢槐花黃連酒炒蒼朮荆芥各八分枳殼條芩酒炒各七分川芎防風各六分升麻生甘草各四分右到作一貼水煎服(回春)

槐黃湯 治腸風藏毒槐花炒生地黃枳殼白皮炒各一錢防風當歸白芍藥荆芥穗川芎黃連枳殼各八分地榆烏梅甘草各三分右到作一貼水煎空心服(必用)

玉屑丸 治腸風藏毒久不止椿根白皮研乾四兩槐根白皮苦楝根寒食餅各三兩成靈仙一兩天南星半夏並生用各五錢右為末滴水和丸梧子大每三十九丸以水一盞煎丸子令淨以匙抄吞送下(本事)

前紅丸 治腸風藏毒下血久不止面色萎黃日漸羸瘠當歸酒浸一兩剉柏葉炒鹿茸去毛醋煮附子炮入門)○下血久不愈者後用

芎歸丸 治腸風藏毒久不止川芎當歸黃耆神麴炒地榆槐花炒各一兩阿膠剉芥水鹹髮灰各五錢右為末蜜丸梧子大空心米飲下五七十丸(入門)

槐黃丸 治腸風藏毒痔漏便血神效槐花炒黃連酒炒各四兩右為末入猪大腸一尺內托住用韭菜二斤水同煮爛去韭取腸藥爛搗丸如梧子大空心米飲下八九十九丸(醫鑿)

痔漏 即瘻痔也○痔核已破謂之痔漏(東垣)○瘻痔亦謂之瘻痔歲月積久蟲蝕其間癢痛不堪或肛門間射血如線乃瘻痔也最痔宜熏千金用絹皮艾者佳(方見下)(本事)○瘻痔之源由乎酒色痔久成瘻痔輕而癢重痔貴而癢虛治痔之法不過涼血清熱而已治瘻則初宜涼血清熱燥淫久則宜滋

痰殺蟲而兼乎溫散蓋初作則腸胃氣實為熱久則腸胃氣虛而為寒矣(明心)○痔瘻先須服補藥

成瘻痔輕而癢重痔貴而癢虛治痔之法不過涼血清熱而已治瘻則初宜涼血清熱燥淫久則宜滋

痰殺蟲而兼乎溫散蓋初作則腸胃氣實為熱久則腸胃氣虛而為寒矣(明心)○痔瘻先須服補藥

生血用參朮者芎歸為主大劑服之外用附子灸法（方見針灸條）（丹心）○痔漏專以涼血為主
宜用涼血飲外用溫藥塞竅（丹心）○痔漏宜黑玉丹獨皮丸活龜丸加味槐角丸（方見上）豚胃丸
秘傳神應膏蓮花益散鈞腸丸（方見上）取瀉膿方
取瀉方塞漏孔方○狐疝亦是蟲蝕肛（詳見傷寒）

涼血飲

治痔漏因風熱燥歸于大腸故涼血為主人參黃蒼黃連生地黃當歸川
芎槐角條岑枳殼升麻各一錢右剉作一貼水煎空心服或丸服（丹心）

黑玉丹

治痔漏及五痔皆因酒色過度即成此疾人多以外治付洗不知病在腸中有
蟲若不去根其病不除與上神應黑玉丹同（入門）○一名烏玉丹（丹心）

獨皮丸

治瘰癧槐花艾葉炒黃枳殼地榆當歸黃耆白芍藥白礬牡黃泉各五錢獨皮燒一兩裝
左三錢豬蹄甲十枚炙焦皂角一挺福灸右為末蜜丸梧子大空心米飲下五七十丸（入門）

活龜丸

治腸風痔漏大為龜一箇先以柴火燒熟以草蓋龜地熱逼出臭屁待昆蟲以秤繩龜身包湯
外用黃泥固濟灰火中煨熟撈起剉淨取肉研如泥其殺用牛骨髓塗灸五七次心透懸乾為末

又用黃連一兩九蒸九晒當歸尾三錢三分為末
和煎龜肉持丸梧子大白湯下五七十丸（入門）

豚胃丸

治痔漏亦治諸瘰癧槐花二兩黃連牡丹皮各一兩獨皮七錢羌活六錢右剉入豬肚
內縫定煮爛去藥食肚如硬再服以患處軟方止或同上藥為丸服亦可（入門）

秘傳神應膏

治漏痔如神小腦能胆血竭牛黃乳香沒藥各五分右為末蠅牛取肉搗成糝
膏每夜洗淨拭乾將此膏搽上患處敷過即愈宜磁瓶收貯不要乾了（回春）

蓮花藥散

治痔漏二三十年不愈者三服效蓮花蕊黑且頭末各一兩半當歸五錢蓉紅二錢右
為末先忌食肉六七日空心食肉一頓取溫酒下藥三錢取下膿血或蟲是效（丹心）

取漏濃法

治內痔久漏取膿最妙煨硝三兩苦參一兩半右為末用布四寸長三寸闊縫一袋入藥
半袋以硫三分放藥末中間方入全藥裝滿縫袋中兩頭安帶子如駱馬繫住（入門）

取痔蟲方

痔漏有蟲如細絲黑頭取去除根豐麥升諸牙皂角一寸右為末入豬腰子一隻內用未泔
煮空心食之少頃腹痛上廁蟲皆隨出作地坑埋之薄粥補之（丹心）○蟲絲瘰癧下膿血槐

白皮濃煎湯盛盆中坐其上重敷道冷則易煖湯良久欲大便當有蟲出三度愈（本草）○蠹魚腸以
五味矣貼痔漏上良久蟲出即去之三次盡出（本草）○蜘蛛生痔為丸塞肛門孔中引痔蟲出盡永
差（本草）○痔漏決洞者批皮葉料爛水清令濕去淨盛盆中漬之蟲自出（本草）○痔漏淫蟲痔
一枚苦酒一合同煎三兩涕滿口飲之蟲立死出即愈或灌肛內亦下蟲及惡物（本草）○痔漏瘰癧
瘰癧取肉入水銀和勻搗如棗核長三寸許脫肛
瘰癧納肛內明日蟲盡出若痛加甘草末（本草）

塞漏孔方

痔漏有瘰癧赤石脂白石脂枯白礬黃丹腦子同為末塞之或飯和蠶絲棉入（丹心）○溫藥塞
瘰癧用童便煨燻甘石牡蠣粉龍骨蜜陀僧（丹心）○秘方用煉蜜半盞入酥脂一分再煉入水成

珠不散將猪鬃髮梳成篦子將蜜塗在篦子上切用片腦熊膽各半分研細搽在篦子上插入漏眼
內底至盡頭刺止如眼多醫得一個又醫一個不可一齊上藥如外皮潰爛用黃蠟黃丹麻油煎膏貼
膏上縛緊一七日發(醫整)○塞竅宜

辰砂膏 痔漏塞竅信一錢白礬二錢蜜陀僧辰砂各五錢右先研信礬細鋪底次用礬末鋪上
辰砂膏生肌散上品錠子寸金錠子

貼生肌散

(丹心) 生肌散 生肌合瘡口龍骨煨五錢寒水石煨輕粉各一錢乾胭脂三分右為末乾搗之(丹心)

上品錠子

專治十八種痔漏紅瘡一兩二錢半信礬火煨五錢乳香沒藥朱砂各二錢半牛黃二分半研
五分熟二分生右為末新糊和勻捻成錠子看瘡大小深淺插入竅內如肉內黑色勿上生

肌散直待黑肉去盡
方上生肌散(入門)

寸金錠子

壯煨粉紅藤根乾漆各五錢藤黃雄黃雌黃硫黃輕粉霜麝香硫磺枯黃丹各一錢右為末
陳米飯和搗丸如棗核大每一丸納肛內深二寸用新磚墻子二個炭火燒赤淬醋中綿裹一

脫肛

即腸痔也。脫肛者肛門翻出也肺與大腸為表裏腎主大便肺腎虛者多有此證參香湯升之(回
春)○脫肛一證氣聚不散也裏急而不得出外脹而不得入先以枳實散毒散則氣散腫消矣(直

指)○難經曰病之虛實出者為虛入者為實肛門之脫非虛無故然哉其有產婦用方過多及小兒
叫聲努氣并久痢不止風邪襲虛亦有此證(直指)○脫肛者氣下陷也肺主魄門肺熱則肛門縮久
肺寒則肛門脫出必須溫肺補胃補中益氣湯○方見內傷加訶子檉根白皮少許或獨皮散釣腸丸
(方見上)血熱者四物湯加黃柏升麻虛熱者縮砂散(入門)○脫肛宜龍骨散二槐丹獨虎散蚊蛤

散浮萍散孩兒散重蓮法久脫
肛黑色生殼方小兒脫肛方

參芪湯

治肛門虛寒脫出入參黃耆蜜炒當歸白朮生地黃白芍藥酒炒白茯苓各一
錢半麻桂梗陳皮乾薑炒各五分甘草炙三分右剉作一貼水煎服(回春)

獨皮散

治因泄痢或勞力脫肛獨皮散甲各一個燒存性礬石煨燭燭七次五錢桂
心三錢右為末每二錢空心末飲下仍用草鞋底灸熱按入忌房事(入門)

縮砂散

治虛而挾熱肛脫紅腫縮砂黃連木賊各
等分右為末每二錢末飲調下(入門)

龍骨散

治大腸虛肛門脫出龍骨河子五錢黑棗煨赤石脂各四分沒石子大者四箇右為末每二錢空心米飲調下(得效)一名提肛散亦治小兒脫肛(回春)

二槐丹

治脫肛槐角槐花各等分右為末生羊血調成塊晒令乾勿使血熟每二錢黃酒送下(醫鑿)

獨虎散

治脫肛五倍子半兩水三椀煎至半入煨硝制芥各一錢乘熱乘洗用五倍子末搽之(直指)

蚊蛤散

治脫肛不收五倍子末入白礬蛇床子煎湯熏洗後以赤石脂末搽芭蕉葉上插入或長尺餘者以兩床相接中空以器盛藥水滿架起與床平令病者仰臥沒器中連日如此餘盡為度(得效)

浮萍散

治脫肛於秋暮取霜露打過浮萍不拘多少以淨瓦攤開陰乾其瓦一日一易不可見日務要陰乾用紙包起研為細末先以井水洗淨肛門取藥末搽上其肛徐徐即入(回春)一名水

聖散

孩兒散

治肛脫熱腫熊胆五分孩兒茶二分片腦一分右為末人乳調肛上熱汁自出而肛收(入門)

重鑿法

治脫肛取鹽一個改罈內入麝香一二分將滾水傾入罈內泡籠坐其上重之良久將水洗痔後將肉作糞食之將籠頭作末搽肛上(醫鑿)

一方

治久痢脫肛黑色生殺者巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煮入朴硝少許洗軟用清油點三滴放三角取白礬煨過龍骨少許為末乾糝肛頭以芭蕉葉托上便卧勿令出(入門)

又方

一女子脫肛以糯米濃煎汁洗肛却取博燒紅沃醋青布罈其上令溫生布上肛自收入(綱目)

肛門癢痛

宜黑玉丹(方見上)秦光羌活湯又宜重法(見下)○治癢槐白皮或五加皮濃煎湯熏洗肛門

(本草)

○蟲蝨肛癢為苦菜一握水一升煮取五合去滓隔夜不食明晨空腹飲之蟲即下小兒同法

散

○肛頭作大痛者火也又大便和澀亦作大痛凡人解飽行房忌泄前陰之氣歸於小兒同法

也宜

秦光羌活丸七聖丸秦光當歸湯當歸郁李仁湯逐瘰湯(方見上)寬腸丸血竭散清心丸枯礬

秦光羌活湯

治痔漏成塊下墜不任其癢羌活一錢五分秦光黃耆各一錢防風七分升麻麻黃紫胡甘草各五分薑本三分細辛紅花各三分剉作一貼空心水煎服(東垣)一名秦光湯(

門入

秦光白朮丸

治痔大便燥硬痛不可忍秦光桃仁泥皂角仁燒存性各一兩當歸梢澤瀉枳實白朮各五錢地榆三錢右為末麪糊和丸兌實大令藥丸光滑焙乾白湯下五七十九丸美膳壓下(東)

七聖丸

治肛門痛不可忍蘇訣曰積氣生於脾蓋傍大腸疼痛障難當此藥主之郁李仁泥一兩半羌活一兩大黃煨八錢桐榔桂心木香川芎各五錢右為末蜜丸梧子大白湯下三五十九丸微利即愈

秦光當歸湯

治痔漏大便結燥疼痛大黃煨四錢秦元枳實各一錢澤瀉當歸枳實皂角仁

當歸郁李仁湯

治痔漏大便硬努出腸頭下血苦痛郁李仁皂角仁燒各一錢枳實七分秦光麻仁當歸

寬腸丸

治痔大便結燥痛用此寬腸黃連枳殼等分右為末麪糊和丸梧子大末飲下五十丸。又用藥

血竭散

治痔漏痛不可忍血竭牡蠣粉髮反各等分為末入麪少許津唾調付或杏仁泥調仁(直指)

清心丸

治痔瘡痛內經曰諸痛癢瘡皆屬心火此諸痔受病之源也此藥主之黃

枯礬散

治五痔瘡痛枯白礬一錢片腦五分右為末先以藥湯洗後棹少許(得效)

一方

治穿臂痔漏極痛魚鱗棹如泥貼之其痛即止(回春)

痔兼諸病

痔疾有兼下疳瘡者有壅中出白津者有兼癢者皆肝腎不足變出勿專服寒涼藥(入門)

痔病治法

痔以涼血為主蓋熱則傷血血滯則氣亦不運而大腸下墜作痛大要以槐花槐角生地黃涼血

痔病通治

一切痔病通治宜槐角丸(方見身形)槐角丸加味槐角丸秦元枳實枳實枳實丸(方見上)水馬散三神丸久痔宜用黑地黃丸蓮花散(方見上)

水馬散

治一切痔夏月三伏內於止水內採妻子一名水馬兒高脚水面跳走者是也採取三十個用三個紙包每包十個於背陰處懸掛陰乾每包作一服研爛空心溫酒調下良久乃吃飯三日連三

服十日內見效久痔膿血者二三十服絕根(秘方)

黑地黃丸

治久痔痔漏下膿血虛者服之神妙治痔之聖藥也蒼朮一斤泔浸地黃一斤五味子八兩乾薑秋冬一兩春七錢夏五錢右為末粟肉和丸梧子大空心未飯或溫酒下百丸(保命)

三神丸

治僧道流固久坐飽食發為諸痔枳殼皂角煨子炒各等分右為末蜜丸梧子大空心溫水下五七十丸(東垣)

洗痔法

凡痔疾內服湯丸疎利藏府外用藥水洗浴以取內消(東垣)○凡痔漏脫肛腸風者登潤後須用溫湯一洗江河水尤妙(直指)○腸虛熱溼脫肛肛腫刺芥穗朴硝泡湯溫洗(直指)○治痔腫癢

痛重成仙枳殼各一兩蠶末煎湯先重後洗則易收膏亦可(綱目)○洗痔瘻方槐花荆芥枳殼艾葉煎湯入白礬先重後洗(得效)○無花果果葉煮水重洗亦可(丹心)○洗痔瘻方川椒艾葉葱白五倍

子焙研末入龍腦少許水調塗之(丹心)○洗痔漏神效隨河柳根上鬚一把花椒芥菜子不拘多少

煎水先重後洗其盡頭黑身白俱從漏處而出立愈(回春)○痔漏不可忍木棉花煎湯入焙硝重洗

單用硝水極妙(綱目)○痔瘻取河水類洗研蠅牛塗之(綱目)○脫肛苦參五倍子粟壁煎湯重洗

洗又煎童尿和白礬末重洗以烘熱鞋底捺入(回春)○痔漏宜用却毒湯

却毒湯

洗痔漏漏一兩瓦松馬齒莧甘草各五錢五倍子川椒防風側柏葉枳殼厚白蒼朮各三錢右水五碗煎至三碗重洗日三次(回春)

重痔法

治五痔及腫漏漏下膿血稠皮三指大劍雄黃如粟子大熟艾雄子大右蠶末入瓦缸內火燒空其上熏之取烟氣從口中出為佳三日將息更熏之三度永差忌雜諸魚生冷毒物(三因)○治五

痔痔漏發鱧魚火燒重肛門痔盡盡死鱧魚亦佳(本草)○又法死蛇一條抽地作坑壘屈置其中火燒以有孔版子覆坑坐板孔上熏之瘰癧出盡大效(本草)

塗痔藥

治諸痔宜塗熊冰膏痔藥膏子蠅牛散田螺青蜈蚣油枯痔方黑聖散

熊冰膏

治五十年久痔及一切諸痔痔漏脫肛腫痛絕腸他藥候臆二分半片腦半分研勻白雄雞膽三個取汁調勻以雞羽蘸塗痔上先以藥水洗淨乃上藥神效(入門)○一方熊膽片腦各少許并

水研調塗痔上名曰熊膽膏(得效)○又方治諸痔雄雞膽片腦研勻塗之(綱目)

痔藥膏子

治外痔及反花痔脫肛腫痛膿水不止紫炭淋濃汁兩碗煎至一碗却入單烏片大黃片各二錢慢火煮至半碗入甘草一錢煎沸下淨石炭末半匙略沸三五次用兩重濾過再煎成膏

候冷入膳營五分研細瓦器盛貯臨用入龍腦末少許和勻以銀葉
煎藥壹付日一次重者三五次先以藥水洗乾乃塗之神效(綱目)

蝸牛散 治痔瘡腫脹作熱如大蝸牛一個入片腦麝香各少許同入瓦器內或蠟半日自化成水取壹升
上痛止腫消立愈(得效)○一名蝸牛膏用法同上(入門)○脫肛不收蝸牛殼為末豬脂和付

之立縮絲桑蝸
牛尤妙(直指)

田螺膏 治痔瘡腫痛坐卧不得諸藥不效惟此極妙一點即好大田螺八九個對破頂蓋入白礬末少許
置地上火底埋土中其頂蓋仰天候一日取蓋上水汁以雞羽塗痔上五七次即消(種杏)

○治痔瘡田螺一個挑開磨入片腦少許過
一宿先以東瓜煎湯洗後取藥塗之(丹心)

蜈蚣油 治諸痔端午日取大蜈蚣一條竹簽陰乾臨發剪一寸煨存性麻油調塗輕則不發重則次年封
周日又發再剪一寸煨塗斷根(入門)治痔活蜈蚣一條浸香油內候生微略熱塗痔上累驗陳

久愈妙(綱目)○枯痔方赤足蜈蚣一條香油煎酥把乾加乳香沒藥各二錢麝香粉霜各
五分人指爪甲五錢泥裏煨乾為末以楸桐管吹上患處如有水即時出盡不疼(綱目)

枯痔方 治諸痔消腫雄黃硫磺明礬各等分右為末用新蓋先鋪礬末一半次鋪餘藥又以礬末蓋上
大煨候礬枯為度研為末津唾調付乾落為度復以石膏五倍子為末付收瘡口神效(綱目)

黑聖散 治脫肛疼痛大蜘蛛一個飽禁重裏線繫定合子內燒黑色取出細研入黃丹少
許研勻先以白礬葱椒煎湯洗浴拭乾將藥末擦在肛上以手托入妙(本草)

痔病禁忌 久痔瘡者當服補藥如黑地黃丸(方見上)腎氣丸(方見虛勞)以滋化源更節嗜慾起居方
可斷根(入門)○治痔忌吃生冷硬物冷藥之類及酒溼物五辣辛熱大料物及薑桂之類犯之

則服藥無效此東垣格言也(綱目)○痔根本是冷慎冷飲食及房勞難肉
最毒而房勞為尤甚甚參酌亦須忌之(綱目)○宜常服茯苓散(入門)

茯苓 麵白茯苓麻子去皮為末和勻丸黍九兩入蜜少
許常服之能漸消酒肉鹹苦可治久痔(入門)

痔病凶證 久痔與陰相通者死(甲乙)痔漏
成穴大小便相通者亦死(甲乙)

單方 凡三十三種有
槐花散猪甲散

生鐵汁 治痔瘡脫肛生鐵三斤水一
斗煮取五升日再洗(本草)

東壁土 治脫肛取土湯泡先煎後
洗亦治小兒脫肛(丹心)

車前子 治諸毒下血車前草連根一握生薑一小塊新水研碎取汁候血
欲下時隨開必覺重便服一盞血即止甚者不過再服(丹心)

白芷

治痔以白芷煮白芒作膠快手藥繫痔上
嫩疼不妨其痔自然乾萎而落(得效)

雞冠花

治血痔取花不拘多少
煎湯空心服一盞(綱目)

槐花

主五痔及腸風藏毒槐花炒水煎服或同刺芥側柏葉為末未飲下二錢名曰槐花散
○腸風槐花炒為末填入猪腸內縛扎兩頭醋煮爛研為丸酒下三十九(得效)

槐實

治五痔及腸風藏毒對痔為末
飲下一錢或蜜丸服亦佳(本草)

桑木耳

治五痔及腸風下血痔漏桑耳二兩
投水三合煮粥空心食之(入門)

馬蘭根

治痔漏取根研細付上片時看肉至去藥稍遲
忍肉反出以爐甘石煨牡蠣粉末塞之(丹心)

五倍子

主五痔及腸風脫肛五倍子白礬各五錢為末順流水丸如梧子大未飲下七丸(綱目)
○脫肛五倍子末三錢白礬一塊同煎湯先乘旋洗又取末捺肛托入(綱目)

樗根白皮

主血痔腸風藏毒取皮切酒蜜炒為末裏肉和丸酒下三五十丸
○又取皮人參等分為末空心未飲下二錢亦佳(丹心)

鯽魚

治五痔及血痔作膾和薑醋芥醬食之
○又作羹飽食良(本草)○痔漏鯽魚一

獨皮

主五痔痔漏腸風脫肛一切痔病取皮燒為末未飲下一錢空心(本草)○氣痔獨皮穿山甲等
分肉豆蔻法半為末未飲下一錢(本草)○痔漏獨皮一個汁臘粉麝香各少許和入一個半體內

懸麝前四十九日旋取如大食許搗
入瘡口內速出惡物是驗(本草)

露蜂房

主腸痔及痔漏有子蜂房焙乾為末新糊
和丸梧子大空心酒下二三十丸(回春)

鱧鱖魚

治五痔瘻瘻取魚治如食法煮
煎入椒鹽醬調和食之(本草)

蘿蔔

治酒痔下血取二十枚留葉寸許及根入醋內水
煮極爛以薑鹽醋同空心食之立出(入門)

胡荽子

治五痔水煮取汁冷服半升日二○腸頭出
取子燒烟熏即入又醋煮熨之亦效(入門)

蔥白

治腸痔下血多取濃煮作湯或盆重之立差○肛熱腫取青黃刮
取涎對停入蜜調勻先以藥水洗機付痔上其冷如水(得效)

艾葉

治痔漏蓋腫肛門熱艾一團確黃少許同
燒火以竹筒納下部引烟薰之良(本草)

木賊

主腸風痔及脫肛同槐花及桑耳
水煎脫肛為末糝丸托入(得效)

槐上木耳

治諸痔及腸風藏毒取耳為
末未飲下一錢日三(本草)

大樹木上寄生

治腸風痔漏如神取葉乾為末水酒
未飲任下一錢或丸服亦佳(丹心)

蛙

主五痔及腸痔下血作膾和薑醬食
之及和五味作羹食之亦佳(本草)

鱉頭

治脫肛不收灸付米未飲調下一
錢又取末油調付肛托入(本草)

蛙

主五痔及腸痔下血作膾和薑醬食
之及和五味作羹食之亦佳(本草)

蛙

主五痔及腸痔下血作膾和薑醬食
之及和五味作羹食之亦佳(本草)

蛙

主五痔及腸痔下血作膾和薑醬食
之及和五味作羹食之亦佳(本草)

蛙

主五痔及腸痔下血作膾和薑醬食
之及和五味作羹食之亦佳(本草)

蛙

主五痔及腸痔下血作膾和薑醬食
之及和五味作羹食之亦佳(本草)

蛙

主五痔及腸痔下血作膾和薑醬食
之及和五味作羹食之亦佳(本草)

蛙

主五痔及腸痔下血作膾和薑醬食
之及和五味作羹食之亦佳(本草)

蛙

主五痔及腸痔下血作膾和薑醬食
之及和五味作羹食之亦佳(本草)

蛙

主五痔及腸痔下血作膾和薑醬食
之及和五味作羹食之亦佳(本草)

蛙

主五痔及腸痔下血作膾和薑醬食
之及和五味作羹食之亦佳(本草)

冬瓜藤 主痔漏取藤煮湯
重洗即愈(丹心)

牛脾 治諸痔臘月牛脾一具熟食之
勿與鹽醬末差再吃(本草)

猪懸蹄 主五痔蹄甲不以多少燒為末末
飲下二錢名曰猪甲散(丹心)

狸肉 主五痔甚妙取肉作羹食之空心作脯食亦良
吳和麝香碎黃為丸服或為末酒下二錢十服見效(綱目)

野猪肉 主血痔腸風瀉血取肉二斤切片五味
羹亦得又取外腎連皮燒作末末飲下

針灸法 痔疾取足太陽即承山穴取督脈即強長
效。治痔平立量并與臍平處顯上灸

○痔漏取承筋飛搗委中承扶攔竹會陰等
之灸痔尤效(入門)○脫肛取大腸俞百會

橫骨百壯又灸脊骨骨上七壯(得效)○痔瘻
灸之(丹心)○痔漏以附子末津唾和作餅子

又灸直至肉平為效(丹心)○一人行路得痔
先以槐枝濃煎湯洗患處以艾炷灸其上三五壯

如失
(本草)

啄木鳥 主痔漏燒為末納孔中
不過二三度差(本草)

鼠狼皮 治痔瘻取皮缸內燒燻坐其
上熏之三五度除根(綱目)

鼯鼠 主痔漏陰蝕爛瘡燒為灰空心末
飲下二錢又取油塗之妙(本草)

痔漏理骨
良

熱空心食之作

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...