

4989

:2 -

疥瘡方法



海寧陳司成九韶甫著



夫徽瘡為患。正氣不虛。則邪毒不入。如肝氣虛。邪毒乘之。則發橫痃。或成魚口。甚則筋疼。瘡形如砂仁。腎氣虛。邪毒乘之。則生下疳。或為蛀梗。甚則骨痛。瘡形如爛柿。肺氣虛。邪毒乘之。則毒聚於上。不為筋疼。必生瘡如花。脾氣虛。邪毒乘之。則毒流四

肢不作骨痛。必生瘡如痘。心氣虛。邪毒乘之。則發大瘡。形如楊梅。左右相對。而作楚。有一經獨虛。而邪氣獨盛者。有兩經三經同虛。而齊病者。有見於外。而滿身生瘡者。有伏於內。而遍體骨痛者。所以出入無常。而隱見不一也。當詳究脉理。按其毒氣。有無輕重。應發表。則當發表。應攻裏。則當攻裏。應疎利。則當疎利。應溫補。則當溫補。應涼解。則當涼解。勿令虛實顛倒。斲削元神。蓋病重而藥輕者。但無近效。病輕而藥重者。必生他變。所以治此症者。須標本兼治。不可偏施。以攻邪補元為主。

主方

凡染有毒之妓。或與患者接談。稍有所感。不拘便毒。疳瘡。或髮際生瘡。梳下薄靨。如麩。或手足肌膚紅點。如班。隱肉。當服此方。使正氣足。而邪自除也。若間服牛黃化毒丸。其效甚捷。

人參

黃芪

川芎

甘艸

各一錢

當歸

二錢

忍冬花 漢防已 各一錢五分 升麻 防風 山甲 各八分

用水二大鍾加生姜三片煎至半饑時服渣再煎

### 牛黃化毒丹

治已上初見形症

牛黃 四分須用西黃色鮮黃者用之烏金黃亦可肝黃形如筆管厚實者功次之廣

黃味薄功不及半 琥珀 五分 血竭 製大黃 雄黃

朱砂 須擇鏡面大塊不涉沙石者用之近有煉丹不就轉與藥店賣者有大毒不入服藥

白蘚皮 川山甲 乳香 木香 各取頭末一錢五分

蟬退末 二錢 生生乳 一錢 沒藥 一錢七分 川貝母 三錢

右各製為末用神麩末五錢打稠糊入藥搗勻丸如梧桐子大另研朱砂為衣每早空心服十五丸每晚空腹服十九砂糖湯送下中病則已如餘毒未盡藥不可徹服此丸切忌煩勞惱怒焦躁茶酒止可用十分之三

### 養榮湯

治肝經形症益其正氣兼服甲字化毒丸標本

同治

當歸三錢 白芍 川芎 丹皮 遠志 龍膽

艸 夏枯艸各一錢 青皮 柴胡各八分

用水二鍾煎八分服渣再煎七分服

甲字化毒丸

治肝經內外前後形症

升麻二錢 牛黃四分 生生乳配礬石用佐藥煉百日而成成則生

生不息乃此症始末要藥但製度繁費不易修  
合如火候不到者服之無驗余識此方三年始  
得礬石煅鍊得法十年間屢用屢効誠千古不  
易王道之聖藥也未有此藥不可依方修合議  
余方之不靈方法已著名醫  
會編因刻未竣今錄本方附後 雄黃須擇舊坑所產透明

不臭者 用之各一錢 硃砂 乳香各一錢 月月紅 白

姜蚕 川山甲 白蘚皮各取頭末一錢五分 廣木香

熟大黃 牡丹皮各二錢五分

右各製為末用神麩末五錢打稠糊入藥搗勻

丸如桐子大另研硃砂為衣每早空心服十二

丸每晚空腹服九丸人參湯送下炒米湯亦可  
病重者逢三六九日加服三丸元弱者不必加  
病去藥減如餘邪未盡藥不可徹服此丸切忌  
一惱怒焦躁茶酒止可用十分之三

補真湯

治腎經形症益其正氣兼服壬字化毒丸標本

同治

何首烏 川牛膝 枸杞子 五加皮

當歸身 石斛 杜仲 黃栢

用水二大鍾煎八分食前服渣再煎服

壬字化毒丸

治腎經內外前後形症

虎脛骨 龜板 川山甲 硃砂

月月紅 蟬退末

沒藥 乳香 白蘚皮 雄黃 生

乳 牛黃 土貝母 沉香

甜香者 琥珀 七分  
用之

右各製為末用神麵末五錢打稠糊入藥搗  
丸如桐子大另研硃砂為衣每早空心服十五  
丸每晚空腹服十九人參湯送下枸杞湯亦可  
病去藥減如餘邪未盡藥不可徹禁忌同前

保脾飲

治脾經形症益其正氣兼服戊字化毒丸標本

同治

金釵石斛 薏苡仁 忍冬花 山藥  
各二錢

茯苓 牡丹皮 陳皮 人參 甘艸  
各一錢

木香 各六分

用冰二大鍾加棗二枚煎八分服渣再煎服

戊字化毒丸

治脾經內外前後形症

牛黃 升麻 生生乳 木香 硃砂  
四分 各一錢

雄黃 川山甲 白蘚皮 乳香  
各一錢 五分 乳

襍沙石者多用入藥則瀉製大黃二錢宜九浸九蒸九曬每十兩當耗煮酒五十

入藥則瀉威靈仙中有補沒藥血竭貝母各錢

右各製為末用神麴末五錢打稠糊入藥搗勻

丸如桐子大另研硃砂為衣每早空心服十五

丸每晚空腹服十九人參湯送下奇良湯亦可

病去藥減如餘藥未盡藥不可徹禁忌同前

益衛散

治肺經形症正氣兼服庚字化毒丸標本

同治

人參 貝母 白芨 百合 阿膠 桔梗

天門冬各一錢 山藥 木香 甘艸各七分

用水二鍾煎八分通口服渣再煎服

庚字化毒丸

治肺經內外前後形症

蟬退淨去沙土 川山甲各二錢 鍾乳石須擇湖廣產者長大脆白

用天葵甘艸水煮一日研萬鬱金二錢 生生通用之色襍性堅者不用



乳已上各一錢 牛黃四分五釐 木香 月月紅 乳

香 白蘚皮 雄黃各一錢五分 硃砂一錢七分

右各製為末用神麴末五錢打稠糊入藥搗勻

丸如桐子大另研硃砂為衣每早空心服十五

丸每晚空腹服十九人參湯送下奇良湯亦可

病去藥減如餘毒未盡藥不可徹禁忌同前

### 安神散

治心經形症益其正氣兼服丙字化毒丸標本

### 同治

人參 茯神 黃連 甘艸各一錢 遠志七分

石菖蒲 栝子仁 生地 赤芍 木通各一錢二分

分用水二鍾加圓肉七枚煎八分服渣再煎服

### 丙字化毒丸

治心經內外前後形症

牛黃 珍珠各五分 犀角蜜色味香有棕紋者用之 瓜兒

血竭 紫草 硃砂 雄黃 白蘚皮 乳香

月月紅 各一錢 五分 姜蚕 酒拌炒 去絲 蟬退 山甲

各一錢三 生生乳 一錢 赤芍藥 二錢

右各製為末用神麩末五錢打稠糊入藥搗勻

一丸如桐子大另研硃砂為衣每早空心服十六

一丸每晚空腹服十一丸人參湯送下龍眼湯亦

可病去藥減如餘邪未盡藥不可徹切忌惱怒

焦躁茶酒止可用十分之三

凡服十干丸先用滾湯汨嚥清胸中濁氣嗣服丸

藥藥後啖糕菓之類壓丸藥下胃日宜尊法毋忽

通氣飲

治橫痃初起或兩髀俱腫作痛肉未堅實應服

此方

木通 各五錢 瓜蒞子 各五錢 忍冬花 粉甘艸 各三錢

貝母 紫蘇葉 各二錢

用水二大鍾煎八分空腹服渣再煎七分服

消毒飲

治便毒单生腫硬大作痛者服此方

歸尾 粉艸 熟大黃 黑丑 搗碎各三錢 姜蚕

貝母 各二錢

用水酒各一大鍾煎八分空腹服渣煎七分服

单方  治同前

黑丑頭末 七錢 空腹熱酒調服或汗或下下後

以粥飲止之

五虎湯 治同前有元氣者服之

全蝎 姜蚕 川山甲 炙各一錢五分 蜈蚣 三條 斑

毛 三個去頭足 生大黃 二錢

右研為末分二次空腹酒服

內托散

治便毒腫痛將作膿者服之

地榆 一兩 黃芪 粉艸 忍冬花 川山甲

白芷 各二錢

用酒二大鍾煎至一鍾空腹服渣再煎服

透膿散

治便毒有膿未破作痛作脹

皂角刺 黃芪

牛膝

各三錢

川芎

一錢

當歸

尾 川山甲

忍冬花

漢防已

各一錢五分

用水二大鍾煎八分空腹服渣再煎七分若服

前方不効者感毒必重當服甲字化毒丸收功

解毒湯

治下疳初起

連翹

荆芥

木通

黃連

生地

牛膝

忍冬花

滑石

甘草

何首烏

各等分

用水二大鍾煎八分服渣再煎七分服

解毒丸

治同前

白芷

一兩

班毛

四十九個

二物和一處用酒拌濕

透文火炒燥揀出班毛用白芷 全蝎胡桃肉

各一兩二物新瓦上焙微焦 生大黃一兩晒

燥四物共研細末酒麴打糊為丸如棗莖大每

服三錢熱酒送下

摻藥方

治下疳瘡

海巴子

煨存性一名貝子

研極細每一兩未加冰片

五分五色粉霜三分再研盛磁罐聽用

又方

雨前茅茶

麻黃

細切各一錢五分

連四紙方七寸

用鉛粉錢半擦在紙上鋪前二味捲筒火灼

存性研細加冰片一分再研盛罐聽用

薰洗方

苦參

川椒

忍冬花

各兩許

用水三四碗煎

數沸先薰後洗瘡口拭乾用摻藥從四沿摻之

用薰洗摻藥不効者毒中必深當服壬字化毒

丸收功

加味化毒飲

治下疳瘡腐爛陷下有凹或包皮腫如鷄肫或

肌膚見形如班如疹將發瘡者當服此方

漢防已 當歸 忍冬花 白蘚皮 連翹

羌活 川芎 各三兩 牙皂 五錢 右切片分作七

帖每帖加奇良四兩猪腩子一枚水四碗煎至

二鍾分二次服渣再煎一鍾服七帖後倘或不

効者當服化毒丸收効

解表飲

治下疳便毒同起內作筋骨疼痛者服之

麻黃 紫蘇 桔梗 各三錢 川芎 升麻

歸 忍冬花 各五錢 姜蚕 蟬退 各三錢五分 子

羊肉 十兩

用煮酒十碗煎至三鍾頓服厚衣蓋覆出汗透

為度其被浸水中大便去空野

加味風流飲

治瘡初起不生疔瘡便毒者服之

防風 荆芥 川芎 升麻 鼠粘子 花粉

白蘚皮 姜蚕 甘草 川山甲 牛膝 何

首烏 赤芍 木通 五加皮 各等分

用水三大鍾加猪脾半隻奇良一兩煎至一碗

熱服取微汗為度渣再煎服兼服庚戌二字化

毒丸

牛黃蟾酥丸 此方好可公

發表化毒能治一切疔腫癰疽瘡瘍

西黃 一錢 蟾酥 二錢 麝香 二分 硃砂 雄黃

乳香 各一錢五分 先以蟾酥切片熱酒化軟將五

味細末和蟾酥搗丸如黍米大每服七丸葱頭

熱酒送下出冷汗為度

萬病解毒丹

治瘡毒初起可作下藥勝用大黃克伐胃氣

山茨姑 二兩須擇巖處土產色紫而價重者方是白者用之効薄

紅芽大戟 去木切薄片取頭末一兩五錢 千金子 去殼去油淨末二兩

文蛤 三兩 硃砂 雄黃 各五錢 麝香 二錢須擇當門

子乾燥者  
抵三錢用

右製為細末以糯米稀粥搗成錠子量人大小  
虛實服一錢上下白滾湯磨化

凡患疔瘡便毒未愈有生瘡之兆預煎此油服之  
可免面部生瘡

麻油八兩用自已頭髮三五錢煎化作二次服

再服亦可

凡患瘡頭面及不便處者先薰洗後點藥五日即

好內服化毒藥者點亦無妨不服藥者忌之

### 薰洗方

番打麻 雷丸各五錢 朴硝 地骨皮各一兩

黃芩兩半用河水五碗煎藥味出先薰後洗用

### 後方藥點

### 點藥方

大杏仁二十個針刺火 胆礬四分 輕粉一錢  
上燒透存性

三物共研如膏點患處每日先薰後洗點藥其



効甚速

甲子戊辰年五月九日

製生生乳

方著明醫會編因刻未竣先附於此

煨煉礬石

三錢

雲母石

二錢五分

硝石

一兩六錢

朱砂

即益硝

液

九錢六分即朱汞  
色粉紅者為上

晉礬

一兩二錢

汞礬

一兩八錢

食鹽

兩

枯礬

五錢六分

青鹽

三錢五分

右件共研

不見星

入羊

確內三方一頂火

候藥化面上有霜頭起離

火候冷用鐵蓋蓋扎鹽泥固濟待確口泥乾入

八卦爐內先用文火候蓋底熱透微七擦水加

炭平口用武火三香足離火先用茸艸牙皂各

炭平口用武火三香足離火先用茸艸牙皂各

二錢煎濃汁收盞底白丹砂棉紙包裹浸汁內  
片時取出連紙埋土中三日夜取來晒乾每兩  
加水麝各七厘辰砂九分共研極細外用乳香  
錢二分滾水燉化和前末研勻為丸每重一錢  
一分外以黃臘封固即名生生乳炤方配合服  
之刻日奏効每見公子王孫沾染此疾百藥無  
効者皆因方之不當藥之不真也余願此方公  
之海內而後世易為采擇永無差悞然世之毒  
藥古方往往用之各有製度耳如水銀一物得  
雲母礬石同煉其毒即解不比粉霜輕粉之酷  
烈也余用生七乳配風藥而治大痲瘋配癆藥  
而治傳屍癆配蟲藥而治諸蟲疾配膈藥而治  
噎塞番胃配瘡毒而治頑毒頑癬久漏骨痛種  
種竒効不獨治廣瘡毒氣之聖藥也大凡藥性  
與稟性有異人有殺藥者毒藥服之竟不覺察  
奏功亦緩性有不殺藥者服之便覺眩冒奏効

亦速所以為醫全在活潑經曰大積大聚襄其大半而止不必盡劑須要體察病情功效未全者再宜進藥或間日再服或停兩三日再服務宜消息增除毋使過劑以生藥病

製金鼎砒方法

此取鉛工之金黃也砒乃八品砒也

淨白砒

二兩五錢研為細末

出山鉛

十六兩開如大莛許敲為薄片

用小

陽城礮

一個以鉛片挑此末重疊在礮內用文

方離火冷定鉛面清如水色如金者無渣質

馬妙苦色青黑非出山鉛也用之無効

結毒方法

海寧陳司成九韶甫著

夫結毒者徽瘡毒氣結於四肢百骸孔竅經絡不易散解作痛作腫久則塊破潰爛不已治此症者不外乎攻補攻則毒氣去補則正氣強經曰邪之所湊其氣必虛虛者空也無也譬諸國內虛則人民離散百禍易起人之虛者亦猶是已又曰不能

治其虛。安問其餘。蓋言虛者。為百病之本。安首舉以冠諸症也。

毒結於肝膽二經者。內作筋痛。攻走脇肋。上至於頭。下至於足。轉側艱難。手不能舉。足不能步。或頸項發塊。或破爛上下。或傳他經。致生別病。當用乙字化毒丸。兼用煎劑調理。

乙字化毒丸

此病感于受毒者。其氣自陰。而手足肝經。皆受其毒。故百病之

治已上諸症

牛黃 丁香 牙皂 各五分 琥珀 須擇体堅 鬱金

生生乳 各一錢 硃砂 雄黃 月月紅 白蘚皮

乳香 川山甲 各一錢 製大黃 二錢 姜蚕 四錢

右製為末。用神麩末五錢打稠糊。入藥搗勻。丸如桐子大。另研硃砂為衣。每早空心服十三丸。每晚空腹服九丸。人參湯送下。炒米湯亦可。病去藥減。如餘邪未盡。藥不可徹。百日內勿使大勞。大怒。順時調理。

煎藥方

當歸 二錢

芍藥 一錢

川芎 七分

人參

丹皮 各八

分

膽草

柴胡

紅花

各五分

枸杞

二錢

石

斛 一錢五分

用水二鍾加蓮子十粒煎八分服渣再煎

胃氣弱加奇良一兩薏苡三錢

魂不寧加酸

棗仁 二錢

氣不順加烏藥香附青皮

各一錢

泄

瀉加白朮山藥

各一錢五分

毒結於膀胱并腎經者內作骨痛流注上下抽掣

時痛發塊百會委中湧泉等穴或陽物腐爛不

已或陰囊腫脹作潰或生獨脚陽癰瘡或傳他

經致生別病當用癸字化毒丸兼用煎劑調理

癸字化毒丸

治已上諸症

牛黃

五分

鹿角屑

三錢

沉香

生生乳

各一錢

硃

砂雄黃

月月紅

白蘚皮

乳香

川山

甲 各一錢 神水 一錢 用出山鉛十觔打薄片

尖底缸二隻 樣的上缸開一孔底中繩穿鉛

片懸上缸下缸盛米醋火酒各十觔缸口架磁

盤一個將缸合好用麵條封固以文 入中白

火下燒俟酒醋乾取出盤中者是 製何首烏 錢三

二錢擇鄉間誠實人家不生瘡 五分毒疾病者取製人藥有效

右製為末用神麴末五錢打稠糊入藥搗勻丸

如桐子大另研硃砂為衣每早空心服十五丸

每晚空腹服九九人參湯送下枸杞湯亦可病

去藥減如餘毒未盡藥不可徹百日內勿使大

勞大怒順時調理

煎藥方

牛膝 枸杞 山茱萸 五加皮 當歸 各二

何首烏 補骨脂 淫羊霍 川石斛 一山藥 各一錢

澤瀉 七分 用水二鍾加川椒一撮煎八分服渣再煎

精氣不固加菖蒲人參 各一錢 五味 四分 內熱

加熟地黃栢牡丹皮 各一錢 盜汗加白芍酸棗

仁麥門冬 各一錢二分

毒結於脾胃二經者外為小塊肌肉疔爛蔓延或

發大塊破潰腿膝或手足生鵝掌風癰或傳他

經致生別病當用巳字化毒丸兼用煎劑調理

巳字化毒丸

治巳上諸症

牛黃 各五分 牙皂 各五分 木香 二錢 生生乳 一錢 乳香

沒藥 各一錢七分 川山甲 白蘚皮 硃砂 雄黃

月月紅 各一錢五分 熟大黃 姜蚕 各二錢 血竭 一錢七分

右製末用神麩末五錢打稠糊入藥搗勻丸如

桐子大另研硃砂為衣每早空心服十三丸每

晚空腹服九丸人參湯送下砂糖湯亦可病去

藥減如餘毒未盡藥不可徹百日内勿使大勞

大怒順時調理

煎藥方

茯苓 山藥 石斛 陳皮 各一錢 薏苡仁 三錢

當歸 二錢 白芍 一錢 丹皮 各八分 木香 各 甘草 五  
分 肉桂 三分

用水二鍾加砂仁六分煎至八分服渣再煎服

飲食少進胸中脹悶加厚朴荳仁 各一錢 有痰加

半夏枳實白朮 各一錢 泄瀉加肉果訶子 各七分 減

當歸

毒結於大腸肺經者為喉癰多作痰唾久則成天

白蟻漸蝕鼻梁低陷或肌膚生癬硬靨如錢色

紅紫褪過即成白點或不生癬竟成赤白癩風

或傳他經致生別病當服辛字化毒丸兼以煎

劑調理。

辛字化毒丸

治已上諸症

白花蛇 真新州產者佳 羚羊角 白蘚皮 各二錢 牛

黃 五分 鍾乳粉 生生乳 各一錢 川山甲 月

月紅 乳香 硃砂 雄黃 各一錢五分 槐花 二錢



神水七分川貝母二錢蜂房炙淨末一錢

右製末用神麩末五錢打稠糊入藥搗勻丸如桐子大另研硃砂為衣每早空心服十三丸每晚空腹服九九人參湯送下熟蜜湯亦可病去藥減如餘邪未盡藥不可徹百日內勿使夫勞大怒順時調理

煎藥方

人參 茯苓 天門冬 貝母 當歸 沙參

玄參各一錢二分 白芍 麥門冬 黃芩各八分

五味子四分

用水二鍾加枇杷葉三片煎八分服渣再煎

痰多加白朮天麻橘紅各一錢喘急加桑皮甘草

紫蘓子各一錢

十母結於心小腸經者毒注瞳仁似乎內障或見或不見或毒聚舌本作腫或十指慘痛無時或瘡生遍體內有不易結痂而腐爛不口者或傳他

經。致生別病。當服丁字化毒丸。兼以煎劑調理。  
丁字化毒丸

治已上諸症

牛黃 珍珠 蜈蚣 去頭足炙燥各四分 犀角

生生乳 牙皂 各一錢 月月紅 白蘚皮 硃

砂 各一錢七分 雄黃 乳香 川山甲 各一錢五分

琥珀 五分 貝母 二錢 血竭 鬱金 各一錢 製大黃 二錢

右製末用神麩末五錢打稠糊入藥搗勻丸如

桐子大另研硃砂為衣每早空心服十五丸每

晚空腹服十九丸人參湯送下圓眼湯亦可病去

藥減如餘毒未盡藥不可徹百日內勿使大勞

大怒順時調理

煎藥方

人參 茯神 栝子仁 當歸 生地黃 各一錢二分

遠志 麥門冬 牡丹皮 黃連 甘草 各八分

用水二鍾加圓眼肉十枚煎八分服渣再煎

不眠加棗仁梔子各一錢咳嗽加貝母知母二分

桑白皮各錢咽喉乾燥加玄參連翹各二錢

心經元陽虛怯畏寒者加大附子八分倍人參

### 拔毒丸

治生瘡時悞服輕粉粉霜服前方無効者當用

此丸間服

槐花一兩川椒二兩象牙末一兩黃丹乳

香沒藥各二錢人中白各二錢血竭蜈蚣川山

甲各一錢金頂砒各一錢生生乳各一錢

右製末用神麩末一兩五錢打稠糊入藥搗勻

丸如桐子大另研硃砂為衣每日早服二十九

晚服十五丸土茯苓湯送下百日內忌房勞惱

怒日宜食猪肉數兩

### 又方

用出山鉛九觔打造壺瓶一大把盛火酒十觔

奇良二十一兩乳香紅花各一兩川椒龜板各  
 二兩封瓶口坐鍋中水煮一日夜取出埋地中  
 三日去火毒每日早晚任意飲數盃  
 加味地黃丸

治病愈後精血未復者宜服

熟地黃 八兩 山茱萸 一兩 山藥 各四兩 茯苓

牡丹皮 各二兩 澤瀉 兩 當歸身 枸杞子

各三兩

右各製末搗熟地極爛和藥如乾加煉蜜再搗  
 千杵丸如梧桐子大每日早晚服二錢淡鹽湯  
 送下

補髓丸

治病愈後精髓空虛者必宜服之

人參 二兩 地黃 四兩 當歸 四兩 鹿茸 一兩五錢

枸杞 三兩 栢子 茯神 白朮 各二兩 麥門冬

一兩 鍾乳粉 七錢 沉香 五錢 石斛 二兩

五錢

右各製末煉蜜和丸如桐子大每日早晚服七  
十九秋石點湯送下醇酒亦可

安神丸

治病愈後精神恍惚升痰動火煩渴

人參 柏子 當歸 麥冬 棗仁 各一兩 生

地 遠志 苜蒲 玄參 貝母 黃連 五

味 各七錢

右各製末龍眼肉七兩熬膏和丸如棗豆大辰

砂為衣每服五十九燈心湯送下

加味養榮丸

治婦人病愈後氣血衰少發熱作嗽

當歸 熟地 白芍 丹皮 香

附 人參 貝母 阿膠 山藥 茯苓

黃芩 川芎 白朮

右各製末煉蜜搗和丸如桐子大每日早晚服

八九十九淡鹽湯送下

助胃膏

治脾胃虛弱飲食少進肌膚不澤

奇良

二十兩 敲碎

甘草

二兩 炙

枸杞子

四兩 炒

補

骨脂

三兩 炒

薏苡仁

八兩 炒

先用大棗二觔水三十碗煎至水減一半去大

棗加前藥文火熬濃約存汁四鍾加飴糖十兩

再熬數沸盛磁瓶坐冷水內一日每日服五六

次每次服三錢七後飲人參湯其効更速

凡患筋骨疼痛先服化毒丸七日外用後方熨烙

熨烙方

川烏

草烏

肉桂

軍姜

胡蔥

各等分 搗細

煮糯米飯和藥搗勻敷患處外以火熨之

凡患喉癰久不愈者先服化毒丸七日外用後方

吹之

吹藥方

西黃

一分

冰片

一分

珍珠

二分

硃砂

八分

象牙

末七分

龍骨一錢

瑤珠一錢五分

金店內用者

右製共研極細盛磁罐患者先用苦茶汨漱日吹三五次

凡患鵝掌風癬先服化毒丸九日外用後方薰洗方可擦藥

### 薰洗方

用桐油一觔內活蟾四隻文火煮之洗患處拭乾嗣用生雞腦醮五色粉霜擦患處以肉熱為度日一次中病則已

### 五色粉霜

是外科要藥點黴瘡去腐肉長新

肌能愈諸瘡殺諸虫敷諸毒

水銀二兩

鉛一兩

火硝四兩

白礬三兩

青鹽八錢

研勻入陽城罐內文火煨一香去其濕氣用鐵油盞蓋口以鐵線扎緊鹽泥封固先文後武武火時盞上擦水到三香離火取出埋土中二日夜取出晒乾研細盛罐聽用

膏藥方

貼楊梅瘡及癰瘡鵝掌風結毒破爛拔毒呼膿  
暖筋骨長肉生肌

千里光自然汁十兩煮酒六兩內當歸大黃赤  
芍肉桂生地玄參苦參躑躅花各五錢文火煎  
濃約存汁一碗許收汁用麻油二十四兩加頭  
髮三兩煎至滴水成珠入前藥汁文火煎和加  
研細鉛粉蜜陀僧各五兩緩緩攪轉俟火侯却  
好滴水不老不嫩離火加入研細乳香沒藥黃  
占白占各三錢麝香三分粉霜一錢收罐坐水  
中出火毒攤貼須用重湯頓軟

余按臟腑感染陰陽傳遞配製化毒十平丸以爲  
定法而服藥亦有條約但人之稟性不同有素服  
藥素不服藥素欲素不欲之殊在患者當請上工  
酌擬詳脈氣稟賦藥性時候攻補不失始獲全功  
尊生者不可不察也



徽瘡宜忌

海寧陳司成九韶甫著

夫宜忌者。卽所苦所欲也。五臟各有所宜。五臟各有所忌。如徽瘡一症。舉世未諳藥物宜忌。并飲食宜忌。混同施治。殊不知從其氣則和。違其性則有偏勝之害。故凡有益於陽者。必不宜乎陰。有益於陰者。必不宜乎陽。宜於燥者。不宜乎濕。宜於濕者。不宜乎燥。能破散者。不可以治虛。能

收斂者。不可以治實。故藥物有良毒之難齊。氣  
味之莫測。有相益相濟。相畏相惡。相忌相制之  
不同。不諳宜忌者。則其失也。罔請以余所見聞  
者陳之。一友患便毒。其勢熾盛。欲速愈。單服大  
黃五錢。不利。又服七錢。亦不利。後加至兩許。終  
不能通。而大黃毒氣上攻。七孔流血而斃。一人  
染廣瘡。服敗毒散不効。後服商陸根汁。遂吐瀉。  
經兩日不止。藥食俱不受。六日而死。一人患楊  
梅瘡。毒結於百會穴。破爛兩年。諸醫不効。偶遇  
方士傳靈砒方。卽製服之。經七日。齒落喉閉。飲  
食不進而亡。一人生棉花瘡。無力贖藥。用毒蛇  
一條。酒煮罄飲。卽時昏暈。膚理腫裂出水。至五  
日。方知痛苦。其瘡猶不愈。一人患疔瘡。便毒兼  
之。筋骨疼痛。數服草藥不効。又取活蟾七隻。內  
猪脂煮食。食未畢。作吐不已。水漿不進。方延余  
治。余診之曰。胃氣傷也。非大劑人參不治。遂咀

人參五錢。加烏梅七個同煎。漸飲之。又服一劑。總能進粥。後用化毒甲字丸一料。服盡而愈。一人生魚口不痊。服大料五虎湯。少頃小便作脹。日夜叫嗷。苦不能溺。邀余診之。余曰。乃斑毛毒氣爲患。當速解之。卽用猪脂二兩。糯米五合。粉草五錢。長流水煎頓服。外以葱白食鹽煎湯。揉洗。解出血筋數條。始通。其毒仍不減。後又生瘡。如砂仁。從余調治方愈。噫。今之庸愚。襲不經之方。投有毒之藥。外患未盡。內毒尚存。諸如此類。悞莫能拔。寧知脈症相對。名實相符。方可投劑。今以五臟苦欲。藥物室忌。謹錄于後。

心爲君主之官。神明出焉。其華在面。充在血脉。爲陽中之太陽。爲牡臟。通於夏氣。神能固守。則氣血流通。萬物係之以興。亾思慮大過。則虛邪從之。病於內傷者。十居六七。病於外感者。百無四五。調治者。當以安神養血爲主。味忌鹹。多食鹹。

則脉凝泣而變色。味空苦。羊肉小麥杏薤之屬。心苦散緩急。食酸以收之。五味子之屬是已。欬則寧靜清明。故宜酸以收其緩也。軟者和調之義也。心君本和調。邪熱乘之則燥急。故復用苦。硝之酸寒。除其邪熱。以軟其燥急。堅勁之氣。使復其平也。以鹹補之。澤瀉導心氣以入腎也。煩勞則虛而生熱。故用參芪甘草之甘溫。以益元氣。而虛熱自退。故為之瀉也。心以下交於腎。為泰炒鹽之鹹以潤之。即得心與腎交也。火空則發。鹽為水味。得之使心氣下降。是既濟之道也。有補之義焉。故軟即補也。

心經藥食所宜

藥宜

補 人參 茯神 遠志 當歸 栝子 石

菖蒲 紅花 天雄 桂心 血餘 紫石英

甘草 首菴 辰砂 琥珀 乳香 胎元

瀉 升麻 細辛 麻黃 紫草 木通 川

山甲 連翹 貝母 鬱金 赤茯苓 蜂房

犀角 珍珠 血結 片腦 赤小豆 忍冬

花 黃連 牛黃 麝

食宜

羊肉 鹿肉 雞卵 牛乳 犬肉 猪心

火肉 風魚 淡菜 龍蝦 荔枝 芝蔴

菜菔 蓴菜 橙 藕 梨 杏 棗

心經藥食所忌

藥忌

死砂 生砒 輕粉 苦參 麥冬 蛇 韶

粉 蝸牛 硝

食忌

石首魚 蟹 螳 猪肝 鴨卵 鵝 蜆

蛤 南麩 荳 茄 菱苜 諸牲血

肝為將軍之官。謀慮出焉。血之本。魂之居也。其華

在爪其充在筋。爲陽中之少陽。爲牡臟。通於春氣。魂靜則至道不亂。木性易動。動則有摧折之意焉。怒甚則血不歸肝。而溢於外。病於外。慮內傷者。居半。味忌辛。多食辛則筋急而爪枯。味宜酸。犬肉小荳李韭之屬。肝苦急。急食甘以緩之。甘草之屬是已。扶蘇條達木之象也。升發開展。魂之用也。故其性欲散。急食辛以散之。解其束縛也。是散卽補也。辛可以散。川芎之屬是已。若其太過。則屈制之。毋使逾分。酸可以收。芍藥之屬是已。急也。歛也。肝性之所苦也。違其性而苦之。肝斯虛矣。補之以辛。是明以散爲補也。細辛。生姜。陳皮之屬是已。

肝經藥食所宜

藥宜

補

當歸

川芎

地黃

山萸

酸棗仁

遠志

茯神

甘草

阿膠

桂皮

木瓜

烏梅 琥珀 辰砂 龍齒 龜甲 牛黃

①瀉 芍藥 胆草 柴胡 青皮 忍冬花

香附 丹皮 瓜蒌 菊花 升麻 木通

射干 秦皮 皂角 薄荷 全蝎 川山甲

降香 羚羊 乳香 片腦 珍珠 胆礬

姜蚕 麝

食宜

犬肉 鴨 鴈 鹿肉 鱸魚 火肉 風魚

猪腎 雞卵 葡萄 橄欖 李 薺 林檎

馬齒莧

肝經藥食所忌

藥忌

死砂 生砒 輕粉 木鱉 胡黃連 商陸

食忌

石首魚 水雞 鵝 鴨卵 猪肝 蝦 茄

蒜 芋 杏 諸血

脾爲倉廩之官。五味出焉。主運動磨物之職。營之居也。其華在唇。四白其充在肌。此爲至陰之類。通於土氣。爲牝臟。意平則智無散越。空健而不空滯。濕則滯矣。滯則邪氣從之。病於內傷者多。半調治者。當以去濕導滯。味忌酸多。食酸則肉胝。膈而唇揭。味空甘。牛肉粳米棗葵之屬。脾苦濕。急食苦以燥之。使復其性之所喜。脾斯健矣。白朮之苦溫是已。過燥則復欲緩之。以甘。甘草之屬是已。稼穡之化。故甘先入脾。性欲健運。氣旺則行。補之以甘。人參是已。長夏之令。濕熱。主入脾氣。斯困。故當急食苦以瀉之。黃連之苦寒是已。虛則空補。炙甘草之甘以益血。大棗之甘以益氣。乃所以補其不足也。

脾經藥石所空

藥空

補 白朮 茯苓 人參 黃芪 薏苡仁



山藥 陳皮 甘草 蒼朮 扁荳 川石斛

荳蔻 天麻 當歸 奇良 雄黃 辰砂

丁香 菱麩 山查

①瀉 升麻 白芍 防已 白芷 砂仁 烏

藥 草果 大黃 靈仙 鼠粘 忍冬花

山甲 皂子 沉香 沒藥 乳香 山荳根

烏蛇 牛黃 麝

食宜

牛肉 猪脂 鴨 犬肉 鹿肉 鰻鱺 甜

時魚 雞卵 火肉 羊 鯽魚 猪腩 芡

蓮肉 棗 荔枝 橄欖 松子 川椒 姜

菜菔 芹

脾經藥食所忌

藥忌

死砂 生砒 苦參 胡黃連 地黃 膽草

蝦蟆 蜈蚣

食忌

石首魚 鵝 猪肝 鴨卵 雉 蝦 南麩  
菱 梅 奈 糟 醋 榴 韭 諸血

肺爲相傳之官。治節出焉。氣之本。魄之居也。其華在毛。其充在皮。爲陽中之太陰。爲牝臟。通於秋氣。魄安則德修壽延。氣常則順。氣變則逆。逆則違其性矣。病於外感者。居半。調治者。當以清肅上焦。而使氣平。味忌苦。多食苦則皮枯而毛折。味宜辛。雞肉黃黍桃葱之屬。肺苦氣上逆。急食苦以瀉之。黃苓之屬是已。其政欽肅。故其性善收。宜食酸以收之。白芍之屬是已。賊肺者熱也。肺受熱邪。急食辛以瀉之。桑白皮之屬是已。不欽則氣無所管束。是肺失其職也。故宜補之以酸。使遂其收欽之性。是卽補也。五味子之屬是已。

肺經藥食所宜

藥安

補 人參 黃芪 茯苓 阿膠 白苳仁

木香 桂枝 沙參 蛤蚧 琥珀 鍾乳粉

辰砂 牛黃

瀉 麻黃 杏仁 防風 升麻 川貝母

桔梗 羌活 荆芥 橘紅 射干 檳榔

蘇皮 花粉 牙皂 蘭葉 槐花 鼠粘

山甲 姜蚕 神水 片腦 白花蛇 麝

食宜

雞 猪肺 火肉 風魚 猪腴 羊肉 雞

卵 牛乳 鴿 鵝 胡荽 菜菔 芹 麻

油 松子 榛子 梨 榧 柿 蜜 葱

肺經藥食所忌

藥忌

死砂 生砒 苦參 黃連 班毛 胡連

天門冬 鉛粉 硫黃 亭力

食忌

石首魚 蝦 蟹 鴨卵 猪肝 麩筋 杏

柰 楊梅 銀杏 萵苣 諸血

腎爲作強之官。伎巧出焉。封藏之本。精之處也。其華在鬚髮。其充在骨。爲陰中之少陰。爲牝臟。通於冬氣。志營則骨髓滿實。屬真陰。其性本潤。故惡燥。涸病於腑者多外感。病於臟者多內傷。調治者當以滋陰益精。味忌甘。多食甘則骨痛而

齒落。味宜鹹。豕肉大豈栗藿之屬。腎苦燥。急食

辛以潤之。知母之屬是已。欲堅。急食苦以堅之。

蓋腎非堅。則無以稱作強之職。四氣以遇濕熱

則軟。遇寒冷則堅。五味以得鹹則軟。得苦則堅。

故宜急食苦以堅之。黃栢味苦。氣寒。可以堅腎。

故宜急食以遂其欲。堅之性也。以苦補之。是堅

卽補也。地黃黃栢是已。鹹能軟堅。卽瀉也。澤瀉

是已。虛者精氣奪也。然非益精。無以爲補。故宜

熟地黄黃栢補之

腎經藥食所宜

藥宜

補 熟地 枸杞 山萸 五味 狗脊 川

牛膝 當歸 杜仲 首烏 故紙 益智仁

鹿茸 敗龜 鱉甲 附子 肉桂 五加皮

蛇床 羊藿 鍾乳 磁石 虎骨 陽起石

海狗腎 紫河車 紅鉛 天靈蓋

瀉 黃栢 知母 澤瀉 獨活 沉香 川

山甲 蟬退 全蝎 血竭 烏藥 琥珀

牛黃 麝

食宜

豕肉 猪腎 醃雞 甲魚 鰻鱺 鹿肉

犬肉 雞卵 火肉 風魚 雀 芡 胡桃

乾笋 栗

腎經藥食所忌

藥忌

靈砂

靈砒

輕粉

胡連

蟾酥

羌郎

食忌

牛肉

鵝

石首魚

鴨卵

猪肝

蝦

蛙

鱸魚

茄

甜菜

蕎麥

南麵

柑

糖

青梅

宜忌一則雖不及於傷寒痘疹投劑少差死生立判。是証少錯輕必變而為重。重必至於傾危。毫

厘千里。毋得忽畧。且宜忌不為智者道也。如產後無虛。肝無補法。痘瘡不宜汗下。傷寒不宜進補。此數者皆謂粗工不諳病之進退。故有是戒。余觀上古哲人治疾。或以毒藥攻之。投毒藥者不盡劑也。所以有十去其幾之約。殊不知十去其幾之約為最難。而又難於識病氣之淺深。明於病氣淺深者。又不拘於藥之良毒矣。如扁鵲投人毒藥。名聞諸侯。五石散不忌參朮。感應

丸芭黃竝施。產後以人參五靈脂同劑。此皆古  
人心契意會。立方之妙。故良將用兵。奇正虛實  
互施者。神筭故也。業此術者。豈不亦猶良將乎  
哉。傳曰。神而明之。存乎其人。信夫。

江左名醫會編徵文檄

竊念

壽世之道。肇自岐黃。衛生之書。衍于諸子。聖賢已  
疾而製方。原非立方以待疾。末學拘方以治症。緣  
不合症而疑方。至有坐井之觀。未窺古今之籍。立  
墻之面。妄侈盧扁之能。攻生人之術。包殺人之羞。  
斯道不明。此輩爲甚。余家高祖掛冠業醫。垂統幾  
三百載。後嗣承流授本。接武已數十人。成學謝五

車。愚無一得。憶昔離經辨志。將奮翮于天池。迄今  
才薄福涼。擬息肩於上水。爰啓傳家之秘。併搜醫  
國之藏。矻矻諮訊於父師。皇皇訪道於吳會。頃者  
訂盟江左之社。更思就正海內之賢。正謂理道無  
窮。在司命者尤宜開悟。工夫難竟。至濟世者務在  
精研。六氣環轉爲宮。受病者不二。七情遞相爲帝。  
抱恙者自殊。五方風土之勿齊。宜知其燥濕高下。  
諸藥味氣之不類。當析其佐使君臣。至于工巧聖  
神。詣之原自有本。斟酌變化。畢竟妙在能權。所以  
欲叩有道之門墻。直挾尊生之了義。伏願

寰宇畸人。

鄉邦先達。共躍慈祥之本性。各披

施濟之弘功。或發祖遺之秘笈。或抒獨悟之靈心。或  
分密友之薪傳。或逗異人之寶籙。彙成一帙。公諸  
四方。還擬互相商畧。不使甲是而乙非。更欲虛  
心講求。必欲守先而待后。行將燮調造化  
用是衽席蒼生。非敢乞身後之名。祇以謙如傷之



視。凡我同志。幸諒婆心。

崇禎壬申秋九月重九日海寧陳司成九韶謹檄

凡海內名公佳帙乞郵

鍊石齋收貯俟訂期叅証以付剞劂

