

泰國研究

陳鏡主編

0096

阿育地亞皇朝第八至第十一代列

帝紀（譯者註）

吳迪著
陳禮頤譯

一布羅瑪拉查三世皇，拉瑪迪菩提二世皇，布羅瑪拉查四

世皇，拉沙達皇，與乎拍猜拉查皇當國時代——

譯者註：拉沙達皇在位僅五月，遭皇叔拍猜拉查所廢除，故史家

不列為一代，而仍以拍猜拉查為第十一代君。

苦洛皇傳位皇長子，即所謂布羅瑪拉查三世皇是矣。先曾任阿育地亞京之攝政皇，及皇極之後，彭世洛遂不復為首都。副君策他皇子（Prince Jettia，選名為~~XETTHY~~）仍留守彭世洛為省長或太守。

策他皇子承其位，進號曰拉瑪迪菩提一世皇。皇因母后故，而係成可太皇朝宗室之苗裔。

布羅瑪拉查三世皇篤崩於一四九一年，享壽四十五歲（譯者註）。皇弟

策他皇子承其位，進號曰拉瑪迪菩提一世皇。皇因母后故，而係成可太皇

朝宗室之苗裔。

譯者註：案丹隆親皇通羅古代史第二章（阿育地亞皇朝），第三

節（阿育地亞之統一時代），第十三款云：「布羅瑪拉

查三世皇享國三年，曾失陷塔烏疾城。」關於塔烏疾城

失守事，吳廸書中無著錄，丹隆親皇之書，殆可補吳廸

氏之失。

皇誕生於一四七二年，故歿祚之時，年僅十九齡。皇踐位後之初步施政，厥為火葬乃父與乃兄之遺骨，并建寶塔以容骨灰。寶塔尚得於阿育地亞之釋利沙拉碧寺（Wat Sri Salarapet）見之。

一四九二年與昌遇復起紛爭。蓋其時有名曰素里旺之通羅皇子，赴昌

遇為信，辦理取得佛陀之白晶聖像事。此像乃孟萊皇曾於一二八一年，取

自喃奔（Lampum）者。碑史稱此像原屬嘛奔「神話化之皇后」，其名曰啓

媽茶薇（Cham Tew），相傳其活至十七世紀。素里旺皇子後卒潛還此

像至阿育地亞。時昌遇卒噶哈拉查拍約（Maharaja Pra Yot），前皇

瑪哈拉查狄洛克之孫，請壁還佛像。通羅通詞以對，拍約延寇邊境，務逼

拉瑪迪菩提二世皇壁還佛像。（原註）

原註：通羅史乘並無言及此遭昌遇寇擾之事。且佬族軍而達阿育

地亞京，其事殊為可疑。

迨一四九九年，拉瑪迪菩提二世皇，下令鑄造一宏偉佛像，并供於釋利沙拉碧寺中。佛像作企立狀，高四十八呎。佛座之長凡二十四呎。數以金葉，所用金葉之重量達八百磅，歷三年始告竣工。此為世界有史以來，企立佛像之最偉大者。不幸於一七六七年遭緬兵所燒。本朝始祖（譯者註），曾將佛像碎片攜至曼谷，冀有以聯砌成之，然事終屬不可能。於是悉數埋於曼谷側都蓬寺（Wat Jetupion），釋利沙拉碧查打陽塔（Jedi Sri sarapit Chadayan）中。

五年，蓋因終皇一代，「使昌遇蒙福」云。因皇先崩加冕之日，乃認為不吉之月曜日。皇子繼為昌遇君主，號為嗎哈拉查勒塔那（Maharaja Rata Ha）。皇於一五零七年，攻客成可太，屢戰之後，老兵挫敗而歸。翌年（一五零八年），通羅舉兵復仇，進逼昌遇領土。不列（Pra）告陷。惡戰而後，通軍被迫退却。一五一零年，通軍再次攻客昌遇，此役結果，亦同歸徒然。

泰國的軟體動物（續完）

湯姆伯樂

淡菜亞目（Mytilacea）

淡菜科（Mytilidae）本科分佈者淡菜屬一屬有（一）*Mytilus senagelinus* Chem 泰名為~~เมล็ดหอยแมลงภู่~~分佈在弄鹽，北撻，蘇梅島，信岬，等地。（二）*Mytilus Lin* 此外尚有*M. philippinensis*, *M. senhauseri* Rve 泰名為~~เมล็ดหอยแมลงภู่~~分佈在昭披耶河北裡口一帶。*Septifer* 一種。

擬瓣鰐目（Pseudolamellibranchiata）

（1）*Megathiria* sp. 泰名為~~เมล็ดหอยแมลงภู่~~。

江珧科（Pinidae）本科有江珧屬（Pinna）*N Pinna hanleyi* Rve 泰名為~~เมล็ดหอยแมลงภู่~~分佈在信岬。

障泥蛤科（Pernidae）本科有*Perna ephippium* Lam 一種，泰名為~~เมล็ดหอยแมลงภู่~~。

牡蠣科（Ostreidae）本科牡蠣屬有四種。（一）*Ostrea chennitzi* H.Lv 分佈在宋卡，蘇梅島等地。（二）*Ostrea edulis* Lin 泰名為~~เมล็ดหอยแมลงภู่~~分佈在萬倫海灣北島（Koh Prap）（三）*Ostrea plicata* Chem 分佈在信岬。（四）*Ostrea plicata* Ch. t. plicatula Gm 分佈在是拉差，干奴北撻，萬倫海灣等地。

海扇科 (Pectinidae) 本科有海扇屬 (Pecten) 兩種。〔1〕Pecten senatorium Gmel 分佈在羅勇，信岬，蘇梅島等地。〔2〕Pecten vexillum Rve 分佈在普吉披披敦島。

鰐蛤科 (Lymidae) 本科在泰國有 Lima sp. 1 種。

海菊科 (Spondylidae) 華蛤 (Spondylus sinensis Sby) 分佈在梅島，宋卡，羅勇，是拉差，信岬，干奴北攬等地。〔1〕環蛤屬之 Plicatula philippinarum Sby 分佈在羅子島。

真瓣鰐科 (Eulamellibranchata)

鵝屋蛤科 (Carditidae) 〔1〕Cardita variegata Brug 分佈在是拉差等地。

蚌科 (Unionidae) 本科分佈的種屬極多。在曼谷和素攀河北都有 Ensidiens ingallsianus Lea，泰名為 naunui，在湄公河，叻武里，巴塞河，娘瓦等處有 Hyriopsis myersianus Lea 1 種。此外較著的還有 Nodularia scobina Lea，泰名為 meun 分佈在曼谷，巴塞河 (unjalok) 但羅等地。Nodularia tumidula Lea 泰名為 meun 分佈在巴塞河，湄公河，叻武里，娘武里，曼谷等地。

瑪丹蛤科 (Lucinidae) 本科有 Lucina punctata Lin 和 Lories pes iculea Gld，兩種的分佈。

蜆科 (Corbiculidae) 分佈者均為本科的蜆屬，分佈地為曼谷各運河，叻武里，尖竹汶河等地，有三種，Corbicula Lydiana Prince 1 種，泰名為 neung。

櫻蛤科 (Tellinidae) 本科櫻蛤屬 (Tellina) 多數分佈在蘇梅島，白鷺蛤屬 (Macoma) 則多分佈在宋卡沿海。

斧蛤科 (Donacidae) 本科分佈者僅有斧蛤屬 (Donax) 有五種，其中 Donax fimbria Chev. 1 種泰名為 neung。

馬珂科 (Mactridae) 本科有馬珂屬三種，Mactra antilibuata Spengs 帶名為 neung 分佈在信岬，普吉披披敦島，蘇梅島等地。Mactra Diomedea Desh. 則分佈在北攬和宋卡兩地。

文蛤科 (Veneridae) 〔1〕文蛤屬 (Cytherea)

N. Cytherea Calophylla Hly 1 種分佈在千奴北攬及宋卡等地。〔2〕蠔屬 (Dosinia) 有五種，分佈在宋卡，萬倫海灣，信岬等地。〔3〕紫蛤屬 (Sunetta solanderi Gray) 分佈在宋卡。〔4〕蛤仔屬 (Tapes) 有兩種：〔1〕小蛤仔 (Tapes variegatus Sby) 1 種 Tapes radiatus Chem (5) 瓦蛤屬 (Venus) 有五種。

鳥蛤科 (Cardiidae) 〔1〕鐵芥蛤 Cardium rugosum Lam. 分佈在是拉差，羅勇等地。〔2〕礎蛤 (Cardium unedo Lin) 宋卡及蘇梅島等地亦均有鳥蛤屬 (Cardium) 之分佈。

鐘螺科 (Tridacidae) 本科為貝類中最大者，產熱帶珊瑚礁上，泰國

分佈者，有鐘螺屬 (Tridacna) N. 鐘螺 1 種，泰名為 neung，neu，meun，分佈在龜島。

幅口科 (Chamidae) 〔1〕蘇海螺 Chama reflexa Rve 1 種。

蘇螺蛤科 (Psammobiidae) 〔1〕繫繩蛤屬 N. Psammobia corrugata Desh 泰名為 meun，而分佈在尖竹汶河 N. Psammotela elongata Lam 1 種，泰名亦稱 meun。

海螺科 (Mytilidae) 本科有西廣海螺 (Lutraria) 1 種 Corbula 1 種，泰名亦稱 meun，分佈在干奴北攬及宋卡等地。

竹螺科 (Solenidae) 〔1〕竹螺屬 N. Selenabreviatus Phil 分佈在宋卡，〔2〕Ensis malacoensis Dkr 泰名為 meun 分佈在佩里及北攬等地。〔3〕Siliqua radiata Lin 分佈在泰國海之海螺屬 (Bing Kia Id.) (4) 細螺屬 Solecurtus scalprum Gld 分佈在干奴北攬。

海筍科 (Pholadidae) 〔1〕Pholas orientalis Gm 泰名為 meung，meun，meu，meo，meo，泰谷分佈的 Martesia rivicola Sby 泰名為 meung，meu，meo，泰谷海筍。

與泰國海筍螺回文。

盤足螺科 (Teredinidae) 本科分佈地為宋卡，有泰國盤足螺 (Teredo siamensis Bartrach) 泰名為 meung，另 1 種為 Bankia smithi Bartrach.

筒螺科 (Clavagellidae) 本科祇有筒螺 1 種。

腕足綱 (Bivalvia)

海豆芽科 (Lingulidae) 此科早現於古生代之寒武和亞紀，中生代為極盛期，現世僅存 110 種。泰國祇有海豆芽 (一名指甲螺) (Lingula sp) 1 種，泰名為 meung。

(註 1) 分類系統及分佈地以及泰名均據 Nai Chote Sivattan "Molluscs of Siam" 1 書。

(註 2) 泰國軟體動物之種屬名主要參考書為 "List of Mollusks in H M Smith's collection" 在 U.S. National Museum, Washington D.C. 出版。

(註 3) 資料參考書。

(1) New Species of Shipworms from Siam. (Jour. Siam. Soc. Nat. Hist. Supp., Vol. 7, No. 1, 1927)

(2) A Freshwater Mussel (Jour. Siam. Soc. Nat. Hist. Supp., Vol. 10, No. 1, 1935)

(3) Shells from a Cave at Buang Bop, Surat, Pen. Siam (Jour. Siam. Soc. Nat. Hist. Supp., Vol. 8, No. 4, 1932)