

外科正宗六五

色建公
今改昌培



重訂外科正宗目錄

卷之二

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽半陰半陽症第五

癰疽五善歌第六

卷之三

癰疽七惡歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法禁炎禁火第九

論病生死法第十

察形色順逆第十一

病有三因受病三治不同論第十二

調理須知十三

雜忌須知十四

卷之三

癰疽圖形十五

附癰疽諸症
瘡名十津

卷之四

膿疽論十六

疔瘻論十七

脫疽論十八

卷之五

瘻瘍論十九

鬱疽論二十

咽喉論二十一

卷之六

暗毒論二十二

癰瘍論二十三

肺癰論二十四

流注論二十五

卷之七

乳癰論二十六

附乳

附骨疽論二十七

附鶴膝風

腸癰論二十八

臓毒論二十九

卷之八

痔瘡論三十

下疳論三十一

魚口便毒論三十二

囊癰論三十三

縣癰論三十四

營瘞論三十五

卷之九

楊梅瘡論三十六

結毒論三十七

多骨疽論三十八

陰瘡論三十九

傷寒發頤四十

痘發四十一

瘰疽四十二

少腹癰四十三

鶴口疽四十四

龍泉疽虎鬚毒四十五

石榴疽四十六

穿骨疽四十七

大麻風四十六

蘿花瘡四十

腋癰五十

脇癰五十一

鼻痔五十二

嘯壻風五十三

紫白癥風五十四

卷之十

齒病五十五

腦漏五十六

破傷風五十七

跌撲五十八

金瘡五十九

杖瘡六十

湯潑火燒六十一

甲疽六十二

繭瘡六十三

癰瘡六十四

天蛇毒六十五

頭痛六十六

食金毒六十七

鼻衄血六十八

牙縫出血六十九

血箭血痣七十之

鵝掌風七十一

腎囊風七十二

瘻瘍七十三

臘瘍七十四

血風瘡七十五

頑癬七十六

瞼窠瘡七十七

凍風七十八

火丹七十九

天泡八十

肺風粉刺酒皰鼻八十一

雀斑八十二

油風八十三

自屑風八十四

耳病八十五

漆瘡八十六

竹木刺八十七

瘞瘍瘡八十八

卷之十一

瘻瘍八十九

瘻瘍九十

癩風九十一

溼腫九十二

疎瘡九十三

風大瘡九十四

女人面生黧黑瘡九十五

鈍叩風九十六

筋筋箭九十七

婦人腳丫作瘡九十八

手足破裂九十九

眼丹一百

黑子一百一

眼膜一百二

體氣一百三

自光瘡一百四

奶鮮二百五

蟻摸頭一百六

小兒遺毒爛斑一百七

蠅蛆串一百八

小兒痘風瘡一百九

小兒赤遊丹一百十

走馬瘡二百十一

重舌二百十二

胎瘤二百十三

鵝口瘡二百十四

痘癆一百十五

痘疔一百十六

黃水瘡一百十七

卷之十二

大人口破一百十八

臭田螺一百十九

牛程躑一百二十

僵螂蛭一百二十一

田螺泡一百二十二

腰痛一百二十三

陰虱二百二十四

薊蕎麥一百二十五

百蟲入耳二百二十六

驛蟲叮咬二百二十七

人面瘡二百二十八

喫吞針鐵骨哽咽喉二百二十九

中肚毒二百三十

落丁須拿法二百三十一

救自刎斷喉法二百三十二

陰毒二百三十三

失榮症二百三十四

試知百病死生法二百三十五

造孽報病說一百三十六

仙方活命飲今古不同論一百三十七

蜃氣一百三十九

拾遺症一百三十八

蜃氣一百三十九

綑縛皆瘡一百四十

癰疽內肉不合一百四十一

陳元明粉一百四十二

取紅鉛法一百四十三

煉金真硃法一百四十四

煉硝石法一百四十五

取蟾酥法一百四十六

製附子法一百四十七

昇白靈藥法三百四十八

製變食麵法二百四十九

逐日人神歌一百五十

十二時人神歌一百五十一

兒神歌訣一百五十二

製炒諸藥一百五十三

醫家五戒一百五十四

醫家十要一百五十五

開割披鍼瘻針形二百五六十六汗班方二百五十七

醫訂外科正宗卷之五

瘰癧類第十九

癰癧者有風毒熱毒氣毒之異又有瘰癧筋癧瘍癧之殊風毒者外受風寒伏於經絡其患先寒後熱結核浮腫熱毒者天時亢熱暑中三陽或內食膏梁厚味醜結成患色紅微熱結核堅腫氣毒者四時殺戾之氣感冒而成其患耳項胸腋驟成腫塊令人寒熱頭眩項強作痛瘰癧者累累如貫珠連接三五枚此不足寒熱其患得於悞食蟲蟻鼠殘不潔之物又或汗液宿茶陳水混入而滌其患先小後大初不覺疼久方知痛筋癧者憂愁思慮暴怒傷肝蓋肝主筋故合筋縮結蓄成核生於項側筋間形如棋子堅硬大小不一或陷或突久則虛羸多生寒熱勞怒則甚瘰癧者飲食冷熱不調餓飽喜怒不常多致脾氣不能傳運遂成癥結初起如梅

如李生及遍身久則微紅後必潰破易於收斂凡觀此症別其風
暑者散其風除其濕如防風解毒湯之類是也熱毒者清其脾鴻
火熟連翹消毒飲之類是也氣毒者調其血和其氣藿香正氣散
之類是也癰瘍者散其堅和其血散腫消堅湯之類是也筋癰者
用其肝解其鬱柴胡清肝湯之類是也瘀瘍者豁其瘀行其氣芩
連二陳湯之類是也又有寡婦尼僧鯉夫庶妾志不得發思不得
遂積想在心過傷精力此勞中所得者往往有之最爲難治有此
元養心血次開鬱祐益腎安神疎肝快膈如歸脾湯養氣養榮湯
俱加香附青皮山梔貝母木香之類是也又男人不宜太陽青筋
明熱咳嗽自汗盜汗女人又忌眼內紅絲經閉骨蒸五心煩熱男
人有此後必變爲癆瘍難治之症但此體質者初起可服散腫潰
利之藥得効者十中三四有不察虛實盡劑追伐損傷元氣

致成壞病者十有八九此非患者之命自出乎人之手予嘗遇初
起成核服前藥未効者用針刺核內深入三四分用冰蠅散燃成
條插入核內糊紙封上待至二七後核子自然落出隨用紅黑二
膏擦貼內服補劑不久便愈又常見斑毛單牛巴霜大黃追蝕等
用往往致其危亡者多矣切宜戒之

癰瘍看決

起核高腫紫色紅軟活微作寒熱肩項不強者易已成根不堅硬
內無小核相譖脾健氣血不衰者易已潰膿稠肉色紅活核腫漸
消肩項自便漸斂者順潰後易消易歟氣體平和胸膈寬利飲食
知味者順未成形體消瘦寒熱往來結核頑硬痰嗽相兼者喰已
成核堅連續如珠大小不等項強筋急脈虛者喰已潰膿水清稀
肌肉消鑠目盜汗寒熱不睡者逆潰後陰虛煩躁作渴泄秘男

不正穴 卷之五
丁骨蒸女人經閉俱逆

癰癧治法

起腫痛增寒壯熱四肢拘急項強頭眩者表散之腫硬發熱便利
口乾胸膈不利惡心脈實者宣利之膏粱厚味醇酒積熱濕痰凝
結而成化瘀降火清中歎息過度鬱怒傷肝筋縮結核者宜養血
開鬱疏肝房慾勞傷陰虛補熱自汗咳嗽形消瘦者滋腎健脾失
利忘名懷抱鬱結積想在心所如不得遂隔陰陽虛散歲月所得
此者精血俱傷先養正氣次治標病堅而不潰腐而潰之潰而不
斂補而斂之皆活法也

瘻瘍治驗

男人項核腫痛拘急惡寒用荆防敗毒散二劑表症悉退餘核不
消用散腫潰堅湯加川芎附貝母十餘服其核漸消外以琥珀

膏貼之月餘而安

一男人仲冬涉江暴發濕氣又值驚恐次日寒熱交作頭面耳項俱腫先以藿香正氣散二服寒熱亦止面腫漸消惟頸間堅腫不退紅嫩作痛此毒聚必欲作曬仍用正氣散加青歸兒刺數服候膿熟針之腫痛頓退又以十全大補湯調健肌生完口

一婦人孀居六載子幼未立憂鬱成核半年又兼經水不調寒熱交作形體消瘦脈亦弦數此勞傷氣血肝火妄動而成斯疾也所謂損者益之不可用追飮之藥損而復損先用逍遙散加香附牡丹皮貝母和其血脉疎其肝氣使寒熱盡退次用益氣養榮湯服至月餘氣血漸復經事漸調元氣漸醒外用火針核上點破四孔用黃線藥挿入五六次候至孔大換用水蠟散搽於核上封之至十三日外其核自落外搽玉紅膏生肌收斂內服人參養榮湯加香

附木香三十餘劑其口自完此婦慎起居回七情戒口味盡調理
故可得愈否則必不能矣

室女年十七因父擇壻未遂耽至二旬懷抱日久項生數核堅硬
如石此肝經凝結筋縮之病也又兼經水斷絕寒熱如瘧咳嗽脉
數惟不顴紅此陰虛火動已成勞瘵症也非藥能愈視其形狀喜
無敗色予曰欲治此病先治其心猶可父問曰何藥治心予曰非
藥也易云天地氤氳萬物化醇男女媾精萬物化生此天地男女
生成化育之道也斯病獨起於孤陰寡陽不生不化所謂逆理之
病此女大失配謂當至而不至漸成失度之疾其病不生而自生
非已作也由時變也故藥不能挽回必得陰陽和而雨澤降夫婦
和而家道成斯時之後用藥方可彼父始悟隨卽擇嫁三月後復
請視之前症稍定先用逍遙散加晉附青皮山梔丹皮貝母十餘

劑開鬱疎肝寒執漸止次以人參養榮湯加丹皮紅花通其血脉
使心血易生容顏稍澤又用益氣養榮湯倍參术培助脾胃增進
飲食間用歸肺湯加麥冬五味遠志沙參收斂神氣寬慰性情又
製參水地黃膏服至半年精神頓復經事亦通惟核不能全退用
火針點破一核琥珀膏貼之漸腐爲膿又兩月而得收斂餘腫三
核漸針漸潰漸斂首尾純用補脾開鬱藥調理一年始得全愈也
一男子年近三十項生數核面白神勞皮羸脈數此元氣受傷之症
也先當補養氣血待根本壯實後治其瘡隨用養榮健脾藥十餘
劑未効彼以爲緩又信方士所惑圖內消之自服斑蝥巴蜀之藥
連篴十數行後致小便淋漓不已虛熱更增飲食減少又復請視
形色內敗不堪調理斷而不治彼後方悔雖請內醫強投扶助降
火之藥終不應而死

婦壯年性急夫湯不爲家左頸生核半載漸至雞卵大堅硬如石皮外紅絲繩繞左右脉俱弦數弦屬肝火妄動數乃脾熱之甚先用梔子清肝湯平伐肝木五服後而脉始平又以清肝解鬱湯數服散其鬱結久用益氣養榮湯調其氣血間服散腫潰堅湯軟其堅腫外以琥珀膏貼之調理百日而元氣乃復堅硬已消八九止存小核未盡彼以爲愈止不服藥後又一載值夫賭訟未勝暴急驚恐前腫復作兩手脉診細而多數此陰血虧損陽火乘之非前有餘症也又兼胸膈不利飲食無味經水先期過多形容憔悴不澤此神傷於思慮則肉脫意傷於憂愁則肢廢魂傷於悲哀則筋攀魄傷於喜樂則皮槁志傷於暴怒則腰脊不能俯仰以上俱七情內損症也法當滋養氣血調和脾胃益腎清心開鬱散滯庶保無虞彼不肯信仍前欲服散腫潰堅之藥欲灸腫上圖內消之予

曰此非前比今則不敢治也請察醫自製前藥亦久患上併灸肘
尖此爲真氣虛而益虛邪氣實而益實後東反加發熱自汙咳嗽
項強四肢不收灸瘡無膿血水不絕腫亦熾盛此臟腑已損之候
必不久居也又曰後傳爲氣急嘔吐嘔血交出而歿子實見庸醫
不辨虛實患家不信正理偏執岐黃往往多致不救者十有九凡
醫者患者俱當省

瘰癧主治

防風解毒湯

防風解毒湯荆桔薄荷枳壳芍藥木通

牛子連翹草石膏知母燈心共葛連

治風毒瘰癧寒暑不調勞傷涼羈攻手足少陽分耳項結腫或
外寒內熱痰凝氣滯者並効

防風

荆芥

桔梗

牛蒡子

連翹

甘草

石膏

薄荷

枳殼

川芎

蒼朮

知母
各一錢

水一鍾燈心二十根煎八分食後眼

連翹消毒飲

連翹消毒飲陳皮
橘葛附子花粉等

甘桔元參芩芍歸
紅花還與大黃噦

治熱毒瘻瘍過食後傅醇酒膏繫以致蘊熱腮項成核或天行丸
熱濕瘻作腫不能轉側者効

連翹

陳皮

桔梗

元參

黃芩

赤芍

當歸

山梔

葛根

射干

花粉

紅花

甘草

大黃

初起便燥
者加之

水一鍾煎八分食後服有瘻者加竹茹一錢

味藿香散

加味藿香散甘桔
不答白芷厚朴另

青陳柴蘇半夏及
夏桔草効君當說

治氣毒瘻瘍外受風邪內傷氣鬱以致頸項作腫肩膊強痛四肢
不舒寒熱如瘧及胸膈不利

藿香

甘草

桂梗

青皮

陳皮

柴葫

柴蘇

牛夏

白水

茯苓

白芷

厚朴

川芎

香附

夏枯草

各等分

黃三片棗二枚水二鍾煎八分食遠服

滋榮散堅湯

滋榮散堅四物湯
陳升麻香附具

甘桔參芩海粉當
紅花昆布共煎膏

治一切癰瘍癰疽所傷氣血不足形體瘦弱潮熱咳嗽堅硬腫痛無分新久但未穿潰者並効

川芎

當歸

白芍

熟地

陳皮

茯苓

桔梗

白朮

香附

甘草

海粉

貝母

人參

昆布

各五分

升麻

紅花

各三分

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服身熱加柴胡黃芩自汗盜汗去升麻倍人參黃芪飲食無味加藿香砂仁食而不化加山楂麥芽胸膈痞悶加澤瀉木香咳嗽痰氣不消加杏仁麥冬白乾作

渴加知母五味子睡臥不寧加黃柏遠志棗仁驚悸健忘加茯神
石菖蒲有汗惡寒加薄荷半夏無汗惡寒加茅木藿香女人經事
不調加元胡索牡丹皮腹脹不寬加厚朴大腹皮

益氣養榮湯

益氣養榮湯水氏
芍藥桔甘兼熟地

參谷陳貝附歸宜
勞傷燥癰大堪題

治抑鬱或勞傷氣血或四肢頸項筋縮結成累索如貫珠者謂之
筋癰此患皆由思慮太過神氣受傷乃勞中所得者也其患或軟
或硬或赤不赤或痛不痛或曰哺發熱或潰而不斂者是

人參

枳芥

陳皮

貝母

香附

當歸

川芎

黃芪

熟地

白芍

甘草

桔梗

白术錢

薑三片棗二枚水二鍾煎八分食透服
如胸膈痞悶加枳殼本杏

飲食不甘暫加厚朴蒼术

往來寒熱加朱萸地骨皮

膿潰作渴倍參芪歸术

膿多或清倍當歸川芎

脇下痛或痞加青皮木香

肌肉生遲加白芍肉桂

痰多加半夏橘紅

口乾加麥門冬五味子

發熱加柴胡黃芩

渴不止加知母赤小豆

膿不正倍加入參黃芪當歸

潰後反痛加熟附子沉香

虛煩不睡者倍人參熟地遠志
蕤仁

連二陳湯

芩連二陳用茯苓
牛蒡桔梗甘草

桔草連翹天花粉
潤燥散核效如神

治瘻瘍生於少陽部分項側結核外皮漫腫色紅微熱或至缺盆
高骨上下發腫形長堅硬作痛名曰馬刀初起並宜服此已成氣
弱者不宜

黃芩

黃連

陳皮

茯苓

半夏

甘草

桔梗

連翹

牛蒡子

花粉各一錢

木香

三分

夏枯草

三錢

薑三片水二盞煎八分食後服渣再煎臨睡服

膿瘻瘍堅

湯散
牛蒡桔梗粉龍胆草
連翹

歸芍桔梗木葛升柴
知母昆布軟堅藥

治瘻瘍馬刀瘻堅硬如石或在耳下或至缺盆或在肩上或至脇
下皆手足少陽經症又發於下頸或至頸重堅而不潰或已破流
膿又屬足陽明症也此治有餘症而效多不足症而效少

黃芩分八

白芍

當歸

龍膽草

桔梗

知母炒

黃耆酒炒

昆布

花粉各五分

連翹

葛根

炙甘草

黃連

三稜酒炒

莪朶

三正子各三錢

升麻分三錢

水二鍾煎八分食後服臨服入酒一小杯亦效此藥可爲末煉蜜

爲丸桐子大每服八十九粒散腫潰堅丸治症同前臨睡食後俱

白滾湯下

升麻散堅湯

升麻散堅湯目草
葛根龍膽夏枯等

莪朶白歸翹芩花粉
三稜陳桔連

治療瘻瘍邊頸或至頰車屬足陽明核深遠陷隱曲肉底又屬足少陰俱作腫塊堅硬大小不一

升麻

甘草

莪朶

三稜

陳皮

桔梗

黃連

龍膽草

葛根

川芎

白芍

夏枯草

連翹

黃芩

當歸各五錢

花粉有蜜加

水二鍾煎八分食後熱服再用上藥加倍爲末。左裝豆大每百

丸苦酒臨睡服頭不枕更妙。

桔草湯

夏枯草湯歸本陳
香附柴胡白芷等

桔甘生也貝母芩
加上紅花效若神

治癰癧馬刀不問已潰未潰或已潰日久成漏形體消瘦飲食不
甘寒熱如瘧漸成勞瘵並效。

夏枯草

錢當歸錢

白朮

桔梗

陳皮

生地

柴胡

甘草

貝母

香附

白芍

錢各一

白芷

紅花分

先用夏枯草水三碗煎至二碗濾清同藥煎至八分食後服將藥
渣同前夏枯草渣共再煎六七分臨臥時入酒半小鍾和服宜食
淡味物件。

血化堅湯稍益
加丹皮

芎歸貝母防角刺
加川芎

治一切癰癧癰癧瘍核初起未潰脹者

正効

防風

赤芍

歸尾

花粉

金銀花

貝母

川芎

皂角刺

桔梗錢

姜蘿

厚朴

五靈脂

陳皮

甘草

乳香

白芷稍分

水二鍾煎八分臨服用酒一小杯食後服

逍遙散

逍遙散當歸芍藥牡丹皮薄荷甘草

白茯苓香附柴胡
雲片冰女病堪扶

治婦人血虛五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忡頰赤口燥咽乾
發熱盜汗食少嗜臥及血熱相搏月水不調脅腹作痛寒熱如瘡
及治室女血弱榮衛不調痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

當歸

白芍

茯苓

白术

柴胡錢

香附八分

丹皮分

甘草六分

薄荷

黃芩

有熱加各五分

水二鍾煎八分食遠服有寒加薑三片棗二枚

通治癰瘡方

通治癰瘡方陳水
荅芷藿香連翹草

當歸柴芩與甘桔
半夏芍附功難迷

治癰瘡不分新久表裏虛實及諸癥結核並效

陳皮

白朮

柴胡

桔梗

川芎

當歸

白芍

連翹

茯苓

香附

夏枯草

黃芩錢

藿香

半夏

白芷

甘草

各五分

薑三片水二鍾煎六分入酒一小杯臨時服

歸養榮湯

歸養榮湯
荅芷藿香連翹草
五味子麥門冬遠志

參芍砂仁熟地黃
麥冬甘草共煎膏

治癰瘡流注及一切不足之症不作膿或不潰或已潰不斂或身體發熱惡寒肌肉消瘦飲食少思睡臥不寧盜汗自汗驚悸恍惚並皆治之

當歸身錢人參

各二錢

黃芪

白朮

川芎

白芍

各五分

熟地

各二

五味子

麥門冬

遠志

甘草

茯苓

各五分

牡丹皮

砂仁

各三

水二錢薑三片棗二枚煎八分食遠服

水螺散

水螺散內用田螺
龍腦硝砂爲細末

白砒將來紙廻糊
總將津拌患頭塗

治癩瘻日久堅核不消及服沙藥不效者用此點落瘻核如馬牙根大面小及失榮等症忌用

大田螺五枚去殼日中線穿兩孔

白砒一錢二分水

硝砂二分

用晒乾螺肉切片同煅熟白砒研爲細末加硝片再研小罐密收凡用時先用艾炷灸核上七壯次後灸瘻起泡以小針挑破將前藥一二厘津唾調成餅貼灸頂上用綿紙以厚糊封貼核上勿動泄氣七日後四邊裂縫再七日其核自落換搽玉紅膏內服補藥兼助完口此藥又治癩瘻大蒂小及諸般高突異形難狀者並效

紫霞膏

紫霞膏晶不多股
前入麻油如紫漆

銅綠松香一處攢
百般頑症貼當安

治癰瘡初起未成者貼之自消已成未潰者貼之自潰已潰核存者貼之自脫及治諸色頑瘡臘瘡濕瘡濕氣新久搾瘡疼痛不已者並用之

明淨松香

淨末一触

銅綠

淨末二兩

用麻油四兩銅鍋內先熬數滚滴水不散方下松香熬化次下銅綠熬至白烟將盡其膏已成候片時傾入磁罐凡用時湯內頓化旋攤旋貼

琥珀膏

琥珀膏內相防歸
丁木二香莫麻子

松脂殊砂木鱉倍
木通白芷共相隨

治療瘻及腋下初如梅子結腫硬強漸若連珠不消不潰或潰膿水不絕經久不瘥漸成漏症

琥珀

木通

桂心

當歸

白芷

坊風

松脂

硃砂

小瀉肉

萸麻同名五錢可香

赤香繖

麻油

二兩

黃丹

飛炒十

先用琥珀丁香桂心硃砂木香爲細末其餘切片浸油內七日入鍋內慢火熬至羣藥焦勻爲度絹瀘淨油徐下黃丹以柳枝手攪候至膏成滴入水中軟硬得中掇下鍋來以益顧穩攬至烟盡方下羣藥攬匀磁器盛之臨取少許摊貼

大紅膏

大紅膏用竭銀珠
輕粉南星併石蠟

硝石樟水味不殊
乳香猫骨效堪塗

治癰瘡核結塊不分新久但未穿破者並效

南星

二兩

銀硃

血竭

硝石

朝腦各三錢
輕粉

乳香

各二錢

猫頭骨

煅

石灰

一兩用大黃二錢切片
同炒石灰紅色去大黃

右共爲細末陳米醋熬稠調藥敷核三日一換敷後皮嫩微損者另換紫霞膏貼之其核自消

火針法

火針之法獨稱雄
煙草桐油相協力

破核消炎立大功
當頭一點破癰瘤

治療癰瘍核生於項間初起堅硬或如梅李結聚不散宜用此法
針之插藥易消用縫衣大針二條將竹筋頭劈開以針雙夾縫內
相離一分許用線扎定先將桐油一盞用燈草六七根油內排勻
點著將針燒紅用手指將核捏起用針當頂刺入四五分核大者
再針數孔亦妙核內或瘀或血隨即流出候盡以膏蓋之次日針
孔必漸作膿輕者用苦線藥插之核堅硬者用水蠅散糊打成條
晒乾插核針孔內外以糊紙二重封固次日其核發腫作痛不妨
乃藥氣攻入於內又至七日外自然核外裂開大縫再至七日其
核自落葱湯洗淨孔大換用玉紅膏搽入外以膏蓋內服益氣養
榮湯或十全大補湯加香附兼戒勞動氣惱房事發物煎炒海腥
等件

首品一條鎗古卽一條鎗加乳香爲線藥

外治瘡漏諸症平

上品錠子去十八種特中品錠子去五漏翻花燐癌氣核下品錠子治癰瘡疔瘡惡腫脹背胸痕等症此爲古之三品錠子但藥同而分兩不同治病故有分別今註一條鎗本方三吊以下之症皆用之俱各相應況又藥品簡易而不繁是曰三品一條鎗之說也凡同志者隨試而用之

明礬兩白矾一兩雄黃二錢乳香二錢

砒礬二味共爲細末入小罐內加炭火煅紅青焰已盡旋起白烟
片時約上下紅徹住火取罐頓地上一宿取出約有砒礬淨末一
兩加前雄黃二錢四分乳香一錢三分共研極細糊調稠搓成
如線條陰乾凡遇前症有孔者挿入孔內無孔者先用針放孔竅
早晚挿藥二次挿至三日後孔大者每挿十餘條挿至七日患孔

卷之三
藥條滿足方住以後所患四邊自然裂開大縫共至十四日前後其疔核瘰癧痔漏諸管自然落下降用湯洗搽上玉紅膏處兼服健脾之藥

瘰癧酒藥方

治年久瘰癧結核甲生滿項頑硬不穿破者服

鵝風草半
牛膝忍冬藤六子野蓬蒿兩野菊花四

四子五瓜龍頭

馬鞭草

一兩
五錢

上藥切碎用老酒十五觔裝貯藥懸於酒內封口煮三盞爲度取起水頓浸一伏時初服盡醉出汗爲效已後隨便應之其酒一料病愈不發

瘰癧鷹角方

玉紅膏

大膏

見腫

柴胡清肝湯

梔子清肝湯

見醫門

荆防敗毒散

見時

十全大補湯

歸脾湯

見醫門

鬚疽論第二十

去鬚疽者乃手少陽三焦相火妄動又兼腎虧不能生水或外受風熱所感但此經多氣少血肌肉相薄凡有患最難腐潰此皆起於情性急暴房然血虛火動肝氣凝結而成疽之初起寒熱交作頭眩痛徹太陽甚則耳目迎眉通脣治法不可妄用針灸必分陰陽表裏邪正虛實治之庶不有悞且如初見瘡時多寒少熱口乾作渴好飲熱湯六脉虛數無力又兼患上堅硬多不焮痛無潰無膿瘍根流散此等之症乃並病虛而邪氣實也治以托裏爲主消毒佐之如清肝養血湯托裏消毒散之類是也又如見症時熱多寒少頭眩作痛口燥舌乾渴欲飲冷二便秘澁六脉沉實右力瘡亦

焮腫疼痛身體發熱易腐易爛根腳不開腫焮在外此乃正氣實而邪氣虛也治以消毒爲主托裏佐之如梔子清肝湯鼠粘子湯之類是也大抵正氣勝則實邪氣勝則虛必然一勝則一負邪正不並立欲其虛而不得損而自虛又有未見瘡時先作渴症或一年半載日久日重然後發爲瘡疽其形色多紫黑瘡多不陷堅硬無膿毒流耳項又兼氣味不正形容不擇精神不明飲食不進者俱爲不治

鬚疽看法

初起無口乾無寒熱飲食有味舉止常發瘡者順已成瘡頭腫起根腳不散形色紅活掀痛潰膿者順已潰膿稠色鮮紅活腫消痛止頃便頭輕口和者順潰後瘀肉易腐新肉易生瘡口易平飲食有味目順初起瘡頭如粟頭軟不同色紫根散木瘤食少者逆已成瘡形

紫黑軟陷無膿足冷身涼便利脉滑者逆已潰膿水清稀多生臭穢
壞肉不腐新肉不生者逼潰後飲食暨食身體發熱口乾不眠肉割
皮筋者逆

醫道治法

初起掀腫堅硬內熱口乾脈數有力邪實也當利之已成寒熱
四肢拘急脈浮者邪在表也宜散之赤腫作痛血凝滯也散並清肝
色黯漫腫升陽和胃已潰堅腫不退脈細而數日補發熱者宜滋陰
健脾肝膽怒火上攻心煩作燥加瀉紅熱者當抑陰降火已潰體冷
腫痛尤甚虛煩食少者宜養氣血健脾胃潰後氣血俱虛身涼脉細
大便多溏者宜峻補溫中潰後不斂新肉生遲瘡白淡白膿水不止
健中補脾

醫道治驗

男子患此三日焮腫寒熱脈浮數以荆防敗毒散一劑表症悉退
腫痛仍作已欲作膿以托裏消毒散膿潰又以氣養營湯加麥
冬五味漸斂而愈

一男子患此五日頭高根若錢大形色紅活此肝經濕熱爲患用麻
子大艾灸七壯以梔子清肝湯二服腫勢稍止以蟾酥餅膏貼灸
上更以柴胡清肝湯加白芷黃芪天花粉數服膿消腫消半月收
斂

一男子渴疾三年寒熱半月自以爲癰瘍間忽生一小瘡三四日外
形如粟瘡半堅硬色暗不澤又兼脉洪數而無力此水竭火旺之
症也終難潰斂辭不敢治復請醫羸爲易治用針刺腫上去瘀血
鍾許內服解毒藥次日邊傍愈腫瘍者謂腫高屬陽易治彼家懼
死又三日思貢其踵口禁不食利口又呵連上日加昏濶又復請

視予曰死將及矣但此症未病先有渴腎水已竭外形如粟裏可
容谷形色紫黑氣敗血衰脈洪無方元氣內敗如此干涉甚者不
死者彼家方信晚矣其二十一日而歿

一男子腫焮五六日彼欲內消外敷以藥內服大黃泄氣導利隨後
焮腫雖退乃生寒熱惡心乾嘔肩胛牽強診之脉數無力此內虛
毒氣入裏瘀滯之過也東垣云瘡疽之發多之有內外之別治之
有寒溫之異受之外者當托裏以溫劑反用寒藥攻利損傷脾
胃多致內虛故外毒乘虛入裏受之內者當疎利以寒劑反用
溫劑托裏初病則是骨髓之毒誤用溫劑使毒上徹皮毛表裏通
潰其爲一瘡助邪爲毒甚楚百倍輕則變重重則死矣前症旣出
塞藥之過以托裏健中湯一服嘔吐全止又以十全大補湯加白
芷數服而原瘡漸起又以人參養榮湯間服膚潤體潤兩月餘瘡

科正宗
卷之五
口收斂

婦人患此腫硬寒熱口乾歎痛脈洪大有力此表裏俱實也以防風通聖散一劑行二次前症稍退又一劑大行數次熱退渴止惟原瘡腫硬用銀針點破挿入蟾酥條內服托裏消毒散漸消腫而安

男子患此三四日項高根活且無表裏之症此肝經濕熱爲患用針挑破瘡項以蟾酥餅蓋貼內服加味道遙散加皂角針數服頭出微膿根腫亦消

鬚疽主治方

葫清肝湯

柴胡清肝丸牛蒡子花粉

黃芩梔子地黃隨

甘草連翹功獨翹

治鬚疽初起未成者毋論陰陽表裏俱可服之

水二鍾煎八分食遠服

馬粘子湯

鼠粘子湯

元參麥冬大花粉

桔梗

赤芍連翹地骨皮
防風大黃不可遺

治瘡疽初起熱壅寒少頭皮作痛口燥咽乾渴宿飲冷便秘泄

六脉沉實有力爛闊疼痛者

馬粘子

桔梗

當歸

甘草稍

赤芍

連翹

元參

地骨皮

防風

花粉

木通各一錢

大黃一錢

水二鍾煎八分食前服

少味逍遙散

加味逍遙散白朮芩
當歸梔子天花粉

治瘡疽七日以上根盤深硬色紫燃痛者宜服

白朮

茯苓

牡丹皮

白芍

柴胡

陳皮

當歸

山梔

貝母

天花粉各八

甘草

紅花

羚羊角各五分

水一鍾淡竹葉二十七片煎八分食後服

竽清肝湯

桔子清肝湯牛子黃連甘草丹皮等

柴芩芍芍石當歸
用冰同煎一處隨

治少陽經虛肝火風熱上攻遂成鬚痘頭項胸乳太陽等處
或寒熱喘甚胸滿口苦舌乾

牛蒡子

柴胡

川芎

白芍

瓦膏

當歸

山梔

丹皮各一錢

黃芩

黃連

甘草各五分

水二鍾煎八分食後服

解鬚湯

清肝解鬚湯桔子清肝解鬚湯人參半夏丹皮附

荅水梔柴貝母隨
川芎熟地草陳宜

治暴怒傷肝動氣鬱結致肝火妄動發爲鬚痘頭眩痛徹大陽胸
膈痞連兩脇酸水皆服之

山梔

半夏

人參

柴胡

丹皮

陳皮

香附

川芎

六分

甘草

四分

水二錢 薑三庄煎八分食還服

芩內托散

參芩內托散當歸熟地官桂甘草藥

治鬚眉已成堅而不潰潰而不乾氣血俱虛身涼肺細飲食少思口淡無味及形體消瘦者服

歸身

黃芪

川芎

白芍

陳皮

白朮

山藥

熟地

茯苓

人參

各一錢

甘草

肉桂

熟附子

丹皮

地骨皮

五分

薑三庄宋二枝水二錢煎八分食還服

安萬靈丹

見癱瘓門

治鬚眉初起增寒壯熱頭眩惡心四肢拘急者

痘應用方

托裏消毒散

見風門

蟾酥餅子

瘡門

荆防敗毒散

見時毒門

人參養榮湯

益氣養榮湯

防風通聖散

見時

升全大補湯

俱見病瀉瘍門

咽喉論第二十一

咽喉雖屬於肺然所致有不同。自由虛火實火之分。緊喉慢喉之說又咽爲心肺肝腎呼吸之器。飲食聲音吐納之道。此關係一身害人迅速故曰走馬看咽喉。待少頃也。假如虛火者色淡微腫脉亦細微小便清白大便自利。此因思慮過多中氣不足脾氣不能中護虛火易至上炎此恙從咽喉乾燥飲食妨礙咳吐痰涎平及不利。生苔鮮靈皆假。又有如生草常利候中又如更物

溢於咽下嘔吐酸水喊出甜瀉而則舌上白脂晨星猶色聲音嘶
啞喘急多痰以上等症皆出於火元氣不足中來治此不可悞
投涼藥上午痛者屬氣虛補中氣湯加麥冬五味子牛蒡元參
午後痛者屬陰虛四物湯加黃柏知母桔梗元參如服不効者必
加薑附以爲引導之用亦爲佐使之法也實火者過飲醇酒縱食
膏粱疊葷重矣鋪食辛辣多致熱積於中久則火動痰生發爲咽
腫甚者風痰上壅咽門閉塞少水不入聲音不出此爲喉閉
緊喉風是也用藥不及事先用刺喉間發泄毒血隨用桐油餲
雞翎探吐稠痰務使痰毒出盡門得鬆湯藥可入語聲得出乃
止內服清咽利膈湯疏利餘毒牙關緊閉難入必當先刺少商
出血其閉自開如針刺探吐無聲如曳鋸鼻掀痰喘湯水不入
語聲不出者真死候也又有喉瘻喉癰乳蛾上脣癰等症其患雖

而咽門半寒半熱其病雖凶而喉道又寬又腫此皆標病雖重
不妨常用金鎖匙吐出痰涎利膈湯推動積熱膿脹痛者開之損
而痛者益之其患自安凡喉閉不刺血喉風不倒痰喉癰不放膿
穿肺乳蛾不針烙此皆非法又云痰火勞瘦咳嗽咽痛者無法可
治

咽喉看法

紅色腫痛語聲清朗亦無表裏之症相兼者輕已成腫痛咽喉
半開咯吐痰涎飲食稍進者虛咽喉腫閉牙關緊急言語不清
氣急聲小者喰咽咽喉驟閉痰壅塞口噤不開探吐不出聲喘
時瘡之後毒結咽喉腫痛腐肉吐納不堪聲啞者重久嗽痰火
上攻咳傷咽痛但見聲嘶面赤者死

咽喉治法

初起腫痛寒熱脉頭指急者亦在表也宜微和丸加細辛
脉有力而便秘者邪在內也宜下之腫痛寒熱口乾作渴脈洪大而
有力者宜發表攻裏咽喉腫痛痰涎壅甚面紅口乾邪在上也宜探
吐之喉閉痰壅塞氣急口噤難開先刺少商後行吐法已成脹痛
咽喉塗塞湯水不入腹已成也宜急針之腫痛微紅脈虛無力午後
痛者屬陰虛宜滋陰降火腫偏色白咯吐多涎上午痛者屬陽虛宜
補中健脾

咽喉治驗

一男子咽喉腫痛發寒體倦脈弦有力此邪在表以荆防敗毒散加
牛蒡元參一劑表症已退腫痛仍作又以元參解毒湯一劑腫痛
減半又二劑而安

一男子咽喉腫痛痰涎壅盛用金鑑匙先吐稠痰清咽利膈湯堆湯

積熟腫痛稍減惟色紅甚此火熟也又以黃連解毒湯加桔梗二
刺紅腫亦退而安

男子素飲火酒一時咽喉腫閉口噤苦強痰涎壅塞勢頗危急用
針先刺少商二穴口噤方開以桐油錢雞翎探吐稠瘀數碗語聲
方出仍用針刺腫上出紫血鍾許溫湯漱淨冰硼散擦之以涼膈
散加芒硝天花粉利去積熟又以蓮翹散二劑而安

婦人肥甚暑熱咽間腫痛痰涎上壅語聲不出甚危先用針刺毒
血次以金鑽匙吐去稠痰五六碗以清咽利膈湯一服腫痛少減
去硝黃又服而安

男子勞甚咽喉腫痛自服清咽利膈藥不應診之脈細而虛此勞
傷虛火之症朝以補中益氣湯加麥冬五味子桔梗元參晚以四
分湯加黃柏知母炒黑佐薑根加童便不數日狂癇亦消吸收回

愈

一婦人咽痛微腫色白吐嚥不利診之脈亦細微此中氣不足虛火假症也用理中湯二服其疼頓止又以補中益氣湯加炒黃柏知母數服再不復作

一男子腫痛日甚服清咽利膈藥不應必欲作膿以防風通聖散去硝黃二服喉脰脹痛而下針便愈

咽喉主治方

清咽利膈湯

清咽利膈湯
大黃牛蒡黃連等

甘桔荆防梔薄銀
朴硝加上黑元參

治積熱咽喉腫痛痰壅盛及乳蛾喉癰舌苔或胸膈不利煩燥飲冷大便秘結等症

連翹

葛芩

甘草

桔梗

荆芥

防風

山梔

薄荷

金銀花

黃連

牛蒡

元參

各一錢

大黃

朴硝各二錢

水二鍾煎八分食遠服

元參解毒湯

元參解毒湯山梔葛根生地兼荆芥

治咽喉腫痛已經吐下飲食不利及餘腫不消

元參

山梔

甘草

黃芩

桔梗

葛根

生地

荆芥各一錢

水二鍾淡竹葉燈心各二十件煎八分食後服

連翹散

連翹散內葛根芩
門冬牛蒡同甘草

赤芍山梔桔梗升
木通加上効如神

治積飲停痰蘊熱膈上以致咽喉腫痛胸膈不利咳吐痰涎舌乾口燥無表裏症相兼者服此

連翹

葛根

黃芩

赤芍

山梔

桔梗

十味

麥冬

牛蒡

甘草

水通

甘草黃芩桔梗隨
竹葉燈心共得宜

水二鍾竹葉二十片煎六分食遠服

薄荷粉桔連大黃

治膈散

涼膈散
元參石膏牛蒡子
中荆芥防

治咽喉腫痛痰涎壅甚膈間有火大便秘滿

貝母山梔功效良

防風

荆芥

桔梗

山梔

元參

石膏

薄荷

黃連

花粉

牛蒡

貝母

大黃各等分

水二鍾煎八分服

金鎖匙

金鎖匙 中川焰硝
加上硼砂研細末

治喉閉纏喉風癆涎壅塞口噤不開湯水不下

焰硝

一兩明少五錢
五錢硼砂錢半錢
上加掌

白姜鹽錢三錢

甘草乾薑白朮散

各另研爲末和勻以竹筒吹患處痰涎卽出如痰雖出腫痛仍不

消急針患處去熏血服前藥

理中湯

理中湯內藥四般
加上人參水煎服

甘草乾薑白朮散
虛陽之火立時安

外科正宗 卷之三
治中氣不足虛火上攻以致咽間乾燥作痛吐嚥妨碍及脾胃不健食少作嘔吐腹陰疼等症

人參一錢

甘草八分

乾薑五分

白朮二錢

炒黑

水二鍾煎八分食遠服

桐油錢

桐油錢

桐油錢

治的喉風如神見

間生起死真堪美

桐油錢 治喉風喉閉其症先兩日胸膈氣急呼吸短促驀然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治先用溫湯半碗加入桐油三四匙攪勻用雞翎蘸油探入喉中連探四五次其瘻壅出再探再吐以人甦醒聲高爲度後服清咽利膈之藥

治喉烏頭散

烏龍散

只一品藥

十八喉風總堪嚼

治喉烏頭散

開關利膈效如神

虛火實火要斟酌

十八喉風總堪嚼

根因

歌

十八喉風各有名

原來總是一根因

曰

子孫代代宜珍惜

誓不輕傳與世人

用猪牙皂角七條去皮燒爲灰水一盞煎五分入人乳三匙治
眼卽時非吐卽瀉治咽喉腫痛痰涎壅盛喉風喉瘻乳蛾等症並
效惟纏喉風牙關緊閉者不可與恐痰上出而口不開壅塞無路
而出故也除此皆效又久病咽痛忌用

神效吹喉散

神效吹喉散薄荷白柴胡火硝黃連等

姜黃青黛朴硝和加上硼砂病自瘥

治纏喉風閉塞及乳蛾喉瘻重舌木舌等症効

薄荷 姜黃 青黛 朴硝 白礬 火硝
硼砂各五錢

上藥各爲細末臘月初一日取雄猪膽七八個倒出膽汁用小半
和上藥拌勻復灌膽殼以線扎頭膽外用青缸紙包裹將地掘一
孔濶深一尺上用竹竿懸空橫吊上用板鋪用泥密蓋候至立春
日取出挂風處陰乾去膽皮青紙磁罐密收藥一兩加水片三

分同研極細吹患止神效歌曰此法端的通神聖萬兩黃金方不傳

少陰甘桔湯

加味甘桔湯黃芩
川芎升麻併葱白

柴胡葛根元參陳多陰咽痛卽安寧

治少陰咽痛頭眩脉沉細而身猶熱者宜服之

桔梗

錢二

甘草

錢一

陳皮

川芎

黃芩

柴胡

元參

各六分

差活

升麻

各四分

水二鍾葱白一根煎八分不拘時服

清音噙化丸

清音噙化丸清音噙化丸

二冬二地歸肺柏

烏梅梨汁人半乳參芩阿膠療音雌

治肺氣受傷聲音

雌啞或久嗽喉傷聲啞亦宜此啞或久嗽喉傷聲啞亦宜

訶子

真阿膠

天冬

鹽水拌炒

知母各五錢熟地各一錢生地各一錢熟地各一錢人參三錢麥冬去心

白茯苓

黃柏

蜜炙

當歸

天冬鹽水拌炒

生地

熟地各一錢生地各一錢人參三錢

烏梅肉

十五個

人乳

牛乳

梨汁各一塊共一錢

亦可取效

治暴疾音

暴失音方猪板油慢火煎至稠膏住

再加白蜜兩相投每日三匙不用憂

雄豬板油一斤入鍋先煉成油瀘去渣入白蜜一斤再煉少頃絹
瀘淨磁器內盛定成膏不時挑服一茶匙其音漸清無疾時亦可
常服潤肺

噙化丸

噙化丸中用白礬明礬蜜肉丸成就

硼砂牙皂共雄黃吐嚥難第一方

治梅核氣乃痰氣結於喉中嚥之不下吐之不出如毛葛常刺作
痒新則吐酸妨礙久成閉塞

膽攀

硼砂

明礬

牙皂

雄黃

各等分爲末紅棗煮爛取肉爲丸芡實天空心噙化一丸溫黃酒

一杯過日內服蘇子降氣湯

陳皮半夏共前胡

蘇子降氣湯

蘇子降氣湯厚朴
甘草少

生薑爲引效堪圖

治虛陽上攻氣不升降致結患咽喉痰涎壅塞

蘇子

一分錢
五分

厚朴

陳皮

半夏

前胡

官桂錢一

甘草

五分

水二鐘量三片煎八分食涼服

小砌散

冰硼散效貴堪考
冰硼散效貴堪考

治咽喉口齒新久腫痛及久嗽癰火咽喉作痛

冰片

五分

冰砂

六分

元明粉

分法性
未卷

硼砂

各五錢

共研極細末吹搽患上甚者日搽五六次最效

四喉應用方 黃連解毒湯

見并
瘡門

少商穴在手掌外側去瓜里角
二分是穴刺血

防風通聖散

四物湯

見并
瘡門

荆防敗毒散

見并
瘡門

補中益氣湯

重訂外科正宗卷之六

時毒論第二十二

夫時毒者天行時氣之病也春當溫而反寒夏宜熱而反涼秋當涼而反熱冬宜寒而反溫此四時不正之氣感於人發成斯疾也自有陰陽表裏寒熱虛實易治初起與風寒相類惟頭面耳項發腫爲宜其患既得寒熱發作體強頭眩脉浮緊數者爲邪在表以荆防敗毒散或萬靈丹發汗以散之如兩目眞赤漸次傳脾者乃正陽明受病其患煩脣發熱便秘口乾多熱少寒脉數有力爲邪在裏五利大黃湯四順清涼飲下之又頭角兩耳前後結腫者乃手少陽經受之其患耳聾筋痛寒熱嘔吐口苦咽乾煩燥時甚當知母石膏湯小柴胡湯和之通用防風通聖散加牛蒡元參解毒攻裏勞役凶荒沿門間巷傳染著黃瀆消毒飲霍香正氣散以安

之表裏俱解腫而消宜砭去惡血腫熱甚者如意金黃散敷之微熱不紅堅硬者冲和膏透而用之自後仍不消者必欲作膿宜托裏消盡散加白芷皂角針托之已潰體倦食少者補中益氣湯膿穢脾虛食而嘔吐者香砂六君子湯潰而不妙者大全大補湯又有毒中三陽自項之以上俱發腫者光如水色雙目合縫唇似猪形口角流涎腫不消潰聲不出飲食不入咽喉腫閉牙關難開破流真水穢氣連綿不絕者如此但爲不治

時毒看法

初起寒熱交作頭面一處作腫紅赤發熱疼痛者易已成高腫發熱疼痛有時語聲清朗湯藥易入者輕已潰膿稠堅腫漸消疼漏漸減飲食漸進身溫者吉潰後膿水漸止腫退肌寬神形精審安穩首頁乃起多寒少熱頭面耳項俱腫尤如水晶不熱者險已成漫腫

無頭牙關閉閉湯水不入脣口不出者過日涓涓有津氣明則身
腫痛不除如尸發肿者死潰後臭水淋漓腫不知痛手足多瘡常出
謔言者死

時毒治法

寒熱交作頭眩體痛六脉浮緊邪在表也宜汗散之頭面赤腫作痛
口燥咽乾大便祕實邪在裏也下之外有寒熱內亦口乾脈弦有力
表裏俱實發表攻裏表裏俱解腫痛仍不消者方瘀血凝滯宜砭去
惡血砭血之後腫痛仍作不消者已欲作癟宜托腰健脾腫痛日久
而脹痛者已有膿針之更兼補托脾胃潰後腫痛不減濃清腥穢
脾胃弱也更宜溫中健脾餓年時毒流行傳染者忌用攻發當和解
宜養正氣

時毒治驗

一男子耳項腫痛發寒熱脈浮數以荆防敗毒散一劑寒退熱存又以連翹消毒飲二劑便行三次內熱頭退餘腫不消本方去大黃加川芎數劑而愈

一男子先發寒熱次日頭面俱腫又二日口噤湯水不入診之脉洪數而有力此表裏俱實也又咽喉不利碍湯藥難下先用針刺咽間去惡血鍾許牙關稍開以防風通陽散一劑徐徐服之便去三四次腫止砭去惡血以金黃散敷之久目腫勢稍退又以普濟消毒飲二劑而腫漸消惟兩耳下堅腫不退此必作瞞又以托裏消毒散數服候瞞熟而針之次以土全大補湯去肉桂加陳皮十餘劑而斂

一男子牙根腫痛久傳腮頸俱腫頸半寒熱此陽明濕熱上攻用荆防敗毒散加石膏一劑寒熱頓退惟腮腫不消以針刺牙根腫上

出毒血以水硼散之外敷項 着妙貼散內服牛蒡子湯勸服而

愈

一男子冬月耳面亦腫發熱口乾 脈洪實而便祕此三陽虛熱症也
必捨時從症治之以五利大黃湯一劑便行二次赤腫稍退內熱
稍減又以升麻解毒湯二服腫亦消而病愈此爲用寒遠寒之意
也

一婦人冬月面腫咽痛口噤難開 脉診洪數有力又見房中煙氣如
烘此因爐火盛也以黃連解毒湯加元參一劑次日腫消咽利又
用一劑其疾痊安

一男子勞甚鬚間腫硬肉色不變 看來勞傷氣血濕瘀凝滯之症與
去外感時毒不同又診脉細數而無力爲內傷損病治當養氣血
調經脉理若續損治之彼欲內消自服仙方活命飲二服腫不覺

治脾胃已損又請一醫方行政
泄不止腫硬愈堅痰癥愈甚復謂視之辭不可治予曰凡療理病
有未治有權宜此病初起肉色不變者血不足也堅硬不熱者
脾胃弱也脉細數而無力正氣衰也豈可用前有餘之藥以攻不
足之病後又強投溫中補劑不懲而死

時疫王治方

防敗毒散

川防敗毒散人參
茯苓枳殼同甘草

治時毒初起頭眩惡寒腮項腫癰脈浮者服之

荆芥

防風

羌活

獨活

前胡

柴胡

川芎

桔梗

茯苓

枳殼

各一
錢

甘草

各五

薑三片水二鍾煎八分食送服

甚加葱三枝

人參各五

利大黃湯

五利大黃湯黃芩
歸脾散加大便散

升麻梔子朴硝評
服之效好

治風寒外感頭痛溫傷秋月實有力者用之

實有力者用之

大黃

黃芩

升麻

芒硝

梔子

各二錢

水二鍾煎八分空心服未利者溼再煎服

連翹消風散

連翹消風散
葛芩花粉桔梗草

赤芍生牛蒡薄荷隨
枳殼升麻共所依

治時毒表裏二症俱罷餘腫不消疼痛不退者

連翹

川芎

當歸

赤芍

牛蒡

薄荷

黃芩

花粉

甘草

枳殼

升麻

芒硝

水二鍾煎八分食後服燥者加酒製大黃

防風通聖散

防風通聖將軍身
桔梗梔子白朮

薄荷芍藥草朴硝
荆芥麻黃滑石膏

治時毒惡寒發熱煩躁口乾表裏脉症俱實者

防風

白芍

薄荷

川芎

桔梗

山梔

黃芩

白朮

當歸

連翹

荆芥

麻黃

滑石

石膏

各一錢
甘草分五分

芒硝一錢
大黃酒炒一錢

水二錘煎六分空心溫服

濟消毒飲

普濟消毒飲以連
柴桔翹藍併馬勃

治時疫發瘧初覺憎寒發熱肢體沉重次傳頭面作腫或咽喉不利舌乾口燥煩渴不寧者服

黃芩

黃連

各二錢
人參

陳皮白

元參

甘草

升麻

桔梗

各三分
連翹

牛蒡

馬勃

板藍根

水二錘煎八分食後服如大便爲度腫勢甚者宜砭去惡血

氣散

通氣散內用延胡
川芎牙皂共爲末

治時疫發瘧寒痛咽喉不利語宣不爽者用之

羊蹄蹠花與藜蘆
擦於鼻內竈治瘧

支吾家藏方 卷之二
水銀分 水銀分 踏頭木五分

爲細末用紙燃薰藥少許于鼻內取嚏爲效

在裏消毒散

見肺門

治時毒壅裏俱解腫尚不退欲似作膿者服之

牛蒡子湯

牛蒡子湯用葛根
江西豆豉同甘草

還將管仲共相呈
煎嘗時毒可安寧

治時毒熱甚腫痛脉數而無力者宜服之

葛根

管仲

甘草

江西豆豉

牛蒡子

半熟研
各二錢

水二鍾煎八分食後服

大辛大補湯

見潰瘍門

治時毒潰後膿水清稀形容消瘦脾胃虛弱飲食減少虛熱不眠
自汗盜汗及不收斂者服之

小兒王宗

卷之二

五

時毒應用方

金黃散

見風
瘡門

冰硼散

見喉
瘡門

真君妙貼散

見風
瘡門

貴連解毒湯

見疔
瘡門

升麻鮮苦湯

見楊梅
瘡門

瘦瘤論第二十三

夫人生癰瘤之症非陰陽正氣結腫乃五臟瘀血濁氣瘀滯而成瘦者陽也色紅而高突或帶小而下垂者陰也色白而漫腫亦無癢痛人所不覺薛立齋分別甚詳肝統筋怒動肝火血燥筋掣曰筋瘤心主血暴急大甚火旺逼血沸騰復被外邪所搏而腫曰血瘤肺主肌肉鬱結復脾肌肉消薄主治不行逆於肉裏而爲腫曰肉瘤肺主氣勞傷氣腠理不密外寒搏而爲腫曰氣瘤腎主骨恣飲傷骨腎火鬱遏骨無榮養而爲腫曰骨瘤予曰筋瘤者堅而

色紫黑者血瘀也其者經行冲脉注會陰清川脈通血舍筋滑
肝蘆會丸是也血瘤者微紫微紅軟硬間雜皮膚隱隱紅絲
擦破血流禁之不住治當養血涼血抑火滋陰安神調和血
脈冬連二母丸是也肉脣者軟若綿硬似餛皮色不變不緊不寬
終年只似覆碗然治當理脾寬中疏通戊土開鬱行瘀調理飲食
加味歸脾丸是也氣瘤者軟而粟不堅皮色如故或消或長無熱無
寒治當清肺氣調經肺理勞傷和榮衛通氣散堅丸是也骨瘤者
形色紫黑堅硬如石痃瘡高起推之不移昂昂堅貼於骨治當補
腎氣養血行瘀散腫破堅利竅調元腎氣丸是也此瘤之五名治
瘤之五法惟在此也又觀立齋云筋骨呈露曰筋癰赤脉交結曰
血癰皮色不變曰內癰隨憂喜消長曰氣癰堅硬不可移曰石癰
此癰之五名也通治癰瘤初起元氣實者海藻玉壺湯六軍丸久

而元氣虛者琥珀黑龍丹十全流氣飲選服此藥自然縮小消磨
切不可輕用針刀掘破出血不止多致立危久則瞼血崩潰滲漏
不已終致傷人又一種粉瘤紅粉色多生耳項前後亦有生於下
體者全是痰氣凝結而成宜拔針破去脂粉以三品一條鎗插入
數次以淨內膜自愈又一種黑砂瘤多生脣腮腿腫突大小不一以
手掘起內有黑色是也亦用針刺內出黑砂有聲軟硬不一又一
種髮瘤多生耳後髮下寸許軟小高突按之不痛亦針之粉髮齊
出又一種蛔蟲瘤生於脇下又一種疽瘤連生肩膊詳在後治驗
中予觀古又有虱瘤焉但其形狀之異皆五臟濕熱邪火濁氣瘀
血各感而成此非正病也以上數瘤皆親手治驗非謬也

癰瘤看法

初起江名光庭微熱微痛根腳浮淺不堅實者爲易已成紅赤高腫

熟瘍漏頂破皮穿膿潰爛消者易
口潰膿褐色黑相間者所因
生外皮漸緊者順潰後氣體平和
飲食如故脾消痛止口不收斂
順初起肉色不變其熟漸生根腳
石舉動牽強咳嗽生痰皮寒食少
者逆已潰無膿惟流血水腫不
痛不止肺氣衰弱者逆破後血水
不止腫硬更增敗腐不脫涴氣
忘者死

癰瘤治法

初起自無表裏之症相兼但結成形者宜行散氣血已成無痛無癰
以軟或硬色白者瘀聚也行瘀順氣上或色紅堅硬漸大微癢微疼
有補腎氣活血散堅形如茄蒂瘤大下者用藥貼其蒂茄落生肌
收斂已破流膿不止痛仍不消宜健脾胃爲主佐以化堅已潰出血
平常瘤口開泛者宜養血涼血佐以清肝潰後瘤腫漸消脾弱不能

斂者補腎氣兼助脾胃

癰瘤治驗

男子臂瘤五年形如覆瓢按之隱黑色此黑粉瘤也以針破之按出黑砂兼黑粉共約碗許用三品一條鎗挿入患內十餘日每次捺出黑膜其瘤漸消內服十全大補湯健脾胃養氣血月餘而愈

男子腮上生瘤半年形若覆桃皮色不變按之微紅此粉瘤也針破之掠去脂粉插前藥半月而愈

義烏吳士肩膊下連生小瘤五枚三月餘漸發癢異狀以手捫之內則喰鴉攻動予視之內動果有蝦勒此必有蟲蟻以針破其一枚先出紅水一匙少頃攻出黑粉紅蟲一條形如蛆樣長六七分又破一枚依然生是其人暫無醫量比世氣之過也餘瘤停止

服補中益氣湯數劑外以膏藥之五日調和水酒酒研石加
以補藥十餘服而愈

一婦人併一女子耳後髮際下一寸土一瘤半年餘漸漸而大此乃粉瘤用針破之先出脂粉後出數根長約二尺餘齊根剪斷出血微許俱用捕藥數日化出內膜而愈以此觀之知有髮瘤也

一婦人腰間生一肉瘤三年餘方漸微痛一日潰後出小蛔三條長約五寸置溫湯中遊動半晌方息其時患者形體衰弱面黃肌瘦口乾發熱朝以八味丸午用大參棗桑湯服至百日外元氣漸醒又百日其口方收予意度之其蛔乃經絡氣血所化

一婦人氣沖穴生瘤結紫堅硬乃面瘤也請視之心肝二脉俱已洪數其患得之心氣鬱結肝氣受傷之故辭不可治後請京師明公

醫治其時頭已穿潰雖強投補托化堅涼血等劑日潰日爛終至不應破經兩月一日湧出紫血盆許隨卽身亡後人問曰何以致此予曰心脉洪數心火旺也肝脉弦數肝氣傷也火旺逼血妄行肝氣傷不能藏血後破之必出血不止多致危亡頸斷不治者此意也

瘦瘤主治方

御肝虧膏丸

清肝蘆薈丸 萍夢海粉還兼甘草節

治惱怒傷肝致肝氣鬱爲癰腫硬色紫黑刺痛筋結若蚯蚓遇喜則安遇怒則痛者服之

川音

當歸

自序

• 100 •

十一

酒漫攜

皮

廣雅

昆布

海粉

里貢節

牙里

食前後服之

芩連二母丸

芩連二母丸芍芍
蒲黃生地與骨皮

熟地當歸羚羊角
甘草桔梗爲丸服

治心火妄動逼血沸騰外受寒涼結爲血瘤其患微紫微紅軟硬
間雜皮膚隱隱如紅絲皮破血流禁之不住者宜服

黃連

黃芩

知母

貝母

川芎

當歸

白芍

生地

熟地

蒲黃

羚羊角

地骨皮

各等分

甘草

誠半

右爲末側柏葉煎湯打寒食麵爲丸如桐子大每服七十丸燈心
湯送下或作煎劑服之亦效

順氣歸脾丸

順氣歸脾丸貝母
棗仁歸志人參等

鳥附箇陳太茯神
木香甘草合歡靈

治思慮傷脾致脾氣鬱結乃生肉瘤軟如綿腫似餛飩氣虛弱日

久漸大或微疼或不疼者服

陳皮

貝母

香附

烏藥

當歸

白朮

茯神

黃芪

酸棗仁

鹽志

人參各一兩

木香

甘草

炙各三錢

右爲末合歡樹根皮四兩前湯著老米糊丸如桐子大每服六十丸食遠白滾湯送下

氣散堅丸

通氣散堅丸半夏
香附桔梗參海藻

陳貝芍歸粉草荅
南星枳實共黃芩

治憂鬱傷肺致氣濁而不清聚結爲瘤色白不赤軟而不堅由陰陽失度隨喜怒消長者宜服

陳皮

半夏

茯苓

甘草

石菖蒲

枳實炒

人參

膽星

花粉

桔梗

川芎

當歸

貝母

香附

每藥

黃芩酒炒各

右爲未荷葉煎湯泛爲丸寒豆大每服一錢食遠燈心二十根

三片泡湯送下

調元腎氣丸

謂元腎氣丸參地
麥冬龍骨香砂柏

山藥丹歸黃墨答
骨皮知母故如神

治房慾勞傷憂愁損腎致腎氣弱而骨無榮養遂生骨瘤其患堅硬如石形色或紫或不紫推之不移堅貼於骨形體日漸衰瘦氣血不榮皮膚枯槁甚者寒熱交作飲食無味舉動艱辛脈脛無力者並服之

生地

酒煮搗膏四兩

人參

歸身

萸肉

山藥

丹皮

茯苓

各二兩

木香

砂仁

各三錢
黃柏鹽水
炒

麥冬

膏

地骨皮

龍骨

各一兩

澤鴻

知母

童便炒
各五錢

右爲未鹿角膠四兩老酒化稠加蜜四兩同煎滴水成珠和藥爲丸如桐子大每服八十九空心溫酒送下忌白蘿蔔火酒房事

藻玉壺湯

海藻玉壺湯青陳半夏獨活併草節

翹貝芍歸甘布評海帶煎來效有靈

治癰瘤初起或腫或硬或赤不赤但未破者服

海藻

貝母

陳皮

昆布

青皮

川芎

當歸

半夏

連翹

甘草節

獨活

各一錢

海帶

水二錘煎八分量

病上下食前後服之凡服此門藥餌先斷厚味

大黃次宜絕慾虛心煮爲妙

血散癰湯

活血散癰湯芍歸參荅昆布丹皮草

治癰瘤已成日久漸大無痛無癢氣血虛弱者

白芍

當歸

陳皮

川芎

半夏

熟地

人參

茯苓

丹皮

各一錢

紅花

昆布

木香

甘草

節各五分

青皮

三分

內桂

各三分

桂

紅花

木香

六軍丸

六軍丸內用蜈蚣
夜明砂 螺壳穿山甲

諸

可見功

治癰瘤已成未潰者不論年月新人並宜服之

蜈蚣去頭足

頭單脫蟲脫

蛤蠣

姜黃

炒去絲

夜明砂

穿山甲

以上等分爲細末神薑糊爲丸粟米大硃砂爲衣每服三分食酒

酒下忌大葷煎炒日漸可消

枯瘍方

枯瘍方用白砒砂
乳香浸藥研砂等

治瘍初起成形未破者及根蒂小而不散者用

白砒

硇砂

黃丹

輕粉

雄黃

乳香

沒藥

硼砂各一
磚石錢

斑蝥二十個

田螺

大者去壳三
枝研細切片

共研極細糯米粥調和捏作小碩子樣曝乾先於瘍頂三炷以繫餅貼之上用黃柏末水調蓋敷藥餅候十日外其瘍自然粘落吹用歟口藥

秘傳欽瘤臺秘傳欽瘤膏血竭
象皮乳香各等分

輕粉 龍骨 海螵蛸

雞子熟油 一處調

治癰瘤以藥落後用此擦貼自然生肌完口

血竭

輕粉

龍骨

海螵蛸

象皮

乳香各一錢

雞蛋

十五枚煮熟用
苦熬油一小錢

以上各藥細末共再研和入雞蛋油內攪勻每日早晚甘草湯洗

淨患上雞翎蘸膏藥蓋貼

琥珀黑龍丹

琥珀黑龍丹海帶
海藻木香併京墨

南星血竭五靈脂
麝香加上茲琪隨

治五癰六瘤不論新久但未穿破者並宜服之

琥珀

一兩

血竭

兩

京墨

五靈脂

炒

海帶

南星

姜汁者炒
各五錢

木香

麝香

一錢

以上各藥細末和勻再研煉蜜丸一錢重金箔爲衣酒乾密收每
用一丸熱酒一杯量病上下食前後化服。患在下部服後隨用

十全流氣飲

十全流氣飲疎皮
木香烏藥芎歸芍

亦茯青皮香附隨
甘草同煎效可奇

治癰瘡傷肝思慮傷脾致肺氣不行逆於內裏乃生氣癰肉瘤皮色不變日久漸大宜服此藥

陳皮

赤芍

烏藥

川芎

當歸

白芍

各一

香附

青皮

甘草

五分

杏香

三分

薑三片棗二枚水二鍾煎六分食遠服

癰瘡應用方

三品一條鎗

補中益氣湯

十全大補湯

俱見瘡疽
瀰瘍門

寒食麵

註未
卷

人參養榮湯

見瘡疽
瀰瘍門

八味丸

肺癰論

第二十四

夫肺癰者金受火刑之症也蓋肺爲五臟華蓋其位至高其質至清
內主平氣中主聲音外司皮毛又兼主平呼貴賤壽夭金清而氣管
深長者其音自清其韻自高其聲自洪此三者主壽主貴亦主通
達如金濁而氣管短細者其音自焦其韻自低其聲自小此三者
主天主賤亦主蹇滯故肺金獨旺於秋者應其輕清之候也倘有
所犯其病自生致患肺癰者先因感受風寒未經發越停留肺中
初則其在毛聳惡風咳嗽聲重胸膈時痛項強不能轉側者是其
真候也久則鼻流清涕咳吐膿痰黃色腥穢甚則胸脇脹滿呼吸
不利飲食減少脉洪自汗法當清金甘桔湯主之冬清肺飲調
之又久嗽勞傷咳吐痰血寒熱往來形體消削咯吐瘀膿聲啞咽
痛其候傳爲肺痿如此者百死一生之病也治宜知母茯苓湯主
之一人參五味子湯調之又有七情幾飽勞役損傷辨肺者麥冬平

肺飲主之紫姑草湯調之又有房熱勞傷丹石補氣清金固水
宜腎氣丸主之金液丸土丹調之又勞力內傷迎風响叫外寒侵
人未經解散致生肺癰者初起脉浮微數胸熱氣壅熱往來咳
嗽生痰者當以小青龍湯主之麥冬清肺飲調之通用金鯉湯清
金寧肺丸等相間服之亦效如手掌皮龜六脉洪數氣急顴紅汚
膿白血嘔噦渴沈水鼻漏不滌飲食者俱爲不治此症以身涼脉細
膿血交流痰色鮮明飲食知味膿血漸止者俱爲無妨反此則死

肺癰看法

初起脈浮虛細身體不熱咳嗽有痰呼吸調勻者順已成脈浮微數
咳吐膿痰形色鮮明語聲清朗者吉潰後咯吐膿痰間吐鮮血時發
時止飲食知味者順吐膿漸漸稀少胸脇不疼面色微微帶黃便調
多穢初起脈洪弦數身熱多寒胸疼氣喘面紅多汗損壽已成咯吐

膿痰氣味澀臭黃痰如膠粘固脣反終亡咯吐再兼白血氣急多煩
指甲紫而帶灣終歸冥路手掌反如枯樹面艷顴紅咽痛音如鴨聲
鼻漱終死

肺癰治法

初起風寒相入頭眩惡寒咳嗽聲重者宜解散風邪汗出熏風咳嗽
氣急鼻塞項強胸膈隱痛實表清肺日間多寒衣覆被夜間發熱
多煩去被滋陰養肺口乾喘滿咽喉而渴咳嗽身熱脈弦數者降火
抑陰胸滿喘急咳嗽膿痰身熱氣癱不得安臥平肺排膿熟退身涼
脉來短濶精神減少自汗盜汗補肺健脾

肺癰治驗

一義官仲冬時督工河道不常迎風呼喚致肺受傷後發此症初起

寒熱發作咳嗽聲重氣急生痰請內醫治之越治越重後予視診

其脉浮而數曰光而澤此肺癰也視其癰果有膿意相粘可憐
湯二服咳嗽稍止以排膿散四服其膿漸多惟胸膈疼痛不減脉
亦帶芤此胸中有瘀而也以四順散加紅花牡丹皮二服吐出紫
血碗許隨後膈痛漸止又以金鯉湯兼人參五味子湯間服月餘
而愈

一男子久嗽不已咳吐膿痰面白神勞胸中隱痛診之脉浮微數此
屬肺氣不足火尚有餘以知母茯苓湯數服其膿漸少又以清金
寧肺丸服之而愈

一男子久勞傷咳嗽不止至夜身熱尤甚日久咯吐膿血診之脉弦
而數此虛火假症也先以童子小便曰飲三四次又服紫苑茸湯
數劑至夜身熱不發又兼服金鯉湯月餘而漸瘳此非童便之功
而陰火豈能得退嘗治瘧湯虛熱不退者用此極效

卷之六
一男子鬱鬱不遂意忘喫半年時或咳吐膿血且形體衰弱飲食減少脈亦微數聲漸將離惟面不紅其病將成肺痿而尚可治以清金二母湯十餘服咳吐減半又以金鯉湯與人參五味子湯兼服之又早飲人乳晚飲童便各一鍾調理百日外而安

一男子生平好飲口乾作渴致肺壅熱成癰咳吐膿痰喘滿難臥以葛根散二服而喘定易睡又以紫菀甘湯加乾葛花粉六錢服而膿痰漸少早以加減八味丸用清金寧肺丸服之兩月而愈

一男子五十餘歲平素寵妾膏梁無厭咳嗽發熱吐痰腥臭視之手掌枯澀面隱微紅疹中白血脉亦細微而數此肺癰所忌症也辭不治後醫強許其生而用藥終至不應乃死人問曰何以致之予曰手掌乾澀血枯土傷不能生其金也面色微紅相火已動痰中白血正肺受傷脉細而數真氣虛故凡肺癰已此豈有不死者乎

以此言之後人乃服

肺癰主治方

麥冬平肺飲

麥冬平肺飲人參
陳皮甘桔同成劑

赤芍檳榔赤茯苓
肺癰咳嗽可同治

治肺癰初起咳嗽氣急胸中隱痛嘔吐膿痰者

人參

麥冬

赤芍

檳榔

赤苓

陳皮

桔梗

各五分

甘草

水二錢煎八分食還服

元參清肺飲

元參清肺飲柴陳
麥冬、骨皮同薑苡

甘草 檳榔 參茯苓
生薑 童便可安寧

治肺癰咳嗽膿痰胸膈脹滿上氣喘急發熱者

元參

八分

銀柴胡 陳皮 桔梗 茯苓 地骨皮

麥冬

各一錢

薏苡仁 鐵人參 甘草

各五分

檳榔

水二錢薑一片煎八分臨入童便一杯食後服

肺桔梗湯

寧肺桔梗湯貝芪防已百合草五味

歸夢枳殼草桑皮
米仁知母地骨皮

治肺癰胸膈隱痛兩脇腫滿口燥咽乾煩渴多渴自汗盜汗眠臥不得時吐稠痰腥臭者服之

桔梗

貝母

當歸

薯蕷

黃茋

枳殼

甘草節

桑皮

防已

百合

米仁

各八五味子

甜葶藶

地骨皮

知母名五分

水二鍾薑三片煎八分不拘時服咳甚加百合身熱加柴胡黃芩大便不利加蜜炙大黃一錢小便澀滯加燈心木通煩躁兼血加白茅根痛甚加人參白芷

順散

四順散內有奇功
甘草杏仁相協力

桔梗紫苑貝母同
肺癰喘嗽承無踪

治肺癰吐膿五心煩熱壅悶咳嗽氣急不能安

貝母

紫苑

桔梗各一錢

甘草

杏仁各七

水二鍾前八分食遠服或爲末白湯調服二錢

清金靈肺丸

清金靈肺貝甘陳銀柴天麥芍連芎

參桔歸苓地骨芩

五味白术二地懸

治肺癰咳嗽日久膿痰不盡身熱虛羸漸成勞瘵者服之效

陳皮

茯苓

桔梗

貝母

人參

黃芩

各一錢

麥冬

地骨皮

銀柴胡

川芎

白芍

胡黃連

各六錢

五味子

天冬

生地

酒浸熟地膏搗

歸身

白术

各二兩

甘草

三錢

人參五味湯

人參五味湯陳木桑皮柴前池骨草

芪桔歸苓枳地黃

肺癰虛乏可煎服

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服七十九食遠白滚湯送下

效

人參

五味子

前胡

陳皮

白术

桔梗

本草正言

卷之六

七

當歸

茯苓

熟地

甘草各一錢

黃芪

地骨皮

桑白皮

枳殼

柴胡各五分

水二錘薑三片煎八分食後服

蕤茲湯

紫苑荳湯參犀角
杏仁百合與呵膠

冬花桑葉草半夏
貝母蒲黃姜莫節

治膏粱厚味飲食過度或煎炒法酒致傷肺氣咳嗽咽乾吐痰唾血喘急脇痛不得安臥並服

紫苑茲

犀角

炙甘草

人參各五分

桑葉用經霜者款冬花

百合

杏仁

呵膠

貝母

半夏

蒲黃生各七分

水二錘薑三片煎八分入犀角未食後服

膾散

排膾散內用黃芪
每服三錢蜜調下

白芷人參五味宜
肺癰瘍吐効堪良

治肺癰已吐膾後宜服此藥排膾穢補肺氣

黃芪

白芷

五味子

人參各等

右爲細末每服三錢食後蜜湯調服

薄荷五味草人參

知母茯苓湯

知母茯苓湯桔梗
柴半冬花芍白朮

阿膠麥冬補肺經

治肺痿喘嗽咳吐痰涎或自汙溢汙往來寒熱

茯苓

黃芩

各一知母

甘草

桔梗

薄荷

人參

五味子

柴胡

半夏

川芎

欒冬花

白朮

呵膠

麥冬

各六分

水二鍾薑三片煎八分加童便一杯食後溫服

潔痰湯

潔痰湯內二陳半
人參桔梗與黃連

麥冬、枳實、膽星煎
竹茹加上病安痊

治心火克肺久而不愈傳爲肺痿咽嗌嘶啞胸膈痞悶嘔吐痰

涎喘急難臥者並服之

陳皮

半夏

茯苓

甘草

麥冬

膽星

枳實

黃連

人參

桔梗

各五分
竹茹一錢

水二鐘煎八分食後服

肺丸

寧肺丸中二般藥
每服二錢功最效

烏梅粟壳去筋膜
肺癰肺癆同鳴齶

治久嗽咯吐膿血胸膈不利咳嗽痰盛坐臥不安言語不出甚則
聲音啞啞者服之

烏梅蜜拌蒸取肉
八錢搗膏

鷺粟殼

去膜蜜拌炒
爲末一兩

用烏梅膏加生蜜少許調作丸每服二錢烏梅湯不拘時下

金二母湯

清金二母湯芩桔
柔五味陳皮麥

知母蘇此尤杏芩
甘草當歸共此呈

治肺痿多嗽少痰午後發熱口乾煩躁不寧者

知母

貝母

桔梗

茯苓

當歸

白朮

陳皮

桑皮

紫蘇

杏仁

柴胡

瓜蔞仁

黃芩

五味子

甘草

麥冬

五味子

白朮

梔子仁湯

梔子仁湯中加桔梗杏仁知母赤芍藥

升麻柴胡白芍葛根葛根白芷草行

治肺癰發熱潮熱或發在亂煩躁而亦咽痛者

梔子仁

赤芍藥

大青葉

知母

各七分

黃芩

石膏

升麻

各一錢五分

柴胡

六分

甘草

五分

淡豆豉

百粒

水二鍾煎八分食遠服

加味理中湯

加味理中湯牛夏
乾姜細辛升麻炙草

治肺胃俱虛咳嗽聲重發熱不已及兼脉浮數而無力者眼之

炙甘草

牛夏

枳荅

乾薑

泡

白朮

陳皮

細辛

五味子

人參

各五分

水二鍾煎八分食遠服

金鯉湯

金鯉湯中效半味
再加童便重湯頓

惟將良母是堪奇
服盡此魚便可醫

治肺癰已成未成胸中隱痛咯吐膿血者服之

金色活鯉魚

一尾約四兩重

貝母

錢

先將鯉魚連鱗剖去肚腸勿經水氣用貝母細末摻在魚肚內線扎之用上白童子小便半大碗將魚湯童便內重湯頓煮留眼乃出爲度少頃取起去鱗骨取淨魚肉浸入童便內頓熟肉與童便作二三次一日食盡一枚其功效甚捷

五穀散

葛根散中苦杏仁
瓜萎升麻桔梗等

甘草桑皮同葛根
肺癰服下可回春

治過食炙焯或飲酒過度致肺熱氣壅喘急不卧及肺癰濁吐腥臭胸膈脹滿不食者並宜服之

桔梗

蕤仁

升麻

米仁

桑皮

葛根

炙甘草

砂甜葶苈

分

水二鍾薑三片煎六分食後服

氣丸

腎氣丸中厚湯蒸

茱萸山藥白朮茶

治腎氣素虛不交於心津液不降敗濁爲痰致生欬逆

乾山藥

四兩
去核

澤瀉

蒸
牡丹皮

佳
白者

白芍芩

各三兩

熟地

用生者八兩
砂器蒸半日
酒拌

右爲赤地黃煮爛杵膏蜜丸如桐子大每服七八十九空心挾湯鹽湯溫酒送下

肺癰應用方

金液散

土丹
見附門

下部癰毒門

流注論第二十五

夫流注者流者行也乃氣血之壯自無停息之機注者住也因氣血之衰是有凝滯之患故行者由其自然住者由其瘀壅其形漫腫無頭皮色不變所發母論穴道隨處可生凡得此者多生於體虛

之人勤勞之輩不慎調燮夏秋露臥縱意取涼熱體當風固身快爽或中風邪發散未盡或慾後陰虛外寒所侵又或腦怒傷肝鬱結傷脾榮氣不從逆於肉裏又或跌打損傷瘀血凝滯或產後惡露未盡流縮經絡此等種種皆成斯疾也既成之後當分表裏寒熱虛實邪正新久而治之初因風寒相中表症發散未盡者人參敗毒散散之房愆之後體虛寒氣外侵者五積散加附子溫之勞傷鬱怒思慮傷脾而成者歸脾湯加香附青皮散之跌撲傷損瘀血凝滯而成者復元活血湯逐之產後惡露未盡流注經絡而成木香流氣飲導之此皆初起將成之法一服至三四服皆可外俱用琥珀膏敷貼其中亦有可消者十中五六如服前藥不得內消者法當大養氣血培助脾胃溫暖經絡通行關節大香流氣飲十全大補湯俱加熟附子香附培助根本此則未成者自消已成者

自潰已潰者自歛而終無殘敗破漏不斂之症且如有腹痛急
之患者又當慎起居戒七情遠寒就溫俱可保全若悞用寒涼犯
伐內消等藥終至不救者多矣

流注看法

初起漫腫皮色光亮微熱微疼筋骨不欠强者爲順已成身體微熱
飲食有味疼痛有時腫生紅色者順已潰膿稠而黃腫消痛止身體
輕便起坐如常者順潰後內肉易生膿水易止精神易復膿口易合
者順初起身體發熱脈細而數皮色微腫痛微筋骨者險已成飲食
少思口乾作渴身體疼痛四肢沉重者險已潰膿水清稀腫仍不消
虛熱不退疼痛不減者逆潰後膿穢不止肌膚瘦削飲食不進發熱
皮龜者死

流注治法

初起風寒表散未盡而後復生腫痛者再宜和解之表邪已盡而後
復生流注者宜清熱消腫行散氣血暴怒所傷抑鬱所致胸膈痞悶
大氣不舒順氣寬中腫硬已成而不得內消者宜和氣血更兼補助
脅胃跌撲閃肭瘀血凝滯爲患者宜調和氣血通行經絡寒邪所襲
肋癰骨痛及遍身疼痛者溫經絡行氣血產後敗血流注關節致生
腰痛者當散敗瘀養氣血潰後膿水不止而形衰食少者宜滋氣血
佐補脾胃

流注治驗

一男子風寒表散未盡兩腮腫痛微熱不退小柴胡湯加川芎天花
粉桔梗連翹二服餘熱頓退又以二陳湯加桔梗黃芩牛蒡子連
翹四服十日而安

男子勞傷受寒首生三腫皮色不變寒熱交作至夜尤甚先以萬

靈丹洗浴發汗熱頓退
惟腫硬不消以助王膏敷之三次其腫
消痛止漸漸而平

一婦人因怒脇下結腫將近半年方痛此得之肝氣鬱結之症以木
香流氣飲四服其腫漸紅此日久之病必欲作膿不可內消又以
十全大補湯加木香香附青皮十餘服其腫漸高又以本方加皂
角刺五服其膿乃潰且清且多此勞中所得者元氣已經虧損其
膿故多而清以入參養榮湯加熟附子月餘膿稠且少又本方倍
參芪歸木兩月而愈

一男子元氣素虛因暴怒脾生腫塊疼痛空強寒熱往來飲食日減
以補中益氣湯加香附貝母十餘服寒熱漸止又以益氣養榮湯
月餘而腫潰間以八珍湯服之外用香附餅日灸二次脾胃健而

安

一婦婦項間乳上各腫一塊將近一年漸大方痛診之脉細數而無力此思慮過傷之病也以歸脾湯加桔梗香附十餘服其腫漸高外以琥珀膏敷之腫項紅色欲其作膿又以十全大補湯加桔梗貝母服之半月膿熟針之後頭癩膿清虛熱復作食少不睡仍以歸脾湯間以逍遙散服之三月而愈

一男子平素怯弱腰後微腫一塊飲食少思口乾發熱此得之腎傷之病也治當朝以附桂八味丸年用人參養榮湯扶植根本爲要彼以口乾發熱內火之故欲投清涼之劑解之予辭不敢治請內醫視之以退熱爲主耳合病家之意投藥三劑腹痛作瀉又以猪苓澤瀉厚朴泄氣等藥大熱發作形體更變復請予治予曰死之速矣伊不知因虛致病法當滋補況是腰間腫塊內腎受傷口乾作渴晝水枯渴發熱不退陰虛血少今以有餘之藥而原不足之

症豈有不死者始信前悞久半月而死

流注主治方

調和榮衛湯

調和榮衛湯甘草
赤芍白芷併烏藥

陳獨芳歸芪大茴
半膝紅花相共隨

治流注初起氣血凝聚結腫不散已成未成服

川芎

當歸

陳皮

獨活

各一錢

赤芍

白芷

烏藥

大茴香

黃芪

各八分入甘草炙

紅花

各五分

牛膝

加下物

水二鍾煎八分入酒一杯量病土下服

木香流氣飲

木香流氣飲芎歸枳殼橘核防半夏

蘇桔青陳烏澤蔴
腹皮白芍膝甘隨

治流注癰瘡及鬱結爲腫或血氣凝滯遍身走注作痛或心胸痞
悶噫咽不利脇腹膨脹嘔吐不食止氣喘急咳嗽痰盛或四肢面
目浮腫者並服之

川芎

當歸

紫蘇

桔梗

青皮

陳皮

烏藥

黃芪

枳實

茯苓

防風

半夏

白芍

錢

甘草節

大腹皮

木香

檳榔

澤瀉

枳殼

分五錢

牛膝

一錢
下部加

水三鍾薑三斤桑一枚煎八分食遠服

六鬱湯

六鬱湯內用川芎
甘草砂仁蒼朮橘

半夏陳苓香附同
溼痰流注卽時通

能解諸鬱結腫左右二搭相串者及濕痰流注等症

川芎

半夏

茯苓

香附

陳皮

山楂各
錢

蒼朮

砂仁

甘草

各五分

薑三片水二鍾煎服

四子八物湯

附子八物卽八味
慾後受寒生腫痛

再加肉桂木香溫
腿脚艰步效如神

治房慾後陰虛受寒致生腫塊又或遍身腿腳疼痛不能步履

白芍

白芍

九地

人參

白术

夷苓

當歸

附子

桂五分

木香

甘草

各三

水二錘薑三片棗一枚煎八分食還服

滌科流氣飲

滌科流氣飲芍歸
防風枳壳香烏藥

甘桔蘇黃易桂芪
白芷八參厚朴喘

治流注及一切勞急癥帶氣血作腫疼痛或胸膈痞悶或風寒溼
毒挾於經絡結成腫塊者服

當歸

甘草

紫蘇

人參

白芍

官桂

黃芪

防風

枳殼

烏藥

桔梗

厚朴各七

檳榔

木香

川芎

白芷各五分

水二錘煎八分食前服

通經道滌湯

通經道滌湯陳丹枳殼甘草節

芍歸芍地滿紫蘇
牛膝紅花道瘀血

治婦人產後敗血流注經絡結成腫塊疼痛者

香附

赤芍

川芎

當歸

熟地

陳皮

卷之五
紫蘇

牡丹皮

紅花

牛膝

枳殼錢

甘草節

獨活名五分

水二鍾煎八分入酒一小杯食前服

香附餅

香附餅最散風寒
熨底熱攻寒氣散

酒和調成患上安
取效苦楚即成歡

治風寒流注襲於經絡結成腫痛用香附爲末酒和量磨大小做
餅覆患處熱熨斗熨藥上未成者自消已成者自潰風寒溼毒宜

薑汁作餅

醒脾湯

醒脾湯中參木芪
龍眼神志柴甘桔

黃連酸棗地骨皮
木香香附共相宜

治懷抱鬱結思慮傷脾致脾氣不行逆於內裏乃生壅腫夜痛不

眠心煩不安神氣不清等症

白朮

黃芪

人參

茯神錢一

酸棗仁

地骨皮

遠志名七分

柴胡

甘草

桔梗

黃連

木香

香附各五分 龍眼肉一錢

水二鍾薑三斤棗二枚煎八分不拘時服

調中大成湯

調中大成異功君歸芍藥志丹皮等

黃芪桂附靈砂仁
膿清食少建大勦

治流注潰後膿水清稀飲食減少不能生肌收斂

白朮

茯苓

歸身

白芍

陳皮

山藥

黃芪

牡丹皮

各一錢

人參

二錢

靈芝

砂仁

遠志

甘草

各五分

附子

肉桂

各八分

水二鍾煨薑

片棗一枚煎八分食遠服

黃芪六

一湯

黃芪六一湯參草
流注膿多併作湯

三味全煎療煩躁
甘溫除熱有奇效

治流注潰後膿水出多口乾作渴煩躁不寧服之

黃芪

半蜜水炒六錢半生

甘草

一錢五分半生半炙

人參

一錢

水二鍾煎八分食遠服

小科正統

卷之六

言

散血葛根湯

散血葛根湯半夏
時草知母併蘇葉

羌防川芎甘升麻

桔梗杏梢與紅花

治跌撓損傷瘀血凝滯結成流注身發寒熱者

乾葛

半夏

川芎

防風

羌活

升麻

桔梗

各八分

白芷

甘草

細辛

蘇葉

香附

紅花

各六分

水二鍾蒸白三枚薑三片煎八分不拘時服

先天大造丸

先天大造君河車
精蕊烏志補骨膏

治風寒溼毒襲於經絡初起皮色不變漫腫無頭或陰虛外寒侵

入初起筋骨疼痛日久遂成腫痛潰後膿水清稀久而不愈漸成
漏症者服

紫河車

一具酒
煮搗膏

熟地黃

四兩酒
煮搗膏

蹄身

茯苓

人參

枸杞

菟絲子

六兩酒
煮搗膏

肉桂

四兩酒

黃精

白木

何首烏

去皮用黑豆蒸熟去皮搗膏

川牛膝

骨碎石微炒

骨破故紙炒

川巴戟

仙茅

浸去赤汁蒸熟去皮搗膏各二兩

各二兩

遠志

去心炒一兩

木香

毒鹽錢各五錢

丁香三錢

黑棗肉二兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服七十九空心溫酒送下此方非獨流注成漏者又補一切氣血虛屬勞傷內損乃男婦久無嗣息並有奇功

琥珀膏

琥珀膏中用大黃同蒜搗稠敷患處

南星白芷鬱金香管敎流毒卽安康

治一切皮色不變漫腫無頭氣血凝滯結成流毒毋論身體上下年月新久但未成膿者並效

大黃

兩

鬱金

南星

白芷

各一

共爲細末用大蒜頭去殼搗爛入上藥再搗稠入酒一二匙調勻遍敷腫上紙蓋隨有熱痛又有不痛俱待藥乾便效次日又有起

利口示
卷之六
泡又有不起泡者如有泡起挑去泡中黃水膏貼之自效

桂應用方

十全大補湯

人參養榮湯

補中益氣湯 彌脾湯

益氣養榮湯

八珍湯俱見癰疽門

萬靈丹見癰疽門

小柴胡湯

二陳湯俱見癰疽門