

赤水玄珠氣門第九卷目錄

氣 九氣見症

血

嘔吐血

咳血

咯血唾血痰涎血

鼻血舌衄

齒衄

肌衄

小便血

下血

九竅出血

中蠱下血

金瘡出血

赤水玄珠第九卷

新安生生子孫一奎著輯

氣門

內經曰百病皆生于氣氣一也因所觸而爲九怒喜悲恐寒熱驚思勞也故怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收炅則氣泄驚則氣亂思則氣結勞則氣耗

九氣見症

怒氣所至爲嘔血爲飧泄爲煎厥爲薄厥爲陽厥爲脅滿脇痛食則氣逆而不下爲喘渴煩心爲消瘦爲肥氣爲目暴盲耳暴閉筋縱發於外爲癱睡

喜氣所至爲笑不休爲毛革焦爲肉病爲陽氣所收甚則

爲狂

悲氣所至爲陰縮爲筋攣爲肌痺爲脉痿男爲數溲血女爲血崩爲酸鼻辛頻爲目昏爲少氣不能報息爲泣則麻恐氣所至爲破膾脫肉爲骨痠痿厥爲暴下綠水爲面熱膚急爲陰痿爲懼而脫願

驚氣所至爲潮涎爲目暎爲口咷爲痴癇爲不省人事爲僵仆久則爲瘡痺瘡音裙也

勞氣所至爲噎病爲喘促爲嗽血爲腰痛骨痺爲肺鳴爲高骨壞爲陰痿爲唾血爲耳閉男爲少精女爲不

月

思氣所至爲不眠爲嗜卧爲昏目爲中痞三焦閉塞爲咽

眩不利爲痺痘嘔苦爲筋痿爲白滯爲不嗜食
寒氣所至爲上下所出水液澄澈清冷

戾氣所至爲喘嘔吐酸暴注下迫

凡此九氣內經以五行相勝之理治之故悲可以治怒
以愴惻苦楚之言感之喜可以治悲以譁浪穢狎之言
娛之恐可以治喜以遽迫死亡之言怖之怒可以治思
以汚辱欺罔之言觸之思可以治恐以慮彼忘此之言
奪之五者之外戾可以治寒塞可以治戾逸可以治勞
習可以治驚要在審証察脉而施治之不可執一也

脉沉實者宜下絃急者宜溫虛細微弱者宜補痛在上者
宜散痛在下者宜利氣虛者宜鎮墜氣結者宜蹠順

夫治氣之法惟在適中氣積於中固宜躁順躁導過劑則
又反耗元氣元氣走泄則下虛中滿之証生焉故曰躁
啟於中峻補於下中滿既除下虛斯實此之謂也

治有餘之症脉沉實而中滿大便秘按之疼則宜下法當
用大黃然亦須入桂皮以辛溫和其氣以苦寒泄其實
氣得泄越痛亦隨愈

凡用利藥其法有三駛利則用大黃芒硝溫利則用硫黃
乳粉鴻積則用巴豆硇砂他如磨積化結聚則以三稜
蓬朮爲先導引閉塞則以木香檳榔先使溫散凝滯則
以姜桂爲主躁順暴戾則以蘇橘爲宣補虛益氣則以
人參白朮爲君隧下輔陽者以黑錫養正爲鎮

生生子曰治氣之劑東垣有法可準如枳壳利肺氣多服
損胸中至高之氣青皮瀉肝氣多服損真氣木香行中
下焦氣香附快滯氣陳皮泄逆氣紫蘇散表氣厚朴瀉
胃氣檳榔瀉至高之氣藿香馨香上行胃氣沉香升降
真氣腦麝散真氣若此之類氣實所宜設認冷生氣而
槩以燥熱投之是以火濟火病日益甚丹溪曰氣有餘
卽是火乃戒好用溫熱治氣者之悞也

原病式曰氣爲陽而主輕微諸所動亂勞傷乃爲陽火之
化子和河間治喜怒悲恐思之証皆以平心火爲主至
於勞者傷於動動便屬陽驚者駭於心心便屬火故治
皆以平心火爲主深中病情又曰五志過極皆爲火也

若用香辛散氣燥熱傷氣真氣耗散濁氣上騰猶曰腎虛弱能攝氣歸原遂用降氣鎮墜之劑不悟肺受火炎子氣亦弱降令不行火無所制丹溪有曰上升之氣自肝而出中挾相火其熱爲甚自覺其冷非真冷也火極似水積熱之甚陽亢陰微故有此症認假作真似是之禍可勝言哉又曰氣無補法俗論也痞悶壅塞似難於補不思正氣虛者由七情勞傷所至脾土受傷轉輸失職胃雖受穀不能運化故陽升陰降而成天地不交之否清濁相混若不補養邪何由行

脈法

下手脉沉便知是氣極沉則伏濁弱難愈其或沉滑氣

兼痰飲滑者血多少氣濇者少血多氣大者氣血俱多
脈來大而堅者血氣俱實小者血氣俱少

七氣湯 治七情之氣鬱結心腹絞痛

人參 炙甘草 肉桂各一錢 半夏五分 一錢

姜三片水煎服

指迷七氣湯 治同上

香附二錢 青皮 陳皮 桔梗 蓬朮 官桂
益智仁 蕺香 半夏 甘草炙

各等分姜三片枣二枚水煎服

縮砂香附湯 調中快氣治心腹刺痛

香附炒十兩 烟甘草一兩 砂仁二兩
烏藥五兩

右爲末每服一錢紫蘇葉三片鹽少許沸湯調下

大便秘陳皮湯下 一方去烏藥加沉香五錢

大七氣湯 治喜怒不節致臟氣不平心腹脹滿

半夏

茯苓

各四錢

厚朴

三錢

紫蘇

二錢

加姜水煎服

木香流氣飲 諸氣痞塞不通胸膈膨脹面目虛浮四肢

腫滿

半夏

厚朴

青皮

紫蘇

香附

甘草

各一錢

錢陳皮

二錢桂

莪朶

丁皮

大腹皮

麥門冬

擗榔

木香

草果

各六分

木通

八分

藿香

白芷

四分

茯苓

白朮

木瓜

人參

石菖蒲

加姜棗水煎服

秘傳降氣湯 上盛下衰氣不升降頭目昏眩痰實嘔逆

胸膈不快怒則氣上驚則氣亂尤宜

骨碎補 詞子 草果 五加皮 半夏

各五分

桔梗

五分

桑白皮 地骨皮 枳壳 陳皮 甘草

各一錢

水煎服

升陽順氣湯 七情所傷及勞役飲食不節滿悶短氣恐

則氣下者尤宜

升麻 紫胡 陳皮

各一錢半夏

人參

各三錢

黃芪

四錢

甘草

黃柏

各五分

川歸

一錢

神曲

炒一錢

草荳仁

二錢

每服五六錢姜三片水煎服

蘇子降氣湯 治中脘不快心腹脹滿噫塞喘促咳嗽痰

涎宿食留飲脇下支結及脚氣沖心 方在痰飲門

分心氣飲 憂思留滯致使心胸痞悶脇肋脹滿噫氣吞

酸頭目昏眩日漸瘦弱或大腸虛秘

紫蘇莖葉四兩

姜活

半夏

肉桂

青皮

陳皮

桑白

皮

大腹皮

木通

芍藥

炙甘草

赤茯苓

各一兩

每服五六錢姜三片棗二枚燈心十根水煎服

四磨湯 治七情傷感上氣喘息妨悶不食

方在喘門

推氣丸 治三焦痞塞大便澀小便赤黃 方在脹滿門

神保丸 治諸氣刺痛流入背膂及脇下諸藥不效者

方在脹滿門

檳榔木香丸 跛導三焦破瘀飲快氣消食

木香

檳榔

枳壳

杏仁

去皮
麸炒

青皮

各一兩

半夏曲

皂角

去白
酥炙

郁李仁

去皮各
二兩

各爲末另以皂角四兩用漿水一碗搓揉成膏更入熟蜜少許和丸如梧桐子大每服五十九姜湯送下九氣丸 治九氣膈氣風氣寒氣熱氣憂氣喜氣驚氣怒氣癰氣積氣聚堅牢如杯心腹疼痛時作時止

姜黃

甘草

香附

爲末每服一錢入薑少許百沸湯點空心服立効
賺氣散 治胸膈痞悶腹脇虛脹氣不宣通及傷寒兩脇刺痛攻心

三稜

蓬朮

煨各五錢

白朮

三錢

枳壳

一錢

木香

五分

每服二錢加姜三片水一鍾半煎八分食前服用砂

糖少許壓下

分氣紫蘇飲 治心下脹滿腸疼氣塞嘔逆不止方在

喘門

勻氣散 胸膈脹滿宿冷不消心腹刺嘔吐

丁香

檀香

木香

白荳仁

各一兩

藿香

甘草

炙各八兩

砂仁

四兩

爲末每服二錢入鹽一字沸湯調服

復元通氣散 氣不宣通流利並閃挫腰脇氣痛

木香
兩半

茴香

川山甲

蛤粉炒二兩

延胡索

炒各一兩

白丑

炒

陳皮

各二兩

爲末每服二錢熱酒調服

一方加乳香沒藥

清膈丸 因溫熱氣滯

黃芩

黃連

炒各五錢

香附

一兩半

蒼朮

二兩

爲末取黃熟瓜蔓去皮搗爛和丸茶荳大每服十九丸

桔梗枳壳湯 諸氣痞結滿悶

桔梗 枳壳

各四錢 炙一錢

甘草 二分 生姜五片水煎服

升降六一湯

香附

六兩炒 薤香

一兩

爲末每服二錢白湯下

二聖散

諸氣痛

芫花

醋煮乾五錢

延胡索

炒一兩五錢

二味爲細末每服一錢

男子元臟氣痛葱酒調下

婦人血氣痛川歸酒下

小腸氣痛茴香湯下

諸氣痛薄荷湯下

勝金散 治男婦一切冷氣

烏藥

酒浸微微炒

茴香 炒青皮

去良姜分等

赤水立成
大卷
右爲末每服二錢空心溫酒調下

婦人用姜煎童便調服

半夏湯 治上氣嘔吐不能下食

半夏三錢 陳皮 白朮 甘草炙 桂心各五錢 人參 一兩
厚朴二兩 每服五錢姜五片棗三枚水煎服

手拈散 一切氣痛

草果 延胡索 乳香 没藥 五靈脂炒酒拌
等分爲末每服二錢好酒調下 一方加良姜

一人病氣上冲口中出如烟霧耳內常鳴此衝脉逆上與

八物湯加炒黃連二分 黃柏三分 數劑而愈

蘇合香丸和劑 專能順氣化痰并治傳尸骨蒸癆瘵卒暴

心痛鬼魅癰瘍赤白下痢小兒驚搐等症

沉香

射香

研

丁香

青木香

調梨勒

煨用皮

安息香

另爲末用無灰酒一升熬膏

香附子

炒去毛

草撥

白朮

白檀香

硃砂

研飛

烏犀角

各一兩

薰陸香

另研龍腦

蘇合油

研入安息

香膏

內

右末研匀用安息膏并密丸梧子大空心温水化下

四丸酒亦可

卷之九

諸見血症總論

內經曰陽明厥逆喘咳身熱善驚衄吐血又曰大怒則形氣絕而血菀於上又曰脾移熱於肝則爲驚衄胞移熱於膀胱則癃而尿血又曰結陰者便血一升再結二升三結三升夫血者生化於脾總統於心藏受於肝宣布於肝施泄於腎灌溉一身陰氣一傷變生多病妄行於上則吐衄衰涸於中則虛勞忘反於下則便紅移熱膀胱則癃閉溺血滲透腸間則爲腸風陰虛陽搏則爲崩中溫蒸熱淤則爲滯下熱極腐化則爲臘血火極似水血多紫黑熱勝於陰則爲瘡瘍濕滯於血則爲痛痒隱疹皮膚則爲冷癥畜之在上則爲喜忘畜之在下則入

喜狂墮恐跌仆則淤血內凝又細分之則咳血衄血出於肺嘔吐出於胃痰涎血出於脾咯血睡血出於腎便血清者屬營虛有熱濁者屬熱與濕色鮮者屬火黑者火極血與泄物並下者屬有積或絡脉傷也尿血因房勞過度陰虛火動以致營血妄行而或者又以此爲得之虛寒當以脉別有嘔吐紫凝血者原病式云此非冷凝由熱甚銷爍以爲調濁而熱甚則水化制之故赤兼黑而紫也又有汗血者由夫大喜傷心喜則氣散血隨氣行故也又下血先見血後見便爲近血自大腸來先有便後見血此遠血自小腸來腸胃中本無血良由氣虛腸薄故血滲入而從下出也東垣曰除傷寒家衄血

外雜病見血多責其熱旨哉言乎大凡血上行爲逆其
治難下行爲順其治易若血上行或唾或嘔或吐忽癥
而下行爲惡痢者吉兆也丹溪曰口鼻出血皆是陽盛
陰衰有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣
降則血歸經矣

素問曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出
清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名爲何何以
得之岐伯曰病名血枯此得之年少時有所大脫血若
醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也帝曰治之柰
何復以何術岐伯曰以四烏鵲骨一蘆茹二物并合之
丸以雀卵大如小豆以五丸爲後飯飲以鮑魚汁利腸

中及傷肝也

王海藏云胸中聚集之殘火復裏積久之太陰上下隔絕
脉絡部分陰陽不通用苦熱以定於中使辛熱以行於
分升以甘溫降以辛潤化嚴肅爲春溫變凜冽爲和氣
汗而愈也然餘毒土苴猶有存者周身陽和尚未泰然
胸中微躁而思涼飲因食冷物服涼劑陽氣復消餘陰
再作脉退而小絃細而遲激而爲衄血唾血者有之心
肺受邪也下而爲便血溺血者有之腎肝受邪也三焦
出血色紫不鮮此重沓寒濕化毒凝泣水穀道路浸積
而成若見血証不詳本源便用涼拆變乃生矣

陽証溢出鮮血

上而血者黃芪桂枝湯 白芍當歸湯

中而血者當歸建中湯 增損胃中湯

下而血者芎歸朮附湯 桂附六合湯

若三血証在行陽二十五度見黃芪四君子主之

若三血証在行陰二十五度見當歸四逆加吳茱萸

萸主之

生生子曰按海藏此論雖爲傷寒而發實戒用藥者要認
血來本原不可妄治以致變亂夫治血當明血出何經
時制多宗丹溪有曰吐血衄血多是火載血上錯經妄
行越出上竅此論固是猶有未盡乃所以啟後人過用
寒涼之惑也夫火者無形之氣也非水可比安能稱載

益血隨氣行氣和則血循經氣逆則血亂氣有餘即是火也實由氣逆而血妄行兼於火化因此爲甚經曰怒則氣逆甚則嘔血暴癥內逆肝肺相搏血溢鼻口是也又東垣曰血妄行上出於鼻口者皆氣逆也况血得寒則凝得熱則行見黑則止迹此觀之治血若不兼之調氣而純以寒涼是施則血不歸經而且爲寒涼所凝滯雖暫止而復來也且脾統諸血寒涼傷脾脾虛尤不能約束諸血其變証可勝言哉

素問示從容論曰夫傷肺者脾氣不守胃氣不清經氣不爲使真臟壞決經脉傍絕五臟漏泄不衄則嘔
綱目云傷肺卽傷氣也當於氣虛不能攝血條參治

戴元禮云吐血者榮氣溢入濁道留聚膈間滿則吐血名
曰內衄宜蘇子降氣湯加人參阿膠 飲酒太過傷胃
吐血用理中湯加青皮梔子乾葛川芎 勞太過吐血
不止蘇子降氣湯加人參芍藥 打損吐血黑神散童
便調服 有時或吐血兩口隨卽無事過數日又發經
年累月不愈者宜黑神散吐血發渴名爲血渴也或四
物湯十全大補湯量胃氣虛實用之

統旨云吐血先哲皆以爲熱其因於寒者理亦有之何則
寒邪屬陰人之榮血亦屬陰古人云風傷衛寒傷榮各
從其類人果身受寒邪口受寒物邪入血分血得冷而
凝則破寒矣在上則從口而出在下則從便而出若此

著實病機之所有焉得爲盡無也但其血色之黑與吐血因熱極而反兼水化者相似茲則宜於脉証間求之脉微遲而身又清涼者寒也脉洪數而身又煩熱者熱也寒則溫之熱則清之治法大不同矣

嘔吐血

生生子曰吐血成碗吐出者甚至有出而成盆者丹溪云多是陽盛陰虛故血不得下行因火炎上之熱而上出血脈必大而芤大者發熱芤者血滯與失血也

又曰有氣虛中塞陰陽不相守血乃妄行而吐出者經所謂陽虛陰必走者是也當用四物理中湯加乾姜甘草煎服中溫則血自歸經矣切不可投苦寒之劑

丹溪云山梔子最能清胃脘之血 先吐紅後見痰噦多
是陰虛火動痰不下降四物湯加痰藥火藥 先痰噦
後見紅多是痰積熱降痰火爲急 痰噦涎帶血出此
是胃口清血熱蒸而出重者梔子輕者藍實或暴吐紫
血一、碗者無事吐出爲好此熱傷血死於中用四物湯
鮮毒湯之類 吐血挾痰積吐一二碗者亦只補陰降
火四物湯加火劑之類 挾痰若用血藥則泥而不行
只治火自止吐血乃少病也 大吐血不止以乾姜炮
黑爲末童便調從治 嘴脣痰血荆芥散妙 又云嘔
吐血出於胃也實者犀角地黃湯主之虛者小建中湯
加黃連主之

千金方云吐血有三種有內衄有肺疽有傷胃
出血如鼻衄不從鼻孔出是近在心肺間津液出還流
入胃中或如荳羮汁或如切齒血凝停胃中因卽滿悶
便吐或出數斗至一石者是也得之於勞倦飲食過常
也按韻書衄音勘凝血也 肺疽者或飲酒後熱毒滿悶吐之時血
從吐後出或一合半合半升一升是也 傷胃者因飲
食大飽之後胃中冷不能消化便煩悶強嘔吐使所食
之物與氣共上衝蹶因傷裂胃今吐血色鮮正赤腹亦
絞痛自汗出其脉緊而數者爲難治也

劉宗厚曰凡治血必血屬之藥欲求血屬之藥其四物之
謂乎河間謂隨証輔佐謂之六合湯者詳言之矣余故

陳其氣味專司之要不可不察夫川芎血中氣藥也

肝經性味辛散能行血滯於氣也地黃血中血藥也通腎經性味甘寒能補真陰之虛也當歸分三治血中主藥也通肝經性辛溫全用能活血各歸其經也芍藥陰分藥也通脾經味酸寒能涼血治血虛腹痛也若求陰藥之屬必於此而取則焉脾胃論有云若善治者隨經損益摘其一二味之所宜爲主治可也此特論治血病而求血藥之屬者也若氣虛血弱又當從仲景血虛以人參補之陽旺則生陰血也若四物湯者獨能主血分受傷爲氣不虛也輔佐之屬若桃仁紅花蘇木血竭丹皮者血滯所宜蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰者血崩

所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者血痛所宜蔻容瓊陽
牛膝枸杞子益母草夏枯草敗龜板者血虛所宜乳酪
血液之物血燥所宜乾姜桂者血寒所宜生地苦參血
熱所宜特取其証治大畧耳若能觸類而長可謂應無
窮之變矣

脉訣舉要曰諸症失血皆見芤脉隨其上下以驗所出大
凡失血脉貴沉細設見浮大後必難治

治火之劑

大薊散 治辛熱傷肺嘔吐血或一碗或半升名曰肺疽

大薊根 犀角屑 升麻 桑白皮 蒲黃

杏仁去皮尖 桔梗各二錢 甘草炙五分

右分作二服每服姜三片水煎服

四生丸 治吐衄血熱妄行

生荷葉 生艾葉 側柏葉 生地黃各等分 搗爛爲丸

如雞子大每服一丸用水二鍾煎至一中去渣服

犀角地黃湯 治血積胸中吐血衄血

犀角镑 赤芍藥 牡丹皮 生地各一錢

水煎服此方若有痰者及氣逆不降者服之皆不効予每用枳壳壳仁滑石効

茜根湯 治吐血咯血嘔血等症

四物湯加童便浸香附

一錢 茜草根二錢半 五分 忌鐵

水煎服二三服立愈

治吐血

大黃末一錢 生地黃汁一合 水半鍾煎四五沸服卽愈

又方 好墨搗去膠氣爲細末每服二錢以白湯化阿

調服

治吐血暴甚昏運不止 人參一兩爲末用雞子清調如稀

糊以匙挑服服盡効五更服之尤妙

治吐血

生地黃五斤搗汁生密半斤共以瓦器盛貯鍋內重湯來柴

火熬三日夜取出入人參末四兩茯苓末六兩攪勻

不拘時服此卽瓊玉膏也

又方加入青蒿汁熬膏再加檳榔末一兩以降其氣使

下行也

奇方 治飲酒過多蘊熱胸膈以致吐血衄血

葛花

二兩

黃連

四兩

右爲末以大黃末熬膏爲丸如梧桐子大每服百丸
溫湯下或煎服亦可

辰膠散 治大人小兒吐血

阿膠炒 蛤粉各一辰砂少

兩

許

右爲末藕節搗汁和密調下食後服

龍腦雞蘇丸 治膈熱咳嗽或吐血衄血

方在火熱門

茯苓補心湯 治心虛爲邪氣所傷吐血

方在心痛門

藕節散 治吐衄不止

赤水玄珠

九卷

十六

藕汁 生地黃汁 生密五匙大薊汁各三合

右和勻每服一小鍾不拘時服

拔萃犀角地黃湯 治熱甚而血積胸中

生地黃

三兩黃芩 黃連

各一兩大黃

五錢

每服一兩水二鍾煎一鍾食後服

雙荷散 治卒暴吐血

藕節

七個荷葉頂

七個

搗碎入密用密水二鍾煎八分去渣溫服或研末密

下調

枇杷散 治暑毒攻心嘔吐鮮血

方在暑門

龍肝膏 治吐血不止

伏龍肝

一兩

生地汁

麥冬汁

小薑汁

藕汁各三

姜汁

一合

入密半匙慢火熬成膏每服一匙

帶補之劑

奇方 治肺損嗽血吐血

生地

四兩

鹿角膠

一兩炒爲末

右以地黃汁拌和每服三錢童便加姜汁少許調下

側柏散

治內損吐血下血或用酒大過勞傷於內其血

妄行出如湧泉口鼻皆流須臾不救則死矣

側柏葉

一兩半

人參

荆芥穗

燒灰存性各一兩

爲末每服二錢麵一錢新汲水調如糊啜服

麥冬飲子 治吐血久不愈者

五味子十粒 麥門冬一錢 當歸各一錢 人參

生地黃各五分 水煎服

白朮散 治飲食過度負重傷胃吐血

白朮 人參 黃芪炙 白茯苓各二錢 炙甘草一錢 山藥

百合 柴胡 前胡各六錢 分作三帖每服加姜棗水煎

又方 治同上

理中湯加葛根

雞蘇散 治勞傷肺經吐紅咽喉不利

紫蘇葉 白茅花 黃芪 生地 阿膠各二錢 麥門冬

桑白皮 桔梗 貝母 蒲黃炒 甘草 加姜棗煎服

天門冬湯 治思慮傷心吐衄不止

天門冬 白芍藥 麥門冬 生地黃 遠志

黃芪 阿膠 没藥 當歸 甘草各一錢 人參一錢

分作二服 姜三片水煎服

蓮心散 治同上

蓮子心

粳米各五
十粒

爲末空心溫酒調服

歸脾湯 治思慮傷脾心多健忘其血妄行或吐或下

白朮

茯神

黃芪炙人參

酸棗仁

炒各二錢五分木香一錢

炙甘草

分五買眼肉五枚

姜一片棗一枚水煎服

赤茯苓湯 治大怒傷肝氣逆於中胸吐血衄血

赤茯苓

人參

桔梗

陳皮

各三分錢

麥門冬

芍藥

檳榔各一分

錢

分二服 姜三片水煎服

丹溪方

治見血後脾胃弱精神少血不止者

人參一

錢黃芪二

錢五味子三

粒十三

芍藥

甘草

當歸

麥門冬各五

分

五

加鬱金尤妙水煎服

又方

治同上

人參

白朮

茯苓

陳皮

各一

錢

甘草

川芎

半夏曲

各五

神曲

青皮

各三

錢

甘草

水煎服

如胃不和加藿香

渴者加葛根

五

錢

痰結塊者加

貝母

一

錢黃芩

橘紅

各五

錢

小便赤加黃柏

五

大便燥結加當歸

七

錢

心煩加酒晒黃連

五

錢

小便

滑加牡蠣

若見血多去半夏恐燥加生地

一

錢牡丹

仁

分

三

若胃中不足飲食少進加炒山梔仁

一

錢

牡丹

仁

分

三

山梔仁

分

皮

五

錢

杏仁

三

分

三

杏仁

分

三

杏仁

分

三

杏仁

分

三

分 若血溢入濁道留叙膈間滿則吐紅蘇子降氣

湯加人參阿膠

各五分

上膈熱壅吐血者以四物湯

加荆芥阿膠

各五分

更不止於本方中加大黃滑石

各五分

胃傷吐血宜理中湯加川芎乾葛

各五分

此是飲酒

傷胃也 吐血不止茜根爲末用二錢待冷食後

服良

必勝散 治男婦血妄流溢或吐或咳或衄

小薑

人參

蒲黃

當歸

熟地

川芎

烏梅

去核一兩各

每服六錢水煎服

大阿膠丸 治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有鮮血

勞傷脾胃吐血嘔血並皆治之

方在後咳血門

止血之劑

白芨散 治吐血

白芨末井花水調服每服一錢

地黃飲 治衄血吐血

新生地搗煮日服數升三日愈

此方治經閉効甚

乾姜散 治吐血不止

姜炭爲末童便調服

治諸血上行用薤菜汁姜汁童便磨薺金飲之其血自清
如無薺金以山茶花代之

又方 用血餘灰三錢 爲末冷水調下

治吐血咯血用藕節搗汁飲之

花蓋石散 治勞証五內崩損湧噴血出成升斗者服之立止

花蓋石

煅過

爲末童便一鍾煎溫調藥末三錢極甚者五

錢食遠服如男子病則和酒一半婦人病則和醋一半

與童便和調服之立止其瘀

血化爲黃水服此藥後患人必疎解其體却服

獨心湯補之

調氣止血之劑

芎附散 治衄吐血不歸經

川芎

二兩香附四兩

爲末每服二錢茶湯調下

綱目云治怒氣傷肝氣而嘔血以黃連香附青黛柴胡甘

草平其肝自愈宜服赤茯苓瀉心湯

大七氣湯入川芎煎調蘇合香丸

咳血

咳噯有聲而痰內有血者是也或咳出純是血痰

丹溪云乃火升痰盛 身熱多是血虛四物湯加減用

丹溪云痰帶血絲出童便竹瀝止之 經血逆行或血醒

吐血唾血韭汁服立効 咳血用姜汁童便青黛入血

藥中加四物湯牛膝膏地黃膏之類

又方用韭汁童便二物加麝金研細末合和服之其血消

自

脈大發熱喉中痛者是氣虛用參芪密炙黃柏荆芥地黃

當歸韭汁童便姜汁磨麝金飲之其血自消

此補兼解麝也

統言云嗽出痰內有血者名咳血又云嗽血其因有二熱

壅於肺者易治不過涼之而已久嗽損於肺者難治此已成勞也熱嗽有血宜金沸草散加阿膠痰盛加爪婁仁貝母勞嗽有血宜補肺湯加阿膠白芨嗽血而氣急者加杏仁痰中帶血絲者此是陰虛火動勞傷肺臟宜滋陰補肺湯

又方

香附

童便浸

北杏仁

童便皮尖炒去

山梔仁

炒青黛

海粉

瓜萎仁

訶子

馬兜鈴

爲細末入白硼砂少

許煉密少加姜汁爲丸噙化一丸白湯下

天一丸 此壯水之主以鎮陽元劑也與前方相兼服治

陰虛火動咳血等症甚効

懷地黃

牡丹皮

黃柏

童便浸

知母

童便浸

枸杞子

五味子 麥門冬 牛膝 白茯苓

爲末煉密爲丸梧子大空心白湯吞下八十九丸

天門冬丸 潤肺止嗽治咯血吐血咳血 方在嗽咳門

丹溪鹿黃丸 治酒色過度飢飽失時吐血咳血痰血 神

枇杷葉 款冬花 扊紫苑 杏仁 去皮木通 鹿茸

炙桑白皮 各一兩 大黃 五錢 為末煉密爲丸臨睡含化

七傷散 治血污血鬱血熱勞嗽吐血血痰 丹溪方

黃藥子 白藥子 各一兩 赤芍藥 七錢 玄胡索 知母 各

五錢 醑金二錢 當歸五錢 山藥 乳香 没藥 血竭 各二錢

爲末每服二錢茶湯下

綱目云肺熱此方極有効本草云白藥子黃藥子治肺熱大有功 一方紅花當歸煎湯調下

海藏甘桔加阿膠紫苑湯

治肺痿咳唾膿血

方見綱目傷寒咽痛門

羅太無大阿膠丸

治血虛嗽血吐血

阿膠炒微

卷柏

生地

熟地

大薑

山藥

雞蘇葉

五味子

各兩

柏子仁

另研

麥門冬

茯苓

百部

遠志

人參

防風

各五錢

爲末煉密丸如彈子大煎小麥麥門冬湯嚼下一丸

綱目云保養精血純補劑也血虛有潮熱者宜之

刲勞散

治肺痿痰嗽痰中有紅線盜汗發熱過則冷飲

食減少

方在咳嗽門

陳日華云有一女子及笄病症甚危百藥不効偶得此只一料除根

羅太無五味黃芪散 治嗽咯血成勞眼痛四肢困倦腳無力

麥門冬

熟地黃

黃芪

桔梗

各五錢

白芍藥

五味

子各二分

人參二錢

甘草一分

每服五錢水煎服一日三服

人參黃芪散

治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩

熱咽乾頰赤心冲潮熱盜汗減食咳嗽臟血

人參一兩

秦艽 茯苓各二兩

知母二錢

桔梗一兩

桑白皮一兩

一

五錢紫苑

柴胡各二兩

半夏洗一兩

黃芪三兩

五錢

鱉甲去裙

酥炙二兩

每服五錢水煎服

人參蛤蚧散

治二三年間肺氣上喘咳嗽咯吐膿血滿

面生瘡遍身黃腫

蛤蚧一對

全者河水浸五宿逐日

換水洗去腥氣酥炙黃色

杏仁去皮尖

炒五兩

甘草炙三

人參

茯苓

貝母

知母

各三兩

桑白皮

二兩

爲細末每日如茶點服神効

海藏云蛤蚧補肺勞虛嗽治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎痛用蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角各一兩除膠外皆爲屑次入膠分四服每服用河水三升於銀石器內慢火煮至半升去渣臨卧微溫細細呷之其渣候服盡再槌都作一服以水三升煎至半升如前服病人久虛不喜水當減水蛤蚧係補中有通久嗽不愈者宜之

麥門冬湯 治傷寒後傷肺咳唾膿血胸脇脹滿上氣羸

瘦 麥門冬 桑白皮 生地黃 各一兩 紫苑 竹茹

半夏

洗桔梗炒麻黃去根節各五錢

七錢五分

五味子

甘草各五錢

各五錢

羅太無續斷散

治骨蒸勞熱傳屍瘦病潮熱煩躁喘嗽

氣急身疼盜汗兼治咳嗽吐膿血

續斷

紫苑

桔梗

竹茹

五味子

各三錢

生地

桑

白皮

各五兩

甘草

炙二兩

赤小豆

半斤

每服五七錢入小麥五十粒水煎日三服

海藏紫苑湯

治咳嗽吐血虛勞症肺痿變癰

方在咳嗽門

本事方云治勞瘵吐血損肺及血妄行神傳膏用剪草一斤婺台州皆有惟婺州者可用狀如茜草又如細辛每

用一斤洗净爲末加入生密一斤和爲膏以器盛之不得犯鐵九蒸九晒日一蒸曝病人五更起向東坐不得語用匙挑藥如粥服每服四匙良久用稀粟米粥壓之藥冷服粥飲亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常咳嗽血妄行每服一匙可也治肺經嘔咳諸血及痰中有血初生用蘿蔔汁半盞入鹽少許服之立効如無生蘿蔔用蘿蔔子一錢紫蘇葉一錢同煎服次用雞蘇散加阿膠治之本草云蘿蔔大下氣氣下則血亦下也驗神經驗方 治咳嗽甚者或有吐血

鮮桑白皮

一斤米汁浸三宿
淨刮去上黃皮

右剉細入粳米四兩焙乾同搗爲末每服一二錢米

飲調下

本事方 治久嗽咯血成肺痰及吐白涎胸膈滿悶不食

扁豆散

扁豆

生姜

各五錢

枇杷葉

去毛半夏

人參

白朮

各一分

白茅根

三分

右水三升煎一升去渣加檳榔末一

錢和勻分作四服不拘時候

千金方

治上氣咳嗽喘息喉中有物唾血

生姜汁

杏仁

各二升

糖

密

各一升

豬膏

二合

右五味先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭令淨搗如膏和姜汁密糖等合煎令可丸每服杏仁一枚日夜服六七次漸次加增

夜服六七次漸次加增

欵花補肺湯

人參 麥門冬 各一錢

五味子 十五粒

紫苑

桑白皮

炒各一錢 當歸 五分

芍藥

知母

貝母

茯苓

橘紅 各八分

甘草 五分

水煎服

寧嗽湯

五味子 十五粒

茯苓 一錢

桑白皮 二錢

陳皮 一錢

知母

錢

馬兜鈴

一錢 五分

川芎 一錢

麥門冬 一錢

粉草 二分

水煎服

滋陰保肺湯

黃柏

鹽水炒

知母

天門冬

一錢 二分

當歸

五分

芍藥

生地

橘紅

紫苑

桑白皮

炒各八分

大粉草

五分

阿膠

一錢 二分

蛤粉炒

分

五味子

十五粒

水煎服

咯血唾血痰涎血

咯血者喉中常有血腥一咯血卽出或鮮或紫者是也
又如細屑者亦是也治法四物入姜汁童便青黛之類
有咯出痰帶血絲者同治但宜加痰火藥

唾血者鮮血隨唾而出者是也二者皆出於腎亦有瘀血
內積肺氣壅逼不能下降用天門冬知母貝母桔梗黃
柏熟地遠志或加炮姜

生生子曰唾血症曾見二人口中津唾皆是紫黑血水如
猪血之色晦而不鮮刑瘦體熱盜汗爲有怫鬱所致如
此者年餘治以清痰降火開鬱等藥或止或發其一乃
姪婦也後因注肛大吐痰涎數椀其症再不復由是觀

之唾血亦有木鬱之症不可不知

痰涎血出於脾以葛根黃連黃芪芍藥當歸甘草沉香之類主之

丹溪曰咯血痰帶血絲出者用姜汁青黛童便竹瀝入血藥中用如四物湯加地黃膏牛膝膏之類

滑伯仁曰寒涼之溢水乃瀉火也溫熱之助火乃折水也衄血手陽明循手經上行入清氣道中咯血乃入於所合也所合肺也

又曰咯血爲病最重且難治者以肺手太陰之經氣多血少又肺者金象爲清肅之臟令爲火所制迫而上行以爲咯血逆之甚矣上氣見血下聞病音謂喘而咯血且

咳嗽也

唾血責在下焦陽火煎迫而爲之也腎主唾爲足少陰少血多氣故其証亦爲難治

恩袍散 治咯血吐血唾血及煩躁咳嗽

生蒲黃 乾荷葉 茅根各等分

爲末每服三錢濃煎桑白皮湯食後溫服

丹溪方 治咯血

桑白皮一錢半夏炒

知母 貝母 茯苓各一錢

生地黃

各一錢

桔梗各一錢

七

陳皮各一錢

阿膠炒

甘草 杏仁炒各五分

山梔子

各五分

姜葱白水煎服

分

柳桂二分入此以治上焦

又方

治咯血衄血

白芍藥一兩

犀角二錢

五分

各爲末新汲水調服一錢血止爲限

又方 治咯血

荷葉

培乾

爲末米湯調下一錢

又方 治痰中血

白朮

一錢五分

貝母

芍藥

桑白皮

菟仁

各一錢

甘草

三分

山梔

炒黑二錢

牡丹皮

一錢五分

水煎服

又方 治痰中血

橘紅

一錢五分

半夏

茯苓

貝母

牡丹皮

桃仁

各一錢

黃連

甘草

大青

各五分

姜三片水煎服

又方 治痰中血

橘紅二錢 半夏 茯苓 白朮 枳壳 黃芩 桑白皮

各一錢 五味子十五粒 甘草三分 人參五分

或加青黛五分水煎服

地黃散 治一切吐血咯血能解一切毒及諸熱煩燥

茜草根

四錢

大荳子

黃藥子

各二兩 甘草

右爲末

每服二錢新汲水調下加人參二兩治痰嗽有血

又方 治吐血熱渴

茅根一味絞汁飲之一日三服効

治虛勞久嗽咯血

五倍子

炒爲末

每服一錢溫茶調勻米飲送下

白芨散 治咯血

白芨一兩 藕節五錢 為細末每服一錢白湯調下神效

錢爲細末每服一錢白湯調下神效

云白芨下咽直至血竅竅爲之填而血止也

醫說云

治肺損咳血殊効

四血散 治衄血吐血便血

益元散加當歸井泉石 淋者加梔子莖中痛加蒲黃

水鴻加車前子 米湯調下

元戎方 治鼻血口血大小便血

服時隨病上
下食前後服

丹參 蒲黃 紫蘇 滑石等分 為末調服

鼻衄

陳無擇曰衄者因傷風寒暑濕流傳經絡涌泄於清氣道
中而致者皆外所因積怒傷肝積憂傷肺煩思傷脾失

志傷腎，暴喜傷心，皆能動血隨氣上溢而致者，皆內所因。飲酒過多，啖炙燙辛熱，或墜墮車馬，傷損而致者，皆不內外因也。

原病式曰：衄者，陽熱怫鬱干於陽明而上熱，則血妄行而鼻衄也。

丹溪云：衄與吐血同，涼血行血爲主。犀角地黃湯加鬱金，又曰：衄血出於肺，以犀角升麻，梔子黃芩芍藥生地黃紫苑丹參阿膠之類主之。愚謂言肺者，以竅言也。言陽明者，以血海言也。其治亦多相須。戴元禮曰：鼻通於腦，血上溢於腦，所以從鼻而出。治宜茅花湯，調止衄散服之。有頭風自衄頭風，綴發則血不止，治頭風兼止衄之劑。有因虛致衄者，此爲下虛上

熱不宜過用涼劑宜四物湯加參芪沉香磨服 傷濕
而衄腎著湯加川芎 伏暑而衄茅花湯調五苓散
上膈極熱而衄犀角地黃湯加黃芩茅花荆芥虛者茯
苓補心湯 飲酒過多而衄茅花湯加川芎乾葛 痘
衄愈後血因舊路一月或三四衄又有洗面而衄日以
爲常四物湯加阿膠蒲黃仍佐以蘇子降氣湯使血隨
氣下
統旨謂風行水動氣行血流治衄者則知血藥以治衄而
不知氣降則血歸經古人所以血藥中必加氣藥一二
味如上所謂蘇子降氣湯之類是也前人謂身熱則死
寒則生亦是大概言之耳豈無熱生而寒死者乎必著
詳脉症而後可也

治風寒之劑

桂枝湯

方見傷寒

治熱之劑

犀角地黃湯

方見吐血門

茜根散 治鼻衄不止

茜根

阿膠

蛤粉炒

黃芩

側柏葉

生地

各一兩

甘草

五錢

加姜三片水煎服

黃芩芍藥湯 治鼻血不止

黃芩

芍藥

甘草

水煎服

川芎二黃散

直指

治實熱衄血

方

大黃

濕紙

川芎

黃連

黃芩

各等分

右爲末每服二錢井水調下食後服

黃連散

經驗方

治大人小兒盛熱秉於血血隨熱氣散溢於

鼻謂之鼻衄凡血得寒則凝滯結聚得熱則流散忘行

黃連

黃芩

柏葉

甘草

各等分

豆豉

三十粒

右每服一兩水煎服

治血衄血汗以人中白新瓦上焙乾爲末入射香少許酒
調下

生地黃湯

治榮中有熱及肺壅鼻衄生瘡一切丹毒疾等

生地

赤芍

當歸

川芎

各等分

水煎食後溫服

若鼻衄加蒲黃生瘡加黃芩丹毒加防風

濟生麥冬飲

治衄血不止

卷之三
麥門冬 生地黃各等分 每服一兩水煎服

一方 治鼻衄及酒疸黃沙淋

萱草根搗汁一鍾生姜汁相和時時細呷

貫眾散 治鼻衄

貫眾根 爲細末水調一錢立止

羅太無寸金散 治鼻衄不止

黃藥子五錢足者 土馬鬃五錢有生甘草一錢

右爲細末每服二錢新水調下未止再服立差本草云土馬鬃卽苦與垣衣之類垣衣生牆垣之上背陰古牆上有側土馬鬃生牆垣之上背陰古牆上有

一方 治衄血

蛀竹末米糊調下二錢効

芋花湯 治衄

芋花一大握剉水煎飲之立止

清熱帶補之劑

生地黃散 治咯血衄血吐血諸血証皆治之

枸杞子 柴胡 黃連 地骨皮 天門冬 白芍藥

甘草 黃芩 生地黃 熟地黃 各等分水煎服

治便血加地榆

海藏龍腦雞蘇丸 治上焦熱除煩解勞去肺熱咳衄血

熱驚悸脾胃口瘡吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志不定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩等疾

薄荷一斤 麥門冬去心阿膠炒黃芪 蒲黃炒人參已上俱淨藥

木通

銀柴胡

各二兩坐同木通
浸一宿絞出汁

生地黃六兩

甘草一兩

五錢

黃連

一兩

右爲細末好密二斤先煎一二沸然後下生地黃末
不住手攪勻加木通柴胡汁浸熬成膏勿冷火緊焦
了然後加前藥末和丸如豌豆大每服一十九白湯
下 虛勞虛煩梔子湯下 肺熱黃芩湯下 心熱
驚悸恍惚人參湯下 咳唾吐衄麥門冬湯下 肝
熱防風湯下 腎熱黃柏湯下 治五淋及婦人漏
下車前子湯下 痰嗽者牛羌湯吞下 莖中痛蒲
黃滑石水一鍾調下 氣逆者橘皮湯下 室女虛
勞寒熱潮作柴胡人參湯下

地黃飲 治衄血往來久不愈者甚効

生地黃 熟地黃

枸杞子

地骨皮

各等分

右爲末每服二錢密湯調下日三服

補虛之劑

止衄散

黃芪

六錢

赤茯苓

白芍藥

當歸

生地

阿膠

炒各三錢

爲末以黃芪湯調下三錢

產後鼻衄

大全云產後口鼻黑氣起及鼻衄者名胃絕此証不可治
遇有此者急取紺線一条并產婦項心髮兩條緊繫中
指節卽止

治產後鼻衄中風以荆芥爲末童便調下氣虛者不可用

齒衄又名牙宣

統旨云血從齒縫中或齒根出者謂之齒衄有風壅有腎虛風壅者消風散外以祛風察牙散腎虛者以腎主骨齒者骨之餘虛火上炎服涼藥而愈甚此屬腎經下虛而上盛宜益湯下安腎丸間服黑錫丹仍用青鹽炒香附黑爲末擦之亦有胃熱而牙斷出血者宜清其熱清胃散主之

附方

肘後方 治齒血不止

苦竹茹以醋浸一宿含之

千金方 治同

礬石一兩滾湯三升煮取一升先拭齒乃含之
又方 濃煎竹葉湯入鹽少許含之

衍義方 治齒縫出血不止

用紙撲蘸蟾蘇少許挿入出血處立止

靈苑方 治虛氣攻牙齒痛血出牙齦痒痛

骨碎補二兩細剉炒黑色爲末擦之早晨漱久吐出臨
睡擦畢俟津液滿口噙之

丹溪治陰虛牙出鮮血氣鬱

四物湯加香附牛膝生甘草側柏葉服

羅太無治牙痛腫動搖牙斷宣露出血口氣等疾

當歸 藁本 地骨皮 防風 白芷 槐花 川芎

甘草 升麻 北細辛

各等分

爲末擦痛處甚者取三錢水鍾半黑荳半合生姜三
片煎至一鍾乘熱漱之冷則吐出

本事方 治一切牙疼風熱斷常出鮮血以至崩落口臭
不可近人者宜服之

大黃

米泔浸軟切片

生地黃

大簿切

右二味旋切各用一二片合定貼所患牙上一夜即

愈未全可再如前用忌說話恐引風毒津液漬患處

舌齶

舌上或出血如簪孔者香薷汁服一升日三服
又方 髮灰二錢米醋調敷舌上血出處

文蛤散 治熱壅舌上出血如泉

五倍子

洗白膠香 牡蠣粉各等分

右爲末每用少許擦患處或燒熱鐵熨孔上

槐花散 治舌上

無故出血

如線

槐花

炒

爲末擦之仍用麥冬煎湯調下妙香散

妙香散

方在婦人門

第二卷夢與鬼交條下

肌衄

一名血汗

河間定命散

治膽受熱熱血妄行鼻中衄衄并血汗

不止

硃砂

寒水石 麝香

爲末每用五分新汲冰調

下不拘時候看老幼虛實加減

肌衄者血從毛孔而出前人多主於肺熱

古方以男胎髮燒灰撲之

大全竹茹湯

方見便血條

黃芪達中湯

辰砂妙香散

小便血

尿血不痛者乃血淋也當與淋門參治

經云胞移熱於膀胱則癃溺血

仲景曰熱在下焦則尿血亦令淋閁不通

玄珠經云小便出血是心伏熱在於小腸宜鏡面竹自然
汁加生密一匙服之或以八正散加麥門冬葱煎服如
小便澀痛以淘金沙細末調治之

綱目云胞絡絕則溲血故經曰悲哀太甚則胞絡
絕則陽氣內動發則心下崩數溲血也

凡咳而溲血脫形其脉小勁是逆也

凡淋不可發汗汗之必便血便血不止用柿一箇燒存性

爲末米湯調下

統旨云屬熱屬血虛有因心腎氣結所致或憂勞房室過度此得之虛寒不可專以血爲熱而淖二者皆致溺血熱用小薊湯四物湯煎服効虛用四物湯調牛膝膏火動榮血妄行者再加黃柏知母虛者十全大補湯加炒黃柏滑柏仁曰小便血足太陽隨經入膀胱也與小腸血同

附方

治房失勞傷小便出血

山藥一兩鹿角錢五錢髮灰二錢

爲末苧根搗汁打糊爲丸梧

子大每服五十丸空心食前白湯吞下

治大小便出血不止

劉寄奴爲末茶青調服立止

治尿後有乾血 乾柿餅三枚燒灰陳米湯調服

羅太無髮灰散 治小便尿血

髮灰

本草云髮灰能消瘀血通閔格利水
道破癰疽血衄丹溪云髮補陰甚捷

右一味每用一二錢以米醋二合湯少許服并花水

調亦可

一法茅草根車前子煎湯調下尤妙兼治肺疽心衄內崩

吐血一兩口或舌上出血如針孔若鼻衄吹內立已

葛氏方 治小便出血

當歸四酒三升煎一升頓服

肘後方 治尿血

苧麻根十根水五升煎取二升一服効

外臺秘要 治尿血

車前草汁五合空心服

茅草根汁亦妙或加酒少許冲服

小薊飲子 治焦結熱尿血成淋

生地四兩小薊根 滑石 通草 山梔仁 當歸

洗

淡竹葉 藕節 蒲黃炒 甘草各五錢

右每服一两水煎空心服

丹溪云尿血有實熱者可用當歸承氣湯後以四物湯加

山梔當歸承氣湯加當歸調胃

又方 治溺血屬熱 山梔

炒

水煎服

或用小薊琥珀 血虛者四物湯加牛膝膏

又方 治血淋

木通 甘草梢 薏麥 山梔 水煎服

濟生鹿角膠丸 治房室勞傷小便尿血

鹿角膠

五錢 没藥 另研 另油頭髮灰 各三錢

右爲末用茅

根湯打糊爲丸如梧桐子大每五十丸鹽湯送下

玉屑膏 治氣虛尿血并五淋砂石疼痛不可忍黃芪

人參各等分 炙乾復蘸復炙盡蜜二兩爲度勿令焦至熟蘸

黃芪人參末吃不時仍以鹽湯送下

又方 治老人小兒尿血不止

川升麻一兩半作一帖水煎服妙

又方 治虛而尿血

阿膠三兩采搗爲末酒二升和溫服

當歸散 治婦人小便出血或時尿血

當歸 羚羊角 赤芍藥各五錢 生地黃一大薊葉半錢

分作三帖水煎食前服

六味地黃丸 治老人尿血及陰虛尿血

玄胡散 治尿血作痛

玄胡索一兩 朴硝三分 水煎服

五倍湯 治尿血不止

五倍子煎湯露一宿次早取上面青者溫服

龍骨散 治尿血

龍骨末一錢水調服日三服瘥

此二方皆收澁之劑

治溺血血淋方 小薑根 琥珀

二味爲末水煎服蓋二味能治下焦熱結

琥珀散 治五淋澁痛小便膿血

琥珀 海金沙 没藥 蒲黃

各一兩

爲極細末每服三錢食前煎萱草湯調下

治血淋及小便閉方

杜牛膝根二兩 朴硝一兩 用雪水二碗煎牛膝至一碗去渣

入朴硝攬勻空心服

治小便出血莖痛不可忍

淡豆豉

一撮

煎湯溫服之甚効

治血淋方

牛膝

一兩

黃柏

知母

澤瀉

各一兩

麥門冬

天門冬

山梔仁

各一兩半

生地黃

二兩

爲末粥糊丸如梧桐子大每空心白湯吞下八九十九

又方 治同上

人參

白朮

川歸

熟地

川芎

山楂

茯苓

各八分

黃芪

七升

麻

三分

水煎服

又方 治同上

牡丹皮

當歸

生地

山梔子

白芍

甘草梢

滑石 澤瀉 白茯苓 木通

各等分

每服五七錢加生姜皮二分燈心一分水煎食前服

下血

素問云結陰者便血一升再結二升三結三升駱龍吉云
結陰之病陰氣內結不得外行血無所稟滲入腸間故
便血也其脉虛澀因血結不行故下

本事方云如下清血鮮色者腸風也血濁而色黯者臟毒
也肛門射血如線者虫痔也

仲景云下血先便後血者此遠血也黃土湯主之先血後
便者此近血也赤小豆當歸散主之

累古云 治血下防風爲上使黃連爲中使地榆爲下使

若血瘀色紫者陳血也加熟地黃 若血鮮色紅者
新血也加生地黃 若寒熱者加柴胡 若肌熱者加
地骨皮 若脉洪實
痛甚者加酒浸大黃

生生子曰便血有虛有濕有熱有寒有食積有酒積有風
入大腸治之之法切不可純以寒涼損壞脾胃脾虛尤
不能約束其血也故丹溪戒人凡用血藥不可單行單
止不可純用寒涼必於寒涼中加辛味爲佐久不愈者
復用溫藥必兼升舉藥中加酒炒酒煮涼藥如酒煮黃
連之類

丹溪曰暘風獨在胃與大腸出治用黃芩秦艽槐角青黛
升麻 定腸風痛用蒼朮滑石當歸生地黃芩甘草

下血屬虛者當溫散之四物湯加乾姜升麻 便血過

多者四物湯加蝎皮 有熱者四物湯加山梔升麻秦

艽阿膠 有兼風者蒼朮秦艽芍藥香附

胃清血非
藍實不除

玄珠經云大便下血曰腸風切勿止瀉究其本末症狀先
清其表後攻其裏其血自止如脈洪大又當以四物合

解毒湯調理

熱創流通虛則下溜故便血屬熱屬虛亦有風傷肝而下

陷及濕盛而傷血者 热而下血或清或濁宜四物湯

加黃芩山梔炒槐花秦艽膠珠虛者四物加乾姜升麻

涼藥隨虛實加減 風傷胃獨下清血者宜四物湯加

防風升麻荆芥柴胡升提之 濕入腸胃下如豆汁色

者宜多四物加蒼朮白朮黃連黃柏地榆槐花陰虛下血無熱者十全大補湯加止血之劑

統旨云便血或清或濁或鮮或黑或在便前或在便後或與泄物並下此由內外有所感傷凝停在胃隨氣下通亦是妄行之意便血清者屬榮虛有熱濁屬熱與濕色鮮者屬火黑者火極先血後糞爲近先糞後血爲遠與泄物並下者屬有積在內或絡脈傷也並宜分治又當別其色而分寒熱也色鮮多因腸胃蘊熱必是飲酒過多辛熱磚炙之故也宜連蒲散或黃連阿膠湯色瘀或因寒邪凝滯血逐冷氣入客腸胃宜理中湯加膠珠炒黑香附其應甚捷大抵下血後必以胃藥收功胃氣回

血自循其經絡矣

伏暑純下鮮血黃連香薷飲治之

方見傷暑門

風熱流入大腸經下血不止敗毒散治之

方見傷風門

風濕乘虛入於腸胃下清血或下瘀血

胃風湯治之

滑伯仁曰大便前後下血便前由手陽明隨經下行滲入

大腸傳於廣腸而下也便後由足陽明隨經入胃滲溢

而下者也古人謂近血遠血者是也又有所謂腸風臓

毒者腸風則足陽明積熱久而爲風風以動之也臓毒

則足太陰積熱久而生濕從而下流也風則陽受之濕

則陰受之

和中去濕之劑

東垣升麻補胃湯 治宿有腸血症因五月大熱吃杏脾
癬下血遠三四尺散漫如篩腰沉沉然腹中不痛血色
紫黑病名濕毒腸澼是陽明少陽經血症

升麻

柴胡

防風

各一錢半

姜活

一錢

當歸身

葛根

各三分

獨活

白芍

生地

丹皮

熟地

甘草

炙各五分

黃芪

一錢肉桂少許

水煎食前服

和中益胃湯

治太陰陽明腹痛大便常溏泄設不泄即

秘結在後傳爲濕熱毒下鮮紅血腹中微痛脇下急縮
脉緩而洪弦中指下得之按之空虛

熟地

三錢歸身酒洗

甘草

炙各三分

益智

各三分

升麻

柴胡

各五分

蘇木

一分藁本二分

水煎食前服

升陽除濕和血湯 治腸澼下血另作一派其血滷出有力而遠射四散如篩下春二月中旬日下二行腹中大作痛乃陽明氣沖熱毒所作也當升陽去濕熱和血脉不兩服而愈 生地 丹皮 甘草生炙各五分 白芍一錢半

熟地

黃芪

各一錢

升麻七分

歸身

蒼朮

秦艽

各三分

肉桂

陳皮

各二分

水煎食前服

當歸和血散 治腸澼下血濕毒下血

槐花

青皮

荆芥

熟地

白朮

各六分

當歸

升麻

各一錢

川芎

四分

爲末食前米飲調下

椿皮丸

本事方

臭椿皮

十四兩

蒼朮

枳殼

各二分

兩

爲末醋糊丸梧子大空心食前米飲下三四十九

玉屑丸 治癰風瀉血久不止者

槐根白皮

去粗皮

苦練根

去三兩

槐根白皮

四兩三味

九月後

二月三兩

前採陰乾

天南星

半夏

各五錢並生用

歲靈仙

乙兩

寒食面

三兩

兩

兩

右末滴水丸梧子大每服三十丸以水一鍾煎沸下丸子煮令浮以匙抄起溫溫送下不要嚼空心食前服有人下血幾盈盆頓爾疲萎諸藥不効許學士以此治之良愈

槐花飲 治腸風有濕脹滿下血

蒼朮

厚朴

陳皮

當歸

枳殼

各一兩

槐花

二兩

甘草

烏梅

各五錢

每服一兩

水煎空心服

治下血方

赤水玄珠

椿根白皮

去粗皮

枯白礬

甘草

滑石

等分

血竭

五錢

人參

二錢

黃蓮

二錢

共爲末

米飲下

烏荳丸

治腸風

川烏頭

一兩泡去皮尖

荆芥穗

二兩

爲末醋丸桐子大每服二十九酒送下白湯亦可下
病發時日進三服不發時日進一服

黃土湯 治先便後血名遠血

粉草

白朮

熟地

附子

泡阿膠

黃芩

已上各三兩

灶中土

半升

右七味以水八升煮取三升分作三服

赤豆當歸散

治先血後便名近血

赤小荳五兩浸令
芽出晒乾當歸一
爲末白湯調下二錢日三

服 梅師云治熱毒下血或因食熱物發動以赤小

荳杵末水調下方寸七

又方 治腸風 赤小荳炒黑爲末每服二錢米飲調下
由此觀之赤小荳寒熱皆能治也

益智和中湯 治腸澼下血紅或深紫黑色腹中疼腹皮
惡寒右三部脉中指下得之俱弦按之無力關脉甚緊
肌表陽明分涼腹皮熱而喜熱物熨之內寒明矣

升麻

甘草

炙歸身

黃芪

各一錢

葛根

益智

半夏

丹皮

柴胡

白芍

錢半

肉桂

乾姜

少許

水煎食後服

羅太無治真定搘管因免強飲釀酒得腹痛次傳泄瀉十

餘日便後見血或立或紫腸鳴腹痛醫以諸見血皆熱治以芍藥柏皮湯之類前証如故仍不欲飲食食則嘔酸刑体愈瘦面青黃不澤心下痞惡冷物口乾時有煩躁不得安卧請予治之診得脉弦細而微遲手足梢冷內經曰結陰便血一升再結二升三結三升又曰邪至五臟則陰脉不和陰脉不和則血留之結陰者病陰氣內結不得外行血無所稟滲入腸間故便血也以平胃地榆湯主之 蒼朮一厚朴 陳皮 茯苓 白朮
乾葛 甘草炙各五分 乾姜 當歸 炒麵 白芍 人參
益智仁各三分 地榆七分 升麻 黑附子炮各一分

生姜三片棗二枚水煎食前溫服

此藥溫中散寒除濕利胃數病服減大半又炙中脘
二七壯引胃氣上升次炙氣海百壯生發元氣以還
少丹服之以長肌肉至春再炙三里三七壯治脾壯
胃生發元氣次服芳香之劑慎言語節飲食而安

王海藏云治楊師醉醒發大渴飲水三大盞又飲冷茶三
碗後病便鮮血四次得一盆先與吳茱萸丸次日又與
平胃五苓各半散三大服血止後自利又與神應丸四
服自利乃止或問曰何不用黃連之類以解毒予曰若
用寒藥其疾大變難治寒飲內傷復用寒藥非其治也
況血爲寒所凝入大腸間而便下血溫之乃所以得熱
則自止

楊氏飲冷酒鴻血對金散止之亦是理中脘分別陰陽安

定血脉之意也 唐生病因飲酪水及食生物下利紫
黑血十餘行脾胃受寒濕與六神平胃散半兩加白朮
三錢以利腰臍間血一服愈

胃風湯 治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄
瀉注下入腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

人參 茯苓 川芎 官桂 白朮 當歸 芍藥

各等分

每服五六錢加粟米百粒同煎稍熱服若加熟地黃

芪甘草等分名十補湯 若虛勞嗽加五味子 有痰

加半夏 發熱加柴胡 有汗加牡蠣 虛寒加附

子 寒甚加乾姜皆依本方等分 骨蒸發熱飲食
自若者用十補湯加柴胡一兩 氣弱加人參小便

不利加茯苓 脉弦澁加川芎 惡風加官桂 附

澁加當歸 腹痛加白芍 胃熱濕盛加白朮

草豆蔻散 治丈夫傷血婦人血崩漬人大腸出血

草豆蔻 檳榔各炒紫色鶯粟殼燒灰

等分爲末每服二錢米飲下

濟生剪紅丸 治臟腑虛寒下血不止面色痿黃日久羸

瘦 側柏葉炒黃鹿茸火去毛附子炮去皮川續斷酒浸

黃芪 阿膠蛤粉白礬枯五錢當歸酒浸各一兩爲末醋煮米

糊爲丸如桐子大每服七十九空心米飲下

羅太無結陰丹 寒濕下血者爲結陰治腸風下血臟毒

下血諸大血疾

枳壳
蓼炒

葳靈仙

黃芪

橘紅

椿根白皮

何首

烏

荆芥穗

各五錢

爲末酒糊丸桐子大每服七十九

陳米飲入醋少許煎過少冷送下

血熱之劑

黃連湯 治大便後下血腹中不疼謂之濕毒下血

黃連

當歸

各五錢

甘草

炙錢五分

水煎食前服

聚金丸 治腸胃積熱或酒毒大便下血腹中熱痛煩渴

脉弦數

黃連

四兩四錢

生

乙兩

酒

炒乙兩

黃芩

乙兩

防風

乙兩

右

爲末糊丸桐子大每服五十九米泔浸枳壳水下

保命集芍藥黃連湯 治大便後下血復中痛謂之

熱毒下血

芍藥

黃連

當歸各五錢

淡桂分五錢

甘草一錢

大黃

右每服一兩水煎服

如痛甚者加木香檳榔末各

一錢調下

拔萃涼血地黃湯
如飲食不節起居不時陰受之陰受之則入五臟入五臟則填滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼水谷與血另作一派唧出也時令值夏濕熱太盛正當客氣勝而主氣弱也故腸澼之証甚此湯主之

熟地

當歸

青皮

槐花

炒各五分知母炒

黃柏

炒各一錢

水煎服
如臍下悶小便澁或大便後重調木香檳榔末各五分稍熱空心服如裏急後重又不去者宜下之如有傳變隨症加減治之

一方 槐花 荆芥穗各等爲末酒調下一錢半空心仍

分

爲末酒調下一錢半空心仍

食猪血炒

連蒲散

黃連

蒲黃

炒各一錢二分

黃芩

當歸

生地黃

枳壳

麸炒

皮槐角

芍藥

川芎

各一錢

甘草

五分

如酒毒加青皮乾葛去枳壳 濕毒加蒼朮白朮

水二鍾煎一鍾食前服

槐角丸 治五種腸風下血痔漏脫肛

槐角

三兩

地榆

黃芩

當歸

防風

枳壳

麸炒各二兩

右爲末酒糊丸桐子大每服七十丸空心米飲下

大臟丸 治腸風下血及痔疾神効

黃連

半斤去蘆爲末入肥大腸臟頭一段內前後用線縛定蒸爛爲度

搗爲丸桐子大每服百丸空心米飲下

秘方柏葉散 治便血甚効

扁柏葉晒乾爲末糯米炒黃爲末等分每服五錢空心白湯調下如未止再加炒黑木耳末一錢

又方 治臟毒不止

當歸 枳壳 側柏葉 槐角 百草霜 芍藥各一兩

右共一處炒令烟微起爲度研末每服一錢空心溫酒調下日午米湯下甚妙

又方 治積血便

蒼朮 陳皮各二錢黃柏 黃芩各七錢連翹五分

右爲末以生地黃膏六兩爲丸桐子大空心及食前

白湯下七八十九

丹溪方 治脈緩大口渴便血及婦人月水紫色勞挾熱濕

白朮

五錢

地黃

黃柏

炒

白芍藥

各三錢

地榆

香附

各二錢

白朮

黃連

二錢

甘草

陳皮

又方 治便血久傷血并麻風症癬瘡見面者

龜板

二兩

升麻

香附

各五錢

白芍

半兩

側柏葉

一兩

椿根皮

七錢

分爲末粥丸桐子大以四物湯加白朮黃連甘草陳皮

煎湯下

槐花散 治腸風臟毒

槐花

炒

側柏葉

燒

荆芥

枳壳

炒等分

俱爲末

每服二錢米飲下空心食前服

又方 治下血

槐花 炒枳壳 炒地榆 蜜炒各三錢

水煎露一宿頓溫服之立愈

梧黃丸 治腸風臟毒下血鮮紅

生地黃 黃柏 各一斤爲末煉蜜丸桐子大每空心食前

米飲下八九十九

枳壳散 治諸便血

枳壳 炒黃甘草 炙三錢
色十兩

爲末每服一錢空心米飲調下酒煮黃連丸

酒煮黃連丸

黃連 去蘆十兩 好酒五升 煮黃連以酒乾爲度焙乾

爲末麵糊丸桐子大每服三十九空心服

加減四物湯 治腸風下血

側柏葉 生地 川歸 川芎各八兩 枳壳 槐花炒
荆芥 甘草炙各一兩 地榆 条芩各六分 防風六分

加烏梅一個 姜三片水煎服

參柏丸 治腸風下血

苦參 黃柏等分

爲末酒打米糊丸空心酒吞百丸

補虛之劑

竹茹湯 治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹 熟地各二兩 人參 白芍 桔梗 川芎 當歸

甘草 桂心各一兩 每服一兩水煎食遠服

參芩白朮散 治脾氣虛不能約束其血或爲寒涼藥傷以致飲食少進而色痿黃

補中益氣湯加阿膠蒲黃 治清氣下陷中氣不足下血不止

十全大補湯 理中湯 胃風湯

雜方

固榮散 治吐血便血

白芷五錢 蒲黃炒一錢 地榆各二兩 甘草一分 一錢

右爲末每服二錢溫酒調服

壯氣者加石羔一兩

一方 治糞後下血不止

艾葉汁 生姜汁 各二合和服

一方 治中毒下血

蝴蝶皮炒成珠 為末每服一錢水調下日三服

烏梅丸 治便血下血

烏梅

三兩燒存性

爲末醋糊丸桐子大空心米飲下七十九

一方 治便血

白芷

五倍子 為末粥丸桐子大每服五十九米湯

靈苑方 治腸風下血久不止

茄蒂

煅存性爲末

每服三錢食前米飲下

丹溪云茄蒂燒存性山枝炒等分爲末丸之米飲吞下百丸効

本事方 治腸風

絲瓜燒存空心酒調下一錢

五槐丸 治臘毒

五倍子 槐花陳百藥煎等分者各爲末酒糊丸桐子大每服廿丸空心米湯下日三服

又方 治腸風臘毒酒利下血

黃連 生姜 二味煎湯下一氣丸 次服五槐丸

又方 金星草五兩味苦寒解丹石毒陳乾姜

右爲末空心新汲水調下一錢

蒜連丸 治臘毒

黃連爲末以大蒜煨熟去衣研和丸桐子大每服五十

丸陳米飲下蒜能清血

東垣烏梅丸 治腸風下血

真姜蚕 烏梅肉

各乙兩
焙乾

爲末糊丸雞頭子大每服百

丸白湯吞下日三服

一方 治腸風下血 馬鞭草搗自然汁服良

一方 治腸風下血及血崩

丹溪云亦治汚血

五靈脂

炒去火
爲末

每服二錢

二麴散 治酒積下血不止糞後見諸藥不効者神麴

半兩

白酒藥

二
丸

俱爲末清水調搘成餅子慢火上炙黃爲末

每服二錢白湯下亦治泄瀉神効

丹溪方 治腸澼

陳年棕櫚燒存性百藥煎爲丸服

又方 治臟毒便血

生藕節切片清晨蘸平胃散嚼下

治腸痔大便常血 葱白三五斤煎湯盆中坐浸之瘥

又灸法 平直量骨脊與臍中處推上炙七壯或年深者更於椎骨兩傍各一寸炙七壯除根

治腸風下血 椿根皮

好酒濃煎服即愈

治下血不止 木賊

二兩作二帖水煎空心服如人行五里再服

九竅出血

耳目口鼻大小便皆出血者是也

黃金散治九竅出血 牛黃

等分鬚金爲末

血餘散 治血淋兼治內崩吐血舌血小便出血

亂髮皂角水洗淨晒乾燒灰爲末每服一錢以茅草根車前草煎湯

下本草謂髮灰消瘀血通閑格利水道破癥瘕血衄
有人生血瘤大如栗常破衣擦破則血出不止血
餘灰敷之愈一人刀傷血流

不止用胎髮灰敷之立愈

孫眞人治九竅出血用黃荆葉搗汁酒和服之

丹溪治九竅出血以大薊

一握搗汁以酒和服之如無生
者以乾者爲末冷水調下三錢

一方龍骨末酒煎通口服

中蠱下血

綱目云唾水沉者心腹絞痛下血如爛肉者爲蠱

千金方治中蠱下血如雞肝出其餘四臟俱壞惟心未毀
或鼻破待死取馬蘭根末水服方寸七隨吐卽出極神

此苗葛蔓綠紫生子似橘

梅師方治卒中蠱毒下血如雞肝晝夜不絕臍腑敗壞待

死用白藜荷葉密置病人臥席下勿令病人知覽自呼
蠱主姓名

百一選方治中蠱毒或吐血下血如爛肝者取蚯蚓十四
條以苦酒三升漬之蚓死但服其汁已將死者皆可治
千金翼 治蠱毒下血蟇毛燒末服方寸七當吐蠱毒

肘後方 治中蠱吐血下血皆如爛肝者

苦瓠一枚水二升煮取一升服之吐卽愈

又方 用苦酒一升煮苦瓠令消服之神効

金瘡出血

軍中方 治金瘡出血不止

半夏生用爲末摻之緊札立止

又方 風化石灰五月端陽日取苧葉搗汁拌勻做成大
餅子陰乾每用研極細末罨上立止

桃花散 治金瘡出血及杖瘡

風化石灰一斤將軍末子四兩先將灰炒漸投將軍末子候
看灰如桃花色卽止每用少許敷之血立止杖丹以調
做膏藥貼之

一方 胎髮灰傳之立止 三七末罨上立止
血竭細末傳之立止

一子隋車血滯於中

大黃 川歸各等分每服一兩水煎服或五錢

血蠶湯

桃仁

香附

撫芎

紅花

青黛

等分

右糊丸桐子大每服白湯下四五十丸