


TUL34
• A1
T71
v.3





18

SPECIES
GRAMINUM

ICONIBUS ET DESCRIPTIONIBUS ILLUSTRAVIT

D. C. B. Trinius,
ACAD. SC. PETROP. SODALIS.

F A S C. XXI.

PETROPOLI.
IMPENSIS ACADEMIAE IMPERIALIS SCIENTIARUM.

Oswald Weigel
Antiquaria & Bibliotheca
Berlin.

A c a d e m i a e j u s s u.

P. H. Fuss.

SPECIES

GRAMINVM


Iconibus et Descriptionibus

illustravit



C.B. TRINII^S, M.D.

Acad. Imp. sc. Petrop. sod.



Vol. III.

Petropoli.

Impensis Academiarum Imperialis scientiarum.


1836.

+2L34

.A1

T41

v. 3



INDEX SPECIERUM VOLUMINIS TERTII.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Agrostis nilens</i> <i>Guss.</i> XXI. 243.
— <i>serotina</i> <i>Nutt.</i> XXI. 251.
— <i>villosa</i> <i>Rchb.</i> XXI. 252.</p> <p><i>Aira alpina</i> <i>L.</i> XXII. 254.
— <i>bottnica</i> <i>Wahlenb.</i> XXII. 255.
— <i>caespitosa</i> <i>L.</i> XXII. 253. 256.
— <i>danthonioides</i> <i>Tr.</i> XXII. 257.
— <i>flexuosa</i> <i>L.</i> XXII. 258.
— <i>media</i> <i>Gouan.</i> XXII. 259.
— <i>pulchella</i> <i>Willd.</i> XXII. 260.</p> <p><i>Alopecurus caespitosus</i> <i>Tr.</i> XXI. 241.</p> <p><i>Andropogon Bladhii</i> <i>Retz.</i> XXVIII. 325.
— <i>filiformis</i> <i>Pers.</i> XXVIII. 329.
— <i>Iwarancusa</i> <i>Roxb.</i> XXVIII. 326.
— <i>pachnodes</i> <i>Tr.</i> XXVIII. 327.
— <i>punctatus</i> <i>Rorb.</i> XXVIII. 328.
— <i>serratus</i> <i>Retz.</i> XXVIII. 329.
— <i>xanthoblepharis</i> <i>Tr.</i> XXVIII. 330.</p> <p><i>Aristida caerulescens</i> <i>Desf.</i> XXVII. 313.
— <i>gibbosa</i> <i>Tr.</i> XXVII. 314.
— <i>Siae Luciae</i> <i>Tr.</i> XXVII. 315.
— <i>spadicea</i> <i>Hb. et Kth.</i> XXVII. 316.</p> <p><i>Arundinaria distans</i> <i>Tr.</i> XXX. 349.
— <i>spathiflora</i> <i>Tr.</i> XXX. 350.</p> <p><i>Arundinella agrostoides</i> <i>Tr.</i> XXIII. 265.
— <i>brasiliensis</i> <i>Radd.</i> XXIII. 266.
— <i>flammida</i> <i>Tr.</i> XXIII. 266.
— <i>nepalensis</i> <i>Tr.</i> XXIII. 268.</p> | <p><i>Arnndo triodioides</i> <i>Tr.</i> XXX. 351.
— <i>villosa</i> <i>Tr.</i> XXX. 352.</p> <p><i>Bambusa capitata</i> <i>Tr.</i> XXIX. 337.
— <i>virgata</i> <i>Tr.</i> XXIX. 338.</p> <p><i>Briza barbata</i> <i>Tr.</i> XXV. 289.
— <i>maxima</i> <i>L.</i> XXV. 290.
— <i>media</i> <i>L.</i> XXV. 291.
— <i>minor</i> <i>L.</i> XXV. 292.
— <i>spicata</i> <i>Sibth.</i> XXV. 293.
— <i>triloba</i> <i>N. ab Es.</i> XXV. 294.</p> <p><i>Bromus Danthoniae</i> <i>Tr.</i> XXX. 353.</p> <p><i>Calamagrostis deschampsioides</i> <i>Tr.</i> XXX.
354.</p> <p><i>Calotheca barbata</i> <i>N. ab Es.</i> XXV. 289.</p> <p><i>Campuloa hirsuta</i> <i>R. et S.</i> XXVI. 310.</p> <p><i>Campulosus aciculatus</i> <i>Tr.</i> XXVI. 301.
— <i>brachystachys</i> <i>N. ab Es.</i> XXVI.
302.
— <i>chapadensis</i> <i>Tr.</i> XXVI. 303.
— <i>cirrosus</i> <i>N. ab Es.</i> XXVI. 304.</p> <p><i>Centothecea lappacea</i> <i>Desv.</i> XXV. 298.</p> <p><i>Chaetaria gibbosa</i> <i>N. ab Es.</i> XXVII.
314.</p> <p><i>Chloris acuminata</i> <i>Tr.</i> XXVI. 305.
— <i>barbata</i> <i>Sw.</i> XXVI. 306.
— <i>ciliata</i> <i>Sw.</i> XXVI. 307.
— <i>confertifolia</i> <i>Tr.</i> XXVI. 308.
— <i>distichophylla</i> <i>Lag.</i> XXVI. 308.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Chloris equitans* *Tr.* XXVI. 309.
 — *falcata* *Sw.* XXVI. 310.
 — *foliosa* *Willd.* XXVI. 311.
 — *pyenothrix* *Tr.* XXVI. 312.
Chrysopogon serrulatus *Tr.* XXVIII. 331.
Clusquea capituliflora *Tr.* XXIX. 339.
 — *pinifolia* *N. ab Es.* XXIX. 340.
Deschampsia alpina *R. et S.* XXII. 254.
 — *caespitosa* *PB.* XXII. 253.
 — *media* *R. et S.* XXII. 259.
Eulalia nepalensis *Tr.* XXVIII. 332.
Eutriana multiseta *N. ab Es.* XXV. 295.
Festuca littoralis *LaB.* XXX. 351.
Gymnopogon foliosus *N. ab Es.* XXVI.
 311.
Helopus brachystachys *Tr.* XXIV. 277.
 — *grandiflorus* *Tr.* XXIV. 278.
Ischaemum paleaceum *Tr.* XXVIII. 333.
Lachnagrostis Chamissonis *Tr.* XXI. 242.
 — *Gussonis* *Tr.* XXI. 243.
Lepideilema lancifolium *Tr.* XXV. 296.
Megastachya thalassica *R. et S.* XXV.
 300.
Melica imperfecta *Tr.* XXX. 355.
Olyra capillata *Tr.* XXIX. 341.
 — *cordifolia* *Willd.* XXIX. 342.
 — *fasciculata* *Tr.* XXIX. 343.
 — *filiformis* *Tr.* XXIX. 344.
 — *floribunda* *Radd.* XXIX. 345.
 — *panienlata* *Sw.* XXIX. 346.
 — *semiovata* *Tr.* XXIX. 347.
Panicum agrostoides *Mhlbg.* XXII. 261.
 — *angustum* *Tr.* XXVIII. 334.
 — *ansatum* *Tr.* XXIV. 279.
 Panicum arnacites *Tr.* XXVII. 317.
 — *barbinode* *Tr.* XXVII. 318.
 — *caucasicum* *Tr.* XXII. 262.
 — *chnoodes* *Tr.* XXI. 247.
 — *demicissum* *Tr.* XXVII. 319.
 — *diffusum* *Sw.* XXII. 263.
 — *effusum* *Br.* XXI. 244.
 — *inconstans* *Tr.* XXVII. 320. 321.
 — *lasianthum* *Tr.* XXI. 245.
 — *Leandri* *Tr.* XXVIII. 335.
 — *Lolium N. ab Es.* XXIV. 282.
 — *loreum* *Tr.* XXI. 246. 247.
 — *petrosum* *Tr.* XXIV. 280.
 — *platycarphum* *Tr.* XXX. 356.
 — *proboscideum* *Tr.* XXVII. 322.
 — *pungens* *Tr.* XXI. 248.
 — *Riedelii* *Tr.* XXVII. 323.
 — *rivulare* *Tr.* XXII. 264.
 — *rottböllioides* *Kth.* XXIV. 281.
 282.
 — *Sclerochloa* *Tr.* XXIV. 283.
 — *secundum* *Tr.* XXVII. 324.
 — *xanthophysum* *Gray.* XXX. 357.
Paspalum aspidiotes *Tr.* XXIII. 269.
 — *cujabense* *Tr.* XXIV. 284.
 — *fasciculatum* *Willd.* XXIII. 270.
 — *heterotrichon* *Tr.* XXIV. 285.
 — *lanciflorum* *Tr.* XXIV. 286.
 — *malacophyllum* *Tr.* XXIII. 271.
 — *prinosum* *Tr.* XXIII. 272.
 — *pusillum* *Vent.* XXIII. 273.
 — *scalare* *Tr.* XXIII. 274.
Pennisetum articulare *Tr.* XXIV. 287.
 — *parviflorum* *Tr.* XXIV. 288.

Pereilema crinitum	<i>Presl.</i> XXX. 358.	Streptochaeta spicata	<i>Schrad.</i> XXIV. 296.
Potamophila parviflora	<i>Br.</i> XXI. 249.		297.
Reimaria acuta	<i>Flüg.</i> XXIII. 275.	Uniola lappacea	<i>Tr.</i> XXV. 298.
— conferta	<i>N. ab Es.</i> XXIII. 276.	— spicata	<i>Willd.</i> XXV. 299.
Schoenefeldia ramosa	<i>Tr.</i> XXX. 359.	— thalassica	<i>Tr.</i> XXV. 300.
Spodiopogon angustifolius	<i>Tr.</i> XXVIII. 336.	Vilfa acuminata	<i>Tr.</i> XXIX. 348.
Stenotaphrum subulatum	<i>Tr.</i> XXX. 360.	— rigens	<i>Tr.</i> XXI. 250.
		— serotina	<i>Tr.</i> XXI. 251.
		— villosa	<i>Rchbch.</i> XXI. 252.

CORRIGENDA ET EMENDANDA IN VOLL. I. II. ET III.

- Fasc. I. tab. 2. restituendum nomen antiquius *Alopecurus vaginatus* Pall.
 — II. — 19. nomen mutetur in *Pennisetum compressum* Br.
 — II. — 21. loco: *Alopecuri alpini* in tabula lege *Phleum alpinum*.
 — V. — 50. *Danthonia livida* est syn. *Danth. curvifoliae* Schrad.
 — V. — 59. *Vilfa rupestris* est var. minor *Vilfae tenacissimae*.
 — VII. — 73. *Phalaris dentata* Thbg. subgenus format *Lasiochloae* Kth.,
 (*Ctenachne*); dicenda *Lasiochloa pectinata*.
 — VII. — 80. *Phalaris nepalensis* vix a *brachystachy* diversa.
 — VIII. — 88. *Panicum accrescens* i. q. *Pan. obliquum* Roth.
 — VIII. — 90. *Panicum ferrugineum* i. q. *Pan. eriochryseoides* N. ab Es.
 — VIII. — 95.96. De *Panico setoso* ejusque affinibus conf. Act. Petrop. Ann.
 1834. Tom. III. p. 226. 227.
 — IX. — 97. *Paspalum aureum* est *Paspalum pulchrum* Willd. herb.,
 nunc *Panicum aureum* nobis dictum.
 — X. — 119. *Paspalum stellatum* est *Paspalum carinatum* Kth.
 — XI. — 124. *Paspalum dissectum* est *Paspalum commutatum* N. ab Es.
 — XI. — 126. *Paspalum ischnocaulon* i. q. *Pasp. glabrum* Poir.
 — XII. — 139. *Paspalum ovatum* i. q. *Pasp. dilatatum* Poir.
 — XII. — 141. *Paspalum polyphyllum* i. q. *Pasp. distichophyllum* Hb. et Kth.

- Fasc. XII. tab. 143. *Paspali scrobiculati* culmus perperam repens depictus.
- XIII. — 145. *Panicum cultratum* i. q. *Pan. monostachyum* Hb. et Kth.
- XIV. — 165. *Panicum scopulifserum* est *Pan. serratum* Br.
- XIV. — 168. *Panicum truncatum* i. q. *Pan. paspaloides* Pers.
- XV. — 171. *Panicum ctenodes* ad *Pan. stoloniferum* Poir.
- XV. — 172. *Panicum distans* i. q. *Pan. granulare* Lam.
- XVI. — 183. Deleatur synon: *Urochloa panicoides*.
- XVI. — 187. et sqq. De *Pan. composito* ejusque affiniibus conf. Act. Petrop. Ann. 1834. Tom. III. p. 211. sqq.
- XVII. — 194. *Panicum exaratum* ad *Pan. pappophorum* N. ab Es.
- XVIII. — 215. *Panicum tenuiculme* i. q. *Pan. laxum* Sw.
- XIX. — 217. *Panicum almadense* inscribendum *Pan. Martianum* N. ab Es.
- XIX. — 218. Est *Panicum paludicola* N. ab Es.
- XX. — 240. *Panicum stenocladium* i. q. *Pan. subulatum* Sprgl.
- XXI. — 241. est species genuina: *Panicum chnoodes* Tr.
- XXII. — 253 ad 260. *Airae* in his tabb. depictae omnes *Deschampsiae* spp. sunt. — In tab. 255. loco *Airae flexuosa* bottnicae ponatur *Desch. caespitosa* bottnica. — Tab. 257. *Aira danthonioides* est *Deschampsia calycina* Presl.
- XXII. — 262. *Panicum caucasicum* i. q. *Pan. eruciforme* Sibth.
- XXIII. — 272. *Paspalum pruinosa* i. q. *Pasp. coryphaeum* Tr. Diss. de Panic. p. 114.
- XXIV. — 284. *Paspalum cujabense* est *Pasp. stellatum* Hb. et Kth.
- XXV. — 289. *Briza barbata* ad genus Calothecae.
- XXVI. — 313. Fig. 7. non valvula superiore, sed squamarum lodicularium alteram sistit; nam in *Aristidis* Lod. sqq. 2, 3 — 5-nerves; Valvula superior autem enervis 1. tenuissime binervis.
- XXVII. — 324. *Panicum secundum* est varietas *Panici latissimi* Mik.
- XXVIII. — 335. *Panicum Leandri* i. q. *Pan. plantagineum* Lk.





Alopecurus aespitum.

A L O P E C U R U S C A E S P I T O S U S.

Dcf. (*Pusillus*). *Thyrso cylindraceo-oblongo;* *Glumis ad basin usque fissis, acutiusculis, glabriusculis, pectinatis;* *Valvula truncato-obtusa;* *Stylis inferne connatis.*

RADIX fibrae tenuissimae, dense fasciculatae, breves, simplices.

CULMI caespitis densissimi plurimi, erecti, sesqui — bi - pollicares, tenuissimi, compressiusculi, striati, glabri, simplices vel basin versus subramosi, ad nodos 1 — 2 — 3 glabros aequi vel geniculati, iuxtra thyrum nudi.

VAGINAE totae fissae, laxae, internodio breviores, lamina pl. min. longiores, striatae, glabrae, cum foliis virides: radicales emarginatae, in fibras solutae. **LIGULA** membranacea, oblonga, obtusa vel subdenticulata, exserta, lineam dimidiam excedens.

FOLIA erecta, linearia, acuta, plana, inferiora siccitate involuta, angustissima (latiora vix lineae quadranteū lata), striata, glabra, culmos caespitis breviores aequantia.

THYRSUS oblongo-cylindraceus, acutiusculus, laxiusculus, lineas 3 — 5 longus, pallens, plerumque simplex.

AXIS tenuissimus, vix flexuosulus, glaber, sparsim neque vero dense emitens **PEDICELLOS:** inferiores subinde subcompositos, superiores simplices, brevissimos, glabros, apice subclaviformes.

LOCUSTAE linearī-oblongae, compressae, lineam longae, laxiuscule imbricatae.

GLUMAE ad imam basin usque liberae, aequales vel superior non-nihil longior, perianthium subaequantes, compressae, apice oblique truncatae et acutiusculae, vel, e carina, mucronulo pusillo terminatae, trinerves: nervis lateralibus margini proxim-

mis, non percurrentibus, inferne brevissime et laxe pilosulis; dorsali carinali, sensim magis magisque (neque vero nimis) pectinato-piloso.

PERIANTHIIUM univalve, linearis-urceolatum, obtusissimum, sere ad medium usque inferne connatum, glumas aequans vel superiori parum brevius, glabrum, 5-nerve: nervo dorsali pl. min. infra medium avulso et setam formante glumas plerumque paulo excedentem, inferne tenuiorem et laevem, superne paulo incrassatam, scabram.

LODICULA nulla.


OVARIUM compressum, hinc convexius. STYLI 2, inferne connati.

STIGMATA simplicissima, exserta, alba, tenuissime pubescentia.

STAMEN 1? (a latere plano ovarii positum). Filamentum tenerimum, exsertum. ANTHERA lineari-oblonga, flavescens.

FIGURA AD SPECIMEN BOREALI-AMERICANUM.

1) Locusta. 2) Perianthium cum exsertis stigmatibus stamineque. 3) Semen immaturum.



Lachnagrostis Chamissonis

RADIX e caespitis basi fibrae fasciculatae, innumerae, tenuissimae, ramulosae.

CULMI cum foliorum fasciculis in caespitem densissimum collecti, subdivergendo - erecti, cum panicula 3 — 5 - pollicares, ad nodos (3 — 4, intra vaginas absconditos) aequi, pertenues, teretiuseculi, striati, sere ad paniculam usque vaginati.

VACINAE totae fissae, arctiusculae, inferiores lamina breviores, superiores eadem longiores, nodos excedentes, glabrae, striatae. LIGULA membranacea, lineam longa, exserta, obtusiuscula, lacera s. in lacinias plures fissa.

FOLIA erecta, in caespite plurima et confertissima, linearia, attenuato - acuta, plana, angusta (lineam dimidiata lata), striata, glabra, siccii graniinis purpurascendo - fuscescentia, inferiora et fasciculorum paniculam fere aequantia, paniculis elatioribus saltem non multum breviora.

PANICULA erecta, lineari - oblonga, pollicem vel cum dimidio longa, contractiuscula et densiuscula, e viridi albo - flavescens.

AXIS tenuissimus, subangulatus, striatus, glaber, flexuosulus, per intervalla brevia emittens *radios* plerumque binos, ipsi simillimos, compositos, alias fere a basi alias superius floriferis. PEDICELLI glabri, apice paulo incrassati.

SPICULAE erectae, lato - hiantes, lineam cum dimidia vel lineas duas longae.

GLUMAE lineari - lanceolatae, angustae, acuminatae, herbaceo - membranaceae, subcarinato - compressiusculae, ad carinam denticulatae: denticulis superne pluribus; subaequales, sesquiflorae, perianthio duplo longiores

PERIANTHIIUM lineari - oblongum, membranaceum, callo insidens
pusillo antrorsum processum piliferum brevissimum emitenti;
valvula inferior basi pilis cineta ipsaque tota pilosa, tenuissime
5-nervis: nervis 4 lateralibus superne in aciculas productis his-
pidulas, medio supra medium avulso, valvulam in lacinias
duas dividente, elongato et setam formante glumas aquantem,
hispida, aequam, rectam. *Valvula superior* paulo brevior,
multo angustior, lanceolata, hyalina, glabra, nervis duobus
nunc dissitis nec nisi superne manifestis, nunc quasi in unicum,
medium, confluentibus notata.

LODICULAE squamae lanceolatae, ovarii longitudine.

OVARIUM subturbinatum, glabrum. STYLI 2, breves. STIGMATA
rainosula, alba.

STAMINA 5. ANTHERAE lineares, bicuspidatae, flavae.

FIGURA AD SPECIMEN EX INSULA PASCHATIS.

- 1) Spicula. 2) Callus processiferus perianthii. 3) Perianthium fere a fronte.
4) Ejusdem valvula superior. 5) Lodicula. 6) Genitalia.
-



Lachnagrostis Gussonei

L A C H N A G R O S T I S G U S S O N I S.

AGROSTIS NITENS Guss. pr. fl. sic. I. p. 59.

:

RADIX fibrae pl. min. dense fasciculatae, flexuosa, simpliciusculae, albidae.

CULMI decumbentes vel procumbendo-obliqui, 4 — 5 - pollicares, tenues, teretes, laevissimi, ad nodos (3 — 4 glabros et spadicescentes) pl. min. geniculati, inferne subadpresso- et florifero-ramosi: ramis plerumque brevibus; infra thyrsus tandem pl. min. longe nudi.

VAGINAE totae fissae, demum internodio paulo breviores, striatae, glabrae, laxae, culmeae et praesertim superiores medio tuuentes: radicales lamina breviores, mediae eandem subaequantes, supremae ipsa longiores. LIGULA membranacea, bifida, exserta, satis longa, culmum amplectens, decurrentia, marginibus saepissime subfimbriata.

FOLIA patula, sublanceolato-linearia, acuta, rigidula, striata, dorso nervo medio notata, glabra vel superne asperiuscula, adultiora plana, lineam dimidiad et quod excedit lata, culnea et juniora compressa vel compresso-involuta, stricta et subpungentia, sensim minora: pollicaria, semipollicaria et breviora; cum reliquis partibus pallide viridia.

THYRSUS panicularis, cylindraceo-oblongus, pollicaris et brevior, densissimus, nitidulus.

AXIS COMMUNIS tenuis, teres, glaber, subarticulatus (sed continuus), ad articulos, non longe et per intervalla satis regularia ab invicem distantes, alternatim emittens radiolos semiverticillatos, erectos, pl. min. appressos, compositos, per breve. PEDICELLI superne clavati, ibidemque glabri.

SPICULAE primum sublineares, dein apertae et paulo hiantes, bilineales, erectae, imbricatae.

GLUMAE chartaceae, lineares vel lanceolato-lineares, acutae, compressae, praeter nervum carinalem denticulato-hispidum enerves et glabrae, perianthio triplo longiores: inferior paulo longior.

PERIANTHIIUM lineari-oblongum, insidens callulo pusillo antrorsum processum tenuem et pilosum emittenti, membranaceum, bivalve: *valvula inferior* obtusa, inferne pilis albis stipata et praeterea pilis pl. min. adspersa s. villosula, obsolete 5-nervis: nervo medio abbreviato, ejusque loco arista longe plerumque supra medium exserta, inferne crassiuscula, torta et spadicea, infra medium geniculata, dein aequa, glumis paulo breviori; nervi laterales aristae propinquai exeuntes in setas rectas, aristae medium aequantes. *Valvula superior* angustior, aequilonga, glabra, dissite binervis: nervis, tautum non semper, in aciculam brevem productis.

LODICULA


OVARIUM oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA**

STAMINA 5. **ANTHERAE** lineari-oblongae.

SEMEN cylindraceo-oblongum, spadiceum, perianthii valvulis adnatum.

FIGURA AD SPECIMEN SICULUM.

1) Spicula, a latere. 2) Perianthium a latere, basi antriorum emittens processum. 3) Perianthii valvula inferior, expansa. 4) Valvula superior cum genitalibus.



Panicum effusum.

RADIX e basi culmorum nodulosa fibrae crassiusculae, subsimplices, flexuosae.

CULMUS geniculato - erectus, pl. min. bipedalis, simplex, teres, striatus, sursum asperiusculus, trinodis: nodo inferiori geniculato et pl. min. patenti - barbato, reliquis aut nudis aut obsolete barbatis, aequis; ad paniculam usque vaginatus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodio laminaque breviores, striatae: radicales saepe basin versus pilosae; culmeae praesertim superne glandulis pusillis obsitae et hirtae, suprema tamen glabra, paniculae basin obvolvens. LIGULA series pilorum brevium.

FOLIA erecta et patula, linearia, plana, acuminata, lineas 2 lata, firmula, striata et nervo dorsali medio percurrente notata, utrinque hirta et scabra, pilis dorsalibus e glandulis pusillis provenientibus, spithamea aut longiora, supremum paulo brevius.

PANICULA dimidiata culmi partem efficiens, pedalis et ultra, erecta, strictiuscula, patula (et forsan patens), basi intra vaginam supremam ita coarctata ut radii infimi abortiant.

AXIS COMMUNIS tenuis, sulcato - angulatus, inferne pallidus, glabriusculus et aequus, superne coloratus, scaber et flexuosus, 10 — 12 - parus. RADII terni, bini, solitarii, subverticillati, angulati, scabri, compositi: inferiores elongati, aequi, erecti, pallidi, fere a basi ramosi; superiores patentiores, tenuiores, flexuosi, fuscescendo - purpurascentes, superne ramosi et, sicut inferiores, superne laxe et rariuscule floriferi: ramulis tenuibus, flexuosulis. PEDICELLI valde scabri.

SPICULAE ovales, acutae, dein apertae, fere lineam longae, e purpureo - fusco pallideque viridi variae.

GLUMA *inferior* cordata, basi obvolvens, acutiuscula, flosculis dimidio aut sere dimidio brevior, compresso-carinata, ad carinam hispidula, praeter carinam plerumque etiam utrinque nervo non percurrente notata; *superior* flosculis sere paulo longior, oblonga, acuta, 7-nervis: nervis superne distinctioribus: medio in extremo apice dorso denticulato.

FLOSCULI subparallelis: *inferior* herbaceo-membranaceus, neuter, bivalvis: valvula exterior glumae superiori similis, sed eadem plerumque subbrevior, glabra; valvula interior tenerior, dimidio brevior, dissitissime binervis, conduplicata. *Flosculus superior* coriaceus, hermaphroditus, ovalis, obtusus, glaberimus, pallens, neutro paulo minor: valvula superior aequilonga, conduplicata.

LODICULAE squamae collaterales, quadratae.

OVARIUM oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosa, atropurpurea.

STAMINA 5. **ANTHERAE** lineares, atropurpleac.

FIGURA AD SPECIMEN E NOVA HOLLANDIA.

- 1) Spicula. 2) Glumae inferioris pars superior. 3) Gluma superior.
4) Flosculi neutrius valvula inferior. 5) Ejusdem valvula superior. 6) Hermaphroditus. 7) Ejusdem valvula superior cum lodicula. 8) Genitalia.
-



Panicum lasianthum.

P A N I C U M L A S I A N T H U M .

Def. 2 — 3-pedale. Juba (spithamea — dodrantali) patente, lucidissima, pauciflora, (radiis racemiformibus); Spiculis linealibus, obovato-oblongis, obtusiusculis, hirtis: pedicellis scabris; Gluma inferiore flosculis duplo breviori, 1-, superiore iisdem paulo minori, 3-nervi; Hermaphrodito oblongo, acuto, tenerime ruguloso, neutrum aequante.

Panico ruguloso (*Tr. Diss. II. p. 195. Icon. gram. XX. 238.*) habitu adeo simile, ut primo intuitu vix varietatem crederes. Quodsi enim gluma inferior, in *ruguloso* aperte major, in *lasiantho* flosculis non dimidio tantum brevior, nervoque unico, superior autem nervis non nisi tribus (quorum quinque in illo) praedita esset; nec sane foliorum, ejusdem ac in illo formae, quamvis paulo minorum, glabrities, nec spicularum hirsuties mihi sufficerent, quibus hoc nostrum a *ruguloso* specie distinguerem. Culmus prostratus pluribus gaudet nodis. Vaginae pubescentes. Folia glabra, scabriuscula. Suprema culmi pars longe, ac saepe praelonge, infra jubam nuda. Radii, ut in illo, basi pubescentes. Glumae flosculique inferioris valvula inferior (trinervis) quasi scrobiculis pilisque brevissimis patentibus consitae, obtusae. Hermaphroditus demum fuscus. Reliqua figura docet.

F I G U R A A D S P E C I M E N B R A S I L I A N U M .

1) Spicula a latere. 2) Gluma inferior, ut 3) superior, ab interiori. 4) Flosculus neueri bivalvis. 5) Hermaphroditus. 6) Ejusdem valvula superior cum lodicula et stigmatibus.

346



Panicum torreum.

P A N I C U M L O R E U M *Tr. Diss. II. p. 211. **

RADIX e culmi basi fibrae aliquot sparsae, satis validae, flexuosa, simpliciusculae, pallidae.

CULMUS erectus, stricto - gracilis, ultra - bi — quadripedalis, teres, striatus, glaber, simplex, ad nodos (praeter baseos plurimos, 3, brevissimos, nudos l. obsolete pubescentes) aequus, superne pertenuis et infra paniculam nudus.

VAGINAE totae fissa, arctiusculae, internodio laminaque (multo) breviores, teretes vel superne subcarinatae, striatae, glabrae et nitidae: radicales squamaeformes, imbricatae, plerumque pilis albis villosae, pallidae vel fuscescentes; culmeae inferiores plures confertae invicemque sese includentes, margine (in planta minori) villis adspersae, cum laminis aut obscure glauco - virides, aut fuscescendo - purpurascens. LIGULA in gramine majori et tenaciore nulla, ne exsertionis suae locum quidem insigniens, ita, ut vagina cum lamina absque callo geniculari continua sit; in minoribus et angustifoliis contra distinctissima, lineam sistens transversam, fuscum, pilis brevibus coronatam.

FOLIA erecta, stricta et pl. min. pungentia, coriacea, tenacissima, linearia, acuminata, striata, glabra, in majori planta concavo-complanata et lineas circiter duas lata, in minori involuta, compressa, angustiora et basin versus margine villis adspersa, inferiora pro altitudine culmi spithamea — pedalia, culmea superiora multo minora, supremum brevissimum.

PANICULA erecta, oblongo - ovata, lucida, pl. min. fusca, spithamea — dodrantalis.

AXIS COMMUNIS pertenuis, teres, superne angulatus, striatus, glaber vel ad radiorum basin villis aliquot praelongis adspersus,

*) Nimiam pungentis esse affinitatem, ex ejusdem descriptione (no. 248.) patebit. Formas nuper intermedias vidi e Brasilia a cel. Langsdorff denuo missas.

aequus vel pl. min. flexuosulus, circiter 12-parus. *Radii* bini — quaterni, semiverticillati (intercurrentibus haud raro solitariis, sparsis), erecto-patuli, pertenues, glabri, pl. min. longe infra medium ramulosi, non nimis decompositi, nunc flexuoso-incomiti, nunc recti et flexuosuli tantum: ramulis capillaribus. *PEDICELLI* glabri, apice claviformes.

SPICULAE, duin clausae sunt, ellipticae, apertae oblongo-subrotundae, obtusae, glabrae, plerumque lineam longae, purpurascendo-fuscae.

GLUMAE ovatae, subnavicularis, acutiusculae vel obtusae, ad carinam pl. min. obsolete hispidulae: *inferior* flosculis duplo brevior, 1—3-nervis, *superior* 3—5-nervis, flosculos aequans.

FLOSCULI subparallelis: *inferior* neuter, bivalvis: valvula exterior glumae superiori siimillima, interior subaequilonga, dissitissime binervis, conduplicata; *superior* cartilagineo-coriaceus, hermaphroditus, ovato-ellipticus, acutus cum mucrone subaduco, glaberrimus, albens vel stramineus: valvula superior aequilonga, obtusa, margine conduplicata.

LODICULAE squamae collaterales, quadratae, emarginatae.

OVARIUM linearis-oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosa.

STAMINA (filamenta) 3. **ANTHERAE**

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIENSE.

- 1) Spicula. 2) Flosculi neutrius valvula superior. 3) Hermaphroditus.
 - 4) Ejusdem valvula superior. 5) Genitalia (absque antheris).
-



Panicum chneodes


P A N I C I L O R E I V A R I E T A S L A N A T A.

PANICUM CHNOODES *Tr. Diss. II.* p. 211.

E *P. lorei* descriptione didicimus, specimina hujus graminis minora vaginas inferiores villosas, culmeas axinque ad radiorum exertioneum villis (longis) adspersos habere; qui tandem villi in varietate, quam eam ob rem *chnoodem* dixeram, sesquipedali tantum et rigida quidem, sed minus coriacea, in vaginis radicalibus nulli, per culmeas vaginas, folia, ipsamque culmi partem superiorem ad paniculae axin usqne ita adscendunt, ut dictas graminis partes inferiores lana densiuscula et mollissima, quasi refracta, saltem patente, superiores s. culmum cum axi pilis magis sparsis longisque induant. Folia in hac var. nunc concava s. marginibus involuta, nunc explanata; ob totius graminis staturam humiliorem breviora. Ligula, ut in *loreo*, modo nulla, modo manifesta. Panicula paulo brevior, ipsis radiolis subinde villo uno alterove adspersis. Spicularum structura, forma, color et magnitudo, plane ut in *loreo*.

F I G U R A A D S P E C I M E N B R A S I L I E N S E.

1) Spicula. 2) Flosculi nentrius valvula superior a fronte. 3) Hermaphroditus. 4) Ejusdem valvula superior cum lodicula.



Panicum spungens

P A N I C U M P U N G E N S *Tr. Diss. II.* p. 210.

RADIX e rhizomate crasso, noduloso, saepe obliquo, fibrae plures validae, flexuosaes, ramulosae, pl. min. longae, pallidae.

CULMUS stricto-erectus, sesqui-pedalis, inferne pennae cygneae crassitudine, basin versus plurinodis et vaginis pl. min. numerosis obtectus, ubi vero e his prodiit, bi — tri-nodis, ad nodos, aut glabros aut pubis annulo circumdatos, aequus, nunc teres nunc sulcato-subangulatus, striatus, glaber, superne tenuis et gracilis, infra paniculam non longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxae, imo hiantes, in aliis striatae, in aliis sulcatae, radicales et culmeae infimae imbricatae, basi fulvo-hirsutae, reliquam partem aut glabrae, aut marginem versus pilosulae, aut, praesertim in humilioribus, totae pilis molliusculis albidis tectae. LIGULAE, quae desideratur, locus, in proceriori planta, non nisi pilis indicatur, qui interiorem laminae paginam, inferius s. in parte vaginali undam, aliquanto obvestiunt, in minori gramine autem plane nullis.

FOLIA divergentia et saepe squarroso-subrecurva, linearia, aut (concavo-) plana et tum lineas 2 — 4 lata, aut compressa et marginibus scabris involuta, coriacea et dura, pungentia, glabra, pl. min. glauca: radicalia dodrantalia et longiora, culmea pl. min. breviora, supremum breve imo nonnumquam pusillum.

PANICULA erecta, palmaris, parum patula, e flavescendo viridis.

AXIS COMMUNIS tenuis, sulcato-angulatus, glaber, subflexuosulus.

Radii alii (praesertim internodii axeos secundi) plures l. plurimi verticillati, alii solitarii binive, axi communi similes sed tenuiores et scabriusculi, basi saepe pilis longiusculis stipati, circiter a medio decompositi: ramulis subadpresso-erectis, flexuosulis.

PEDICELLI glabri, superne paulo incrassati.

SPICULAE oblongae, demum apertae, obtusiusculae, glabrae, linea longae.

GLUMA inferior oblongo-ovata, acuta, flosculis fere dimidio brevior (interdum tertiam tantum partem), trinervis, ad carinam scabra; superior latior, 5-nervis, flosculos aequans, obtusior.

FLOSCULI subparalleli: inferior masculus, bivalvis: valvula exterior glumae superiori similiuna, 5—7-nervis, interior parvum brevior, tenerior, acuta, dissitissime binervis. Flosculus superior hermaphroditus, coriaceus, ellipticus, obtusiusculus, opacus, striatus, pallidus, masculo paulo minor: valvula superior aequilonga, marginibus conduplicata.


LODICULAE squamae collaterales, quadratae, subemarginatae.

OVARIUM oblongum. STYLI 2. STIGMATA violacea.

STAMINA 5. ANTHERAE lineares, violaceae.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Spicula a latere. 2) Flosculi masculi valvula superior cum antheris.
3) Hermaphroditus a latere, florens. 4) Idem a tergo. 5) Ejusdem valvula superior, cum lodicula.
-



Potamophila parviflora.

POTAMOPHILA PARVIFLORA Br. *Tr. Diss. J.* p. 160.

RADICEM non vidi.

CULMUS (subramosns, 3—5 - pedalis, *Br.*) abscissus cum juha fere tripedalis, erectus, fistulosus, compressiusculus, glaberimus, ad nodos (3, glabros) aequas vel vix geniculatus, totus vaginatus.

VAGINAE totae fissae, internodio longiores, lamina breviores, subcompressae, glabrae, striatae, ut totum gramen glaucae. LIGULA membranacea, lineas tres longa, inclusa, acuta, fissa.

FOLIA stricto - erecta, linearia, acuminata, e basi compressa plana, lineas 2—3 lata, satis firma, striata, nervo crasso non prorsus percurrente medio notata, dorso retrorsum aspera, margine (siccitate) involuta, sesquipedalia, sensim parum minora.

JUBA panicularis erecta, subnutans, virgato - contracta, sesquipedalis.

AXIS pl. min. compressus et subangulatus, aequus, glaber, sulco exaratus, per distantias inferne longas (ultrapalmares) superne breviores emittens radios, basi tomento stipatos, subadpresso-erectos, plerumque aliquot fasciculatos, a basi ramosos. Radioli plurimi, varie flexuosi, villis adspersi. PEDICELLI superne incrassati, apice excavati et utrinque mucronulati, cum locustis articulati, ibique plerumque villo brevissimo muniti.

LOCUSTAE erectae, linear - lanceolatae, pl. min. acutae, lineas duas longae, deciduae, pallide glaucescentes, glabrae: radiorum inferiorum staminibus abortivis.

GLUMAE pusillae, tenui - membranaceae, enerves, oblongae, apice excisae: inferior duplo brevior et angustior.

PERIANTHUM membranaceum, stipiti impositum callum mentienti, glabrum, bivalve: *valvula inferior* oblonga, acutiuscula, 5 - nervis; *superior* paulo longior et angustior, acuta, 3 - nervis.

LODICUL'AE squamae 2, lanceolatae, acutae.

OVARIUM oblongum, glabrum. STYLI 2. STIGMATA plumosa.

STAMINA 6. FILAMENTA demum elongata, locustarum paniculae inferiorum linearis-lanceolatae, absque antheris; superiorum ANTHERAЕ lineares.

SEMEN oblongum, compressiusculum, liberum.

FIGURA AD SPECIMEN E NOVA HOLLANDIA.

- 1) Radiolus, locustis delapsis. 2) Locusta. 3) Ejusdem basis. 4) Glumae.
5) Valvula perianthii inferior. 6) Superior. 7) Lodiculae squamae. 8) Genitalia.
9) Eadem locustarum inferiorum antheris abortientibus. 10) Semen.
-



Vilfa rigens

V I L F A R I G E N S.

Def. Juba subthyrsode, elongata, angustata: radiis subcompositis; Glumis acutiusculis: inferiore perianthio paulo ($\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$) breviori, superiore idem aequante.

RADIX: culmi basis multinodis in arenam perpendiculariter descendens teres, ad nodos aliquot fibras emittens horizontales, simplices.

CULMUS erectus, circiter tripedalis, teres, laevissimus, aequus et strictus, vaginis circumcirca arcte inclusus ita, ut nodi penitus occultentur, simplex, infra thyrsum nudus, cum reliquis partibus e flavo-viridi albens.

VAGINAE totae fissac, arctae et teretes, obsolete striatae, internodiis longiores, lamina breviores: radicales in fibras tenaces solatae, culmi inferiores plures, imbricatae et liantes. LIGULAE loco tomentum villorum brevium molle.

FOLIA ercta, angusta, semiteretia vel potius dorso convexa et fronte sulco exarata, tenuissima et coriacca, glabra, sub lente striatula: radicalia siccitate incurva et saepe fuscescentia; superiora tenuiora, strictissima, subpungentia, thyrsi non multum breviora; pl. min. bipedalia, sensim paulo minora.

THYRSUS erectus, pedalis, cylindraceo-contractus et perangustus, inferne interruptus, albido-splendens, compositus.

AXIS COMMUNIS inferne teres, aequus et glaber, superne angulatus, flexuosulus et subpubescens, e parte inferiore emittens radios appressos solitarios, distantes, longiores, e superiori confertos consertissimosque, breviores et brevissimos: illos praesertim compositos e radiolis, quorum axis tenuissimus, flexuosulus, brevi-pilosulus. PEDICELLI teretusculi, hispiduli.

LOCUSTAE, dum clausae sunt, linearis - oblongae, acutiusculae, glabrae, circiter bilineales.

GLUMAE chartaceae, acutae, imo quandoque in mucronulum abundantes, glabrae, linearis - oblongae, nervo medio inferne depresso apiceque praeterea utrinque nervis aliquot lateralibus, pl. min. obsoletis, deorsum mox abbreviatis notatae: inferior superiore, perianthium aquante, quartam, et quod excedit, partem brevior.

PERIANTHIIUM ejusdem consistentiae, formae et coloris, basi in torulum contractum callum inentientem: valvula inferior glumae superiori simillima; superior aequilonga, dorso medio longitudinaliter sulco exarata, basi lobulo squamulaeformi munita, obsolete binervis.

LODICULAE squamae collaterales, linearis - oblongae, obtusae, hinc emarginatae, ovario paulo breviores.

OVARIIUM linearis - oblongum, glabrum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosa, pallida.

STAMINA 5. **ANTHERAE** lineares, lutescentes.

FIGURA AD SPECIMEN CHILENSE.

1) Locusta. 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior. 4) Perianthium ab interiori, obversa valvula superiori. 5) Valvula inferior. 6) Genitalia cum lodicula.



Vulpia secalina.

V I L F A S E R O T I N A.

AGROSTIS SEROTINA NUTT. ms.

Def. Panicula patula, oblongo-lineari (pauciflora); Glumis paulo inaequalibus, perianthio duplo brevioribus; (Foliis angustissimis, compressis).

RADIX fasciculus fibrarum aliquot brevium, tenuissimarum, simplicium.

CULMUS erectus, cum panicula pl. min. pedalis, tenuissimus et subsiliformis, compressiusculus, glaber, ad nodos (quorum tres, brevissimi et glabri) inferiores paulo geniculatus, ad superiorem aequus, simplex, infra paniculam non longe nudus.

VAGINAE usque ad basin fissae, plerumque solatae, inferiores internodio longiores et lamina breviores, carinatae, striatae, glabrae. LIGULA membranacea, acuta, brevis.

FOLIA patula, angustissima, lincaria, acuta, compressa, striata, glabra, pl. min. palmaria, pallide viridia.

PANICULA culmi duas tertias partes efficiens, erecta, linearis-patula, lucidissima, atropurpurascens, tenerissima.

AXIS aequus, teretiusculus, pertenuis, scabriusculus, pallens, per intervalla inferne majora (bi — sesqui — pollicaria) superne sensim breviora exserens radios solitarios, rectos, patulos, tenuissimos, scabros, fere a basi decompositos, interstitiis longiores: radiolis capillaribus, PEDICELLIS locusta plerumque multo longioribus, glabris, superne incrassatis.

LOCUSTAE erectae, lincari-lanceolatae, obtusiusculae, minimae (vix lineam dimidię longae), glabrae, atropurpureae vel e viridi variae: radiorum inferiorum pusillae, abortivae?

GLUMAE chartaceae, enerves, oblongo-lanceolatae, acutiusculae, perianthio (in spiculis superioribus perfectis) dimidio breviores: inferiore paulo breviori.

PERIANTHIIUM lineare, obtusiusculum, torulo insidens brevissimo calliformi (rarissime processum exscrenti floriferum ideoque spiculam bifloram sistenti), glabrum: valvulis aequalibus: inferiore chartacea, subnervi, superiore dissite binervi.

LODICULA

STAMINA 5. ANTHERAE oblongae, acutae.

OVARIUM oblongum. STYLI 2. STIGMATA plumosa.

FIGURA AD SPECIMEN BOREALI-AMERICANUM.

1) Locusta a latere. 2) Perianthium. 3) Ejusdem valvula superior. 4) Genitalia (juniora). 5) Spiculae biflorae flosculi.



V I L F A V I L L O S A REICHENB. MS. *)

AGROSTIS VILLOSA, *Suppl. in S. V. L. ed. XVI. p. 5.*

RADIX fibrae plurimae, pertenues, flexuosa, ramulosae, albidae, fasciculatae.

CULMUS obliquus? pl. min. pedalis, teres, superne compressiusculus, tenuissime striatus, glaberrimus, plurinodis, ad nodos breves et glabros pl. min. geniculato-flexuosus, basi foliifero-subramosus, infra thyrum parum nudus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodia pl. min. aequantes, striatae et ob costas aliquot prominentiores quasi angulatae, quo inferiores eo magis ad fissuram ciliatae: radicales confertae, imbricatae, brevissimae, culmeae mediae laminae circiter longitudine, supremae magis magisque elongatae et lamina longiores. LIGULA obsoleta, loco ejusdem pili aliquot.

FOLIA patula, linear-lanceolata, acuminata, e basi amplectente plana, strictiuscula, striata, nervo medio vix distinctiori, utrinque e glandulis pusillis laxe pilosa margineque inaequilater patent - ciliata: radicalia plurima, confertissima; culmea sursum sensim distantiora et minora: inferiora lineas 3 - 2 - lata, sesqui - uni - pollicaria; suprema perangusta, glabra, semipollicaria; terminale pusillum.

THYRSUS erectus, angustus, inferne paulo amplior, palmaris, (graminis seminiferi) contractus, densiusculus, fuscescens.

AXIS communis subaequus, angulatus, glaber, sparsim emittens radiolos adpresso-erectos, breves, pertenues, compositos, solitarios vel, praesertim superiores, pl. min. confertos et subverticillatos. PEDICELLI glabri, sub locusta vix paulo incrassati.

*) Valde affinis *Vilfae piliferae*, ic. gram. V. 58. Fig. B.

LOCUSTAE lineari-oblongae, acutiusculae, minimae, vix lineam dimidiad longae, glaberrimae et subnitidae.

GLUMAE chartaceae, enerves, sub lente striatulae, acutiusculae, lineari-oblongae: inferior perianthio dimidio brevior; superior perianthium aequans.

PERIANTHIIUM basi absque callo, chartaceum, bivalve: valvis enervibus, striatulis, acutis, aequalibus.

LODICULAE squannas oppositas jam, ut tandem esse solent, elongatas tantum vidi, semen includentes, tenerrimas, oblongas, obtusiusculas, perianthium subaequantes.

OVARIUM . . . STYLI 2. STIGMATA . . .

STAMINA 5? ANTHERAE oblongae.

SEmen magnum, oblongum, compressiusculum, e rufescente fuscum

FIGURA AD SPECIMEN SURINAMENSE.

- 1) Locusta (seminifera). 2) Glumae, magis auctae. 3) Perianthium.
4) Semen lodicula elongata inclusum (quale aquae immersum sese praebet) cum adhaerente stamine.
-

SPECIES FASCICULI VIGESIMI PRIMI.

- 241. *Alopecurus caespitosus Tr.*
 - 242. *Lachnagrostis Chamissonis Tr.*
 - 243. *Lachnagrostis Gussonis Tr.*
 - 244. *Panicum effusum Br.*
 - 245. *Panicum lasianthum Tr.*
 - 246. *Panicum loreum Tr.*
 - 247. *Panici lorci var. chnoodes.*
 - 248. *Panicum pungens Tr.*
 - 249. *Potamophila parviflora Br.*
 - 250. *Vilfa rigens Tr.*
 - 251. *Vilfa serotina Tr.*
 - 252. *Vilfa villosa Reichenb.*
-

Adiecta est tabula nova *Phlei echinati*, loco Tab. 7. Fasc. 1.

S P E C I E S
G R A M I N U M

I C O N I B U S E T D E S C R I P T I O N I B U S I L L U S T R A V I T


D. C. B. *Trinius*,
ACAD. SC. PETROP. SODALIS.

F A S C. XXII.

P E T R O P O L I .
I M P E N S I S A C A D E M I A E I M P E R I A L I S S C I E N T I A R U M .

A c a d e m i a e j u s s u.

P. H. Fuss.



Agrostis capillaris.

A I R A C A E S P I T O S A L.

DESCHAMPSIA CAESPITOSA PAL. R. et S. II. p. 685.

RADIX e caespitis basi fibrae plurimae, dense fasciculatae, flexuosa, ramulosae.

CULMUS erectus, nunc (ut in regionibus borealibus nonnumquam) digitalis, nunc 2 — 4-pedalis, satis tenuis, teres, striatus, glaber, ad nodos (supra folia radicalia 1 — 2, glabros) aequus vel laevissime geniculatus, simplex, sub panicula tandem prae-longe nudus.

VAGINAE usque ad basin fissae, inferne arctae superne laxiusculae, internodio plerumque longe breviores, lamina multo longiores, striatae, glabrae. LIGULA membranacea, exserta, 2 — 3-linealis, acuta vel acuminata, decurrentis, saepe bifida.

FOLIA patula, linearia, lineam unam vel cum dimidia lata, acuta, plana vel, ubi breviora et rigidiora sunt, pl. min. margine involuta, imo, in pumila planta, subsetacea, firmula et haud raro rigidula, deorsum pl. min. scabra: inferiora nunc prae-longa, nunc abbreviata; culmea illis minora.

PANICULA erecta vel apice pl. min. nutans, pro graminis magnitudine nunc ampla et magna (interdum pedalis), nunc parva et contractiuscula (in speciminiibus borealibus nonnumquam pollicaris, pauciflora).

AXIS pertenuis, teres, striatus, vix flexuosulus, deorsum scaberimus, in majoribus 8 — 12 parus. Radii semiverticillati, patuli vel patentes, subcapillares, scabri, i. laeviusculi, nunc a medio, nunc fere a basi ramosi et floriferi: inferiores 2 — 5 — 10, superiores sensim pauciores, supremi solitarii. Radioli breviusculi, plures fasciculati vel solitarii. PEDICELLI glabri, apice paulo incrassati.

SPICULAE, duin apertae sunt, conicae, sesqui — 2 - vel, (praesertim in speciminibus ex Ins. Unalashka) ultra - 3 - lineales, nunc e spadiceo, viridi, purpureo et albo variae, nunc e viridi alben-tes, nunc totae spadicescentes, nunc e spadiceo suscescentes, bi - rarius 3 — 4 - florae.

GLUMAE subaequales vel inferior parum minor, flosculos subequan-tes, linearis - oblongae, acutae vel acutiusculae, ad nervum viridem seabriuseulæ, membranaceæ: inferior angustior 1 -, superior paulo latior 3 - nervis: nervis lateralibus abbreviatis.

RHACHEOS articulus infimus brevissimus, nudus; secundus et, si adest, tertius villis albis ipso longioribus vestitus.

FLOSCULI 2, 3, 4, callo parvo, apice circumcirca sed praesertim antrorsum pilifero incidentes: *Valvula inferior* membranacea, linearis - oblonga, dorso convexa, apice erosio - et inaequaliter denticulata, 5 - nervis: nervis non percurrentibus: medio fortiori longe infra valvulae medium (supra basin) avulso in setam hispidam, rectam, valvula nunc paulo breviorem, nunc ean-dem pl. min. excedentem. *Valvula superior* subaequilonga, hyalino - membranacea, bisido - dentata, dissite binervis, ad nervos hispidula. Loco flosculi tertii vel quarti rudimentum styliforme, antrorsum pilosum.

LODICULAE squamae 2, ovatae, acutissimae, nudae.

OVARIUM obovatum. STYLI 2. STIGMATA a basi stylorum plu-moso - ramosa, alba.

STAMINA 5. ANTHERAES lineares.

FIGURA AD SPECIMEN PETROPOLITANUM.

1) Spicula a latere. 2) Flosculi. 3) Articuli rhacheos superiores. 4) Gluma inferior. 5) Gluma superior. 6) Perianthii valvula inferior. 7) Valvula su-perior. 8) Stamina. 9) Pistillum, cum squamis lodiculae.

259

2



Carex alpina.

AIRA ALPINA L.

DESCHAMPSIA ALPINA R. et S. II. p. 686.

Aira caespitosa vulgaris, tum panicula contracta, densiori, vivipara occurrit ita, ut, flosculo infimo vel utroque integro, secundus vel superior quidam valvulam suam inferiore in foliolum elongatum, tunc aut plane muticum, aut setula superne enata armatum, producat. Qui prolificandi nisus cum in gramine boreali vel alpino magis praevaleat, flosculosque, nisi omnes, tamen vel ab ipso secundo reliquos occupet, in totam spiculam agens, partium, praesertim accessoriarum, ut pilorum basis et aristae, mutilationem aliquam efficit. Quo fit, ut in *Aira*, quam *alpinam* Linnaeus dixit speciemque peculiarem esse voluit, pili basin flosculorum cingentes, arista ipsaque nonnumquam rachis abbreviati inveniantur: arista, tum setuliformi, non nisi a medio flosculi perfecti avulsa ipsoque breviori, proliferorum autem nulla aut in aciculam subterminalem contracta. Caeterum reliqua omnia quae *Airam caespitosam* constituent, et in *alpina* reperiuntur. Gramen plerumque brevis, vix pedale, rigidus. Folia brevia, rigida, involuta, subpungentia. Arista plerumque e medio valvulae, nunc ipsa brevior nunc eandem paulo excedens. Flosculus infimus fertilis, exsertione aristae excepta, plane ut in *A. caespitosa* vulgari. In secundo, imo in superioribus qui sequuntur, quorumque nonnumquam 3 — 5 adsunt, valvula superior legitima quidem, sed abbreviata. Horum autem valvula inferior foliolum resert perfectum, ipsa valvula vaginam sistente, callo articulari a lamina linearis et elongata, plerumque involuta, sejunctam, ligulamque exserente magnam, ligula foliorum latiorum, bifidam. Genitalia flosculorum prolificantium sensim magis magisque abortiunt.

FIGURAE AD SPECIMINA LAPONICA.

1) Glumae. 2) Flosculi magis etiamnum integri. 3) Flosculi prolificantis valvula inferior a fronte. 4) Eadem a tergo. 5) Ejusdem flosculi valvula superior.



Aria flex. bottinica.

Quot formas, pro se quidem habitu quodammodo diversas, cunctas vero ad typum unius ejusdemque speciei redeuntes, *Aira caespitosa* secundum loci natalis coeliique naturam induere possit, varietatum ejusmodi aliquot principalium figurarum, in tabulis 253, 254, 255 et 256 exhibitas, testes esse volui. In varietate ea, quam *bottnicam* dixit cel. WAHLENBERG, partium omnium praevalet, ut ita dicam, acuminatio quaedam, seu protractio, qua fit, ut panicula, saepe perangusta, ipsaeque spicularum aristae insigniter elongentur, glumae dentesque perianthii, haud minus tamen quam in *A. caespitosa vulgari* inaequales, magis acuminentur. In reliquis autem, iisque specificis notis, var. illa prorsus cum typica planta convenit; nam folia et in aliis hujus varietatibus haud raro involuta et brevia, in ipsa autem *A. bottnica*, cum culta fuerit, plana inveniuntur. Specimina hujus plantae, tam panicula angustata aristisque elongatis, quam spiculis, praesertim glumis acuminatis, *bottnicae* simillima, in ins. Sitka legit cel. MERTENS, quibus folia praelonga sunt, eaque in aliis plana, in aliis involuta; dentes perianthiorum autem minus quam in *bottnica* protracti. — Caeterum hac varietate transitus quidam sistitur ab *A. caespitosa* ad *flexuosam*.

FIGURA AD SPECIMEN VESTERBOTTONICUM.

1) Spicula. 2) Flosculi.



Stipa capillaris L.

A I R A E C A E S P I T O S A E VARIETATES.

Tabula 256, boreales potissimum *Airae caespitosae* complectens varietates, in *Fig. A.* eam exhibet, quam cel. BROWN *Deschampsiam brevifoliam* dixit, magnitudine (3 — 6 unciali), panicula coarctata, foliisque brevibus solis, neque vero, ut mihi videtur, specie a planta communni differentem. Glumae plerumque flosculis nonnihil breviores et seta e medio vel infra medium valvulae enata, haud raro et in planta nostrate occurunt. — *Fig. B.* aliam varietatem sistit, ad summum pedalem, panicula plerumque contractiuseula vel patula tantum, ob folia in aliis involuta, fere omnia patentia et strictiuscula habitus peculiaris; spiculae autem, excepta forte seta glumas nonnihil excedente, prorsus ut in planta vulgari sese habent. — *Fig. C.* denique plantulam depingit pumilam, caespites densissimos formantem, panicula parva, angusta, foliis angustissimis, nunc planiusculis nunc fere capillaceo-involutis, brevissimisque insignem, spiculis vero omnino cum *A. caespitosa* communis congruentem.

FIGURAE AD SPECIMINA:

- A) EX INSULA MELVILLEI.*
- B) UNALASCHKENSE.*
- C) KAMTSCHATICUM.*

1) *Deschampsiae brevifoliae* Br. spicula. 2) Flosculi. 3) Perianthii valvula inferior.



Agrostis danthonioides.

A I R A D A N T H O N I O I D E S.

Tr. in Mém. de l'Ac. de St. Pét. Sér. VI. Tom. I. p. 57.

RADIX e basi culmorum fibrae fasciculatae, pertenues, breviusculae, simpliciusculae, flexuosaæ.

CULMI erecti vel ima basi procumbentes, pertenues et subsiliformes, spithamei — dodrantales, teretes, striatuli, laeves, ad nodos (cum basi 3, glabros) aequi vel pl. min. geniculati, ad paniculam usque vaginati.

VAGINAE totae fissac, laxiusculae, internodio breviores, inferiores laminam aequantes superiores eadem longiores, striatae, glabrae. LIGULA membranacea, lincam vel. lin. cum dimidia longa, acuta, decurrentis.

FOLIA erecta, angustissima, linearia, plana, acuta, striata, glabra, viridia, inferiora in speciminiibus nostris circiter pollicaria, superiora semipollicaria vel paulo longiora.

PANICULA dimidiæ culmi partem occupans, erecta, contracta, lucida, pallide viridis.

AXIS COMMUNIS pertenuis, leviter flexuosulus, teretiusculus, laevis, 6—8-parus. Radii plerunque bini, erecti, subangulati, laeves, tenuissimi, circiter tertiam quartamve partem inferne nudi, tunc radioles emittentes solitarios, subsimplices: PEDICELLIS alternis, solitariis, laevibus, sub spicula paulo incrassatis.

SPICULÆ linearí-cuneatae, appresso-erectæ, fere tres lineaæ longæ, pallide virides, bifloræ.

GLUMAE herbaceo-membranaceæ, linearí-lanceolatae, acuminatae, parum inæquales (inferiore nonnihil breviori), compressæ, trinerves, ad nervum dorsalem superne scabriusculæ, flosculo superiore quartam tertiamve partem longiores.

FLOSCULI substantia glumis vix firmiores, linearí-oblongi, obtusi, subaequivalves: inferior insidens callulo, pilis brevissimis antror-

sum longioribus coronato; superior articulo rhacheos flosculo inferiore dimidio breviori, piloso. *Valvula inferior oblonga*, obtusa, 4 - dentata dentibus ciliato-fimbriatis, viridicans, 5 - nervis: nervis lateralibus non prorsus percurrentibus, dorsali in medio valvulae aheunte in aristam inferne paulo tortam et spadiceo-fuscum, medio geniculatam, superne aequam, glumas satis longe superantem. *Valvula superior angustior*, ohtusa, dissite binervis, ad nervos superne densiuscule ciliata.

LODICULAE squamas et GENITALIA non vidi.

SEmen oblongum, compressiusculum, spadiceum.

FIGURA AD SPECIMEN BOREALI-AMERICANUM.

1) Spicula. 2) Flosculi. 3) Articulus rhacheos. 4) Perianthii valvula inferior. 5) Ejusdem valvula superior. 6) Semen.



Carex flava.

RADIX e basi culmorum nodulosa fibrae pertenues, plurimae, fasciculatae, flexuosae, simpliciusculae, interdum stolone uno altero auctae.

CULMUS erectus vel basin versus geniculato - procumbens, semi — 2-pedalis, pertenuis, teres, striatulus, laevissimus, ad nodos 3 glabros aequus vel laevissime geniculatus, infra paniculam longe nudus et non raro purpurascens.

VAGINAE arctiusculae, totae fissae, internodio breviores, superiores lamina longiores, striatae, laeves aut deorsum scabriuscule. LIGULA membranacea, sesqui — bi - linealis, decurrentis, obtusa, saepe fissa.

FOLIA erecta vel patula, radicalia saepe leviter arcuata, angustissima, setaceo - involuta, striatula, laevia vel scabriuscula, plerumque laete - rarius atro - viridia, culmea sensim breviora: inferiora in plurimis culmo tres quartas partes minora, sed interdum etiam longiora, aut, in aliis, brevissima.

PANICULA erecta (dum floret nutans), aperta, lucidissima, rarius contracta et tum atropurpurascens, pertenuis et subcapillaris, palmaris, rarius fere spithamea.

AXIS COMMUNIS tenuissimus, angulatus, laevis vel scabriusculus, inferne aequus, superne pluriuum flexuosus, sub 6 - parus, non raro cum radiis atropurpureus. *Radii* longe plerumque hini, subcapillares, patuli vel patentes, duas tertias partes nudi, superne trichotomi et cum radiolis patulis scabriusculi: in panicula contracia et pluriflora inferne minus longe nudi. PEDICELLI laeves, sub spicula paululum incrassati.

SPICULAE linear - cuneatae, 2 — 3 lineas longae, e viridi et spadiceo interdum et e purpureo alboque variae, 2 - rarius 3 - florae.

GLUMAE paleaceo-membranaceae, parum inaequales (inferiore paulo minori), flosculos subaequantes, compressiusculae, 1-nerves, apice pl. min. acutae, vel obtusiusculae et tum plerumque denticulatae: inferior saepe ad nervum hispidula.

FLOSCULI ejusdem et vix paulo firmioris substantiae, subaequales, aequi-valves: inferior callo brevissimo insidens pilis coronato ipso quinques brevioribus, superior rhacheos articulo subconico, pilis ejusdem longitudinis obsito. *Valvula inferior* linearis-oblonga, punctulis exasperata, apice inaequaliter brevidenticulata, 5-nervis: nervis abbreviatis: medio supra basin avulso et abeunte in aristam tortilem, medio geniculatam, glumas pl. min. longe excedentem. *Valvula superior* angustior, bidentata, dissite binervis, ad nervos hispidula.

LODICULAE squamae 2, oblongae, acutae, nudae, ovario breviore.

OVARIUM obovatum, glabrum. **STYLI** 2, brevissimi; **STIGMATA** ramosa, alba.

STAMINA 5. **ANTHERAE** lineares.

FIGURA AD SPECIMEN PETROPOLITANUM.

1) Spicula. 2) Flosculus. 3) Articulus rhacheos. 4) Perianthii valvula inferior. 5) Ejusdem valvula superior, a fronte. 6) Genitalia cum lodicula.



Aira media.

A I R A M E D I A GOUAN.

DESCHAMPSIA MEDIA R. et S. II. p. 687.

RADIX e basi culmorum subinflata fibrae fasciculatae, crassiusculae, flexuosa, simpliciusculae, pallentes.

CULMUS erectus, pl. min. pedalis, strictiusculus, teres, tenuis, striatulus, ad nodos 3 brevissimos et glabros aequissimus, rarissime paulo geniculatus, tandem sub panicula non longe nudus.

VAGINAE arctiusculae, totae fissa, internodio longiores, lamina breviores, striatae, deorsum asperiusculae. LIGULA membranacea, amplectens, acuminata, latissime decurrent, longa et interdum fere semipollicaris, haud raro distinete binervis.

FOLIA erecta vel patula, saepissime curvata, setaceo-involuta, non striata, firmula, deorsum scabriuscula: radicalia s. fasciculorum innumera, confertissima, culmo multo breviora, 2—3-pollicaria, rarius medium culmi aequantia, *) culmea superiora plerumque non nisi paulo breviora.

PANICULA erecta, strictiuscula, aperta, lucidissima, circiter sesquipalmaris.

AXIS COMMUNIS pertenuis, aequus, teres, scabriusculus, plerumque purpurascens, sub-6-parus. Radii 2, 3, 5, pl. min. patuli, aequi vel vix flexuosi, ad medium usque nudi, superne trichotomo-divisi, cum radiolis patulis scabriusculi. PEDI-CELLI laeviusculi, sub spicula incrassati.

SPICULAE cuneatae, pl. min. bilineales, e spadiceo et purpureo variae, biflorae.

GLUMAE chartaceo-membranaceae, subaequales, compressiusculae, lanceolatae, acutiusculae vel, si obtusiores, apice brevissime denticulatae, dorso punctis exasperatae, flosculum

*) Longitudine foliorum praesertim specimina boreali-Americanæ a Gallicis differunt.

superiorem pl. min. aequantes vel parum superantes: inferior, plerumque paulo angustior, 1-, superior 3-nervis: nervis lateralibus non percurrentibus.

FLOSCULI substantia glumarum, pro se singuli glumis breviores, aequivalves: inferior insidens callo brevissimo, coronato pilis, aut dorsalibus brevioribus aut omnibus aequilongis, flosculo 3—5^{es} brevioribus; superior articulo rhacheos sussultus ipso circiter duas tertias partes breviori, antrorsum sensim longius piloso: pilis tamen calli pilis non longioribus. *Valvula inferior* lineari-oblonga, obtusa, apice aut aequali-4-dentata et tum infra apicem emittens setulam ipsa vix longiore, aut dentibus interioribus brevioribus et tum ex ipsa incisura brevissime cuspidata, inferne purpurascens, 5-nervis: nervis non percurrentibus. *Valvula superior* angustior, bidentata, dissite binervis, ad nervos scabra.

LODICULAE squamae 2, ovato-lanceolatae, acutae, nudae, ovario breviores.

OVARIUM obovatum, glabrum. STYLI 2, brevissimi. STIGMATA ramosa.

STAMINA 5. ANTHERAE lineares.

FIGURA AD SPECIMEN MONSPELIENSE.

- 1) Spicula. 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior. 4) Flosculus.
5) Ejusdem valvula inferior; *) varietatis apex. 7) Valvula superior cum lodicula. 8) Genitalia.
-



Aloa pulchella.

RADIX e basi culmorum fibrae fasciculatae, plurimae, tenuissimae, flexuosa, simpliciusculae, perbreves.

CULMUS erectus, spithameus — dodrantalis, tenuis et plerumque filiformis, teres, striatulus, laevis, ad nodos (cum basi 3, glabros) pl. min. leviter geniculatus, interdum ex ima basi ramum agens floriferum, demum infra paniculam pl. min. longe nudus.

VAGINAE totae fissae, inferne arctae superne tumidiusculae, internodio breviores, lamina longiores, striatae, glabrae. LIGULA membranacea, fere sesquilinealis, amplectens, obtusa, late decurrentia.

FOLIA patula, linearia, angustissima, plana, striata, glabra, glaucescentia, fasciculorum ultrapollicaria, culmea brevia, saepe pollicem dimidium non excedentia, supremum brevissimum.

PANICULA erecta, sesqui-3-pollicaris, demum patens, tenerrima, lucida.

AXIS COMMUNIS capillaceo-filiformis, teres, laevissimus, aequus l. flexuosulus, sub-6-parus. Radii bini, sed et terni solitarii, capillacei, laevissimi, inferne circiter tertiam partem nudi, tunc in radiolos di-vel trichotomo-divisos, tenerrimos discedentes, cum hisce ipsis basi callosuli. PEDICELLI satis longi, laeves, sub spicula paulo intumescentes.

SPICULAE cuneatae, lineam longae, glabrae, e fusco spadicescentes, biflorae.

GLUMAE excepta basi medio chartacea membranaceae, parum inaequales (inferiore paulo breviori), lanceolatae, acutiusculae, compressiusculae, enerves, flosculos pl. min. aequantes.

FLOSCULI substantia glumarum, linear-lanceolati, subaequivales: inferior callo insidens pilis brevissimis coronato, superior articulo rhachicos perbrevi, antrorsum pilosulo. *Valvula* *inferior*

oblongo-linearis, obtusa, apice quadridentata dentibus interioribus majoribus, 5-nervis: nervis lateralibus non percurrentibus, medio supra valvulae medium abeunte in setulam scabram, ipsam glumasque paulo superantem. *Valvula superior* angustior, brevi-bidentata, dissite binervis.

LODICULAE squamae 2, ovato-lanceolatae, acutae, nudae, longitudine ovarii.

OVARIUM obovatum, glabrum. STYLI 2, brevissimi. STIGMATA ramosa, brevia.

STAMINA 5. ANTHERAE lineares.

FIGURA AD SPECIMEN HISPANICUM.

1) Spicula. 2) Floculus insimus cum adpresso rhacheos articulo. 3) Perianthii valvula inferior. 4) Valvula superior. 5) Genitalia cum lodicula.



Panicum agrostoides.

P A N I C U M A G R O S T O I D E S MÜHLENB.

Tr. Diss. II. p. 212.

RADIX fibrae fasciculatae, flexuosa, ramulosae, albidae.

CULMUS erectus (vel forte obliquus), bipedalis vel paulo altior, satis tenuis, compressus, sulco uno binisve oppositis exaratus, glaberrimus, tam e basi quam ad nodos omnes (3, glabros, aequos vel parum geniculatos) florifero- et erecto- s. adpresso-ramosus: ramis culmo principali multo brevioribus nec nisi supremo paniculae ejus basin attingente; infra paniculam non longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxae et pro exserendo ramo hiantes, internodio laminaque breviores, carinato - compressae, striatae, glabrae, ad ligulae latera interdum pilis aliquot munitae, cum foliis pallide vel subglaucescendo - virides. LIGULA brevissima, truncata, membranacea, sed in fimbrias, saepe fere in pilos divulsa.

FOLIA erecta, lanceolato - linearia vel linearia tantum, plana, inferne carinato - subcompressa, acuta, inferiora latiora fere lineas 3 -, superiora lineas 2 vel $1\frac{1}{2}$ lata, glabra, pagina superiore et ad margines deorsum hispidula, pl. min. dodrantalia: supremum panicula plerumque non multum brevius.

PANICULA terminalis (prius florens) pyramidata, lucidissima, sesquipalmaris — spithamea; ramorum tum adhuc contractae, breviores.

AXIS COMMUNIS tenuis, vix paulo flexuosus, bisulcato - angulosus, superne scabriuscus, 10 - 14 - parus. Radii plerumque solitarii, rarius bini, pertenues, angulati, scabri, ab ipsa basi callosa partiti et hanc ob rem verticillos axeos pluriradiosus mentientes, demum horizontales imo deflexi: inferiores cum radiolis suis longiores (2 — 3 - pollicares), sensim breviores, supremi brevissimi: radioli inferiorum, ut ipsi radii superiores,

racemiformes et toti satis conferte floriferi, ab invicem distantes, patentes. PEDICELLI spicula breviores, hispidi.

SPICULAE, dum clausae sunt, ovatae, acutae, linea paulo breviores, glabrae, pl. min. purpurascentes.

GLUMAE cordato-ovatae, acutae: *inferior* basi amplectens, sub-3-nervis, ad nervum medium hispidula, flosculis dimidio brevior; *superior* flosculum neutrum aequans, 5-nervis.

FLOSCULI subparallelē: *inferior* neuter, bivalvis: valvula exterior glumae superiori ex toto simillima et aequimagna, interior tenuior, angustior, tertiam partem brevior, dissidente binervis, ad nervos brevissime ciliata. *Flosculus superior* hermaphroditus, coriaceus, oblongus, obtusus, apice pilorum fasciculo brevissimo coronatus, neutro paulo brevior, flavendo-viridicans, nitidissimus: Valvula superior aequilonga, conduplicata.


LODICULAE squamiae collaterales, linearī-quadratae, truncatae.

OVARIUM oblongum. STYLI 2. STIGMATA plumosa, atropurpurea.

STAMINA 5. ANTHERAE atropurpureae.

FIGURA AD SPECIMEN BOREALI-AMERICANUM.

- 1) Spicula aperta, obversa gluma inferiori. 2) Flosculi ueutrius valvula superior. 3) Hermaphroditus. 4) Ejusdem valvula superior cum lodicula. 5) Genitalia juniora.
-



Panicum caucasicum.

P A N I C U M C A U C A S I C U M.

Def. Semipedale — pedale, totum pubescens. Racemis (8 — 12) pl. min. semi-pollicaribus, interstitia subaequantibus, superioribus iisdem longioribus; Spiculis linealibus, brevissime pedicellatis, biserialibus, imbricatis, ovalibus, pl. min. acutis, pilosis; Gluma inferiore cordata, brevissima, superiore flosculos aequante; Hermaphrodito oblongo, obtusissimo, mutico, laevissimo (neutro paulo minori).

RADIX fibrae tam e basi culmorum quam saepissime e nodis infimis ramorum plures paucioresve, breviusculae, simplices, albidae.

CULMUS ex ipsa basi ramosissimus: rami (iterum ramosi) undique decumbentes, geniculato - adscendentes, semipedales pedalesque, compressi, pubescentes, multinodes: interstitiis pollicaribus sesquipollicaribusve, saepe atropurpurascentes; fere ad racemos usque foliosi.

VAGINAE ad basin usque fissae, laxae et, praesertim superiores, tumidiusculae, internodio (saepe dimidio) breviores, inferiores laminam aequantes, superiores eadem longiores, striatae, compressae, hirsutiusculae. **LIGULA** series pilorum densiuscula.

FOLIA pl. min. patentia, plana, lanceolata, acuta, tenuissime striata fere abque nervo medio distinctiori, scabra, pubescentia, subaequalia, plerumque pollice paulo breviora, cum vaginis racemisque glaucescentia.

RACEMI (8 — 12) ad axin communem tenuem, triquetrum, pubescentem, paulo flexuosum, 2 — 3 - pollicarem alterni, secundi, appresso - erecti, lineares: inferiores circiter semipollicares, internodium aequantes vel eodem non nisi paulo-, superiores sensim pl. min. breviores eodem longiores.

AXIS PARTIALIS pertenuis, angulato - teretiusculus, aequus, pilosopubescens, exteriore latere alternatim exserenis **PEDICELLOS** brevissimos, claviformes, pilosos, persistentes.

SPICULAE biseriales, imbricatae, ovales, pl. min. acutae, lineam longae, piloso-pubescentes, glaucescentes.

GLUMA *inferior* minima (flosculis sexies brevior), amplectens, corodata, acutiuscula, 3—5-nervis; *superior* flosculos aequans, ovalis, acutiuscula, 5-nervis, pilis (interdum densiuscule) adspersa.

FLOSCULI subparallelis: *inferior* neuter, bivalvis: valvula exterior glumae superiori ex toto simillima eique aequilonga, tantum plerumque minus pilosa; interior parum brevior, angustior, obtusa, tenerior, dissite binervis. *Flosculus superior* hermaphroditus, coriaceo-chartaceus, ovalis, obtusissimus, nitidus, e griseo pallens, neutro paulo brevior: valvula superior aequilonga, (in maturo gramine) vix marginibus conduplicata.

LODICULAM et **GENITALIA** non vidi.

SEMEN forma hermaphroditi, fere ejusdem longitudinis, depressiusculum, griseum.

FIGURA AD SPECIMEN E CAUCASO ORIENTALI.

- 1) Spicula, obversa gluma inferiori. 2) Flosculi neutrius valvula superior.
 - 3) Hermaphroditus. 4) Ejusdem valvula superior cum semine.
-





Panicum diffusum

P A N I C U M D I F F U S U M . Sw. Tr. Diss. II. p. 214.

RADIX e basi culmorum nodosa fibrae subsacciculatae, interdum praelongae, flexuosa, ramulosae.

CULMI (in icono erecti) maximam partem decumbentes, 1 — sesquipedales, filiformes, teretes, striati, glabri, superne floriferoramosi, ad nodos 3 barbulati et aequi vel leviter geniculati, infra paniculam non longe nudi.

VAGINAE totae fissa, arctae, ad ramificationes liantes, internodio laminaque breviores, striatae, laeves, sauce superne pilosulae. LIGULA brevissima, ciliaris.

FOLIA erecta (culmum sequentia), linearia, angusta, pl. min. involuta, vel plana et tum lineam pl. min. lata, acuminata, striata, nervo medio vix eminentiori, laevia, in pagina superiori basin versus pilosula: inferiora paulo vel pl. min. breviora, superiora ultrapalmaria — dodrantalia, cum vaginis glaucescentia.

PANICULA palmaris et ultra, rara, strictiuscula, viridis.

AXIS COMMUNIS tenuissimus, filiformis, aequus vel superne vix flexuosulus, angulatus, laevis, 5 — 7 - parus. Radii solitarii, deum patentes, parum et subadpresso-compositi, ob arctissimos radiolos racemiformes, axi communi similes ipsoque vix tenuiores, circiter a medio floriferi, satis pauciflori. PEDICELLI tenuissimi, spicula plerumque paulo longiores, seabriuscui.

SPICULAE ovato-oblongae, acutae, glabrae, laete virides, circiter lineam longae.

GLUMA inferior ovata, acuta, 5 — 7 - nervis, flosculis dimidio et quod excedit brevior; superior eodem aequans, oblonga, acuta, 9 - nervis.

FLOSCULI subaequales: inferior neuter, bivalvis: valvula exterior glumae superiori ex toto simillima et aequimagna, interior

tertiam partem brevior, tenerior, acuta, marginibus conduplicata, dissite binervis. *Flosculus superior* hermaphroditus, coriaceus, elliptico-ovatus, acutiusculus, flavo-viridis, nitidissimus, neutro paulo minor: valvula superior aequilonga, marginibus conduplicata.

LODICULAE squamae collaterales, linearis-quadratae, emarginatae.

GENITALIA non vidi.

SEMEN (immaturum) elliptico-oblongum, STYLIS 2 coronatum.

FIGURA AD SPECIMEN DOMINGENSE.

- 1) Spicula. 2) Flosculi neutrius valvula superior. 3) Hermaphroditus.
4) Ejusdem valvula superior cum lodicula et semine immaturo.
-

RADIX ignota.

CULMUS erectus, 4 — 6 - pedalis, inferne fere crassitie digitii minoris, simplex, ad nodos (3? brevissimos et subinde non nisi lineolam transversalem constituentes, glabros) aequus, compressus, striatus, glaber, cum vaginis glaucescens, totus vaginatus vel infra juham parum longe nudus.

VAGINAE totae fissae, arctinsculae, internodio parum, lamina multo breviores, striatulae, glabrae, interdum cum foliis coriaceae. LIGULA in coriaceis obsoleta aut brevissima et ciliaris; in herbaceis membranacea, brevis, truncata; vagina folioque tum circum ligulam tomentosis maculaque fusca notatis.

FOLIA erecta, linearia, apice attenuata, inferne compressa, longissima, (interdum pedes 3 — 4 excedentia) superiora pl. min. breviora, glabra, apicem versus margine hispida: ubi magis membranaceo - herbacea sunt, tunc fere pollicem dimidium lata, flaccidiora, distincte striata, nervo medio inferne crasso supercurrente; ubi coriacea, tunc multo angustiora, concavo - compressa nec nisi versus apicem complanata, obsolete striata, nervo medio distinctissimo, margine hispidissima.

JUBA contracta vel parum patula, satis densa, 1 — 2 - pedalis, fuscescens.

AXIS COMMUNIS sulcato - angulatus, aequus, ad angulos hispidus, per distantias inaequales exserens radios, aut solitarios, aut binos pluresve confertos et pseudoverticillatos, subadpresso-erectos, subaequos, angulatos, scabros, racemosos, compositos: inferiores spithameos vel pede non multum breviores, inferne pl. min. longe nudos; superiores sensim (at non nimis) minores, a basi floriferos: radiolis racemosis: in illis longioribus,

distantioribus; in his brevioribus demumque brevissimis, pl. min. dense confertis. PEDICELLI brevissimi, hispidi.

SPICULAE in racemulis secundae, oblongae, nunc magis obtusae nunc acutiusculae, glabrae, vix linearis longae, e viridi fuscantes.

GLUMA inferior ovata, obtusiuscula, amplectens, 3-nervis, ad carinam scabra, flosculis nunc dimidio nunc duas tertias partes-, superior iisdem paulo minor, nunc obtusa nunc acutiuscula, 3- vel 5-nervis.

FLOSCULI subparallelis: inferior neuter, 1- vel 2-valvis: valvula exterior glumae superiori simillima sed paulo longior, 3—5-nervis; interior, si adest, aquilonga, parum angustior, tenerior, dissidente inervis. *Flosculus superior* hermaphroditus, coriacens, ovato-ellipticus, acutiusculus, apice obsolete barbatus, neutrum aequans, demum viridis: valvula superior aquilonga, acuta, marginibus conduplicata.

LODICULAE squamae collaterales, quadratae, emarginatae.

OVARIUM oblongum. STYLI 2. STIGMATA plumosa, atropurpurea.

STAMINA 3. ANTHERAE lineares, atropurpureac.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIENSE.

- 1) Spicula, in qua gluma inferior flosculis duplo-, superior iisdem solito brevior est. 2) Gluma inferior, 3) Gluma superior: utraque ab interiori visa. 4) Flosculi neutrius valvula inferior 3-nervis. 5) Ejusdem valvula superior. 6) Hermaphroditus. 7) Ejusdem valvula superior cum lodicula. 8) Genitalia.
-



Panicum virulare.

SPECIES FASCICULI VIGESIMI SECUNDI.

- 253. *Aira caespitosa L.*
- 254. *Aira alpina L.*
- 255. *Aira bottnica Wahlénb.*
- 256. *Airae caespitosae* varr.
- 257. *Aira danthonioides Tr.*
- 258. *Aira flexuosa L.*
- 259. *Aira media Gouan.*
- 260. *Aira pulchella Willd.*
- 261. *Panicum agrostoides Mühlenb.*
- 262. *Panicum caucasicum.*
- 263. *Panicum diffusum Sw.*
- 264. *Panicum rivulare Tr.*

Adjecta est tabula nova *Vilfae commutatae*, loco Tab. 10.
Fasc. 1.

S P E C I E S
G R A M I N U M

I C O N I B U S E T D E S C R I P T I O N I B U S I L L U S T R A V I T

D. C. B. *Trinius*,
ACAD. SC. PETROP. SODALIS.

F A S C. X X I I .

P E T R O P O L I .

I M P E N S I S A C A D E M I A E I M P E R I A L I S S C I E N T I A R U M .

A c a d e m i a e j u s s u.

P. H. Fuss.



Arundinella agrostoides.

A R U N D I N E L L A A G R O S T O I D E S.

Def. Paniculae (spithameae et minoris) radiis fasciculato-semiverticillatis, compositis; Pedicellis nudis; Hermaphroditō simpliciter aristato gluma sua duplo breviori, neutro suā, quae superiore fere dimidio brevior, paulo excedente.

RADIX e basi culinorum nodulosa fibrae fasciculatae sparsaeque, flexuosalae, satis tenues, ramiculosae, albidae.

CULMI caespitosi, obliqui et erecti, dodrantales vel paulo altiores, satis tenues, teretes vel compressiusculi, striati, glabri, inferne florifero-ramosi, ad nodos (3, glabros) pl. min. geniculati, infra paniculam non longe nudi.

VAGINAE totae fissae, inferiores laxae et pl. min. hiantes, superiores arctiusculae, internodio plerumque paulo longiores, lamina breviores, striatae, glabrae, cum reliquis partibus glaucescentes.
LIGULA brevissima, fimbriata.

FOLIA patula, lanceolato-linearia (in gramine Wahovensi linearia tantum), acuminata, plana, basi compressa, lineas 2 — 3 lata, striata, nervo medio eminentiori non protrsus percurrente, glabra, margine asperiuscula: inferiora circiter sesquipalmaria, superiora sensim, at non nimis, breviora.

PANICULA erecta, strictiuscula, sublanceolata, lucidula, 3 — 6 pollices longa, paniculam *Agrostis albae* fere referens, pallide glaucescens.

AXIS tenuis, subaequus, teretiusculus et alternatim hinc sulcatus, superne angulatus, glaber, pluriparus. Radii per distantias subregulares fasciculati potius quam semiverticillati, 3, 5 et plures: medio longiori; a basi contractiusculo-ramosi et floriferi, pertenues, glabri, compositi. PEDICELLI glabri, apice nudi.

SPICULAE dum clausae sunt lanceolato-ovatae, teretiusculae, dein hiantes, lineam circiter longae, biflorae.

GLUMAE membranaceae, dissitiusculae, compressiusculo-concavae, albidae, nervis viridibus notatae et, aut utraque aut superior sola, medio e nervo dorsali pilis, plerunque 2, distantibus, longiusculis munitae: *inferior* superiori tertiam partem vel fere dimidio brevior, in acumen breve subuliforme attenuata, tri-nervis; *superior* in acumen sublineare, perangustum, apice truncato subfimbriatum excurrens, 5-nervis: nervis lateralibus plerunque margini propioribus.

FLOSCULI 2: *inferior* neuter, bivalvis: valvula exterior substantia glumarum, linearis-oblonga, pl. min. obtusa, glumam inferiorem paulo excedens, trinervis: nervis superne sensim eminentiорibus; interior tertiam partem brevior, paulo angustior, dissitissime binervis, marginibus implicatis. *Flosculus superior* chartaceus, hermaphroditus, obclavatus, neutro angustior, callulo piloso insidens ejus pili ipso flosculo $\frac{2}{3}$ breviores sunt, albidus: Valvula inferior cylindraceo-involuta, verrucoso-scabra, obsolete 5-nervis, ex apice oblique obtuso emittens aristam ad medium usque tortam et fuscum, tum geniculatam, aequam ac pallidam, flosculo suo plus triplo longiorem; valvula superior aquilonga, tenerior, obtusa, dissite binervis.

LODICULAE squamae 2, margine amplectentes, subquadrato-cuneatae, emarginatae.


OVARIUM oblongum, glabrum. STYLI 2. STIGMATA plumosa, ferruginea.

STAMINA

SEMEN ellipticum, depressiusculum, spadicescens, dorso leviter excavatum.

FIGURA AD SPECIMEN MANILLENSE.

1) Spicula. 2) Flosculi neutrius valvula inferior a tergo. 3) Ejusdem valvula superior ab interiori. 4) Hermaphroditus. 5) Ejusdem valvula superior cum lodicula. 6) Semen.



Trundinella brasiliensis.

A R U N D I N E L L A B R A S I L I E N S I S R A D D I.

Tr. Diss. II. p. 62.

:

RADIX ignota.

CULMUS erectus, 3—4-pedalis, teres, inferne (non computatis vaginis) crassitie pennae cygneae, striatus, glaber, simplex, ad nodos (5—6, obsolete pubescentes) aequus vel vix geniculatus, infra paniculam pl. min. longe nudus.

VAGINAE totae fissae, tumidinsculae, internodio laminaque breviores, striatae, inferne glabrae, superne pilis brevissimis canescens hirtae. LIGULA nil nisi margo transversalis membranaceus.

FOLIA erecto-patula, sublanceolato-linearia, acuminata, plana, pollice dimidio fere latiora, basi semiamplexicaulia ibique in pagina superiori pilosula, striata, medio nervo latiusculo albido non percurrente notata, inter striae glandulis minimis, hinc inde pilos brevissimos emittentibus obsita et hanc ob rem utrinque pl. min. scabra immo hirtula, margine hispidissima, ultra-pedalia, sensim breviora, pallide glaucescentia.

PANICULA erecta, subthyrsiformi-contracta, densiuscula, circiter sesquipedalis, e glauco et fusco varia.

AXIS teretiusculus, inferne pennae gallinaceae erassitudine, superne angulatus et flexuosulus, scabriusculus. Radii erecti, tenues et subfiliformes, subangulati, superne sensim plures (plurimi) verticillati: inferioribus distantioribus subsolitariis, basi adpressis, dodrantalibus, circiter a medio-, superioribus a basi divisis et floriferis, digitalibus: radiolis contractis, racemosis. PEDICELLI hispidi, plerumque bini: alter longitudine spiculae, alter brevissimus, infra spiculam paulo incrassati et apice brevissime barbati.

SPICULAE erectae, linearis - oblongae, teretiusculae, lineam et quod excedit longae, biflorae.

GLUMAE chartaceae, dissitusculae, oblongae, acutae, 3 — vel sub-5 - nerves: *inferior* flosculis paulo brevior, plerumque e pallide glauco et amethystino fuscove varia, cuspitulata, nervis viridibus notata, ad nervum medium hispida; *superior* flosculos subexcedens, laevis, nervis minus quam in inferiore distinctis.

FLOSCULI 2: *inferior* neuter, bivalvis: valvula exterior substantia et forma glumae superioris eaque paulo brevior, obtusa, 3 - nervis; interior plus duplo brevior, hyalino - membranacea, dissipissime binervis, marginibus implicatis. *Flosculus superior* multo angustior, herinaphroditus, chartaceus (deum coriaceo - chartaceus), callulo brevissimo circuincirca barbato insidens, obclavato - cylindracens, neutro quartam partem brevior, albens: valvula exterior obsolete 5 - nervis, superne exasperata, apice obtusa, terminata arista ipsa duplo longiore, basi fusca et contorta, dein refracta, aqua et scabra; valvula interior paulo brevior, tenerior, acuta, dissite et tenuissime binervis.


LODICULA

OVARIUM linearis - oblongum. STYLI 2. STIGMATA plumosa, purpurea.

STAMINA 5. ANTHERAE linearis - oblongae, purpureae.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Spicula. 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior. 4) Flosculi neutrius valvula inferior. 5) Ejusdem valvula superior. 6) Hermaphroditus a fronte visus. 7) Ejusdem valvula superior. 8) Genitalia.



Brundinella flammula.

A R U N D I N E L L A F L A M M I D A.

Def. Paniculae (sesqui — bi-pedalis) radiis verticillatis, compositis; Pedicello (hinc) sub spicula obsolete pilosulo; Hermaphrodito juxta aristam bifido, (longe piloso), gluma sua paulo minori, masculo sua, quae superiori di-midio brevior, duplo majori.

RADIX e culini basi nodulosa fibrae sparsae, validae, flexuosa, ra-mulosae, pallidae.

CULMUS erectus, strictus et gracilis, 4 — 7-pedalis, inferne cras-sitie pennae cygnae et crassior, teres, striatulus, glaber, ad no-dos (4 — 5, pallide et molliter barbatos) aequus vel ad infe-riores levissime geniculatus, simplex, infra paniculam tandem satis longe nudus.

VAGINAE totae fissae, arctiusculae, teretes, lamina superioresque inter-nodio breviores, striatae, in aliis omnes glabrae ac laeves, in aliis, praesertim superiores, undique pilis brevibus obsitae. **LIGULAE** loco barba pilorum, interdum rigida et satis longa.

FOLIA erecta, rigida, linearia, plana aut (in planta sicca?) pl. min. involuta, acuminate, inferiora lineas 4 lata, in planta majori bipedalia, superiors angustiora, sensim breviora, striata, dorso glabra, fronte scabriuscula, marginie hispida.

PANICULA erecta, stricta, thyrsiformi-contracta, pl. min. densa, inferne interrupta, flavescens, sesqui — bi-pedalis.

AXIS teres, inferne crassitie pennae gallinaceae, aequus, strictus, sensim magis magisque hispidus, ad verticillos inferiores bar-batus. **RADI** tenuissimi, teretiusculi, erecti, basi adpressi, hispidi: inferiores plures, fasciculati, superiores plurimi, ver-ticillati, exteriores a basi, interiores s. medii a medio rauulosi et floriferi: verticillis per distantias regulares, sensim breviores enatis: infimis pollices 4 vel 3 ab invicem distantibus. **RADIOLI** terni binive, scabriusculi, fere capillacei, scabriusculi. **PEDI-CELLI** longitudine spiculae aut eadem breviores, superne pau-lulum incrassati et sub fissura glumae inferioris brevissime pi-losuli.

SPICULAE cuneato-lineares, juniores teretiusculae, pallide ochraceae, circiter trilineales, biflorae.

GLUMAE subcoriaceo-membranaceae, dissitiusculae, trinerves, concavae, obtusiusculae: *inferior* duplo brevior, linearis-ovata, sublente hirtula, infra apicem e punctis fuscis utrinque e nervis lateribus exserens pilos, plerumque duos, erectos, albos, satis longos; *superior* lanceolata, attenuata, glabra, flosculum inferiorem aequans, nervis multo minus quam in inferiore prominentibus.

FLOSCULI 2: *inferior* neuter vel masculus, bivalvis: valvula exteriora glumae superiori simillima, minus attenuata, trinervia; interiora fere duplo breviora, duplo angustiora, membranacea, acuminato-attenuata, dissite binervia. *Flosculus superior* hermaphroditus, stipiti brevissimo longe piloso insidens, coriaceo-membranaceus, cylindraceo-involutus: Valvula exterior tenuissime 5-nervis, infra medium usque nudiuscula, dehinc pilosa, pilis longis, ipsam superantibus, erectis patulisve, albis, apice brevi-bifida, inter laciniis exserens aristam, non tortam, flexuoso-arcuatam, pallidam, magis magisque scabram, ipsa quater longiorem (circiter pollicarem); valvula interior angustior, membranacea, aequilonga, obtusa, binervis.

LODICULAE squamae (in flore masculo — nam in hermaphrodito eas non observavi) 2, cuneatae, truncatae, submarginatae, eberbes.

OVARIUM (nimis juvenile) lineare: in flore masculo abortiens, absque stylis. **STYLI** in flosculo hermaphroditico 2. **STIGMATA** plumosa.

STAMINA in utroque flosculo 2. **ANTHERAE** linearis-oblongae.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Spicula. 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior. 4) Flosculi masculi valvula inferior. 5) Ejusdem valvula superior ab interiori, cum staminibus, adpositis squamis lodicularibus. 6) Hermaphroditus. 7) Ejusdem valvula inferior ab interiori. 8) Valvula superior. 9) Genitalia juvenilia
-



Tridinella nepalensis.

ARUNDINELLA NEPALENSIS *Tr. Diss. II. p. 62.*

RADIX ex rhizomate lignoso, pl. min. transverso, fibrae sparsae, subsimplices, tenaces, flexuosulae.

CULMUS (in specimine quod coram est, ex ipso rhizomate erecto- et conferte - ramosus) erectus, crassitie pennae columbiniae, sesqui — 3 - pedalis et fortasse altior, teres, tenuissime striatus, glaber, ad nodos (quorum, praeter confertos baseos culni communis limo immersae, in ramo florifero quovis 3, obsolete pubescentes) subaequus vel leviter geniculatus, cum foliis pallide viridis, infra paniculam tandem non longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxae et (in sicco gramine) saepissime solutae, internodio inferioresque lamina breviores, striatae, glabrae vel asperiusculae, ad margines saepe obsolete pilosulae. LIGULA membranacea, brevissima, dorso pilis rigidis stipata.

FOLIA patula, linearia, plana vel (in sicco gramine) margine involuta, acuminata, 2 — 3 lineas lata, satis firma, striata, medio nervo pallidiori vix percurrente notata, glabra, scabriuscula, pedalia — spithamea, sensim paulo breviora.

PANICULA erecta, apice forte paulo nutans, primum contracta et densiuscula, deinde lucida et patula, pro ramorum floriferorum altitudine nunc vix spithamea vel ultrapalmaris, nunc ultrapedalis, pallide fuscescens.

AXIS communis teretiusculus, inferne hinc ob radios primum adpresso sulco exaratus et laeviusculus, superne pl. min. angulatus et scaber, subaequus, per distantias satis regulares emittit radios solitarios binosve, statim a basi discedentes in radiolos contracto - divisos, satis tenues, scabrinusclos, angulatos. racemiformes: PEDICELLIS plerumque binis: altero duplo quadruplove longiori, in planta majori pl. min. dissitis (unde radii lance floriferi), scabris, infra glumas nudis vel obsoletissime barbatulis.

SPICULAE erecto - patulae, juniores oblongo - lineares et teretiusculae, deinceps apertae et hiantes, lineas duas longae, biflorae.

GLUMAE chartaceae, dissitusculae, lanceolatae: *inferior* parum brevior 3 - nervis, apice in cuspidem caudiformem, brevem

et rigidum, hispidum et satis fortem excurrens; *superior* 5-nervis, simpliciter aetus, laeviusculus.

FLOSCULI 2: *inferior* masculus, bivalvis: valvula exterior substantia et forma glumae superioris, glumam suam (*inferiorem*) raro subaequans, rarius excedens, plerunque eadem paulo brevior, 5-nervis: nervis lateralibus margini propioribus; interior paulo brevior, paulo tenuior, obtusiuscula, dissitissime binervis, marginibus et saepe etiam dorso pilosula. *Flosculus superior* femineus, multo angustior, linearis-obclavatus, gluma sua (*superiori*) dimidio brevior, chartaceus, albus, callulo insidens circum circa sed praecipue antice et postice pilifero: pilis erectis, medium flosculi non attingentibus: Valvula inferior involuta, punctis margaritaceo-exasperata, tenuissime 5-nervis, apice oblique obtuso emittens aristam, inferne tortam et fusco-spadiceam, infra medium geniculatam et dehinc aequam, ipsa spicula sere dimidio longiorem; valvula superior inclusa, aequilonga, obtusiuscula, tenerior, dissitissime binervis, marginibus implicata.


LODICULAE squamae (in utroque flosculo) 2, ut videtur amplectentes s. suboppositae, cuneatae, emarginatae, dorso apice productiusculae, nervis tenuissimis notatae.

OVARIUM (valde juvenile) linearis-obclavatum, in flore masculo nullum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosa, ferruginea.

STAMINA in flore masculo 2—3. **ANTHERAE** lineares. (In flosculo femineo filamenta vidi se inibi videor).

FIGURA AD SPECIMEN NEPALENSE.

1) Spicula. 2) Flosculus masculus. 3) Ejusdem valvula superior, magis aucta. 4) Flosculus femineus. 5) Ejusdem valvula inferior, magis aucta, terminata aristae parte inferiore detorta s. sub aqua explanata, ut nervi medii in aristam ipsam transitus adpareat, dum nervi aristae laterales, e duobus valvulae exterioribus compositi, multo crassiores evadunt. 6) Ejusdem flosculi valvula superior ab interiori visa. 7) Ovarium cum stylis, adpositis utrinque squamis lodicularibus.



Paspalum aspidioides.

P A S P A L U M A S P I D I O T E S.

Def. 2—3-pedale. Racemis 2 conjugatis, (2—3-pollicaribus); axi aequo floribus angustiore, glabro, margine membranaceo hispido; Spiculis maximis, sessilibus, ovatis, glabris; Glumis complanatis flosculo lanceolato lateribus pubescente latioribus longioribusque.

RADIX e culmi basi nodosa fibrae sparsae, flexuosa, simpliciusculae.

CULMUS erectus, strictus, 2—3-pedalis, teres vel compressiusculus, striatulus, glaber, ad nodos, quorum plures (7—8), glabros aequus, simplex, undique vaginis tectus nec nisi infra racemos pl. min. longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodio longiores, lamina breviores, striatae, glabrae, longitudine non multum inter se diversae, in sicco gramine cum foliis fuscescendo-virides. **LIGULA** membranacea s. chartacea potius, perbrevis, truncata, subdecurrens.

FOLIA patula, linearia vel fere lanceolato-linearia, superne valde attenuata, e basi compresso-amplectente plana (lineas 3—4 lata) vel siccitate involuta, subcoriacea, haud raro paulo curvata, striata absque nervo medio eminentiori, glabra, infra obscure viridia, supra fuscescentia et interdum pruinosa, spithamea — dodrantalia et longiora, suprema breviora, extimum brevissimum et angustissimum.

RACEMI terminales 2, conjugati, erecti et coaretati vel patuli, satis crassi, aequales, 2—3-pollicares, gilvi.

AXIS PARTIALIS linearis, apice attenuato flores excedens, planus, aequus, spicula multo angustior, dorso viridis, medio costa complanata pallidiori notatus, margine submembranaceo hispidus, fronte septo longitudinali complanato divisus et ex eo utrinque alternatim exserens dentes dilatatos brevissimos, pedicellorum locum tenentes, approximatos.

SPICULAE biseriales, imbricatissimae, sessiles, cordato-ovatae, acutae, depresso-complanatae, lineas tres et quod excedit longae.

GLUMA *inferior* nulla; *superior*, axi adpressa, membranacea, plana, medio dorso paullulum convexa, cordata, baseos incisae lobis conniventibus et ultra dentem pedicelliformem axis descendenter, margine hispida, 7-nervis: nervis tenuibus, lateralibus non percurrentibus, obsolete inter se anastomozantibus.

FLOSCULI subparallelis: *anterior* neuter, 1-valvis, chartaceo-membranaceus, elliptico-cordatus, gluinae superioris sinus, qui incisura formatur, basi adnatus ideoque gluma altius positus, apice eandem aequans, diametro transversali ea angustior, complanatus, margine hispidulus, nervis tribus tenuibus dorsoque utrinque inter nervos supra medium usque scrobiculis aliquot notatus. *Flosculus posterior* hermaphroditus (stamina tamen non distinxii), chartaceus, ovato-lanceolatus, obtusiusculus, praeter marginem inflexum tenuissime 3-nervis, pallens, dorso glaber, ad flexurae margines brevissime et densissimule ciliatus apiceque barbatus, flosculo neutro multo angustior. Valvula superior aequilonga, glabra, marginibus conduplicata.

LODICULAE squamae collaterales, linearis-quadratae.

OVARIUM obovatum. **STYLI** 2. **STIGMATA** angusto-plumosa, ferruginea.

STAMINA

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Pars axis partialis a fronte visa. 2) Spicula ab anteriori, obverso flosculo neutro. 3) Eadem spicula, demto flosculo neutro, ut adpareat frons hermaphroditii. 4) Hermaphroditus a tergo. 5) Ejusdem valvula superior cum lodicula et stylis.



Paspalum fasciculatum.

PASPALUM FASCICULATUM WILLD. R. et S. II. p. 292.

RADIX mihi ignota (*fibrosa Kunth*).

CULMUS nunc decumbens, plurinodis et inferne valde ramosus, nunc erectus et pl. min. simplex, 2 — 5 - pedalis, compressus, striatus, glaber, ad nodos (glabros vel tomentoso - pubescentes) aequus vel pl. min. geniculatus, aut totus vaginatus, aut infra racemos non nimis longe nudus: in majori planta basi fere crassitie digitii minoris.

VAGINAE totae fissae, laxae, ramiferae hiantes, internodio longiores, inferiores lamina breviores, striatae, glabrae vel dorso superne pilosulae et ad saucem infra ligulam ciliatae. LIGULA in planta glabra membranacea et brevissima, in pilosula ciliaris.

FOLIA patula, lanceolato - linearia, basi compressa, deinceps plana, (interdum longe) acuminata, pro altitudine graminis lineas 4 — 9 lata, aut utrinque glabra, aut inferne ad nervum medium carinalem et subpercurrentem pilosula: in planta minori pl. min. spithamea, in majori pedalia, fuscescendo nec raro simul glaucescendo viridia.

RACEMI ad axin communem pl. min. angulatum, flexuosulum et glabrum 8 — 30, solitarii, bini pluresve fasciculati, sparsi, pl. min. invicem approximati, basi barbati sed nonnumquam etiam nudi, sessiles vel inferiores (longiores) brevissime pedunculati, patuli vel patentes, 2 — 5 - pollicares, sordide albo-virides vel fuscescentes, jubam constituant erectam, pl. min. lato - ovatam, lucidulam densiusculamve, palmarem — dorstantalem.

AXIS PARTIALIS linearis, planus, nunc subaequus nunc valde flexuosus, spiculam nunc fere latitudine aquans, nunc eadem pl. min. angustior, dorso laevis, margine hispidulus, fronte

septo longitudinali divisus prominulo, utrinque alternatim emitente **PEDICELLUM** brevissimum, glabrum, longe plerumque simplicem, aut altero interdum diviso in pedicellulos 2.

SPICULAE bi — 3-seriales, densius laxiusve imbricatae, ovato-ellipticae, acutae vel acuminatae, hinc convexae inde planae, lineas 2 longae, aut totae nudaे, aut, frequentius, praesertim margine villis seu villorum fasciculis tenerimis adspersae.

GLUMA *inferior* nulla; *superior* membranacea, concava, totam spiculae formam ac longitudinem efficiens, aut 3-nervis: nervis lateralibus marginalibus, aut 5-nervis, glabra vel, praesertim superne, margine tenuissime villosula.

FLOSCULI subparalleli: *anterior* neuter, univalvis, gluma superiori simillimus sed complanatus, 3 — 5-nervis, glaber; *posterior* hermaphroditus, coriaceus, ellipticus, submucronato-acutus, neutrum subaequans, sordide albo-viridulus: *valvula superior* aequilonga, marginibus conduplicata.


LODICULAE squamae collaterales, quadratae, emarginatae.

OVARIUM oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** angusto-plumosa, atro-purpurea.

STAMINA 5. **ANTHERAE** lineares, ferrugineo-purpurascentes.

FIGURA AD SPECIMEN (MAIVS) BRASILIANUM.

1) Pars axis partialis cum insidente spicula. 2) Spicula, magis aucta, obversa gluma superiori, 3-nervi. 3) Flosculus neuter, 3-nervis. 4) Hermaphroditus. 5) Ejusdem valvula superior cum lodicula et stigmatibus.



Papaver malacophyllum.

P A S P A L U M M A L A C O P H Y L L U M.

Def. Tripedale et ultra. Racemis plurimis sparsis s. jubatis, patentibus, (2 — 3-pollicaribus); Axi subaequo, glabro, florum latitudine; Spiculis perparvis, 2 — 4-serialibus, inaequaliter brevi-pedicellatis, obovato-ellipticis, glabris; Foliis lanceolatis, molliter sericeo-pubescentibus.

R A D I X

CULMUS erectus, tri — quadri-pedalis, teres, tenuissime striatus, glaber, ad nodos (4 — 5 glabros) aequus, simplex, totus vaginatus, infra racemos non nimis longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxae, internodia superantes, striatae: inferiores punctis glauco-losis fuscescentibus conspersae, praesertim marginem versus pilis molliusculis longisque hirsutae, laminam subaequantes; superiores, eadem longiores et elongatae, sensim laeviores, suprema vix scabrescula, glabra. LIGULAE membranaceae, brevissimae: inferiores dorso pilis praelongis stipatae.

FOLIA patula, lanceolata, plana, acuminata, firmula, inferiora pollicem lata, margine pilis brevissimis rigidis aculeolata, utrinque sed praecipue dorso pube subtomentosa mollissima s. velutinosa tecta: in pagina inferiori sere sericeo-splendente, in pagina superiori, quae fuscescens potius, basin versus in pilos seu villos tandem praelongos abeunte; inferiora longiora, dodrantalia, superiora sensim breviora, supremum vix ullum.

RACEMI plurimi (circiter 30) ad axin communem superne magis magisque angulatum et pubescentem, aequum, satis tenuem sparsi, inferiores solitarii et subpedunculati, superiores bini ternive fasciculati, basi callosa barbati, patuli et patentes, circiter 4-pollicares, sensim paulo breviores, satis tenues, jubar constituent erectam, pedalem, lucidulam.

A X I S P A R T I A L I S linearis, subaequus, dorso complanatus, viridulus et nervo distincto notatus, spiculam latitudine aequans, margine hispidulus et hinc inde pilum praelongum emittens, fronte medio septulum forinans utrinque alternatim exserens **P E D I C E L L U M** glabrum, in parte axis inferiore saepissime simplicem, in superiore parte discedentem in pedicellulos 2, quorum exterior, paulo longior, spicula sua plus duplo brevior est.

S P I C U L A E bi - vel (superne) quadriserialis, imbricatae, elliptico-oblongae, acutiusculae, glabrae, linea dimidia longiores, saltem linea breviores, fuscescendo - pallidae.

G L U M A *inferior* nulla; *superior* totam spiculae formam ac magnitudinem efficiens concava, tenero - membranacea, 5 - nervis, inter nervos sinuato - exarata, hermaphroditii dorso arctissime adhaerens.

F L O S C U L I subparallelis: *inferior* neuter, univalvis, glumae superiori substantia similis, complanatus, 3 - nervis, non exaratus; *superior* hermaphroditus, chartaceus, nervis 5 prominentibus notatus, oblongus, obtusiusculus, fuscescendo - albus: valvula superior aequilonga, marginibus inflexa.

L O D I C U L A E squamas non distinx.

O V A R I U M obovatum. **S T Y L I** 2. **S T I G M A T A** plumosa.

S T A M I N A

S E M E N obovato - subrotundum, fusco - spadiceum.

F I G U R A A D S P E C I M E N B R A S I L I A N U M.

1) Pars axis partialis. 2) Par spicularum. 3) Flosculus neuter. 4) Hermaphroditus. 5) Ejusdem valvula superior cum stigmatibus. 6) Semen.



Paspalum pinnatum.

P A S P A L U M P R U I N O S U M *).

Def. 3 — 4-pedale. Racemis pluribus alternis fasciculatisque patulis (3 — 4-pollicaribus); Axi subaequo, glabro, floribus angustiore; Spiculis subparvis, quadrirserialibus, inaequaliter pedicellatis, ellipticis, pubescentibus; foliis linear-lanceolatis, pube tenerrima pruinosa tectis.

RADIX e basi culini fibrae sparsae, satis validae, flexuosa, ramulosae.

CULMUS erectus, inferne satis crassus maximumque partem vaginis tectus, teres, tenuissime striatus, glaber, circa nodos (5 — 6, barbatos) pilosulus, aequus, simplex vel basin versus foliifero-subramosus, infra racemos pubescens et non nimis longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodia superantes, striatae: inferiores lamina breviores, villosae, superiores sensim magis elongatae eadem longiores, pubescentes. LIGULA barba pilorum densissima.

FOLIA patula, linear-lanceolata, acuminata, plana, lineas 5 — 7 lata, firma, margine, plerumque deorsum subinvoluto, scabra, utrinque pube brevissima tecta et pruinosa, ex albo rufescens, striata, nervo medio satis tenui non percurrente, inferiora do-drantalia, culmea superiora breviora et angustiora, supremum per breve et angustissimum.

RACEMI (circiter 30) ad axin communem satis gracilem, angulatum, superne flexuoso, pubescendo-pilosulum per distancias minus irregulares sparsi, inferiores, circiter 4-pollicares, solitarii, superiores, demum duplo fere breviores, bini aut plures fasciculati, basi villis, interdum satis longis, barbati,

* An haec sit planta spontanea *Paspali pubescens* (*elegantis Flügg.*), quod non nisi cultum huc usque innotuit, decidere non audeo. Habitus idem; axi autem angustiore et colore totius graminis pruinoso-rufescente differre videtur.

jubam constituunt erectam, pl. min. dodrantalem, pallide
fuscescens, densiusculam.

A X I S P A R T I A L I S linearis, flexuosulus, perangustus et, praesertim
superne, spicula manifeste angustior, dorso angulato-convexus
et laevis, margine seabriusculus, fronte septum format longitudi-
nale, utrinque alternatim exserens **P E D I C E L L U M**, mox dis-
cedente in pedicellulos 2, glabros, quorum exterior longior
spicula sua duplo brevior est.

S P I C U L A E 4-serialis, imbricatae, ellipticae vel obovato-ellipticae,
obtusiusculae, pubescentes, linea paulo (sed parum) breviores.

G L U M A *inferior* nulla; *superior* totam spiculae formam et longi-
tudinem efficiens, convexa, membranacea, 3—5-nervis, sub
lente punctulis adspersa, pubescens, pube apicem versus paulo
longiori.

F L O S C U L I subparalleli: *inferior* neuter, univalvis, membranaceus,
complanatus, glumam superiore aequans, 3-nervis, pube
rariore adspersus; *superior* hermaphroditus, elliptico-obova-
tus, acutiusculus, coriaceus, glaberrimus, viridicans, longi-
tudine neutrius: valvula superior aequilonga, inferne margini-
bus inflexa.


L O D I C U L A E squamae collaterales, quadratae.

O V A R I U M oblongum. **S T Y L I** 2. **S T I G M A T A** plumosa, ferrugineo-
pururascentia.

S T A M I N A

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Pars axis partialis.
 - 2) Spicula.
 - 3) Flosculus nenter.
 - 4) Hermaphroditus.
 - 5) Ejusdem valvula superior cum lodicula et stigmatibus.
-



Paspalum pusillum.

P A S P A L U M P U S I L L U M V E N T . R . et S . II . p . 298.

Def. *Digitale* — *dodrantale*. *Racemis (subternis) alternis patulis (semipollicularibus et ultra); Axi flexuosulo, glabro, floribus angustiore; Spiculis minimis, biserialibus, perbrevi-pedicellatis, obovato-orbiculatis, glabris; (Foliis linearis-lanceolatis, brevibus; culmo repente).*

RADIX fibrae pertenues, ramulosae, subfasciculatae e basi, pauciores e nodis culni prostrati inferioribus.

CULMUS tenuissimus, prostratus et e nodis pilosulis, quibus per intervalla pollice minora interceptus est, radiculas et ramos agens, quorum extimus iterum ramosus est, compressiusculus, sulcatus, glaber: ramis pluribus, foliosis, folii-floriferisve, infra racemos parum nudis.

VAGINAE laxiusculae, totae fissae, internodio demum laminaque non multum breviores, compressae, striatae, glabrae, superne ad fissuram ciliatae. **LIGULA** brevissima, membranacea, obtusissima, pilis orae vaginalis stipata.

FOLIA pl. min. patentia, linearis-lanceolata, acuta, plana, lineam cum dimidia lata, latitudine parum inter se diversa, striata, fere absque nervo medio distinctiori, glabra ac laevia, viridia, pl. min. pollucaria, suprema paulo breviora.

RACEMI plerumque 3, ad axin communem 3 — 4-linealem, triquetrum, angustissimum, glabrum alterni, patentes, basi barbati, pallide virides, 6 — 8-lineales.

AXIS PARTIALIS linearis, complanatus, flexuosulus, utrinque striatus, margine pl. min. hispidulus, spicula paulo angustior, fronte septulo divisus longitudinali angusto et parum prominente, utrinque alternatim emittente **PEDICELLOS** brevissimos, pertenues, glabros, simplices.

SPICULAE biseriales, imbricatae, subovato-orbiculatae et vix apice acutiusculae, glabrae, fronte planae dorso convexae, linea di-midia paulo breviores.

GLUMA *inferior* nulla; *superior* herbaceo-membranacea, convexa, ovato-orbiculata, 3-nervis: nervo medio pl. min. obsoleto, totam spiculae longitudinem et latitudinem efficiens.

FLOSCULI subparallelis: *anterior* neuter, univalvis, glumae superiorei simillimus sed complanatus; *posterior* hermaphroditus, coriaceus, forma et magnitudine glumae superioris, nitidus, maturascens castaneus: valvula superior aequilonga, obtusa, marginibus inflexa.

LODICULAE squamae collaterales, minimae, quadratae.

OVARIUM oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosa.

STAMINA

FIGURA AD SPECIMEN GUYANENSE.

- 1) Pars axis partialis cum spicula a fronte visa. 2) Spicula a tergo, obversa gluma superiori. 3) Hermaphroditus. 4) Ejusdem valvula superior cum lodicula. 5) Semen immaturum.
-





Paspalum scutare.

P A S P A L U M S C A L A R E.

Def. Pedale. Racemis (1 — 4) conferto-alternis, patulis (1 — 1½ - pollicaribus); Axi pl. min. flexuoso, glabro, floribus angustiore; Spiculis minimis, 4-seri- alibus, subbrevipedicellatis, elliptico-oblongis, viloso-pubescentibus; (Foliis sublanceolato-linearibus, patentissimo-distichis).

RADIX e basi culmi sub-obclavata fibrae plurimac, sparsac, tenu- issimae, flexuosae, subrainulosae.

CULMUS ut videtur decumbens, pertenuis et subfiliformis, pedalis, teres, striatulus, glaberrimus, ad nodos (plurimos, glabros) aequus, foliosissimus, superne adpresso-ramosus: ramis flori- feris, plerumque non nimis inaequalibus, fere ad racemos usque vaginatis.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodio longiores, laminam fere aequantes, in foliosiori culmo subimbricatae, striatae, aut glabrae, aut, praesertim inferiores, totae vel apicem versus pubescentes, ad oras pl. min. dense villosulae, glaucescendo- pallidae. **LIGULA** membranacea, brevissima, pilis longius- culis coronata.

FOLIA pl. min. patentia et demum horizontalia, disticha, plurima, saepissime valde approximata, angusto-lineari-lanceolata, acuminata, plana vel siccitate subinvoluta, latiora lineam lata, satis firma, tenuissime striata, glabra et laevia, supra pallide viridia, infra glauca, longitudine subaequalia, 1 — 2 - pollicaria.

RACEMI 2 — 4 — 5, (rarius solitarius) ad axin communem filiformem, tenuissimum, subaequum, sulcatum, glabrum, 3 — 6- linealem subdigitato-alterni, erecti, pertenues, semi — sesqui- pollicares, pallidi, basi barbati: uno alterove solitario acces- sorio, e vagina suprema longe-pedunculato.

A X I S P A R T I A L I S linearis, angustissimus, spicula paulo angustior, flexuosulus, dorso convexiusculus, glaber, fronte septo satis prominente et crasso longitudinaliter divisus, exserente utrinque alternatim **P E D I C E L L U M** sere a basi discedentem in pedicellulos 2, glabros, tenues, spicula dimidio et quod excedit breviores.

S P I C U L A E quadriseriales, imbricatae sed sublaxiusculae, ellipticae, nunc acutiusculae nunc obtusae, flavendo-pallidae, pubescentes s. villosulac, linea dimidia vix paulo longiores.

G L U M A *inferior* nulla; *superior* totam spiculae longitudinem efficiens, concava, elliptica, membranacea, villosula, tenuissime 3-nervis.

F L O S C U L I subparallelis: *anterior* neuter, univalvis, glumae superiori simillimus sed complanatus; *posterior* hermaphroditus, coriaceus, ellipticus, obtusus, albens, non splendens: valvula superior aquilonga, marginibus inflexa.

L O D I C U L A E squamae collaterales, minimae, quadratae.

O V A R I U M oblongum. **S T Y L I** 2. **S T I G M A T A** plumosa, atropurpurea.

S T A M I N A . . .

F I G U R A A D S P E C I M E N B R A S I L I A N U M.

1) Pars axis partialis. 2) Par spicularum. 3) Flosculus neuter. 4) Hermaphroditus. 5) Ejusdem valvula superior cum lodicula et stigmatibus.

275



Reimaria acuta.

RADIX tam e basi culmi quam ex ejusdem nodis fibrae aliquot tenues subsfasciculatae, flexuosae, simpliciusculae.

CULMUS prostratus et repens, pl. min. pedalis, tenuis, teres l. laterē superiore sulcatus, laevis, ad nodos (per intervalla circiter pollicaria plures, griseo - barbatos) subaequus, fibras radicantes agens et ramos floriferos, semipedales, oblique erectos, basi ramosissimos, tenues, sursum sensim magis angulatos, ad racemos usque vaginatos.

VAGINAE totae fissae, laxae et tumidiusculae, internodio breviores, laminam subaequantes, striatae, subcarinatae, glabrae, ad fissuram vel ad faucem solam pilis sordide albis barbatae, apicem racemi singulae emitentes. LIGULAE loco barba pilorum longiuscula.

FOLIA patula, linearia vel linearri - lanceolata, perangusta (linea angustiora), acuminata, plana vel margine involuta, striata absqne nervo medio eminentiori, glabra, culmi prostrati longiora (2 — 3 - pollicaria), raniorum pollicaria, sensim breviora.

RACEMI 4 — 6 ad axin communem 5 — 6 - linealem, pertenuem, angulatum, glabrum inaequaliter alterni, supremi plerumque binati, primo intra vaginam involucrantem contracti et erecti, deum patentes vel reflexi, circiter pollicares, tenues, in gramine sicco fuseescentes, basi per spatium 2 — 3 - lineale floribus destituti.

AXIS PARTIALIS linearis, flexuosulus, angulatus, glaber, sub lente hinc inde aculeolis hispidulus, pro spiculis quas alternatim laxe emittit, excavatus, spicula parum vel vix augustior.

SPICULAE alternae, adpressae, subsessiles s. pedicellulo brevissimo insidentes, linearri - lanceolatae, acuminatae: inferiores, plerumque longiores, interdum lineas tres, superiores lineam cum

dimidia longae, inferne (nec basi) utrinque villis mollibus barbatae, uniflorae.

G L U M A I, axi opposita, lanceolata, acuminatissima, chartaceo-membranacea, 3-nervis, paulo infra medium e lateribus villos densculos et patentes, e nervo medio raros et breviores emittens, perianthio, quod apice suo excedit, arcte adpressa.

P E R I A N T H I U M forma et substantia glumae, paulo brevius, sessile, glabrum, inversum: *valvula inferior* glumae opposita, dorso axi adjacens, trinervis; *superior* parum brevior, inclusa, dissimilis binervis: nervis flexuram formantibus.

L O D I C U L A E squamae 2, collaterales, marginibus ovarium utrinque amplexantes, cuneatae, emarginatae, nudaee.

O V A R I U M subcylindricum. **S T Y L I** 2. **S T I G M A T A** pennata.

S T A M I N A 2. **A N T H E R A E** lineares 1. subclavatae.

F I G U R A A D S P E C I M E N B R A S I L I A N U M .

1) Pars axis partialis. 2) Spicula ab exteriori s. a parte glumae visa. 3) Eadem ab interiori, obversa perianthii valvula inferiori. 4) Perianthium a fronte s. a parte valvulae superioris visum. 5) Valvula superior ab interiori. 6) Genitalia, adpositis utrinque squamis lodiculae sejunctae.



Reimaria conferta

REIMARIA CONFERTA NEES AB ES. *Tr. Diss. II.* p. 59.
?

Reimaria acuta minor (specimina nostra pollices 4 parum excedunt), ad nodos non radicans, non minus ramosa sed ramos confertos adscendendo atollens, racemos apice ferens quam in illa plures (9), ut videntur semper pl. min. contractos, in eo praecipue a priori, maxime quidem affini, gramine recedit, quod spiculae (quibus axes partiales ad basin usque obsiti sunt) acutae tantum, aut undique nudae, aut eodem, quo illae, loco villis brevioribus rarioribusque obsitae, denique quod minores sint: inferiores sesquilineales tantum, superiores vix lineales. Stamina in hac specie tria numerasse mihi videor; lodiculae squamas antem connatas vidi. Semen ellipticum.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Pars axis partialis. 2) Spicula a parte glumae (rarius villosula, ut hic repraesentatur). 3) Eadem ab interiori s. a parte perianthii visa. 4) Perianthii valvula superior ab exteriori. 5) Eadem ab interiori cum semine et stamine unico. 6) Lodicula.
-



SPECIES FASCICULI VIGESIMI TERTII.

265. *Arundinella agrostoides* *Tr.*
266. *Arundinella brasiliensis* *Raddi.*
267. *Arundinella flammida* *Tr.*
268. *Arundinella nepalensis* *Tr.*
269. *Paspalum aspidiotes* *Tr.*
270. *Paspalum fasciculatum* *Willd.*
271. *Paspalum malacophyllum* *Tr.*
272. *Paspalum pruinatum* *Tr.*
273. *Paspalum pusillum* *Vent.*
274. *Paspalum scalare* *Tr.*
275. *Reimaria acuta* *Flügg.*
276. *Reimaria conferta* *Nees ab Es.*

Accedit *Phlei alpini* tabula (loco Tab. 21. *Fasc. II.*) nova,
errore lithographi *Alopecurus alpinus* inscripta.

S P E C I E S
G R A M I N U M

ICONIBUS ET DESCRIPTIONIBUS ILLUSTRAVIT


D. C. B. Trinius,
ACAD. SC. PETROP. SODALIS.

F A S C. XXIV.

P E T R O P O L I .
IMPENSIS ACADEMIAE IMPERIALIS SCIENTIARUM.

A c a d e m i a e j u s s u.

P. H. Fuss.



Holopus trachystachys.

H E L O P U S *) B R A C H Y S T A C H Y S.

RADIX e basi culmorum nodulosa fibrae plurimac, fasciculatae, simpliciusculae.

CULMI caespitosi, erecti, bipedales et altiores, teretes, glabri, ad nodos (5 — 6, barbulatos) pubescendo - asperiusculi, aequi vel paulo geniculati, ramosi: ramis patulis imo patentibus; infra racemos non longe nudi et pubescentes.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, ramificationum hiantes, inter-nodio inferioresque lamina breviores, striatae, subcarinatae, glabrae aut pilis rarissimis brevissimisque adspersae, interdum, ut et culmus, paulo purpurascentes. LIGULAE loco series pilorum brevissimorum.

FOLIA fascicularum erecta, angustissima, subinvoluta, cum vaginis suis pubescentia; culmea patula, linearia, acuminata, e basi compressa plana, plantae robustioris lineas 2 (et ultra) lata, strictiuscula et seabriuscula; minus robustae angustiora et haud raro pubescentia; inferiora spithamea et longiora, superiora pl. min. palmaria, sensim breviora, pallide viridia.

RACEMI 2 — 4 ad axin communem tenuem, mollissime albo - pubescentem, aequum, sesqui — bi - pollicarem per distantias semi-pollicares l. pl. min. pollicares alterni, patuli, solitarii, pollice breviores, villoso - pubescentes, albo - glaucescentes.

AXIS PARTIALIS aequus, rectus vel rarius paulo incurvus, angustus, villis patulis undique tectus, fronte ad septulum medium utrinque et alternatim emittens PEDICELLOS solitarios, perbreves, subclaviformes, dense pubescendo - villosos: villis extimis rectis spiculam fere acquantibus.

*) *Helopus* est subgenus Panici, inter *Paspalum* et *Brachiariam* collocandum, torulo claviformi et valvula flosculi incompleti superiori saepe evoluta a *Paspalis*, gluma inferiori nulla a *Brachiariis* diversum, inter quas *Panicum Helopus* (Ic. Gram. XVI. 183.) transitum ad *Helopoda* facit. — De reliquis speciebus cf. XII. 133.

SPICULAE unilaterales, biserials, pectinato-imbricatae, lanceolato-ellipticae, acutae, depressiusculae, clausae, sere lineam cum dimidia longae, pubescentes, albidae et interdum purpurascentes, deciduae, cum pedicello articulatae ope toruli orbicularis, depressi, glaberrimi et splendentis, superne constricto in stipitem brevissimum, interdum fuscescentem, ipsam spiculam sustentantem.

GLUMA *inferior* nulla; *superior* totam efficiens spiculae longitudinem et formam, acuta vel acutissima, paulo concava, villis adspersa superne crebrioribus et longioribus, 3-vel obsolete 5-nervis.

FLOSCULI subparallelis: *inferior* neuter (interdum cum rudimento staminum), bivalvis: valvula exterior glumae superiori, qua vix brevior, ex toto simillima, sed planior; interior subaequilonga, tenerior, glabra, angustior, marginibus implicata, dissitissime binervis. *Flosculus superior* hermaphroditus, chartaceus, neutro brevior, ellipticus, obtusiusculus, pallidus, tenuissime transversim rugulosus, apice barbula pilorum coronatus. Valvula superior aequilonga, marginibus implicata.


LODICULAE squamae collaterales, quadratae, subemarginatae.

GENITALIA . . .

SEMEN subrotundo-ellipticum, gilvum. *Scutellum* ipso dimidio brevius.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Spicula a parte flosculi neutrius. 2) Gluma superior. 3) Flosculi neutrius valvula superior. 4) Hermaphroditus. 5) Ejusdem valvula superior cum lodicula. 6) Semen.
-



Melophaus grandiflorus.

Lape del.

H E L O P U S G R A N D I F L O R U S.

RADIX e basi culmi nodulosa fibrae sparsae, flexuosa, simplices vel ramulosae.

CULMUS erectus, 4 — 5-pedalis, simplex vel e nodo inferiori uno altero erecto - s. adpresso-ramosus, teres, striatus, pubes molli, patente, infra nodos racemosque longiori tectus, ad nodos (6, breves et barbulatos) aequus vel leviter geniculatus, tandem infra racemos satis longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodio inferioresque lamina breviores, striatae, culmi instar pubescentes: superiores longiores, suprema elongata. LIGULA membrana transversalis brevissima, dorso barba pilorum brevium densa stipata.

FOLIA erecta, linearia, acuminata, firmula, utrinque pubescentia, basin versus compressa, reliqua parte plana et lineas 3 — 4 lata, dorso nervo prominente et percurrente notata, cum culmo vaginisque e gilvo viridia, inferiora ultrapedalia, sensim breviora, supremum per breve (vix pollicare).

RACEMI 3 — 6, ad axin communem subangulatum et subaequum, mollissime et deñissime albo-pubescentem, ad summum spithameum per distantias pl. min. pollicares alterni, solitarii; patuli vel erecti, inferiores bipollicares, superiores breviores, glaucescendo-sericei.

AXIS PARTIALIS aequus vel falcatus, trigonus, villosa-pubescentia, angustus, fronte ad septulum medium utrinque et alternatim exserens PEDICELLOS brevissimos et solitarios, dense pubescentes, clavaeformes, e parte suprema circumcirca emitentes pilos erectos, spiculam, qua non multum breviores, obvallantes.

SPICULAE unilaterales, biserialis, pectinato-imbricatae, lanceolato-ellipticae, acutae, depressae, clausae, lineas duas longae,

sericeo - glaucescentes, deciduae, cum pedicello articulatae mediante torulo orbiculari, depresso, glaberrimo et splendente, superne constricto in stipitem brevissimum, glabrum, fuscescens, ipsam spiculam sustentantem.

G L U M A *in*ferior nulla; *superior* herbaceo - chartacea, totam formam longitudinemque spiculae efficiens, paulo concava, pilis adspersa sed apicem versus et longius et multo densius pilosa, obsolete 5 - nervis, glaucescens.

F L O S C U L I subparallelis: *inferior* masculus, bivalvis: valvula exterior glumae superiori, qua includitur, ex toto simillima; interior tenui-membranacea, paulo brevior, dissitissime binervis. *Flosculus superior* hermaphroditus, masculo tertiam circiter partem brevior, coriaceo - chartaceus, ellipticus, acutiusculus, pallidus, punctulatus, apice pilorum barba coronatus: valvula interior subaequilonga, marginibus implicata.

L O D I C U L A E squamae (in utroque flosculo) collaterales, quadratae, subemarginatae.

O V A R I U M lineare. **S T Y L I** 2. **S T I G M A T A** exserta plumosa, gilvo-crocea.

S T A M I N A 3. **A N T H E R A E** lineares, colore stigmatum.

F I G U R A A D S P E C I M E N B R A S I L I A N U M .

1) Spicula integra, a tergo, pedicello insidens. 2) torus quo spicula cum pedicello articulatur, insidente parte spiculae inferiori. 3) Flosculi masculi valvula inferior (glumam superiore spiculae mentiens) ab interiori visa. 4) Ejusdem flosculi valvula superior cum staminibus et lodicula. 5) Hermaphroditus. 6) Ejusdem valvula superior cum lodicula et stigmatibus.



Panicum ansatum.

P A N I C U M A N S A T U M.

Def. Subpedale. Racemo unico terminali (erecto, 1-sesquipollicari); Spiculis (intra axin membranaceum obvolventem) sesquilinealibus, biserialibus, brevissime pedicellatis, elliptico-oblongis, acutis, basi apiceque barbatis; Glumis aequalibus flosculos aequantibus: inferiore adscendendo-amota, linearis, cuspidata; Hermaphrodito ovato-lanceolato, acutissimo, glabro. (Foliis lanceolato-linearibus, ciliatis).

RADIX e culmorum basi et saepe etiam e nodis radicantibus aliquot approximatis fibrae tenues, flexuosulae, subsimplices, breviusculae, pallidae.

CULMI caespitosi, plerumque subprocumbendo-adscendentes, do- drantales vel subpedales, pertenues, compressinsculi, striatuli, glabri, infra racemum, ubi tenuissimi demumque pl. min. longe nudi, deorsum asperinsculi, basi adpresso- et folii-floriferoque ramosi, ad nodos (pro ramositate culni 3—5 pluresve, barbatulos) inferiores pl. min. geniculati, cum reliquis partibus pal- lide virides.

VAGINAE totae fissae, arctiusculae, internodio inferioresque lamina breviores, superiores eadem longiores, striatae, ad fissuram, praesertim apicem versus, ciliatae, superiores glabrae. LIGULA brevissima, fimbriata.

FOLIA radicalia patula et patentia, conferta, plurima, culmis quaduplo quintuplove breviora, lanceolato-linearia, acuminata, plana, lineam et quod excedit lata, striata, margine e glandulis remotiuscule ciliata dorsoque hinc inde pilis ejusmodi adspersa, 1—sesqui—bi-pollicaria; culmea erecta, pl. min. concava, multo breviora (semipollicaria—3—2-linealia), angustiora, superiora glabra, brevissima.

RACEMUS terminalis, erectus, subclaviformi-linearis, pl. min. ses- qui pollicaris, pallide glaucescens.

AXIS membranaceus, ex ipsa culmi parte superiore dilatata et vaginae in modum fissa (inferne vero integra et culmiforini) sensim esurgens veramque vaginam formans glabram, flosculos

obvolventem, e cuius nervo medio crassiori, vix flexuoso, nervi axeos vaginantis exerunt in ejusdem substantiam membranaceam virides, interdum iterum partiti (quasi paniculae radii membrana conjuncti et coerciti) intusque e nervo medio utrinque erumpunt **PEDICELLULI** simplices, brevissimi.

SPICULAE axi membranaceo semi- obvolutae, biserialis, imbricatae, erectae, albidae, sesquilineales, deum deciduae.

GLUMAE membranaceae, aequilongae, flosculos aquantes, angustae, compressae, lanceolato-lineares, 3-nerves: *inferior* (interior s. nervo axeos adjacens) ad nervum medium subindurata, basi angustata, ibidem extrorsum convexo-curvata et hanc ob rem a flosculis amota, superne iisdem iterum adjacens, ad basin curvaturae in nervo medio harbata et per totum ejus decursum exasperata, apice e nervo dorsali cuspidato-acuta et utrinque subemarginata; *superior* obtusior, paulo tenerior, marginibus apiceque viloso-ciliata.

FLOSCULI subparallelis: *inferior* masculus, membranaceus, bivalvis, valvula exterior lineari-lanceolata, acutiuscula, 3-nervis, apice et ad nervos laterales villis ciliata extrorsum versis; interior paulo brevior, acuta, nuda, dissidente nervis. *Flosculus superior* hermaphroditus, chartaceus, elliptico-lanceolatus, acuminatus, glaberinus, albens, masculo paulo brevior: valvula superior subaequilonga, marginibus implicatis.

LODICULAE squamae collaterales, quadratae, emarginatae.

OVARIUM oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** pluunosa, ferruginea.

STAMINA 3. **ANTHERAE** lineares.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Pars axis membranacei ab interiori visa, explanata. 2) Spicula. 3) Gluma inferior explanata, a tergo. 4) Gluma superior explanata. 5) Flosculi masculi valvula inferior. 6) Ejusdem valvula superior cum staminibus. 7) Hermaphroditus. 8) Ejusdem valvula superior cum lodicula. 9) Genitalia.
-



Panicum petrosum

P A N I C U M P E T R O S U M.

Dcf. 3 — 4-pedale. Racemo solitario terminali (falcato, spithameo — dodrantali); Spiculis maximis, subsessilibus, solitariis, (intra axin concavum, margine glabrum) uniserialibus, imbricatis, elliptico-ovatis, acutis, villosis; Gluma inferiore pusilla (superiore flosculos aequante); Hermaphrodito elliptico-lanceolato, laevi, apice barbato, (masculo fisso).

RADIX e culmorum basi nodosa fibrac sparsae, satis fortes, flexuosa, simpliciusculae, fuscae.

CULMUS erectus et gracilis, 3 — 4-pedalis, inferne crassitie pennae gallinaceae et sub lente tenuissime pubescens, teres, striatus, ad nodos (6, albo- l. spadiceo-barbatos) pl. min. aquosus, sub racemo, quocum nodo etiam barbato conjunctus est, tenuissimus, glaber, non nimis longe nudus.

VAGINAE totae fissae, subcarinatae, striatae, glabrae, ad fissuram inferne et ad oram pubescendo-ciliatae: inferiores arctae, internodio longiores lamina vero breviores, superiores tumidiusculae, elongatae, internodio breviores, lamina multo longiores.
LIGULA chartacea, brevis, obtusa.

FOLIA erecta, compresso-involuta, angustissima, subcoriacea, striata, glabra, glaucescendo-viridia: inferiora sesquipedalia, superiora sensim breviora, supremum angustissimum, subuliforme, interdum semipollicare.

RACEMUS solitarius terminalis, (rarissime 2 e vagina supremâ aequali-pedunculati), erectus, paulo falcatus, 5 — 8-pollicaris, basi insidens nodo pubescenti, sub quo pedunculus paulo intumescit.

AXIS foliaceus s. herbaceo-membranaceus, carinato-compressus, glaberrimus, aut totus concolor, aut ad carinam suscens, versus marginem dilutius viridis, ipso margine spadiceus, foveas unilateraliter spiculas carinae lateri interiori longitudinaliter et serie singulari affixas; singula spicula duplo latior.

SPICULAE altera super alteram uniserialiter imbricatae , basi torulo auctae (ut in *Helopodis* speciebus) globoso , in eo loco, ubi axi affixus est, pilis brevissimis stellatim harbato, ovato-lanceolatae, acutae, depressiusculae , albo-lanatae et apicibus villosis ex axi obvolvente porrectae , cum torulo lineas fere 3 longae.

GLUMAE membranaceae: *inferior* e torulo antrorsum pronata pusilla, imo plerumque obsoleta, triangularis, glabra, enervis ; *superior* s. posterior flosculos aequans, ovato-lanceolata, acuta, obsolete 5-nervis , toto dorso sed potissimum inferne villis albis erectis pilosa.

FLOSCULI subparallelē: *inferior* masculus , 2-valvis: valvula exterior glumae superiori simillima sed medio depressa et longitudinaliter in duas lacinias aequales fissa , quarum utraque binervis: nervo medio, s. integrae valvulae quinto, fissura partito; valvula interior chartacea , lanceolato-ovata, subaequilonga, complanata, dissitissime binervis, glabra , marginibus hyalinis implicata. *Flosculus superior* hermaphroditus , chartaceus, lanceolato-ellipticus , depresso, albens, versus apicem pubescens et in ipso apice barbatus , masculo paulo brevior: valvula superior aquilonga , marginibus implicatis.


LODICULAE squamae (in utroque flosculo) collaterales , cuneato-quadratae , emarginatae.

OVARIUM oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosa.

STAMINA 5. **ANTHERAE** lineares.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Pars axis foliacei ab interiori visa. 2) Spicula ab anteriori, obverso flosculo masculo et glumula (*) inferiore pusilla. 3) Gluma superior a tergo. 4) Flosculus masculus ab interiori s. a tergo valvulae suae superioris, postice adparentibus laciinis valvulae inferioris. 5) Hermaphroditus. 6) Ejusdem valvula superior cum lodicula et genitalibus.



Panicum rottbolliioides.

PANICUM ROTTBÖLLIOIDES KUNTH. *R. et S. II. p. 463.*

RADIX e culmorum basi nodulosa fibrae fasciculatae, flexuosa, ramulosae, fuscescentes; interdum etiam fibra radicans e nodo uno alterove inferiori.

CULMUS erectus, fere bipedalis, satis tenuis, teretiusculo-angulatus, striatus, glaber, inferne erecto- et florifero-ramosus, ad nodos (5, glabros vel a latere fissurae vaginarum pubescentes) parum geniculatus aut aequus, infra racemum tenuissimus tandemque satis longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, striatae, internodio breviores: inferiores glandulis satis dense pilisque adspersae, laminae subacquiloniae, superiores elongatae, glabrae, lamina breviores. LIGULA brevissima, fimbriata.

FOLIA cresto-patula, lanceolato-linearia, acuta vel acuminata, satis firma et rigidula, plana, latiora lineam cum dimidia vel lineas 2 lata, striata, nervo medio vix eminentiori, brevissime pilosula, saturate viridia: inferiora bi-aut fere tri-pollicaria, sensim minora, suprema brevissima et angustissima.

RACEMUS in quovis ramo terminalis solitarius, erectus, linearis, circiter bipollicaris.

AXIS tenuissimus, viridis, flexuosus, triqueter, dorso complanatus, marginibus sub lente pubescens, fronte utrinque ad angulum septum formantem alternatim emittens PEDICELLUM simplicem, crassiusculum, sursum arcuatum, glabriusculum, persistentem, spicula multoties breviorem.

SPICULAE laxiuscule imbricatae, secundae, biserialis, elliptico-lanceolatae, acutae, hirsutae, inferne subferrugineae, superne flavae, sesquilineales, deciduae.

GLUMAE membranaceae: *inferior* (s. axi adversa) flosculis circiter quartam tertiamve partem brevior, quadrato-oblonga, truncata,

ita quasi conduplicata ut margines, superne coaliti, inferne non nisi fissuram forment, basi utrinque et ad margines pilis flavo-rufescentibus obsita, subnervis; *superior* flosculos excendens, lanceolato-oblonga, 3-nervis, inferne adpresso-pilosa: pilis spadicescentibus, glumae medium superantibus; apice bifido brevi-barbata.

FLOSCULI subparallelē: *inferior* neuter, univalvis, ob substantiam tenero-membranaceam nervosque dissitissimos duos, valvulae potius interiori cuidam simillimus, ad margines pilis rigidis hirsutus; *superior* hermaphroditus, chartaceus, lanceolato-ovatus, acutus, depressiusculus, albens, apice hispidulus, cum neutro gluma superiori paulo brevior: valvula superior aequilonga, marginibus implicata.

LODICULAE squamae collaterales, quadratae, emarginatae.

GENITALIA non vidi.

SEmen oblongum, depressiusculum, e griseo flavescens.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Spicula, a latere. 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior. 4) Flosculus neuter. 5) Hermaphroditus. 6) Ejusdem valvula superior cum lodicula et semine.
-



Pan. rottbolliodis var.


P A N I C I R O T T B Ö L L I O I D I S V A R I E T A S.

PANICUM LOLIUM NEES AB. Es. Agr. Bras. p. 102.

Praeter culmum simplicem et racemum duplo longiore, notam, qua hanc varietatem a *Pan. rottböllioide* Kth. specifice distinguam, nullam invenio. Florum analysis ad amussim eadem; quam ob rem inutile visum est, praeter spiculam integrum, singulas ejusdem partes, in tabula antecedente exhibitas, huic iterum adjicere. Vaginorum autem foliorumque indumentum in utraque varitate, ut solet, inconstans reperitur.

F I G U R A A D S P E C I M E N B R A S I L I A N U M .

289.



Panicum sclerochloa.

P A N I C U M S C L E R O C H L O A.

Def. Pl. min. pedale, repens. Racemo unico terminali (bipollicari); Spiculis maximis, biserialibus, subsessilibus, cuneatis, glabris; Glumis (coriaceis) aequalibus, flosculos aequantibus; Hermaphrodito oblongo, acutiusculo, laevi, neutro paulo minore. (Foliis lanceolatis, rigidis, breviusculis).

RADIX e culni tam basi quam nodis inferioribus fibrae plures subfasciculatae, flexuosa, valde ramulosae, albidae.

CULMUS ab ipsa basi in ramos plures divisus, aut adscendentibus et tum simplices, aut radicando-decumbentes et tum iterum ramos: rami foliiferi aut floriferi, spithamei — pedales, subangulati, sulcato-striati, glabri, ad nodos (plures et satis approximatos, glabros vel obsolete pubescentes) plus minusve sed plerumque leviter tantum geniculati, multifolii et vaginis ad thyrsum usque tecti, cum foliis vaginisque flavo-virides.

VAGINAE totae fissae, laxae, compressae, internodia subaequantes, lamina pl. min. breviores, striatae, subsulcatae, glabrae, ad fissuram obsolete-, ad oram tenui-ciliatae. LIGULA brevissima, ciliaris.

FOLIA suberecta, linearis-lanceolata, acuta vel acutiuscula tantum, plana, lineas circiter 3 lata, rigidula et satis firma, utrinque glabra, margine asperiuscula, striata et saepissime subplicato-sulcata, nervo medio vix eminentiori, in singulis ramis parum inter se inaequalia, sesqui — bi — tri-pollicaria.

RACEMUS terminalis solitarius, simplicissimus, strictus, bipollicaris, flavendo- vel fere glaucescendo-viridis, demum fuscescens.

AXIS linearis sed superne magis attenuatus, strictus, flexuosulus, dorso convexiusculus, glaber et striatus, fronte triquier ob septum medium utrinque alternatim per intervalla circiter linealia emittens PEDICELLOS solitarios, brevissimos, claviformes, laeviusculos.

SPICULAE unilaterales, biseriales, laxe imbricatae, coriaceae, compressiusculae, cuneiformes et obtusae, glabrae, lineas 2 longae, demum deciduae.

GLUMAE aequales, induratae, linearis - oblongae, compressae, carinatae, 5 - nerves: nervo medio s. dorsali multo fortiori, acutiusculae, apicis marginibus eroso - emarginatis, glabrae, flosculos aequantes: inferior ad carinam asperiuscula.

FLOSCULI subparallelis: *inferior* neuter, bivalvis: valvula exterior consistentia glumarum iisque similis, tantum nonnihil longior, supra medium utrinque ad carinam saepissime impressionibus aliquot seu scrobiculis notata; interior tertiam partem brevior, multo angustior, obtusa, membranacea, binervis, nervis dissitae et satis crassis. *Flosculus superior* hermaphroditus (*femineus?*), chartaceus, elliptico - lageniformis, albidus, haud nitens, flosculo neutrō paulo brevior: valvula superior paulo minor, acutissima, marginibus implicatis.

- **LODICULAE** squamae collaterales, linearis - quadratae, emarginatae. **OVARIUM** oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** angusta, pluinosae, atropurpurea.

SEMEN elliptico - ovatum, lutescens.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Spicula, a latere. 2) Glumarum altera a tergo. 3) Flosculi neutrius valvula superior a tergo. 4) Ejusdem valvula superior. 5) Hermaphroditus. 6) Ejusdem valvula superior cum lodicula et pistillo. 7) Semen.
-



Paspalum cuyabense

P A S P A L U M C U J A B E N S E.

Def. Bipedale et ultra. Racemo solitario; Axi aequo, glabro, foliaceo, latissimo; Spiculis submagnis, biserialibus, sessilibus, ovatis, basi marginibusque sericeo-villosissimis; Hermaphrodito glumis fere $\frac{1}{3}$ minori; Foliis angusto-linearibus, pl. min. involutis, glabris.

RADIX e basi culmorum nodulosa fibrae subfasciculatae, satis longae, flexuosa, pl. min. ramulosae.

CULMI caespitosi, erecti, plerumque bipedales aut paulo altiores, tenues, teretes, glaberrimi, obsolete striatuli, ad nodos (4 — 5, brevissimos, glabros) subaequi, simplices, tandem infra racemum non nimis longe nudi.

VAGINAE totae fissae, satis arctae, internodio inferioresque lamina breviores, striatae, glabrae, saepe ad oram pilosulae. LIGULAE loco barba pilorum brevissima subtomentosa.

FOLIA erecta, strictiuscula et firmula, linearia, striatula, glabra, basi paginae superioris pilis aliquot hirsuta, fusco-viridia: inferiora plerumque plana, lineam vel fere lin. cum dimidia lata, spithamea; superiora sensim breviora, pl. min. involuta imo subsetacea; supremum brevissimum et angustissimum.

RACEMUS unicus terminalis, erectus vel cum pedunculo angulum obtusissimum formans, basi squamula 1 — 2-lineali, membranacea, fuscescente, adpressa patulave dorso involucellatus, pollices 2 — 3 et quod excedit longus.

AXIS (partialis) compressus, expansus lineas 3 latitudine exce-
dens, glaber, dorso nervo viridicante, aequo, subcarinali notatus, lateribus lato-membranaceis spiculas premens et inclu-
dens, juxta nervum dorsalem purpureis, marginem versus spa-
dicescentibus; intus s. intra carinam medio septulum formans
angustissimum et vix prominens, parum flexuosum, e quo

utrinque alternatim erumpunt denticuli brevissimi, stellatum
barbulati, quibus affixa sunt

SPICULAE biserialis, imbricatae, ovatae, depressiusculae, flaventes,
cum lana sua, marginem axis subexcedente, circiter sesqui-
lineales.

GLUMA inferior nulla; **superior** lanceolato - ovata, acuta, sub-
complanata, chartacea, binervis: nervis prorsus marginalibus,
basi utrinque fasciculum pilorum densum, ipsius medium attin-
gentem, et e marginibus a medio ad apicem usque villos deuse
mittens erectos, albos, quorum extimi glumam longitudine
fere aequant.

FLOSCULI subparallelis: *anterior* neuter, univalvis, glumac ex toto
simillimus sed paulo brevior et angustior; *posterior* herma-
phroditus, chartaceus, pedicellulo pertenui et brevissimo insi-
dens, ovatus, acutus, depressiusculus, albens, tenuissime stri-
atus, gluma circiter tertiam partem brevior; valvula superior
aequilonga, marginibus implicata.

LODICULAE squamiae collaterales, quadratae, minimae.


OVARIUM oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosa, linearis - lan-
ceolata, ferruginea.

STAMINA 3. **ANTHERAE**

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Pars axis membranacei ab interiori, cum affixa spicula. 2) Spicula
(magis aucta) ab interiori, s. a parte glumae. 3) Flosculus neuter. 4) Herma-
phroditus. 5) Ejusdem valvula superior cum lodicula et Styli.

285.



Paspalum heterotrichon.

P A S P A L U M H E T E R O T R I C H O N.

Def. Tripedale. Racemis (3 — 7) alternis, patulis (sesqui — tripollicaribus); Axi aequo, glabro, foliaceo, latissimo; Spiculis linealibus, biserialibus, subsessilibus, ovalis, dorso sericeo - villosissimis; Foliis angusto - linearibus, glabris.

RADIX e basi culmi bulboso - inflata fibrae plurimae, fasciculatae, tenues, flexuosae, simpliciusculae.

CULMI caespitosi, erecti, graciles, pl. min. tripedales, pertenues sed firmi, teretes, glaberrimi, ad nodos (circiter 12, albo-barbulatos) aequi et ad superiorum unum alterumve subramosi, toti vaginati nec nisi parum infra racemos nudi.

VAGINAE totae fissaee, arctae, teretes, tenuissime striatae, glabrae, ad fissuram tenerime ciliatae, internodio longiores, lamina breviores. **LIGULA** membranacea, brevissima, longo - barbata.

FOLIA patula (fasciculorum brevia, patentia), linearia, plana vel (siccitate) marginibus involuta, lineam lata vel angustiora, attenuato - acuminata, firmula, glabra, vix scabriuscula, versus medium culmum longiora (circiter spithamea), suprema angustissima et breviora.

RACEMI 3 — 7, ad axin tenuissimum et filiformem, obsolete pubescentem, pl. min. tripollicarem per distantias satis regulares alterni, solitarii, sessiles, basi brevissime albo - barbati, patuli, falcatuli et paulo nutantes, plerumque ultra - bipollicares: extremis uunc reliquis longioribus, nunc brevioribus et pollicaribus tantum.

AXIS PARTIALIS foliaceus, membranaceus, compressus, spadiceus, fusco - carinatus, laevissimus, spiculas ita obvolvens, ut villosum earundem non nisi apices emergant, expansus lineas 2 latus, intus e septo medio aequo utrinque alternatim arcteque emittens **PEDICELLOS** breves, glabros, solitarios et simplices.

SPICULAE biseriales, imbricatissimae, a pedicello solubiles, lanceo-lato-ovatae, acutae, albae, cum ipsis villis lineam longae.

GLUMA *inferior* nulla; *superior* totam spiculae formam efficiens, membranacea, trinervis, marginibus satis late inflexa, ad hanc flexuram villoso-hirsuta: villis albis, aliquot productis et spicula fere duplo longioribus; basi medio barbata pilis medium glumiae attingentibus.

FLOSCULI subparalleli: *inferior* neuter, univalvis, glumam aequans, angustior, membranaceus, trinervis, praeter margines superne parce et brevi-ciliatos glaber et laevis, medio dorso exaratus. *Flosculus superior* hermaphroditus, chartaceus, lanceolato-ellipticus, acutiusculus, albus, neutro tertiam partem brevior: valvula superior aquilonga, marginibus involuta.

LODICULAE squamae collaterales, quadratae.

OVARIUM (juvenile) lineare. **STYLI** 2. **STIGMATA**

STAMINA 5. **ANTHERAE**

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Pars axis partialis ab interiori. 2) Spicula a parte flosculi neutrius. 3) Eadem a parte glumae. 4) Flosculus neuter ab interiori visus. 5) Hermaphroditus. 6) Ejusdem valvula superior cum lodicula.



Paspalum lanciflorum.

P A S P A L U M L A N C I F L O R U M.

Def. Bipedale et altius. Racemis 2 (— 3) conjugatis, erectis (subtripollicaribus); Axi aequo, glabro, foliaceo, latissimo; Spiculis maximis (3-linealibus), biserialibus, sessilibus, lanceolatis, acuminatis, basi barbatis; Foliis linearibus, papilloso-hirsutis.

RADIX e basi culmi pl. min. nodosa fibrae aliquot flexuosae, subfasciculatae, simpliciusculae, fnscae.

CULMUS erectus, tenuis et satis gracilis, bipedalis et altior, teres, striatulus, glaber, ad nodos (4 — 5, pl. min. pubescentes) aequus vel paulo geniculatus, simplex, infra racemos satis longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodio inferioresque lamina breviores, striatae, glabrae; inferiores superne e glandulis minimis pilis longis patentibus et sordide albis hirsutae; suprema elongata, superne tumidiuscula. LIGULA membranacea, decurrentis, dorso pilis longis stipata.

FOLIA erecta, firma et satis rigida, linearia, acuminata, plana, lineam et quod excedit lata, dorso nervo forti et percurrente notata, antice et praesertim margine e glandulis (neque vero dense) hirsuta pilis patulis, sordide albis, in sicco gramine (saepe una cum vaginis culmoque) pl. min. fusca, inferiora dodrantalia, superiora sensim breviora, supremum brevissimum, interdum vix ullum.

RACEMI plerumque 2 conjugati, rarius 3 digitati vel solitarius, erecti, patuli, basi villis candidis barbati, pollices 2 — 3 cum dimidio longi.

AXIS PARTIALIS foliaceus, linearis, expansus lineas 2 latus, spicula latior, apice acuto spiculas paulo excedens, glaber, dorso complanatus, herbaceus, viridis et nervo latiusculo notatus, lateribus membranacens, spadiceo-fuscescens et utrinque paulo

compressus, fronte ad septum medium utrinque alternatim emittens denticulos brevissimos pro sustentandis spiculis.

SPICULAE biserialis, sessiles, arcte imbricatae, depresso-acute, apicibus axi paulo excedentes, ovato-lanceolatae, acuminatae, lacte virides, lineas 2 cum dimidia longae.

GLUMA *inferior* nulla; *superior* totam spiculae formam ac longitudinem efficiens, ovato-lanceolata, herbaceo-membranacea, dissite trinervis: nervo medio percurrente, lateralibus tertiam partem brevioribus; basi pilis brevibus et squarrosis barbata.

FLOSCULI subparallelis: *inferior* neuter, univalvis, gluma quartam partem brevior, urceolari-ellipticus, obtusissimus, nervis 3 percurrentibus notatus, basi pilis s. villis erectis ipso triplo brevioribus barbatus, marginibus densiuscule villosus, villis supremis longioribus et utrinque porrectis. *Flosculus superior* hermaphroditus, chartaceus, ellipticus, acutiusculus, minute pedicellatus, neutro quartam partem glumaque dimidio brevior, glaber, albens. Valvula superior aequilonga, marginibus implicata.


LODICULAE squamae collaterales, quadratae, emarginatae.

OVARIUM oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosa.

STAMINA 5. **ANTHERAE** lineares.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Pars axis partialis ab interiori.
 - 2) Spicula a parte flosculi neutrius.
 - 3) Gluma ab exteriori visa.
 - 4) Flosculus neuter.
 - 5) Hermaphroditus.
 - 6) Ejusdem valvula superior cum lodicula.
 - 7) Genitalia.
-



Pennisetum articulare.

PENNISSETUM ARTICULARE *Tr. Diss. II.* p. 65.

RADIX e basi culmorum fibrae subfasciculatae, satis tenues, flexuosa, simpliciusculae.

CULMUS ex ima basi ramos plurimos agens (iterum subadpresso-ramos et foliosissimos) caespitem formare videtur densissimum, circumcirca decumbendo - divergente: ramis 1 — 2 pedalibus, longe plurimis foliosis tantum, paucis floriferis, angulato-teretiusculis, strictis, glabris seabbrusculisve, per intervalla pl. min. pollicaria nodis pluribus glabris interceptis, sed parum vel vix geniculatis.

VAGINAE plurimae, totae fissa, satis laxae, superne solutae, internodio longiores, lamina breviores, striatae, carinatae, glabrae vel pilis tenuibus adspersae. LIGULAE loco series pilorum brevium.

FOLIA innomera, patula, linearia, plana, lineam vel lineas duas lata, (fasciculorum angustiora), acuminata, scabriuscula, inferne hinc inde pilis adspersa, sere fastigiata, culmum floriferum aut aequantia, aut eodem non multum breviora.

THYRSUS rectus vel paulo nutans, pl. min. bipollicaris, densiusculus, ita tamen, ut spiculae singulae facile distinguantur, plerumque flavescens, in aliis purpurascens. Axis communis subaequus, subuliformis, angulatus, glaber, sparsim et undique exserens protuberantias dentiformes, spiculas ferentes.

SPICULAE subsolitariae, patulae vel sere patent, subsessiles, linear-lanceolatae, teretiusculae, non computato involucello lineas 2 — 3 longae, biflorae.

INVOLUCELLUM setae 35 — 40, non multum divergentes, hispidae, inaequales: extimae breves, interiores spiculam aequantes vel paulo superantes, intimae eadem duplo triplo longiores.

GLUMAE 2, flosculi circiter dimidio breviores, ovato-lanceolatae, acutissimae, membranaceae: *inferior*, quae paulo minor, 1-nervis, *superior* 3-nervis.

FLOSCULI 2, subparalleli: *inferior* membranaceus, neuter vel masculus, bivalvis: valvis acuminatis: exteriore 5-nervi, interiore, paulo minore, dissite binervi. *Flosculus superior* hermaphroditus, masculo vel neutro simillimus et vix etiam longitudine ab eodem diversus.

LODICULA nulla.


OVARIUM oblongum. **STYLI** 2, infra connati. **STIGMATA** angusta, plumosa.

STAMINA 5. **ANTHERAE** lineares.

SEmen ellipticum. **SCUTELLUM** ipso dimidio brevius.

FIGURA AD SPECIMEN EX INS. NUKAHIVA.

- 1) Spicula. 2) Eadem, demto involucello, a parte glumae inferioris.
 - 3) Eadem a parte glumae superioris. 4) Flosculus incompletus. 5) Hermaphroditus. 6) Genitalia. 7) Semen.
-



Pennisetum purpureum.

RADICEM non vidi.

CULMUS decumbens (procum dubio), sesqui — bi-pedalis, per intervalla pl. min. palmaria plurinodis et ramosus, ad nodos per breves et glabros acquis vel geniculatus, teres vel leviter angulatus, glaberrinus, parte inferiore vix striatus et pennae corninae crassitudine, superne pertenuis, plerumque fere ad thyrsum usque vaginatus, sed, in adultioribus ramis, infra thyrsum nonnumquam satis longe nudus. Internodia stricta. Rami parum patuli, omnes floriferi.

VAGINAE totae fissae, satis arctae, internodio inferioresque lamina breviores, rainorum solutae, striatae, glabrae, rarius ad fissuram superne ciliatae, virides, demum enim reliquis partibus fuscescentes. LIGULAE loco pili longiusculi, rigidi.

FOLIA patula, linearia, attenuato-acuminata, plana, lineam, lineas duas vel cum dimidia lata, undique retrorsum aspera, sub lente glandulis minimis, adpresso-piliferis adspersa, inferiora et adultiora spithamea, juniora et superiora breviora.

THYRSUS cuiusvis raini terminalis, strictiusculus, palmaris vel fere spithameus, primum e viridi gilvescens, demum fuscescens, dense floriferus, angustus (lineam vel sesquilineam diametro aequans). *Axis communis* strictus, aequus, glaber, scrobiculis protuberantissime approximatissimis undique exasperatus, pro densissime exserendis spiculis sessilibus adpressis.

SPICULAE arcte imbricatae, sessiles, lancolato-ellipticae, teretiusculae, lineam vel vix lineam longae, glabrae, biflorae, involucellatae.

INVOLUCELLUM setae circiter 9, erectae, longitudine maxime inaequales, dorsum hispidulae: aliae spicula triplo duplo breviores, tenuiores; aliae spiculam pl. min. aequantes vel paulo

superantes, paulo fortiores; unica reliquis crassior, spicula ter quaterve longior, a parte glumae inferioris posita.

GLUMA *inferior* nulla; *superior* tenui-membranacea, totam spiculae longitudinem efficiens, acutiuscula, 5-nervis: nervis pertenuibus: medio in aciculam s. cuspidem brevem excurrente.

FLOSCULI 2, subparalleli: *inferior* neuter vel masculus, membranaceus, bivalvis: valvula exterior gluma quartam circiter partem brevior, acutiuscula, 5-nervis, subcuspidata; interior paulo minor, dissite binervis. *Flosculus superior* hermaphroditus, chartaceus et demum subcoriaceus, linearis-ellipticus, superne angustior, obtusiusculus, flosculo incompleto sere tertiam partem, gluma sere duplo minor, albens: valvula superior aequilonga, inclusa.

LODICULA nulla.

OVARIUM linearis-ellipticum. **STYLI** connati. **STIGMATA** angusta, plumosa.

STAMINA 5. **ANTHERAE** lineares.

FIGURA AD SPECIMEN E SIERRA-LEONE.

1) Spicula involucellata. 2) Gluma superior. 3) Flosculi incompleti valvula inferior. 4) Ejusdem valvula superior cum staminibus. 5) Hermaphroditus ab interiori s. a fronte visus. 6) Genitalia.

SPECIES FASCICULI VIGESIMI QUARTI.

- 277. *Helopus brachystachys Tr.*
- 278. *Helopus grandiflorus Tr.*
- 279. *Panicum ansatum Tr.*
- 280. *Panicum petrosum Tr.*
- 281. *Panicum rotthöllioides Kunth.*
- 282. *Pan. rotthöllioidis var: P. Lolium Nees ab Es.*
- 283. *Panicum Sclerochloa Tr.*
- 284. *Paspalum cujabense Tr.*
- 285. *Paspalum heterotrichon Tr.*
- 286. *Paspalum lanciflorum Tr.*
- 287. *Pennisetum articulare Tr.*
- 288. *Pennisetum parviflorum Tr.*

Adjecta est *Phlei alpini tenuis* tabula nova, loco
Tab. 22. *Fasc. II.*

S P E C I E S
G R A M I N U M

ICONIBUS ET DESCRIPTIONIBUS ILLUSTRAVIT

D. C. B. *Triniius*,
ACAD. SC. PETROP. SODALIS.

F A S C. XXV.

P E T R O P O L I.
IMPENSIS ACADEMIAE IMPERIALIS SCIENTIARUM.

A c a d e m i a e j u s s u.

P. H. Fuss.



Briza barbata

B R I Z A B A R B A T A *Tr. in Act. Petr. nov. Ser. T. I. p. 563.*

C A L O T H E C A B A R B A T A N. AB Es. *Agr. Bras. p. 477.*

R A D I X e basi culmorum nodulosa fibrae plurimae, fasciculatae, longae, flexuosulac, ramulosae, albidae.

C U L M U S circiter pedalis, subprocumbendo - erectus, pertenuis, teres, striatus, glaber, ad nodos (quorum basin versus 3, glabri) infimis geniculatus et erecto - floriferoque ramosus, tandem sub panicula longe nudus.

V A G I N A E totae fissae, culmeae arctiusculae, ramificationum hiantes, internodio paulo inferioresque lamina breviores, subcariñatae et compressiusculae, striatae: infimae glabriusculae, superiores e tuberculis sparsim pilosae: pilis patentibus, albis. L I G U L A brevissima, simplicata.

F O L I A erecta, linearia, acuminata, plana, lineam circiter lata, undique pilosula, fasciculorum breviora (pl. min. bipollicaria), culmea circiter digitalia, suprema parum minora.

P A N I C U L A erecta, patula vel patens, lucidissima, ultrapalmaris. *Axis communis* tenuis, subaequus, teretiusculus et scabriuscus, 5 — 7 - parus, per distantias regulares alternatim emitens *radios* solitarios, filiformes, patulos vel subpatentes, rectos vel paulo arcuatos, scabriuscules, ad axillas minutim barbatos, pl. min. pollicares, unifloros vel medio ramulum perinde uniflorum et pateutem emittentes, superne glandulis sparsim obstitos et sub spicula paulo incrassatos.

S P I C U L A E orbiculato - obovatae, obtusae, subtetragono - compressae, lineas 3 longae, ex albo et purpureo variae, circiter 10 - florae.

G L U M A E membranaceae, carinatae, compressae, praeter nervum carinalem scabrum crenates, acutae et ex apice brevi-setigerae, flosculis infimis paulo breviores: *inferior* lanceolato - oblonga,

persistens, *superior* paulo longior et fere duplo latior, cordato-oblonga, cum flosculis demum decidua.

FLOSCULI imbricati, per racheos articulos brevissimos invicem cohaerentes: *Valvula inferior* membranaceo-chartacea, compressa et in hoc statu lato-cuneata, expansa labelliformis, trinervis: nervo dorsali s. carinali infra apicem obtusissimum in setam excurrente scabram, purpuream, valvula sesquiloniorem, in flosculis superioribus sensim minorem, rectam, paulo reflexam; nervis lateralibus arcuatis, percurrentibus: singulis, praesertim inferne, pilis rigidis, albis appressisque barbatis. *Valvula superior* tertiam partem brevior, multo angustior, obtusa, plicato-compressa et hanc ob rem dorso profunde canaliculata, a latere visa sublinearis et paulo supra basin recta adscendentem inflexa, ad hunc flexurae angulum barbam villorum rectam densaque emittens, ad nervos 2, dissitissimos, utriusque lateris carinales, ciliata.

LODICULAE squamiae lanceolato-oblongae.

OVARIUM cuneatum. **STYLI** 2. **STIGMATA** ramulosa.

STAMINA 3. **ANTHERAE** parvae, cordatae.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Gluma inferior. 2) Gluma superior, utraque expansa. 3) Perianthii valvula inferior a latere visa. 4) Ejusdem valvula superior a latere, cum lodicula et genitalibus.

290



Briza maxima

Page 290

RADIX e culmi basi fibrae plures, fasciculatae, ramulosae.

CULMUS erectus pl. min. pedalis, teretiusculus l. subcompressus, simplex vel inferne erecto-ramiferus, ad nodos (3—4, glabros) aequus vel paulo geniculatus, striatus, glaber, tandem sub panicula pl. min. longe nudus.

VAGINAE totae fissac, laxiusculae, superne interdum paulo amplatae, internodio et superiores lamina breviores, striatae, glabrae. LIGULA membranacea, circiter lineam longa, obtusissima, suberosa, pl. min. decurrentis.

FOLIA erecta, linearia vel sere lanceolato-linearia, acuta, plana, lineas 2 vel minus lata, striata, nervo medio inferne paulo distinctiori, asperiuscula, non multum inaequalia (radicalibus tamen plerumque duplo brevioribus): 2—5-pollicaria.

PANICULA subovata, apice nutans, subsecunda, pauciflora, pl. min. bipollicaris. *Axis communis* pertenuis, teretiusculus, glaber, flexuosulus, 2- (rarius 1-) — 5-parus, per distantias regulares et sensim breviores emittens radios tenuissimos et subcapillares, binos solitariosque, basi callosos, aequos vel flexuosulos, plerumque cernuo-incurvos, scabros, uni-vel bi-floros, ipsos tali modo formantes PEDICELLOS spicula plerumque longiores, infra illam hinc in nodulum tumescentes.

SPICULAE ovatae vel ovato-subrotundae, lineas 5—9 longae, compressae, e viridi-flavo et purpureo variae, demum spadiceae vel fulvae, cernuac, 7—17-florae.

GLUMAE compresso-concavae, subaequales (aut inferiore satis breviori), lato-ovatae, acutae, glabrae, flosculis insimis tertiam partem vel magis breviores, 9-nerves, dorso purpureae, margine flavendo-membranaceae.

FLOSCULI distiche imbricati, articulis racheos solubilis brevissimis, tenuissimis et glabris inter se juncti. *Valvula inferior* latissime cordato-ovata, compresso-concava, acuta saepe cum mucronulo, 7-vel obsolete 9-nervis: nervis intus distinctioribus, lateralibus fasciculato-divergentibus et abbreviatis; inferiorum flosculorum aut tota glabra, aut (ut in fig. 2.) dorso ad medium usque pilis apice glandulosis et brevissimis hirsuta; superiorum apice a medio pilis adspersa. *Valvula superior* paulo brevior et duplo angustior, obovata, obtusissima, complanata, dissipissime binervis, ad nervos fimbriata, membranacea, alba.

LODICULAE squamae collaterales, tenerrimae, ovato-lanceolatae, acutae.

OVARIUM obcordatum, glabrum. STYLI 2. STIGMATA ramosa, alba.

STAMINA 3. ANTHERAE lineares.

SEmen obcordatum, complanatum, pericarpio superne libero.

FIGURA AD SPECIMEN HISPANICUM.

- 1) Glumarum altera. 2) Perianthii valvula inferior a latere (prominente racheos articulo deflexo). 3) Ejusdem valvula superior. 4) Genitalia cum lodicula. 5) Semen.
-





Briza media.

RADIX e basi culmorum nodulosa, plerumque transverse subrepido - prolongata et stolonem unum alterumve brevem foliiferum emitte fibrae pluriimae, tenues, ramulosae, albidae.

CULMUS erectus, 1 — 2 - pedalis, tenuis et satis gracilis, teres, tenuistriatus, ad nodos (2 — 3, glabros) aequus vel vix geniculatus, simplex, demum sub panicula longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodiis superioresque elongatae lamina multo breviores, striatae, glabrae, saepe asperiusculae, superne paulo intumescentes. LIGULA membranacea, truncata, lineam dimidiad et quod excedit longa, interdum pl. min. decurrens.

FOLIA erecta, linearia vel fere lanceolato - linearia, vix acuta, plana, lineari vel lineas duas lata, striata, nervo medio parum distinctiori, scabriuscua, laete viridia: fasciculorum palinaria vel sesquipalmaria, culmea sensim breviora, supremum saepe brevissimum.

PANICULA erecta, lucidissima, patens, lato - ovata, pl. min. quadruplicaris. *Axis communis* pertenuis, teretiusculus, pl. min. hispidus, inferne aequus superne flexuosulus, plerumque atropurpurascens, rarius viridis, 5 — 7 - parus. Radii per distantias regulares sensim breviores, huius, tenuissimi, patentes, hispiduli, ad medium usque nudi et aqui, tunc trichotomi radiolis iterum binis (rarius solitariis) subcapillaribus, superne flexuosulis, plerumque unifloris, excurrentibus in PEDICELLUM glabrum, saepissime recurvum, apice noduloso - incrassatum.

SPICULAE subrotundo - ovatae vel, dum florent, cordatae, ob tenuissimos radioles tremulac, circiter lineas 2 et dimidiad longae, lineas fere 3 latae, compressae, e viridi, albo et purpureo eleganter variae, rarius praeter margines albentes virides, 5 — 9 - florae.

GLUMAE compresso - concavae, superne subampliores, in mucro-nulum abeuntes, subaequales, dorso viridulæ, tum lato purpureæ, margine membranaceo quartam circiter totius lateris partem occupante albo, flosculis suis distincte breviores, rarius eosdem subaequantes, trinerves.

FLOSCULI distichi, imbricati, sensim minores. *Valvula inferior* glumis forma et compressione similis ejusdemque coloris, latovata, basi contracta in callulum glabrum cum reliquis constituentem racheos solubilis articulos brevissimos, margine inferne in auriculam utrinque producto, 7 — 9 - nervis: nervis extus minus intus magis distinctis, quinque subperecurrentibus, reliquis lateralibus inferne fasciculatis et abbreviatis. *Valvula superior* multo angustior, paulo brevior, oblonga, complanata, apice obtuso emarginata, dissitissime viridi-binervis, marginibus implicatis, alba.

LODICULAE squamae collaterales, lanceolato-ovatae, acutae.

OVARIUM oblongum, glabrum. STYLI 2, breves. STIGMATA rainosa, alba.

STAMINA 5. ANTHERAE exsertae, lineares, flavae.

FIGURA AD SPECIMEN PETROPOLITANUM.

1) Spicula. 2) Perianthii valvula inferior a latere. 3) Ejusdem valvula superior ab interiori. 4) Genitalia cum lodicula.

272



Beccia minor.

Poppe del

BRIZA MINOR L. *Tr. in Act. Petr. nov. Ser. I. p. 362.*

RADIX e basi culmorum nodulosa fibrae plurimae, pertenues, simpliciusculae, fasciculatae.

CULMUS digitalis — dodrantalis et altior, compressiusculus, tenuissime striatus et scabriusculus, basi florifero - ramosus, ad nodos (2 — 3, glabros) pl. min. geniculatus et hanc ob rem saepe subprocumbendo - erectus, tandem infra paniculam non longe nudus.

VAGINAE totae fissae sed inferne arcte includentes, superne laxae, internodiis inferioresque lamina breviores, paulo compressae, striatae, glabrae, cum foliis lacte virides. LIGULA tenuimembranacea, linearis - lanceolata, folio angustior eique intus adnata, apice libero vel eodem ipso folio adhaerente.

FOLIA erecta, lanceolato-linearia (vel, in minoribus, linearia et angustissima), acuta, plana, lineam vel lineas duas lata, striata, nervo medio reliquis non crassiori, asperiuscula, non multum inaequalia, sesqui — tri-pollicaria.

PANICULA ovata, lucida, demum valde patens, 2 — 3-pollicaris.

Axis communis pertenuis, teretusculus, scabriusculus, subaequus, plerumque 5 — 6-parus. Radii per distantias regulares, sensim minores, bini, rarius solitarii, tenuissimi, aequi, laeviusculi, medio vel supra medium trichotomi: radiolis iterum trichotomis, subcapillaribus, aequis, plerumque unifloris et sic PEDICELLOS formantibus, sub spicula nodoso-inflatis.

SPICULAE latissime cordata vel subtriangulares, lineam circiter longae, fere lineas duas latae, compressae, ex albo et viridi variae, 5 — 7 - florae.

GLUMAE compresso-concavae, apice cucullatae, subaequales, dum spiculae florent patentissimae, flosculis suis longiores, trinerves:

nervis dorso approximatis, singulis linea viridi utrinque septis, margine latissimo, membranaceo, albo.

FLOSCULI distichi, imbricati, sensim minores, decidui. *Valvula inferior* compresso-cucullata et sic oblonga, acutiuscula vel pl. min. obtusa, basi callulo insidens minuto, articulum emittente brevissimum, cum reliquis rachin constitcente solubilem; medio utrinque 3-nervis: nervis basi fasciculatis fasciamque viridem formantibus, dorso marginaque membranaceo albis, glabris. *Valvula superior* paulo brevior, plus duplo angustior, complanata, oblonga, acutiuscula, alba, dissitissime binervis, marginibus membranaceis angustis inflexis, ad flexurae angulos ciliata pilis crassiusculis, inferne longioribus; rarius nudiuscula.

LODICULAE squamae collaterales, ovato-lanceolatae, tenerrimae.

OVARIUM turbinatum, hinc gibbum. **STYLI** 2, breves. **STIGMATA** ramosula, alba.

STAMINA 3. **ANTHERAE** lineares, flavae.

SEmen obcordatum, compressum.

FIGURA AD SPECIMEN E ROSSIA AUSTRALI.

1) Spicula. 2) Perianthii valvula inferior a latere 3) Ejusdem valvula superior a fronte. 4) Pistillum cum lodicula a latere. 5) Semen.

293.



Beckmannia spicata.

Type del

BRIZA SPICATA SIBTH. *Tr. in Act. Petr. nov. Ser. I. p. 361.*

RADIX e basi culmorum fibrae plures, tenues, villosae, simpliciusculae, albidae, fasciculatae.

CULMI e radice aliquot erecti, spithamei vel ultrapedales, pertenues et subfiliformes, teretes, glabri, vix striati, simples, ad nodos (2 — 3, glabros) aequi vel pl. min. geniculati, infra paniculam, ubi tenuissimi, plerumque longe nudi.

VAGINAE totae quidem fissae sed inferne arcte includentes, sensim paulo intumescentes, internodiis superioresque (elongatae) lamina breviores, striatae, glabrae. LIGULA membranacea, acuta, amplectens: inferiorum foliorum brevior, superiorum longior, saepe lineis duabus longior.

FOLIA patula, perangusta, linearia, attenuato-acuta, plana lineam dimidiad lata, vel angustiora et compressa, striata, asperiuscula, sensim paulo minora: culmorum humiliorum pollicaria et breviora, altiorum pollices 2 — 3 longa.

PANICULA erecta, linearis - angustata et saepe quasi racemum referens, densiuscula, viridis, pollicem vel fere pollices tres longa. *Axis communis* pertenuis, flexuosus, teretiusculus, superne planiusculus angulis scalbris, glaber, per distantias linearum 2 — 4 alternatim exserens radios adpresso-erectos, simples, plerumque secundos, 1 — 4-floros: PEDICELLIS brevissimis, glabris.

SPICULAE ovatae, pl. min. acutae, tumidae, paulo compressae, 5 — 7-florae, erectae vel subnutantes, lineas 2 vel cum dimidia longae.

GLUMAE subaequales, oblongae, compresso-concavae, glabrae, herbaceo-membranaceae, margine subscarioso angustissimo, trinerves: nervo medio in mucronulum excurrente, lateralibus

infra apicem convergentibus, flosculos infimos nunc subaequantes, nunc (etiam in speciminibus Tauricis) iisdem distincte breviores.

FLOSCULI subdistiche imbricati, callo subobsoleto et rachin solubilem vix perceptibilem constituenti insidentes, oblongi, acuti vel acutiusculi. *Valvula inferior* consistentia glumarum, mucronata, 5-nervis, nervo medio percurrente, reliquis infra apicem desinentibus, margine angustissime subscariosa, inferne ad valvulae tertiam circiter partem pubescens, pube tamen in aliis speciminibus obsoleta. *Valvula superior* aequilonga, paulo angustior, membranacea, complanata, dissitissime binervis, ad flexurae angulos inferne scabriuscula.

LODICULA squamae 2, ovarium acquantes, ovatae, acutae.

OVARIUM oblongum, glabrum. **STYLI** 2, breves. **STIGMATA** ramosa, alba.

STAMINA 5. **ANTHERAE** lineares, luteae.

FIGURA AD SPECIMEN TAURICUM.

1) Spicula (glumis flosculis infimis brevioribus). 2) Glumarum altera. 3) Flosculus ab interiori visus. 4) Valvula inferior. 5) Valvula superior ab interiori. 6) Genitalia juniora cum lodicula. 7) Ovarium magis evolutum.



Briza trileba.

RADIX e culmorum caespitis basi nodulosa fibrae tenues, fasciculatae, ramulosae, albidae.

CULMI erecti, pedales vel sesquipedales, teretes, scabriusculi, striati, simplices, ad nodos (1 vel 2, glabros) pl. min. geniculati, tandem infra paniculam satis longe nudi.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodio inferioresque lamina breviores, striatae, sursum asperiusculae: superior elongata, lamina longior. LIGULA membranacea, brevis, obtusa, plerumque lacera.

FOLIA erecta, linearia et, excepta una alterave fasciculorum lamina complanata, involuta, fimbria, striata, scabriuscula, spithamea — dodrantalia (minorum minora), superius brevius.

PANICULA erecta vel paulo nutans, lineari-lanceolata, lucidula, palmaris vel paulo longior, virescens. *Axis communis* flexuosulus, satis tenuis, teres, scaber, circiter 5-parus, per distancias regulares, sensim breviores, emittens radios basi subadpresso-erectos, scabros: aut solitarios et ab ipsa basi discedentes in radiolos iterum ramulosos, aut binos: altero tum circiter a medio ramuloso. PEDICELLI sub spicula paulo incrassati, eaque paulo vel duplo triplo longiores.

SPICULAE ovato-oblongae, linea pl. min. longiores, ob valvularum nervos dorsales marginesque prominulos subtetragonae, virides, 6—12-florae.

GLUMAE concavae, herbaceo-chartaceae, flosculis infimis breviores, persistentes: *inferior* oblonga, acuta, 3—5-nervis; *superior* paulo major et duplo latior suborbiculata, mucronulata, margine scarioso-membranacea, 7—9-nervis.

FLOSCULI imbricati, racheos solubilis articulis brevissimis et glabris inter se juncti, demum decidui. *Valvula inferior* orbiculato-

cuneata, complanato-concava, medio, ubi demum semine gibba redditur, herbaceo-chartacea, margine lato et praesertim superne membranaceo quasi triloba: lobis lateralibus utrinque subauriculato-productis, medio in dente, flosculorum inferiorum brevissimum, superiorum sensim longiore excurrente; nervis distinctis 3 ad 5 notata, ita tamen, ut nervorum lateralinum basis praeterea nervos 2 — 4 abbreviatos et obsoletos fasciculatim emittat. *Valvula superior* fere dimidio brevior et angustior, subrotunda, complanata, marginibus implicatis, glabris.

LODICULAE squamae collaterales, lineari-obovatae.

OVARIUM (maturescens) obcordatum, complanatum. STYLI 2, breves. STIGMATA ramosula, alba.

STAMINA non vidi.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Spicula (6-flora). 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior. 4) Perianthii valvula inferior. 5) Ejusdem valvula superior cum ovario matuscente et lodicula.



295.



Elytrigia multisetosa

Page 101

RADIX e basi caespitis densi, hinc inde stolones emittentis, fibrae plurimae, fasciculatae, ramulosae, albidae.

CULMI palmares — spithamei, obliqui erective, tenues et subfili-formes, ad nodos (2, glabros) aequi vel ad infimum geniculati, simplices, teretiusculi, striatuli, laeves, superne longe nudi.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, lamina et in culmis adultioribus internodio breviores, striatae, glabrae. LIGULA e ciliis bre-vissimis densisque conflata.

FOLIA erecta patulave linearia, plana, lineam lata et angustiora, acuta, striata, scabriuscula, inferne in pagina superiore sae-pissime pilis adspersa, pro statura plantae pollicaria — ultradi-gitalia, e laete viridi glaucescentia.

RACEMI compositi *axis communis* pl. min. pollicaris, tenuis, com-presso - triqueter, striatus, glaber, 3 — 4-parus, per inter-stitia 5 — 3 - linealia exserens dentem subcuneatum, pubescen-tem, pro sustentandis racemulis patentibus alternis sed hetero-mallis, demum deciduis. *Axis partialis* circiter semipollicaris, apice subulato tertiam longitudinis suaे partem nudus, supra • canaliculatus, subtus pro insertione spicularum alternatim den-ticulatus, inferne lateribus villoso - pubescens.

SPICULAE fasciculum s. scopas referentes imbricato-secundae 3 — 6, cum subulis pollice multo longiores, pallidae et fere albentes, solitariae, sessiles, pseudo - biflorae.

GLUMAE membranaceae, linear-lanceolatae, rostrato - subulatae: *inferior* angustior, tertiam circiter partem aut duplo brevior, uninervis: nervo crasso, dorso hispido; *superior* flosculo com-pleto longior, sub - 3 - nervis: nervo medio crasso, glabro, excurrente in subulam, saepe utrinque membranaceo - auri-culatam.

FLOSCULI insidentes callo brevi, conico, pilosulo: *inferior* compleatus, bivalvis: valvula inferior chartacea, basi obsolete pubescens, oblonga sed compresso-concava, trinervis: nervis crassiusculis, singulis excurrentibus in subulam ipsa valvula duplo longiore, hispidam: media utrinque aucta setula membranacea; lateralibus intus tantum brevissime auriculatis. Valvula superior lanceolato-linearis, aequilonga, bicostata et bisubulata, glaberriina: subulis brevibus, hispidulis. — *Flosculus superior* sterilis, e subulis pluribus (ad 13) conslatus, ut videatur (et ut ab illustr. NEESIO AB Es. describitur) constans e flosculis 3—4, singulis trisetis (in speciminiibus nostris autem basi arcte in fasciculum connatis): setis flosculum completum longissime superantibus: aliis pollice longioribus, aliis brevioribus et tenuioribus.

LODICULAE squamae in flosculo completo 2, cuneatae.

GENITALIA non vidi.

SEmen lineari-oblongum, spadiceum.

FIGURA AD SPECIMEN MONTE-VIDENSE.

1) Glumae. 2) Gluma superior a tergo visa. 3) Flosculi, sejuncti. 4) Hermaphroditii valvula inferior. 5) Ejusdem valvula superior semen obvolvens, basi adjectis squamis lodiculae.



Streptochaeta specata.

Page 36

STREPTOCHAETA SPICATA SCHRAD. N. AB ES. *Agr. Br.* p. 537.

LEPIDEILEMA LANCIFOLIUM *Tr. in Act. Petr. nov. Ser. I.* p. 93.

RADIX e basi culmi nodulosa fibrae satis validae et longae, flexuosa, ramulosae.

CULMUS pl. min. sesquipedalis, erectus, teretiusculus, striatus, glaber vel altero latere linea hirta notatus, plerumque nodis pluribus glabris interceptus, subaequis, simplex aut erecto- et florifero-ramosus, ad apicem usque vaginatus.

VAGINAE laxae, subcompressae, totae fissae, lamina superioresque internodio breviores, striatae, margine superne ciliatae. LIGULAE loco linea hirta.

FOLIA patula, ovato-lanceolata, plana, acutissima, nunc pollice angustiora nunc fere pollices duos lata, saepe in pseudopetiolum brevem basi attenuata, substantia satis tenui, medio nervo percurrente et praeterea nervis pluribus tenuioribus hisque inter se venulis transversalibus conjunctis notata, superficie asperiuscula, palmaria — spithamea, non multum inaequalia, saturate viridia, demum cum reliquis partibus fuscescentia.

CADUCEUS terminalis, erectus, solitarius, perangustus, spithameus vel brevior. Axis flexuosus, subtriqueter, pubescens, 8 — 12-parus, per distantias satis regulares alternatim emittens dentem brevissimum et hirtum pro exserendis spiculis.

SPICULAe alternae, solitariae, sessiles, erectae, axi adpressae, axeos interstitia aequantes vel iisdem longiores, obtuse-teretes, primum dilute virides, demum subfuscescentes, non computata canda in quam exeunt pollice paulo breviores, diametro baseos vix lineam excedentes.

INVOLUCELLUM arce cingens, coriaceum, duplex: *exterius* brevius: squamae 4 — 6 subimbricatae, pl. min. parallelae, glabrae, lineam et quod excedit longae (interdum breviores), nunc, si pauciores, latiores (lineam latae), nunc, si plures, angustiores: aliae, eaeque exteriores, lanceolato-acutae, aliae truncatae; omnes apice et in margine superne inaequaliter et pl. min. profunde inciso-dentatae, 5 — 7-nerves: nervis crassis, saepissime supra ipsorum basin furcato-partitis, apicibus

suis tantum non semper in squamae dentes sed juxta eos excurrentibus; (squamarum nonnumquam ea, quae axi proprius adjaicit, nervum dorsalem infra medium avulsum processi instars. setae crassioris dorsoqne spinulosae, squama ipsa brevioris, emittit). *Involucellum interius squamae* 2 — 3 elongatae, coniventes, cuneato-lanceolatae, concavae, subparallelae, tamen altera alteram vaginantes, glabrae, 7 — 9 nerves: exterior, quae paulo latior et longior, totam spiculae longitudinem efficiens, axi lateraliter adstans, attenuata in caudam praelongam, superne capillaceam et adeo cirrhosam, ut et reliquis et axi ipsi complexa adhaereat; interiores squamae tertiam partem breviores, acutissimae.

GLUMAE 2, aequales, concavae, longitudine totius spiculae, forma et substantia squamarum involucelli interioris, 9-nerves, acuminate.

PERIANTHIIUM hivalve: *Valvula inferior* glumis ad amussim similis; *superior* subaequilonga, hyalina, involuta, linearis, nervis 6 tenerrimis (quorum tamen 2 vel 4 paulo distinctiores) subobsolete notata, amplectens genitalia.

LODICULA nulla?

STAMINA non vidi. (6, monadelpha, antheris linearibus *Nees ab Es. l. l.*)


OVARIUM oblongum, glabrum. **STYLUS** 1. **STIGMATA** 3, simplissima, subinclusa, sub lente denticulata.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

Analysis in tabula separata.

- 1) a — f. Squamae involucelli exterioris. 2) Involucelli interioris squama exterior. 3) Ejusdem squamarum interiorum altera. 4) Glumarum altera. 5) Perianthii valvula inferior. 6) Ejusdem valvula superior stylum obvolvens. 7) Eadem expansa. 8) Pistillum.
-

297.



Steptochaetae spicatae anal.



Urtica lappacea.

Engrd

UNIOLA LAPPACEA *Tr. in Act. Pet. nov. Ser. I. p. 558.*

CENTHOTHECA LAPPACEA DESV. *R. et S. II. p. 531.*

RADIX e basi culmi nodulosa fibrae subfasciculatae, ramulosae, fuscescentes.

CULMUS (videtur) obliquus vel decumbendo-ascendens, 1 — 2-pedalis, teres vel compressiusculus, inferne crassitudine pennae corvinae aut gallinaceae, simplex vel paulo ramosus, ad nodos (7 — 10, breves, glabros) subaequus aut paulo geniculatus, striatus, glaber, tandem infra jubam non longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodio longiores, lamina breviores, striatae, glabrae, ad oram interdum minute ciliatulae, cum foliis saturate virides. LIGULA membranacea, brevis, ciliata.

FOLIA patula, lanceolata, acuta, plana, lineas 6 — 9 lata, substantia satis tenui et tenui-striata, punctulis s. lineolis transversim positis praesertim in pagina inferiori scabriuscula, satis numerosa, culmea sesquipalmaria vel semipedalia, inferiora et superiora paulo breviora.

JUBA terminalis recta, sesquipalmaris — dodrantalis, primum patula, demum patentissima, multiflora, glaucescens.

AXIS tenuis, aequus, striatus, glaber, superne paulo angulatus, absque ordine et lucidule exserens radios solitarios vel binos pluresve pseudoverticillatos, pertenues, rectos, aequos vel vix flexuosulos, primum erectos et interduin subfastigiatos, demum patentissimos, racemiformes, scabriusculos, parum compositos: inferiores saepe 4 — 5-pollicares, basi nudos, superiores sensim breviores et a basi floriferos. Ramuli tenuissimi et subcapillares, solitarii, alterni, parum patuli, inferiores ad summum 3-flori, superiores uniflori, cum PEDICELLIS, spicula vix brevioribus et apice brevissime barbulatis, hispidi.

SPICULAE linear-i-oblongae 1. lanceolatae, lineam cum dimidia vel lineas duas longae, compressiusculae, 2 — 3-florae, tandem una cum pedicello deciduae.

GLUMAE dissitiusculae, nodo quaevis proprio pedicelli affixa, herbaceae, margine submembranaceae, compressae, flosculis suis fere dimidio breviores: *inferior* paulo minor, ovato-lanceolata, 3 — 5-nervis, apice brevi-cuspidata; *superior* linear-i-lanceolata, acuminato-acuta, 5 — 7-nervis.

FLOSCULI lanceolati, substantia glumarum, bivalves: *valvula inferiore* satis obsolete 7-nervi, cuspidato-acuminata, flosculi intimi sessilis laevi, superiorum, racheos articulis glabris insidentium, apicem versus e nervis marginalibus glandulosa et e glandulis primum erecto-demum refracto-pilifera: pilis brevibus, solitariis, rigidis; *valvula superior* membranacea angusta, paulo brevior, plicata, dissite binervis, superne ad nervos hispida.

LODICULAE squamas pusillas non satis distincte vidi ut depingi potuissent; **PALISOTIO** obovatae, subtruncatae dicuntur.

OVARIUM linear-i-oblongum, glabrum. **STYLI** 2. **STIGMATA** angusto-plumosa.

STAMINA 3. **ANTHERAE** parvae, linear-i-oblongae.

SEmen minimum, oblongum, fusco-spadiceum, *scutello* ipso fere dimidio breviori.

FIGURA AD SPECIMEN EX INS. TAITI.

- 1) Spicula (billora, adultior). 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior.
4) Flosculus intimus. 5) Ejusdem valvula superior. 6) Flosculi superioris valvula inferior explanata. 7) Flosculus extimus. 8) Genitalia. 9) Semen.
-

299.



Urtica spicata.

U N I O L A S P I C A T A W I L D.

Tr. in Act. Petr. nov. Ser. I. p. 359.

RADIX sub terra agens sarmenta squamata fibras emittentia tenues, flexuosa, raimulosas, albentes.

CULMI plures e trunko subterraneo, densus saepe caespitem constituentes, erecti, pl. min. stricti, spithamei — pedales, nunc inia basi sola ramoso-juncti et reliquam partem simplices, nunc et altius erecto-ramosi, tenues et interdum tenuissimae, teretes, laeves, ad nodos (plurimos, glabros) aequi vel parum geniculati, valde foliosi, tandem infra thyrum pl. min. nudi.

VAGINAE arctiusculae, totae fissae, internodio longiores, lamina breviores, striatae, glabrae, ad orae latera saepissime pilis aliquot munitae. LIGULA brevissima, ciliaris.

FOLIA erecta vel patula, plurima, subdisticha, angusta: in gramine altiori et vegetiori planiuscula, fere lineam lata nec nisi superne involuta, in minori tota involuta, subsetacea; firma, glabra, striata, 1 — 2 — 4 - pollicaria, non multum inaequalia.

THYRSUS nunc simplicissimus, lucidus nec nisi e spiculis aliquot solitariis et brevi-pedicellatis constitutus, nunc pl. min. densus, compositus e radiolis 2 — 3-floris, imbricatis, basi tum saepe interruptus, linearis, 1 — 2 - pollicaris, pallidus. *Axis communis* subaequans, tenuis, subangulatus, glaber, per interstitia, longiora vel brevissima, aequalia vel inaequalia, exserens radiolos erectos, brevissimos, 1 — 3 - floros, PEDICELLIS glabris, brevissimis.

SPICULAE erectae, teretiusculae vel compressiusculae, ovato-lanceolatae, lineas 3 — longae, 3 — 9 - floriae, stramineae.

GLUMAE ovato-lanceolatae, acutissimae, concavae, firmae, glabrae, flosculis suis diuidio breviores: inferior 1 — 3 -, superior 3 — 5 - nervis: nervis obsoletis.

FLOSCULI omnes completi, arce imbricati, basi attenuati in st-ipi
tem brevem et glabrum, alterum alteri impositum singulisque
stipitibus sic rachieos spiculae articulos formantibus. *Valvula*
inferior ovata, acuta, convexa, coriaceo-chartacea, marginibus
membranacea, 9—11-nervis; *superior* subaequilonga, con-
duplicata, basin dorsi versus gibba, bicostata, ad costas tener-
rime sed dense pubescens, superne attenuata, apice bidentata.

LODICULAE squamae ovarium margine amplectentes, lato-cuneatae,
oblique et submarginato-truncatae, nervis tenuibus notatae.

OVARIUM lineari-lanceolatum, compressum. STYLI 2. STIGMATA
exserta, linearia, plumosa.

STAMINA non vidi.

SEMEN compressum, dorso gibbum et profunde sulcatum.

FIGURA AD SPECIMEN CANADENSE.

1) Spicula. 2) Flosculus sejunctus. 3) Valvula inferior. 4) Valvula su-
perior. 5) Pistillum, adjectis squamis lodicularibus. 6) Semen.

300



Uniola thalassica.

UNIOLA THALASSICA *Tr. in Act. Petr. nov. Ser. I. p. 359.*

MEGASTACHYA THALASSICA *R. et S. p. 590.*

RADIX mihi ignota.

CULMUS prostratus, repens, nodis innumeris approximatissimisque interceptus, totidem squamis tectus imbricatis, ovato-lanceolatis, acutissimis, striatis, glabris, pl. min. semipollicaribus, versus extremitates ramosus: ramis confertis, adscendentibus, 4 — 6-pollicaribus, ad thyrsi basin usque foliosissimis.

VAGINAE (in ramis) plurimae, distiche imbricatae, totae fissaee, arctiusculae, internodio longiores, lamina multo breviores, striatae, glabrae, cum soliis glaucae. **LIGULA** brevissima, ciliaris, lateribus interdum pilo uno alterove elongato et tenuissimo aucta.

FOLIA patentia, (in ramis) plurima et approximatissima, disticha, linearia, attenuato-acuminatissima, plana (inferne lineam et quod excedit lata), vel, praesertim superne, siccitate pl. min. involuta, firma et rigidula, striata, glabra, sursum sensim longiora: inferiora (ramorum) circiter sesquipollicaria, superiora fere tripollicaria.

THYRSUS in quovis ramo terminalis, ovatus, densus ac compactus, pollice pl. min. longior, multiflorus.

AXIS COMMUNIS parum crassus, angulatus, glaber, pallidus, undique absque ordine exserens radios solitarios, erectos, brevissimos, compressiusculos et ad marginem hispidulos, fere statim a basi discedentes in radiolos brevissimos et a basi floriferos. **PEDICELLI** perbreves, complanati, sub spicula paulo latiores.

SPICULAE confertissimae et altera alteram imbricantes, compressae, lineares vel elliptico-ovatove-lineares, flavendo-pallidae, 12 — 20-florae, 6 — 10 lineas longae.

GLUMAE flosculis infimis tertiam partem vel fere duplo breviores, subcoriaceae, ovatae l. lanceolato-ovatae, acutae, subcarinatae,

compressae: inferior superiore tertiam partem brevior 3 - l.
sub - 5 - , superior 5 - nervis.

FLOSCULI aequales, consistentia glumarum, lanceolato-ovati, di-
stichi, compressi, in specimine quod coram est omnes seminici
cum rudimentis staminum: infimus sessilis, reliquorum quivis
axicolo racheos brevissimo, tenui et glabro affixus. *Valvula*
inferior lanceolato-ovata, acuta l. submucronata, glabra, ner-
vis 7 (accidente interdum uno altero obsoleto) tenuibus no-
tata. *Valvula superior* paulo brevior, valde compressa et bi-
carinato-plicata, acuta, ad carinas tenui-ciliatula.

LODICULAE squamae 2 (interdum connatae?), tenui-membrana-
ceae, cuneiformes, paulo dilatae, truncatae et medio emargin-
atae, nervis aliquot tenuissimis notatae.

OVARIUM (fere maturum) ovatum, compressum, fusco-spadicum.
STYLI 2, filiformes. STIGMATA satis longa, plumosa, in sicco
gramine fuscescentia.

STAMINA 3. FILAMENTA brevia. ANTHERAE abortivae hastatae.

FIGURA AD SPECIMEN EX AMERICA AEQUINOCTIALI.

1) Spicula (11-flora). 2) Gluma inferior (expansa). 3) Gluma superior
(aeque expansa). 4) Flosculus (e superioribus). 5) Ejusdem valvula inferior a
tergo. 6) Valvula superior a latere. 7) Squamae lodiculares. 8) Ovarium ma-
turescens cum stylis stigmatiferis et stamiibus abortivis.

SPECIES FASCICULI VIGESIMI QUINTI.

- 289. *Briza barbata Tr.*
- 290. *Briza maxima L.*
- 291. *Briza media L.*
- 292. *Briza minor L.*
- 293. *Briza spicata Sibth.*
- 294. *Briza triloba N. ab Es.*
- 295. *Eutriana multiseta N. ab Es.*
- 296. *Streptochaeta spicata Schrad.*
- 297. Ejusdem analysis.
- 298. *Uniola lappacea Tr.*
- 299. *Uniola spicata Willd.*
- 300. *Uniola thalassica Tr.*

Accedit *Anthoxanthi gracilis* tabula nova, loco
Tab. 15. *Fasc. II.*

S P E C I E S
G R A M I N U M

ICONIBUS ET DESCRIPTIONIBUS ILLUSTRAVIT

D. C. B. *Trinius*,
ACAD. SC. PETROP. SODALIS.

F A S C. XXVI.

P E T R O P O L I .
IMPENSIS ACADEMIAE IMPERIALIS SCIENTIARUM.

A c a d e m i a e j u s s u.

P. H. Fuss.



Campuloclinium aciculatum

C A M P U L O S U S A C I C U L A T U S.

Def. Crista solitaria; Seta glumae superioris brevissima; Flosculis neutris ciliatis, fertili glabro; Setis neutrorum valvulis multo-, fertilis sua duplo longioribus; Rudimento duplici.

RADIX e culmorum basi nodulosa fibrae dense fasciculatae, flexuosaliae, simpliciusculae, albae.

CULMI caespitosi, erecti, circiter sesquipedales, teretes, substriati, glabri, ad nodos (3, glabros) aequi vel vix geniculati, simplices, ad cristam usque vaginati, infra eandem pubescentes.

VAGINAE totae fissa, inferne arctiusculae, superne pl. min. intumescentes et solutae, internodio inferioresque lamina breviores, superiores sensim longiores, striatae, glabrae. LIGULA membranacea, brevissima, lacera.

FOLIA erecta, siccitate saepe incurva, perangusta, linearia, attenuata, a basi concavo-plana (siccitate?) involuta, striata, glabra, asperiuscula, pl. min. sespuipalmaria, sensim paulo breviora; cum culmo vaginisque consistentia firma.

CRISTA terminalis solitaria, erecta, apice falcato-recurva, in specimine quod coram est quadripollicaris, pallide viridis, densissime pectinata.

AXIS perangustus, aequus, dorso convexus, fronte pro recipienda spicularum basi scrobiculis bifariam notatus, apice sensim attenuatus flosculosque extimos paulo superans, basi in nodulum pubescentem tumescens.

SPICULAE unilaterales, biserialis, densissime imbricatae, ab axi pectiniformi - patentes, lineares, perangustae, una cum setis 5 — 6 lineas longae, pedicello s. potius nodulo pilosulo affixae.

GLUMAE membranaceae: *inferior*, quae intus posita, tenerior, flosculis tertiam partem-, gluma superiore subquadruplo brevior, oblongo-lanceolata, subcarinato-uninervis: carina inferne papillis munita, apice in setulam excurrente gluma triplo breviorem; *superior* lanceolato-linearis, flosculis duplo longior, binervis: nervo altero carinam formante, ad medium usque

papilloso, dehinc hispido, infra glumae apicem bidentatum exente in setulam brevem et scabram; altero, margini lateris sui propiori, laevi, medio soluto et in aciculam abeunte erecto-patulam, brevissimam.

FLOSCULI membranacei, conniventes, subquinque, basi brevissime stellatim barbati: exteriores seu insini duo suboppositi, neutri, univalves, lanceolati, 3-nerves, e nervo dorsali infra apicem setam emitentes rectam, tenuem, scabram, ipsis fere quintuplo longiorem, e nervis lateralibus s. marginalibus ciliati pilis albis, sensim longioribus (nec densis longisque): inferior, flosculo intermedio tertiam partem brevior, apice obtusissimus; superior, flosculo eodem paulo brevior, acutus, superne e margine inter cilia pilos aliquot praelongos porrigens. Inter hos positus est flosculus tertius, bivalvis, *masculus* (nam et aliae hujus generis species dioicae inveniuntur), basi stellatim brevi-barbatus, bivalvis: valvula inferior lanceolata, glabra, sub 5-nervis: nervis exterioribus dorsalique infra apicem obtusiusculum confluentibus et excurrentibus in setam, setis neutrorum pl. min. breviorem; valvula superior aequilonga et aequilata, apice bidentata, dissite binervis, nervis carinalibus scabriusculis. Ad basin hujus valvulae superioris *flosculus neuter*, plerumque duplex: alter interior, aequilongus, pedicellatus, subclavae-formis; alter exterior, pusillus, sessilis, squamulaeformis (saepe deficiens).

LODICULAE squamiae pusillae, cuneatae, emarginato-truncatae.

OVARIUM inter stamina flosculi majoris lineare, ut videtur abortiens, absque stylis.

STAMINA 3. FILAMENTA brevissima. **ANTHERAE** lineares, flavac.

FIGURA AD SPECIMEN SENECALENSE.

1) Gluma inferior. 2) Gluma superior. 3) Flosculi. 4) Flosculus neuter inferior a latere. 5) Flosculus neuter superior a tergo. 6) Flosculus masculus cum rudimentis.



Campuloclinium brachystachyus.

Fig. 1

CAMPULOSUS BRACHYSTACHYUS N. AB Es.

Agr. Bras. p. 417.

RADIX e culmorum basi tumida et squamata fibrae sparsae, firmae, simpliciusculae.

CULMI caespitosi, erecti, 1 — 2 - pedales, teretes, striatuli, inferne tenuissime superne distinctius pubescentes, simplices, ad nodos (3, glabros) plerumque paulo geniculati, tandem infra cristam pl. min. longe nudi.

VAGINAE radicales plurimae, imbricatae, squamiformes, aphyllae, adustae, saepe lacerae; culmcae totae fissae, laxiusculae, superne paulo tumescentes, infimae perbreves, superiores internodio pl. min. breviores lamina longiores, striatae, punctulis exasperatae, cum soliis fusco - glaucae. LIGULA membranacea, perbrevis, truncata, lacera.

FOLIA erecta, fasciculorum angustissima et subsetacea, culmea paulo latiora, tamen vel in majoribus vix lineam lata, superiora angustiora, pl. min. involuta, omnia satis firma, rigidula, striata, glabra, marginibus hispidula, pl. min. digitum longa, superiora sensim sed non nimis breviora.

CRISTAE e nodo viloso - pubescente oriundae aut solitaria, aut duae conjugatae atque tum nonnumquam brevi - pedunculatae, pl. min. retrorsum falcatae, lineares, crassiusculae, obtusae: solitariae breviores, circiter sesquipollulares, conjugatae bipollulares et ultra; e fusco - glauco alboque (villorum) variae.

AXIS tenuis, aequus, dorso convexus, in gramine monostachyo scaber, in distachyo pubescendo - hirtus; fronte pro exserendis spiculis bifarium scrobiculatus.

SPICULAE unilaterales, distichae, imbricatissimae, patulae, angustae, elliptico - lineares, non computatis setis lineis duabus paulo longiores, sessiles.

GLUMA *inferior* membranacea, quadruplo brevior, lanceolato-ovata, acuta, uninervis, nervo scabro, apice plerumque in setulam brevem excurrente; *superior* firmior, fusca, totam spiculae longitudinem efficiens, flosculis, non computatis villis, longior, obtusiuscula, sed saepe etiam dentata, binervis: nervis crassis: altero percurrente plerumque glandulis obsito, altero in media

gluma avulso et setam formante patentem, gluma parum breviorem (quandoque nullam s. non avulsam); interdum nervus tertius subobsoletus, non percurrens, unde tuin setula e nervo intermedio exire dici possit.

FLOSCULI membranacei, basi stellatim albo - barbati: exteiiores 2 oppositi subaequales, completo paulo breviores, lanceolato - oblongi, acuti, 3 - nerves, nervo medio infra apicem in setam producto valvulam longitudine aequantem vel paulo superantem, margine, praesertim superne, villis albis dense ciliati: *inferior* univalvis, sterilis, *superior* bivalvis, neuter l. masculus, valvula superiore breviori et angustiori, binervi, bidentata. *Flosculus intermedius* hermaphroditus: valvula inferiore lanceolato - oblonga, trimervi, marginibus superne dense villosa, apice hispida, infra apicem emitte setam ipsa plerumque paulo breviorem; valvula superiore subaequalonga, angustiore, teneriore, dissitissime binervi, marginibus implicatis, ad flexuram angulos brevissime ciliata. Ad basin valvulae superioris accedunt flosculi 3: exterior sessilis, cuneatus, brevissimus, squamiformis; interior pedicellatus, masculus, hermaphroditum aequans, linearis - ellipticus, bivalvis: valvulis subaequalibus, subglabris, muticis; atque ad hujus valvulae superioris basin tertius, sterilis, clavaeformis, alterum aequans.

LODICULAE squamae pusillae, cuneato - quadratae.

OVARIUM oblongum, truncato - obtusum, glabrum. STYLI 2, breves. STIGMATA plumosula.

STAMINA 5. ANTHERAE lineares, flavae.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

A, Distachya planta. 1) Gluma inferior. 2) Gluma superior. 3) Flosculus neuter inferior. 4) Superior bivalvis. 5) Flosculus hermaphroditus cum accessoriis. 6) Genitalia cum lodicula, antheris delapsis?*. 7) Accessorii flosculi pedicellati.

* Plantae monostachyae flosculus intermedius mihi semper masculus. distachyae semineus visus est, filamentis abortivis. — Reliqua quae in descriptione nostra ab ill. Neesii ab Es. descriptione differre videntur, non magni discriminis sunt.

323.



Campulocladus chapadensis.

Pape del

C A M P U L O S U S C H A P A D E N S I S.

Def. Crista solitaria binisve conjugatis; Seta glumae superioris ipsa dimidio breviori; Flosculis omnibus ciliatis; Setis valvulis suis subtriplo longioribus; Rudimento solitario.

RADIX e caespitis basi, ob squamas laceras innumeras tumida, fibrae plurimae, fasciculatae, tenues, flexuosa, simpliciusculae.

CULMI in caespite conferti, erecti, 2 — 3 pedales, satis graciles, teretes, striatuli, glabri, superne pubescentes, ad nodos (3, glabros) aequi vel parum geniculati, simplices, tandem sub crista longe nudi.

VAGINAE totae fissae, arctiusculae, internodio inferioresque lamina breviores, striatulae, glabrae, utrinque ad ligulam pl. min. longe auritae: radicales plurimae, imbricatae, breves, squamiformes, lacerae. LIGULA membranacea, brevissima, truncata.

FOLIA erecta, perangusta, setiformi-involuta nec nisi juniora planiuscula, firma et strictiuscula, striatula, deorsum asperiuscula: fasciculorum dodrantalia, culmea inferiora spithamea, superiora pl. min. digitalia, sensim breviora; fuscescendo-glaуca.

CRISTA terminalis solitaria aut duae conjugatae, pollices 4 — 6 longae, culinorum tenuiorum et breviorum interdum vix pollares, retrorsum falcatae, colore foliorum.

AXIS angustus, aequus, dorso convexo-planus, laevis, fronte pro exserendis spiculis bifariam scrobiculatus.

SPICULAE unilaterales, distichae, imbricatissimae, erecto-patulae, angustae, lineares, non computatis setis lineas tres longae, sessiles.

GLUMA *inferior* membranacea, quadruplo brevior, lanceolato-ovata, uninervis, nervo in scutulam excurrente; *superior* totam spiculae

longitudinem efficiens, firmior, suscens, acuminatissima, binnervis: nervis glanduloso - hirtis: altero percurrente, altero in media gluma avulso et abeunte in setam, basi bulbosam, gluma paulo breviorem, patentem.


FLOSCULI membranacei, gluma superiore plus duplo breviores, quatuor: exteriores oppositi steriles, univalves, basi barbatuli, lanceolati, trinerves, nervo medio infra apicem excurrente in setam rectam valvula circiter triplo longiorem (in planta distachya breviorem l. valvula vix duplo longiorem): *inferior*, paulo brevior, obtusus, margine brevius-, *superior*, acutus, longius villoso - ciliatus. Inter hos *flosculus completus*, neutros paulo excedens, lanceolatus, bivalvis: valvula inferior obtusiuscula, trinervis, infra apicem setam emissens ipsa subduplo longiorem, margine superne longe villoso - ciliata; valvula superior aequilonga, dissite bicostata, glabra. Ad hujus basin *flosculus accessorius* pedicellatus, clavatus, ipsam aquans, sterilis.

LODICULAE squamas et GENITALIA non vidi.

SEmen oblongum, utrinque acutiusculum; *Scutellum* ipso dimidio brevius.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Gluma inferior. 2) Gluma superior a tergo. 3) Flosculus neuter inferior.
4) Flosculus neuter superior. 5) Flosculus completus cum quarto sterili. 6) Semen.
-



Campuloclinium cirrosus.

CAMPULOSUS CIRROSUS N. AB ES. Agr. Br. p. 416.

RADIX e culmorum basi subnodulosa fibrae tenues, breves, albae, simplices.

CULMI plures conserti, neque vero ex eadem radice prodeentes, bi — 3-pedales, erecti et graciles, pennae passerinae crassitie, teretes, substriati, scabriusculi, ad nodos (5 — 7, breves, glabros) aequi, basi interdum erecto-ramosi, tandem infra cristam pl. min. longe nudi.

VAGINAE totae fissae, inferiores solutae, superiores laxae et paulo ampliatae, internodio inferioresque lamina breviores, obsolete striatae, glabrae. LIGULA chartacea, brevis, rotundata, saepe lacera.

FOLIA erecta, linearia, acuminata, firmula, plana, lineam et quod excedit lata vel plura involuta, striata, in pagina superiore punctulato-scabra, in inferiore glabra, dodrantalia vel spithamea, sensim paulo breviora.

CRISTA terminalis, erecta, retrorsum falcata, 2 vel fere 6 pollices longa, densissime pectinata, flava, setis intortis secundis eleganter comata.

AXIS aequus, tenuis, dorso convexus, glaber, intus pro recipiens spiculis bifariam scrobiculatus.

SPICULAE unilaterales, distichae, imbricatissimae, patulae, angustae, lineares, compressiusculae, non computatis setis lineas tres longae, PEDICELLO brevissimo hirto insidentes.

GLUMAE membranaceae: *inferior*, quoad axin intus posita, flosculis brevior, lanceolata, acuminata, subcarinato-uninervis, ad nervum scabra; *superior*, dorso extus spectans, flosculis longior, lanceolato-linearis, obtusa vel pl. min. acuta, binervis: nervis inferne glandulis (interdum pilis brevissimis) obsitis: altero infra medium soluto et in setam abeunte scabram, patulam, gluma breviorem.

FLOSCULI chartaceo-membranacei, trinerves, subparallelis, subquinque: exteriore seu insimi duo suboppositi neutri, univalves: *inferior* reliquis brevior, lanceolatus, acutus, ad margines (e nervis, ut in reliquis, formatos) sensim longius ciliatus, infra apicem membranaceum emitens setam tenuem, scabriuscum, rectam, ipso duplo longiorem; *superior* hermaphroditum aequans, linearis-lanceolatus, marginibus perinde ciliatus, sub apice excurrens in setam validam, pollicarem, scabram, luteam vel medio rufescensem, late flexuoso-retortam. Inter hos flosculos exsurgit *hermaphroditus* bivalvis: valvula inferiore dorso neutrum inferiorem spectante, lanceolata, setiformi-acuminata, marginibus a medio ciliata pilis sensim longioribus; valvula superiore aequilonga, tenera, linearis, binervia, glabra. Accedunt inter hujus valvulas interiorem flosculumque neutrum superiorem *rudimenta* bina, membranacea, 3-nervia, marginibus denticulata, angustissima: exteriori cuneato, brevissimo; interiori pedicellato, subclavata, hermaphroditum aequante.


LODICULAE squamiae pusillae, subcollaterales, quadratae.

OVARIUM oblongum, hinc gibbum, glabrum. STYLI 2. STIGMATA elongata, plumosa, flavida.

STAMEN 1. ANTHERAE . . . (lineares N. AB Es.)

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Spicula integra. 2) Glumae. 3) Gluma superior a tergo. 4) Flosculi, obverso flosculo neutro superiori. 5) Flosculus neuter inferior. 6) Hermaphroditus adstantibus rudimentis. 7) Haec rudimenta seorsim. 8) Hermaphroditus valvula inferior. 9) Ejusdem valvula superior. 10) Genitalia cum lodicula (filamento absque anthera).



Chloris acuminata.

Paper del.

C H L O R I S A C U M I N A T A.

Def. Cristis plurimis; Glumis inaequalibus: superiore integra, acuta, infra apicem aciculata, inferiore duplo longiori, périanthium acuminatum margine villosum subaequante. *)

RADIX e basi culmi nodulosa fibrae plurimae, subfasciculatae, simpliciusculae, spadicescentes.

CULMUS erectus, ultrabipedalis, crassitie pennae cygneac, angulato-compressus, striatus, glaber, simplex, ad nodos (3, breves, glabros, fuscos) aequus, infra cristas non longe nudus, cum foliis vaginisque lacte viridis.

VAGINAE totae fissae, laxae et superne pl. min. tumidiusculae, compressae, carinatae, striatae, glabrae, inferiores internodio breviores laminam aequantes, superiores sensim magis elongatae, lamina longiores. LIGULA e ciliis confertissimis brevissimisque conflata.

FOLIA erecto-patula, sublanceolato-linearia, obtusa acutave, plana vel, praesertim inferne, compressa et carinata, lineas 3 — 6 lata, satis firma, striata, undique glaberrima: inferiora culmea pollices 4 — 6 longa, supremum brevissimum.

CRISTAE 9 — 30, fasciculatae, confertissimae, erectae, subarcuato-flexuosulae, lineares, 4 — 5 pollices longae.

AXIS COMMUNIS vix pollicaris, (si cristae pauciores, nullus) crassitie pennae passerinae, subangulatus, glaber, fasciculatim sparsimque emittens *axes partiales* tenues, filiformes, triquetros, ima basi subnudos, hispidos, extus canaliculatos et alternatim bifariamque exserentes denticulos spiculas ferentes.

*) a maxime affini *distichophylla* differt foliis, et perianthio acuminato nec obtuso.

SPICULAE unilaterales, biserialis, imbricatae, subsessiles, patulae, compressiusculae, lanceolato-ellipticac, lineam longac, deciduae glumis persistentibus.

GLUMAE membranaceae, acutae, uninerves, pallide virides: *inferior* duplo brevior, oblonga, ad nervum denticulata; *superior* flosculos subaequans, lanceolata, saepe ad marginem unum alterumve inferne denticulata, prope infra apicem e nervo emittens aciculam brevissimam.

FLOSCULI coriacei, e spadiceo fusci: *inferior* hermaphroditus, sessilis: valvula inferior elliptico-lanceolata, glumam superiore vix superans, triquetro-compressiuscula, acuminata, trinervis, dorso glaberrima, margine (s. e nervis marginalibus) dense longeque ciliata, ciliis patentibus albis; valvula superior subaequialonga, angustior, spathulata, dissitissime binervis, ad nervos pubescentes. *Flosculus superior* angustior, brevissime stipitatus, aequivolongus, nunc sterilis et univalvis, nunc rudimenta genitalium sovens et bivalvis: valvula inferior elliptico-linearis, triquetro-compressa, obtusa et subemarginata, undique glabra; superior, si adest, plerumque duplo brevior, angustior, hyalina.

LODICULAE squamae pusillae, quadratae, subcollaterales.

OVARIUM turbinatum, glabrum. STYLI 2. STIGMATA angusta, plumosula.

STAMINA 5. ANTHERAE breviusculae, lineares.

SEMEN elliptico-lineare.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Glumae. 2) Flosculi completi valvula inferior. 3) Ejusdem valvula superior a tergo, explanata. 4) Genitalia cum lodicula. 5) Semen. 6) Flosculus superior incompletus, bivalvis.



Chlorella turbata.

RADIX e caespitis basi nodulosa fibrae plurimæ, fasciculatae, ramulosae, satis longae.

CULMI suberecti vel divergendo - procumbentes, pl. min. pedales, angulato - compressi, striati, glabri, simplices aut ad nodum unum alterumve subramosi, ad nodos (3 — 5, glabros) superiores aequi, ad inferiores plerumque geniculati, tandem sub cristis satis longe nudi, basi saepe purpurei.

VAGINAE totae fissaæ, laxiusculæ, plerumque solutæ, internodio inferioresque lamina breviores, striatae, glabrae, carinato - compressæ: radicales plurimæ, confertissimæ et saepe amethystinæ, culmeæ sensim longiores. LIGULA membranacea, brevissima, pilis longis tenuissimisque stipata.

FOLIA linearia, perangusta, plana vel siccitate marginibus pl. min. involuta, alia compressa, lineam dimidiæ, saltem vix lineam lata, attenuato - acuminata, glabra, basin versus interdum e glandulis minimis pilis adspersa, cum vaginis culmoque glauca: inferiora 1 — sesqui - palmaria, culmea sensim breviora.

CRISTAE 2 — 12, digitatae, erectæ, fastigiatae, pollicares 1. sesquipollulares, e viridi, albo et purpureo variae, basi barbulatae.

AXIS partialis tenuissimus, aequus, triqueter, pubescendo - hispidulus, fronte concavo alternatim pro exserendis spiculis denticulatus.

SPICULÆ unilaterales, biseriales, imbricatae, patulae, linear - cuneatae, linea parum longiores.

GLUMAE membranaceæ, lanceolatae, acutissimæ, compressæ, 1 - nerves, glabrae: *superior* flosculos aequans vel parum excedens, ad carinam scabra, *inferiore* tertiam partem vel fere dimidio longior.

FLOSCULI 3, subfastigiati: *inferior* hermaphroditus, sessilis, barba piloruni stipatus, a latere visus lanceolato-ellipticus: valvula exterior angusto-ephippiiformis s. triquetro-compressa, coriacea, pallida, expansa obovata, obtusiuscula, 3-nervis: nervo dorsali s. carinali infra apicem excurrente in setam hispidam, purpuream, valvula triplo longiorem, ad nervos laterales s. marginales a medio ad apicem albo-barbata, dorso villis brevibus adspersa; valvula interior aequilonga, angustior, membranacea, acuta, dissite binervis. *Flosculi 2 superiores* pedicellati, aquales, neutri, univalves, coriacei, e purpurascente pallidi, urceolato-obovati, compressi, truncati, infra apicem setam ferentes setae hermapliroditi aequalem et concolorem.

LODICULAE squaniae pusillae, oblongae.

GENITALIA non vidi. SEMEN linearis-ellipticum, subtriquetrum.

FIGURA AD SPECIMEN DOMINGENSE.

1) Glumae. 2) Flosculi. 3) Flosculi inferioris valvula inferior explanata, a tergo. 4) Ejusdem valvula superior cum lodicula. 5) Semen. 6) Flosculi steriles pedicellati.



Chloris ciliata

RADIX e basi caespitis nodulosa fibrae plurimae, pl. min. fasciculatae, flexuosa; ramulosae, albidae.

CULMI pedales, sesquipedales et altiores, erecti vel adscendentes, satis tenues, teretes aut inferne paulo compressi, glabri, tenuissime striati, simplices, ad nodos (4, glabros) aequi vel pl. min. geniculati, tandem infra cristas non longe nudi.

VAGINAE totae fissa; laxiusculae, internodio et, excepta suprema elongata, lamina breviores, striatae, glabrae. LIGULA brevissima, obsolete simbriata.

FOLIA erecta, linearia, attenuato-acuminata, in planta vegeta lineas duas lata, in macriori linea angustiora, fasciculorum involuta, glabra vel basin versus in pagina superiore et margine scabro pilis, saepe longis, adspersa, glaucescentia, pro statura graminis spithamea — palmaria, culmea sensim minora, supernum saepe brevissimum.

CRISTAE terminales 4 — 5, digitatae, erectae, contractae, sesqui — bi-pollicares aut paulo longiores, canescentes.

AXIS PARTIALIS angustissimus, aequus, triquierter, margine hirtus, fronte excavato alternatiim et bifariam emittens PEDICELLULOS brevissimos, pubescentes.

SPICULAE unilaterales, biseriales, imbricatae, patulae, cuneatae, linea longiores.

GLUMAE membranaceae, lanceolatae, compressae, carinato-unerves, ad carinam hispidulae, persistentes: *inferior* flosculus tertiam partem brevior, acuta, *superior* flosculos aequans, acuminata.

FLOSCULI 3 — 4, coriacei, fastigiati, decidui, saepe omnes bivalves: *inferior* sessilis, hermaphroditus, basi barbatus, major;

superiores pedicellati, sensim minores, basi nudi, neutri. *Valvula inferior* ephippiiformis, a latere visa suboblique truncata, expansa autem oblonga et pl. min. acuta, pallida, trinervis: nervis lateralibus marginalibus, superne conniventibus; flosculi sessilis margine dorsoque dense ciliato-villosi et flosculi pedicellati primi paulo infra apicem emitens setam hispidam, nunc valvulae longitudine, nunc (plerumque) eadem breviorem; reliquorum pedicellatorum mutica et glabra. *Valvula superior* aequilonga, chartacea, lanceolata, acuminata, demum subcomplanata, dissitissime binervis: flosculi completi, quo junior est, eo magis ad nervos ciliato-similiata.

LODICULAE squamae oblongae, glabrae.

GENITALIA non vidi.

SEmen cuneato-oblongum, triquetrum, spadiceo-fuscum.

FIGURA AD SPECIMEN DOMINGENSE.

- 1) Glumae. 2) Flosculi. 3) Flosculi insimi valvula inferior expansa, a tergo.
4) Valvula ejusdem superior, adultior, a fronte, cum lodicula. 5) Eadem valvula,
junior, a tergo. 6) Semen. 7) Flosculi pedicellati, neutri.
-



Chloris distichophylla.

CHLORIS DISTICHOHYLLA LAG. R. et S. II. p. 612.

CHLORIS CONFERTIFOLIA Tr. Diss. I. p. 230.

RADIX e culmi partis inferioris recta (in solum humidum vel aquosum?) descendantis nodis aliquot ab invicem remotis fibrae tenues, flexuosa, satis longae, ramosae.

CULMUS erectus, pl. min. bipedalis, compresso, glaber, striatus, ad nodos (versus medium culmum confertissimos, plurimos et glabros) aequus, tandem infra cristas non nimis longe nudus.

VAGINAE totae fissa, laxae et (excepta suprema) solutae, carinato-compressae, striatae, glabrae, internodio longiores, laminam longitudine pl. min. aequantes, infra culmi medium plurimae, confertae, imbricatissimae et distichae; superiores elongatae et nonnihil ampliatae. LIGULA brevissima, in fimbrias minutis soluta.

FOLIA patula, lato-linearia, obtusiuscula vel brevi-acuta, basi compressa, dehinc plana et lineas circiter 3 lata, striata, undique glabra, firma, infra medium culmi plurima et disticho-confertissima: pl. min. palmaria, superiora breviora, extremum saepe brevissimum.

CRISTAE terminales 4 — 15 — 25, fasciculatae, erecto-patulae, 4 — 5-pollices longae, tandem fuscescentes.

AXIS communis, ubi cristae plures, brevissimus et angulatus; ubi pauciores, nullus. Partialis angustissimus, filiformis, aequus, triqueter, glaber, fronte subexcavato utrinque et alternativi ad costam medianam exserens denticulos pro sustentandis spiculis.

SPICULAE brevissime pedicellatae, unilaterales, biserialis, imbricatae, patulae, elliptico-oblongae, lineam longae.

GLUMAE membranaceae, ovato-lanceolatae, glabrae, persistentes, biflorae: *inferior* duplo aut tertiam partem brevior, acuta, uninervis; *superior* flosculos aequans vel iisdem paulo brevior:

nunc (pleruinque) uninervis, nervo infra apicem obtusiusculum excurrente in aciculam brevem, refracto - patulam ; aut (rarius) binervis et mutica (fig. 3).

FLOSCULI 2, coriacei: *inferior* hermaphroditus, sessilis, major: valvula exterior compressa s. ephippiiformis et in hoc statu lineari - elliptica, explanata oblongo - elliptica, obtusa, fusca, 3 - nervis: ad nervos laterales s. marginales, praesertim apicem versus, dense albo - ciliata; valvula interior aequilonga, acuta, membranacea, dissitissime binervis, ad flexurae angulos tenui - et brevissime fimbriata. *Flosculus superior* brevipedicellatus, neuter, univalvis, minor, compressus lineari - ellipticus, obtusus, glaber.

LODICULAE squamiae in flore fertili pusillae, oblongae, glabrae.

OVARIUM oblongum. STYLI 2. STIGMATA plumosula.

STAMINA 3. ANTHERAE lineares.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Glumae. 2) Gluma superior uninervis, aciculata. 3) Eadem binervis, mutica. 4) Flosculi inferioris valvula inferior a tergo. 5) Ejusdem valvula superior. 6) Genitalia cum lodicula. 7) Flosculus pedicellatus a latere.



Chloris equitans.

Sapote del

C H L O R I S E Q U I T A N S.

Def. Cristis subquaternis; Glumis inaequalibus: superiore integra, obtusiuscula, infra apicem setuligera, inferiore tertiam partem longiore, perianthio infra apicem setuligero, dorso longitudinaliter barbato, marginibus pilosulo quartam partem breviore.

RADIX e basi caespitis subinflata fibrae plures, subfasciculatae, simplices, albae.

CULMUS erectus, pl. min. semipedalis, compressiusculus, glaber, striatus, simplex, ad nodos (3, brevissimos, glabros) aequus, infra cristas satis longe nudus.

VAGINAE totae fissa, laxae et paulo tumentes, compressae, carinatae, ad carinam hispidulae, striatae, glabrae: radicales plurimae, confertissimae, disticho-imbricatae, patulae, laminam aequantes, culmeae sensim laminaque longiores. **LIGULA** obsoleta.

FOLIA erecto-patula, linearia, plana, vix lineam lata, obtusa, rigidiuscula, glabra, margine hispidula, cum vaginis (pallidioribus) glaucescentia: radicalia plurima, confertissima et culmea inferiora pl. min. pollicaria; supremum vix ollum.

CRISTAE erectae, digitatae, subquaternae, basi barbulatae, lineares, falcatae, sesquipollicares, spadiceo-fuscae.

AXIS partialis angustissimus, aequus, trigonus, viridi-glaucens, ad angulos hispidulus, extus alternatum et bifarium emittens denticulos s. **PEDICELLOS** brevissimos, glabros.

SPICULAE unilaterales, biserialis, imbricatae, patulae, oblongae, compressiusculae, lineam longae, e spadiceo fuscescentes.

GLUMAE chartaceae, inaequales, compressiusculae, a latere visae lanceolato-ellipticae, obtusae, uninerves: nervo pertenui; glaberrimae: *inferior* flosculo subdimidio-, superiori gluma tertiam partem brevior, integra, mutica; *superior* flosculo suo

quintam circiter partem brevior, brevi-biloba, infra fissuram e nervo emittens setulam hispidam, rectiusculam, ipsa triplo breviorem.

FLOSCULI 2, coriacei, subaequales, compressiusculi, subsessiles: *inferior* semineus (*hermaphroditus?*) oblongus, urceiformis, bivalvis: valvula *inferiori* obtusissima, apice rotundata, integra, 3-nervi: nervo dorsali ultra medium usque longitudinaliter et sensim paulo longius barbato, infra apicem excurrente in setulam brevissimam, patulam, seta glumae superioris tenuiorem; nervis lateralibus marginalibus, tenuissime ciliatis; valvula *superior* parum brevior, longitudinaliter plicata, multo angustior, elliptico-clavata, bidenticulata, dissite binervis, ad nervos pubescens. *Flosculus superior* masculus, bivalvis: valvula *inferiore* triangulari-compressa, paulo oblique truncata, undique glabra, e nervo carinali mucronulum emittente saepe obsoletum; valvula *superior* angustissima, hyalina, parum brevior.

LODICULAE squamas in neutro flosculorum distinxii.

OVARIUM (in flosculo *inferiore*) turbiatum, glabrum. STYLI 2.
STIGMATA plenosula.

STAMINA (in flosculo *inferiore* filamenta tantum elongata) in flosculo *superiori* 3. ANTHERAE lineares.

FIGURA AD SPECIMEN CAPENSE.

1) Spicula. 2) Gluma *inferior*. 3) Gluma *superior*. 4) Flosculi *inferioris* valvula *inferior* paulo ab *inferiori* visa. 5) Valvula *superior* a tergo. 6) Genitalia. 7) Flosculus *superior* masculus.



Chloris falcata.

C H L O R I S F A L C A T A Sw.

CAMPULOA HIRSUTA R. et S. II. p. 517.

RADIX e basi culmorum nodosa fibrae tenues, sparsae, flexuosa, simplices.

CULMUS erectus, sesqui — bi - pedalis, satis gracilis, compressus, glaber, tenuissime striatus, simplex, ad nodos (2, glabros vel pubescentes) aequus vel leviter geniculatus, infra cristam non longe nudus et pubescens.

VAGINAE totae fissae, inferne arctiusculae superne pl. min. solutae, striatae, radicales aliquot consertae et fasciculorum pubescendo-hirtulae lamina breviores, culmeae glabrae lamina longiores, internodio multo breviores: inferior carinata, superior compressa, clongata. LIGULA brevissima, fimbriata, utrinque pilis rigidiusculis barbata.

FOLIA erecta, linearia, acuta, aut inferne tantum aut tota compressa, linea angustiora, striata, glabra, firma, nunc incurva tantum, nunc spiraliter torta, glaucescentia: fasciculorum pl. min. sesquipalmaria, culmea breviora, supremum angustius, pollicare.

CRISTA solitaria, erecta, paulo retrorsum falcata, sesqui — tri-pollicaris, compressa, fusca.

AXIS cum peduculo articulatus, angustissimus, aequus, triquetro-compressus, dorso glaber, marginibus tenui - villosus, fronte excavato biseriatim et alternatim dense emitteus denticulos pro exserendis spiculis.

SPICULAE sessiles, secundae, biserialis, dense imbricatae, lanceo-lato - lincares, lineas tres et ultra longae.

GLUMAE membranaceae, compressae, glabrac, fuscae: *inferior* oblonga, acutiuscula, flosculis dimidio brevior, uninervis: nervo

carinali, scabro, apice in mucronulum excunte; *superior* lanceolato-linearis, acutiuscula, flosculos excedens, binervis (vel cum nervo tertio, obsoleto, laterali, non percurrente): nervis sebris: altero in apicem gluma excurrente et mucronulum formante, altero infra apicem in marginem abeunte: ambo interdum inferne coaliti.

FLOSCULI terni, coriacei, fusi, bivalves: *inferior* sessilis, basi barbatus, major, hermaphroditus; *superiores* pedicellati, basi nudi, sensim minores, neutri vel masculi. *Valvula inferior* ephippiiformis, linearis-oblonga, oblique truncata-obtusa, mutica: flosculi sessilis margine toto dorsoque, neque vero ad apicem usque, dense alboque villosa, pedicellatorum glabra; *Valvula superior* membranacea, multo angustior, paulo brevior, subconduplicata, binervis et bidentata: flosculi sessilis margine, praesertim inferne, satis longe pilosa. In flosculo sessili filaments sola, in pedicellatorum secundo genitalia nulla, in tertio stamina antherifera inveni.

LODICULAE squamae cuneato-quadratae, truncatae, emarginatae, glabrae.

OVARIUM oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosa, elongata.

STAMINA 3. **ANTHERAE** lineares.

FIGURA AD SPECIMEN CAPENSE.

- 1) Spicula a latere.
 - 2) Gluma superior a tergo.
 - 3) Flosculi.
 - 4) Flosculus inferior sessilis.
 - 5) Ejusdem valvula superior cum lodicula, filamentis et ovario.
 - 6) Flosculi pedicellati, quorum extimus staminiferus.
-

211.



Chloris foliosa

C H L O R I S F O L I O S A WILLD. *Tr. Diss. I.* p. 233.

G Y M N O P O G O N F O L I O S U S N. AB ES. *Agr. Bras.* p. 426.

R A D I X e culmi basi fibrae plurimae, fasciculatae, flexuosa, ramulosae, albidae.

C U L M U S erectus, semi-pedalis l. pedalis, tenuis, teres, laevissimus, superne striatus, simplex vel basin versus erecto- et florifero-ramosus, ad nodos (plurimos, brevissimos et glabros) pl. min. aequus, infra cristas non nimis longe nudus.

V A C I N A E totae fissae, arctiusculae, internodium laminamque pl. min. aeqnantes, plurimae, inferior basin superioris amplectentes, breves, superiores sensim longiores, striatulae, glabrae, margine obsolete villosulae, cum foliis glaucae. **L I G U L A** brevissima, fimbriata, pilis rigidiusculis satis dense stipata.

F O L I A patula et patentia, lanceolato-linearia l. sub-hastata, lineam lata vel angustiora, acuminata, concavo-plaua vel (plerumque), margine praesertim, involuta, glabra, striata, firma et pungentia, vix inaequalia, 6—9 linealia.

C R I S T A E terminales 2, 3, 4, 6, erectae, contractiusculae, ad axin communem per breve angulatum, glabrum, hinc sulcatum alternae l. subfasciculatae, basi barbulatae, uni—sesqui-bipollicares, flaventes.

A X I S P A R T I A L I S tenuissimus, depressiusculus, vix flexuosus, extus alternatim neque vero confertim exserens denticules pro sulcendis spiculis.

S P I C U L A E unilaterales, biseriali-alternae, subsessiles, erectae, lanceolato-lineares, non computando setas duas longae.

G L U M A E subaequales (inferiore tamen paulo breviori), angustae, lanceolato-lineares, acuminatae, compressae, 1-nerves, glabrae, patulae, sesquitlorae, flosculis tertiam partem longiores.

FLOSCULUS inferior stipiti linearis, subangulato, pubescenti insidens, lanceolatus, chartaceus, hermaphroditus: valvula exterior compressa, inferne, dorso et ad margines tenui-pubescentis, obsolete trinervis, infra apicem acutum e nervo subcarinali emittens setam rectam, aequam, ipsa quinque longiorum; valvula interior aquilonga, acuta, dissite binervis. *Flosculus superior* angustissimus et minutus, pedicello valvulis flosculi completi dimidio breviori et glabro insidens, membranaceus (absque dubio e flosculis s. valvulis 2 constitutus), bisetus: setis flosculo hermaphrodito triplo longioribus, rectis.

LODICULAE squamae minutae, obovatae, glabrae.

OVARIUM linearis-ellipticum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosula.

STAMEN 1? **ANTHEA** linearis.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Spicula a latere. 2) Flosculi. 3) Flosculi inferioris valvula inferior. 4) Ejusdem valvula superior cum adnato flosculo incompleto. 5) Genitalia cum lodicula.

272



Chloris pyrenothrix

RADIX aut e basi culmorum communi fibrae plurimae fasciculatae, aut e culmi decumbentis nodis inferioribus pauciores, flexuosa, ramulosae, spadicescentes vel rufescentes.

CULMI basi repentes obliqui, adscendententes vel procumbentes, spithamei — pedales, satis tenues, compressi, striati, laeves, ad nodos (2 — 3, vel, ubi repunt, plures, glabros) pl. min. geniculati, basi ramosi et ad nodos radicantes dense foliiferi, tandem infra cristas satis longe nudi.

VAGINAE totae fissae, laxae, internodio breviores, inferiores laminea pl. min. acquantes, superiores elongatae eadem longiores, carinato-compressae, striatae, glabrae. LIGULA brevissima, fimbriata villulisque aliquot teneris longisque interdum stipata.

FOLIA patula, linearia, plana, obtusissima, lineam lata, striata, margine hispidula, in pagina superiore glandulis minutis adspersa, glabra, glauca, pl. min. pollicaria, fasciculorum paulo longiora, supremum saepe vix 3 — 4-lineale.

CRISTAE 4 — 7 digitatae, rectae, deum patulae, basi pubescentes, sesqui — bi-pollicares, pallidae.

AXIS PARTIALIS pertenuis, linearis, aequus, dorso planus, margine hispidus, fronte ad costam flexuosam utrinque et alternatim exserens denticulos pro affigendis spiculis.

SPICULAE unilaterales, biserales, brevissime pedicellatae, imbriatae, adpressae, lanceolatae, lineam longae, deciduae.

GLUMAE linear-lanceolatae, acuminatae, compressae, uninerves, nervo carinali et satis crasso denticulis hispido: *inferior* flosculis dimidio-, *superior* iisdem paulo brevior vel, si longius acuminata est, eosdem aequans.

FLOSCULI 2, chartacei: *inferior* hermaphroditus, callulo brevissimo, brevi- (antrorsum paulo longius-) barbato insidens, lan-

ceolatus: valvula exterior bifido-acuta, uninervis, ad nervum marginesque scabriuscula, infra apicis dentes emittens setam rectam, ipsa 6 — 8^{ies} longiorem, scabram, purpurascentem; valvula interior aequilonga, angustior, brevi-bidentata, bicarinata, ad carinas scabra. *Flosculus superior* neuter, pedicello glabro insidens, perparvus, hermaphrodito brevior, univalvis, linearis-oblongus, obtusus, infra apicem exserens setam rectam hermaphroditum circiter triplo excedentem.

LODICULAE squamae minimae, cuneato-oblongae.

GENITALIA non vidi. SEMEN oblongo-lineare, triquetrum.

FIGURA AD SPECIMEN BAHIENSE.

1) Spicula. 2) Flosculi. 3) Flosculi hermaphroditi valvula superior cum lodicula. 4) Semen. 5) Flosculus neuter.

SPECIES FASCICULI VIGESIMI SEXTI.

301. *Campulosus aciculatus Tr.*
 302. *Campulosus brachystachys N. ab Es.*
 303. *Campulosus chapadensis Tr.*
 304. *Campulosus cirrosus N. ab Es.*
 305. *Chloris acuminata Tr.*
 306. *Chloris barbata Sw.*
 307. *Chloris ciliata Sw.*
 308. *Chloris distichophylla Lag.*
 309. *Chloris equitans Tr.*
 310. *Chloris falcata Sw.*
 311. *Chloris foliosa Willd.*
 312. *Chloris pycnothrix Tr.*
-

Accedit tabula nova *Vilfae spicatae*, loco Tab. 12. Fase. I.

S P E C I E S
G R A M I N U M

I C O N I B U S E T D E S C R I P T I O N I B U S I L L U S T R A V I T.

D. C. B. *Triniius*,
ACAD. SC. PETROP. SODALIS.

F A S C. XXVII..

P' E T R O P O L I.
IMPENSIS ACADEMIAE IMPERIALIS SCIENTIARUM.

A c a d e m i a e j u s s u.

P. H. Fuss.



Aristida eucalyptosperma

A R I S T I D A C A E R U L E S C E N S D E S F.

Tr. in *Act. Petr.* nov. ser. 1. p. 83.

RADIX e caespitis basi nodulosa fibrae validiusculae, tortuoso-fle
xuosa, ramosae, albidae.

CULMUS simpliciusculus adscendens vel quo ramosior eo magis de
cumbens, 1—3-pedalis, tenuis sed tenax internodiis strictis,
teres, obsolete striatus, glaber, ad nodos (3, breves, glabros)
aequus vel leviter geniculatus, ad inferiores pl. min. ramosus:
ramis patulis, interdum aliquot fasciculatis, floriferis, infra
paniculam pl. min. longe nudis.

VAGINAE totae fissae, arctae (ramificationum solutae), internodio
laminaque breviores, obsolete striatae, glabrae, juxta ligulam
obtuse auriculatae. LIGULA brevissima, in fimbrias soluta.

FOLIA erecta vel patula, perangusta, linearia, attenuata, marginibus
vel (juniora) tota involuta, firma et fere coriacea, striata, gla
bra, cum culmo vaginisque (basin versus non raro purpura
scentibus) glaucescendo-pallida, pro graminis statura spitha
maea — ultrapedalia, superiora breviora.

PANICULA subinterrupto-contractiuscula, satis tenera, rectiuscula,
pl. min. spithamea, e flavo-viridi purpureoque varia, demum
fuscescens. *Axis communis* tenuis, subfiliformis, aequus, su
perne scabriuscus, multiparus: *radiis* binis, inferne adpressis,
superne patulis, tenuissimis, laeviusculis, inferioribns inferne
quartam circiter partem nudis, dehinc adpresso-ramosis. PEDI
CELLI sub spicula sensim paulo incrassati, scabriuscui.

SPICULAE erectae, linearis-angustae, non computatis setis lineas
circiter 4 longae.

SOLUMAE fere lineares, subchartaceae, compressae, uninerves, cae
rulescendo-purpurascentes: *inferior* pl. min. acuta, ad ner

vum carinalem hispidula, flosculo tertiam partem vel fere dimidiio brevior; *superior* obtusa, laevis, flosculum aequans.

PERIANTHIIUM stipiti brevi, antrorsum paulo longius villosulo insidens, chartaceum, cylindraceum, perangustum, e viridi flavescens: *Valvula inferior* involuta, expansa linearis, trinervis: nervis apice in totidem lacinias s. setas excurrentibus, paulo divergentes, hispidas, subaequales (media tamen nonnihil longiori), ipsa valvula nunc fere duplo nunc non nisi parum longioribus; ad setas denticulis, inter illas punctulis seriatim exasperata; *valvula superior* multo minor et vix ovarium superans, linearis - oblonga, concava, obtusa, laevis, obsolete 5-nervis, ut videtur, inconstans.

LODICULAE squamae, deficiente valvula superiori, 3, cum filamentis alternae, linearis - lanceolatae, acutiusculae, ovario paulo longiores: 2 anterioribus tertiam dorsalem paulo superantibus; aut, praesente valvula superiori, unica, dorsalis.

OVARIUM cylindraceo-fusiforme, glabrum. **S**TYLI 2. **S**TIGMATA plumosula.

STAMINA 5. **A**NTHERAE lineares, flavae.

FIGURA AD SPECIMEN EX HISPANIA AUSTRALI.

- 1) Spicula. 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior, utraque a tergo. 4) Perianthii pars inferior stipitata. 5) Ejusdem valvula inferior expansa, abscissis setis. 6) Valvula superior cum genitalibus oppositaque squama lodiculari. 7) Valvula superior distinctius 5-nervis seorsim. 8) Genitalia cum lodicula trivalvi.
-



Trisetida gibbosa

A R I S T I D A G I B B O S A.

CHAETARIA GIBBOSA N. AB Es. *Agr. bras.* p. 383.

RADIX e basi culmorum nodulosa fibrae subsfusciculatae, flexuosae, simplicisculae, pallidae.

CULMI stricto-erecti, 2 — 3-pedales, satis tenues, compressiusculo-teretes, glaberrimi, ad nodos (6 pluresve, glabros, quorum inferiores, ramositatis loco, saepe bini approximatissimi et proinde hinc pl. min. gibbosi) aequi, ad superiores erecto- et adpresso-ramosi, iufra paniculam demum non nimis longe nudi.

VAGINAE totae fissaee, pl. min. solutae, lamina inferioresque internodio breviores, paulo compressae, striatae, glabrae. LIGULA brevissima, fimbriata.

FOLIA erecta, firmula, linearia, plana vel subinvoluta, attenuato-acuminata, lineam et quod excedit lata, glabra, cum vaginis glaucescentia: inferiora pl. min. pedalia, superiora sensim breviora.

PANICULA erecta, contracta, multiflora, densiuscula, spithamea — pedalis, subfuscescendo-straminea. *Axis communis* pertenuis, sere filiformis, aequus, scabriusculus, per distantias (inferiores sesquipollicares) sensim breviores multiparus. *Radii* terni, adpressi, tenuissimi, semiverticillati. PEDICELLI sensim sub spicula incrassati.

SPICULAE erecto-patulae, perangustae, cum aristis lineas circiter 9 longae.

GLUMAE chartaceae, lanceolato-lineares, compressae, setoso-acuminatissimae, uninerves, ad apicem setiformem scabrae, subaequales (inferiore vix paulo longiori breviorive), perianthio, non computatis setis ejusdem, tertiam et quod excedit partem longiores.

PERIANTHIUM stipiti brevi, clavaeformi et villosulo insidens, chartaceum, angusto-cylindraceum, trilineale: *valvula inferiore* involuta, superne scabra, expansa linearis, obsolete trinervia, apice divisa in setas tres, divergendo-patulas, tenuissimas, scabras, lineas 5 longas: media paulo longior. *Valvula superior* brevissima, ovario paulo longior, membranacea, concava, lanceolato-ovata, acuta.

LODICULAE squamam non nisi unam, valvulae superiori oppositam eaque breviorem, linearis-lanceolatam distinxii.

OVARIUM oblongo-cylindraceum. **S**TYLI 2. **S**TIGMATA plumosula.

STAMINA 5. **A**NTHERAE lineares, lutescentes.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Spicula. 2) Perianthium absque setis. 3) Ejusdem valvula superior cum squama lodiculari et genitalibus.



stictidae var. *Lucidum.*

ARISTIDA S^{tae} LUCIAE Tr. in Act. Petrop. nov. ser. 1. p. 83.

RADIX e caespitis basi fibrae plures, tenues, fasciculatae, flexuosae, simpliciusculae.

CULMI erecti, digitales — spithamei, pertenues et subfiliformes, compressiusculi, laeves, ad nodos (2 — 3, glabros) subaequi, simplices, tandem sub panicula pl. min. longe nudi.

VAGINAE totae fissaee, laxiusculae, inferiores internodio laminaque breviores, compressae, striatae, glabrae, plerumque purpurascentes, utrinque ad LIGULAM brevissimam, obsolete fimbriatam obtuse et brevi-auriculatae.

FOLIA perangusto-linearia, acuta, subinvoluto-compressa, striata, glabra, glaucescendo-viridia: fasciculorum et radicalia pl. min. incurva cum culmeis inferioribus erectis pollicaria vel sesquipollucaria; culmeum supremum paulo brevius.

PANICULA erecta, saepe subsecunda, contractiuscula, multiflora, sesqui — bi-pollicaris, e purpureo viridi varia. *Axis communis* tenuissimus, subaequus, subangulatus, laeviusculus, pluriparus: *radiis* subbinis, inferne adpressis, fere capillaribus, subangulatis: inferioribus pl. min. longe supra basin-, superioribus a basi divisis et floriferis. PEDICELLI sub spicula paulo iu-crassati, laeviusculi.

SPICULAE angustissimae, suberectae, cum setis circiter lineas 7 longae.

GLUMAE membranaceae, lanceolato-lineares, uninerves, compressiusculae, glabrae, purpureae, apice brevissime et angustissime bidentatae, inter dentes munitae setula brevi, scabra: *inferior* perianthio glumaque superiori tertiam partem brevior; *superior* perianthium aequans.

PERIANTHUM chartaceum, stipiti brevi, conico, barbulato insidens, cylindraceum, angustissimum, viride: *Valvula inferior*

involuta, expansa linearis, trinervis, ad setas usque lineas fere duas longa, a medio superne scabra, apice divisa in setas 3, tenuissimas, divergentes, scabras, ipsa fere triplo longiores: dorsali lateralibus parum longiori. *Valvula superior* perparva, lanceolato-oblonga, concava.

LODICULAE squamarum non nisi duas distinxii, minutissimae, valvulae superiori oppositas, lineari-lanceolatas.

GENITALIA non vidi.

SEMEN angustissimum, cylindricum.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Spicula. 2) Glumarum altera, a tergo. 3) Perianthium. 4) Valvula superior cum semine et squamis lodicularibus.



Aristida spudicea.

Dane del.

RADIX e caespitis densi basi fibrae tenues, plurimae, fasciculatae, flexuosa, ramulosae.

CULMI erecti et strictiusculi, 1 — 2-pedales, tenues, teretes, striatuli, glaberrimi, ad nodos (5, vix nisi vaginarum basis colore pallidiori distinctos, glabros) aequi, simplices vel subramosi, infra paniculam tandem non nimis longe nudi.

VAGINAE totae fissae sed arctissimae, lamina inferioresque interno-dio breviores, glabrae, striatulae, (ore pilosae Kt h.). LIGULA brevissima, obsolete fimbriata.

FOLIA erecta, perangusta, setaceo-involuta, stricta, in pagina superiore scabriuscula, dorso margineque glabra, inferiora do-drantalia, superiora digitalia et breviora, fasciculorum juniora viridia, vetustiora fusco-straminea.

PANICULA erecta, subsecunda, apice paulo nutans, contractiuscula, satis multiflora, inferne interdum interrupta, 4 — 9 - pollicaris, e fusco et primum e flavo, demum e sordide stramineo varia. Axis communis tenuissimus, subaequus, scabriusculus, pluriparus: radiis subbinis, subangulatis, scabriusculis, a basi adpresso-divisis in radiolos: inferiorum superne, superiorum a basi floriferos. PEDICELLI parum incrassati, scabriusculi.

SPICULAE angustissimae, patulae, cum setis circiter lineas 9 longae.

GLUMAE angusto-lanceolato-lineares, subchartaceae, compressiusculae, uninerves, fuscae: *inferior* ad carinam hispidula, acuminata, perianthii divisionem in setas paulo excedens; *superior*, inferiore paulo longior, glabra, apice brevissime bidentata, carina inter dentes in setulam protracta.

PERIANTHUM callulo brevissimo, obtuso, antrorsum pilosulo insidens, chartaceum, cylindraceum, primum flavesens, demum sordide stramineum: *Valvula inferior* involuta, expansa linearis,

trinervis, dorso circiter a medio superne scabra, ad divisionem usque lineas duas longa, deline divisa in setas 3, scabras, divergentes, aequas: dorsali ipsa triplo-, lateralibus eadem duplo longioribus. *Valvula superior* perparva, lanceolato-oblonga, concava.


LODICULAE squamas et

GENITALIA non vidi.

SEMEN angustissimum, cylindricum, fuscum.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Spicula. 2) Perianthium abscissis setis. 3) Valvula superior cum semine.



Panicum annacites.

Page delc.

P A N I C U M A R N A C I T E S.

Def. Sesquipedale. Paniculae (2 — 3 pollicaris) radiis subcapillaribus tortis; Spiculis bilinealibus, ellipticis, obtusis, hirsutissimis: pedicellis glabris; Glumis tenui- 5 - nervibus: inferiore flósculis fere dimidio (aut minus) breviori, superiore eosdem aequante; Hermaphrodito lanceolato - elliptico, acuto, neutrum (l. masculum) subaequante; Foliis angustissimis, subinvolutis, hirtis.

RADIX e basi culmorum squamata fibrae aliquot simpliciusculae, flexuosa, fuscae.

CULMUS erectus, pede altior, tenuissimus, teretiusculus, glaberimus, ad nodos (4 — 5, barbatos) aequus, simplex, fere ad paniculam usque vaginatus.

VAGINAE totae fissae, superne laxae, internodio longiores, striatae: radicales vetustiores squamiformes, complanatae, adustae, aphyllae, nodis confertis culmi fulvo-pilosus affixae; juniores lamina pl. min. breviores, dorso superne e punctulis hirtae; culmeae sensini-, omnes vero lamina longiores: inferiores dorso superne hirtulae, superiores glabrae. LIGULA series pilorum brevissimorum utrinque membranaceo-aurita.

FOLIA erecta, angustissima, canaliculato-subinvoluta, firma et rigidula, sulcato-striata: fasciculorum spithamea et breviora fere tota longiusque pilosa; culmea inferiora, 3 — 2 - pollicaria, inferne hirta superne glabra; superiora brevissima (interdum obsoleta), tota glabra.

PANICULA 2 — 3 - pollicaris, erecta, lucida, radiis aliis patentibus, aliis contractis.

AXIS communis tenuissimus, subangulatus, glaber, superne flexuosulus, e viridi fuscus, 6 — 7 - parus. Radii solitarii, alterni, basi barbulati, capillares, glaberrimi, cum radiolis simplicissimis, paucis (2 — 4), unifloris et propterea PEDICELLOS formantibus apice clavatos et spicula duplo triplove longiores, quos

longe ab invicem distantes inde a basi sua emittunt, tortuosi immo contorti (saltem in gramine sicco).

SPICULAE, nisi plane clausae sunt, obovato-ellipticae, obtusae, lineas 2 longae, albo-hirsutissimae: pilis erectis.

GLUMAE membranaceae, concavae, linearis-oblongae, acutae, pilis albis, erectis, ad basin glumarum brevioribus et patentibus, versus earum apicem longioribus, dense obsitae: *inferior* angustior, flosculis tertiam partem 1. saltem non prorsus dimidio brevior, 3 — 5-, *superior* latior, flosculos aequans, 5-nervis: nervis in utraque tenuibus.

FLOSCULUS *inferior* neuter vel masculus, bivalvis: valvula exterior linearis-oblonga, acutiuscula, pilis quam in gluma superiori parum brevioribus vestita, 5 — 7-nervis; interior tenerior, si flosculus neuter, perbrevis, si masculus, exteriori paulo minor, dissitissime binervis; (inter stamina interdum ovarium cum stylis abortivum). *Flosculus superior* hermaphroditus (seminalis?), chartaceo-coriaceus, ellipticus, acutus, apice interdum aduncus, albus, flosculum incompletum nunc aequans, nunc eodem paulo brevior: Valvula superior aequilonga, acuta, marginibus inflexis.

LODICULAE squamae collaterales, minimae, quadratae, submarginatae.

OVARIUM (maturescens) subsusiformi-ellipticum.

STAMINA (in flosculo incompleto) 3. ANTHERAES lineares.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Spicula. 2) Gluma inferior, 3) Gluma superior, 4) Flosculi incompleti valvula inferior, — omnes ab interiori visae. 5) Ejusdem valvula superior. 6) Flosculi ejusdem genitalia. 7) Hermaphroditus. 8) Ejusdem valvula superior. 9) Semen immaturum.



Panicum barbinode.

Page det.

P A N I C U M B A R B I N O D E.

Def. 3 - pedale. Racemis alternis vel laxiuscule jubatis, erectis patulisve; Spiculis (fasciculatis) linealibus, ovatis, acutis, glabris; Gluma inferiore flosculis quadruplo breviori (enervi); Hermaphrodito elliptico, depresso, punctulato, neutrum aequante; Foliis (lato-) linearibus; Culmi nodis villosissimis.

RADIX mihi ignota.

CULMUS erectus, circiter 3 - pedalis, pennae anserinae crassitie, compressus, striatus, glaber, inferne erecto- et foliifero-ramosus, ad nodos (3, dense, patentissime vel refracte albo - villosos) aequus vel vix geniculatus, infra jubam tandem longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxae, compressae absque carina, internodio demum laminaque paulo breviores, striatae, praesertim inferiores pilis albis e glandulis pusillis oriundis, patentibus et albis inferne hirsutae, in extrema ora pubescentes. LIGULA series pilorum laminae adpressa.

FOLIA patula vel patentia, linearia, acuminata, plana, lineas 4 — 5 lata, striata, nervo medio parum productiori, utrinque glabra, marginibus hispidula, sicca fulvescentia, non multum inaequalia: spithamea — dodrantalia.

RACEMI ad axin teretiusculum, superne angulatum, vix flexuosulum, striatum, glabrum, satis tenuem alterni, solitarii, inferiores palmares et compositi distantiores, superiores sensim breviores et simpliciusculi, primum erecti, tandem patuli, ad insertionem pubescendo - barbati, jubar constituent circiter dodrantalem, pl. min. lucidam, subfuscescendo - viridem.

AXIS *partialis* subaequus, striatus, basin versus et ad insertionem radiolorum pubescens, dorso convexus, fronte angulato floriferus: racemorum inferiorum *radiolos* distinctos, alternos, semipollicares et breviores, deuse floriferos emittens; superiorum

fasciculos potius PEDICELLORUM brevissimorum, inaequalium,
basi tomentoso-pubescentium.

SPICULAE ovatae, acutae, glabrae, lineam et quod excedit longae.

GLUMA inferior membranacea, ovata, acuta, enervis, flosculis
quadruplo brevior; superior cosdem aequans, ovata, acuta,
concava, 5-nervis.

FLOSCULUS inferior neuter, bivalvis: valvula exterior glumae su-
periori siuillima, sed depresso-complanata, minus distinete
et irregulariter 5-nervis: nervis tenuioribus; valvula interior
aequilonga, angustior, tenerior, dissitissime binervis, margini-
bus inflexis. Flosculus superior hermaphroditus, coriaceus,
ellipticus, obtusus (sub lente cum mucronulo obsoleto seu pun-
ctiformi), depresso, tenuissime punctulatus, albens. Valvula
interior aequilonga, marginibus inflexis.

LODICULAE squamae collaterales, quadratae, emarginatae.

OVARIUM oblongum. STYLI 2. STIGMATA

STAMINA 3. ANTHERAES

FIGURA AD SPECIMEN BAHIENSE.

1) Fasciculus spicularum (minus quam reliquae figurae auctus). 2) Gluma in-
ferior. 3) Gluma superior. 4) Flosculi neutrius valvula inferior. 5) Ejusdem
valvula superior. 6) Hermaphroditus. 7) Ejusdem valvula superior. 8) Lodicula
cum ovario et filamentis.





Panicum demissum.

PLANICUM DEMISSSUM.

Def. Semipedale, decumbens. Ramis lucide compositis, subpaniculatis, demum patentibus refractis; Spiculis sublinealibus, oblongis, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore flosculis tertiam partem vel saltem non prorsus dimidio breviori; Hermaphrodito oblongo, acutiusculo, laevissimo, neutrum aequante; Foliis lanceolatis breviusculis; Vaginis culmo axi pedicellisque pubescentibus.

RADIX e basi culmorum communi fibrae plurimae, fasciculatae, ramulosae.

CULMI plures circumcirca decumbentes, spithamei et breviores, ramosi, teretes, striati, pubescendo-pilosi, 4 — 5 nodes, ad nodos pube eadem tectos aequi vel paulo geniculati, fere ad paniculam usque vaginati.

VAGINAE laxiusculae, totae fissae, internodio in ramis adultis saepe dimidio-, lamina paulo vel duplo breviores, compressiusculae, subbearinatae, striatae, pubescendo-hirtae. LIGULA series pilorum densiuscula.

FOLIA patula et patentia, linearis-lanceolata, acuminata, basi subamplectentia, plana, lineas 2 vel fere 3 lata (superiora et juniora angustiora), striata absque nervo medio crassiori, firma et rigida, glabra vel inferne ad margines ciliatula, eum reliquis partibus pubescendo-viridia, parum inaequalia: pollice longiora vel fere hipolllicaria.

PANICULAE ramorum terminales, ad summum bipollieares, adultae lucidissimae. *Axis communis* subangulatus, inaequaliter flexuosulus, pubescendo-hirtus, 6 — 8 parus. RADII bini solitarii, primum erecti demum patentes imo refracti, pubescendo-hirti, inferiores circiter lineas 9 longi, superiores sensim breviores; per distantias circiter bilineales alternatim emittentes *radiolos* racemiformes, demum patentes, densiuscule floriferos, lineas 3

longos et sensim breviores, ramulosos: radiolis plerumque bifloris. PEDICELLI hirti, longitudine spicularum vel breviores. SPICULAE ovales, obtusiusculae, linea plerumque breviores, glabrae, saturate virides.

GLUMAE obtusiusculae: *inferior* subcordata, 5-nervis, flosculis tertiam partem vel ultra dimidium brevior; *superior* eodem aequans vel illis nonnihil brevior, 7—9-nervis.

FLOSCULUS *inferior* neuter, ovalis, obtusus, bivalvis: valvula exterior glumae superiori simillima, 7-nervis; interior aequilonga, tenerior, dissitissime binervis, ad margines inflexos superne villosula. *Flosculus superior* hermaphroditus, coriaceus, neutro aequilongus, laevissimus, minus obtusus, albens. Valvula interior aequilonga, marginibus inflexis.

LODICULAE squamae collaterales, quadratae, emarginatae.

OVARIUM oblongum. STYLI 2. STIGMATA

STAMINA 3. ANTHERAE

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Radiolus. 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior. 4) Flosculi neutrius valvula inferior. 5) Ejusdem valvula superior. 6) Hermaphroditus. 7) Ejusdem valvula superior cum lodicula et ovario matuscente.



Panicum inconstans.

P A N I C U M I N C O N S T A N S *Tr. in N. ab Es.*

Agr. Bras. p. 152.

RADIX mihi ignota.

CULMUS 3 — 4 - pedalis, erectus? satis tenuis, teres, striatus, glaber, ad nodos (plurimos, glabros) aequus vel leviter geniculatus, valde ramosus, ramis patulo - erectis: aliis solii - aliis simul floriferis, foliosissimis, ad jubam usque vaginatis.

VACINAE totae fissae, pl. min. laxae, internodiis demum laminaque (in ramis) breviores, striatae, adultae glabrae, juniores pubescentes, cum foliis fuscescendo - virides. LIGULA brevissima, simbriato - membranacea, foliorum juniorum pilis longiusculis stipata.

FOLIA patula et patentia, linearis-lanceolata, basi rotundata, acuta et acutissima, plana, (ramorum) 2 — 4 lineas lata, striata, nervo medio vix fortiori abbreviatissimo, supra glabra, infra pilis brevissimis adpressis pubescentia, (ramorum) pollicem vel pollices 2 longa, plurima et confertissima.

RACEMI simpliciusculi et laxe floriferi ad axin communem tennem, angulatum, ad angulos scabriuscum, flexuosulum per distancias irregulares alterni, solitarii, patuli vel patentes, circiter pollicares, sensim minores, jubam constituunt lucidam (in ramis) ultra - bipollicarem, erectam.

AXIS partialis communi siuillimus sed angustior, vix flexuosus, extus exserens radiolos brevissimos, e duobus PEDICELLIS compositos scabriuscum, quorum inferior brevissimus spiculam fert saepe abortientem, superior fere longitudine spiculae.

SPICULAE erectae, ovato - oblongae, compressae, glabrae, circiter bilineales, virides.

GLUMAE chartaceae, lanceolatae, naviculari - compressae, dissitiusculae, glabrae, saepe patulae: inferior 3 - nervis vel cum nervo

quarto laterali, vel 5-nervis, nunc obtusiuscula, nunc in acumen pl. min. longum excurrens, flosculis tertiam vel quartam partem, saepe vero quoque aut parum tantum aut sere dimidio brevior; *superior* 5 nervis, acutiuscula vel acuta, flosculis paulo brevior aut eosdem aequans.

FLOSCULUS inferior neuter, bivalvis: valvula exterior glumae superiori ex toto simillima, sed saepe paulo longior; interior subaequilonga, membranacea, compressa, dissite binervis. *Flosculus superior* hermaphroditus, coriaceus, elliptico-linearis, mucrone obtuso subadunco, glaberriimus, albens vel spadiceus: Valvula inferior basi e callulo fronte appendiculata squamis 2 membranaceis, lanceolatis, adpressis, glabris, ipsa quinque brevioribus. Valvula superior inclusa, perangusta, subaequilonga.

LODICULAE squamae collaterales, cuncto-quadratae, emarginatae. *OVARIUM* linearis - oblongum. *STYLI* 2. *STIGMATA* plumosa, spadicea.

STAMINA 5. *ANTHERAE*

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Spicula. 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior. 4) Flosculi neutrius valvula inferior. 5) Ejusdem valvula superior a latere visa. 6) Hermaphroditus appendiculatus. 7) Ejusdem valvula superior. 8) Genitalia cum lodicula, (delapsis? antheris).




Panicum incognitum var.

Pape del.

P A N I C I I N C O N S T A N T I S V A R . M O N T A N A .

Idem gramen (quod non ob variabilem glumarum proportionem solam *inconstantis* nomen meretur), dum in fruticetis humidis vegetat, ramorum virgis partim foliosissimis luxurians quatuorque pedum altitudinem attingens, in montibus genitum ramositate in sere omnem exuit atque vix ad duorum pedum magnitudinem assurgit. Hujus autem varietatis specimen, in summo monte *da Sillada pr. Camapuan Brasiliae* lectum in tabula adjecta delineari curavimus. Radix huic e rhizomate crasso et tomento canescente obducto fibrae sparsae, simplices. Culmus subramosus tantum. Folia pauciora sed majora omnia, interdum quinquepollicaria. Vaginae radicales dorso pubescentes, superiores glabrae. Juba quam in priori varietate lucidior sed plerumque major, saepe spithamea, radiis inferioribus longe ab invicem remotis. Spiculae vero per omnes partes ejusdem, ac prioris, tam constructionis quam formae, ita ut analysin eandem iterum exhibere inutile nobis visum sit.



Puccinum proboscideum.

Cope det.

P A N I C U M P R O B O S C I D E U M *Tr. Diss. II.* p. 184.

RADIX e culmi basi nodulosa squamuñisque gilvescendo - tomentosis tecta fibrae satis validae, flexuosa, simplices, spadiceae.

CULMUS circiter tripedalis, stricto - erectus, inferne crassitie pennae asserinae, teres vel vix compressiusculus, striatus, scabriusculus, ad nodos (4 — 5, angustos, tomentoso - pubescentes) aequus, superne interdum adpresso - subramosus, ad paniculam usque vaginatus.

VAGINAE totae fissa (sed basin versus margines alter alteri adeo arcte incumbentes ut connati videantur), arctae, internodio demum laminaque breviores, striatae, inferiores totae-, superiores marginem versus hirsutae, cum foliis subgilvescendo - virides. LIGULA brevissima chartacea, pilis longis albis hirsuta.

FOLIA patulo - erecta, lanceolato - linearia, acuminata, firma et rigida, plana et lineas 4 — 6 lata vel marginibus pl. min. involuta, striata, medio nervo prominulo et subpercurrente notata, asperiuscula, margine hispidula, dodrantalia — pedalia, superiora spithamea.

PANICULA e vagina suprema surgit ereta, stricta, contractiuscula, sublineari - obovata, spithamea — fere pedalis, viridis.

AXIS communis subangulato - teretiusculus, striatus, scaber, superne flexuosulus, inferne per distantias 2 — 3 - pollicares, superne breviores, emitens radios ternos pluresve subadpresso - erectos, angulatos, scabros, basi obsolete barbatos, circiter inde a quarta tertiate parte ramulosos: radiolis patulo - erectis, angulatis, scabris, per distantias satis longas iterum radiolosis: his radiolis dissite 1 — 2 floris. PEDICELLI superne subgibbosoincrassati, scabri.

SPICULAE erectae vel obtusissimum cum pedicello angulum formantes, lanceolato-ovatae, teretiusculae, acuminatissimae, lineas circiter 3 longae, glabrae, virides.

GLUMAE chartaceae (satis firmae), ovato-lanceolatae, concavae, acuminatae, glabrae, dissitiusculae: *inferior* flosculis quartam tertiamve partem brevior, 9-nervis; *superior* acumine flosculos fere paulo superans, 13 — 15-nervis.

FLOSCULUS *inferior* neuter, univalvis, glumae superiori simillimus, sed 11-nervis tantum basique pilis aliquot brevissimis adspersus. *Flosculus superior* hermaphroditus, coriacetus, demum cartilagineus, linearis-ellipticus, obtusus, flosculo neutro fere tertiam partem brevior, albens, circa callum cui insidet tomentoso-pilosulus: valvula inferior basi et ad margines non prorsus ad medium usque tomentosa squamulis piliformibus, linearibus, planis, pellucidis, apice mucronatis. Valvula superior subaequilonga, obtusa, marginibus implicatis.


ODICULAE squamiae collaterales, quadratae, emarginatae.

OVARIUM linearis-oblungum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosa.

STAMINA 5. **ANTHERAE** lineares, atropurpureae.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Spicula. 2) Flosculus neuter univalvis ab interiori visus. 3) Hermaphroditus a tergo. 4) Idem a fronte. 5) Tomenti ejusdem squamulae aliquot magis auctae. 6) Valvula hermaphroditii superior cum lodicula et genitalibus junioribus.



Panicum Riedelii

Pape del.

P A N I C U M R I E D E L I I.

Def. Pl. min. sesquipedale. Paniculae (spithameae — pedalis) strictae, —uos tractae radiis racemosis; Spiculis maximis, linear-ellipticis, obtusiusculis, glabris: pedicellis angustatis, scabris; Glumis vix inaequalibus, flosculos subaequantibus, 7-nervibus; Hermaphroditio ovato-lanceolato, acutinculo, glabro, basi (longe) bi-appendiculato, neutrum aequante; Folii petiolatis, lanceolatis.

RADIX e culmi basi nodulosa fibrae subsparsae, plerumque prae-longae et valde ramulosae, interdum sarmentum unum alterius emittens.

CULMUS erectus, in planta validiori strictiusculus, cum panicula sesquipedalis vel paulo minor, compressus, glaber, striatus, ad nodos (praeter radicales consertiores, 2—3, villosos) aequus nec nisi in debilioribus pl. min. geniculatus, simplex, demum sub panicula pl. min. longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxae, compressae, internodio longiores vel ipsi aequilongae: inferiores, quae longe plerumque sordide albo- et sericeo-villosae nec nisi in debiliori planta saepius glabrae sunt, lamina breviores; suprema elongata, minus et praecipue marginem versus villosula, rarius tota glabra, laminam subaequans vel eadem longior; cum foliis (in planta sicca fuscae).

LIGULAE loco villi sordide albi, densiusculi, pl. min. longi.

FOLIA erecto-patula, lanceolata, acuminata, plana, graminis vegetoris lineas 7—9, debilioris lineas 3—4 lata, glabra, scabriuscula, basi in petiolam attenuata linearem, compressum, glabrum vel inferne ad margines villosulum, saepe pollicarem, foliorum infimorum tamen plerumque semipollicarem tantum; inferiora s. radicalia subdisticha, 2—3—4-pollicaria; superiore, parum inaequalia, 5—6 pollicaria.

JUBA PANICULARIS erecta, in planta vegetori stricta, contracta et interdum dimidiata totius culmi partem occupans, in debiliori brevior et laxior, glaucescendo-viridis, spithamaca-dodranthalis.

AXIS communis subaequus, praesertim superne angulatus, sub-10-parus. *Radii* solitarii vel aliquot pseudofasciculati, erecti, angulati, scabriusculi, a basi ramulosi, racemiformes, inferiores

pl. min. digitales, superiores sensim breviores: radiolis racemosis, adpressis vel parum patulis, dissite floriferis. **PEDI-CELLI** solitarii, angulati, scabri, plerumque spicula breviores. **SPICULAE** erectae, linearis-ellipticae, dum clausae sunt acutiusculae, dum apertae, obtusiusculae, lineas duas cum dimidia longae, glabrae.

GLUMAE lanceolatae, acutae vel acutiusculae tantum, compressae, 7-nerves, parum inaequales, flosculos aut aequantes aut iisdem nonnihil minores: *inferior* plerumque paulo (in gramine debiliiori interdum $\frac{1}{2}$ -) brevior, basi ad marginem alterum pilosula; *superior* glabra aut, rarius, una cum flosculi neutrius valvula inferiori e margine pilum unum alterumve praelongum et tenuissimum emittens (id quod praesertim in debilioris plantae spiculis observatur, ita tamen, ut tota spicula pilos non nisi 2—3 ferat).

FLOSCULUS *inferior* neuter, bivalvis: Valvula exterior glumis similis, tamen obtusior, minus distincte nervata et interdum 5-nervis tantum; interior membranacea, angustissima, paulo brevior, dissite binervis. *Flosculus superior* hermaphroditus, ovato-lanceolatus, acutus, apice interdum subaduncus, coriaceus, glaber, sordide albens, brevissime stipitatus et ex hoc stipite autrorsum utrinque emittens squamam adpressam, ovato-lanceolatam, acutam, membranaceam, enerveam, ipso tertiam quartamve partem breviorem. Valvula superior aequilonga, acuta, marginibus iusflexis.

LODICULAE squamae collaterales (ut in congeneribus tamen marginibus posticis ovarium amplectentes), quadratae, emarginatae.

OVARIUM oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosa.

STAMINA 5. **ANTHERAE** lineares.

FIGURA AD SPECIMEN BAHIENSE.

- 1) Spicula. 2) Flosculi, a latere. 3) Flosculi neutrius valvula superior. 4) Hermaphroditus appendiculatus a latere. 5) Idem a fronte. 6) Squama appendicis (s. rudimenti membranacei) altera, explanata. 7) Valvula hermaphroditi superior cum lodicula et genitalibus. 8) Genitalia (juniora) cum lodicula.
-



Panicum secundum.

Pope del.

P A N I C U M S E C U N D U M.

Def. 3 — 4-pedale. Racemis subsimplicibus densiuscule jubatis, demum patentibus; Spiculis linealibus, oblongis (cum pedicellis) aut glabris aut pilis adspersis; Gluma inferiore flosculis quartam tertiamve partem (saltem non prorsus dimidio) breviori; Hermaphroditio elliptico, acuto, laevissimo, neutrum subaequante; Foliis subamplexicaulibus, lanceolatis, subcoriaceis, subsecundis, glabris.

RADIX ignota.

CULMUS erectus, ut videtur 3 — 4-pedalis, teres, striatus, glaber, ad nodos (quorum plures, 5 — 8? adesse videntur) glabros aequus, subramosus, ad jubam usque vaginatus.

VAGINAE totae fissae, laxae et saepe solutae, internodio multo longiores et altera alteram vaginantes, lamina breviores, striatae, glabrae. LIGULA series pilorum brevissimorum.

FOLIA patentia, plerumque (ob vaginas laxas) ut in *Phragmita communis* secunda, basi circa ligulam fusca culmum amplectentia, sublineari-lanceolata, acuminata, plana, inferne compressa, pollicem cum dimidio lata (saltem pollice latiora), firma, utrinque glabra, striata, nervo medio crassiori non percurrente, in pagina superiori saturate fusco-viridia, vix inaequalia, fere pedalia, excepto supremo angustissimo et circiter sesquipollari.

RACEMI ad axin communem subaequum, sulcato-angulatum, glabrum plurimi, irregulariter sparsi, solitarii vel aliquot subfasciculati, primum erecto-patuli, deum patentes et patentissimi, pollices duos cum dimidio longi, ad apicem juba breviores, subsimplices, densius laxiusve floriferi, basi nudi aut pilis aliquot brevibus barbati, *jubam* constituunt pedalem, lucidiorem densioremve, fuscescenteim.

AXIS *partialis* angulatus, satis tenuis, dorso (s. parte axi communis adversa) glaber, sulco exaratus, ad margines angulos formantes seaber vel hispidulus, fronte per distantias longiores hrevioresve et saepe brevissimas irregulariter exserens PEDICELLOS

brevissimos (spicula breviores), aut solitarios aut aliquot subfasciculatos, nudos vel pilo uno alterove brevi adspersos, persistentes.

SPICULAE oblongae, dum clausae sunt acutiusculae, mox autem apertae, lineam longae, deciduae: aut undique glabrae aut (in speciminiibus quorum pedicelli pilos emittunt) praecipue ad glumae superioris basin apicemque flosculi neutrius pilis aliquot barbatae.

GLUMAE compressiusculae, ovatae, acutae, 5-nerves: *inferior* flosculis quartam tertiamve partem (interdum sere dimidio) brevior, tota glabra aut ad nervum medium carinalem hispidula; *superior* flosculos aquans, glabra aut (in pilifera planta) inferne pilis brevibus adspersa.

FLOSCULUS *inferior* neuter, bivalvis: Valvula exterior glumae superiori ex toto simillima et, ut eadem, aut glabra aut marginem versus et praecipue superne pilis aliquot brevibus barbata; interior subaequilonga, tenerior, dissitissime binervis, glabra aut ad margines pubescens. *Flosculus superior* hermaphroditus, coriaceus, elliptico-ovatus, acutiusculus, laevis, sordide pallens, neutrum aut aquans aut eodem parum brevior. Valvula superior aequilonga, marginibus inflexis.

LODICULAE squamae collaterales, quadratae, emarginatae.

OVARIUM oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** plumosa.

STAMINA 3. **ANTHERAE**

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

(Analysis ad plantam piliferam): 1) Pars axis partialis, a fronte. 2) Spicula. 3) Gluma inferior. 4) Gluma superior. 5) Flosculus neuter a latere visus. 6) Hermaphroditus. 7) Ejusdem valvula superior. 8) Genitalia cum lodicula.

SPECIES FASCICULI VIGESIMI SEPTIMI.

- 313. *Aristida caerulescens Desf.*
 - 314. *Aristida gibbosa Tr.*
 - 315. *Aristida s^{tac} Luciae Tr.*
 - 316. *Aristida spadicea Hb. et K.*
 - 317. *Panicum arnacites Tr.*
 - 318. *Panicum barbinode Tr.*
 - 319. *Panicum demissum Tr.*
 - 320. *Panicum inconstans Tr.*
 - 321. *Panicum inconstantis var. montana.*
 - 322. *Panicum proboscideum Tr.*
 - 323. *Panicum Riedelii Tr.*
 - 324. *Panicum secundum Tr.*
-

S P E C I E S
G R A M I N U M

ICONIBUS ET DESCRIPTIONIBUS ILLUSTRAVIT

D. C. B. *Trinius.*

ACAD. SC. PETROP. SODALIS.


F A S C. XXVIII.

P E T R O P O L I.

I M P E N S I S A C A D E M I A E S C I E N T I A R U M .

A c a d e m i a e j u s s u.

P. H. Fuss.



Andropogon Bladhii.

Pope del

RADIX mihi ignota.

CULMUS, ut videtur, pl. min. decumbens, tripedalis, teretiusculus, hinc canaliculatus, crassitie pennae corvinae, glaber, striatulus, ad nodos, quorum plures, dense barbatus, parum geniculatus et plerumque adpresso-ramosus: ramis in speciminibus, quac vidi, foliiferis tantum; superne infra spicas pertenuis et satis longe nudus.

VAGINAE laxae et saepe solutae, totae fissae, internodio laminaque breviores, striatae, glabrae. LIGULA brevis, membranacea, obtusa, foliorum juniorum pilis satis longis stipata.

FOLIA patula, linearia, plana, acuminata, lineas 2 vel unam cum dimidia lata, striata, nervo medio in dorso magis prominente, pagina superiore pilis brevissimis, plerumque e glandulis pusillis provenientibus adspersa, laeta viridia, culmea sesquipalmaria vel digitalia, suprema breviora et angustiora.

SPICAE terminales, subsenae, ad axin communem pertenuem, pollice breviorem, glabrum alternae, sed ita confertae, ut subdigitatae videantur; singulae pedunculo tenuissimo, inferiores trilineali, superiores sensim breviori insidentes, vix bipollicares, fuscescendo-virides.

RHACHIS articulata, minus facile solubilis: *articulis* circiter lineatis, pertenuibus, teretiusculis, utrinque ciliatis: ciliis erectis, accrescentibus, ita, ut superiora articulo ipso paulo longiora sint.

SPICULAE imbricatae, ad quemvis articulum binae:

SESSILIS linear-elliptica, lineas duas longa, pseudouniflora, hermaphrodita. *Gluma inferior* s. exterior herbaceo-chartacea, elliptica, paulo concava marginibus subinvolutis, apice

obtuso minute tridentata, 7-nervis, marginem versus pilis longiusculis albis subciliato-adspersa, versus basin pilis brevissimis dorso hirsutiuscula. *Gluma superior* s. posterior chartacea, subaequilonga, angustior, obtusiuscula, 3-nervis et subtriquetro-concava, glabra. *Perianthium* formatum e duobus flosculis univalvibus, quorum *anterior* neuter, hyalinus, tenerrimus, sublanceolatus, acutiusculus, glumis brevior, glaber; *posterior*, cujus valvula superior suppressa, hermaphroditus, basi quoque hyalinus, angustissimus et mox abiens in *aristam* coriaceam, tortam, geniculatam, medio sublente hirtulam, spadicescentem, tota spicula circiter quadruplo longiore.

PEDICELLATA neutra, forma similis sessili et fere ejusdem magnitudinis, insidens *pedicello* articulis rhacheos simillimo, spicula sua duplo breviori. *Glumac 2: inferior* ut gluma eadem in spicula sessili; *superior* illa tertiam partem brevior, angustior, marginibus involuta et pilis teneribus adspersa, trinervis, alba, membranacea. *Perianthium* nullum.

LODICULAE in spicula sessili squamae 2, cuneato-quadratae, oblique truncatae, hyalinae.

GENITALIA non vidi.

SEMEN oblongum, depresso, spadiceum.

FIGURA AD SPECIMEN INDIAE ORIENTALIS.

- 1) Articulus rhacheos.
 - 2) Gluma inferior spiculae sessilis.
 - 3) Ejusdem gluma superior.
 - 4) Flosculus neuter 1-valvis.
 - 5) Flosculus hermaphroditus aristaeformis.
 - 6) Semen cum squamis lodicularibus.
 - 7) Spicula pedicellata.
 - 8) Ejusdem gluma superior.
-



Andropogon Inarancusa.

Pare del.

A N D R O P O G O N I W A R A N C U S A R O X B.

Schult. Mant. II. p. 458.

RADIX e basi culmi nodulosa fibrae breviuseculae, subfasciculatae (aromaticae).

CULMUS 3 — 6-pedalis, erectus, crassitie pennae anserinae, teres vel compressiusculus, laccissimus, ad nodos (4 — 6) glabros subaequus, in speciminibus, quae coram sunt, simplex, ad paniculam usque vaginatus.

VAGINAE laxae, totae fissae, internodio laminaque breviores, striae, glabrae. LIGULA membranacea, brevissima.

FOLIA patula, linearia, plana vel leviter compressa, firma, lineas 2 lata vel angustiora, striata, scabriuscula, margine hispidula, inferiora pedalia et longiora, superiora sensim breviora et angustissima.

PANICULA longissima (circiter bipedalis) linearis-angustata, interrupta et albicans, formata e ramis erectis, e singuli paniculae nodi vagina solitariis, iterum nodosis, ad nodos vaginatis et e quavis harum vaginalium radiolos floriferos porrigentibus: infimis fere dodrantibus, superioribus perbrevibus; omnibus tenuibus, glaberrimis; subflexuosis. *Radioli* floriferi tenerimi, ad vaginalae spicigerae nodum plerumque infracto-geniculati.

SPICAE e quavis radiolorum vagina, ut in radiis ipsis paulo inflata et subaphylla, geminae. vagina spathaeformi involucratae, patulae, longiores (inferiores) pollici breviores, supremae vix semipollicares in radioli s. pedunculi nodulo pubescente conjugatae, minus facile solubiles: *articuli* rhacheos linea vix longiores, tenues, extus et ad latere dense villosi: villis albis, accrescentibus, patentibus, supremis articulum longitudine superantibus.

SPICULAE patulo-imbricatae, in quovis articulo rhacheos binae:

SESSILIS linearis-lanceolata, lineis duabus longior, pseudouniflora, hermaphrodita. *Glumae* chartaceae, acuminatae:

inferior 5-nervis, nervis inferne (circiter a medio glumae) evanescens, superne ad latera hispidula; *superior* 3-nervis, vix triquetro-compressiuscula, glabra. *Perianthium* hyalinum, ex flosculis 2 uni-valvibus compositum: valvula s. flosculo *inferiori* neutro, lineari-elliptico, obtusiusculo, glumis paulo breviori; *superiori* s. posteriori fertili, fere dimidio breviori, angustissimo, fimbriato-bilobo; dorso *arista* supra basin ipsi adnata recta, flexuosa spicula sua circiter duplo longiori, pallida.

PEDICELLATA mascula, sessili forma similis, sed fere non nihil longior, insidens *pedicello* articulis rhacheos ex toto simillimo, ipsa duplo breviori. *Glumae* acuminatae: *inferior* 9-nervis, apice marginibus hispidula; *superior* 3-nervis, sub-triquetro-compressa. superne ad margines (praesertim ad alterum) ciliatula. *Perianthium* univalve, lineari-oblongum, hyalinum, obtusum, muticum, marginibus superne fimbriatum.

LODICULAE in utraque spicula squamae 2, cuneato-quadratae, oblique truncatae, amplectentes, hyalinae, nervatae.

GENITALIA hermaphrodita inter valvulas spiculae sessilis: **OVARIUM** oblongum. **STYLI** 2. **STIGMATA** angusto-plumosa. — **STAMINA** in utraque spicula 3. **ANTHERAE** lineares.

FIGURA AD SPECIMEN INDIAE ORIENTALIS.

- 1) Articulus rhacheos. 2) Gluma inferior spiculae sessilis. 3) Ejusdem spiculae gluma superior. 4) Flosculus neuter. 5) Flosculus hermaphroditus 1-valvis. 6) Genitalia cum squamis lodiculae. 7) Spicula pedicellata. 8) Ejusdem gluma inferior. 9) Gluma superior. 10) Perianthium. 11) Stamina cum lodicula.
-



Andropogon pachnodes.

Pape del

A N D R O P O G O N P A C H N O D E S.

RADIX ignota.

CULMUS erectus, 4-pedalis, crassitie pennae anserinae, teres, tenuissime striatus, pruinosus, ad nodos (plures, glabros) aequus vel vix geniculatus, simplex, infra paniculam non nimis longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodio et lamina breviores, striatae, glabrae. LIGULA brevissima, membranacea.

FOLIA patula, lanceolato-linearia, acuminata, plana, basi subcordato-rotundata semiamplexentia, striata, glabra, margine hispida, majora lineas circiter 8 lata, pedem longa, superiora sensim angustiora et breviora, cum vaginis fuscescendo-glaucia.

PANICULA sesquipedalis et longior, sublineari-contracta, e glauco, viridi et rufescente vel spadiceo varia, formata e ramis s. radiis erectis, e singuli paniculae nodi vagina solitariis, iterum nodosis et vaginatis, e vaginularum qualibet radiolos floriferos emitentes: infimis spithameis, superioribus sensim brevioribus; singulis tenuibus, glaberrimis, rectis. *Radioli* floriferi tenuissimi, ad nodum vaginulae, quae spicarum basin obvolvit, aequi vel paulo geniculati.

SPICAE e vaginula involucrante pl. min. inflata et plerumque aphylla geminae, patulae, pollicem dimidium et quod excedit longae, teretusculae, solubiles: *Articuli* rhacheos lineam longi, pubescentes et utrinque pilis albis, ipsis brevioribus, villosuli.

SPICULAE imbriatae, in quovis articulo rhacheos binae:

SESSILIS linear-lanceolata, fere lineas 2 longa, pseud-uniflora, hermaphrodita. *Glumae* chartaceae, glabrae: *inferior* obtusiuscula, 4-nervis: nervis non nisi apicem versus manifestis, loco quinti s. medii longitudinaliter exarato-depressa; *superior* aequilonga, paulo acutior, angustior, 3-nervis.

Perianthium hyalinum e flosculis 2 univalvibus compositum: flosculus (s. valvula) inferior neuter, lineari-lanceolatus, acutiusculus, glumis paulo brevior; superior angustissimus, mox abiens in aristam 5 — 6-linealem, inferne tortam et spadicem.


PEDICELLATA magnitudine sessilis, acutior, mascula. *Pedicellus* articulo similis, sed latere altero brevissime, altero longius ciliatus: pilis tamen ipso brevioribus. *Glumae* glabrae: *inferior* 7-nervis, *superior* 3-nervis, subtriquetro-compressa. *Perianthium* 1-valve, lineari-lanceolatum, hyalimum, glumis paulo brevius, muticum.

LODICULAE squamae in utraque spicula 2, cuneato-quadratae, oblique truncatae, paulo emarginatae, hyalinae.

GENITALIA hermaphrodita inter valvulas spiculae sessilis: OVIUM oblongum. STYLI 2. STIGMATA plumosa. — STAMINA in utraque spicula 3. ANTHERAE lineares, cum stigmatibus atropurpureae.

FIGURA AD SPECIMEN NEPALENSE.

- 1) Articulus rhacheos. 2) Gluma inferior spiculae sessilis. 3) Ejusdem spiculae gluma superior a latere. 4) Flosculus neuter ab interiori. 5) Flosculus hermaphroditus aristatus. 6) Genitalia cum lodicula. 7) Spicula pedicellata. 8) Ejusdem gluma inferior. 9) Gluma superior. 10) Perianthium. 11) Stamina cum lodicula.
-



Indigofera punctata

Burm. ad

A N D R O P O G O N P U N C T A T U S R O X B.

Schult. Mant. II. p. 45o.

R A D I X e culmi basi nodulosa, interdum etiam e culmi tum procumbentis nodorum inferiorum uno altero fibrae crassiusculae, ramulosae, subsacciculatae.

C U L M U S erectus vel geniculato-procumbens, 2 — 3-pedalis, crassitie pennae corvinæ vel gallinac, teretiusculus, tenuissime striatus, ad nodos (6, glabros vel pubescentes) aequus aut superne leviter geniculatus, erecto-ramosus, infra paniculam demum pl. min. longe nudus.

V A G I N A E totae fissae, laxiusculae, ad ramorum ortum solutaç, internodiis laminaque breviores, supremæ eadem longiores, striatae, glabrae. L I G U L A membranacea, brevis, pilis interdum praelongis stipata, rarius nudiuscula.

F O L I A erecta, linearia, acuminatissima, plana, majora lineas 2 lata, striata, glabra, interdum in pagina superiori basin versus pilis, e glandulis parvis provenientibus longisque adspersa, glaucescendo-pallida: inferiora pro altitudine graminis dodrantalia vel ultrapedalia, superiora sensim breviora et angustiora, suprema saepe brevissima.

P A N I C U L A culmum et saepe etiam ramos terminans digitalis — sesquipalmaris, erecta, interdum subsecunda, e flavo-viridi et amethystino varia, nunc lucidula, nunc densior.

A X I S C O M M U N I S pl. min. tenuis, teres, glaber, pl. min. aequus, 10 — 12-parus. *Radii* ad singulum axeos nodum plures verticillati, basi leviter barbulati, erecto-patuli, pertenues, rarius simplices, longe plerumque paulo supra basin compositi: radiolis saepissime iterum divisus: singulis erecto-spiciferis.

S P I C A E plurimae, teretiusculae, tenues, majores sesquipolligares, plantae minus vegetae breviores, articulatim solubiles. *Articuli*

rhacheos complanati, satis tenues, lineam longi, utrinque pilis brevibus, sensim paulo accrescentibus, ipso articulo brevioribus ciliati.

SPICULAE imbricatae, in quovis articulo binae:

SESSILIS linear-elliptica, sesquilinealis, pseudouniflora, hermaphrodita. *Glumae* chartaceae, aequilongae, obtusae: *inferior* paulo supra medium serobiculo rotundo notata, praeter margines ciliato-hispidulos 5-nervis: nervis tribus evidentioribus, subpercurrentibus, duobus abbreviatis, tenuioribus; *superior* 3-nervis, compresso-triquetra. *Perianthium* hyalinum, formatum e flosculis 2 univalvibus, inferiore neutro, mutico, glumis paulo breviori; superiore angustissimo et mox supra basin abeunte in aristam tortam, geniculatam, spadiceam.

PEDICELLATA magnitudine sessilis aut parum longior et acutior, neutra. *Pedicellus* articulo similis, paulo angustior. *Glumae* ut in sessili, inferior autem non serobiculata, ciliis marginis fortioribus, nervis omnibus percurrentibus. *Perianthium* 1-valve, hyalinum, linear-oblongum, obtusum, muticum.


LODICULA squamae in spicula sessili 2, cuneato-quadratae, suboblique truncatae, emarginatae, obsolete nervatae.

OVARIUM oblongum. STYLI 2. STIGMATA angusta, plumosa.

STAMINA 3. ANTHERAE lineares.

FIGURA AD SPECIMEN NEPALENSE.

1) Articulus rhacheos. 2) Spiculae sessilis gluma inferior. 3) Ejusdem spiculae gluma superior. 4) Flosculus neuter. 5) Hermaphroditus aristaeformis. 6) Genitalia cum lodicula. 7) Pedicellus spiculae superioris. 8) Ejusdem spiculae gluma inferior. 9) Gluma superior. 10) Perianthium.



Endropogon serratus

Ram. ad.

ANDROPOGON SERRATUS RETZ.

ANDROPOGON FILIFORMIS PERS. R. et S. II. p. 81.

CULMUS decumbens, bipedalis et ultra, crassitie pennae passerinae. teres, glaberrimus, nodis permultis (inferioribus glabris, superioribus pl. min. barbatis), interceptus, ad eorum plurimos fibras radicantes et ramos agens, plerumque iterum ramosos, foliifloriferosve.

VAGINAE totae fissae, arctiusculae, ramos emittentes solutae, internodio laminaque breviores, striatae, glabrae. LIGULA membranacea, brevissima, plerumque lacera.

FOLIA parum patula, linearia, plana, lineam lata, acuminata, in pagina superiori, basin versus, glandulis, plerumque piliferis, adspersa: culmea pl. min. palmaria, ramorum folioserorum juniora longiora. supremum pedunculi floriferi angustissimum et brevissimum.

SPICA in pedunculo subfiliformi, glabro vel apicem versus pubescente, terminalis, solitaria, teretiuscula, sesqui - bi - pollicaris. laete viridis. *Rhachis* flexuosa. demum solubilis. *Articuli* teretiusculi, vix linea dimidia longiores. ad juncturas albo - et brevi - barbati.

SPICULE imbricatae. ad quemvis articulum binae:

SESSILIS obovata, lineas duas longa, pseudouniflora, hermaphrodita. *Gluma inferior* herbaceo - chartacea, concava, oblongo - obovata, obtusa, apice tridenticulata, praecipue inferne et ad latera villosulo - pubescens, 11 — 13 - nervis; *superior* aquilonga, fere duplo angustior, ovato - lanceolata, acuta, glabra, 3 - nervis, carinato - compressa, carina versus apicem hispidula. *Perianthium* longe plerumque inversum, (rarius evoluta valvula hermaphroditi superiori). hyalinum:

Valvula anterior neutra, glumis parum brevior, elliptico-lanceolata, obtusa, mutica; *posterior* hermaphrodita, angustissima, linearis, neutra brevior, abiens in aristam fere 9-linealem, suscescendo-spadiceam, tortam, geniculatam, sub lente hirtulam.

PEDICELLATA mascula, forma sessilis. *Pedicellus* articulo similis, superne hinc longius barbatus. *Gluma inferior* 19-nervis, denticulis apicis minus conspicuis; *superior* ut in sessili, marginibus apicem versus ciliatula. *Valvulae* hyalinae 2, lanceolatae, muticae.

LODICULAE squamae cuneato-quadratae, truncatae, emarginatae.

OVARIUM oblongum. STYLI 2. STIGMATA plumosa.

STAMINA 3. ANTHERAE lineares.

FIGURA AD SPECIMEN INDIAE ORIENTALIS.

- 1) Spiculae sessilis gluma inferior. 2) Gluma superior. 3) Valvula neutra.
4) Valvula hermaphrodita. 5) Genitalia cum lodiculae squamis. 6) Pedicellus spiculae masculae. 7) Ejusdem spiculae gluma inferior. 8) Gluma superior. 9) et 10) Valvulae. 11) Stamina.
-



Andropogon xanthoblepharis.

A N D R O P O G O N X A N T H O B L E P H A R I S.

RADIX ignota.

CULMUS erectus. ut videtur 3 — 4-pedalis, teres, laevissimus, ad nodos glabros subaequus, fere ad paniculam usque vaginatus.

VAGINAE totae fissae, internodio laminaque breviores, laxiusculae, striatulae, superne carinatae, undique glabrae. LIGULA tenuimembranacea, circiter lineam longa, rotundato-obtusa, dorso pilis albis longiusculis stipata.

FOLIA erecta, satis firma, linearia, acuminata, inferne carinato-compressa, superne plana ibidemque sensim paulo latiora (lineas fere 3 lata), glabra, e pallide viridi rubentia: inferiora ultrapedalia, superiora sensim breviora.

PANICULA ultrapedalis, lucida, laxiuscula, e viridi-spadicescente rubenteque varia, formata e radiis patulo-erectis, e singuli axis communis nodi (quorum 6) vagina solitariis binisve, tenuibus, glabris, iterum nodosis et vaginatis, vaginularum qualibet involucrantibus radiolum fere capillarem, glabrum, apice e nodiolo discedentem in pedicellos 2 conjugatos linea breviores, spiciferos.

SPICAE geminae, patulae, pollice breviores, sublaxiflores, spadicescentes. Articuli rhacheos angusti, teretiusculi, lineam circiter longi, utrinque ciliati pilis eréctis, rufis, ipsis brevioribus.

SPICULAE patulo-imbricatae, in quovis articulo binae:

SESSILIS linear-lanceolata, bilinealis, pseuduniflora, hermaphrodita: *Glumae chartaceae*, aequales: *inferior* obtusiuscula vel brevissime bidenticulata, praesertim inferne et ad marginem pilis adspersa, 5-nervis: nervis 3 mediis subobsoletis, duobus lateralibus crassis; *superior* glabra, acuta, compresso-carinata, 3-nervis: nervo carinali abeunte in

mucronulum. *Flosculi* 2, hyalini, i-valves: inferior neuter, lanceolato-linearis, glumis parum brevior, obtusus; superior brevior, angustissimus, involutus et apice abiens in aristam circiter 9-linealem, spadiceam, glabram, inferne tortam, medio geniculatam.

PEDICELLATA magnitudine sessilis, acuta, mascula. *Pedicellus* articulo similis. *Glumae* aequales, acutae: *inferior* pilis rufis adspersa, 9-nervis: nervis lateralibus et medio paulo fortioribus; *superior* glabra, 3-nervis, subcompresso-carinata. *Valvulae* 2, hyalinae, aequilongae, sublineares, muticae: inferior latior, sub 5-nervis, superior enervis. *Stamina* 3.

LODICULAE squamae 2, cuneato-quadratae, truncatae, subemarginatae.

GENITALIA hermaphrodita . . . (nimis juvenilia). STAMINA in spicula mascula 3. ANOTHERIS linearibus.

FIGURA AD SPECIMEN E GUINEA INFERIORI.

1) Articulus rhacheos. 2) Spiculae sessilis gluma inferior. 3) Ejusdem spiculae gluma superior. 4) Flosculus hermaphroditus. 6) Pistillum cum squamis lodiculae. 7) Spiculae pedicellatae gluma inferior. 8) Gluma superior. 9) et 10) Valvulae. 11) Genitalia mascula.



Chrysopogon serrulatus.

Page 331

C H R Y S O P O G O N S E R R U L A T U S.

RADIX ignota.

CULMUS erectus, bipedalis vel longior, inferne crassitie pennae gallinaceae, teres, glaber, ad nodos (circiter 8, glabros) aequus vel inferne leviter geniculatus, ad inferiores erecto-ramosus, ramis floriferis.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, saepe solatae, internodio laminaque breviores, glabrae: pedunculi extrema elongata. LIGULA brevissima, ciliaris.

FOLIA erecta, linearia, lineas 2 — 3 lata, acuminata, glabra, margine serrulato-hispida, glaucescentia: culmea inferiora dodrantalia, supremum angustissimum et brevissimum.

PANICULA erecta, contractiuscula, ultrapalmaris. *Axis* pertenuis, teres, flexuosulus. glaber, pluriparus. *Radii* verticillati, in quovis verticillo plurimi, capillares, simplicissimi, pl. min. undato-flexuosi, inaequales, apice paulo incrassati, et annulo pilorum brevissimorum terminati.

SPICULARUM fasciculi in radiis terminales, cum horum apice articulati, decidui, compositi e spiculis 3, basi communis pilorum barba brevi et spadicea stipatis: una subsessili, duabus pedicellatis.

SPICA SESSILIS s. potius brevissime stipitata hermaphrodita, lanceolata. *Glumae* coriaceo-chartaceae, trinerves: *inferior* angusta, lanceolato-linearis, obtusiuscula, glabra, canaliculato-concava; *superior* paulo latior, marginem versus magis chartacea, compressiuscula, nervo carinali excurrente in setam longitudine glumae, rectiusculam vel reclinatam, quae tamen seta interdum non evoluta s. suppressa est. *Perianthium* hyalinum, formatum e flosculis 2, univalvibus: *valvula*

inferior neutra, glumis paulo minor, lanceolato-linearis, acutiuscula; *superior* hermaphrodita, pl. min. brevior, angustissima, excurrens in aristam circiter 7-linealem, spadicescentem, inferne tortam, medio geniculatam.

S P I C U L A E P E D I C E L L A T A E 2, laterales, aequales, masculae.

Pedicelli medium spiculae sessilis attingunt, tenues, teretes. inferne glabri, superne ciliato-hirsuti pilis sensim longioribus, aureis. *Glumae* lanceolatae, acutae, aequales: *inferior* 5 — 7-nervis, ad nervos hispidula, nunc mutica, nunc in utraque nunc in altera tantum spicula apice brevius longiusve setifera; *superior* paulo latior, 3-nervis, glabra. *Valvulae* hyalinae 2, perangustae, lanceolatae, aequales, margine superne tenuissime fimbriato-ciliatae.

L O D I C U L A E squamae cuneato-quadratae, truncatae, subemarginatae.

S T Y L I et S T I G M A T A

S T A M I N A 3. A N T H E R A E lineares.

S E M E N linearis-oblongum, scutello suo dimidio longius.

F I G U R A A D S P E C I M E N N E P A L E N S E.

- 1) Apex radioli. 2) Fasciculus spicularum, apud * cum radiolo articulatus.
3) Gluma inferior. 4) Gluma superior. 5) Valvula neutra. 6) Valvula hermaphrodita. 7) Semen et squamae lodiculac. 8) Spiculae pedicellatae gluma inferior.
9) Gluma superior. 10) et 11) Valvulae. 12) Stamina.
-



Eulalia nepalensis

Pape del

E U L A L I A N E P A L E N S I S.

RADIX ignota.

CULMUS tripedalis? erectus, teres. laevissimus, simplex, ad nodos (in specimine basin versus abscisso 5) glabros aequus. ad infimum leviter geniculatus, infra racemos non longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodio (non multum) lamineaque breviores, superne carinatae, glabrae, in dorsi apice obsolete hirtulae vel pilosulae. LIGULA membranacea, acutiuscula, circiter lineam longa.

FOLIA erecta, sublinearia, acuminata, basin versus angustiora, compressa, explanata lineas 4 et quod excedit lata, medio nervo latè validoque albo, fere percurrente notata, striata, glabra, margine hispidula, sesquipedalia, in gramine sicco rubentia: superiora angustiora et multo breviora.

JUBAE terminalis axis pollice longior, teretiusculus, inferne pilis aliquot adspersus, sub 7-parus. *Radii* per distantias 2 — 3-lineales ab invicem remoti, basi pilis brevibus fulvis barbati, aliquot fasciculati, nunc ab ipsa basi nunc iterum paulo supra basin divisi in racemos (inarticulatos) 3-pollicares vel paulo longiores, subfastigiatos, in tota juba circiter 20, fulvas. *Pedicelli* alternatim bini, glabri: alter linea longior, alter duplo brevior.

SPICULAE omnes homomorphae et homogeneae, lanceolato-oblongae, circiter duas tertias lineae partes longae, fulvae, pilisque fulvis, ipsis triplo longioribus, erectis hirsutae.

GLUMAE chartaceae, ovato-oblongae, acutiusculae, 3-nerves, aequales: inferior pilis modo dictis obsita, superior glabra.

FLOSCULI hyalini, 2: *inferior* neuter, 1-valvis, glumis paulo brevior et angustior, earumque forma; *superior* hermaphroditus bivalvis: valvula inferiori flosculi neutri simili, sed infra apicem

brevissime denticulatum. interdum ciliatum. excurrente in aristam setiformem. aquam. tenuem, sub lente hispidulam.
4 — 5-linealem; valvula superior paulo brevior. integra.


LODICULAE squamae nullae?

STAMINA 3. ANTHERAE linear-oblongae.

STYLI 2. STIGMATA plumosa. purpurea.

FIGURA AD SPECIMEN NEPALENSE.

1) Par spicularum. 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior 4) Flocculus neuter. 5) Flocculi hermaphroditici valvula inferior. 6) Ejusdem valvula superior cum genitalibus.



Ischaemum paleaceum

Pape del

I S C H A E M U M P A L E A C E U M.

RADIX ignota.

CULMI oblique adscendentes, pedales — sesquipedales, basi pennae passerinae crassitie, teretiusculi. glabri, paulo et brevi-ramosi. ad nodos (plures, glabros, versus basin culni crebriores) leviter geniculati, inferne polyphylli, infra spicas tenuiores et non longe nudi.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae (suprema elongata paulo tumescens), internodio et inferiores lamina quoque breviores. striatae. exceptis superioribus sensim glabrioribus superne e glandulis pusillis densiuscule canescendo-hirsutae. LIGULA membranacea, brevissima, truncata.

FOLIA erecta, firma, linearis-lanceolata, acuta, basi (interdum subcordata) semiamplexentia, utrinque e glandulis minimis hirsutiuscula: majora lineis duabus latiora et pollices 2 longa, superiora sensim breviora, extimum minimum et angustissimum; cum reliquis partibus rufendo-fuscescentia.

SPICAE terminales 2, subconjugatae, erectae, ita altera alteri adpressae ut unicam mentiantur, pollice longiores — sesquipollitaires, cum culmo articulatae: altera subsessilis, altera pedunculo brevissimo suffulta. Articuli rhacheos 18 — 24, brevisimi (linea breviores), non nimis tenues, sublineari-triquetri, ad angulos laterales erecto-pilosae: pilis subaccrescentibus, ipsis parum brevioribus; cum pilis fusco-spadiccescentes, spiculam et pedicellum ananthum ferentes.

SPICULAE imbricatae, sessiles, lineas 2 longae, nitido-fuscae: *Gluma inferior* subenneato-oblonga, plano-convexa, coriaceo-palacea, glabra, subtruncato-obtusa, 7-nervis: nervis plerumque 2 (praesertim magis lateralibus) saepius vero etiam intermedio-

rum uno alterove excurrentibus in mucronulos marginem apicis brevissime crenulato-simbriatum ut totidem dentes superantes; *superior* sere duplo angustior, paulo longior, obtusa, 3-nervis, superne scabra, ceterum itidem nitido-fusca, compres-siusecula. — *FLOSCULI* 2, mutici, uterque bivalvis: *inferior* neuter, valvulis glumas aequantibus, aequilongis, hyalinis, oblongo-lanceolatis, obtusis: *inferiori* 1-nervi, *superiori* binervi; *superior* hermaphroditus: valvulis. binervibus et glumas subaequanti-bus, paulo magis membranaceis, lineari-oblongis, obtusis. La-teri spiculae sessilis appresse adpositus est *PEDICELLUS* tenuis. linea longus, pilis fusco-spadiceescentibus erectis ipsius circiter longitudine hirsutus, ananthus.

LODICULAE squamae . . . (nullae videntur).

STAMEN 1? *FILAMENTUM* longum. *ANTHERA* linearis, exserta. *OVARIUM* (juvenile) lineari-oblongum. *STYLI* 2. *STIGMATA* longa, subfiliformia, angustissime plumosula.

FIGURA AD SPECIMEN NEPALENSE.

- 1) Spicula articulo suo rhacheos insidens ab interiori visa, obversis gluma superiori et pedicello anantho. 2) Gluma inferior a tergo. 3) Gluma superior. 4) Flosculus nenter. 5) Flosculus hermaphroditus.
-





Panicum angustum.

P A N I C U M A N G U S T U M.

Def. Thyrso subsimplici, denso, linearis angusto (mediocri); Spiculis parviusculis, ovato-ellipticis, acutis, (pilis rarissimis adspersis); Gluma inferiore flosculis dimidio breviori, superiore eodem aequante; Hermaphrodito ovato, acutiusculo, laevissimo, neutro parum minori; Foliis angustis, linearibus.

R A D I X e culmorum nodis infimis approximatis fibrae plurimae, fasciculatae, simpliciuseculae.

C U L M I plures, inaequales: digitales et tenuissimi, spithamei — doctrantales fortiores, erecti, teretiuseculi, glabri, praeter nodos radicales 1 — 3-nodes, ad nodos glabros aequi vel pl. min. geniculati, simplices vel inferne ramosi, infra thyrum satis longe nudi.

V A G I N A E totae fissae, laxiuseculae, inferiores internodio longiores, lamina breviores, superiores eadem longiores, compressae, striatae, glabrae, cum reliquis partibus atropurpureo s. rubendo-fuscae. L I G U L A nil nisi margo angustissimus.

F O L I A erecta, linearia, plana, linea angustiora, acuta, striata, glabra: inferiora culmi elatioris palmaria, superiora pl. min. pollicaria.

T H Y R S U S erectus, densus, linearis, lineis 2 angustior, a pollice dimidio ad pollices fere 2 longus, ex atropurpureo vel fuseo et viridi varius. *Axis* pertenuis, angulatus, glaber, undique emittens P E D I C E L L O S sparsos, simplices vel binos aut subecompositos et tum inaequales, spicula paulo breviores, teretes, glabros.

S P I C U L A E erectae vel paulo nutantes, imbricatae, oblongae, acutae, vix lineam longae, superne pilis rarissimis et brevissimis adspersae, distincte nervosae, vix lineam longae.

GLUMA *inferior* ovata, acutiuscula, 3-nervis: nervis lateralibus marginalibus, glabra, floreulam dimidio brevior; *superior* ovata, concava, pl. min. acuta, 7-nervis, floreulum neutrum aequans, superne ad marginem pilis aliquot brevissimis adspersa.

FLOREULI subparalleli: *inferior* neuter, bivalvis: Valvula exterior simillima glumae superiori, sed 5-nervis tantum et superne dorso pilis brevissimis aliquot adspersa; valvula interior dimidio brevior, multo angustior, obtusiuscula, hyalino-membranacea. *Floreulus superior* hermaphroditus, ovatus, acutiusculus. laevissimus. viridulo-albens. Valvula superior subacutilonga.


LODICULAE squamae pusillae, quadratae, subemarginatae.

GENITALIA

SEMEN oblongum.

FIGURA AD SPECIMEN NEPALENSE.

1) Par spicularum. 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior. 4) Floreul neutrius valvula inferior. 5) Ejusdem valvula superior. 6) Hermaphroditus 7) Ejusdem valvula superior cum lodicula. 8) Semen.



Panicum Leandri.

P A N I C U M L E A N D R I.

Def. Bipedale. Racemis (8) sesquipollicaribus, superioribus interstitiis longioribus; Spiculis bilinealibus, brevissime pedicellatis, biserialibus, subimbriatis, elliptico-ovatis, obtusiusculis, glabris; Gluma inferiore lato-cordata, obtusiuscula, flosculis triplo breviori; Hermaphrodito ovato, obtusiusculo, transverse punctato-rugulosos; Folii sublanceolatis.

RADIX e culmi basi et e nodo subsecuente fibrae plures fasciculatae, ramosulae, albidae.

CULMUS (videtur obliquus vel parte inferiore decumbens) circiter bipedalis, crassitudine pennae gallinae, angulato-compressus, striatus, glaber, ad nodos (7, glabros) leviter geniculatus, praesertim inferne paluto-ramosus, infra racemos parum longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxae et plerumque solatae, interuodiis paulo laminaque breviores, compressae, striatae, glabrae, margine tenuissime ciliatae. LIGULA brevissima, ciliaris, alba.

FOLIA patula, sublanceolata, acuta vel acutiuscula tantum, basi compressa amplexicaulia, dein plana et medio fere pollicem diuidium lata, tenui-nervia, utrinque glabra, margine (interdum crenulato) hispidiuscula, cum racemis saturate viridia, majora circiter pollices quatuor longa.

RACEMI ad *axis* angulatum, subflexuosum et curvulum, glabrum, circiter dodrantalem per distantias regulares affixi, sensim breviores, alterni, solitarii, in specimine quod coram est 8, sessiles, patuli, sesquipollicares, interdum paulo incurvi.

AXIS *partialis* linearis, aequus, spicula dimidio angustior, glaber, dorso planus, fronte septulo flexuoso percursus, utrinque alternatim emittente PEDICELLOS brevissimos, compressiusculos, glabros, simplices.

SPICULAE unilaterales, biserales, subimbricatae. elliptico-ovatae vel obovatae, obtusiusculae, depressiusculae, glabrae, lineas 2 longae.

GLUMA *inferior* herbaceo-membranacea, basi hinc cordata et amplectens, latior quam longa, apice rotundato vix acutiuscula, tenui-5-nervis, flosculis duas tertias partes brevior; *superior* flosculos aequans. herbacea, vix acutiuscula, tenuissime 5-nervis, glabra.

FLOSCULI subparalleli: *inferior* neuter, 2-valvis: valvula inferior glumae superiori ex toto similis; superior aequilonga et subaequilata, paulo acutior, tenui-membranacea, dissitissime binervis. *Flosculus superior* hermaphroditus, subrotundato-ovatus, neutro vix brevior, viridulo-albens, transverse rugulosus et punctatus. Valvula superior subaequilonga, apice rotundata, marginibus implexis.


LODICULAE squamae quadratae, subemarginatae.

OVARIUM oblongum. STYLI 2. STIGMATA plumosa, atropurpurea.

STAMINA 3. ANTHERAE lineares.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Spicula ab interiori visa. 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior. 4) Flosculi neutrins valvula inferior. 5) Ejusdem valvula superior. 6) Hermaphroditus. 7) Ejusdem valvula superior cum lodicula. 8) Genitalia (juniora).
-



Spodiopogon angustifolius.

SPODIOPOGON ANGUSTIFOLIUS.

RADIX e basi culmi subbulboso-tumente fibrae validiusculae, flexuosa, simpliciusculae, albidae.

CULMUS erectus, sesquipedalis et altior, strictiusculus, inferne crassitie pennae columbinae, teres, glaberrimus, ad nodos (3, ad vaginarum basin puberulos) aequus vel leviter geniculatus, simplex vel e vaginis superioribus adpresso- et florifero-ramosus, tandem sub spicis non longe nudus.

VAGINAE totae fissae, arctiusculae, lamina breviores, inferiores internodio longiores, striatae, glabrae: radicales squamiformes tomentosae, culmeae basi pubescentes. LIGULA brevissima, membranacea, apice truncato minutissime fimbriata.

FOLIA erecta, firma, angustissima, subfiliformi-involuta, superne saepc incurva, basi in pagina superiore albo-hirsuta, striata, glabra: inferiora longissima (culnum aequantia), superiora sensim minora, spicas tamen plerumque fere superantia, cum vaginis dilute glauco-viridia.

SPICAE in culmo, vel etiam in ramis, si adsunt, terminales, 2 — 4, ad axin tenuem, subangulatum, pollice breviorem subdigitato-alternae, erectae, sesqui — bipollicares et longiores, flaventes. *Rhacheos articuli* linea breviores, compressi, apice barba pilorum ipsis longiorum densa et gilva hirsuti, biflori.

SPICULAE imbricatae: altera sessilis, altera insidens pedicello tereiusculo, articulo paulo longiori, apice brevissime pilosulo: ambae perfecte homomorphac et homogeneae, lanceolatae, lineas duas longae.

GLUMAE coriaceo-chartaceae, subaequilongae: *inferior* convexa, ovato-lanceolata, acutiuscula, apice brevissime 3-denticulata, 9-nervis, margine hirsuta et infra medium dorsi fasciculo pilo-

rum gilvescentium rigidiusculorum barbata; *superior* simillima, sed pilis pl. min. brevioribus et paucioribus, nervorum aliquot lateralibus non prorsus percurrentibus, dorsali plerumque in aciculam producto; ceterum carinato-compressa.

FLOSCULI 2, subhyalini, glumis paulo breviores: *inferior* masculus, bivalvis: valvulis linearis-lanceolatis, enervibus: superiore apice simbriata; *superior* hermaphroditus, bivalvis, masculo similis, sed valvula inferiori e nervo dorsali, inferne evanido, aristam emittente, fere 3-lineam, vix tortam, ubi valvulae apicem linquit geniculataim, spadicescentem.

LODICULAE squamiae cuneatae, truncatae, emarginatae.

OVARIUM oblongum. STYLI 2. STIGMATA angusto-plumosa, gilva. STAMINA in utroque flosculo 3. ANTERAE lineares, flaventes.

FIGURA AD SPECIMEN NEPALENSE.

- 1) Articulus rhacheos. 2) Gluma inferior. 3) Gluma superior. 4) Valvula flosculi masculi inferior. 5) Ejusdem flosculi valvula superior. 6) Stama. 7) Flosculi hermaphrodoti valvula inferior. 8) Ejusdem flosculi valvula superior. 9) Genitalia cum squamis lodiculae.
-

S P E C I E S F A S C I C U L I V I G E S I M I O C T A V I .

- 325. *Andropogon Bladhii Retz.*
 - 326. *Andropogon Iwarancusa Roxb.*
 - 327. *Andropogon pachnodes Tr.*
 - 328. *Andropogon punctatus Roxb.*
 - 329. *Andropogon serratus Retz.*
 - 330. *Andropogon xanthoblepharis Tr.*
 - 331. *Chrysopogon serrulatus Tr.*
 - 332. *Eulalia nepalensis Tr.*
 - 333. *Ischaemum paleaceum Tr.*
 - 334. *Panicum angustum Tr.*
 - 335. *Panicum Leandri Tr.*
 - 336. *Spodiopogon angustifolius Tr.*
-

S P E C I E S
G R A M I N U M

ICONIBUS ET DESCRIPTIONIBUS ILLUSTRAVIT

D. C. B. Triniius,

ACAD. SC. PETROP. SODALIS.

F A S C. XXIX.


P E T R O P O L I.

IMPENSIS ACADEMIAE IMPERIALIS SCIENTIARUM.

A c a d e m i a e j u s s u.

P. H. Fuss.





Bambusa capitata

W. Pape del

BAMBUSA CAPITATA.

CULMI (15 — 20-pedalis) rami, qui suppetunt, ultrapedales, crassitie pennae corvinae, teretes, farcti, glabri, strictissimi, simplices, usque ad capitulum florum inferius vaginis tecti.

VAGINAE plurimae, altera alteram vaginantes, arctae, glabrae, apice utrinque auricula brevi auctae, plerumque emitte cirrulos perbreves; inferiores demum aphyllae. LIGULA chartacea, brevisima, truncata.

FOLIA patula, numerosa, approximata, stricta, cum vagina articulata, sublanceolato-linearia, inferne carinata, acuminata, firma, multi-striata, undique glabra, pollices 6 — 10 longa, lineas 4 — 7 lata (superiora breviora magisque lanceolata), infra glaucescentia supra gilvo-viridia, siccitate saepe fissa.

FLORES in capitulis vel glomeribus magnitudine nucis juglandi, in ramorum extremitate pl. min. distantibus, sessilibus, (in speciminiibus nostris) duobus vel tribus, formatis e spicularum fasciculis substellatim divergentibus.

SPICULARUM fasciculi ad axis nodum nunc laterales nunc eundem ambientes, basi stipati squamis aliquot magnitudine valde inaequilibus, membranaceis, multinervibus (infima axi adpressa bicostata), imbricatis, inter quas plerumque spicula una alterave accessoria multoque minor et angustior prodit, et quarum 2 superiores pro spicula singula GLUMARUM locum tenent. — *Rhacheos* spiculae articuli continui, brevissimi, superiores sensim longiores, glabri.

FLOSCULI in singula spicula 3, vel cum rudimento terminali 4, cylindraceo- et sublineari-convoluti, lineas 5 — 6 longi, distiche alterni, subaequilongi (terminali tamen paulo minori), chartacei, obtusiusculi interdum cum mucronulo, glabri, patuli, hermaphro-diti, bivalves: *Valvula inferior* concava, 13-nervis: nervo medio superne paulo fortiori et subcarinali; obvolvens *valvulam superio-*

rem aequilongam l. paulo longiore, depressam, dorso concavam, antice convexiusculam, conduplicatam marginibus contignis, disseminate bicostatam et praeterea tenui-9-nervem. — Flosculi tertii fusiformis et arctissime convoluti valvula superior brevistipitata pariter quidem 11-nervis, neque vero dorso canaliculata, sed arcte convoluta. — *Rudimentum* flosculi quarti, si adest, stipitatum, fusiforme, angustissimum, valvulaceum.

LODICULAE squamae 2 (numquam 3 inveni), ovario latiores et longiores, membranaceae, inferne plurinerves, apice erosulo-obtusiusculae et brevissime ciliatulae.

OVARIUM oblongum, superne puberulum, excurrens in **STYLO** pariter puberulum, divisum in **STIGMATA** 3, pluinosulo-pubescentia.

STAMINA 6, **FILAMENTIS** demum elongatis, **ANTHERIS** linearibus.

FRUCTUS Caryopsis sublinearis, libera, fusca, apice puberula, dorso sulco lato et profundo excavata, in sulci fundo linea elevata percursa, antice convexa. — Matura in unius ejusdemque spiculae flosculo infimo, non nisi semiimatura in secundo, dum in tertio genitalia vix etiamnum explicata sunt.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Capituli fasciculus minor. 2) Una e squamis fasciculi basin stipantibus.
 - 3) Flosculi inferioris valvula inferior. 4) Ejusdem valvula superior a fronte. 5) Eadem a tergo. 6) Lodicula hujus flosculi cum staminibus 7) Ejusdem flosculi Pistillum. 8) Flosculus tertius. 9) Ejusdem valvula superior a latere. 10) Ejusdem genitalia. 11) Rudimentum. 12) Fructus a fronte. 65) Idem a tergo.
-



Bambusa virgata.

W. Paine del.

B A M B U S A V I R G A T A.

CULMI (25-pedalis, inferne pollices 2—3 crassi) rami inferiores crassitie digitii minoris, superiores pennae corvinae, e nodis emittunt ramulos (in nostris specim. senos) fasciculatos, satis tenues, plurinodes, crassitie et longitudine inaequales, compositos, floriferos foliiferosque: inferiores digitales—spithameos, mere et fere a basi floriferos; terminales ultrapedales, apicem versus (ob vaginas imbricatas) sensim incrassatos et foliiferos, ex ipso apice floriferos; omnes virgatos.

VAGINAE ramulorum plures: inferiores aphyllae; superiores internodio longiores, imbricatae, sub lente pubescentes, margine ciliatae, foliiferae. *Ligula* brevissima, utrinque producta in auriculam brevem, chartaceam, e marginibus emittementem cirrulos plures, 1—2-lineales.

FOLIA patula, subdistiche approximata, lanceolato-linearia, basi in petiolum fere bilinealem tomentoso-pubescentem attenuata, apice acuminata, ramulorum longiorum 4-pollicaria et lineas 5—7 lata, breviorum paulo breviora et angustiora, multistriata, supra scabriuscula et subsordide viridia, infra pubescentia et subcanescentia, margine interiori hispidula, exteriori vero ciliatula.

PANICULAE, quas ramuli inferiores toti superiores apice tantum formant, spiciformes, angustae, interruptae, virgatae, palmares—dodrantales, laete virides. *Ax is* pl. min. tenuis, teres, glaber, plurarticulatus sed continens, per intervalla ad summum pollicaria alternatim emittens spiculas sessiles, aut 3—4 fasciculatas aut (rarius) solitarias, patulas.

SPICULAE teretiusculae, subcylindricae, attenuato-acutissimae, nitidulae, 4—8-florae: longiores fere pollicares, breviores pl. min. semipollicares: paleis imbricatis, sensim majoribus, supremis iterum paulo brevioribus et angustioribus.

GLUMAE 2 (inter quas saepe spicula parva accessoria pullulat), membranaceae, perbreves, oblongo-ovatae: *inferior* axi adpressa 2-carinata, ad carinas et apice mucronulata brevissime ciliatula; *superior* vix longior, mucronulata, 7-nervis: nervo medio carinali, lateribus tenuissimis.

RHACHIS spiculae continua, formata ex articulis turbinatis, flosculo
multo brevioribus, sensim majoribus, ultimis tenuioribus.

FLOSCULI omnes bivalves: inferiores 1—2-steriles; sequentes masculi,
supremus hermaphroditus. *Valvulae exteriores* ovatae, compres-
siusculo-concavae (nec carinatae), convolutae, apice mucronatae,
marginē ciliatae: flosculorum inferiorum sterilium breviores,
9—11-nerves; muscularum majores, 15—17-nerves; Herma-
phroditi angustior, arcte convoluta, 13-nervis: nervis omnium
pertenuibus, apicem versus magis conspicuis. *Valvulae superiores*
flosculorum praeter hermaphroditi omnium depresso, rhachi dor-
so arcte adpressae, postice concavae, antice conduplicatae margi-
nibus contiguis, apice rotundatae, dissite bicarinatae et praeterea
nervis 5—7 tenuissimis notatae, ad flexurae angulos dense cilia-
tae, albae: flosculorum infimorum sterilium et ante hermaphroditi
tum supremi brevissimae, muscularum reliquorum valvula infe-
riore tertiam partem vel sere dimidio breviores. Hermaphroditi
valvula superior angusta, lanceolata, acutissima, inferiorem aequans,
viridis, convoluta, in speciminibus nostris juvenilibus nimis tenuis
quam ut nervorum status et numerus rite explorari possit.


LODICULAE squamae in flosculis masculis nullae; in hermaphrodito
(solo quem invenire contigit adultiori) 3? (nam non nisi duas di-
stinguere licuit: alteram ovatam, inferne nervatam, margine su-
perne fimbriatam; alteram lanceolatam, angustiorem, breviorem
et glabram).


OVARIUM cum stylis

STAMINA 6. *Filamenta* subnulla, *antherae* lineares: in masculis infimo
et extremo, ut et in hermaphrodito minimae, in masculis reliquis
internodiis duplo saltem longiores.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Gluma inferior. 2) superior. 5) et 4) Valvulae flosculi infimi sterilis. 5) Ar-
ticulus rhacheos cum basi flosculi masculi. 6) Valvula inferior flosculi masculi.
7) ejusdem flosculi valvula superior a fronte, 8) a tergo. 9) Stamina ejusdem flos-
culi. 10) Hermaphroditus integer. 11) ejusdem Valvula inferior, 12) superior,
convoluta. 13) et 14) Squamae lodiculares. 15) Stamina Hermaphroditi.





Cheiogyna capituliflora.

W. Pape del.

CHUSQUEA CAPITULIFLORA.

CULMI (altissimi, scandentis) rami qui suppetunt pedales, crassitie penae corvinae, teretes, laeves, farcti, internodiis circiter 4-pollicaribus. Ramuli dodrantales, semiverticillato-fasciculati 3—5—8, patentes imo quandoque declinati, simplices, nodis circiter 7 intercepti et geniculati, apice folii- et floriferi.

VAGINAE ramulorum membranaceae, arctiusculae, glabrae: inferiores internodio breviores et aphyllae, superiores foliferae. LIGULAE loco margo vaginae subauriculato-productiusculus.

FOLIA chartacea, versus apicem ramulorum per distantias semi-l. 1-pollicares alterna, patentia, brevissime petiolata, e basi ovata lanceolata, acuminata, pl. min. 3-pollicaria, lineas 5—6 lata, utrinque laevia et glabra, margine vix hispidula, (fronte laetius) glaucescendo-viridia, obsolete multistriata, nervis 15 (quorum medius infra paulo prominens) tenuissimis quidem, tamen distinctioribus.

CAPITULUM florum in apice ramulorum solitarium, folio supremo parvo stipatum, semirotundum, fere magnitudine cerasi, pallide fuscens, compositum e spiculis plurimis, secundis. Axis capituli circiter bilinealis, pubescens; altero latere emittens radiolos brevissimos (vix lineales), sparsos, discedentes in pedicellos minimos, pubescentes.

SPICULAE ovato-oblongae, 3—4-lineales, pl. min. obtusae, compressiusculae, lineam latae, 3-florae.

GLUMAE 2, membranaceo-chartaceae, satis angustae, ovato-lanceolatae, carinato-compressae, attenuato-acuminatae, medio et apicem versus sub lente visae hispidae, interdum pilis patentibus adspersae: inferior 1-nervis superiore 3-nervi paulo-, flosculis circiter triplo-brevior.

FLOSCULI ob rhachin subnullam alter alterum arcte vaginantes, chartacei, lineari-oblongi; duo inferiores 1-valves, neutri, 7-(9-)

nerves, glabri, obtusi, interdum minutissime micronulati: *infimus* superiore paulo vel $\frac{1}{4}$ brevior; *superior* hermaphroditum aequans vel parum superans. — Rarissime accedit flosculus neuter tertius. *Hermaphroditus terminalis*, bivalvis: Valvula inferior flosculis neutrīs forma nervisque similis; superior aequilata, paulo brevior, compressa, bicostata et praeterea utrinque tenuissime binervis.

LODICULAE squamæ 3, subaequales, tenui-membranaceæ, ovatae, acutiusculæ vel acutæ, superne fimbriatae, inferne nervatae, ovarium aequantes.

OVARIUM oblongum, glabrum. STYLI 2, breves. STIGMATA pubescentio-plumosula.

STAMINA 3. FILAMENTA brevissima. ANTHERAE lineares.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Spicula. 2) Basis flosculorum. 3) Flosculus neuter inferior. 4) Hermaphroditus a latere. 5) Ejusdem valvula superior. 6) Lodiculae squamarum una. 7) Genitalia.
-



Chasquea penifolia

W. Pepe del

CHUSQUEA PINIFOLIA N. AB ES. IN LINNAEA IX.

Arundinaria? pinifolia N. ab Es. Agr. bras. p. 525.

CULMI arborescentis, 4 — 6-pedalis rami, qui prostant, pedales, crassitie pennae anserinae vel corvinae, solidi, lignosi, teretes, ob ramulos confertissimos digitales — ultrapalmates stricto-erectos et soliiferos subsecundo-virgati, dum floriferorum ramuli superiores patuli eosdem apice crassiores reddunt. Internodia ramorum pl. min. bipollicaria. Ramuli semiverticillati, plerumque plurimi, tenues, juniores basi squama vaginante scariosa decidua tecti, brevius et adpresso-ramuloso: ramulis inferne denudatis, superne confertim foliosis.

VAGINAE ramulorum plures, altera alteram vaginantes, breves, sulcato-striatae, glabrae: inferiores aphyllae. LIGULAE loco apex vaginac rotundatus.

FOLIA patula, sublanceolato-linearia, pungentia et quasi acerosa, ramulorum suprema ultrapollicaria, inferiora breviora, vix linearia lata, utrinque laete viridia, glabra.

FLORES in jubulis racemoso-thrysoidibus, pl. min. pollicaribus, densis, lineari-oblongis, ramulos terminantibus, basi foliolo involucratis, pl. min. secundis. Axis subtriqueter, satis tenuis, plurimam saltem partem altero latere emittens radios brevissimos, approximatost, nunc solitarios et statim supra basin divisos, nunc aliquot fasciculatos: alios 1-floros, alios compositos, sub lente pubescentes: radiolis pedicellos formantibus spicula plerumque pl. min. longiores.

SPICULAE subfusiformes, 3 lineales, compressiusculae, nunc obtusiusculae, nunc acutiusculae, demum fuscescentes.

GLUMAE minutae, chartaceae, ovatae, obtusae, inferiori pl. min. breviori, cum pedicello continuae, 3 florae.

FLOSCULI chartacei, alter alterum arcte vaginantes, callo brevissimo glabro insidentes: inferiores 2 neutri, univalves, subaequales, her-

maphrodito dimidio vel fere dimidio breviores, 3 nerves, submucronulato-acuti, sub lente dorso asperiusculi, carinato-compressiusculi. *Hermaphroditus terminalis*, clausus, bivalvis: valvulis chartaceis, aequilongis, concavis potius quam compressis: inferior mucronulato-acutiuscula, 7-nervis; superior plerumque oblusa, trinervis, nervis subobsoletis.

LODICULAE squamae 3, ovario paulo longiores, membranaceae, ovatae, acutiusculae, apice fimbriatae, inferne nervatae.

OVARIUM oblongum, glabrum. **STYLI** 2, breves. **STIGMATA** plumosula, alba.

STAMINA 3. **FILAMENTA** brevia. **ANTHERAE** lineares, luteac.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIUM.

1) Spicula. 2) Glumae. 3) Flosculorum neutrorum alter. 4) Hermaphroditii valvula inferior. 5) Ejusdem valvula superior. 6) Squamularum lodicularium una. 7) Genitalia cum squama lodiculari dorsali.



Oryza capillata.

U. S. Peacock

RADIX ignota.

CULMUS sesquipedalis, inferne geniculatus, ad nodos 5 — 6 reliquos puberulos aequus, crassitie pennae columbinae, sulcato-subangulatus, e foliorum axillis ramos floriferos perbreves et adpressos emittens, sub juba non longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodio et, superiores, lamina breviores. striatae, glabrae, marginem versus pubescentes. LIGULA membranacea, brevis, subrepando-obtusiuscula.

FOLIA patula et patentia, sursum sensim majora et magis conferta: inferiora oblongo-cordata, pollicaria et breviora (interdum brevissima et angusta), superiora 3 — 4-pollicaria, lanceolato-ovalia, sesquipollicem lata, in petiolum vix linealem hirto-pubescentem attenuata, basi subaequali-rotundata: omnia multi- et subaequali-striata, nervo medio parum prominulo, acuminata, undique glabra, glaucescentia.

JUBA terminalis 3-pollicaris, patens, exceptis spiculis semineis alboviridulis purpurea. *Axis communis* tenuis, angulatus, glabriusculus, 7 — 8-parus. *Radii* solitarii. satis approximati vel 2 — 3 in pseudoverticillum collecti, ob radiolos tenuissimos et brevissimos subsimplices, racemiformes: inferiores, circ. sesquipollicares, mere masculi; superiorum, parum breviorum, unus alterve apice feminiserus; supremus cum pedunculis axillaribus reliqui culmi circ. pollicaribus totus femineus.

SPICULAE MASCULAE plurimae, imbricatae, brevi-pedicellatae, angusto-lineari-lanceolatae, 3-lineales, purpureae. *Glumae* 2, aequilatae, 3-nerves: inferior in subulam capillaceam, flexuosulam, ipsa paulo breviorem excurrens, eamque ob rem superiore, simpliciter acutata, quartam quintamve partem longior. *Perianthium* nullum.

Lodiculae squamae 2? oblongae, obtusae, enerves. *Stamina* 3.
Filamenta brevissima. *Antherae* lineares, angustae.

SPICULAE FEMINEAE, in radio juba extremitate et in pedunculis axillaribus circiter 4, laxe alternae, in radiis masculis superioribus solitariae et terminales, pedicello suffultae ipsis triplo breviori, angulato, erecto, sub glumis parum vel vix tumente, linearis-ovatae, 6 — 7 lineales. *Glumae* herbaceae, linearis-lanceolatae, subcaudato-subulatae, aequilatae, pallide virides: inferior, parum longior sub-7-, superior sub-5-nervis. *Perianthium* coriaceo-cartilagineum, niveum, elliptico-lineare, obtusum, laevissimum, glumis quintam partem brevius: valvula superiore inferiori aequilonga. *Lodiculae* squamae 3, aequales, oblongo-subquadratae, truncato-obtusae, nervatae. *Ovarium* linearis-ellipticum. **STYLI** inferne connati.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Radiolus masculus.
- 2) Spiculae masculae gluma inferior.
- 3) Gluma superior.
- 4) Stamina cum lodicula.
- 5) Spicula feminea.
- 6) Ejusdem perianthium.
- 7) Pistillum cum squamis lodicularibus.





Oryza cordifolia

OLYRA CORDIFOLIA Willd. Ib.

CULMUS (abscissus) bipedalis, teres, cum vaginis crassitie pennae galinaceae, glaber, ad nodos tenuissime pubescentes aequus, totus vaginis tectus, infra paniculam pubescens demumque ibidem longius breviusve aphyllus.

VAGINAE totae fissae, laxae, internodiis longiores et alteram vaginantes, superne carinatae, glabrae, apice utrinque productae in auriculam obtusam, brevem.

FOLIA plura, consertim alterna, patula l. patentia, ovata, acuminata, petiolo brevissimo insidentia, basi rotundata interdum subcordata, utrinque glabra et subglaucous, margine scabra, pollices $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ lata, 4 — 8 longa, multistriata, striis (praeter nervum medium) 15 — 17 paulo evidenteribus, longitudinaliter (neque vero nervis parallelo) leviter 7 — 9 plicata: plicis ad nervi medii latus alterum 3 — 4, ad alterum 4 — 5.

PANICULA terminalis, circiter palmaris, subpyramidato- aut lanceolato-ovata, fuscescens. *Axis communis* angulatus, puberulus, superne glabratus. *Radii* 5 — 4 — 3, verticillati, intermixtis solitariis, patuli, verticillorum singulorum subaequales, totidem thyrsulos lucidulos referentes, puberuli, inferne masculi, apice seminei: inferiores fere biplicares, superiores breviores.

SPICULAE MASCULAE duas tertias radiorum inferiorum partes occupantes, in radiolis sparsis, tenuibus, parum compositis et puberulis dispositae, pedicellatae, erectae, lanceolato-lineares, acuminatae vel caudatae, cum caudula 4-lineales: *Glumae* clausae: inferior multistriata, superne asperiuscula; superior subaequilonga, 3-nervis. *Flosculus* (saltem plerumque evolutus) hyalinus, univalvis, glumis paulo brevior, acutiusculus. *Stamina* 3, filamentis brevissimis, antheris linearibus.

SPICULAE FEMINEAE radiorum inferiorum apicem occupantes, 1—2—3,
in radiis superioribus sensim brevioribus et sub-anandris subsolitariae , pedicellis incidentes ipsis plerumque brevioribus , clavatis ,
scabriusculis , ovatae , cum caudula circiter 7 - lineales , glabrae.
Glumae 7 - nerves , flosculo duplo longiores , caudato-acuminatae ,
fuscescentes : inferior paulo longior . *Perianthium* ovatum , obtusiusculum , eburneo-cartilagineum , laeve ; valvula superiore infe-
riori subaequilonga . *Lodiculae* squamae 3 , quadratae , truncatae ,
nervatae . *Genitalia* . . .

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Spicula mascula (omissa a pictore caudula). 2) Ejusdem perianthium 1-valve.
3) Spicula feminea. 4) Ejusdem perianthium. 5) Hujus valvula superior. 6) Lodiculae squamarum altera.
-





Olyra fasciculata

M. Pape del

RADIX ignota.

CULMUS videtur tripedalis, teres, crassitie pennae anserinae, obsolete pubescens, ad nodos glabros aequus, sere totus vaginis tectus, infra racemos non nimis longe nudus.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, inferiores internodiis longiores, laminam pl. min. aequantes, teretes, striatae, sub lente pilis brevissimis pubescentes, marginibus tenui-ciliatae. LIGULA chartacea, brevis, truncata, laciniata.

FOLIA plura, patentia, ovata, acuminata, basi in petiolum brevissimum attenuata alteroque latere convexa, altero paulo rectiora (oblique subtruncata), excepto margine hispidulo utrinque glabra, multi-striata, striis 17 magis manifestis, nervo medio crassiori et productiori, dodrantalia — spithamea, pollices 2 cum dimidio l. 3 lata, subtus glaucescentia, supra laete viridia.

PEDUNCULUS nunc e vagina suprema solitarius nunc aliis e foliorum superiorum axillis adjunctis, glaber, hinc sulcatus, aut nudus et interdum spithameus, aut ad racemos usque vaginatus.

PANICULA e verticillis non nisi 2—3-constans, per distantias circiter pollicares ab invicem remotis: *axi communi* satis tenui, subcompresso, glabro. *Radii* quini l. pauciores, racemiformes, fastigiati, verticilli inferioris circiter 5-pollicares, ob radiolos spicularum muscularum brevissimos, adpressos, tenuissimos et parum compositos specie simplicissimi: inferne masculi, apice seminei.


SPICULAE MASCULAE partem radii cuiusvis inferiorem ambientes plurimae, brevissime pedicellatae, subadpresso-erectae, lanceolato-lineares, angustae, lineas 3-longae, fuscescendo-virides, praesertim in media radii parte deciduae. *Glumae* 2, linearis-lanceolatae, herbaceo-membranaceae, 1-nerves, glabrae: inferior paulo longior in subulam brevem scabram excurrens; superior acuta tantum.


Perianthium nullum. Lodiculae squamae 3, breves, perangustae,
truncatae, aequales: 2 anteriores, tertia dorsalis. *Stamina* 3. *Fi-*
lamenta brevissima. *Antherae* lineares, angustae.

SPICULAE FEMINEAE in apice radii cuiusvis 2—3, remotiusculae,
ovato-lanceolatae, lineas 6—8 longae, incidentes pedicellis ipsis
brevioribus, crassiusculis et angulatis. *Glumae* herbaceae, tenui-
7-nerves, caudato-acuminatae, glabrae, virides: inferior paulo lon-
gior. *Perianthium* linearis-conicum, 4 lineale, obtusum, demum
eburneo-cartilagineum, glabrum, punctulatum: valvula superiore
inferiori subaequilonga. *Lodiculae* squamae 3, squamis spicula-
rum muscularum similibus sed paulo latioribus. *Orarium* linearis-
ellipticum. *Stigmata* 2, exserta, atro-purpurea.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Radiolus cum spicula mascula. 2) Hujus spiculae gluma inferior; 3) gluma
superior. 4) Stamina. 5) Lodiculae squamae 2 anteriores, 6) squama posterior.
7) Spicula feminea. 8) Ejusdem gluma inferior. 9) Perianthium. 10) Ejusdem
valvula superior cum ovario et lodiculae squamis anterioribus.
-





Oryza filiformis.

W. Pope Del.

RADIX ignota.

CULMUS 2-pedalis? gracilis, crassitie pennae passerinae, compressus, striatus, glaber, ad nodos (plures, annuliformes, glabros) aequus, simplex aut e vaginis superioribus appresso- et florifero-ramosus.

VAGINAE totae fissa, arctae, internodio duplo-laminaque breviores, striatae, carinatae, glabrae. LIGULA chartacea, brevis, cuin vaginæ fauce confluens et utrinque in auriculam producta.

FOLIA erecta l. patula, sere linearia, linea \tilde{s} 5 — 8 lata, pollices 5 — 6 longa, acuminata, basi in petiolum brevissimum contracta et margine exteriori trapezoideo-angulata (nervo medio margini interiori propiore quam exteriori), margine hispidula, in pagina inferiori viridi scabra, in superiori glauca laeviuscula.

PEDUNCULI e vagina extima terminales bini vel solitarius, nec raro e vagina secunda duo alii axillares, filiformes, satis elongati, *panículam* ferentes circiter palmarem, angustissimam, paucifloram, compositam e *radiis* aliquot solitariis, alternis, simplicibus, rarius subcompositis, adpressis, triquetris plerumque 6-linealibus (raro longioribus), inferne masculis, apice semineis.

SPICULAE MASCULAE in radiis inferiores plerumque 8, laxiuscule alternae, adpressae, brevissime pedicellatae, sere semper binatae (altera brevius pedicellata), lanceolatae, acutae, linea \tilde{s} 2 et qu. exc. longae, ad nervos scabriuscule. *Glumae* subaequales, e viridi gilvae, clausae: inferior acuta 3-, superior bidentata 2-nervis. *Perianthium* nullum. *Lodiculae* squamae 3, aequales, cuneatae, emarginatae, nervatae. *Stamina* 3. *Filamenta* brevissima. *Antherae* lineares.

SPICULA FEMINEA in apice radiorum subsolitaria, erecta, ovato-lanceolata, linea \tilde{s} circiter 8 longa, pedicello insidens ipsa subtriplo breviori, apice dilatato, hinc angulato-gibbo, inde complanato.

Glumae parum inaequales, herbaceae, caudato-subulatae, glabrae: inferior, paululum longior, 5—7—9-, superior 5—7-nervis. *Perianthium* glumis sere duplo brevius, linearis-subovatum, superne paulo attenuatum, apice obtuso, demum coriaceo-cartilagineum, album, undique punctis s. scrobiculis apiatum: valvula superiori aequilonga. *Lodiculae* squamae 3, ut in spicula mascula, sed paulo latiores. *Ovarium* linearis-ellipticum. *Styli* inferne connati.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Spicula mascula. 2) Ejusdem gluma inferior. 3) Gluma superior. 4) Stamina cum squamis lodiculae anterioribus. 5) Spicula feminea. 6) Ejusdem perianthium. 7) Ovarium et squamae lodiculares.
-



Oryza floribunda

11'. Imperat.

OLYRA FLORIBUNDA Raddi. Agr. bras. p. 20.

RADIX fibrae flexuosa, lignosae, ramulosae.

CULMI subcaespitosi s. plures fasciculati, obliqui, diffusi vel suberecti, pede breviores l. sesquipedales, superne florifero - ramosi, tenues sed firmissimi et sublignosi, subfiliformes, teretes, sulcato - striati, glabri, ad nodos puberuli et aequi l. paulo geniculati.

VAGINAE usque ad basin fissae, superiores tumidiusculae, laminam subaequantes vel eadem paulo -, internodio multo-breviores, striae, superne puberulae. LIGULA margo angustissimus, subtilissime et brevissime ciliolatus.

FOLIA patentia, ovato-oblonga, obtusa, basi subcordata l. truncato - rotundata in petiolum brevissimum puberulum attenuata, superiora approximato-disticha, inferiora remota, parum inaequalia, tenuissime-striata, glabra, margine serrulato-hispidula, glaucescendo-viridia, pollices 2 vel $1\frac{1}{2}$ longa, lineas circiter 6 lata, suprema paulo breviora et angustiora.

FLORES FEMINEI in racemis simplicibus l. subsimplicibus, solitariis l. aliquot fasciculatis, ex axillis foliorum inferiorum remotorum prodeuntibus, 7 — 12-pollicaribus; ex axillis foliorum altius sitorum paniculam masculam unam alteramve stipantibus eademque multo brevioribus.

Axis communis triqueter, flexuosulus, puberulus, altero latere alternatim exserens *pedicellos* 4 — 6, subangulatos, puberulos, plurimumque solitarios, erectos, spicula breviores.

Spicula ovata, circiter 3-linealis. *Glumae* coriaceo-herbaceae, ovatae, caudulato- s. attenuato-acuminatae, vix vel parum inaequales (inferiore paulo majori), flosculum paulo superantes, 5-nerves, hirtulo-puberulae.

Flosculus coriaceus, basi in stipitem brevissimum obtusum s. rotundatum glabrum constrictus, linearis-lanceolatus, pl. min. obtusus, obsolete 3-nervis, glaber, laevis, sordide vel fuscescendo-

albens, clausus; *valvula superior* subaequilonga, acutiuscula, dissite binervis.

Lodiculae sqq. tres, membranaceae, oblongae, truncatae, ovario paulo minores: duae anteriores apice hinc in lobulum obtusum productinsculae; dorsalis paulo brevior, denticulata; inferne nervo uno alterove notatae.

Orarium lanceolato-oblongum, glabrum. *Styli* 2. *Stigmata* plumosa, sessilia. — *Fructus*

FLORES MASCULI in paniculis tenuissime pedunculatis, e foliorum distichorum inferioribus una cum semineis aliquot, e supremorum axillis absque his prodeuntibus, plerumque 3 — 5 fasciculatis, inaequalibus, majoribus plus minusve longe exsertis, subsecundo- contractis, 1 — 2-pollicaribus, fusco rubellis, interdum pallentibus.

Axis communis pertenuis, angulatus et sub lente puberulus. *Radius* axi communi similes, inferiores fasciculati et inaequales: breviores (5 — 7-lineales) a basi-, longiores paulo superius floriferi. *Radioli* racemosi, secundi-flori, breves. *Pedicelli* flosculo multo breviores.

Spiculae deciduae, perangustae, linearis-lanceolatae, caudulato-acuminatae, circiter 3-lineales. *Glumae* membranaceae, parum inaequales (inferiore paulo majori), 3-nerves, glabrae, clausae.


Flosculus proprius nullus.

Lodicula nulla.

Stamina 3, filamentis brevibus, antheris linearibus, purpurascenscentibus.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Spicula feminea. 2) Ejusdem flosculus. 3) Flosculi feminei valvula superior.
 - 4) Ovarium cum squamis lodiculae. 5) Radiolus paniculae masculae. 6) Spicula mascula. 7) Ejusdem gluma superior cum staminibus.
-



Olyra paniculata

O L Y R A P A N I C U L A T A S^w.

RADIX fibrae satis longae, crassiusculae.

CULMUS 3 — 6-pedalis, teres, inanis, glaberrimus, inferne crassitie pennae aquilinae, ramosus: ramis patentibus, folii-floriferisque.

VAGINAE totae fissa, ramorum juniorum arcta, adultiorum laxae et solutae, (inferiores emarcidae), internodio laminaque breviores, striatae, glabrae, juniores margine superne ciliatulae. LIGULA chartacea, obtusa, vix linealis, petiolo foliorum latior.

FOLIA plurima, patentia, ovato-lanceolata l. lanceolato-oblonga, acuminata, basi in petiolum brevissimum attenuata, altero margine convexa, altero subtrapezoideo-rotundata, excepto margine hispido glabra, multistriata, striis 11 — 13 — 17 magis manifestis, nervo medio paulo crassiori, pollices 5 — 6 longa, pollicem l. sesquipollicem lata (ramorum inferiora breviora et angustiora), aut utrinque aut subtus magis glaucescentia.

PANICULA vel JUBA e ramorum apice solitaria vel interdum cum altera e folii superioris axilla, basi demum libera et pedunculo pl. min. longe nudo sussulta, pl. min. palmaris, praesertim demum patula et subpyramidata. *Axis communis* satis tenuis, sulcato-angulatus, pilosulo-pubescent, radios emittens nunc solitarios et sparsos, nunc aliquot pseudo-semiverticillato-fasciculatos, flexuosulos, angulatos, pube adspersos, inferiores pl. min. pollicares, inferne masculos, apice feminineos.


SPICULAE MASCULAE pedicello insidentes superne paulo incrassato, erecto-patulae, lanceolato-lineares, cum caudula circiter 4 lineales, glabrae, deciduae. *Glumae* herbaceo-membranaceae, non computata cauda inferioris subaequales: inferior 3-nervis, excurrentis in caudam scabram circiter ipsius longitudine; superior acuta tantum, 2-nervis. *Perianthium* nullum. *Lodiculae* squamae 1—2—3,

oblongo - quadratae , truncatae , nervatae. *Stamina* 3, *filamentis* deum elongatis, *antheris* linearibus.

SPICULAE FEMINEAE in apice radiorum solitariae, oblongo - ovalae, cum cauda circiter 8 lineales, pedicello sussultae clavato, glabro. **Glumae membranaceae**, caudato-acuminatae, pallide fuscescentes: inferior 7 — 9-nervis, longius caudata : cauda saepe pubescente; superior 5-nervis, caudula breviori. **Perianthium** ovato-ellipticum, obtusum, cartilagineo-eburneum, laeve, 2 — 3-lineale, clausum; valvula superiore subaequilonga. **Lodiculae squamae** 3, masculorum similes. **Ovarium** oblongum, in *stylum* excurrens inferne simplicem. **Stigmata** 2, plumosa. **Caryopsis** oblonga, arcte inclusa, depressiuscula, scutello suo 4 — 5^{ies} longior.

FIGURA AD SPECIMEN EX INDIA OCCIDENTALI.

- 1) Pars radioli, spiculis delapsis.
 - 2) Spicula mascula.
 - 3) Ejusdem gluma superior.
 - 4) Genitalia mascula cum lodicula.
 - 5) Spicula feminea.
 - 6) Ejusdem Perianthium.
 - 7) Hujus valvula superior cum Pistillo.
 - 8) Squamarum lodicularium altera.
 - 9) Ovarium cum squamis 2.
 - 10) Caryopsis.
-





Oryza semiovata.

RADIX ignota.

CULMI pars superior teres, crassitie pennae corvinae, glabra, obsolete striata, ad nodos glabros aequa, tota vaginis foliorum tecta.

VAGINAE totae fissae, laxiusculae, internodio longiores, lamina breviores, striatae, vnde glabrae, superne carinatae, apice utrinque in auriculas obtusas productae. LIGULA membranacea, brevissima, truncata, sub lente ciliatula, fusca.

FOLIA in parte culmi descripta plura (in aliis speciminibus ejusdem magnitudinis 3, in aliis 5, in aliis 8), patula, petiolo circiter bilineali coriaceo fusco obsolete pubescente sussulta, lanceolato-ovata, acuminata, baseos altero margine convexa, altero oblique subtruncata, praeter marginem hispidulum glabra, multistriata, striis 13 magis manifestis (intermedia crassiori s. nervo dorsali non solii medium tenente, sed parti ejusdem convexae propiori), pollices 3 vel 2 cm dimidio lata, dodrantalia, laete viridia.

PEDUNCULUS e vagina suprema nunc solitarius, nunc duo vel tres: tum altero binisve elongatis (pedalibus), tertio brevi, serius florante; subcompressi, glabri, aequi.

JUBA PANICULARIS ovato-oblonga, circiter spithamea, densiuscula. *Axis communis* rectus, subaequus, angulatus, glaber, pluriparus. *Radii* absque ordine ex axi erumpentes, communiter tamen plures conserti ita, ut verticillum mentiantur, patuli, pertenues, recti, subaequi, scabri, circiter a medio ramulosi: radiolis brevibus, secundis; inferiores, circiter digitales, plerumque toti masculi; superiores, sensim breviores et in juba extrema tandem vix pollinaires tantum, inferne masculi, apice spicula seminea solitaria terminati et sub eadem in pedicellum cuneatum inflati.

SPICULAE MASCULAE in quovis radio inferiori plurimae, secundae, angusto-lineares, non computata subula sua caudiformi lineas 4

longae, virides, deciduae; in radiis terminalibus pauciores, ad minimum tamen 6. *Glumae* 2, linear-lanceolatae, membranaceae, nervis 3 viridibus notatae: duobus insuper minus manifestis marginalibus; inferior in subulam flexuosam, pertenuem, circiter bilinealem excurrens, superior acuminata tantum et hanc ob rem brevior. *Perianthium* nullum. *Stamina* 3, filamentis brevissimis, antheris angustissimis, linearibus, glumis sere dimidio brevioribus. *Lodicula* nulla.

SPICULAE FEMINEAE in radiis superioribus terminales, solitariae, elliptico-ovatae, non computata subula glumae inferioris lineas 6 longae, dilute virides, diutius quam masculae persistentes. *Glumae* 2, forma spiculae, herbaceo-membranaceae, sub-5-nerves, glabrae: inferior apice in subulam flexuosam, asperiusculam, ipsius longitudine attenuata; superior acuminatissima tantum. *Perianthium* elliptico-ovatum, gluma inferiori cum subula ejusdem triplo brevius (lineis 3 longius), demum cartilagineum et nitido album: Valvula inferior basi apiceque margine pubescendo-hirta; superior angustior, subaequilonga, glabra. *Lodiculae* squamae 3, aequilongae, cuneato-quadratae, 4—5-nerves, ovario breviores: duae anteriores, tertia dorsalis. *Ovarium* lanceolato-ellipticum. *Styli* connati. *Stigmata* 2. exserta, ramosa, pubescentia, viridula. *Fructus* ellipticus, valvulis paulo brevior, liber, scutello orbiculato, ipso tres quartas partes breviori.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

- 1) Pars superior radii superioris. 2) Glumae spiculae masculae. 3) Stamina. ejusdem. 4) Spicula feminea a tergo. 5) Eadem a fronte. 6) Ejusdem valvula superior cum ovario florente. 7) Squamarum lodicularium 2. 8) Caryopsis.
-





Vilfa acuminata.

M. Gaye del'

V I L F A A C U M I N A T A.

RADIX fibrosa, fibris parum ramulosis, perennis.

CULMUS basi fasciculis foliorum densis circumdatus, erectus, strictus, cum panicula pedes $2\frac{1}{2}$ altus, crassitie pennae gallinaceae, teres, sulcatus, ad nodos (3, breves et glabros) aequus, totus vaginis obtectus.

VAGINAE usque ad basin fissae, arctiusculae, internodio laminaque longiores, glabrae, striatae: radicales plurimae, imbricatae: infimae squamiformes. LIGULA margo angustissimus, brevissime ciliatus, margine parce barbulatus.

FOLIA pallide viridia, lancéolato-linearia, acuminata, subcoriaceo-firma, sulcato-striata, utrinque glabra, margine, praesertim inferne, e glandulis aculeato-ciliata, ciliis patentibus; fasciculorum plurima conferta, inferne compressiuscula, superne plana, pedalia, lineas 5 lata, patula; culmea adpresso-erecta, 4—5 pollicaria; supremum angustissimum et breve.

PANICULA subjunctalis basi vagina supra involucrata, stricto-erecta, linearis-lanceolato-contracta, densa, circiter 10-pollicaris. Axis communis aequus, sulcatus, glaber, multiparus. Radii plures semiverticillato conferti, subadpresso-erecti, tenuissimi et filiformes, glaberrimi, inferne, saepe ad medium usque, nudi, dehinc contracto-radiolosi et floriferi: inferiores ultrabipollicares; radioli 4—5-lineales, racemosi: tertiarii adpressi, brevissimi, 1—2-flori. PEDICELLI subangulati, superne paulo incrassati, spicula breviores.

SPICULAE deciduae, siccae pallide fuscescendo-stramineae, angustissimae, linearis lanceolatae, subacuminatae, teretiusculae, lineis 2 paulo breviores, glaberrimae, subimbricato-racematae, clausae.

GLUMAE chartaceo membranaceae, 1-nerves: inferior patula, ovato-lanceolata, acuta, apice interdum denticulato-fissa, concava, flos-

culo dimidio vel paulo magis brevior; *superior* adpressa, flosculum obvolvens et aquans, acuta l. subacuminata, laevis vel apicem versus dorso denticulo uno alterove scabriuscula.

FLOSCULUS chartaceo-membranaceus, linear-lanceolatus, acutus l. subacuminatus, inferne in stipitem s. pseudocallum nudum constrictiusculus. *Valvula inferior* forma glumae superioris, 1-nervis; *superior* aequilonga, dissite binervis.

LODICULAE squamiae 2, sublaterales, quadrato-truncatae.

OVARIUM ovato-oblongum, glabrum. **STYLI** 2, breves. **STIGMATA** plumosa, pallida.

STAMINA 2? **ANTHERAE** lineares, pallidae.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Radiolus paniculae. 2) Spicula. 3) Gluma inferior magis aucta. 4) Flosculus a latere. 5) Ejusdem valvula inferior, 6) superior. 7) Genitalia cum lodicula.

SPECIES FASCICULI VIGESIMI NONI.

- 337. *Bambusa capitata* *Tr.*
 - 338. *Bambusa virgata* *Tr.*
 - 339. *Chusquea capitaliflora* *Tr.*
 - 340. *Chusquea pinifolia* *N. ab Es.*
 - 341. *Olyra capillata* *Tr.*
 - 342. *Olyra cordifolia* *Willd.*
 - 343. *Olyra fasciculata* *Tr.*
 - 344. *Olyra filiformis* *Tr.*
 - 345. *Olyra floribunda* *Raddi.*
 - 346. *Olyra paniculata* *Sw.*
 - 347. *Olyra semiovata* *Tr.*
 - 348. *Vilfa acuminata* *Tr.*
-

S P E C I E S
G R A M I N U M

ICONIBUS ET DESCRIPTIONIBUS ILLUSTRAVIT

D. C. B. Triniius,

ACAD. SC. PETROP. SODALIS.

F A S C. XXX.

P E T R O P O L I.

IMPENSIS ACADEMIAE IMPERIALIS SCIENTIARUM.

A c a d e m i a e j u s s u,

P. H. Fuss,



Arundinaria distans

W. Pape del

A R U N D I N A R I A D I S T A N S.

CULMUS altissimus, scandens, basi pollicem dimidium crassus. *Rami* diffusi, pertenues, filiformes, plurinodes, internodiis pl. min. palmariibus. *Ramuli* ad nodum quemvis 3 — 4^{mi}, rarius solitarii, patentes l. recurvi, palmares — spithamei, vagina membranacea stipati, foliosi, apice floriferi.

VAGINAE altera alteram vaginantes, glabrae, cum foliorum petiolo articulatae, inferiores saepe aphyllae. LIGULA brevissima, e lateribus emittens cirrulos plures, erectos, 1 — 2-lineales.

FOLIA patentia l. refracta, e basi ovata linear-lanceolata, mucronulato-acutata, in petiolum brevissimum constricta, per distantias pl. min. pollicares alterna, 1 — 2½ pollicaria, lineas 2 — 3 lata, glabra, multistriata, subtus glaucescentia et interdum scabriuscula.

SPICULAE in ramulorum apice 3 — 4, alternae, distantes, erectae, brevipedicellatae, pollicem ½ l. 1. longae, fuscae aut fusco-purpureae, 2 — 5-florae. *Axis comm.* pertenuis, glaber.

GLUMAE 2 pusillae, vix nisi lentis ope conspicuae, a flosculis pl. min. remotae, oblongae, acutiusculae, enerves: inferior paulo brevior et angustior.

FLOSCULI ad rhachin per articulos ipsis ½ breviores et glabros solubilem dissiti, chartacei, semipollicares, linear-lanceolati: *Valvula inferior* acutissima, glabra, compressiusculo-concava, 7-nervis; *superior* paulo brevior, compressiuscula, bicarinata et inter carinas dorso canaliculata.

LODICULAE squamae 3, dolabriformi-oblongae, acutiusculae, obsolete nervatae, dense fimbriatae.

STAMINA 3. ANTHERAE lineares.

OVARIUM linear-oblongum, glabrum. STYLI 2, brevissimi. STIGMATA plumosula.

RUDIMENTUM spiculae terminale nullum.

FIGURA AD SPECIMEN BRASILIANUM.

1) Spicula. 2) Pedicellus cum glumis. 3) Valvula inferior. 4) Valvula superior a tergo, cum articulo rhacheos. 5) Squamarum lodicularium una. 6) Genitalia.



Andropogon spathiflora.

W. Pape del.

A R U N D I N A R I A S P A T H I F L O R A.

CULMUS . . . *Rami*, qui suppetunt, pedales, lignosi, inanes, crassitie penuae gallinaceae, glabri. *Ramuli* 3 — 4ⁿⁱ, semiverticillato-fasciculati, adpresso-erecti, multinodes et pl. min. laxe ramosissimi, dodrantales — pedales.

VAGINAE chartaceae, laxae l. hiantes, internodiis longiores, altera alteram vaginantes, glabrae, cum folio articulatae: inferiores aphyllae. **LIGULAE** loco apex vaginae utrinque auriculatus et ad auriculae basin posteriorem emittens cirrulos aliquot perbreves.

FOLIA numerosa, patula, lanceolato-linearia, acuminata, basi in petiolum brevissimum attenuata, pollices 2 — 4 longa, lineas pl. min. 3 lata, glabra, utriusque punctulis subexasperata, laete viridia.

RACEMI florum in ramulis laxis terminales et axillares, involucrati vagina ipsis subduplo longiori, spathiformi et plerumque aphylla, maximam partem non nisi e spiculis 2 formati, quarum altera subsessilis, altera longius pedicellata.

SPICULAE dissitusculae, pl. min. pollicares, 4 — 8-florae, compressiusculae, fuscescendo-pallidae.

GLUMAE chartaceo-membranaceae, lanceolatae, acutae, flosculis suis circiter $\frac{1}{3}$ breviores: inferior paulo minor 1-, superior 9-nervis.

FLOSCULI ad rhacheos articulos (ipsis $\frac{2}{3}$ breviores apiceque pilorum barbula flosculi basin stipantes), linear-lanceolati, acuminatissimi, glabri. *Valv. inferior* membranaceo-chartacea, 9 — 11-nervis, superne scabriuscula, compressiusculo-concava, sere lineas 8 longa; *superior* 5-linealis, compressiuscula, ejusdem substantiae, tenuibicostata et praeterea utrinque binervis, inter costas dorso anguste canaliculata. — *Flosculus penultimus* sterilis, adjecto rudimento subulato, brevissime pedicellato.

LODICULAE sqq. 3, lanceolatae, superne fimbriatae.

STAMINA 3. **FILAMENTA** demum elongata. **ANTHERAE** lineares.

OVARIUM lineari-oblongum, glabrum. STYLI 2 — 3, breves. STIGMATA plumosula.

FRUCTUS caryopsis lineari-oblonga, glabra, libera, dorso canaliculata, scutello perbrevi.

FIGURA AD SPECIMEN NEPALENSE.

1) Spicula. 2) Pars rhacheos spiculae. 3) Valvula inferior. 4) Valvula superior a latere. 5) Eadem complanata, a tergo. 6) Lodicula. 7) Genitalia.



Arundo tridicoides.

A R U N D O T R I O D I O I D E S.

(*FESTUCA LITTORALIS LaBill.*)

RADIX recta descendens fibrasque horizontales ramosas et repentes emittens.

CULMUS pl. min. bipedalis, teres, inanis, simplex l. ex ima basi adpresso - subramosus, glaber, inferne conferto - vaginatus, praeter nodos radicales 3-nodis, cum reliquis partibus pallide viridis, demum stramineus.

VAGINAE totae fissae, internodio breviores longioresve, laxiusculae, glabrae, lamina breviores. LIGULA chartacea, bilobo rotundata, lineam longa.

FOLIA erecta, subsetaceo-convoluta, firma, glabra, ultrapedalia, supremum paniculae proximum palmare — spithameum.

PANICULA erecta, cylindraceo-lanceolata, pl. min. densa, 4 — 5-pollicaris. *Axix communis* satis angustus, teretiusculus, glaber, pluriparus.. *Radii* subterni, contracti, inaequales, tennes, puberuli, breviores sere a basi-, longiores bipollicares superius floriferi. *Radioli* breves, 1 — 2 - flori. *Pedicelli* spicula breviores, sensim paulo incrassati..

SPICULAE compressae, pl. min. semipollicares, 4 — 5-florae.

GLUMAE chartaceae, subcarinato-concavae, lanceolatae, acutiusculae, parum inaequales (inferiore nonnihil minori), obsolete puberulae, 3 — 5-nerves, flosculis circiter quartam quintamve partem breviores.

FLOSCULI substantia et forma glumarum, rhacheos articulis brevissimis, calliformibus et barbulatis alternatim insidentes. *Valvula inferior* 5 — 7-nervis, apice brevissime et obtuse 3-dentata, inferne, praesertim ad nervos dorsalem et laterales, pubescens; *superior* aequilonga, acuta, depressa marginibus conduplicatis, disseitate bicostata, ad costas puberula:

LODICULÆ squamae 2, obovatae, emarginatae, inferne nervosae.

STAMINA 3. ANTHERAE lineares.

OVARIUM subturbinalium, glabrum. STYLI 2, breves. STIGMATA plumosa.

FIGURA AD SPECIMEN E NOVA HOLLANDIA.

- 1) Spicula. 2) Glumarum altera. 3) Flosculus. 4) Ejusdem valvula inferior,
5) superior, a fronte. 6) Genitalia. 7) Lodicula.
-



Arundo villosa.

W. Pape del.

A R U N D O V I L L O S A.

RADIX recta descendendo repens.

CULMUS 4—5-pedalis, teres, sarcus, simplex, glaber, inferne vaginum lacerarum fibris complexo-tortis obtectus, plurinodis, cum reliquis partibus stramineo-glaucescens.

VAGINAE totae fissae, internodio longiores, laxiusculae, glabrae: superiores lamina longiores. LIGULA tenui-membranacea, lineas 2—3 longa, acuta, lacera.

FOLIA perangusta, convoluta, sensim attenuata, firma, glabra: inferiora sesquipedalia, supremum dodrantale — pedale.

PANICULA erecta, linearis-angustata, inferne subinterrupta, superne densa, interdum ultra-bi-pedalis, pallide straminea. *Axis communis* teres, aequus l. superne flexuosulus, glaber, multiparus, ad radiorum exsertionem obsolete pubescens. *Radii* plures (inferiores 7—9ⁿⁱ) semiverticillati, adpresso-erecti, inaequales (inferiorum longiores interdum spithamei), angulati, asperiusculi satis tenues, breviores a basi-. longiores superne compositi: *radiolis* adpresso-erectis, tenuissimis. *Pedicelli* sensim paulo crassiores.

SPICULEAE compresso-teretiusculae, parum apertae, semipollicares l. paulo breviores, uniflorae (rarius biflorae).

GLUMAE chartaceae, lanceolatae, subaequales l: inferior nonnihil brevior, flosculum plerumque aequantes l. paulo superantes, acutiusculae, glabrae, tenui-5-nerves.

FLOSCULUS substantia et forma glumarum, insidens callo brevissimo, subconico, nudo (ubi flosculi 2, superior eodem modo suffultus et inferiorem parum l. vix superans). *Valvula inferior* tenui- et fere obsolete-7-nervis, acuta, concava, dorso undique et paene usque ad apicem acutum et integrum villis albis patulis vestita; *superior* aequilonga, vix angustior, substantiae ejusdem, obtusiuscula, villosa, non nimis dissite binervis..


LODICULAE squamae 2, lanceolato-oblongae, acutae, tenerae, dorso
nudae aut villos aliquot emittentes.

STAMINA 3. FILAMENTA perbrevia ANTHERAE lineares, longae,
stramineae.

OVARIUM lineari-oblongum, glabrum. STYLI 2. STIGMATA

FIGURA AD SPECIMEN E MONGHOLIA CHINENSI.

1) Spicula. 2) Glumarum altera. 3) Flosculus. 4) Ejusdem valvula inferior,
5) superior. 6) Genitalia cum squamis lodicularibus (villigeris).





Bromus Danthoniae.

B R O M U S D A N T H O N I A E.

RADIX fibrae fasciculatae, tenues, breviusculae, ramulosae.

CULMUS spithameus — ultrapedalis, erectus, teres, glaber, simplex l. ex ima basi florifero-ramosus, ad nodos (3, glabros) aequis l. pl. min. geniculatus, infra paniculam pl. min. longe nudus.

VAGINAE inferne connatae, arctiusculae, striatae, nunc, praesertim in humiliori planta, pubescentes l. patenti-villosae, nunc glabrae, internodio in humilioribus longiores, in majoribus eodem laminaque plus min. breviores. **LIGULA** membranacea, obtusa, vix lineam longa.

FOLIA patula, linearia, plana, obtusiuscula, interdum cum mucrone minuto, rigidula, utrinque asperiuscula, minoris plantae linea angustiora, majoris linea latiora, pollices $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ longa, laete viridia aut cum culmo vaginisque purpurascens.

PANICULA erecta, sublanceolata, contracta l. patula, 2 — 4-pollicaris, interdum subsecunda. *Axis communis* sulcato-teretiusculus, pl. min. exasperatus, 3 — 6 parus, aequus et rigidulus. *Radii* bini vel solitarii, asperi, sursum paulo incrassati, uniflori, plerumque spicula (multo) breviores, saepe brevissimi, raro inferiores spiculam longitudine aequantes.

SPICULÆ subovato-lanceolatae, pl. min. compressae, erectæ, 7 — 11-floræ.

GLUMÆ primum herbaceo-membranaceæ, demum chartaceæ, inaequales, flosculis suis $\frac{1}{2}$ vel fere duplo breviores, acutæ: inferior linearis-lanceolata, 5-nervis, superiore $\frac{1}{4}$ minor et angustior; superior lanceolato-ovata, 7-nervis.

FLOSCULI disticho-imbricati, demum decidui: insimnis callo testiculiformi et nudo insidens. reliqui rhacheos articulis brevibus et nudiusculis affixi. *Valv. inferior* rhomboidea s. marginibus superne in angulos obtusos productis, dorso herbacea et viridis, marginibus

latiuscule membranacea et alba, 9 — 11-nervis, apice in denticulos 2 acutata, satis longe infra apicem emittens: in flosculo insimo setam solitariam, in reliquis setas ternas subfasciculato-approximatissimas, purpureas, patulas l. patentes: lateralibus circiter longitudine valvulae, media eadem longiori. *Valv.* *superior* inferiore brevior et multo angustior, tenerior, linearis, obtusa, dissite bicarinata et ad carinas serrulato-denticulata.

LODICULAM et GENITALIA in gramine jam fructifero non vidi. ANTHERÆ superstites tamen lineari-oblongæ.

FRUCTUS caryopsis linearis, depressa, utriusque valvulae adnata, apice barbata, fronte angulata, dorso excavata, scutello $\frac{1}{3}$ longior.

FIGURA AD SPECIMEN PERSICUM.

1) Spicula. 2) Gluma inferior, 3) superior. 4) Basis flosculorum. 5) Valvula inferior flosculi insimi. 6) Eadem valvula reliquorum flosculorum. 7) Valvula superior. 8) Fructus a fronte. 9) Idem a tergo.



Calamagrostis deschampsiioides.

W. Pape del.

STAMINA 3. ANTHERAE lineares, flavae.

OVARIUM oblongum, glabrum. STYLI 2, brevissimi. STIGMATA plu-
mosula, alba.

FIGURA AD SPECIMEN KAMTSCHATICUM.

1) Spicula. 2) Gluma inferior, 3) superior. 4) Flosculus. 5) Ejusdem val-
vula inferior, 6) superior. 7) Genitalia cum lodicula. 8) Rudimentum flosculi se-
cundi.

C A L A M A G R O S T I S D E S C H A M P S I O I D E S .

RADIX (ut videtur solo paludoso immersa) plus min. repens, fibras capillares et ramosissimas simulque stolones perennes emittens.

CULMI caespitosi, erecti, spithamei — dodrantales, tenuis, ex ima basi ramosi ibique conferto-foliosi, dehinc simplices ac binodes. glabri, compressiusculi, a medio ad paniculam usque nudi.

VAGINAE ad basin usque fissae, sursum laxiusculae, glabrae, interno-dio breviores, lamina pl. min. longiores. LIGULA membranacea, obtusa, linea brevior, apice fimbriatula.

FOLIA patula, angustissima, glabra: radicalia et fasciculorum compresso-convoluta l. subsetacea, digitalia et breviora, saepe curvula; culmea inferne paulo latiora ibidemque planiuscula, semipollucaria l. pollucaria.

PANICULA erecta, ovata, lucidissima, sesqui- ant sere bi - pollucaris, fusco - spadicescens. *Aris* pertennis, glaber, 6 — 7 - parus. *Radii* terni semiverticillati, sed et bini solitariique, glabri, patentes, ant a medio ant apice tantum emittentes radiolos patulos, 1 — 2 - floros.

SPICULAE bilineales, sub anthesi patulae, 1 - florae (sesquiflorae).

GLUMAE herbaceo - membranaceae, lanceolatae, subacutae, aequales, flosculum aequantes vel eodem nonnihil longiores: inferior 1-, superior 3-nervis.

FLOSCULUS membranaceus, callulo brevissimo insidens circumcirca emittenti pilos teneros, alias flosculo triplo-, alias duplo breviores, antrorsum producto in processum brevem s. *Rudimentum* flosculi secundi, pilis coronatum. *Valv.* inferior linear-lanceolata, apice obtusiusculo plerumque bidenticulata, 5-nervis, medio vel paulo infra medium exserens setam rectam, aequam, glumas paulo exce- dente. *Valv.* superior aequilonga, bidentata, dissite binervis.

LODICULAE squamae 2, lanceolatae.



Melica imperfecta

W. Popov del.

M E L I C A I M P E R F E C T A.

RADIX fibrae aliquot fasciculatae.

CULMUS cum panicula ultrapedalis, erectus, simplex, teres, glaber, ad nodos (5, glabros) aequus, fere ad paniculam usque totus vaginis (radicalibus emarcidis) tectus.

VAGINAE fere ad basin usque fissae, arctiusculae, internodio longiores, lamina breviores, striatae, sursum pl. min. asperae. LIGULA tenero-membranacea, lineam l. sesquilineam longa, plerumque lacera.

FOLIA erecta, linearia, plana l. compressa, superne attenuata, lineam lata, glabra, fronte scabriuscula, parum inaequalia, 5 — 7-pollicaria, obscure viridia, supremum dimidiata paniculam aequans.

PANICULA erecta, contracta, dodratalis, dimidiata totius culmi partem efficiens, ex albendo-viridi et purpureo-fusco varia. Axis pertenuis, teretiusculus, laeviusculus, subaequus, 7 — 8-parus. Radii subquini ternive subfasciculato-semiverticillati, tenuissimi, subangulati, laeviusculi, ab ipsa basi l. fere a basi contracto-compositi et floriferi, valde inaequales: longiori internodium suum in semiverticillo inferiore aequante, in superioribus superante. Pedicelli spiculae longitudine vel eadem pl. min. breviores, scabriusculi, cum glumis continui.

SPICULAE erectae, ovales, bilineales, teretiusculae, totac glabrae.

GLUMAE chartaceo-membranaceae, oblongae, acutiusculae, subaequilatae, longitudine inaequales: inferior flosculis nunc $\frac{1}{2}$ nunc $\frac{1}{4}$ -, superior iisdem nunc $\frac{1}{2}$ nunc parum vel vix brevior; utraque 5-nervis, nervo medio solo percurrente, lateralibus abbreviatis.

FLOSCULI 2 l. sub-3: *inferior* sessilis calluloque brevissimo depresso et glabro insidens, lanceolato-ovalis, hermaphroditus: *Valvula inferior* chartaceo-membranacea, acutiuscula, compressiuscula, 7-nervis; *superior* paulo longior, substantiae ejusdem, angustior, bi-

carinata, obtusa. *Flosculus secundus* clavato - oblongus, obtusiusculus, subunivalvis, membranaceus, sterilis, pedicello brevissimo insidens, flosculi hermaphroditi medium attingens, interdum sovens *flosculum incompletum tertium* minulissimum, oblongum, obtusissimum.

LODICULA in flosculo perfecto 1-valvis, dilatata, truncata.

STAMINA 3. FILAMENTA basi in tubum connata. ANTHERAE lineares.

OVARIUM turbinatum, glabrum. STYLI 2. STIGMATA plumosa.

FIGURA AD SPECIMEN CALIFORNICUM.

1 et 2) Spiculae, varia glumarum proportione. 3) Gluma inferior. 4) Gluma superior. 5) Flosculi. 6) Flosculi inferioris valvula inferior. 7) Ejusdem valvula superior. 8) Genitalia cum lodicula. 9) Flosculus secundus et tertius.



Panicum platycarphum

P A N I C U M P L A T Y C A R P H U M T R.

Act. Petrop. 1834. *Tom. III. p. 198.*

RADIX fibrae fasciculatae ramulosae et flexuosa.

CULMI dense caespitosi, adscendendo-erecti, circiter dodrantales, simplices, inferne plurinodes, foliifero-ramosi et densissime foliosi, superne infra racemos longe nudi, tenues, teretes, glabri.

VAGINAE totae fissae, imbricatae, carinatae, laxiusculae, internodio longiores, lamina breviores, glabrae. LIGULA membranacea, brevis, lacera, utrinque brevi-auriculata.

FOLIA plurima et confertissima, patula, firma, lanceolato-linearia, sub-pungendo-acuminata, plana, latiora lineam cum dimidia l. lineas 2 lata, glabra aut pilis rarissimis adspersa, subaequalia, pl. min. sesquipollucaria.

RACEMI terminales 2 — 3, digitati, contracti, sere pollicares. *Axis partialis* subfoliaceus, glaber, lineam sere latus, spiculis latior, dorso convexiusculus, fronte ad septum medium pro recipiendis spiculis utrinque scrobiculatus.

SPICULAE unilaterales, solitariae, sessiles, alternae, biserialis, lanceolato-ellipticae, depresso-acute, ad margines pubescendo-villosulae, linea longiores.

GLUMA *inferior* nulla; *superior* minuta, rotundato-ovata, quasi in fimbrias soluta.

FLOSCULI 2, paralleli: *exterior* neuter, chartaceo-membranaceus, 1-valvis, dorso depresso, 7-nervis, marginibus pubescendo-villosulis amplectens *interiorem* hermaphroditum, aequilongum l. nonnihil longiorem, chartaceum, albentem, laevem: *Valv. inferior* obscure 3-nervis, convexiuscula; *superior* aequilonga l. paulo excedens, marginibus conduplicatis.

LODICULAM et GENITALIA non vidi.

FRUCTUS caryopsis elliptica, depressa, libera, fronte convexior dorso planior, scutello $\frac{2}{3}$ longior.

FIGURA AD SPECIMEN EX BONIN-SIMA.

- 1) Axis partialis a tergo. 2) Idem a fronte. 3) Spicula ab exteriori s. a parte flosculi neutrius. 4) Spicula ab interiori cum gluma superiori. 5) Flosculus hermaphroditus. 6) Ejusdem valvula superior 7) Caryopsis a fronte, 8) a latere, 9) a tergo.
-



Puccinum xanthophysum

H. Pope Esq.

P A N I C U M X A N T H O P H Y S U M G R A Y.

(*Ann. of the Lyc. of N. Hist. of N. York. V. III. p. 233*).

RADIX fibrae aliquot breves, simpliciusculae.

CAULUS erectus, simplex l. basi ramosulus, pedalis et ultra, compressus, glaber, ad nodos (glabros, 3) subaequus, cum reliquis partibus laete viridis, siccus viridi-flavescens, infra jubam satis longe nudus.

VAGINAE ad basin usque fissae, internodio demum laminaque paulo breviores, arctiusculae, striatae, e punctis minutissimis villosae.

LIGULA margo angustissimus.

FOLIA subamplexicauli - sessilia, erecta l. patula, lanceolata, acuta, plana, striata, nervis 9 manifestioribus, glabra, margine scalpta, ima basi ciliata: inferiora breviora (semi — 1 — 2 - pollicaria), sensim majora, culmea superiora parum inaequalia, 4 — 5-pollicaria, lineas 4 — 6 lata.

JUBA PANICULARIS linearis-angustissima, circiter digitalis, pallidissime glaucescens, pauciflora. *Axis communis* subangulatus, flexuosulus, glaber, 6 — 7 parus. *Radii* solitarii, adpressi, subangulato-teretiusculi, simplices, 2 — 3-flori: inferiores circiter pollicares. PEDICELLI laeviusculi, circiter longitudine spicularum.

SPICULAE erectae, dissitae, turgidulae, obovatae, submucronulato-obtusiusculae, sub lente puberulae, ultralineales.

GLUMA inferior lanceolata, acuta, flosculis dimidio brevior, 3-nervis; superior flosculos aequans l. hermaphroditico nonnihil brevior, obtusa l. submucronulata, 9-nervis.

FLOSCULI subparallelis: *inferior* masculus l. nenter, bivalvis: *valvula inferiori* forma, magnitudine et nervatione glumae superioris; *superiori* paulo breviori, angustiori, membranacea. *Flosculus superior* hermaphroditus, coriaceus, obovatus, obtusus, submucronulatus, laevis, albens, nitidus. *Valv. superior* subaequilonga.


LODICULÆ sqq. 2, subquadratae, truncatae.


STAMINA 3. ANTHERAË lineares.

OVARIUM turbinatum, glabrum. STYLI 2. STIGMATA plumosa, atro-purpurea.

FIGURA AD SPECIMEN EX AMERICA BOR.

1) Spicula, adversa gluma inferiori. 2) Gluma superior. 3) Flosculi neutrius valvula inferior. 4) Ejusdem valvula superior. 5) Hermaphroditus. 6) Ejusdem valvula superior cum lodicula et genitalibus.





Porelema crenatum.

P E R E I L E M A C R I N I T U M P R E S L.

CULMUS inferne decumbens et e nodis inferioribus fibras agens radicantes tenues, interdum praelongas et ramiculas, teres, spithameus — bipedalis, florifero-ramosus, ad nodos (plurimos, glabros) pl. min. geniculatus, infra paniculam brevi spatio nudus.

VAGINAE ad basin usque fissae, laxiusculae et, praesertim inferiores, solutae, internodio laminaque breviores illove longiores, glabrae, striatae, superne asperae, ad faucem saepe barbatae. LIGULA brevis, membranacea.

FOLIA patula, laxa, sublanceolato-linearia, plana, lineam vel (in majoribus) lineas 2 — 3 lata, attenuato-acuminata, glabra, utrinque scabra, pro statura plantae palmaria — spithamea, saturate s. obscure viridia.

PANICULA jubalis formata e *radiis* dense thyrsoideis, ad axin communem subtriquetrum pl. min. scabrum et pollices 2 — 6 longum alternis, solitariis, lineas 4 — 12 longis, tenuibus scabrisque, a basi dense floriferis, patentibus, viridibus, inferioribus plerumque secundis. *Radioli* iidem solitarii et alterni, a basi dense fasciculato-floriferi, brevissimi.

SPICULAE compacto-fasciculatae ita, ut inferiores semper, sive sub glumarum sive sub setarum forma, aboriantur, nec in fasciculo quovis nisi una alterave spicula liberior fructifera sit, eaque lanceolata, lineam cum dimidia longa, 1-flora.

GLUMAE membranaceae, oblongae, apice bilobo-dentatae, 1-nerves, nervo inter dentes in setam glumarum longitudine producto, sub-aquales, flosculo plus dimidio breviores.

FLOSCULUS insidens callulo brevissimo et angusto, membranaceus, demum subchartaceus, compressiusculus, subovato-lanceolatus, clausus, basi ex utraque valvula breviuscule pilosus. *Valvula* inferior 3-nervis, apice brevi-bidentata, nervo medio inter dentes

in setam longitudine valvulae longiore reme excurrente; *Valv. superior* aequilonga, paulo angustior, parum dissite binervis, apice bidenticulata.

LODICULA

STAMINA 3. **FILAMENTA** demum elongata. **ANTHERAE** oblongae.

OVARIUM glabrum. **STYLI** et **STIGMATA**

FRUCTUS caryopsis fusiformi-linearis, compressiuscula, libera, eberbis, subexsulca, scutello $\frac{2}{3}$ longior.

FIGURA AD SPECIMINA BRASILIANA.

1) et 2) Spicularum fasciculi. 5) Spicula fertilis. 4) Flosculus. 5) Ejusdem valvula inferior. 6) Valvula superior. 7) Fructus a latere.



Schoenoplectus ramosus.

W. Pape del.

S C H O E N E F E L D I A R A M O S A.

RADIX fibrae fasciculatae, parum ramulosae.

CULMI caespitosi seu potius ab ipsa basi compacto-ramosissimi, plurimi, adscendendo-crecti, dodrantales — pedales, singuli inferne iterum contracto-ramosi, 3 — 4-nodes: nodis glabris, aequis l. paulo geniculatis; teretes, laeves, firmi, demum sub racemis brevius longiusve nudi.

VAGINAE ad basin usque fissaes, laxae, compressiusculae et subcariatae, internodio laminaque longiores, tenui-striatae, glaberrimae, cum reliquis partibus pallide glaucae, racemos juniores involucrantes inflatae. LIGULA brevissima, ciliaris.

RACEMI 1 l. plerumque 2 conjugati (rarius 3 digitati) terminales, contracti, erecti, sesqui — 3-pollicares, lineares, extus densissime floriferi. *Axis partialis* linearis, angustissimus, marginibus subrepando-flexuosulis, dorso complanatus et striatus, fronte subtrigonous et ad septum medium utrinque alternatim exserens denticulos brevissimos pro assigendis spiculis.

SPICULAE subsessiles, densissime s. imbricato-biseriales, subovato-lanceolatae, compressae, 1-florae.

GLUMAE membranaceae, compressae, lanceolatae, subulato-acuminatae, praeter carinam fortem et serrulato-scabram enerves, flosculo circiter quartam partem longiores: inferior paulo minor.

FLOSCULUS linearis-lanceolatus, insidens callo brevi, subturbinato et circumcirca emittenti pilos perbreves, compressiusculus, primum membranaceus: demum chartaceus. *Valvula inferior* tota villosula, apice brevi-bifida, praeter nervum tenuissimum dorsalem infra apicem magis manifestum et in setam longissimam, curvam et cum reliquorum flosculorum setis complexam excurrentem, ener- vis. *Valvula superior* vix brevior, linearis-lanceolata, acuta, compressa, junior tenui-binervis, fructifera sub- 1-nervis (nam ner-

vorum sejunctio non nisi basi paulo manifesta), dorso pilis aliquot adspersa.

LODICULAE sqq. cuneatae, truncatulae.


STAMEN 1? **ANTHERA** sublanceolato-oblonga.

OVARIUM lineare, glabrum. **STYLI** 2, breves. **STIGMATA** simplicia, dentata.

FRUCTUS subfusiformi-oblongus, compressus, valvulae superiori subadhaerens sed solubilis, eberbis, exsulcus, scutello dimidio minus longior, pericarpio in superiori parte laxo.

FIGURA AD SPECIMEN EX INSULIS CAP. VIRIDIS.

- 1) Spicula. 2) Glumarum altera. 3) Flosculus. 4) Ejusdem valvula inferior,
5) superior cum lodicula. 6) Genitalia. 7) Fructus a latere, 8) a tergo.
-



Stenotaphrum subulatum.

H. T. Moore del.

S T E N O T A P H R U M S U B U L A T U M.

CULMUS prostratus, latissime repens, tenuis, teres, glaber, per distan-
tias pl. min. sesquipollicares nodis turgidulis glabris et saepe ultra
medium culmi usque fibras radicantes fasciculatas et ramosas agen-
tibus interceptus ibique geniculatus et ramosus, 1 — 2 — 3-peda-
lis, superne arrectus et ad spicam usqne vaginis tectus.

VAGINAE ad basin usque fissae, laxae, internodium aequantes l. eodem
paulo longiores, lamina breviores, striatae, glabrae: inferiores
emarcidae, solutae. LIGULA brevissima, ciliaris.

FOLIA multa, patula et patentia, lanceolata, acuminata, flaccidula, li-
neas 3 — 5 lata, glabra, margine scabra, tenui-striata, 3 — 4-
pollicaria, saturate viridia.

SPICA e vagina ramorum suprema prodit stricta, depressiusculo-cylin-
dracea, superne attenuata, vix lineam crassa, 3 — 4-pollicaris,
saturate viridis. Rhachis continua, subacqua, utrinque alterna-
tum scrobiculis 3 — 4-linealibus excavata pro exserendis racemis
iisdem impressis: inferioribus 5-, superioribus 3 — 2 — 1-floris,
scrobiculos aequantibus. Axis racemorum partialis flexuosus,
depressus, dorso convexiusculus et striatus, margine scaber et ad
spicularum ortum obsolete barbulatus, fronte alternatim scrobicu-
lis excavatus pro recipiendis spiculis.

SPICULAE subsessiles, lanceolato-ellipticae, acutae, dorso quo scrobi-
culis incumbunt convexae, fronte planae, glabrae, lineam et qu.
exc. longae, biflorae:

GLUMAE membranaceae, enerves, flosculis 5—6^{ies} breviores, nunc acu-
tiusculae nunc rotundatae nunc subtruncatae: *superior* (s. interior)
saepissime, praesertim in racemis superioribus, nulla.

FLOSCULI 2, paralleli: *anterior* neuter, 1 — 2-valvis. *Valv. inferior*
herbaceo-chartacea, forma spiculac, 3 — 1, flexura laterali com-
putata, 5-nervis; *superior*, si adest, minima, hyalino-membrana-
cea, enervis. *Flosculus posterior* vix brevior, ejusdem formae,

hermaphroditus, paulo firmior, acutus, viridis, nitidulus. *Valv.*
superior subaequilonga, inclusa, marginibus conduplicata.

LODICULÆ squamae 2, pusillæ, quadratae, truncatae.

STAMINA


OVARIUM oblongum, glabrum. STYLI 2. STIGMATA

FIGURA AD SPECIMEN EX INS. GUAHAN.

- 1) Pars spicae ab anteriori, 2) a latere. 3) Racemus a fronte. 4) Idem a tergo. 5) Spicula a fronte et paulo a latere visa, cum gluma anteriori s. inferiori. 6) Spicula a tergo, cum gluma (superiori, vaga). 7) Flosculus neuter bivalvis, ab interiori. 8) Hermaphroditus a tergo. 9) Valvula ejusdem superior cum lodicula et ovario.
-

SPECIES FASCICULI TRICESIMI.

- 349. *Arundinaria distans* *Tr.*
 - 350. *Arundinaria spathiflora* *Tr.*
 - 351. *Arundo triodioides* *Tr.*
 - 352. *Arundo villosa* *Tr.*
 - 353. *Bromus Danthoniae* *Tr.*
 - 354. *Calamagrostis deschampsioides* *Tr.*
 - 355. *Melica imperfecta* *Tr.*
 - 356. *Panicum platycarphum* *Tr.*
 - 357. *Panicum xanthophysum* *Gray.*
 - 358. *Pereilema crinitum* *Presl.*
 - 359. *Schoenfeldia ramosa* *Tr.*
 - 360. *Stenotaphrum subulatum* *Tr.*
-



New York Botanical Garden Library
QL 34 .A1 T71 v.3
Trinius, Karl Bernhard/Species Graminum



3 5185 00064 6412

