859
54

秘傳經驗痘疹方

上

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

859-54

秘傳經驗痘瘡方序

醫之爲術仁術也古之儒者明是術以養生亦
推是術以濟人儒與醫其寃用一也予不能知
醫而於醫書頗留意焉顧其書散漫難考檢閱
靡窮所至輒求經驗良方錄之積久成帙竊欲
詳校入梓以廣醫家之見聞以嘉惠於人而未
能也獨念嬰兒夭閼恒起痘疹此人生第一緊
關如千金聖惠等方悉用寒涼之劑如陳氏畏
攻等散又皆辛熱之投是倚於一偏而無益於

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

世用者也予前室産數子皆痘皆弗育偶遊楚
得一書名曰痘疹醫方觀其方淵源於樞素出
入於諸家審形色之吉凶辯証候之善惡論氣
血之盛衰驗表裏之虛實熱者解之寒者温之
簡而有要精而弗雜中而不偏其諸痘疹之要
訣醫家之捷徑乎予因以試諸子子輒效因以
試諸人人亦罔弗效嗟乎使予未子而先得是
書則前數子豈盡皆厄耶今予有子數人且盡
痘矣則是書也夫乃造物者為予廣後嗣耶然
僻壤小民目不覩醫書而良醫尤未易致及病
一委之庸醫鮮不為所誤至有祷得一子愛如
掌珠或痘或疹疑似莫辯迨變成呼吸之間即
聲資以祈禱卒亦何益噫情可哀矣予心竊憫
之欲撿刻本方以為保幼之一助特力有未逮
時僚友迓和張君子益屠君皆為予慫慂遂捐
俸命梓以廣其傳云
萬曆七年七月吉旦東郡邢邦書於長蘆南川
樓

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

秘傳經驗痘疹賦卷之一上集

楚山人黃廉逑

臨清邢邦刊

痘疹賦

痘李胎毒號曰天瘡傳染由於外感輕重過於內傷初起太陽壬水剋乎兩火後歸陽明血水化為膿漿所喜者紅活滋潤所畏者黑陷乾黃勢若燒眉變如反掌皮膚臭爛氣血卿猖若救焚兮徒薪何如燋額似拯溺兮落井不及褰裳

原夫一元肇化二氣成祥慾火動而妄作胎火熾而流殃啼聲驟發臟毒深藏命門養虎胞戶收鎖

特四時之疫癘動五臟之安囊榮氣入於肉裡惡
血發於膀胱二火相扇四大成瘡毒之輕者發則
微貴乎調養毒之重者發則甚急於隄防
○至若運氣推遷有如勝復升降時令乖異無非寒
熱温涼苟陰陽之逆理為氣候之反常五行鬱而
災見九曜窒而變張癘氣流行不論郡邑鄉黨惡
毒傳染豈分黎庶侯王此則不形於診責在能制
其方先事解散兮十全八九臨時區處兮算為尋
常
○大抵氣運先歲瘡疹屬陽春夏為順兮樂其生長
秋冬為逆兮恐其收藏暴寒兮恐邪毒之鬱遏暴
熱兮慮腠理之開張膿泡春而莫療黑陷夏而為
殃秋斑慮惡冬疹非祥此逆四時之令休誇三世
之方知其凶而治之自求怨謗明其吉而往也得
號賢良
○且如証候殊形臟腑異狀肝主淚而水泡肺主涕
而膿漿心斑紅艷脾疹赤黃惟腎經之無病為變
黑而可防所以觀其外証因而推其內臟呵欠頓
悶兮肝衣之因咳嗽噴嚏兮肺經之象手足稍冷
而昏睡兮脾土困於中央面目帶赤而驚悸兮心

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

火炎於膈上耳聾屬腎溫煖如常二處灼熱兮下極火炎而必斃四肢厥冷兮中州土敗而須亡

○先分部位次察災祥陽明佈於面中太陽形於頭上心肺居胞膈之內肝膽主脇肋之傍手足事乎脾胃腰背統乎膀胱外証分明用心想像泄瀉者邪甚干下嘔吐者邪其於上氣逆而腹疼隱隱毒甚而腰痛惶惶心熱甚而驚搐胃邪實而顛狂口燥咽乾肺受火邪而液竭屎鞕溺澁腎因火旺而精亡氣弱少食者不任其毒神強能食者不失其常

○欲決重輕但觀發熱如占順逆須認成瘡毒甚兮身如炎火勢微兮休式清涼若寒熱之往來定徵兆之佳祥數番旋出兮春回寒谷一齊湧出兮火烈崑崗蚊跡蚤斑刻期而為鬼錄蛇皮蚕殼引日而返泉鄉不喜朱紅更嫌灰白最宜蒼蠟切忌紫黃常要明潤兮恐薄嫩之易破豈宜乾枯兮又搔痒之難當

○要候形觀上工審詳面頰稀而磊落清安可保胸膈密而連串凶吉難量頂要尖圓不宜平陷漿宜飽滿切忌空洋色喜老而愁嫩膚愛糙而怕光斂

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

起根窠終防痒瘍毋浮皮肉必主殃傷頭面預膛
兮三陽亢甚手足厥發兮五臟催傷瘡堆喉舌毒
纏頸項咽喉痛而呼吸則難飲食少而吞吐則嗆
此天命之安排豈人力之倚伏
○煩燥悶亂兮七神離散譫妄脇骨兮五毒猖狂皷
頷戰慄兮肺敗咬牙噤齒兮腎強渴不住兮燋瞬
泄不止兮滑腸失聲兮咽爛吼氣兮腹脹晝夜扤
捶兮將榮氣之外脫飲食斷絶兮必胃氣之中傷
膧忽消而毒歸於內色變黑而疔起於瘡食谷則
噦兮在人之夭壽飲食則噴兮較醫之短長

○輕重返復調理乖張輕變重而可畏重變輕而莫
慌風寒素謹飲食如常出入禁乎男女蓋覆適其
溫凉內無妄動治不乖方此則變輕之候實為保
命之良若或常犯乎禁忌亦或悞服乎丸湯徒自
肆其房室不知順其陰陽外感不正之氣內傷不
時之糧平人且病患者敢當是以順則逆而逆則
險宜乎輕者重而重者亡
○發自肺經相連脾藏氣熱味辛燥金受剋形寒飲
冷華蓋先傷浩飲則水來侮土而成瀉痢過食則
脾不消谷而作瘡脹皮毛虛損肌肉羸陋發起遲

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

而不能胖壯收靨緩而反作騰瘡輕則延綿乎時日重則泣送於郊邙何愚夫之不曉致生命之早亡不信醫而禱諸神鬼枉殺牲而號乎窮蒼

○藥貴中病醫不執方喜行溫補者動稱乎文仲專行乎涼解者袒述乎仲陽執知因人而治毋虛虛毋實實相時而行必遠熱必遠涼正氣為先戒開門而延寇解毒為急休視虎以如狼首尾不宜汗下兮治之要略緩急各有權宜兮法之經常執其繩墨者如守株之待兔惑於方書者似多岐之亡羊

○旦如紅紫撳腫兮涼血為上灰白平陷兮補氣最良出不快兮責表實而發散可用便或秘兮責裏實而疎利何防毒不能以速散毒甚者令微汗之散越熱不可以盡除熱劇者使小便之清長三陰甚而多寒兮必投辛熱三陽數而多熱兮無過苦涼安可惡寒而喜熱莫之貴陰而賤陽

○是故補氣者參著白朮養血者歸芍地黃發散表邪輕柴葛而重官桂疎通裏實微只殼而甚大黃解毒兮芩連梔子快斑兮荊防牛旁連喬瘡中之要領甘草藥中之君王咽痛求諸甘桔頭腫取夫

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

荊防木通利其小水人屎救其黒瘡氣逆兮青皮
陳皮胃寒兮丁香木香泄瀉莫如訶蔻嘔吐無過
橘姜冬乾葛而止渴厚朴腹皮而治脹五味杏
仁傷風者以之定喘山查枳實善食者用之消糧
良工司命推惻隱之仁心神物効靈起沉疴於反
掌、

○其諸藥味各有主張春憂桂枝而少眠秋冬苓連
而莫嘗瘡若乾枯白术非其所益色如紅艷黄芪
豈其攸良裏實少食兮勿投枳實表虚多毒兮休
使生姜汗自出兮用乾葛重虚其表溲自數兮加

木通再虧其陽泄瀉酸臭兮訶蔻不可以遽止嘔
吐清冷兮連梔安得以作湯凡用苓連必須炒制
如加丁桂須假寒涼應制伏而不誅其過得和平
而保壽無疆大熱若平餘邪須講毒氣流肝兮雙
睛出翳火邪入脾兮四肢成傷口内生瘡兮爛齦
破舌腹中作痢兮腐胃敗腸皮膚嫩而洗浴大早
因漆餘熱臟腑虚而肥耳太過遂至内傷若中風
寒多為咳嗽無時擡掐即灌蝕瘡既多異証亦有
奇方望月砂退翳有準川山甲排毒無雙枳實曲
蘗山查子消宿食而剋化生黄柴葛地骨皮解餘

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

熱以清涼咳嗽以欵冬杏仁痢疾以黄連木香苦
參主乎熱毒溺白治於疽瘡用之合宜工可謂良
嗟夫罹此証候勢非尋常外纏皮肉内連腑臓改
換形容如蛇退皮龍退骨淋漓膿血若蚓在灰蟮
在湯軒岐制而未言秦漢弃而無方古無其疾或
云起于建武今有是証相傳得于南陽拘於日數
者不知輕重之病執其偏見者罔察虚實之龎本
溫再熱已寒又涼徒自膠而不變返斯民而見殃
洩骨髓之真詮非子孫而不示埈肺腑之秘的牢
記誦而莫忘

痘疹西江月

痘疹毒從何起母胎火毒流傳生來穢物下喉咽
藏在命門裏面一旦天行時氣感令相火熬煎毒
藏骨髓見皮間從此一般傳染
五臓各般形証認時須要分明往來潮熱睡脾經
呵欠頓悶肝証咳嗽噴嚏屬肺面紅驚悸居心惟
腎清淨忌邪侵手足耳骫俱冷
五臓各有一証其間治法難同肝為水泡肺為膿
大小瘡形異種脾証發為疹子心經見作丹紅腎
為黒陷病多凶縱有靈丹何用

瘡疹須明順逆天時人事相隨大都陽火是根基若遇陰寒不喜春夏順而多吉秋冬逆以何疑如逢稠密必凶危稀少輕為平易治法而今不定清涼溫補分門各持一見論紛紜俱曰予為神聖解毒喜行涼瀉補中不使辛溫不明時令與元神枉自捕風捉影假使天時暄熱辛溫助火為殃病者如何抵當勇實再行溫補羸虛又使寒涼虛虛實實伐無傷好似隔靴爬痒看取時行疫癘天時熱氣炎炎精神肥健又能飡

解毒消涼甚便若是寒凝太甚虛羸吐瀉連綿此宜溫補法為先又在醫人活變

痘疹要知輕重吉凶順逆須通毒輕痘少順家風湯藥不宜妄用痘密毒重為逆皮膚寸寸為膿此般形証例為凶仔細扶持休縱

輕者三四次出頭面胸背稀疎小便清利大便稠飲食知常充足重者遍身齊出狀如麻子麥麩咽痛泄瀉悶啾啾飲食不思可惡

輕者不須服藥重者凶吉難明出時紅點蚤和蚊蚤似鍼頭血浸頭面預先浮腫皮膚黑爛黃昏四

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

肢逆冷啞無聲悶亂而死証
多有先輕後重只因觸犯風寒房事不避臭腥傳
縱口只思生冷悶雜人帶穢物諸般禽獸羶羶庸
醫淺術誤湯丸能使瘡瘡改變
重者變輕何以常常和煖衣衾房中謹密少人行
飲食如常漸進未見誤投湯藥不曾妄啖酸辛此
為人事奪天灵安可歸乎有命
要識瘡瘡死証無過五証分明紫黒喘渴悶何寧
痒瘍咬牙寒噤灰白頂陷腹脹皮嫩易破成坑泄
瀉氣促見鬼神聲啞頂溫足冷

既識五般死証其間吉病如何瘡頂飽滿作膿窠
任是揩磨不破四畔根児紅活安眠静睡乎和光
壯妝靨不嗟咤管取介疾勿藥
黒陷乾枯胃敗咬牙寒戰虧傷失聲喘氣肺御猫
泄瀉脾事腹脹痒瘍悶亂心死狂言見鬼神亡皮
嫩易破氣無陽便血除崩模様
首尾不宣汗下汗時腠理開張風寒易入透斑瘡
收靨不齊火旺慌下必犯脾胃無事自取内傷泄
瀉黒陷致傾亡頓使魂灵飄蕩
大抵痘瘡未出先須升葛參蘇如斯不出汗令疎

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

紅點見時藥阻大便若還秘結輕輕四順相扶假
饒自利莫糊塗只與閻羅掌薄
治痘無過二法溫中解毒兼行補中參朮草芪苓
枳實山查有應解毒苓連梔栢連喬惡實防荊芎
歸養血妙如神加減消詳前定
氣血要分虛實但於痘色中求紅掀紫腫血實由
四物內加消毒灰白中陷氣弱四君子是良謀略
加解毒藥相扶莫使丁香桂附
但是痘瘡初出如逢熱甚昏沉解毒發散藥先行
莫使臨渴掘井桔梗升麻干葛連喬耳草黃芩牛

旁梔子木通荊蟬蛻防風作引
若是如常潮熱不須乾葛升麻參梔耳草赤芍住
惡實連喬無價或用參蘇飲子青皮木香內加煎
來一服勝灵砂痘現表踈纔罷
初出多生驚搐急將導赤踈通木通耳草與防風
生地黃連同用再加辰砂調服須臾救醒朦朧此
方端的有神功管取百發百中
壯熱不曾出現大便秘結難通顛狂唇熱眼珠紅
此証凶危堪痛急與芩連梔栢大黃酒炒踈通連
喬惡實與木通貫仲射干俱用

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

自此出而稠密認他虛實調醫虛家泄瀉色如灰
大補煨姜堪取若是膿撤紅綻芩連梔栝芎歸連
旁升麻桔耳奇此箇真機秘的
色似塗朱滿面身如蚊蚤傷痕不消三日丧黃泉
切莫再行丸散若被爺娘強勒要伊死裏來生但
將四物入連芩喬葛梔耳桔梗
灰白不能起發又於泄瀉頻任溫中丸散不宜停
急急扶危濟困當歸黃芪白朮乾姜耳草人參木
香訶子及青陳官桂丁香灵應
毒甚常生咽痛可憐飲食難嘗射干耳桔與牛旁

連喬升麻穩當若是疽堆頸項此名鎖腸恤惶一
朝惆悵命將亡變作咽啞水喰
發起狀如蚕亮乾枯不見水漿此名血竭毒深藏
不治必然命喪當歸地黃養血參芪耳草溫良連
喬牛旁與木香桔梗青皮發壯
發起常常撿視須防黑陷來攻若見黑陷在其中
藥點許多妙用莞豆粒粒燒過亂髮火煅合同珍
珠水浸胭脂紅鍼破搽時脹腫
藥點轉如黑陷丧門吊客匆匆面祥半季及宣風
總是脫空責弄不如人猫猪犬各燒存性和同水

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

香湯引妙無窮萬兩黃金何用
起發若生搔痒此與痒瘡善殊傷氣身痒正相如
血鍼瘡窠不愈宜用疎風涼血荊防喬惡芎歸生
黃乾葛木通宜竹葉引煎痒住
大抵瘡宜脹痛若加虛痒顛連只因飲食冷邪干
心火剋而悶亂外用茵陳艾炷內服參朮調元若
還痒止就回生又怕爬傷正面
何以正面怕痒內含五臟精華假饒破損實堪嗟
氣散神飛干罷由忌先傷正額心經火帶虛邪幾
番式驗不移差敘與兒孫體察

人相火居正額出現胖靨休先果然額上露其端
記取決依死斷最喜兩頤口鼻始終都在其間任
從稠密勢纏綿到底終無坎陷
出發成漿欲靨忽然泄瀉來攻此時脾胃不宜空
變出百端可痛多是內傷飲食只求藥有神功若
還消腫泄淋膿父母爬墳追送
先用人參白朮黃芪茸草乾姜茯苓訶子及木香
大劑切來溫養不刻次陳皮藿木香陳氏良方三
番只有異攻良此是盡頭模樣
記取成漿時候最防穢物風寒大黃蒼朮共燒烟

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

可解一切癰疽內服調元飲子黃芪梔子人參當
歸蒼朮酒芩連莫犯荆防發散
到得漿成痘熟依時都要成痂若還癰煉臭鯉加
此是表虛堪呀急進參芪桂朮荆防蒼葛升麻連
喬惡實密蒙花休得弄真成假
若是痘瘡熟爛皮破膿血淋漓內服參朮與歸芪
惡實連喬官桂外用多年敗草晒乾細研成灰辰
向席上仜施為最解火邪毒氣
痘熟不行收斂及行破損成瘡一時焦痛甚難當
請問如何度量但取耳草濟石辰砂真粉清涼蜜
調摶上便安康此法不留書上
有等痘瘡出放緣何日久難收請君仔細問根由
不可臨時差誤或是胃傷冷水或因便結熱留此
般治法各推求不杜秘傳肺腑
果是曾傷冷水濕傷脾胃中虛脾主肌肉待何如
怙抵血膿流仜可用參芪蒼白青皮耳茯無拘丁
香及桂照方書救表攻裏妙處
于是大便秘結三朝一七未通此為熱氣內蒸烘
因此毒難開縱內服歸黃麻子大黃略用相攻再
行胆導妙無窮菅取痂成去壅

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

收後許多餘症醫人各要分明毒流肝臟目生疔
翳灌瞳人隱隱毒流肺脾癰膿貴歸乎足太陰肉
傷外感一時辰變作各般怪症
兩目忽然瞳痛痘家毒入肝經輕為浮翳掩瞳人
重則終身瘡痂去翳菊花蝉蛻密蒙蒺藜谷精各
為細末共和勻別用豬肝作引
癰毒發於肢節常常膿水不乾不知調理早求安
瘡疾終身遺患內服千金托裏外塗萬病金丹排
膿長肉未為難任是千金不換
痘後不宜澡洗瘡疱皮嫩易傷不知禁忌受風涼
遍體痛生熱僵此因傷寒勞後不宜官桂麻黃只
消九味羌活湯又以補中調養
痘後或傷飲食致令腹痛難任不宜轉下損脾經
消導方為對症白朮人參枳實黃連曲蘗青陳山
查白茯與砂仁積化腹疼俱定
痘爛不齊收靨正面灌痛流膿急防兩目毒來攻
解毒清涼好用酒炒芩連梔栢連翹蝉蛻木通升
麻旁子苦參同細研酒丸湯送
大凡痘瘡一片名為百歲聖瘡如龍退骨換心腸
又似蝉脫壳樣出現光壯收靨落痂顏色相當不

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

宜黑色在中央犯著實為魔癢
瘡瘡始終日子難以定日為言俗人不達妙中玄
專把日期來算人有虛實勇怯毒分疎密深淺密
深虛怯定延綿實勇淺疎日短
瘡瘡苦難捉摸假如用藥如何常行歸芎參术多
耳草黃芪白芍枳殼木通黏子連翹桔梗同和青
皮木香茯苓訶調理陰陽不錯
出瘡要知凶吉須將部位消詳如從腮頰及承漿
口耳鼻邊先放此者當為吉論其他正額堪防天
廷方廣兩眉眶切忌如丹模樣

麻疹骨髓賦
麻雖胎毒多帶時行氣候暄熱非令男女傳染而
成其發也與瘡相類其變也比瘡匪輕愚夫愚婦
常視如泛常若死若生總歸於天命不知毒起於
脾熱流於心始終之變腎則無証臟腑之傷肺則
尤甚閉門問途不如路中尋徑楊湯止沸不若竈
裏抽薪初則發熱亦似傷寒目出淚而不止鼻流
涕而不乾咳嗽太急煩燥難安以火照之隱隱皮
膚之下以手摸之磊磊肌肉之間其形若介其色
若用隨出隨沒乍隱乍現根窠若瞳兮疹而兼癮

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

皮膚如赤兮疹以夾斑似景而明兮十有九効如
煤而黑兮百無一生疹毒最重治法不同微汗常
出熱勢越而不留清便自調邪氣行而無壅滕理
拂鬱兮即當發散腸胃秘結兮急與疎通苟視大
而若細恐變吉而為凶惟卹不必憂邪從卹解利
不必止毒以利鬆所喜者身上清涼可畏者咽中
腫痛飲水不休法在坐津養血飲食欲減方煩救
胃和中
旦如出之太遲發表為貴出之太甚解毒其宜毋
伐天和常視歲氣寒風凜凜毒氣鬱而不行火日
炎炎邪氣乘而作癘或施溫補勿助其邪者用寒
涼休犯其胃制其過但取其平誅其暴必欲其已
遠寒遠熱陰陽之勝負不齊責實責虛人品之強
弱或異
防風荊芥散滕理之留邪升麻葛根開榮衛之蘊
熱人參養氣地黃涼無黃連入心而瀉火黃芩入
肺而定咳玄參石膏治邪火之浮遊梔子連翹開
惡毒之鬱結瓜婁潤肺止渴須合麥冬知母降火
生津必同黃栢芍藥住乎腹痛白朮止乎脾泄溲
者澀兮苓通咽常痛兮耳桔心神驚妄兮鎮以厥

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

砂臟腑秘結兮利以大黃牙蚤生疽蚊蛤配乎溺
白咽喉若痺射干助以牛旁五味杏仁治喘氣之
吟吟薄荷竹葉解膚熱之烊烊火燒人尿蜜炒麻
黃發斑毒之出現令邪氣之舒張枳實山查助脾
熱而化毒兪鈴地骨清肺熱以回瘡
瘡疹既出調理甚難坐臥欲煖飲食宜淡風寒著
受兮為腫為熱酸鹹不禁兮為咳為喘異氣縱戚
變証宜桑便多膿血兮倉凜夾熱咳多涎沫兮華
蓋傷寒口爛唇瘡心脾之火未退皮焦髮稿榮衛
之液將乾苟不詳於臨証何以見其折衄

治此變証各有奇方身熱不除紫葛合乎四物口
瘡若甚耳桔對乎三黃消腫定喘兮草蔗取効化
痰止咳兮順氣為良血氣已虛八物增損而可飲
水穀不納二陳斟酌以堪嘗劑血兮香連丸去蔻
而加秦皮黃栢咳血兮五拘湯去麻而加茅根地
黃此疹科之治法繼瘡科而再詳（麻疹此証屢火宜用清凉解毒）

麻疹西江月

瘡疹俗呼麻子蓋因火氣薰蒸遍身紅點硃砂形
乃是心脾二証最忌生斑死候切宜赤似朱紋大
都治法喜涼清不可辛耳犯禁

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

疹子何因咳嗽、只因肺與心連、肺經被火若熬煎、
以致咳嗽氣喘、治要清金降火、不宜誤用辛耳、嘉
如疱干薰、籠然、只要氣鬆火緩、
疹子如何辯認、分明狀似傷寒、此因咳嗽有紅斑、
噴嚏眼中水現、或見腹中疼痛、或時吐瀉相兼、疹
家吐瀉不須安、正要毒除熱散、
疹與痘疹異治、二家不可同方、痘宜溫解疹宜涼、
又要形見為上、若受風寒不出、其間凶險難當、急
為發散保平康、切忌神昏腹脹、
凡遇疹來出現、詳看天令如何、假如自暖又風和、

敗毒荊防堪可、若是時行疫熱、芩連消毒宜多、用
心調理救沉疴、莫學觀天并坐、
且說荊防敗毒、此為發散仙方、防風荊芥生地黃、
酒炒芩連二樣、桔梗人參甘草、連翹升麻牛旁、玄
參酒栢炒為良、竹葉水煎停當、
又有芩連消毒、散火散毒尤佳、芩連梔子及升麻、
桔梗甘草多把、石膏人參知母、連翹旁子紅花引、
用竹葉要多加、此箇方兒無價、
若是發散不出、令人真箇憂疑、麻黃酒蜜炒如爆、
梔栢芩連一例、更著大黃酒炒、連翹旁子相宜、石

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

膏蟬蛻紅花子不効命離塵世
如見出時紫黑此般今古多山急求人糞路歸東
火燒存性取用細研酒調吞下須臾黑色變紅若
還依舊黑朦朧管取黃粱一夢
疹子現形發熱尋常只用化斑石膏耳草及人參
桔梗連翹有驗若見毒多熱甚連翹消毒為先大
腸秘結大黃添務使微溏數遍
疹毒類多咽痛火邪薰灼無他連翹耳桔要多加
射干旁子前罷外用十宣妙散吹喉休要吁嗟假
如見效莫爭差消毒荅連無價

疹子若無瀉劑預先用藥調醫瀉時加減五苓宜
加上耳草滑石如見劑無赤白香連丸子相隨大
端劑止便為奇不效令人疑忌
疹咳聲聲氣促只消降火清金黃芩梔子赤茯苓
桔梗石膏一定知母人參地骨瓜婁麥冬杏仁玄
參旁子妙如神竹葉煎來作引
疹後須防四証不治常致慌人遍身餘熱欠清寧
咳嗽連聲牽引牙齒疳生走馬劑下赤白難禁各
求方法慢評論纔顯小兒醫聖
問甚身間壯熱只因餘毒留連金花丸子是靈丹

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

梔子芩連龍胆鬱金雄黄解毒燈心地骨湯吞著
還胃弱熱綿延集聖胃苓任選
咳嗽頻頻不止或因不禁酸鹹又如火毒肺家延
尤恐胸高氣喘體實兼行葶藶神虚清肺神丹如
斯調理保平安莫向風波弄險
葶藶丸除肺熱杏仁葶藶防已牽牛菜菔子相隨
棗肉搗成現劑清肺神丹降氣鹽水煑焙陳皮芩
連甘桔杏仁泥蘇子稀糊丸易
口齒生瘡臭爛此名走馬凶疳金花丸子内求安
外用除疳妙散先取尿桶白澗火烘白色如鹽五

倍銅泉退紙蚕砒末燒成黒炭
赤痢下時鮮血黄連栢葉槐花枳壳荊芥穗同加
痢止血除纔罷白痢茱萸滑石樗根枳壳升麻烏
梅取肉作丸佳赤白香連可下
四疾更防死証臨時休得殊差熱多體熱瘦如麻
咳嗽面青聲啞走馬唇齒肉落痢疾禁口吁嗟此
般即是死究家不可騎牛問馬

秘傳經驗痘疹賦終

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

秘傳瘍疹治法卷之二

瘍科總敘

治瘍之要諸家論之已詳大抵臨病應變因時制宜其用歸於使人正氣不損邪氣得解而已後世不知古人立法一以中和為貴曲學偏見滯於一隅喜行溫補者既昧解毒之制專用凉瀉者又失中和之旨妄投湯餌僥倖成功設遇脉証乖常時世差異惟束手待斃焉耳其間實實虛虛令人夭折未必非醫之咎也予迺蒐輯先哲診視之法又先君經驗之方彙成歌括凡一百五十首序次于后

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗瘍疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

瘡瘡節要總論

瘡瘡源流諸書已詳或謂母懷胎之時不肯禁口恣食辛酸煎炒而成者或謂父母交媾之時淫火熾盛流注于胎而成者論須不同大抵歸於胎毒但視其瘡有稠密則知其毒有淺深毒淺瘡木稀者不必服藥若不知禁忌誤服湯丸漸變成重者有之毒深瘡勢密者臨機應變因時制宜必使元氣得實毒氣得越而後已苟病家縱意以違工醫者隱忍而冀差漸成死証不可為者有之又有廛市村落相傳染者輕則俱輕重則俱重此係天行疫癘豈可槩謂胎毒哉凡遇此等必先立其年以定其氣次觀其人虛實以審其治要在於解表和中解毒而已

瘡瘡治法久無定論喜行溫補者不問其人壯實槩行丁桂姜附之劑以致皮肉潰爛咽瘡目昧傳諸惡毒不可治者多矣喜行凉瀉者不問其人虛弱槩行芩連梔柏之劑以致脾胃傷損嘔吐瀉泄不食痒痛瘢而死者有矣予深痛之故立治法先定歲氣次察色脉以審病勢如果天令嚴凝形體虛瘦六脉微弱或曾經大病而未愈或初起吐瀉之交

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

作此當從虛而治宜行溫補使正氣勝而邪氣退也如果天時暄熱形體壯盛六脉洪數飲食如常大小便秘此當從實而治宜行清涼解毒之法使邪氣無留滞之患以為正氣之賊也今分列門類收集歌括詳載方藥其命方也以預防通解托裏快斑化毒和氣復元其實不出古方庶臨病之工擇而取之因証得方合宜用藥以收十全之功幸毋得魚而忘簽也

一 治瘟瘡總括 凡一十四首

瘟疹緣因胎毒成　發生須是待天行

如逢疫癘將行候　預解湯丸最是靈

瘟疹之病皆由父母胎毒蓄於命門之中命門者右腎相火也為人身生化之本或遇冬溫陽氣暴洩人則感之觸動相火至春夏生長之時即發傳染相似是謂天行疫癘也未出瘡疹者但覺冬溫宜先服解毒之藥如辰砂散三棗湯代天宣化丸頓與之使毒易出易靨無陷伏留連之患凡小兒未出瘟瘡之先欲預防者只服代天宣化丸甚効不可妄下以損胃氣又如古方辰砂散油飲子龍鳳膏予皆試之未見其効今不敢錄入

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

凡值天時不正鄉邑瘟癘盛發此天行正令也欲
預防者只服宜化丸如脾胃素弱者更宜調其胃
氣適其寒溫節其飲食間以四君子湯加山查枳
實青皮木香之屬與之使胃氣和暢榮衛流通其
瘴易出亦易靡也

三豆湯

赤小豆　黑大豆　綠豆各一升生　小甘草三兩生剉

右以三豆淘淨同甘草用雪水八升如無用長流水代之煮
豆熟為度去甘草將豆晒乾又入汁再浸再晒汁
盡為度逐日取豆水煮任意食之

預解毒丸

代天宣化丸　即韓氏五瘟丹加減也

人中黃屬土甲己年爲君　黃芩屬金乙庚年爲君　黃柏屬水丙辛年爲君
梔子仁屬木丁壬年爲君　黃連屬火戊癸年爲君　苦參佐
荊芥穗佐　防風去蘆佐　連翹去心酒洗佐
山豆根佐　牛旁子酒炒佐　紫蘇葉佐

先視其年所屬取其藥以為君其餘主歲者為臣
為君者倍之為臣者半之為佐者如臣四分之三
於冬至日修合為末取雪水煮升麻和竹瀝調神
麴為丸外用辰砂雄黃為衣每服竹葉湯下
制人中黃法取甘草大者不拘多少用新竹一節
納甘草于中仍緊寒無節空處放屎

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

缸中浸七七日、取出晒乾聽用、

預知痘疹吉凶機　氣色都于面部推
年上山根尤緊要　紅光吉兆黯青危

未病先知是上工　能言輕重吉和凶
不離氣色分清濁　藏府幾微阿賭中

痘瘡未出之先、欲知吉凶、輕重者、但於面部推之、其色紅黃明潤者吉、青黑昏黯者凶、相書以山根管命宮、年上管疾厄、所以二處尤緊要

首尾汗下謂不宜　尋常孰著豈通醫

若分虛實能權變　可奪乾坤造化機

首尾不可汗下、此誠古人深戒之言、然亦語其平証耳、若遇風寒外襲、應出不出、則汗劑亦可用也、如大便連日不行、煩悶狂燥、不與下之、寧不夭人性命哉、是下劑亦可用也、但能消息虛實與時權變、迺不謂之通醫乎、

始終清便自調佳　便弱阻難事可嗟
腹脹喘呼多壅遏　急行疎導解留邪

此言可利則利者也、大抵痘瘡首尾小便長而大便潤者為順、若小便或秘急宜利其小便大便秘

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

鞭結三五日不行急宜利其大便利小便以八正
散利大便以通幽湯

八正散
木通　赤茯苓
連翹　升麻
瞿麥　燈心
滑石　甘草
梔子　淡竹葉

通幽湯
紫草　當歸稍
枳殼　酒大黃
桃仁泥　水煎服
生地黃　麻仁研
桔梗末　紅花

瘡疹脈候貴和平胃氣之中最要清
弦急浮洪休太過微遲短濇是虛因
大抵人以胃氣為主所謂弦不弦石不石也太過
為實不及為虛最宜消息
損塌方將倒陷時急憑神物强扶持
空中神瘡無留毒復腫成膿吉可知
瘡子損破平塌者謂之陷伏急用神方托裏發表
解毒和中須要無瘡處再出一層謂之補空破損
處復令腫灌方是吉兆也脈藥無靈者勿治
陷伏須分虛與實莫將神湯混同施

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

能於臨証加斟酌起死回生只一時

又

瘡疹傷寒証一般上工臨病盡須諳
莫將汗下輕相試解表和中命快斑

瘡疹發熱與傷寒相似但傷寒只見一經形証若
痘瘡則五藏之証皆見如呵欠頓悶肝証也乍涼
乍熱手足稍冷多睡脾証也面燥腮赤咳嗽啘噴
肺証也驚悸心証也骸涼耳涼腎之平証也已上
諸証獨見多者即主其藏之毒時甚治之要識此
意如肝証多用川芎梔子仁青皮之屬肺証多用

黃芩知母地骨皮之屬心證多用黃連木通之屬
脾證多用防風耳草之屬惟腎不可有證如耳熱
骸熱則邪在於腎用黃柏木通茯苓豬苓之屬此
其大略也臨機應變存乎其人焉

凡痘疹未出疑似之間不可妄用汗下之藥蓋首
尾不可汗下者汗則虛其表而難成就下則虛其
裏而易倒陷也古人戒汗下者衛生可謂嚴矣
大法治痘不過解表和中解毒而已解表如防風
荊芥穗升麻葛根之類和中如人參白朮當歸川
芎陳皮耳草之類解毒如酒炒芩連牛旁連翹梔

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

子之類古人謂如疱人蒸籠之法欲其鬆者此之謂也

瘡疹為陽待熱成　微微發熱始和平

假如大熱身猶火　鮮毒常令小便清

凡瘡疹屬陽非熱不能成就故治瘡瘡者不可盡除其熱如熱太甚者毒未發盡只鮮毒無利小便加味連翹升麻湯主之無脈牛黃丸

加味連翹升麻湯

連翹去心酒洗　升麻初酒洗　葛根初　桔梗汨浸

赤芍　甘草稍　酒芩甚　酒梔仁甚

大熱食少

木通酒洗　牛蒡子酒淘炒研　白滑石　麥門冬去心中

右剉水一盞浸竹葉燈心為引煎服不拘時候

始終能食最為良　平日其人脾胃強

食少即防中氣弱　淹留引日變瘍瘡

瘡瘡始終能食者其人脾胃素強自然氣血充實易出易靨如平日能食一旦食減者即問其咽痛不痛或傷何飲食依法治之咽痛者加味升桔湯傷食者橘皮湯如無上證只食少者此脾胃氣弱不能消穀以參苓白朮散主之

加味升桔湯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

桔梗　芎草　牛旁子 炒研 麝香
升麻　荊芥穗　取順流水煎熱服
橘皮湯
橘皮　青皮
芎草　白茯苓
水一盞大麥蘗炒一撮為引煎不拘時服
參苓白朮散
人參　白朮 去蘆炒　枳殼 炒　白茯苓　粉草
陳皮　桔梗　山查肉
枳實 炒　木香　山查肉

水一盞入砂仁椎碎一箇為引煎不拘時服
最宜安靜號和平表裏無邪志自寧
忽然煩擾宜詳審　又怕亡神轉悶昏
瘡瘡以安靜為貴此表裏無邪不必服藥但有煩燥者必毒氣壅併表裏不寧宜審諦之如爬搔不停者瘡痒也不寧者襲熱也呻吟者痛也非折肱之妙手豈能識其病而藥之也哉
治瘡先須順四時　風寒暑濕一同推
莫教異氣來相觸　反覆妖苗在霎期
大凡治病養生之道春夏養陽秋冬養陰故春病

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

治在肝夏病者治在心秋病者治在肺冬病者治在腎不可逆也治痘之工切須識此而勿使有誤也如天有飄風暴雨酷暑嚴寒常要謹其帳遣其寒溫故寒則蓋覆欲厚熱則居處欲清苟偏熱則血氣淖澤而瘡易腐爛偏寒則血氣凝聚而瘡難起發若有觸犯輕者變重卒生異證是謂災怪也如暴風連日而有傷風之證者桂枝葛根湯主之若寒凜烈而有寒證者正氣散主之酷熱薰蒸而有熱病者人參白虎湯主之要在遠中無犯正氣而已

桂枝葛根湯

桂枝　赤芍藥　乾葛　甘草
防風　水一盞姜一小片棗一枚煎七分温服

正氣散

茸草炙三分半　陳皮　蒼木各半兩
厚朴姜制　麻黃　官桂三分
水一盞姜一片大棗一枚煎七分熱服

人參白虎湯

人參君　知母　石膏
香薷　麥門冬　甘草
藿香葉

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

水一盞淡竹葉梗米白扁豆炒過作引煎服

胃苓湯

蒼朮（汗水制）　陳皮　甘草

澤瀉　赤茯苓（去皮）　白朮

水一盞煎七分温服

瘡瘧皆言要補脾　補中有害少人知

脾胃本強不須服藥今人不論虛實輒以四君子與之謂之實實益增煩熱燥悶昏亂遺害匪輕也

審證施方貴合宜

虛虛實實休輕易　猪苓（去黑皮）

瘧始終以脾胃為主若飲食如常大腑充實此　官桂

大抵不能食常泄瀉瘡灰白者此氣虛也四君子湯主之能食大便閉瘡撮腫者此血熱也四物湯加解毒藥主之故曰藥不執方合宜而用

四君子湯

人參　白朮　白茯苓　甘草（熱甚生用虛炙用）

水煎服

四物湯

當歸（身）　川芎　生地黃　芍藥（熱甚用赤補用白）

水煎服

一發熱證治括九十六首

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

瘡疹未形先發熱　吉凶輕重如何決
熱輕毒淺吉堪云　熱重毒深凶可說
凡發熱乍進乍退者其瘡必稀熱少者瘡亦稀蓋毒
淺則熱輕也若焮焮發熱或蒸蒸作熱煩燥昏眩
者其瘡必盛蓋毒盛則熱重也輕者不須服藥重
者宜發表解毒托裏加味葛根湯主之
瘡瘡發熱類傷寒　證治分門不一般
疎解透肌斑毒出　陰陽和暢不流連
加味葛根湯
升麻　乾葛　赤芍　甘草
桔梗　柴胡　荊芥穗　防風
連翹　牛旁子炒　木通
水一中淡竹葉為引煎服　大便結燥加紫草紅
花作渴加天花粉麥門冬腹疼閉結少加酒大黃
發熱而渴熱在裏切忌生冷及水水
生津解毒口中和　小渴任之而已矣
凡發熱作渴此瘡毒內蒸銷鑠津液故令口乾而
渴也微者頻與炒米湯飲之切不可以冷水紅柿
柑梨西瓜菱藕等物反傷胃氣必有後災亦不以
椒湯姜湯飲之恐助瘡毒而生他變也渴甚不止

発熱作渴

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

者以葛根解毒湯主之、
如瘡已出膏或起發或收斂一向渴而不止者以
人參麥門冬散主之如泄瀉不止更作渴者此胛
胃虛弱也、以參苓白朮散主之、

葛根解毒湯

生葛汁（如無取葛粉代之）　天花粉　粉耳草（取粉）
升麻　茅根汁　麥門冬　生地黃
酒芩　水煎衆藥和汁飲之

人參麥門冬散

人參　白朮　麥門冬　葛根

耳草　天花粉　酒芩
水煎和竹瀝乳汁服之

參苓白朮散

人參　白朮　木香　白茯苓
耳草（炙）　藿香葉（炙等分）　乾葛（北上六味倍用）　水煎服

發熱腹中急痛時毒攻於裏不須疑
大便鞕結宜攻下莫待臨危悔却遲

訣云發熱腹痛斑瘡腹肉攻發多防不透發少更
防癮可見瘡疹腹痛者乃惡候也凡瘡疹發熱但
覺腹痛者即當托裏化毒使毒得散不可逡巡以

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

致後艱也若能飲食如常而腹痛者化毒湯主之大便秘結煩燥作渴腹痛者三黃解毒湯主之泄瀉腹痛者建中托裏湯主之或桂枝大黃湯亦可

化毒湯

葛根　桂　白芍　甘草

青皮　木香　枳殼　山查肉

連翹　水煎服

三黃解毒湯

當歸稍　酒連　酒芩　酒大黃

紫草　紅花　枳實　木通

枳榔　水煎服

建中托裏湯

黃芪　官桂　白芍　人參

白朮　甘草　升麻酒炒　水煎服

發熱腰疼毒氣深　幾人病此幾惺惺

人參敗毒真奇絕　痛減瘡稀免損傾

凡痘瘡發熱腰痛者其候最惡治之宜早也但覺腰微痛者即與人參敗毒散治之如痛止者吉兆也若不止作凶論之

人參敗毒散兼治疫癘之氣

發熱腰痛

羌活　獨活　前胡　柴胡
川芎　枳殼　桔梗　白茯苓
人參　甘草　升麻　乾葛
水一盞生姜為引煎七分入竹瀝同服或用五苓
散加獨活通用

惟有痘瘡能發搐　要識病源屬肝木
不能勝脾又帰心　風火相爭脾不足
凡痘瘡發熱有驚搐者皆由木邪盛而侮土以導
赤散加辰砂未服之即止此驚痘甚好者以搐搦
發散於四肢也如痘應出不出搐搦不止者以瀉

青導赤散治之如不作搐但心悶啼哭者以麥冬
導赤湯治之
如痘已收靨餘熱不退而發搐搦者此慢驚之類
也多不可治但父母不忍坐視責而治之以寧神
湯抱龍丸合而治之輕者可愈

導赤散
生地黃　木通　甘草
薄荷葉　燈心　水煎服

瀉青導赤散　防風
當帰稍　木通　甘草
羌活

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

防風　川芎
淡竹葉　燈心
麥冬導赤湯
木通　麥門冬
燈心　水煎服
寧神湯
石葛蒲　白茯苓
炙耳草　黃連
水煎入竹瀝同服
抱龍丸
酒梔子仁　酒連
水煎和竹瀝飲之
耳草炙　酒梔仁
梔子仁　麥門冬
木通　燈心

發熱吐利

劑恐傳寫誤當佐膽

膽星四分　天竺黃五分　牛黃二分　辰砂二分
雄黃五分　共為末耳草水煮蒸餅為丸不用麝者
以瘡瘡已忘之故也
膽星制法　臘月收牛牯膽大者一枚用南星去皮
天德二方上百　劑壽未傾出膽汁相和解入膽中懸掛
日陰乾收用
發熱吐利如併作上下毒出無鬱遏
三焦火甚熱中求　日久不止脾胃弱熟火治又不同
凡瘡瘡發熱有嘔吐者有泄瀉者有吐瀉兼作者
不可驟止之令毒氣上下得出也但瘡疹見形吐
瀉即止者吉之兆也如久不止先用理中湯和之

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

瀉仍不止者以荳蔻丸治之吐瀉既止之後更服調中湯使脾胃氣實其瘡易壯易靨也如三焦火熱甚者又當從清凉之劑以解之

理中湯

人參　白朮　炙甘草　酒炒升麻

炙乾姜　水煎服

肉荳蔻丸

木香三錢　砂仁二錢　肉荳蔻麵裹煨五錢　赤石脂七錢半

白龍骨五錢　白枯礬七錢半　訶梨勒肉五錢

共為末水糊丸如粟米大三歲者五十四歲以上

百丸陳米飲下

調中湯

人參　黃芪　甘草炙　白朮

白芍酒炒　木香　陳皮　棗引水煎服

發熱譫語如見鬼　神識不清毒深取

鎮神解毒以平期　一向不止應不起

凡痘發熱妄有所見而譫語者皆昏昏好睡夢中語喃喃者或狂欲走尋衣摸床者皆毒氣內攻神識不清所為也急用鎮神解毒之藥辰砂導赤湯主之人事清爽神彩復舊者吉若連綿不止則魂

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

皃將離之兆、安可治哉、

辰砂導赤湯

人參　白茯苓　黃連炒　梔子仁炒
木通　石菖蒲　麥門冬去心　辰砂另研末
燈心　水煎入竹瀝調辰砂牛黃末服之

遍身發熱四肢寒　脾胃虛弱理須參

補中益氣令和煖　瘡盛仍前急買棺

凡痘瘡遍身皆熱、獨耳骭二處宜凉、所以瘡疹之證頭宜凉、手足宜溫、如手足宜溫而反冷者此謂脾胃虛弱也、四肢者脾胃所主、可用補中益氣湯治之、若服此湯手足煖者生、厥逆不退者死、

補中益氣湯

人參　黃芪　白朮　炙甘草
官桂　當歸身　陳皮
病甚者加熟附子　水煎服

熱毒熏蒸血妄行

但從鼻出方無忌、別道來時總不應

人身之血不可妄動、痘疹之火熏灼於內迫血妄行、隨火而動、或從口出、或從鼻出、或從大小便而出、皆死証也、但從鼻出者、或有可救之理、玄參解

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

毒湯主之亦有瘡疹潰爛不能收斂出血不止者
此陽瘡出血之證多不可治
玄參解毒湯
玄參　生芩　梔仁炒焦　桔梗
耳草　生地黃　葛根　荊芥穗
水煎臨服入芳根汁京墨和飲
晝夜發熱渾不歇　口舌生瘡唇破裂
咽喉塞痛食難嘗　解毒黃連合耳桔
凡瘡瘡未出而熱不退晝夜煩燥口舌生瘡唇裂
咽痛者此毒火內熏其熱誠急治之不可少緩也

急用黃連解毒合耳桔湯治之如不已者不治
黃連解毒合耳桔湯
酒芩　酒連　酒梔　石膏
桔梗　耳草　薄荷葉
連翹　牛旁子炒　荊芥穗
發熱身汗不須醫　水煎和竹瀝飲之
如恐汗多陽氣弱　腠理疎通毒發稀
調元的均有神奇
凡瘡疹發熱自汗者此不必治蓋腠理疎通毒氣
洩越無鬱遏也所以古人謂如庖人蒸籠之法但
欲其鬆者正此意也如恐汗出大多衛氣反弱瘡

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

痘不能成就者調元湯主之

調元湯

黄芪　人参　耳草　生芩

白朮　麥門冬　白芍藥　水煎服如汗

不止加地骨皮麻黄根以獖猪心肺煑湯兼飲之

尤妙

寒熱往來且戰兢　表虛邪正得相爭

但將柴葛加官桂　入口能令大勢平

瘡疹所忌者寒戰也如發熱之時增寒壯熱身振

振戰動者其人表氣素虛瘡毒欲出不出留連於

腠理之間邪正相爭故振振戰者火之象也但用

柴葛桂枝湯治之

柴葛桂枝湯

柴胡　葛根　耳草　羌活

人参　防風　官桂　牛旁子炒

水一盞淡竹葉十片同煎服

發熱綿綿不見形　其中凶吉事難明

解肌托裏須斟酌　施治詳分内外因

凡痘瘡發熱三日而便出者此常期也如過四五

日瘡猶不出勢熱綿綿無休歇者吉凶之兆未可

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

卜也急與解肌托裏分内外而治之踈者吉密者凶如勞苦之人皮膚粗厚腠理閉密者及外感風寒其瘡疹為外邪所遏而不易出者此外因也麻黄解表湯主之如虚吐瀉毒氣内陷而不出及傷飲食陳物菀於腸胃之間與毒合併鬱而不出者此内因也因虚者托裏十補散主之内實者枳實導滯湯主之

麻黄解表湯

麻黄（去根節用密酒炒黑色）　羌活　升麻

葛根　防風　荊芥穗　牛旁子（炒）

蟬蛻　甘草　桔梗

水煎入燒人屎同服

托裏十補散

黄芪　人參　當歸　厚朴（姜製）

桔梗　官桂　川芎

甘草　白芷　水煎調牛旁子末服

枳實導滯湯

枳實　山查肉　連翹　半夏（製）

酒連　酒大黄　木通　甘草

紫草　水煎調梹榔末服

発熱綿々

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

發表時師少定方古人專用葛根湯
能通權變知增損何必多方立紀綱
時師治痘瘡者方其發熱但知用葛根湯一見紅
點便禁而不用此不知權變者也蓋醫者意也藥
不執方合宜而用如瘡見熱除此表裏無邪不須
服藥所以不可再服葛根湯若痘已現熱甚不退
此毒深於裏尚恐葛根力小不足以勝之寧可止
而不飲乎
解表升麻湯最良 紅斑須見飲何妨
時師膠柱無通變一現紅斑不敢嘗

凡痘瘡發熱初用解表之劑要在審證用藥不可
草草詳見此門各條之下庶不重述但附葛根湯
加減之例于后臨病之工擇而用之可也

葛根湯主方

升麻 葛根 芍藥 甘草
口渴加天花粉 麥門冬 蒡根汁
腹痛加枳實 木通 山查
腰痛脚膝疼加蒼朮 黃栢 羌獨活 木通
頭痛加藁本 白芷
驚搐加木通 竹瀝 薄荷葉 燈心

国立国会図書館 タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』 請求記号 859-54
ガラス使用

嘔吐加白朮　半夏　陳皮
泄瀉加人參　白茯苓　訶子肉　白朮
發狂讝語加梔仁　石菖蒲　木通　辰砂
四肢冷加人參　黃芪　乾薑　官桂
吐血加茅根汁　山梔仁　黃芩　玄參
咽喉痛加桔梗　牛旁子　麝香
咳嗽加蘇葉　陳皮　前胡　枳殼
大便結燥加當歸梢　生地黃　紫草　紅花
常用加桔梗　防風　連翹　荊芥穗　大力子
多叫哭加山梔仁　黃連　木通　麥門冬

見形症治

吐舌弄舌加黃連

見形證治括凡一十八首

防風　山梔仁

發熱三朝痘出稀此為吉兆不須醫

先期毒盛渾無制過此多因氣血虧

凡痘瘡發熱三日而出此常期也依期而出稀者不須服藥如不及期發熱一二日即出者此毒氣太甚沖擊榮衛一齊湧出無所制伏大凡之象必欲治之不過解毒救裏使無陷伏耳消毒快斑湯主之如過期至四五六日始出者此氣血本虛不能載毒使之即出當補中托裏發表增損八物湯主

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

之

消毒快斑湯

桔梗　耳草節　荊芥　牛旁子
防風　當帰尾　赤芍　天花粉
黄芩　玄参　連翹　前胡

木通　水煎服

增損八物湯

人参　黄芩　白朮　耳草
當歸　川芎　牛旁子炒　赤芍
防風　荊芥穗　連翹　桔梗

葛根　水煎服

痘出遲遲有數般　皮膚閉密屬風寒
裏虛吐瀉宜分治　毒壅三焦治却難

瘡疹之出自有常期如應出不出者責而治之苟
外感風寒玄腑閉密不能即出者其證頭疼身痛
發熱無汗喜蓋覆猥衣懷中此惡風寒之象也當
與發散之用加減參蘇飲若胃吐瀉當實其裏虛
不能出快也加減調中湯主之如發熱煩燥狂妄
大渴唇燥此毒氣壅併留而不洩上焦主頭面至
胸中焦主胸至臍下焦主臍至足毒火蘊於三焦

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

則榮衛不行上下不通而死矣、

加減參蘇飲

人參　紫蘇葉　葛根　陳皮
前胡　白芷　桔梗　枳殼
甘草　羌活　防風

加減調中湯

竹葉為引水煎熱服

人參　白朮　黃芩　炙甘草
木香　官桂　白茯苓　半夏
陳皮　生姜引水煎服

應出不出却如何發表奇方効驗多
腹脹便堅煩悶苦消斑承氣救沉痾

凡痘疹應出不出或因外感風寒或因內虛吐瀉治各不同如前參蘇飲調中湯敗毒散葛根湯之類皆奇方也若熱甚腹脹氣粗煩燥悶亂大便鞕結者此毒火內蕃急與解之消斑承氣湯主之

枳殼　厚朴　大黃　酒炒　黃芩
黃柏　梔子　連翹　木通
甘草　甚者加芒硝

水煎生姜引空心服一方内加紫草

痘出熱退毒已盡熱如不減毒還甚

纍纍常出無定期外邊最怕垂形證

痘瘡之熱毒火為之也未出之時其毒在裏煎熬氣血熏蒸榮衛故熱發於外其現形則洩而熱解所以瘡疹出而熱解者其毒本輕瘡勢亦稀若瘡既出熱還不減者此毒積於中其熱方盛不可言為輕也當急解之用解肌化斑湯之後其熱漸退者可言為輕熱更不退其瘡纍纍旋出於痘空之間始雖似稀而終漸密如此者最怕生出他證或

煩渴或狂妄或泄瀉或腹脹或瘙痒或寒顫或失聲或錯喉乾嘔或喘促或黑陷皆不可治而死矣

解肌化斑湯

升麻　葛根　木通　牛旁子

桔梗　天花粉　地骨皮　荊芥穗

甘草　連翹　酒芩　酒栢

大便秘者加紫草水煎服

出現先於面部中其間凹吉妙難通

遠唇夾頰方為吉額上眉間總是凹

凡人之面部左頰屬木肝也右頰屬金肺也額屬

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

火心也、頰屬水腎也、鼻屬土脾也、又正額者太陽、
脉之所會、唇頰者陽明脉之所經、兩耳傍少陽脉
之所過、瘡為陽毒故隨陽而先現於面、但陽明者、
胃與大腸也、積陳受朽氣血俱多先於其位出現
者吉、若太陽則水火交戰之位、少陽則水火相併
之衝、若於其位出現者凶、不但出形忌於正額眉
間耳之前後、凡起漿收靨但從此處先者皆逆象
也、多不可治、故不立方、

頭面呼為元首尊　咽喉緊隘譬關津
莫致瘡子多稠密　鎖項蒙頭事足驚

經曰、頭者精明之府、又曰、春氣者病在頭、可見頭
為諸陽之會、為發生之本也、五臟精華皆見於面、
是頭面者、為人之元首至尊至貴不可淩犯者也、
咽者胃脘水穀之道路也、主納而不出、喉者肺脘
呼吸之往來也、主出而不入、非此則水穀絶、呼
吸廢而死矣、故在人身譬之關津隘口焉、瘡瘡之
出最要頭面頸項稀少如頭面多者、謂之蒙頭、頸
項多者、謂之鎖項、蒙頭則視聽皆廢、神明矣居、鎖
項則內者不出、外者不入、正所謂神去則機息、氣
止則化絶、死之兆也、

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

頭面胸前總要稀　四肢多也不須疑
遍身碎密堪惆悵　疎解當令發透齊

頭面者諸陽之會也胸者諸陽之所受氣也陳氏曰瘡瘡輕者作三四次出頭面稀少胸前無以清陽之分不可輕犯也四肢雖為諸陽之本乃身之所役使者為卒伍卑賤之職非若頭面之為元首也但屬四末非若胸膈為心肺之居故不畏其多也若遍稠密瑣碎者急與解毒疎通榮衛令氣得其勻血得其活一齊起發無乾枯黑痂之變可也

疎毒快斑湯

防風　荊芥穗　連翹　牛旁子炒
當帰　人參　桔梗　甘草
赤芍　熱甚者加酒芩　酒連　地骨皮
渴者加葛根　天花粉
氣虛者加黃芪　木香
便堅者加紫草　枳殼
溺赤者加車前子　木通
食少者加白朮　山查　陳皮

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

痒者加荏
腹脹者加厚朴
喘渴者加知母
泄瀉者加官桂
痛者加白芍

大腹皮
桑白皮
訶子
乾姜
酒芩
水煎服

瘡疹磊落最為奇　只怕相黏聚作堆
蚕壳蛇皮生不久　蚤斑蚊迹鬼相隨

凡瘡瘡初出且看相去遠近多少何如如相去三五寸一粒者必輕而稀相去一二寸者頗密如三兩成叢出者必密而重其候多變痒塌也如蚕之

遠近多少

[illegible]蛇之皮者此氣至而血不隨也當用行氣補血之藥芎歸勾氣飲主之服藥之後氣血相隨者吉瘡如舊者凶

芎歸勾氣飲

川芎　當歸身　赤芍　麥冬
人參　防風　荊芥穗　青皮
木香　官桂　甘草
水煎不拘時服

參苓和血飲

人參　黄芩
連翹　牛旁子　炒

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

酒芩　葛根　蟬退　當歸稍
木通　甘草　桔梗　水煎服

一出形來艷色嬌　定知皮嫩不堅牢
溶溶破損生難久　箇箇成膿死可逃

痘瘡出形如其人平日正色者吉若瘡色帶艷而赤其後多皮嫩易破痒塌而不可救也但見帶艷者即防後日痒塌之變早用疎風固表消毒之藥使氣血充實邪火漸退正氣不虧光壯乾收如期不亂可也固陽散火湯主之

固陽散火湯

人參　黃芪　甘草　當歸稍
升麻　葛根　荊芥穗　連翹
防風　生地黃　木通　水煎服

最怕頭焦鳥焠焠　又愁皮嫩水溶溶
頭焦變黑多歸腎　皮嫩逡巡痒塌攻

痘瘡初出所喜者明潤而鮮也若頭焦帶黑此毒在血分當涼血解毒為主不急治則變黑歸腎而難救矣涼血解毒湯主之

痘瘡初出所喜者堅實而厚也若皮嫩囂薄此毒在氣分當補氣散火為主不急治則痒塌而死矣

形色吉凶

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

固陽散火湯加白朮茯苓去生地黄主之

凉血解毒湯

赤芍　當歸稍　生地黄　甘草

木通　連翹　牛旁子炒　酒紅花

紫草　桔梗　山豆根

水煎調燒人屎一錢同服

皮中簇簇如寒粟　肉腫隆隆似熱瘤

如此豈能多引日　哀哉不久赴冥都

凡痘初出欲其顆粒分明皮肉柔嫩也如初出之時簇簇在於皮中似寒風栗子之狀此証變如反掌不待起發復隱而不見啼叫煩悶而死矣或正面或胸背或手足腫硬成塊如丹瘤之狀者此証待起發之時本處瘡子先黑陷破爛不能成漿乾較而死矣此二者皆不可治故不立方

出形未定先涵水　起發之時便載漿

膿水未成收靨急　十人得此九人亡

凡痘瘡初出一點血血化為水水化為膿膿成而毒解此自然之序也若痘初出之時半為水泡或將起發便戴白漿水或膿水未成忽然收較此皆毒火大甚失其自然之序不應至而至為之太過

出形惡症

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

比之應至而不至謂之不及者又不相侔矣蓋不
應至而至者所謂早發還先蓐也其進銳者其退
速不久倒陷入裏而死也無有治法應至不至者
責其氣血不充尚可補療所謂人奪天巧拗命者
醫也但病者隱忍而畏藥醫者俄延以倖成至於
日久虛憊而死者亦有之矣悲夫

痘瘡之證始終歸重太陰陽明二經也手太陰肺
陽明大腸足太陰脾陽明胃也鼻者肺之竅貴於
滋潤鼻乾黑燥如竈突狀火刑金也面者陽明之
經所聚也貴於鮮明面黑而枯精華散矣皮者肺
之合也欲其色紅白如常若似塗朱火之象也或
如橘色火極如土燥土之象也則黃也咽喉者肺與
胃之管籥也唇口者脾之竅也舌本者脾之絡也
痘盛如此其毒可知

痘瘡切忌解咽喉痺咽瘡毒火饒
祇恐一朝封管籥錯喉聲啞却徒勞
凡痘疹未有咽喉不痛者如烟窗之狀火焚於下
其燄上熏宜尒作痛也急用鼠粘子湯解其毒如

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

痛者用一聖散吹之若不早治以咽瘡潰爛吸門
腫塞水入則嗆食入則嘔咽啞失聲為之則難矣
鼠粘子湯
麝香　鼠粘子炒研　桔梗
連翹　水煎入竹瀝和飲之
一聖散
用苦參一味研取細末每用一字吹之甚効
若恐斑瘡入眼中膏前黃栢妙無窮
但觀眼內多紅脉急瀉心肝免毒攻
瘡瘡之毒為害者咽喉最甚眼次之所以古人用

黃栢膏為護眼之法其慮深矣但觀兩眼紅脉縈
纏或目腫閉不開多生膠淚急瀉心肝之火庶免
他日喪明之患蟬花散主之
黃栢膏
黃栢一兩　甘草二兩
右將黃栢甘草二味研為細末另收再用新汲水
三盞浸菉豆一晝夜去豆不用以浸豆水熬紅花
約減二盞去紅花纔入藥慢火熬成膏子每用眼
胞上下厚塗之則斑毒不入眼矣
蟬花散
新菉豆五合　紅花一兩

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

蟬蜕　密蒙花　酒連　當帰梢
木通　柴胡梢　龍膽草 酒洗　川芎
防風　酒梔仁　白豆蔻
淡竹葉為引水煎服

瘄瘡只出一般奇　夾疹夾斑都不宜
消疹化斑令解散　若還不解勢傾危

錢氏曰豆瘡只出一般者善凡瘄已見形其間碎密若瘡子者此夾疹也皮肉鮮紅成堀此夾斑也皆由毒火熏灼於中故使斑疹夾出於外也急宜解毒使斑疹消散瘄得單成可也荊防解毒湯主

之若服此湯斑疹不退者凶之兆也

荊防解毒湯

防風　荊芥穗　酒荅
玄參　牛蒡子 炒　升麻　知母
人參　石膏　甘草
木通　淡竹葉
水煎服

瘄標纔見兩三點　爬搔渾身痒莫禁
此是火邪留腠理　便須發散瀉心肝

凡瘄瘡初出之時便身作痒爬搔不寧者此瘄毒火邪傳於肌肉皮膚之間不能即出故尔作痒也

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

與傷寒汗不出而身痒者同況諸瘡痒痛皆屬心火河間曰痒為美疾者火之變也又肝主風爬搔不寧者風使之也肝屬筋而運乎爪經曰在變動為掻可見瘡痒好爬者皆心肝二臟之證治宜瀉心肝之火邪其痒自止矣消風火化毒湯主之

消風火化毒湯

防風　荊芥穗　升麻　白芍
桂枝　牛旁子 炒　葛根　淡竹葉
水煎服

口中息出多惺臭　肺受火邪焦爛故

凡瘡瘡初出口中氣惺臭勃勃出衝人者此肺中火邪煎熬潰爛故惺臭之氣出於口也急與瀉火清金之藥淹延不治至七日而死矣經曰肺絕者七日死此證之變或失聲或喘或乾嘔皆其候也

清金瀉火急解之　七日之後應不救

清金瀉火湯主之

清金瀉火湯

知母　生片枯芩　石膏　桔梗
甘草　麥門冬　馬兜苓
木通　山梔仁　天花粉

答

作痒氣臭

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

水煎和竹瀝服

一起發證治括凡二十六首

五六日間起發時俗醫計日強猜疑不知毒氣分深淺俗醫云三日發熱三日出形三日起發此鄒論也蓋毒有淺深氣有厚薄出之先後壯亦因之大抵不出五六日間彼毒淺氣厚者其起發也常易毒深氣薄者纏綿延挨至六七日如始壯者有之又未可以常期准也俗醫見其起發之遲不認痘之淺深槩謂中氣不足妄用補脾之藥殊不知胃吐瀉不能食者補脾以助長可也若無吐瀉能食而六腑堅者復用補脾之方不免黨邪為害非徒無益而反害之矣

起発症治

發起如期貴適中過與不及類吉凶

先期毒盛充膚腠過此斑瘡腹裏壅

凡痘瘡起發只在六七日之間謂之得中蓋在發熱筭起正當在六七日也如未及期而驟發此毒火大甚榮衛氣虛直犯清道而出謂之邪氣大過也發當固表解毒以防痒塌之變黃芪芍藥湯主之如過六七日又不起發者此臟腑虛弱毒留於

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

中壅塞不出謂之正氣不及也法當托裏解毒以
防倒陷乾黑之變內托護心散主之

黃芪芍藥湯

黃芪　白芍　酒芩　連翹
防風　大力子炒　荊芥穗　桔梗
甘草　葛根　人參　淡竹葉
水煎服

內托護心散

人參　當歸稍　荊芥穗　防風
酒連　大力子炒　酒芩　酒栢
甘草　蟬蜕　木通　桂枝
連翹　水煎入人屎調服
便秘者加大黃

出形已定視根窠紫草　去人參
若是青乾幷紫黑　急宜解散莫蹉跎

凡瘡出現已盡時當起發謹視根窠以決輕重
如形充肥色紅潤者此氣血和暢毒氣發越大吉
之兆也不須服藥若見形扁而塌色枯而黑者此
氣血虛乏毒氣壅遏不能發光壯急用解毒托裏
之藥如十宣內托散之類毋得草率悞人性命

出形輕重 十

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

十宣内托散

黄芪　人參
桔梗　甘草
防風　當帰酒洗　川芎
大便秘加酒大黄　牛旁子炒　荆芥穗
小便秘加木通　紫草
渴加天花粉　葛根
水煎入燒人屎同服此瘡癤必用之藥也
大抵痘標只要稀　如斯平順不須醫
若然稠密休輕易　解毒常常慮險危

痘稞稠密

凡痘瘡稀者其毒少不須服藥若見稠密其毒必盛切防氣血不足起發不透漸生變異常服解毒托裏散令易壯易靨可也如服此藥紅活光壯者此氣血内實毒不能留即止後藥如服藥後病勢淹延者邪氣盛正氣衰不能成就宜屢服之如服此藥當起不起此必有變不可治之反取人之怨尤也

解毒托裏散

桔梗　牛旁子炒　人中黄
防風　酒紅花　當帰稍　荆芥穗
蝉蜕去土

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

升麻　葛根　赤芍　連翹

水煎入燒人屎服

鄞郭充肥實且堅　色多蒼蠟或紅鮮

如逢破損多囂薄　縱有良方命不痊

凡痘瘡郛郭充實皮囊堅厚以指捺之堅實不破又其色蒼蠟或紅活者此皆順候也不喜乾燥淫濕若瘡雖紅鮮反乾燥而不充肥者此火盛而血不足也宜退火凉血輕清之劑四物快斑湯主之瘡如充肥而帶淫濕者此濕甚而氣不足也宜瀉濕補氣兼風藥治之蓋風能勝濕也四君子快斑湯主之如紅活充肥以指捺之隨捺隨破者此乃皮嫩易破後多痒塌而不可治宜用大補保命湯如但起發浮囊空殼如蚕之殼麩之皮中無水色者此氣血俱虛用大補快斑湯其瘡轉澤潤而中舍水者可治無水者必增痒塌而不可治悶亂叫哭而死

四物快斑湯

川芎　當歸稍　赤芍　荊芥穗

生黃　牛旁子炒　升麻　葛根

連翹　紫草　地骨皮

堅活燥嫩

水煎入燒人屎調服

四君子快斑湯

黃芪　人參　白朮　白茯苓

甘草　官桂　白芷　荊芥穗

防風　陳皮　白芍　水煎服

大補保命湯

黃芪　當歸稍　人參　川芎

赤芍　生黃　牛旁子炒　甘草

防風　荊芥穗　連翹　官桂

水煎入燒人屎服

諦視形色

痘瘡將起辯形色　虛實寒熱分氣血

莫教差錯半分毫　子細消詳用補瀉

凡痘瘡起發須諦視形色以定輕重吉凶如根紅潤頂蒼蠟色者上吉根窠紅頂灰白色者次之根窠赤頂亦赤帶艷者此火勝也用解標瀉火湯色退者生不退者死如純灰白色者作寒看此氣虛也如純紫赤色者齊湧出者作熱看此血熱氣實也虛則補之實則瀉之以平為期服藥瘡色回者十死一生

解標瀉火湯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

酒芩　牛旁子炒　當帰稍
酒梔　連翹　山豆根　耳草
桔梗　升麻　葛根　地骨皮
水煎入燒人屎服

四圍起發陷居中　中氣虧虛尚未通
若是中枯成黑子　又名疔毒急須攻
瘡瘡起発其形不一　有緊小而充實者俗呼珍珠
瘡是也此則易壯易靨有高大而飽滿者俗呼大
瘡是也此則早壯遲靨有四圍起而中心落陷者
俗呼茉莫瘡是也此則有吉有凶有輕有重出稀

者輕出密者重蓋有中氣不足所以時日未到但
四圍起發而中心尚是好肉未得起發耳時日既
到自然充拓而成血漿輕稀者不須治之重密者
解毒化斑湯主之若先有水忽乾枯黑陷此名瘡
疔不可與中氣不足者例論也
解毒化斑湯

黃芪　人參　耳草　當帰稍
川芎　牛旁子炒　荊芥穗　防風
連翹　寒月加官桂
水煎入燒人屎服

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

中心微起四圍乾
毒火熏蒸津液竭　不久焦枯變一般
痘本稀者自然易壯易靨　開關起篇治應難
害有中心微起含水色四畔却乾枯者此火毒熏
蒸津液將竭之兆急宜治之如痘疔之法失此不
治則盡焦枯復入於裏煩燥叫哭腹滿喘渴而死
矣
痘疔治法古多般　只要開通毒氣先
解毒透肌令發散　胭脂四聖保平安
大抵痘瘡初出一點血屬正氣被毒氣

衝擊隨腠理而出現也其後毒與血併血化為水
水化為膿膿成而毒解矣故毒火太甚煎熬陰血
其血乾枯而變黑色不得化水反塞閉毒出之路
以致毒氣陷伏而不得出此名倒陷者是也其人
煩燥腹脹喘渴多不可救故古方外或用針刺破
而吮出其血者或用火炷之者無非欲其開關起
篇而使毒氣得出也然不如四聖珍珠散用之有
効內多服穿山甲燒人牙者既非解毒發表之意
又非托裏快斑之法愚者執而用之其偶中者未
遇真病也若遇真病寧無噬臍之悔哉然不如加

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

味四聖快斑散用之屢驗錢氏用百祥丸牛李膏者必其人大小便秘結煩熱作渴故宜服之若其人大便自調身無大熱者則不可用矣今改用百祥丸牛李膏以宣風快斑散代之若或泄瀉其瘡由灰白而變黑陷者此名倒伏黵也以木香快斑散治之中病即止不可多服反增熱症也

四聖珍珠散

碗豆 四十九粒 菉豆 四十九粒 味各燒成灰 油髮 一握燒 珍珠 七粒

右共碾為細末用胭脂取汁調勻以針挑破黑頭納藥於中更用胭脂水塗四畔其瘡便回如其不回反添黑陷者此死症也不可妄治

加味四聖快斑散

黃芪 人中黃 酒紅花 麻黃 酒炒 焦黑

紫草 牛旁子 炒 絲瓜 連蒂燒 欣 另碾 木通

連翹 辰砂 另碾 燒人屎

水煎調上三味末服

宣風快斑散

木香 枳殼 甘草

大黃 水煎調黑牽牛半生半熟碾末服之以木通為度通後瘡回以四君子湯調之

梹榔

木香快斑散

木香　黃芪　人參　桂心
青皮　訶子肉　炙甘草　當歸身
白朮　陳皮　白茯苓
生姜引水煎服

黑陷瘡中最所嫌此名惡候古今傳
然黑陷亦有不可治之者如用前藥其瘡紅活依
期光壯吉之兆也若服藥如故則不可治矣但痘
本稀或痘稠密其中起發者多寡有數箇黑陷者

此則可治假如稠密無縫又不起發或灰白或紫
赤或青乾又加黑陷者治之無功大抵痘疹紅鮮
者吉黑乾者凶其變黑歸腎之說詳見下卷

灰白遲延頂又平　紫紅撥睛候須明
只將氣血分虛實　莫學庸醫執一論

凡痘瘡喜紅活充實不能紅活充實者虛也紅腫
太過者實也假如灰白色當起不起其頂平陷者
此氣虛也必問其人初起證候若初起吐瀉不能
飲食其後瀉止而瘡灰白頂平者此正氣虛弱十
全快斑湯主之其瀉一向不止異攻快斑湯亟蒐

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

丸兼而治之甚者附子理中湯主之若未吐瀉其人素怯此元氣不足補元快斑湯主之或悞服解毒涼藥及飲冷水者調中快斑湯主之若灰白色又加痒瘍頂陷腹脹者此不治之證也假如紫紅掀腫此血熱也涼血快斑湯主之或其人素實初起悞服熱藥以致斯證者三黃解毒湯主之若紫赤變黑喘渴不寧者此又不可治也庸醫不知氣血虛實之分喜行溫補者不問內實率用陳皮木香異攻之劑喜行解毒者不問中虛率用芩連梔栢之類實實虛虛執論一偏其悞人者多矣戒之

形色凶危

慎毋傷人命以貽天殃

十全快斑湯

人參　黃芪炙　甘草炙　白朮

白芍　當歸身　川芎　木香

官桂　陳皮　藿香　大棗

生姜　水煎服

異攻快斑湯

人參　黃芪炙　甘草　白朮

木香　當歸身　桂心　陳皮

訶子　丁香　白茯苓　大棗

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

生姜　水煎服
肉豆蔻丸
木香　砂仁
白礬各七錢半赤石脂
共為細末麪糊丸如米大每五十丸至百丸米飲
送下
附子理中湯
人參　白朮
附子煨熟　訶子肉
甘草炙　乾姜炙
水煎服
補元快斑湯
白龍骨　訶子肉各五錢
肉豆蔻五錢麪

人參　黃芪炙
當歸身　水煎服
補中快斑湯
人參　白朮　甘草炙
半夏　桂心　陳皮
蒼朮　厚朴　藿香葉
水煎服
凉血快斑湯
連翹　生地黃
升麻　牛旁子炒　當歸稍
甘草　酒紅花

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

大便堅者加紫草甚者加大黃
小便少者加木通水煎服

三黃解毒湯

酒芩　酒連　酒梔　酒柏
連翹　牛旁子炒　木通　甘草
升麻　淡竹葉　水煎服

一發便如錫面形皮膚浮睛勢猙獰其人能食方無慮　不食昏迷鬼伴行凡瘡疹稠密要依次起發紅活尖長者吉如一齊起發遍身白色如錫餅形頭目浮睛者此惡候也

但看其人飲食如何其人能食大便堅小便清無他證者往往延至日久渾身皮脫而愈若不能食後加吐瀉熱渴搔痒者必死之證也能食者宜服消導解毒之藥助脾快斑湯主之然亦少少與之不可過多也

助脾快斑湯

陳皮　山查肉　荊芥穗　牛旁子炒
甘草　木香　青皮　枳殼
木通　水煎服

起發初時未試漿口唇瘡色早焦黃

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

如斯惡候無人識　慢自多方立紀綱

口唇者脾之候也脾司手足以養氣血所以疹瘡不宜脾胃受病如初出起發之時漿水未試口唇瘡色便帶黃漿者此惡候也時人不識喜其成漿便呼為吉延至五六日問其瘡先靨其唇剝落一層又一層漸加而死矣

起發瘡頭戴白漿　不知何處總為殃

謾誇妙手奪天巧　七日之中見不祥

凡瘄瘡由紅黑而水泡由水泡而膿泡由膿泡而結痂有自然之次序若初起發瘡頭便帶白漿者此疫癘也不問何處但有此便不可治主七日死

發時磊落最堪誇　相串牽連事可嗟

若又四圍添小粟　定然搔痒證來加

凡瘄瘡起發顆粒分明尖員磊落者吉如彼此串連成一片者重看虛實用解毒快斑之藥如上分氣血而治之若本瘡起發根窠四畔又旋出小瘄攢簇本瘡成叢似粟者不待養漿即加搔痒而死矣

起發時常驗手足　發如不透多返覆

發散補脾兼解毒　此緣脾胃弱中求

口唇焦黃　起發白漿

但痘瘡起發之時常要相視手足看發達何如手足循序起發此毒得越脾胃素強不必憂慮若遍身俱起手足起不透者此脾胃本弱也蓋脾胃主灌溉四肢今脾胃虛不能行其津液便毒得越所以手足起發不齊用補脾快斑湯主之若手足之瘡見而復隱起而復瘍者必死之候此本根已拔枝葉支蕤之象也

補脾快斑湯

黃芪　人參　甘草　防風
防己　桂少許　水煎服

變輕變重在斯時調養看承勿縱馳
禍發卒然難救療噬臍束手悔須遲

痘瘡有輕變重者犯禁戒誤醫藥受風寒也有重變輕者守禁戒擇醫藥適寒溫也然輕重凶吉之變存乎起發之時以調護不可以縱驅也

凡痘瘡或遇暴風雨迅雷之變即當密布帳帷謹飭房戶以防客氣之侵如有失於調護為寒涼所鬱不能起發者用正氣快斑散治之

正氣快斑散

羌活　蒼朮　防風　甘草

手足冷氣

桔梗　當歸　乾葛　白芷
川芎　冬月加桂　生姜引水煎服
凡瘡瘡起發遇久陰雨不能起發者用平胃快斑
散治之、
平胃快斑散
蒼朮　厚朴　陳皮　甘草
羌活　防風　官桂　猪苓
白茯苓　水煎服
凡瘡病起發遇天氣暄熱俗人不知謂瘡欲温蓋
覆太厚以致毒火過鬱而不得越者此壯火食氣
蓋覆太厚
及虛其氣也、白虎快斑湯主之、
白虎快斑湯
人參二錢　石膏煅　甘草　麥門冬
葛根　升麻　淡竹葉
昏迷者加辰砂末
小便赤者加木通　滑石
大便堅者加生石膏　水煎服
凡瘡瘡起發悞傷生冷以致脾虛不能發透者理
中快斑湯主之、
理中快斑湯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

人參　白茯苓
官桂　炙乾姜
嘔吐者加半夏
生姜引水煎服
凡瘄瘡起發內傷飲食腹中飽悶或痛以致中氣
鬱遏不能發透者用寬中快斑飲治之
寬中快斑飲
陳皮　半夏　白朮　枳實
查肉　神曲炒　砂仁　黃連姜汁炒
木香　甘草炙　厚朴　青皮

連翹　生姜引水煎服
凡瘄瘡起發悞服湯丸偏寒偏熱以致不透者必
詳問其所服之藥若悞服寒涼者調中快斑湯主
之悞服熱藥者王黃解毒湯主之　二方見前
自此常宜大便堅　如常調潤保無艱
若逢泄瀉無休歇　寒熱須教仔細參
瘄瘡自起發之後大便要堅雖三四日不大便亦
無事惟小便常欲流利耳若見赤少四苓新加湯
主之如有忽泄瀉者要分寒熱治之視其所瀉之
物焦黃酸臭者此內熱或傷飲食也胃苓和中飲

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

主之若所出之物青白澄冷者裡寒也附子理中
湯主之方見前久瀉不止以理中湯吞豆蔻丸甚効

四苓新加湯

猪苓　澤瀉　赤茯苓　木通
滑石　甘草稍　燈心　淡竹葉
連喬　水煎服

胃苓和中飲

猪苓　澤瀉　白朮　白茯苓
陳皮　炙甘草　黄連酒炒　木香
升麻　訶子肉　藿香

粳米引水煑服

其人能食素脾强　大便雖塘也不妨
但用補中及消導　二陳君子是奇方

如人能食雖有泄瀉不能為害但當常服補中之
藥六君子湯主之

六君子湯

人參　白朮土炒　白茯苓　炙甘草
陳皮　炙黄芪　山查肉　神曲炒
木香　升麻炒　砂仁
大棗引水煎服

能食便瀉

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

起發頭面預腫時大頭時氣可無醫

瘡宜磊落色宜潤及此須防命必殞

凡瘡瘡起發有頭面以漸而腫者此毒氣發越聚於三陽欲作膿血故宜皮肉敝腫也此雖正病亦當解毒護目救咽喉而無治之用消毒化斑湯頭面而不腫者此瘡本稀疎石砾落毒根輕淺雖作膿血却不占處所故宜不腫不必治之若瘡稠密應腫不腫者此毒鬱留於內不即發越急服托裡快斑湯瘡起者吉不起者凶至於腫時又要觀其皮色何如瘡本磊落皮色紅活者吉瘡本糢糊皮色黑黯灰白者多不可治也亦有痘將起發便光頭目腫者此天行疫癘之氣各大頭瘟者是也急宜解毒用救苦散治之應藥者吉不應藥者凶則易腫易消漸變搔痒瘡水錯喉聲啞倒陷百無一生矣

頭腫疫氣

托裏快斑湯

消毒化斑湯

桔梗　牛旁子炒　人中黃　連翹

防風　柴胡　密蒙花　龍膽草

升麻　蝉蛻　水煎服

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

羌活　防風　牛旁子炒　桔梗
升麻　荊芥穗　連翹　甘草
葛根　當歸稍　官桂少許
竹葉引水煎服

救苦散

羌活　防風　牛旁子　桔梗
酒芩　荊芥穗　人中黃　連翹
水煎入竹瀝姜汁少許細細嚥之

頭面膧胖雙目閉　毒氣壅塞在經隆
此為惡証謹愼汤　膧退目開事不濟

瘡瘡起發頭面膧有目閉者亦有目不閉者觀其
瘡本疎密毒氣輕重若疎瘡輕者目自不閉瘡密
毒甚者其目要閉宜閉而不閉者凶但遇目閉之
證必待收較而後漸開也若未收較漸生瘙痒膧
消目開者凶

瘡瘡痛痒作何憑　痒虛痛實自分明
都來痛者終為吉　諸痒緣無一吉云

大凡諸痛為實諸痒為虛謂之實者邪氣實也謂
之虛者正氣虛也蓋瘡瘡始終氣以載之血以養
之氣血充實則禁固綳束其毒不得以橫行所以

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

緊實而為痛也痘瘡痛者此是美事不須服藥苟欲治之用涼血芍藥湯氣血若虛則邪氣橫行泛溢皮肉不任燎灼浸螫是為痒也蓋痘瘡回頭作痒者容或有之此否極泰來之兆若發熱及養漿時而痒者此危証也內服托裏解毒外用薰浴之法令無致於痒瘍破陷可矣仍要分虛實而治如能食而大便秘結者此邪氣內實正氣外虛也加味四聖解毒湯主之外用浴法如泄瀉者此正氣裏虛邪氣外實也調元托裏湯主之用薰法如用上二法而痒即止者吉痒不止而反甚者不再治

涼血芍藥湯

白芍 酒炒　當歸稍　生黃　酒紅花

地骨皮　水煎服

四聖解毒湯

紫草　木通　枳殼　黃芪

桂枝　大黃 酒炒　水煎服

浴法

升麻　蒼朮　麻黃　槐柳桑枝煎

水乘熱拭之

調元托裏湯

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

人參　黃芪　甘草　訶子肉
木香　陳皮　桂枝　防風
赤芍　荊芥穗　羌活
生姜引水煎服

薰法

用乾山茵陳白艾二味縛為束子燃火薰之
凡瘡瘡起發身上作熱起發之時熱竭加火邪內迫事甚嗟
瘡不能發也如熱大甚過於常時唇焦口燥小便
急宜解毒生津液休得俄然恨落花

短少者則不可治導赤解毒湯主之熱平則止勿
過劑焉

導赤解毒湯

木通　防風　甘草
連翹　升麻　赤芍　麥門冬
葛根　天花粉　生黃　地骨皮
燈心引水煎服

瘡瘡作渴此是常事蓋由胃中津液不能滋養本
元內則熾於毒火外則灌潤瘡本故宜渴耳凡渴
之時切不可與西瓜紅柿蜜水梨菱諸般生冷之

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

物、只宜炒米湯頻頻飲之可也、俗人喜用椒湯姜
湯者、不知椒姜性熱、有毒、當禁之也、或有飲冷水
及椒湯而獲安者、此僥倖之計、不可以為常耳、古
人之戒、良有以焉、但渴太甚者、看其人虛實而治
如大便堅實而渴者、此內實作熱也、生津地黃湯、
主之、泄瀉而渴者、內虛作熱也、白朮散主之、

生津地黃湯

生地黃　麥冬　知母
茸草　竹葉　引水煎服
白朮散　天花粉

白朮　人參　木香　黃芪
茸草　藿香葉　白茯苓　葛根
水煎服

幾番起發便無聲　咬齒增寒神識昏
乾嘔錯喉痰氣急　瀉青腹脹總歸寃
瘡瘡始終要聲氣清朗、人事安靜、六腑堅實飲食
如常也、如起發之時、便咽喉失聲者、咬牙者、寒戰
者、燥煩昏迷者、乾嘔者、嗆水錯喉者、痰氣喘急者、
泄瀉不止者、腹脹悶亂者、皆凶證也、人皆云瘡已
出而聲不變者、形病也、瘡未出而聲變者、氣病也、

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54
ガラス使用

瘡出而聲不出者形氣俱病也將欲治之誠難為力吾見失聲而死者矣未見失聲而生者也間有咳嗽失聲者不在此例

病人嘔噦勢難驚　莫認寒邪在胃停
妄進湯丸如拙匠　內傷臟腑死將臨

凡痘瘡乾嘔無物或時噦逆者此臟腑內傷衝任之火上犯清道而出故為嘔噦之聲嘔噦者惡聲也經曰絃敗者聲必嘶木陳者葉必落臟敗者聲必噦短鍼無取毒藥無攻此之謂也若飲食而嘔吐者當分寒熱而治如曾傷冷物受寒氣此寒嘔也二陳理中湯主之如未傷冷物未受寒傷此熱嘔也二陳一連湯主之若飲食哽塞而嘔逆者此咽中有瘡必然作痛閉塞而嘔也加味鼠粘子湯主之更用控延散及獨聖散吹之殊効

二陳理中湯

人參　白朮　陳皮　白茯苓
半夏　生姜引水煎服

二陳一連湯

陳皮　半夏　白茯苓　黃連酒炒
竹茹　生姜引水煎服

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2巻』　請求記号 859-54
ガラス使用

加味鼠粘子湯

桔梗　牛旁子炒　射干　山豆根
防風　耳草　陳皮去白　荊芥穗
連翹　水煎細細呷之

控延散

辰砂三分　雄黃三分　孩兒茶五分　黃栢末五分
硼砂一分　研為極細末少許吹之

獨聖散

苦參一味　研為細末吹喉痺咽痛神効

遍身稠密發未透　啼聲呻吟更煩燥

狂言妄語見鬼神　臟腑敗傷大限到

凡痘瘡稀疎磊落者自然起發光壯若是稠密切防氣血虧損起發不透即視病之所在如前法而治之虛則補之實則瀉之在氣治氣在血治血臨機應變不可坐視以悞人命如用藥施治每中權衡神瀉無功反增沉重或啼哭不止日夜呻吟煩悶亂狂言妄語如見鬼神此臟腑敗傷神魂離散復何為哉

秘傳經驗痘疹治法卷之上

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

859
54

5027

国立国会図書館　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『祕傳經驗痘疹治法2卷』　請求記号 859-54

ガラス使用