

內科門

醫  
西  
藥  
大  
全

茹十眉醫士編著

# 醫藥大全總目

## 第一冊

### 內科門

【一】中風 中風概說	一
風中經絡	二
風中血脈	三
風中臟腑	四
類中風症	五
中風通治	六
中風口噤	六
中風不語	七
中風口喎	七
中風痰厥	八
中風痰壅	八

老人中風	八
【二】傷寒 傷寒概說	九
傷寒太陽	一〇
傷寒陽明	一一
傷寒少陽	一二
傷寒太陰	一三
傷寒少陰	一四
傷寒厥陰	一五
陰證傷寒	一六
傷寒無汗	一六
傷寒譫語	一八
傷寒發狂	一八
傷寒盜汗	一九
傷寒頭痛	一九

傷寒煩渴	一九
傷寒呃逆	一九
傷寒氣喘	一九
傷寒煩逆	二〇
傷寒結胸	二〇
傷寒肢痛	二〇
傷寒下痢	二〇
試驗傷寒	二二
【三】寒病 濕病概說	二二
春日濕病	二三
暑天濕病	二三
濕病爲毒	二四
濕熱濕病	二五

溫病兼瘧	.....	二六
冬大溫病	.....	二七
溫病伏熱	.....	二七
【四】暑病 暑病概說	.....	二六
暑風暑濕	.....	二六
伏暑霍亂	.....	二六
中暑暈厥	.....	二六
中暑腹瀉	.....	二六
中暑通治	.....	二六
預防中暑	.....	二六
暑日吐瀉	.....	二六
【五】霍亂 霍亂概說	.....	二六
陰症霍亂	.....	二六
陽症霍亂	.....	二六
乾霍亂症	.....	二六
霍亂通治	.....	二六
霍亂轉筋	.....	二六

霍亂腹痛	.....	二六
霍亂煩渴	.....	二六
【六】瘧疾 瘧病概說	.....	二六
陽氣瘧瘧	.....	二六
寒邪瘧疾	.....	二六
伏暑正瘧	.....	二六
瘧瘵瘧母	.....	二六
瘧病通治	.....	二六
久瘧不止	.....	二六
截瘧方法	.....	二六
【七】咳嗽 咳嗽概說	.....	二六
風寒咳嗽	.....	二六
痰熱咳嗽	.....	二六
虛勞咳嗽	.....	二六
痺飲咳嗽	.....	二六
咳嗽通治	.....	二六
久咳不已	.....	二六

老年咳嗽	.....	二六
酒後咳嗽	.....	二六
咳嗽吐血	.....	二六
咳嗽失音	.....	二六
【八】痢疾 痢疾概說	.....	二六
虛寒痢疾	.....	二六
赤白痢疾	.....	二六
休息痢疾	.....	二六
噤口痢疾	.....	二六
痢疾通治	.....	二六
久痢不愈	.....	二六
五色痢疾	.....	二六
下痢脫肛	.....	二六
【九】嘔吐 嘔吐概說	.....	二六
熱症嘔吐	.....	二六
寒症嘔吐	.....	二六
乾嘔嘔吐	.....	二六

嘔吐蛔蟲	五
嘔吐通治	六
嘔吐清水	六
嘔吐酸水	六
中酒嘔吐	六
【一〇】脚氣 脚氣概說	六
濕脚氣病	六
乾脚氣病	六
脚氣通治	六
脚氣衝心	六
老人脚氣	六
【一一】臌脹 臌脹概說	六
水臌水腫	六
氣滯成臌	六
實症臌脹	六
虛症臌脹	六
臌脹通治	六

病後浮腫	六
黃腫通治	六
血臌通治	六
【一二】疸病 疸病概說	六
陽症黃疸	六
陰症黃疸	六
女勞疸症	六
黃疸通治	六
穀氣危症	六
黑疸危症	六
【一三】吐衄 吐衄概說	六
五臟吐血	六
六腑吐血	六
鼻衄鼻血	六
吐血通治	六
衄血通治	六
【一四】哮喘 哮喘概說	六

暑熱哮喘	六
風冷哮喘	六
實症哮喘	六
虛症喘呼	六
暴發喘症	六
肺虛喘急	六
肺熱氣喘	六
氣喘通治	六
痰喘通治	六
老年氣喘	六
痰喘通治	六
哮喘通治	六
【一五】三消 三消概說	六
上焦消渴	六
中焦消渴	六
下焦消渴	六
消渴通治	六

消渴尿多	八九
腎消通治	八九
老人消渴	八九
【一六】痰飲	
濕停痰症	八九
燥火痰症	八九
風邪痰症	八九
濕熱痰症	八九
寒痰暴厥	九〇
濕氣痰飲	九一
水停臌飲	九二
溢飲浮腫	九三
支結飲症	九三
伏飲喘咳	九四
痰飲通治	九五
【一七】疝氣 疝氣概說	
衝心疝氣	九七

狐狸疝氣	九七
癪疝疝氣	九八
厥逆疝氣	九八
殺瘡疝氣	九八
潰爛疝氣	九九
癢結疝氣	九九
疝氣通治	九九
【一八】諸汗 諸汗概說	
陽虛自汗	一〇一
陰虛盜汗	一〇二
黃汗黏衣	一〇三
諸汗通治	一〇四
【一九】痺症 痺症概說	
三痺疼痛	一〇四
五般痺症	一〇六
腸胞痺症	一〇八
手足風痺	一〇八

風痺緩急	一〇九
頑痺腹痛	一〇九
【二〇】痿症 痿症概說	
肺腑痿症	一〇九
心肢痿症	一一〇
肝肢痿症	一一〇
脾肢痿症	一一一
腎肢痿症	一一三
痿症通治	一一三
【二一】虛勞 虛勞概說	
陽虛不足	一一四
陰虛不足	一一六
五般勞症	一一七
虛勞通治	一一九
驗勞方法	一一九
【二二】癲狂 癲狂概說	
癲癩重症	一二九

猖狂重症	一三〇
癲症眩仆	一三三
癲癩通治	一三三
羊癩風症	一三三
卒得痢疾	一三四
【二三】遺精	
夢裏遺精	一三四
無夢自遺	一三五
遺精通治	一三五
內熱遺精	一三六
心虛遺精	一三六
腎虛遺精	一三六
虛滑遺精	一三六
小便遺精	一三七
心虛夢遺	一三七
勞心夢遺	一三七
陰虛夢遺	一三七

【二四】傷風 傷風概說	
傷風咳嗽	一三七
鼻淵氣塞	一三八
傷風通治	一三八
【二五】頭痛 頭痛概說	
外感頭痛	一三九
內傷頭痛	一四〇
頭痛通治	一四一
風寒頭痛	一四一
風熱頭痛	一四一
風虛頭痛	一四一
氣虛頭痛	一四一
氣鬱頭痛	一四一
風痰頭痛	一四一
痰熱頭痛	一四一
腎虛頭痛	一四一
熱病頭痛	一四一

血風頭痛	一四一
【二六】眩暈 眩暈概說	
外感眩暈	一四一
內傷眩暈	一四一
眩暈通治	一四一
【二七】腹痛 腹痛概說	
寒邪腹痛	一四〇
脾虛腹痛	一四一
食滯腹痛	一四一
血凝腹痛	一四一
蟲積腹痛	一四一
腹痛通治	一四一
交合腹痛	一四一
【二八】腰痛 腰痛概說	
風濕腰痛	一四一
寒濕腰痛	一四一
濕熱腰痛	一四一

內傷腰痛……………	一四
腰痛通治……………	一四
腎虛腰痛……………	一四
腎痿腰痛……………	一四
卒然腰痛……………	一四
閃挫腰痛……………	一四
老人腰痛……………	一四
【二九】胸痛 胸痛概說	一五
外感胸痛……………	一五
內傷胸痛……………	一五
胸痛通治……………	一五
結胸疼痛……………	一五
【三〇】小便病 小便病概說	一五
小便不通……………	一五
小便不禁……………	一五
尿秘通治……………	一五
遺尿通治……………	一五

小便頻數……………	一五
尿白如注……………	一五
小便血尿……………	一五
老人尿多……………	一五
老人尿閉……………	一五
壯年遺尿……………	一五
老人遺尿……………	一五
夢中遺尿……………	一五
【三一】大便病 大便病概說	一五
大便不通……………	一五
遺尿不禁……………	一五
便秘通治……………	一五
老人虛秘……………	一五
大便下血……………	一五
便前有血……………	一五
便後有血……………	一五
【三二】咽喉 咽喉病總說	一五

虛實喉風……………	一六
喉風通治……………	一六
白喉風痛……………	一六
鑲喉風痛……………	一六
喉痧疫症……………	一六
喉痧通治……………	一六
雙單乳蛾……………	一六
喉疔喉癰……………	一六
喉痛通治……………	一六
咽喉聲啞……………	一六
諸骨間喉……………	一六
【三三】痔漏 痔漏總說	一七
內外痔瘡……………	一七
痔瘡潰漏……………	一七
痔瘡通治……………	一七
血痔通治……………	一七
痔濕通治……………	一七

痔瘡腫痛……………一七七  
 痔瘡作癢……………一七六  
 痔瘡出血……………一七六  
 酒毒痔瘡……………一七六  
**【三四】淋症 淋症總說**  
 石淋便痛……………一七六  
 石淋通治……………一七六  
 勞淋便痛……………一八〇  
 熱淋便痛……………一八一  
 熱淋通治……………一八一  
 氣淋便痛……………一八三  
 氣淋通治……………一八三  
 血淋便痛……………一八四  
 血淋通治……………一八四  
**【三五】濁症 濁症總說**  
 溲濁白濁……………一八五  
 白濁通治……………一八六

溲濁赤濁……………一八六  
 赤濁通治……………一八六  
**【三六】目疾 目疾總說**  
 目赤腫痛……………一八六  
 紅白目痛……………一八六  
 眼生外障……………一八六  
 眼生內障……………一八六  
 赤眼通治……………一八六  
 目痛通治……………一八六  
 內外目障……………一八六  
 風眼淚下……………一八六  
 睡起目赤……………一八六  
 目難遠視……………一八六  
 目昏多淚……………一八六  
**【三七】口疾 口疾總說**  
 虛實口瘡……………一八六  
 寒熱口臭……………一八六

口瘡通治……………一八六  
 口臭通治……………一八六  
 口乾無津……………一八六  
**【三八】牙疾 牙疾總說**  
 風火牙痛……………一八六  
 牙疳腐爛……………一八六  
 虛實牙齦……………一八六  
 牙痛通治……………一八六  
 濕熱牙痛……………一八六  
 風寒牙痛……………一八六  
 腎虛牙痛……………一八六  
 蟲蛀牙痛……………一八六  
 牙疳通治……………一八六  
 牙縫出膿……………一八六  
 睡中磨齒……………一八六  
 取除痛牙……………一八六  
**【三九】耳病 耳病總說**



耳聾不聞	二〇三
耳聾通治	二〇三
兩耳發聾	二〇三
腎虛耳聾	二〇三
老人耳聾	二〇四
病後耳聾	二〇四
耳鳴聞雜	二〇四
耳鳴通治	二〇五
耳癢難忍	二〇五
耳忽作痛	二〇五
耳中出血	二〇五
耳爛流膿	二〇六
流水入耳	二〇五
壁虎入耳	二〇五
蜈蚣入耳	二〇五
螞蝗入耳	二〇五
飛蠅入耳	二〇六

螞蟻入耳	二〇六
蛋虱入耳	二〇六
臭蟲入耳	二〇六
【四〇】健忘 健忘總說	二〇六
脾傷健忘	二〇六
吐血健忘	二〇六
【四一】厥症 厥症總說	二〇九
陽氣厥症	二〇九
陰氣厥症	二〇九
中暑厥症	二一〇
中暑厥症	二一〇
怒氣厥症	二一一
痰逆厥症	二一一
批蟲厥症	二一一
【四二】脇痛 脇痛總說	二二三
內因脇痛	二二三
外因脇痛	二二三
仆跌脇痛	二二五

脇痛通治	二二六
脇胸氣逆	二二六
【四三】蟲病 蟲病總說	二二七
諸蟲積積	二二七
口吐蛔蟲	二二八
刺蟲心痛	二二八
蟲食下部	二二八
【四四】翻胃 翻胃總說	二二九
膈症雜食	二二九
噎食虛症	二三〇
反胃嘔吐	二三一
噎膈通治	二三一
【四五】吞酸 吞酸總說	二二三
痰鬱吞酸	二二三
食積吐酸	二三四
【四六】陽痿 陽痿總說	二三五
精虛陽痿	二三五

七情陽痿	三五六
筋弛陽痿	三五六
陽痿通治	三三七
腎虛陽痿	三三七
精脫慾絕	三三七
【四七】不寐 不寐總說	三三六
食積不寐	三三六
血虛不寐	三三八
驚悸不寐	三三九
痰壅不寐	三三九
【四八】積聚 積聚總說	三三〇
積聚初起	三三〇
積聚已成	三三三
積聚不消	三三三
食積通治	三三四
糯米成積	三三五
牛肉成積	三三五


食積成積	三三五
食豆成積	三三五
羊肉成積	三三五
飲酒成積	三三五
腎積不消	三三五
脾積不消	三三五
癥塊攻痛	三三五
食飽煩脹	三三六
【四九】呃逆 呃逆總說	三三六
風寒呃逆	三三六
胃火呃逆	三三七
胃寒呃逆	三三八
腎虛呃逆	三三八
呃逆通治	三三九
陰寒呃逆	三三九
【五〇】鬱症 鬱症總說	三三〇
暴怒鬱症	三三〇

憂思鬱症	三三三
【五一】感冒 感冒總說	三三三
春日感冒	三三四
夏日感冒	三三四
秋日感冒	三三四
冬日感冒	三三六
感冒通治	三三七
【五二】癩病 癩病總說	三三七
烏色癩病	三三七
白色癩病	三三八
【五三】內癰 內癰總說	三三〇
肺癰咳嗽	三三〇
腸癰腹脹	三三一
胃癰寒熱	三三三
【五四】心痛 心痛總說	三三三
氣壅心痛	三三三
氣血心痛	三三四

燥熱心痛	二五四
寒厥心痛	二五五
停飲心痛	二五六
傷食心痛	二五七
虛弱心痛	二五八
蟲嚙心痛	二五九
邪疰心痛	二六〇
心痛通治	二六一
急氣心痛	二六二
積年心痛	二六三
心痛吐水	二六四
心痛徹背	二六五
【五五】五絕 五絕總說	
自縊急救	二六九
搥壓急救	二七〇
溺水急救	二七一
魔魅急救	二七二
服毒急救	二七三

# 醫藥大全

茹十眉醫士編



## 內科門

### (中風)

(總說)

中風者。風氣中於人也。風是四時之氣。分佈八方。主長養萬物。從其鄉來者。通外不得泄。其入經脈行於五臟者。各隨臟腑而生病焉。心中風但得偃臥。不得傾側。汗出。若唇赤汗流者。可治。若唇或青或黑。或白或黃。此時心壞爲水。面目亭亭。時悚動者。皆不可得治。五六日死。肝中風。但踞坐不得低頭。若繞兩目連額。色微有青。唇青面黃者。可治。若大青黑。面一黃一白者。是肝已傷。不可復治。數日而死。脾中風。踞而腹滿。身通黃。吐鹹汁出者。可治。若手足青者。不可復治。腎中風。踞而腰痛。視脇左右。未有黃色如餅棗大者。可治。若齒黃赤。鬢髮直。頭面土色者。不可復治。肺中風。偃臥而胸滿。短氣冒悶。汗出。視目下鼻上下兩邊。下行至口。色白可治。若色黃。爲肺已傷化爲血。

不可復治。其人當妄掇。空指地。或自拈衣尋縫。如此數日而死。

## 一、風中經絡

(病因)風爲流動空氣。具病皆從表入。傷風輕而中風重。經云。中於面則下陽明。中於項則下少陽。中於脊則下太陽。外風由皮膚而入經絡。最爲捷徑。亦當有二陽經絡之分辨。

(病狀)邪中經絡。形寒發熱。身體重痛。肌膚不仁。筋骨不用。頭痛項強。角弓反張之症。迭見間出。且每有暴仆昏厥者。脈浮而洪。或弦或浮。雖有脈伏。由於鬱邪。不久自現。亦必有以上諸症爲斷。

(療法)辨明邪在經絡。急當辛溫解散。宜服大秦朮湯。小續命湯。有熱者宜兼清瀉。若初見昏厥。宜先用開關法。如開關散。稀涎散等。開其竅。吐其痰。宜通經隧。待其氣自流行。然後用藥。

【大秦朮湯】 秦朮一錢五分 甘草炙 川芎 當歸 芍藥 生地 熟地自製 茯苓 羌活 獨活 白朮 防風 白芷 黃芩酒炒各八分 細辛五分

右水煎服。煩躁口渴。加石膏一錢五分。陰雨加生薑三片。春夏加知母八分。此方初時宜用。

若日久則以四物四君子湯爲主。而以風藥佐之。庶收全功。

(小續命湯) 麻黃二錢 防己二錢 人參二錢 黃芩二錢 桂心二錢 芍藥二錢 甘草二錢 川

芎二錢 杏仁二錢 防風三錢 附子一枚 生薑五片

右十二味。以水一斗二升。先煮麻黃三沸去沫。納諸藥煎取一升。作一服。不羶。更合豆  
四劑。隨人風輕重虛實。脚弱。服之亦瀉。恍惚者。加茯神。遠志。骨節疼痛有熱者。去附子  
倍芍藥。

(開關散) 皂角二錢 北細辛三分 共研細末。吹少許入鼻中。即醒。如買細辛不及。即皂角一  
味亦可。

(稀涎散) 江子仁六粒 牙皂三錢 明礬一兩 先化開礬。入二味待礬枯爲末。每用三分吹入喉  
中。

## 二、風中血脈

(病因) 人身之血脈流行而不休止。風邪入中則痺阻不通。皆由絡脈空虛。是以賊邪不瀉。或左或  
右。熱則筋弛。寒則筋急。視其人之陰陽虛實爲病。要之。皆陽氣不得宣通也。

(病狀)中風跡者。過僻不遂。久之不治。便成形廢。血脉較經絡已深一層。病此尤宜急治。若一任其口眼歪斜。半身不能運用。必致偏廢之患。

(療法)宜服黃耆五物湯。合大秦芎湯。和榮通絡。疏散風邪。有痰者宜加竹瀝姜汁。口噤宜用鉤藤勾之。並用桂枝。秦艽。鬼羽箭等煎洗。

(黃耆五物湯) 黃耆 芍藥 桂枝各三錢 生薑六錢 十棗三枚  
右五味以水煎。溫服。

### 三、風中臟腑

(病因)六腑爲陽。瀉而不藏。臟爲三陰精氣神之所舍。一宜通而一宜藏。經絡血脉猶人身之外守。臟腑則人身內舍。邪入於此。其病更重矣。

(病狀)邪入於肺。四肢不舉。便溺阻隔。昏不知人。邪入於臟。則舌瘖神昏。不能言語。唇緩吐涎。中腑者。脈沉滑。中臟者。脈沉弦。皆邪入於裏之徵。

(療法)腑實者。宜三化湯。釜底抽薪。氣行自愈。中臟者。宜麻仁丸。滋潤通腑。愈後宜常服養血滋潤之劑。令其腑氣常通。氣血流行得其常度。自無遺患矣。

【三化湯】厚朴姜汁炒 大黃酒蒸 枳實麵炒 羌活各一錢半

右水煎服。

【麻仁丸】白楨榔半生半熟 山茱萸 防風去蘆 枳殼去穢炒 羌活酒浸 車前子 肉桂去粗皮 山預各二兩半 郁李仁去皮別研 大黃半蒸半生 麻仁別搗研各四兩 羌活去蘆 木香各一兩

右爲末。入研藥勻。煉蜜和丸如梧桐子大。每服十五丸至二十丸。溫水臨臥服。

#### 四、類中風症

（病因）腎陰不足。陰虛生熱。熱生風。風火挾痰上升。驟然跌仆。似風非風。謂之類中。亦有陽虛氣脫而然者。

（病狀）四肢不收。舌捲偏枯。甚則痰壅神昏。其由來以漸。其發以暴。其脈不浮而沉。或見微細。若兼外邪。亦有見浮脈者。當先疏解。但類中究屬內虛。必無體痛寒熱喘僻等症。

（療法）陰虛動風。宜服地黃飲子去桂附。脈洪大爲陽浮。宜加附子。陽虛氣脫。宜參附湯。合補中益氣湯。此類虛脫危急之症。宜重用獨參湯。挽回氣化。否則亡可立待。



【地黃飲子】熟地九兩二錢 巴戟去心 荳肉去核 肉蓯蓉酒浸焙 右斛 附子炮 五味子杵炒

白茯苓各一錢 石菖蒲去毛 桂心 麥冬去心 遠志去心 甘草水泡炒各五分。

右入薄荷少許。姜一片。棗二枚。水煎服。氣虛甚加人參二錢。

【參附湯】人參五錢 附子製二錢半

右加薑棗。水煎服。

【補中益氣湯】黃耆炙 人參 雪朮炒各一錢五分 甘草炙一錢 陳皮五分 當歸一錢 升麻柴

胡各五分

右八味加生薑三片。大棗二枚。水煎溫服。

【獨參湯】人參分兩隨人隨症 須揀上者。濃煎頓服。待元氣漸回。隨症加減。

(中風通治單方) ①。凡中風忽然昏倒。不省人事。須先順氣。然後治風。用竹瀝薑汁。調蘇合

丸。如口噤棗開灌之。如棗不開。急用牙皂。生半夏。細辛。爲末吹入鼻內。有嚏可治。無

嚏則死。(聖惠方) ②。生薑嚼碎。不拘多少。向患者面上天庭等處頻擦。又以生薑汁。滴

男左女右眼角內。卽醒。(醫門法律)

(中風口噤單方) ③。伏龍肝末五升。水八升。攪澄清灌之。(本草綱目) ④。白朮四兩。酒三斤。

煮取一升。頓服。(千金方) ③獨活四兩。好酒一升。煎半升服。(千金方) ④羌活三兩。

牛蒡子二兩。水煎一鍾。入白礬少許漬之。取效。(聖濟總錄) ⑤附子未吹入喉中。即瘥。

(千金方) ⑥豉二斤。吳茱萸一升。二味。以水七升。煮取三升。漸飲之。(食療本草) ⑦

柏葉一握。去枝。葱白一握。連根研如泥。無灰酒一升。煎一二十沸。溫服。如不進酒。分

作四五分服。(家藏方) ⑧蘿蔔子。牙皂莢各二錢。以水煎服。取吐。(丹溪心法) ⑨竹瀝

一升。飲之。連飲佳。⑩細研乳香末一錢。以酒煎蘇方木調服。立吐惡物。瘥。(海藏)

(中風不語單方) ⑪陳醬五合。人乳五合。相和研勻。以布絞汁。隨時與服。良久。當語。(聖

惠方) ⑫黑大豆煮汁。煎稠如飴。含之。並嚙汁。(肘後方) ⑬細牛蒡根。取時避風。

以竹刀或荊刀刮去土。用布拭淨。搗爛。絞汁一大碗。和好蜜四合。溫分兩服。得汗出。便

瘥。(博濟方) ⑭酒五合。和人乳汁鑽半。分爲二服。即能言。(食療本草) ⑮藜蘆一

分。南星一個。去浮皮。於臍上剗一坑。納入陳醋二椀。四面火逼黃色。研爲末。生麵九

小豆大。每三丸。溫酒下。(經驗方) ⑯獨活一兩。酒二升。煎一升。大豆五合。炒有聲

。以藥酒熱投。蓋之。良久。溫服三合。未瘥。再服。(小品方)

(中風口喎單方) ⑰荆芥煮汁飲之。(本草綱目) ⑱新石灰一合。醋炒。調如泥塗之。左塗右。

右塗左。立便牽止。(寇氏衍義) ③生烏頭。青礬各等分。每用少許。喘入鼻內。取涕吐涎

。立效。(醫中方) ④括蘆絞汁。和大麥麴作餅。炙熟熨之。正。便止。(聖惠方) ⑤蓖麻

子仁搗膏。左貼右。右貼左。即正。(外臺秘要) ⑥天南星生研末。自然姜汁調之。左貼右

。右貼左。(仁存堂方) ⑦桂心酒煮取汁。故布蘸搗病止。正即止。左囑搗右。右囑搗左。

常用大效。(千金方) ⑧乳香烟燻之。順其血脉。自愈。(證治要訣) ⑨皂莢五兩。去皮爲

末。三年米醋和之。左囑塗右。右囑塗左。乾更上之。(外臺秘要) ⑩巴豆七枚。去皮研。

左囑塗右手心。右囑塗左手心。仍以暖水一盞安藥上。須臾即正。洗去。(聖惠方)

(中風痰厥單方) ①白礬一兩。牙皂莢五錢。爲末。每服一錢。溫水調下。吐痰爲度。(陳師古

方) ②生川烏頭。生附子。並去皮臍。各半兩。生南星一兩。生木香二錢半。每服五錢。

生薑十片。水煎一盞。溫服。(和劑局方)

(中風痰厥單方) ③旋覆花洗淨。焙研。煉蜜丸梧子大。夜臥時茶下五丸至七丸。十九。(陳氏

經驗方) ④砒如菜豆大。新汲水調下。少頃。以熱水投之。大吐即愈。未吐。再服。(聖

惠方)

(老人中風單方) 牛蒡根一升。去皮晒乾。杵爲麴。白米四合。淘淨。和作餠飪。飪汁中煮。加

葱椒五味。空心食之。極效。(壽觀齋老書)

## (傷寒)

(總說)

經言春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣冰寒。此則四時正氣之序也。冬時嚴寒。萬類深藏。君子固密則不傷於寒。夫觸冒之者。乃爲傷耳。傷於四時之氣。皆能爲病。而以傷寒爲毒者。以其最爲殺厲之氣也。卽病者爲傷寒。不卽病者其寒毒藏於肌膚中。至春變爲溫病。夏變爲暑病。暑病者。熱重於溫也。是以辛苦之人。春夏必有溫病者。皆由其冬時觸冒之所致。非時行之氣也。其時行者。是春時應暖而反寒。夏時應熱而反冷。秋時應涼而反熱。冬時應寒而反溫。非其時而有其氣。是以一歲之中。疾無少長。多相似者。此則時行之氣也。夫傷寒病者。起自風寒入於腠理。與精氣交爭。榮衛否隔。周行不通。病一日至二日。氣在孔竅皮膚之間。故病者頭痛惡寒。腰背強重。此邪氣在表。洗浴發汗卽愈。病三日以上。氣浮在上部。胸心填塞。故頭痛。胸中滿。當吐之則愈。五日以上。氣深結在臟。故腹脹身重。骨節煩疼。當下之則愈。夫熱病者。皆傷寒之類也。或愈或死。皆以六七日間。其愈皆十日以上何也。巨陽者諸陽之屬也。其脉連於風府。故爲諸陽主氣。人之傷於寒也。故則爲病熱。雖甚不死。其兩感於寒而病者。必死。兩感於寒者。其脉應與其病形何如。兩傷於寒者。病一日則巨陽與少陰俱病。則頭痛口乾煩滿。二日則陽明與太

陰俱病。則腹滿身熱。不食謔言。三日則少陽與厥陰俱病。則耳聾囊縮。厥逆。水漿不入。則不知人。六日而死。夫五藏已傷。六府不通。榮衛不行。如是之後。三日乃死何也。陽明者。十二經脈之長也。其氣血盛。故不知人。三日。其氣乃盡。故死。其不兩傷於寒者。一日巨陽受之。故頭項痛。腰脊強。二日陽明受之。陽明主內。其脈夾鼻絡於目。故身熱而鼻乾不得臥也。三日少陽受之。少陽主骨。其脈循脇絡於耳。故胸脇痛耳聾。三陽經絡皆受病而未入通於臟也。故可汗而已。四日太陰受之。太陰脈布於胃絡於噎。故腹滿而噎乾。五日少陰受之。少陰脈貫腎絡肺繫舌本。故口熟舌乾而渴。六日厥陰受之。厥陰脈循陰器而絡於肝。故煩滿而囊縮。二陰三陽五臟。六腑皆病。榮衛不行。五臟不通則死矣。其不兩感於寒者。七日巨陽病衰。頭痛少愈。八日陽明病衰。身熱少愈。九日少陽病衰。耳聾微聞。十日太陰病衰。腹滿如故。則思飲食。十一日少陰病衰。渴止不滿。舌乾已而飲。十二日厥陰病衰。囊從少腹微下。大氣皆去。病日已矣。

## 一、傷寒太陽

(病因)太陽之上。寒水主之。其經脈從目內眦上額交巔絡腦下項挾脊抵腰。其府爲膀胱。凡風寒

客人。必先從太陰入。乃受邪之第一步也。

（病狀）風寒外束。必見頭項強痛。惡寒發熱。惟傷風則時有微汗而能食。脈浮緩。傷寒則壯熱無汗不能食。脈浮緊。若頭身疼痛。發熱惡寒。不汗出而煩躁者。則風寒兩傷。入府有蓄水蓄血之別。少腹滿口渴。小便不利者。爲蓄水症。少腹硬滿。小便自利者。爲蓄血症。

（療法）傷風宜服桂枝湯。傷寒宜服麻黃湯。風寒兩傷宜服大青龍湯。蓄水宜服五苓散。蓄血宜服桃仁承氣湯。

【桂枝湯】桂枝三錢去皮 芍藥三錢 甘草炙二錢 生薑三錢 大棗三枚擘

右五味咬咀。火煮。去渣。適寒溫服。服已。須臾。飲熱稀粥一升餘。以助藥力。溫覆。令一時許。通身發々。微似有汗者益佳。不可令如水流漓病必不除。若一服汗出。病瘳。禁止冷私滑肉麵五辛酒酪臭惡等物。

【麻黃湯】麻黃三錢去節 桂枝二錢去皮 甘草一錢炙 杏仁七個湯泡去皮尖

右四味。先煮麻黃。然後納諸藥煮。去滓溫服。

【大青龍湯】麻黃六錢去節 桂枝二錢去皮 甘草二錢炙 杏仁二十粒去皮尖 大棗三枚擘 生薑三錢切 石膏如桐子大碎

醫藥大全 內科門（傷寒）：傷寒太陽

右七味以水。先煮麻黃。然後納諸藥。煮沸。去滓。溫服。取微似汗。汗出多者。溫粉撲之。

【五苓散】澤瀉五錢 豬苓去皮 赤茯苓去皮 白朮去蘆各三錢 肉桂去粗皮一錢

右爲細末。每服二錢。熱湯調下。不拘時。服訖多飲熱湯。有汗出即愈。

【桃仁承氣湯】桃仁五個去皮尖 桂枝二錢去皮 大黃四錢 芒硝 甘草炙各二錢

右五味。以水煮。去滓。納芒硝。更上火微沸。下火。溫服。當微利。

## 二、傷寒陽明

〔病因〕陽明之上。燥氣主之。其經脈挾鼻絡於目。陽明爲多氣多血之海。乃陽盛之經。其府爲胃。萬物所歸。無所復傳。

〔病狀〕前額眼眶脹痛。鼻槩塞而流清涕。發熱不惡寒。此邪中陽明之經。口燥心煩。汗出惡熱。渴欲飲冷。此熱邪漸入陽明之裏。張目不眠。聲音嚶亮。口臭氣粗。身輕惡熱。大便閉結。

此邪入陽明之府。若胃實腹滿而拒按。府氣不行。譫語。舌苔乾燥。則病勢劇矣。

〔療法〕宜服葛根湯以解其表。白虎湯以徹其熱。三承氣湯以酌病之輕重而蕩其實。

【葛根湯】葛根四錢 麻黃三錢去節 桂枝二錢去皮 芍藥二錢切 甘草二錢炙 生薑三兩切

大棗十二枚擘

右七味咬咀。以水先煮麻黃葛根。然後納諸藥。煮再沸去滓。溫服覆取微似汗。不須啜粥。餘如服桂枝湯法。將息及禁忌亦然。

【白虎湯】石膏一兩碎 知母六錢 甘草二錢 硬米半合

右四味。以水煮米熟。湯成。去滓。溫服。

【大承氣湯】大黃四錢酒洗 厚朴八錢去皮炙 枳實三枚炙 芒硝五錢

右四味。以水先煮二物。去滓。納大黃再煮。去滓。納芒硝。更上微火一兩沸。溫服。

【小承氣湯】大黃四錢 厚朴二錢去皮炙 枳實一枚炙

右三味。以水四升煮。取一升二合。去滓。分溫二服。初服湯。當更衣。不爾者盡飲之。若更衣者勿服之。

【調胃承氣湯】大黃三錢去皮清酒浸 甘草二錢炙 芒硝三錢

右三味咬咀。以水三升。先煮大黃甘草。取一升。去滓。納芒硝。更上火微煮令沸。少少溫服。

三、傷寒少陽



(病因)少陽之上。火氣主之。居於半表半裏之間。而爲陽樞。其經脈行於身側。相火游行。症多熱。

(病狀)邪在少陽之經。其見症爲頭痛在側。耳聾喜嘔。不欲食。胸脅滿。往來寒熱。小便利。邪在少陽之府。其見症爲口苦咽乾。目眩自利。若更兼小腹痛。不大便。則爲少陽陽明合病矣。

(療法)解在經之邪。宜服小柴胡湯。解在腑之邪。宜服黃芩湯。解少陽陽明合病之邪。宜服大柴胡湯。

【小柴胡湯】柴胡二錢 黃芩 人參 甘草各三錢 半夏三錢洗 生薑三錢切 大棗二枚擘

右七味。水一斗二升。煮取三升。去滓。再煎取一升。溫服即愈。日三服。若胸中煩而不嘔。去半夏。加枳實一枚。若渴者。去半夏。加人參。合前成二兩半。括蘆根四錢。若腹中痛者。去黃芩。加芍藥三錢。若脇下痞脹。去大棗。加牡蠣四錢。若心下悸。小便不利者。去黃芩。加茯苓四錢。若不渴。外有微熱者。去人參。加桂三錢。溫覆取微汗愈。若欬者。去人參。大棗。生薑。加五味子五錢。乾薑二錢。

【黃芩湯】黃芩三錢 甘草 芍藥各二錢 大棗二枚

右四味以水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再。夜一服。

【大柴胡湯】柴胡三錢 黃芩三錢 芍藥三錢 半夏三錢 洗 生薑五錢切 枳實二枚炙 大棗二

枚擘 大黃二錢

右八味以水煮。去渣。再煎。溫服。

#### 四、傷寒 太陰

（發因）太陰之上。濕氣主之。寒濕之邪。最易侵犯。所謂同氣相求也。故邪入太陰。從寒化者多。而從熱化者少。職此之由也。

（病狀）腹滿而吐。食不下。時腹自痛。自利不渴。手足自溫。此太陰本症也。太陽合病而見表症者。必畏寒骨楚自利。有傳陽明而見傳裏症者。必腹滿時減。減不足言。

（療法）太陰病以溫運爲主。宜服四逆湯。或理中湯。甚則加附子。

【四逆湯】甘草炙 枳實破水漬炙乾 柴胡 芍藥各一錢

右四味搗篩。白飲和服方寸匕。日三服。秋者加五味子乾薑各五分。並主下痢。悸者加桂枝五分。小便利者。加茯苓五分。腹中痛者。加附子一枚。炮令拆。

【理中湯】人參 甘草炙 白朮 乾薑各三錢

右切。用水煮。去渣。溫服。

## 五、傷寒少陰

(病因)少陰之上。熱氣主之。標陰而本陽。凡真陽素旺之人。外邪傳入。則挾火而動。真陽素虛者。則挾水而動。

(病狀)挾火而動者。必見心煩不眠。飢燥。神氣衰滅。小便短而咽中乾等症。挾水而動者。必見目瞑倦臥。聲低息微。少氣懶言。身重惡寒。四肢厥逆。腹痛泄瀉等症。

(療法)挾火者宜分解其熱。潤澤其枯。可服黃連阿膠湯。挾水者宜溫經散邪。回陽止瀉。可服四逆湯。

【黃連阿膠湯】黃連三錢 黃芩一錢 芍藥二錢 阿膠三錢 雞子黃一錢

右五味以水先煮三物。去渣。納阿膠。烱盡少冷。納雞子黃攪和。溫服。

【四逆湯】方見太陰病。

## 六、傷寒厥陰

(病因)厥陰之上。風氣主之。爲陰之盡。亦陽之生。陰陽錯雜。故邪犯之也。亦寒熱不定。有純

陽無陰之症。有純陰無陽之症。有陰陽錯雜之症。

〔病狀〕張目不眠。聲音響亮。口臭氣粗。身輕惡熱。熱深厥深。上攻爲喉痺。下攻便膿血。此屬純陽症。四肢厥冷。爪甲青黑。腹中拘急。下利清穀。嘔吐酸苦。冷厥關元。屬純陰之證。腹中急痛。吐利厥逆。心中煩熱。頻素冷飯。飲下即吐。煩渴轉增。腹痛加劇。此屬陰陽錯雜之症。

〔療法〕厥者宜破陽行陰。以通其厥。宜服當歸四逆湯。寒者宜驅陰止瀉。以回其陽。宜服四逆湯。錯雜者。宜服烏梅丸。

〔當歸四逆湯〕當歸 桂枝 芍藥各三錢 細辛二錢 大棗三枚 甘草 通草各二錢  
右七味以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

〔四逆湯〕方見太陰病。

〔烏梅丸〕烏梅三十個 黃連一兩 黃柏六錢 乾薑十錢 附子二枚泡 蜀椒四錢熬去汗 桂枝六錢 細辛六錢 人參六錢 當歸四錢

右十味。異搗篩合治之。以苦酒漬烏梅一宿。去核。蒸之五升米下。飯熟。搗成泥。和藥令相得。納臼中與蜜杵二千下。丸如梧桐子大。先食飲服十丸。日三服。稍加至二十丸。禁生

冷滑物臭食。

(陰症傷寒單方) ①即夾色傷寒。俗名夾陰陽寒。男子腎囊。女子乳頭內縮。或手足彎曲紫黑。

甚則牙緊氣絕。用紋銀一塊搥扁燒紅。如病人未絕氣。止燒滾熱。放在臍上。再用活鷄一只

。連毛破開。不去腸雜。色於銀上。用布縛住。以手按緊。即愈。(證治秘要) ②百合煮濃

汁。服一碗。良效(千金方) ③黑大豆炒乾。投酒熟飯。或灌之。使吐。復飲。取汗爲度。

(居家必用方) ④先因愁事。後感寒邪。陽衰陰盛。六脈沉伏。小腹絞痛。四肢逆冷。嘔吐

清水。不假此藥。無以回陽。用人參。乾薑炮各一兩。生附子一枚。破作八片。水四椀半。

煎成一碗。頓服。自然脈出身溫矣。(傷寒雜要)

(傷寒無汗單方) ①凡初覺疼痛。身熱脈洪者。用葱湯煮米粥。入鹽豉食之。取汗。核驗(肘後

方) ②水調芥子末填臍內。以蒸物隔衣熨之。取汗出妙。簡便方) ③芝麻炒焦。乘熱搗

酒飲之。煖臥取微汗出。良。(肘後方) ④真丹砂一兩。水一斗。煮一升。頓服。覆被取汗

而愈。(外臺秘要)

(傷寒證語單方) ①川大黃五兩。剉。炒微赤。爲末。用鹽雪水煎成膏。每服半匙。冷水送下。

(聖惠方) ②蚯蚓泥。凉水調服。簡便方)

（傷寒發狂單方）○目不識人。驚悸恍惚。甚至踰垣上屋。用玄明粉二錢。朱砂一錢。末之。冷

水服。（傷寒雜要）⑤番紅花二分。水一盞。浸一夕。服之。（醫方集要）

（傷寒盜汗單方）○鼓一升。酒二升。漬三日。服之。不瀉。更合服。不過三劑即止。（千金方）

⑥傷寒後汗不止。地黃三斤切。水一斗。煮取三升。分作三服。（千金方）

（傷寒頭痛單方）○烏梅十四枚鹽五合。水一升。煎半升。溫服取吐。吐後。避風甚良。（梅

師方）⑦荆芥穗一兩。濃煎服之。（本草綱目）⑧連鬚葱白半斤。生薑二兩。水煮溫服。

（活人書）⑨乾艾葉三升。水一斗。煮一升。頓服。取汗。（時後方）

（傷寒煩渴單方）○豬苓。茯苓。澤瀉。滑石。附子。阿膠各一兩。以水四升。煮取二升。每服

七合。日三度。（傷寒論）⑩秦朮一兩。牛乳一大盞。煎六分。分服二服。（聖惠方）三。

括蘆根三兩。水五升。煮一升。分二服。先以淡竹瀝一斗。水二升。煮好銀二兩半。冷飲汁

。然後服此。（外臺秘要）

（傷寒嘔逆單方）⑪枳殼半兩。木香一錢。爲末。每次白開水下一錢。未止。再服。（本事方）

⑫葶藶。高良薑。各等分爲末。每服二錢。水六分。煎十沸。入醋少許。服之。（圖經）

（傷寒氣喘單方）紫蘇一把。水煮。稍稍飲之。其喘立止。（時後方）⑬防己。人參。等分爲末

。桑白皮煎水。服二錢。(醫林集要)

(傷寒厥逆單方) ①面青。四肢厥逆。腹痛身冷。一切冷氣。大附子二枚。炮製去皮臍爲末。每服三錢。薑汁半盞調服。良久。臍下如火暖爲度。(濟生方) ②身有微熱。煩燥。六脈沉細。宜用人參五錢。水一鐘。煎七分。調牛膽。南星末二錢。熬服。立甦。(三因方)

(傷寒煩燥單方) ①半兩附子一個。生破作四斤。生薑一大塊。作三斤糯米一撮。以水一升。煎六合。溫服。暖臥。或汗出。或不出。候心定。則以水解之。解之不得。與冷水。如渴。更煎淨服。用多效。(續傳信方) ②晝夜煩燥。不得屢安眠。用乾薑一兩。生附子一枚。水煮。頓服。(傷寒論)

(傷寒結胸單方) ①醃醋拌麩皮炒。納布袋中。蒸熟。即效。(陳氏本草) ②用牽牛子末一錢。白糖化湯調下。(鄭氏家傳方) ③苦參二兩。以醋三升。煮取一升二合。飲之。取吐即愈。(外臺秘要) ④半夏四錢。生薑七斤。酒一盞煎服。(百病方)

(傷寒肢痛單方) ①羊桃煮汁。入少鹽。漬之。(肘後方) ②四肢煩疼。羊桃十斤。搗熟。侵蒸湯三斗。正午時。入坐一炊久。不過三次。愈。(千金方)

(傷寒下痢單方) ①蕙草。當歸各二兩。黃連四兩。水六升。煮四升。日三服。(范汪方) ②以

豉一升。薤白一握。水煮薤熟。納豉更煮。色黑。去豉。分爲二服。(藥性論)

(試驗傷寒法) 野芋頭切斤。磨擦背上第三節骨。如覺痛癢即是。仍用野芋片。周身骨節。用力

擦勻。並用芋斤炒熟。煎濃汗服二三次。即愈。忌食雜飯。(中藏經)

## (溫病)

(總說)

經言春氣溫和。夏氣暑熱。秋氣清涼。冬氣冰寒。此四時正氣之序也。冬時嚴寒。萬類深藏。君子固密則不傷於寒。觸冒之者。乃爲傷耳。其傷於四時之氣。皆能爲病。而以傷寒爲毒者。以其最爲殺厲之氣焉。即病者爲傷寒。不即病者爲寒毒。藏於肌骨中。至春變爲溫病。是以辛苦之人。春夏必有溫病者。皆由其冬時觸冒之所致也。凡病傷寒而成溫者。先夏至日者爲病溫。後夏至日者爲病暑。其冬復有非節之暖。名爲冬溫。邪與傷寒大異也。有病溫者。汗出輒復熱而脈燥。病不爲汗衰。狂言不能食。病名爲何也。曰。病名曰陰陽交。陰陽交者死人。所以汗出者。皆生於穀。穀生於精。今邪氣交爭於骨肉之間。而得汗者。是邪却而精勝。則當食而不復熱。熱者。邪氣也。汗者。精氣也。今出汗而輒復熱者。是邪勝也。汗出而脈尙燥勝者死。今脈不與汗相應。此不稱其病也。其死明矣。狂言者。是失志。失志者死。今見三死。不見一生。雖愈必死。凡皮膚熱甚。脈盛燥者。病溫也。其脈盛而滑者。汗且出也。凡溫病人二三日。身軀熱。脈疾。頭痛。食飲如故。脈



直疾。八日死。四五日。頭痛。喜吐。脈來細。十二日死。此病不治。八九日。脈不疾。身不痛。目不赤。色不變而反利。脈來膝膝。按不彈手。時大。心下柳。十七日死。病三四日以下。不得汗。脈大者。生。脈細小難得者。死不治也。下利。腹中痛甚者。死不治。

## 一、春日溫病

(病因)春日風木動。時令溫暖。腠理開泄。或感時邪。或由伏氣。責任太陰肺。

(病狀)微寒身熱。頭痛咳嗽。煩燥胸膈痞悶。自汗鼻鼾。脈浮而虛。舌苔初起薄膩。繼轉黃色而大。甚則轉絳而黑。

(療法)主辛涼清解。宜服葱豉湯。梔鼓湯。銀翹散。桑菊飲等。

【葱豉湯】葱白一握 香豉三錢 煎服。取汗出。

【梔鼓湯】梔子十四枚擘 香豉四合搗裹

右二味以水四升。先煮梔子。得二升半。納豉煮取一升半。去滓。分爲二服。溫進。一服得吐者。止後服。

【銀翹散】銀花 連翹各三錢 苦梗 桔 牛蒡子 薄荷各三錢 竹葉 荊芥穗各三錢 生甘草

淡豆豉各二錢

右爲末。每服六錢。鮮薑根煎湯。香氣大出。即取服。病重者約二時一服。

## 二、暑天溫病

〔病〕夏爲火令。赤日當空。奔走道途。熱傷元氣。津液消燄。水不勝火。實在陽明胃。少陰心。病狀頭痛壯熱。煩渴喘促。或昏悶。或汗泄。肌肉如火。脈洪數或虛。舌光絳而乾。

〔療法〕宜服十味香薷飲。白虎湯。生脈散。六一散。清暑益氣湯。等益氣生陰之藥。不得用香燥瀉氣之品。

〔十味香薷飲〕香薷五錢 厚朴 白扁豆各二錢半炒 人參 甘草 黃耆 木瓜 陳皮 白朮 茯苓各一錢

右水煎。候冷服。

〔白虎湯〕知母三錢 石膏一兩碎 甘草一錢 粳米半合

右四味。以水一升。煮水熟。湯成。去滓。溫服一碗。日三服。

〔生脈散〕人參 麥冬各五分 五味子七粒 水調服。

【六一散】滑石六錢 甘草一錢 爲末。冷水或燈心湯調下。

【清暑益氣湯】黃耆 人蔘 白朮炒 蒼朮 神麩炒 青皮麩炒 陳皮留白 甘草炙 麥冬 五味 當歸酒炒 黃蘗酒炒 澤瀉 升麻 葛根 隨病施量。薑棗煎。

### 三、溫病爲毒

(病因)病溫更過穢濁。觸之成病。入於腠中。漸至心包。

(病狀)面赤斑如錦紋。咽痛自汗。口糜而渴。神躁暮昏。舌黃或赤。脈洪數。

(療法)宜芳香辟穢解毒。可服至寶丹或牛黃清心丸。

【至寶丹】生烏犀屑 生玳瑁屑 琥珀研 朱砂研細水飛 雄黃研水飛各一兩 龍腦 麝香各一分 分研 牛黃半兩研 安息香一兩半爲末以無灰酒研澄飛過濾去砂石約取淨數一兩慢火熬成膏 銀箔五十片 研金箔五十片一半爲衣

右將生犀玳瑁爲細末。入餘藥研勻。將安息香。膏重湯煮凝成。後入諸藥中。和搜成劑。盛不津器中。並旋圓如桐子大。用人蔘湯化下。三圓至五圓。

【牛黃清心丸】膽星 全蠍去足焙 蟬退二錢五分 牛黃 白附子 溜蘊洗焙 防風 天麻。錢

半 麝香五分

右爲丸。荆芥薑湯下。

#### 四、濕熱溫病

〔病因〕暑雨炎蒸。化生濕熱。人在氣交。感而爲病。貴在足太陰陽明。

〔病狀〕舌苔厚膩。或黃或白。身痛頭重。面垢自汗。兩脛逆冷。胸滿口乾不能飲。小便不利。大便反快。

〔療法〕濕重用藥偏燥。溫重用藥偏清。宜服四苓散。蒼朮白虎湯。平胃散等。

〔四苓散〕猪苓 茯苓 白朮炒各一兩，澤瀉八錢

爲末。每服三錢。服後多飲熱水。汗出而愈。

〔蒼朮白虎湯〕知母五錢 甘草二錢炙 石膏一錢 蒼朮 粳米各三錢

右爲末。每服四錢。水一盞半。煎至七分。去滓。取汁溫服。

〔平胃散〕蒼朮五兩米泔浸七日 陳皮去白 厚朴各三兩薑汁炒 甘草三兩炙  
右爲末。每服二錢。薑湯下。日三服。或水煎。每服五錢。

## 五、溫病兼瘧

〔病因〕先傷於風。邪鬱於裏。中經春夏暑熱。髓肌銷鑠。腠理發泄。陰氣先竭。陽氣獨發。

〔病狀〕先熱後寒。或但熱不寒。病以時作。少氣頭痛煩冤。手足熱而欲嘔。脉弦數。舌薄黃。甚則絳。

〔療法〕大柴胡湯。小柴胡湯。白虎加桂枝湯。地骨皮湯皆可服。

〔大柴胡湯〕柴胡八錢 黃芩三錢 芍藥三錢 半夏八錢洗 生薑五錢切 枳實二枚炙 大棗二枚擘 大黃二錢

右八味以水煮。去滓。再煎。溫服。

〔小柴胡湯〕柴胡八錢 黃芩 人參 甘草各三錢 半夏八錢洗 生薑三錢切 大棗二枚擘 右七味水煮。去滓。再煎服。

〔白虎加桂枝湯〕知母六錢 甘草二錢 石膏一錢 粳米半合 桂枝三錢去皮 右剉。每五錢。水一盞半。煮至八分。去滓。溫服。

〔地骨皮湯〕地骨皮 牡丹皮 當歸 熟地各三錢 川芎一錢五分 白芍二錢酒炒

右水煎服。不拘時。

## 六、冬天溫病

〔病因〕冬時溫暖。感而即發。陽不潛藏。亦屬非時之氣。

〔病狀〕身熱頭痛。不惡寒。或微惡寒。即發熱咳嗽煩渴。或咽痛下利。脈舌略同春溫。

〔療法〕忌風藥升舉。宜服葱豉湯。或葳蕤湯。

〔葱豉湯〕葱白一握 香豉一升搗裹 煎服。取汗出。

〔葳蕤湯〕葳蕤三分 石膏一兩杵碎 白薇 麻黃湯泡焙乾秤 川芎 葛根生者可用二兩尤妙

大羌活去蘆 甘草炙 杏仁去皮尖雙仁槌碎各半兩 青木香一兩

右剉如麻豆大。每服五錢。水一盞半。煎一盞。日三四服。

〔溫病伏熱單方〕一蘿蔔子搗碎。溫湯和。攪取淡湯。徐徐飲之。少頃。當吐。或爲末。溫去麩

服一匙。(景岳全書) 二茅根切。枇杷葉拭去毛。炙香各半兩。水四升。煎二升。去滓。稍

々飲之。(傷寒卒病論)

## （暑病）

（說總）

古稱靜而得之爲中暑。動而得之爲中熱。暑陰而熱陽也。不思暑字。以日爲首。正言熱氣之襲人耳。夏日烈々。爲太陽之亢氣。人觸之則生暑病。至於靜而得之者。乃納涼於深堂水閣。大扇風軍。嗜食瓜果。致生寒疾。或頭痛身痛。發熱惡寒者。外感於寒也。或嘔吐腹痛。四肢厥冷者。直中於寒也。與暑症有何干涉。大抵暑症辦法。以自汗口渴。煩心溺赤。身熱脈虛爲的。然有傷者。中暑。閉暑之不同。傷暑者。感之輕者也。其症煩熱口渴。中暑者。感之重者也。其症汗大泄。昏悶不醒。或煩心喘喝妄言也。閉暑者。內伏暑氣。而外爲風寒閉之也。其頭痛身痛。發熱惡寒者。風寒也。口渴心煩者。暑也。又有暑天受濕。嘔吐瀉利。發爲霍亂。此停食伏飲所致也。更有乾霍亂症。欲吐而不得吐。欲瀉而不得瀉。攪腸大痛。變在須臾。俗名攪腸痧。烏痧眼皆此之類。此係惡氣閉塞經隧。氣滯血澀。脾土壅滿。不能輸轉。失天地運行之常。到眼閉而危矣。

### 一、暑風暑濕

（病因）暑爲熱邪。多由太陽而入。陽明而其應。最易耗氣傷津。津氣兩竭。勢必內燔。亦有兼風兼濕者。所謂暑風暑濕也。

(病狀)身熱或微惡汗。汗出而喘。煩渴多言。倦怠少氣。脈虛數。兼風則發熱惡寒。身重疼痛。小便已。洒然毛聳。手足逆冷。小有勞身即熱。脈弦細孔遲。兼濕則身熱疼痛。胸悶頭重。妄言多汗。脈微弱。

(療法)中暑宜服白虎加人參湯。清血養津而益氣。暑風宜服黃連香薷飲。疎清而達邪。暑濕宜一物瓜蒂散。湧吐而達邪。

【白虎加人參湯】知母六錢 石膏一兩碎 甘草二錢 粳米一合 人參三錢

右五味以水煮米熟。湯成。去滓。溫服。

【黃連香薷湯】香薷五錢 厚朴薑汁炒 白扁豆炒各二錢 黃連錢半薑汁同炒黃

右水煎浸冷服。

【一物瓜蒂湯】瓜蒂二十個

右剉。以水一升。煮取五合。滓頓服。

## 二、伏暑霍亂

(病因)先受暑毒。繼爲風寒所閉。漸漸入內。伏於三焦腸胃之間。或秋或冬。久而始發。有晴曝



晝暎衣。暑氣未散，隨即收藏。至秋冬近之而遂發。則近乎附會矣。

（病狀）頭痛腕閉。漸至昏燥齒乾。內熱煩冤。或霍亂吐瀉。或腹痛下痢。或瘧疾寒熱。亦有暑毒深入。熱結在裏。臍語煩渴。不欲近衣。大便秘結。小便赤澀者。

（療法）伏暑宜服涼膈湯。見霍亂。宜服藿香正氣散。見痢下。宜服木香交加飲。見瘧疾。宜服小柴胡湯。加香薷。黃連。竹葉。見便秘。宜服調胃承氣湯。寒涼以清暑。芳香以化濁。辛燥以理氣。急下以存陰。終不離乎此旨也。

【清膈湯】黃芩 山梔 桔梗 連翹各三錢 天花粉 黃連 薄荷各一錢

右水煎服。

【藿香正氣散】厚朴 陳皮 桔梗 半夏各二錢 甘草一錢 大腹皮 白芷 茯苓 蘇葉各三錢 藿香三錢

右十味。加薑棗。水煎熱服。

【木香交加飲】木香 生地黃五錢 研取汁 生薑五錢 研取汁

右交互用汁浸一夕。各炒黃。漬汁盡爲度。末之。酒或水調下三錢。

【小柴胡湯】柴胡半錢 黃芩 人參 甘草各三錢 半夏半兩 洗 生薑三錢 切 大棗二枚 擘 擘

右七味。水煮。去滓。再煎。溫服。

【調胃承氣湯】大黃四錢去皮清酒浸 甘草一錢炙 芒硝半兩

右二味咬咀。以水先煮大黃甘草。去滓。納芒硝。更上火微煮令沸。少少溫服。

### 三、中暑暈厥

（病因）暑穢薰蒸。鬱遏於內。閉塞孔竅。頓失知覺。此暑厥之所由。若忽然中暑。頓時神識昏迷。名曰暑迷。似厥而實青厥也。當分別施治。

。或再三厥而熱。但頭汗出者。此所謂厥深熱亦深也。暑迷則昏迷不省。欲睡頓語。手足或亦厥冷。惟不若厥之勢急耳。

（療法）前者。先服牛黃丸。或至寶丹。以芳香利竅。神甦後。再服連翹心。竹葉心。玄參。生地。麥冬。天冬也屬。以清涼血分。後者先服星香湯。加香薷以精神利竅。神甦後。再服香薷飲。急則治標。乃不易之法也。

【牛黃丸】牛黃六錢 麝香 龍腦以上三味另研 羚羊角 當歸酒洗防風 黃芩 柴胡 白朮

麥冬去心 白芍各七錢五分 桔梗 白茯苓 杏仁去皮尖 川芎 大豆黃卷 阿膠各八錢五分  
分 蒲黃 人參去蘆 神龜各一兩二錢五分 雄黃另研四錢 甘草二兩五錢 白斂 肉桂去  
皮 乾薑各三錢七分 犀角磅一兩 乾山藥三兩五錢 大棗五十枚熬爛去皮 金箔六百五十  
片內存二百片爲衣

右爲細末。煉蜜同棗膏丸。每兩內作十丸。用金箔爲衣。每服一丸。溫水化下。

【至寶丹】生烏犀屑 生玳瑁屑琥珀研碎研飛 雄黃研細各一兩 龍腦 麝香研各一分 牛黃  
五錢研 安息香一兩半爲末酒研飛淨一兩熬膏用水安息尤妙 銀箔金箔各五十片研細爲衣  
右將生犀玳瑁爲細末。入餘藥研勻。將安息香膏。重湯煮凝成。後入諸藥中。和搜成劑。丸  
如桐子大。用人參湯化下三丸至五丸。

【星香湯】南星 木香等分

右每服四錢。薑十片。水煎。

【香薷飲】香薷一兩 厚朴薑汁炒 白扁豆炒各半兩  
右水煎。浸冷服。

#### 四、中暑腹瀉

（病因）暑病中人。挾濕挾滯。擾亂傷胃。腸胃受傷。乃爲暑瀉。亦有暑月煩渴。引飲過多。脾胃停積冷濕而成。全屬寒證。輿上有差。

（病狀）挾濕滯而瀉者。症見煩渴溺赤。腹痛陣瀉如水。日夜無度。自汗面垢。積冷瀉而瀉者。症見腹痛喜按。泄直注。口或渴。必類飲。全屬太陰爲病。因當暑冷。故當以暑瀉云。

（療法）前者以消暑化濁爲主。宜桂苓甘露飲加黃連。葛根。升麻之屬。後者以溫中健脾爲主。宜大順散加生薑。蒼朮。藿香之屬。

【桂苓甘露飲】肉桂 茯苓 枇杷葉 熟地 天冬 枳殼 茵陳 生地 麥冬 石斛 甘草炙  
黃芩各等分

右爲末。每二錢。水一盞。煎七分。去滓。食後。臨臥溫服。

【大順散】甘草三十錢剉寸長 乾菴 杏仁去皮尖。肉桂去粗皮各四錢

右先將甘草用白砂糖炒。及八分黃熟。次入乾菴同炒。令盡裂。次入杏仁又同炒。候不作聲爲篩。度淨。後入肉桂一處。搗爲散。每服二錢。水煎溫服。如煩燥。并花水調下。不拘時沸湯調亦得。

（中暑通治單方）①地黃汁一匙服之。（金匱要略）②皂莢一兩。燒存性。甘草一兩。微炒爲末

溫水調一錢服之。(濟寮方) ③濃煮參汁二盞服之。(外臺秘要) ④急取蒜頭兩個。研爛。

再取街心熟土。去面層不用。污泥亦不可用。攪新汲水調勻。服一椀。甚效。(應驗良方)

⑤暈泄。用白朮。車前子。等分。炒爲末。開水下二三錢(楊赤簡便方)

(預防中暑單方) ①暑月解毒。用肉桂去粗皮。不見火。茯苓等分爲細末。煉蜜丸龍眼大。每新

汲水化服一丸。(和劑局方) ②出門。或歸家時。將烏梅兩個。搥碎。放一椀內。加白糖一

匙。開水沖服。便可預防。(芝隱方)

(暑月吐瀉單方) 滑石炒二兩。藿香二錢半。丁香五分爲末。每服一二錢。浙米泔調服。(經驗

方)

## (霍亂)

(總說)

霍亂者。陰陽清濁二氣相干。謂之氣亂。氣亂於腸胃之間。爲霍亂也。發則心腹絞痛。其有先心痛者。則先吐。先腹痛者。則先利。心腹並痛者。則吐利俱發。挾風而實者。身發熱頭痛。體痛而復吐利。虛者但吐利心腹刺痛而已。亦有飲酒食肉腥膻生冷過度。因居處不節。或露臥濕地。或當風取涼。而風冷之氣歸於三焦。傳於脾胃。脾胃得冷則不磨。不磨則水穀不消化。亦令清濁二氣相干。脾胃虛弱則吐利。水穀不消心腹脹滿。皆成霍亂。

## 一、陰症霍亂

〔病因〕夏月伏陰在內。加以食受寒涼。恣啜生冷。陽氣遏抑。中焦不和。正氣不守。邪干腸胃。以致揮霍撩亂。

〔病狀〕胃痛則吐。腸痛則瀉。胃腸俱痛。吐瀉交作。肢厥汗冷。小溲清澀。昏面青白。踣臥轉筋。脈微或伏。苔白潤或黑。亦有惡熱口渴而不能飲冷。面赤似朱。是爲戴陽。最宜辨別。

〔療法〕以溫臟回陽。和中逐穢爲主。輕則服霍香正氣散。六和湯。重則服四逆湯。或理中湯可愈。

【霍香正氣散】厚朴 陳皮 桔梗 半夏各二錢 甘草一錢炙 大腹皮 白芷 茯苓 蘇葉各三錢 藿香三錢

右十味加薑棗。水煎熱服。

【六和湯】香薷 厚朴 茯苓 藿香各四錢 半夏 縮砂 甘草 人參各一錢  
右水煎服。

【四逆湯】甘草炙 枳實破水漬炙乾 柴胡 芍藥各十分

右四味搗篩。白飲和服方寸匕。日三服。

【理中湯】人參 甘草炙 白朮 乾薑各三錢

右四味切碎。用水四升。煮取升半。去滓。溫服半升。日三服。

## 二、陽症霍亂

(病因) 吸受暑穢，飲食不謹。清濁相干。氣機窒塞。水穀之道路。失其常度。邪思心包則煩滿。亂於腸胃則渴利也。

(病狀) 吐瀉頭痛。發熱煩渴。氣粗喘悶。小便短赤。舌紅或黃而糙。脈沉數或伏。有時見代。俯熱邪攻心。必神識昏迷。熱深厥亦深。必手足厥冷。螺輪陷。脈急或伏。舌絳汗多。煩渴難耐。

(療法) 以清暑滌穢。芳香化濁爲主。輕者官服黃連香薷飲。四苓散。重者服瀉心湯。或竹葉石膏湯。

【黃連香薷飲】黃連 香薷各一兩 厚朴薑炒汁 白扁豆炒各半兩  
右水煎浸冷服。

【四苓散】澤瀉一兩一分 豬苓去皮 白朮 茯苓各三分

右五味爲末。白飲服方寸七。日三服。

【渴心湯】大黃四錢 黃連二錢

右二味以麻沸湯。漬之須臾。絞去滓。溫服。

【竹葉石膏湯】淡竹葉 生地黃各二錢 黃芪 麥冬 當歸 川芎 黃芩 甘草 芍藥 人參

半夏 石膏各一錢

右水煎服。

### 三、乾霍亂症

（病因）穢濁之氣。蒙閉中焦。升降之機失常。清濁混淆。陽不宜通。內經曰。出入廢則神機化滅。

升降息則氣立孤危。最爲危殆。

（病狀）欲吐不吐。欲瀉不瀉。爪甲青紫。語塞不利。腹絞痛異常。有無可奈何之狀。脈伏。

（療法）治法以通爲主。可用燒鹽。熬童便沖服。使其吐利。蓋吐則上焦得通。下焦得降。邪氣外

達。可望轉機。

（霍亂通治單方）①藿香葉。陳皮各半兩。水二盞。煎一盞。溫下服之。回生。②食鹽一撮。

醫藥大全內科門：（霍亂）：乾霍亂症：霍亂單方



放刀口上。燒紅。以陰陽水。即半滾水半冷水一鐘沖服。服後。腹痛漸止。(濟生秘覽) ㊶

鹽醋煎服。甚良。(如宜方) ㊷菜豆粉。白糖各二兩。新汲水調服。即愈。(生生稿) ㊸芥

子搗細。水和敷臍上。(聖濟總錄) ㊹上不得吐。下不得利。腹痛欲死。此係乾霍亂。急用

鹽一大匙。熬令黃色。和童便一盞。溫服。少頃吐下。即愈。(柳州方)

(霍亂轉筋單方) ㊺患此者。氣絕欲死。服有暖氣。用青銅錢四十九枚。木瓜一兩。烏梅炒五枚

。水二盞煎。分溫服。(聖濟總錄) ㊻吳茱萸二兩炒。酒二盞。煎一盞溫服。得下立安。

(急救方) ㊼白扁豆爲末。陳醋和服。(普濟方) ㊽木香一錢。木瓜汁一盞。入熱酒調服

。(聖濟總錄) ㊾生薑三兩。搗。酒煮三兩。沸服。仍以薑搗貼痛處。甚驗。(外臺秘要)

㊿桑葉一握。煎飲。一二服。立定。(聖惠方)

(霍亂腹痛單方) ㊽炒食鹽二包。一握其心腹。一握其背。氣通。自愈(救急方) ㊾高良薑一兩

。剉。以水三大盞。煎二盞半。去滓。入粳米一合。煮粥食之。便止。(聖惠方)

(霍亂煩渴單方) ㊿豆蔻。黃連各一錢半。烏豆五十。粒生薑三片。水煮。服(聖惠總錄) ㊽糯

米三合。水五升。蜜一合。研汁。分服。或煮汁服。(楊氏家藏秘方)

# （瘧病）

（總說）

夏日傷暑。秋必病瘧。瘧之之發以時者。此是邪客於風府。循膂而下。衛氣一日一夜常大會於風腑。其明日下一節故其作則滕理開。滕理開則邪氣入。邪氣入則病作此。所以日作常晏也。陽遇邪則捲。陰遇邪則緊。捲則惡寒。緊則爲慄。寒慄相薄。故名瘧。

## 一、陽氣瘧瘧

（病因）由於邪氣內藏。陰氣先傷。陽氣獨發。

（病狀）熱多寒少。或但熱不寒。骨節疼痛。肌肉消燼。汗出頭痛破。煩渴而嘔。脈弦數。苔黃或膩。

（療法）宜服小柴胡湯加香薷。黃連。或加生地。知母。白芍。首烏。丹皮。杏仁。象貝。花粉等。

。甘寒養津。視其輕重與之。

【小柴胡湯】柴胡半兩 黃芩 人參 甘草各三錢 半夏兩洗 生薑三錢切 大棗二枚擘

右水煮。去滓。再煎。溫服。

## 二、寒邪癘症

〔病因〕暑月乘涼沐浴。感受寒邪。伏於太陰。不能外出。而與陽爭。故多寒少熱。

〔病狀〕多寒少熱。或但寒無熱。腰背頭項疼痛。無汗。脈弦遲。傷食則弦而短。多痰則弦而滑。

舌上白苔。不能食。

〔療法〕法宜溫解。可能小柴胡湯加桂枝。乾薑。羌活。紫蘇等。虛久不愈。宜服六君子湯。四獸

飲加砂仁。神曲。穀芽等。

〔小柴胡湯〕方見瘧瘧。

〔六君子湯〕人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮 半夏各二錢

右加荳蔻。水煎服。

〔四獸湯〕半夏 人參 茯苓 白朮 橘紅 草果 生薑 烏梅 大棗 甘草各等分

右以鹽少許淹。食頃。濕紙厚裹。慢火煨香熟。每服四錢。溫服。

## 三、伏暑正瘧

〔病因〕夏暑內伏。秋涼外束。邪入於內。陰陽相搏。淺者病在三陽。隨衛氣以爲出入。故一日一作。重者病在三陰。邪氣不能與衛氣並出。故間一日。或三四日而作。

〔病狀〕寒熱往來。發有定時。頭痛胸悶納少。小溲渾黃。脈弦。隔一日者。謂之間日瘧。隔三日者。謂之三陰瘧。愈久愈重。

〔療法〕不論新久。宜即服瘧疾方。應手取效。

〔瘧疾方〕白朮土炒 白茯苓 川芎各六分 白芍酒炒 陳皮去白 當歸 山楂蒸取肉 知母鹽透晒乾 黃蘗鹽水炒各八分 甘草 黃連薑汁炒 青皮各三分 軟柴胡 半夏姜汁煮透晒乾 條芩酒洗各五分 枳殼麸炒二分 薑一片  
右水煎服。寒熱退。去柴胡。加人參三分。孕婦勿用枳殼可也。

#### 四、癥瘕瘕母

〔病因〕瘧邪挾瘀血痰濕結塊腸下。伏於肝經。金匱謂瘧病一月不瘳。此爲結瘕瘕。名瘕母。

〔病狀〕寒熱間作。或不作。少食。痞悶有塊。結於左脇。硬痛。此疾先由瘧而來。故曰瘕母。此病纏綿難愈。正氣受傷。失治或治不如法。則成癥瘕疾。遺患終身。或促人壽命。

(療法) 治法不可專作癩積。純用攻下。宜疏通血絡。服髓甲煎丸最效。

【髓甲煎丸】 髓甲十二分炙 烏扇三分燒 黃芩三分 柴胡六分 鼠婦三分熬 乾薑二分 大黃三分 芍藥五分 桂枝 葶藶一分熬 石菖三分去毛 厚朴三分 牡丹五分去心 僵麥三分 紫葳三分 半夏一分 人參一分 麩蟲五分熬 阿膠三分 蜂窩四分炙 赤硝十二分 螻蛄六分熬 桃仁二分

石二十三味爲末。取煨燼下灰一斗。清酒一斛五斗浸灰。候酒盡一半。著髓甲於中煮。令泛爛如膠漆。絞取汁。納諸藥煎。爲丸如梧子大。空心服七丸。日三服。

(瘰癧通治單方) ①將老蠶搗爛。裹於兩膝蓋上。週夜始行取去。則可保永久不發。(簡便方) ②

青蒿一握。水二升。搗汁服。(肘後方) ③胡椒。硫黃各三厘。研末。摻膏藥上。貼背脊之

正對肚臍眼處。過期即愈。(應驗良方) ④柴胡一錢。和清水兩碗。熬成一碗。於發病之煎

六小時服之。無不效。(養生主論) ⑤薏仁一兩。好酒半壺。同煮。露一宿。次晨熬透。去

薏仁。飲酒。神效。(聖濟總錄) ⑥治隔日瘡。宜用早蓮草研碎。如黃豆大。以紫蘇葉裹之

。男左女右。塞鼻孔內半日。即出涕淚。輕者立愈。重者漸次而愈。(醫宗必讀) ⑦治三日

瘡。宜用獨蒜一個。黃丹一錢。搗和。作三丸。於發日早起。向東。以井花水送下一丸。連

服三日效。(應驗良方)

(久瘡不止單方) ①桃花陰乾爲末。酒服一小匙。良效(梅師方) ②薊穗一大握。炙令赤色。以

水濃煎一盞。欲發前服。(斗門方) ③鼈甲醋炙。研末。每用二錢。酒服。隔夜一服。清晨

一服。臨時一服。無不斷者。(壽域神方) ④真若根燒灰。水服一合。量人強弱用。(千金

方) ⑤常山二兩。研末。鷄子白和。丸如梧子大。瓦器煮熟。晒乾收之。名常山丸。每服二

十九。竹葉湯下。五更一服。天明一服。發前一服。或吐或不吐。卽止。數年不瘥者。兩劑

瘥。一月以來者。一劑瘥(千金方) ⑥龍骨末一錢。先發一時。酒一升半。煮三沸。乘熱服

盡溫。覆取汗。卽效。(肘後方) ⑦麻葉。不問榮枯。鍋內文武火慢炒香。取起。以紙蓋之

。令出研盡爲末。臨發前。用茶或酒下。移病人原睡處。其狀如醉。醒卽愈。(集簡方)

(截瘧單方) ①生鼈甲。不見湯煮者。醋炙黃爲末。烏梅肉爲丸。每服三錢。效。(醫宗必讀)

②何首烏。忌鐵爲末。酒調不三錢。臨發先服或煎湯服。(醫宗必讀) ③常山一兩。漿水三

升。浸一宿。煎取一升。欲發前頓服。取吐。或浸酒飲之。(外臺秘要) ④常山一兩。糯米

百粒。水六升。煮三升。分三服。先夜未發。臨發時服盡。(肘後方)

# （咳嗽）

（總說）

咳嗽者。肺感於寒微者則成咳嗽之。肺主氣。合於皮毛。邪之初傷。先客皮毛。故肺先受之。五臟與六腑爲表裏。皆稟氣於肺。以四時更主。五臟六腑皆有咳嗽。各以其時感於寒而受病。故以咳嗽形證不同。五臟之咳者。乘秋則肺先受之。肺咳之狀。咳而喘息有聲音。甚則唾血。乘夏則心受之。心咳之狀。咳則心痛。喉中介介如哽。甚則咽腫喉痺。乘春則肝受之。肝咳之狀。咳則兩脇下痛甚。甚則不可以轉。兩脚下滿。乘季夏則脾受之。脾咳之狀。咳則右下脇下痛。痞々引放臍背。甚則不可動。動則咳。乘冬則腎受之。腎咳之狀。咳則腰背相引而痛。甚則咳逆。此五臟之咳也。五臟咳久不已。傳與六腑。脾咳不已。則胃受之。胃咳之狀。咳而嘔々。甚則長蟲出。肝咳不已。則膽受之。膽咳之狀。咳而嘔。膽汁。肺咳不已。大腸受之。大腸咳之狀。咳而遺尿。心咳不已。則小腸受之。小腸咳之狀。咳而失氣。氣者與咳俱出。腎咳不已。膀胱受之。而膀胱咳之狀。咳而遺尿。久咳不已。三焦受之。三焦咳之狀。咳而腹滿。不欲食飲。此皆聚於胃。鬲於肺。使人多涕唾國而浮腫逆氣也。

## 一、風寒咳嗽

〔病因〕症由皮毛而入。皮毛爲肺之合。寒邪外襲。必先入肺。肺爲嬌臟。不耐邪侵。清肅失司。則氣逆而咳。

〔病狀〕咳吐痰濁。白稠而爽。頭寒頭痛。胸悶納少。鼻流清涕。脈象浮滑。舌苔薄白或微膩。甚則微有氣急。

〔療法〕治宜疏風化痰。寧咳化痰湯。二陳湯可服。蓋初病風寒咳嗽。必有表症。藥宜動而不宜靜。早用兜補。戀邪多成癆損也。

【寧咳化痰湯】桔梗 枳殼麩炒 半夏薑湯泡七次 陳皮 前胡 乾葛 茯苓各一錢 紫蘇一錢 二分 麻黃一錢冬加夏減 杏仁炒去皮 桑皮各一錢 甘草四分錢 右水二鐘。薑三片。煎八分。食遠熱服。

【二陳湯】半夏 茯苓各三錢 陳皮去白二錢 甘草一錢 右四味加薑三片。水煎服。

## 二、痰熱咳嗽

〔病因〕風熱襲入肺中。煎熬津液。鍛鍊成痰。火動陽升。木叩金鳴。治節失司。乃爲咳嗽。此病



多生於春夏病溫者。及陽旺陰虛之人。

(病狀)咳嗽發熱。痰粘而不爽。或黃膩如膿。口乾欲飲。胸悶不舒。心煩不寐。脈象浮數。舌苔黃。

(療法)宜疏風化痰。清肺飲。瀉白散皆可服。

【清肺飲】杏仁去皮尖 貝母 茯苓一錢 桔梗 甘草 五味子 橘紅各五分  
右加薑煎。食遠服。

【瀉白散】桑皮 地骨皮各一錢 甘草五分 粳米百粒  
右水煎一服。

### 三、虛勞咳嗽

(病因)肺屬燥金。爲水之母。陰損於下。陽浮於上。水涸金枯。肺苦於燥。燥則喉癢而咳。況水涸則不能涵木。木火鳴張。上犯肺金。肺葉日被薰灼。痿而致咳。

(病狀)咳嗽無痰。音低短息。內熱口渴。形質消瘦。納穀減少。脈象細數或弦數。舌絳或薄黃。或吐血後而致咳。或咳血後而成勞。其病久。其根深。

〔療法〕此病久而不愈。宜服補肺阿膠湯。人參清肺湯等。內傷咳嗽。用藥宜靜不宜動。忌苦寒敗胃。辛溫散氣。

【補肺阿膠湯】阿膠一兩半 馬兜鈴焙 惡實炒 甘草炙各一兩 杏仁七錢  
右加糯米一合。水煎服。

【人參清肺湯】人參 阿膠 骨皮 知母 烏梅 粟壳 炙草 杏仁 桑皮等分  
右棗子水煎服。

#### 四、痰飲咳嗽

〔病因〕形寒飲冷則傷肺。脾胃之陽不足。健運失司。水穀不化。精微而爲痰飲。漬之於肺。或受風寒。其發更甚。皆不慎起居。不節飲食所致。

〔病狀〕咳嗽形寒。咯痰甚多。目眩。胸悶。不欲食。甚則氣急。或胸背之間。一處作冷。舌苔白膩。脈象濡滑。或則沉遲。

〔療法〕宜溫化滯濁。可服小青龍湯蘇子降氣湯。甚效。

【小青龍湯】麻黃去節 芍藥各三錢 五味子二錢 乾薑 甘草炙 細辛桂枝去皮各三錢 半夏

二錢湯洗

右八味以水煮麻黃。去上沫。納諸藥。再煮。去滓。溫服。

【蘇子降氣湯】蘇子 半夏各二錢半 前胡 甘草炙 厚朴 陳皮各八分 當歸二錢 沉香七分

薑三片

右水煎。不拘時服。若虛冷入。加肉桂五分。黃耆一錢。

(咳嗽通治單方) ①甜杏仁一兩。去皮尖。搗如泥。分三服。每服如冰糖三錢。開水沖。連末服

下。早晚各一次。三服愈。煎服則不驗。(續名醫類案) ②元胡索一兩。枯礬二錢半。爲末

。每服二錢。和鷓鴣一塊含之。此方老小皆治。(仁存堂方) ③浮石末湯服。或蜜丸服。(

肘後方) ④豬腎二枚。乾薑三兩。水七升。煮二升。稍服。取汗。(張文仲方) ⑤百部。

生薑各搗汁。等分。煎服二合。(集簡方) ⑥百部根漬酒。每溫服一升。日三服。(集簡方)

⑦梨一個。切片。酥煎食之。(海上方) ⑧風寒咳嗽。蘇葉。加水糖一匙。煎服之。一

服即愈。(心鏡) ⑨熱盛而咳嗽者。用石膏二兩。甘草炙半兩。爲末。每服三錢。生薑蜜調下

。(普濟方) ⑩咳嗽有痰者。用熟摺蓼十個。明礬三兩。搗和餅。陰乾。研末。糊丸梧子大

。每薑湯下五七十丸。(醫方摘元)

(久咳不已單方) ①取白煎焙搗爲末。每溫酒服二錢。(深師方) ②三十年老咳。百部根二十斤

。搗取汁。煎如飴。服一錢。日三服。(千金方) ③紫菀。款冬花各一兩。百部半兩。搗羅

爲末。每服三錢。菹三片。烏梅一個。煎湯燂下。日二次。甚佳。(國經) ④五味子五錢。

甘草錢半。五倍子。風化硝各二錢爲末。乾嚙口中。咳嗽自止。(丹溪纂要) ⑤百部根切炒

。袋盛浸酒。頻頻飲之。(宣明方) ⑥貫衆。蘇方木等分。水一盞。生薑三片。煎服三錢。

早晚各一次。(聖惠方) ⑦扁柏葉陰乾。加紅棗七枚。煎濃湯代茶。時時飲之。(直指方)

⑧久咳漸成癆瘵。鳳尾草爲末。用魚鱗燻食之。(聖惠方) ⑨久咳欲死。用厚榆皮削如指大

。長尺餘。納喉中。頻出入。當吐而愈。(千金方) ⑩經年氣咳者。用橘皮。神曲。生薑焙

乾。等分爲末。蒸餅和丸。梧桐子大。每服三五十丸。食後夜臥各一服。(慈氏衍義)

(老年咳嗽單方) ①杏仁。胡桂仁等分。搗爛。蜜丸彈子大。薑湯嚼下。(萬病回春)

(酒後咳嗽單方) ①白蠟蠶焙研末。每茶服一錢。(怪證奇方)

(咳嗽吐血單方) ①痰嗽帶血者。用款冬花。百合蒸焙。等分爲末。蜜丸龍眼大。每臥時。嚼一

丸。滾湯下。(濟生方) ②白前。桔梗。桑白皮三兩炒。甘草一兩一兩炙。水六升。煮一升

分三服。忌豬肉菘菜。(外臺秘要) ③苘子三撮。吞之。日五六度。(必效方) ④年深咳

嗽作膿血者。貫衆。蘇方木。等分。每服三錢。生薑三片煎服。日二服。(席延賢方) ⑤ 藥地黃末。酒服一錢。日三次。(聖惠方) ⑥ 防已。葶藶等分爲末。米飲湯下一錢。發驗非常

(古今錄驗方)

咳嗽失音單方) 白果仁四兩。白茯苓。桑白皮。各二兩。烏豆半升。沙蜜半斤。煮熟。日乾爲末。以乳汁半椀半湯九晒九蒸。丸如菘豆大。每服三五十丸。白湯下。神效。(金居士方)

### (痢疾)

(總說)

痢之爲症。多因外受暑濕。內傷生冷而成。傷於氣者色多白。以肺與大腸爲裏。傷於血者色多赤。以心與小腸爲表裏也。裏急者。腹窘痛也。後重者。煩下墜也。又有寒痢。噤口痢。休息痢等之別。宜詳察治之。

## 一、虛寒痢疾

(病因) 體弱者。過食生冷。濕滯鬱於大腸。致奔迫下痢。素問所云食飲不節。起居不時。則陰受之。入五臟則脹滿閉塞。下爲飧泄。久爲腸癖者是。

(病狀) 腹痛下痢。其色或青。或白。或黑。食不消。脈沉而滑不數。苔必白。若脈轉浮大急疾。四肢厥冷者難治。

〔療法〕宜溫連中土。升清降濁。可服附子理中湯。或詞子散。

〔附子理中湯〕附子 人參 甘草 白朮 乾薑各二錢

右用水四升。煮取升半。去滓。溫服半升。日三服。

〔詞子散〕詞子炮去核 甘草炙 厚朴薑製 乾薑炮 神曲炒 草果去殼 良薑炒 茯苓 麥芽

炒 陳皮各等分

右爲散。每服二錢。用水煎入鹽少許服之。

## 二、赤白痢疾

〔病因〕腸胃虛弱。冷熱相乘。傳化失職。變而爲痢。熱乘於血。流滲腸間則赤。冷氣入搏。津液凝滯則白。

〔病狀〕腹痛下痢。裏急後重。至圍而所下無多。赤白相雜。腥穢難聞。脈弦滑或濡數。舌苔厚膩或黃。若邪戀久而不退。勢必變劇。所下如凍如涕。或如猪肝。此脾腎內潰。精氣下脫。法在不消。

〔療法〕大化滯推蕩。有表宜兼解表。和榮則便膿自愈。調氣則後重自除。宜服荊防敗毒散。白

頭翁湯。膿血久而虛寒者。宜服桃花湯。

【荊防敗毒散】荊芥 防風 羌活 獨活 柴胡 前胡 川芎 枳殼 桔梗 茯苓各三錢 甘草

八分

右爲末。加薑三片。薄荷少許。水煎服。

【白頭翁湯】白頭翁 黃連 黃柏 秦皮各三錢

右四味以水煮。去滓。溫服。不愈再服

【桃花湯】赤石脂兩一半到一半篩末 乾薑一錢 粳米一握

右三味以水煮米令熟。去滓。溫服納赤石脂末方寸匕。日三服。

### 三、休息痢疾

(病因)腸中宿挾痼滯。每遇飲食不節。停飲不消。痢下旋辭。如以時休息者焉。蓋痰熱留伏於膜

原隱匿之地故耳。

(病狀)痢下無時。乍瀉乍發。飲食減少。四肢無力。最傷正氣。此病多隔年而發。最屬纏綿。

(療法)宜服肉豆蔻散。或溫脾湯。

【肉豆蔻散】 訶子皮 川烏炮去皮脂 肉桂去爺皮尚香炒各二錢 肉豆蔻麩裏煨 厚朴去爺皮薑

炒甘草燬 乾薑炮 陳皮各四錢 蒼朮米泔浸一宿去皮焙八錢

右爲末。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。溫服。

【瀉脾湯】 厚朴 乾薑 甘草 桂心 附子各二錢 大黃四錢

右六味或咀。水煎六分頓服。

#### 四、噤口痢疾

〔病因〕 瘀滯挾熱阻中。胃不能運。穀氣銷鑠。多因痢疾初起。專用苦寒或溫補。陽遏於內。膈中清氣不升。故致此病。

〔病狀〕 舌乾咽澀。飲食不得下。嘔噎胸悶。心煩。痢不止。脈數實。身熱。

〔療法〕 此症半屬不治。惟調治得宜。或可挽救。宜速服參連開噤散救之。

【參連開噤散】 人參 川連薑炒 蓮子肉各等分

右爲細末。米飲調下。

〔痢疾通治單方〕 ①白痢用訶子二個。一根一生爲末。沸湯調服。水填。加甘草末一錢。(普濟



方) ⑤赤痢用烏梅肉炒。黃連各四兩爲末。煉蜜丸梧子大。每米飲二十丸。日三服。(直指方) ⑥赤白痢同下者。用罌粟子殼炙。等分爲末。煉蜜丸梧子大。每服三十九。米飲下。(百一選方) ⑦噤口痢。用蘆白片。不拘新舊。染蜜噙之。噤汁。味淡在換。覺思食。以肉煮粥與食。不可過多。(聖惠方) ⑧休息痢。用椿根白皮。訶黎勒各半兩。母丁香三十個爲末。醋糊丸梧子大。每服五十九。米飲下。(仁存堂方)

(久痢不愈單方) ⑨阿芙蓉小豆許。空心溫水代下。日一服。忌葱蒜漿水。若渴。飲蜜水解之。

(易簡方) ⑩艾葉。陳皮。等分。煎湯服之。亦可爲末。酒煮。爛飯和丸。每鹽湯下三三十

丸。(聖濟總錄) ⑪茄根燒灰。石榴皮等分爲末。以沙糖水服之。(簡便單方) ⑫烏梅肉二

十個。水一盞。煎六分。食前分二服。⑬黃連四十九個。鹽梅七個。入新瓶內。燒烟盡。

熬研。每服二錢。

(五色痢單方) ⑭乾絲瓜一枚。連皮燒研。空心酒服二錢。(經驗方) ⑮酸石榴五個。蓮子搗汁

二升。每服五合。神妙。(千金方)

(下痢脫肛單方) ⑯白龍骨粉撲之。(姚和衆方) ⑰百藥煎一塊。陳白梅三個。木瓜一握。以水

一碗。煎半碗日二服。(聖濟總錄)

# 嘔吐

(說總)

嘔吐者。皆由脾胃虛弱。受於風邪所爲也。若風邪在胃則嘔。隔間有停飲。胃內有久寒。則嘔而吐。其狀長嘆息。心裏澹々然。或煩悶大便秘。或澹泄並其候。

## 熱證吐嘔

(病因)陽明有熱。火勢上炎。胃氣不能下降。每多嘔吐。或因肝膽有火。風陽上亢。金不能平木所致。

(病狀)凡嘔吐者。食入則吐。不能傾刻停留。發熱口渴。苔黃。脈滑數。卽胃熱之。若吞酸嘔惡。口苦咽乾。頭目昏眩。脈弦數。此爲肝陽上亢之嘔。

(療法)上者宜瀉火緩中。可服大黃甘草湯。下者可服左金丸。

【大黃甘草湯】大黃四錢 甘草一錢

右二味。以水煮。溫服。

【左金丸】黃連六錢 吳茱萸一錢洗泡

右爲末作丸。作一服

## 二、寒證嘔吐

(病因)脾胃虛寒。滯陽不佈。濁氣不能下降。乃上逆而爲嘔。亦有肝經虛寒。厥氣犯胃而吐者。  
(病狀)嘔吐之屬於寒者。口鼻氣清。吐多稀涎寒飲。口不渴。舌白。脈沉細或緩滑。厥陰嘔吐。  
頭眩多涎沫。脈沉細者是。

(療法)宜用溫運脾陽。芳香化濁之法。輕則服霍香正氣散。重則兼用附子理中湯。愈後。切忘冷飲冷食。誤犯必復發。若至呃逆。多難治。

【霍香正氣散】厚朴 陳皮 桔梗 半夏各二錢 甘草一錢炙 大腹皮 白芷 茯苓 蘇葉各三錢 霍香三錢

右十味加薑棗。水煎服。

【附子理中湯】人參二錢 附子泡一枚 乾薑泡 甘草炙各二錢 白朮土炒四錢 右爲末。每服二錢。水一盞。煎至七分。食前服。

## 三、乾嘔不吐

〔病因〕內無寒飲熱積。祇由清濁之氣。升降失常。阻拒於胸膈之間。滯礙失司。故現此症。

〔病狀〕嘔吐多有痰涎及食積隨聲而出。乾嘔則有聲而無物。其聲甚厲。有時亦有甚低微者。

〔療法〕切不可有消痰化積峻劑。以其內無實蘊。徒傷耗中氣。無益也。其用藥如藜香。佩蘭。陳皮。蘇梗。雲苓等類。總之以不攻破爲佳。

#### 四、嘔吐蛔蟲

〔病因〕蛔之所由生。良由傷飢過飽。喜啖生冷腥膾甘肥等類。脾胃欠運。濕熱之氣。得肝經風木之化。逢八臟腑之虛。則侵蝕於中。

〔病狀〕凡患此者。其心當嘈雜。面色痿黃。唇口時紅時白。腹中痛。脈不沉弦而反洪小。是有蛔蟲。熱則生虫。故脈洪大。

〔療法〕吐蛔屬厥陰病。此經陰盡陽生。多寒熱雜錯之邪。宜服烏梅丸。切忌甘草蜜類。

〔烏梅丸〕烏梅三十個。黃連一兩。黃柏六錢。乾薑一兩。附子二枚泡。蜀椒四錢泡去汁。桂枝六錢。細辛六錢。人參六錢。當歸四錢。

右十味異搗篩合治之。以苦酒漬烏梅一宿。去核。蒸之五升米下。飯熟。搗成泥。和藥令相

得。納白中與蜜杵二千下。丸如梧桐子大。先食飲服十丸。日三服。稍加至二十丸。禁生冷澀物莫食。

(嘔吐通治單方) ①麻仁杵爛。水研取汁。著鹽少許。噉食。立效。(外臺秘要) ②用北黃丹四

兩。米醋半斤。煎乾。炭火三秤。就鉢內煨紅。冷定爲末。粟米飯丸。梧子大。每服七丸。

醋湯下。(集驗方)

(嘔吐清水單方) 乾蘄艾煎湯噉之。(怪證奇方)

(嘔吐酸水單方) 黑山梔三錢。煎濃汁。入生薑汁少許。和服。(驗方)

(中酒嘔吐單方) 赤小豆煮汁徐服。(良方)

## (脚氣)

(說總)

脚氣者。脚下腫痛。即痺症之類也。因其痛專在脚。故以脚氣名之。其腫者名濕脚氣。不腫者名乾脚氣。濕脚氣。水氣勝也。乾脚氣。風氣勝也。宜分別治之。

## 一、濕脚氣病

(病因) 多因地氣卑濕。或脾不運化。寒濕下注。襲入足脛經絡皮肉。無他病而卒然得之者是。或

由病後而漸得之。宜究原別治。

〔病狀〕初起甚微。人多不覺。遂漸脚軟弱。不便步履。自跗至膝。麻痺浮腫。以指按之。皆而不起。脈遲濡。甚則寒熱。或腹痛下痢。飲食減少。皆有風濕爲患也。治如不得法。則厥氣上升。濕濁不降。不降則由膝上犯而入腹。衝胸欲絕。嘔噎腹脹。或入脊而作痞。皆屬危候。慎之慎之。

〔療法〕初起以木瓜。檳榔。吳茱煎服。成病。宜服檳榔散。

【檳榔散】檳榔 半錢 防己 獨活 秦朮各一錢 青木香 天麻 赤芍各二分 桑枝二錢 當歸五分

右爲末。每服二錢。水煎。食後服。

## 二、乾脚氣病

〔病因〕此因陰傷而熱熾。下流則脚無力而痿弱。凡多服乳酪醇酒及濕熱之物。皆能致之。勞較由於濕者爲甚。

〔病狀〕此症脚屈弱。不能動。飲食如常。大致與濕脚氣無異。惟濕脚氣則腫。此則不腫。爲大異

耳。惟其不腫。治者每易忽略。遇有輾轉以死者。可憫孰甚。

〔療法〕宜服四物湯加牛膝。木瓜。愈後忌食牛羊肉。鮮魚葷膏。麵食。生果等百日。濕脚亦如此。

〔四物湯加牛膝木瓜〕當歸 熟地 牛膝 木瓜各三錢 川芎一錢五分 白芍二錢酒炒

右水煎服。

〔脚氣通治單方〕○白楊皮切片。浸酒。頻飲。(本草綱目) ⑤枳殼炒二兩四錢。甘草六錢爲末

。用木瓜煎湯。送吞二錢。(直指方) ⑥大麻仁熬香。以水研取一升。再入水三升。煮一升

。入赤小豆一升。煮熟。食豆飲汁。(外臺秘要) ⑦桐葉煮汁漬之。并飲少許。或加小豆。

尤妙。(聖惠方) ⑧陳扁豆一升。愈陳愈佳。新者忌用。通草一兩。同煮爛。將豆與水。頻

頻飲食之。二三日便愈。(必效方) ⑨杉木節三寸。橘葉三錢。煎服。七服自愈。最忌洗脚

。(芝隱方) ⑩馬齒莧。和少粳米醬汁。煮食之。(外臺秘要) ⑪葱莖葉煮湯漬之。日三五

次。妙。(獨行方) ⑫桑條三兩。炒香。以水一升。煎二合。每日空心服。(聖濟總錄) ⑬

草烏頭一兩。以生薑一兩。同研。交感一宿。蒼朮一兩。以葱白一兩。同研。交感一宿。各

焙乾爲末。酒糊爲梧子大。每服五十九酒下。(如宜方)

〔脚氣衝心單方〕○白糯米半兩。水一斗五升。煎沸浸洗。(千金方) ⑭威靈仙末。每服二錢。

酒下。痛減一分。則藥亦減一分。(簡便方) ⑤吳茱萸。生薑汁。服甚良。(食療本草) ⑥

陳皮一斤和杏仁五兩去皮尖熬。少加蜜搗和丸如梧子大。每日食前米飲下三十丸。(食療

本草)

(老人脚氣車方) ⑦用豬腎一對。以醋蒜五味治食之。日作一服。或以葱白粳米。同煮粥食之。

(率親養老書) ⑧猪肚一具。洗淨。細切。以水洗。布絞乾。和蒜椒醬醋五味。常食。(率

親養老書)

## 臌脹

(說)

或問方書有鼓脹蠱脹之別。何也。答曰。鼓者。中空無物。有似於鼓。蠱者中

實有物。非蠱即血也。中空無物。填實則滯。此所謂脹困寒用也。中實有物。

消之則平。此所謂堅者削之是已。然脹滿有寒熱虛實淺深部位之不同。若不細辨。何由取效

。假如溺赤便閉。脈數有力。色紫黑。氣粗厲。口渴飲冷。唇焦舌燥。多屬於熱。假如溺清

便澀。脈細無力。色皓白。氣短促。喜飲熱湯。舌潤口和。多屬於寒。又如腹脹按之不痛。

或時脹時減者爲虛。按之愈痛。腹脹不減者爲實。凡脹滿飲食如常者。其病淺。飲食減少者

。其病深。隨症施治。未可固執也。



## 一、水臌水腫

（病因）水臌與水腫相同。多由四肢先腫。由於受雨淋濕。飲水過多。脾胃受傷。運輸失職。水毒結聚。鬱而生熱。濕熱相生。清濁相混。隧導不通。腹乃脹大。其人陽虛。則為寒水。

（病狀）腹部脹大。外皮翻急而薄。皮色瘡黃而澤。且食不能暮食。仍時欲飲水。脈浮大者。順。細小者。逆。舌苔白膩或嫩黃。倘久不能愈。遂致臍突出。吐見青筋。皮光如油。脈虛小。是土敗木賊之象。為不治。若四肢不腫。但腹脹大。由於脾氣虛而不能運行。濁氣滯塞於中。俗名蜘蛛臌。書稱單腹脹。最為險候。

（療法）以培土制水而潔淨內腑為上策。可服鷄矢醃方或五皮散。然急則宜治標。可服葶藶丸。或大腹水腫方。亦須忌食鹽醬糟物。恐助腎水之邪也。

【鷄矢醃方】鷄矢八合研炒焦。無灰酒三碗。

右共煎乾。至一半許。用布濾取汁。五更熱飲。則腹鳴。辰巳時行二三次。皆黑水也。次日覺足面漸有縐紋。又飲一次。則漸縐至膝上而病愈矣。

【五皮散】蒼朮皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮 茯苓等分

右五味。每三錢水煎。熱服。或加白朮磨沉香木香亦可。

【葶藶丸】葶藶子半兩 牽牛子半兩生熟各半 澤漆葉 海藻洗去鹽炙 昆布如上炙 桑根白皮

炙 甘遂熬 椒目 葶李仁各三分 桂心一分

右爲末。蜜丸桐子大。一服十五丸。日再加至二十丸。

【大腹水腫方】牛黃二分 椒目三分 昆布 海藻 牽牛子 桂心各八分 葶藶六分

右二味爲末。別搗葶藶如膏。合和丸如桐子。飲服十丸。日二稍加。小便利爲度。

## 二、氣滯成臃

（病因）水臃由水滯自形而爲實。氣臃由於氣滯無形而爲虛。推其根原。多由七情鬱結。氣道壅滯。致上不得降。下不得升。內不干於臟腑。厥常鬱於肌滕。遂作此病。

（病狀）腹大皮色不變而厚。鼓空然不堅。按之實而不起。四肢瘦削。喘促煩悶。脈弦緊。或沉弦（療法）宜服木香流氣飲。沉香降氣湯。木香順氣湯等。以理氣降氣。氣散腹自平。惟適可而止。

不宜過度。恐傷真氣也。

【木香流氣飲】陳皮去白二兩 甘草燻 厚朴去粗皮薑汁炙 紫蘇葉 青皮去白 香附炒去毛各

腎藥大全 內科門（臃脹）：氣滯成臃

一兩 木通八錢去節 大腹皮 丁皮不見火 檳榔 肉桂去麩皮不見火 葦果仁 蓬朮煨切  
麩香去枝梗 木香去粗皮各六錢 乾木瓜 人參去蘆 白朮 麥門冬去心 石菖蒲 赤茯苓  
去皮 白芫各四錢 半夏二錢湯洗七次切片焙乾

右爲窠末。每服四錢。水一盞半。薑三片。棗子二枚。煎七分。去滓鶻服。不拘時。

【沉香降氣湯】香附子五錢炒去鬚毛 沉香五分 縮砂仁三錢 甘草七錢半煨

右爲細末。每服一錢。入鹽少許。沸湯點服。凌旦霧露。空心服之。

【木香順氣湯】木香 草薢仁炒 益智 蒼朮三分 厚朴四分 青皮 陳皮 半夏 吳茱萸 乾

薑。澤瀉二分 升麻。柴胡一分 當歸五分

右水煎服。

### 三、實症腹脹

(病因)濁氣中阻爲實脹。感於濕滯。傷於生冷。脾土爲困。乾健失常。不能運化消微。水穀聚而  
不散。腹爲至陰之廓。脾病則形於外。內經曰。濁氣在上。則主腹脹是也。亦有於血凝結下  
焦而成脹者。

〔病狀〕腹脹而堅。小便赤黃。大便秘結。體重。臥不安。脈滑有力。每起於旬日間。蓄血者少腹硬滿。大便色黑。小便清長。發狂善忘。脈沉而結。

〔療法〕宜服大小承氣湯。以直清陽明。蓄血者宜搜逐。可服桃仁承氣湯。一切生冷滋膩難化酸收之品。均在禁例。三餐後嚼豆蔻半顆。極有益。

【大承氣湯】大黃四錢酒洗 厚朴半兩去皮炙 枳實二枚炙 芒硝一合

右四味以水先煮二物。去滓。納大黃再煮。去滓。納芒硝。更上火微沸。沸。溫服。

【小承氣湯】大黃四錢 厚朴二錢去皮炙 枳實一枚炙

右三味以水煮。去滓。溫服。

【桃仁承氣湯】桃仁五個去皮尖 桂枝二錢去皮 大黃四錢 芒硝 甘草炙各二錢

右五味以水煮。去滓。納芒硝。更上火微沸。下火。溫服。

#### 四、虛症臌脹

〔病因〕中氣不運爲虛脹。亦由飲湯失節。不能調養。戕伐生主之氣。清氣下降。濁氣臌滿。惟實脹則內有實滯。此則全由脾虛。內經曰。飲食起居失節。入五臟。則腹滿閉塞是也。

(病狀)腹脹。小便清白。大便稀薄。容顏枯槁。語言低微。食少瀉多。脈細微無力。多由經年累月而成。若腹脹而見身熱脈大。或腹鳴而滿。四肢清泄。脈大。皆爲逆。十五日而死。若腹大脹。或未清脫。形泄甚。或腹脹便血。脈大時絕。亦爲逆。不過一日而死矣。

(療法)治以補中爲主。宜服枳朮丸或香砂六君子湯。瘥後可常服白朮。以保脾土乾健。

【枳朮丸】枳朮一兩 白朮二兩

右用荷葉裹燒飯。爲丸桐子大。每服五十丸。

【香砂六君子湯】人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮 半夏 藿香 砂仁各二錢

右加薑棗。水煎服。

(膨脹通治單方) 水臖①大蒜。田螺。車前子。等分。熬膏。攤貼臍中。效。(香祖筆記) 二手

按之。下陷不起者是。用活黑魚一尾。重七八兩。去鱗甲。將肚破開。去腸。入好黑糝五分。松蘿茶三錢。男用蒜八瓣。七女瓣。共入魚腹內。盛瓷器中蒸熟。令病人食魚。能令茶食蒜。更妙。藥從頭上食起。病即。頭上消起。從尾食起。即從脚上消起。立效。兼治氣臖。(醫學綱目) ③數年陳蠶豆三四兩。加紅糖二三兩。蠶豆連殼熬服。新病一次即愈。重者亦不過二三次。神效無比。(醫林集要) 水腫①白商陸根去皮。切如豆大一杯。水煮一盞。更以

米一盞。同煮成粥。每日空心吸食。(外臺秘要) ㊸砂仁。土狗一個。等分研和。酒服。(直指方) 氣蕘(㊸)按之隨手即起者是。用雄豬肚一具。去穢。內裝大蠟蠟一隻。大砂仁一兩。研。老絲瓜根半條。破爛敗鼓皮手大一塊。紫背浮萍一兩。炙焦。以麻線縫好。入新砂鍋內。加水。用桑柴火煮爛。去淨浮油。煮好去藥。將肚洗淨。竹刀切片。仍入原湯中。再加真紫油厚朴。白烏各五錢。鷄心檳榔。大腹皮。沉香。枳殼醋炒各三錢。芫花醋炒一綿大戟麩包煨。上梅片研細。甘遂麩包煨。各二錢。用文武火。再煎數滾。候原汁約有一大茶碗。將藥去淨。豬肚與湯。分作二三服。沉香。梅片二味。不宜見火。臨服時。和肚肉食之。服後以大便下白沫爲驗其穢即消。嚴禁鹽醬一百二十天。(古今醫統) ㊸香附子一斤。童便浸三日。焙爲末。丸梧子大。旋覆花湯下四五十丸。(驗方)

(病後浮腫單方) 老鴨一隻。加真川厚朴二錢。蒸熟食之。連食三隻即愈。惟體虛者勿服。(古今錄驗方)

(黃腫單方) 亞腰胡慮。連子燒末。食前溫酒下。或白湯下。連服十數個。效。(簡便方)

(血腫單方) 週身老黑色。皮內有紫斑點者是。用雄豬肚一具。去穢。茜草一兩。雄雞矢四兩。炒焦紫背浮萍一兩。老絲瓜根半條。各藥共裝肚內。用麻線縫好。煮熟。去藥。將肚切片。

仍入原湯。再加蜈蚣一條。燒枯存性。乾漆三錢。煨令煙盡。炒蠹蟲。真花蕊石研。眞血隔各三錢。紅花。降香。各五錢。甘遂。大戟各麵包煨。芫花醋炒各二錢。文武火煮透。去藥。食吐與湯。分作二三次服。服後。以大便下黑水數次爲驗。其敵自消。嚴禁鹽醬一百二十天。方內蜈蚣。必不可少。俟病愈後。照解蜈蚣毒法治之。(萬病回春)

### (痘病)

(說總)

黃痘者。目珠黃。漸及皮膚。皆現黃色也。此濕熱壅遏所致。如盒麵相似。漏蒸熱鬱。而黃色成矣。然濕熱之黃。黃如橘子柏皮。間火氣而光彩。此名陽黃。又有寒濕之黃。黃如薰黃色。暗而不明。或手足厥冷。脈沉細。此名陰黃。其間有傷食者。名曰穀痘。傷酒者。名曰酒痘。出汗染衣。名曰黃汗。皆陽黃之類也。復有久病之人。及老年。脾胃虧損。面目發黃。其色黑暗不明。此臟腑之眞氣泄露於外。多爲難治。

## 一、陽症黃痘

(病因)夏月天氣之熱。與地氣之濕交蒸。人受二氣。內結不散。發爲黃痘。與盒麵無異。

(病狀)濕熱屬陽。故曰陽黃。後世所稱。所以別陰黃也。其症多見一身黃色。色明如橙。煩渴頭汗。消穀善飢。小水赤澀。大便祕結。脈必滑數。責在胃腑濕熱泄越於上。故多與胃家實相

彷彿。

〔療法〕宜消化濕熱。佐之以下。所以廓清胃府。宜服茵陳蒿湯。病後時服佩蘭梗。菡豆衣。生苡米。新會皮等。芳香化濁。靈巧無礙。佳品也。

〔茵陳蒿湯〕茵陳蒿六錢 梔子四枚 大黃二錢

右三味以水先煮茵陳。納二味。再煮。去渣。溫服。小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便去也。

## 二、陰症黃疸

〔病因〕黃疸由濕熱釀成固矣。亦有不盡然者。張仲景云。傷寒汗已。身目爲黃。以寒溫在裏不解故也。則非但濕熱發黃。寒濕亦發黃。惟寒濕少而濕熱多。故多側重濕熱。

〔病狀〕黃濕屬陰。故曰陰黃。證亦身目爲黃。惟色如烟薰。而不若陽黃之鮮明。肢體重着。身寒胸痞。腹滿臌臥。目汗自利。小便渾少。渴不欲飲。甚則嘔吐。一派寒濕之象。

〔療法〕宜連脾溫化。茯苓滲濕湯可服。善後宜以大麥代茶飲。頗佳。

〔茯苓滲濕湯〕茵陳七分 白茯苓 木猪苓 澤瀉 白朮 陳皮 蒼朮米泔浸一宿炒 黃連各五



分。山梔炒 秦朮 防己 葛根各四分

右水二鐘。煎七分。食前服。

### 三、女勞痘症

(病因)女勞無度。脾中之濁陰下趨八脾腎入腎。脾腎之色外現。故身黃而額黑。或謂男子精動。則一身之血俱動。眞陽爲血所塞閉。血瘀不行所致云。

(病狀)額上黑。微汗出。手足中熱。薄暮即發。膀胱急。小便自利。大便黑。爲女勞痘之證。身亦黃。滿腹者難治。腹如水狀不治。

(療法)初起宜服硝礬散。滌熱而不傷胃。最忌攻下。恐成黑痘。

【硝礬散】硝石 礬石各等分

右每服二錢。水煎服。

(黃痘通治單方) ① 薏苡根煎湯。頻服。甚效。(本草綱目) ② 茵陳蒿一握。白鮮皮等分。水二

鐘煎服。每日二次。漸愈。(三十六黃方)

(穀疸單方) ① 卽食積疸也。亦名食疸。石膏。蒼耳。黃連。各等分。粥飲湯和丸。小豆大。每

服四十丸。以痊爲度。(墨娥小錄) ⑤龍膽一兩。苦參三兩爲末。牛膽汁和丸。梧子大。麥飲湯下五丸。日三服。(刪繁方) ⑥青括。蔓焙研。每服一錢。水半盞。煎七分。臥時服。五更瀉下黃物。立愈。(普濟方) ⑦飲酒大醉。當風入水所致。用黃芪二兩。木蘭一兩爲末。酒服一小匙。(肘後方) ⑧田螺水養數日。去泥。取出生搗爛。入好酒內。用布濾過。飲汁。晨。午。晚。各一服。(壽域神方)

(黑疸單方) 黃疸變黑。或女勞疸服攻下之藥而致黑。危疾也。括裏根一斤。搗汁六合。頓服。隨有黃水從小便出。如不出。再服。(簡便方)

## (吐血)

(總說)

夫吐血者。皆由大虛損及飲酒勞損所致也。但肺者。五臟上蓋也。心肝又俱主於血。上焦有邪。則傷諸臟。臟傷血下入於胃。胃得血則悶滿氣逆。氣逆故吐血也。但吐血有三種。一曰內衄。二曰肺疽。三曰傷胃。內衄者。出血如鼻衄。但不從鼻孔出。是近心肺間津出還流入胃內。或如豆汁。或如蝦血。凝停胃表。因即滿悶便吐。或去數升乃至一斛是也。肺疽者。是飲酒之後。毒滿便吐。吐已後有一合二合或半升是也。傷胃者。是飲食大飽之後。胃內冷不能消化。便煩悶強嘔吐之。所食之物。與氣共上衝。因傷損胃口。便吐血。色鮮正赤是也。亦有思慮傷心。心傷則吐。勞發者。並以易於辨治計。故分作

臟血。腑血。朝血三者言之。

## 一、五臟吐血

(病因)吐血之症。縱有外感內傷。而以臟腑爲主。蓋血稟水穀之精華。生化於脾。宣佈於肺。統於心。藏於肝。化精於腎。陰平陽秘。何病之有。一有偏傷。或感勞怒。則迫而上升。大抵由於肺者。多本金燥氣鬱。由於肝者。多本怒動木火。肝陰傷而肝陽獨旺。由於腎者。多本房勞斷傷。陰虛失納。陽虛不攝。由於心脾者。多本思慮過度。仲景所謂心氣不足則吐血。因此而致者。皆屬臟血。亦即內傷也。

(病狀)咳嗽吐血。血出散漫不聚者。肺氣傷也。咳嗽吐血。兩脅作痛者。肝氣逆也。吐血而神勞心悸者。心氣損也。吐血而神疲。惡聞食臭者。脾氣傷也。吐血驟至。行動喘促者。元海虛而龍餒升也。此臟血之見證。若粉紅者肺血。赤如硃漆光者心血。鮮稠濃紫者脾肝血。痰吐雜紅絲紅點者腎血。尤可望而知之矣。吐血久而不已。勢必現貧血之象。面色脫白。神疲乏力。納穀不香。中氣不足。若勞瘵虛損之類。蓋血無以奉養於周身也。至於脈見寬大。或小而疾。或咳出白血。似肉似肺。色作淺紅。則皆死矣。

〔療法〕屬心者宜服導赤各半湯。屬脾者宜服歸脾湯。屬肝者宜服加味道遙散。屬肺者宜服黃芩一物湯。屬腎者宜服腎氣丸。總之治吐血宜行血不宜補血。行血令循經絡。不止自止。宜降氣不宜降火。氣降則火降。自無溢出之患。然清熱養陰之品。似不可少。惟不當有一味滯膩耳。

【導赤各半湯】生地 木通 甘草 川黃連 麥門冬 犀角  
右各等分。水煎服。

【歸脾湯】人參 龍眼肉 黃耆各二錢半 甘草五分 白朮二錢半 茯苓二錢半 木香五分 當歸 酸棗仁炒 研遠志各一錢

右加薑三片。水煎服。

【加味道遙散】芍藥酒炒 當歸 白朮炒 茯苓 甘草炙 柴胡 丹皮 梔子各二錢  
右加煨薑三片。薄荷少許。煎服。

【黃芩一物湯】黃芩附症之輕重用量  
右一味。水煎服。

【腎氣丸】乾地黃八兩九蒸爲度搗膏 乾山藥 山萸肉各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉 桂枝 子各一兩

右八味爲末。煉蜜丸。如桐子大。酒下十五丸。日再服

## 二、六腑吐血

(病因)五臟皆有見紅症。惟六腑則但胃有之。故或稱腑血爲胃血。誠以大腸小腸無血。三焦皆油膜。膀胱屬水道。惟陽明爲多血多氣之海。又爲溫熱之藪。熱動火升。氣逆血迫。而溢於口矣。然亦有飲酒過多。損傷胃家而致者。要亦腑血之一也。

(病狀)五臟之血。其來少而緩。胃血則血來如潮湧。頃刻盈益。其色鮮膿。火之象也。出不即凝。熱之徵也。右脈堅者。治在氣分。係震動胃絡所致。在堅則肝腎陰傷矣。其飲多傷胃者。必現面紅氣粗之象。可問而知也。肺血浮。肝腎血沉。胃血浮中。可驗而知也。

(療法)腑血初發時。急以還元湯飲之。立定。然後投以犀角地黃湯。或加桃仁。藕汁。童便。亦可。極效。傷酒者宜服六君子湯加香砂。葛花。按此症其來驟而其勢猛。惟病實較臟血爲輕。蓋無非胃火升騰。不若臟血之由於五志之火。七情之鬱也。

### 【還元湯】童便

右須取十二歲無病童子。不茹葷辛。清徹如水者。去頭尾。熱飲。冬則用湯溫之。或加藕

汁。阿膠。和服。有痰加薑汁。

【犀角地黄湯】生地黃兩半 白芍一兩 丹皮 犀角二錢半

每服五錢。熱甚如狂者。加黃芩一兩。因怒致血者。加梔子柴胡。

【六君子湯】人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮 半夏各二錢

右加薑棗。水煎服。

### 三、鼻衄鼻血

（病因）經云。陽絡傷則血外溢。血外溢則衄血。有鼻衄。耳衄。眼衄。齒衄。肌衄。等等之分。

但除鼻衄外。餘見皆不常見。故現多以衄爲鼻出血之專稱。然推以治他衄。亦多有效。所謂

其理一也。其感溫熱火邪。或風寒壅盛於經而發者。是爲外因。其有怒傷肝陰。慾傷腎精。

陰虛陽浮而發者。是爲內因。亦有飲酒過量。努力負重而發者。是爲不內外因。然不論內外

虛實。多責之熱。熱則迫血妄行而溢出也。

（病狀）身熱口渴。胸滿脈實血紫。此得之溫熱火邪者。血出而表症仍在脈浮。昔日謂之紅汗。此

得之風寒者。面青而脈弦。得之於大怒。責之肝浮氣逆。煩心而內熱。得於慾傷。責之腎虛

陽亢。若傷酒者。則酒升血沸。面赤多汗。勞力。則傷中損絡。自汗怠倦。以此爲別。

〔療法〕屬於溫熱者。宜辛潤清涼。可服生地黃湯。屬於風寒者。宜祛邪和榮。可服桂枝湯或麻黃湯。得之怒者。宜服加味逍遙散。得之愁者。宜服七味都氣丸。得之飲酒者。宜服四生丸。得之負重者。宜服保元湯。善後凡因溫熱者。切戒辛辣之品。因怒者。極力潛心靜養。他若因愁因酒等。均宜自加戒懼。否則每易復發。元氣已傷。且多加劑。不可不慮。

【生地黃湯】生地黃八錢 阿膠 甘草各一錢 黃芩 柏葉一錢  
右水煎服。

【桂枝湯】桂枝三錢去皮 芍藥三錢 甘草三錢炙 生薑三錢 大枣二枚擘  
右五味咬咀。以水微火煮。去渣。適寒溫。頓服。

【麻黃湯】麻黃三錢去節 桂枝二錢去皮 甘草一錢炙 杏仁七個湯泡去皮尖  
右四味以水先煮麻黃。去上沫。納諸藥再煮去滓。溫服。

【加味逍遙散】芍藥酒炒 當歸 白朮炒 茯苓 甘草炙 柴胡 丹皮 梔子各二錢  
右加煨薑三片薄荷少許。煎服。

【七味都氣丸】熟地砂仁酒拌九蒸九晒八兩 山茱萸 肉酒潤四兩 山藥四兩 牡丹皮三兩 茯苓

苓乳拌三錢 澤瀉三兩 五味子三兩

研爲末。練白蜜和下。每服三錢。淡鹽湯送下。

【四生丸】生薄荷 生艾葉 生柏葉 生地黄各等分

右爛研。圓如鷄子大。每服一丸。水三盞。煎至一盞。去滓。溫服。無時

【保元湯】黃耆三錢 人參二錢 甘草一錢 肉桂春夏二三分秋冬六七分

右四味水煎服。

（吐血通治單方）○用伏龍肝末半升。新汲水一升。淘汁。和蜜服。（廣利方）⑤吐血不止者。

用京墨磨汁。同蘿蔔汁飲。或生地黄汁亦可。（集簡方）⑥黃芪二錢半。紫背浮萍五錢爲末

。每服一錢。薑蜜水下。（聖濟總目）⑦三七一錢。自嚼。米湯送下。（集簡方）⑧黃連一

兩。搗散。每服一盞。水七分。入鼓二十粒。煎至五分。去滓溫服。（濟衆方）⑨麥門冬去

心一斤。搗取自然汁。入蜜二合。分作二服。即止。（活人心統）⑩鷄子白三個。好香蜜二

兩爲末。和丸如梧子大。每服十丸。不拘時。生地黄汁送下。（瑞竹堂方）⑪桑樹根皮。去

粗皮。用裹白皮。微精豬肉。淡食數次。奇效。（摘元方）⑫地榆三兩。米醋一升。煮十餘

沸。去滓。食前服。（聖惠方）⑬槐花燒存性。入麝香少許。研勻。糯米飲下三錢。（普濟方）

醫藥大全 內科門：（吐血）：鼻衄鼻血：吐血單方：鼻衄單方 七七



(鼻衄通治單方) ①麥門冬去心。生地黃各五錢。水煎服。(保命集) ②蘿蔔搗汁半杯。入酒少

許。熱服。並以汁注鼻中。甚良。(衛生易簡方) ③亂髮燒灰。吹之立止。男用母髮。女用

父髮。永不再發。(應驗方) ④馬蘭頭搗爛。漚汁飲之。立愈。乾者無效。婦人不可飲。因

其性甚涼。(孫一松試效方) ⑤人乳治之亦效。惟須將阻乳頭對準鼻管擗之。使射入管中。

其血立止。(西陽雜俎)

## (哮喘)

(總說)

哮喘者。氣爲痰阻。呼吸有聲也。有熱因冷因之分。熱者中熱而哮是也。冷者遇風寒而發者是也。俱與喘相似而實不同。而喘復有虛實之分。治宜細辨。

### 一、暑熱哮喘

(病因)哮喘者。氣爲痰阻。呼吸有聲。當暑月火盛之時。痰熱內鬱。留於肺絡。熱痰氣逆而致者。是爲熱哮。

(病狀)喉若拽鋸。甚則喘咳。不能臥息。身熱口渴。脈滑數。一派痰熱之象。且多病於木火體質之人。惟其爲病。非朝夕所發。宿根積久。隨感隨起。久則胸突背駝。此爲肺絡敗。於法爲不治。

〔療法〕治須清疏。禁用熱劑。恐痰火更升也。宜服桑白皮湯以清其肺。勢猛者。先以四磨飲逆而折之。

【桑白皮湯】桑白皮五錢 乾薑一釐 桂心五寸 大棗二十枚

右切。黃酒一斛。煮三四沸去滓。分溫服。衣適厚薄。毋令汗出。

【四磨飲】人參 檳榔 沉香 天台 烏藥

右四味各濃磨水。取七分。煎三五沸。空心溫服。

## 二、風冷哮喘病

〔病因〕貪涼露臥。風寒外束。膠痰與陽氣併於膈中。不得洩越而致者。是爲冷哮。

〔病狀〕冷哮有二。一則中外皆寒。現惡寒痰多脈沉細等象。俗所謂老痰風是也。一則外寒內熱。

現惡寒口渴脈浮數等象。俗所謂寒包熱是也。

〔療法〕身發熱者。外有感冒。宜先解表。服防風瀉白散。佐以化痰之藥。身無熱。無外邪者。消痰理氣爲主。宜服二陳湯。或小半夏湯。患此症者。必脾腎陽虛。往往老年人多患之。故平時宜健脾攝腎。四君子湯。腎氣丸主之。腎陽壯則津液化。脾陽健則痰不聚。此症遂少成矣。

【防風瀉白散】防風 桑皮炒 地骨皮各一兩 甘草五錢

右爲末。每服一二錢。入粳米百粒水煎。

【二陳湯】半夏製 茯苓各三錢 陳皮二錢去白 甘草一錢

右四味。加薑三片。水煎服。

【小半夏湯】半夏半兩 生薑五片

右二味以水煮。溫服。

【四君子湯】人參 白朮 茯苓 甘草各二錢

右加薑棗。水煎服。

【腎氣丸】乾地黄八兩九蒸爲度搗膏 乾山藥 山萸肉各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各三兩 桂

枝 附子 車前子 牛膝各一兩

右八味爲末。煉蜜丸。如桐子大。酒下十五丸。日再服。

### 三、實症喘呼

(病因)實喘者。肺感邪氣。氣道壅塞。升降出納失常。經云。邪入六腑。則身熱不時臥。上爲喘

呼。又云。不得臥。臥則喘者。水至客之。此舉喘之實者也。

(病狀)實喘之症。其來驟。其脈實。喘時胸脹氣粗。聲高息涌。不得臥。臥則甚。澎々然若不能容。惟以呼出爲快。責在肺也。

(療法)宜卽服定喘湯。垂愈。以生熟苡米煎湯代飲。速效。

【定喘湯】麻黃 款冬花 半夏 桑皮各三錢 蘇子二錢 杏仁一錢五分 白果二十一枚碎炒  
黃芩 甘草各一錢

右以水煎。徐徐服。

#### 四、腎虧虛喘

(病因)虛喘者。腎元虧損。腎氣不納而上於肺。肺爲氣衝。不能自主。經云。秋脈不及。令人喘。又云。勞則喘息。汗出。此明喘之虛者也。

(病狀)虛喘之症。其來徐。其脈虛。喘時慌張氣怯。聲低息短。惶惶然若氣欲斷。提之若不能升。吞之若不相及。勞動則甚。但得引長一息爲快。責在腎也。

(療法)宜服七味都氣丸。愈後戒絕房事。換勞。庶不致復發。

【七味都氣丸】熟地砂仁酒拌九蒸九晒 山藥羊肉酒潤四兩 山藥四兩 牡丹皮二兩 茯苓乳拌

三兩 澤瀉三兩 五味子三兩

右研末。煉白蜜和。水泛亦可。每服三錢。淡鹽湯送下。

〔暴喘單方〕有痰梗塞者。細對厚朴七八錢。薑七片。水二椀。煎七分服。滓再煎服。不過數服

愈。(資生經)

〔肺虛喘急單方〕(一)人參末。湯服一錢。日五六服。效。(肘後方) (二)光明生鍾乳粉五錢。糯米

飯團和。飯籠內蒸過。研丸梧子大。每溫水下一丸。(聖濟總錄)

〔肺熱氣喘單方〕(一)肺熱喘急。寒熱往來。不堪服藥者。用桃皮。芫花。各一升。以水四升。煮

取一升。以故布納汁中。取薄胸口。溫四肢。盈數刻。即止。(圖經) (二)生茅根一握。剉碎

水二盞。煎一盞。食後溫服。甚者三服止。(聖惠方)

〔氣喘單方〕(一)杏仁。桃仁各半兩。去皮尖。炒研。水調生麵。和丸梧子大。每服十九。薑蜜湯

下。微利爲度。(聖濟總錄) (二)氣喘。時有咳嗽。茶子百合。等分爲。末蜜丸梧子大。每服

七丸。新汲水下。(聖惠方) (三)韭汁飲一升。效。(集簡方) (四)澆白搗汁。飲之。(聖惠方)

〔馬兜鈴二兩。去殼及膜。酥半兩。入碗內拌勻。慢火炒乾。甘草炙一兩。爲末。每服一錢

水一盞。煎六分。溫時。或噴之。○簡要集方

〔痰喘單方〕 ① 喘而有痰者。用馬蹄香焙研。每服一三錢。正發時。淡醋調下。少頃。吐出痰涎

。爲驗。○普濟方 ② 肺濕痰喘。甜葶藶炒爲末。棗肉丸服。○摘元方 ③ 蘿蔔子炒。杏仁

去皮尖炒。等分。蒸餅丸。每服三五十丸。時時津嚥。○醫學集成 ④ 苦丁香三個爲

光。水調服。吐痰即止。○集驗方 ⑤ 桔梗一兩。童便半升。煎四合。去滓。溫服。○聖惠

方

〔老年氣喘〕 蘿蔔子炒研末。蜜丸梧子大。每服五十丸。白湯下。○濟生秘覽

〔痰喘單方〕 浸濕海帶四兩。煎湯。調飴糖服。○良方

〔哮喘通消〕 白鳳仙花全料。冷開水洗淨泥污。連根帶葉。搗爛絞汁。須稱準分量。加上好高粱

。如汁有一兩。加高粱一兩。向日晒之。候冷。以手蘸汁。輕拍背盲穴。隨蒸隨拍。初覺微

冷。旋熱旋涼。繼而微痛乃止。用巾搥乾。勿使受風。連行數日。輕者即愈。○國經

### （三消）

（總說）

三消之症。皆燥熱積聚也。渴而多飲爲上消。消穀善饑爲中消。口渴小便如膏

者爲下消。大法。治上消者。宜潤其肺。並清其胃。治中消者。宜清其胃。兼

滋其腎。治下消者。宜滋其腎。兼補其肺。夫上消清胃者。使腎火不得傷肺也。中消滋腎者

醫藥大全 內科門：（三消）：哮喘單方：三消總說：土焦消渴 八三

。使相火不得攻胃也。下消清肺者。滋本源以主水也。三消之治。不必專執本經。而滋其化源。則病易痊矣。

## 一、上焦消渴

(病因)上消者。心肺爲病。內經謂心移於肺。傳爲隔消。又謂心肺脉微小。皆爲消瘴。是也。肺本燥金。心復移以熱。火爆相合。因而膈上焦煩。乃氣受傷。陰血暗耗之候。簡言之。即津液枯也。

(病狀)膈上焦煩。大渴引飲。飲而善消。舌上赤裂。咽如火燒。小便頻數。病屬上焦。謂之隔消。大便如常。

(療法)宜清心火。養肺陰。兼清其胃。那二冬湯甚驗。愈後。以蓮心糯米煮食。收效頗佳。

【二冬湯】天冬二錢去心 麥冬三錢去心 花粉一錢 黃芩一錢 知母一錢 甘草五分 人參五分 荷葉一錢

右水煎服。

## 二、中焦消渴

〔病因〕中消者。脾胃爲病。內經謂瘴成爲消中。又謂邪在脾胃。陽氣有餘。陰氣不足。則熱中善飢是也。夫陽明雖氣感熱壯。然以血多津守。未嘗有所飢。今言其飢。則陽盛而傷陰。枯其津液。故時欲飲食以濟之。

〔病狀〕多食善肌。精微不榮肌肉。自汗。大便堅。小便數而甜。病屬中焦。謂之中消。

〔療法〕服調胃承氣湯或生地八物湯。皆可見效。惟病後不宜服膏粱芳草石藥之類。

【調胃承氣湯】大黃四錢去皮清酒浸 甘草二錢炙 芒硝半兩

右三味咬咀。以水升半。先煮大黃甘草。取半升。去滓。納芒硝。更上火微煮令沸。少少溫服。

【生地八物湯】生地三錢 山藥一錢五分 知母一錢五分 麥冬三錢 黃芩一錢 黃連一錢 黃柏一錢 丹皮一錢五分 荷葉二處

右水煎溫服。



### 三、下焦消渴

(病因)下消者。肝腎爲病。即西醫之謂糖尿病也。自汗口渴頻數而膏濁不禁。肝腎主之。又謂肝腎脈微小。皆爲消瘵是也。坎之爲象。一陽居於二陰。腎陰久虧。孤陽無依。蒸燬精金。肺被火燬。不能管束津液。上朝咽喉。而反輸下矣。

(病狀)煩燥引飲。飲水不多。隨即尿下。小便多而濁。脛膝枯細。骨節痠疼。精屬下焦。謂之腎消。

(療法)下消主乎肝腎。虛多實少。治宜滋陰降火。服六味地黃丸極效。

【六味地黃丸】乾地黃四兩九蒸爲度搗膏 乾山藥 山茱萸各二兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各兩半 石六味爲末。煉蜜丸。如桐子大。酒下十五丸。日再服。

(消渴通治單方) ①白芍藥。甘草等分爲末。每用一錢。水煎服。日三服。(陳日華經驗方) ②

生芭蕉根搗汁。時飲一二合。(聖惠方) ③晚蠶沙焙乾爲末。每用冷水下二錢。不過數服。

即愈。(斗門方)

(消渴尿多單方) 黃連末蜜丸瘳子大。每服三十九。白湯下。良效(靈方)

(腎消單方)時々飲水。小便如膏油。茴香炒。苦棟子。各等分。爲末。每食前酒服二錢。

(經驗方)

(老人消渴單方) 寒食大麴一升。水煎五升。入飴糖二合。渴即飲之。大效。(奉親養老書)

(痰飲)

(總說)

飲則清稀。故爲陰盛。痰則稠濁。故爲陽盛。稠濁是熱痰。屬心也。沫清是寒痰。屬腎也。少而粘連。咯不易出。是燥痰屬肺也。多而易出。是濕痰。屬脾也。抽搐眩暈。是風痰。屬肝也。膈上痰滿。嘔吐痰涎。此飲留於膈間。名曰伏飲也。喘咳而腫不得臥。此飲留於肺。名曰支飲也。飲流四肢。身體重痛。此飲流行於體。名曰溢飲也。咳嗽引脇疼痛。此飲留於脇下。名曰懸飲也。素盛今瘦。漉々有聲。水走腸間。此飲流於腸胃。名曰痰飲也。凡餘留於胸肺則喘滿。短氣而渴。飲留於脇下則心下悸或背心寒冷也。

## 一、濕停痰症

(病因)濕痰皆屬於脾。其因有三。一因脾虛生濕。積濕生痰。一因濕邪傷脾。脾陽不運。濕停爲痰。一因酒濕釀痰。

(病狀)脈緩面黃。肢體沉重。腹脹嗜臥。納穀不香。其痰多而易於咯出。倘流注肌肉。必變痰核。

醫藥大全 內科門：(痰飲)：下焦消渴：消渴通治

流入骨節。臂痛難舉。

(療法)輕者宜服二陳湯。重者宜服控涎丹。愈後。可用異功散調理。更宜戒茶酒。薄滋味。

【二陳湯】半夏製 茯苓各三錢 陳皮二錢去白 甘草一錢

右四味加薑三片。水煎服。

【控涎丹】甘遂 大戟 白芥子等分

右爲末。煮。糊丸桐子大。晒乾。臥時。淡薑湯或熱湯下。五七丸至十九。

【異功散】人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮各二錢

右加薑棗。水煎服。

## 二、燥火痰症

(病因)燥痰皆屬於肺。肺失清肅。津化爲痰。

(病狀)脈滑面白。喉癢氣短。咳引胸痛。其痰少而不易咯出。此症失治。多變肺痿肺癆等症。殊

屬危險。初起宜急治之。

(療法)宜服貝母瓜蒌散。加海蛤粉杏仁。或用海螵及萊菔子齊。煎湯飲之。愈後忌食辛辣。

【貝母瓜蒌散】貝母一錢五分 瓜蒌一錢 花粉 茯苓 橘紅 桔梗各八分  
右水煎服。

### 三、風邪痰症

（病因）風痰皆屬於肝。肝風內動。肝火隨之。風火相煽。煉津爲痰。

（病狀）脈弦而青。頭目眩暈。胸脇滿悶。驚悸善怒。甚痰清而多泡。有時上逆。蒙閉神機。騷擾。

厥神昏。四肢抽搐。喉間痰聲如鋸。

（療法）輕者宜服小半夏加茯苓湯。重者可先服稀涎散吐之。愈後宜安心靜養。毋動肝火。

【小半夏加茯苓湯】半夏五錢 茯苓三錢 生薑三錢

右作一服。水一盞。煎七分。服不拘時。

【稀涎散】江子仁六粒 牙皂三錢 明礬一兩

右先化開礬。入二味。待礬枯爲末。每用三分吹入喉中。取吐。

### 四、濕熱痰症

（病因）寒痰皆屬於心。心火熾盛。與濕相合。濕熱蘊積。變成爲痰。

（病狀）脈洪面赤。煩熱口乾。小瘦短赤。昏沉多睡。其痰黃厚成塊。甚或謔語狂亂。

（療法）服金珠化痰丸。牛黃丸。礞石滾痰丸皆見效。愈後忌食油膩辛熱。

【金珠化痰丸】辰砂研飛二兩 生白龍腦細研半兩 皂莢子炒黃色 白礞研 鉛白霜細研 天竺

黃研各一兩 金箔爲衣二十片 半夏湯洗七次炙黃四兩

右以半夏。皂莢仁爲末。與諸研勻。生薑汁煮麵糊。丸如梧桐子大。每服十九。至十五丸。

生薑湯。食後臨臥服。

【牛黃丸】膽星 全蠍去足焙 蟬蛻二錢五分 牛黃 白附子 礞石洗焙 防風 天麻錢半 麝

香五分

煮棗肉和水銀五分。細研入藥末爲丸。荊芥薑湯下。

【礞石滾痰丸】青礞石二兩 沉香五錢 大黃酒蒸 黃芩八兩

右水和爲丸。辰砂爲衣。每服一二錢。開水下。

## 五、寒痰暴厥

〔病因〕痰瘵皆屬於腎。腎中命火不足。水泛爲痰。

〔病狀〕脈沉而黑。小便不利。手足清冷。小腹拘急。其痰有黑點而稀薄。甚則暴厥。致死極易。

〔療法〕宜服金匱腎氣丸。若暴厥者。宜三生飲。須遠房室。忌飲冷。

〔金匱腎氣丸〕熟地黃四兩 薯蕷二兩 山茱萸二兩 澤瀉兩半 茯苓兩半 牡丹皮兩半 桂枝

附子炮各半兩

右八味末之。煉蜜和丸。如梧子大。酒下十五丸。加至二十五丸。日再服。

〔三生飲〕南星五錢生用 川烏去皮生用二錢 附子去皮生用二錢 木香八分

右每服五錢。薑水煎。加入參一兩。

## 六、濕氣痰飲

〔病因〕素體肥胖。濕氣充斥。復因中氣虛弱。以致肌滕之水。不走網膜。反入於內。而走腸間。

身遂瘦削。

〔病狀〕脈弦而滑。其人素盛今瘦。水走腸門。漉漉有聲。心下覺冷。頭目眩暈。

〔療法〕宜服苓桂朮甘湯。健脾而化水飲。或合二陳湯以燥之。或合五苓散以利之。隨證選用。慈

後忌食豬肉百日。

【苓桂朮甘湯】茯苓四錢 桂枝 白朮各二錢 甘草二錢

右四味。以水煮。溫服。

【二陳湯】方見濕痰。

【五苓散】澤瀉一兩一分 猪苓去皮 白朮 茯苓各三分 桂二分去皮

右五味爲末。白飲服方寸匕。日三服。

## 七、水停懸飲

(病因)肝失疏泄。三焦不利。水停脅內之板油。懸度不下。留積爲飲。

(病狀)脈弦而緊。咳唾白沫。脅下引痛。脅乃肝部。板油居之。飲在板油。肝氣拂逆。而肺氣亦

不順矣。故咳而脅下引痛。

(療法)宜服苓桂朮甘湯去甘草。加甘遂。

【苓桂朮甘湯】方見痰飲。

## 八、溢飲浮腫

〔病因〕三焦水道不利。水入膈膜。不能下走網油。以達膀胱。遂致外溢於肌腠。或走於四肢。

〔病狀〕脈浮而弦。肢節作腫。身體疼痛。汗不得出。乾嘔喘咳。甚則週體浮腫。指臂不能舉動。

喘急不能安臥。

〔療法〕宜服小青龍湯或越婢湯。分別熱與之。

【小青龍湯】麻黃去節芍藥各三錢 五味子八錢 乾薑 甘草炙 細辛 桂枝去皮各三錢 半夏

五錢湯洗

右八味以水一斗。先煮麻黃。減二升。去上沫。納諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。

【越婢湯】麻黃六錢 石膏八錢 生薑三錢 甘草二錢 大棗五枚

右五味以水先煮麻黃去上沫。納諸藥再煮。溫服

## 九、支結飲症

〔病因〕水氣不化。支結於內。其證有四。或在肺。或在腸。或在心下。或在三焦之網膜。

醫藥大全 內科門：(痰飲)：溢飲浮腫：支結飲症



（病狀）脈弦而細。在肺者。欬逆偷息。氣短不得臥。在腸者。脹滿。在心下者。心下痞。嘔吐。在三焦者。其人若冒眩。形如腫。

（療法）在肺者。宜服葶藶大棗瀉肺湯。在腸者。宜服厚朴大黃湯。在心下者。宜服小半夏加茯苓湯。在三焦者。宜服澤瀉湯。

【葶藶大棗瀉肺湯】葶藶熬令黃色搗丸如彈子大。大棗十二枚

右洗以水三升。煮棗取二升。去棗。納葶藶煮取一升。頓服。

【厚朴大黃湯】厚朴五錢 大黃三錢 枳實二枚

右三味以水煮。溫服。

【小半夏加茯苓湯】半夏五錢 生薑三錢 茯苓三錢

右三味以水煮。溫服。

【澤瀉湯】澤瀉五錢 白朮二錢

右二味以水煮。溫服。

## 十、伏飲喘咳

(病因)水飲不散。伏於胸中。即其肺氣。則痰滿喘欬。阻其中氣。則吐痰。伏於膈背。太陽表邪外束。則寒熱背痛。伏於上焦。阻絕清升之氣。則目淚自出。飲伏胃家。胃陽滯塞。不能四布。故身振振劇也。

(病狀)痰病喘欬而吐。發則寒熱背痛腰疼。目泣自出。其人振振身劇劇。

(療法)宜服小青龍湯或木防己湯。愈後並宜勤於運動。促行氣血。以防痰飲再伏。

【小青龍湯】方見溢飲。

【木防己湯】木防己三錢 石膏鷄子大二枚 桂枝二錢 人參四錢

右四味以水煮。溫服。

(痰飲通治單方) ①頑痰不化。石膏一兩。石綠半兩。並水飛。麴糊。丸葶豆大。每服十丸。溫

水下。吐去痰一二碗。不損人。(瑞竹堂方) ②礬石一兩。水二升。煮一升。納蜜半合。頓

服。須臾大吐。未吐。飲稻熟湯引之。(外臺秘要) ③絲瓜一條。研細末。棗肉爲丸。彈子

大。每服一丸。好酒化下。(經驗方) ④白芥子五錢。白朮一兩爲末。棗肉和搗。丸梧子大

。每白湯服五十丸。(摘元方) ⑤橘皮半兩。微熬爲末。水煎代茶。細呷。(食醫心鏡) ⑥

厚朴一兩。薑汁炙黃。爲末。非時。米飲調下二錢。(靈惠方) ⑦生南星。刮去皮。半夏湯

泡七次。各五兩爲末。以薑汁和爲餅。以楮葉蓋之。令發黃色。曬乾。須五六月內做。合時用香附子一兩。製如常法。以陳麴二錢。共爲末。水糊。丸梧子大。每服四十九。食後薑湯下。（經驗方）  
② 薄荷末煉蜜。丸如芡子大。每嚼一九。白沙糖和之亦可。（簡便方）  
③ 冷瘕惡心。葦芩一兩爲末。食前。用米湯服半錢。（聖惠方）  
④ 砂仁搗碎。以蘿蔔汁浸透。焙乾爲末。每服一二錢。食遠。沸湯服。（簡便方）  
⑤ 飲酒。痰癖兩脅脹滿。時夜嘔吐。腹中如水聲者。括蕞實去殼焙一兩。神麴炒半兩爲末。每服二錢。葱白湯下。（聖惠方）  
⑥ 茯苓。吳茱萸等分。蜜丸。日再服。效。（驗方）

# 疝氣

（說總）

經曰。任脈爲病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。瘕聚者。即女子之疝也。七疝主任者。原以任脈起中極。循腹裡也。七疝主肝者。蓋以肝經過腹裡環陰器也。是以諸疝病無不由是二經。故主之也。疝病之症。少腹痛引陰丸。氣上衝心。不得二便者。爲衝疝也。少腹痛引陰丸。肝之逆氣衝胃作吐者。爲厥腹也。少腹之氣不伸。左右癢塊作痛者。爲瘕疝也。臥則入腹。立則出腹。入囊似孤之疝則出穴而溺。夜則入穴而不溺者。爲孤疝也。少腹痛引陰丸。橫骨兩端狀。如黃瓜。內有膿血者。爲瘕疝也。少腹痛引陰丸。小便不通者。爲瘕疝也。少腹不痛。陰囊腫大頑硬者。爲癩疝也。

## 一、衝心疝氣

〔病因〕此由於寒濕之邪。久鬱於內。化而爲熱。客寒觸之。遂成此疾。

〔病狀〕氣從少腹上衝心而痛。不得前後。甚則二便不通。數久不愈。漸變衝心疝氣。證似蟲脹。

〔療法〕宜服禹功散加炮薑。枳實。青皮。下之。

【禹功散】黑牽牛四錢 茴香一錢炒

右爲末每一錢薑汁調下。

## 二、狐狸疝氣

〔病因〕肝所生病爲狐疝。由於寒客厥陰。沉結下焦。邪挾肝風而上下些。

〔病狀〕睪丸偏有大小。臥則入腹。立則出腹。時上時下。脹緊攻痛。久則正氣日衰。病氣日盛。

以致不能坐立。坐立則脹墜疼痛欲絕也。

〔療法〕宜服蜘蛛散。或補中益氣湯。外用牡蠣六兩。煨取二兩。乾姜一兩。焙末。水調塗患處。

【蜘蛛散】蜘蛛四枚熬焦 桂枝二錢

醫藥大全 內科門…(疝氣)…衝心疝氣…狐狸疝氣

右爲散。取八分一七。飲和服。日再服。蜜丸亦可。

【補中益氣湯】黃耆炙 人參 雲朮炒一錢五分 甘草炙一錢 陳皮五分 當歸一錢 升麻 柴胡各五分

右八味加生薑三片。大棗二枚。水煎溫服。

### 三、癰疝氣

(病因)三陽爲病發寒熱。其傳爲癰疝。由於太陽寒濕之邪。下結膀胱所致。

(病狀)少腹控卵。腫急絞痛。甚則陰囊腫大。如斗如拷。或頑固不仁。甚者腎囊腫大。與身齊等。若腎囊破裂。卽致不救。

(療法)宜服濟生橘核丸。

【濟生橘核丸】橘核炒 海藻 昆布 海帶各泡 川椒肉炒 桃仁炒各一兩 製厚朴 木通

枳實炒 延胡索炒 桂心 木香各一兩

右爲細末。酒丸桐子大。每服七十丸。酒鹽湯下。

#### 四、厥逆疝氣

〔病因〕肝經素有火邪。寒氣外鬱。肝不條達。木乘土位。遂成斯疾。

〔病狀〕脈大而虛。腹中疼痛。上下左右。攻衝無時。甚則厥逆。

〔療法〕宜服川棟子丸。

【川棟子丸】川棟子淨。肉一斤。分四處。四兩用麵一合。斑貓四十九個。同麩炒黃色。去麩。斑貓不用。四兩用麵一合。巴豆四十九粒。同麩炒黃色。去麩。巴豆不用。四兩用麩一合。巴戟一兩。同麩炒黃色。去麩。巴戟不用。四兩。用鹽二兩。茴香一合。同炒黃色。去鹽及茴香不用。木香一兩。不見火。破故紙一兩。炒香爲度。

右爲末。酒糊丸如桐子大。每五十丸鹽湯下。甚者日進三兩服。空心食前服最宜。

#### 五、癥痞疝氣

〔療因〕脾傳之腎爲癥痞。由於脾經濕氣。下注於衛任交會之所。

〔病狀〕腹有癥。痞痛而且熱。時下白濁。女子不月。男子囊腫。

醫藥大全 內科門：(疝氣)：癥痞疝氣：癰爛疝氣

〔療法〕宜服龍膽瀉肝湯。去生地。加橘核。桃仁。吳茱萸。丹參。白茯苓。

〔龍膽瀉肝湯〕龍膽酒炒三分 黃芩炒 梔子酒炒 澤瀉一錢 木通 車前子各五分 當歸二分

炒酒洗 柴胡 甘草 生地酒炒各三分

右水煎服。

## 六、癩爛疝氣

〔病因〕肝不條達。血凝氣滯。肝脈循陰器。故結於陰囊而爲癩疝。

〔病狀〕肝脈滑甚。卵核腫脹。備有大小。堅硬如石。痛引臍腹。甚則膚囊因腫脹而成瘡。時出黃

水。或成癰潰爛。或下膿血。

〔療法〕宜服濟生橘核丸。或桃仁。紅花。玄胡索。山查。橘核。荔枝核之屬。

〔濟生橘核丸〕方見癩疝

## 七、癰結疝氣

〔病因〕脾經濕熱。下注膀胱。膀胱之旁爲血室。濕熱與血凝結而成也。

(病狀)脾脈微熱。少腹滿痛。腎囊腫大。小便秘澀。甚則眼緊欲絕。

(療法)宜服五苓散加桃仁。山查。川棟子。茴香。

【五苓散】澤瀉二兩一分 猪苓去皮 白朮 茯苓各三分 桂二分去皮

右爲末。白飲服方寸七。日三服。

疝氣通治單方 ①大茴香炒。青皮炒。烏藥。良薑各等分。共爲末。空心溫酒下。(墨娥小錄)

②鯽魚十尾。同茴香煮食。久久自愈。(生々編) ③鮮荔枝殼。及核。盛入盆中。文火燂之

。患者以臀部承其上。徐々燂之。三四次即愈。(儒門事親) ④連蒂老絲瓜。燒存性。研末

每服三錢。熱酒調下。甚者亦不過二三服。(養生集) ⑤茴香炒作兩包。更換熨。(簡便單

(諸汗)

(總說)

方)無因汗出。謂之自汗。自汗乃表陽虛。汗出則惡寒冷。睡則汗出。覺則汗止。謂之盜汗。盜汗爲陰虛。更有所謂黃汗者。得之汗出入水中浴也。俱宜慎重治之。勿忽。

## 一、陽虛自汗

(病因)自汗屬陽虛。陽者。衛外而固者也。陽氣內虛。陰中無陽。則汗隨氣泄。經謂陰勝則身



汗出即其候也。過服汗劑則亡陽而汗不止。即其證也。

(病狀)陽虛者。不因勞動。不因發散。識然汗自出。或每至天明時汗出。身寒而冷。脈象虛微。久延不治。則津液俱虧。易成損證。

(療法)宜補氣以衛外。固衛則表氣實而腠理下疏。可服黃管建中湯。惟此證往々愈而復發。欲杜其幣。須常以黃管。浮小麥。黨參。棗仁四者。煎湯作飲。

【黃管建中湯】黃管三錢 桂枝五錢去皮 甘草五錢炙 大棗四枚 芍藥六錢 生薑三片 膠飴二匙

右以水煮。去滓。納膠飴。更上微火消解。溫服。

## 二、陰虛盜汗

(病因)盜汗屬陰虛。陰者內營而斂藏者也。陰氣虛弱。則生內熱。而迫液外泄。經謂腎病者癯汗憎風。即此意也。

(病狀)陰虛者。寐中汗竊出。醒後倏收。自不知汗何時泄。惡風口渴。脈虛細而散。仲景云。男子平人脈虛弱細微者。善盜汗也。久不已。亦延入損門。若汗出如珠不流者。此爲絕汗。死

不可治。

〔療法〕宜補陰以營內。填營則裏真固而津液不泄。可服當歸六黃湯。並時以經絡桑葉爲末。茶調服。戒暴怒。恐引動肝火也。

【當歸六黃湯】當歸 生地 熟地 黃芩 黃芪 黃連 黃柏 隨症之輕重爲量。  
右水煎服。

### 三、黃汗黏衣

〔病因〕黃汗者。汗出黏衣作黃色也。因脾熱汗出。用水浸浴。水入毛孔而成。仲景所謂黃汗得之汗出入水中浴。水從汗孔入得之是。蓋氣從汗孔而入。鬱蒸爲熱。濕熱相蘊。遂成黃汗也。

〔病狀〕身腫而冷。狀必周痺。胸中塞。不能食。及緊痛。暮躁不得眠。汗出而渴。狀如風水。汗沾衣。色正黃如柏汁。脈見沉。

〔療法〕宜服黃耆桂枝芍藥苦酒湯。晝熱者加防風。夜熱者加當歸。食少者加白朮。茯苓。

【黃耆桂枝芍藥苦酒湯】黃耆 芍藥 桂枝 苦酒  
右隨症之輕重用量。水煎服。不拘時。

(續汗通治單方) 自汗⊖身上常擦燒酒。便能止汗。(西藥大成) ⊕鬱金末。以時。調塗乳上。有效。(集簡方) ⊕粳米碾粉。盛絹包內。時時撲之。(保命集) 盜汗⊖小麥炒熟。泡湯飲之。約一大椀。即止。(易簡方) ⊕白芷一兩。辰砂五錢。爲末。每服二錢。溫酒下。屢驗。(集驗方) ⊕經霜桑葉。研極細末。米飲湯下。汗立止。(丹溪心法) ⊕熟艾二錢。白茯苓三錢。烏梅三枚。水一杯。煎八分。以時溫服。(真人方) ⊕倍子去蜂末。炙乾。研末。稍用糯米發調和。填臍中。外用舊膏藥貼之。勿令洩氣。兩次即愈。(席延賞方)

## 痺症

(總說)

三痺之因。風寒濕三氣雜合而爲病也。其風邪勝者。其痛流走。故曰行痺。

寒邪甚者。其痛甚苦。故曰痛痺。濕邪甚者。其痛重著。故曰著痺。此爲病之因而得名曰三痺也。又有曰五痺者。謂皮。脈。肌。筋。骨之痺也。以秋時遇此邪爲皮痺。則皮雖麻尙微覺痛癢也。以夏時遇此邪爲脉痺。則脉中血不流行而色變也。以長夏遇此邪爲肌痺。則肌頑木不知痛癢也。以春時遇此邪爲筋痺。筋筋攀節痛屈而不伸也。以冬時遇此邪爲骨痺。則骨重痠疼不能舉也。久痺不已。傳而入腑。則爲腸痺胞痺矣。

## 一、三痺疼痛

〔病因〕風寒濕三氣雜至。合而成痺。風勝者爲行痺。寒勝者爲痛痺。濕勝者爲著痺。凡痺之類。逢寒則急。逢熱則縱。

〔病狀〕風勝行痺。走注疼痛。寒邪勝者。其痛甚苦。濕邪勝者。其痛重著。風盛脈浮。寒甚脈緊。濕甚脈濡。

〔療法〕風勝者宜服防風通聖散。寒勝者宜服家秘羌活湯。濕勝者宜服朮附湯。

〔防風通聖散〕防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷 麻黃 連翹 芒硝各半兩 石膏 黃芩 桔梗各一兩 滑石三兩 甘草三兩 荆芥 白朮 梔子各二錢 生薑三斤 右爲細末。每服三錢。

〔家秘羌活湯〕羌活 防風 秦朮 柴胡 葛根 獨活 川芎 蘇梗 木通 釣藤 隨症之輕重 用量

右水煎服。

〔朮附湯〕附子一枚泡去皮 甘草八錢炙 白朮一兩 生薑八切錢 大棗三枚 右五味以水煮。去滓。溫服。

## 二、五般痺症

〔病因〕凡風寒濕三氣。秋遇此邪爲皮痺。夏時遇此邪爲脉痺。長夏遇此邪爲肌痺。春時遇此邪爲筋痺。冬時遇此邪爲骨痺。

〔病狀〕皮痺則肌膚雖木。尙覺疼痛。脉痺則血脉不行。變色。肌痺則麻木不知痛癢。筋痺則筋掣節痛。屈而不伸。骨痺則骨重痠痛。不能舉動。皮痺不愈。內合爲肺痺。則喘滿咳嗽。脉痺不愈。內合爲心痺。煩悸噎乾。噎氣時恐肌痺不愈。內合爲脾痺。嘔痞肢解。筋痺不愈。內合爲肝痺。臥驚太息。

〔療法〕皮痺。氣實麻木者。用小續命湯加麻黃治之。氣虛麻木。用黃耆益氣湯加五味子治之。脉痺宜秦朮四物湯。肌痺宜黃耆桂枝五物湯。筋痺宜羚羊角散。骨皮宜拔毒膏。傳入而能五臟之痺。五痺湯可觀何臟之痺。加入引經之藥。

〔小續命湯〕麻黃 防己 人參 黃芩 桂心 芍藥 甘草 川芎 杏仁各二錢 防風三錢 附子 半枚 生薑五片

右咬咀。以水先煮麻黃三沸去沫。納諸藥再煮。作一服。

【黃耆益氣湯】黃耆炙 人參 雲朮炒各一錢五分 紅花 黃蘗各一錢 甘草炙一錢 陳皮五分

當歸一錢 升麻 柴胡各五分

右加生薑三片。大棗二枚。水煎溫服。

【秦艽四物湯】秦艽 當歸 熟地各三錢 川芎一錢五分 白芍二錢酒炒

右水煎服。

【黃耆桂枝五物湯】黃耆 芍藥 桂枝各三錢 生薑六錢 大棗二枚

右以水二升。煮取一升。溫服半升。日三服。或加人參亦可。

【羚羊角散】羚羊角 茯神各一錢 芎藭 防風 半夏 白芷 甘草各五分 枳殼 附子各三厘

右生薑半分。水煎服。

【拔痺膏】用生半夏爲末。同廣膠等分。先用薑汁對膏煎烱。調入半夏塗。

【五痺湯】片薑黃 羌活 白朮 防己各一錢 甘草炙五分

右薑水煎服。

### 三、腸胞痺症

〔病因〕凡風寒濕之氣。久痺不已。復感於邪。臟實不受。用而傳腑。則爲腸痺胞痺矣。胃附於腸。三焦附於膀胱。從其類。不另立名。

〔病狀〕口渴喜飲。小便秘。不脹則瀉。不瀉則脹。邪內傳於大小腸。謂之腸痺。凡少腹胞中。按如沃湯而痛。小便秘澀。鼻流清涕。邪傳膀胱。謂之胞痺。

〔療法〕腸痺宜服青皮飲。胞痺宜服清心蓮子湯。

【青皮飲】青皮 大腹皮 木通 枳殼各三錢 廣皮 白芍藥 甘草各一錢  
右水煎服。

【清心蓮子湯】黃芩 麥冬 地骨皮 車前子 石蓮肉各三錢 人參 黃芪 白茯苓 甘草各一錢  
錢

右水煎服。

〔手足風痺單方〕①白芷二分。熟附子一分爲末。每酒服半匙。日二服。以身中熱行爲候。十日便覺。忌豬肉冷水。（千金方）②威靈仙炒五兩。生川烏頭。五靈脂各四兩爲末。醋糊。丸

梧子大。每服七丸。鹽湯下。忌茶。(普濟方)

(風痺緩急單方) 葱豉仁十五兩。大附子十枚。炮爲末。每服一錢。日三服。(金匱要略)

(頑痺單方) 諸節不隨。腹內宿痛者。用原蠶砂炒黃。袋盛浸酒飲。(本草綱目)

## 痿症

(總說)

一 痿者。心。肝。脾。肺。腎。之痿也。痿屬燥病。故皆因肺熱而生也。陽明熱。不能成痿也。肺熱葉焦。陽明虛弱。津液不化。節骨失養。皮毛瑛痿。發爲痿躄不能行也。因而心氣熱爲脉痿。經節縱而不任地。肺兼心病也。因而腎氣熱爲骨痿。則腰脊不能舉。肺兼腎病也。因而肝氣熱爲筋痿。則筋失所養。拘攣不伸。肺兼肝病也。因而脾氣熱爲肉痿。則胃燥而渴。肌肉不仁。肺兼脾病也。

## 一、肺腑痿症

(病因) 或吐或下。或利小便。或因熱病。或陰虛亡津液。肺中乾燥。無津以輸佈。五臟失陰。上源水絕。下乃無所生化。

(病狀) 咳嗽咽乾。口渴泛吐白沫。皮毛憔悴。音聲不揚。時覺形寒。脉虛數。無氣以動也。若賦



吐白沫潮多。音啞聲嘶。無蕪華色。虛寒虛熱。納少。脈細欲絕。不渴或遺尿。多涎沫。皆肺痿之末路也。

〔療法〕肺虛熱。咽喉不利。宜服麥門冬湯。若不渴遺尿。頭眩吐涎沫。上虛不能制下。宜服甘草乾薑湯以溫之。咳嗽吐涎沫已愈。宜常服生脈散。平時代茶尤佳。並勿飲冷形寒以傷肺。

【麥門冬湯】麥門冬五錢 半夏一錢 人參三錢 甘草二錢 大棗二枚 粳米一握

右水煎。分三服。

【甘草乾薑湯】甘草四錢炙 乾薑二錢泡

右二味以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

## 二、心臟痿症

〔病因〕內而慾心妄動。外而起居如驚。則心火上炎。三陰在下之脈。亦厥逆而上。火盛水衰。顯陰血日損。

〔病因〕四肢關節不能活動。足脛縱緩。不能收持。如樞紐之折而不能提挈。面頰常赤。意亂心煩。脈多洪數。

【療法】凡脉果爲洪數。而在寸尤甚者。宜服導赤各半湯。

【導赤各半湯】生地 木通 川連各三錢 甘草五分 黃芩 山梔 犀角磨沖各一錢  
右水煎服。

### 三、肝臟痿症

【病因】惱怒傷肝。肝氣鬱鬱。木燥火生。則筋膜乾急。

【病狀】時覺口苦。兩脅攻刺作痛。筋膜乾急。筋縮而攣。

【療法】宜服清肝順氣丸。其筋縮而攣者。宜服舒筋飲。

【清肝順氣飲】柴胡 黃芩 山梔 蘇梗 青皮 枳殼各三錢 甘草一錢  
右水煎服。

【舒筋飲】片薑黃二錢如無以莖朮代之 赤芍 當歸 海桐皮去粗皮 羌活炙甘草各一錢  
右七味加姜三片。煎服。磨沖沉香末少許。

#### 四、脾臟痿症

(病因)或因水飲不謹。水積熱生。或因膏粱積熱。濕熱傷脾。

(病狀)唇焦齒燥。口乾作渴。飢肉不仁。身重不易轉側。縱緩不能舉動。

(療法)因水濕生熱者。宜服梔連平胃散。或梔連二陳湯。因膏粱積熱者。宜服瀉黃散。

【梔連平胃散】梔子 黃連 蒼朮米泔浸七日各五斤 陳皮去白 厚朴各三斤 薑汁炒 甘草三七

兩炙

右爲末。每服二錢。薑湯下。日三服。或水煎。每服五錢。

【梔連二陳湯】梔子 黃連 半夏製 茯苓各三錢 陳皮二錢去白 甘草二錢

右四味加薑三片。水煎服。

【瀉黃散】藿香七錢 山梔一兩 甘草二兩 防風四錢

右四味。同蜜炒爲末。每二錢煎服。

## 五、腎臟痿症

(病因) 思想無窮。意淫於外。入房太甚。諸筋弛縱。又有遠行勞倦。達大熱而渴。陽氣內伐。水不勝火。水虧於下。則腎熱而骨痿。

(病狀) 腰骨不舉。尻以代踵。脊以代頭。足不任地。骨痿不能起於床。

(療法) 兩足痿軟。內熱。不能步履。宜服二妙散合虎潛丸。

【二妙散】黃柏炒 蒼朮炒去皮

右爲末。生薑研。沸湯調服。如表實氣實者。少酒佐之。

【虎潛丸】龜板 黃柏各四兩 知母 熟地各三兩 牛膝三兩五錢 鎖陽 虎骨 當歸各一兩

芍藥一兩五錢 陳皮七錢五分 冬月加熟薑五錢

右爲末。煮羯羊肉。搗爲丸。桐子大。淡鹽湯下。

(瘵病通治單方) ①俗名軟癯是也。蒼朮。黃柏煎服。(經驗方) ②杜仲一兩。切碎。酒水各半

煎服。三日能行。又三日愈。(千金方) ③牛膝煎服。丸服。或浸酒服。(經驗方) ④葶

藶十二兩。杜仲四兩。搗末。每旦酒下三錢。忌牛肉。(集驗方) ⑤羊腎一枚。煮熟。和米

醫藥大全 內科門：(瘵症)：心臟瘵症肝臟瘵症

粉六兩。煉成乳粉。空腹食以愈爲度。

## 虛勞

(總說)

虛者。陰陽。氣血。榮衛。精神。骨髓。津液不足是也。損者。外面皮肉。脈。筋骨。內而肺心。脾。肝。腎消損是也。成勞者謂虛損。日久留連不愈。而成五勞。七傷。六極也。因復感者。謂不足之人。陽虛復感外寒。則損從皮毛。肺始陰虛。更生內熱。則損從骨髓。腎始內傷。飲食勞倦。則損從肌肉。脾始此虛損。成勞之因。其證有五。一損皮聚毛落。瀉漸惡寒。咳嗽。肺勞也。二損血脈虛少。男子面無血色。女子月經不通。心勞也。三損飲食減少。肌肉消瘦。大使溏瀉。脾勞也。四損兩脅引胸而痛。筋緩不能行。肝勞也。五損骨痿不能久立。午後發熱。盜汗骨蒸。腎勞也。七傷者。一爲恐懼不解則傷精。二爲穢傷思慮則傷神。三爲喜樂無極則傷魄。四爲悲哀動中則傷魂。五爲憂愁不已則傷意。六爲感怒不止則傷志。七爲勞倦過度則傷氣也。六極者。一爲筋極。二爲骨極。三爲血極。四爲肉極。五爲精極。六爲氣極也。

### 一、陽虛不足

(病因)經言精氣奪則虛。凡陽虛陰虛。不外精與氣而已。脾肺衛外而主氣。憂思鬱結。榮衛失和

。脾肺虧損。則成陽虛之症。亦有腎中真陽虛者。以腎有水火二藏也。

〔病狀〕經曰。陽虛生外寒。凡怯寒少氣。自汗喘乏。食減無味。嘔脹飧泄。皆陽虛之症。脈見大而無力。金匱所謂脈大爲勞。極虛亦爲勞也。腎陽虛者。兼見精氣清冷。目眩肢痠。膝下清冷。水泛爲痰等症。命門衰絕也。

〔療法〕宜服甘溫之品。保元湯。建中湯。歸脾湯並主之。腎陽虛者。則當與益火。八味丸主之。久不復者。宜人參。白朮。當歸。黃耆。杞子。山藥。胡桃。龍眼。大棗。茯苓。補骨脂。鹿茸。羊肉。人乳之屬。大劑與之。

【保元湯】黃耆三錢 人參二錢 甘草一錢 肉桂春夏二三分 秋冬六七分  
右四味水煎服。

【大健中湯】黃芪 當歸 桂心 芍藥 人參 甘草各一錢 半夏炮 黑附子炮各二錢半  
右藥每服五錢。加薑三片。棗二枚。煎服。

【小健中湯】桂枝三錢去皮 甘草三錢炙 大棗二枚 芍藥六錢 生薑三錢 膠飴二匙  
右六味以水煮。去滓。納膠飴。更上微火。消解。溫服。

【歸脾湯】人參 龍眼肉 黃耆各二錢半 甘草五分 白朮二錢半 茯苓二錢半 木香五分 當

歸 酸棗仁炒研 遠志各一錢

右加薑三片。水煎服。

【八味地黃丸】乾地黃八兩九蒸爲度搗膏 乾山藥 山萸肉各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各三兩

桂枝 附子各二兩

右八味爲末。煉蜜丸。如桐子大。酒下十五丸。日再服。

## 二、陰虛不足

(病因)陰虛亦由精氣虧損。而肝腎爲之主。肝主藏血。腎主藏精。精血消耗。則精髓枯竭。君相  
火炎。而城陰虛。以肝腎皆陰臟也。亦有腎中真陰虛者。經謂腎勞傷精。即指此也。

(病狀)經曰。陰虛生內熱。凡怔忡盜汗。欬血吐血。遺精崩漏。閉經骨蒸。皆陰虛之症。脉見數  
而無力。陰虛則弱。內熱則數也。腎陰虛者。兼見面赤唇紅。五心煩熱。口乾不寐。蓋陰虛  
於下。則陽浮於外也。

(療法)宜服甘潤之品。人參固本丸主之。腎陰虛者。則當與補水。六味丸主之。久不復者。宜麥  
冬。五味子。杏仁。川貝。熟地。烏菴蓉。烏骨鷄。阿膠。秋石。河車。龜膠。白蜜之屬。

大劑與之。並可煮海參。淡菜時食之。

【人參固本丸】人參二兩 天冬炒 麥冬炒 生地黄熟地黄四兩

右蜜丸。梧子大。每服十五丸。日再服。

【六味地黃丸】乾地黃八兩九蒸爲糜搗膏 乾山藥 山萸肉各四兩 丹皮白茯苓 澤瀉各三兩

右六味爲末。蜜丸桐子大。酒下十五丸。日再服。

### 三、五般勞症

（病因）精氣內奪則虛。積虛成損。積損成勞。乃精與氣虛憊之極也。越人謂自上損下者。一損肺。二損心。三損胃。四損肝。五損腎。自下損上者。一損腎。二損肝。三損肺。四損心。五損脾。五臟俱損。故曰五勞。

（病狀）肺勞者。皮毛枯槁而欬哈。心勞者。血脈不榮而盜汗。脾胃勞者。食少肌消而脹瀉。肝勞者。血虛筋緩而脅痛。腎勞者。腹腫足弱而遺泄。此皆五勞之現象。餘宜細酌陰虛陽虛二症而觸類旁通之。蓋勞固由虛來也。此症若更有增無減。勢必成六極七傷。

（療法）宜服保元湯以治其肺。八珍湯以治其心。四君子湯以治其脾胃。牛膝丸以治其肝。金剛丸



以治其腎。此治五勞之正軌。若六極則宜白芍。木瓜以治其筋。鹿角。熟地以治其骨。人參。阿膠以治其血。白朮。山藥以治其肉。熟地。巴戟以治其精。麥冬。人參以治其氣。七傷則併宜九龍丹治之。

【保元湯】方見陽虛。

【八珍湯】當歸 熟地各三錢 川芎一錢五分 白芍二錢酒炒 人參 白朮 茯苓 甘草各二錢 右加薑棗水煎服。

【四君子湯】人參 白朮 茯苓 甘草各二錢 右加棗水煎服。

【牛膝丸】牛膝酒浸 萹藋 杜仲炒去絲 白茯苓 防風 兔絲子酒浸 肉桂醇酒浸 各等分 肉桂減半

研爲末。煉蜜和丸。溫酒送下。

【金剛丸】萹藋 杜仲炒去絲 菴蓉炙浸等分

右爲末。酒煮腰子。搗丸如桐子大。每服五七十丸。溫酒下。

【九龍丹】枸杞子 金櫻子去皮刺核 蓮鬚 蓮肉去心 芡實去殼 山茶葉肉 當歸身酒洗

熟地黄酒蒸另研 白茯苓三兩

研末。酒煮米糊丸梧子大。每服五十丸。溫酒或鹽湯送下。

(虛勞通治單方) ①大黃四分。以童便煎取四合。去滓。空心分二次。服下頗驗。(廣利方) ②

活鲫鱼三尾。浸重便中。死後取出。不去鱗雜。用泥塗之。燒灰爲末。臨睡時。用黃酒分數

次送下。(席延賢方)

(驗勞法) 乳香燒煙。薰其手背。男左女右。以絲巾蓋手掌心。良久。有毛自掌中出。視毛色白

者易治。紅者難治。黑者不治。無毛者非勞病也。屢試屢驗。(醫林集要)

## 癲狂

(總說)

邪入於跟陽者爲狂。邪入於陰者爲癲。蓋癲發始發。志意不樂。甚則精神呆痴。言語不倫。而睡如平時。以邪併於陰也。狂疾始發多怒不臥。甚則兇狂欲殺。目直罵詈。不識親疏。夜不多臥。以邪併於陽也。然俱不似瀾疾發則吐涎。神昏卒倒。口噤牙聚。抽搐時發。多少不等。而省後居飲食皆若平人無別也。

## 一、癲癩重症

(病因) 癲癩多因抑鬱不遂。性傷無聊。以致鬱痰鼓塞心包。神不守舍。有狂之意。不如狂之爲甚

。貴之心肝。若因受驚而得者。與此又別。

(病狀)或笑或歌。或悲或泣。如醉如痴。語與顛倒。穢潔不知。精神恍惚。經年不愈。脉大滑。久自己。小堅急。死不治。受驚者得之倉卒。狀亦如此。

(療法)因鬱痰鼓塞心包者。宜服礞石滾痰丸。或生鐵落飲。因驚者。宜服抱膽丸。

【礞石滾痰丸】礞石二兩 沉香五錢 大黃酒蒸 黃芩八兩

右將礞石打碎。用朴硝一兩。煨末。和諸藥水丸。量人虛實服之。薑湯送下。服後仰臥。令藥在胸膈之間。除逐上焦痰滯。不宜飲水行動。

【生鐵落飲】天冬去心 麥冬去心 貝母各三錢 膽南星 橘紅 遠志肉 石菖蒲 遠翹 茯苓 茯神各一錢 元參 鈎藤 丹參各一錢半 辰砂三分

右用生鐵落。煎熬三炷線香。取此水煎藥。服後。安神靜睡。不可驚駭叫醒。犯之。則病復作。幾乎爲力。凡狂症。服此藥三十餘劑。而愈者多矣。若大便閉結。或先用滾痰丸下之。

## 二、猖狂重症

(病因)狂病多因七情過度。五志之火內燔。煎熬成痰。上蒙心包。以致神志失常。猖狂剛暴。貴

之心胃。然亦有熱入血室而發狂者。陽明實熱而如狂者。所當別論。

（病狀）自悲喜忘。善怒善恐。少臥不飢。自高自尊。善詈罵。日夜不休。又好歌樂。妄行無度。脈見實大爲順。沈細爲逆。熱入血室者。必在經水適來。發熱惡寒。胸膈下滿。如結胸狀。聲則明了。夜則譫語。如見鬼狀。陽明實熱者。棄衣而走。登高而歌。或至不食數日。踰垣上屋。所上之處。非素所能。

（療法）狂病原因多端。治宜分析。上焦實者。生鐵落飲主之。痰火在上者。三聖散主之。心火狂亂者。黃連瀉心湯主之。若熱入血室。則審其經水來而與以小柴胡湯加地黃。經水斷而與以桃仁承氣湯。陽明實熱。則與以大承氣湯。

【生鐵落飲】方見癲症

【三聖散】甜瓜蒂炒黃 鬱金 韭汁各等分

右爲末。鷲翎探吐。

【黃連瀉心湯】黃連四錢 大黃 黃芩各二錢

右以麻沸湯。漬之須臾。絞去滓。溫服。

【小柴胡湯】柴胡八錢 黃芩 人參 甘草各三錢 半夏三錢洗 生薑三錢切 大棗二枚

右七味以水煮。去滓。再煎。溫服。

【桃仁承氣湯】桃仁五個去皮尖 桂枝二錢去皮 大黃四錢 芒硝 甘草炙各二錢 右五味以水煮。去滓。納芒硝。更上火微沸。溫服。當微利。

【大承氣湯】大黃四錢酒洗 厚朴八錢去皮炙 枳實二枚炙 芒硝一錢八分 右四味以水煮。二物去滓。納大黃再煮去滓。納芒硝。更上火微火一兩沸。溫服。

### 三、痢症眩仆

(病狀)痢症多由心腎虛怯。肝風膽火倏逆。痰涎上壅心包。經絡閉阻。迫痰涎排泄於外。而正氣回則愈。大抵病後及醫閱之人多患此。以體氣本虛。復感六淫。氣虛不能化痰。陰虛不能制火。火炎痰壅故也。

(病狀)發時昏不知人。猝然眩仆。甚則 肢抽搐。目上視。或口眼歪斜。將醒時吐涎沫。醒後又發。有連日發者。有一日發三五次者。脈細緩。則雖久劇可治。虛散沉實強急者不治。

(療法)宜先服定痢丸以止其急。再服河車丸以斷其根。

【定痢丸】明天麻一兩 川貝母一兩 膽南星九製者五錢 半夏薑汁炒一兩 陳皮洗白去七錢

茯苓蒸一兩 茯神去木蒸二兩 丹參二兩 麥冬去心二兩 石菖蒲石杵碎取粉五錢 遠志去心甘草水泡七錢 全蠍去尾甘草水洗五錢 殭蠶甘草水洗去嘴炒五錢 眞琥珀五錢煑煮燈草研 辰砂細研水飛三錢

右爲丸。如梧子大。每服十五丸。

【河車丸】 紫河車一具 茯苓 茯神 遠志 各一兩 人參五錢 丹參七錢

右爲丸。如桐子大。每服十五丸至三十丸。不拘時。

〔癲狂通治單方〕 ①苦參五片。秘蜜丸如酸棗大。每服十丸。薄荷湯化下。 ②伏龍肝末。水服一匙。每日三服。 ③川鬱金一錢。天竺黃兩。雌黃五錢。白礬三錢爲末。以不落水猪心血搗爲丸。硃砂爲衣。如桂圓大。每日以石菖蒲五分煎湯。送下一丸。 ④蘆薈子爲末。溫水調服。探吐痰涎。 ⑤猪肚一具。內放起碼金箔十張。仍用線縫好。煮熟。水不須多。約兩湯椀爲度。連肚帶湯。設法令其服盡。瘋病自愈。誠奇方也。

〔羊癩風單方〕 ①卒然栽倒。不省人事。口吐白沫。取茶葉或青草。放口中。立時蘇醒。再以青椀椀一斤打破。砂鍋內熬十數沸。去核。入石臼內。搗爛再熬。熬至無味去渣。熬成膏。用白礬八錢。研末。加入攪勻。每日早晚取膏三錢。開水送下。服完。自愈。（成無己明理論）

②伏龍肝末。水服一小匙。日三度。（千金方）③上好松羅茶一斤。晉礬一斤。爲末。煉蜜丸桐子大。每服四十九丸。滾湯下。（身經通考）④用尖嘴鱈魚數尾。和白糖搗爛。敷患處。三四次即可速愈。（應驗良方）

（卒得痢疾單方） 鈎藤。甘草炙各二錢。水五合。煎一合。每用茶少許。日三五度。（聖惠方）

## 遺精

（說總）

不夢而遺。謂無所感於心而自遺。則爲心腎虛弱不固也。夢而後遺。謂有所感於心。相火煽而強迫之。則爲二火之強不固也。或過慾之人。日慣精滑。或清氣不足。下陷不固。或久曠之人。精盛溢瀉。或醴酒厚味。火強不固。皆爲是病也。

## 一、夢裏遺精

（病因）心爲君火。肝爲相火。中年腎氣充盈。所欲不得。心火動於上。相火翕然從之。水不能敵。精隨以泄。

（病狀）精泄時。每夢與女子交合。久則神思恍惚。脈洪弦。舌紅。有時薄黃。

（療法）宜先服苦寒之藥瀉之。繼用養陰安神法。可先服龍膽瀉肝湯。繼服大補陰丸。

【龍膽瀉肝湯】 龍膽酒炒三分 黃芩炒 梔子酒炒 澤瀉一錢 木通 車前子各五分 當歸二

分炒酒洗 柴胡一錢 甘草 生地酒炒各三分 右十味水煎服。

【大補陰丸】 黃蘗鹽酒炒 知母鹽水炒各四兩 熟地黃酒蒸 敗龜板稍炙各六兩。

右猪脊髓和蜜丸。鹽湯下。

## 二、無夢自遺

（病因）色慾過度 心腎氣虛。氣不攝精。因之滑泄。更有走陽一症。氣隨精脫。尤爲危險。

（病狀）無夢自遺。出於不覺。每在中年以後。氣短神疲。脈象虛細。至於走陽。多屬久曠之人。或縱慾之人。與女人交合。泄而不止是也。

（療法）宜填補收滯。十全大補湯主之。走陽者。其女須抱定勿使陰莖出戶。急呵熱氣於口中。以指捻住尾閭。庶可挽救。

【十全一補湯】 當歸 熟地各三錢 人參 白朮 茯苓 甘草 桂心 陳皮各二錢 川芎一錢 五分 白芍二錢酒炒。

右水煎服。

（遺精通治）○鷄子一個。用銀簪鑽一小孔。實胡椒少許。紙封其孔。候飯將熟。將鷄子挿入。



熟後取食。每日一個。連服七個。便可斷根。(易簡方) ⑤猫耳朶草三兩。和大蒜煎濃。

日三服。每服一椀。三日後。病必愈。猫耳朶草一名綿絮草。處處有之。(集驗方) ⑥兩膝

宜曲。身能宜側。曲右手之膝。而枕於左手之掌。或曲一膝。一足伸直。加於所曲之足上。

兩手置於兩肋之旁。面向上臥。此法可免遺精之患。(瑞竹堂方) ⑦熟地六兩。山萸肉。

真山藥各四兩。芡實。丹皮。雲苓各二兩。蓮鬚二兩。龍骨生研。水飛淨三錢。魚鱗四兩。

蛤粉炒成珠。共爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每日早晚服三四錢。一月即止。(林屋山人秘

方) ⑧白龍骨研細一兩。韭菜子炒一合。爲末。空心陳酒調服二錢。(驗方)

(內熱遺精單方) 鐵銹末。冷水服一錢。三服止。(活人心統)

(心虛遺精單方) 猪心一個。批片相連。以飛過硃砂末摻入。用線縛好。煮熟食之。(唐璠經

驗方)

(腎虛遺精單方) 猪腰子一個。切開去膜。入附子末一錢。濕紙裏煨熟。空心食之。飲酒一杯

。不過三五服。效驗非常。(經驗方)

(虛滑遺精單方) 白茯苓二兩。縮砂仁一兩。爲末。入鹽二錢。精羊肉批片。搽藥炙食。以酒

送下。(普濟方)

（小便遺精單方）龍骨。遠志。等分丸服。或加韭子。（驗方）

（心虛夢遺單方）白茯苓末二錢。米飲調下。日二服。（蘇東坡方）

（勞心夢遺單方）菟絲子五兩。茯苓四兩。石蓮子肉一兩半。山藥糊丸服。（良方新集）

（陰虛夢遺單方）鼈甲燒研。一分。以酒半盞。童便半盞。葱白七寸。同煎。去葱。日隨時服

之。出臭汗。即愈。（醫墨元戎）

## 傷風

（說總）

傷風屬肺。故噴嚏也。鼻淵屬腦。故不噴嚏也。傷風寒邪。故涕滑也。鼻淵蒸邪。故涕濁也。鼻淵病久或有穢氣則熱深。故腦敗鼻血也。

### 一、傷風咳嗽

（病因）傷風者。風邪傷衛也。人爲風寒所觸。邪氣入於滕理也。重者爲傷寒。則治法較難矣。

（病狀）風邪傷衛。衛主皮毛。內合於肺。故有汗嚏涕。鼻塞聲重。不時咳嗽。甚則身隨發熱。

滑塞頭痛。

（療法）氣虛者宜服參蘇飲。氣實者宜服川芎茶調散。有痰者加半夏清痰。有熱者加石膏滑熱。

【參蘇飲】 人參 蘇葉 乾葛 前胡 陳皮 枳殼 茯苓 半夏各八分 桔梗。木香。甘草各

五分 生薑五片 大棗一枚。

右十三味水煎。熱服取汗。

【川芎茶調散】 川芎 白芷 薄荷 甘草 羌活 茶葉 細辛 荆芥 防風。

右隨症用量。爲末。茶調服。

## 二、鼻 淵 鼻 塞

(病因) 鼻淵病屬風熱入腦。故鼻塞氣不利而鼻孔熱也。

(病狀) 目暝而頭痛。涕流不止。較之傷風爲甚。

(療法) 宜服蒼耳散取效。

【蒼耳散】 蒼耳子炒去刺研破一兩 辛夷三錢 白芷 薄荷各一錢。

右加葱三根。

(傷風通治單方) ①初起時。即用葱白一握。淡豆豉半合。泡湯服之。取汗。即愈。(瀨湖集)

簡方) ②黃糖加老薑葱頭煎湯。或加豆豉並酒煎服。甚妙。(萬病回春)

# 頭痛

(總論)

頭痛屬疾。屬寒。屬濕。屬風。屬氣。或兼氣虛。右痛屬氣多痰熱。左痛屬血少痰風。其頭痛筋則連腦內。手足背冷至肘膝之節。朝發夕死。

## 一、外感頭痛

(病因) 起居不謹。睡臥當風。沖寒冒雪。邪因而入。

(病狀) 惡寒發熱。頭項顛腦髮際作痛。

(療法) 宜服加味清震湯。或清空膏。頭痛神方皆見效。

【加味清震湯】 升麻一錢 蒼朮一錢 青荷葉一強全用 甘草炙 陳皮各八分 荊芥 蔓荊子各一錢五分 薄荷五分。

右水煎服。

【清空膏】 羌活。防風各六錢。柴胡五分。黃芩一錢二分半生半炒。川芎四分。甘草一錢炙。薄荷三分 青連六分酒炒。

右水煎服。

【頭痛神方】 土茯苓四兩 金銀花三錢 玄參八分 蔓荊子 防風 天麻各一錢 辛夷花 川芎

各五分 燈心二十根 黑豆四十九粒 芽茶五錢。  
右用河水井水各一鐘半。煎一鐘服。

## 二、內傷頭痛

(病因) 或元氣虛寒。遇勞即發。或血分不足。陰火攻沖。或積熱不得外泄。或積痰留飲。或食滯中焦。或七情惱怒。肝膽火鬱。皆能上沖頭痛。

(病狀) 因氣虛者。氣怯神衰。遇勞即痛。血虛者。五心煩熱。時常牽引作痛。痛積熱。者口渴唇。焦二便赤澀。痰飲者。惡心嘔吐。肝火攻沖者。惱怒即發。痛引脅下。

(療法) 氣虛血虛者。宜服調中益氣湯。積熱者。宜服梔連平胃散。痰飲者。宜服半夏白朮天麻湯。肝火上沖者。宜服柴胡清肝飲。

【調中益氣湯】芍藥二分 升麻二分 黃芪一錢 甘草五分 五味子七粒 當歸 白朮 人參各三分 柴胡 橘皮各二分。

右水煎服。

【梔連平胃散】蒼朮一兩米泔浸七日 陳皮去白 厚朴各八錢薑汁炒 甘草炙五錢 山梔 黃

連各四錢。

右爲末。每服二錢。薑湯下。日三服。或水煎。每服五錢。

【半夏白朮天麻湯】 半夏一錢半 白朮 神效妙各一錢 天麻 黃芪 人參 蒼朮 陳皮 澤瀉 茯苓各五分 大麥藥一錢半 乾薑三分 菖蒲酒製二分。

右每服半兩。水煎服。

【柴胡清肝飲】 柴胡 白芍藥各三錢 山梔 黃芩 丹皮 當歸 青皮 鈎藤各一錢半 甘草一錢。

右水煎服。

(頭痛通治單方) ①元精石末。入羊胆中。陰乾。水調一字。吹鼻中。立止。(千金方) ②

頭痛欲死者。以硝石末吹鼻中。即愈。(雷公炮炙論) ③當歸二兩 酒一升 煎取六合

飲之。日再服。(外臺秘要) ④草烏頭梔子。等分爲末。自然葱汁。隨左右調塗太陽及額

上。勿近眼。避風。(三因方) ⑤天南星。茴香。等分。生研末。鹽醋煮麵糊丸。薑湯下

二十丸。⑥決明子炒研。茶調敷兩太陽穴。乾則易之。一夜即愈。(醫方摘元) ⑦丁香

一錢。白芷半兩。瓜蒂一兩。爲細末。每用半字。吹入鼻中即瘳。(儒門事親) ⑧生烏頭

一錢。白芷四錢爲末。茶服一字。仍以末噴鼻。效。(聖惠方) ①大蒜一個。去皮。研取

自然汁。令病人仰臥垂頭。以銅筋點少許。滴入鼻中。急令病人睡。眼中淚出。瘥。(①頭

痛不止。楊梅爲末。以少許噴鼻。取嚏。妙。(千金方)

(風寒頭痛單方) ①大附子。或大川烏頭二枚。去皮蒸過。川芎。生薑各一兩。焙研。茶湯調

服一錢。或切片。每用五錢水煎服。(聖惠方) ②當歸。木通各等分。酒浸三晝夜。取湯

煮熟。乘熱飲之。去枕臥。立愈。(證治準繩)

(風熱頭痛單方) ①荊芥穗。石膏。等分爲末。每服二錢。茶調下。(永類鈴方) ②川芎一

錢。茶葉二錢。水一鐘。煎五分。食煎服。(簡便方)

(風虛頭痛單方) 杏仁去皮尖。晒乾研末。以水九升。研濾汁。煎如糜爛狀。取和羹粥食之。

七日後。大汗出。諸風漸減。但須慎風冷。忌食豬雞魚蒜醋。(千金方)

(氣虛鉅痛單方) ①川芎爲末。臘茶調服二錢。甚效。(集簡方) ②大附子一枚。剉心令穿

。入全蠍去毒五枚在內。以餘附末。同鍾乳粉二錢半。白麵少許。水和作劑。包附煨熟。去

皮研末。葱涎和丸梧子大。每椒鹽湯下五十九丸。(集簡方)

(氣鬱頭痛單方) 香附子炒四兩。川芎二兩爲末。每服二錢。臘茶清調下。常服除根。(濟東

方)

(風痰頭痛單方) ①天南星一兩。荊芥葉一兩。爲末。薑汁糊丸。梧子大。每食後。薑湯下二

十丸。(濟生方) ②白附子炮去皮臍半斤。石膏煨紅半斤。米砂二兩二錢半。龍膽一錢。

爲末。粟米飯丸小豆大。每服三十丸。食後茶酒任下。(御藥院方)

(痰熱頭痛單方) 壯實人氣實有痰。頭痛眩暈。大黃酒浸三次。爲末。茶調服。(丹溪心法)

(腎虛頭痛單方) ①硫磺一兩。胡粉爲末。飯丸梧子大。痛時冷水服五丸。即止。(普濟方)

②硫磺六錢。烏藥四錢爲末。蒸餅丸梧子大。每服三五丸。食後清茶下。(普濟方)

(熱病頭痛單方) 大括葉一枚。去麩。細剉。置磁碗中。用煎湯一盞泡之。蓋定。良久。去滓

服。(聖惠方)

(血風頭痛單方) 女人患此者。至爲困苦。用草烏頭。梔子。等分爲末。自然葱汁。隨左右。

調塗太陽。及額上。勿近眼。避風。(三因方)

## 眩暈

(總說)

眩謂眼黑。暈者頭旋也。俗稱頭旋眼花是也。其中有肝火內動者。經云。諸風掉眩。皆屬肝目是也。有濕痰壅遏者。書云。頭旋眼花。非天麻半夏不除是也。

有氣虛挾痰者。書曰清陽不升。濁陰不降。則上重下輕也。亦有腎水不足。虛上炎者。亦



有命門火衰。真陽上泛者。當辨而治之。

## 一、外感眩暈

(病因) 或外受風邪。風熱爲患。或疾風暴冷。胃寒入胃。激動涎痰。亦令人眩暈。或春夏之時。天之熱氣下降。地之濕氣上升。人感冒之。而成濕熱眩暈。若陰雨太多。人感冒之。亦爲眩暈。是因寒濕。

(病狀) 感受風邪者。則頭眩而兼頭痛額痛。骨節煩痛。身熱多汗。上氣喘逆。蹉擾時眩。外感寒邪者。則頭眩而兼身熱無汗。惡寒拘緊。頭痛身熱。時時冒眩。外感濕熱者。則頭眩而兼自汗身熱。面垢背寒。煩渴引飲。小便赤澀。外感寒濕者。則頭眩而兼惡寒無熱。身重身痛。不能轉側。無汗拘緊。

(療法) 感受風邪者宜服川芎散。體質者。服柴胡防風湯亦可。兼痰者宜服天麻半夏湯。感受寒邪者。宜服柴胡羌活湯。感受濕熱者。宜服黃連香薷飲。沖六一散服。感受寒濕者。宜服羌活勝濕湯。

【川芎散】 川芎 山藥 白茯苓去木 甘菊花野菊不外 人參各半兩去蘆 山茱萸肉一兩。

右爲細末。每服二錢。溫酒調下。不拘時。日進三服。

【柴胡防風湯】柴胡八錢 黃芩 人參 甘草各三錢 防風半升 生薑三錢切 大棗三枚擘。

右水煎服。

【天麻半夏湯】天麻 半夏各一錢 橘皮 柴胡各七分 黃芩 甘草 茯苓 前胡各五錢 黃

連三分。

右生薑水煎服。

【柴胡羌活湯】柴胡 羌活各三錢 防風 川芎各一錢。

右水煎服。

【黃連香薷飲】香薷一錢 厚朴薑汁炒 人參 甘草 黃耆 木瓜 陳皮 白朮 茯苓 白扁

豆椹各八分 黃連四分薑汁同炒黃色。

右水煎服。

【羌活勝濕湯】羌活 防風 柴胡 蒼朮 川芎 茯苓 豬苓 澤瀉各一錢 黃柏 甘草各八

分。

右水煎服。

## 二、內傷 眩暈

(病因) 內傷眩暈。其因不外燥火。氣虛。血虛三者。

(病狀) 因燥火者。則身熱煩燥。口渴引飲。夜臥不寧。頭旋眼黑。小便赤澀。因氣虛者。則其人面色白。身無熱。神識清爽。言語輕微。二便清利。時或虛陽上浮。頭面得火。眩暈不止。因血虛者。則形體黑瘦。五心常熱。夜多盜汗。睡臥不寧。頭面火升。則眼花旋轉。火氣下降。則暈旋亦止。

(療法) 因燥火而左脈燥疾。厥陰掉眩者。宜服柴胡清肝湯。左脈躁疾。脈熱上沖者。宜服清肺飲。左右躁疾。肝肺太過者。宜服河青各半湯。因氣虛而右寸脈虛者。肺氣不足也。宜服人參生脉散合四君子湯。右關脈虛者。中氣不足也。宜服補中益氣湯。左寸脈虛者。心氣不足也。宜服酸棗仁湯。左關脈虛者。肝膽氣虛也。宜服逍遙散。兩尺脈虛。腎氣不足也。宜服都氣丸。因血虛而脈多細澀。細而不數者。血虛無熱也。宜服歸脾湯。或補中益氣湯。左寸細澀者。心血不足也。無火者宜服酸棗仁湯。有火者。宜服天王補心丹。合安神丸。左關細澀者。肝不藏血也。無火者宜服逍遙散。有火者宜服知柏四物湯。右關澀者。脾不統血也。無

火者歸脾湯。有火者加味當歸補血湯。兩尺細數者。腎陰枯竭也。宜服八味丸。血虛有火者。脉多清數也。

【柴胡清肝湯】 柴胡 青皮 枳殼 山梔 木通 鈎藤 蘇梗 黃芩 知母 甘草。

右可隨症之輕重爲量。水煎服。

【清肺飲】 桔梗 桑白皮 地骨皮 知母 人參 烏梅 阿膠 罌粟殼 杏仁 甘草。

右入棗蜜。爲煎藥。量當隨症之輕重。

【瀉青各半湯】 黃芩 山梔 桑白皮 地骨皮 甘草。

右水煎服。量隨症施。

【人參生脉散】 人參五錢 麥門冬 五味子 各三錢。

右爲散。作一劑。水煎服。

【四君子湯】 人參 白朮 茯苓 甘草 各二錢。

右加薑棗。水煎服。

【補中益氣湯】 黃耆炙 人參 雲朮炒各一錢五分 甘草炙一錢 陳皮五分 當歸一錢 升麻

柴胡各五分

右八味加生薑三片。大棗二枚。水煎溫服。

【酸棗仁湯】 酸棗仁一兩 甘草三錢 知母 茯苓 川芎各四錢

右五味。以水煮棗仁。再納諸藥煮。溫服。

【逍遙散】 芍藥酒炒 當歸 白朮炒 茯苓 甘草炙 柴胡各二錢

右加煨薑三片。薄荷少許。煎服。

【都氣丸】 熟地砂仁酒拌九蒸九晒八兩 山茱萸肉酒潤四兩 山藥四兩 牡丹皮三兩 茯苓乳

拌三兩 澤瀉三兩 五味子三兩

右研爲細末。煉白蜜和。水泛亦可。每服三錢。淡鹽湯下。

【歸脾湯】 人參 龍眼肉 麻耆各二錢半 甘草五分 白朮二錢半 茯苓二錢半 木香五分

當歸 酸棗仁炒研 遠志各一錢

右加薑三片。水煎服。

【天王補心丹】 人地四兩酒洗 人參 元參炒 丹參炒 茯苓 桔梗 遠志炒五錢 酸棗仁

炒柏子仁炒研去油 天冬炒 麥冬炒 當歸酒洗 五味子一兩

右蜜丸彈子大。硃砂爲衣。臨臥燈心湯下一丸。或嚙化。

【安神丸】 麥冬 白伏神 山藥 辰砂 甘草 馬牙硝 寒水石

右爲末。糊丸。桐子大。

【知柏四物湯】 知母 柏子 當歸 熟地 各三錢 川芎一錢五分 白芍二錢酒炒

右水煎服。

【加味當歸補血湯】 當歸二錢 黃柏 知母 黃耆各一兩

右水煎服。

【八味丸】 乾地黃八兩九蒸爲度搗膏 乾山藥 山茱肉各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各三兩

桂枝 附子各一兩

右爲末。煉蜜丸。如桐子大。酒下十五丸。日再服。

（眩暈通治單方） ①頭風旋暈。痰逆。惡心懶食。真馨陵香。藿香葉。莎草根炒。等分爲末。

每服二錢。茶下。日三服。（本事方） ②風熱上衝。頭目運眩。或胃中不利。川芎。槐角

子。各一兩爲末。每服三錢。用清茶調下。（保命集） ③頭風暈眩。起倒無定。獨活。胡活

白芷。石膏各一兩。枳實炒七錢半。每服三錢。煎六分服。（聖惠方） ④頭風旋暈。蟬殼一

兩。微炒。爲末。非時酒下一錢。白湯亦可。（聖惠方） ⑤失血過多。眩暈不省。芎藭。

當歸。酒浸等分。每服四錢。水煎溫服。(奇效良方) ⑤濕熱眩暈。不可當者。酒炒大黃

爲末。茶清服二錢。效。(丹溪纂要) ⑥蒼耳葉晒乾爲末。每服一錢。酒調下。日三服。

若吐。則以蜜丸梧桐子大。每服二十九。十日全好。(經驗方) ⑦首風旋暈。多汗惡風。

駒腦搽飲。川芎一斤。天麻四兩。爲末。煉蜜丸如彈子大。每嚼一丸。茶清下。(宣明方)

⑧頭暈吐逆。胃冷生痰。用川乾薑泡二錢半。甘草炒一錢二分。水一鐘半煎。減半服。累

用有效。(傳信適用方) ⑨大黃。荆芥穗。防風。各等分。水煎服。以利爲度。(奇效良

方)

## 腹痛

(總說)

大腹痛甚。其症甚多。臍以上屬火屬實。臍以下屬寒。屬虛。有外感寒邪而痛。有脾虛而痛。有食滯而痛。有血凝而痛。有蟲動而痛。有氣滯而痛。有

濕熱痛。更有因陰寒而痛者。當辨其何因。凡實痛者拒按。虛痛者喜按。脈之有力者爲實。

脈無力者爲虛。宜細辨治之。

## 一、寒邪腹痛

(六病因) 外感寒邪。以至犯臟。或因飲冷胃寒。

〔病狀〕凡外感寒邪而痛者。其腹柔軟喜手重按。痧氣之類。則腹痛如絞。面青手冷。或吐或瀉。其欲吐不吐。欲瀉不瀉。而爲乾霍亂。則依照霍亂治之。

〔療法〕宜解寒行滯。可服經驗排氣飲或做和胃飲治之。

〔經驗排氣飲〕 製香附二錢 陳皮錢半 木香八分 炮薑五分 川朴錢半 枳殼錢半 澤瀉錢

半 烏藥 藿梗 枳梗各一錢

右水煎服。

〔和胃飲〕 厚朴錢半 陳皮二錢 白扁豆四錢去殼 藿香梗三錢 枳梗 車前子 乾薑各一錢

枳殼炒 甘草炙各八分

右水煎作一劑服。

## 二、脾 虛 腹 痛

〔病因〕脾胃虛寒。冷氣凝滯不通。因而致痛。

〔病狀〕其痛綿綿不已。喜熱手按揉。面白神疲。小便清利。飲熱惡寒。或似飆非飆。得食稍安。

。愛愛成感。莫可言狀。其氣弱。其脈微。



〔療法〕宜甘溫補脾。和中發氣。可服安胃飲子。加熟附片一二錢。倘痛甚而汗出。小便多者。急服參附理中湯。

〔安胃飲子〕 生薑藥 扁豆 黨參炒炭各四錢 陳皮一錢半 生苡米七錢 丁香五分 豆蔻五

分。雲苓三錢 甘草炙一錢

右水煎服。

〔參附理中湯〕 人參 附子 甘草炙 乾薑各三錢

右水煎。作一劑服。

### 三、食滯腹痛

〔病因〕皆由口腹不謹。或食過傷。或食後坐臥。或食不應食。以致停滯不化。

〔病狀〕胸腹脹滿。痛不欲食。噎氣作酸。痛而欲利。利後稍減。其脈右寸緊盛。

〔療法〕宜服扶脾內消飲。以除積滯。

〔扶脾內消飲〕 白朮炒焦四錢 焦麥肉三錢 枳實 赤芍 麥芽各二錢 廣陳皮錢半 建麩一

右水煎。作一劑服。

#### 四、血凝腹痛

〔病因〕氣血流通。人乃不病。若惱怒傷肝。思慮傷脾。焦勞傷心。甚至跌撲傷損。辛辣不斂。血乃凝滯。腹乃痛矣。

〔病狀〕不眠不滿。飲水作呃。遇夜更痛。痛於一處。定而不移。服行氣消化之藥。不應。以熱爲畏之。稍減。

〔療法〕宜服桃仁承氣湯治之。

【桃仁承氣湯】 桃仁五個去皮尖 桂枝二錢去皮 大黃四錢 芒硝 甘草炙二錢  
右五味以水煮。去滓。納芒硝。更上火微沸。溫服。

#### 五、蟲積腹痛

〔病狀〕其人體氣虛弱。而又口腹不謹。多食生冷。致受傷於脾胃。健運力薄。蟲從此生。

〔病狀〕其痛必時作時止。或一日一作。或歇二三日又痛。痛必身曲喜揉。隱々憺々。往來不定。

醫藥大全 內科門 (腹痛) 食滯腹痛 血凝腹痛 蟲積腹痛 一四三

。或嘔吐青黃綠水。或時吐涎沫。或吐出蟲。或坐臥不安。大痛不可忍。面色或黃。或青。或白唇則紅。痛定則能飲食者。便是蟲積之症。

(療法) 宜服追蟲丸以逐之。

【追蟲丸】 黑牽牛取頭末 檳榔各八兩 雷丸醋炙 木香各二錢爲末 茵陳二兩 大皂角 苦楝皮各一兩

右煎濃汁。水爲丸。菘豆大。大人每服四錢。小兒三錢。或二錢。量人虛實。用砂糖水吞下。服二三次。方以粥補之。

(壯痛通治單方) 梳背三兩炒。白朮五錢炒。茯苓三兩。半夏一兩製。黨參二兩。清花桂一兩。熟豆蔻一枚。甘草一兩。水極半。煎八分。兩劑則全愈。(驗方)

(交合腹痛單方) 男女交合之後。或外受風寒。或內食生冷等物。以致肚腹疼痛。腎囊內縮。亦有不縮者。手足彎屈紫黑。重則牙緊氣絕。用鷄蛋煮熟。對切去黃。再用銀針插入蛋白。合在肚臍眼上。合友則愈。

## 腰痛

(說總)

腰痛之證。其因不同。有腎虛。有風。有寒。有濕。有痰飲。有氣滯。有血瘀。有濕熱。有閃挫。凡患腰痛極甚。而面色忽紅忽黑。是爲心腎。交爭。難治。

之症也。

## 一 風 濕 腰 痛

〔病因〕或雨濕之年。風濕襲入肌表。或沖風冒雨。風濕感入。成以水爲事。水舍皮膚。皆致此病。

〔病狀〕發熱惡風。自汗身重。腰背重痛。不能轉側。

〔療法〕宜服獨活湯治之。

【獨活湯】 獨活 桑寄生 防風 秦朮 威靈仙 牛膝 茯苓各一錢 桂心五分 細辛 甘草 炙各三分 當歸 金毛狗脊各二錢 生薑二片  
右水煎服。

## 二 寒 濕 腰 痛

〔病因〕或寒濕之年。或沖寒冒雨。陰寒雨濕之邪致痛。

〔病狀〕頭痛身痛。無汗。拘緊腰痛。不能轉側。

醫藥大全 內科門 (腰痛) 風濕腰痛 寒濕腰痛

【療法】宜服羌活勝濕湯治之。

【羌活勝濕湯】 防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷 麻黃 連翹 芒硝各四錢 石膏 黃芩 桔梗 附子各二錢 滑石六錢 甘草六錢 荊芥 白朮 梔子各一錢 生薑二片  
右爲細末。每服三錢。

### 三 濕 熱 腰 痛

（病因）或濕火之年。濕熱行令。或外冒濕熱之邪。

（病狀）內熱煩熱。自汗口渴。二便赤澀。痠痛沉重。

（療法）宜用蒼蘗散或煨腎丸治之。

【蒼蘗散】 蒼朮 黃蘗各三錢 牛膝 杜仲 防己 木瓜 川芎各一錢  
右爲散水煎服。

【煨腎丸】 豬腰子剖開。入川椒食鹽甘遂末。濕紙裏煨。熬酒食之。

### 四 內 傷 腰 痛

（病因）控閃撲跌。勞動損傷。則腰腹作痛。七情怒惱。憂思鬱結。則腰脇疼痛。脾濕不運。水

飲凝結。則爲痿注腰痛。先天不足。眞陽虧損。則爲陽虛腰痛。眞水不足。復損陰精。則腎虛火旺而腰痛。

（病狀）日輕夜重。痛定一處。不能轉側。尺脈芤滑。此瘀血停蓄也。脇肋氣脹。遇怒愈甚。尺脈沉結。此怒氣鬱結也。腰間重滯。一片如水。得熱稍減。得寒愈甚。尺滑尺伏。此爲痿注腰痛也。時常怕冷。手足不煖。凡遇寒氣。腰背即痛。脉空大微遲。此眞火不足。陽虛之症也。五心煩熱。足心如火。痛如錐刺脉細數躁疾。此陰虛火旺之症也。

（療法）閃挫撲跌。瘀血內蓄者。宜服澤蘭湯。血虛者。宜服六君子湯加杜仲。續斷。怒氣鬱結者。宜服橋核丸。痿注者。宜服二陳湯加白朮。荜薢。白芥子。竹瀝。薑汁。陽虛者宜服八味丸。陰虛者。宜服六味丸合補陰丸治之。

【澤蘭湯】 澤蘭三錢 丹皮 牛膝各二錢 桃仁十粒去皮尖研 紅花五分 當歸尾五錢 廣三七一錢 赤芍藥一錢五分

水煎。熱酒衝服。如二便不通。加酒蒸大黃三錢。

【六君子湯】 人參 白朮 茯苓 甘草 陳皮 半夏各二錢

右加薑棗。水煎服。

【橘核丸】 橘核鹽酒炒二兩 川楝子煨去肉 山查子炒 香附薑汁浸炒各一兩五錢 荔枝核煨

研 山茴香微炒各一兩 神麴四兩

右煮糊爲丸。如桐子大。每服三錢。淡鹽水下。

【二陳湯】 半夏製 茯苓各三錢 陳皮二錢去白 甘草一錢

右四味加薑三片。水煎服。

【八味地黄丸】 乾地黄八兩九蒸爲度搗膏 乾山藥 山萸肉各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各三

兩 桂枝 附子各一兩

右八味爲末。煉蜜丸。如桐子大。酒下十五丸。日再服

【六味地黄丸】 卽八味地黄丸去桂枝。附子。

【補陰丸】 熟地三兩 丹皮 天冬 當歸 枸杞子 牛膝 山藥 女貞子 茯苓 龜板 杜仲

續斷各一兩二錢 人參 黃柏各五錢

右先用石斛四兩熬膏。和煉蜜爲丸。每早淡鹽水下三錢。

(腰痛通治單方) ① 香附子五兩。生薑二兩。取自然汁。浸一宿。炒黃爲末。入青鹽二錢。搗

牙數次。其痛即止。(乾坤生意) ② 大豆六升。水拌濕。炒熟。布裏熨之。冷即易去。(

延年秘錄) ⑤ 鼈甲炙。研末。酒服一匙。每日二次。(肘後方) ⑥ 白朮土炒三兩。芡實

一兩。薏苡仁二兩。分數次服下。(應驗良方)

(腎虛腰痛單方) ① 用羊脊骨一具。搥碎。肉搥蓉一兩。草果五枚。水煮汁。下葱醬作藥食。

(正要) ② 羊腎去膜。陰乾爲末。酒服二錢。日二。(千金方) ③ 破故紙一兩。炒爲末

。溫酒服三錢。神效。(經驗良方) ④ 杜仲爲末。每旦以溫酒服二錢。(三因方) ⑤ 杜

仲去皮炙黃一大斤。分作十劑。每夜取一劑。以水一大升。浸至五斤。煎三分。減取一汁。

以羊腎三四枚。切下。再煮三五沸。如作羹法。和以椒鹽。空心頓服。(海上方)

(腎症腰痛) 用青皮炒研。每服溫酒一錢。或酒煎服。(大明醫方)

(卒然腰痛) ① 芥子末。酒調貼之。立效。(摘元方) ② 大豆炒二升。酒三升。煮二升。頓

服。(肘後方)

(閃挫腰痛單方) 蒔蘿研末。酒服二錢。理良。(永類鈴方)

(老人腰痛單方) 象兩腿瘦痛者。用棠棣子。鹿茸炙。等分爲末。蜜丸梧子大。每服百丸。日

二服。(千金方)



# 胸痛

(總說)

胸者。肺之分野。然少領膈經受病。亦令胸痛。此邪氣初傳入裏。而未深入於裏。故胸痛也。

## 一 外感胸痛

(病因) 或傷寒表邪未散。下之太早。內陷胸中。或六淫之邪傷肺。肺熱焦蒸佛鬱不宣。胸亦爲之作痛。蓋胸爲心肺之室也。

(病狀) 外邪內陷。則悶痛。六淫邪傷。則脹痛咳嗽。不能仰臥。

(療法) 內陷者。宜服柴胡湯加枳殼治之。若已成結胸者。宜服大小陷胸湯。肺壅風熱者。宜服加味瀉白散。

【小柴胡湯】 柴胡八錢 黃芩 人參 甘草各三錢 半夏三錢洗 生薑二片切 大棗二枚擘

右七味水煮。去滓。再煎。溫服。

【大柴胡湯】 柴胡八錢 黃芩三錢 芍藥三錢 半夏四錢洗 生薑五錢切 枳實二枚 大棗二

枚擘 大黃二錢

右以水煮。去滓。再煎。溫服。

【大陷胸湯】 大黃六錢去皮 芒硝一兩 甘遂五分

右三味以水先煮大黃。去滓。納芒硝。煮一兩沸。納甘遂末。溫服。

【小陷胸湯】 黃連二錢 半夏四錢洗 栝蒌實一個

右三味以水先煮栝蒌。去滓。納諸藥。再煮。去滓。溫服。

【加味瀉白散】 桑皮炒 地骨皮 防風 荊芥各一兩 甘草五錢

右爲末。每服一二錢。入粳米百粒水煎。

## 二 內 傷 胸 痛

〔病因〕七情六欲。動其心火。刑及肺金。或佛鬱氣逆。傷其肺道。則痰凝氣結。或過飲辛熱。

傷其上焦。則血積於內。而悶閉胸痛矣。

〔病狀〕不因外感。胸中隱々作痛。其痛緩。其來漸。久久不愈。飲食漸少。此內傷胸痛也。

〔療法〕氣不清痰。宜服瓜蒌仁湯。加青燈海石。兼火者。梔連二陳湯。心火乘金。宜服薄心湯。

。救肺宜服清肺飲。

【瓜蒌仁湯】 瓜蒌仁一個。去皮炒黑研。甘草同煎服。

【梔連二陳湯】 半夏製 茯苓各五錢 山梔 黃連 陳皮二錢 去白 甘草一錢

右加薑三片。水煎服。

【瀉心湯】 大黃四錢 黃連 黃芩二錢

右水煎服。

【清肺飲】 杏仁去皮尖 貝母 茯苓一錢 桔梗 甘草 五味子 橘紅五分

右加薑煎。食遠服。

【胸痛通治單方】 ①胸脇痺痛如刺。不得俛仰。汗出。或微背。生韭菜。或根五斤。搗汁。飲

②胸痛癢而復發。薤根五升。搗汁。服。

【結胸單方】 ①杏仁。桂枝。橘皮。訶黎勒皮等分爲丸。每服三十丸。白湯下。無忌。(食療

本草) ②桔梗。枳壳各等分。水二盞。煎一盞。溫服。(活人書) ③枳實二錢 麩炒微

黃爲末。非時。以清粥飲調下二錢。(聖惠方) ④人參一兩。橘皮去白四兩。爲末。煉蜜

丸梧子大。每米飲下五六十九。(聖惠方) ⑤大蒜搗爛攤貼。必愈。(經驗方)

## 小便病

(總說)

膀胱熱結輕者爲癢。重者爲閉。膀胱虛寒。輕者爲遺尿。重者爲不禁。閉者則小便閉。無點滴下。故少腹滿脹也。癢者。卽淋瀝點滴而出。一日數

十數。或動出無度。故莖中澀痛也。不知而尿出。謂之遺尿。知而不能固。謂之小便不禁。

## 一 小便不通

〔病因〕肺主通調水道。腸胃主傳化水穀。上焦失清化失清之令。則小便不通。然亦有因熱實。陽虛。陰虛。氣虛之分。

〔病狀〕實熱者。煩悶煩。舌赤便閉。小便不通。陽虛者。憎寒喜煖。手足逆冷。小腹如冰。心胃無熱。陰虛者。內熱神衰。肌肉黑瘦。下午咳嗽。小便不通。氣虛者氣怯神離。面色萎黃。言語輕微。衰無嚙候。唇不焦。口不渴。欲便而不能。

〔療法〕熱實者。宜服八正散加木香。陽虛者宜服腎氣丸。陰虛者。宜服通關丸。氣虛者。宜服春澤湯。

〔八正散〕 瞿麥 梔子 蘆薈 大黃 滑石、木通 車前子 甘草各一錢  
右加燈心一錢。煎服。

〔腎氣丸〕 乾地黄八兩九蒸爲度搗膏 乾山藥 山茱萸各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各三兩。

桂枝 附子 車前子 牛膝各一兩

醫藥大全 內科門 (小便病) 小便不通

右爲末。煉蜜丸。如桐子大。酒下十五丸。日再服。

【通關丸】 知母 黃蘗 肉桂 各少許

右爲末。蜜糊丸。每服三錢。

【春澤湯】 澤瀉一兩一分 猪苓去皮 白朮 茯苓 人參各三分 桂二分去皮

右爲末。白飲服方寸匕。日三服。熬湯下。

## 二 小便不禁

〔病因〕 經云膀胱不利爲瘕。不約爲遺溺。所以不及者。一日肝熱。肝氣熱則陰挺失職。書云。

肝主疏泄是已。二曰氣虛。中氣虛。則不能統攝。以致遺溺。大抵老幼多見此症。悉屬肝氣

不固。老人挾寒者多。嬰兒挾熱者衆。三日腎敗。傷寒日久見之。多難救。

〔病狀〕 肝熱者。便色黃。氣虛者。便色白。腎敗者。狂言反自。搜便自遺。

〔療法〕 肝熱者。宜服加味道遙散。氣虛而挾寒者。宜服十補湯。挾熱者。服六味地黃丸。腎敗

者。急用附子理中湯救之。

【加味道遙散】 芍藥 當歸 白朮炒 茯苓 甘草炙 柴胡 丹皮 梔子各二錢

右加煨薑三片。薄荷少許。煎服。

【十補湯】 當歸 熟地各三錢 川芎一錢五分 白芍二錢 酒炒 人參 桂心 陳皮 白朮 茯苓 甘草各二錢

右加薑棗。水煎服。

【六味地黃丸】 乾地黃八兩九蒸爲度搗膏 乾山藥 山萸肉各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各三兩

右六味爲末。煉蜜丸。如桐子大。酒下十五丸。日再服。

【附子理中湯】 附子 人參 甘草炙 白朮 乾薑各三兩

右搗篩末。蜜丸如鷄子黃大。以沸湯數合和一丸。研碎溫服之。日三服。

（小便不通通治方） ①紅豆搗碎。與江茶和勻。開水調服。立效。（墨娥小錄） ②綿黃芪二

錢。水二盞。煎一盞。溫服。兒童減半。（總微論） ③馬蘭花炒。茴香炒。葶藶炒。爲末。

每酒調服二錢。（十便良方） ④麝香一錢。蜈蚣一個。葱白連鬚一握。共搗。封臍中。即

下。（墨娥小錄） ⑤鱖魚。滑石。亂髮。等分爲末。飲服五分。日三服。（金匱要略）

（小便不禁通治方） ①雄鷄翎搗研。酒服一小匙。（外臺秘要） ②蓄薇根煮汁飲。或爲末酒

醫藥大全 內科門（小便病） 小便不禁

一五五

服。野生白花者更良。(聖秘方)

(小便頻數單方) ①白果十四枚。半生半煨食之。效。或煨熟去火氣。細嚼。米飲下。(驗方)

②茴香不拘多少。淘淨。入鹽少許。炒研爲末。炙糯米糕蘸食。(醫學六要)

(尿白如注單方) 小腹氣痛者。茶筵內箬葉燒灰。入麝香少許。米飲下。(良方)

(小便血尿單方) ①五倍子炒爲末。烏梅肉搗膏。丸如梧子大。空心酒下五十丸。(三因方)

②當歸四兩剉細。酒三升。煮取一升。空心頓服。(本草綱目) ③延胡索一兩。朴硝七

錢半爲末。每服四錢。水煎服。(朱肱活人書) ④烏梅燒存性。研末。醋糊丸梧子大。每

服四十丸酒下。(易簡方) ⑤早蓮草。車前草焙乾。入蚌粉。炒槐花。百藥煎等分爲末。

每服三錢。米泔空心調服。(易簡方)

(老人尿多單方) 晚食糯米餐 即效。(集驗方)

(老人尿閉單方) 白頸蚯蚓。茴香等分。杵汁飲之。立愈。(朱氏集驗方)

(壯年遺尿單方) 枯白礬。牡蠣粉。等分爲末。每服一匙。溫酒下。(余居時選奇方)

(老人遺尿單方) 草烏頭一兩。蜜便浸七日。去皮。同鹽炒爲末。酒糊丸菜豆大。每服二十九

。鹽湯下。(普濟方)

〔夢中遺尿單方〕桑螵蛸十個。燒研末。沙糖湯調服。愈。

## 大便秘

〔說解〕

經曰北方黑色。入通於腎。開竅於二陰。是知腎主二便。腎經津液乾枯。則大便秘結矣。然有實閉。虛閉。熱閉之不同。脾胃虛弱。或火性急速。

則大便秘矣。

## 一 大便秘不通

〔病因〕或因陽明胃實。或因氣秘。或因血枯。以致腸胃不潤。大便秘不通。

〔病狀〕陽明胃實者。內熱煩燥。口苦舌乾。小便赤澀。夜臥不寧。腹中脹悶。胸前苦濁。大便秘不行。氣秘者心腹脹滿脅肋刺痛。血枯者。形弱神衰。肌肉消瘦。內無實熱。大便秘結。

〔療法〕因陽明胃熱者。宜服小承氣湯。氣秘者。宜服二陳湯。血枯者。宜服四物湯加松子仁。

柏子仁。肉苁蓉。枳朮。人乳之類。以潤之。

〔小承氣湯〕大黃四錢 厚朴二錢去皮炙 枳實一枚

右三味以水煮。去滓。溫服。

〔二陳湯〕半夏製 茯苓各三錢 陳皮二錢去白 甘草一錢

醫藥大全 內科門 (大便秘) 大便秘不通



右四味加薑三片。水煎服。

【四物湯】 當歸 熟地各三錢 川芎一錢五分 白芍二錢酒炒

右四味水煎服。

## 二 遺尿不禁

(病因) 一因脾胃虛弱。倉庫不固。腸滑而遺者。一因火性急速。逼迫而遺者。

(病狀) 脾胃虛弱者。遺少而次多。火性急速者。遺多而次少。

(療法) 脾胃虛弱者。宜服理中湯。火性急速者。宜服芍藥甘草湯加黃連。

【理中湯】 人參 甘草炙 白朮 乾薑各三錢

右四味搗篩爲末。蜜丸如鷄子黃大。以沸湯數合和一丸。研碎溫服之。日三服。

【芍藥甘草湯】 白芍藥酒炒三錢 甘草炙一錢五分 黃連一錢

右水煎服

(大便不通通治方) ○當歸、白芷、等分爲末。每服二錢。米飲湯下。(聖濟總錄) ㊦大棗

一枚。去核。入輕粉五分。縛定。煨熱食之。仍以齋湯送下。(直選方)

(老人虛秘單方) 肉蓯蓉。浸酒焙二兩。沉香末一兩爲末。麻子仁汁打糊。丸梧子大。每服七八丸。白湯下。

(大便下血單方) ①土砂一兩。火煨。米醋淬盡。醋一升。搗鹽如麪。每服一錢。白湯下之。

(斗門方) ②香白芷爲末。每服二錢。米飲下。神效。(選奇方)

(便前有血單方) 石葦爲末。茄子枝煎湯。下二錢。(普濟方)

(便後有血單方) ③艾葉不拘多少。以生薑汁三合和服。(丹溪纂要) ④不見水豆腐渣炒黃。

清茶調服。即愈。(古今良方) ⑤王不留行末。水服一錢。(聖濟總錄) ⑥白鵝花并子炒。

煎服。(聖惠方) ⑦括蘆一個。燒灰。赤小豆五錢爲末。每空心酒下一錢。(普濟方)

## (咽喉)

(總說)

吾人氣機呼吸在喉。而瞬息存亡之界亦在於喉。喉之係於人蓋甚重矣。胡可令受病哉。致病之由。啓於不遵衛生故也。或脾受熱毒。蘊積胸膈口腹。多嗜煎炒或膏粱厚味。飲酒過度。不辭勞力。貪嗜炙煇熱毒之物。受鬱結之氣。感冒風寒。濕熱內積。痰火上蒸。辛苦越格。種種根源。皆病之所由。以浸於喉。其症各有不同。且如喉痺之害。有陰有陽。而陰陽之狀不可不察。紅腫外見者。陽也。候服辛熱之劑。謂之以陽攻陽。毒氣愈甚。喉爲出入生死之路。急欲奏效。必不得之數也。如舌生黃黑。飲食阻礙。吞吐不

利。疼痛難忍。不見紅腫者。陰也。驟用寒涼剋伐之劑。反致生痰作燥。謂之以陰剋陰。其痰愈甚。致之於膏肓。縱有明驗。百無一生矣。此施治者極宜留意者也。

## 一、虛實喉風

(病因) 前人雖有十八種喉風之別。然綜其大要。不外虛實二種而已。虛者由於虛火上炎。實者由於痰火及風。且喉痺即實者之重症。喉癰亦與實者相類。白喉係虛喉風之一種。皆不必另分。

(病狀) 實證喉風。腫紅嫩痛。痰多脉洪。甚則咽喉閉塞。湯水難下。語言不出。謂之喉痺。若其腫偏在一隅。痛引耳根腮下牙牀者。為喉癰。微腫微紅。咽乾脈虛者。為虛證喉風。上午痛甚而白苔者。屬陽虛。下午痛甚而喉白者。屬陰虛。且喉風為喉症中最重之症。治之消緩。即至危殆。所謂走馬看喉風也。大抵服藥隨手應效者可治。若至面青唇黑。氣急頭汗。直視反張。鼻流清涕。六脈模糊者。雖見一端。皆不可救也。

(療法) 實證治法。表實者宜服防風敗毒散。裏實者。宜服雄黃解毒丸。或利咽涼膈湯。表裏俱實者。宜服清咽利膈湯。痰盛者。用元明礬導吐之。熱盛者。貼異功散。刺少商穴。虛證治

法。陽虛者宜服補中益氣湯加麥冬。元參。桔梗。牛蒡。陰虛者。宜服養陰清肺湯。喉間俱吹玉鑰散。膿熟則針破之。病時不宜多臥。慮其痰炎不能下降。病後不宜厚味。慮其餘燼復熾。

【防風敗毒散】 荆芥一錢五分 防風一錢 茯苓八分 甘草五分 羌活一錢五分 川芎一錢

獨活一錢 人參一錢 枳殼八分 桔梗一錢 柴胡一錢二分 前胡一錢

右用薄荷葉十片爲引。水煎八分。食前服出汗。

【雄黃解毒丸】 雄黃一兩 鬱金一錢 巴豆十四粒去油殼

右共爲細末。醋丸菜豆大。每服七丸。熱茶湯下。吐出頑痰立甦神效。如未吐再服。若牙關緊急不開。以物幹開灌之。如人死心頭尚熱。研末灌之。起死回生。

【利咽涼膈湯】 梔子 元參 石膏 薄荷 黃連 花粉 粘子 貝母 大黃各等分

右水煎。食遠服。利數次即愈。

【清咽利膈湯】 連翹一錢 梔子一錢 薄荷一錢 防風一錢 甘草 粘子銀花上等分 荆芥一

錢 桔梗一錢 元參一錢 黃連一錢 朴硝二錢 大黃二錢

右用水二鍾。煎一鍾。食遠服。

【元明醋】 用元明粉和好醋。灌入喉中。鬚毛探攪。痰出即愈。

【異功散】 斑蝥四錢 眞血竭 乳沒 全蠍 元參六分 元寸三分 冰片三分

右爲末。摻膏藥上。貼患處。

【補中益氣湯】 黃芪一錢五分 甘草炙 人參 當歸 白朮各三錢 升麻 柴胡 陳皮各三分

右加大棗二枚。薑三片。水煎服。

【養陰清肺湯】 大生地一兩 麥冬六錢去心 白芍炒四錢 薄荷二錢五分 元參八錢 丹皮四

錢 貝母四錢去心 生甘草二錢

右水煎服。如喉間腫痛甚者。加煨石膏四錢。大便燥結數日不通者。加青甯丸二錢。元明粉

二錢。胸下脹悶者。加神龜二錢。焦查二錢。小便短赤者。加水通一錢。知母二錢。澤瀉二

錢。燥渴加天冬三錢馬兜鈴三錢。面赤身熱或舌苔黃者。加銀花四錢。連翹二錢。

【玉鑰匙】 元明粉五錢 礞砂五錢 炙姜薑五分 硃砂六分 冰片五分 西瓜霜錢半

右研極細末。吹入喉中。

(喉風通治單方) ①皂莢一斤。米醋三斤。拌曬乾末。吹之。痰涎出盡。用良薑末少許。入蒸

內漱口嚥之。即愈。(孫氏集效方) ②萬年青根頭。切碎打爛。絞汁漉下。吐出痰涎。即好

。俯口閉。用牙刷挖開灌下。如再不吐。可用潔淨鵝毛進口間探之。(經驗單方) ③玄參。  
鼠粘子半生半炒。各一兩。爲末。新水服一盞。立有效驗。(聖惠方) ④紫菀草根一莖洗淨  
。納入喉中。待惡痰涎出。即瀉。更以馬牙硝津嚥之。即絕。(斗門方) ⑤絲瓜根。以瓦瓶  
盛水浸數小時。乃取水飲之。其痛可立減。(海上名方)

(白喉風痛單方) ①蒼耳煎水服之。神效無比。(經驗良方) ②以獨頭老蒜瓣。搗泥如豌豆大  
。敷經渠穴。(近手腕寸脈有窩處即是。)男左女右。用瓦楞子或相類之物。蓋上紮住。閱五  
六時。起一水泡。將銀針挑破。搯去毒水。即愈。(過氏醫案)

(鎖喉風痛單方) 用鵝毛一根。粘真桐油一分。入喉掩搥。痰隨油吐。服甘草水。可解油氣。  
(奚護備急方)

## 二、喉痧疫症

(病因) 春應溫而反寒。冬應寒而反溫。非其時而有其氣。釀成疫癘之邪。邪從口鼻而入。蒸騰  
於咽喉。漫佈於三焦。故上而咽喉疼痛。外而發現丹痧也。

(病狀) 初起寒熱咽乾。胸悶心煩。遍身骨楚。繼則外發丹痧。其點細銷成粘者爲痧。紅暈如雲

成片者爲丹。然亦有受邪本輕。不發丹痧。僅喉痛愈後。寒熱自退而愈。

(療法) 此症即西醫所謂腥紅熱也。有濕熱者。治宜清滲。服甘桔湯加瓜萸。通草。燈心。有痰火痰結者。治宜消降。服清氣化痰丸。去半夏。加貝母。淡竹如。邪達則痧透。痧透則爛止。宜服利膈湯。外吹玉鑰匙。爛者吹錫類散。然其症有可治不可治。其口氣作臭。喉色淡黃。或深黃者。係痰火所致。皆可治。若爛至小舌。及鼻塞目閉。元氣日虛。毒氣深伏。色白如粉皮者。皆不可治。

【加味甘桔湯】 甘草 桔梗 瓜萸 通草 燈心各二錢

右水煎服。

【清氣化痰丸】 南星 陳皮 伊穀 杏仁 瓜萸 黃芩 茯苓各等分

右爲細末。合丸和梧桐子大。每服二十丸。

【利膈湯】 薄荷 荊芥 防風 桔梗 甘草 牛蒡子炒 人參各等分

右水煎服。每次二錢。或加麩蠶。

【玉鑰匙】 元明粉五錢 硼砂五錢 炙姜蠶五分 硃砂六分 冰片五分 西瓜霜錢半

右研極細末。吹入喉中。

【錫類散】象牙屑三錢焙。壁錢焙二百個。犀黃五分。梅片五分。青黛六錢。人指甲五分炙。

珠粉一錢

右研極細末。吹入喉中。

〔喉痧通治單方〕又名爛喉痧。喉間作痛。爛不收口。服櫻桃數十粒。即愈。如無新鮮者。服

密餞者亦可。（本草衍義）

### 三、雙單乳蛾

〔病因〕多食辛蒸酒肉等物。熱毒蘊於肺胃兩經。結於厥陰之絡。復感風寒。凝結而成。輕者爲單乳蛾。重者爲雙乳蛾。若其火更甚者。則爲蛾疔。

〔病狀〕乳蛾生於蒂丁之旁。形如乳頭。或如蠶蛾。或如棗栗。紅腫疼痛。防阻嚥飲。兩旁俱生者。爲雙乳蛾。一旁生者。爲單乳蛾。喉疔與單乳蛾相類。但蛾圓而大。疔尖而小。形如釘尖。色紫堅硬初覺麻癢。旋即大痛。

〔療法〕乳蛾不論雙單。皆宜服清咽利膈湯。吹冰硼散。日久不潰者烙之。膿熟者針之。此症若兼痰湧氣急者險。急用三稜針刺少商穴。或厥陰之火。乘勢大升。手足厥冷。頭目昏沉者。



用吳茱萸末。醋調。敷足心引火下行。若熱毒內陷。胸高面黑。神昏譫語者死。毒甚成喉疔者。宜服三黃涼膈湯。倍加甘草。銀花。地丁草。菊花。外貼異功散。內吹金不換。

【清咽利膈湯】

連翹一錢 梔子一錢 黃芩一錢 薄荷一錢 防風一錢 甘草 結子 銀花各

等分 荊芥一錢 桔梗一錢 元參一錢 黃連一錢 朴硝二錢 大黃二錢

右用水二鍾。煎一鍾。食遠服。

【冰硼散】

月石五錢 元明粉五錢 硃砂六分 冰片五分

右研極細末。吹入喉中。

【三黃涼膈湯】

上川連 梔子 黃柏 黃芩 川芎 赤芍 甘草 薄荷 青皮 陳皮 金銀花

花粉 當歸 射干 元參各等分

右水煎服。加燈心一分。淡竹葉二十四片爲引。

【異功散】

斑蝥四錢 眞血竭 乳沒 全蝎 元參各六分 元寸三分 冰片三分

右研末。用少許摻膏藥上貼患處。

【金不換】

元明粉五錢 硼砂五錢 炙殭蠶五分 硃砂六分 冰片五分 西瓜霜錢半 人中白

三錢 青黛三錢 犀黃三分 珠末三分

右研極細末。吹入喉中。

(乳喉通治單方)

①老鴉蒜搗汁。生白酒調服。嘔吐自愈。(神醫十全鏡)

②青魚膽汁。入豬

糝。陰乾。每用少許點喉。取吐。(萬氏方)

③金銀花連莖葉。搗自然汁半碗。煎八分服之

(隨氏積善堂方)

④米醋調皂角末。塗頸與下頰。乾即換塗。乳蛾自破。(應驗良方)

⑤蝦蟆衣。鳳尾草搗爛。入霜梅肉煮酒各少許。再研。絞汁。以鷺翎擦患處。隨手吐痰。即消

。(養疴漫筆)

## 四、喉疔喉癰

(病因) 其因有二。一因梅毒未盡。循任脉上攻於咽喉。一因腎水久虧。相火挾脾濕上薰於咽喉

。前人有喉疔喉癰之分。其實無甚差別。且其因亦同。

(病狀) 梅毒喉疔。初起周圍有紫暈。久則腐爛疼痛。臭穢不堪。虛證喉疔。初起咽喉乾燥。如

物硬喉。其色紫暗微腫微痛。久則腫痛日增。喉上破爛。腐皮重疊。更且嘔吐酸水。噦出甜

涎。梅毒喉疔。爛上則鼻注爛壞。爛下則飲食難進。多致不救。虛證喉疔。日久則聲音嘶啞

。喘急多痰。臭腐蝕延。妨礙飲食。由此胃氣漸衰。病氣愈深。而難藥救矣。

(療法) 梅毒喉疳。宜服硫黃不二散。吹結毒靈藥。弱症喉疳。服甘露飲加川連。或知柏地黃湯。腫吹水糊散。腐吹錫類散。愈後宜服六味丸。有毒者加禹餘糧。龜板。虛者加玄參。知母。女貞。枸杞。俱用鹽水炒。或稍加附子。導火歸原。更宜薄滋味。寡色慾。庶不致再發。

【硫黃不二散】 硫黃一錢 龍花一分

右共研末。用涼水一鍾調服。

【結毒靈藥】 水銀一兩 硃砂 硫黃 雌黃各三熟

右共研細。每用靈藥一錢加入中白二分。吹入喉中。日三次。

【甘露飲】 枇杷葉 熟地 天冬 枳殼 茵陳 生地 麥冬 石斛 甘草炙 黃芩各等分

右爲末。每二錢。水一盞。煎七分。去滓。食後。臨臥溫服。

【知柏地黃湯】 知母 黃柏 山茱肉 山藥四錢 茯苓 丹皮 澤瀉三錢

右水煎作一劑。空心服。

【水糊散】 月石五錢 元明粉五錢 硃砂六分 冰片五分

右研極細末。吹入喉中。

【錫類散】 象牙屑三錢焙 壁錢焙二百個 犀黃五分 梅片五分 青黛六錢 人指甲五分炙

珠粉一錢

右研極細末。吹入喉中患處。

【六味丸】 乾地黃八兩 乾山藥 山萸肉各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各三兩

右六味爲末。蜜煉丸。如桐子大。酒下十五丸。日再服。

〔喉痛通治單方〕 ①喉頭寬癢或痛。用明礬一兩。薄荷腦五厘。分作二十分。每分以水二合至

三合。溶解含漱。(醫典) ②冰片三分。殭蠶五厘。硼砂二錢半。牙硝七錢半。共研細末。

吹患處。(丹溪心法) ③點膽草。搗服之。(集簡方) ④銀朱。海鹽硝末等分吹之。取效。

(急救方) ⑤咽喉腫痛紅腐。真青黛一錢。龍腦薄荷末五分。人中白一錢。粉口兒茶一錢。

元明粉五分。馬屁勃五分。梅花冰片二分。研細搗之。病甚者。加厚黃三分。珍珠五分。效

尤捷。(喉科秘傳)

〔咽喉癢單方〕 真硼砂一兩。元明粉。膽星各一錢。訶子肉二錢。冰片三分爲末。外加大烏

梅一兩。搗爲丸。如龍眼核大。每用一丸噙化。數粒即愈。(局方發揮)

〔諸骨脫喉單方〕 白鳳仙子。研水一大杯。以竹筒灌入咽喉。其骨即軟。但不可經牙。恐牙受

傷。故用竹筒灌之。神效無匹。(松窓雜記)

醫藥大全 內科門：(咽喉)：咽喉通治

## (痔漏)

(總說)

此證係肛門生瘡。有生於肛門外者。初起成癰。不破者爲痔。易治。破潰而出膿血黃水浸濕。溼久不止者。爲漏。難痊。斯證名因形起。其名雖有二十四種。總不外乎醉飽入房。筆脈橫解。精氣脫泄。熱毒乘虛下注。或憂思太過。蘊積熱毒。憤鬱之氣。致生風濕燥熱四氣相合而成。如結腫脹悶成塊者。濕盛也。結腫痛如火燎。二便閉者。大腸小腸熱盛也。結腫多瘡者。風盛也。肛門圍遶摺橫破裂便結者。火燥也。又有血筋痔。生肛門或裡或外。堵塞墜腫。每逢大便用力。則鮮血念流如箭。不論發煎發後。由腸胃風熱而兼暴怒成之。各證愈後須戒房勞。河豚。海腥。辛辣。椒酒等物。有久患痔而後咳嗽者。取效甚難。久病咳嗽而後患痔者。多致不效。

## 一、內外痔瘡

(病因) 久居濕熱之地。或素有濕熱。或好食辛熱炙煇之品。(如川椒。胡椒。桂椒等) 或縱飲無度。皆以過熱。初起大便秘結。非數日不解。燥屎蘊積直腸。直腸爲燥屎熱毒所攻。漸生紅色小瘰。先痛後癢。積之既久。乃爲痔瘡。有生於肛門者。謂之內痔。有生於肛門外者。謂之外痔。大抵年高陰虛火盛而患痔者。多爲內痔。故內痔多見虛證。外痔多見實症。有熱

極而血妄行者成爲血痔。又有憂思恐慮而爲痔者。謂之氣痔。

〔病狀〕肛外突出息肉。狀如肉珠。亦似鼠奶。即外痔也。外痔之狀。有極怪者。如似鷄冠。如似蓮花。故有鷄冠痔。蓮花痔諸名。若痔生於肛內。肛外不可見。肛邊痛癢難忍者。內痔也。好酒者食杯即發。疼不可忍。甚者流血。或更衣輒出清血者。血痔也。稍有憂思恐怒立見腫痛。氣痔也。

〔療法〕初起俱宜內服止痛如神湯消解之。外俱用善提露或田螺水點之。若堅硬者。以五倍子散唾津調塗之。兼用朴硝。葱頭煎湯洗之。頂大蒂小者。用藥勒於痔根。每日緊線。其痔枯落。隨以月白珍珠散撒之。即可收口。又有頂小蒂大者。用枯痔散枯之。內痔不出者。用喚痔散填入肛門。其痔即出。隨以朴硝。葱頭煎湯。洗之。又有因勤苦勞役。負重遠行。以致氣血交錯。而生痔者。俱可用止痛如神湯加減服之。血箭痔初服生熟三黃湯。若唇白。面色痿黃。四肢無力。屬氣血兩虛。宜十全大補湯倍用芎藭參服之。外用自己小便洗之。其血自止。因酒毒而發出血者。宜服苦參地黃丸。效後必多服臨連丸約二三料。除根。又有產後用力太過而生痔者。宜補中益氣湯。加桃仁。紅花。蘇木服之。又有久瀉久痢而生痔者。宜補中益氣湯加槐花。皂莢子。滾末服之。

【止痛如神湯】 秦朮去苗 桃仁去皮尖研 皂角子嶺一錢燒灰存性研 蒼朮米泔水浸炒 防風

各七分 黃蘗五分酒炒 當歸末酒洗 澤瀉各三分 檳榔一分 熟大黃一錢二分

右除桃仁。皂角子。檳榔。用水二鍾。將群藥煎至一鍾。再入桃仁。皂角子。檳榔。再煎至八分。空心熱服。待少時。以美膳壓之。不犯胃也。忌生冷五辛。火酒硬物。大料濕麵之類。

如腫有膿。加白葵花五朶去蕊心 青皮五分 木香三分 則膿從大便出也。

如大便秘甚。倍大黃。加麻仁。枳實各五分 通便則毒已去也。

如腫甚倍黃蘗。澤瀉。加防己。猪苓。條芩各少許。

如痛甚加羌活。郁李仁各少許。

如癢甚倍防風。加黃耆。羌活。麻黃。藜蘆。甘草各少許。

如血下倍黃蘗。多加地榆。槐花。荆芥穗。白芷。如小便澀數不通者。加赤茯苓。車前子。

燈心。扁蓄各少許。

【菩提露】 熊膽三分 冰片一分

右用涼水十茶匙調化。搽於患處。甚效。

【五倍子散】 用文蛤大者一枚。敲一小孔。用陰乾荔枝草揉碎。塞入文蛤內令滿。用紙塞孔。濕紙包煨。片時許。取出去紙。研爲細末。每一錢加輕粉三分。冰片五釐。共研極細末。唾津調塗患處。

【藥線】 莞花五錢 雙錢二錢 用白色絛衣線三錢。同莞花雙錢用水一盞盛貯小磁罐內。慢火煮至湯乾爲度。取線陰乾。凡遇痔瘡癰瘤。頂大蒂小之證。用此線一根。患者二根。雙扣緊紮患處。兩頭留線。日漸緊之。其患自然紫黑冰冷。輕者七日。重者十五日後枯落。

【月白珍珠散】 青缺花五分 輕粉一兩 珍珠一錢  
右爲末撒患處。

【枯痔散】 天靈蓋用童子者佳。又用青線。水將天靈蓋浸片時。撈出。以火煨紅。孫入青線水內淬之。如此七次。淨用四錢。砒霜一兩 白礬二兩生 輕粉四錢 煨酥二錢

右共爲細末。入小新鐵鍋內。上用粗磁盤密蓋。鹽泥封固。炭火煨至二柱香。待冷。揭開盤。將藥研末搽痔上。每日辰。午申三時用溫水洗淨患處。上藥三次。上至七八日。其痔枯黑堅硬自落。

【喚痔散】 枯白礬五分 食鹽三分炒 草烏生 刺蝟皮各一錢煨存性 麝香五分 冰片二分。



右共研細末。先用溫水洗淨肛門。隨用唾津調藥三錢。填入肛門。片時即出。

【生熟三黃湯】 生地 熟地各一錢五分 黃連 黃蘗 黃芩 人參 蒼朮米泔水浸炒 白朮土

炒 厚朴薑炙 當歸身 陳皮各一錢 地榆 防風 澤瀉 甘草各六分生 烏梅二個

右水二鍾。煎八分。食前服。

【十全大補湯】 人參一錢 茯苓一錢 白朮一錢五分 甘草五分炙 川芎一錢 當歸一錢 白

芍一錢炒 地黃一錢 黃耆一錢 肉桂一錢

右十味。水煎服。

【黃參地黃丸】 苦參切片酒浸濕蒸晒九次爲度炒黃爲末淨一觔 生地黃四兩酒浸一宿蒸熟搗爛

和入苦參末內、

右加煉過蜂蜜爲丸。如梧桐子大。每服三錢。白滾水送下。或酒下亦可。日服二次。

【鐵蓮丸】 黃連八兩研淨末 公豬大腸肥者一段長一尺二寸水洗淨

右二味將黃連末裝入大腸內。兩頭以線紮緊。放沙鍋內。下煮酒二觔半。慢火熬之。以酒乾爲度。將藥腸取起。共搗如泥。如藥濃。再晒一時許。復搗爲丸。如梧桐子大。每服七十丸

。空心溫酒送下。久服除根。

【和中益氣湯】 人參一錢 當歸一錢 生黃耆二錢 白朮一錢土炒 升麻三分 柴胡三分 甘草一錢炙 麥冬一錢去心 五味子五分研 陳皮五分  
右十味。以水二鍾。薑三片。棗二枚。煎一鍾。空心煎服。

## 二、痔瘡潰漏

（病因）痔瘡不治而潰。積久不愈。仍復貪飲善喫好色。漸成漏管。不能收口。乃成漏瘡。

（病狀）痔瘡成管。終年破流血水。膿穢淋漓。時發時止。脈弦絕澀者難治。滑大和柔者易治。

（療法）宜用胡連追毒丸酒服之。服後膿水反多者。藥力到也。勿以為懼。如漏有管者。用黃蘗

閉管丸服之。並時以却毒湯洗之。

【胡連追毒丸】 胡黃連切片薑汁拌炒研末 刺骨皮各一兩炙切片再炒黃研末 麝香三分研細。

右共和一處研勻。饅飯爲丸。如麻子大。每服一錢。食前溫酒送下。

【黃連閉管丸】 胡黃連一兩淨末 穿山甲香油。炸黃 石決明煨 槐花各五錢微炒

右共研細末。煉蜜爲丸。如麻子大。每服一錢。空心清米湯送下。早晚二次。至重者不過四  
十日而愈。

【却毒湯】 瓦松 馬齒莧 甘草各五錢生 川文蛤 川椒 蒼朮 防風 葱白 枳殼 側柏葉

各三錢 煅硝一兩

右水五盃。煎三盃。先薰後洗。日用三次。

(痔瘡通治單方)

① 膽豬汁調蕎麥麵爲丸。開水送下。成漏有管者。改用牛膽汁。極效。(肘

後方)

② 經霜扁豆葉。地骨皮各少許。同研細末。搗思慮。具極效。(梅師方)

③ 用盆盛沸湯。以器蓋之。留一孔。用洗淨韭菜一把。泡湯中。乘熱坐孔上。先薰後洗數次。自然全

愈。(袖珍方)

④ 臭梧桐葉。煎湯洗數次。即愈。(黃氏醫抄)

⑤ 胡葱二三斤。煮熟。臧瓦盆內。令患人坐上。不逾時。即收復。如覺腹中膨脹。即服利濕藥。可保無虞。(海上方)

⑥ 食鹽二兩。炒焦至如黑炭。水兩大碗。燒滾。傾鹽水中。盛瓦盆內。患人坐上薰之。約十

分鐘。仍以此水洗。俟冷爲止。日洗二次。數日盡愈。(扶壽方)

⑦ 五倍子三四個。皮硝一撮。水二碗煎膿。先薰後洗。(肘後方)

⑧ 胡葱二三斤。煮熟。臧瓦盆內。使病人坐上。不逾時。即收復。如覺腸中膨脹。即服利濕藥。可保無虞。(養荷漫筆)

⑨ 馬齒莧不拘鮮乾。煮熟。初起者。用此即愈。(醫林集要)

⑩ 石膏五錢。雲母五錢朴硝一兩。硫黃二錢。白礬一兩。胡麻五錢。蟬蛻二錢。柴胡二錢。荊芥三錢。白茅根三錢。一同煎湯。先薰後洗。

(崔氏方)

(血痔通治單方) ①益母草葉搗汁飲。(外科精義) ②貫衆去皮毛。剉焙爲末。每服二錢。空

心米飲下。或醋糊丸梧桐子大。每米飲下三四十丸。或燒存性。出火毒爲末。入麝香少許。

米飲服二錢。(普濟方) ③龜肉煮爛食一椀。效。(壽域方) ④歸生二錢。地榆炭一錢。水

煎服。(聖濟總錄) ⑤生豆粉渣。鍋內炒乾爲末。每服三錢。白沙糖湯下。日三次。遠年垂

危者亦效。(危氏方) ⑥馬鬃子一斤研破。酒浸。夏三日。冬七日。曬乾何首烏半斤。雄黃

雌黃各四兩爲末。以浸藥酒打糊。丸梧子大。每服三十丸。溫酒下。日三服。見效(普濟

方) ⑦柿餅煨研。再以煮爛柿餅拌和。丸如梧子大。仍以柿餅湯下。久服效。(斗門方)

(痔漏通治單方) ①忍冬草浸酒常飲。佳。(易簡方) ②多年頑漏。大脚魚一只。好冰片三錢

。鑲乳石五錢。研細末。入脚魚口內。倒掛三五日。待即腫大。快刀殺下頭。陰陽瓦炭上炙

。鹽泥封固。留一小孔出煙。燻盡。小孔封固。俟冷打開研細。用四五分。好酒送下。(千

金方) ③桑樹上桑生爲末。米飲下。(聖濟總錄) ④側魚一條。去腸。入白糝令滿。瓦上

燒末。以鷄羽掃開敷效。(聖惠總錄) ⑤款冬花嚼爛敷上。一二次即愈。(集驗方)

(痔瘡腫痛單方) 大蛭蟪。(即壁上背包蛭蟪)一個。研泥。入龍腦少許。燕脂子五分。同

敷。(醫方大全)

(痔瘡作渣單方) 古石灰。川烏頭炮。等分爲末。飯和丸梧子大。每服二三十丸。白開水下。

(活法機要)

(痔瘡出血單方) 酸漿草一握。水煮一椀服。日三次。見效。(外台秘要)

(酒毒痔瘡單方) 青蒿葉爲末。糞前血。冰水調服。糞後血。酒調服。神效。(外科精義)

## (淋症)

(總說)

淋症者。由腎虛而膀胱熱故也。膀胱與腎爲表裏。俱主水。水入小腸。下於脬。行於陰爲溲便也。腎氣通於陰。陰津液下流之道也。若飲食不節。喜怒不時。虛實不調。則腑臟不和。致腎虛而膀胱熱也。膀胱津液之府。熱則津液內溢而流於壑。水道不通。水不上不下。停積於脬。腎虛則小便數。膀胱熱則水下澀。數而且澀。則淋瀝不宜。故謂之淋。其狀小便出少起數。小腹弦急。痛引於臍。又有石淋。勞淋。熱淋。氣淋。血淋之分。形證各隨名。宜分別治之。

## 一、石淋便痛

(病因) 膀胱熱則失其氣化之職。小便數而爲石淋。猶湯瓶久在火中。底結白礬也。惟此證非陰

陽大虛。而會患生殖器病者不易得此。故五淋證中當以石淋爲最少。然一經患此。頗難立時治愈。恒非經三四十日之調治不可。是以宜於初起小澀中含有砂粒時即行醫治。庶幾稍免痛苦。且易於療治也。

〔病狀〕 臍腹隱痛。小便艱難。輕則下沙。甚則下石。或黃赤。或渾濁。色澤不定。便時刺疼澀於心肺。令人難忍。

〔療法〕 初起如覺小便混濁。澀時有砂。即宜常服六一散。苟其證已成。宜服二神散三五劑。或魚石散亦可。砂出盡乃愈。

【六一散】 滑石六錢 甘草一錢

右爲細末。服時用布袋貯藥。滾水泡湯代茶常飲。

【二神散】 海金砂五錢 滑石四錢 木通一錢 車前子三錢包

右水煎服。三五劑見效。

【魚石散】 黃魚骨取頭小者雪白如齒者十枚火煨爲末 滑石五錢

右加木通一錢。煎湯調服。

〔石淋通治單方〕 ①小便急脹。痛如刀割。尿如沙石者即是。用覆麥子搗爲末。酒服一小匙。

醫藥大全 內科門：(淋症)：石淋便痛：石淋通治

日三服。三日當下石出。(外臺秘要) ①胡桃肉煮粥。多食神效。(張果醫說) ②入參焙。黃芪鹽水炙。等分爲末。用紅皮大蘿蔔一枚。切作四片。以蜜二兩。將蘿蔔片蘸炙令乾。再炙。勿令焦。以蜜盡爲度。每用一片。蘸藥食之。仍以鹽湯送下。以瘥爲度。(三因方)

③石淋作痛。桃木膠如棗大。夏以冷水三合。冬以湯三合。和服當下石。石盡即止。(千金方) ④黑豆一百二十粒。生粉草一升。以水煎。乘熱入滑石末一錢。空心服。(丹溪心法)

## 二、勞 淋 便 痛

(病因) 此症由於本能衰弱。元氣不足。膀胱不能輸送水道故也。凡宗氣虛者。一遇勞事。氣即下陷。下陷則氣墜於下。而不能排洩水濕。苟一遇勞事。溺竅即因此而復爲之淤塞不通。故爲勞淋也。

(病狀) 小便淋澀不通。遇勞即發。勞於脾者。腹時數痛。身體疲憊。勞於腎者。溺澀腹脹。牽引穀道。勞之微者。其淋亦微。勞之甚者。其淋亦甚。

(療法) 因思慮勞者。當獨乘思慮。臨臥服歸脾湯。因多事勞者。當調節勞倦。服補中益氣湯。

因房室勞者。此證最爲可危。當力戒色慾。服六味地黃丸。

【歸脾湯】 人參 龍眼肉 黃耆各二錢半 甘草五分 白朮二錢中 茯苓二錢半 木香五分

當歸 酸棗仁炒研 遠志各一錢

右加薑三片水煎服。

【補中益氣湯】 人參 雲木妙各一錢五分 甘草炙一錢 陳皮五分 當歸一錢 升麻柴胡各五分。

右八味加生薑三片。大棗二枚。水煎溫服。

【六味地黃丸】 乾地黃四兩 乾山藥 山萸 肉各二兩半 丹皮 白茯苓 澤瀉各兩半

右六味爲末。煉蜜丸。如桐子大。每晨空心淡鹽湯調服三錢。

### 三、熱 淋 便 痛

（病因）熱淋有虛實之因。實者如與不潔之婦女交合。或好飲辛辣。或煎炒厚味。胃中積熱太甚。流於下焦。膠秘而爲熱淋是也。虛者如好色縱慾。陰精乾枯。相火充陽。燥灼津液。腎氣爲之虧損。故水道不利而成熱淋也。



(病狀) 濕熱流於下焦之熱淋者。其人多肥盛。多有痰濕。多發於夏季濕令。如陰虛津枯熱甚而淋者。其人多瘦削。多有煩熱。然輩中熱痛。小便熱赤。口渴喜飲水者一也。

(療法) 初起宜服葶藶飲。如濕熱太甚。輩中劇痛。而漫出涓滴者。可用四苓散加味治之。如屬虛熱者。宜服知礬地黃丸。

【葶藶飲】 葶藶三錢 文蛤粉研細 石膏 車前子 茯苓各一錢五分 煨心二十節 蓮子肉

石葛蒲 黃柏各八分

右水煎。作一劑服。

【加味四苓散】 澤瀉三錢炒 赤豬苓一錢五分 滑石一兩 木通三錢 甘草生一錢

右各剉爲末。每服三錢。廣木香三分。煎湯調服。

【知礬地黃丸】 地黃四兩 山茱萸 山藥二兩 丹皮 茯苓 澤瀉各兩半 知母 黃蘗各一兩

右爲末。蜜丸桐子大。每晨空腹湯下三錢。

(熱淋通治單方) ①小便熱而赤。短而澀者是。煎馬齒莧汁服之。(聖惠方) ②大棗二十七枚

葵根切一升。冬用子。夏用苗。二味以水三升。煮取一升二合。分二服。熱加黃芩一兩。

(仁存堂方) ③蠶種燒灰。入麝香少許。水服二錢。極效。(衛生家寶方) ④乾柿。燈心等

分。水煎日服(朱氏方) ②生藕汁。生地黃汁。生葡萄汁各等分。每服一盞。入蜜和服。(乾坤秘蘊)

#### 四、氣淋 便痛

(病因) 氣化不及州郡。胞中氣漲。遂使小便點滴。

(病狀) 少腹滿痛。溺有餘瀝。

(療法) 宜服假蘇散。數劑可愈。

【假蘇散】 薊芥 陳皮 香附 麥芽炒 瞿麥 木通 赤苓

右各等分爲末。每服三錢。開水下。

(氣淋通治單方) ①白芷醋浸。焙乾。二兩爲末。煎木通。甘草調下一錢。連進二服。(普濟

方) ②小便急滿。欲解不出。點滴者是。食鹽和醋調服。良效。(廣利方) ③好綿四兩。

燒灰。磨香半分。每服二錢。溫葱酒。連服三服。(扶壽精方) ④熬鹽鹽煨小腹。冷復易。

(經驗方) ⑤甘蔗上青梢一兩。酒煮服。三日全愈。極效(醫學集成)

## 五、血淋 便痛

(病因) 熱甚搏血。失其常道。與瘦俱下。

(病狀) 溺痛帶血。血色鮮紅。脉數有加。

(療法) 此證最忌補氣之藥。誤服之。血得補而愈著。熱得補而愈盛。漸至氣道不通。水道閉塞而絕。服導赤散最宜。

【導赤散】 生地 木通 甘草梢各等分

右三味水煎服。

(血淋通治單方) ①海螵蛸末一錢。生地黃汁調服。(經驗良方) ②黃芩一兩。水煎熱服。(

千金方) ③葵花根。車前子各一錢。水煮。日服之。(簡便單方) ④苧根煎湯。煎服大妙

。(聖惠方) ⑤茄葉熏乾爲末。每服二錢。溫酒或鹽湯下。隔年者尤爲佳妙。(經驗良方)

## (濁症)

(總說)

濁症之因有二。一由腎虛敗精流注。一由濕熱滲入膀胱。腎氣虛。補腎之中必兼利水。蓋腎經有二竅。溺竅開。則精竅閉也。濕熱者。導濕之中必兼理脾。

蓋土旺則能勝濕。且土堅凝。則水自澄清也。濁由赤者。此濁津流多。不及變化也。又或心

火盛亦見赤色。

## 一、瘦溺白濁

（病因）腎臟天一。以慳爲事。志意內治。則精全而澆。思想外淫。房室太甚。則淫失不守。輒隨瘦溺而下。即爲白濁。

（病狀）敗精流溢。竅端時有穢物。如瘡之膿。如眼之眵。淋瀝不斷。不與瘦溺相混。脈大滑。按之無力。

（療法）察其腎虛者。宜服兔絲子丸。濕熱者。宜服葶藶分清飲。白濁不治。久久則脾氣下陷。水道不清。與夫相火已殺。心腎不交。精滑不固。遺濁不止。皆傳變之候。當求脾腎而舉之。固之。

【兔絲子丸】 兔絲子二兩 茯苓 山藥 沙苑蒺藜炒 車前子 遠志肉去心甘草水泡炒各一兩 牡蠣醋煨碎五錢

右用石斛二兩熬膏。量加煉蜜爲丸。每服三四錢。開水下。

【葶藶分清飲】 川葶藶二錢 黃柏炒褐色 石菖蒲各五分 茯苓 白朮各一錢 蓮子心七分

醫藥大全 內科門：（濁症）：瘦溺白濁

丹參 車前子各一錢五分

右水煎服。

(白濁通治單方) ①蕎麥炒焦爲末。鷄子白和丸。每服五十丸。鹽湯下。日三服。(濟生方)

②陳冬瓜仁炒爲末。每空心。米飲湯服五錢。(救急良方) ③桑礪硝炙。白龍骨等分爲細

末。每服二錢。空心用鹽湯送下。(外臺秘要) ④清明所挿簷上之柳條。煎服。治白濁。神

效。(正園臆草) ⑤生蘿蔔剉空。留蓋。入吳茱萸填滿。蓋定。錢住。糯米飯土蒸熟。取去

茱萸。以蘿蔔焙研末。糊丸桐子大。每服五十丸鹽湯下。日三服。(普濟方)

## 二、瘦 弱 赤 濁

(病因) 赤濁之因。與白濁相類。由於陰火。張。血不及變精。即迫而流出。以精爲血所化也。

(病狀) 莖中熱痛。如火灼刀割。溺赤濁亦赤。若見鮮血。口濁。時發熱。則爲尿血之候。當別

論。

(療法) 宜服猪苓湯治之。極效。

【猪苓湯】。苓去皮 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉各二錢

右五味以水煎服。

(赤濁通治單方)

○兔絲子。麥門冬。等分爲末。蜜丸梧子大。鹽湯下。每服七十丸。神效。

(醫學入門)

⑤遠志。甘草。水煮四兩。茯神。益智仁各一兩。爲末。酒糊丸梧子大。空心

麥湯下五十丸。(普濟方)

## 目疾

(總說)

自有五輪。合乎五臟。眼脛屬脾。其肉輪。紅絲屬心。爲血輪。白色屬肺。爲氣輪。青色屬肝。爲風輪。瞳人屬腎。爲水輪。是知目者。五臟精華之所繫也。其病總不外爲虛實。凡目疾暴赤腫痛。畏日羞明。名曰外障。實症也。久痛昏花。細小沉陷。名曰內障。虛症也。實者由於風熱。虛者由於血少。實則治宜散風瀉火。虛則治宜滋水養陰。然散風之後。必繼以養血。經曰。目得血而能視也。養陰之中。更加以補氣。經曰。氣旺則能生血也。能知乎此。則目疾易愈矣。

## 一、目赤腫痛

(病因) 目赤有內外二因。外因不外風熱。內因不越肝火。所謂目不因火則不病也。

(病狀) 兩目白眼紅絲交錯。迎風流淚。畏見日火之光。甚則滯痛。上下皮亦腫。得之外因。兼

醫藥大全 內科門：(目疾)：目病總說：目赤腫痛

寒熱頭痛。脉浮數。得之內因。兼口苦。脉弦數。

(療法) 宜內服疏肝湯。外用蟬花無比散散之。如大便久不通。用四順清涼飲下之。

【疏肝湯】 菊花 決明 木賊 蒼朮 防風 羌活 柴胡 薄荷 川芎 青皮 黃連 麥冬 黃

芩。枝子 桔梗 枳殼 陳皮各五分 大黃三分

右用白水一碗半。煎至一碗。晚服。

【蟬花無比散】 蟬退去足一兩 羌活五錢 川芎 石決明鹽水煮一時 防風 茯苓 赤芍各五

錢 白藜 藜藜炒去刺四兩 甘草炙 當歸各兩半 蒼朮五錢炒

右共爲細末。食後米湯調服三錢。忌生冷油麵煎炒諸物。

【四順清涼飲】 當歸 赤芍 甘草 大黃各一錢

右水煎服。如不行。大黃一錢。

## 二、紅白目痛

(病因) 不外七情內傷。五賊外攘。飢飽不節。勞役異常而致。

(病狀) 有白眼痛。有紅眼痛。或因天行赤熱。或緣暴風客熱。或由火脹大頭。患者自覺睛硬驗

疹。怕日羞明。畏風。甚者痛如針刺。淚乾下。

〔療法〕 治目珠夜痛。宜服夏枯草散。風熱痛。宜服洗肝散。天行赤熱。怕熱羞明。涕淚交流。宜服大黃當歸散。暴風客熱。白仁壅起。包小烏睛。疼痛難開。宜服瀉肺散。赤腫痛甚。宜服瀉肺湯加黃連。目赤痛。而頭目浮腫。宜服普濟消毒飲。珠痛如針刺。心經實火。宜服洗心湯。雷頭風。目痛便秘。宜服清震湯。陽邪風症。眉稜骨痛。兼火者。宜服選奇湯。陰邪風症。腦後枕骨疼。連及目痛者。宜服三因芎辛湯。顛頂風症。頂骨內痛。連及目珠。眼翳。赤。斯外症之惡候也。

【夏枯草散】 夏枯草三錢 製香附三錢 甘草一錢  
右水煎服。

【洗肝散】 薄荷 當歸 羌活 防風 山梔 甘草各一兩 酒大黃二兩 川芎八錢  
右爲細末。每服三錢。開水下。

【瀉肺湯】 羌活 元參 黃芩各一錢 地骨石 桑皮 大黃 芒硝 甘草各八分  
右水煎服。

【普濟消毒散】 黃芩 黃連各三錢 陳皮 甘草 前胡 桔梗 元參 連翹各二錢 升麻 薄荷



荷 板藍眼 馬勃 鼠粘子各一錢

右水煎服。

【洗心散】 麻黃 當歸 大黃 白朮各一錢 芍藥 荆芥 薄荷 甘草各五錢 薑三錢

右爲散。每用三錢。開水送下。

【清震湯】 升麻一蒼朮 荷葉各四錢

右用水煎服。

【選奇湯】 防風 羌活各三錢 黃芩一錢 甘草八分

右水煎服。

【三因芎辛湯】 附子 川烏 南星 乾薑 細辛 川芎各一錢 炙草五分 薑七片 茶一撮

右水煎服。

### 三、眼 生 外 障

(病因) 多屬風火上壅。所致

(病狀) 上下胞肉菴翳。磨蕩其睛。久而生翳。在眼外暗遮。

〔療法〕 宜外用陽丹及陰丹。內服石決明散。

【陽丹】 黃連 黃蘗各一兩 生大黃 黃芩 防風 龍膽各五分 當歸 連翹 羌活 梔子

白菊花 生地黄 赤芍 苦參各三錢 蒼朮麻黃 川芎 白芷 細辛 千里光 龍腦薄荷

荊芥 木賊各一錢

右藥以井水洗淨。剉碎。以井水浸銅器內。春三。夏二。秋四。冬五日晒。常將手搥出藥味。晒出藥力。熟涓過淨。留清汁一碗以飛藥。留濁汁三碗以淬藥。然後用溶銅鍋子一個。裝打碎甘石一斤在內。新瓦蓋上。松炭固封。燒令透極紅色。錯出少時。淬入藥汁內。煨碎三次。就將留下清汁飛細。碾令千萬餘下。澄清去濁。晒乾再碾。令無色爲度。細絹重濾過。磁器收貯。聽用。入後藥。

爐甘石一錢 麝香三厘 片鱗一分

右爲細末。次入片鱗煨熟。涓濾過。磁器收貯。點眼。如有翳膜。配合陰丹。

【陰丹】 蜜陀僧二分半 爐甘石一兩 銅青一錢九分 礬砂六分二厘半 沒藥二分 青鹽 乳

香各三分七厘半 熊膽一分二厘半

右八味。用黃連五錢。龍膽草二錢半。煎汁過淨。將前藥和一處。入汁碾細。晒乾。再碾極

細。入後藥。

白丁香 礬硝 白礬生 輕粉各一分七厘半 硼砂二分半 雄黃 牙硝 黃丹 血竭 硃砂  
各一分二釐半 鉛白霜 粉霜膠條 膽礬各七釐半

右各另製細末。依方秤合。研令無聲。至于萬餘下。磁器收貯。聽用。

【石決明散】 石決明煨 枸杞 木賊 荊芥 桑葉 粉草 穀精草 金沸草 蛇蛻 蒼朮 白  
菊花

右各等分。爲末。每服二錢。茶清調。食後服。

#### 四、眼生內障

(病因) 飲食不節。勞傷形體。脾胃不足。以致血虛氣鬱而成。

(病狀) 外似好眼。而不能照物。不痛不癢。惟瞳神之內。有隱隱白色。

(療法) 宜服黃芩黃連湯。或復明散。極效。

【黃芩黃連湯】 黃芩酒洗炒 生地黃酒洗 龍膽各一兩 黃連七錢酒洗炒

右剉碎。每服二錢。水二盞。煎數沸。去滓。再煎至一盞。煎服。午後晝間。俱不可服。惟

午飯時服之方效。

【復明散】 黃芪一錢半 生地黃 柴胡 連翹 甘草炙各一錢 當歸二錢 蒼朮 川芎 陳皮 各五分 黃蘗三分

右以水兩大盞。煎至一盞。去渣。稍煎服。食後。忌酒及辛熱之物。

〔赤眼通治單方〕 ①黃連三分。黃柏一錢。白礬一錢。銅青一錢。以上藥用水煎。濃晴天露一夜。蘸抹眼睛。極效。(經驗良方) ②冬桑葉。野菊花。等分煎水。俯首盆口。上覆布袱。使熱氣入眼。俟溫將水洗之。有效。(古今醫說) ③明礬一小塊。入水洗之使光滑無稜。濕口涎少許。日於眼角上輕々磨擦數次。有效。(慈溪日鈔) ④決明子炒研。茶調敷兩太陽穴。乾則易之。一夜即愈。(醫方摘元) ⑤赤眼澀痛。白蘆末。水調貼足心。妙。

(聖濟總錄)

〔目痛通治單方〕 累年不愈者。生蠟取汁洗之。或入黃連末在內。取汁點之。(陳藏器本草)

〔內外障通治單方〕 ①麻黃根一兩。當歸身一錢。同炒黑色。爲麝香爲末。時時噴鼻。(普濟方) ②遠年自障者。用鴛兒不食草。川芎。青黛各等分。爲末。擗鼻取嚏。(崔知悌方)

③久患內障。用車前子。乾地黃。麥門冬等分爲末。蜜丸如桐子大服之。(普濟方)

(風眼、下淚單方) ①木耳一兩。燒存性木賊一兩爲末。每服二錢。以清米泔水煎服。(惠濟方)

②青魚膽。和人乳蒸三次。露三次。點眼角。再用桑葉煎洗。(經驗方)

(睡起目赤單方) 生地黄汁。浸糯米半升。晒乾。三浸三晒。以米煮粥。日食一盞。數日即愈

。(醫餘錄)

(目難遠視單方) 豬肝一具。細切。去皮膜。葱白一握。用鼓汁作羹。待熟。下鷄子三個食之。

。(普濟方)

(目昏多淚單方) 生地。熟地。川椒。各等分爲末。蜜九梧子大。每服五十九。鹽米湯空心下。

。(經驗方)

## 口疾

(總說)

肝熱則口酸。膽熱則口苦。心熱亦口苦。脾熱則口甜。胃熱則口臭。虛則口淡。肺熱則口辣。甚則口腥。腎熱則口鹹。胸胃熱鬱則口臭。口糜口瘡。俱係熱毒。而其中仍當以口瘡口臭二症爲常見而病重。故先述之。

## 一、虛實口瘡

(病因) 此症有虛實之分。實者由於過食膏粱厚味。脾胃積火上升。虛者由於七情色慾太過。心

腎虛火上炎。

（病狀）瘡色鮮紅。滿口闕斑。甚者腮頰俱腫。脉實口渴。此爲實症。瘡色淡紅。滿口白斑微點。甚者陷露龜紋。脉虛不渴。此爲虛症。

（療法）實症宜服涼膈散。虛症宜服加味四物湯。口瘡雖屬於火。然有服涼藥久不愈者此因孤陽上亢。當用七味地黃湯冷服。引火歸原。甚者可加附子。以爲引導。從治之法也。

【涼膈散】 連翹四錢 大黃酒浸 芒硝 甘草各二錢 黃芩酒炒 薄荷 梔子各一錢  
右爲末。每服三錢。加竹葉生薑煎。

【加味四物湯】 當歸 熟地各三錢 川芎一錢五分 白芍酒炒 黃柏 知母 丹皮各二錢  
右七味水煎服。

【七味地黃湯】 地黃四錢 山藥 山萸肉二錢 丹皮 白茯苓 澤瀉各錢半 桂枝五分  
右水煎。作一劑冷服。

## 二、寒 熱 口 臭

（病因）此症有寒熱之分。寒者譬如陰濕留垢。熱者譬如暑天腐肴。然其所以上升。皆由胃氣不

降。

(病狀) 臭如酸酢。苦賦不渴。飲食噎滯。此爲寒症。臭如糞穢。口渴引飲。胃納甚旺。此爲熱症。

(療法) 熱症宜服甘露飲。寒症宜服平胃散加味。

【甘露飲】 枇杷葉 熟地 天冬 枳殼 茵陳 生地 麥冬 石斛 甘草炙 黃芩各等分

右爲末。每二錢。水一盞。煎七分。去滓。食後。臨臥溫服。

【加味平胃散】 蒼朮五錢 陳皮去白 厚朴各三錢 甘草一錢五分 檀香 佩蘭各二錢

(口瘡通治單方) ①生甘草二寸。白礬一粟大。常噙之。嚙津。(活法機要) ②研砂。硝焰會

口中。以天南星爲末。用醋調貼足心。神效。(醫學正傳) ③久患口瘡不愈者。生附子爲末

。醋麵調貼足心。男左女右。日再換之。(經驗良方) ④沒石子炮三分。甘草一分。研末

之。月內小兒生口瘡者。則以少許置乳上吮之。入口即啼。不過三次。(聖惠方) ⑤大椒去

閉口者。水洗。麵拌。煮作粥。空腹吞之。以飯壓下。重者可再服。以瘥爲度。(食療本草

) ⑥濃煎升麻湯入鹽。頻々含漱。(本草綱目) ⑦生白礬爲末。敷之。亦效。(丹溪心法

) ⑧蜜陀僧煨研。搗之。(聖濟總錄) ⑨五倍子一兩。蜜炙黃蘗。滑石各五錢。銅綠二

錢。麝香三分半。爲末。搗之。極效。(醫學正傳) ①苦竹葉煎湯漱口。或取溼塗之。俱良。

(本草)

一(口臭通治單方)

①豆蔻。細辛。爲末。含之。(肘後方)

②白梅善治口臭。常含之。可以香口。

(本草)

③尋常口臭。每夜於臨臥時。口含荔枝肉一二枚。次早吐之。七日後即見小效。

(集簡方)

④口中如膠而臭。知母。地骨皮。山梔。麥門冬。甘草。鹽湯噉。早起汲井中第一汲水含之。吐棄廁下。即瘥。(本草)

⑤香白芷七錢爲末。食後。井水服一錢。(普濟方)

一(口乾無津單方)

①元參二三片。含口中。便生津液。大佳。(斗門方)

②虛勞口乾者。用麥冬一兩爲末。大棗肉三十個。以蜜一升。和令熟。用米五升蒸之。任性服。(千金方)

## 牙疾

(說總)

齒爲腎之標。故齒疾多腎症。條而析之。上齒則胃絡所經。止而不動。善寒飲而惡熱飲。下齒則大腸絡所貫。嚼物能動。喜熱飲而惡寒飲。其爲病。或痛搖

宣露。疏豁枯落。不外風火蟲虛。其風熱痛。齒齦腫。風冷痛。齦不腫。日漸動搖。腸胃積熱。痛。齦腫腐臭。或爲虫食齦痛。則齒齦有孔。其齦腮俱痛。連頭面腫者。實火也。齒齦腫痛。頭面不腫者。虛火也。治宜別施。



## 一、風火牙痛

【病因】陽明胃火。循經上升而痛者。爲胃火牙痛。少陰陰虧。陽亢於上而痛。肥甘濕熱。化生牙虫。蛙蝕齒敗而痛者。爲虫牙痛。

【病狀】牙齦紅腫疼痛。喜寒惡熱者。胃火也。牙齒浮動。痛而不腫者。虛火也。惡風發熱。痛引頭腦者。風火也。蝕損蛙空。牙敗而痛者。虫也。

【療法】胃火宜服清胃湯。虛火宜服玉女煎。風火宜服涼膈散。虫痛宜用一笑散噙漱。

【清胃湯】 石膏四錢煨 黃芩 生地各一錢 丹皮一錢五分 黃連 升麻各一錢  
右水二鐘。煎八分。食後服。

【玉女煎】 生石膏五錢 熟地 麥冬 知母 牛膝各二錢  
右用水煎服。

【涼膈散】 連翹四錢 大黃酒浸 芒硝 甘草各二錢 黃芩酒炒 薄荷 梔子各一錢  
右爲末。每服三錢。加竹葉生蜜煎。

【一笑散】 川椒末 巴豆一粒

右爲末。溫水含漱。

## 二、牙疳腐爛

(病因) 此症多生於小兒。小兒陰氣未充。脾胃薄弱。肥甘厚味。恣意嗜啖。以致陽明積火。蘊蒸於上。或加以暴噪啼哭。肝火妄動。或加以疹痘之後。餘毒留戀。遂成此病。

(病狀) 初起口有臭氣。漸至齒黑。牙齦作爛。腐臭難聞。熱甚則牙縫出血。血聚成膿。甚則牙齦腫紫而硬。腐穿頰頰。牙齒搖動。寒熱往來。形肉瘦削。

(療法) 胃火可服清胃散。肝胃火宜服蘆薈消疳飲。痘後餘毒宜服清疳解毒湯。

【清胃散】 生地黃三錢 當歸 川連 升麻 牡丹皮各一錢

右用水煎服。

【蘆薈消疳飲】 蘆薈生 胡黃連 石膏煨 羚羊角鎊 梔子生研 牛蒡子炒研 銀柴胡 桔梗

大黃生 元參各五分 薄荷葉四分 甘草三分

右用水二鐘。淡竹葉一錢。煎六分。食遠服。

【清疳解毒湯】 人中黃 川連生 柴胡各五錢 知母生 連翹去心 牛蒡子炒研 犀角鎊煨

醫藥大全 內科門：(牙疾)：牙疳腐爛

黑參 荊芥 防風各一錢 石膏一錢五分

右加淡竹葉一錢。燈心五十寸。水二鍾。煎八分。食遠服。

### 三、虛實牙齦

(病因) 此症多屬於熱。然有虛實之別。虛火牙齦。由於七情色慾。不知自節。陰水虧耗。不能濟火。實火牙齦。由於膏粱厚味。恣食太過。熱積於胃。循經上升。

(病狀) 口臭煩渴，牙齦腫痛。齒不動搖。血出甚多。血色鮮赤者。實火也。口不臭。牙齦微痛或不痛。齒牙搖動。血出點滴不多者。虛火也。

(療法) 實火宜服清胃湯。甚則服調胃承氣湯。虛火宜服六味地黃丸。

【清胃湯】 石膏四錢煨、黃芩 生地各一錢 丹皮一錢五分 黃連 升麻各一錢  
右用水二鍾。煎八分。食後服。

【調胃承氣湯】 大黃四錢酒浸 芒硝三錢 甘草二錢炙  
右用水三鍾。煎一鍾。去渣。少少溫服。

【六味地黃丸】 地黃四兩 山藥 山萸肉各二兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各兩半

右爲末。煉蜜丸。如桐子大。酒下十五丸。日再服。

〔牙痛通治單方〕

○熟石膏研末 與白胡椒調和。擦於牙痛處。即愈。(薛己醫按) ⑤火硝一

錢。冰片一分。明雄黃一分。元明粉五分。爲細末擦患處。(得效方) ⑥兒茶貼患處。流出

風涎。自愈。不可嚙下。(局方) ⑦石膏煨熟四兩。白茯苓去刺四兩爲極細末。頻擦之。立

愈。每日用之。可免此患。(本草綱目) ⑧黑胡椒。桑葉。泡濃湯漱。不痛乃止。(集驗

方)

〔風火牙痛單方〕

白芷焙末。蜜丸。以硃砂爲衣。每服一粒。荊芥湯下。(本草萬方鏡錄)

〔濕熱牙痛單方〕

生絲瓜一條。擦鹽。火熬存性。研末。頻擦。涎盡即愈。(食療本草)

〔風寒牙痛單方〕

高良薑二寸。全蠍焙一枚。爲末。擦之。吐涎。以鹽湯漱口。(百一選方)

〔腎虛牙痛單方〕

甘松香。硫黃。等分爲末。泡湯漱之。(經驗濟世方)

〔虫蛙牙痛單方〕

韭菜子燒煙薰之。牙虫即出。其法。以筆管。用紙糊喇叭樣。可以收煙。(

應驗良方)

〔牙疳通治單方〕

○用少許桐油。敷患處。三五次即效。若入口覺有桐油氣。即非是疾。宜止

之。(蘇悅亭方)

⑨黃蘗。青黛各一錢。冰片一分。研細漱之。(三因方)

(牙縫出濃單方) 明雄末二兩。真小磨麻油四兩。調勻。含漱片時。吐血再漱。數次即愈。(

丹溪綦要)

(睡中磨齒單方) 臨睡時含糖一小塊。可免。(三輔故事)

(取除痛牙單方) 鳳仙花子研末。入砒少許。點痛牙根上。取除甚易。(葉氏摘元方)

## 耳病

(總說)

耳爲腎之竅。足少陰經所生。然心亦寄竅於耳。在十二經脉中。除足少陽手少陰外。其餘皆入於中。人體精之氣。多走此竅。而聽覺生矣。苟一經一格有虛實失調。即足亂此竅之精明。或鳴或癢。以至聾瞶。惟聾症須分虛實。由於年衰體弱精氣不足者爲虛。若黑瘦健壯而聾者。則精氣固藏閉塞所致。乃稟賦有餘之兆。例多高壽。無須治也。

## 一、耳聾不聞

(病因) 耳爲腎竅。主藏精。精虛則不上榮於竅。而失其聰明。

(病狀) 腎虛者昏々眼々。脉見細微。病後精血不足者。眼見黑花。脉軟弱而小。

(療法) 腎虛宜服滋陰地黃湯。病後宜服腎氣丸。

【滋陰地黃湯】 乾地黃四錢 乾山藥 山萸肉各二錢 丹皮 白茯苓 澤瀉各錢半 當歸 白

芍 川芎 菖蒲 遠志 知母 黃柏各二錢

右水煎服。

【腎氣丸】 地黃四錢 山藥 山萸肉各二錢 丹皮 白茯苓 澤瀉各錢半 桂枝 附子各一錢

磁石三錢 龜版五錢

【耳聖通治單方】 ① 蜈蚣五錢。穿山甲炮五錢。麝香少許。爲末。葱汁和丸。塞入耳內。即通

。(普濟方) ② 以陳醋微火炙附子。削尖塞之。(千金方) ③ 乾百合爲末。溫水服二錢。每

日二次。(千金方) ④ 蝸牛一兩。石膽鍾乳粉各二錢半。爲末。瓷盆盛之。火煨赤末。入水

片一分。滴入耳中。無不愈。(聖惠方) ⑤ 蠶蛻紙作捻。入麝香二錢。入筆筒燒煙薰耳。連

作三次。即通。(胡洽居士百病方)

【兩耳暴聾單方】 ① 甘遂半寸。綿裹插入兩耳。口中嚼甘草少許。耳自然通(永煩鈴方) ② 香

附子瓦炒研末。蘿蔔子煎湯。早夜各服二錢。忌用鐵器。(衛生易簡方)

【腎虛耳聾單方】 ① 真磁石一塊。如豆大。穿山燒研二分。用綿包裹塞耳。口含生錢一塊。覺

耳內有風雨之聲。須臾自通。(濟生方)

〔老人耳聾單方〕 豬腎一對。去膜切片。以梗米二合。葱白二根。薤白七枚。人參二分。防風

一分。爲末。同煮粥食。(奉親養老書)

〔病後耳聾單方〕 生薑蒲汁澆之。有效。(聖惠方)

## 二、耳 鳴 聞 雜

〔病因〕 耳雖腎竅。但手足少陽之脉。俱會其中。少陽主相火。風火痰氣上逆。亦能使耳不聰。則皆爲耳鳴之類。

〔病狀〕 肝膽火升者。如聞蜂鳴。口苦咽乾。脉象弦數。痰火上升者。氣粗咳嗽。脉象滑數。

〔療法〕 肝膽火升者。宜服龍膽瀉肝湯。痰火上升者。宜服龍薈丸。

〔龍膽瀉肝湯〕 龍膽酒炒三分 黃芩炒 梔子酒炒 澤瀉各一錢 木通 車前子各五分 當歸

二分炒酒洗 柴胡一錢 甘草 生地酒炒各三分

右十味水煎服。

〔龍薈丸〕 當歸 龍膽草 炒山梔 黃連 黃柏 炒黃芩各一兩 大黃 青黛 蘆薈各五錢

木香二錢 麝香五分

各爲末。蜜丸梧子大。每服三錢。白湯下。

〔耳鳴通治單方〕 ①生地黃火煨。綿裹塞耳。數易之。以瘥爲度〔本草綱目〕 ②生地黃截塞耳

中。日易數次。或煨熟尤妙。〔肘後方〕

〔耳癢難忍單方〕 生烏頭一個。喫溫削如棗核大。塞入耳內。日換數次。過三五日便愈。〔楊

炎甫行方〕

〔耳忽作痛單方〕 ①用北細辛次末。以醋爲丸。塞耳。有奇效。〔阮氏方〕 ②木香末以葱黃藥

鵝脂。釀末。深納入耳中。〔聖濟總錄〕

〔耳中出血單方〕 龍骨末吹之。立止。〔三因方〕

〔耳爛流膿單方〕 ①陳皮一錢。燈草燒灰一錢。冰片一分。爲末。吹耳效〔外科正宗〕 ②寺隴

大香爐內煙膏一錢。冰片五厘。研末吹入。〔群書日抄〕

〔流水入耳單方〕 薄荷汁滴入。立效。〔外臺秘要〕

〔壁虎入耳單方〕 鷄冠血滴入。即出。〔奇效良方〕

〔蜈蚣入耳單方〕 炒肉放耳邊。聞香自出。烹鷄更妙。〔醫彙集〕

〔蠅蝗入耳單方〕 用手將耳扯動。或用穿山甲燒灰研末。調水灌入。〔十藥神書〕

醫藥大全 內科門：〔耳病〕：耳鳴聞雜：諸物入耳



(飛龜入耳單方) 急尋取皂莢中蠶虫。研爛。同鯽魚血灌之。極驗(危亦林得效方)

(螞蟻入耳單方) 穿山甲燒研。水調灌之。即出。(肘後方)

(蠶虱入耳單方) 菖蒲研末炒熟。袋盛枕之。效。(聖濟總錄)

(臭虫入耳單方) 緊閉口目。以一手掩鼻孔。一手掩其餘一耳。力屏其氣。虫自出。否則用香

油滴耳。(衛生寶鑑)

## 健忘

(總說)

健忘者。陡然而忘其事也。盡心力思量不來。爲事有始無終。言談不知首尾。皆主於心脾二經。蓋心之官則思脾之官亦主思。此由思慮過度。傷於心則血耗。散。神不守舍。傷於脾則胃氣衰憊而疾愈深。二者皆知人事。則卒然而忘也。

### 一、脾傷健忘

(病因) 心主血。因血少而不能養其真臟。或停飲而氣鬱以生痰。氣既滯脾不得舒。是病皆由此作。

(病狀) 陡然忘事。甚則驚悸怔忡。或則飲食不思。大便不實。

(療法) 治之必須養其心血。理其脾土。加減補心湯。天王補心丹。皆可服。飲食不思。大便不

實者。則宜服安神定智丸。因讀書辛苦而有房勞者。宜服歸黃湯。

【加減補心湯】

人參 白茯苓 陳皮 白芍酒炒 遠志甘草水泡去心 酸棗仁炒 知母 白朮

生地黃 當歸 石菖蒲 麥門冬去心 黃柏酒炒 甘草

右隨症輕重用。薑棗煎服。

【天王補心丹】

懷生地二兩 天門冬去心 桔梗各二錢半 當歸 柏子仁 酸棗仁炒 五味子

各五錢 麥門冬去心 遠志甘草水泡去心 白茯苓去皮 玄參 丹參 人參各二錢

右爲細末。煉蜜爲丸如梧桐子大。朱砂爲衣。每服三二十丸。臨臥燈心竹葉煎湯送下。

【安神定志丸】

人參一兩五錢 白朮去蘆炒 白茯苓去皮 白茯神去心 遠志甘草水泡去心

石菖蒲去毛忌鐵 酸棗仁炒各一兩 麥門冬去心一兩 牛黃另研一錢 辰砂二錢半水飛爲衣

右爲細末。圓眼肉四兩蒸膏。和煉蜜三四兩爲丸。如梧桐子大。辰砂爲衣。每服三十九。酒

米湯下。不拘時。日三服。

【歸黃湯】

當歸 生地黃 白朮 玄參各一錢 川芎 白芍 白茯苓 黃柏酒炒 知母酒炒

麥門冬去心 山梔炒 甘草各五分

右剉一劑。生薑煎服。

## 二、吐血健忘

(病因) 思慮傷脾。不能攝血。致血妄行。

(病狀) 血或吐或下。或健妄。怔忡。驚悸不寐。發熱虛汗。或心脾傷痛。嗜臥少食。大便不調。或血虛發熱。或肢體重痛。

(療法) 宜服歸脾湯以補脾傷。

【歸脾湯】 人參 龍眼肉 黃耆各二錢半 甘草五分 白朮二錢半 茯苓二錢半 木香五分

當歸 酸棗仁炒研 遠志各一錢

右加薑三片。水煎服。

## 厥症

(總說)

厥者逆也。陰陽之氣不相接。則手足厥逆也。其症有陽厥。煩渴譫妄。身熱脈洪數是也。有陰厥。身冷脈沉。足踈臥。唇口青。或自利不渴。小便白是也。

然陽厥伏熱深而振慄。反見身冷。脈微欲絕。此極陽似陰。服熱藥即死。陰厥。虛寒甚而發躁。欲坐泥水中者。此陰極似陽。服寒藥即死。不可不辨。此外又有暑厥。中暑耗氣發厥。脈虛自汗。有氣厥。因暴怒而得。即氣中也。與中風相似。惟風中身熱。氣中身冷。有痰厥。

其脈弦滑。或咽中如拽鋸聲。有虺厥。胃中冷。吐出長虫者是。

## 一、陽氣厥症

【病因】陽厥者。是熱深則厥深。蓋陽極則發厥也。

【病狀】忽然厥逆。煩渴。譫妄。身熱。脈洪數。極而似陰。振慄身冷。脈沉。

【療法】陽厥與陽極似陰。宜用大小承氣湯。隨其輕重下之。

【大承氣湯】 大黃二錢酒洗 厚朴四錢去皮炙 枳實二枚炙 芒硝半合

右四味以水先煮二物。去滓。納大黃再煮。去滓。納芒硝。更上微火一兩沸。分溫再服。得下。餘勿服。

【小承氣湯】 大黃四錢 厚朴二錢去皮炙 枳實枚半炙

右三味以水煮。去滓。分溫二服。

## 二、陰氣厥症

【病因】陰厥者。是寒深則厥深。蓋寒極而發厥也。

醫藥大全 內科門：(厥症)：陽氣厥症：陰氣厥症

〔病狀〕 此症始得之身冷脈沉。四肢厥逆。足踈臥。唇口青。或自利不渴。小便色白。極則發躁

。欲坐泥水中者。此陰極似陽也。

〔療法〕 宜服理中湯或四逆湯。

〔理中湯〕 人參 甘草炙 白朮 乾薑各三錢

右水煎溫服。

〔四逆湯〕 甘草炙二錢 乾薑錢半 附子半枚生用去皮破四片

右水煎。去滓。溫服。

### 三、中暑厥症

〔病因〕 中暑耗氣遂致發厥。

〔病狀〕 此症得之於夏。卒然厥倒。脈虛自汗。

〔療法〕 宜服白虎湯，或香薷飲。加羌活。

〔白虎湯〕 知母三錢 石膏六錢 梗米合半

右以水煮米熟。湯成。去滓。溫服。

【香需飲】香需五錢 厚朴薑汁炒 白扁豆炒各二錢半

右水煎浸冷服。

#### 四、怒氣厥症

（病因）因暴怒而得。即氣中也。蓋怒則氣上。氣上則上焦氣實而不行。下焦氣逆而不吸。故令暴死。

（病狀）此症與中風相似。但風中身溫。氣中身冷。脈細。

（療法）宜服蘇合香丸。或蜜香正氣散。加南星。木香。烏藥各二錢。

【蘇合香丸】蘇合香油五錢入安息香內 安息香一兩另爲末用無灰酒半斤熬膏 丁香 青木香 白檀香 沉香 藿香 香附子 訶子煨去肉 烏犀鱗 硃砂水飛各一兩 薰陸香 片腦研各五錢 麝香七錢半

右爲細末。入安息膏。煉蜜和劑。丸如芡實大。每四丸。空心。用沸湯化下。溫酒下亦得。

【蜜香正氣散】厚朴 陳皮 桔梗 半夏各二錢 甘草一錢炙 大腹皮 白芷 茯苓 蘇葉各三錢 藿香三錢

右十味加薑棗。水煎熱服。

## 五、痰逆厥症

〔病因〕因痰上逆而致氣塞。

〔病狀〕卒然不省人事。喉中如拽鋸聲。脈象弦滑。

〔療法〕急用牙皂。白礬。等分研末。吹鼻。即以香油一盞入姜汁少許澆之。立醒。或燒竹瀝發汗。亦可。醒定宜服二陳湯加薑汁。竹瀝各少許。

〔二陳湯〕 半夏製 茯苓各三錢 陳皮二錢去白 甘草一錢  
右四主加薑二片。水煎服。

## 六、蛔虫厥症

〔病因〕就厥者。乃胃寒所致。經曰。蚘者長虫也。胃中冷即吐蚘。

〔療法〕宜服加味理中湯及烏梅丸。

〔加味理中湯〕 人參 甘草炙 白朮 乾薑各三錢 川椒五粒 檳榔五分

右水煎溫服。

【烏梅丸】 烏梅三十個 黃連一兩 黃柏六錢 乾薑一兩 附子二枚泡 蜀椒四錢熬 桂枝六

錢 細辛六錢 人參六錢 當歸四錢

右五味異搗篩合治之。以苦酒漬烏梅一宿。去核。蒸之二升米下。飯熟。搗成泥。和藥令相得。納臼中與蜜杵千下。丸如梧桐子大。先食飲服十丸。日三服。稍加至十餘丸。禁生冷滑物臭食。

## 脇痛

(總說)

肝臟於內。外應乎脇。所藏者血。所屬者怒氣。仆跌關蹇。內傷乎血。積於肝分。則脇痛作矣。或外觸惱怒。鬱結不行。藏於肝部。即無瘀血亦痛。然而左有季脇作痛者。季脇在肋稍之下。肝之下。膈之位也。痛甚而下連少腹者。亦是死血。痛不甚而止於一處者。痰也。脈沉氣滯血。滑疾數熱。兩脇痛脈必雙弦。弦澀者順。洪大者逆。

## 一、內因 脇痛

(病因) 因暴怒傷臟。悲哀氣結。或飲食過度。冷熱失調。或因痰積流注於脇。與血相搏。皆能



爲痛。此內因也。

(病狀) 怒氣作痛外。痛而且膨。得噫則緩。已而復痛。痛有是而息。左脇痛甚者。必肝火甚。木氣實。右脇痛甚者。是痰流注並食積也。食積者。必脇下扛起一條作痛。

(療法) 因怒氣者。宜服疏肝散。肝火盛者。宜服當歸龍薈丸。痰流注者。宜服加味二陳湯。食積宜服保和丸。

【疏肝散】 黃連與棗黃煎炒二錢 柴胡 當歸酒洗各一錢五分 青皮 桃仁研如泥 枳殼麩炒各一錢 川芎 白芍酒炒各七分 花紅五分

右剉一劑。水煎。食遠服。

【當歸龍薈丸】 龍薈草 當歸俱酒炒 山梔 黃芩 黃連各一兩 蘆薈 青黛 大黃酒製各五錢 木香一錢 麝香五分

右研細末。麪和丸。每服二十九。薑湯下。

【加味二陳湯】 半夏製 茯苓各三錢 陳皮二錢去白 甘草 南星 蒼朮 川芎 白芥子各一錢。右加薑三片。水煎服。

【保和丸】 厚朴 半夏 腹皮 柴胡 枳實 甘草 生薑

右各等分爲末。丸如桐子大。煨實煎湯下二十丸。

## 二、外因脇痛

〔病因〕傷寒少陽。耳聾脇痛。風寒所襲而爲脇痛者。此外因也。

〔病狀〕脇痛發熱。脈弦數。頭引痛。或耳不聞。

〔療法〕宜服柴胡芍歸湯。

〔柴胡芍歸湯〕柴胡 川芎 白芍 青皮 枳殼 麩炒各一錢五分 甘草 香附子 當歸 龍膽

草 木香 砂仁各一錢

右剉一劑。薑一片。水煎。溫服。

## 三、仆跌脇痛

〔病因〕仆跌鬪毆。內傷乎血。積於肝分。則脇痛作矣。

〔病狀〕痛而不膨。按之而痛。不按亦痛。痛無時息。

〔療法〕宜服活血湯治之。

醫藥大全 內科門：(脇痛)：外因脇痛：仆跌脇痛

【活血湯】 常歸尾 赤芍 桃仁去皮尖 牡丹皮 玄胡索 烏藥 香附子 枳殼各一錢 紅花

官桂各五分 木香五分另磨汁 川芎七分 甘草二分

右剉一劑。生薑一片。水煎服。

【脇痛通治單方】 ①脇下刺痛。小茴香一兩炒。枳殼五錢。麩炒。爲末。每服二錢。鹽酒調下

。神效。(袖珍方) ②葱苡根剉。煮濃汁服三升。乃定。(肘後方) ③羚羊角燒末。水服一

錢。(子母秘錄) ④脇骨疼痛。因驚傷肝者。枳殼一兩。麩炒。桂枝生半兩爲細末。每服二

錢。薑棗湯下。(本事方) ⑤風脇痛。防風水煎服之。(本草綱目) ⑥槲殼煎服。末服並佳

。(本草綱目) ⑦連胸欲死者。香薷搗汁。二三升服。(肘後方) ⑧腎氣衝脇。如刀刺痛。

喘息不得。生茴香搗汁一合。投熱酒一合。和服。(食療本草)

【脇胸氣逆單方】 茯苓一兩。人參半兩。每服三錢。水煎服。日三服。(聖濟總錄)

## (蟲病)

(總說)

虫由有形之物。假陰陽之氣。面生於腸胃。蓋飲食停積。濕熱相感。稠粘膠固。資熱血以相成。得生氣以陶鑄。始因飲食而變。即賴食以養。食精氣。飲膏血。壞臟腑。爲害不小。大凡難化之物。皆能生虫。成於何物。即思嗜何物。又有瘡虫。即尸虫也。瘡瘵之人多瘡血。瘡血不得消。得火煨煉。遂成細虫。其色變赤。皆血之所化。血

統於肝。々。穀魂。病人既死。魂隨虫出。好覓同氣。染之卽成傳尸瘡症。虫病面黃肌瘦。唇白毛豎。時覺惡心。口吐清水。心腹絞痛。或頭髮猗猗。洒浙惡寒。或頭面生瘡。濕癢治速。若瘡虫形症。必一人患瘡而死。其人復有是症。乃可以決。豈與虫形症同哉。

## 一、諸 蟲 疔 積

（病因）不節飲食。或好食生硬等物。以致積而不化。久即變虫。

（病狀）面色痿黃。肌體羸瘦。四肢無力。或好食生米。或好食壁泥。或好食茶炭鹹辣等物。

（療法）先服指迷七氣湯。再服退黃丸。一服除根。

【指迷七氣湯】 青皮 陳皮 三稜 莪朮各一錢 香附八分 益智仁 麝香 官桂 桔梗 大黃 檳榔 甘草各五分

右到水煎。露一宿。五更空心溫服。不得些少飲食。不然則藥力減而虫積不行矣。服藥頃肚腹必痛。當下如魚凍或長虫。或血髓。至日午虫積下盡。方用溫粥止之。後服退黃丸一料。全愈。

【退黃丸】 平胃散三兩 絳礬半兩

醫藥大全 內科門（虫病）：諸虫瘡積

右用醋糊爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。滾湯送下。忌生冷澀澀等物。

## 二、口吐蛔蟲

(病因) 胃火上升。蛔不能安。故隨火而起。

(病狀) 口中吐出蛔蟲。時或頭痛。泛嘔。面青唇赤。

(療法) 宜先以烏梅。黃連安之。使其降下。然後服撥蛔蟲丸。

【撥蛔蟲丸】 雷丸熬 橘皮 棧仁各五分 狼牙六分 貫衆三枚 青柏子 蕪荑 乾漆熬各四

分 亂髮如鷄子大燒 殭蠶二十枚熬

右十味搗篩。蜜丸。飲及酒。空心服二七丸。日再服。

(蛔蟲心痛單方) 作痛如刺。口吐清水者。白熟艾一升。水三升。煮服。或生艾搗汁。五更食

香脯一片。乃飲汁。(驗方)

(虫食下部單方) 虫食下部。肛門瘡甚。乃大虫受熱。化生細蟲爲害也。雖服丸散煎劑。不能

奏功。可用豬肝一大塊。切作一條。長六七寸。煮熟四圍刺作眼。如簪脚大者二三孔。蘸

糖進肛門。其瘡愈甚。少頃瘡止。蟲已在肝中。徐々取出。另換新者塞之。如此三次即愈。

亦治婦人陰尸有蟲。痒不可忍者。(醫學津梁)

## (翻胃)

(總說)

夫翻胃之症。其來也。未有不由膈噎而始者。膈噎者。喜怒不常。憂思勞役。驚恐無時。七情傷於脾胃。鬱而生疾。痰與氣搏。升而不降。飲食不下。血氣流於咽噎。五竅結於胸膈者爲五膈。法當順氣化痰。溫脾養胃。如陽脈緊而澀者。爲難治之症。夫翻胃即膈噎。膈噎乃翻胃之清也。

## 一、膈症難食

(病因) 膈有十般之病。其實同出於一源。皆因動性不能發洩。則鬱於肝火之膈膜屬肝木。否則木乘土位。木曰曲直作酸。然酸則能收寒。胃腕因之而收小窠礙。乃作膈症。

(病狀) 飲食之際。氣忽壅塞。飲食原可下咽。如有物梗塞之狀。

(療法) 宜服當歸潤膈湯。如大便秘燥。痰咳喘滿。脾胃壅滯者。宜服人參利膈丸。

【當歸活血潤膈湯】 當歸酒洗一錢五分 桃仁去尖一錢 廣陳皮八分 川厚朴姜炒一錢 黃

連吳茱萸煎湯炒一錢 大腹皮甘草湯洗一錢 紅花七分 片白朮鹽水炒 炙甘草三分 善酒

者加葛根

右剉一劑水煎溫服。

【人參利膈丸】 人參三錢 當歸二錢 藿香一錢五分 厚朴姜汁炒二兩 枳實麸炒二兩 大黃酒蒸一兩 木通一錢五分 檳榔一錢五分 甘草三錢炙  
右爲末。滴水爲丸。如梧子大。每服五十丸。溫水下。

## 二、噎食虛症

(病因) 五噎名雖有五。原其要在於氣弱血枯之人。思慮勞愁而成者也。氣弱則運化不開。血枯則道路閉澀。蓋心生血。腎生氣。任脈乃陰之母。枯則精涸。任脈不潤矣。任脈循咽嚥胸中胃之三皖一直而下。腎虛則丹田清氣不升。故中焦失須下之化脾。雖思味而愛食。因升降不前。而成噎矣。

(病狀) 腹中非不欲食。但不肯留。胃氣不溫。不能消食。食既不消。不爲精粕而入大腸。必隨氣上逆。從口而出。

(療法) 宜絕慾。以後精血須節。願志以和心脾。服加味當歸活血潤膈湯。或加減不換金正氣散  
【加減當歸活血潤膈湯】 當歸酒洗一錢五分 桃仁去皮尖一錢 廣陳皮吳茱萸煎湯炒一錢 大

腹皮甘草湯洗一錢 紅花七分 甘草三分炙 人參一錢 白豆蔻七個 黃柏酒炒七分 知母七分 梔子炒一錢 瓜蒌仁炒一錢 遠志甘草湯去心八分

右加紅棗一枚。水煎服。

【加減不換金正氣散】 蒼朮米泔浸 陳皮去白 厚朴薑汁炒 藿香 半夏薑汁炒 枳實麸炒

白朮去蘆 白茯苓去皮 白豆蔻去殼 甘草 黃連土炒 上隨症之輕重用量

右加生薑三片。水煎溫服。

### 三、反胃嘔吐

〔病因〕皆由七情之氣太過。鬱則生火生痰而致病。病則耗氣耗血以致虛。氣虛不能運化而生痰。血虛不能滋潤而生火。遂成此病。

〔病狀〕或朝食而暮吐。或暮食而朝吐。或食已即吐。

〔療法〕初起有實熱者。宜服保和丸。久而致脾胃虛弱者。宜服人倉丸。其日久不愈。誤投香燥攻尅之藥過多。以致危殆者。宜服加減補中益氣湯。

【保和丸】 陳皮 半夏薑汁炒 白茯苓去皮 連翹 神麴 山楂肉 蘿蔔子炒各三錢 黃連薑



炒五錢

右爲末。稀米糊爲丸。胭脂爲衣。粟米大。每服六七十丸。人參煎湯。入竹瀝同下。

【人倉丸】 丁香 砂仁 白豆蔻去殼各五錢 陳倉米炒一合

右爲細末。生薑自然汁爲丸如梧子大。每服二十丸。食後用淡薑湯送下。有怒氣加香附子薑汁炒。

【加減補中益氣湯】 黃耆炙 人參 雲朮炒各一錢五分 甘草炙一錢 陳皮五分 當歸一錢

半夏 白茯苓 白芍酒炒 枳實麩炒 神麩炒 黃連薑炒各一錢

右加生薑三片。大棗二枚。水煎溫服。

(噎膈通治單方) ①威靈仙一握。醋蜜各半盞。煎五分服之。吐出宿痰愈。(經驗方) ②赤稻

細梢燒灰。滾湯隔絹。淋汁三次。取汁。入丁香一枚。白豆蔻半枚。米一盞。煮粥食。神效。  
③(摘元方) ④白猪肚連食。烘乾氣末。每服二三錢。酒調下。(千金方) ⑤昆布一兩。洗

去鹹水。小麥二合。水三盞。煎至小麥爛。去渣。不拘時。每服一小盞。仍取淨昆布。頻舍二三片。津咽下。有效。(千金方) ⑥柿蒂六枚。丁香一錢。水兩飯碗。煮滾。逐口徐飲之。再有艾葉一團。同高粱酒週身擦之。即愈。(朱肱活人書) ⑦常食梗米飯。即不噎。(千

金方) ①蘿蔔蜜煎浸油。糖嚼。咽良。(普濟方) ②葶澄茄。白豆蔻等分爲末。乾紙之。

(壽域神方) ③甘遂麴煨五錢。南本香一錢爲末。壯者一錢。弱者五分。水酒調下。(怪證

奇方) ④用北庭砂二錢。水和蕎麥麵包之。煨焦待冷。取中間濕者。焙乾一宿。入檀榔二

錢。丁香二個。研勻。每服七釐。燒酒送下。日三服。愈。即止。後進白帶半月。(千金方)

## (吞酸)

總) 夫酸者。肝木之味也。由火盛制金不能平水。則肝木自甚。故爲酸也。如飲食

熱則易於酸矣。或言吐酸爲寒者。誤也。乃濕熱在胃口上。飲食入胃。被濕熱

## 一、痰鬱吞酸

(病因) 痰熱鬱於胃口。飲食被遏而不得化。

(病狀) 時吐酸水。甚而糟雜酸水刺心。脉數而洪。

(療法) 宜服清鬱二陳湯。其有痰。有熱。有氣。有食。胸膈不寬。飲食不化者。宜服香蔻和

丸。

【清鬱二陳湯】 陳皮 半夏薑炒 茯苓 香附 黃連薑炒 梔子炒各一錢 蒼朮米泔炒 川芎

醫藥大全 內科門：(吞酸)：吞酸總說：痰鬱吞酸

枳實炒各八分 神麴炒五錢 白芍炒七分 甘草二分

右到一煎。加生薑二片。水煎服。

【香薷和中丸】 白朮去蘆炒 山柰肉 連翹各二兩 白茯苓去皮 枳殼去穢炒 陳皮去白

神曲炒各二兩 乾生薑半兩 白豆蔻炒二錢半 木香一錢五分

右爲細末。神麴糊爲丸。如梧桐子大。每服二十九。食後白湯送下。

## 二、食積吐酸

(病因) 食不消化。積於胃口。時乘胃火而上。

(病狀) 時吐酸物。便澀胸悶。右關沉實。

(療法) 宜服萊連丸。效。

【萊連丸】 蒼朮米泔浸一兩 陳皮二兩 半夏薑炒一兩 白茯苓去皮一兩 黃連兩半薑炒夏月

倍用 吳茱萸炒一兩冬月倍用

右爲細末。蒸餅爲丸。如菉豆大。每服三十丸。食後白滾湯送下。

# （陽痿）

（總說）

夫男子陽痿不起者。多由於命門火衰。精氣虛冷。或七情勞倦。損傷陽氣。或濕熾盛。以致宗筋弛縱而爲痿弱者。譬如酷暑時期。諸物棉萎。經云。壯火食氣。亦此謂也。

## 一、精虛陽痿

（病因）房事不節。命門火衰。精氣虛寒。遂成此症。

（病狀）陽物不舉。或下都極冷而爲陽痿。

（療法）多服右歸飲必能大驗。如妄用助興之藥。雖強助一時。而真陰愈竭矣。戒之戒之。

【右歸飲】 大熟地一兩 兔絲三錢 玉桂二錢研末沖 生五味八分搗碎 鹿茸二錢 瑱陽三錢

熟附片四錢 枸杞三錢酒炒 川椒七分微炒 川椒七分微炒 淮山藥五錢 固脂二錢

右水煎溫服。

## 一、七情陽痿

（病因）因憂思驚恐過度。致令脾腎虧敗而氣受傷。

醫藥大全 內科門：（陽痿）：陽痿總說：精虛陽痿：七情陽痿二二五

(病狀) 陽物不舉。或舉而不久。左尺虛微是也。

(療法) 必須大開懷抱。方得振興。徒資藥力。恐難見效。宜服加味五福飲。或每晚服加寧志膏一劑亦可。

【加味五福飲】 人參一錢 熟地一兩 當歸三錢 焦朮二錢 炙草錢半 枸杞 兔絲各三錢

右用水煎服。

【加味寧志膏】 人參八分 乳香一錢 辰砂二分 北五味八分 茯神三錢 炒棗仁三錢 大熟

地一兩

右與金器同煎。出金器。溫服。

### 三、筋弛陽痿

(病因) 肝腎濕熱。以致宗筋弛縱而爲痿弱。

(病狀) 陽物不舉。脉洪。外見火症。或小便熱澀。

(療法) 亦服六味地黃湯或加減一陰煎。切不可用苦寒瀉之。當知腎無瀉法也。

【六味地黃湯】 熟地一兩 棗皮三錢炒 淮藥四錢炒 丹皮二錢 澤瀉二錢 茯苓三錢

右水煎服。

【加減一陰煎】 生地五錢 熟地一兩 冬青子四錢 麥冬二錢 知母一錢 地骨皮三錢 白芍

二錢 真龜膠四錢

右水煎服。如小便熱澀者。加赤苓三錢。

（陽痿通治單方） ①覆盆子作丸。久服能令堅長。（本草綱目） ②購泥鰍煮食之。（集簡方）

③蛇牀子。五味子。兔絲子。等分爲末。蜜丸梧子大。每服三十丸。溫酒下。日三服。（千金

方） ④紫梢花。生龍骨各二錢。麝香少許。蜜丸梧子大。每服二十丸。燒酒下。欲解。飲

生薑甘草湯。（集簡方） ⑤雀卵和天雄。菟絲子丸服。令陰強盛。（本草綱目）

（腎虛陽痿單方） ⑥豬腰子一對。切片。枸杞藥八兩。以豉汁一盞。同椒鹽煮羹食。（經驗方

） ⑦鹿角霜。茯苓等分爲末。酒糊丸梧子大。每鹽湯下三十丸。（良方）

（精脫慾絕絕方） ⑧男子精瀉不止者。女急咬其人中。痛極自止。累效。（驗方） ⑨男女交感

藥核。精脫而死。切不可驚走下牀。男脫則女以口哺送其熱氣。女脫則男以口哺送其熱氣。

一連數十口呵之。則必悠悠然陽氣重回矣。再以人參附子湯灌之。送氣之法。先須閉口提丹

田之氣上來。盡力哺於口中。送下喉去。可救氣絕於俄頃。若貧者不能得參。急用黃芪四兩

。當歸二兩。附子五錢。水煎服。(宣明方)

## (不寐)

(總說) 經曰。衛氣者。晝行於陽。夜行於陰。行陽則寤。行陰則寐。醒則行陽。臥則行陰。蓋陽盛陰虛。則晝夜不得寐。若陰氣盛。則目瞑而臥也。不寐之因。不

外乎外感熱病。而內有心肝血虛。心血虛。神不守舍。故不寐。肝虛。魂不守舍。亦不寐。或有肺腎並病。真陰虧損。孤陽上越者。亦不寐。胃不和者。亦不寐。

## 一、食積不寐

(病因) 食不消化。停積胃間。胃不和。臥因不安矣。

(病狀) 胃中脹悶疼痛。不得安眠。不思食而渴飲。

(療法) 宜服保和湯。以取效。

【保和湯】 麥芽 山楂 芩子 厚朴 香附各一錢 甘草 連翹各五分 陳皮一錢五分  
右水煎溫服。

## 二、血虛不寐

(病因) 皆由思慮太過。血虛而神不得藏也。

〔病狀〕 心血空虛。恍惚多忘。心跳不得臥。

〔療法〕 宜服歸脾湯以補氣血。

【歸脾湯】 黃芪一錢五分 白朮 人參 茯苓 棗仁 當歸各一錢 遠志七分 木香 甘草炙 各五分 圓眼肉五枚

右水煎服。若挾肝火。加柴胡。山梔。丹皮各一錢。

### 三、驚 慌 不 寐

〔病因〕 日間受驚。遂致神傷志失。夜間則不得安寐。

〔病狀〕 其人夜中驚跳穢傷是也。

〔療法〕 宜服安神定志丸。

【安神定志丸】 茯苓 茯神 人參 遠志各一兩 石菖蒲 龍齒各五錢  
右煉蜜爲丸。如桐子大。辰砂爲衣。每服二錢。開水送下。

### 四、痰 壅 不 寐

〔病因〕 濕痰壅遏。神不得安。遂致不寐。

醫藥大全 內科門：(不寐)：驚慌不寐：痰壅不寐



（病狀）其症嘔噦氣悶。胸膈不利。睡不得安。

（療法）服二陳湯。導去其痰。臥可立至。

【二陳湯】 陳皮 茯苓 半夏薑汁炒 炙草各一錢五分

右加大棗二枚。水煎溫服。

## 積聚

（總說）

積者。推之不移。成於五臟。多屬血病。聚者。推之則移。成於六腑。多屬氣病。治積聚者。當知初中末之三治法焉。邪氣初客。積聚未堅。宜直消之而後和之。若積聚日久。邪盛正虛。法從中治。須以補瀉兼爲用。若塊消立半。便從末治。即住攻擊之藥。但和中養胃。導滯經脈。俾榮衛流通。而塊自消矣。更有虛人患積者。必補先其虛。理其脾。增其飲食。然後用藥攻其積。斯爲善治。此先補後攻之法也。

### 一、積聚初起

（病因）積者。生於五臟之陰也。其發有根。其痛有常。虛脈必結伏。聚者。聚於六腑之陽也。其發無根。其痛無常。虛脈必浮結。由陰陽不和。臟腑虛弱。四氣七情失常。所以爲積聚也（病狀）初起甚微。人多不以爲意。但覺氣滯不舒。胸膈滿悶。氣捉不安。嘔吐清水。飲不下咽。

脉來附骨者是也。

〔療法〕初起不拘氣血。飲食。蟲積。痰水皆宜服大無神功散。

【大無神功散】 地龍蓄 瞿麥穗 大麥芽各五錢 神麩二錢五分 沉香 木香各一錢五分 甘

草炙五錢 大黃酒蒸二兩

右爲細末。每服二三錢。燈心竹葉煎湯。及無灰酒調服。女以燈心紅花當歸煎湯。及無灰酒送下。忌油膩動氣之物。及房室一月。藥須黃昏服。勿食晚飯。大小便見惡物爲度。

## 二、積聚已成

〔病因〕初起失治。則積聚成矣。世有五積之分。言積之所在也。

〔病狀〕肝積者。在左脅上。狀如覆杯。或如盤。或嘔逆。或痛在兩脅牽引小腹。足寒轉筋。久則如瘕。名曰肥氣。肺積者。左右脅下。大如覆杯。氣逆背痛目瞶膚寒。皮中時痛。如風緣針刺。久則咳嗽。名曰息賁。心積者。起臍下直至心。大如臂。腹熱。咽乾心煩。甚則吐血。名曰伏梁。脾積者。在胃脘。大如覆杯。痞塞不通。覆背心痛。饑減飽見。腹滿吐瀉。足腫肉消。久則四肢不收。名曰痞氣。腎積者。發於小腹。奔上至心。上下無時。如奔豚走。

飢見飽減。小腹急。脹痛。口乾目昏。骨冷久則骨痿。名曰奔豚。

(療法)宜用和中丸隨症加藥。多服見效。

【和中丸】 白朮陳土炒二兩 扁豆炒兩半 茯苓七錢 枳實麩炒一兩 陳皮兩半 神龜炒黑

麥芽炒 山楂炒 香附薑汁炒一兩 砂仁七錢 半夏薑汁炒半兩 丹參一兩酒炙 五穀蟲兩

半酒拌炒焦黃色

右加荷葉一枚。煎水和爲丸。每日上午下午開水服二錢。肝積。加柴胡。蟹甲。青皮。莪朮。疝積。加白蘞仁。桑白皮。鬱金。心積。加石菖蒲。厚朴。紅花。莪朮。脾積。加厚朴。腎積。另用奔豚丸治之。熱積。加黃連。黃芩。寒積。加乾薑。附子。肉桂。酒積。加葛根。痰積。加半夏。水積。加桑白皮。赤小豆。血積。加桃仁紅花。乾漆。肉積。加阿魏。山查。

【奔豚丸】 川練子煨去肉一兩 茯苓 橘子鹽水炒各一兩五錢 肉桂三錢 附子炮 吳茱萸湯

泡七次各五錢 荔枝子煨八錢 小茴香 木香各七錢

熬砂糖爲丸。每服二錢。淡鹽湯下。若有熱者。去附桂。

### 三、積聚不消

(病因) 初成失治。或治不得法。延之日久。遂成惡症。

(病狀) 積聚固牢不動。堅硬不軟。則病深矣。

(療法) 積聚不消。身體虛弱。宜先補而後攻之。化堅湯。消積保中丸。大七氣湯。消痞破積丸。

。皆可服。若塊消及半。即住攻繫之藥。而服理中湯。

【化堅湯】 白朮去蘆 白茯苓去皮 當歸 川芎 香附炒 山楂 枳實 陳皮 半夏薑炒 桃

仁去皮尖。紅花 莪朮。甘草。

右隨症之輕重用量。加生薑三片。水煎溫服。肉積加黃連。麴積加神曲。左有塊倍用川芎。

右有塊加青皮。壯人加三稜。弱人加人參。

【消積保中丸】 陳皮去面一兩 半夏湯浸切 白茯苓去皮二兩 白朮去蘆炒二兩 香附醋炒一

兩 青皮去穰四錢 朮香三錢不見火 檳榔七錢莪朮醋炒八錢 三稜醋炒八錢 萊菔子炒一

兩 砂仁炒四兩 神曲炒一兩 麥芽炒六錢 白芥子炒一兩 黃連薑汁炒一兩 梔子仁薑汁

炒一兩 桃仁去皮尖一兩 紅花五錢 當歸酒洗一兩 川芎八錢 阿魏酒浸五錢 乾漆炒蠶

醫藥大全 內科門三(積聚)：積聚不消

炮五錢

右爲細末。薑汁酒打稀糊爲丸如梧子大。每服四十九。食後白湯送下。虛人加入參一兩。外用化鐵膏貼之。

【化鐵膏】 肥皂四兩熬膏 生薑四兩 葱半斤 蒜半斤 皮硝半斤化水

右加大黃末四兩。入膏再熬。貼塊上。

【大七氣湯】 三稜 莪朮 青皮 陳皮 桔梗 藿香 益智 香附 肉桂 甘草

隨症之輕重用量。

右剉劑。生薑三片。棗子一枚。水煎溫服。渣再煎服。

【消積破積丸】 三稜煨 大黃煨 乾漆炒去烟 礞砂入醋煎乾 巴豆去油各一兩

右爲末。醋糊爲丸。如菉豆大小。每服三丸。空心米湯退下。不可過服。損人之真氣。

【理中湯】 人參 甘草炙 白朮 乾薑各三錢

右水煎溫服。

(食積通治單方) ①牽牛末一兩。巴豆三個研末。水丸梧子大。每服二十九。食後隨所傷湯下

。(子和方) ②蓖麻油。牛乳等分。煮沸。入糖少許。冷服。(本草綱目)

(糯米成積單方) 神麴炒爲末。加木香。鹽開水下。數日。口中必聞酒香。其積卽消。(奇效

良方)

(牛肉成積單方) 乾稻草一握。煎濃湯熬飲。白消。(延年秘錄)

(食桃成積單方) 桃梟燒灰二錢。水服。取吐。卽愈。(張文仲備急方)

(食豆成積單方) 生蘿蔔煎飲之。卽消。(名醫別錄)

(羊肉成積單方) 栗子殼煎湯。服之卽愈。(延年秘錄)

(飲酒成積單方) 鷄內金。乾葛。等分爲末。蒸餅。丸梧子大。每酒下五十丸。(袖珍方)

(腎積不消單方) 奔豚。上氣。疼痛。茯苓四兩。小茴香四兩研末。水爲丸。開水下三錢。驗。

(驗方)

(脾積不消單方) 黃犛牛腦子一個。去皮筋。搗爛。皮硝一斤。蒸餅六個。曬研和勻。糊丸梧

子大。每服二十丸。酒下。日三服。百日有效。(驗方)

(癰塊攻痛單方) 在腹中攻痛。面黃肌瘦。眞阿膠一兩。蛤粉炒鬆。研細。丸製陳磨星五錢。

入乳浸。微火烘研。貝母一兩。去心。麝香四分。忌見火。醋甲三枚。必須九骨七骨者。眞

麻油炙脆黃。研。共爲細末。眞柏油二兩。火鐸開。入煎藥末在內。攪和。每服用芻衣。包

醫藥大全 內科門：(積聚)：積聚不消：諸般食積

一三五

一分半。茶酒送下。清晨三包。飯後三包。(治驗錄)

(食飽煩脹單方) ①大麥麩。炒微香。每白湯服一錢。佳。(肘後方) ②酒肉過多。眼滿不快

用鹽花擦牙。溫水漱下。二三次。便如湯沃雪也。(簡便方)

## 呃逆

(總說)

呃逆之氣。即經云胃爲氣逆。爲噦爲恐是也。噦者。呃逆也。非噦逆也。致逆者。噦嗽之甚也。非呃逆也。今醫妄以噦爲乾嘔。殊不知乾嘔者。無物之吐。即嘔者。非噦也。又云。致逆即噫也。殊不知噫者。食飽之息。即噯氣也。非噦逆也。當以此辨。勿悞聽俗醫所言總是一症。呃逆有兼寒兼熱者。有食滯氣滯者。有中氣虛腎氣竭者。若傷陰之呃。人之常情。氣順則止。本不必治。惟屢呃及呃之不止者。而更以病中元氣大虛而忽然大呃不止。連聲呃者。此元氣敗。極爲危險。一日不止。即難治理矣。

## 一、風寒呃逆

(病因) 外感風寒。或多食生冷。致令胃寒而呃。

(病狀) 聲才發於喉間。又戛然止。呃々然連續數聲。然短促不長。呃逆者。入聲也。聲逆入喉。逆聲盡。然後呼也。

〔療法〕宜服加味橘皮乾薑湯。若寒之甚者。可服四逆湯。

〔加味橘皮乾薑湯〕 乾薑錢半 黨參二錢 米炒 橘皮錢半 玉桂八分去皮研末另沖 通草一錢

甘草八分 雲苓錢半 薏仁七分去殼研末沖 法夏錢半 柿蒂五個

右水煎服。

〔通脈四逆湯〕 炮薑三錢 炙草二錢 生附子五分

右水煎溫服。

## 二、胃 火 呃 逆

〔病因〕胃火上逆。氣不得順。因而致呃。

〔病狀〕呃而喜冷。口渴口臭。胸中煩悶。脉見滑實。

〔療法〕服安胃飲一服即止。

〔安胃飲〕 陳皮二錢 杏肉二錢 麥芽一錢炒 木通錢半 澤瀉一錢 黃芩一錢 石斛三錢

右水煎。食遠溫服。



### 三、胃寒呃逆

(病因) 此中胃寒所生。寒氣由逆而上。亦有初本是熱。因大發汗後。復吐下之。攻熱太過。以

致胃寒者。

(病狀) 呃逆而飲食喜熱惡寒。

(療法) 服加味烏梅理中湯。或丁香柿蒂散均効。

【加味烏梅理中湯】 乾薑四分 玉桂四分研沖 白朮一錢 人參八分 陳皮八分 雲苓錢半

甘草三分

右用烏梅薑棗煎服。

【丁香柿蒂散】 丁香五分研沖 柿蒂六個 良薑八分 炙草九分 半夏錢半 陳皮一錢 茯苓

二錢薑炒 生薑三錢 附片一錢 玉桂八分

右加生薑三大片。水煎服。

### 四、腎虛呃逆

(病因) 腎氣虛寒。下焦之氣不能暢達上升。致令悠悠作呃。而不稍止。

（病狀）呃逆而腰膝無力。甚至酸痛。

（療法）宜服做歸氣飲極妙。

【做歸氣飲】 熟地八錢 茯苓三錢 炮薑錢半 丁香一錢另沖 柿蒂五個 陳皮錢半 炙草八分 玉桂八分研末另沖

右水煎溫服。

（呃逆通治單方） ①以枇杷葉濃煎飲。殊效。（驗方） ②黃蠟燒煙薰二三次。即止。（醫方類

要）

（陰寒呃逆單方） 乳香。硫黃。陳艾各二錢。爲細末。用好酒一杯。煎數滾。乘熱用鼻嗅之。

外用生薑擦胸前。鼓效。（景岳全書）

## 鬱症

（說解）

凡結聚不得發越者。即鬱也。當升不升。當降不降。當變化不得變化。故傳化失常而鬱病發矣。大抵諸病皆有餘鬱者。如情志不遂。思想無窮。名利嗜慾。

富貴貧賤。無不有之。或鬱久生病。或病久生鬱。或用藥雜亂而成鬱。又疏五過論曰。凡未診病者。先問營衛後賤。雖不中邪。病從內生。名曰脫營。營當後貧。名曰失精。然五氣流連。病有所并。凡脈見結促者。病有所鬱。即見有血氣不順。脈不和平者。其中即皆有鬱也。

。又如弦緊。沉澁。遲細。短數諸脈。亦皆爲情志之鬱。是以脈病貴乎圓通活潑。用藥貴體察機宜。診治之法。豈易言哉。

## 一、暴怒鬱症

(病因) 皆由暴怒傷肝。動氣動血。所致。

(病狀) 傷肝者。脹滿爲痛疼。動血者。吐血氣結。若怒後氣雖順適。而倦怠食少。

(療法) 傷肝者。宜服經驗舒肝理氣湯。或七氣湯。服蠶煎均效。動血者。宜服平肝湯。或既濟

湯。怒後倦怠食少者。此肝脾受傷也。宜服大營煎。或五君子煎調養之。

【經驗舒肝理氣湯】 厚朴錢半 青皮一錢 陳皮二錢 白芥子八分 枳殼一錢炒 雲苓三錢

梔子七個 大破仁八分

右水煎溫服。

【七氣湯】 法夏二錢 厚朴錢半 白芍錢半 茯苓三錢 黨參二錢 橘紅一錢 蘇葉八分 玉

桂八分

右加生薑三片。紅棗二枚。水煎溫服。

【服煎】 生地五錢 麥冬四錢 白芍錢半 石菖蒲錢半 石斛三錢 丹皮二錢 茯苓三錢

陳果皮錢半 木通二錢 知母錢半 川貝二錢

右水煎溫服。

【平肝湯】 生白芍五錢 當歸二錢半 荊芥錢半 梔子一錢炒 丹皮一兩 甘草五分

右水煎。服二三劑即愈。

【既濟湯】 熟地一兩 元參五錢 丹皮二錢 北五味一錢 川連三分 麥冬三錢去心 桔梗二

錢 粉甘草一錢 洋參二錢炒 玉桂一分沖服

右水煎服。

【大營煎】 當歸三錢 熟地一兩 枸杞二錢 炙草二錢 杜仲二錢薑汁炒 牛膝錢半 玉桂錢

半沖服

右水煎溫服。

【五君子煎】 人參八分 焦朮四錢 雲茯苓三錢 炙草二錢 乾薑二錢炒 油藥五錢炒 白朮

五錢 陳皮錢半 砂仁八分

右加連肉三十粒。水煎服。

## 二、憂思鬱症

(病因) 憂思太甚。或傷氣血。甚者脾肺俱傷。而成內傷之症。

(病狀) 思鬱不解者。心痛胃痛。思慮不遂者。或男或女。致令遺精滑濁。思慮過度。或男或女。致令遺精滑泄。或經期錯亂。思鬱動火。則致陰虛肺熱。煩渴。咳嗽見血。骨蒸夜熱。若儒生寔厄。思給腸枯。及任勞任怨。心脾受傷。致令怔忡倦怠。健忘少食。消至消瘦。憂鬱太過。內傷甚者。飲食日減。飢肉日消。精神耗敗。

(療法) 思鬱不解者。宜服加味沉香降氣飲。或做和胃飲。神香散均效。思慮不遂。遺精帶濁者。宜多服做秘元煎。思慮過度。遺精滑泄及經期。錯亂者。宜服加減固陰煎。思鬱動火者。宜服加減一陰煎。儒生思結腸枯。及任勞任怨。心脾受傷者。宜服養脾煎。若胸膈氣有不順。或微痛者。宜用扶脾養元湯與神香散合服。思鬱內傷甚者。宜服大補元煎。或青娥飲均可。切勿不察病源。亂食市上各種補品。以致延誤爲要。

## 感冒

(總說)

人爲風寒所觸。邪氣入於腠理。榮衛受病。輕者爲感冒。易痊。重者爲傷寒。雜治。傷風者。風邪傷衛也。衛主皮毛。內合於肺。故令身體發熱。憎寒頭痛

。有汗噎涕。鼻寒聲重。不時咳嗽。脈浮緩。傷寒者。乃寒邪傷表榮分也。其證身體發熱。惡寒無汗。頭痛身疼。而脈浮緊。英嘔逆煩渴者。則爲邪盛欲傳經也。

## 一、春日感冒

〔病因〕春三月偶爾感冒。

〔病狀〕輕者頭痛發熱惡寒。或咳嗽。或時熱時退。重者大寒熱。身體疼痛。或項強脚氣。

〔療法〕輕者宜服做參蘇飲加減法。必得避風忌油。重者宜服人參加減敗毒散。一二劑即愈。

〔做參蘇飲加減法〕 生黨參四錢 蘇葉八分 前胡二錢 法夏三錢 炒橘殼錢半 雲苓二錢

橘紅一錢 桔梗錢半 生淮藥三錢 乾葛八分 甘草七分 生薑五片 紅棗三枚

右水煎服。如小兒兼驚者。加變鈎藤二錢。查肉錢半炒焦。

〔人參加減敗毒散〕 生黨參五錢 雲苓三錢 桔殼一錢 柴胡錢半 大川芎錢半 羌活一錢

獨活一錢 苡米四錢 生玉竹四錢 陳皮錢半 甘草八分 生苻三片

右水煎服。小兒用量減半。

## 二、夏日感冒

〔病因〕夏三月偶爾感冒。與傷暑不同。蓋傷暑症狀並不惡寒。忽然大熱之後。而頭目昏花。莫名其狀。要或嘔不嘔。或泄不泄。昏々迷々。糊々塗々。而脉極虛細。感冒則異之。

〔病狀〕發熱而微惡寒。頭疼身疼。小便短黃。咳嗽濃痰。煩悶內熱。大便堅硬。

〔療法〕宜服做消風百解湯。如素係陽虛體弱者。宜服做大溫中飲。如素係陰虛體弱者。當服養陰解湯爲安。

【做消風百解湯】 生沙參五錢 厚朴錢半 芥穗錢半 藿香梗三錢 北防風錢半 雲苓三錢

陳皮一錢 蟬蛻錢半炒 陳茶葉三錢 滑石二錢 燈心七條 竹葉五片

右水煎。溫服。

【做大溫中飲】 熟地一兩 乾薑錢半炒 柴胡二錢 焦朮三錢 玉桂一錢 麻黃錢半去節 當

歸二錢如溼瀉者以生淮藥一錢代之

右水煎服。取微汗即愈。

【養陰解湯】 生西黨四錢 熟地一兩 當歸三錢 生淮藥五錢 前胡二錢 法半夏二錢 蘇

槳三錢 陳廣皮錢半 甘草一錢炙 大杏仁四錢 生薑三錢片 紅棗五個  
右水煎服。宜避風忌油。取自然汗。若已有汗。卽避風可也。

### 三、秋日感冒

〔病因〕 秋三月偶爾感冒。或感秋燥之氣而鬱於中焦。或秋天陰雨過過多。乍涼乍熱。而忽經失調。

〔病狀〕 頭痛發熱。口乾舌燥。喉痛。大便結。小便黃。感秋燥之氣而鬱於中焦者。則大熱大渴。而舌胎焦乾。脉洪大。其人昏迷痰壅者是。秋雨過多。乍涼乍熱而忽失調者。發熱頭痛。微惡寒。不甚渴。或澀泄。或腹痛。須防痢瘧兩症。

〔療法〕 偶感感冒者。宜服經驗潤燥湯。感秋燥之氣者。宜服解鬱清燥湯。秋涼失調。澀泄腹痛。宜服清理導滯湯。兼防痢瘧。此方最效。

〔經驗潤燥湯〕 天冬三錢 杏仁二錢 貝母錢半去心 淡竹葉五錢 雲苓二錢 牛膝一錢 以  
米七錢 酒黃芩錢半 阿膠二錢  
右用米泔水煎服。



【解鬱清燥湯】 川貝三錢 去心 黃芩二錢 梔子錢半 川牛膝二錢 天冬五錢

右加萊豆一兩。水煎服。

【清理導滯湯】 前胡二錢 藿香梗三錢 厚朴錢半 焦菴肉三錢 雲苓三錢 橘殼錢半 神麴

錢半 炒麥芽二錢 陳皮錢半 天冬二錢 甘草一錢 木香片八分 生薑五片

右用淨水煎服。

#### 四、冬日感冒

(病因) 冬三月感冒。輕則傷風。重則傷寒。如嚴寒而傷之即病者。謂之正傷寒。茲以冬間偶爾

感冒。尙未能正傷寒者言之。

(病狀) 身熱畏寒。頭痛。脉洪數。或緊。

(療法) 體虛者宜服固元兩解湯。體強實者。宜服加味柴胡飲。但女人產後忌用。

【固元兩解湯】 注黨參五錢 蘇葉一錢 麥芽一錢 防風四錢 焦菴肉三錢 砂仁八分 桔殼

一錢 神麴八分 法半夏錢半 雲苓二錢 前胡錢半 炙草八分 生薑三大片

右水煎服。如大便結加麻仁錢半。口渴加花粉八分。

【加味柴胡飲】柴胡二錢 前胡二錢 防風錢半 生白芍一錢 陳皮二錢 蘇葉一錢 甘草八分

大川芎錢半 生薑九片 葱白三條

右水煎。溫服。

〔感冒通治單方〕 ①黃糖。加老薑。葱頭煎湯。或加豆豉並酒煎服。甚妙。(萬病回春) ②初

起時。即用葱白一握。淡豆豉半合。泡湯服之。取汗即愈。(湖潮集簡方)

## 癩病

〔總說〕

此瘡古名瘡癩。俗稱大麻風。濕熱在肉。而爲風鼓之。則肌肉生蟲。白屑重疊。搔癢頭摩。甚則眉毛脫落。鼻柱崩壞。事不可復矣。

## 一、烏色癩病

〔病因〕 乃惡風滲入臟腑。血肉皆死。內生細蟲。食生脂膏。

〔病狀〕 初覺皮半變色。或淫淫苦癢如蟲行。或眼前見物如垂絲。言語無定。心常驚恐。皮肉之中。或如桃李。癩疹赤黑。手足頑癢。針刺不覺痛。脚下痛頑。不得踏地。食時開口。出氣而鳴。語亦如是。身體生瘡。癢而時如蟲行。或兩肘如繩縛。

〔療法〕 宜服苦參湯。或地黃酒。外敷加味當歸膏。往々有效。未可據視爲廢病而忽之也。

【苦參湯】 苦參一錢五分 生地二錢 黃柏五分 當歸 秦朮 生劈子 赤芍 白茯苓 丹皮

丹參 銀花 貝母各一錢

右加甘菊三錢。水煎服。

【地黃酒】 生地二錢 黃柏 苦參 丹參 葶藶 菊花 銀花 丹皮 赤芍 當歸 枸杞子

蔓荊子 赤茯苓各一錢 秦朮 獨活 威靈仙各五分 桑枝一錢五分 烏梢蛇去頭尾半條

右煮好酒五斤。退火七日後用。

【加味地黃膏】 當歸 生地各一兩 紫草 水饅子肉去殼 麻黃 大楓子肉去殼研 防風 黃

柏 元參各五錢 麻油八兩 黃蠟二兩

右先將前九味入油熬枯。濾去渣。再將油覆入鍋內。熬至滴水成珠。再下黃蠟。試水中不散爲度。傾入盞碗內。坐水中出火三日。聽用。

## 二、白色癩病

(病因) 與烏癩相同。爲病狀稍異。

(病狀) 語聲嘶啞。目視不明。四肢煩痛。身體大熱。心中懊惱。手脚緩緩。背脊拘急。內如針

刺。或生癩疹而起。往々正白在皮肉裡。鼻有息肉。目生白珠。當於醴子。視無所見。

〔療法〕宜服一醉仙散。或乳香丸。

【一醉仙散】 胡麻子炒 牛蒡子炒 枸杞子 蔓荊子炒各一兩 白茯苓 苦參 防風 括髮根 各五錢

右爲細末。每一兩五錢。入輕粉二錢。拌勻。每服一錢。茶清調。晨午各一服。至五七日。於牙縫中出臭涎。令人如醉。或下膿血。病根乃去。仍量人病之輕重虛實用。病重者。先以藥下之。候元氣將復。方用此藥。忌一切炙煇厚味。止可食淡粥青菜。或用諸蛇以淡酒蒸熟食之。可以助藥力。

【乳香丸】 通明乳香二十兩 苦參好者去麩剉四兩

右先用好酒五升。浸苦參於瓶內。以重湯煮一伏時。常用文武火慢熬。合小沸爲候。一伏時取出。濾去渣。將酒浸乳香。於砂鍋內煎如錫。入天麻四兩。爲末。大麻仁二兩。另研如膏。入乳香管內。攪令勻。慢火熬之。爲丸如桐子大。每服二十九。用大麻仁酒送下。空心及晚食前服之。

〔癩風通治單方〕 ①取死人身土鼠。炒乾爲末。酒送下。諸蟲皆消肌膚自潤。(醫學津梁) ②

醫藥大全 內科白：(癩病)：白色癩病

二四九

多取毒蛇。晒乾切片。磨作細粉。糯米糊丸。每日酒服一二錢。能起死回生。(醫學津梁)

## 內癰

(說總)

內癰者。由飲食不節。冷熱不調。寒氣客於內。或在胸膈。或在腸胃。折於血。血氣流止。與寒相搏。壅結不散。熱氣乘之。則化爲膿。故曰內癰也。胸內痛。少氣而發熱。以手按左眼。右眼見光者。胸內結壅也。若不見光。瘡內若吐膿血者。不可治也。急以灰掩其膿血。不爾者。著人腸內。有結痛。或在脇下。或在臍左近。結成塊而壯熱。必作癰脹。診其脈數而身無熱者。內有癰。

## 一、肺癰咳嗽

(病因) 由寒之氣。內舍於肺。其氣結聚之所成也。蓋因調理失宜。勞傷血氣。風寒得以乘之。

寒生熱。風亦生熱。壅積不散。遂成肺癰。

(病狀) 咳而齩滿。右脇隱痛。二脚腫滿。咽乾口燥。煩悶多渴。時出黃唾。腥臭。狀如糯米粥

者難治。有熱而嘔者。不可治。嘔膿盡而止。則自愈。若吐黃色膿臭。或帶粉紅色者。即肺

痿也。大抵脈數而實者。肺癰也。其脈短而澀者。自痊。浮大者。難治。

(療法) 其所吐止是浸沫。或膿血。未成宜服射干麻黃湯。已成宜服桔梗湯。

【射干疾黃湯】 射干三錢 麻黃 生薑各四錢 細辛 紫苑 款冬花各三錢 大棗七枚 五味子 半夏各三錢

右水煎溫服。

【甯肺桔梗湯】 苦桔梗 貝母去心 當歸 括蕁仁研 生黃耆 枳殼麩炒 甘草節 桑白皮炒 防己 百合去心 薏苡各八分炒 五味子 地骨皮 生知母 杏仁炒研 苦孝藤各五分 右水煎溫服。

## 二、腸癰腹脹

（病因）腸癰者。由寒溫不適。喜怒無度。使邪氣與榮衛相干在腸內。滯滯。加之血氣蘊積。結聚成癰。熱積不散。血肉腐壞。化而爲膿。

（病狀）小腹重而微強。抑之卽痛。小便數似淋。時々汗出。復又惡寒。其身及指甲錯。腹皮急如腫狀。診其脈洪數者。已有膿也。其脈遲緊者。未有膿也。甚者腹脹大。轉側開水聲。或繞臍生瘡。穿而膿出。或膿自臍中出。或大便出膿血。惟宜急治之。

（療法）小腹堅硬。如掌而熱。按之則痛。肉色如故。或燉赤微腫。小便頻數。汗出憎寒。脈緊

實而有力。此日淺未成膿也。亦服大黃湯。已成者。宜服千金牡丹散。

【大黃湯】 大黃炒 朴硝各一錢 牡丹皮 白芥子 桃仁去皮尖各二錢

右水煎溫服。

【千金牡丹散】 丹皮五錢 苡仁五錢 瓜蒌仁一錢五錢 桃仁去皮尖十三枚研

右水煎服。若大便不通。加大黃一錢五分。當歸三錢。得利。止後服。

### 三、胃 癰 寒 熱

(病因) 胃脘癰。由寒氣隔陽。胃口蒸聚。寒熱不調。故血肉腐壞。以氣逆於胃。故胃脈沉細。

以陽氣不得上升。故人迎熱甚。

(病狀) 令人寒熱如瘧。胃脘脹痛。手不可按。時吐膿出。

(療法) 膿成而未潰者。脈必洪數。宜服赤豆薏苡仁湯。已潰者。亦服忍冬湯。

【赤豆薏苡仁湯】 赤小豆 苡仁 防己 甘草

右各等分。水煎服。

【忍冬湯】 金銀花四兩 甘草三錢

右水煎頓服。能飲者用酒煎服。

## 心痛

(總說)

當胸之下歧骨陷處屬心之部位。其發痛者。即曰心痛。然心不受邪。受邪則爲眞心痛。且暮不保矣。凡有痛者。胞絡受病也。胞絡者。心主之宮城也。寇凌宮禁。勢已可危。而況犯主乎。故治之宜亟々也。心痛有九種。一曰氣。二曰血。三曰瘀。四曰寒。五曰飲。六曰食。七曰虛。八曰蟲。九曰瘵。宜分而治之。

### 一、氣 壅 心 痛

(病因) 氣分不舒。壅攻刺痛。

(病狀) 痛處游走不定。

(療法) 宜服沉香降氣散。

【沉香降氣散】 沉香三錢細剉 砂仁七錢 甘草炙五錢 香附鹽水炒五兩 元胡索一兩酒炒

川棟子煨去肉淨一兩

右共爲末。每服二錢。淡薑湯下。



## 二、氣血心痛

(病因) 血因氣之不暢而滯。積於胞絡。因而心痛。

(病狀) 痛有定處而不移。轉側若刀錐之刺。

(療法) 服手拈散甚妙。

【手拈散】 元胡索醋炒 香附酒炒 五靈脂去土醋炒 沒藥若上炙乾各等分

右共爲細末。每服三錢。熱酒調下。血老者。用紅花五分。桃仁十粒。煎酒調下。

## 三、燥熱心痛

(病因) 燥熱結於胞絡。因而致痛。

(病狀) 舌燥唇焦。溺赤便閉。喜冷畏熱。其痛或作或止。脉洪大有力。

(療法) 宜服清中湯取效。

【清中湯】 香附 陳皮各一錢五分 黑山梔 金鈴子即川楝子 元胡索各八分 甘草炙五分

川黃連蘆汁炒一錢

右用淨水煎服。

#### 四、寒厥心痛

〔病因〕寒氣凝結於胞絡。因而致痛。

〔病狀〕其痛暴發。手足厥冷。口鼻氣冷。喜熱畏寒。其痛綿綿不休。脈沉細無力。

〔療法〕宜用薤附湯加肉桂服之。

【薤附湯】 高良薑酒炒 香附醋炒等分

右水煎溫服。

#### 五、停飲心痛

〔病因〕水飲停積於心胞絡。因而致痛。

〔病狀〕乾嘔吐涎。或咳或噎。甚則搖之作水聲。脈弦滑。

〔病狀〕宜服小半夏加茯苓湯。

【小半夏加茯苓湯】 半夏薑汁炒三錢 茯苓三錢 甘草炙一錢 生薑三片

右水煎溫服。

醫藥大全 內科門：(心痛)：寒厥心痛：停飲心痛

## 六、傷食心痛

(病因) 傷食不化。因而致痛。

(病狀) 傷於飲食。心胸悶脹。手不可按。或吞酸暖腐。脉緊滑。

(療法) 保和湯主之。

【保和湯】 麥芽 山楂 芫荽 厚朴 香附各一錢 甘草 連翹各五分 陳皮一錢五分  
右用水煎服。

## 七、虛弱心痛

(病因) 因心血虛弱。不能榮養而痛。

(病狀) 心悸怔忡。以手按之則痛止。

(療法) 宜服歸脾湯治之。

【歸脾湯】 黃芪一錢五分 白朮 人參 茯神 棗仁 當歸各一錢 遠志七分 木香 甘草炙  
各五分 圓眼肉五枚

右水煎服。若挾肝火。加柴胡。山梔丹皮。各一錢。

## 八、蟲 嚙 心 痛

〔病因〕腐積不消。血氣不養。遂致蟲生嚙絡而痛。

〔病狀〕面白唇紅。或唇之上下有白斑點。或口吐白沫。飢時更甚。

〔療法〕宜服化蟲丸。

【化蟲丸】 蕪莢去梗 白雷丸各五錢 檳榔一錢五分 雄黃一錢五分 木香 白朮 陳皮各三

錢 神麩四錢炒

右以百部二兩。熬膏糊丸。如桐子大。每服一錢五分。米飲下。如取下蟲積。加大黃五錢。

酒炒。

## 九、邪 疰 心 痛

〔病因〕觸冒邪祟。卒而心痛。

〔病狀〕面目青黯。或昏憤譫語。脈來乍大乍小。或兩手如出兩人。

醫藥大全 內科門：(心痛)：蟲嚙心痛：邪疰心痛

(療法) 神朮散葱白酒生薑湯並治之。

【神朮散】 蒼朮陳土炒 陳皮 厚朴薑汁炒各二斤 甘草炙十一兩 藿香四兩 砂仁二兩

右共爲末。每服二三錢。開水調下。

(心痛通治單方) ①烏梅一個。棗二枚。杏仁七粒。一同搗爛。男用酒。女用醋。(海上仙方)

②桑耳燒存性。熱酒服二錢。(瀕湖集簡方) ③陳蒼米燒灰。和蜜服之。即止。(不藥

良方) ④香樟樹皮。刮去面上黑黃。用第二層皮。搗碎。煎湯服。即止。永不再發。(本

草綱目) ⑤鷄子一個。打破。醋兩合。調服。(驗方)

(急心氣痛單方) ①豬心一枚。每歲入胡椒一粒。如二十歲。入二十粒。同鹽酒煮食。(食醫

心鏡) ②生麻油一合服。(驗方)

(積年心痛單方) 濃煮小蒜食飽。勿著鹽。效。(本草綱目)

(心痛吐水單方) 飲食不下。發止不定。用雌黃二兩。醋二斤。慢火煎成膏。用乾薑餅和。丸

梧子大。每服七丸。薑湯下。(聖惠方)

(心痛徹背單方) 赤石脂。乾薑。蜀椒各四分。附子炮二分。烏頭炮一分爲末。瘥丸梧子大。

先服一丸。不止。再服。(金匱玉函)

# （五絕）

（說總）

五絕者。一曰自縊。二曰摧壓。三曰溺水。四曰魘魅。五曰服毒。皆宜急救。不可須臾或緩者也。

## 一、自縊急救

自縊者。自旦至暮。雖已冷必可治。自暮至旦則難治。陰氣感也。然予嘗見自暮至旦而猶救活者。不可輕棄也。救治之法。先將人抱下。以被褥塞住竅道。次將繩索徐徐解去。不得遽然截斷。然後將手按摩胸膈。若有氣從口出。微有呼吸。即以好肉桂心二三錢。煎湯灌之。若已僵直。令兩人以竹管吹其兩耳。然後以半仙丸納鼻孔中。並研末吹入耳中。但心頭溫者。雖一日猶可活也。

【半仙丸】 半夏爲末。水丸如黃豆大。每用一丸。納鼻中。男左女右。

## 二、摧壓急救

摧壓者。或墜墮。壓覆打傷。心頭溫者。皆可救也。將本人如僧打坐。令一人提住頭髮。用半仙丸納入鼻中。並以廣三七二三錢。煎酒灌之。青木香煎酒灌之亦佳。

### 三、瀉水急救

瀉水者。撈起以其人伏橫背上。如無牛。以橈代之。瀝去其水。用半仙丸納入鼻中。再以生薑自然汁灌之。但鼻孔無血出者。皆可救也。

### 四、魘魅急救

魘魅者。夢而不醒也。此濁氣頑痰閉塞所致。可用韭根搗汁灌之。或用薑汁。或用葱白酒灌之。或令人痛咬其大姆指。而唾其面。即活。

### 五、服毒急救

服毒者。砒信爲重也。用小薊根搗汁飲之立效。或用黃礬散治之。

【黃礬散】 大黃五錢 明礬二錢半 共爲末。每服至四錢。下冷水調。

# 正誤表

誤	正	頁	行
二	不	二	下 一七
治	治	六	下 一五
蛙	蛙	七	下 一二
過僻不遂	(喝)僻不遂	四	一
舌瘖偏枯	舌(瘖)偏枯	五	九
和作餽餽	和作餽(餽)	八	一四
餽汁中煮	(跋)汁中煮	八	一四
去半人	去半人(參)	一四	〇
下利清穀	下利清(穀)	一七	三
凡初覺務痛	凡初覺(頭)痛	一八	八

正誤表



正誤表

踰垣上屋	踰(垣)上屋	一九	
野芋頭切斤	野芋切(片)	二一	二
芋斤炒熬	芋(片)炒熬	二一	三
轉絳而黑	轉(絳)而黑	二二	六
光絳而乾	光(絳)而乾	二三	四
煮水湯	煮(米)湯	二三	一一
磨杏五分	磨(香)五分	二四	一
甚則絳	甚則(絳)	二六	三
或歲熬湯	或歲(蕤)湯	二七	四
歲熬湯	歲(蕤)湯	二七	六
歲熬三分	歲(蕤)三分	二七	六
臆語煩渴	(謔)語煩渴	三〇	三
泄直注	泄(瀉)直注	三三	四

爲篩	爲(度)	三三	一一
度淨	(篩)淨	三三	一二
楊赤簡便方	楊(起)簡便方	三四	三
香薷	香(薷)	三五	九
氣粗喘悶	氣粗(喘)悶	三六	五
舌絳汗多	舌(絳)汗多	三六	六
黃連香薷飲	黃連香(薷)飲	三六	一〇
厚朴遊炒汁	厚朴遊(汁炒)	三六	一〇
神機化滅	神機化(滅)	三七	七
脈伏	(脈)伏	三七	九
脈弦遲	(脈)弦遲	四〇	二
秋涼外束	秋涼外(束)	四一	一
山檀蒸取肉	山(檀)蒸取肉	四一	六

正誤表

則成癩疾

則成(癩)疾

癩瘕

癩(瘕)

專作瘕積

專作(瘕)積

放髀北

(於)髀北

賢咳不已

(腎)咳不已

國面浮腫

(而)面浮腫

舌絳

舌(絳)

半椀半濕

半椀(拌)濕

九晒九蒸

(九蒸九晒)

脈沉

(脈)沉

脈轉

(脈)轉

或詞子散

或(詞)子散

詞子皮

(詞)子皮

五三	五一	五〇	五〇	五〇	五〇	四六	四四	四四	四四	四二	四一
一	一	一一	一一	五	五	一一	一一	一〇	六	一	一〇

沙糖水服之	沙(糖)水服之	五四	八
切忘	切(忌)	五六	四
目汗自利	(自)汗自利	六九	一〇
八脾腎入腎	下趨(入腎)	七〇	三
慾傷腎精	慾傷(腎)精	七七	八
茯苓乳拌三錢	茯苓乳拌三(兩)	七八	一
將阻頭對準	將(乳)頭對準	九六	四
爲厥腹也	爲厥(疝)也	九七	一一
而上下些	而上下(也)	一〇二	六
膝理下疏	膝理(不)疏	一〇二	四
黃芩建中湯	黃(耆)建中湯	一〇二	四
常以黃芩	常以黃(耆)	一〇二	五
黃芩三錢	黃(耆)三錢	一〇二	六

正誤表

盈汗屬陰虛	盜汗屬陰虛	一〇二	九
及聚痛	(反)聚痛	一〇二	八
骨重痠痛	骨重(瘦)痛	一〇六	四
生脈散	生(脈)散	一一〇	四
合友則愈	合(久)則愈	一四四	一二
理良	(甚)良	一四九	一一
少領膽經受病	少(陽)膽經受病	一五〇	一
筆脈模解	(筋)脈模解	一七〇	三
後火爆也	(〇)火爆也	一七〇	五
念流如箭	(急)流如箭	一七〇	六
患者二根	患(大)者二根	一七三	六
絕澁者難治	絕(澁)者難治	一七五	五
馬齒寬	(馬寬齒)	一七六	一

膽豬汁	(豬膽汁)	一七六	四
陰火 <sub>一</sub> 張	陰火(鷓)	一八六	八
用無灰	用無(灰)	二二一	七
入安息膏	入安息(香)膏	二二一	〇
桃仁去去尖	桃仁去(皮)尖	二一九	〇
三皖一直	三(皖)一直	二二〇	七
其人夜中	其人(夢)中	二二九	七
必補先其虛	(必先補其虛)	二三〇	八
連聲呃者	連聲呃(逆)者	二三六	九
呃而喜冷	呃(逆)而喜冷	二三七	八
大破仁八分	大(砂)仁八分	二四〇	八
英嘔逆煩	(若)嘔逆煩	二四一	二
或澀泄	或(澀)泄	二四五	七

正 誤 表

八

澀泄腹痛

(湧)泄腹痛

二四五

八

不見光滯

不見光(煩)

二五〇

四

一錢五錢

一錢五(分)

二五二

四

7141  
444.647

1.00

1

444.647

