

急救仙方卷之九

側九

急救仙方卷之九

秘傳五痔品

原痔者貧富男女皆有之富者酒色財氣
貧者擔輕負重飢露早行皆心肝二血喜
則傷心怒則傷肝喜怒無常風血侵於大

腸到穀道無出路結積成塊出血生乳各有形相婦人因經後傷冷月事傷風餘血在心經血乃流入於大腸小兒因利後或母腹中受熱也治方于後

水澄膏

護肉

麝香

白芨

各一兩一方加黃連

右二味為細末候內痔登廁翻出在外用溫湯洗淨不須坐入即側卧床治上用新水和蜜調令稀稠用篦挑藥輕手塗穀道四邊好肉上只留痔頭在外用薄紙圓轉

蓋藥上仍用筆蘸溫水塗紙上紙以護水
澄膏不令四散耳才覺藥乾又用溫水潤
之後用枯藥

好白礬

四兩

生信石

二錢半

硃砂

一錢生研十分

妙細為

右各研為細末先用砒在建蓋中次用白
礬末蓋之用火煨令煙斷其砒盡隨煙去
止借砒氣於礬中耳用礬為細末十分細
可也者痔頭大小用礬末在掌上入生硃
砂少許以唾調稀用筮頭塗痔上周徧一

日三上須子細看痔頭顏色焦黑爲妙至
夜有黃水出切勿他疑水盡爲妙至中夜
上藥一徧來日依然上藥三次有小痛不
妨換藥時以碗盛新水或溫湯在痔邊用
筆一管輕洗刷痔上去舊藥上新藥仍用
護藥此藥只是借砒信又有硃砂少解砒
毒次用荊芥湯洗之三兩日之後黃水出
將盡却於藥中增硃砂減白礬則藥邊緩
矣三兩日方可增減漸漸取之庶不驚人
全在用藥人看痔頭轉色增減厚薄傳藥

方是活法

荆芥湯

右用荆芥剉水三椀煎常常煎下如洗痔
了依然傾入瓶內火煨之可用三五次

潤腸丸

大黃

濕紙包煨剉

枳殼

去穰

當歸

蜜煉

右三味等分為末蜜丸每服二十九或三十丸湯下量臟腑虛實多寡服之緣為已

用枯藥後痔頭將欲焦枯糞門迫急恐大便堅難下所以預服此令臟腑稀滑耳

龍石散

龍骨煨去火毒

香白芷
好黃丹

軟石膏煨去火毒

右等分為極細末候痔頭落盡以此藥摻
取斂瘡口預先備好血碓末止血或斂瘡

口倉卒要用耳

道寸赤散

生地黄二兩

黃芩三兩

右剉每服三錢水一盞煎六七分溫服用
藥之後小便恐赤澁即服之加滑石甘草

燈心

雙金散

黃連

鬱金

右二味等分為末極細用蜜水調傳痔頭
上虛人已用枯藥上忽有些疼痛用此其
止一方只用腦子末傳亦可

內補散此藥調理氣血排膿生肌候痔瘡將
欲收斂即服此所謂腸頭直候瘡口安好血
氣中和自然收入

人參

黃耆

當歸

各二兩

桔梗

芎藭

厚朴

官桂 防風

白芷

甘草

各一兩

右十味各等分為細末木香湯溫酒亦可

日二三服

國老湯甘草煎湯常常要煎下薰洗痔瘡蓋
甘草自是痔藥又解砒毒若瘡取斂其痒異
常尤要此藥澆洗溫熱隨意

催痔治痔雖硬只是不脫用此藥催自落

百草霜

二錢

白姜末

一錢

川烏頭

右為細末以井水調稀以筆點痔上良久

立脫

熨法

凡醫痔用枯痔藥後急大小便間好肉疼
如針刺及痛上腎根令人將衣物火上烘

之令熱熨痛處三五次其痛立止

水澄膏蓋慮痔根毒水流汗好肉生瘡故用
藥塗油單紙護內周徧不用連紙貼定可也

喚痔

真磁石

研另

白姜

各一錢 另別研

白礬

半錢 枯過

草烏尖 三箇 生用

右為末却以葱涎調傅腸頭上其乳出用

枯藥

又方磁石

煨醋淬九次研水飛

白礬 枯

大草烏 川山甲 朋砂

右末如前出用洗藥

痔二十四證歌

此疾酒色氣風食五事過度

痔證分三八憑君子細看莫教年日久見者

膽心寒菱角看形怪蓮花不可觀穿腸并鼠

妳酒色兩相干莫願翻花怨蜂窠亦不寬雌

雄同氣血子母及腸盤玄珠由可恠勾腸痛
若鑽核桃與流烝見者便心酸嚙子於中大
雞心在外安珊瑚形可惡那更脫肛難內痔
紅不出搭腸裏內盤垂珠更難治日有雞
冠切莫輕刀火令君性命殘用工無半了去
病更除根

用喚藥用此

紅肉膏

治痔

辰砂

黃丹

各一錢

乳香

半錢
別研

白礬

一兩

砒

半兩用白礬鋪
底火煨七分

巴豆三箇

右為末每用二錢斑猫三箇香油一兩同
一處煎斑猫巴豆赤為度去二味只用油
調藥末成膏子看大小貼之一二日一次
換藥至六七日看焦黑不用塗用搥藥末

破已破用紙撚子任藥入瘡為妙

金花散洗痔

無名異半錢

黃蘗一兩

黃連半兩生

烏黑豆半升

右為末温洗了用海蛤散傅

龍骨海蛤散

蕪荑兩一

龍骨

海蛤各一錢煨

蜜陀僧半錢

右為末先摻次用貼痔膏日一次貼

乳香膏

貼痔

茱萸

白芨

白斂

黃連

黃蘗

當歸各等分

右用香油四兩入柳枝三尺四寸長同煎

柳枝黑為度入前藥末同煎紫色用絹濾

去滓再煎數沸次入黃丹乳香一二錢熬

成膏以瓦瓶盛藏用少許貼瘡上立効然
凡下痔先服通血積藥一日二次方用喚

痔藥

當歸飲通血積

黃連

火麻子

當歸各半
兩

右為末用一錢嚼温酒下又將通真丸一

粒臨卧再服

通真煨姜丸

良姜炮

柯子炮

肉桂去皮

木香

肉豆蔻

破故紙

茴香

葫蘆巴

末研各一錢

右研勻醋糊丸如梧桐子大用一錢重木瓜生姜藥一處濕紙裏煨香熟溫酒下

下高散

不思飲食

苦參一兩

蓬莪朮炮

益智去皮

荊芥穗炒各一兩

右為末每服一錢水一盞姜蜜同煎八分

入鹽虛心服

洗腸犀角散

骨碎補

川山甲

蛤粉炒各二兩

甘草根

玄胡索

生用 半兩

右為細末茶調半錢空心服

止痛麥煎散

滑石

三錢

鼈甲

半錢

川烏

去皮尖 一兩

秦艽

半錢

前胡

半兩

右為末每二錢小麥三十五粒同煎至七

分通口服不拘時三四服見效

黑神黃耆散

京墨

一兩

黃牛角

一隻

蛇蛻

一條 全

檳榔

三箇

川山甲

蔓荊子

半兩

黑狗脊

去毛

枳殼

去皮白各一兩

黃京子

兩半

猪牙皂角

十箇

右為末以瓜婁五箇去子入藥在內用新

瓦瓶盛之後用黃泥固濟火煨烟盡末入

沒藥青木香各一錢

白蕪荑

兩半

荊芥

一兩

右為末同煎藥一處服二錢胡桃酒下日

三服茶亦可

宣風散

巴豆

去油

大黃

炮

朴硝

枳殼

陳皮

去穢

右各等分每服二錢水一盞煎至七分溫服如服藥後大便結澁二三日可服

木通散

人參

一錢

斑猫

炒去殼足羽

鶴虱

大黃

牡礪

煨

枳殼

各等分

葶澄茄

兩半

丁香

少許

右為末糯米糊為丸如梧桐子大每服五丸煎沙糖湯下此藥恐不可用

收膿膏

丁香

白安

外製海金砂

乳香

白芨

雄黃各等分

右為末入瘡口次以乳香膏貼之無膿正

車前散

食茱萸

車前子

雄黃

乳香

赤石脂

龍骨各一錢生用

右為末摻瘡口以乳香膏壓之一日二次如瘡口乾只用乳香膏貼有清水出用後

藥注青膏

注青膏

五倍子

生 三箇

玄胡索

白礬

各一錢

右為末服少許如清水出以紙貼膏藥入

瘡口內

金花散

鬱金

甘草

白姜

炮

槐花

炒各一兩

右為末每服二錢空心陳米飲下

山甲散

五倍子

川山甲

各一兩 炒存性

右為末瀉血水者服二錢空心陳米飲下

解腸散治藏毒瀉血邪二發空以斬米煨下

歲靈仙

蕤生

各分

貫衆

一兩

右為末每服二錢麝香酒調服

凡內痔用葱涎膏次用洗腸當歸丸次用

取血當歸散次用取血黃連丸次日上紅

肉膏凡服藥忌猪血毒食及去風不可摩

動藥有惡水出汗好肉生瘡以和風膏妨

出入以藥塗綿子掩痔上綿托帛縛日二

次上重十日輕八日若有痔曰連腸若惡

滯腰間疼者用肉桂膏貼腰煩痛以通心

散逐日服次下丁鬲散煨姜丸枳殼散落
洗用海蛤散附之乳香膏貼退痔勻腸散
收腸貼頂散

治痔久不差變漏不戒酒色服藥耳治則
先用紙撚子細看大小淺深即服通真丸

黃耆散以紙撚貼紅肉膏入瘡一日五六
次用乳香膏入作撚子貼瘡口日一次三
五次進藥入瘡內凡取爛肉有血水出方
不進藥須用收膿膏三日後用藥洗三日
用龍骨海蛤散摻以車前散摻口內一日

兩次服藥至三服至取深効後有水出即効也藥煎取汁以熟膏三日外用藥去三日又神驗治痔方

信 沒藥 乳香 各半
白礬 朴硝 綠礬 各一兩
各一兩 各一兩 各一兩 各一兩

麝少許

右用鐵銅鍋先以信在鍋底以白礬覆之又以綠礬覆之又以硝覆之候成水投乳香末攪勻候乾如石方出地上出火毒一宿末方入麝同研加片腦少許用唾調塗

附瘡口上四邊一日三次其痔自然焦落
又枳殼水浸去穰每二片去皮用巴豆一
粒在內線縛入銀石器內米醋高一指煮
乾去豆焙爲末醋糊丸每服十五丸空心
茶清下或隨津下亦可

腸風下血平胃散加續斷煎服
又方加小麥四十九粒去續斷治痔上瘡臍
蓮蓬等分鍋內慢火微煙熏之

治腸風下血

五倍子末服二錢麝香酒下

治痔

白礬

四兩

綠礬

一分

信

兩半

朴硝

兩半

右礬硝作一處以少半許入建盞內以信成塊入中以餘藥塗上以炭火約二斤許

燒四圍下候沸將乾却覆細末用砂合收此藥經年火熟黃色則效而不疼赤色則不可用如傳外痔可以白礬減半如速効可將津液調傳不疼甘草湯調傳此藥久留不損且能不疼次用茅根湯熱洗然後

附藥日夜三五易丸疼發必大腸秘結服
寬腸丸併通大便不可燒煙熏入腸反為
害暑月加百草霜黃丹調附如痔落了肛
門腫痛用槐皮煎湯洗用津洗瓦上磨枳
殼附如肛門不收木賊朴硝煎湯附各以
一次二次即効未落已前黃皮薄荷煎湯
唾調附肛門夏月用此尤佳

洗藥

初用
此洗

木通

黃芩

黃栢

黑豆

列九

右熟煎即洗三次

本草

黄芩

黄芩

本草

急救仙方卷之九



