





瘡瘍經驗全書目錄

第五卷

肩疽鼠疽圖說 方二

三串毒圖說

脾癰圖說

左搭肩發圖

右搭肩發圖說 方四

左右串圖說

兩肩兩脇癰疽發圖說

血潰流注疽圖說 方三

癰發圖說

癰瘡圖說 方三

委中毒圖說 方二

臀疽圖說 方一

腿遊風圖說 方三

腎癰圖說 方三

又圖說

陰蝕瘡圖說

方十七

女陰蝕瘡圖說

方廿一

左右便毒圖說

方二

小腸流注圖說

方二

穿襠發圖說

方四

冷漏濕毒流注圖說

方二

紫疥瘡圖說

方四

坐馬癰圖說

方三

貼骨疽圖說

方一

附骨癰圖說

見上

臟毒症圖說

方三

瘡瘍經驗全書卷之五

宋燕山竇漢卿輯著


天都洪瞻巖

桐川陳友恭

全校

圖論方

上肩疽下鼠疽



此毒因怒氣上攻于心酒後房事下傷于腎宜服

加味托裏散

桔梗

厚朴

白芷

人參

黃芪

當歸

官桂

川芎

荊芥

黃芩

烏藥

防風

連翹

香附

枳殼

天花粉

右水煎服

胸膈滿悶加陳皮砂仁

熱盛加小柴胡黃芩玄參

咳嗽加麥冬兜苓五味杏仁桑皮

口乾煩燥加麥冬前胡乾葛烏梅

寒多加厚朴防風藿香再服黃凡丸通氣散仍貼

玄武膏金絲膏

如膿出盡時服內補散三四貼

膿未盡時服排膿內托散

小便赤澁用五苓散加黃連燈心服之

其毒從小便中出

更服乳香護心散日進五服

又服黃凡丸日進三服

開胃散 治發背寒氣入胃不欲飲食

砂仁

枳殼

陳皮

茯苓

肉桂

甘草


藿香

厚朴

右水煎服

仍用神異膏貼之

三串毒



痧痧外馬全書

卷五

二



此症上下生之其形雖一而中間皮好但內肉潰爛初起紅色亦不大痛日漸潰爛此症之來六氣七情所感嚴寒酷暑所遇積毒于臟腑或年老男婦性度怡默而亦患此者想平居坐臥濕地而然也若無外症得生若飲食日減泄瀉發熱勢難生矣治法與發背諸癰同

腎俞怒發及脾癰



此症下腎俞雙發因飲熱酒行房怒氣傷肝受濕而得也陽發于外可治痰發陰發傷于腎膜膿稀者爲虛難治若老少婦人性氣溫和飲食謹節又無六情惱懷而亦患此者乃受地之濕氣或暑月以冷水沐浴而然脾癰發于左膊之間初發可用艾火灸之急服追疔湯汗之卽散治法服藥同前蠟凡丸甚宜服之

左搭肩發




天  
髮  
絲  
馬  
全  
書

卷  
五

四

右搭肩發



此症少陽經少血有相火尤甚于厥陰發于左搭

肩骨上生者以動之處入可治難安串于右搭肩者必難治也此症由于風變之來以脉斷之邪在表其症大小便如故飲食如常口能知味知其不在裏也不惡風只燥熱脉不浮知不在表若表裏既和則邪在經絡中凝于經絡其癱斯出身半已上風從受之故云八風之變法當却寒邪調和經絡中氣血則氣血通暢自愈

○  
摻藥

雞黃皮

焙

血竭

花蕊石

冰片

右爲細末濕用乾摻乾用清油調搽

加味麻黃桂枝湯 形實色黑背生紅腫胛骨下痛

脈浮數而洪緊食則嘔

生附子

一錢

瓜蒌仁

一錢五分

羌活

一錢

甘草節

六分

人參

一錢

青皮

一錢

黃芪

二錢

半夏

六分

白朮

一錢

山藥

一錢

水二鍾姜三片煎服

冬天加黃柏

牛膠飲 截癰疽惡瘡險處服之使毒氣不攻于內

不傳惡症

牛皮膠

透明好者四兩淨

右用好酒一碗入膠內重湯煮

令膠溶透者亦用酒煎米湯調和服之

白芷升麻湯

白芷 一錢  
升麻 五分  
桔梗 五分  
甘草 一兩  
生地 一兩


黃芩 二錢  
酒炒  
黃芪  
連翹 各二錢  
生黃連 一錢  
五分

紅花 一錢  
歸稍 二錢  
官桂 三分  
當歸 一錢

右十三味水酒各一碗煎至半碗服之須睡并怡  
養心神不可妄想以動心火



左右串




癩癧系馬全書 卷五  
此症發于左搭肩骨上生在移動之處可治難安  
串于右搭肩必難治矣可用雞黃皮及綿絮焙乾  
爲末濕則乾搽乾則清油調搽

如症發于右搭肩骨上生在移動之處可治難安  
串于左搭肩者亦難治之用藥搽搽依前左搭肩  
藥治之

另有良方在前左串右串二形圖後看方治之


兩肩兩脇癰疽發



凡兩肩下兩脇邊成癰疽因血虛而氣亦虛切不可服補陽之藥熱劑卽補陽也倘受熱劑則虛熱愈盛易致傷骨膜切慎切慎宜服十六味流氣飲內疎黃連湯治法與發背癰疽同

湯劑附子薄桂烏頭之類禁用


血潰流注疽



此症多生膏梁形重之人有此症者好食煎炒炙  
燂糖蜜之類其疽大者如雞子形像猶如紫李只  
腫不紅內串經絡之間流注骨節之內遍身痠疼  
百節疼痛用內托散加木瓜 白芍 連翹  
再服乳香護心散 黃凡丸  
外用圍藥敷之不可遲也

凡用藥以意消息切勿執方對症夫子曰疾固也

癩發



此症屬陰多生骨骼之間初生如梅子大在于皮  
肉之間內不疼不痒無力之人二十日始作紅腫  
有力人一月方作紅腫內先潰爛皮面上紫黑色  
破後口不能收時常作痛出臭膿水必成其漏則  
難治矣急服排膿托裏散

排膿內補散

人參內補散

人參膏

五香連翹湯

蠟凡丸

護心散

更用猪蹄湯頻洗之 未潰之先用鐵箍散敷之  
能消其一半





大抵下部之症以蒼朮爲主佐以黃柏之辛行以  
青皮加以甘草隨症用引經之劑則得効矣此毒  
受在肝腎經痛不可忍用內托流氣飲治之

蒼朮

黃柏

青皮

甘草

芍藥

當歸

白朮

栝榔

川芎

羌活

獨活

白芷

木瓜

牛膝

杜仲

冬加薄桂

夏加黃芩

姜三片煎服

內托清氣飲

人參

茯苓

白朮

官桂

陳皮

木瓜

紫蘇

枳殼

甘草

芍藥

當歸

蒼朮

羌活

獨活

川芎

白芷

姜三片棗一枚煎服

再服紫蘇流氣飲

三香和氣飲

搽藥用腿遊風及婦人癩瘡藥通用



此毒受在腎經寒氣阻滯而成加減紫蘇流氣飲  
治之先用敗毒流氣飲

先服敗毒流氣飲

紫蘇

厚朴

枳殼

桔梗

陳皮

烏藥

白芍

白芷

香附

檳榔

木香

木瓜

牛膝

杜仲

防風

甘草

姜三棗一煎服

後服紫蘇流氣飲

紫蘇

厚朴

甘草

香附

烏藥

檳榔

杜仲

木瓜

枳殼

桔梗

川芎

防風

當歸

姜三棗一空心服

排膿加人參黃芪

臀疽



此癰受在腎經而臀屬少陽後此陰中之陰道遠

位僻藥力所難及者須預補之皆因受虛寒濕毒  
結聚成風故生此症也當用上下助癰藥治之

敗毒流氣飲 內托流氣飲 內托羌活湯

羌活

官桂

酒洗

大黃

酒洗各四分

黃芪

一錢五分

藁本

連翹

歸稍

各一錢

炙草

陳皮

蒼朮

各五分

白芷

右作一服水酒各一鍾煎空心熱服以被覆患上  
使藥力行之方能奏功如或不愈用鐵箍散姜汁  
醋火上熬熱調敷留孔時令熱餘汁潤之以助藥

力

腿遊風



此癰受小腸腎經傷于寒熱邪氣毒流于腿此是遊毒也當用紫蘇流氣飲治之後服敗毒流氣飲

紫蘇流氣飲

紫蘇

檳榔

厚朴

甘草

香附

烏藥

獨活

白芷

荆芥

蒼朮

黃柏

陳皮

木瓜

枳殼

川芎

防風

姜三棗一煎服

敗毒流氣飲

紫蘇

桔梗

枳殼

檳榔

陳皮

羌活

防風

荆芥

木瓜

桂枝

黃柏

獨活

烏藥

甘草

香附

山梔仁

熱服



先用金絲膏貼四五日以拔其毒水後用搽藥治之

搽藥

輕粉 二錢

黃連末 三錢

孩兒茶 一錢

黃柏末 一錢

白芷末 一錢

荆芥末 一錢

雞內黃 一錢

冰片 二分

枯凡 二錢

韶粉 三錢

右和勻為細末先用溫苦茶洗淨再用紙挹乾滋

水乾搽

陰囊毒 卽外腎癰



此症因肝經濕熱不利遂流毒于膀胱腎經感冒

寒暑邪氣偏腎于陰之經絡以至血氣凝聚寒濕不散陰囊上腫而痛或潰爛皮脫腎子懸掛宜用瀉肝清熱湯服之

龍膽草

酒拌炒

當歸稍

車前子

炒

澤瀉

生地

芍藥

黃連

黃柏

知母

木通

淡竹葉

防風

各二錢

甘草稍

五分

右作一劑水二碗煎八分食前服

外用鐵箍散圍之

此症腐壞急用烏金散敷之

烏金散

麩

不拘多少煨存性為末

紫蘇葉

俱爲末香油調搽乾摻亦可

或潰爛飲食少思日晡發熱急服加味小柴胡湯

小柴胡

人參

黃芩

川芎

白朮

黃芪

當歸

甘草

黃柏

知母

各錢

半夏

五分

白芍

五分

右水煎服

痛甚加黃連

小便不利加木通車前子

口渴加天花粉麥冬五味



偏腎灸此雙關水  
左灸左右灸右

此毒年高者因宿有疝氣疾及感冒寒濕氣辛勤少壯爲因房事所得初起陰囊赤腫身發寒熱攻小注歸來二穴痛不可忍用手按之皮寬不急可用敗毒散加入當歸須川棟子發散用手按之急脹似火之熱急用陰囊毒之藥治之

更服黃凡丸

倘或開刀須待其熟以油頭繩扎住腎子以小刀開海底穴其膿血卽流盡矣外貼金絲等膏少勞戒色并避湯火風氣及諸毒物

陰蝕瘡



此陰蝕瘡之生也皆由臟中虛怯腎氣衰少風邪

入腑毒惡損傷榮衛或與有毒婦人交接不曾洗  
淨故時痛時痒以漸成竅作疔膿水湧流若不早  
治命亦難保先用蛇床子地骨皮桑槐枝煎湯溫  
洗內服清熱消疔解毒湯外用摻藥先用金絲膏  
後用紫金膏拔出毒水易能長肉

摻藥

輕粉 二錢

孩兒茶 二錢

紅絨灰 一錢

五分

飛丹 一錢

冰片 三分

珍珠 五分

雞內金 一錢

煨存性

射香 二分

蘆甘石 一錢

煨

夫陰蝕瘡者卽下疳也陰汗燥臭故莖根生疔瘡

此處乃肝經所屬之分野



清濕瀉肝湯

升麻

羌活

柴胡

知母

黃柏

生甘草

澤瀉

青皮

川芎

生地

蒼朮

龍膽草

木通

水煎

熱加黃芩

小便不利加車前子

虛加人參

又方 氣弱無力莖根下生瘡膿水不止

人參

黃芪

當歸

柴胡

升麻

草梢

黃柏

知母

膽草

紅花

白芍

黃芩

甘草梢能緩莖中痛故用之

又方 補中益氣湯加南星蒼朮黃柏知母黃芩牛

膝燈草

防風羌活散 治下疳

防風 羌活 荆芥 獨活 黃芪

牛旁子 山梔 甘草 木通 蒼朮

車前子 天花粉

洗方 冬青葉 四五 甘草 黃柏

防風 煎湯洗之

下疳摻藥 輕者用輕粉末一味摻上

又方 孩兒茶 輕粉 黃柏 冰片

橄欖核 煨一 為末乾摻

蛙疔

輕粉

韶粉

各等分爲末摻之

外蛙捍內蛙捍

冰片

二分

輕粉

六分

射香

五分

爲細末摻孔內

內外蛙疔瘡并小便一切疔疾

蒼朮

二錢

黃柏

二錢

秦艽

一錢

滑石

二錢

水煎服

如小便澀滯疼痛加甘草節蒲黃

又方

黃芪

白蒺藜

羌活

白附子

各二錢

末之用猪腰子一付竹刀切破入藥在內線扎定

白酒煮熟空心服之

內外蛙疔身熱小便澀滯宜服小柴胡湯加龍膽草

浩然樓

黃連車前子

下疳摻藥

青橄欖

燒灰一錢

孩兒茶

錢一

冰片

三分

為細末

先用杏仁

四分去皮  
尖另研

又加輕粉

四分

和研如泥先

敷患上一日米泔洗之後用前摻藥

又方 紅棗去核嵌明凡二分珍珠四粒煨過存性

末之乾摻

疼痛不可忍

黑羊角穿山甲煨過研末各二錢乳香沒各一錢

空心酒下

薰法 菜豆一升煮極爛茶葉五錢研末乘熱傾在  
多年馬桶內在無風處薰之待出一身汗妙甚男  
婦並用

小便疳瘡大爛者

面粉 一兩

黃蠟 八錢

白蠟 一兩

冰片 一錢

先用麻油三兩火上熬化二蠟隨下面粉次下水  
片爲隔紙膏貼之五日后痛卽止肉卽生矣

陰蝕瘡

癩癧類編全書

卷五

三



婦人之性多偏而多鬱若有不遂則心肝胃三經

之火勃然而起遂致陰內生瘡其種不一或生陰  
蝕瘡或生陰茄或生陰篔或生疔瘡或生翻花瘡  
或生蠹瘡極痛極痒狀如蟲行淋瀝膿汁等症皆  
由濕熱與心火相擊而生惟陰茄難治性氣和緩  
之婦胸次坦夷服藥易愈若性急悍妬之婦習與  
性成服藥百帖方愈必須忌口絕慾戒性爲要當  
以補心養胃與茯苓補心湯內補托裏流氣飲間  
服之其陰中腫塊如棗核者名陰茄匾如篔者名  
陰篔陰中極痒者名蝕瘡名蠹瘡餘類倣此

茯苓補心湯

白茯苓 乾葛 前胡 桔梗 甘草

陳皮 白芍 紫蘇 人參 半夏

當歸 熟地 川芎 枳殼

姜三片 棗肉二枚 燈心廿根 水二鍾煎服

補心養胃湯 陳皮 半夏 茯苓

甘草 台朮 黃連 當歸 川芎

生地 青皮 白芍 檳榔 烏藥

遠志 滑石 山梔仁 車前子 玄胡索

內補托裏流氣飲 甘草節 茯苓 澤瀉

猪苓 紫蘇 山梔 黃連 台朮



當歸 川芎 生地 白芍 人參

黃芪 木通 紫蘇 青皮 香附

苦參 澤瀉 白蒺藜

冰黃膏 用黃連二兩水二碗文武火煎至一碗濾

去渣再重湯慢火煎至一酒杯加冰片三分射香

二分輕粉五分硫黃末一錢俱研末調和用鵝毛

潤陰內立効

一抹散

黃連末 鹿角灰 紅絨灰 雞內金灰 一錢

孩兒茶 珍珠末 冰片 輕粉 射香

告然樓

右爲細末乾摻患處

洗方 芭蕉根搗爛煎湯溫洗避風

又方

川椒

五錢

蛇床子

半升

礬

三錢

桃柳枝

各七枝

艾

一兩

苦參

一兩

米泔五六碗煎滾去查乘熱薰洗之

又方

治陰蝕瘡蠹瘡

雄黃

一錢

硫黃

五分

桃仁

五粒

木鱉子

一枚

艾剉片

五錢入前藥在內作條放在馬桶薰之其蟲卽死

麻黃湯

陰腫或瘡或爛

麻黃

黃連

蛇床子

各五錢

艾

三錢

烏梅

三枚

大戟

防風

白凡

右剉煎湯薰洗再用

孩兒茶一錢輕粉冰片杏仁灰各五分爲末摻之  
陰中極痒及蝕蠹瘡

用大蒜搗碎煎湯洗之後以杏仁不拘燒烟盡研  
末絲綿包納陰戶

又方 取鷄肝或牛肝猪肝煮熟乘熱納入陰戶其  
蟲入肝內

又方 水銀輕粉雄黃和棗肉研細無星納陰戶  
又方 以鯽魚膽搽之

陰茄 用茄根燒灰末之香油調勻鵝毛潤內

陰中堅痛

白凡 五錢

生大黃

生甘草

各二錢五分

為末綿包如

棗核大入陰中

陰中生瘡

黃芩湯

當歸

黃芩

川芎

大黃

白凡

各二錢

黃連

三錢

右剉水五碗煎薰洗洗付雄黃

硫黃輕粉末

陰爛

孩兒茶

雞內金

各一錢

輕粉

五分

冰片

三分

為細末乾摻

陰瘡

與男子妬精瘡畧同

黃丹

枯凡

扁蓄

藁本

各一兩

硫黃

五錢

蛇脫

一條

為末搽之如不乾息再用芍藥末摻之

或隱處疼痛鹽三合炒熱青皮包熨之立止

陰冷母丁香

十粒

研末縫紗袋如指大入藥內納陰戶

小便濕痛牛膝

五兩

酒二升煮半升去渣作三服亦治

血結痛無故血尿龍骨一兩研末熱酒調下一匙

左右便毒



夫便毒者生于小腹兩腿合縫之間或行路遠涉  
辛苦或上或下低閃胸氣或房事所傷或男女大  
慾不得直遂其志故敗精滯血留聚中途或夢寐  
之間而不泄或妄想不能忘情息念故結成毒然  
腎者作強之官伎巧所出一有所感精血疑滯此

症遂生初起之時寒熱交作兩腿牽絆腫起不能  
屈伸乃症之漸也急服龍膽湯

龍膽草

錢一

木鱉

枚三

大黃

錢三

瓜萸

枚一

桃仁

紅花

歸須

各等分

水酒各

一碗煎

八分去查

夜露一宿早空心溫服行利十餘次

荆防敗毒散

穿山甲

甘草

紅花

羌活

當歸

川芎

赤芍

生地

金銀花

防風

木通

枳殼

烏藥

天花粉

各一錢

槐花末

二錢

牛膠

五錢

小腸流注



此症受在心經伏熱結聚成毒也當用敗毒流氣



飲再服清心流氣飲治之

敗毒流氣飲

紫蘇

桔梗

枳殼

甘草

香附

防風

川芎

羌活

獨活

白芷

白芍

檳榔

茴香

澤瀉

玄胡索

姜三棗一煎空心服

清心流氣飲

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

麥冬

青皮

防風

柴胡

羌活

赤芍

香附

生地

川芎

紫蘇

甘草

姜三棗一煎服

小便不利加車前子滑石木通

時服蠟凡丸

穿襠發一名瘕瘕一名橫癰



此毒因辛苦得之生于窮骨穴上若不速治毒潰

傷于谷道內爛臟腑卽死急服蠲毒散

蠲毒飲

甘草

貝母

赤芍

當歸

白芷

金銀花

青皮

木通

連翹

桃仁

龍膽草

天花粉

各二錢

穿山甲

炮

如元氣欲泄加酒蒸大黃三四錢煎服飲酒隨量  
以助藥力行痢十餘次其毒無膿血從大便中出  
又方 欲作未作之時服之立消

皂角七片灰火煨黃色去皮陰地上去火毒爲末

酒下

代刀散

穿山甲

殭蚕

枳殼

姜黃

牽牛

赤石脂

大黃

白芷

貝母

各等分

爲細末每服五錢早辰空心用酒調下行利十餘  
次用薄粥補之其膿血從大便中出

灸初起便毒臙毒法

用濕蚯蚓糞捻成餅如銅錢厚放患處以艾火在  
餅上灸之覺熱一二十壯爲度或痛或痒卽可  
後服蠲毒散

冷漏濕毒流注



此毒或因足痒爪破有傷湯火風氣或因寒濕流  
注於足脛生瘡形如牛眼四畔紫色黑色常出臭  
血水先用三稜針刺週迴血出盡然後金絲膏貼  
之呼出毒水腐肉然後將紫金膏貼看瘡已紅活  
再合隔紙膏貼之方具後

面粉 三錢

輕粉 一錢

白蠟 一錢

黃連末 一錢

黃柏 一錢

血丹 飛過一錢

為細末清油燭調和攤隔紙膏貼之

又方摻藥

黃連末

二錢 輕粉

二錢

冰片

二錢

血竭

一錢

孩兒茶

一錢

右為極細末乾摻

紫疥瘡



此症五臟六腑之積毒其氣蒸肺而肺主皮毛故發于經絡相傳頭面體膚手足形如紫疥或疹或痒遍生不拘何處項中黑陷久則嘔逆沉重神思恍惚速治之方保無虞

清肌解毒湯

升麻

乾葛

粉草

防風

荆芥

連翹

薄荷

白芷

山梔

白朮

蒼朮

黃連

苦參

花粉

桔梗

羌活

胡麻

青皮

膽草

當歸

川芎

生地

赤芍

靈仙

白蒺藜



虛加人參煮酒加白花蛇蟬脫黃芩肉桂天麻馬鞭草等味以意消息之宜服苦參丸

煎湯洗法 荆芥 薄荷 苦參 白芷

蒼朮 柏樹枝 獨活 桑枝 柳枝

槐枝 鳳仙梗 金銀藤 用水不拘煎湯

去查在無風處薰洗之拭乾用搽藥

搽藥 杏仁 一兩 去皮 風子肉 一兩二味 另研如泥

輕粉 真者 五錢 川椒末 三錢 硫黃末 二錢 荆芥末 一錢

防風末 一錢 白芷末 一錢 樟冰 二錢 枯凡 三錢

右各另末和勻雄豬膽汁加生桐油調勻搽入肌

肉不見藥爲効

清肌燥濕解毒湯

蒼朮

白朮

防風

荆芥穗

胡麻子

白蒺藜

苦參

減半

當歸

白芍

羌活

薄荷

白芷


川芎

石菖蒲

甘草

右十五味各等分磨末水和爲丸每服二錢百沸湯送下

坐馬癱



此毒癰受在腎經虛毒氣熱毒傷于內大腸之經  
並聚成毒而為漏瘡此乃毒症先用宣毒湯次用  
敗毒流氣飲

宣毒湯

白芷

赤芍

甘草

五分

大黃

三錢  
酒蒸

當歸稍

二錢

連翹

枳殼

各一錢

水酒各一鍾煎一滾去查早辰空心服

又方

紫蘇

人參

桔梗

枳殼

甘草

柴胡

川芎

羌活

白芷

防風

白朮

芍藥

金銀花

姜三棗一煎服

後用內托追毒飲

人參

黃芪

厚朴

甘草

桔梗

枳殼

金銀花

黃連

烏藥

當歸

芍藥

白芷

川芎

防風

附骨疽癰論

夫貼骨癰者卽附骨癰也皆附骨貼肉而生字雖殊而病則一此症之發盛暑身熱賊風入于骨節與熱相搏復遇冷濕所折或居勞太過兩足下水或坐臥濕地身體虛弱而受寒邪然風熱伏結壅遏附骨成疽着大骨節間其急者身不得轉動按之

應骨痛經曰便覺皮肉生急洪洪如肥狀其緩者  
一點酸疼漸覺長大行步艱澁以致骨肉不相續  
若失治合身成膿不潰至死身變青黯但痛按之  
至骨久則結腫或結癰癰其附骨疽久而卽腫結  
膿以此爲異若治附骨疽作賊風中之則病深膿  
多凡偏枯攣曲之生乃附骨疽之漸也四肢困倦  
乍寒乍熱小便赤大便澁無汗須用紫蘇蘄艾鳳  
仙草煎湯熱熨之使腠理開發以布拭乾再用乾  
被覆之燒乳香薰之如虛甚隨服人參膏畧加附  
子以助其氣復以艾火攻之萬無不愈者

貼骨疽



會通

卷五

音

浩然樓

此症用筋頭按患處極痛是穴以墨點定艾灸百壯爲期忽爾艾壯爆起不拘壯數乃其驗也不必灸矣獨活寄生湯加人參二錢一服

附骨疽癰之症其毒入于骨髓所犯甚深外膚若好而貼骨之肉已先內潰骨肉已不相連日輕夜重煎寒發熱至百日有膿方可用火針刺之不若初起之際艾灸百壯方可保命若待其出膿百入之中能生幾何急服蠟凡丸

久雨陰濕倍加

蒼朮

白朮

澤瀉


防風

木瓜




附骨癰

治法同前



臟毒症



臟毒者其大腸盡處是臟頭一曰肛門又曰屎孔

內是也毒者其勢兇也皆喜怒不測飲食不節陰陽不調臟腑不和或房勞太過或飲醞戾之酒或食五辛炙燂等味畜毒在內流積爲癰肛門腫痛大便堅硬則株痛其傍生小者如貫珠大者如李核煎寒作熱疼痛難安勢盛腫脹翻凸虛浮早治易愈失治潰膿孔爛陷內寸許者難生血膿出而腫消痛減者易生也

一初起微腫卽用濕蚯蚓糞捻成餅如錢厚放患上艾壯如半粒豆大者燒之微熱卽去再換餅燒之再易如前法以十四壯爲期外用冰香散搽之

爐甘石

火煨二錢

黃連膏淬之待乾乳末所用

乳香

一錢另研

石膏

一錢另研

冰片

二分

射香

一分

和研細末田螺搗爛取汁調

塗患上偶無田螺煎黃連汁亦可

先服行藥一劑追其毒

歸尾

二錢

生甘草

二錢

白芷

一錢

黃連

一分五錢

枳殼

檳榔

烏藥

赤芍藥

一錢

生地

天花粉

一錢

皂角刺

桃仁泥

二錢

紅花

各五分

大黃

三錢

穿山甲

焙二錢

玄明粉

二錢

水二鍾浸一宿明早前煎至一滾空心服之行利六

七次用薄粥補之若補早腹反痛

清臟內托散

人參

黃芪

當歸

川芎

陳皮

甘草

黃連

生地

赤芍

白朮

黃芩

獨活

枳殼

白芷

防風

牡丹皮

槐花

升麻

烏藥

水二鍾廣膠五錢煎服倘寒熱脾胃餘症以意增減全在隨症活法

瘡瘍經驗全書卷之五