

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷二十八至



詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十六

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

治諸風方

賊風第三

灸法方

桂枝酒治肝虛寒卒然瘖啞不聲踞坐不得面目青黑

四肢緩弱遺失便利厲風所損方

桂枝

芍藥

獨活

牛膝

欽定四庫全書

備急千金要方

薯蕷

甘草 各三兩

附子 二兩

防風

茯苓

天雄

茵芋

杜仲

菟藿根

白朮 各四兩

乾薑 五兩

躑躅

猪椒葉根皮

各一升

大棗

四十枚

右十八味 㕮咀以酒四斗漬七日每服四合日二加

至五六合

肝風占候其口不能言

當灸鼻下人中次灸大椎次灸肝輸第九椎下是五

十壯餘處隨年壯眼暗灸之得明二三百壯良

大定心湯治心氣虛悸恍惚方

見別卷中

乾薑附子湯治心虛寒風半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面喎邪方

乾薑

附子 各八兩

桂心

麻黃 各四兩

芎藭 三兩

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服三日後服

一劑

側子酒治心寒或笑或呻口歌方

見別卷中

芎藭湯治卒中風四肢不仁善笑不息方

芎藭

一兩半

黃芩

石膏

一用黃連

當歸

秦艽

麻黃

桂心

乾薑

甘草

各一兩

杏仁

二十一枚

右十味以水九升煮取三升分三服

荆瀝湯治心虛寒陰氣傷寒損心驚悸語聲寬急混

濁口喎冒昧好自笑厲風傷心方

荆瀝三升

母薑

取汁一升

麻黃

白朮

芎藭各四兩

防風

桂心

升麻

茯苓

遠志

人參

羌活

當歸各三兩

防己

甘草各二兩

右十五味㕮咀以水一斗五升煎麻黃兩沸去沫次

下諸藥煮取三升去滓下荆瀝薑汁煎取四升分四

服日三夜一

白朮酒補心志定氣治心虛寒氣性反常心手不隨語

聲冒昧其疾源厲風損心具如前方所說無窮

白朮切

地骨皮

荊實各五斗

菊花三斗

右四味以水三石煮取一石五斗去滓澄清取汁釀米二石用麴如常法酒熟隨能飲之常取半醉勿令至吐

治心風寒方

灸心輸各五十壯第五節兩邊各一寸半是

依源麻黃湯治脾虛寒厲風所傷舉體消瘦音沉澀

如破鼓聲舌強不轉而好咽唾口噤唇黑四肢不舉身

重如山便利無度方

見別卷中

半夏湯温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮嗔喜無
度昏悶恍惚脹滿方

半夏

大麻仁

熬研為脂

生薑

各一升

芍藥

茯苓

五味子

桂心

橘皮

各三兩

白朮

四兩

附子

五兩

甘草

二兩

大棗

三十枚

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓下大

麻仁脂更上火一沸分三服

當歸圓補脾安胃調氣止痛治脾虛寒身重不舉語音

沉鼓厲風傷痛便利無度方

當歸

酸棗仁

乾薑各八兩

芎藭

乾地黄

天雄各六兩

地骨皮

黃耆各七兩

大棗二十枚

吳茱萸五合

甘草

秦椒葉

厚朴

秦朮各四兩

桂心

防風

附子

白朮各五兩

右十八味為末蜜丸如梧子酒服三十九丸加至四十丸日再服

脾風占候聲不出或上下手

當灸手十指頭次灸人中次灸大椎次灸兩耳門前脉去耳門上下行一寸是次灸兩大指節上下各七壯

治脾風方

脾風者總呼為八風

灸脾輸夾脊兩邊各五十壯凡人脾輸無定所隨四季月應病即灸臑輸是脾穴此法甚妙

依源麻黃續命湯治肺虛寒厲風所中噓吸戰掉聲嘶
塞而散下氣息短憊四肢痺弱面色青葩遺失便利冷
汗出

麻黃

六兩

大棗

五十枚

杏仁

白朮

石膏

各四兩

桂心

人參

乾薑

茯苓

各三兩

當歸

芍藥

甘草

各二兩

右十二味呖咀以水一斗二升煮麻黃去沫次下諸
藥煎取三升去滓分三服舊方無白朮茯苓今方無

黃芩轉以依經逐病增損

八風防風散治肺寒虛傷語音嘶下拖氣用力戰掉緩弱羸瘠厲風入肺方

防風

獨活

芍藥

秦椒

乾薑

黃耆

附子

四十二銖

天雄

麻黃

五味子

山茱萸

石膏

各三十銖

秦朮

桂心

薯蕷

細辛

當歸

防己

人參

杜仲

各三十銖

甘草 十二銖

貫衆 二枚

甘菊

紫苑 十二

右二十四味治下篩每服方寸匕酒調進至兩匕日

再

溫中生薑湯治肺虛寒羸瘦緩弱戰掉噓吸胃滿肺痿

方

生薑 二斤

桂心

橘皮 四兩

甘草

麻黃 三兩

右五味㕮咀以水一斗煮取二升半分三服先煎麻

黃兩沸去沫然後入諸藥合煮

治肺寒方

灸肺輸百壯

腎瀝湯治腎寒虛為厲風所傷語音蹇吃不轉偏枯脰
脚偏跛蹇緩弱不能動口喎言音混濁便利仰人耳偏
聾塞腰背相引隨病用藥依源增損方

羊腎

具一

黃耆

芎藭

桂心

當歸

人參

防風

甘草

五味子 各三兩 玄參 茯苓 芍藥 各四兩

磁石 五兩 地骨皮 二升切 生薑 八兩

右十五味 㕮咀 以水一斗五升 煮羊腎取七升 下諸

藥取三升 去滓 分三服 可服三劑

茵芋酒治耳聾口歌等病 方見別卷

乾地黄圓治腎虛呻吟喜恚怒反常心性陽氣弱腰背

彊急髓冷方

乾地黄 山茱萸 天門冬 桂心

續斷 各一兩半

栝子仁

杜仲

牛膝

茯苓 各四十

茯苓 二銖

天雄

鍾乳 各二兩

松脂

遠志

乾薑 各三十銖

菖蒲

薯蕷

甘草 各一兩

右十八味末蜜丸梧子大酒服三十九日二加至四

十丸

治腎寒方

灸腎輸百壯

大巖蜜湯治賊風腹中絞痛并飛尸遁注發作無時發
即搶心脹滿脇下如錐刀刺并主少陰傷寒方

梔子

十五枚

甘草

乾地黄

細辛

羊脂

青羊角亦得

茯苓

吳茱萸

芍藥

小品用芍藥

乾薑

當歸

桂心

各一兩

右十一味以水八升煮取三升去滓內脂令烊
分三服溫服相去如人行十里須若痛甚者加羊脂
三兩當歸芍藥人參各一兩心腹脹滿堅急者加大

黃三兩

胡洽不用梔子羊脂
茯苓桂心名巖蜜湯

小巖蜜湯治惡風角弓反張飛尸入腹絞痛悶絕往來

有時筋急少陰傷寒口噤不利方

大黃

二兩

雄黃

青羊脂

各一兩

當歸

乾薑

桂心

乾地黄

芍藥

甘草

細辛

各四兩

吳茱萸

三兩

右十一味以水二斗煮取六升分六服重者加

藥用水三斗煮取九升分十服

排風湯治諸毒風邪氣所中口噤悶絕不識人及身體
疼煩面目手足暴腫者方

犀角

貝子

升麻

羚羊角

各一兩

右四味治下篩為粗散以水二升半內四方寸匕煮
取一升去滓服五合殺藥者以意增之若腫和雞子
傅上日三度老小可斟酌加減神良亦可多合備用
烏頭湯治寒疝腹中絞痛賊風入腹攻五臟拘急不得
轉側叫呼發作有時使人陰縮手足厥逆方

烏頭

十五枚要
畧用五枚

大棗

十枚

甘草

二兩

芍藥

四兩

桂心

六兩

老薑

一斤

右六味㕮咀以水七升煮五味取三升去滓別擣烏

頭去皮四破蜜二升微火煎令減五六合內湯中煮

兩小沸去滓服一合日三間食彊者三合以如醉狀

為知不知增之

治賊風所中腹內攣急方

麻黃

四兩

甘草

尺一

石膏

鬼箭羽

各雞
子大

右四味呿咀以東流水二升煮取一升頓服之

論曰夫歷節風著人久不治者令人骨節蹉跌變成癩病不可不知古今以來無問貴賤徃徃苦之此是風之毒害者也治之雖有湯藥而並不及松膏松節酒若羈旅家貧不可急辦者宜服諸湯猶勝不治但於痛處灸三七壯佳

防風湯治身體四肢節解如墮脫腫按之皮陷頭眩短氣温温悶亂欲吐者方

防風

白朮

知母

桂心各四兩

芍藥

芍藥

杏仁

甘草各三兩

半夏

生薑各五兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

古今錄驗方無半夏杏仁
芍藥用附子二枚為八味

羌活湯治中風身體疼痛四肢緩弱不遂及產後中風

方

羌活

桂心

芍藥

葛根

麻黃

乾地黄

各三兩

甘草

二兩

生薑

五兩

右八味㕮咀以清酒三升水五升煮取三升温服五

合日三服

防已湯治風歷節四肢疼痛如槌鍛不可忍者方

防已

茯苓

白朮

桂心

生薑

各四兩

甘草

三兩

人參

二兩

烏頭

七枚

右八味㕮咀以苦酒一升水一斗煮取三升半一服

八合日三夜一當覺焦熱痺忽忽然慎勿怪也若不

覺復合服以覺乃止凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪
用不然至毒人宜慎之

千金翼不
用苦酒

治濕風體痛欲折肉如錐刀所刺方

附子

乾薑

芍藥

茯苓

人參

甘草

桂心

各二
兩

白朮

四
兩

右八味呔咀以水八升煮取二升日三服

一方去桂
心用乾地

黃二
兩

大棗湯治歷節疼痛方

大棗

十五枚

附子

一枚

甘草

一尺

黃耆

四兩

生薑

二兩

麻黃

五兩

右六味㕮咀以水七升煮取三升每服一升日三服

犀角湯治熱毒流入四肢歷節腫痛方

犀角

二兩

羚羊角

一兩

前胡

黃芩

梔子仁

射干

各三兩

大黃

升麻

各四兩

豉

一升

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

治歷節諸風百節酸痛不可忍方

松脂三十斤鍊五十遍酒煮十遍不能五十遍二十
遍亦可鍊酥三升溫和松脂三升熟攪令極調勻且
空腹酒服方寸匕日三數數食麩粥為佳慎血腥生
冷物酢果子百日已後瘥

松節酒治歷節風四肢疼痛猶如解落方

松節

三十斤

猪椒葉

三十斤細剉各用水四石煮取一石

右二味澄清合漬乾麴五斤候發以糯米四石五斗

釀之依家醞法四酸勿令傷冷熱第一酸時下後諸藥

栢子仁

天雄

草薺

芎藭

各五兩

秦朮

六兩

人參

茵芋

各四兩

防風

十兩

磁石

十一兩末

獨活

十二兩

右十味㕮咀內飯中炊如常酸法酸足訖封頭四七

日壓取清適性服之勿至醉吐

石膏湯逐風毒方

石膏

雞子大三枚

雞子

二枚

甘草
尺一

麻黃

三兩

杏仁

四十枚

右五味㕮咀以水三升破雞子內水中烱令相得內

藥煮取一升服之覆取汗汗不出燒石熨取汗出為

佳

治歷節風方

松膏一升酒三升浸七日每服一合日再數劑愈

又方松葉三十斤酒二石五斗漬三七日服一合日五

六度

備急千金要方卷二十六

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十七 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

治諸風方

偏風第四

方
針灸法

防風湯治偏風甄權處療安平公方

防風

芍藥

白芷

牛膝

狗脊

草薺

白朮

各一兩

羌活

葛根

附子

外臺作人參

杏仁

各二兩

薏苡仁

石膏

桂心

各三兩

麻黃

四兩

生薑

五兩

右十六味以水一斗二升煮取三升分三服一

劑覺好更進一劑即一度針九劑九針即瘥灸亦得

針風池一穴

肩髃一穴

曲池一穴

支溝一穴

五樞一穴

陽陵泉一穴

巨虛下廉一穴

凡針七穴即瘥

仁壽宮備身患脚奉勅

針鑲鉞一穴

陽陵泉一穴

巨虛下廉一穴

陽輔一穴

凡針四穴即能起行

大理趙卿患風腰脚不隨不能跪起

針上窳一穴

鑲鉞一穴

陽陵泉一穴

巨虛下廉一穴

凡針四穴即能跪起

庫狄欽患偏風不得挽弓

針肩髃一穴即得挽弓甄權所行

治猥退風半身不遂失音不語者方

杏仁去雙仁及皮尖三斗洗入臼搗二斗令碎研如
寒食粥法取汁八升煎取四升口嘗看香滑即熟未
及此則為不熟惟熟為妙停極冷然後內好麩一斗
六升煎取八升第一遍酸饒也次一炊復取杏仁三

升研取一斗二升汁煎取六升第二醎也次一炊準
第二醎取杏仁汁多少為第三醎也若疑米不足別
更取二升杏仁研取八升汁煎取四升更斟酌炊米
醎之若猶不足更研杏仁二升取八升汁煎取四升
更醎之以熟為限一石米杏仁三斗所以節次研杏
仁者恐并煎汁酢故也若冬日任意并煎準計三斗
杏仁取汁一石六斗煎取八斗四升漬麴以分之醎
饋酒熟封四七日開澄取清然後壓糟糟可乾末和

酒服之大驗祕方

又方草麻子脂一升酒一斗銅鉢盛著酒中一日煮之
令熟服之

又方灸百會次灸本神次灸承漿次灸風府次灸肩髃
次灸心輸次灸手五冊次灸手髓孔次灸手少陽次灸
足五冊次灸足髓孔次灸足陽明各五百壯

治大風半身不遂方

蠶沙兩石熟蒸分作直袋三枚各受七斗熱盛一袋

著患處如冷即取餘袋一依前法數數易換百不禁
瘡止須羊肚釀粳米蔥白薑椒豉等爛煮熟喫日食
一具十日止此方千金不傳

又方蒸鼠壤土袋盛熨之瘡即止

葛根湯治四肢緩弱身體疼痛不遂婦人產後中柔風
及氣滿方

葛根

芍藥

桂心

乾地黄

羌活

各三兩

麻黃

甘草

各二兩

生薑

六兩

右八味以清酒三升水五升煮取三升温服五合日

三

麻子湯治大風周身四肢攣急風行在皮膚身勞彊服
之不虛人又治精神蒙昧者方

秋麻子

三升淨擇水漬一宿

防風

桂心

生薑

石膏

碎綿裹

橘皮

各二兩

麻黃

三兩

竹葉

葱白

各一握

香豉

合一

右十味呶咀先以水二斗半煮麻子令極熟漉去滓

取九升別煮麻黃兩沸掠去沫內諸藥汁中煮取三升去滓分三服空腹服當微汗汗出以粉塗身極重者不過三兩劑輕者一兩劑瘥有人患大風賊風刺風加獨活三兩比之小續命湯準當六七劑

仲景三黃湯治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食方

麻黃

三十銖

黃芩

十八銖

黃耆

細辛

各十銖

獨活

一兩

右五味咬咀以水五升煮取二升分二服一服小汗
 兩服大汗心中熱加大黃半兩脹滿加枳實六銖氣
 逆加人參十八銖心悸加牡蠣十八銖渴加栝蒌十
 八銖先有寒加八角附子一枚此方祕不傳
 白斂薏苡湯治風拘攣不可屈伸方

白斂

薏苡仁

芍藥

桂心

酸棗仁

牛膝

乾薑

甘草

各一升

附子

三枚

右九味以酒二斗漬一宿微火煎三沸每服一升日三扶杖起行不耐酒服五合千金翼有車前子
獨活寄生湯夫腰背痛者皆由腎氣虛弱卧冷濕地當風得之不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛攣脚重痺宜急服此方

獨活三兩 寄生古今錄驗用續斷 杜仲

牛膝 細辛 秦艽 茯苓

桂心 防風 芎藭 乾地黃

人參

甘草

當歸

芍藥

各二兩

右十五味，以水一斗，煮取三升，分三服，溫身勿冷。喜虛下利者，除乾地黃服湯，取蒴藿葉火燎厚安席上，及熱眠上，冷復燎之。冬月取根，春取莖，燹卧之。佳其餘，薄熨不及蒴藿葉為愈也。諸處風濕亦用此法。新產竟或患腹痛，不得轉動及腰脚攣痛，不得屈伸，痺弱者宜服此湯，除風消血。

肘後有附子一枚大者無寄生人參甘草

當歸

菊花酒治男女風虛寒冷腰背痛食少羸瘦無顏色嘔
吸少氣去風冷補不足方

菊花

杜仲各一斤

防風

附子

黃耆

乾薑

桂心

當歸

石斛

各四兩

紫石英

菝葐

各五兩

草薺

獨活

鍾乳各八兩

茯苓

三兩

右十五味以酒七斗漬五日一服二合稍稍加

至五合日三

千金翼不用乾薑

杜仲酒治腰脚疼痛不遂風虛方

杜仲八兩

石南二兩

羌活四兩

大附子五枚

右四味以酒一斗漬三宿每服二合日再偏宜

冷病婦人服之

風痺第五

論方灸法

論曰夫風痺者卒不能語口噤手足不遂而彊直者是

也治之以伏龍肝五升為末冷水八升和攪取汁飲之

能盡為善

肘後此方治心煩恍惚腹中痛滿絕而復蘇

自此已下九方皆主

此風用之次第宜細尋之

論曰凡欲醫此病當知先後次第不得謾投湯藥以失機宜非但殺人因茲遂為痼疾已既得之當進三味竹瀝飲少似有勝于常更進湯也竹瀝飲子患熱風者必先用于此制其熱毒

竹瀝湯治四肢不收心神恍惚不知人不能言方

竹瀝

升二

生葛汁

升一

生薑汁

合三

右三味相和溫暖分三服平旦日晡夜各一服服訖

覺四體有異似好次進後湯方

竹瀝升一

生葛汁合五

芎藭

防已

附子

人參

芍藥

黃芩

甘草

桂心兩各一

生薑兩四

羚羊角兩三

石膏兩六

杏仁枚四十

麻黃

防風兩各一

右十六味哎咀以水七升煮減半內瀝煮取二升五

合分三服取汗間五日更服一劑頻與三劑漸覺少

損乃進後方

竹瀝升三

防風

升麻

羚羊角

防已

桂心

芎藭各二兩

麻黃三兩

右八味以水四升合竹瀝煮取二升半分三服
兩日服一劑常用加獨活三兩最佳此方神良頻進
三劑若手足冷者加生薑五兩白朮二兩若未除更
進後方

竹瀝升一

甘草一本作根二兩人參

芎藭

獨活

升麻各一兩防風

麻黃

芍藥 各一兩半

生薑

石膏

羚羊角

防已

桂心

黃芩

附子

一本作杏仁四十枚

白朮

各二兩

右十七味以水八升煮減半內瀝煮取二升半

分三服相去如人行十里久更服若有氣者加橘皮

牛膝五加皮各一兩

凡風痲服前湯得瘥訖可常服煮散除餘風方

防風

防已

獨活

秦朮

黃耆

芍藥

人參

白朮

茯苓

芍藥

遠志

升麻

石斛

牛膝

羚羊角

丹參

甘草

厚朴

天門冬

五加皮

地骨皮

黃芩

翼作薯蕷

桂心

各一兩一云各四兩

乾地黄

橘皮

生薑

麻黃

各三兩

檳榔

翼作甘草

藁本

翼作附子

杜仲

翼作麥門冬

烏犀角

各二兩翼作山茱萸

薏苡仁

石膏

六兩一云三兩

右三十三味搗篩為粗散和攪令勻每服以水三升藥三兩煮取一升綿濾去滓頓服之取汗日一服若覺心中熱煩以竹瀝代水煮之

荆瀝湯凡患風人多熱常宜服此方

荆瀝

竹瀝

生薑汁

各五合

右三味相和溫暖為一服每日旦服煮散午後進此平復好瘥乃止

獨活煮散治諸風痺方

獨活兩八

芎藭

芍藥

茯苓

防風

防己

葛根各六兩

羚羊角

當歸

人參

桂心

麥門冬

石膏各四兩

磁石十兩

甘草三兩

白朮五兩

右十六味各切剉分為二十四分每分入生薑生地

黃切一升杏仁二七枚以水二升煮取七合或日晚

或夜中或日一服或間服無所忌

五補圓凡風服湯藥多患虛熱翕翕然宜除熱方

防風

人參

蕤蓉

乾地黄

羚羊角

麥門冬

天門冬

各一兩半芍藥

獨活

乾薑

白朮

丹參

食茱萸

一云山茱萸

甘草

茯神

升麻

黃耆

甘菊花

地骨皮

石斛

牛膝

五加皮

薯蕷 各三銖

秦朮

芍藥

桂心

防己

生薑屑

黃芩 各一兩

附子 十八銖

石膏 三兩

寒水石

二兩

右三十二味為末白蜜和丸如梧子大生薑蜜湯服
二十丸日三稍加至三十丸忌油麪蒜生冷酢滑及
猪羊雞魚等肉

論曰古人立方皆準病根冷熱制之今人臨急造次搜
尋即用故多不驗所以欲用方者先定其冷熱乃可檢
方用無不效湯藥既爾丸散亦然凡此風之發也必由
熱盛故有竹瀝葛汁等諸冷藥焉後之學者不能仔細

識其方意故有茲論具而述之其人無密室者不可與
療以強人居室不密尚中風邪况服藥之人乎

治風痺不能語手足不遂方

度病者手小指內岐間至指端為度以置臍上直望
心下以丹注度上端畢又作兩度續所注上合其下
開其上取其本度橫置其開上令三合其狀如到作
么字形男度左手女度右手嫌不分了故上丹注三
處同時起火灸之各一百壯愈

備急千金要方卷二十七

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十八 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

治諸風方

風懿第六

論方
針灸法

獨活湯治風懿不能言四肢不收手足躡曳方

獨活

兩四

桂心

芍藥

括萎根

生葛

兩各三

生薑

兩六

甘草

兩三

右七味呔咀以水五升煮取三升分三服日三

論曰脾脉絡胃俠咽連舌本散舌下心之別脉係舌本
令心脾二臟受風邪故舌彊不得語也

治中風口噤不能言方

防已

桂心

麻黃

各二兩

葛根

三兩

甘草

防風

芍藥

各一兩

生薑

四兩

右八味呔咀以水六升煮取二升半分三服瘖瘓不

語皆治之

石南湯治六十四種風注走入皮膚中如蟲行腰脊彊直五緩六急手足拘攣隱胗搔之則作瘡風尸身癢卒風面目腫起手不出頭口噤不能言方

石南

乾薑

黃芩

細辛

人參

各一兩

桂心

麻黃

當歸

芎藭

各一兩半

甘草

二兩

乾地黄

十八銖

食茱萸

三十銖

右十二味㕮咀以水六升酒三升煮取三升分三服

大汗勿怪

治中風口噤不知人者方

芥子一升

酢三升

右二味煮取一升薄頭以布裹之日一度

肘後以治卒不得語

又方豉五升

吳茱萸一升

右二味以水七升煮取三升漸飲之

肘後以治不能語

又方白朮四兩以酒三升煮取一升頓服

又方服荆瀝一升

又方服淡竹瀝一升

針灸法

卒中風口噤不得開灸機關

千金翼名頰車

二穴穴在耳下八

分小近前灸五壯即得語又灸隨年壯僻者逐僻左右
灸之中風失瘖不能言語緩縱不隨先灸天窻五十壯
息火仍移灸百會五十壯畢還灸天窻五十壯者始發
先灸百會則風氣不得洩內攻五臟喜閉伏仍失音也
所以先灸天窻次百會佳一灸五十壯悉洩火勢復灸
之視病輕重重者一處三百壯大效凡中風服藥益劇

者但是風穴悉皆灸之三壯無不愈也神良決定勿疑
感也不至心者勿浪盡灸

論曰風寒之氣客于中滯而不能發故瘖不能言及喉
痺失聲皆風邪所為也入臟皆能殺人故附之于治風
方之末凡尸厥而死脉動如故此陽脉下墜陰脉上爭
氣閉故也針百會入三分補之灸熨斗熨兩脇下又竈
突墨彈丸大漿水和服之又針足中趾頭去甲如韭葉
又刺足大趾甲下內側去甲三分

桂湯治卒失音方

濃煮桂汁服一升覆取汗亦可末桂著舌下漸漸嚥
汁

又方濃煮大豆汁含亦佳無豆用豉

治卒不得語方

酒五合和人乳汁中半分為二服

論曰夫眼睜動口脣偏喎皆風入脉急與大續命湯附
子散摩神明膏丹參膏依穴灸之喉痺舌緩亦然風入

臟使人瘖瘂卒死口眼相引牙車急舌不轉喎僻者與
伏龍肝散和雞冠血及鼈血塗乾復塗之并灸吻邊橫
文赤白際逐左右隨年壯報之至三報三日不瘖更報
之

附子散治中風手臂不仁口面喎僻方

附子

桂心

兩各五

細辛

防風

人參

乾薑

兩各六

右六味治下篩酒服方寸匕日三稍增之

甘草湯治偏風積年不瘥手脚枯細面口喎僻精神不定言語倒錯方

甘草

桂心

芎藭

麻黃

當歸

芍藥

人參各二兩

附子

側子各二枚

獨活

防已各三兩

生薑

石膏

茯神各四兩

白朮

黃芩

細辛各一兩

秦朮

防風各一兩半

菊花一升

淡竹瀝四升

右二十一味哎咀以水一斗先煮麻黃去沫取七升
 內竹瀝及藥煮取三升分四服服三服訖間一盃粥
 後更進一服待藥勢自汗慎生冷醋蒜麩乳酪魚等
 治中風面目相引口偏著耳牙車急舌不得轉方

獨活三兩

生地黄汁

竹瀝各一升

右三味合煎取一升頓服之即愈

又方牡蠣

礬石

附子

竈下黃土

右四味各等分為末取三年雄雞冠血和藥傳其上

持鏡候纜欲復故便急洗去之不速去便過不復還

也千金翼云偏右塗左偏左塗右

又方竹瀝三升

防風

防己

升麻

桂心

芎藭

各二兩

麻黃

四兩

羚羊角

三兩

右八味呔咀以水四升合竹瀝煮取一升半分三服

日服一劑常用效

又方青松葉一斤擣令汁出清酒一斗漬二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗出即止

又方酒煮桂取汁以故布搨病上正則止左喎搨右右喎搨左此秘方不傳余常用大效

治口耳僻方

防風

附子

葛根 各二兩

栝實

麻黃 各三兩

獨活

生薑 各四兩

杏仁 三十枚

右八味呿咀以水一斗酒二升煮取三升分四服

治卒中風口喎不正方

取空青末如豆大一枚含之即愈

又方炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服

肘後以治口噤

不開

又方大皂莢一兩去皮子下篩以三年大酢和左喎塗右右喎塗左乾更塗之

又方以葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麩密塞之勿令泄氣一頭內大豆一顆并艾燒令然灸七壯即瘥患右灸左患左灸右千金不傳耳病亦可灸之

又方灸手交脉三壯左灸右右灸左其炷如鼠屎形橫

安之兩頭下火

枳茹酒主諸藥不能瘥者方

枳實上青刮取末欲至心止得茹五升微火炒去濕

氣以酒一斗漬微火暖令得藥味隨性飲之主口僻

眼急大驗治緩風急風並佳

肘後以治身直不得屈伸反覆者枳樹皮亦得

角弓反張第七方

治卒半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷或智或癡

或身強直不語或生或死狂言不可名狀角弓反張或

欲得食或不用食或大小便不利皆療之方古今錄驗名八風續

命湯

人參

桂心

當歸

獨活

黃芩

乾薑

甘草

各十八銖

石膏

一兩半

杏仁

四十枚

右九味以井花水九升煮取三升分三服日二

覆取汗不汗更合加麻黃五兩合服

倉公當歸湯治賊風口噤角弓反張瘓者方

當歸

防風

各十八銖

獨活

一兩半

附子

一枚

細辛

兩半

麻黃

三十銖

右六味以酒五升水三升煮取三升服一升口

不開者格口內湯一服當蘇二服小汗三服大汗

又方酒一斗膠二斤煮令烱得六升每服一升稍服得

愈

又方單服荆瀝良

秦朮散治半身不遂言語錯亂乍喜乍悲角弓反張皮

膚風癢方

秦艽

獨活

胡洽用
烏頭

黃耆

人參

甘菊花

各二兩
胡洽用蜀椒

茵芋

十八銖
胡洽用茵草

防風

石斛

胡洽用
草薺

山茱萸

桂心

各一兩半

附子

芍藥

胡洽用
桔梗

細辛

當歸

五味子

甘草

白朮

乾薑

麻黃

白鮮皮

胡洽用白
各三十銖

天雄

遠志

各一兩
胡洽用防已

右二十二味治下節酒服方寸匕日再漸漸加至二匕又云治風無新久并補

吳秦朮散治風注入肢體百脉身腫角弓反張手足酸疼皮膚習習身體盡痛眉毛墮落耳聾驚悸心滿短氣魂志不定陰下濕癢大便有血小便赤黃五勞七傷萬病皆治

秦朮

蜀椒

人參

茯苓

牡蠣

細辛

栝蒌根

麻黃

各十銖

乾薑

附子

白朮

桔梗

桂心

獨活

當歸 各一兩

黃芩

柴胡

牛膝

天雄

石南

杜仲

莽草

烏頭 各半兩

甘草

芎藭

防風 各一兩半

右二十六味治下篩盛以韋袋食前溫酒一升服方寸匕日三服急行七百步更飲酒一升忌如常法

風痺第八

方論

論曰血痺病從何而得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛

因疲勞汗出卧不時動搖加被微風遂得之形如風狀

巢源云其狀如被微風所吹但以脉自微澀澀在寸口關上緊宜針

引陽氣令脉和緊去則愈

治風濕脉浮身重汗出惡風方

甘草 二兩

黃耆 五兩

漢防已 四兩

生薑

白朮 各三兩

大棗 十二枚

右六味㕮咀以水六升煮取三升分三服服了坐被

中欲解如蟲行皮中卧取汗

鐵精湯治三陰三陽厥逆寒食胸脇支滿病不能言氣
滿胸中急肩息四肢時寒熱不隨喘悸煩亂吸吸少氣
言輒飛颺虛損方

黃鐵 三十斤以流水八
斗揚之三千遍 人參 三兩

炭 五十斤燒鐵令赤投冷水復燒
七遍如此澄清取汁二斗煮藥 半夏

麥門冬 各一升 白薇 黃芩 甘草

芍藥 各四兩 石膏 五兩 生薑 二兩 大棗 二十枚

右十味㕮咀內前汁中煮取六升服一升日三服兩日令盡

黃耆湯治血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風狀方

蜀黃耆 人參要畧無 芍藥 桂心各二兩

生薑六兩 大棗十二枚

右六味㕮咀以水六升煮取二升服七合日三服令盡

治遊風行走無定腫或如盤大或如甌或著腹背或著
臂或著脚悉主之方

海藻

茯苓

防風

獨活

附子

白朮

大黃

當歸

鬼箭各二兩

各三兩

五兩

一本作商陸

右九味呔咀以酒二斗漬五日初服二合漸加以知

為度

白斂散治風痺腫筋急展轉易常處方

白斂兩半

附子六銖

右二味治下節酒服半刀圭日三不知增至一刀圭

身中熱行為候十日便覺

治風痺遊走無定處名曰血痺大易方

草薺

薯蕷

牛膝

澤瀉各二兩

地膚子

白朮各半兩

乾漆

蟻螯

狗脊

車前子

天雄各十銖

茵芋六銖

山茱萸三十銖

乾地黄二兩半

右十四味為末蜜和丸如梧子大酒下十丸日三後
稍加

治諸風痺方

防風

甘草

黃芩

桂心

當歸

茯苓

秦艽

葛根

生薑

大棗

杏仁

右十一味㕮咀以酒水各四升煮取三升分三服取

汗

附子酒治大風冷痰癰脹滿諸痺方

大附子一枚重二兩者

亦云二枚

酒五升漬春五日每服

一合日再以瘥為度

麻子酒治虛勞百病傷寒風濕及婦人帶下月水往來不調手足疼痺著牀服之令人肥健方

麻子

一石

法麴

一斗

右二味先擣麻子成末以水二石著釜中蒸麻子極熟炊一石米傾出滓隨汁多少如家醞法候熟取清

酒隨性飲之



備急千金要方卷二十八

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄監生臣邱繹曾