

Centimetres

Kodak
LICENSED PRODUCT
Black

KODAK Color Control Patches © The Tiffen Company, 2000

3/Color

White

Magenta

Red

Yellow

Green

Cyan

Blue

圖畫

和語本草綱目

二部
草部

水

水 1
P13
2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

三奴1
813
2

岡氏
杏庵

岡氏
杏庵

廣益本草大成卷之一

洛下

去橋

九折堂山田
氏圖書記
岡本爲作

抱子

撰

○本草辨

古昔神農氏草木金石ノ氣味性功ヲ察メ醫藥ノ道ヲ始ム此ヲ本
草ト云世ニ本草ヲ以テ書ク号トシニ覺者ハ誤ナリ總テ藥石ノ道ヲ
本草ト呼ソシテ記セル書タルカ故ニ題ノ本草ト号ス素問六節藏象
論曰草生五色五色之變不可勝視草生五味五味之美不可勝極
帝問ニ万物ノ中孰少孰多トヲ以テ岐伯ノ所答如此草ヲ以テスル
者ハ万物ノ中草木尤多カ故ナリ是以用藥ノ品類數種アリテ草木
取ニ非トシテ草木ノ尤多ヲ以テ一切藥品ノ道ノ總号ヲ本草ト云蓋
草木ノ氣味性能ニ本テ醫療スルカ故ナリ夫神農氏所傳者ハ三百
六十五種ニノ一歳ノ日數ニ應ス其上藥一百二十爲君三養命十藥

和語本草

卷之一

一百二十七爲臣王養性下藥一百二十五種爲佐使主治病此神農
代ヨリロツカラ傳者ナリ。然凡口傳遂ニ失ヒ易キヲ以テ。後人
レ方策ニ述テ書傳トシ。名テ神農本草經ト云。凡テ三卷ニオ
象平漢書第二卷平帝記曰。元始五年。舉天下通知方術本草者在
所爲篤一。封軹傳遺詔京師ト。漢書例傳第六十二。樓護傳曰。護少
誦醫經本草方術數十萬言ト。此本草書ノ目始テ所出也。然凡此
書傳トヘル者。何人ノ致コト未詳。或華佗カ所致。或仲景ノ所述ト云
ノ説アリト雖皆不正也。又華佗カ弟子。廣陵ノ吳普。李當之等。魏晉
以來ニ所用ノ藥品三百六十五種ヲ集テ。名醫別録ト号ス。又梁ノ
陶弘景ト云者。神農本草經ニ彼々名醫別録ヲ附合メ。藥品七百三十
種弘景集註トシ。卷トシ集註本草ト号ス。又唐ノ高宗顯慶中。蘇恭
等。二十三人ニ命メ弘景カ集註本草ニ藥品一百二十種ヲ増益

ノ八百五十種。目錄合ノ二十一卷。唐本草凡新修本草凡号ス。又此
間ニ於テ藥圖二十卷。圖經七卷。新修圖二十六卷。諸家本草。本草
音義等ノ作アリ。又唐ノ七王明皇玄宗ノ天寶中。單方藥圖ア
リ。又五代ノ末。僞蜀ノ孟昶韓保昇ニ命メ。顯慶中ノ唐本草ト。永
徽中ノ圖經七卷トヲ合メ。蜀本草十卷トス。又宋ノ太祖ノ開宝六
年ニ尚藥奉御ノ馬士等九人ニ命メ。諸家ノ本草ヲ校陳藏器カ本草
拾遺李含光カ本草音義等ヲ參合メ。開宝詳定本草アリ。同七年
ニ開宝重定本草二十卷アリ。又宋ノ仁宗嘉祐二年ニ嘉祐補註
本草二十卷。圖經二十卷。目錄合四十二卷。藥品一千八百二十二種ニ
至ル。其後次第ニ改正増益メ。李時珍カ本草綱目ニ至ニテ本草ノ
書アルコト四十七家。李氏カ綱目五十三卷。藥品一千八百九十二
種ニ。此道大ニ備レリトス。凡病者ノ所頼ハ醫ナリ。醫ノ所頼者ハ

藥也。藥性ノ神義ニ未達ハ、タトヒ神聖工巧ノ四知ニ達スルコト有ト云凡何ヲ以カ瀉邪補正ノ功ヲ致サンヤ。抑藥性ノ深ニ達セント欲ハ味ノ厚薄、氣ノ陰陽、性ノ寒温、形ノ輕重、質ノ精麁、色ノ五行、其生スルノ時、令等ヲ詳ニ察スルニ非ンバ、本草ノ奧旨ニ至ルコト不能者ナリ。假令蟬蛻ハ皮膚、風熱濕熱ヲ療シ、蟬躰ハ胞衣ヲ下シ、胎ヲ墮スルカ如キ、其蟬ノ皮殼タルヲ以テ皮膚ニ行、其皮殼ノ久ク風雨寒熱ニ壞サルヲ以テ風熱濕熱癢痒ヲ治ス。其蟬躰ハ胞衣ガ皮殼ヲ脫出コトノ易ヲ以テ下胞衣墮胎ノ能アリ。其外人參ノ元氣ヲ補ヒ、白朮ノ中氣ヲ補ニ至テモ、此功アル所以ノ者ハ、其本何ニ從テ然ト云ノ義ニ達セスンバ、日ニ本草數万言ヲ誦スル藥性ノ奧旨ヲ得者ニ非ス。醫ハ意也。又理也。意ヲ以テ理ニ向ニ非スルハ、醫云乎哉。

○藥性辨

藥ニ寒熱温涼微寒微温及平アリテ、四時ノ氣令ニ應ス。寒ハ盛冬十月ノ氣令ノ如シ。大寒ノ者ハ十二月ノ令ノ如シ。熱ハ夏五月ノ氣令ノ如シ。太熱ノ者ハ六月其熱ノ令ノ如シ。温ハ三月ノ氣令ノ如シ。涼ハ九月ノ氣令ノ如シ。微寒微温ハ寒温ノ間ノ者ナリ。平ト云ニ似タリ。微寒ハ寒ノ甚薄者。平ニ似テ平ヨリハ微寒者ヲ云。彼八月ノ氣令ノ如シ。微温ハ温ノ甚薄者。此亦平ニ似テ平ヨリハ微温者ヲ云。彼二月ノ氣令ノ如シ。平ハ寒熱温涼ノ偏ナク、中和者ヲ云。是以其氣ノ寒熱ニ屬スル者ハ、其偏性ナルヲ以テ、寒藥ハ温熱ノ劑中ニ合入スレバ、其寒ヲ不減。十一月ノ時マ、圍爐重綿コトアリト雖、遂ニ寒令ヲ防コトヲ致シ難ニ同。熱藥モ亦然リ。寒涼ノ劑中ニ合入スレバ、其熱ヲ不減。五月ノ時マ、扇テ風ヲ致シ、凉水ニ洗浴スルコトアリト雖、遂ニ熱令ヲ防コトヲ致シ難ニ同。微温微寒ノ者ハ、衆藥ニ引レテ其氣

ヲ移レ易キ者ナリ。温熱ノ藥中ニ合入ノハ。温性ノ如クニテリ。寒涼ノ藥中ニ合
入ハ。寒性ノ如クニナル。二月九月ノ時。又。圍爐重綿則温ナルコトヲ覺。風ヲ致
シ水ニ洗ハ涼ナルコトヲ覺。カ如ク平者モ亦同。凡温者ハ其氣順ニシテ緩シ
熱者ハ其氣悍ニシテ速ニ且發テ上ル。寒者ハ其氣嚴シテ下ル。涼者ハ其氣伸
引ノ順ス。又五味各其氣ヲ異ニス。辛ハ開テ散シ。苦ハ疎テサ推或堅入。酸
ハ收聚テ且推。甘ハ或緩或持。鹹ハ爽ニシテ淡ハ泄ノ通スル者ナリ。夫諸藥石
ノ病ヲ治スル所以ノ義ハ其性ノ寒熱温涼。其氣ノ順緩悍速發上嚴下
伸引ト。其味ノ辛甘苦酸鹹淡。トヲ合メ各其功ヲ出者ナリ。此ニ其形色
及香氣。生時。採時。修製トヲ相兼テ。無量ノ治功ヲ發者ナリ。深以上ノ
義ヲ盡シ諸藥治功ノ源本ヲ推窮則太古神農氏ノ意。今日ニ著シ醫藥
幸甚カラシ。蓋藥性治功ノ深義ヲ極者ハ穴カチニ本草家ノ言ニ不拘
彼ニ此ヲ治スルト云ト雖。考テ不用之コトアリ。此ヲ治スルト云サレモ察

ノ用之コトアリ。若藥性治功ノ詳義ヲ不得者ハ偏ニ本草家ニ所記
ノ言ニノミ從テ妄ニ用。施ガ故ニ藥石ノ至能ヲ發セシムルコト不能ノ
反テ動スレハ其病邪ヲ助テ膏七日ヲ重ス。假令人參ノ如キ。李珣云止
煩躁。元素云止渴生津液ト。然凡諸煩渴及生津ニ此ヲ通用スベ
ケンヤ。此皆元氣不足ヨリ致所ノ者ヲ治スル。若其本ヲ不知。只一
偏ニ此言ニ從テ通用ニスルトキハ過アルコト不サ。故ニ本草家ノ道ニ達
者ハ惟其理ヲ本トシ其言ヲ不信也。本草家ニ所謂ヲ視ニ。一藥ノ功
能數千病ニシ。一藥ヲ以テ諸病ヲ通治スルニ似タリト云ハ。其至能
本功ノ出所ノ一根アリテ。他ハ皆此カ枝葉タリ。是以其至治ノ源本ヲ
察シ窮テ用則他ノ枝葉ニハ不拘也。苟モ其書言ニ執滯シ枝葉ニ泥
ス。醫藥ニ益ナク人ヲ擣コト多シ。慎ガルベケンヤ

○補氣補血辨

世ニ此一分ノ藥味ヲ以テ生氣生人血生精スルノ義ヲ疑者アリ
上雖皆是愚者ノ所致タリ蓋藥品直ニ氣火精血ヲ生スルニ非ス惟
陰陽ヲ生スルノ三陽ハ爲氣爲火陰ハ爲形爲水陰陽兩義ハ本也氣
火形水ハ此ヨリ生スル所ノ標タリ陽生スレハ氣火温熱從テ生ス陰
生スレハ形水凉寒從テ生ス陰陽ハ天地ノ間ニ充滿シ万物ノ内外ニ
包蔵ス故ニ藥石ノ中ニ於テモ陽ノ包蔵盛者アリ陰ノ包蔵盛者アリ
其陽ノ包蔵盛物ヲ用則腹内自其陽ヲ充レム陽充則氣火温熱
從テ生ス其陰ノ包蔵盛物ヲ用則腹内自陰ヲ充レム陰充則精血
凉寒從テ生ス譬天陽充レハ清光ニ温熱ヲ生シ地陰充レハ雲雨降
テ凉寒ヲ生スルカ如シ陽藥ヲ服則人ノ腹内清天ニ温火生ス陰
藥ヲ服則人ノ腹内雨天ニ寒水生ス人ハ小天地タリ萬方皆陰陽
ヲ存ス何ゾ疑ヲ致サシヤ桂附ヲ碎テ火ナシ地黃ヲ絞テ精血ナシト

雖桂附ハ陽ノ充地黃ハ陰ノ充タルカ故ニ服之ノ其陰陽ニ富則精火自
然ニ生者ナリ彼金石ヲ擊テ火ヲ散シ梅ト言テ煙津ヲ生スルカ如キ此
皆陰陽ノ自然所人意ノ多ク知ヘキニ非ス炎帝神農氏ノ聖生知ヲ
以テ深コレヲ察シ人命ノ夭壽ヲ濟テ後人ソノ生ヲ遂ニ至レリ已ニ管
見區人ヲ以テ妄知ニ此道ヲ疑テ不信者ハ愚ニシ知ナキ耳ニ非ズ謂
ベシ狂人ニ比者ト

○製藥辨

世ノ麁工藥性ノ深義ニ未達取ニ非ス藥品ノ製法ヲ悞者多シ夫醫
ノ藥ヲ使ヤ將ノ兵ヲ使ニ同シ藥ノ製法各其度アルヤ兵ノ各其力ニ
相應スル所ノ甲鎧ヲ與此カ所喜ノ戈戟ヲ授テ戰シムルニ同シ彼
燄ベキヲ炒炒ベキヲ焙或少炒ベキヲ炒黒シ或製製蜜製糖製茶ヲ不
分或製スレバ其蜜鹽ヲ甚濃シ甚淡ノ皆法度ヲ失者ハ遂ニ病ヲ愈

ス下不能。假令輕焙^レキヲ強炒^レ黒シ。ザ^ラ蜜水ニ製スヘキヲ蜜ヲ濃^クシ者ハ彼力^カ弱^キ兵ニ甲^シ鎧^ヲ又^ハ戟ノ重物ヲ投^テ戰^シムルカ如シ。其^ノ兵具ノ重^キ已ガカ^ラ奪^レ失^テ。遂ニ敵ニ勝^{コト}不能^ト同^シ。其^ノ製^ノ強^ガ爲^ニ藥力^ノ主^能ヲ奪^レ失^テ。遂ニ病^ニ勝^{コト}不能^也。又炒^黒ニスベキヲ輕^ク焙^用。或^ハ蜜水甚^ク淡^シ。或^ハ不^レ製^シ。使^者ハ彼^ノ甲^シ鎧^ヲ者^セシメス。モ^ハ戟^ノ鈍^クヲ投^テ戰^シムルカ如シ。兵^ノ力^ハ悍^ト雖^モ其^ノ兵具^ノ善^クヲ失^カ。故^ニ此^モ亦^ハ遂^ニ勝^{コト}不能^ト同^シ。其^ノ製^ノ弱^ガ爲^ニ藥力^ノ主^能ヲ發^スルコト不能^也。其^ノ邪氣^ハ戰^ト雖^モ藥力^反テ邪氣^ニ負^テ。病^平伏^セサルナリ。凡^レ戰^テ勝^マ。大將^ノ良^ニ從^テナリ。員^マ兵^ノ過^ニ非^ス。大將^ノ過^{ナリ}。藥^ノ病^ヲ愈^ヤ醫^ノ良^ニ從^テナリ。藥^ノ效^チキヤ。藥^ノ過^ニ非^ス。皆^ハ醫^ノ致^ス過^{ナリ}。然^ル庸^醫ハ已ガ理^學ノ昧^ラ。不^レ知^テ答^ラ古^方ニ遺^恨ヲ藥^性ニ致^ス。マ^{コト}ニ愚^ナルカナ。市^ノ良^醫ハ國家^ヲ醫^ス。況^ヤ人^身八^尺ノ小^病ヲヤ。何^ゾ不^レ愈^セ者^{アラ}

シ。然^レ凡^レ人^身ノ病^{アル}コト四百^四病。其中^ニ真^死不^レ治^者一^百一^病ニシ。此^レ必^ズ死^ノ症^ハ四^分ノ一^ニ居^セリ。他^ハ皆^ハ良^醫ノ療^メ治^者也。然^レ則^チ病^重ト云^テ死^地ニ定^ヘカラス。已^ガ醫^案ノ不^レ足^ヲ省^ク。方^藥未^ダ的^クヲ察^メ。詳^ニ四^知ヲ盡^シ。藥^性ヲ明^カニ救^フコトヲ欲^スヘシ。或^ハ遂^ニ難^ク愈^者ハ速^ニ他^醫ニ任^テ。惟^ニ病^者ノ命^ヲノ重^キ。醫^ノ私^ヲ以^テ其^ノ生^ヲ天^{コト}ナカ^ラシコトヲ致^セ。此^レ意^醫家^ノ尤^モ切^要ナリ。夫^レ醫^ハ仁^道ノ最^トス。己^ニ曲^帯メ人^ノ長^生ヲ亡^{コト}カレト云

○草部

人參



其温○補五藏安神氣止驚悸多
夢保短氣生津液止渴除邪明目
通血脉主健忘養胃氣守肺心治

眩運自汗頭痛嘔吐痰瀉瀉痢中風中暑痿軟吐血嗽血下血血崩
霍亂痰弱虛熱男婦一切內傷虛證及虛勞△補五藏△益人參ノ
本ノ字ハ人參也浸ハ浸也浸漸ノ義此草根年々ニ漸長成シ人ノ
形ニ似テ其功神妙故ニ人參或神草ト号ス然レ茂ノ字書繁ニ
因テ後人遂ニ代テ人參ニ作レリ夫人參ノ生ズルコトニ極ニシテ才ニ
應シ五葉アリテ五行ニ應シ其根自人形ノ如ク黄ニシテ中種ノ土色ヲ見
ス且此カ所生ノ上ニ紫雲氣アリ實ニ神妙不測ノ靈草常理ヲ以
テ尋ヘキニ非ス是以能ク五藏ヲ補ノ功アリ本草家ニ謂人參ハ手太

陰肺經ノ藥ト肺ハ諸氣ヲ主フ以ノ故ナリト雖愚按ニ人參ハ胃氣
ヲ補養スルノ聖藥トスヘレ時珍曰色黄屬土而補脾胃ト此義至レリ
盡セリ人ニ神氣真氣清氣宗氣等ノ名類多ト雖總合則皆胃氣ノ別
名タリ東垣曰清氣榮氣衝氣春升之氣皆胃氣之別稱也ト玉版
論曰人之所受氣者穀也ト彼肺氣神氣五藏氣モ皆此胃氣ヨリシ
生育ス故ニ稱ノ元氣トス實ニ人身後天元源ノ氣此ヨリ貴ハナレ此
ヲ能ク補養者ハ人參ニ勝者ナレトス是以外内血氣諸ノ虛證ト云ニ至
テハ皆人參胃氣補助ノ功ニ非ンバ不能致效者ナリ胃氣一復盛ナレ
ハ渾身充實ノ何ノ不足カアラシヤ胃氣一度虚スレバ渾身皆不足レテ
虛病蜂起ス世ノ庸工多ク此義ニ昧メ謂血虚陰虛火旺者人參ヲ服
之レバ陽火ヲ扶テ升衝ノ患アリト人參ヲ恐コト蛇蝎ノ如ニスル
者ハ啾譔レリ精血ノ生ズル其本何ニカ在唯中焦胃氣ノ一源ヨリ

發スルコト苟モ其源ヲ不治ノ其流ヲ充シムルコト不能ナリ。然レモ古ノ
 明哲ノ醫ニモ亦此誤アルコト不尠也。好古論ニ肺受火邪者服之傷肺
 ト。王論論ニ陰虛火動諸血症勿用人參。陽旺則陰愈消ト。雷斅論ニ
 夏月サ使^ハ人參發^ス心^ノ眩^ト。此皆一理ニ曲滯ノ陰陽互根ノ義ト其宜不
 宜ノ時トヲ不辨者ナリ。言聞陽起等詳ニ此誤論ヲ論メ。後學ヲ誘引
 ス。夫或血虛或陰虛ノ火熱旺^シ。胃氣イミダ不足セズ。火熱肺ニ升^リスル
 者ノ如キ。實^ニ人參ヲ用^{コト}ヲ忌^ム。若^シ其陰血虛極^シ。胃氣不足^ニ心肺ノ
 氣モ亦從^テテ^テ虛^レ疲^レ。陰火旺^シノ熱者ノ如キハ。人參^ニ非^レバ不能治^{ナリ}。何
 妄^リニ總槩^シノ人參ハ血虛陰虛火旺肺熱者ニ忌^トノ^ニセ^ンマ。肺ニ燔^ル火ノ
 實執^{アル}者ハ實^ニ不宜^カ東垣謂^フ火與元氣不兩立^ノ理アリテ。肺氣虛
 ノ陰火ニ乘^セラレテ。肺熱者ハ人參ヲ用^テ其元氣ヲ補^ル則陰火自退^テ
 熱清^シ是東垣謂^フ溫能除^ク大熱^ノ義例也。今ノ時師ハ火熱ハ苦寒降^ル沉^ル
 陰劑ニ瀉スルトノ^ニ覺^テ精血ハ純陰ノ劑ニ補^トノ^ニ覺^テ。其溫^ク及^テ
 火熱ヲ除^キ陽ヨリ^シ陰ヲ長^シ。補氣^テ精血ヲ生^セシムルノ義アルコト
 ヲ不知^{ナリ}。人參ハ補^ル元氣^ノ聖藥タリ。惟^テ元氣ノ虛實ヲ察^シテ用^フ
 之^ヲ。其精虛血虛肺熱血症。夏月等ニ不可^ク拘^ル元氣ヲ主^トノ宜^レ見^テ元
 氣ノ虛モ亦其輕重ヲ考^テ用^フ之^ヲ。故^ニ補^ル五藏^ト云^フモ亦五藏ノ元氣
 ヲ補^ル者ト知^ル之^レ。安神氣^ニ神氣ハ在心^ニ一身ノ主宰タリ。神氣ハ先天ニ
 生^レ後天ノ元氣ニ從^テ養^ハル者ナリ。故^ニ人參ヲ以^テ胃氣ヲ補^ル
 生^スルトキハ。神氣自安定ナルコトヲ得^{ナリ}。驚悸^{怔忡ノ}類^{ナリ}。神
 氣元氣虛疲^ノ驚^ヘキ事モ非^ニ驚^キ悸^ラ云^フ。驚悸怔忡ノ症數種アリテ。
 治方モ亦不同。血虛アリ。痰動アリ。熱躁アリ。夫神ハ胸中心宮ニ藏^ル
 心^ノ南方ノ離^ニ離中ニ^ニ陰アレバ。人ノ心中ニ血ヲ生^ズ此ヲ心血トス。神
 ハ其血中ニ含^ム藏^ス。譬^ハ水魚ノ如^シ。心血ハ水ナリ。神氣ハ魚ナリ。彼血

陰劑ニ瀉スルトノ^ニ覺^テ精血ハ純陰ノ劑ニ補^トノ^ニ覺^テ。其溫^ク及^テ
 火熱ヲ除^キ陽ヨリ^シ陰ヲ長^シ。補氣^テ精血ヲ生^セシムルノ義アルコト
 ヲ不知^{ナリ}。人參ハ補^ル元氣^ノ聖藥タリ。惟^テ元氣ノ虛實ヲ察^シテ用^フ
 之^ヲ。其精虛血虛肺熱血症。夏月等ニ不可^ク拘^ル元氣ヲ主^トノ宜^レ見^テ元
 氣ノ虛モ亦其輕重ヲ考^テ用^フ之^ヲ。故^ニ補^ル五藏^ト云^フモ亦五藏ノ元氣
 ヲ補^ル者ト知^ル之^レ。安神氣^ニ神氣ハ在心^ニ一身ノ主宰タリ。神氣ハ先天ニ
 生^レ後天ノ元氣ニ從^テ養^ハル者ナリ。故^ニ人參ヲ以^テ胃氣ヲ補^ル
 生^スルトキハ。神氣自安定ナルコトヲ得^{ナリ}。驚悸^{怔忡ノ}類^{ナリ}。神
 氣元氣虛疲^ノ驚^ヘキ事モ非^ニ驚^キ悸^ラ云^フ。驚悸怔忡ノ症數種アリテ。
 治方モ亦不同。血虛アリ。痰動アリ。熱躁アリ。夫神ハ胸中心宮ニ藏^ル
 心^ノ南方ノ離^ニ離中ニ^ニ陰アレバ。人ノ心中ニ血ヲ生^ズ此ヲ心血トス。神
 ハ其血中ニ含^ム藏^ス。譬^ハ水魚ノ如^シ。心血ハ水ナリ。神氣ハ魚ナリ。彼血

虚ノ神動スルガ故ニ驚悸者ハ水涸テ魚ノ跳ガ如シ。水滿則魚自安
 故ニ如此者ハ當歸ノ類ヲ用テ心血ヲ補則愈又痰飲心竅ニ支
 テ神動スルガ故ニ驚悸者ハ水靜ナリト雖人ニ追レ鳥ニ追レテ魚ノ
 跳ガ如シ其追者ヲ除則魚自安シ如此者ハ茯苓茯神等ヲ用テ
 痰ヲ引去則愈又心熱ノ神躁動テ驚悸者ハ水熱ノ魚ノ跳ガ如シ
 辰砂ノ類ヲ用テ愈トス人參ヲ用テ所治ノ驚悸怔忡ハ水ノ涸ニ
 モ非ス物ニ追ニモ非ス水ノ熱スルニモ非ス魚自疲弱テ常ノ風声
 水流ニ躁テ跳ガ如ク惟神氣虚怯ノ常ノ呼吸升降等ノ氣ニ動
 ノ驚悸者ヲ主治人多ハ遠志ト合用ノ宜共遠志ハ心腎ノ神志ヲ
 ノ能交通セシムルノ物タレバ人參ニシテ神氣ヲ養遠志ニシテ神志ヲ定
 テ愈之ノ理ナリ又右ニ所辨ノ血虚痰動熱躁ノ症モ亦其神氣ノ
 虚怯ヲ兼者ハ右ノ諸藥ニ人參ヲ合用スヘシ假令心血虚ノ怔驚

セハ當歸人參ヲ合用スルノ類ナリ多夢多夢ト云ニ至テモ亦各虚實
 ノ辨アリ實夢ハ其藏所屬ノ物類有餘ヲ見虚夢ハ其藏所屬ノ
 物類不足ヲ見假令腎邪有餘スレバ洪水大魚等ヲ夢腎水虚スレバ
 水ヲ扶治コトヲ夢類ナリ凡毎宵同事ヲ多夢者各五藏ノ別アリ
 テ人參ノ主治ニ非ス人參所治ノ多夢ト云ハ種々サレクノ別モナキ
 コトヲ云々多夢者ナリ此ニ元氣ノ不足ニ因テ所致人參ヲ用テ宜
 藥權曰多夢心者加之ト云々八種々チワリタルヲ云保短氣呼
 吸氣短メ息シ難ヲ云短氣ノ症モ痰ノ爲ニ阻ラレテ致アリ胃氣胸
 中ニ塞テ致アリ如此者ハ化痰順氣ノ藥ニ宜人參所治ノ短氣ハ
 心脾胃ノ元氣虚メ息氣短者ニ宜或腎氣不足ノ短氣ヲ致メアリ
 八味丸等ニ宜生津液津液ノ義ハ靈樞決氣篇及五癆津液別論
 ニ詳ナリ津ハ液ノ清者腠理ニ發ス液ハ津ノ厚者骨屬ニ注ル俱ニ

水精ツルホイノ名ナリ人參ノ生津液ト云ニ至テ深義存セリ此義ヲ
誤則害不分凡人參ハ補氣陽劑タリ津液ハ水類陰氣タリ。古人
謂無陽則陰無以生陽生則陰長ト隆冬ノ水ハ寒凝ノ潤流セ陽
化ノ薄ケレバナリ春温應ノ寒凝解水液潤流ス陽化ノ盛ニ從テナリ。
易ノ坎中ニ陽アル者モ亦此義ナリ陽氣ハ陰水ノ母タリ。子母相
連テ氣水合一ノ者ナリ。故ニ人身ノ津液モ亦陽温ノ氣化ナリ時ハ
津液ノ充身テ濡潤スルニ不能譬疑タル水ハ物ヲ潤コト不能ニ同。
是以人參ノ生津液ト云ハ津液ノ潤乾レタル此ガ直ニ生ヘルニハ
非ズ。此ヲ直ニ生スル者ハ地黄當歸ノ類ナリ。夫津液ノ不足ニ於テ
ニ辨アリ腎水潤テ泉源ノ虛ニ因テ津液ノ流不足者アリ。地黄丸
ノ類ニ宜腎源未潤津液未乾ト雖彼元陽ノ氣化虛スルニ因テ津
液凝テ流サルガ故ニ周身ニ其津ノ流滿コト不能津液ノ不足ヲ致

者アリ。此人參ヲ用ベキノ症ナリ。人參ハ温ノ化ヲ以テ津液ノ母タル元
陽氣ヲ補生スルトキハ津液ノ凝者解テ渾身ニ滿潤者ナリ。經ハ膏ヲ
火ニ懸テ温時ハ液ノ潤液滿カ知レ然氏火強ノ熱ニ甚則妙者燥ス
故ニ陽生則陰長スルノ義ニ泥テ妄ニ桂附等ノ陽剛ノ劑ヲ太過レ或
人參ト維京ニ過用則反テ陽邪ヲ扶テ陰液ヲ消ス只春温ハ潤レ
夏熱ハ燥ス温與熱ノ辨アリテ用之今ノ時節此ニ味ノ補氣ノ劑ハ
扶陽消陰ト云テ人參ヲ恐レ陰虛血虛ヲ療症ニ忌之此皆玉合カ相
醫雜著ノ誤ヨリ始者ナリ。仲景治血虛加人參東垣用人參精自生ト
云。丹溪治陰虛四物加人參又古方治血虛養營湯有人參葛可久
治勞瘵以獨參湯保真湯何ハ人參ヲ恐ニヤ只用之時アリ便之ニ
分量アルノニ○或問吾子カ言ハ是ナリ然氏虛氏正傳或問ニ云テ
人參血虛者以參芪補之真陰虛者固不可用。吾子カ言テ異ナル

八何ゾア。曰天良始テ王綸ガ誤ラ發明シ東垣ノ血全目ヲ起シテ血
 虚者宜用人參ト云ト雖其真陰ノ虚症ニハ不可用トハ智者ノ一
 失歟夫血與精何ゾ異トラン河海異ナリト雖其源ハ一ノ水氣之精
 血異ナリト雖其本ハ一ノ陰液也故ニ血虚則精虚ス精虚則血虚ス
 精ハ本血ハ標標本合エタリ是以精虚症ニモ四物湯ヲ用血虚症ニ
 モ地黄丸ヲ不用ニハ非ナリ何如血虚ハ用人參腎虚ハ忌ム人參ノ
 養シマシマ血虚ト雖元氣未疲ハ不宜用人參真陰虚症ト雖元氣ノ
 虚疲アラバ人參ヲ用ヘレ人參ノ宜與不其精血ヲ以不可別惟元氣
 ノ虚實輕重ニ從ヘキノ三葛氏カ下藥神書ニ於テ始テ勞瘵真陰虚極
 者ニ大劑ノ人參湯ヲ用此實ニ千古ノ惑ヲ解天亡ノ患ヲ濟庸醫ノ過
 ヲ防者乎止渴渴症ニ種人アリ肺燥ニ渴マハ麥門冬ノ類胃熱ニ渴
 渴セハ葛根ノ類腎熱ニ渴セハ知母ノ類ヲ用エ人參ヲ所止ノ渴症ハ

右ノ生津液ノ義ト同ク元氣不足スルニ因テ津液枯涸ト不能シテ
 渴者ニ用ユ此症必冷飲ヲ惡テ温湯ヲ好者ナリ若冷飲ヲ好者
 ハ實熱タリ凉劑陰藥ニ宜シ除邪邪ハ思邪ヲ指テ云思邪ノ犯
 入皆其神氣ノ虚ニ乘ソ致者ナリ神氣ノ守堅固ナル時ハ思神何
 ニ從カ犯サンヤ故ニ人參ヲ用テ其神ヲ補則狐狸等一切邪惡鬼
 氣迫テ遂ニ退去明目靈樞大惑論曰目者心使也心者神之舍也
 素問解精微論曰心者五藏之專精也目者其竅也靈樞夾氣篇曰
 氣脫者目不明ト眼目ハ神氣ノ會所タリ故ニ神氣虚ノ目不明者ハ
 人參ヲ用テ治之今ノ時節眼目ノ病ヲ療スルニ惟火熱上衝トノミ
 云テ清涼苦寒ヲ用ヒ人參ハ上衝ニ害アリトノ恐テ不用之亦謬レ
 リ夫目疾種人アリテ人參ノ宜不宜アリ或風寒ニ中テ邪氣其目
 ヲ犯者ハ敗毒散ノ類ヲ用ユ精血不足ノ熱火上衝者ハ四物湯六味

地黃丸ノ類ニ宜シ。肝火實盛ニテ致者ハ龍胆瀉肝湯ノ類ヲ用ニ。胃氣
 不足シ清腸下陷メ。神氣其眼目ニ達スルコト薄者ハ補中益氣湯
 ノ類。人參ヲ以テ治之。太極目ヲ疾テ温ヲ得ハ快ク。右脈虛弱ニシテ
 不食シ。木便下。實者ハ疾ニ涼劑ヲ用テカレ。人參補陽ノ藥ヲ施シテ
 其元氣ヲ温養ス。ヘシ**通血脉**。朱熹篇曰。壅遏官氣令無所避。是謂脈
 上。脈ハ天真委和ノ氣。血氣ヲ通スル所以ノ者。即神氣ノ致所ナリ。人
 參ハ補神ノ聖藥タリ。故ニ能通血脉ノ血氣ヲ流行セシムルナリ。是以
 孫真人ガ生脈散ニ以テ人參爲君。夫生脈散ハ夏月暑熱傷元氣汗大泄
 痿厥症ト成ニトスル者ヲ治ス。以テ人參爲君補元氣。テ濕火以交門
 冬爲臣潤肺金。テ腎水ノ源ヲ滋。以五味子爲佐。直ニ腎精ヲ生シ。其
 酸味ヲ以テ耗氣ヲ救ム。此皆人參ニテ元氣ノ眞氣ヲ養。金水ヲ補テ
 血脉ヲ通ジ。夏月冒暑ノ虛熱ヲ治ス。凡中暑者則汗泄氣脫ノ元氣

ノ不足ヲ致ス。故ニ夏月ハ熱冬ハ寒。一雖反テ人參ニ宜所ノ病者多シ。
 然ニ雷斃ト云ニ云テ。夏月使人參發心疾トハ謬ナリ。主健忘。健
 物ヲ忘テ健忘ト号ス。亦數種アリテ藥不同。或氣結ノ不順。故ニ
 忘者アリ。開鬱順氣ノ劑ニ宜。或痰結ニ因者アリ。化痰ノ藥ニ宜シ。
 人參ヲ所用ノ健忘ハ元氣不足ノ事ヲ主持スルニカイナク。ヒテ多忘
 者ナリ。凡覺モ忘モ皆神氣ノ所爲ナリ。天地ノ間ハ常ニ神氣去レ補
 スルガ故ニ能覺テ四時ノ道。迷ニ不忘ノ能行ル。人モ神氣ナク。盛
 ハ忘ル。ト云コトナシ。以テ人參其神氣ヲ補則何ノ健忘ト云コトカラン。
 然凡又腎ハ藏志。志ハ万草ノ根ガレトナリテ遠達通スル氣ナリ。此志氣
 不足則其氣ノ遠及所ナキヲ以テ多忘。故ニ今ハ好色ノ人ニ健忘。患
 者ハ腎志ノ虛スルニ因ナリ。此ヲ治スルニハ遠志ヲ以テ。前後方ニ健忘
 者ヲ治スルニ遠志ノ味ヲ以テ服セシム。其人ニ知スルコト勿ク。本抵健忘

症ニハ人參遠志ヲ合用スベシ。養胃氣。胃氣ハ人身後天ノ元氣。此ヨリ貴キナレ。養之者ハ人參ニ勝ハナシ。培元氣湯。四君子。六君子湯等ノ養胃氣者モ皆人參アルヲ以テ故ナリ。人參ノ主功ハ胃氣ヲ養ニ止ル。他ノ治功ハ皆枝葉ナリ。言聞ガ陽春生發之氣ト云モ此。胃氣ヲ補所ヲ以テリ。胃氣ハ清純中和ノ氣。生ノ主ナリ。宗氣。榮氣。衛氣。神氣。真氣。津液。精。脈。髓。腦。筋。骨。肌。膚。毛。髮。ニ至リテ。胃氣ニ從フト云コトナレ。況藏府ヲヤ。皆胃氣ニ養レテ。ナレ。皆ノ職ヲ調者ナリ。人參補之ノ功勝ナリ。故一切ノ病。虛症ノ極ニ於テハ無不用之。若シ元氣虛弱症ニ或ハ益氣四君子君等ノ劑ヲ用テ人參ヲ施ス。其效ナキ者ハ本方ニ人參ヲ合用スルノ外。又別ニ獨參湯ヲ煎服セシムベシ。人參ノ功能發メテ致易シ。今ノ庸醫ハ病已ニ至極ノ死ニ向タルニ於テ。驚テ人參ヲ加倍シ。或ハ大劑ノ獨參湯ヲ用ガ故ニ渴ノ穿井。闔テ鑿兵ガ如ク。其治遲ノ益ナシ。病因脈證ヲ認シテ元氣ノ虛極ニ屬者ハ病未進前ニ速ニ服之。其危ヲ防ヘシ。自飛霞謂人參回元氣於無何有之鄉。雖胃氣已ニ絶セントスルニ至テハ人參ト雖再生氣ヲ致難シ。長病虛病若病ハ病ヲ考ヘ時ヲ察シテ未極サキニ用之。テ生氣ヲ續レムベシ。此醫療ノ最要ナリ。且其病因脈證俱ニ胃氣ノ不足ヲ見シ人參ヲ用ニ。反テ氣升食減レ。胸膈悶ノ不快者アリ。慶士多ハ誤之。謂稟賦ノ根蒂實シ人參ヲ不受ト。此甚誤ナリ。何ゾ病因脈證皆胃氣ノ真虛ヲ見シ人參ヲ不受ノ理アラシヤ。若シ其診候ニ過アル者ハ不知。其診候真ニシ。胃氣ノ虛極タル者ニ於テ人參ヲ不受コトアルハ人參ヲ用コトノ不足ガ故ナリ。至真要大論曰。塞因塞用ト。凡大虛者少補テ補ヲ不受益大補スベシ。必效アリ。益補劑ハ皆其性重シ。明易シ。且人參ハ浮テ升易シ。故ニ胃氣甚虛ノ不行者ニ用之。少則胃氣ヲ補ニ不

ナシ。病因脈證ヲ認シテ元氣ノ虛極ニ屬者ハ病未進前ニ速ニ服之。其危ヲ防ヘシ。自飛霞謂人參回元氣於無何有之鄉。雖胃氣已ニ絶セントスルニ至テハ人參ト雖再生氣ヲ致難シ。長病虛病若病ハ病ヲ考ヘ時ヲ察シテ未極サキニ用之。テ生氣ヲ續レムベシ。此醫療ノ最要ナリ。且其病因脈證俱ニ胃氣ノ不足ヲ見シ人參ヲ用ニ。反テ氣升食減レ。胸膈悶ノ不快者アリ。慶士多ハ誤之。謂稟賦ノ根蒂實シ人參ヲ不受ト。此甚誤ナリ。何ゾ病因脈證皆胃氣ノ真虛ヲ見シ人參ヲ不受ノ理アラシヤ。若シ其診候ニ過アル者ハ不知。其診候真ニシ。胃氣ノ虛極タル者ニ於テ人參ヲ不受コトアルハ人參ヲ用コトノ不足ガ故ナリ。至真要大論曰。塞因塞用ト。凡大虛者少補テ補ヲ不受益大補スベシ。必效アリ。益補劑ハ皆其性重シ。明易シ。且人參ハ浮テ升易シ。故ニ胃氣甚虛ノ不行者ニ用之。少則胃氣ヲ補ニ不

足ノ徒ニ其氣升リ其性閉上氣膈滿等ヲ致ス。是ニ於テ醫者有察ノ人參ヲ倍加スレハ胃氣根ニ既テ七分ノ氣降リ。胃氣行テ膈通レ中焦開テ食味進ム。此亦醫療ノ關係ナリ。虛極ニ至テハ少劑ノ人參反テ害アリ。大劑反テ其害ヲ愈スノ義ヲ知テ。錢一二分ノ人參ヲ用テ捨コト勿レ。神聖工巧ヲ規矩準繩トシテ。虛極ニ來定者ハ補劑ヲ用テ不受。又方ヲ改製ヲ代。分量ヲ増減ノ惟補フテ愈スヘシ。誤テ意ヲ疎通攻劑ニ轉メ。人命ヲ敗コト勿レ。守肺心肺ハ諸氣ヲ總心ハ神ノ舍ニシ肺心ハ俱ニ氣ヲ主者ナリ。人參ハ補氣ノ主劑タルカ故ニ用之。肺心ノ氣ヲ守テ堅固ナラシム。夫肺ハ皮毛ヲ主リ。其脈右寸ニ在。故ニ肺氣虛スレハ皮毛疎ニシ自汗惡寒シ或息短或清涕ヲ流テ外邪ノ如シ。其有シ脈虛弱者ハ肺虛ナリ。外邪ニ非ス。人參ヲ用テ補之。凡肺氣弱則腠理空疎ニシテ外邪乘。虛感冒者ハ偏ニ表發ノ劑ヲ不可用。若強テ發散ヲノニ致。則表氣益脱。邪氣反テ沈ム。羌活獨活ノ類ニ人參ヲ合シ用ヘシ。虛ノ太者桂枝湯ニシ。風藥ヲ合シ用ヨ。或問參蘇飲敗毒散麻黃湯ハ皆表發ノ劑タリ。然ニ參蘇飲敗毒散ハ俱ニ人參ヲ用ユ。麻黃湯ハ人參ナシ。此我何ゾヤ。且此三方ノ發散ノ輕重何如。曰麻黃湯ハ發表ノ強者トス。次之者ハ敗毒散ナリ。參蘇飲ハ發表ノ輕者トス。夫麻黃湯ハ偏ニ表ニ於テ開散ス。參蘇敗毒ハ裏ヨリ表ニ發散ス。此ニ人參ヲ用者ハ裏ヨリ其氣ヲ張テ風藥ヲ能表ニ達シシメシメシコトヲ欲ンナリ。然則參蘇飲敗毒散ニ所用ノ人參ハ反テ表發ノ佐トナル者ニシ補シガ爲ニハ非ス。庸醫不知之。人參アルトキハ補テ發表ニ輕ト云ハ誤ナリ。人參ニ從テ反テ發表ノ功ヲ盛ニスルノ義ニ昧シ。肺氣虛弱ノ風症ニ參蘇飲ヲ用テ人參ヲ使則此補ヲ兼テ發表ヲ輕スルニ似タリ。雖不然。何如トナ

口語本草 卷之二 四

レハ肺氣虛弱者ハ風寒ノ邪モ亦其虛ニ乘ノ感スルコト深シ發
 表ヲ輕ク以ハ其邪ヲ散シ難シ然レ強發散則重テ肺虛ヲ致
 シコトヲ恐ル故ニ人參ヲ合用ノ裏ヨリ其氣ヲ張シメテ發表ノ
 功ヲ盛ニセシコトヲ欲フナリ。庸醫ハ此意ヲ不知シ參蘇飲ニ人參
 ヲ用ヒ及敗毒散ニ人參ヲ用則皆發表ノ功ヲ薄セシコトヲ欲ス
 ルガ故ナリト云者ハ誤ナリ。或問補藥ハ性重ノ閉發表ノ劑中
 ニ用之恐ハ邪氣ヲ補住セシコトヲ。何故ニ參蘇敗毒ニ用之乎曰
 外邪アル者用之則左邪氣ヲ補住スト雖參蘇飲敗毒散ノ發表
 風劑群聚ノ中ニ此一味ヲ合用則表藥ニ引レテ閉塞ヲ致スニ不至
 然レ肺氣ノ弱者ニ非シバ勿用彼麻黃湯等ヲ用ヘキ所ノ實邪ノ
 者ニハ恐之蛇蝎ノ如シ治眩暈眩暈ヲ云此症數因アリテ不同外
 風邪ヨリ致アリ發散ニ宜或内用風ヨリ致者ハ天麻柴胡ノ類ヲ

用ユ或痰氣ノ逆厥ヨリ致者ハ香附子半夏ノ類ヲ用ユ或ハ婦人
 瘀血ヨリ致者アリ人參所治ノ眩暈ハ元氣虛ノ虛氣浮升テ
 眩或胃氣虛ノ下陷シ清陽不升カ故ニ濁陰上ニ塞テ不降ヲ以
 眩者ナリ如此ハ人參ヲ用テ元氣ヲ補テ其根ヲ堅スレハ自虛氣
 收テ愈或升麻柴胡ト合用メ元氣ヲ補清陽ヲ升提スレハ濁
 陰自降テ眩暈愈或曰補胃氣清陽ヲ升提スルニ於テハ人參升麻
 柴胡ヲ合用則人參獨用テハ升上セザル者欤曰聞説ニ人參氣
 味俱薄ト薄者ハ能升ル故ニ人參ヲ獨用ト雖益升者ナリ升ニ非
 レハ春温生發ノ胃氣ヲ養コト不能ナリ收降ハ肅殺秋令ノ陰氣
 胃氣ノ所不欲ナリ人參ハ甘温春升ノ氣性アルヲ以元氣補養ノ
 聖藥トス故ニ誤用レハ氣ヲ上引セシメテ反テ眩暈眼疾上熱等ヲ
 致ス自汗形氣ヲ使動サシ汗自出ヲ云此肺氣弱ノ表ノ守ノ法

か故ナリ頭痛頭痛ノ疾諸因アリ外邪ヨリ致者多シ發散ノニ痰
 氣ノ逆上ノ致者アリ化痰順氣ノ劑ニ宜シ人參所治ノ頭痛氣虛
 ノ痛者ヲ主黃芪ト合用ノ宜シ氣虛ノ頭痛ハ作止アリテ或白朮或
 眩暈或四肢冷温ヲ喜テ微冷微風ヲ惡脈虛弱ニシ或瀉ヲ兼人
 參黃芪ノ所主ナリ嘔吐食積酒熱痰結等ノ嘔吐ニハ不宜胃氣虛者
 食飲ヲ不納或胃氣虛ノ升降不調嘔吐者人參ニ宜若胃氣ノ虛冷
 強ハ或乾姜肉桂ノ類ト合用ス大抵食滯ノ嘔吐モ後ニハ人參ヲ用
 テ止者ナリ何如トナレハ始ハ食積胃中ニ塞カ故ニ嘔吐スト雖已ニ
 嘔吐スルコト數ナレバ遂ニ其食積ヲ吐盡ス然レ嘔吐未止者ハ吐
 ニ因テ胃氣虛レ胃口萎テ食藥俱ニ受コト不能吐スルナリ此時
 人參ニ温中ノ劑ヲ合用メ胃氣ヲ補ヒ中焦ヲ温順シテ宜レトス
 痰癘諸癘ノ總名ナリ癘ハ風寒ノ外邪ナレハ初發ニハ人參不宜然レ

虛癘ノ症ハ初發カラモ人參ヲ使テ胃氣ヲ補助則邪氣ノ容地ナク
 ノ愈也凡截癘ノ劑ニ多ク人參ヲ用者ハ蓋癘邪ハ胃氣ノ弱ニ因テ陽
 明ニ塞者ナリ故ニ人參ヲ用テ胃氣ヲ補ヒ陽明ヲ張則邪氣ノ
 結所ナク塞所ヲ失テ其病自愈猶口博アリ大抵癘疾ハ外邪タ
 リト雖皆胃氣ノ不足ヲ兼サルハナレ苟モ胃氣盛者ハ癘疾ノ患ナ
 レ故ニ癘疾ノ始ハ先發散ノ其邪ヲ除邪退ノ後人參ヲ用テ胃氣ヲ
 調則邪氣再復スルコトナレ瀉痢津瀉痢病モ其虛實ニ從テ人參ヲ
 用ノ善惡アリ胃氣虛ノ水穀ヲ消化セズ瀉痢レ或胃氣下行ヲ
 上行セサルガ故ニ瀉痢後重スル者ハ初發ヨリ人參ヲ用ユ或ハ升麻
 ト合用ノ能胃氣ヲ上行セシメテ虛痢後重ヲ治ス大抵津瀉ノ始ハ
 水穀ヲ分利レ痢疾ノ始ハ宿滯ヲ疎通ス此實人ノ醫療也如此ノ時
 妄ニ人參ヲ用テ補益スレハ大ニ害アリ已ニ津瀉ハ分利レ痢疾疎通

ノ治ヲ行_レ凡_レ瀉痢後重未_レ愈者胃氣ノ不足ナリ。此ニ至_テハ其_レ始_レ實_レ症
ヨリ_レ病_レ出_レト雖_レ亦_レ人_レ參_ニ非_レバ不能_レ愈_{ナリ}。只_レ宿_レ食_ノ有_レ無_レ胃_レ氣_ノ虛
實ヲ察_シ用_フ之_ル尤_ニ右_ノ關_ノ脈_ノ虛_弱ノ候_{アル}ヲ主_ト用_ベキナリ。中_風庫
實_ノ辨_{アル}レ_バ十_ノ中_{七八}ハ神_氣胃_氣ノ虛_症人_參ニ宜_シ。東_垣所_謂
四十_{以後}肥_テ色_白者_ノ中_風ハ尤_ニ元_氣ノ虛_症人_參ノ主_治スル
所_{ナリ}。中_風偏_枯癱_瘓者_卒中_風且_倒者_ハ皆_胃氣_神氣_ノ虛_症タ_リ。人
參_ヲ久_服多_服スル_ニ非_ズハ難_愈。若_シ其_レ因_氣因_痰者_ハ順_氣化_痰ノ
劑_ニ人_參ヲ兼_用ヨ。中_暑索_古東_垣ノ謂_靜ヲ得_テ中_暑下_云ノ症_ハ
非_ズ。其_レ症_ハ夏_熱ニ納_涼ノ病_者ナ_リ。治_法發_散ヲ主_トス。人_參ニ宜_シ。
今_此謂_中暑_ハ直_ニ夏_月ノ炎_暑ニ中_ラレ_{タル}症_ヲ云_{。索}古_東垣_ノ謂_動
動_テ得_テ中_熱トス_ル者_{ナリ}。陰_陽應_象大_論曰_熱傷_氣ト_{。舉}痛_論
曰_是則_滕理_開榮_衛通_汗大_泄故_氣泄_矣ト_{。是}ハ熱_也。夫_夏月_ノ氣

暑_ニ中_ラレ_バ皮_腠開_テ汗_泄汗_ニ從_テ元_氣ヲ脫_ス。故_ニ病_氣虛_ニ屬_ス
ノ人_參ニ宜_シ。或_汗大_ニ泄_{スト}雖_暑ハ火_熱ノ邪_{タル}ヲ以_テ肺_氣ヲ伐_テ
テ亦_氣虛_ヲ致_ス。人_參ニ宜_シ。孫_眞人_ガ生_脈散_{。東}垣_ガ清_身是_無氣_湯ハ
夏_月中_暑ノ主_方。皆_人參_ヲ以_テ補_元氣_者是_{ナリ}。然_凡內_經云_用
熟_地黃_ト少_黃藥_麥麥_閉冬_ノ類_ヲ加_用ノ。火_ヲ制_シ。金_ヲ潤_シ。水_源ヲ
滋_ヘシ。此_亦治_ノ要_法ナ_リ。痿_軟大_抵足_痿ハ腎_ニ屬_{スル}ノ說_{アリ}ト
雖_太陰_陽明_論云_四支_稟氣_於胃_ト。痿_論曰_治痿_者獨_取陽_明ト_{。陽}明_ト
ハ胃_經ヲ指_ス。故_ニ手_足痿_軟ヲ患_者ハ胃_氣虛_ノ水_穀ノ精_氣ヲ其_四支_ニ
注_{コト}ノ薄_ガ故_{ナリ}。人_參ヲ以_テ胃_氣ヲ補_テ愈_ス。或_血虛_精虛_痿
血_痿結_者アリ_ト雖_此モ亦_胃氣_ノ虛_ヲ兼_{スト}云_{コト}ナ_リ。胃_氣盛_ニ
ノ四肢_水穀_ノ精_氣ニ富_則タ_トヒ精_血痿_痿ノ滯_{コト}アリ_ト云_凡。痿_ニ痿_ニ
軟_ノ甚_ニ不_至是_以痿_症ヲ治_者ハ人_參ヲ主_トノ胃_氣ヲ補_{コト}ヲ主

ト入。痿論ニ足陽明ヲ刺テ痿ヲ治スルノ義ヲ考ヘヨ。吐血嗽血下血
血崩血崩ハ婦人ノ經水不時ニ崩下ヲ云。王綸曰。凡酒色過度損傷
肺腎真陰。陰虛火動。勞嗽吐血。嗽血等證。勿用之。蓋人參入手太陰
能補火。故肺受火邪者忌之。若誤服參者。其溫之劑則病日增。張之
過多則死。不可治。蓋其溫助氣。氣屬陽。陽旺則陰愈消。惟宜苦寒
之藥。生血降火。世人不知。識往人服參者。為補而死者多矣。實陰虛
火動血症。勞嗽。人參ノ温陽ハ難用者ナリ。然凡亦人參ニ非レバ不
愈者アリ。何如。トナレハ。火ニ兩辨アリテ人參ニ宜ト不宜ト存ス。精
血虛衰ノ火熱升動シ。血氣逆亂ノ勞嗽吐血。咳血下血等ヲ致ト雖
元氣未虛。只火邪ノ升逆實盛ナル者ハ。實ニ此參其甘温ノ劑ヲ用
コト勿レ。火熱ノ升逆ヲ助ノ。王綸謂肺受火邪。勿服參。其陽旺則陰
消トハ是ナリ。又精血虛衰シテ元氣不足シ。陰火乘土位。虛氣與陰火

並浮テ血ヲ不收ガ故ニ。勞嗽嗽血吐血下血等ヲ致者ハ。人參ニ非ン
ハ元氣何ニ從テ力收シヤ。元氣不收ハ火何ニ從テ力退シ。血何ニ從テ
力靜ナラシヤ。東垣曰。火與元氣不兩立。此時以人參。元氣ヲノ勝シム
ルトキハ。邪火退降リテ嗽止血止。此張仲景身熱亡血脉沉遲者。加人
參ノ義。人參能補元陽。生陰血。而瀉陰火トハ東垣ノ説也。虛火可補
參芪之屬。陰虛潮熱喘嗽吐血盜汗等證。四物加人參。黃蘗知母。好
色之人。肺腎受傷。咳嗽不愈。變玉膏王。之。肺腎虛極者。獨參膏王。之。
トハ。漢ノ説ナリ。此皆陰虛火旺ノ勞嗽血症ト雖。元氣ノ虛弱ヲ主トス
ル者ハ。人參ヲ用ニ非バ。治スルコト不能。血藥陰劑モ亦人參ヲ合用セズ
ニバ。補血ノ力ヲ致コト不能。或黃蘗ノ類。サシ佐トシ。輕ク清熱スルモ亦法也。
如此。元氣不足ノ陰虛火旺ヲ以テ。元氣有餘ノ陰虛火動ノ症トハ。合同
ノ偏ニ苦寒降沉ノ劑。黃蘗。知母。生地。黃芩。連ノ類ヲ群聚ノ用コト

アヲハ苦寒胃氣ヲ伐陰藥重テ元陽ヲ損テ脾ハ血ヲ總トト不能
肺ハ氣ヲ收テ經脈ヲ調トト不能水源ヲ化スルコト不能シテ陰益
表邪火彌熾トト嗽血ナラ加テ遂ニ其生ヲ失ニ至ル恐サルヘケンマ惟
人參ハ精虛血虛火動ニ不拘元氣ノ虛ヲ主トノ用之而已太抵元氣
有餘ノ實火ハ其脈洪大實數元氣不足ノ虛火ハ其脈虛浮虛數或
身熱ト雖反ノ脈ハ沉遲ナリ此大法タリ然レ元氣ノ虛甚ト陰火ノ
勢熾者ハ反テ脈洪大ナルコトアリ然レ浮トテ洪大按テ根ナシ且有餘
ノ火症ハ大使實シ渴ト冷水ヲ欲ト能飲不足ノ陰火ハ大使不實渴ト
熱飲ヲ欲ス或冷水ヲ欲ト多不飲有餘ノ火症ハ食入不足ノ陰火ハ食
ヲ不欲ト又有餘ノ火症ハ眼勢ト候ニ眩トニ昏ト不足ノ陰火ハ眼中ニ
勢力ナシ或ハ時陰火ニ從テ嚴悍ナルコトアレト暫トニ又怯勞ス眼
ハ神ノ舍ナリ病者ノ眼勢ト候テ元氣ノ虛實ヲ察ト用之ト霍亂

吐瀉同時ニ發者ハ濕霍亂ト人欲吐ト不吐ト欲瀉ト不瀉トハ乾霍亂ナリ
霍亂ハ太抵中焦宿食ノ停滯ニ因テ升降ノ阻隔ト致者ナリ故ニ
始ハ中焦ト温順ト或吐ト或瀉ト或瀉ト或吐ト宿食去ト後胃氣ノ虛實
ヲ候テ人參ヲ用ト其胃氣甚虛ト脈微ト四肢厥冷ト者ハ初發トヨリ
人參ヲ用ト或乾姜或肉桂ト合用ト温補スト便ト痰弱ト弱字眼也胃
氣虛弱ト津液不順ナルガ故ニ痰トヲ生スル者ハ人參ニ宜ト在ト元氣
盛トノ痰症ニ候テ用之トハ反テ氣トヲ塞トテ痰トヲ加ト虛熱ト氣分ト虛熱
ハ人參ニ非トレハ清トコト不能ナリ東垣謂温能除大熱又曰火與元
氣不兩立トノ義是ナリ凡熱ハ人身常ニ存スル所ノ陽氣タリ若
陽氣留滯則熱ニ変ス其陽氣ノ留滯ニ兩辨アリ陽氣有餘ト滿
ガ故ニ四逆ト群トテ熱者アリ此ト有餘ノ邪火トス苦寒ノ藥ト以テ清
涼者是也又陽氣不足ト不行トガ故ニ留滯トノ熱者アリ不足ノ陰火

トス。此ニ苦寒清涼ヲ用レバ陽氣ナラ陰藥ニ伐テ不行不行則
熱ナラ盛ナリ。惟人參ヲ用テ陽氣ノ力ヲ扶テ能順行セシムレバ。
熱自退去故丹溪曰虛火可補參芪之屬ト。世人誤テ一切ノ虛火ニ
參芪ヲ通用ノ害ヲ致コト不サ丹溪ノ謂虛火ハ元氣不足ノ虛火
ノミ。或血虛ノ火陰虛ノ火皆虛火ナリ。此兩ノ虛火マ。元氣ノ不足
ヲ不氣ハ必シモ用コト勿レ。若此兩虛火ト雖元氣ノ虛火ノ兼有
亦用之丹溪虛火可補參芪之屬實火可瀉芩連之屬トハ專元氣
虛實ノ火ヲ主トシ云東垣陰火乘土位ト云モ元氣不足ノ火ヲ主ト
シ云者ナリ。然ニ庸愚誤テ人參補火ト云者アリ。此一偏ノ説タリ。
彼元氣有餘ノ熱火ニ用人參ハ實ニ補火ノ義アルベシ。元氣不足ノ
熱火ニ用バ人參反テ瀉火ノ劑トナル者ナリ。惟其元氣ノ虛實ニ
從テ補火ニモ瀉火ニモ至コトヲ知ベシ。今時ノ人ハ内觀ナク外

ニ馳形ハ動ノ形氣ノ勞傷古ニ倍シ。元氣ノ損耗者不サ故有餘ノ
火ハ希ニ不足ノ陰火ハ多シ。是以苦寒ノ治法多ハ害ヲ致易シ。參
芪甘温ノ醫療多ハ回生ノ功ヲ致ス。醫ハ只虛實ノ兩道ニ在ノミ
男婦一切内傷虛證 人參ハ胃氣ヲ補肺氣ヲ養神氣ヲ扶故男婦
一切内傷虛證ニ至テハ此ニ非ハ元氣ヲ補助スルコト不能ナリ。大抵
内傷元氣虛證ヲ療スルニ人參ヲ君トシ。白朮茯苓黃芪ノ屬ヲ使
ト合用スベシ。中氣虛者ハ食味少水穀消難。肌肉瘦テ四肢倦怠ス。
白朮茯苓ト合用ス。肺氣虛者ハ風寒ニ感易ク。汗泄易ク。鼻淵涕ヲ
流。屬黃芪ト合用ソ宜トス。凡諸病未極ニ於人參ノ宜不宜ノ論
アリト雖病已ニ至極ノ死ニ向タルニ於ハ宜不宜ノ別ナク惟人參ヲ以
テ元氣ヲ無何有ノ鄉ニ回ニ非ハ再生ノ效ヲ得コトナシ。然ハ人參ハ
補氣ノ靈藥。神草ノ名アルコト實ナルカチ。**虛勞** 虛勞勞瘵ハ諸病

塞ノ欬ヲ加不可用乾姜ニ宜。久爵ノ結熱肺分ニ塞者不可用。
○氣血實滯ノ痛火熱ノ邪氣銳ニ塞テ酸痛者不可用。○胸腹實滿
堅積ノ者不可用。其中焦不足ニ因テ腹滿シ。元氣ノ虛ニ因テ積滯
難解者ハ反テ人參ヲ用則滿消シ積開ク。○陰虛火動血症痼疾
勞嗽者胃氣未虛食消シ脉弦數ニ有力者ハ相火ノ有餘タリ。虛火
ニ不屬人參ヲ不可用。○大抵肥白ノ者ハ多ハ氣虛人參ヲ用易シ。瘦
黒ノ者ハ多ハ氣實火鬱人參ヲ難用。○左ノ寸關及尺脉虛レ右ノ
寸關脉盛者ハ心肝腎ノ精血虛ノ相火肺脾ニ乘ノ元氣未虛不可用。
人參宜用當歸地黃之類。○諸瘡ノ始痛甚熱ノ赤也未潰者ハ實
邪也不可用。已潰テ後用之瘡口ヲ收△或元氣虛ノ潰コト不能者
ハ用之潰サレム。○外邪アル者用之邪氣ヲ神遊ス然レ元氣虛弱者
ハ少人參ヲ兼サレハ發表シ難コトアリ。○老人久病ハ大抵人參ニ宜

新病小兒二十跡後ノ者ニハ難用。然レ必トスルニハ非ス。○日中前
ノ潮熱ハ氣虛トス日中後ノ潮熱ハ陰虛トス。用ヒ難シ。○不食嘔
吐者不宜也。然レ胃氣虛ノ胃口レホミテ不食嘔吐スル者ハ反テ
人參ニ宜トス。○以上ノ宜與不宜ハ皆此大藥ノ法例也。必然ト決
スヘカラス病ニ臨テ其症因ヲ詳ニシ。元氣ノ虛實輕重ヲ明ニシテ
宜不宜ヲ辨ズベシ。泥滯印定スルヲ勿レ。凡以下ノ諸藥皆此意也。
畏惡 人參惡浸疏。鹵鹹反藜蘆。一説云畏五靈脂。惡皂莢黑豆。
動紫石英。○明ニ藥性ニ達シ。詳ニ病因ニ通ズル所ノ上工
ハ權ニ從テ或相畏相友相惡ノ者ヲ合用ノ治療スルコトアリ。雖
此皆精微妙奧ノ神手ヨリノ致者ナリ。庸醫此ヲ見テ常法ノ如クニ
ノ用コト勿レ。彼東垣交泰丸ニ人參皂莢ヲ用ヒ。古方婦人經閉ヲ治
スル四物湯ニ人參五靈脂ヲ用ヒ。胸痰ヲ療スルニ人參藜蘆ヲ用ハ

常人ノ敢テ
及所ニ非ス

附方

人參膏 人參十兩。細ニ切剉。清水二十盞ニ
能浸透テ。銀石ノ罈ニ入。桑柴火ニテ緩ニ煎

ノ十盞ニ至。時汁ヲ瀘取。滓ニ亦水十盞ヲ入。煎ノ五盞ニ至。時一
番ノ汁ト合。膏ト成。瓶ニ收。入テ隨病作湯使。元氣虛極ヲ補。ノ
力充強シ。獨參湯 大人參去蘆。二兩剉。テ水二鐘。大棗五箇。煎。不
拘時細人服之。服後宜熟睡。出。葛可久。十藥神書補元氣妙法ナリ

參附湯 附子ノ附方ニ見タリ。胃寒ノ食スレハ即吐者ヲ治ス。人參

丁子。藿香各二盞半。陳皮五盞。生薑三片。水二盞煎。一盞ニ至リ。温
服。出。後粹方 胃虚ノ嘔吐。惡心。有痰者。人參一兩。水二盞。ヲ入。一盞ニ
煎。竹瀝一盞。姜汁三匕ヲ入。食遠ニ温服ス。老人ニ尤宜。出簡便方

食入テ即吐スルヲ治ス。人參半。夏湯 水一斗ヲ用。テ枳ニ汲。湯コト
百四十遍。其水三升ヲ取。人參一兩半。夏一兩五盞。生薑十片。白

蜜三合ヲ入。一升半ニ煮テ服ス。出張仲景金匱方 霍乱嘔吐ヲ治
人參二兩。水一盞半。煎。一盞。雞ノ卵ノ白一枚ヲ入。再煎。温服ス。或

丁香ヲ加。出衛生家室方 橫生倒産 手ヲ出。ヲ橫生トシ。足ヲ出。ヲ
倒産ト云。人參末。乳香末各一錢。丹砂末五分。研勻。雞ノ卵ノ白一枚

生薑汁三匕ヲ入。攪勻。冷服ス。母子俱ニ安。神效アリ。出婦人良方
小兒聞雷驚恐スル者。此元氣ノ虛怯也。人參。麥門冬。當歸各二兩。

五味子五錢。水一斗。煎。五升。滓水五升。煎。二升。一番煎。ト合。煎。ノ膏

ニシ。每服三匕。白湯下。出簡便方 人參粥 瓦甑垂死者ヲ治ス。人參

三兩。水一升。煎。四合。服ス。外別ニ人參汁ニ粟米雞ノ卵ノ白。薑白
ヲ入。粥ニ煮テ噉シ。房事後神氣困倦 人參七錢。陳皮一錢。水一

盞半。煎。八分。食前ニ温服ス。齒縫出血 人參赤茯苓。麥門冬各
二錢。水一鍾。煎。七分。食前ニ温服ス。蘇東坡方 禁口痢 人參蓮肉

各三錢。一盞水。二盞入煎。一盞細人呷。或姜汁炒黃連三錢。加
出經驗方。酒毒傷胃氣。瘀血滯其中。目盲。脈瀉者。蘇木煎湯。二
テ人參末一錢。調服。次日鼻兩掌皆紫黑色也。此滯血ノ行。ト入
四物湯。三蘇木。桃仁。紅花。陳皮ヲ加。人參末ヲ調服。ノ愈。出丹溪纂
要。傷寒壞症。傷寒服藥ヲ悞。テ神氣困重。脈沉伏。ノ夢中ニナリ。垂
死。トスル者。七日以後。ハ獨參湯ヲ井水ニ冷レテ服ス。鼻頭ニ汗出。脈
生。立瘳。神ノ妙方也。出聖一選方。狗咬腫痛。人參一味置。桑炭上
燒存性。以益覆沙頭ノ末。トシ。糝之。立瘳。出經驗方。蜈蚣咬傷。蜂
蟻螫傷。嚼人參末。之。蜂蟻傷
ハ人參末。傅之。出證治要訣
ト。愚案スルニ。此皆病因。ニ不的藥性。ニ不達。ガ故。ノ三。人參ハ實火ニ
用。則扶火。虛火ニ用。則瀉火。實升ニ用。則升衝。虛升ニ用。則降

愚案

時師人參ヲ恐者多シ。蓋
人參ハ扶火升上スルガ故

コトアルノ理ヲ不知。ノ頭面ノ病。熱火ノ症ヲ見テハ。其本。虛症タリ。ト
人參ヲ不可受。ト察。ノ孟浪。トノ恐。之無用。誤レルカナ。夫病ノ外。ニ見
者ハ。枝葉。内ノ虛實ハ。根本ナリ。其根本ノ虛タルコトヲ知ハ。何ノ枝
葉ニ拘ラシマ。或其虛ヲ知テ用。レ。正。恐テ。少。施テ。候者アリ。若其
少ノ人參。病ニ不應。則人參不宜。ト云テ。此ヨリ。恐之。遂ニ不近。口。李士
枕。白。少。用。則壅滯。多用。宜通。ト。虛ノ大者。ニ用。之。少。則。反。テ。氣。ヲ。壅
閉。セシム。其。虛。ニ。應。ノ。多。用。則。能。元。氣。ノ。力。ヲ。致。テ。反。テ。順。通。セシムル
ナリ。故。家法。ニ。曰。一。錢。ノ。人。參。ハ。二。錢。ヲ。得。テ。能。降。ト。入。此。人。參。ヲ。用
ノ。要。法。タリ。或。世。ニ。言。虛。ノ。輕。者。ハ。以。沙。參。代。人。參。ト。此。說。素。古。老。人。ニ
驗。レリ。然。正。好。古。曰。人。參。補。五。藏。之。陽。沙。參。補。五。藏。之。陰。安。得。無。異
ト。人。參。沙。參。其。味。ハ。俱。ニ。甘。ト。雖。其。功。ニ。於。ハ
兩。參。各。異。ナリ。何。合。一。互。ニ。用。コトヲ。致。サ。シ。ヤ

修治

人參ハ朝
鮮ヲ上品

トス。今唐人船ニ持來物見トコロハ良ト雖其功ハ朝鮮ニ及也。
人參ハ色黄ニ潤館ノ色ノ如クニ太ク肥重其形雞ノ腿ノ如ク或
人形ノ如ナルヲ極品トス。蘆頭ヲ去リ用蘆頭ハ耗氣今人吐李子
郁説ニ人參忌鐵器然凡舊本草ニ不忌李子始テ言ノ三心モ忌ニ
不及。人參ハ中風見日ハ蛙易シ。蓋人參ノ生スル向陰背陽カ故也。
人參ヲタクワユルニハ細辛ト合ソ瓦罐ニ納紙ニテ能密封シ風氣ヲ不
通マラニスベシ。或其蛙ヲ悉テ樟腦ニ雜置者アリ。樟腦ノ香氣人
參ニ通テ不宜。若藥店物樟腦ノ香氣アラハ能焙テ去其香氣ヲ
クシ去テ用ベシ。生熟言聞曰人參生用氣涼熟用氣温ト愚按ニ
生熟俱ニ温ナリ。熟則温性強シ。大補セント欲セハ熟ノ用ヨ。熟スト
ハ紙ヲ隔テ焙用ヲ云。或酒ニ潤透シ焙用コトアリ。升陽補陽ヲ盛
ニセントヲ欲フナリ。或塩水ニ浸テ焙過シ用レハ肺經有火右脈實

者ニモ亦用易シ。蓋塩ハ能潤下ス。且人參ハ鹵塩ヲ畏カ故也。或
秋石製モ亦良然凡此不得已ノ用時ノ製ナリ。惟右脈實者ニ
ハ人參不所好也。土佐向長澤道壽ハ土佐ニ居レリ。世人稱ノ土
佐道壽ト呼道壽療病ニ藥物ノ上品ヲ擇用故ニ今ニ土佐ノ醫ハ藥
ノ上品ニ非ハ不用。是以藥店ニ上人參ヲ以テ土佐向ト号ス極品也
人參人參大人參ノ細小者ヲ聚扎テ形ヲ大ニ作者ナリ。或ハ其量ヲ
重セントヲ欲ス。然ラ裏テ偽者アリ。皆功力薄シ。碎人參人參ト今
ト不同古ノ碎ト云物ハ大人參ノ末梢ノ折タル物。或太細小ニ太
人參ト稱シ難キ物ヲ以テ。碎人參ト稱セリ。今ハ此ヲ聚束テ扎人
參ニ作ガ故ニ近世ノ碎人參ト稱スル物ハ皆鬚人參ノ中ヨリ揀出
セル者ナリ。功力薄シ。鬚人參人參或小人參凡号。人參ノ根頭ニアル細
毛ノ如者ナリ。功力大人參ヨリ薄ト雖湯參ヨリハ其氣味勝レリ

浮人參或服厄号。本綱ニ謂湯參也。朝鮮ニ人參ヲ完ナカラ煎用テ其跡ヲ晒乾テ本邦ニ渡物ナリ。功力甚微ナリ。薩摩人參小人參厄号。薩摩州ヨリ出タリト。今ハ處々ニ有之。三極五葉紫白色花ヲ生レ子ヲ結根ノ大ハ小葉ノ如ク鬚アリ。味甚苦鬚ハ其苦ノ微人參ニ似タリト雖真ノ人參ニハ非ズ。此草形本草圖經ノ説ニ合スルガ故ニ世人多ハ以テ之真人參トスルハ謬ナリ。或此草根ヲ取テ甘草ノ煎湯ニ煮浸テ人參ニ偽者アリ。不可用。朝鮮國來聘ノ人ニ此草ヲ問ハ百濟ノ人參ト答然厄東醫宝鑑ノ説ニ不合朝鮮人ノ和人ニ所答多ハ謬ヲ以テ不可信也。又一種アリ。葉微蔽ニ似テ根ハ人參ノ如ク鬚アリ。氣味甚薄。真人參ニ非ズ。又一種アリ。苗ノ高三四尺葉七頭ニ似テ小房子ヲ結此即漏蘆ニ真人參ニ非ズ。以上皆世ニ稱ノ薩摩人參ト云。又一種人參ト呼者アリ。加藤清正朝鮮ヲ征セシ時ニ此種ヲ得テ歸ト。氣味胡蘿蔔ニ似タリ。真人參ト不合。白山人參加賀白山ニ生ス根ノ大指ノ如ク氣味當飯ノ如シ此モ亦人參ニ非ズ。此外防葵及白芷ヲ以テ蒸造テ人參ニ偽物多シ。誤用レハ害不少。不可不揀用。唐人參清ヨリ來物也。味耳ノ微苦朝鮮人參ノ功力ニ不及也。惟朝鮮大人參ノ黃色潤肥重實ニシテ藥店ニ謂土佐向極上ノ物ヲ揀用ヘシ人參ハ元氣ヲ無何有ノ郷ニ画ス所ノ要藥タレハ其極品ニ非ンハ用コト勿レト云

參蘆 昔温○吐痰飲△參蘆ハ人參ノ蘆頭ナリ。人參ハ補氣其蘆頭ハ瀉氣瀉氣トハ人ヲノ能吐セシムレハナリ。吳緩曰人弱者以人參蘆代瓜蒂ト。瓜蒂參蘆俱ニ能吐痰ノ劑ニシ瓜蒂ハ吐スルコト強ク參蘆ハ吐スルコト柔ナリ故ニ虛弱ノ人痰飲等ノ胸中ニ鬱積ノ病者吐セシメテ欲去之ハ人參蘆頭一味判テ水煎レ用則能

和語本...

吐痰神效アリ。實ニ人參ハ補元氣其蘆頭ハ吐セシメテ上焦ノ氣
ヲ瀉者ハ物人具太極ノ義自然ノ妙道ニ存メ人意ノ及所ニアラス

黃耆 網本 始原



其微温○補肺氣實皮毛益胃氣
癰疽久敗瘡排膿去肌熱治喘嗽
虛勞自汗腎衰耳聾止瀉遂五藏

惡血癆崩帶△耆ハ長也此草根ノ色黄ニシテ補藥ノ長タルヲ以
黃耆ト名俗ニ黃芪黃耆ニ作者ハ俱ニ非也補肺氣實皮毛黃耆
ハ甘ノ温氣薄味厚陰中ノ陽也手足太陰氣分ニ入手太陰ハ肺足太
陰ハ脾也黃耆ハ脾肺ニ經氣分ノ主藥タリ尤肺氣ヲ補ノ聖劑トス
益肺ハ諸氣ヲ總テ皮毛ヲ主黃耆ハ能皮毛腠理ヲ閉密之裏ニ肺氣
ヲ滿シムルノ劑ナリ夫人參ハ元氣ヲ補ヒ黃耆ハ肺氣ヲ補フ肺氣ト
ハ周身ニ所充ノ氣也刺節真邪論曰真氣者所受於天與穀氣并而

充身也ト先天ヨリ此身中ニ受滿ル所ノ氣ハ後天水穀ニ所生ノ氣ト
并合ソナラ身内ニ充滿ス此ヲ真氣ト号真氣ハ皮毛ヲ以テ收閉テ
不泄カ故ニ身内ニ滿テ生々ノ化ヲ致ス此即肺氣ナリ是以表疎ナ
レハ肺氣虚ス表固ケレバ肺氣盛ナリ黃耆ハ能表ヲ收固スルガ故ニ
肺氣ヲ補ニ長セリトス或問東垣曰衛氣者所以温分肉ニ而充皮
膚肥腠理而司開闔黃耆既補ニ焦實衛氣ト然則黃耆ハ三焦衛
氣ヲ補ノ主藥タリ吾子何ノ真氣ヲ補ト云マ曰三焦ハ名アリテ
形ナシ上中下周身薰蒸ノ陽氣ヲ指テニ焦トス黃耆ハ表ヲ收
テ氣ヲシテ周躰ニ充シムル者ナリ氣ハ陽タリ氣充則ト中下ニ
焦ノ陽氣ヲ補ニ足リ衛氣ハ脈外ヲ行テ外ヲ衛者ナリ故ニ衛氣
ト云黃耆能表ヲ收テ氣ヲシテ外ニ泄ケレメサルトキハ衛氣ノ衛ヲ
實スルニ足リ然則補ニ焦實衛氣ト云者ハ皆余右ニ所辨ノ皮

毛ヲ密テ周身ノ真氣ヲ補ヨリ致者ナリ。且黃耆ハ肺氣ヲ補
肺ハ金トシ腎水ノ母タリ。氣ハ陽トス火ノ屬タリ。黃耆能肺金
ノ陽氣ヲ補ヲ以テ。元素謂黃耆ハ足少陰命門ニ入トス。又手少陽
三焦ニ入トス。此皆肺氣ヲ補テ水源ノ氣ヲ養。皮毛ヲ實。陽氣ヲ
充シムルヲ以テ云ナリ。直ニ命門三焦ノ相火ヲ補者。覺ヘカラス。甄
權謂其補腎者。氣為水母也。嘉謨曰。人參補中。黃耆實表。凡氣虛
者ハ多ハ人參。黃耆合用ノ效ヲ致ス。夫人參ハ元氣ヲ補。黃耆ハ身
ニ充ノ諸氣ヲ補。諸氣衰則元氣モ亦從テ衰。元氣衰則諸氣モ亦
從テ衰。故ニ氣虛者ハ參耆ヲ合用ノ效アル者ナリ。此ヲ治水ニ譬
言ニ。昔耆言ハ堤坊ヲ堅。流水ヲ不泄ニ比。人參ハ泉源ヲ長。水勢
ノ盛ナルニ類ス。堤坊ハ皮毛腠理ナリ。泉源ハ元氣ナリ。流水ハ諸
氣ナリ。泉源雖木減。堤坊弱。流ヲ防止サルガ故ニ。水外ニ泄去テ

流減者。彼元氣雖未衰。表疎ニシテ諸氣外ニ耗散。元氣虛ヲ致ス。ト
同シ。黃耆ヲ用テ表ヲ實シ。其堤坊ヲ固スルニ非ハ。氣ヲ充シ
ムルコト不能。若泉源モ已ニ減シ。堤防モ亦弱。流皆減者。ハ彼元
氣モ表衰。氣モ衰。テ氣虛ヲ致シ。同人參ヲ用テ元氣ヲ補ヒ。黃耆ヲ
用テ表氣ヲ實メ。泉源モ深シ。堤防モ固スルニ非ハ。其虛ヲ補足。不
能ナリ。此參耆合用ノ奧旨也。○東垣曰。黃耆得防風。其功愈大。ト。
黃耆ハ收表氣分ノ聖藥タリ。ト雖。其味厚。性純。故ニ輕肌表。上
浮ニ遲。是以防風ノ表藥ト合用。則此ニ引テ速ニ肌膚ニ發メ。表氣
ヲ實スルノ功盛ナリ。譬ハ兵アリテ戰。ニ良ト雖。足遲ノ敵陣ニ進。ト
鈍カ如シ。此ニ良馬ヲ與。則馬ニ乘メ。敵陣ニ進テ。勝利アルト同。黃耆ハ
兵ナリ。防風ハ良馬タリ。黃耆乘防風。肌膚ニ進テ。表氣ヲ收。ノ功ヲ
致ス。他ニ表藥多ト雖。黃耆ヲ引ニ。防風ヲ宜トス。何如トナレハ。他

本草綱目卷之十一 補劑 三十七

ノ表藥ハ皆開發ノ勢アリテ。黃耆ノ表ヲ閉塞スルニ害アル者ナリ。防風ハ達表ノ劑ト雖。妄ニ開發セサル者ナリ。故ニ惟黃耆ヲ引テ表ニ達セシムル耳。其密表ノ功ヲ害セス。譬彼兵所乘馬強剛ナレハ妄ニ走跳テ反テ其兵ヲ損トアリ。惟良馬ノ從容トノ能乗テ快之敵陣ニ進レムルニ非ハ勝利ヲ得コト不能ニ同シ。防風ハ黃耆カ爲ニハ良馬ナリ。他ノ表藥ハ彼強剛走跳ノ馬ナリ。實ニ古人ノ藥性ニ達シ其引藥ヲ合用者神ナルコト如此。千金内托散ニ黃耆防風ヲ合用者皆此義アルヲ以ナリ。

益胃氣 胃ハ土府。其色ハ黃其味甘。惡寒欲温。故ニ黃耆ノ黃色甘温ハ俱ニ中焦土氣ノ所欲ナリ。是以益胃氣ノ功アリ。然凡ハ參ノ益胃氣ニ不及。黃耆ハ專肺氣ヲ補ノ主藥ニシテ。益胃氣者ハ此カ餘功ナリ。癰疽久敗瘡排膿。癰疽ハ一朝一夕ノ病ニ非ス。日月ヲ積テ氣血凝滯シ。肌肉腐爛ノ生ス。

多ハ中年ノ後ニ此患アリテ。虛ヲ不兼ト云コトナシ。故ニ黃耆ヲ用テ表ヲ收テ。内氣ヲ滿シメ。裏ヨリ氣ヲ張レムレハ。膿ヲ排出シテ。潰易シ。已ニ潰ノ後モ亦此ヲ用レハ。生肉ヲ舉。李士材云。托已潰之瘡。收口生肌トハ是也。多ハ人參ト合用ス。靈樞癰疽篇曰。熱勝則腐肉肉腐則爲膿。膿不瀉則爛筋。筋爛則傷骨。骨傷則髓消。不當骨空。不得泄瀉。血枯亦虛。則筋骨肌肉不相榮。經脈敗漏。薰於五藏。藏傷故死矣。癰疽早久不潰。膿ヲ不排出トキハ。筋骨ヲ腐ラレ。藏府ヲ損スルコト如此。故ニ黃耆人參ヲ合用シ。元氣ヲ盛ニシ。諸氣ヲ滿シ。裏ヨリ其氣ヲ張。則腐ノ人コト深カラズ。能膿ヲ外ニ排バ。マク潰テ愈易シ。此ヲ内托ト号ス。蓋内ヨリ托テ出セハナリ。久敗瘡トハ。久敗爛テ瘡口ノ不收ヲ云。此氣虛ノ不滿。故ニ肉腐テ不生肌者ナリ。黃耆ヲ用テ氣ヲ充張シ。ムレハ。瘡口生肉ヲ舉テ愈ナリ。元素謂瘡家聖藥トハ。如此ヲ

以ナリ。或痘疹症。肺胃ノ氣虚ノ痘出ガタク。或出後凹ニ陷或膿泡ヲ致カタク。或痘色灰ノ如ク。或痂ヲ結カタク。或痂落テ後渴ノ不食シ。或痂落テ後癰腫ヲ生スル等ノ症。陽氣ノ虚ニ屬者ハ人參黃耆ヲ合用ノ氣ヲ充張シムレバ自愈然。疔痘ノ初出難者ニ兩辨アリテ黃耆ノ宜不宜ヲ存ス。表氣弱ノ痘ヲ出起ノ氣力怯クテ難出者ハ用之。其氣ヲ充張シムレバ自出起ス。若外邪ヲ兼テ出カタキ者アリ。或陽明ノ熱邪肌表ニ迫テ難出者アリ。皆黃耆ニ不宜升麻葛根湯ノ類ニ輕微ニ發散スルヲ宜トス。然。疔葛根湯ハ痘已ニ出テ後ハ宜ニ用カタキ劑トス。詳ニ葛根ノ條ニ見タリ。痘疹陽氣ノ虚症ニ屬者ヲ治スルニ保元湯アリ。灸黃耆三錢。人參二錢。炙甘草一錢。生薑一片。水煎メ用ユ。此東垣治慢驚風黃耆湯ノ中。白芍藥ヲ去者ナリ。凡痘疹陽氣虚ノ難出。出後痘頂陷漿行。時痘灰色。或濕

テ痂ヲ結ガタク。或痂後胃氣弱ノ咽渴不食スル等ノ虚症。保元湯ヲ用ニ宜。或臨症川芎ヲ加。或肉桂或糯米ヲ加用。詳ニ玉機ニ見タリ。去肌熱。此肺氣不足ノ虚熱肌膚ニ在者ヲ去也。元素謂瀉陰火去虚熱トスル者モ亦肺氣ノ不足ニ所生ノ熱火ヲ云。大抵人參黃耆俱ニ陰火ヲ瀉シ。氣分ノ虚熱ヲ去者ナリ。故ニ此兩藥多ハ合用ス。若陰火虚熱ヲ治ルニ參耆合用。則何ヲカ君王トセン。蓋元氣ノ虚ヲ主トシ。肺氣ノ不足ヲ兼者ハ人參ヲ君トシ。黃耆ヲ臣トス。若肺氣ノ不足ヲ主トシ。元氣ノ不足ヲ兼者ハ黃耆ヲ君トシ。人參ヲ臣トス。ヘシ喘嗽。喘息欬嗽ハ俱ニ肺ノ病ナリ。然。疔虚實ノ兩辨アリ。テ黃耆ノ宜不宜アリ。或一切外邪ヨリ所致ノ喘嗽。或氣ノ鬱實。實痰ニ屬メ。肺氣未疲者ハ絶メ。黃耆ヲ不可用。只肺氣ノ虚ヲ主トシ。所致ノ喘嗽ハ黃耆ノ專主。治スル所ナリ。惟黃耆ハ表ヲ閉テ氣

ヲノ満シムルカ故ニ動スレハ肺氣ヲ閉テ喘嗽ニ害アルコトナリ。此其虚ニ似テ實タル者ヲ慎テ黃耆ヲ用カ故ナリ。因之世人多クハ黃耆喘嗽ニ不宜ト云テ忌之者ハ非ナリ。真ノ肺虚ヨリ所致ノ喘嗽ハ何ノ恐アリテカ黃耆ヲ忌ンヤ。皆此至愚ノ説ナリ。虚勞虚勞肺氣ノ勞傷ヲ至トスル者ハ宜用之。虚勞元氣ノ不足ヲ本トスル者ハ參耆合用ノ宜トス其法右ノ人參ノ條ト參考スベシ。大藥虚勞者色白。自汗レ右寸脈虚弱者ハ熱スト雖參耆ヲ兼用ルニ宜。自汗肺ハ其氣ヲ皮毛ニ合ス。故肺氣虚トキハ腠理疎ニシ汗自泄。專黃耆ノ主治スル所ナリ。黃耆ハ皮膚ヲ厚メ不泄ヲ以テ此カ主能ノ根本トス。故ニ表虚ノ自汗盜汗ヲ出。或表疎ニシ風ニ感シ易者ハ必用之效アリ。丹溪曰黃耆補元氣肥白而多汗者爲宜ト。肥者ハ其氣怯シ色白者ハ肺氣ノ虚トス故ニ

肥白者ハ多クハ汗出コト多クトヲ致ス。黃耆ヲ用テ收表固衛スルニ宜トス。然凡外邪ニ因テ表氣不順ニシ汗自出者アリ。黃耆ヲ不宜用ナラ此ヲ發散ノ邪去則汗自愈ナリ。元素曰無汗則發之。黃耆ハ一切ノ汗症ヲ止ノ義。右ニ辨スル所ナリ。然ニ元素ハ反テ出汗ト云者ハ何ゾヤ。夫黃耆ハ收表不泄者ナリ。其出汗ト云者モ亦收表不泄ヨリノ所致ナリ。丹溪黃耆葛根ヲ合用メ汗ヲ發シ熱ヲ去。此外邪アルノ發表ニ非ス。紫蘇麻黃ノ意ト大ニ異也。其症氣虚ノ肌表ニ熱ヲ生シ。其熱ノ本胃ニ連迫テ然者ナリ。此時冷藥ヲ用テ清熱セント欲スレバ。其氣虚ヲ擊コト有コトヲ恐。又汗藥ヲ用テ汗メ肌熱ヲ去シテ欲スレバ。表氣ヲ重テ散セシムコトヲ恐。故ニ葛根ヲ用テ連胃熱ヲ清則熱ナラ肌表ニ浮。此ニ黃耆ヲ用テ表氣ヲ收テ不泄則陽氣内ニ滿テ熱其表ヲ蒸蒸則汗出。汗出則

從之肌熱自去コトヲ致者ナリ。深此意ヲ考テ黃耆發汗ノ義ヲ味
ヘシ。黃耆自直ニ汗ヲ出ニハ非ス。黃耆ノ收表不泄ヨリノ反テ汗ヲ出
者ナリ。此カ直ニ發表出汗ノ功アリト覺則大ニ害ヲ取コトアル
ベシ。故外感ノ症ニ氣虛ヲ兼テ自汗者アリ。此時表發ノ劑中ニ於
テ少人參ハ加用スルコト有ト雖。黃耆ハ絶テ不用ナリ。此其收表
故ニ外邪ヲ補住ヲ恐テナリ。或外感症發汗ノ外邪已ニ去ト雖其
跡表虛トナリテ自汗不止者アリ。此時ハ黃耆ヲ用テ表氣ヲ收
固ノ宜トス。又盜汗ノ症ニ於テモ陰陽ノ兩辨アリ。陰虛ノ盜汗
アリ陽虛ノ盜汗アリ。然凡黃耆ハ何ノ汗症ニモ皆通用スルノ劑
タリ。黃耆ノ治功千變萬種ト雖。惟收表不泄ノ根ヨリ致者也。
故一切ノ汗症ニ通用ノ外邪アル者ニハ忌之。腎衰耳聾黃耆ハ
直ニ腎陰ヲ補ノ劑ニ非ス。然ニ腎水衰テ耳聾者ヲ治ストハ何
ゾヤ。蓋耳ハ腎水ノ竅タリ。諸ノ聲音ハ肺金ノ所主ナリ。凡人ノ聞
聲者ハ聲音耳ニ通ノ腎精ニ達ス。其精ノ音氣肺ニ響テ心聞之
者ナリ。四十難曰。腎者北方水也。水生申。申者西方金。金者肺也。肺
主聲。故今耳聞聲上。腎ハ水トシ肺金ノ子タリ。故ニ腎水衰則母
金ノ不足ヲ知ヘシ。且氣水ハ合一ニシテ氣化則水生シ。氣虛則水不
足ス。是以黃耆ノ腎衰耳聾ヲ治スル者ハ黃耆能肺氣ノ虛ヲ
補コトヲ得タリ。肺氣盛則金ヨリ水ヲ生シ。氣ヨリノ水ヲ化シ腎
衰補養ノ助トナル。五行ノ中金ノ三獨聲ヲ發ス。黃耆ヲ用ヒテ金
肺ノ氣ヲ補則金剛ノ後耳門ヨリ腎ニ通スル精音ノ動ヨク肺
金ニ響フタリテ聽コトヲ致者ナリ。甄權曰。其補腎者氣ハ水母
也。若誤テ黃耆ハ直ニ補腎表者トシ補陰ノ劑ニ比スルコトアラ
ハ其害不尠。丹溪曰。面黑形實而瘦者服之令人胸滿下黑ハ腎氣

和語本直

足色瘦タル者ハ氣盛ニ液少シ。肥タル者ハ氣少ク液盛ナリ。故ニ肥白者ハ黃耆ニ宜ク。瘦黒ノ者ハ黃耆ニ不宜トス。然則黃耆ハ直ニ補津液ノ劑ナラサルコト明ナリ。是以耳聾症以黃耆ヲ治者ハ金肺ノ氣虚ヲ本トシ此ニ腎衰ヲ兼テ致者ニ宜。或腎氣上ニ結滯ノ耳聾者ハ黃耆ニ不宜。閉氣ガ故ナリ。木通等ノ疎氣ノ劑ニ宜トス。[止渴] 渴症ニ種々アリ。肺燥ニ因者アリ。麥門冬ノ類ニ宜シ。肺熱ニ因者アリ。黃芩、天門冬ノ類ヲ用ユ。胃熱ニ因者アリ。葛根ノ類ニ宜シ。腎熱ニ因者アリ。知母、黃柏ノ類ヲ用ユ。痰燥ニ因者アリ。枯蘘貝母ノ類ニ宜シ。外邪鬱熱ニ因者アリ。發散ノ宜トス。黃耆ヲ以テ所治ノ渴ハ肺氣虚シ上焦逼迫ノ致者ニ宜シ。其症多ハ自汗シ右脈弱渴ノ温ヲ喜。冷飲ヲ惡。或渴スレモ反テ多飲サルハ此皆肺氣ノ虚ヨリノ致者ナリ。夫氣水ハ合一氣虚則津液至コト不能ノ渴ヲ

致ス。人參、黃耆ハ俱ニ氣藥ナリト雖。止渴ノ功アル者ハ此義ニ因ナリ。右ノ人參止渴ノ條ニ詳ナリ。[逐五藏惡血] 此モ亦氣水合一ノ義ナリ。血ハ得氣行。氣血ノ能脈中ヲ流者ハ宗氣衛氣ニ從テ行者ナリ。若其氣不順則血モ亦滯テ溢血ノ滯溢者ハ惡血トス。即瘀血ナリ。故ニ黃耆能逐五藏惡血者ハ其本衛氣ノ不足ニ因ナリ。肺氣虚ノ衛疲氣道虚ノ不行ガ故ニ血行滯滯テ五藏ノ間ニ惡血ヲ致ス。黃耆ヲ用テ其氣ヲ補則氣行。氣行則血能行テ滯滯ナシ。此ヲ逐五藏惡血ト云。元素曰止痛法。血生血モ皆黃耆能。肺氣ノ不足ヲ補テ以ナリ。氣不足スレバ不行。氣不行。血不行。不生ノ死血トナルヲ以也。黃耆所止ノ痛ハ此氣虚ノ不行。故ニ血氣凝滯ノ痛者ヲ治スルナリ。若氣實血滯ノ瘀血及血氣實滯ノ痛ニ用之。ハ黃耆ノ氣ヲ開ニ從テ補氣。血滯テ瘀血ナラテ不行。痛ナラテ不止ノ大害ヲ致ス。黃耆則與

紅花俱ニ瘀血ヲ逐テ活血ノ功アリト雖用之症雲泥異ナリ。紅花ハ直ニ瘀血ヲ敗テ血道ヲ行シム。黃耆ハ血藥ニ非ス。直ニ瘀血ヲ碎クコト不能。惟氣虛ノ不行。力故ニ血モ亦不行ノ滯者ハ用之。氣ヲ補則氣分ニカヲ得テ氣能行ニ從テ血行テ惡血ヲ逐者ナリ。此等黃耆補氣ノ餘ヨリ致者ナリ。且黃耆ニ直ニ氣ヲ行ト覺ベカラス。或ハ氣鬱ノ瘀血ヲ致者ハ木昆侖子ノ類。直ニ類氣ノ劑ニ宜此ニ黃耆ヲ用レバ加其氣ノ鬱閉ヲタスク。惟黃耆ハ表氣ヲ閉者ナリ。故ニ氣虛ノ不行ハ用之。閉其氣則氣滿滿則行トス。行ハ黃耆ノ直ニ致所ニハ非ス。黃耆ニ氣ヲ閉滿セシムルカ故タルコトヲ知則敢テ誤ヲ致コトナレ。療崩帶 婦人經水不時ニ崩下者。及赤白帶下ヲムスルモ亦氣虛ニ因テ其血ヲ經絡ニ行シムルコト不能ノ血崩ニ氣虛ノ陽氣ノ頓升ナキカ故ニ帶下スル者ヲ治ス。日華曰。其止崩帶者。氣

則無下陷之憂也。黃耆直ニ止血ニ非ス。氣虛ノ血ヲ御ラザルカ故ニ血崩スル者ヲ治スル也。其或下焦ノ熱火ニ因。或濕熱ノ滯ルニ因。或氣滯氣動等ニ因テ血崩帶下スル者多シ。黃耆ノ宜所ニ非ス。用之反テ害アル者ナリ。好古治咯血ト云モ。黃耆ハ非補陰非止血。氣虛ノ不納カ故ノ咯血ヲ治ス。補腎藏元氣ト云モ。腎藥ニ非ト雖腎水ノ母タル金肺ノ氣ヲ補ニ因ナリ。鑿泉ノ源冷レハ流ノ末モ冷ナリ。氣温ナスハ流ノ末モ温ナルヘシ。腎水生化ノ源タル金肺ニ氣ヲ滿者ハ黃耆ニ勝レルハナレ。肺金滿則豈腎藏モ亦從テ自元氣ニ富サルヘナシヤ。好古カ説深意存セリ。腎藏ノ水ヲ補ト云スト補腎藏元氣ト云。元氣ノ二字ニ深眼ノ余。辨ノ意ヲ察スベシ。然凡挂附ノ腎元ヲ補トハ甚異也。彼ハ直ニ腎元ヲ温補ス。此ハ肺氣ヲ補ノ餘力也。

總藥

李士材曰。原其功能。惟主益氣。東垣曰。用黃耆温分肉。益皮毛。實腰

理不令汗出。好古曰。是皮表之藥也。黃耆實表。黃耆八作
收表不泄者。不泄則氣滿。故補氣。良劑。ハスル也。元氣
ハ胃ニ生ノ裏ニ根ナス。諸氣ハ肺ニ滿テ外ノ衛トナル。元氣虛者ハ
人參ヲ主トス。肺氣虛ノ表氣疎者ハ黃耆ヲ主トス。東垣曰。脾胃
一虛。肺氣先絶ト。苟胃氣未虛。ノ肺氣獨虛スルノ義ナシ。故ニ參耆
ノ兩藥多ハ合用ノ互ニ君臣ノ劑トナレリ。嘉謨曰。内傷脾胃發
熱惡寒吐泄。息臥脹滿。痞塞神短。脉微者。當以人參爲君。黃耆爲臣。
ト。此元氣ヲ本トスルカ故ナリ。又白朮表虛自汗亡陽。潰癰痘疹。陰
瘡者。當以黃耆爲君。人參爲臣。ト。此肺氣ヲ本トスルカ故ナリ。其虛
ノ本ヲ辨ノ君臣ノ別ヲ致ト。雖經藥ノ云。則參耆合用ノ互ニ補
氣ノカラテ并テ元氣ヲ補ヒ。肺ヲ温養スル者ナリ。東垣謂。黃耆與
人參。耳草ニ味爲除燥熱肌熱之聖藥ト。人參補元氣。黃耆補肺氣。

炙甘草持中。氣テ此ニ味。用則互ニ補藥ノカラテ
取テ。周旋ノ氣ヲ補ノ功アルコト。神妙ナル者ナリ。
使藥 茯苓

黃耆ノ使藥トス。陳皮白朮ト同用。テ虛人ノ大腸閉ヲ通シ。脾肺ヲ
補ノ功ヲ善ス。人參ト合ノ能補元氣。耳草ト合ノ脾胃ヲ補助シ。防
風ヲ得テ能毒。黃耆ハ收表不泄者ナリ。故ニ外邪アル者勿
表ニ達ス。用面黑形氣實瘦ノ者及右寸脉實者勿用。黃耆
ハ收氣。肺ニ滿シムル者ナリ。故ニ肺氣鬱結ノ胸滿者勿用。凡肥々
ル者ハ肺氣ノ不足トス。黃耆用易。瘦々ル者ハ其氣滿易。故ニ瘦人ハ
多ハ黃耆ヲ得レハ胸腹痞
滿ヲ致易シ。詳ニシテ用之。
畏惡 忌龜甲 白鮮皮
附方 兒慢驚風
脾胃不足ノ陰火。肺金ヲ損。木邪乘ノ致者ヲ治ス。炙黃耆二錢。人
參一錢。炙甘草五分。白芍藥五分。水一大盞。煎。半盞温服。瀉陰火補。

肺氣益胃土神治ノ切アリ東垣製保元湯 痲瘡陽氣ノ居ヨリ所
 致ノ変症ヲ治ス前ノ辨膿條ニ詳也 氣虛ノ白濁ヲ治ス 黃耆湯
 炒半兩茯苓一兩為末每服一錢白湯用出經驗良方 肺癰吐血 黃
 耆二兩為末每服二錢水一中盞煎六分温服出聖惠方 孕婦胎動
 不安者 腹痛ノ陰戸ニ黃汁ヲ流者黃耆川芎各一兩糯米一合水
 一升煎五合服出婦人良方 氣虛ノ小便不通 黃耆二錢水二盞煎
 一盞温服
 出惣論 愚案 黃耆ハ陰中ノ陽ト也或純陽トスルノ兩説アリ
 此其連表ヲ欲メナリ然則黃耆其温ニ陽タリト雖其功能收
 氣不泄者ナリ其收テ不泄ヤ陰 屬ス實ニ陰中ノ陽タルノ義明シ
 純陽タラハ何ゾ防風ヲ待テ連表ヲ大ニスルニ至ンヤ又李士材此ヲ
 酒製ニスルモ亦連表ヲ盛ニセシコトヲ欲メナリ皆其陰中ノ陽屬メ

其在ノ遲鈍ナルヲ制セシガ爲ナリ或蜜水炒ニスル者ハ其温ヲ減
 ノ補氣ノ切ヲ大ニセシガ爲ノミ然ニ庸醫兵ニ蜜ヲ濃ノ製スル者ハ
 誤ナリ蜜濃則チナラ其性ノ 修治 太ノ柔ニ不岐ノ肉ハ黄色
 泥滯ヲ益テ行難コトヲ致ス 此本草ニ謂綿黃耆ナリ蘆頭ヲ去剉用ユ中焦補氣ノ劑ニ合用セ
 ハ水ニ少蜜ヲ滴テ蜜水トシ黃耆ヲ三寸許ニ切テ二三割右ノ蜜水ヲ塗
 焼ト五六度ノ剉用ユ焦コト勿レ或剉テ後蜜ニマシ濕ノ焙乾
 用ユ或酒ニ浸テ炙用則能上焦ニ行表ニ達メ其性遲滯セス李士
 材曰古人劑黃耆多用蜜炙愚易以酒炙既助其連表又行其泥滯
 也ト或腎ニ行コトヲ欲レ或婦人血崩帶下淋疾便濁等ノ下焦主
 治ノ藥中ニ用ハ塩水ニ浸炒用ユ 愚案ニ黃耆能收表補衛氣止
 自汗 乾瘡聖藥タリト雖其性鈍メ連表頃行レ難者ナリ故ニ防風

ニ合シ達表内花ノ功ヲ健ニス或蜜炙ノ其甘温ヲ助テ補氣ノ力ヲ盛ニセシテ欲シ雖蜜性モ亦其重シク順行シ難シ故ニ蜜炙ノ黄耆ハ動スレバ臍痛不食ヲ致易シ是以李士材製黄耆湯後交用ニ當ニ深意アルカナ酒ハ陽性喜達表能行黄耆得之能達表得之能順行ノ泥滯スルコトナシ**富士黄耆** 近代富士山ヨリ出入甲斐州ノ諸止ニ皆アリ富士黄耆ノ中ニ種アリテ善惡存セリ其形肥潤味其物ハ眞ノ黄耆ナリ一種其形新ニ採ヌル年ハ能眞ノ黄耆ニ似ト雖岐多ノ年ニ經則堅脆輕虚ニテリテ如木其味アルコトナシ此黄耆ニ非ス本綱ニ謂首宿根俗呼土黄耆物ナリ眞黄耆ハ令人肥其甘柔ヲ以ナリ土黄耆ハ令人瘦其苦堅ナルヲ以テリ然則和黃耆ニハ眞偽アリテ難擇採藥ニ不詳者ハ妄ニ用コトカレ

廣益本草大成卷之一終

廣益本草大成卷之二

浴下

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

甘 綱本
草 始原



甘平補脾胃緩止氣治寒熱邪氣長肌肉止渴潤肺六腑痛解百毒療小兒胎毒驚癇除火熱通經脈通九

竅養陰血治瘡腫腰脹煩滿止痛益精壯筋骨補益傷△原始曰根因味甘甜遂名甘草ト此草ノ味專甘レ故ニ甘草ト稱ス補脾胃甘草性平色黄ニシ味甘レ夫脾胃ハ中宮ニ位ソ土トス土性ハ平正ニシ偏奇ヲ惡ム且土ハ甘ヲ欲ノ苦味ヲ惡其色黄ナリ故ニ甘草ノ其本黄色ハ土德ニ合ソ能脾胃ヲ補者也本草云甘草甘平之品合土之德故獨入脾胃又云採穡作其土之正味故甘草爲中宮補劑ト是以内傷不足ヲ補益スルノ劑中甘草ヲ兼用スト云コトナシ或

問。寇宗奭曰。生則微涼。味不佳。炙則溫。本草匯曰。生寒。炙溫。東垣曰。生用則氣平。補脾胃不足。而大瀉心火。炙之則氣溫。補三焦元氣。而散表寒。除邪熱。此諸說。二從則生甘草性涼寒。炙甘草性溫。タルカ。如シ。然マ否マ。曰。此說アリト雖實。不然。夫苦ハ泄辛ハ散。酸ハ收。鹹ハ軟。甘ハ緩。此五味ノ性ナリ。火熱ヤ陽ニシテ其氣急烈。甘草ノ性ヲ以テ火氣ノ急烈ヲ緩。則熱火自解。瀉ス。此大連知栢ノ火熱ヲ瀉スルト異ナリ。彼ハ苦寒ノ以テ直ニ火熱ヲ清瀉ス。甘草ハ惟甘味ヲ以テ火急ヲ緩瀉ス。宗奭等其熱火ヲ瀉スルノ功ヲ視テ。或涼或寒ト云ト雖。生甘草ノ本性涼寒ノ者。ニ非ス。平ナルカニ。若其涼寒トス。何ノ東垣生用則氣平。補脾胃不足ト云シヤ。涼寒ノ者ハ脾胃ノ所惡。ニシテ補益ヲ致コトナシ。炙甘草ハ微温ニシテ能中焦ノ元氣ヲ補益シ。元氣不足ノ虛熱ヲ除ニ勝タリ。本草匯曰。性緩。諸火。理。虛熱。東垣曰。其

温能除太熱。ト是ナリ。元氣不足ノ太熱ハ參耆甘草合用ノ其功尤盛ナリ。宗奭等謂炙則温タリト雖。全温ニ非ス。微温ナルカニ。惟實熱實火ノ急烈ヲ除ニ於ハ生甘草ヲ用ユ。虛熱虛火ノ急烈ヲ除ニ於ハ炙甘草ヲ用ベシ。九方劑ノ中ニ惟甘草ト稱スル者ハ皆炙甘草也。生甘草ヲ用則必生字ヲ加置。生炙ノ字ヲ不加者ハ皆炙甘草ト知ベシ。蓋脾胃ハ中州ノ土トス。土ハ緩ヲ欲シ。其ヲコノム。甘草素ヨリ甘ト雖。炙者ハ甘味尤佳。宗奭謂生則味不佳ト。故ニ炙甘草ノ甘味ノ厚佳ヲ以テ能中焦ノ緩土ヲ補。炙テ微温ナルカ以テ胃氣ヲ助ニ宜シ。彼火熱ノ實ニ屬者ハ生甘草ニ宜トスル所以ハ。炙テ微温ナルトギハ其温ヲ以テ瀉火ニ害アレコトヲ恐テナリ。緩正氣。甘草ノ味甘ハ緩故正氣ヲ緩和スルノ功アリ。九物急則不瀉。緩則充滿ス。甘草ハ正氣ヲ緩ヲ以テ參耆ト合テ能氣ヲ補。地

黃芩歸下合之能精血ヲ補 治寒熱邪氣寒ハ陰邪タリ陰ハ
收斂急迫ノ氣ナリ熱ハ陽邪タリ陽ノ常性ハ緩散ナリト雖已
ニ熱火ノ盛ナルニ至テハ反テ急烈ナル者ナリ然則寒熱ノ兩邪
俱ニ急者ナリ故ニ甘草ノ甘緩ヲ以テ寒熱二邪ノ急ヲ緩解テ
治ス此ヲ誤テ寒熱ノ邪ヲ發散スト覺ヘカラス惟邪氣ノ急ヲ緩
ノニ東垣謂散表寒トハ外寒邪在表者ヲ發散スルニハ非ス彼三焦
ノ元氣不足ノ表寒者灸甘草ノ甘温ヲ以テ三焦ノ元氣ヲ補ガ故
ニ表陽不足ノ陰邪ノ急者ハ此ガ緩解スル所ヲ以テ散表寒ト云直
ニ發散スルニ非ス然レテ發散ノ劑中ニ多ク用之コトアリ蓋東垣曰
甘草性能緩急而又協和諸藥使之不爭ト甘草ノ性能急ヲ緩テ
和スル方故ニ金石草木寒熱上下ノ諸藥ヲ合劑メテ方ヲ製表スルニ
於ハ甘草ヲ合用ノ方中ノ藥氣ヲ和調セシム是以甘草ノ下名ヲ

國老ト呼老長者ハ若輩ノ喧嘩口論ノ間ヲモ此ガ能ナクメアツカ
ウテ和合セシムルノ義ヲ以ナリ既權曰謙和衆藥有功故有國老
之號ト故ニ發表ノ劑中ニ用之者アテガキニ此ガ發散ノ功ナレト
雖其劑中安藥和調ノ爲ニ用ユ且中官不緩則發表ノ劑ト雖其功ヲ
致コト不能故ニ甘草ヲ以テ中焦ヲ緩クソログルニキハ膏養開易
ノ發表ノ藥力ヲ盛ニス麻黃湯ニ甘草アル者是ナリ夫甘草ハ能緩
急熱藥ニ得之其熱性ヲ緩ス寒藥ニ用之其寒性ヲ緩ス仲景附
子理中湯ニ甘草ヲ用者ハ其速ニ上過コトヲ恐テナリ此皆用之其藥性ノ
湯ニ甘草アルハ其速ニ下過コトヲ恐テナリ此皆用之其藥性ノ
急速ヲ緩ス麻黃湯ニ甘草アル者モ亦杏仁ト合メ裏ヲ緩クソログ
テ發表ヲ助ケ兼テ麻黃桂枝ノ發表速ニ過則汗多ク亡陽アラン
コトヲ恐テナリ然レ傷寒ノ病急症ニ其治モ亦急ニス彼麻黃

少カ故ニ瘦者アリ。如此ニ甘草ヲ用コト過多則其味ナラ中焦ノ積滯ヲ塞テ反テ害アリ。惟其積ヲ消シ中焦ヲ開テ胃氣食氣ヲノ傾行セシムル時ハ中氣能肌肉ニ薰滿ノ肥盛ヲ致ス。若中焦不足シ中氣急道シ胃氣其肌肉ヲ緩滿スルコト不能ノ羸瘦スル者ハ甘草ノ主治スル所ナリ。止渴甘草ハ滋陰ノ劑ニ非トイヘ凡能生津止渴功アリ。蓋味ノ甘ヲ以テナリ。試之砂糖餠飴ノ類一切其味ノ物ヲ嚼食則口中必津唾ヲ生ス。然則甘草ノ其味ナル津ヲ生スルコト明ナリ。然凡甘草直ニ津液ヲ生スルニハ非ズ。此能津ヲ持ノ劑タリ。凡其ハ緩トイヘ凡緩中ニ亦持ノ義アリ。人一切ノ其物ヲ食則腸ニ泥腹ニ滿者ハ此其味ハ緩中ニ持ノ義アリ也。故甘草能氣ヲ持氣水合ニ相並行者ナリ。是以甘草ヲ用テ氣ヲ持則氣ニ從テ津液モ亦會持テ止渴後中焦補益ノ劑中ニ甘草ヲ用

者モ亦其持津ノ功ヲ兼取何如トナレハ脾胃ハ土トス土乾則不能生物惟緩ニ少濡アリ且泥濕ナキ處ノ土ハ能物ヲ生化ノ盛ナリ。故ニ人身脾胃土ノ氣ヲ養者モ甘草ノ其緩ニ津ヲ持テ不乾ニ宜トス。多ハ白朮陳皮人參甘草ヲ合並テ中焦ヲ補益ス。乃四君子湯ノ品ナリ。白朮マ中氣ヲ持テ中焦所惡ノ濕泥ヲ去。陳皮マ中焦ヲ順和ノ緩土ノ氣ヲ得セシム。譬錒鐵ヲ以テ土ヲ疎テ稼力如レ人參ヤ日光ヲ移テ土温ニ物ヲ生スルカ如シ。然凡白朮乾濕陳皮疎之。人參温養之則土乾潤ノ不能生物。故ニ甘草ノ其ヲ以テ持津不乾且其其緩陳皮ノ順和ヲ助。亦其其味ノ持氣マ。白朮人參ノ中氣ヲ持テ助テ能脾胃不足ノ補益トナルコトヲ致ス。潤肺甘草ハ中焦ヲ補益ノ且持氣持津ノ劑タリ。肺金ハ脾胃土ノ子ニ氣ヲ主。津液ハ氣ニ從テ至故ニ甘草ヲ以テ肺金ノ母タル脾胃土ヲ補テ其

氣液ヲ持シムルトキハ。金肺モ亦自氣液ニ富テ潤ヲ致コトアリ。然
 凡交門冬五味子ノ肺ヲ潤ト異ナリ。彼ハ直ニ手太陰肺經ノ藥ニ
 麥門冬ハ直ニ肺部ノ津液ヲ生化シ。五味子ハ酸收ニ直ニ津液ヲ
 金肺ニ聚者ナリ。甘草ハ脾胃土ノ氣液ヲ持ノ餘ニ肺金ヲ潤者也
 去咽痛凡一切ノ痛マ。皆氣血ノ急迫ニ生ス。譬ハ人身以繩縛ト急
 ナク痛ニ同シ。故ニ甘草ノ其緩其急迫ヲ除テ諸痛ヲ治ス。且咽喉
 ハ胃與肺ニ連。甘草ハ脾胃ノ劑タリ。肺ハ脾胃ノ子ニシテ母其氣
 ヲ通ス。故ニ甘草能咽喉ノ痛ヲ治ス。古人咽喉ノ痛ヲ治スルニ甘
 草桔梗合用ノ神効アリ。各テ其桔湯ト云。蓋甘草ハ緩急諸痛ヲ治
 スルノ良藥ト雖。其味厚ノ鈍故ニ速ニ高上テ咽喉ニ達スルコト遲シ。
 桔梗ハ諸藥ヲ載テ能高ニ至ラシムル者。古人譬舟楫。其能浮上
 テ沉シメガルヲ以ナリ。且桔梗モ亦幸ニ利咽喉ノ功ヲ存ス。故ニ甘

草其緩ニシテ治咽喉痛者ヲ以テ。桔梗ノ舟楫ニ乘浮テ能咽喉ノ高
 ニ至ラシム。彼前ニ辨スル黃耆得防風其功大ナルノ義ト同シ。或問
 吾子カ言ノ如ナルトキハ。甘草一味ヲ以ハ咽喉痛ヲ治スルノ功ナシマ
 否ヤ。曰不然。甘草一味ニ能雖治咽喉痛。其味ノ其厚ナルヲ以テ。速
 ニ咽喉ノ高ニ上達スルコト不能シ。其効ヲ致ニ遲シ。故ニ桔梗ニ合シ
 速効ヲ致ノミ。夫咽喉ハ食飲呼吸ノ道路ト身ノ要部タリ。若病ア
 ラハ速ニ治スヘシ。慢コト勿レ。若咽喉痛甚ク速ニ治セシコトヲ欲セバ。甘草
 合桔梗用之。若痛輕者ハ或單ニ甘草ノミ用モ可ナリトス。必桔梗ヲ
 兼サレハ咽喉痛ヲ治スルコト不能ト云ニハ非ス。解百毒百毒ハ諸毒也。
 甘草能諸ノ毒氣ヲ解ス。解字。和ニ登久ト訓ス。此モ亦甘草ノ其ヲ以
 テ毒氣ノ急烈ヲ緩解テ治スルナリ。又甘草ノ其ヲ以ハ能諸藥ヲ調
 和スルヲ以テ。毒氣ノ雜發ヲ調和ノ諸毒ヲ治スルノ功ヲ致者也。

黒大ニユノ煎汁。雖解百藥毒。甘草ヲ加入セザレハ解毒ノ驗アルコ
トナレ。故ニ思邈曰。甘草解百毒。如湯沃雪。甘草解毒ノ功勝タルコ
可見。甄權モ謂。甘草治七十二種乳石毒。解一千二百般草不毒。一
故ニ常ニ甘草ヲ懷中ノ不可絶。若食物等ノ毒ニ中コトヲ覺ハ。火
甘草一寸ヲ以テ。嚼テ其汁ヲ煎ハ。即毒物ヲ吐出ス。不吐則厚毒ニ
非ズ。吐ノ後。炙甘草三兩。生姜四兩。水六升。煎二升。服ス。或大豆
甘草等分。煎ノ甘草湯ト名ク。解諸毒。奇妙ナリ。烏頭巴豆ノ毒ヲ
解スルニ甘草亦妙ナリ。衛生ノ士ハ必。甘草數寸ヲ帶テ。中毒ノ急
ヲ救コトヲ欲セヨ。葛洪云。常帶甘草數寸。隨身備急。若經含其
草而食物不吐者。非毒物也。コノ毒物ハ。鼠毒等ノ厚毒ヲ指也。輕毒
ハ不吐ノ自愈トス。療小兒胎毒驚癇。此モ亦甘草解毒ヨリ所致
トリ。驚癇ハ驚風ノ名ナリ。小兒初テ生ハ。火炙甘草一寸許。判碎水煎

メ此ヲ綿ニ浸テ。小兒ノ口中ニ滴飲シムルコト。規效一ス。ト程用則
胸中ノ惡汁ヲ吐出メ。胎毒ヲ去。驚風ヲ除。痘瘡サノ且智慧アリ。
此玉璆選方ニ見タリ。或甘草黃連等分ニ煎メ。綿帛ニ浸吮シムル
モ可ナリ。胎毒胎熱ヲ去ノ治也。本草匯曰。小兒初生加黃連煎湯
拭口有益。夫胎毒ノ症或熱アリ。或寒アリト雖。胎寒ハ稀ニ胎熱
ノ毒尤多シ。故ニ甘草黃連湯多ハ小兒初生ノ良法タリ。又小兒驚
癇症多ハ胎毒脾胃ニ屬ス。甘草ノ解毒補中ノ者ニ宜シ。除火熱實
火ハ生甘草ニ宜シ。虛熱ハ炙甘草ニ宜シ。此義右ニ辨スルコト詳也。
甘草直ニ火熱ヲ清涼スルニハ非ス。只虛實兩火ノ急烈ヲ緩テ除
去者ナリ。故丹溪曰。甘草味其大緩。諸火ト。緩字ヲ以テ予ガ辨ヲ
可知。東垣モ謂。甘草性能緩急。生甘草ハ只其緩ヲ實熱ト
急烈ヲ緩シコトヲ欲ス。炙甘草ハ其緩温和ニテ。虛熱ノ急烈ヲ緩

シトヲ欲スルナリ。謂温能除大熱ノ義タリ。或問東垣曰生明則大
 瀉心火下。甘草ハ手少陰ノ藥タル欤。曰不然東垣ノ醫法ヲ察ニ
 心ハ南方離火ノ本部タルヲ以テ。實火ヲ心位ニ歸メ云。生甘草ハ大
 ニ實火ヲ除フ以テ瀉心火下ス。甘草ハ手少陰ノ藥ニハ非ズ。虛火
 ハ胃氣ノ不足ニ生ジ。衝脉ノ火ト並テ中州ニ起トス。故ニ灸甘草ノ
 其温能元氣不足ノ虛熱ヲ除カ故ニ東垣謂灸之則氣温補ニ焦
 元氣而散表寒除邪熱ト。此邪熱ハ正氣不足ノ虛熱ヲ指ナリ。散表
 寒ノ説ハ右ニ見タリ。通經脉 玉好古曰。甘草入足太陰厥陰經ト。時
 珍曰。通入手足十二經ト。李士曰。甘草獨入脾胃李時珍以爲通入十
 二經者非也。實ニ李士ノ説ヲ是ナリトス。甘草ノ其味黄色ナル
 ハ專中焦坤土ノ氣色ヲ全メ脾胃ノ本藥タルコト明ナリ好古謂
 入足太陰説述之入足厥陰トハ甚非ナリ。時珍謂入十二經トハ

甘草ハ脾胃ノ劑タリ。脾胃ハ土トス。土ハ中宮ニ在テ其氣ヲ四方
 四行ニ寄應スルヲ以テ通入十二經ト云乎。○通經脉トハ。十二經
 脉ニ通入スルニハ非ズ。夫經脉ハ榮衛所行ノ道路タリ。榮衛ノ生ス
 ルヤ。中焦脾胃ノ氣ニ從。甘草能中焦ノ氣液ヲ養コト。右ノ辨ノ如
 ナルトキハ。營衛自調和ノ經脉通行スルコトヲ得ベシ。且營衛ノ中焦
 ニ生スルハ其源ナリ。營衛ノ經脉ニ通行スルハ其流ナリ。源急迫ナ
 レバ其流通行セズ。故ニ甘草ヲ以テ中焦營衛ノ本源ヲ緩和ナ
 ラレムシハ。經脉營衛ノ流自通行スルニ至ル。通九竅 九竅ハ中焦ノ
 水穀氣液ノ出入往來ノ道路ナリ。九竅ノ不通ハ中焦ノ緩和セザ
 ルガ故ナリ。故ニ甘草ヲ以テ脾胃ノ氣ヲ緩和セシムル時ハ。九竅自
 通行ス。然凡茯苓。猪澤ノ通竅通水トハ不同彼ハ直ニ淡味ヲ以テ
 通利滲泄ス。甘草ハ直ニ竅ヲ通ズルコト不能中焦緩和ノ餘ニ通九

竅ノ功ヲ致ス。此モ亦源ヲ緩和ノ其流ヲ通スルノ義ニ取者也。
養陰血 甘草ノ其ハ津液ヲ持^ツニ因テ然リ。直ニ陰血ヲ生化スル
ニ非ス。然レ厄當歸。芍藥。地黄等ノ滋陰生血ノ劑ニ合入ノハ自生
血ノ功ヲ發ス。凡^ソ甘草ハ中央土德ノ氣味ヲ備^フコトノ全キ物タリ。
且^ツ甘草ノ外^ハ赤^ク中^ニ黃ナルハ離火坤土ノ色ヲ兼タリ。其氣薄^ク其味
濃ナルハ陰陽浮沉ノ氣ヲ全ス故ニ甘草ハ可^レ下^レ可^レ上^レ可^レ内^レ可^レ外^レ有
和^有緩^有有^有瀉^有補中道ヲ盡ス。諸藥ノ中ニ於テ王道土德ノ化ヲ得
者^ハ甘草ニ勝^ルハナレ。然ニ好古ハ謂^フ甘草升^テ而浮陽也。李杲ハ謂^フ陰
中陽也。トハ俱ニ不是^ナ。甘草ハ居中^ニノ君子。陰陽浮沉升降補瀉寒熱
氣血ノ道ヲ備^フ故ニ諸藥ニ合^シ並^シノ爭^ハ乖^ハコトナキ者ナリ。是以陰劑
ニ合^シハ能^ク陰血ヲ補^フ。陽劑ニ合^シハ能^ク陽氣ヲ補^フ。升^ル藥ニ並^シハ浮^ク降^ル藥ニ
並^シハ沉^ク。隅^ニ執^シ滯^スル者ニ非^ズ故ニ諸^ノ方劑ニ甘草ヲ合^セサルハナレ。

惟^テ其緩和ノ能ヲ取^テ方中ノ臣佐トスレ^バ。君藥ニ取^者サレ^シ。此藥ハ
諸劑ノカイレキトスルニ便^ナ者ナリ。益^ニ嫉^ナキヲ以^テナリ。仲景小柴胡
湯ニ柴胡黃芩ノ寒。人參半夏ノ温アリテ。寒温不和^ニ故ニ甘草ヲ用^フ。
テ此ヲ調和スル類ナリ。甘草若^シ陰陽浮沉升降補瀉寒熱氣血ノ間ニ
於^テ惟^テ一道ヲ得^テ偏^倚タラ^ズ。何^ノ調和ノ功ヲ致^スコトアラシヤ。丹溪
甘草ヲ稱^シノ厚^徳ノ君子ト^シレ。時珍稱^シノ王道ノ化ヲ得^{タリ}トス。實^ニチ
ルカナ^ク治瘡腫^ノ諸瘡ノ生ズルヤ。氣血ノ凝滯急迫ニ因^ル者ナリ。故ニ甘
草ノ其緩和ヲ以^テ其氣血ノ急迫ヲノ緩和ナラレ^ハ愈^易シ。大抵
瘡腫未^ク潰^破者ハ實熱ニ屬^ス。生^キ甘草ニ宜^シ。其^レ已^テ潰^破ノ後ハ屬^ス虛
灸^ニ甘草ヲ用^ヘレ。益^ニ灸^ニ甘草ヲ以^テ中焦ヲ温養^シ。肌肉ヲ長^ゼレ
メ^シコトヲ欲^スルナリ。腹脹^ノ腹脹中滿ノ症。虛實ノ二辨アリテ甘草ノ
宜^ハ與^ハ不^レ宜^ナヲ存^セリ。夫^レ胃ハ水穀ヲ納^メ脾ハ水穀ヲ消化^ス。脾由^リ是^レ

ナルトキハ能水穀ヲ消化傳送ノ上下升降レ。管衛流行ノ脹滿等ノ
 患ナレ。若脾胃一度虛則水穀留滯シ。升降不順。中焦不塞。遂
 ニ脹滿ノ患ヲ致ス。故甘草ヲ以テ脾胃ヲ補則中宮消化升降ノ
 脹滿ヲ除。此塞因塞用ノ義ニ迹。若此虛症ヲ以テ妄疎通順利ノ
 劑ヲ用ハ脾胃彌虛脹滿彌厚。コトヲ致ス。然王好古曰。甘者令入中
 滿中滿者勿服甘。甘緩而壅氣。非中滿所宜也。此甘草。中滿
 症ニハ不宜用者トス。蓋脾胃土太過。中焦結實ノ脹滿ヲ云。若此中
 焦實滿症ヲ治スルニ於テ。甘草ノ甘緩ヲ用則甘味中宮ニ塞リ滿
 テ。其滿脹ヲノ加甚カラレム。故中滿者勿服甘草ト云。按好古ハ
 謂甘草非中滿所宜ト。別錄ニハ謂甘草下氣除滿ト。甄權モ謂甘
 草除腹脹滿ト。此三説不同者。虛實ノ不同ニ從テナリ。好古ガ説ハ中
 焦脾胃ノ實滿ヲ云。別錄ト甄權トガ説ハ中焦脾胃ノ虛滿ヲ

云也。世人此辨ニ昧ノ一藥ニ中滿症ニハ絶テ甘草ヲ不宜用トス。誤
 レルカナ。内經曰。以甘瀉之。以甘緩之ト。彼中焦不足ノ脹滿ハ甘草ノ
 甘ヲ以テ虛中ノ實邪ヲ瀉シ。虛ノ脹スル急ヲ緩テ其滿脹ヲ治
 ス。何ゾ一例ニ甘草不宜トセンヤ。李士材曰。脾得補則善干健運也。
 若脾土太過者。慎服則轉加脹滿。故曰脾病人母多食甘。甘能滿中。
 此爲土實者言也。世俗不辨虛實。每見脹滿便禁甘草。何不思之甚
 耶。且世俗謂乳母ニ甘草ヲ用則乳汁ヲ閉澁セシムト。是以乳母ハ
 絶ニ甘草ヲ禁者モ亦悞ナリ。蓋此モ亦虛實ノ兩辨ヲ存ス。夫乳汁
 ノ閉澁スルヤ。氣血胸腹ニ鬱結シ。痰飲迫膈致者ハ實ナリ。若此ニ甘
 草ヲ用則甘味泥膈。腹氣痰ナヲ胸中ニ塞リ。乳閉加甚。如此者ハ
 痰氣ヲ順シ胸膈ヲ開通ノ宜トス。若其脾胃虛ノ升降不順ガ故ニ
 上中二焦ノ氣急迫ニ乳閉ヲ致者ハ。反テ甘草ノ甘ヲ以テ中焦ヲ

補則升降能順レ胸腹ノ氣急自緩テ乳汁ヲノ通利セム然則一藥
ニ甘草ヲ以テ乳母ニ林不^ス者ハ豈^ア誤ニアラスヤ。凡^ソ諸藥ノ禁忌善惡ハ
類云ヘカラス病ニ臨^ス時ニ從^テ當用者ヲ不用不當用者ヲ用ユ故ニ醫
ハ尺權ニ在^テ變ニ應スルニ非^ズバ治療ノ神ヲ致^スコト不能トス**煩滿胸**
膈ノ煩滿者モ亦虛實ニ從^テ甘草ノ宜不宜アリ。若^シ上中焦ノ氣實
鬱結ニ屬者用之則其味胸膈ニ填^テ鬱塞不開煩滿ナラ盛^リ。若^シ中
焦虛ノ上焦不行元氣不足ノ虛火旺ノ胸中煩滿ヲ致^ス者ハ炙甘草
ヲ以テ中焦元氣ヲ補^テ宜トス。凡^ソ胸中ノ煩スルヤ皆胸氣ノ急ナルニ
因^リ故ニ實煩ノ者モ亦或^ハ生甘草ヲ用^テ暫^ク其氣急ヲ緩^テ可ナ
ルコトアリト雖實症者多^ク用之不宜其味其膈ニ泥^ル易^ク以^テ也。虛
煩者ハ必用之補緩テ効^ヲ致^ス若^シ煩ノ滿ス^ル雖上中焦ノ虛ヨリ
致^ス者ハ甘草ニ宜^シ其滿ヲ恐^ムコト勿^レ**止痛**諸痛ヤ皆急迫ニ生^ス故

甘草ヲ以^テ其急迫ヲ緩^ル則諸痛乃止東垣謂^ク心火乘脾腹中急痛
腹皮急縮者宜倍用甘草其性能緩急トハ是^{ナリ}。大抵實痛ノ者ハ
生甘草ヲ用^テ虛痛症ハ炙甘草ニ宜トス**益精**古人謂^ク補腎不如
補脾ト甘草ハ直^ニ下焦腎精ヲ補^ル者ニ非^ズト雖^モ甘草能脾胃ヲ補
脾ヲ潤^ル以^テ益精ノ功アリトス。蓋脾胃盛則水穀能消化ノ中焦
水穀ノ精液注^シテ五藏ノ精ヲ養^フ且^ニ肺金ハ腎水ノ母タリ故ニ甘草ノ
脾胃ヲ補^ル肺ヲ潤^ル者ハ自^ラ益精ノ功ナクシバアラス。然^レ李士謂^ク甘草
下焦藥中勿用トハ何^ゾヤ。此^レ前^ニ辨^スル如^ク甘草ノ其ハ緩ト雖^モ
中^ニ自^ラ持^ツノ義ヲ存^ス故^ニ下焦ノ藥中ニ用^テ之^ル則藥氣ヲ中焦ニ持^テ
下^ニ達スルコトノ遲滯センコトヲ恐^レテナリ。愚案李士說深意アリト
雖^モ下焦藥中勿用之ト云^テ必^ストスル者ハ恐^ハ不是^{ナリ}古人下焦ノ藥中ニ
於^テ甘草ヲ用^{コト}多^シ惟^テ下焦藥中ニ用^テ之^ル宜^ク裁^ス多用^ル勿^ト

云ハ可ナラシニ**壯筋骨筋ハ肝ノ主骨ハ腎ノ主**雖總テ皮肉血
 脈筋骨周躰ハ皆中焦脾胃ノ所養タリ。脾胃盛則筋骨柔弱ナリ。
 中焦盛則筋骨自健ナルコトヲ致ス。故ニ甘草ノ甘緩ヲ以テ中焦ヲ
 補則筋骨自壯堅ナリ。然レ虎骨松節等ノ筋骨ヲ壯ニスルトハ不
 同彼ハ同類求テ直ニ筋骨ノ氣カヲノ壯實ナラシム。甘草ノ壯筋骨
 中焦補益ノ餘ニ致者ナリ。**補益内傷**飲食不節肢體勞倦ハ内傷
 ノ症皆中焦ノ不足ニ属ス。甘草ハ中央土ノ氣味ヲ全ク脾胃ヲ補ノ
 功ニ長セリ。且脾胃土ハ常ニ緩和ヲ欲メ急迫ヲ惡。甘草ノ甘也脾
 胃ヲノ緩和ノ土徳ヲ得セシメテ急迫ヲ除。故ニ諸内傷補益ノ劑
 中ニ必用之。補脾胃。或問大抵甘ハ上行ノ發ス。然レ別錄云。甘草
 下氣トハ何ノヤ。曰甘草ハ居中ノ道ヲ盡メ升降浮沉ノ功アリト雖
 本草能中焦ヲ緩和ス。中焦緩和ナルトキハ上焦通シ其氣下行ス。

別錄ニ所謂モ其理ナキニ非ズ。然レ此中焦虛急ニテ上氣ノ不下者
 ヲノ甘草コレヲ下サレム。彼逆氣胸中ニ上貫メ不下者ノ如キ。其用之
 下ト欲セハ反テ其味隔ニ
 閉テ上氣ナヲ不可下ナリ。**總藥** 甘草ノ主治數品アリ。雖此ヲ
 者ナリ。緩ハ緩急ノ義。建中湯ニ甘草アルハ脾ノ急ヲ緩テ中焦ヲ
 補メカ爲ナリ。鳳髓丹ニ甘草アルハ腎ノ急ヲ緩テ下元ヲ生センガ爲
 ナリ。其外寒藥ニ合メハ其寒ヲ緩シ。熱藥ニ合メハ其熱ヲ緩シ。上藥
 ニ合メハ其上ヲ緩シ。下藥ニ合メハ其下ヲ緩スルノ類。緩ヨリ所致奉
 テ數ヘカラス。和ハ和合調和ノ義ナリ。寒熱草石相雜ニ於テ甘草ヲ
 用則能此ヲ和調シ。或相畏相反ノ劑ヲモ能和合シ。爭シメス。故ニ古
 方多ハ甘草ヲ入用テ劑中ノ釋品ヲ和合セシム。惟甘草ノ主治スル
 所ハ緩和ノ兩道ヨリ致者ナリ。其所入中焦脾胃ノ部ニナリ。他ハ

皆此カ。枝葉ニ属ス。蓋甘草ノ緩和スルヤ。中焦ニ入ヤ。只其味ヨリ致之。生甘草ノ瀉シ。炙甘草ノ補モ。亦味ノ其ニ因テ致之者ナリ。

使藥

木苦參。乾漆ヲ使トス。人參白朮ト合ノ善。脾胃ヲ補。陳皮ト合ノ中官ヲ順和ス。桔梗ト合ノ善。咽痛肺癆ヲ治ス。

ノ能。百毒ヲ解ス。 **毒** 甘草ハ緩急。故ニ一切急症ニ臨テ汗下尅ニ屬ヘル。脹滿者勿用之。其其味中焦ヲ塞テ加滿悶ス。嘔吐不食。痞隔ノ者。妄ニ勿用之。動スレバ其味中胸泥隔害ヲ致ス。酒病ハ濕熱中焦ニ閉。胸膈滿ノ多ハ嘔吐惡心等ヲ致ス。

只辛散ヲ欲ノ其味ヲ不喜。故ニ酒病ハ甘草ヲ用テ勿。 **畏惡** 甘草惡遠志。反大戟。羌活。其遂海藻。忌猪肉。東垣結核ヲ治ス。ル消腫潰堅湯ニ甘草海藻ヲ用。丹溪治勞瘵。蓮心飲ニ甘草羌

花ヲ用ユ。此皆相友ノ物ヲ合劑ノ効アル者ハ何ゾマ。蓋病深ノ甚者ハ其相友ノ相爭ノ勢ニ乘ノ病根ヲ拔去ント欲ス。以毒治毒ノ義ナリ。如此ノ法ハ達神明醫ニ非ハ敢テ所不致也。故弘景曰。古方亦有相惡相友。並乃未爲害。非妙達精微者不能知此理ト。○予常ニ時師ノ古方ヲ施者ヲ視。甘草ノ大戟羌活。其遂海藻ト反スルヲ

トヲ知凡多ハ惡遠志ノ義ニ味ノ古方ノ甘草アル劑中ニ於テ。妄ニ遠志ヲ合用ノ施者不少。此本草ニ不詳ノ過也。

附方 治懸癰。前後陰ノ間ニ生ノ初。松子ノ如ク。漸大ニシテ赤腫。桃李ノ如ク。成膿。即破テ難愈。懸癰ト名ク。大甘草五錢。酒ニ煎シテ服ス。出癰疔方。諸毒ヲ治スル。甘草黑豆等分。合煎シテ用ユ。諸藥。毒。一切魚鳥等ノ食毒ヲ治ス。出千金方。○飲食ノ後。中毒。腦亂。何ノ毒タルコトヲ不覺。急ナル者。甘草薺。薺ノ煎湯ヲ用ユ。死スレバ入口便

タルコトヲ不覺。急ナル者。甘草薺。薺ノ煎湯ヲ用ユ。死スレバ入口便

活出金匱至函方。傷寒咽痛ヲ治ス甘草湯。蜜炙甘草二兩。水二升。煮一升半。服之。出。傷寒論。痰熱在肺。喉痛者。炒甘草二兩。桔梗一兩。合劑之。每一貼五錢。水一鍾半。阿膠半片ヲ入煎服ス。出。小兒直訣。小兒初生便閉ノ不通者。甘草枳殼煨ノ各一錢。水半盞。煎服セシム。出。全幼心鑑。小兒初生臍帶ノ落口ヨリ風寒ヲ受テ。卒ニ口噤テ撮ミタルガ如ク。臍風撮口トス。小兒ノ口中上鰓ニ必小泡子アリ。テ身冷。帝テ不飲乳。温湯ニ帛ヲ浸メ指ニ卷テ輕入ニ口中。小泡子ヲ措ツグレ。次ニ生甘草二錢半。水一盞。煎六分。温服スレバ痰涎ヲ吐ス。次ニ乳汁ヲ口中ニ含スレバ愈。出。金匱至函。小兒尿不覺タル者。大甘草ノ蘆頭煎湯ニ。毎夜服ス。出。得效方。小兒羸瘦者。炙甘草三兩。末トシ蜜ヲ以テ之。綠豆ノ大ニ丸レ。温水ニテ服ス。出。金匱至函。小兒尿ニ血ヲ下ス。甘草一兩。二錢。水六合。煎二合。日ニ服入。出。至寶方。舌

腫塞 急ニ不治殺入。甘草ヲ濃煎シ。熱ヲ漱テ。頻ニ吐出。聖濟總錄。陰囊生瘡者。蜜炙甘草ノ末。頻ニ塗テ。愈尤妙也。出。千金方。陰囊後陰濕癢者。甘草ノ煎湯ニ。日ニ洗コト三五度。出。古今錄驗。凍瘡發裂者。甘草煎湯ニ。洗。次ニ黃連黃柏黃芩ノ末ニ。少許粉ヲ加。胡麻油ニ調テ塗。談笑翁方。湯火瘡。甘草蜜ニテ煎。塗。李樓奇方。

愚案 甘草ハ惟中焦補土ノ聖劑。諸急ヲ緩和スルノ良藥タリ。今ノ世醫甘草ヲ以方劑ノ帥ノ如クシ。此ガ主功ノ秀タルヲ不知。深氣性ノ所行ヲ不究。漫爾トシ少用之耳。分量加減ノ論ニ及者ナシ。恨カテ。假令四君子六君子湯ノ如キ。其四六ノ品味皆居中。道ヲ窮故ニ稱ノ君子トス。其中甘草尤君子ノ徳ヲ全ス。然則四六君子ノ類ハ專方中ノ眼。甘草ニ在ノミ。然レ時師惟參朮ニ意ヲ留メ。症ヲ察シ時ヲ考テ。此ガ分量ヲ加減スルコトアリト雖。甘草ニ於ハ意ヲ

留テ加減ヲ考者アルコトナク。一例ニ先許ヲヒメノ四六ノ藥數ニ合スルニ。此實ニ不思ノ甚ナリ。凡古人之方ヲ製スル何ノ藥力意義ノ輕物アラシ。一方ノ諸藥盡深意存スルコトアリテ。病ニ從ヒ時ニ從テ。人其氣味性功ヲ察シ。盡分兩ヲ加減スヘシ。豈甘草ヲ以テ。一藥ニ減少ノ用ガ理ナラシマ。大抵中焦補益ノ劑ハ。甘草甚減少スルコト勿レ。甘草補土ノ功盛ナレバナリ。急症ニ臨テ急ニ汗シ。急ニ下シ。急ニ攻伐スルニ於テハ。甘草ヲ拔少セヨ。甘草藥カラ緩ノ功盛ナク也。

修治

甘草ハ太シク皮薄ク。色黄ニ堅實ナルヲ粉草ト名ク。甘草ノ極上ナリ。藥ニ入テ功力強シ。細シ堅實ナルハ中品。輕虛ニ或蛙或朽色。或黒色ニ皮厚。或皮麩脫物ハ下品ナリ。皆功用甚惡シ不入藥。凡甘草ヲ使ニハ。大粉草ヲ擇テ麩皮ヲ去。蘆頭ト尾サキトヲ切捨テ。剉灸用テ。或生ヲ用ユ。方ニ依ヒ。甘草ノ

蘆頭尾サキハ。人ヲ吐逆セシム。必去用ヘシ。雷斅曰。凡使須去頭尾尖處。其頭尾吐人ト。今ノ醫家人參ノ蘆頭致吐コトヲ知テ去之。凡甘草ノ頭尾致吐ノ義ヲ忘テ多ハ恐去コトナレ。○和ノ藥店堅韌ト呼物。甘草ノ極上也。其次ヲ中韌ト名ク。其次ヲ切込ト名ク。堅韌中韌切込ニ亦。各上中下品アリ。良香様ト呼ハ。良香ニ似テ細小ナリ。最下品ナリ。良香様ノ太細ヲ藁甘草トス。極下品ナリ。俱ニ不足用。○今駿州富士山ニ此草アリト。或甲斐州ノ諸山ニ皆此草アリト。延喜式ニハ常陸陸奥出羽。三箇國ヨリ甘草ヲ獻スル目アリ。今モ有テ無テ未知之也。

甘草稍

甘草ノ稍ノ細處ヲ云也。○甘草稍生ニテ用レハ。胸中ノ積熱ヲ除。陰莖中ノ痛ヲ去也。元素曰。加酒煮之。胡索苦棟子。尤妙。○龔庭賢曰。稍去尿管澁痛。子除胸熱。尿管ハ陰莖也。子トハ甘草

岐出タル小枝ナリ

甘草頭 生ニテ用レハ脾胃ニ經ノ瘀血ヲ行レ消腫瘡毒ヲ導

瘡ヲ主治ス或吐藥ニ入テ能人ヲノ吐セシム稍尾モ亦宜入吐藥

白朮



其温〇補中益氣除濕治風寒濕痺止汗除熱消食去痰逐水腫利腰臍間血温中進食療脹滿利水安胎止霍亂吐下治反胃躄重心下急滿臍腹痛長肌

肉補内傷△此草根枝葉ノ形朮字ニ似テ其色白シ故ニ白朮ト号
上古ニハ蒼白朮ノ別ナレ宋ヨリ以來始テ白朮蒼朮別テ用來レリ
古方ニ所使ノ朮ハ二朮ヲ通用セリ或聞古方ノ朮ハ皆白朮ナリト
時珍云古方ニ朮通用ト頌云古方所用朮者皆白朮也ト蓋古人
ハ只朮トノニ云テ二朮ヲ通用ス陶隱居以來始蒼白ヲ別用ニ使

陳皮青皮ノ例也 補中益氣除濕好古曰白朮入手太陰少陰足太
陰陽明少陰厥陰六經ト愚案ニ朮ハ中焦脾胃ノ聖藥足太陰足
陽明ノ劑タリ李士曰白朮得中宮冲和之氣故補脾胃之藥更無
出其右者ト白朮ハ全其温ニ非ス微其微苦ノ微温ナリ能中焦ヲ
補ヒ元氣ヲ益濕ヲ除蓋補中益氣ハ氣味ノ其温ヲ以テリ其土
ノ味温ハ寒熱ノ中氣ニ中焦ノ所欲ナリ除濕ノ功アル者ハ氣
味ノ苦温ナルガ故ナリ内經ニ謂以甘緩之以苦燥之ノ義タリ
然凡補中益氣除濕ノ功中ニ於テ脾胃ヲ補ノ力勝リ其益氣除
濕ノ功ハ合用ノ劑ヲ以テ其力ヲ盛ニス人參黃耆ト合ノ能元氣
ヲ益茯苓ト合ノ能除濕凡脾胃ハ中州ノ土タリ土ノ化ハ濕タリト
雖潤濕ハ土ノ本化萬物ヲ生養ス泥濕ハ土所惡ノ濕ヲ土中ニ泥
濕在則物ヲ生化スルコト不能故ニ人ノ脾胃ハ亦少津液潤則能

管衛五藏ヲ生化ス。此中焦所欲ノ濕也。若脾胃土或不足シ。或太過ノ陰濕中焦盛ナレバ。胃氣コレガ爲ニ阻ラレテ管衛五藏ヲ生化スルコト不能。此中焦所患ノ濕也。白木其濕ヲ除。故ニ中焦補益ノ功ヲ致テ。補土ノ劑中必コレヲ不用ト云コトナレ。然レ白木動スレバ中氣ヲ塞易シ。故ニ少ク陳皮ヲ加用ノ能。中焦ヲ補和ス。何如トナレハ。凡補者ハ必閉塞ノ意アリ。蓋閉則不散。塞則不泄。不泄則能充滿スルニ至ル。是以閉塞ノ意アルニ非ハ。何ニ從カ補益ノ功アラズ。故ニ白木ハ能脾胃ヲ補益スルノ物タレハ。中焦ニ閉塞レ易コト明ナリ。陳皮ハ苦辛ニテ中焦頰和ノ劑タリ。白木補土ノ中ニ陳皮ノ苦辛ヲ兼テ頰和則補ヘテ閉堅ムス。滿レテ不滯。補益頰和ノ兩道ヲ兼テ補中ノ功盛ナリ。故ニ古方多クハ白木陳皮ヲ並用者是ナリ。然レ陳皮ハ白木ノ五分一ヲ用ユ。陳皮ノ苦辛頰和ヲ用コト過則反テ白木

補中ノカヲ薄ス。若中焦ノ虛甚者ハ。陳皮ノ頰和反テ白木ノ補ニ害アリ。故ニ中虛甚ハ白木ノ三分一ヲ用ユ。白木ハ中焦ヲ補テ微閉ノ義アリ。陳皮ハ中焦ヲ頰和ノ微疎ノ義アリ。其閉與疎ノ意ヲ得則白木陳皮合用ノ理ニ達スルコトアラシト云。或問元素謂非白木不能去濕ト。然則白木除濕ノ功勝タル者也。五字謂補中ノカ勝テ益氣除濕ハ合用ノ劑ニシ其カヲ盛ニストハ。恐ハ元素所謂ノ説ト反スルニ非ヤ。曰不反。白木實ニ除濕ノカ勝ト雖然。然レ濕ニ天人ノ二辨アリ。曰天造濕。曰人爲濕也。天造濕ハ雨露水川等ヨリ所受ノ者ナリ。人爲濕ハ多クハ飲食ヨリ受之。故ニ天造濕ハ皮肉ヨリ始ル。人爲濕ハ中焦ヨリ生ス。元素謂非白木不能去濕トハ。中焦脾胃ニ生スル人爲ノ濕ヲ主トシ云。予所謂人爲濕ハ。除濕之功盛也トハ。一切ノ濕ニ通用スルノ功ヲ云ノミ。且濕ニ寒濕濕熱アリ。白木能中焦ノ寒

濕ヲ除ノ要藥タリ。或中焦不足ノ濕熱ヲ除ト雖其功寒濕ヲ除
 二次者ナリ。夫白朮ノ主功本根ヲ厚則味其ヤ中焦ヲ補ヒ中氣ヲ
 持苦ヤ中焦ノ濕ヲ除テ補土除濕ノ兩功勝項ナキガ如トイハレ
 補土ノ力盛ニテ除濕ノ力次之者ナリ。今ノ時師ハ謂ラク白朮ノ主功
 ハ惟除濕其脾胃ヲ補ノ功モ亦除濕ヨリ致トスル者ハ真説ニ非ス
 治風寒濕痺痺ハ後世ニ謂白虎歷節痛風也其症風寒濕ノ三邪
 交合ノ管衛ヲ閉澁スルニ因テナリ。其中風勝者ヲ風痺トシ寒勝
 者ヲ寒痺トシ濕勝者ヲ濕痺トス。脾胃盛則管衛ノ運行モ亦盛ニ
 ノタトヒ風寒濕ノ三邪襲コトアリト云レ閉澁留滯ヒレメテ諸痛
 ヲ致ニ不及若脾胃虛則管衛ノ運行モ亦不順ニ。彼三邪乘虚閉
 澁留滯ヒレメテ遂ニ諸痛ノ症ヲ致ス。故ニ白朮ヲ以テ脾胃ヲ補益シ
 寒濕ヲ除則諸痺自安シ白朮能除濕則尤凡濕痺ヲ療スルノ功盛

ナリトス。止汗一切ノ汗ヲ止ニハ非ス。彼中焦虚熱ノ且濕氣脾胃
 ノ間ニ在者。濕熱肌肉ニ熏ノ自汗スルコトアリ。白朮ヲ以テ中焦ヲ補
 ヒ濕ヲ除則虚ニ生スルノ濕熱自去テ汗出ノ患ナシ。黃耆ヲ止汗ハ直ニ
 閉表也。白朮ノ止汗ハ中焦不足ノ濕熱ヲ去ハナリ。除熱中焦脾胃不
 足ノ虚熱ヲ除ク諸熱ヲ除ノ劑ニハ非ス。前ノ參耆ノ除熱ト同レ。東
 垣謂陰火乘脾胃ノ熱ナリ。脾胃不足スルニ元氣不足ス。元氣不足
 則虚熱從テ生ス。此熱ヤ凉寒ノ劑ヲ以テ直ニ清解スレハ寒劑其元
 氣ヲ輕テ虚熱ナラ増ナリ。惟白朮參耆ノ藥ヲ以テ脾胃ヲ補ヒ
 元氣ヲ益則熱火自退コトヲ得ナリ。前ノ人參ノ條ニ詳ナリ。消食消
 食ノ義兩辨アリ。直ニ消食物アリ。直ニ壅滯不消食脾胃ヲ補ヨリノ消
 食者アリ。神麴麥芽等ノ宿食ヲ消化スルハ直ニ其宿滯ノ食ヲ激者
 也。白朮ノ消食ハ不然。中焦不足ノ食飲ヲ消化スルコト不能故ニ食滯

ヲ致者アリ。如此ハアチカチニ食飲ヲ太過セルニアラザレバ。常ノ飲食中
 焦ニ宿滯レ。或ハ微食飲ノ常道ヲ過ハ即宿食ト成テ病ヲ致ス。此ニ
 神麴麥芽等ノ直ニ宿食消化ノ劑ヲ用則反ナラ中焦ヲ損傷ス。故
 白朮ヲ以テ惟其脾胃ヲ補テ中氣健ナルトキハ食飲自消退スル者
 ナリ。然則白朮ハ直ニ宿食ノ劑ニハ非ズ。惟其脾胃ノ虚ヲ補テ自食滯ヲ
 消化セシム。消食ハ補中ノ餘力ナリ。故ニ飲食過飽ノ宿食中宮ニ盛ニ
 中氣未傷者ハ白朮ヲ勿用。反テ食滯ヲ助テ滿悶ヲ加フ。麴麥等類ヲ
 以テ直ニ消化スヘシ。若或中焦不足ノ宿食ト雖。食滯盛ニ宿食滿スル
 者ハ白朮ニ少積實ヲ合用シ。白朮ヲ以ハ脾胃ヲ補ヒ積實ヲ以ハ宿
 食痞滿ヲ消シ宜トス。元素カ積米丸是ナリ。乃各テ虚中ノ實症トス。
 白朮ハ暖中燥濕ノ劑ナリ。暖則食消シ燥則飲消スト雖。直ニ消食ノ
 劑ニハ非ズ。蓋白朮ハ補中ノ力盛ニ且閉塞ノ意アルトキハ動スレバ食

飲ノ邪ヲ補任シ易シ。惟補中ノ餘ニ消食ノ功アリト覺則過コトアル
 コトナシ。去痰痰與津液本一根也。行テ順ナレバ津液也。若此カ滯留ス
 ルトキハ痰飲ト成。其行ト滯ト具中焦脾胃ノ致ス所ナリ。中氣健ニ
 轉則升降氣道能順行ノ津液流通ス。何ノ痰ト云コトカアラシ。若脾胃
 不足ノ中焦不運トキハ。升降氣道順行ヒスノ津液留滯レ。遂ニ痰飲
 ト成コトヲ致ス。且痰ハ津液ノ留滯タルトキハ即濕化ニ屬者ナリ。故ニ
 白朮ヲ以テ脾胃ヲ補テ中焦ヲ健ニ轉シメ。又能濕氣ヲ除則痰
 自退去ス。然凡濕痰燥痰涼痰熱痰ノ不同アリテ。白朮ハ諸痰ノ通
 劑トハ決シ難シ。惟濕痰涼痰中焦不足ノ虛痰ヲ主治者ナリ。陳皮
 ト合シ除痰ノ功ヲ盛ニシ。半夏ト合シ能濕痰ヲ燥スニ至ル。逐水腫
 水濕ヲ逐去テ水腫ヲ治ス。蓋水腫ノ本ハ腎ニ屬ル。脾胃ハ土ニシテ水ヲ
 剋勝者也。脾胃土健固ナレバ水氣溢コトナク脾胃氣盛ナレバ皮與肉

親著テ水ヲ分肉ニ注シムルコトナレ。若脾胃不足則水濕ノ邪侮溢
 テ中宮ニ乘シ。分肉ニ注テ水腫ノ病ヲ致ス。彼地中流行ノ水マ堤土
 鞏則水溢ニ堤外ニ注ガ如シ。脾胃土ハ防水ノ堤ナリ。此ガ虚ナルニ從
 テ邪水溢テ水腫ト成。白木ヲ以テ脾胃土不足ヲ補益シ。中焦ノ
 容濕ヲ除則水氣自土氣ノ堅固ナルニ逐レ防ガレテ腫病消退ス。逐
 トハ主君水ノ意ニ似タリ。直ニ利水ノ劑ト覺ヘカラス。治水腫モ亦
 補中除濕ノ餘力也。然凡水腫症ニ虛實ノ兩辨アリ。中焦脾胃土ノ
 鬱結太過ニ因テ水液ヲ防止テ水腫ヲ致者アリ。彼堤坊妄ニ防
 止テ水流反テ溢ガ如シ。如此者悞テ白木補土ノ藥ヲ施則水ナ
 ヲ溢滿コトヲ致ス。惟平胃利水猪苓澤瀉等ノ劑ヲ用テ中焦ノ大
 壅ヲ平治シ直ニ其水ヲ通利ノ愈コトヲ致ス。若或中焦不足ノ水腫
 ト雖邪水ノ溢滿盛ニテ白木ノ補土除濕ノ力ニ不及者ハ少道水ノ劑

ヲ兼モ亦權道ナリ。世ニ仲景五苓散ニ白木ヲ用テ利水ヲ見テ謂
 白木ハ直ニ通水ノ藥トハ謬説ナリ。凡土能水ヲ尅スト雖亦土ニ
 非ハ水行コト不能。故ニ水土ト辨ノ説アリ。是以仲景五苓散ニ白
 木ヲ用ニ蓋脾胃ヲ補ヒ濕ヲ除テ土堅固則水能流通スルノ義ニ
 徇直ニ利水ノ劑ト用ルニ非ス。利水ノ劑ノ佐ナリ **利腰膈間血** 夫
 心ハ生血肝ハ納血脾ハ一身ノ血ヲ總統者也。腰膈ノ間ハ血液所行所
 膈ノ分野也。故ニ白木ヲ以テ脾胃ヲ補養ノ中氣健則血液ヨク流
 行ノ瘀血ノ滯留スルコトナレ。是以白木ハ腰膈間ノ瘀血ヲ利スル功ヲ
 養ス。此モ亦補中ノ餘力也。本草匯曰。脾胃統一身之血。而腰膈乃其
 分野也。藉其養正之力。而瘀血不敢稽留。養正ハ中焦ノ正氣ヲ養
 ノ義ナリ。温中温ハ温養ノ義ナリ。桂附等ノ如ニ直ニ温熱セシムルノ
 劑ニ非ズ。右ニ辨スルガ如ク白木性温トスルノ説アリト雖詳ニ此ガ件

功ヲ察スレバ全温者ニハ非ズ。微温ナル者ナリ。夫温藥ハ直ニ寒涼ヲ
 ノ温ナラシム。微温者ハ直ニ温ナラシムト云ニハ不至。然レ久クニ用
 フ積テハ即温ナラシムルニモ至ルベシ。故ニ速ニ中焦ヲ温シコトヲ欲ス
 ルニ於テハ白朮ノ所不能也。脾胃不足ノ微寒者ハ白朮ヲ用ニ中焦ヲ
 補益スルコト久則其微温ヲ積テ漸ニ温中ノ力ヲ發ス。若ク焦
 虛ノ寒太者急ニ温補セシコトヲ欲セバ姜桂ノ類ヲ合用シ可ナリ
 トス。且世ニ謂白朮ハ燥劑タリト。此モ亦謬ナリ。蓋白朮ノ性温ニシテ
 除濕ノ功アルヲ以テナリ。然レ白朮微温ニシテ全温ナラス。除濕ノ功アリト
 雖アチガチ強テ燥劑トスルノ燥ニ不至。故ニ本草家ノ諸説ニ謂白
 朮除濕ト。別録云益津液ト。元素曰生津止渴ト。白朮ハ本燥劑ナ
 ラガレテ以テ除濕ト云テ燥トイフス。若其燥タラバ何ノ生津止渴
 ノ功アルシヤ。世ニ白朮ヲ以テ燥劑トスル者ハ本草滙ヨリ始メ之滙ノ

書善ト多ト雖亦或不詳ノ義ヲ著ス。孟子謂盡信書則不如無
 書ノ意知ヘシ。或問吾子謂白朮惟除濕テ燥ニ非スト。別録元素ノ
 謂生津止渴ヲ以テ證トスルトキハ白朮ヲ以テ潤劑トスルカ。曰白
 朮ハ不燥不潤惟除濕ノ劑トスベシ。然レ除中ニ自微燥ノ意ヲ存ス
 ト雖強テ燥劑トスル程ノ燥ニ非ズ。故ニ半夏トムコト能濕痰ヲ燥ニ
 至ル。或四君子湯ニ於テハ人參ノ温茯苓ノ淡ニ合シテハ燥濕ノ力アリ
 故ニ甘草ノ持津ヲ加テ燥ヲ防シ此皆合用ノ劑ニ從テ燥濕トナル
 コトアリト雖單ニ白朮ノミヲ以テ燥劑トスル程ノ燥アルコトナレ。又生
 津止渴ト云ト雖白朮直ニ津液ヲ生スル潤劑ニモ非ズ。中焦ハ津液
 氣血ノ家タリ。白朮ヲ以テ脾胃ノ氣ヲ補則氣液ヨク周流シ津液
 テ潤止且濕ハ此停滯ノ氣ナリ。中焦ニ濕アル時ハ氣液其濕滯ニ
 留ラレテ亦周流スルコト不能遂ニ渴ヲ致シ至ル。白朮中焦ノ濕ヲ

除則氣液流行ノ渴ヲ潤ス或生津止渴ノ功ヲ云李士云元素謂其
生津止渴者濕去而氣得周流而津液生矣下此說實三可也滙云
白木性本燥本草言其生津者蓋肥惡濕濕勝則氣不得旋化津何
由生故膀胱津液之府氣化則出今用木以燥之則氣得周流津液
亦隨氣化而出矣下此說亦是ナリト雖多燥字ヲ以辨者恐ハ
理ニ於テ不恰ト入白木潤劑ナラザレバ中氣ヲ補益スルヲ以テ故ニ
氣津流化ノ力ヲ致スニ茯苓ハ淡滲利水ノ劑ニ燥藥ニ近ト雖本
草家ニ多ハ謂茯苓能生津液ト亦コノ意ナリト進食脾胃虛ノ不
食者中焦虛ノ濕氣胃ニ旺ノ不食者皆白木ヲ以テ補中除濕則
安レ或中焦實ノ不食ハ反テ白木害ヲ致ス然レ白木ハ微閉ノ義
アルヲ以テ進食ヲ欲者其陳皮ヲ加用ノ可ナリ此白木ノ補益ト陳皮
ノ順和ト相兼テ能進食ノ功ヲ致ス療脹滿脹滿ノ症實虛ノ兩辨

アリ實滿者ハ絶ン白木ヲ用コト勿レ惟中焦虛ノ升降不順濕痰其
間ニ在テ脹滿ヲ致者ハ白木ノ善主治スル所ナリ予常ニ脹滿者ヲ
視ニ實脹ハ少ノ虛脹症多シ其實脹者ト雖中氣ノ疲ヲ不兼ハテ
シ苟中氣全健ニシ何ノ脹滿ト云コトカアラシ故ニ脹家白木ヲ恐ル者
希ナリトス利水前ニ辨スル如ク白木ハ直ニ小便通利ノ劑ニ非ト
雖水土ハ一縣氣水ハ合ユラ土堅固ナレバ水能流氣健ナレバ水能通
ス故ニ白木ヲ以テ補中除濕益氣則脾胃土堅固ニ氣行健ニシ小
水能通利スルナリ此モ亦脾胃ヲ補ヒ除濕ノ餘力ナリ直ニ通水ノ
劑ト覺ベカラス右ノ逐水ノ條ト參考スヘシ安胎李士本草通
玄曰安胎者除胃中熱也下愚察ニ此說不是白木除胃中熱者ハ
一切ノ胃熱ヲ除ニ非ス胃中ノ虛熱ヲ除也然則此通例ノ義ニテ
ラス余竊ニ考ニ見ノ母腹ニ在マ母ノ中焦水穀ノ氣液其胞衣臍帶

二注ニ此ヲ育母ノ宮衛外ニ行テ胎ヲ養フ。宮衛モ中焦水穀ノ精
 脾ノ氣也。故ニ母ノ中焦不足則水穀ノ氣液宮衛ノ行皆不得和
 其胎ノ育養不得常遂ニ胎動ノ不安也。壁土不堅則木根不治ノ
 動搖スルニ似タリ。故ニ白朮ヲ以テ中焦ヲ補則水穀ノ精氣宮衛
 ノ行盛ニシ能養胎。胎養治則何ノ動ト云コトアラシ。或中焦不足ノ
 生濕濕下焦ニ流テ胎動ヲ致者モ白朮ノ補中除濕ニ宜キ者也
止霍亂吐下 霍亂ハ病名。吐下ハ病症ナリ。上吐シ下瀉シ吐瀉同時
 ニ病ヲ名テ霍亂ト云。夫脾胃土ハ中州ニ位ノ上下升降ノ間々ニ居
 者也。故ニ中州病則下氣不升ノ瀉シ。上氣不降ノ吐ス。是以霍亂吐
 瀉ス。白朮ヲ以テ脾胃土ヲ補テ中氣健テレハ升降能通ノ濁陰ハ
 下降シ清陽ハ上升ス。濁氣降則吐止清氣升則瀉止。故ニ吐瀉者ハ
 白朮ヲ缺ベカラス。若或食飲中焦ニ塞テ吐瀉者ハ消食ノ劑ト相

兼テ用之。治反胃反胃ハ食不消ノ即吐ス。此專脾胃ノ虛寒ニ因
 ノ。故ニ白朮補中暖胃ノ劑ニ宜シ。體重脾胃不足ニ生ス蓋脾胃ハ
 手足肌肉ヲ主者也。故ニ脾胃虛則手足倦怠シ肉氣不行且脾濕
 肌肉ニ注テ形骸重コトヲ致ス。白朮ノ補脾胃除濕ニ宜キコト明シ
 心下急滿中氣不健ノ濕容中焦ハ濁痰積心下急迫痞滿ス。白
 朮ヲ以テ中氣ヲ健シ濕ヲ除則濁痰自去テ急滿去然。凡或中焦
 ノ實滯或氣分ノ鬱實ニ因テ心下急滿者ハ白朮ノ主治スル所ニ
 非ス。臍腹痛臍腹ハ中焦ノ分野ナリ。若中焦ノ不足ニ因テ痛者
 ハ宜用白朮。胃ノ實滯ニシ痛者ハ不宜用之。長肌肉肉ハ脾ノ主
 ル所也。故ニ脾胃虛則其氣ヲ肉ニ滿シルコト不能ノ羸瘦ス。然則
 白朮補中ノ劑ヲ以テ豈肌肉ヲ長セザラシマ。鋪内傷飲食勞倦ハ
 内傷ノ病皆脾胃ノ不足ニ因。故ニ白朮人參耳草補中ノ劑ハ一切

内傷脾胃虛ノ聖藥トス。人參ハ胃元氣ヲ補。白朮ハ脾胃土ヲ補。甘草ハ脾胃ヲツ令得中和。德者ナリ。

總藥

白朮

ハ惟脾胃土ヲ補ヒ除濕ノ良藥也。此ガ主治ノ能多ト雖皆補中除濕ノ餘カヨリ致ス。元素白朮ノ主功ヲ九ニ辨ノ謂温中一也。去中濕二也。除胃熱三也。強脾胃進食四也。和胃生津五也。止肌熱六也。治四肢困倦。昏目不能開。不思食七也。止渴八也。安胎九也。然此惟補中除濕ノ一根ヨリシ如此ニ主治ノ品ヲ多ス。好古説ニ白朮ハ上ニハ皮毛。中ニハ心胃。下ニハ腰膝ヲ療スト云。此ガ所入ノ本官ハ中焦脾胃ニ在也。脾胃ハ中州。其氣ヲ四方ニ注者ナリ。故ニ白朮能中焦ヲ補則其力上下内外ニ不及ト云所アルコトナレ。本草滙曰。白朮安脾胃之補品ト。尤是ナリ。

使藥

防風地榆ヲ使トス。陳皮ヲ加テ善脾胃ヲ補和ス。枳實ト合テ補脾胃消痞。

滿黃艾ト合シ屬熱安胎動。甘草ト合シ補脾。

毒

白朮ハ中焦ヲ補。

胃除濕亦不燥。乾姜ト合シ中焦ノ寒濕ヲ去。

其補所以ハ中

氣ヲ留閉トナリ。故ニ脾胃實滿ノ者。胃中實熱ニシテ不食者勿用之。

○腎虛ノ逆氣攻築テ臍下ニ動氣アル者勿用之。蓋白朮閉氣カ故

ナリ。○劉涓子癰疽論曰。潰癰忌白朮。以其燥。乾而閉氣。反生膿。作

痛也。○愚案ニ白朮實ニ閉氣則生膿。作痛ノ義。或是ア。然癰疽

疽甚ソ脾胃既ニ虛衰シ。官衛不足スルニ至テハ參朮ニ非ハ此ヲ補

助スルコト不能。彼ハ珍湯大補湯益氣湯ハ癰疽補虛ノ主劑ニ非ヤ。

其方皆白朮ヲ以テ君臣トス。若其劉氏ガ論ノ如ナラバ。癰疽虛ヲ

補ニ於テハ珍大補益氣湯等ヲ用ル。白朮ヲ除去テ可ナリトス。

次ハ珍大補益氣湯等ノ白朮ヲ去ハ。何ニ由テ其補益ノ功ヲ致シ

ヤ。不思ノ甚也。或潰癰用白朮宜少ト云ハ可ナラシ。思之ト云者ハ恐

ハ不可ナリトス。且劉氏謂燥腎ノ義モ亦是ナルニ非ス。詳ニ後ノ愚案ニ見タリ

畏惡

桃李。松葉。雀肉。青魚ヲ忌

附方

枳朮丸 白朮一兩土炒ニス。枳實一兩麩炒ニス。右末トシ薄荷ノ煎湯ヲ以テ燒タル飯ニテ丸スルコト。梧子ノ大毎服五十丸。白湯ニテ服ス。消痞強胃。久服スレハ善食ノ不滯也。若中氣鬱滯セハ陳皮一兩ヲ加。胃火アラハ加黃連一兩。濕痰盛ニハ加半夏一兩。胃寒セハ加乾姜五錢。不香三錢。宿食アラハ加神麩麥芽各五錢。紫古製**白朮膏** 脾胃虛ノ久瀉久痢ヲ治ス。白朮一兩切。鍋内ニ入テ水ニ浸過コト二時。不緩不強火ヲ以テ煎半。分渣亦如此。三煎ス。煎スルコト總テ三度。其汁ヲ合シ。熬膏。入器。一夜ノ明日清。水ヲ傾去。收置。每服二三匙。蜜湯ニテ下ス。出千金良方。參朮膏補脾胃。虛益元氣。白朮一斤。人參四兩。剉テ流水十五碗ニ浸コト一夜ノ

熱柴ノ不緩不強火ヲ濃煎シ。汁ヲ取テ熬膏。煉蜜ヲ加人ノ改置。以白湯點服ス。出集簡方。温白丸 小兒脾虛ノ久瀉。米穀不化。飲食不進ヲ治ス。白朮半。夏冬各二錢半。下末自五分。烏朮。生薑ヲ合タル麩糊ヲ以テ黍米ノ大ニ丸シ。米飲ニテ用。出全効心鑑。寬中丸 脾氣不和。冷氣中焦ニ壅テ脹滿スルヲ治ス。白朮二兩。陳皮四兩。烏朮。酒ヲ合タル糊ニテ梧子大ニ丸シ。食前ニ木香湯ヲ以テ服ス。出指迷方。或濕或暑ニ因テ津瀉者 白朮。車前子等分炒末シ。白湯ニテ二三錢ヲ服ス。出簡便方。面ニ黧黯多ノ雀卵色ノ者 醋ニ白朮ヲ漬テ日ハ拭之。神效アリ。牙齒日ニ長。漸難食者。髓溢病ト名ク。白朮一味煎シ。濃服ス。出備急良方。吃力伽散 婦人血虛。小兒脾虛ノ蒸熱羸瘦。不能飲食者ヲ治ス。白朮。白茯苓。白芍藥。各一兩。甘草半兩。爲散。生薑大棗煎服ス。出外臺秘要。

愚案

吳門。章宜。曰。凡藏皆

屬陰世人但知木能健脾不知此蓋指脾為正邪所干故曰補也寧
 知脾虛無濕者用之反致燥竭脾家津液是損脾陰也何補之有木
 低陰虛燥渴少血骨蒸痰嗽喘唇燥咽塞便閉帶下肝腎攻築腰
 滿動氣者切須急之。思案ニ白木雖除濕燥劑トスル程ノ燥ニ非ス
 何燥腎燥血ノ恐アラシマ。夫濕ハ停滯壅遏ノ氣脾胃ハ精血津液
 ノ家也若脾胃虛ノ濕滯アル時ハ精血津液何ニ由テカ生カ流通
 スルコトアラシ。白木ノ補中除濕ハ反テ精血津液ヲ生カ流通セシ
 ムルノ佐ニスベシ。古人謂補腎ノ意ト同シ且脾虛ス凡無濕者
 ニ用ハ損脾陰トセバ白木ハ一切ノ脾胃虛ヲ補聖藥トシ難シ。諸藥
 ノ中ニ於テ補元氣者ハ人參ニ勝ハナシ。補脾胃者ハ白木ニ越ハナシ。
 若脾虛ノ無濕者白木ヲ恐忌バ何ノ物ヲ以テカ其脾虛ヲ補フトセン
 由テ考ニ脾虛ノ無濕者モ脾虛ノ燥者モ俱ニ白木ニ非バ其中虚ヲ

補ニ不足若脾虚ノ無濕者ハ甘草當歸等ト合ノ白木ヲ用ユ脾虚
 ノ燥者ハ生血潤液ノ劑ト合ノ白木ヲ用ユ何ノ息之ノ殺アラシマハ珍
 湯ニ白木地黃ヲ用。益氣湯ニ白木當歸ヲ用モ亦此意ナリ或問好
 古曰無汗則發有汗則止與黃耆同効ト然ヤ否ヤ曰黃耆ハ表氣ヲ
 稀ヒ白木ハ裏氣ヲ補其發汗止汗ノ功モ亦補中ノ餘力也脾ノ裏
 ノ肺金ヲ不生皮肉疎ニ有汗者或脾土虚ノ肺金ヲ不生陰火乘之
 皮肉焦熱ノ無汗者皆白木ノ所主ナリ。然无汗ヲメ或止或發スルヲハ
 單ニ白木ノニヲ用テ効ケシ。黃耆芍藥等ニ合ノ善止汗サ辛散ノ劑
 ヲ加入ノ善發汗ヲ三益白木ハ中宮中神ノ品ニ偏奇ナラス。故ニ卑
 藥ニ合ノ補血ノ佐トナリ。氣藥ニ合ノ補氣ノカヲ加好古曰在氣主
 氣在血主血ト然无補氣ノ助ニ厚ノ補血ノ佐ニ薄シ惟白木ハ補脾胃
 閉氣除濕ノ良藥トモ他ハ皆此カ餘力ナルコトヲ知ハ効ヲ致スト盛ニ

ノ邊ルコト
ナカルベシ

修治

白朮蒼朮本一類ニシテ其苗葉根ノ形色氣味微不同コトアリテ各公法功ヲ異ニス蒼朮ハ色蒼黒シ肉ハ白形老姜ノ如シ堅骨アリ白朮ハ色白ノ指ノ太ノ如ク形太鼓ノ槌ノ如ク柔ナリ大ナルハ拳ノ如ク小ナルハ如ク近代ノ藥店ニ誤テ白朮ヲ蒼朮トシ蒼朮ヲ白朮トシ或老根ヲ以蒼朮トシ嫩ヲ以白朮トシ或蒼朮ノ中ニ白朮ヲ雜エ白朮ノ中ニ蒼朮ヲ雜テ不正或謂和ノ朮ハ皆蒼朮ニシテ白朮ハ本朝ニテレトハ皆謬也白朮與蒼朮俱ニ吾朝ノ處ハ山中ニ多有之ニ朮俱ニ苗ノ高二三尺或一ニ尺其葉抱莖生シ稍ノ葉ハ棠梨葉ノ如ク根ニ逆キ葉ハ三五又アリテ皆鋸齒小刺アリ白朮ハ葉稍蒼朮ヨリ大ニシテ毛アリ他ハ皆蒼朮ニ同シト雖其根ノ形色右ニ辨スルカ如ク大小堅柔蒼白ノ異アリテ蒼朮白朮ヲ別彼老嫩ヲ以テ蒼白ヲ分者ハ非ナリ

○米泔水ニ浸コト二夜ノ土氣ヲ洗去藥店ノ者多ハ粗皮ヲ削出ス如此ハ其儘割日ニ乾メ炒用若粗皮ヲ留者ハ粗皮ヲ削去テ割日ニ乾メ炒用ユ脾胃ヲ補メトシ盛ニセント欲セハ東壁土ニ雜炒蓋土氣ヲ措テ脾土ヲ取ントス東壁土ハ東方ニ向ノ壁也此常ニ朝日ノ陽光ヲ受カ故也○東壁土ニ合メ炒則土末相雜テ難擇故言家傳ノ人共アリ東壁土ヲ以テ水ヲ滴テ粘レ龍眼ノ大ニ丸テ數十丸白朮ニ合メ俱ニ炒用則土氣然能白朮ニ移テ且土末紛雜スルコトナレ或脾胃ヲ潤補スル劑中ニ用ベ則蜜水ニ浸メ炒用ユ或乳汁ニ拌テ炒使或中焦不足ノ濕痰ヲ去ノ劑或中焦ヲ補ヒ胃氣ヲ行ス劑中ニハ生薑汁ニ浸炒用ユ方ニ從ベシ和唐和朮ハ性味緩和ナリ唐朮ハ氣性強シ故ニ緩治ハ和朮急治ハ唐朮ニ宜シトス川白朮近代川白朮ト名ル一種ヲ渡ス本綱謂削木斤朮是也藥力薄シ然凡亦和

木ヨリハ其氣味勝タルニ似タリ



若微辛温○除濕健胃散風發汗治風
 寒濕痺主頭痛消痰水逐皮間風水結
 腫除心下急滿腹脹腹痛止霍亂吐下
 暖胃消穀進食治嘔泄冷痢濁帶腸風

大風痲癢諸瘵諸爵除寒熱惡氣弭山嵐瘴氣灾冷△此木赤黑蒼
 色故ニ蒼木ト名ク白木ノ條ニ辨スル如ク古ハ蒼白ノ別ナレ陶隱居木
 有兩ト云ユリ始テニ木ヲ別ク白者ヲ貴赤黑者ヲ蒼木トシ主能ク
 ニ用之也除濕白木蒼木俱ニ去濕ノ良藥タリト雖白木ハ其氣味
 辛烈ナラカレカ故ニ除濕ノ功柔ク燥ト云程ニハ不至也蒼木ハ其氣味
 辛烈ニシテ強シ故ニ燥濕ノ要藥タリ宗奭謂蒼木氣味辛烈白木不烈
 ト李士曰蒼木其而辛烈性温而燥ト夫蒼白ノ二木ハ本ト類ト雖

其氣味不同トアリ。白木ハ其微温也。故神中ノ功盛也。蒼木ハ苦辛
 ニシテ其氣烈。其性全温也。故燥濕開胃口。且達表發汗ノ強効アリ
 テ。補中ノ功ハ懸ニ白木ニ劣リ。是以補中ノ劑ハ白木ヲ主トシ燥
 濕開胃中焦ノ大過ヲ平クルニ於ハ蒼木ヲ主トス。通玄曰木低架監
 之土宜與白木以培之。敦阜之土宜與蒼木以平之。一。卑監土不
 ノ各別脾胃ノ不足ヲ指也。敦阜ハ土大過ノ名。則脾胃濕土ノ亢實ヲ
 指也。白木ハ中氣ヲ補テ不泄。蒼木ハ苦辛温。苦ハ推テ疎シ。辛ハ發
 テ散スルガ故ニ中焦ノ大過結實ヲ平發ノ功ヲ得タリ。古方平胃散ニ
 蒼木ヲ以テ脾胃濕土ノ大過ヲ平ノ要藥トスルモ亦此義也。健胃
 時珍曰蒼木入足太陰陽明。手太陰陽明。太陽之經。一。愚案。蒼木
 亦白木ト同ク。足太陰陽明脾胃兩經ノ藥タリ。丹溪曰蒼木爲足陽
 明經藥。李士曰蒼木入脾胃二經ト。蒼木ハ白木ト同類タリト雖

其氣味柔緩ニ善脾胃ヲ補者也。蒼朮ハ氣味苦辛ニ烈シ。故ニ脾胃ノ濕ヲ燥シ。中焦ノ結實ヲ開散シ。胃ヲ健ニスルノ功アリ。健ニストハ補益ト云。程ノ義ニ非ス。惟中焦ノ濕ヲ燥シ。中焦ノ結實ヲ開散シ。胃土ヲ平ナラシムル時ハ。脾胃自健ナルヲ云ナリ。震亨曰。蒼朮氣味辛烈。強胃強脾。發穀之氣。是ナリ。胃ヲ平開散セシムル時ハ。穀食ノ氣ヨク中焦ニ發ス。木ハ直ニ中焦ヲ補ヒ。蒼朮ハ胃土ノ大過ヲ平テ健ニス。平與補不同。藥用スヘカラス。散風。蒼朮ノ中焦ヲ平テ健ニス。辛ク發表出汗。故ニ風邪ヲ散スルノ功アリ。凡表裏ヲ以テ根トス。中焦塞則表モ亦開コト不能。是以蒼朮ノ苦。中焦ヲ平テ根トス。辛味ノ開散スルトラ合シ發汗散風。羌活ト合シ能風濕ヲ散シ。葱白麻黃ト合シ大ニ風寒ヲ散ス。皆蒼朮ノ辛烈ナルヲ以也。白朮ハ補中除濕テ散發ノ勢ナシ。蒼朮ハ辛烈ニ散發ス。故ニ補中

ノ功ハ白朮ニ劣レリトス。發汗。蒼朮ノ辛烈ナル。中焦ヨリ出テ皮ニ達シ。腠理ニ散テ發汗。故ニ發表ノ劑中ニ多用ス。或問。東垣曰。蒼朮能出汗。與白朮止汗特異。用者不可以此代彼。蓋有止發之殊。然ニ王好古。白朮ヲ釋シ云。無汗則發。有汗則止。與黃耆同功。一兩說不同。其故何ゾヤ。曰。諸補者ハ閉塞ノ義アリ。閉則不泄。塞則滿。補益ノ功ヲ致ス。故ニ白朮ハ能中焦ヲ補益スルヲ以テ止汗ノ功アリ。然レ亦或中焦虛シ。肉氣怯シ。出汗不足者ハ白朮ヲ以テ中焦ヲ補テ。裏氣ヲ滿シムル時ハ。出汗ノ力ヲ致ス。根黃耆ハ止汗ノ本藥タリト雖。或表氣怯虛ノ發散ニハ。蒼朮ヲ以テ反テ出汗ノ義ニ同。此皆補テ止汗ノ本。其義ニ或ハ汗ヲ發スト雖。直ニ此ガ發表スルニハ非ナリ。故ニ此ガ要能トスル所ノ者ハ白朮黃耆俱ニ止汗ノ劑トス。蒼朮ハ辛烈直ニ發汗ノ功アルトキハ。實ニ白朮與蒼朮止發ノ功異者也。不可混

治風寒濕痺 蒼朮燥濕發汗 風寒濕ヲ散ノ能 諸痺ヲ治スルノ要藥
トス 王頭痛 張子曰 蒼朮山濕 上中ト皆有 可用ト 然凡蒼朮ハ辛
烈ナリ 中焦ノ本藥ニソ上行ノ氣壯也 故ニ上部ノ風寒濕ヲ散シ 痰
飲氣鬱ヲ解テ 治頭痛 李杲曰 蒼朮別有雄壯上行之氣ト是ナリ
消痰水 蒼朮善燥濕 故痰飲水ノ留滯ヲ消功ナリ 逐皮間風水結腫
風腫與水腫不同 風腫ハ上軀ノ腫盛ニノ按之窩ヲ成テ不起 此風
寒皮間ニ結滯シ 水其間ニ流テ腫者ナリ 論疾診尺篇云 按手足上
背而不起者 風水膚脹也 水腫ハ下軀ノ腫盛ニノ按之隨手腫起
直ニ皮裏ニ水ヲ裹カ如者 此偏ニ水濕ノ邪 皮肉ノ間ニ結滯シ腫者也
水脹篇曰 以手按其臍 隨手而起如裹水之狀 此其候也 蒼朮ハ
水濕ヲ燥シ 風濕ヲ散シ 辛烈ニソ皮表ニ達ス 故ニ皮肉ノ間ノ風結水
結ノ邪ヲ逐テ 諸腫氣ヲ治スルノ要藥トス 除心下急滿 白朮ノ除

心下急滿者ハ中焦不足スルガ故ニ濁陰不能降ノ然ソ治ス 蒼朮
所治ノ心下急滿ハ中焦鬱結ノ胃氣開通セサルガ故ニ然ヲ除ク
腹脹腹痛 蒼朮ハ中焦ニ入テ燥濕解鬱散寒 開滯故ニ腹脹腹痛ヲ
治ス 然凡中焦ノ虛脹 虛痛ノ者ニハ不宜用 若或用之 白朮ヲ王
ノ於蒼朮ヲ佐トス 多用コト勿レ 本草匯云 腹脹痛必有濕也 實邪
者用之則邪散而濕除 即寬若痺悶痛者用之則耗其氣血 燥其精
液 虛火益動而愈悶 不如調其止氣則悶自是而散矣 止霍亂吐下
中焦不足スルガ故ニ升降不通ノ霍亂吐瀉者ハ白朮ニ宜シ 中焦少
陰滯ニ因テ升降不通ノ霍亂吐下者ハ蒼朮ニ宜シ 凡中濕ノ瀉痢
ヲ治スルニ蒼朮ノ功盛也 暖胃消穀進食 蒼朮ハ辛ノ胃口ヲ開キ 温
クノ胃ヲ暖故ニ穀食ノ滯ヲ消テ進食然凡神麴麥芽等ノ直ニ消
食ノ不同 彼ハ直ニ穀食ノ積滯ヲ剋消ス 蒼朮ハ惟暖胃開胃消穀

ヲ噴消スルノ三 治嘔泄冷痢 嘔吐泄瀉ヲ治スルモ亦暖胃中焦ノ爵ヲ
 煖シ寒濕ヲ散スルカ故ナリ 是以屬冷痢病ニハ蒼朮ノ功尤大ナリトス
 濁滯 小便赤白濁 婦人ノ帶下諸因アリテ不同 腎虛ヨリ致アリ 脾
 胃虚ヨリ生者アリ 如此ハ蒼朮ノ主治スル所ナラズ 夫水ハ土ニ從テ行
 且濕ハ濁テ重下故ニ日焦脾胃土ノ濕太過ノ下流スレバ小便因之濁
 下焦因之濁液ヲ生シ 遂ニ帶下小便濁ノ病ヲ致ス 此中焦濕土ノ本
 過ニ屬ノ蒼朮ノ主治スル所ナリ 中虛下虛ノ者ハ安ニ勿用之 腸風本
 便道一血ヲ下者腸風ト号 腸胃ノ風濕ニ因テ下血者蒼朮ニ宜シ
 若脾胃ノ不總血腎虛ノ血液ヲ不治カ故ニ下血者ハ不宜之 大風天
 風ハ癩病也 風寒ノ邪 經絡ニ壅リ 皮肉ヲ腐シテ致者ナリ 蒼朮
 ノ風寒濕ヲ散シ其ノ辛烈發汗ノ勢カヲ以テ大風ヲ療ス 痰癥 蒼朮ノ
 辛温ヲ以テ氣血ノ爵ヲ解ニ功アリ 故ニ痰癥癥瘕ノ滯ヲ除ク 諸癥

諸癥ハ足陽明胃ニ屬ルコト素問癥論ニ詳ナリ 且濕ハ物ヲ濡弱
 ナシムルノ氣タリ 故ニ諸癥多ハ脾胃ノ濕ニ屬シ 又筋月經絡ノ濕
 ニ屬ス 是以蒼朮ノ脾胃ニ行去濕ヲ以テ此癥瘕ヲ治スルノ功ア
 リ 丹溪曰 怪入諸經 疎洩陽明之濕 通行欽瀉大明 曰治筋骨軟弱
 諸爵 蒼朮ノ苦ハ疎辛ハ開散ス 故ニ痰火濕食氣位ノ六爵ヲ解ニ宜シ
 凡脾胃ハ中宮ニ位ノ痰食氣血ノ家タリ 故ニ中氣噴開則何ノ六爵ト
 云コトアラン 蒼朮ノ苦辛能中焦ヲ噴開シ諸爵ヲ解ノ功ヲ出ス 蒼朮
 與香附俱ニ解爵ノ劑タリ 雖其功不同 蒼朮ハ中焦ノ諸爵ヲ開散
 ノ升降ヲ通ス 香附ハ氣爵ヲ噴散スルニ快ノ氣ヲ下コト最速者也
 除寒熱 蒼朮辛烈ニシテ發汗 故ニ寒熱ノ表邪ヲ除ニ宜シ 然元表邪盛
 者ハ蒼朮獨ノ力ニ不及 宜ク發表ノ劑ト合用ニシ 惡氣 一切不正ノ
 惡氣ヲ除ニ勝リ 詳ニ下文ニ見タリ 海山嵐瘴氣災冷阻ハ止也

冷ハ陰陽ノ亂氣ヲ云。火冷ハ天地火感ノ冷氣也。瘴ハ山谷ノ間濕熱
 薰蒸不正ノ氣ヲ云。此山嵐ノ瘴氣也。蒼朮ハ一切不正ノ惡氣山嵐
 瘴疫天地火冷ノ氣ヲ去除ス。疫癘行ノ時。或歲且ニ於テ蒼朮ヲ燒
 則惡疫ノ邪氣其家ニ入コトナシ。張仲景一切惡氣ヲ辟ニ。亦木ヲ以
 猪蹄甲ト同燒烟ニ去ス。赤木ハ蒼朮也。時珍曰病疫及歲且。人家
 往々燒蒼朮以辟邪氣。一吾朝ノ中都宣義坊。天福宮ニ於テ除夜ニ
 木ヲ朮。民家燒之。烟薰シ。歲中ノ火疫ヲ除ト云。亦此義ニ從乎。凡
 山谷濕熱薰蒸ノ地ニ往來シ。或旧廟。或傳尸。疫癘ノ家。或海濱。若久雨
 ノ時。或入火。不在旧屋等ニ至。若ハ皆必蒼朮ヲ燒烟ニ。其不正ノ
 氣ヲ辟ヘシ。男ハ鼻竅ヲ薰。女子ハ陰戸ヲ薰。ヨ。蓋疫氣ノ類ハ男ハ鼻
 竅ヨリ犯シ。女ハ下陰ヨリ入バナリ。或不胃散能。山嵐不正ノ惡氣ヲ去
 モ亦蒼朮ナルヲ以ナリ。蒼朮逐邪辟嵐瘴ノ功ニ長セルコト知ヘシ

總標

蒼朮ハ脾胃ノ藥也。中焦ノ太過ヲ平ケ。且能濕ヲ燥ス。白
 朮モ亦除濕ノ劑タリト雖。彼ハ中焦除濕ノ藥トス。蒼朮ハ
 辛烈ニシ皮膚ニ透シ表ヲ發テ汗ヲ出ス。故ニ蒼朮ハ中焦ノ濕ヲ燥。善
 皮膚ノ濕ヲ散ス。陶節菴ハ味苦恬湯ニ蒼朮ヲ用ハ足太陽ノ濕熱
 ヲ燥シガ爲ナリ。仲景白虎湯ニ蒼朮ヲ用者ハ。濕熱ノ表邪ヲ開發
 セシガ爲ナリ。蒼朮ハ脾胃土ノ太過ヲ平ケ。表濕ヲ散シ。胃ヲ解。邪惡
 ヲ辟ノ
使藥
 葱白。麻黃ノ類ニ合シ善ク。肉皮膚ニ至テ表ヲ散ス。
 黃柏。牛膝ノ類ト合シ善ク。下焦ノ濕熱ヲ治ス。

毒

蒼朮ハ中焦ノ太過ヲ平者也。故ニ中焦ノ虛甚者ハ斟酌スヘシ。○
 中焦燥結者。自汗盜汗多者。精血津液ノ燥耗者。陰分ノ虛火躁
 動者。皆蒼朮ヲ用ニ宜カラス。蓋辛
 烈ニシ善燥シ善散スルガ故ナリ

畏惡

右ノ白朮ト同

附方

食生 飲

食ノ暴。腸胃ニ滯テ生蟲。善生米ヲ食テ飲食ヲ不思。形悴色黃ヲ
治ス。蒼朮米泔ニ浸コト一夜。剉焙爲末。蒸餅ニテ梧子ノ大ニ丸シ。每
服五十丸。食前ニ米飲ニテ用ユ。出揚氏經驗方。[麴木丸]夏月ノ暴瀉
飲食傷ニ属者ヲ治ス。蒼朮米泔ニ浸コト一夜。焙。神麴炒等分爲末。
糊ニテ丸シ。梧子ノ大。每服二三十九丸。米飲ニテ下ス。出局方。[椒木丸]
瘰癧久痢ヲ治ス。蒼朮二兩。川椒一兩爲末。醋糊ニテ梧子大ニ丸シ。
每服二十丸。食前ニ温水ニテ下ス。惡痢久者ニ八角桂ヲ加。出保命集。
取目昏眩。蒼朮半升。米泔ニ浸コト七日。去皮切焙。木賊各二兩爲末。
每服一錢。茶酒ニテ下ス。出聖惠方。[因風牙根腫痛]蒼朮塩水ニ浸。
燒テ性ヲ存シ。研末シ。牙ニ指テ風熱ヲ去。出普濟方。[臍蟲腹中鐵石ノ
如ク臍中ヨリ水流。其水變蟲。身ヲ逸。痒掃。疔不盡。蒼朮ノ濃煎湯
ニテ洗浴シ。蒼朮ノ粉ニ麝香少許ヲ入水ニ調服ス。出益壽方。

愚案

本草家ニ謂。蒼朮ハ皮表ノ濕ヲ去。白朮ハ中焦ノ濕ヲ去ト。
愚案ニ蒼朮白朮俱ニ中焦除濕ノ要劑タリ。白朮ハ補
中ノ功盛。ニテ去濕ノ功ハ蒼朮ニ劣レリ。蒼朮ハ烈ク燥濕且辛烈ヲ
以テ中焦ヨリ皮膚ニ達ノ汗ヲ發シ。善表濕ヲ散ス。豈蒼朮ハ表
濕ヲノミ除テ中焦ノ濕ヲ不除者ナランヤ。白朮蒼朮俱ニ能中焦ノ
濕ヲ除ト雖。白朮ハ中焦ノ濕ヲ除。表濕ヲ散スルコト不能。蒼朮ハ中
焦ノ濕ヲ毛燥シ。表濕ヲ毛開散ス。元素曰。蒼朮與白朮主治同。但此白
朮氣重而沈。若除上濕發汗功最大。若補中焦除脾胃濕力。少不如
白朮。腹中窄狹者。須用之。氣重而躄沈トハ白朮ヲ指除上濕發汗
トハ蒼朮ヲ指。腹中窄狹者。須用之トハ。蒼朮ノ功ヲ云。窄狹ハ俗ニ云。腹
スボル也。愚案ハルニ蒼朮ハ味苦辛。ニ其氣溫烈。若ハ疎テ。雅辛ハ開テ
散ス。腹中窄狹ハ中焦ノ結。鬱收縮ニ属ス。故ニ蒼朮ノ苦辛溫ヲ以テ開

疎寬發せしめて宜す。此中焦ノ結實ニ屬スル者ヲ以テ云。若中氣
 不足ノ不充カ故ニ腹中窄狹ヲ致者アリ。如此ハ蒼朮ニ不充其
 辛温氣烈ヲ以テ中氣ヲ充サラシム。惟白朮ノ沉重ニテ中氣
 ラ補持シムレハ胃氣充中窄狹自快シ。一藥ニ腹中窄狹者ハ蒼朮
 ニ宜トシ賞ヘカラス。且蒼朮白朮主治同ト雖。白朮ハ中氣ヲ不開ノ
 補ヒ蒼朮ハ中氣ヲ開テ表ニ散
 則ニ朮ノ所治豈同キ者ナラシヤ
 ノ粗皮ヲ去。到干乾シ焙用ユ。或土炒ニテ油氣ヲ去。モ良。土炒ノ法ハ
 酢ノ白朮ノ條ニ見タリ。或脂麻ニ拌テ炒。或脂麻ト同蒸。トトニ次
 ノ用コトアリ。脂麻ト同スルハ蒼朮ノ燥氣ヲ制セシガ爲ナリ。或藥店
 ニテ水ニ浸シ粗皮ヲ去。出者ハ其儘用ヘシ。或塩水ニ浸シ炒テ用レハ下
 焦ノ濕熱ヲ去也。○按ニ本草准ニハ糯米泔浸三日ト通玄ニハ米

修治

糯米泔ニ浸コト二日毎
 日水ヲ換テ洗清シ上

泔水浸ニ日ト。和ノ修治纂要ニハ米泔水ニ浸コト春秋ハ二日。夏
 ハ二日。冬ハ四日ト。愚カ家法ハ四時皆浸コト二日ヲ宜トス。浸ニ必
 糯米泔ヲ以ス。時珍曰。以糯米泔浸去其油ト。和藥ノ評議ハ
 酢ノ白朮ノ條ニ見タリ



