

該患者ニ注目スレハ却テ最モ近ク最モ新ラシキ事ヲ遺
 忘スル者トス即チ尺牘或ハ金錢ヲ藏メタル處ヲ忘レ食事
 ニ當テ晝食ナルカ將タ晚餐ナルカヲ想出スルコト克ハス自
 己ノ居室ヲ確知セズシテ他人ノ居室ニ入り喫烟讀書等ヲ
 爲シ毫モ家財什具ノ同シカラザル者アルヲ知ルコトナク室
 主來リテ之ヲ咎ムレハ唯謝シテ而シテ去リ敢テ自ラ之ヲ
 恠ムノ風情ナキ等是ナリ病症漸ク増進スレハ時ト處トチ
 撰ハスシテ濫リニ假睡シ又ハ貴女ノ目前ニ於テ猥褻ノ事
 ナ談シ自己ノ品位ニ適セサル事ヲ行フテ毫モ羞ツルコトナ
 ク傍人之ヲ厭ヒ之ヲ制スルモ微笑シテ顧ミス甚ダシキニ
 至テハ己レノ自由ヲ妨クルトシテ忿怒スルコトアリ此期ニ
 至レバ初會ノ人ト雖モ其ノ精神ノ平常ナラサルヲ知得ル

ナ常トス
 以上ノ精神破壊ト共ニ漸々運動機ノ障害ヲ來シ言語不利
 聲音嘎嘶シテ曩キニ能辨ナリシ者今ハ變シテ明辨トナリ
 談話ニ際シテ吃々スルカ或ハ不明ニシテ傍人之ヲ解スル
 コト克ハサルニ至ル之ニ次ク者ハ歩行ノ障害ニシテ脊隨勞
 ニ於ケルカ如ク筋肉ノ固有力ハ未ダ著シルシク減少セサ
 ルニ患者己ニ行步蹣跚トシテ速カニ疲勞ヲ來タシ動モス
 レハ跌躓ス之レ共働機ノ障害ニ因ルナリ且ツ同時ニ諸筋
 ノ痙攣ヲ發シ口角攣縮舌尖及手指ノ震戰ヲ來タス故ニ談
 話ハ更ニ吃シ書風モ亦變更ス又虹彩ノ可動性減少シテ明
 暗ニ感スルコト遲鈍トナル然レモ該變症ハ通常一側ニシテ
 斯ク侵サレタル瞳孔ハ同時ニ散大スル者トス

此ヨリ以后ノ經過ハ二般ノ徵候即チ精神的障害ト運動機
 障害ノ徵候ヲ呈出シテ益々増悪スル者ニシテ將ニ發來ス
 へキ症狀ヲ順次ニ預言シ得ルナリ乃チ或ル症ニ在テハ此
 ノ時期或ハ尙ホ早ク癲癇様ノ發作ヲ來タシテ精神頓ニ鈍
 麻シ竟ニ高度ノ失神ニ陥ルコアリ又他ノ症ニ在テハ記憶
 力ノ減少益々加ハリテ自他ノ辨別ヲ失ヒ濫リニ他人ノ物
 件ヲ掠取シテ屢法庭ニ引致サルハモ自ラ知ラサルコアリ
 然レモ精神ノ衰弱ハ通常此ノ如ク増進セズ多クハ先ツ甚
 タシキ神思不和ヲ來タシテ夜中安眠セス臥床ヲ去テ室内
 ヲ走行シ高聲ヲ發シテ演說シ翌朝ニ至レハ毫モ夜來シコ
 ト記憶セズ日中ト雖モ近傍ニ人オキモハ往々獨語シテ
 一定ノ計畫或ハ議題ヲ説明スル如キ狀況ヲ呈スルコアリ

其ノ他事ニ應ズル急遽ニシテ深慮スルコト克ハズ一事ヲ爲
 シ卒ラサルニ又他ノ一事ニ移リ晝夜孜々トシテ務ムルモ
 決シテ一事ダモ完結スルコトナシ情義乖戾シテ家人ヲ苛遇
 シ浪費荒淫ニシテ濫リニ貨財ヲ人ニ投與シ娼家ニ豪遊シ
 妄リニ車馬ヲ驅リ或ハ酒食ニ耽リ市街ニ裸袒スル等全ク
 人事ノ節度ヲ脱却シタル時ニ至テ始メテ狂院ニ來ルチ常
 トスル者ナリ
 狂院ニ在テハ患者大抵久シカラスシテ鎮靜スレモ此ノ鎮
 靜ハ決シテ醫家ノ善徵トナス處ノ者ニ非ズ精神ノ衰弱更
 ニ増加シタル標徵ナリ乃チ患者ハ漸ク妄想ヲ生シテ身ハ
 地球上ノ最大有力者ナリト思惟シ己レカ貯フル處ノ金玉
 ハ數百万ニ過キ己カ領地ハ五大洲ニ跨ルト云ヒ己レハ

リウネセサレカリ己レハ佛帝ガボレオンナリ己レハ今
 將ニワレテルロノ戰場ニ在リト稱言ス此ノ如キ妄想ハ
 多クハ漸々ニ増進スル者ニシテ終ニ己レハ救世者タリ天
 帝タルト云フニ至ルヲ常トス之レ本病經過中ノ最高點ニ
 シテ地球上肉體ノ苦痛不如意ハ毫モ感ズルコトナク恰モ天
 國樂土ニ呼吸シテ最快樂ノ生活ヲ送ルト一般ナリ
 前記ノ最高點ヲ通過シタル后ニハ患者ノ妄想ハ漸々鎮靜
 シテ先ツ一定不變ノ性ヲ得了シ胸中ニハ尙ホ烈火ヲ遺存
 スルモ之ヲシテ發焰セシムルコトナク室隅窓邊ニ佇立シテ
 徒ラニ囊裡ノ金玉ヲ胸算スルニ過キス而シテ此時ニ在テ
 ハ數千萬ノ黃金ヲ擲テ數百萬ノ糝ヲ徵集セント欲シ彼
 時ニ在テハ一片ノ白紙一塊ノ蒸餅ダモ分ツヲ惜ム等ノ事

其爲シ己レカ行爲彼此矛盾撞着スルヲ知ラサルナリ此
 如キ神思變換益々甚クシキヲ加エテ益々退縮抑鬱ノ方向
 ニ傾キ患者ノ大妄想ハ終ニ轉換シテ他ノ極端ニ達スルニ
 至ル即チ該患者ハ九天ノ上ヨリ墮落シテ今ハ千尋ノ地極
 ニ到達シ樂土ハ暗夜ニ變シ地球ハ變小シテ一片ノ遊球ト
 ナリ身體モ亦縮小シテ視ル可ラサルニ至リ咽喉塞カリ食
 ヲ取ルコト克ハス肛門閉チテ便ヲ泄スコト克ハスト云フ此ヨ
 リ以後ハ精神ノ喪失駭々トシテ増進シ運動機ノ障害モ亦
 加ヘリ本病ノ初起ニハ唯共働機ノ障害ヲ呈スルノミナリ
 シカ今ハ手筋及ヒ足筋ノ麻痺ニ移行シ糞尿ノ漏泄ハ往々
 不隨意的ニ來ルコトアリ知覺機モ亦初期ニハ減衰スルコト少
 ナクレハ末期ニ至レハ完全ナル知覺脫失ヲ繼來シ觸神及

ヒ温神共ニ早晚消滅スルヲ常トス其ノ他真正ノ幻覺ハ稀
 有ノ症ヲレモ失明ハ麻痺狂末期ノ必發徵候ニシテ嗅神味
 神及ヒ聽神モ同シク往々減衰スル者トス
 嚥下困難ハ末期ノ必發徵候ニシテ患者自ラ飲食スルコ克
 ハ其ノ故ニ他ヨリ之ヲ哺養セサル可ラス往々此ノ時期ニ
 於テ嚥下肺炎ヲ發シテ患者ノ生命ヲ絶ツコアリ然ラサル
 症ニ在テハ衣食起臥共ニ他人ノ扶ケヲ要シ久シク病床ニ
 在ル中ニ褥瘡膀胱炎或ハ腎臟膿瘍ヲ發シテ膿毒症ノタメ
 ニ死スル者アリ癲癩狀ノ痙攣ヲ再發スルカ或ハ延髓麻痺
 ナ發シテ頓死スル者アリ又他ノ症ニ在テハ蔓延性肺炎若
 シクハ肺瘍ニ由テ斃ルコアリ
 以上ハ定型性麻痺狂ノ經過ナリ他ノ麻痺狂ニ在テハ發揚

期久シク持續シテ抑鬱期ニ甚ク短カキ症アリ又之ニ反ス
 ル症アル故ニ麻痺狂ヲ分類シテ癲狂性及ヒ鬱憂狂性ノ二
 種トスル人アリ其ノ他麻痺狂ノ經過中往々輕快ヲ來タシ
 稀ニハ徵候殆ト消散シテ本病ノ間歇スルコアル故ニ裁判
 醫タル者ハ本病ヲ鑑定ニ當テハ克ク此ニ注目シテ疑惑セ
 サルヲ要ス又本病ノ痊治スルコアルハ毫モ疑フ可ラサル
 ノ事實タレモ其ノ症ハ數千人中ノ一二ニ過キス
 麻痺狂ノ經過ハ長短同シカラズ數月ノ短カキアリ又五年
 乃至六年ニ亘ルコアレモ本病患者ノ四分ノ三ハ二年乃至
 三年ニシテ死スルヲ常トス

第六章

(甲) 診斷

前段ノ精神病各論ニ於テ精神病ノ主症ヲ記述シタリト雖
 毛每症必シモ一定不變ノ徵候ヲ呈スル者ニ非ス精神病ノ
 症狀ニ千狀方能ニシテ原因年齡體質若シクハ他ノ景況ノ
 異ナルニ從テ多少其性狀ヲ變スル故ニ時トシテハ何レノ
 種類ニ屬スル者タルガヲ判決シ難キヲ往々之レアリ稀ニ
 ハ尙ホ特發癲狂特發發揚狂急性譫妄等ノ種類ヲ分ツ人ア
 レモ未タ之ヲ以テ精神病全症ヲ總括シ得ル者トナシ難シ
 如シ每症ニ適切ナル名稱ヲ下タザシテ下欲セハ數千百ノ種
 類ヲ分ツト雖モ尙ホ完全ナラス況ヤ精神病ノ名稱ハ多少
 興好色狂放火狂ノ如キ徵候的ノ病名ヲ於テモヤ故ニ

精神病ヲ鑑定スルハ先ツ主トシテ其侵サレタル精神機
 能ト其ノ發育トヲ細密ニ検査シテ一定ノ病症中ニ算入シ
 複雑ナル名稱ヲ用サザルヲ良トス患者ノ既往症ヲ尋問ス
 ルハ固ヨリ必用ノ件ナレド時トシテハ又經過ノ綿密ナル
 検査ヲ經サレハ病症ヲ判別シ克ハサルコトアリ顛狂醫タル
 者ハ必ス精神病入ト懇篤周到ナル談話ヲ交エテ精神ノ狀
 況ヲ洞察スルコトヲ要スル故ニ必ス先ツ患者ノ信用ヲ得サ
 ル可ラズ
 精神狀況ヲ洞察スルハ當テ尤モ緊要ナル件ハ左ノ如シ
 (一) 性狀ノ變更 此ノ變更愈突然ニ來ルハ愈貴要ナル
 精神變調ノ徵候トナス
 (二) 抗抵抗可ラサル意思或ハ想像ノ發來例之疼痛的ノ沈鬱

症狀脅迫想像及ヒ脅迫所行
 (三)原智的ノ性質、笑フヘキノ愚癡原因ヲ有セサル過大ノ
 行爲目的ノ順序トテ失ヒタル行爲及ヒ定時的ニ發作スル
 一定ノ行爲
 精神病人ノ暴行ハ患者必スシモ自ラ其ノ暴行タルヲ知
 ラサル者ニ限ラス鬱憂狂及ヒ意思狂ニ在テハ患者自ラ
 非道ヲ働キ法律ヲ侵スコトヲ明知スレモ其ノ精神ハ決シ
 テ健全ナラス又錯迷狂者ニ在テハ精神ハ外見的健全ナ
 ルモノ其ノ實ハ智力ノ危重ナル障害アリテ存ス
 (四)原因、遺傳、往時ノ腦患(小兒時ノ瘧疾及ヒ腦膜炎)奇異敏
 捷ナル性質及ヒ癲癇性ノ病狀ハ尤モ緊要ナル標徴ナリ
 精神病ノ擬似ハ尤モ至難ナリ殊ニ癲狂及ヒ鬱憂狂ノ擬似

ニ至テハ詐病者ノ體力持久セズシテ其ノ症狀長ク摸倣
 スルコト克ハサル故ニ多クハ錯迷狂若シクハ失神ヲ擬似ス
 ル者ナレモ學識經驗ニ富メル醫士ハ克ク數様ノ精神懦弱
 症ト詐病トヲ鑑定シ得ル者トス眞正ノ精神病人ニ在テハ
 固ヨリ自己ノ思想ノ狂妄ナルヲ知ラサル故ニ之ヲ他ノ思
 想ト共ニ胸中ニ收藏シテ敢テ濫リニ妄想ヲ説カサレモ詐
 病者ニ在テハ法庭或ハ醫士ノ目前ニ於テハ故サテニ妄想
 ヲ發露スルヲ常トス
 匿病モ亦許多ノ錯迷狂及ヒ自殺ヲ企圖スル鬱憂狂ニ在テ
 ハ往々看ル處タル故ニ醫士タル者ハ綿密周到ナル洞察ヲ
 遂ケサル可ラス

(乙) 預後

腦中ニ器質的障害ノ存在スル者即チ解剖的組織ノ損傷シタル者ハ預後一般ニ不良ナリトス故ニ麻痺知覺脫失失語症等ハ險惡ナル合併症ナリ之ニ反シテ生理的思考作用ノ尙ホ完全ナル症ハ預後愈佳良ナリ其ノ他預後ナト定スルルニ當テ着目スヘキ件ハ左ノ如シ

(一) 遺傳 遺傳性ノ素因愈分明ナル者ニ在テハ預後愈不良ナリ殊ニ遺傳性ノ變質症ハ多クハ不治ナリ然レモ變質症ヲ除クノ他ハ輕症ナレハ遺傳性ヲ有スルモ容易ニ治スルコアリ

(二) 年齡 生理的ノ化育時期即チ春機發動期更年期及ヒ老人期ニ發シタル精神病ハ他ノ時期ニ發シタル症ニ比スレ

ハ預後一般ニ不良ナリ

以上ノ三期ヲ除クノ他ハ年齡愈低ケレハ預後益々佳良ナリホイト氏ノ統計ニ據レハ二十年ヨリ三十年ノ間ニ發シタル精神病百人中男子ニ在テハ八十六人女子ニ在テハ九十一人ノ痊治ヲ視タリト云フ

(三) 生計ノ狀況 貧人營養不良ナル人酒客及ヒ房事過度ニ陥リタル人ノ精神病ハ之ニ反スル狀況ヲ有スル症ニ比スレハ預後不良ナリ

鬱憂狂及ヒ癲狂ノ經過整然タル者ハ預後多クハ佳良ナレモ錯迷狂及ヒ進行性麻痺ハ治スル者少ナシ又急性失神ハ痊治ニ轉歸スルノ症多シ其ノ他患者ノ感情尙ホ遺存シテ自己身心ノ平常ナラサルヲ多少知覺スル間ハ預後ハ比較

的佳良ナリ
 精神病ノ經過ニ至テハ病症ノ持續愈短カキ者ハ預后モ亦
 從テ佳良ナリ鬱憂狂ノ一少年以上持久シタル者ハ大抵痊
 癒ヲ望ム可ラス
 食餌嫌厭ノ存スル者ハ預后多クハ不良ナリ食料輸入ノ不
 充分ナル故ニ直接ニ全身ノ營養ヲ害スルト嚙下肺炎ヨリ
 シテ肺壞疽ヲ繼來スル傾キアルトニ因ルナリ
 急性躁狂ニ在テハ體質健全ニシテ克ク食餌ヲ攝取シ狂躁
 劇甚ナラズ脈博増加セス體温ノ亢進セサル者ハ預后佳良
 ナリトス
 經過中病症ノ緩解シ或ハ間歇スル者ハ之ニ反スル症ニ比
 スレハ預后佳良ナリト思惟スヘシ又病症ノ間歇スル者ニ

精神病前之十四

在テモ症狀ノ漸々ニ緩解スル者ハ分利的ニ消散スル者ニ
 比スレハ預后佳良ナリ症狀ノ消散急速ナル者ハ多クハ再
 發シ易キ故ナリ定時狂及ヒ回歸狂ハ遺傳ニ起因スル者ト
 然ラサル者ト夫間ハ大抵治スルコトナシ然レモ解剖的ノ
 障害即チ貧血梅毒又ハ癩癩ヲ存スル者ハ適當ナル治療ヲ
 施コセハ輕快シ罕レニハ痊愈スルコトアリ
 狂院ニ投シタル精神病人中痊愈ニ轉歸スル者ハ從來ノ統
 計ニ據レハ百分ノ三十八乃至四十五ノ間ニ在リ

(丙) 治術
 精神病ハ治療スル所ニ當テハ必ズ先ツ各人各症ニ就キ
 テ其不遠因及ヒ近因ヲ洞察シ現症及ヒ體質ヲ參照シテ以

テ現在ノ症狀ヲ誘起シ及ヒ保持スル處ノ主因ヲ撲滅シ若シクハ之ニ由テ來ル處ノ主徵ヲ改良スルヲ務ムヘシ精神病人ハ治術ヲ施スト愈早ケレハ奏効モ亦從テ善良確實ナリトス又精神病ノ治術ハ殊ニ耐忍ヲ要スル者タル故ニ一定ノ治術ヲ始メタルモハ數週日ニシテ効ヲ奏セサルモ決シテ之ヲ中止ス可ラズ必ズ確乎不拔ノ氣象ヲ以テ其ノ目的ニ到達スルヲ務ムヘシ精神病ハ感冒或ハ急性發疹等ノ如ク數日ノ培養ニテ發生シタル者ニ非サル故ニ之ヲシテ痊癒ニ至ラシムルニモ亦許多ノ日月ヲ要スルハ論ヲ俟スシテ明ラカキリ

精神病ノ特效藥ハ吾人未ダ之ヲ知ラス唯精神病人ヲ治療スルニ當テハ其ノ疾患ニ罹リタル腦漿ヲシテ安息セシム

ルヲ最大緊要ノ件トス故ニ精神病人ニ對シテハ濫リニ人情道理ヲ説キテ故サラニ衰弱變調シタル腦ヲ刺戟ス可ラズ務メテ諸般ノ刺衝物並ヒニ腦漿及ヒ身體ヲ毀傷スヘキ傾キアル諸感應ヲ避クルヲ要ス初期ノ鬱愛狂ハ恰モ網膜炎患者ノ如ク之ヲシテ只暗室ニ棲息セシムルモ已ニ症狀ノ緩解ヲ來サズ者トス之レ狂院ノ必要タル所以ナリ狂院ハ一種ノ貴要ナル醫療物ニシテ諸般ノ刺衝物ヲ防禦シ從來疾患ニ罹リタル思想方向ヲ中斷シ若シクハ變換スルノ効アリ又狂院ニ在テ患者ニ適宜ノ作業ヲ與フルハ最モ有益ノ件トシ園藝書畫及ヒ奕棋等ハ尤モ適當ナル消日法タル也其ハ他適當ナル滋養物ヲ與エテ全身ノ營養ヲ改良シ貧血ヲ快復スルハ最モ緊要ニシテ往々意外ニ佳良ナル

効驗ヲ呈スル者トス

治療總論

(一)誘導療法ハ腦充血ニ起因スル興奮及ヒ刺戟症狀ニ應用

(二)刺絡ハ往時精神病ニ賞用シタル治術ナレトモ從來ノ經

験ニ從テハ身體ノ營養ヲ損害シ經過ヲ險惡ナラシムル

害アリ故ニ唯強壯ナル患者ニシテ危險ナル急性腦充血

ヲ呈スル處ノ症ニノニ應用スヘシ之ニ反シテ水蛭ハ兩

側ノ耳后ニ大抵各十五條ヲ貼用スレハ多クハ直チニ刺

戟症狀ヲ鎮靜スルノ効アリテ營養ヲ損スルノ恐レナシ

(三)水罨法ハ腦充血ニ著明ナル奏功アリ温浴ニ併用スレ

ハ更ニ確實ナリ然レモ稀ニハ水罨法ヲ施シ室内ヲ暗黒

ナラシムルモ尙暴狂躁ノ減退スルコト少ク却テ更ニ増劇

スルコトアリ之レ水罨法モ知覺過敏ナル患者ニ於テ刺

戟ノ効用ヲ呈スル故ナリ此ノ如キ場合ニ在テハ之ヲ撤

去シ后来再ヒ試ムルヲ良トス

(四)温浴攝氏ノ三十五度ヨリ三十七度ニ至ルハ誘導ト鎮

靜ノ効アリ數時間持續スルヲ良トス芥子脚浴及ヒ大ナ

ル芥子泥ヲ脚部ニ貼付スルモ亦然リ但シ此法ハ心臟ノ

虛弱ナル人ニハ禁忌スヘシ

(五)下劑ハ持久シテ使用スルヲ要スル故ニ腸ヲ甚タシク

刺戟セサル者ヲ撰用スルコト癲狂患者ハ多クハ便秘ヲ兼

ズル者タル故ニ唯其ノ通利ヲ調節スルコトヲ旨トスヘシ

決シテ峻下劑ヲ亂用シテ患者ノ營養ヲ徒ニ毀損ス可ラ

殊ニ貧血性ノ人ニ於テ然リト定期ニ洗腸法及ヒ蘆
蒼苦土鹽等ハ尤モ適當ナリ
(ホ)痘瘡軟膏ヲ顛頂ニ貼付スルカ又ハ肩胛部ニ貫線打膿
術ヲ施スハ殊ニ進行性麻痺ニ賞用スル處ノ法ナリ

(二)鎮靜療法

(イ)阿片及ヒ其ノアルカロイド殊ニ莫爾非涅及ヒ亞剎莫
爾非涅ハ精神の疼痛ヲ有スル症ノ療法ニ欠ク可ラサル
藥物ナリ阿片療法ノ適症ヲ枚擧スレハ知覺機亢盛(依
昆埜兒性ノ鬱憂狂貧血或ハ房事過度ニ起因スル衰弱性
神經症及ヒ腦貧血ヲ兼ヌル諸般ノ不安症ナリ急性ノ腦
充血症殊ニ躁狂ニ在テハ一般ニ阿片療法ヲ禁忌スレ
躁狂却テ衰弱ノ原因トナリテ危險ノ恐レアルキニ破

格的ニ阿片ヲ要スルナリ
阿片丁幾ハ一回ノ量ヲ十滴乃至二十滴トナシ一日三回
乃至三四回投與シ奏功ナキキニハ漸々ニ増量シテ六十
滴ニ達シ一日ニ同量ヲ三回乃至四回迄使用スルヲ得
ル

莫爾非涅ハ常ニ皮下注入料トシテ使用シ〇〇一瓦ヨリ
始メ漸々增加シテ〇一瓦乃至尙ホ以上ニ至ルヘシ阿片
及ヒ莫爾非涅療法ノ通則ハ主トシテ患者ニ定期ノ投藥
ヲ爲シ漸々ニ増量シテ各人固有ノ飽和點(鎮靜)ニ達スル
ニ在リ又將ニ來ラントスル處ノ發作ヲ撲滅セント欲ス
ルキニハ必ズ發作前或ハ發作ノ初發徵候ヲ呈シタルキ
ニ投藥スヘシ然ルキニハ漸々ニ藥量ヲ減スルモ尙ホ發

作防禦シ得患者トス
 莫爾非涅ノ皮下注入ニ由テ稀ニ來タル處ノ偶發症狀ハ
 腦充血、紅疹、皮膚痒癢及ヒ嘔吐ナリ極メテ稀ニハ突然虛
 脱ニ陥リ再ヒ回生セサルコアリ之レ各人ノ特異性中毒
 症ニシテ呼吸及ヒ血行中樞ノ麻痺ニ基ツク者タリ故ニ
 莫爾非涅ヲ使用スルニハ必ス先ツ少量ヨリ始メ患者ガ
 莫爾非涅ニ對スル感受性ヲ試験スヘシ決シテ卒爾ニ多
 量ノ莫爾非涅ヲ投與ス可ラス

(B)亞篤魯比涅及ヒ莨菪越幾斯ハ往々莫爾非涅或ハ阿片
 併用シテ偉効ヲ奏スルコアリ一回ノ量ハ〇、〇〇〇五
 乃至〇、〇〇一瓦ナリトス莨菪越幾斯ハ往時ハ幻覺ノ特
 効藥トシテ使用サレタリシカ當時ハ殆ト之ヲ單用スル

(ハ)非沃斯質亞密涅ハ一回ノ量〇、〇〇三乃至〇、〇一瓦ニ
 シテ往々著明ナル鎮靜効用ヲ呈スルコアリ殊ニ奇異ノ
 癖ヲ有スル慢性及ヒ次急性癲狂ニ於テ然リトス其ノ中
 毒症狀ハ共動機障害、咽頭痒癢、腰痛、數脈及ヒ頭痛ナリ稀
 ニハ突然ニ來ルコアル故ニ注意スヘシ

(ニ)抱水格魯刺兒ハ睡眠ヲ誘起スレ共莫爾非涅ノ如キ鎮
 靜ノ効ナシ一回ノ量ハ一、〇乃至三、〇瓦ナリ多量ノ格魯
 刺兒ハ突然ノ心臟麻痺ヲ發スル恐レアリ殊ニ動脈ノ亞
 的魯麻變性及ヒ心臟ノ脂肪變性アル症ニハ決シテ之ヲ
 用ユ可ラス
 (ホ)亞硝酸アミールハ癩癩、偏頭痛、胸廓苦悶及ヒ喘息ニ用

其テ効アリ一回ノ量ハ四滴乃至六滴ナリ然レモ効用ハ
 多クハ持久セズ一時乃至二時ニシテ消散スル故ニ再々
 投藥ヲ要スルノ煩アリ
 (一)實莖荅利私ハ急性ノ興奮症ニシテ脈搏不整頻數トナ
 リ心機甚タシク亢盛シタル者ニ用ヰテ鎮靜ノ効アリ殊
 ニ阿片ニ併用スルチ良トス禁忌ハ胃加多兒及ヒ淫欲亢
 盛ナリ
 (二)臭素加里ハ近年尤モ賞用スル處ノ鎮痙藥ニシテ殊ニ
 反射機能亢盛神經過敏精神不安及ヒ癲癇歇私的利神經
 痛並ヒニ淫欲亢盛ノタメニ興奮シテ躁狂ノ發作ヲ呈ス
 ル處ノ症ニ偉効アリ臭素加里ハ數月若シクハ一年以上
 持久ニテ使用スルチ良トス一日ノ量ハ四乃至十五瓦ナ

其テ臭素加里ハ久シク服用スレハ往々粉刺血瘍ヲ發シ稀
 ニ全身衰弱加之消削ヲ來タスコアリ其ノ他極メテ稀
 ニ發來スル處ノ腦症狀ハ神思遲鈍記力減少及ヒ步行蹣
 跚ナリ
 就尋安息ハ衰弱及ヒ貧血ノ患者殊ニ衰弱シタル鬱愛狂
 者ニ賞用スル處ノ法タリ
 隔室分離ハ知覺過敏ノ患者ニ適用スル法ニシテ室内チ
 適度ニ暗黒ナラシムレハ更ニ其ノ効力ヲ増ス者トス然
 レモ幻覺ヲ有スル患者ハ却テ公衆中ニ放置スルチ良ト
 ス例之幽囚狂ニシテ幻覺アル者ハ之ヲ眷族或ハ他ノ公
 衆中ニ放還シタルノミニテ已ニ治スルコアリ
 往時一般ニ賞用シタル脅迫療法ハ方今殆ント敗滅ニ歸

シズリ其ノ主要ナル者一ハ脅迫衣ニシテ后方ニテ扣鈕ヲ掛ケ袖長キカ故ニ狂暴ヲ働クハス二ハ廻旋椅子ニシテ患者ヲ之ニ倚ラシメ頻回廻旋シテ患者眩暈ノタメニ鎮靜スルニ至ル以上ハ皆野蠻的ノ療法ニシテ全ク無用ナリ然レモ罕ニハ患者ノ狂躁ヲ制スルタメニ之ヲ臥床ニ緊縛スルヲ要スルコトアリ

(三)變調療法 (emulsive Heilmittel) トハ患者ニ突然不意ノ侵襲ヲ加エテ神経系統ヲ振動シ之ニ由テ從來ノ神経感應ヲ變調セシムルヲ云フ冷水ヲ不意ニ患者ノ頭部若シハ全身ニ灌漑スルハ則チ其一ナリ又小量ノ吐酒石ヲ特久シテ投與シ絶エス嘔氣ヲ誘起シテ鎮靜セシムルノ法アリ亞剝莫爾非涅〇〇〇六乃至〇〇〇八瓦一回ノ極量〇〇〇一八瓦

ニシテ一日ノ極量ハ〇〇三瓦ナリ)ヲ皮下ニ注入スレバ暫時ニシテ嘔吐ヲ來タシ爾后忽チ半時乃至五時間ノ睡眠ヲ來タス者トス

莫爾非涅ヲ持久增量シテ使用シ患者ノ稍慣習シタル時期ニ至テ頓ニ之ヲ中止スレバ神経系統ノ劇甚ナル振盪ヲ來タシ痙攣ヲ發シ遂ニ虚脱ノ狀況ニ陥イリ從來狂躁シタル癲狂患者モ之カタメニ鎮靜スルコトアリ然レモ此法ハ往々危険ノ恐アル故ニ克ク注意スヘシ

(四)刺戟療法トハ衰弱或ハ弛緩シタル腦ノ活機ヲ喚起スルヲ云フ爰ニ賞用スル醫療物ハ左ノ如シ

(イ)龍腦 一日ノ量ハ〇一乃至〇三瓦ナリ往時ニ諸種ノ懦弱症ニ賞用セリ

(四) 鱗 一日ノ量ハ〇〇〇五乃至〇〇一五ナリ丸劑トシ
 テ懦弱症殊ニ進行性麻痺ニ賞用シ往々偉効ヲ奏スル故
 ニ必ク之ヲ試ムベシ
 (五) エルゴナン即チ水製麥奴越幾斯ハ血管ノ弛緩ニ起因
 スル處ノ興奮症ニ偉効アリ
 (六) 斯篤里規尼涅モ亦エルゴナント同一ナル症ニ投シテ
 往々効ヲ奏シタルコアリ
 (ホ) 冷水療法ハ尤モ貴重ナル刺戟物ナリ十五度乃至二十
 度ノ冷水ヲ以テ全身ヲ洗濯摩擦シ爾后直チニ乾燥シタ
 ル綿布ヲ以テ皮膚ヲ摩擦シ少シク潮紅スルニ至テ一時
 間許痒ニ就キ温包シテ安臥セシム此ノ療法ハ手淫或ハ
 房事過度ニ起因シタル鬱憂狂ニシテ消化不良全身弛緩

ヲ兼タル症ニ偉効アリ
 (ニ) 頭部灌漑ハ急性時期ヲ經過シタル後半月乃至一ヶ月
 間持久シテ施行スルチ良トス然レモ貧血甚ダシキ症ハ
 總テ冷水療法ニ耐エサル故ニ妄リニ斷行ス可ラス
 (ト) 電氣ニ從來効ヲ奏シタルト少ナシ進行性麻痺ニハ平
 流電氣ノ導子ヲ兩側ノ顳顬部ニ貼シテ頭腦ヲ横徑ニ流
 通セシム又脊髓機能ノ過敏ナル症ニハ消極導子ヲ脊背
 ニ貼シ積極導子ヲ他ノ末梢部ニ貼シ幻聽アル症ニハ消
 極導子ヲ乳頭突起ニ他ノ導子ヲ他部ニ貼シテ鎮靜スル
 ノ効アリ感傳電氣ハ唯局處刺戟物トシテ麻痺及ヒ知覺
 脱失ニ使用ス
 (五) 精神療法トハ患者ノ精神方向ヲ轉換シテ鎮靜ニ歸セシ

ムルヲ云フ精神病ハ遺傳或ハ他ノ素因並ヒニ許多ノ誘因アリテ漸々養成シタル者タル故ニ之ヲ治療スルキニ當テハ總テ其原因タル者ハ可及的之ヲ除去スルハ治療ノ大眼目ナリ故ニ精神病人ハ可及的疾病ニ罹リタル眷族ヲ離レテ狂院ニ投スルヲ良トス周圍ノ人及ヒ生活法ヲ頓ニ轉換シタルノミニテ已ニ佳良ノ成績ヲ得ルコトアリ又狂院ニ在テ一定ノ適當シタル作業ニ從事スルハ大ニ精神ヲ轉換スルノ方便ナリ醫士ノ精神療法ヲ施コスニハ大ニ忍耐ト慈愛トヲ要シ且ツ患者ノ信用ヲ得テ良友タルヲ要スル故ニ應對交話共ニ伶俐灑落ナラサル可ラス妄想ニハ決シテ急劇過激ニ抗抵ス可ラス徐々ニ患者ノ腦裡ヨリ除去スルコト計ルヘシ不潔ナル患者ハ一日數回沐浴セシメテ漸ク清

淨ヲ好ムノ心情ヲ養成スヘシ

治療各論

(一)恐怖感覺ハ數多ノ精神病人ニ於テ看ル處ノ症ナリ其ノ原因及ヒ所在ニ從テ處置スヘシ胸廓苦悶及ヒ肋間神經痛ニ基ツク者ニハ心窩ニ格魯々保兒謨ヲ擦入スルカ或ハ莫爾非涅ヲ注入スヘシ肺充血ニ基ツク者ニハ胸壁ニ芥子泥ヲ貼シ温浴ヲ取ラシメ或ハ平流電氣ヲ用ユヘシ腦ヨリ來ル處ノ恐怖ハ就寐安息ニ由テ輕快スルコトアリ格魯刺兒及ヒ臭素加里療法モ亦之ヲ輕減ス腦鬱血ニ基ツク者ニハ耳后ニ水蛭ヲ貼スルカ或ハ手浴及ヒ脚浴ヲ取ラシムヘシ

(二)不眠症 恐怖感覺及ヒ知覺過敏ニ基ツク者ニハ莫爾非

(一) 涅或臭素加里投與之腦貧血ニ基ツク者ニハ鎮劑及
 ビ興奮劑(龍腦或ハ酒精飲料)ヲ投スヘシ腦充血ニ基ツク
 者ニハ頭部ノ氷囊耳后ノ氷蛭或ハ熱キ脚浴ヲ撰用スヘ
 シ麻睡劑ヲ止テ得ザルノ場合ニ非サレハ用ユ可ラス其
 ノ他不眠症ニ在テハ總テ晚餐ヲ節減セシメ就寐ノ時限
 ニテ大抵稍空腹ヲラシムルヲ度トスヘシ
 (二) 食餌嫌厭 格魯兒酸加里ノ溶液(五百倍ノモノ)ヲ以テ頻
 回含嗽セシムレハ往々食餌ヲ嫌厭セサラシムルニ至ル
 可アレモ稀ニハ胃唧筒ヲ用テ壓制的ニ食餌ヲ輸入スル
 (三) 法要タルコトアリ直腸ヨリノ滋養灌腸ノミヲ以テ營養ヲ
 保持スルハ甚ク難シトス失神患者ノ飲食ヲ得サル者又
 (四) 食事ヲ忘却シ或ハ患者ニ在テハ小兒ノ如ク之ヲ哺養セ

サル可ラス而シテ嘔下スルコト克ハサル者ニハ胃唧筒ヲ
 以テ食餌ヲ輸入スヘシ
 (四) 抑鬱症ノ療法 此療法ニハ安息ヲ最大緊要トスル故ニ
 在院ニ投セシムルヲ良トス鬱憂狂ノ自宅ニ於テ痊癒セ
 シハ稀ナリ在院ニ在テハ適宜ノ作業ヲ賦課シ微温浴ヲ
 取ラシメ時々散步セシムヘシ之ヲ要スル場合ニ在テハ
 臭素加里若シクハ莫爾非涅ヲ投ス痴鈍性ノ鬱憂狂及ヒ
 身體ノ甚クシク衰弱シタル患者ニ在テハ全身ノ營養ヲ
 改良スルコトヲ計ルヘシ又鬱憂狂者ハ動モスレハ自殺ヲ
 企テツル故ニ必ズ嚴重ニ之ヲ監視セサル可ラス快復期
 ニ在テハ專ラ精神療法ヲ施コスヲ良トス
 (五) 興奮症ノ療法 此ノ症モ亦安息ヲ要スル者ニシテ殊ニ

他人ト分離シ獨居セシムルヲ良トス決シテ作業ヲ取ラシム可ラス劇甚ナル興奮ニ在テハ室内ヲ暗黒ニシテ頭部ニ氷嚢ヲ貼置シ或ハ又少シク瀉血スルカ若シクハ下劑ヲ投シテ偉効ヲ奏スルコアリ酒客ニハ少量ノ酒精飲料ヲ與エ食餌ハ滋養多キ品物ヲ撰用スヘシ脅迫療法ハ唯止ヲ得サルノ場合ニ在テノミ撰用スヘシ心悸亢盛シタル者ニハ實荳荅利私ヲ投シ精神過敏ナル症ニハ注意シテ阿片若シクハ莫爾非涅ヲ與フヘシ姪欲亢盛ニハ臭素加里ト龍腦ヲ配伍シテ投ス

定時狂及ヒ回歸狂ハ甚タ治シ難シ通常狂院ニ棲息セシメ之ヲ要スル場合ニ在テハ嚴重ノ監視ニ附スルヲ良トス

(六) 進行性麻痺ノ療法 平流電氣療法ヲ最モ良トス其ノ他隣或ハ亞砒酸ヲ持久シテ服用セシムヘシ本病ノ快復ハ蓋シ望ムヘキ者ニ非サレモ往々著シルシク輕快スルコアリ

(七) 續發懦弱症ノ經過中往々躁狂ノ發作ヲ來タスコアリ故ニ醫タル者ハ常ニ預メ之レヲ備ヘ發作中ハ克ク之ヲ監視シ若シクハ分離スヘシ此ノ如キ症狀ハ久シカラスシテ消失スル故ニ瀉血等ノ如キ療法ヲ施コス可ラス唯頭部ニ氷嚢ヲ貼ズルヲ良トス

急性失神ハ適當ナル精神療法ニ由テ痊治スルコアリ特發錯迷狂及ヒ遺傳性變質作用ニ基ツク處ノ精神病ニハ殆ト治術ナシ唯對症療法ヲ施コスノミナリ

凡精神病人ニシテ梅毒ヲ患ヒタル者ニハ假令現在其ノ
 徴候ヲ看スト雖モ梅毒療法ヲ怠ラズ可ラス塗擦法ヲ尤
 モ長トス
 精神病人ノ手姪ハ甚ク治シ難シ器械的ノ緊縛法ハ多ク
 ハ無効ナルノミナラス却テ刺戟ヲ増悪スルノ恐れアリ
 唯誠實ナル精神療法ヲ施ユシテ臭素加里ヲ兼用スルヲ
 尤モ有益ナリトス婦人ノ手姪ニ在テハ克ク瞳孔ヲ検査
 シテ異物蟻虫或ハ他ノ疾病アリテ刺戟症狀ヲ保持セサ
 ルカヲ搜索シ如シ之アルキニハ其ノ改良ヲ計ル可シ
 精神病ノ預防法ハ主トシテ身體ト精神ノ發育ヲ恰好調和
 セシムルニ在リ健康ナル身體ニ健康ナル精神寓スルトハ
 古人ノ確言ナリ殊ニ遺傳性ノ神經質ニ在テハ勉メテ體質

ノ改良ヲ計リ已ニ小兒期ヨリ神經過敏ヲ緩和スルヲ務
 メ冷水浴ヲ應用シテ組織ヲ強固ナラシムヘシ此ノ如キ兒
 童ニ在テ尤モ注意ヲ要スルハ春機發動期ナリ即チ飲食起
 臥ヲ整然タラシメ總テ身體ノ營養ヲ害スル處ノ感應ヲ避
 ケ精神ノ興味ヲ實學實驗ニ向ハシメ(直覺教授)決シテ小説
 稗史ヲ讀ミ虛想空談ニ入ラシム可ラズ又神經虛弱ノ人ニ
 過大ノ學課ヲ與エテ精神系統ヲ衝動スルヨリハ寧ロ之ヲ
 寛容シテ無病ナルヲ愈レルニ如カサルヲ旨トスヘシ第二
 ノ要點ハ兒童ノ競争心ト道德心トヲ平等ニ養成スルニ在
 リ決シテ濫リニ進取力ヲ培養シテ意馬駑々止マル處ヲ知
 ラサルニ至ラシム可ラス癲癩ノ素因アル小兒ニ在テモ其
 ノ自恣強情ヲ漸々壓制緩解スレハ之ヲ預防シ得又已ニ發

シタル癲癩モ父母タル者早ク此ニ注意スレハ痊愈スルコ
 アルヲ以テ之ヲ證スヘシ
 其他曾テ精神病ニ罹リタル人及ヒ精神病ノ遺傳ヲ有スル
 人ノ婚姻ヲ禁スルコトヲ得ハ精神病ハ大ニ減少スヘシ精神
 病ハ多クハ遺傳ニ出ツル者タレハナリ然レモ醫士タル者
 ハ甲ノ男子ト乙ノ婦人ヲ配偶セハ之ヨリ生スル子孫ノ預
 后如何ノ問題ニ至テハ假令男女共ニ遺傳ノ素因著明ナリ
 ト雖モ決シテ之ヲ否拒スルノ權ナシ唯危険ナル配偶ハ之
 ナ勸奨セサルヲ以テ自己ノ義務ト思惟スヘシ

精神病論終

明治十九年六月三十日版權免許
 全二十年一月出版

定價拾錢

纂譯兼出版人

朽木縣士族

江口

神田區猿樂町貳番地



發兌

島村利



日本橋區馬喰町貳丁目五番地

書林

同支店

本郷區春木町三丁目一番地

25


242

100

100

100

100



21

781

(M)

059139-000-0

21-781

精神病学

シュウレ/著

M20

CBE-0027

