



續名醫類案卷三十一

錢塘魏之琇編集

海昌王士雄孟英  
定州楊照藜素園 同校

癰疽

李東垣治通父家翟梗于尻鷄上足太陽經生癰堅硬腫痛大作左右尺脈俱緊按之無力羌活黃柏各二錢防風藁本連翹各一錢肉桂七分甘草蒼朮陳皮各五分當歸一錢黃耆一錢五分酒二大盞水一大盞煎至一盞去渣空心熱服以夾被蓋覆其癰使藥行罷去之一服愈。

予族叔父平生多慮質弱神勞年近五十忽右膊外側廉上  
生結核身微寒熱而易怒食味頗厚脈之俱弦大浮數而  
重按似澁曰此多慮而憂傷血時在初秋勿輕視之宜急  
補以防變症以人參一斤作膏下以竹瀝病者吝費招一  
外科以十宣五香散閒與服旬日後一日大風拔木病者  
發熱神思不佳急召視之核稍高大似有膿于中起一紅  
線延過肩後斜走繞背脊過入右脇下不痛覺肩背重而  
急迫食有嘔意脈同前但弦多耳作人參膏合芎朮生薑  
汁飲之用人參二斤瘡潰膿乾又與四物湯加參朮陳皮  
甘草牛夏生薑百餘帖而安此等若在春令雖神仙不治

也幸而在秋金之令不幸因時下暴風激起木中相火而  
致此自非參膏驟補何由得免

朱朗年四十餘惡寒發熱右腿內廉厥陰分生一腫毒此是  
冷折熱在肺經血分與此方。莫仁黃藥子赤芍歸頭條芩  
各三錢青皮角刺桂枝各二錢甘草節一錢分四帖煎服  
一盞入忍冬藤汁二蛤殼食前飲以忍冬藤渣敷腫上。  
呂孺人惡寒發熱腹上有小疽此血少有熱與此方白朮川  
芍各三錢赤芍連翹各二錢半防風陳皮黃芩各二錢木  
通錢半甘草五分分五帖煎服

鄭經厯性嗜酒與煎燉年五十餘忽春末夏初患額絲竹空

涌出一角。長短大小如雞距稍堅。求治曰此非膏梁所致而何宜斷厚味。先解食毒。針灸以開泄壅滯。未易治也。此少陽經所過。氣多血少者。鄭以憚煩召他醫。以大黃朴硝。腦子等涼藥。卷之一夕豁開如醬。蚶徑三寸。一二日後血自蚶中濺出。高數尺而死。此涼藥外逼。熱鬱不得發。宜其發之暴如此也。

陳自明外科精要云。神仙截法。治癰疽發背一切惡症。預服則毒氣不入內。真麻油一斤。銀石器內熬。十數沸候冷用酒兩碗入油五盞。通口熱服。一日用盡。緩則數日服之。吳安世云。吾家三世用之。無有不驗。又云。獘者云。凡中藥箭

急飲麻油藥毒卽消鄭學諭德甫屢用之甚驗

薛立齋治一男子患癰腫硬疼。痛發熱煩躁。飲冷脈沈實大便祕。乃邪在臟也。用內疏黃連湯疏通之。以絕其源。先投一劑。候行一次。勢退二二。再進一劑。諸症悉退。乃用黃連

消毒散四劑而消。

一男子患癰。膿熟不潰。欲針之。補以托裏。不信。乃服攻毒藥。及致惡心少食。始悟而用針。更以六君子湯加藿香當歸。四劑少可。再以加味十全大補湯數劑而愈。凡瘡膿熟不行針刺。膿毒侵蝕。輕者難療。重者不治。老弱之人或偏僻之處。及緊要之所。若一有膿。宜急針之。更以託裏。庶幾無

變

一男子患癰作痛服寒涼藥痛雖止而食愈少瘡亦不潰以六君子湯而食進再以託裏藥潰之而愈大抵瘡疽之症寒熱虛實皆能作痛熱毒之痛者以寒涼之劑折之寒邪之痛者以溫熱之劑散之因風而痛者除其風因溼而痛者導其溼燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補之實而痛者瀉之膿鬱而閉者開之惡肉侵蝕者去之陰陽不和者調之經絡閉滯者利之慎勿概用寒涼之藥况血脈喜溫而惡寒若冷氣入裏血卽凝滯反爲難瘥矣

馮楚瞻治趙翁年七十二右頰腫硬連及頤項耳後一片堅

實不熱不痛已兩月餘諸治不效漸至口內出膿牙噤不開飲食少進精神日衰脹則洪大而空知爲元氣大虧陰寒所聚所謂石疽是也不得陽和何以外解若內潰日久穿喉破頰不可療矣乃用豬脂搗爛入玉桂細末葱頭食鹽杵勻厚敷患處敷藥以脂膏治血肉同氣相應也葱能透竅鹽能軟堅桂能行血油能浸潤皮膚內則空心生脈飲送八味丸食遠志參著歸芍芥朮薄桂銀花角刺之類使陽回則陰寒自解血氣沖和自能逐毒三五日後冰硬者熱軟漫腫者高聳木者疼痛紫者紅活飲食日進血氣漸長毒既外出久凝久瘀之血肉消者消膿者膿不再有

而愈。

張景岳治一儒者年近三旬素病聾耳發必潰膿至是益甚  
自耳根下連頸項上連頭角耳前後莫不腫痛或與散風  
降火一月後稠膿鮮血自耳迭出每二三日必出鍾許而  
腫痛全不消枕不可近察其形色已大不足而腫痛則若  
有餘脈之或急或緩弱此非實熱可知遂先與六味湯二  
三劑元氣稍振繼與一陰煎加牛蒡代芩澤瀉倍加白蒺  
藜爲君服五十餘劑外用降癰散晝夜敷治兩月而後愈  
蓋此症雖似潰瘍有餘而實以肝腎不足上實下虛一奇  
症也何奇

張通府耳後髮際患腫一塊無頭肉色不變按之微痛彼以爲痰結核其脈軟而時見數經云脈數不時見則生瘡也非痰結仲景云微弱之脈主血氣俱虛形精不足又云沈遲軟弱皆宜託裏遂以人參白朮黃耆當歸川芎炙草以託裏少加金銀花白芷桔梗以消毒彼謂不然內飲降火化痰外帖涼藥覺寒微腦患處大熱頭愈重飲食愈少復請治以四君子湯加藿香炮干薑數劑飲食漸進膿成刺之更以十全大補湯去桂及炙草貼以豆豉餅又月餘而愈

胡生耳後寸餘發一毒名曰銳疽焮痛發熱煩躁喜冷此膽

經蘊熱而發先用神仙活命飲一劑勢減二三時值仲冬。  
彼惑於藥有用寒遠寒之禁故不再服自用十宣散託裏  
之藥勢漸熾耳內膿潰復請治視其喉腫閉藥不能下而  
歟

一婦人年逾四十近環跳穴生一毒尺脈沈緊腿不能伸經  
曰脾寒移于肝癰腫筋攣夫脾主肉肝主筋肉溫則筋舒  
肉冷則筋急遂與乳香定痛丸治之少愈更以助胃壯氣  
血藥二十餘劑而消

一婦人倏傷次指成膿不潰焮痛至手誤敷涼藥以致通焮  
微嘔少食彼以爲毒氣內攻診其脈沈細此痛傷胃氣而

然也。遂刺之服六君子湯加藿香當歸食進更服八珍湯。  
加黃耆白芷桔梗月餘而愈。又一後生亦患此色黑不痛。  
其指已死欲令斬去速服補劑恐黑上臂不治彼不信另  
服敗毒藥手竟黑遂不可救。又一男子亦傷拇指色紫不  
痛服託裏藥及炙五十餘壯作痛潰膿而愈。又吳舉人幼  
女因凍傷兩足至春發潰指俱壞遂去之服以大補藥而  
愈。又藍上舍女患嵌甲傷指年餘不愈日出膿數滴謂足  
大指乃肝脾二經發源之所宜灸患處使瘀血去陽氣至  
瘡口自合否則不治彼忽之不早治後變勞症而歿蓋至  
陰之下血氣難到若女人患此又多因扎縛致血脉不通。

或被風邪所襲。則無氣血榮養。遂成死肉。惟當壯其脾胃。  
行其經絡。生其血氣。則愈。其有成破傷風。以致牙關緊急。  
口眼喎邪者。先以玉真散一二服。然後投以通經生血之  
劑。

于御郎骸胛患毒痛甚。服消毒藥。其勢未減。卽以槐花酒一  
服。勢隨大退。再以託裏消毒之藥而愈。

立齋曰。子丙子年。忽惡心。大稚骨。甚痒。須臾臂不能舉。神思  
甚倦。此天疽危病也。急隔蒜灸之。痒甚愈。又明灸五十餘  
壯。痒遂止。旬日而愈。精要云。灸法有回生之功。信矣。大凡  
蒸灸。若未潰。則拔引鬱毒。已潰。則接補陽氣。祛散寒邪。瘡

口自合。其功甚大。其法用大獨蒜。切片如三錢厚。貼疽頂上。以艾炷安蒜片上灸之。每三壯一易蒜。若灸時作痛。要灸至不痛。不痛要灸至痛方止。大概以百壯爲度。膿潰則以神異膏貼之。不日而安。一能使瘡不開。二內肉不壞。三瘡口易合。見效甚神。丹溪云。惟頭爲諸陽所聚。艾壯宜小而宜少。

王大廣年逾六十。素厚味。頰頸患毒。未潰而肉先死。脈數無力。胃經積毒所致。致頰頰正屬胃經。未潰肉死。則胃氣虛極。老人豈宜患此。辭不治。果歿。內經云。膏梁之變。足生大疔。受如持虛。

黃履素曰子座師茅五芝先生長公子子京偶于腎間患一  
毒地非要害直易視之子京素知醫恐痛傷元氣輒服人  
參其毒愈甚發寒熱乃始延醫又遇粗工潰後胸懣應服  
參者又不能多假竟致不能收口而歿蓋癰疽初起先宜  
瀉毒而後議補若補之太早遂有此禍可鑒也

邱汝誠面生疽卽買藥鋪肆所含神芎散丸予之曰以此療  
之其人怒不肯服歸而告人人曰未必非良法也服之卽  
瘥蓋其人嗜酒此丸實去酒病云

揮麈新談

彭羨門少宰傳治腫毒初起方用雞子用銀簪插一孔用明  
透雄黃二錢研極細未入之仍以簪攬極勻封孔人飯內

蒸熟食之日三枚神效錄

居易

前宦都令李聘說。麥粉不拘多少。用陳醋熬膏。貼無名腫毒。  
神效。雄按此名烏龍膏。麥粉乃洗麩造麵筋澄下之粉也。

徐靈胎曰。瘍科之法。全在外治。其手法必有傳授。凡辨形察色。以知吉凶。及先後施治。皆有成法。必讀書臨症。二者皆到然後無誤。其升降圍點。去腐生肌。呼膿止血。膏塗洗熨等方。皆必純正和平。屢試屢驗者。乃能應手而愈。至於內服之方。護心託毒。化膿長肉。亦有真傳。非尋常經方所能奏效也。惟煎方則必視其人之強弱陰陽。而爲加減。此則必通於內科之理。全在學問根柢。然又與內科不同。蓋煎

方之道相同。而其藥則有某毒主某藥。某症主某方。非此不效。亦另有傳授焉。故外科總以傳授爲主。徒恃學問之宏博無益也。有傳授則較之內科爲尤易。惟外科而兼內科之症。或其人本有宿疾。或患外證之時。復感他氣。或因外症重極。內傷臟腑。則不得不兼內科之法治之。此必平日講於內科之道。而通其理。然後能兩全而無失。若不能治其內症。則并外症亦不可救。此則全在學問深博矣。若爲外科者。不能兼。則另請明理內科。爲之定方。而爲外科者。參議於其間。使其藥與外證無害。而後斟酌施治。則庶幾兩有所益。若其所現內症。本因外證而生。如痛極而昏。

暈膿欲成而生寒熱。毒內陷而脹滿。此則內症皆由外症而生只治其外症而內症已愈。此又不必商之內科也。但其道甚微。其方甚眾。亦非淺學者所能知也。故外科之道。淺言之則惟記煎方。數首合膏園藥幾料。已可以自名一家。若深言之。則經絡臟腑氣血骨脈之理。乃奇病怪疾千態萬狀無不盡識。其方亦無病不全。其珍奇貴重難得之藥。亦無所不備。雖遇極奇極險之症。亦了然無疑。此則較之內科爲更難。故外科之等級高下懸殊。而人之能識其高下者。亦不易也。

曰外科之法最重外治。而外治之中尤重園藥。凡毒之所最

忌者散大而項不高。蓋人之一身。豈能無七情六慾之伏。火風寒暑溼之留邪。飲食痰涎之積毒。身無所病。皆散處退藏。氣血一聚而成癰腫。則諸邪四面皆會。惟圍藥能截之。使之併合。則周身之火毒不至矣。其已聚之毒。不能透出皮膚。勢必四布爲害。惟圍藥能束之。使不散漫。則氣聚而外洩矣。如此則形小項高。易膿易潰矣。故外治中之圍藥。較之他藥爲特重。不但初起爲然。卽成膿收口。始終賴之一日不可缺。若世醫之圍藥。不過三黃散之類。每試不效。所以皆云圍藥無用。如有旣破之後。而仍用圍藥者。則羣然笑之。故極輕之。毒往往至於散越。而不可收拾者。皆

不用圍藥之故。至於圍藥之方，亦甚廣博。大段以消痰拔毒，束肌收火爲主。而寒熱攻提和平，猛厲則當隨症去取。世人不深求至理，而反輕議圍藥之非安，望其術之能工也。

神授衛生湯治一切瘡症。能宣熱散風，行瘀活血，解毒消腫。

疏通臟腑

徐靈胎曰：其法不外此四句。

藥性和平，功效甚速。誠外科首

用方也。羌活八分，搜風。發表勝溼，防風。勝溼解表，去風。白芷發表散風，熱活血，排膿。穿山甲土炒研，沈香，紅花，散結消腫。排膿瘡家聖藥。連翹石決明，煅各六分。金銀花，皂角刺，歸尾，甘草節，生肌止痛。花粉太寒，不可用。破後口渴者。

可用以上各一錢。乳香五分。大黃酒浸炒一錢。脈虛便利者勿用水二碗煎。八分病在上部。先服藥。隨飲酒一杯。病在下部。先飲酒一杯。隨後服藥。以行藥勢。徐靈胎曰。其方之分量亦最宜斟酌得中。除大黃共一兩零五分。此外科之主方加減不外乎。此又曰外科與內科大不相同。內科之病千頭萬緒。一病必有一病之主方。外科不遇託毒清火。及生肌長肉等數法耳。卽有加減亦惟隨症選擇幾味無多法也。學者果能將藥性細細參考。自能隨症施治。投無不利。

繆仲淳治疗疽。及一切腫毒方。生甘菊連根打碎一兩五錢。

紫花地丁五錢。甘草用水炙三錢。鼠粘子炒研一錢五分。  
括蔥根二錢。貝母三錢。金銀花五錢。白芷一錢五分。生地  
三錢。白芨三錢。連翹一錢五分。五爪龍卽茜草五錢。先用  
夏枯草六兩。河水六碗煎三大碗。去渣入煎藥一碗。不拘  
時服。潰後加鹽水炒黃芪五錢。麥冬五錢。

又圍陰症瘡瘍方。紅藥子四兩。白芨一兩五錢。白斂一兩五  
錢。乳香六錢。沒藥六錢。硃砂三錢。雄黃三錢。麝香一錢。冰  
片一錢。黑狗下頰一個。煅存性。豌豆粉一兩。各另研極細。  
末和勻。以醋蜜調敷四圍。以極滾熱醋蘸潤亦可服。

# 腦疽

薛立齋治一男子患腦疽，其頭數多痛不可忍。先服黃連消  
毒散不應，更以忍冬酒服之，卽酣睡覺而勢去六七。再四  
劑而消又一。男子所患尤甚，亦令服之，腫痛頓退。但不能  
平加以黃耆當歸瓜蔞白芷甘草節桔梗數劑而愈。

舉人潘光甫，年四十，患腦疽，焮腫，診其脈沉靜，謂陽症陰脈。  
斷不起。已而果然，蓋瘡瘍之症，雖屬心火，尤當分表裏虛  
實。巢元氣充實，內有實火者，寒劑或可責效。若寒涼過度，  
使胃寒脾弱，陽變陰，或結而不潰，潰而不敏，陰陽乖戾，水

火交爭死無日矣。

一老婦患腦疽，稟壯實，潰而痛不止，脈實便祕，與清涼飲二劑而痛止，更以消毒託裏藥而愈。

一老人患此症，色赤腫痛，脈數而有力。與黃連消毒散二劑少愈，更以清心蓮子飲四劑而愈。

一男子患此症，腫痛脈數，以黃連消毒散二劑少退，以仙方活命飲二劑而止。更以菖歸白芍銀花知柏而潰，又以託裏藥而愈。

一男子頭項俱腫，雖大潰，腫痛益甚，兼作瀉，煩躁不睡，飲食少思，其勢可畏。診其脈毒尚在，與仙方活命飲二劑，腫痛

退半。與二神丸及六君子湯加五味麥冬棗仁四劑。諸症少退。飲食少進。睡亦少得。又與耆苓白朮散數服。飲食少進。又與十全大補湯加銀花白芷桔梗。月餘而瘥。

一老人面赤腫痛。脈數而有力。與黃連消毒散二劑。少退。更與清心蓮子飲四劑而消。

一婦人患此症。膿熟不潰。脹痛欲嘔。飲食少思。急針之。與託裏藥而愈。又一婦人患之。不甚痛。不作膿。以託裏消毒散。膿成針之。補以託裏藥而愈。

一老人患此症。膿清兼作渴。脈軟而濇。以爲氣血俱虛。用八珍湯加黃耆五味子。彼不信。乃服降火之劑。果反作嘔。少

食始信服香砂六君子湯四劑嘔止食進仍投前湯四劑而愈

一男子患此症膿成未潰兼作渴尺脈大而無力以四物湯加知柏麥冬黃耆四劑而渴減又與加味八味丸渴止瘡潰更用託裏藥兼前丸而愈

一男子患此症腫痛脈數以荆防敗毒散二劑而痛止更以託裏消毒藥而消

一男子患此症焮腫疼痛發熱飲冷脈洪數與涼膈散二劑而止以金銀花四劑散而潰更以託裏藥而愈

一老婦患此症裏實潰而痛不止脈實便祕而清涼飲二劑

而止更以託裏消毒藥而愈

一男子患此症腫硬不作膿惟瘡口出水痛甚以仙方活命飲二劑痛止而膿成針之更以託裏藥而愈常治膿清而補不應及不痛或木悶堅硬者俱不治

一男子患此症膿將成微痛兼渴尺脈大而無力此陰虛火動之症彼謂心經熱毒自服清涼降火藥愈繼復求治乃以四物湯加知柏五味麥冬黃耆及加減八味丸渴止瘡潰更以託裏藥兼前丸而愈中藏經云癰疽瘡腫之作皆五臟六腑畜毒不流非獨榮衛壅塞而發其行也有處其主也有歸假今發于喉舌者心之毒皮毛者肺之毒肌肉

者脾之毒骨髓者腎之毒發于下者陰中之毒發于上者陽中之毒外者六腑之毒內者五臟之毒故內曰壞外曰潰上曰從下曰逆發于上者得之速發于下者得之緩感于六腑者易治感于五臟者則難治也觀此則疽發于腦者乃膀胱腎脈陰氣不足陽火熾盛而出也豈可耑泥于火而不滋益陰氣耶

一男子耳後漫腫作痛肉色不變脈微數以小紫胡湯加芎歸桔梗四劑腫少起更以託裏消毒散數劑脈滑數此膿已成矣宜針之彼畏而不肯用因痛極始針之出膿碗許以託裏藥兩月餘始愈凡瘡不起者託而起之不成膿者

補而成之使不內攻。膿成而及時針之。不數日卽愈矣。當見患者皆畏針痛而不肯用。又有恐傷良肉而不肯用。殊不知瘡雖發于肉薄之所。若膿成其腫亦高寸餘。瘡皮又厚分許。用針深不過二分。若發于背腫高必有三四寸。入針止寸許。况患處肉已壞矣。何痛之有何傷之慮。怯弱之人又患附骨疽。待膿自通以致大潰不能收斂。氣血瀝盡而亡者多矣。用針之法

一男子素不慎起居飲食。腦忽焮赤腫痛。尺脈洪數。以黃連消毒散二帖。濕熱頓退。惟腫硬作痛。以仙方活命飲二帖。腫痛悉退。但痛頭不消。投十宣去桂加銀花藁本。曰木茯。

苓陳皮以託裏排膿。彼欲全消。自製黃連消毒散二帖。反腫硬不作膿。始悟仍用十宣。加白朮。茯苓半夏。腫少退。乃去桂。又四劑而膿成。膿勢亦退。繼以八珍散。加黃耆五味麥冬。月餘膿潰而愈。夫苦寒之藥雖治陽症。尤當分表裏虛實次第時宜。豈可始末悉用之。然焮腫赤痛。尺脈數按之。則濡乃膀胱溼熱壅盛也。故用黃連消毒散。以解毒除溼。腫硬作痛。乃氣血凝滯不行而作也。遂用仙方活命飲。以散結消毒。破血。其瘡頭不消。蓋因熱毒薰蒸。氣血凝滯而然也。宜用甘溫之劑。補益陽氣。託裏以腐之。況此症原屬督脈經陰。虛火盛而出。若不審其因。專用苦寒之劑。使

胃氣弱。何以腐化收斂。幾何不致于敗耶。凡瘡之易消散。  
易腐潰。易收斂。皆氣血壯盛故也。

汪太常太夫人年逾八十。腦疽已潰。發背繼生。頭如粟。許脈  
大無力。此膀胱經溼熱所致。夫脈無力。乃血氣衰也。遂以  
託裏消毒藥數服。稍可。更加參耆之劑。雖起而作渴。此氣  
血虛甚。以人參黃耆各一兩。當歸熟地各五錢。麥冬五味  
各一錢。數服渴止。而不潰。以前藥加玉桂十餘劑。膿成針  
之。瘀肉漸腐。徐徐取去。而膿猶清不歛。投以大劑十全大  
補湯。加白斂貝母。遠志三十餘劑。膿稠而愈。凡患者氣質  
素實。或有痰。不服補劑。不知膿血出多。氣血並虛。豈不宜

補賞治瘡陰用參耆大補之劑。陽用敗毒之名與服之。服不中滿。瘡亦有效。虛甚者尙加薑桂及附子也。

一男子患腦疽腫高作痛。腫處敷藥痛雖止。而色變黯。腫外作痛。仍敷之。肉色亦黯。喉肉不痛。不腫。此爲涼藥所誤。及盡頸敷之。其頸皆潰而死。

朱丹溪治元杜清碧學道武夷。至婺源病腦疽。自治不愈。朱往視之曰。何不服防風通聖散。清碧曰。服數次矣。朱曰。盍以酒製之。清碧乃悟。服不盡劑而愈。自此心服丹溪。續醫說

竇材治一人病腦疽。六日危篤。不進飲食。竇曰。年高腎虛邪氣滯經也。令服救生湯。卽刻減半。夜間再進一服全安。

一老婦腦後作痛筋拘急竇曰此欲發腦疽也急服救生湯。

三服全愈

# 鬚疽

薛立齋治一男子患鬚疽焮腫作痛發熱以小柴胡湯加連翹金銀花桔梗四劑而消。

一男子因怒後鬚際腫痛發熱以小柴胡湯加連翹銀花花粉桔梗四劑根畔俱消惟瘡頭作痛以仙方活命飲二劑痛止膿成針之更以託裏消毒藥而愈。

一男子頭面焮腫作痛時仲冬脈弦緊以託裏溫經湯汗之。

而愈。

一男子患此症腫痛寒熱拘急脈浮數以荆防敗毒散二劑表症悉退更以託裏消毒散潰之而安。

一男子患此症膿熟不潰脹痛針之而止更以託裏消毒散而愈。凡瘡膿熟不潰屬氣血虛也若不託裏必致難瘥。

一男子患此症作膿焮痛發嘔少食以仙方活命飲一劑而止以六君子湯加當歸桔梗角刺潰而愈

一男子患此症膿清不斂以託裏散加乳香麥冬而斂

一老人患此症腫痛發熱膿清作渴脈軟而濇此血氣俱虛也欲補之彼見作渴發熱乃服降火之劑果作嘔少食復

求治投六君子湯四劑。嘔止食進。仍用補藥月餘而愈。夫患者。臟腑血氣上下各有虛實。況陰症似陽。陽症似陰。豈可以發熱止渴而概用寒涼之劑。常治患者。正氣虛邪氣實。以託裏爲主。消毒佐之。正氣實邪氣虛。以攻毒爲主。託裏佐之。正氣虛邪氣實。而專用攻毒。則先損胃氣。宜先用仙方活命飲。託裏消毒散。或用灸法。俟邪氣退。正氣復。再酌量治之。大抵正氣奪則虛。邪氣勝則實。蓋邪正不並立。一勝則一負。其虛不待損而自虛矣。若發背膿疽方毒及患在四肢。必用灸法。拔引鬱毒。以行瘀滯。尤不可專于攻毒。診其脈而辨之。庶不有誤。

一男子患此症腫焮痛甚發寒熱服十宣散愈熾診之脈數而實此表裏俱有邪也以荆防敗毒散加岑連大黃二劑少愈更以荆防敗毒散四劑而消大抵瘡瘍之症腫焮痛甚寒熱往來或大便祕結小便淋漓心神煩悶恍惚不寘皆邪熱之實也豈可補哉東垣云瘡疽之法其受之有意外之別治之有寒溫之異受之外者法當託裏以溫劑反用寒劑則是皮毛始受之邪引入骨髓受之內者法當疏利以寒劑反用溫劑託裏則是骨髓之病上徹皮毛表裏通潰共爲一瘡助邪爲毒苦楚百倍輕則危殆重則死矣趙宜人年逾七十患癰疽已潰焮腫痛甚喜冷服實大便祕

海東垣云煩躁飲冷身熱脈大精神昏悶者皆臟腑之實也遂以清涼飲一劑腫痛悉退更以託裏消毒藥三十餘劑而平若謂年高潰後投以補劑實實之禍不免矣

維陽俞黃門年逾三十冬月鬚患毒腫焮煩躁便祕脈實此膽經風熱壅上而然也馬氏云瘡瘍之症熱壅而不利者大黃湯下之遂以一劑便通瘡退更以荆防散敗毒散二

劑再以十宣散去桂加花粉銀花數劑而愈大宗伯羅公耳後髮際患此焮痛脈緊數以小柴胡湯加桔梗牛蒡銀花四劑而愈

# 頤疽

薛立齋治高舉人年逾三十夏月熱病後患頤毒積日不消氣息奄奄脈診如無飲食少思大便不禁脈經云脈息如無似有細而微者陽氣衰也齊氏云飲食不入大便滑利腸胃虛也遂以六君子湯加炮羌肉豆蔻破故紙數劑瀉止食稍進更加以黃耆當歸肉桂潰而稠水清稀就于前藥每服加熟附子一錢數劑食進膿亦漸稠再以十全大補湯用酒芍加白斂月餘而痊

# 項癰

薛立齋治一守施為祿患項毒膿已成，因畏針，歟延至胸，色赤如霞，其脈滑數，飲食不進，月餘不寐，肢體甚倦。此氣血虛而不能潰也。乃針之，膿出，卽睡覺而思食，用託裏藥兩月而愈。劉靈素虛患此，不針，潰透頸頬，氣血愈虛，竟不救一婦人項患癰，焮痛發寒熱，以荆防敗毒散二劑少愈，以小柴胡湯加連翹、牛蒡、桔梗四劑而消。

一男子項患毒潰而作痛，以參耆地黃芎歸補之而止，更以八珍湯加黃耆、桔梗三十餘劑而愈。

馬元儀治沈氏婦，頸項間患瘡痛甚，躁煩發熱，晝夜不眠，多方不愈。診之，兩脈浮大沈小，此陽明氣血交虧之候也。陽明之氣一日一夜五十周于身，而血隨之。氣虛血滯，則病生焉。況所現皆血虛氣衰之症，較之熱毒有餘者殊矣。用黃耆一兩，當歸五錢，人參三錢，炙草七分，紅花五分，調補氣血四劑而安。

張子和在西華寄食，子夏官人宅，忽項上病，一病狀如白瘡，瘡腫根紅硬，以其微小不慮也。忽故人見邀，以羊羔酒飲，雞魚醃蒜皆在焉。張以故人不能辭，又忘禁忌，是夜瘡大痛不可忍，項腫及頭，開口發狂言，目見鬼神。夏君甚懼，欲

報其家。張笑曰。請無慮。來日當平。乃以酒調通經散六七錢。下舟車丸百餘粒。次以熱麵羹投之上。涌下泄。一時齊作各去半盞。明日日中瘡腫已平。二日膿出而愈。

朱丹溪治王姑丈七十餘患項疽。脈實而稍大。此因憂悶而生太陽經。治之歸頭二錢。黃柏一錢五分。黃耆羌活地黃酒岑桔梗各一錢。酒連連翹防風。生甘草。人參陳皮防已澤瀉各五分。白水煎服。

柴嶼青治夏同司鑲黃旗覺羅諱瑪德。患對口人。皆謂之落頭疽。難治。柴以爲無害。服藥五十日而愈。後某公亦患前症。亦服藥五十日而安。

姚應鳳診一人項生瘡求治應鳳曰是天蛇頭瘡宿因也三

年頭當自落而癧竟如其言

仁和縣志

# 肩癧

薛立齋治一男子肩患毒癰痛飲冷煩躁便祕脈數而實以清涼飲二劑少愈以金銀花散四帖悉退又以十宣散去桂加天花粉銀花數帖瘡潰而痊此脈與症皆有餘也。

一婦人癸卯冬失物發怒缺盆內微腫甲辰春大如覆碗左肩胛亦腫肉色如故或針出鮮血三碗許腹痛如錐泄瀉不止四肢逆冷嘔吐惡寒或時發熱絕食已七日矣其脈

洪大時或微細。此陽氣脫陷也。用六君加炮羌三錢。附子二錢早服至午不應。再劑加附子五錢。熟睡覺來諸症頓退。六七少進稀粥。再四劑諸症悉退。飲食如故。缺盆始痛。針出清膿二椀許。諸症復至。此虛極也。以十全大補加羌桂附各一錢。三劑而安。後減羌桂附各五分。與歸脾湯兼服五十餘劑而愈。

人舍陳履學之丙。先從左肩下一點寒。三日後右肩下發一曰。瘡腫如甌盅紅如酒盞。自用消解涼藥一劑不散。次投十宣散四劑。加痛畧紅。次連投參耆丁桂防芷之劑。膿潰後惡心嘔吐。頭暈不上厥逆。寒戰鼓牙。虛汗項平。膿清此

投解散涼劑之快。急洗去圍藥，投以參耆歸芍地黃、羌附  
大劑一服。原從左肩下舊寒一點先熱起。又進一服遍腫  
浮熱。腫高膿稠兼紅烏金膏數日出腐筋如脂膜大小數  
片。日進前藥二服。參耆投至八錢。踰兩月始安。愈後時以  
燙厥。卽投參耆歸木羌附大劑乃甦。

一男子肩患毒瘍。痛飲冷煩躁便祕。脈數而實。以清涼飲二  
劑少愈。以金銀花散四劑悉退。又以十宣去桂加天花粉  
金銀花數劑瘡頭潰而痊。

一婦人肩下患毒脈弦緊。以白芷升麻湯二劑表症已退。更  
以託裏藥潰之而愈。

一男子素弱肩患腫欲內消服涼藥反致作瀉少食以二神  
丸及香砂六君子湯加肉豆蔻而瀉止食進又以託裏藥  
而腫亦消。

一男子肩下患疽已數日漫腫微痛頭甚多皆如粟許色不  
變不起發此氣血虛也診其脈果然先以仙方活命飲二  
劑殺其大勢更以託裏藥而起發瘡頭雖潰但流血水氣  
血尙虛不能爲膿也彼欲服大乙錠子謂此藥止能攻毒  
不能託裏不信仍服之至四次飲食不進瘡色黑陷吃逆  
不絕胃氣虛極也不治強投溫中健脾之劑不應而死  
一男子肩患毒腫硬作痛惡症迭見用白礬末二錢糊丸以

葱頭七莖煎湯調下。腫痛悉退。再服諸症亦退。更以仙方活命飲二劑出水而消此祕方名于金化毒湯曰礬末葱湯調服因未難服故易爲丸一方主治瘡疽不問腫潰先用此藥三二服後用消毒藥甚效常治芻蕘之人用此卽退不用託裏藥亦愈蓋此熱毒爲患血氣不虧故也若因金石毒藥發疽者尤效蓋礬又能解金石之毒也一方用礬末五錢硃砂五分。熟酒下亦效此藥託裏固內止瀉解毒排膿不動臟腑不傷氣血有益無損其藥易得其功甚大偏僻之處不可不知此方或蟲犬所傷溶化熱塗患處更以熟酒調末服皆效。

福泉黃更部肩患毒發熱惡寒大渴煩躁似有餘之症其脈雖大而無力卻屬不足用當歸補血湯治之愈

王喬年逾三十肩患毒以人參敗毒散一劑更以十宣散去參桂加銀花花粉四劑而潰因怒動肝火風熱上壅頭面赤腫燉痛飲冷以荆防敗毒散加芩連薄荷二劑不應急砭患處出黑血蓋許仍以一劑勢退大半再進人參敗毒散四劑而愈夫病有表裏上下之殊治有緩急攻補之異若不砭刺毒氣結于內裏藥不能及燉腫日甚使投峻利之藥則上熱未除中寒已作必傷命矣

一上舍肩患疽脹數以槐花酒一服勢頓退再與金銀花黃

著甘草十餘劑而平槐花治溼熱之功最爲神速。若虛寒之人不可過劑。

王洪緒治姚氏女年二十九小產月餘左肩手搭處先發一  
毒周尺有五半月背添一毒上下長一尺三寸上闊下尖  
皆白陷十日後始延治熱甚篤連服陽和湯三劑能起坐  
五劑自能便溺十二劑其續發者全消先發之搭手亦消  
剩瘡頂如碩子大不痛而潰四日收功後云背上如負一  
版轉舒不快以小金丹十九每日三進全愈。

# 臂 瘰

陽明經風熱邪之症用桔梗升麻湯二劑外邪頓散用託  
裏消毒散二劑腫痛頓退乃用補中益氣散湯調理形氣  
漸復而愈。

一婦人臂患腫惡寒不作膿以十宣散六劑而潰以託裏散  
數劑而瘳。

一婦人臂腫未成膿飲食少思遇勞作痛發熱以補中益氣  
湯二劑痛少止補氣血健脾胃藥而消。

一婦人臂患毒腫硬咽喉壅塞四肢逆冷發寒熱以五香連  
翹湯二劑頓愈以瘡科流氣散四劑而消。

一男子臂患癰，脈弦緊有力。以白芷升麻湯二劑，頓退。又二劑而消。

一男子臂患癰，不作膿。炙以豆豉餅及飲託裏藥三十餘劑而潰，又月餘而瘳。

一婦人患臂癰，瘡口紫陷，膿清不斂。彼以爲毒未盡，欲服攻毒之劑，謂瘡瘍之症。腫起堅硬，膿稠者實也。腫下軟慢，膿稀者虛也。遂以附子餅炙之。及飲十全大補湯百劑，始愈。

西蜀彭黃門大安人，臂痛數年。服活絡丹二丸而瘥。

朱丹溪治從叔平生多慮，質弱神勞。年近五十，忽左膊外側，腋上起一小紅腫，大約如栗。曰：慎勿輕視。且先與人參大

料作湯。二三斤爲好。彼未之信。慢進小帖。數服未解而止。  
旬餘。值大風拔木。瘡上起一道紅綫。繞至背胛。直抵右肺。  
肋。曰必大料人參。少加川芎陳皮。白朮等補劑。與之後。與  
此方。兩閱月而安。

東垣曰尹老家素貧。已四歲十月初寒。形志皆苦。于手陽明  
大腸經分出癰。初有癩。痏其臂外。皆腫痛。先腫在陽明。左  
右寸脈。皆短中得之。俱弦。按之洪緩有力。此癰得自八風  
之變。以脈斷之。邪氣在經脈之表。其症大小便如故。飲食  
如常。腹中和。口知味。知不在裏也。不惡風寒。止熱躁脈不  
浮。知不在表也。表裏既和。邪氣止在經脈之中。內經曰。凝

于經絡爲瘡癰。其癰出身半已上風從上受之故知是八  
風之變爲瘡者也。宜治其寒邪。調其經絡中血氣。使無凝  
而已。以白芷升麻湯療之。一服而愈。炙甘草升麻桔梗白  
芷當歸稍生地黃生黃芩酒黃芩連翹黃芪肉桂紅花右  
咬咀水酒各大盞半同煎服愈。

薛治王揮使臂腫一塊不痛不赤。惟脈軟懶。食時嘔。以六君  
子加藿香酒芍。嘔止食進。再以八珍湯二十餘劑。成膿刺  
之。又以十全大補而愈。次年傷寒。後此臂仍腫微痛。乃傷  
寒餘毒也。無表症但虛弱。先用十宣散四劑。取參芪菖歸  
扶助元氣。防風桔梗白芷厚朴行散腫結。玉桂引經破血。

腫退三四。再以八珍湯膿潰而愈。至冬臂復作痛。因復祛風藥。反筋攀痛甚。此血虛不能養筋。筋虛不能束骨。遂以加味十全大補而愈。

一室女臂患腫潰久不斂。寒熱交作。五心煩熱。飲食少。思月水不通。與逍遙散八珍湯。經行瘡愈。一婦人月水不行。潮熱咳嗽。肌體日瘦。胸膈不利。頸腫一塊。日久不消。亦服前藥。熱退腫消。經行而愈。

宋琰年逾三十。臂患癰潰而不痛。膿稀脈弱。丹溪云。疽潰深而不痛者。胃氣大虛。而不知痛也。東垣云。膿水清稀。瘡口不合。氣血俱虛也。當以大補藥治。彼不聽。服消毒藥。氣血

虛甚遂不救。丹溪云：纔見腫痛參之脈症虛弱，便與滋補氣血無虧，可保終吉。又云：潰瘍內外皆虛，宜接補爲主。

王時亨年逾四十，臂患毒瘍，痛作嘔，服託裏消毒藥，愈甚。以涼膈散二劑頓退，更以四物湯加芩連四劑而消。

王文遠臂患毒瘍，痛服寒涼藥，遂致食少，大便不實，以理中丸二服，更以六君子湯加砂仁、藿香治之。再以託裏藥，膿潰而愈。夫凡瘡痛甚者，如裏厚有火，則宜苦寒之劑。若裏薄者，則宜補中益氣湯，加芩連之類，在下加黃柏。人肥而瘡作痛者，用荆防羌獨之類，蓋取其風能勝溼也。

方云：起臂生一疽，膿潰百日方愈，中有惡肉突起，如蠶豆大。

月餘不消醫治不效。因閱本草得劉涓子鬼遺方用烏梅  
肉燒存性研敷試之一日夜去其大半再上一日而平乃  
知世有奇方如此。遂留心搜刻諸方始基于此方也。本草綱目

# 乳癰丸子巖

薛立齋治一婦人因怒兩乳腫兼頭痛寒熱此肝經氣鬱症  
也。用人參敗毒散二劑表症已退用小柴胡加芎歸枳殼  
桔梗四劑而愈。

一婦人因怒左乳作痛胸膈不利此屬肝脾氣滯以方脈流  
氣飲加木香青皮四劑而安。

一婦人久鬱。左乳內結核如杏。三月不消。心脈澁。脾脈大。按之無力。此肝脾氣血虧損。以八珍加貝母。遠志。香附。柴胡。青皮。桔梗。五十餘劑而消。

一婦人乳內結核年餘。晡熱少食。此血氣不足。欲用益氣養榮湯。彼反服行氣之劑。潰出清膿而歿。又一婦乳內結核如栗。亦服前藥。大如覆碗。堅硬如石。出血水而歿。又郭氏妾乃放出宮人。乳內結一核如栗。亦以前湯。彼不信。乃服瘡科流氣飲及敗毒散。三年後不如覆碗堅硬如石。出水不潰。亦歿。大抵鬱悶則脾氣阻。肝氣逆。則成隱核。不痛不痒。人多忽之。最難治療。若一有此。宜戒七情。遠厚味。解鬱。

結更以養氣血之藥治之庶可保全否則不救亦有一二載或五六載方潰下陷者皆曰乳巖以其形巖凸似巖穴也最毒慎之可保十中一二也

一婦人乳腫而不作膿以益氣養榮湯加香附青皮數劑而膿成針之旬日而愈

一婦人右乳腫發熱怠惰嗜臥無氣以動至夜熱亦甚以補中益氣湯兼逍遙治之而痊

一男子左乳腫硬痛甚以仙方活命飲二劑而止更以十宣散加青皮四劑膿成針之而愈若膿成未破瘡頭有薄皮剝起者用代針之劑點起皮處以膏藥覆之膿亦自出不

若及時針之。不致大潰。如出不利。更紙搜膿化毒之藥。若膿血未盡。輒用生肌之劑。反助邪氣。縱早合。必再發。不可不慎也。

一男子年踰五十。憂子不成立。左乳腫痛。左脇脹。腫肝脈弦數。而濾先以龍蒼丸二服。諸症皆退。又以小柴胡對四物加青皮貝母遠志。數劑而膿成。欲針之。仍以養氣血解鬱結。彼不從。乃雜用流氣敗毒之劑。致便祕發熱作渴。復請治。謂膿成不潰。陽氣虛不能鼓舞也。便祕發熱。陰血竭不能濡潤也。辨不治果死。

一男子因怒。左乳腫痛。肝脈弦數。以復元通氣散。一服少愈。

以小柴胡湯加青皮芩歸數劑而消。復元通氣散。木香茴  
香青皮甲片陳皮白芷甘草漏盧貝母各等分。每服三錢。  
溫酒調下。

孫文垣姪婦素有痰涎。胸膈痞脹。近因乳腫大發。寒熱欲成  
癰。以加味神效瓜蔓散二帖。寒熱退而腫不消。用貝母白  
芷爲臣。瓜蔓爲君。赤芍當歸連翹爲佐。青皮甘草柴胡爲  
使。痛稍減。腫仍不消。脈之近數。知己成膿。與內託十宣散  
加銀花地丁二帖。而膿潰。因腳上生瘡。且有浮氣。前方去  
地丁銀花。加苡仁蒼耳子。調理全安。

薛立齋治王汝道。室年踰三十。每怒後。乳內作痛。或腫。此肝

火所致。用小柴胡合四物加青皮桔梗香附枳殼而愈。彼  
血被損而然。與八珍三十餘劑。喜其年壯元氣易服愈。  
一婦人乳內腫一塊。如雞子大。勞則作痛。久而不消。服託裏  
藥不應。此乳勞症也。屬肝經血少所致。先與神效瓜蔞散  
四劑。更隔蒜炙之。腫稍退。再與八珍湯。倍加香附、夏枯草  
地丁。仍間服前散。月餘而消。亦有乳疽一症。其狀腫硬木  
閼。雖破而不潰。腫亦不消。尤當急服此散。及隔蒜炙之。此  
症氣血爲七情所傷。亦勞症也。宜戒惱怒。節飲食。慎起居。  
否則不治。

一婦人患乳癰氣血頗實。但瘡口不合。百治不應。與神效瓜  
蔓散四劑少可更與數劑。及豆豉餅炙之而愈。一婦人患  
此未潰。亦與前藥三劑而消。陳良甫曰：婦人乳勞。便服此  
藥可杜絕病根。毒已成能化膿爲水。未成者則從大小便  
散之。

一人抱病小愈。左乳復生癰。繼又胸膈間結核。其堅如石柱。  
冉半載百藥不能施。已而牽掣于肩痛特甚。禱于張王祠。  
夢神語曰：但用生薑自然汁製香附服之可也。比覺簡本  
草視之。二物治症相符。訪醫者張祿。亦云有理。香附去毛  
薑。沖浸一宿爲末。二錢米飲調。纏數服。瘡膿流出。腫硬漸

消而愈桂菴  
小乘

朱丹溪治一婦人。年六十。厚味鬱氣。而形實多。如夏無汗。而性急。忽左乳結一小核。大如棋子。不痛。自覺神思不佳。不知食味。經半月。以人參湯調青皮甘草末。入生薑汁細細呷。一日夜五六次。至五七日。消矣。此乃乳巖之始。不早治。隱至五年十年已後。發不痛不痒。必于乳下潰一竅。如巖穴出膿。又或五七年十年。雖飲如故。食如故。洞見五內。乃死。惟不得于夫者有之。婦人以夫爲天。失於所天。乃能生此。謂之巖者。以其如穴之歎呀空洞。而外無所見。故名曰巖。患此者。必經久淹延。惟此婦治之早。消患于未形。餘者。

皆死凡十餘人。又治一初嫁之婦，只以青皮甘草與之安。一孺人但經將行而乳腫，先兩日發口乾而不渴，食少減脈，左弦帶數。右却平治用四物湯加陳皮白朮茯苓，帶熱下與點凡三十粒。

義一孺人平時乳內有結核不痛，忽乳邊又有二腫核，頗覺有些痛。黃芩川芎木通陳皮各四錢，人參二錢，白芍一錢。大腹皮三錢，炙甘草生甘草各一錢。當歸頭一錢。分二帖煎服。

黃孺人乳腫痛，青皮石膏連翹角刺黃藥子當歸頭木通各一錢。生甘草三分入好酒些少同煎飲。又別藥洗腫處。

李東垣治一婦人乳間出黑頭瘡瘍頂陷下作黑眼子其脈  
弦洪按之結小升麻連翹葛根各一錢半肉桂三分黃芩  
歸身甘草炙各一錢牛蒡五分黃柏二錢水煎至一盞二  
服愈

立齋治一婦人患乳癰寒熱頭痛與荆防敗毒散一劑更與  
蒲公英一握搗爛入酒二三盞再搗取汁熱服渣熱塗患  
處而消丹溪云此草散熱毒消腫核又散滯氣解金石毒  
之聖藥。

陳良甫云開慶間涪川嘉林曾都運恭人年已五十而病嫗  
癰後果不起又癸亥年僕處五羊趙經畧夫人年七十二

歲隔一二年前左乳房上有一塊如鷄卵大今忽然作楚召子議藥僕云據孫真人云婦人年五十以上乳房不宜見癰見則不可以治矣幸而未破恐是氣瘤漫以五香連翹湯去大黃煎服服後稍減則已過六七年後每遇再腫脹時再合服必消減矣

立齋曰一婦人乳內結核年餘不消口乾倦怠脈澁少食此肝脾二經血氣虧損之症宜培養爲主乃用草藥數帖遂不救

繆仲濬治顧文學又善內人患左乳巖用夏枯草蒲公英爲君銀花漏蘆爲臣日母桑葉甘菊雄鼠糞連翹白芷紫花

地丁山茱萸炙草瓜蔞茜根陳皮乳香沒藥爲佐使另用  
夏枯草煎濃汁丸之服効許而消三年後右乳復患用舊  
存餘藥服之亦消後以方治數人俱效

廣筆記

馬銘鞠治沈氏婦患乳癰潰爛經年不見臟腑者一膜耳用

鼠糞土棟樹子

經霜者佳  
川棟不用

露蜂房各三錢俱煅存性各取

淨末和勻每服三錢酒下間兩日一服痛卽止不數日膿

盡收斂此方傳自江西販糖客因治祝氏喉症得之

廣筆記

張王屋錄後江孟修兄驗過乳癰方白芷一錢雄鼠糞一錢

二種晒乾爲末用好酒調服飲取一醺睡而愈

雄鼠糞又  
尖者是又

一神驗方用活鯽魚一個山藥一段如魚長同搗汁敷乳

上以紙蓋之立愈廣筆記

薛治一婦人乳癰愈後發熱服養氣血藥不應與八珍湯加炮薑四劑而止。仍以前湯加黃芪香附三十餘劑血氣平復。

薛立齋治一婦年逾二十稟弱乳內作痛頭疼脈浮與人參敗毒散倍加人參一劑表症悉退但飲食少思日晡微熱更以小柴胡湯合六君子湯二劑熱退食進方以託裏藥加柴胡十餘劑針出膿而愈。又一婦患此症膿成畏針病勢漸盛乃強針之膿出三椀許脈數發渴以大補藥二十餘帖而愈丹溪云乳房爲陰明所經乳頭爲厥陰所屬厥

陰者肝也乃女子致命之地宗筋之所且各有囊橐其始  
焮腫雖盛患止於一二囊若膿成不針攻潰諸囊矣壯者  
猶可弱者多致不救所以必針而後愈也

錢國賓治一婦人年五十六歲左乳患癰已七年爛過半矣  
中間一孔如桃時流血水凡貼膏藥痛反增劇以布圈繫  
護防其摩擦夫乳頭屬足厥陰肝乳房屬足陽明胃乃肝  
胃二經之症非單方不足以治其外非峻補不足以養其  
內以形色氣味治之用陳香櫟一個其穰之瓣如乳內之  
房其色先青而後黃青屬肝黃屬胃其味先酸而後甘酸  
屬肝甘屬胃其氣香能通肝胃之氣煅黑止血酒服和經。

此治其乳也。制一枚爲末。作二次服。又用酒炒黃芪二兩。  
益氣實表。土炒白朮二兩。山藥五兩。健脾收溼。芎歸地芍  
各一錢。養血水六椀煎三椀。作四次服。調至一月痊。論藥入微  
可爲格物之法。

王洪緒曰。凡乳巖初起。或乳中。或乳旁。生一小塊。不痛不癢。  
皮色不變。與瘰癧惡核相似。是乃陰寒結痰。總因悲哀憂愁。  
患難驚恐所致。初起以犀黃丸。每服三錢。酒送下。十服  
卽愈。或以陽和湯加土貝母五錢。煎服。數日可消。倘以膏  
藥敷貼。必至日漸腫大。內作一抽之痛。便覺難治。若遲至  
皮色變異。尤難挽回。勉以陽和湯與犀黃丸。早晚輪服。服

至自潰而痛者用大蟾多隻每日早晚取蟾破腹連雜以蟾身刺孔貼患處內服千金託裏散人參防風黃芪官桂甘草白芷厚朴川芎桔梗

三五日後接服犀黃丸可救十中三四潰後不痛而癢極者無一挽回大忌開刀開則翻花最慘萬無一生男女皆有此症

王洪緒治一婦乳患白疽寒熱痛甚與以陽和丸同二陳湯煎服得睡痛息三服全愈又一婦患相同服夏枯草花粉連翹蘇葉等藥五劑號痛不絕王曰向患白色今變紅色難以全消矣投以前藥痛止能睡根盤收小連進數劑不痛而潰貼陽和膏收功陽和丸方肉桂一兩麻黃五錢炮

卷之三  
薑炭五錢水泛爲丸

一婦兩乳皆患乳巖兩載。如桂圓大因子死悲哀。忽發如杯以五通丸。犀黃丸早晚輪服。九日全消。五通丸方廣大香麻黃沒藥去油。乳香去油。五靈脂等分研末。飯搗爲丸。梧子大。每服五錢。用川芎當歸赤芍連翹甘草煎湯送下。凡大癰生要緊穴道。將發大時。服此丸甚效。與三黃丸間服尤妙。三黃丸熟大黃二兩。乳香沒藥各一兩。麝香一錢五分。西牛黃三分。雄黃五錢。以熟大黃酒浸搗爛。將各末和入搗丸如梧子大。每服五錢。

一男子患乳巖貼鯽魚膏兩日發大如拳色紅。王令揭去膏藥。與陽和湯四劑。色仍紅。以陽和湯犀黃丸輪服至十六

日四圍皆消獨患頂潰用蟾救毒三日半月收功。

# 胸癰

薛立齋治一男子胸患癰腫高熾痛脈浮而緊以內託散煎服二劑表症悉減以託裏消毒散四劑而消。

一男子素弱胸患癰飲食少而倦以六君子湯加芎歸黃芪膿成針之更以託裏藥而愈。

薛立齋治一男子胸患癰焮痛煩躁發熱作渴脈數而實時季冬此熱毒內畜也須舍時從症欲治以內疎黃連湯彼以時當隆寒乃雜用敗毒藥愈熾仍求治投前藥二劑後

去二次諸症悉退。以金銀花散加連翹山梔四劑出水而消。大抵症有主末。治有權。宜治其主。則末自退。用其權。則不拘于時。泥於守常。必致病勢危甚。況慣用攻劑。動損各經。故丹溪云。凡瘡發於一經。只當求責本經。不可干擾餘經。羅謙甫曰。守常者。眾人之見。知變者。智者之事。知常而不知變。細事因而取敗者多矣。

一男子胸患毒瘍。痛怕冷。脈洪數。以黃連解毒湯二劑頓退。更以金銀花散六劑而消。

一少婦胸膺間潰一殷。膿血與口中所咳相應而出。以參耆當歸加退熱排膿等藥而愈。余按此因肺疫所致原注

張都憲夫人性剛多怒。胸前作痛。肉色不變。脈數惡寒。經云。  
洪數之脈。應發熱而反惡寒。瘡疽之謂也。今脈洪數則膿已成。但體豐厚故色不變。似乎無膿。以痛極始肯用針。入數寸膿出數椀。遂以清熱消毒藥治之而愈。設泥其色而不用針。無可救之理矣。

瑤按肝脈挾胃貫鬲。又曰是所生病者爲胸滿。故胸之癰疽本由於肝也。

楊百石胸患毒腫。高煖赤發熱。脈數大小便澁。飲食如常。齊氏曰。腫起色赤寒熱疼痛。皮膚壯熱。頭目昏重。氣血之實也。又云大便硬。小便澁。飲食如故。腸滿膨脹。胸膈痞悶。肢

節疼痛。身熱脈大。精神昏塞。臟腑之實也。遂以黃連內疎湯二劑。諸症漸退。更以荆防敗毒散。加芩連山梔四劑少愈。再以四物加芩連白芷桔梗甘草銀花數劑而愈。

一男子胸腫一塊。半載不消。令明炙百壯方潰。與大補藥不歛。復炙以附子餅而愈。

張路玉治談仲安。體肥善飲。夏患壯熱嘔逆。胸膈左畔隱痛。手不可拊。便溺澁。數舌上滑胎。食後痛嘔稠痰。漸見血水。脈來澁澁不調。與涼膈散加石斛連翹。下稠膩極多。先是醫作肺癰治。不效。張曰。肺癰必咳嗽吐腥穢痰。此但嘔不嗽。洵爲胃病無疑。下後四五日復嘔如前。再以小劑投之。

三十而勢甫平。後以保元芩橘平調二十日而痊。先時有  
李姓者患此專以清熱豁痰解毒爲務。直至膈畔潰腐。膿  
水淋漓。纏綿匝月而瘥。良因見機不早。悔無及矣。

琇按此症最難別白。卽內經所謂內有裏大膿血之症  
也。吾鄉一名醫自患此。同道診之。不知爲癰也。雜進參  
附丁桂之劑。久之吐出臭膿乃省。已無及矣。

# 脇癰

薛立齋治一婦人脇患癰未成膿。惡寒脈緊。以十宣散加柴  
胡二劑。表症悉退。更以託裏散數劑。膿清而愈。

一男子近脇患疽腫而不潰投大補之劑潰而已愈後患弱症而沒。

薛立齋治一上舍年逾四十因怒脇內作痛不止數日後外結一塊三寸許漫腫色不赤按之微痛此怒氣傷肝致血傷氣鬱爲患以小柴胡湯對四物倍用芎歸黃芩貝母肉桂治之彼謂丹溪云腫瘍內外皆癰宜託裏表散爲主又云凡瘡未破毒攻臟腑一毫熱藥斷不可用况此症爲氣血凝滯乃服流氣飲愈虛始信而復求治視之虛症併臻診之胃氣更虛彼欲服薛前藥曰急者先治遂以四君子湯加酒芍炮薑四劑少得更加當歸又四劑胃氣漸醒乃

去薑又加黃芪芍歸肉桂。數劑瘡色少赤。并微作痛。又二十餘劑膿成針之却與十全大補湯。喜其謹疾。又兩月餘而瘳。夫氣血凝滯多因營衛之氣弱不能運散。豈可復用流氣飲以益其虛。況各經氣血多寡不同。心包絡膀胱小腸肝經多血少氣。三焦膽腎心脾肺少血多氣。前症正屬膽經少血之臟。人年四十以上陰血日衰。且肝症俱屬不足。腫瘍內外皆壅。宜託裏表散爲主。乃補氣血藥而加以行散之劑。非專攻之謂也。若腫焮痛甚。煩躁脈大。辛熱之劑不但腫瘍不可用。雖潰瘍亦不可用也。凡患者須分經絡氣血地步遠近。年歲老幼稟氣虛實及七情所感。時令。

所宜而治之常見以流氣十宣二散概治結腫之症以致  
取敗者多矣此案與舊案東侍御一則正同而此之發  
明最爲緊要而舊案節之故重錄於此

馬元儀治沈氏婦左脇患腫瘍長五寸許治已兩月發表託  
裏劑多功少診其兩脈弦數兼澁腫處低陷作痛寒熱經  
行不止口燥難食此症頗危必得之勞鬱且怒邪熱結聚  
厥陰之位榮衛不行周身火邪獨徹上下表歟俱所不宜  
用生首烏一兩滋其內燥柴胡一錢疎其氣忽枳壳桔梗  
各一錢舒通肺氣以制肝木杏仁蘇子各二錢調氣化痰  
以清上焦丹皮一錢清其血半夏麴一錢和其中兩劑寒  
熱減而經止患處焮腫潰爛飲食少進瘍醫以潰後當

行大補。投耆木之屬。復致瘡口內陷食少。曰癰疽已潰。當補。此其常耳。今兩脈遲澁。遲則氣滯。澁則血滯。鬱而得補。其鬱彌甚。始猶肝木自傷。既乃轉戕脾胃。以不循常度。分肉不溫。經隧不行。而欲瘡之歛也。其可得乎。夫榮不通。須以血藥和之。當歸桃仁紅花延胡索是也。白朮枳殼一補一瀉。所以推陳氣以致新氣。乾薑煖胃而和血。查肉消滯而和中。服二劑。復大遺出。稠膿一碗許。食進神旺而安。名言至理

須細參之。

朱丹溪診李兄年四十餘。而面稍白。神氣勞甚。忽脇下生癰腫如桃。一人教用補劑。縱笑阻之。於是流氣飲十宣散。

襍而進之旬餘召視之曰非惟不與補藥抑且多得解利血氣俱憊不可爲矣已而果然。

立齋曰一男子因怒左脇腫一塊不作痛脈澁而浮此肝經邪火熾甚而真氣不足爲患宜培養氣血爲主乃用草藥數帖遂致不救。

一男子因勞發熱脇下腫痛脈雖大而按之無力此氣血虛腠理不密邪氣襲於肉裏而然也河間云若人飲食疎精神衰氣血弱肌肉消導榮衛之氣短促而澁滯故寒薄腠理而癰腫也當補之以接虛怯之氣遂以補中益氣湯加羌活四劑少可去羌活又十餘劑而愈又一男子年二十

遍身微痛。腰間作腫痛甚。以前藥加茯苓半夏並愈。

一朝士腹脇間病疽經歲或以地骨皮煎湯淋洗出血一二升家人懼欲止之病者曰疽似快更淋之有五升許血漸淡乃止以細穰貼之次日結痂而愈全上

張子和治襄陵馬國卿左乳二肋間期門穴中發痛硬而不潰痛不可忍瘍醫皆曰乳癰或曰紅絲漏或曰覲心瘍使服內託數百日又服五香連翹湯數只皆無驗張曰此馬刀也足少陽膽經之病出靈樞十二經以示之其狀如馬刀故曰馬刀堅而不潰乃邀之於食肆中使食浸湯餅稍覺緩次日先以滄鹽上涌又以涼劑滌去熱勢約十數行

腫已散矣

朱葛黃家妾左脇病馬刀憎寒發痛已四五日矣。張曰：此足陽少陽膽經病也。少血多氣，堅而不憤，不可急攻。當以苦劑涌之。以五香連翹湯託之。既而痛止。然瘡根未散。有一道人過見之曰：我有妙藥可潰而爲膿。不如此何時而愈？既綏毒藥痛不可忍。外寒內嘔血不止。大便黑色。飲食不下。號呼悶亂幾于死。再求治。張曰：脇間皮薄肉淺。豈可輕用毒藥。復令洗去。以涼劑下之。痛立止。腫亦消。

# 腋癰

薛立齋治一童子腋下患癰久不斂膿清脈大倦怠懶食少寐自汗口乾以內補黃芪湯及豆豉餅炙之兩月而愈凡瘡膿潰而清或瘡口不合或聚腫不赤肌肉寒冷自汗色脫者皆氣血俱虛也非補不可

一男子腋下患毒欬逆不食腸鳴切痛四肢厥冷脈細以託裏溫中湯二劑頓愈更以香砂六君子湯三神丸而飲食頓進以十全大補湯二十劑而歟

里中有周七者少年曾患毒左腋下得一異方用糯米燉飯乘熱入鹽塊夾葱管少許搗極爛如膏貼患處轉消至中年腰間忽生一毒熱如火板硬痛不可忍僵不能動自分

必死。屢藥不效。急思前方。如法貼之。未幾大便去糞如宿垢。甚多。硬者漸軟。數日而起。

薛立齋心法治河南張承祖年逾二十。腋下患毒十餘日。腫硬不潰。脈弱時嘔。謂腫硬不潰。脈弱乃陽氣虛。嘔吐少食。乃胃氣弱。先以六君子湯加藿香砂仁治之。彼謂腫瘍時嘔。當作毒氣攻心治之。潰瘍時嘔。當作陰虛補之。曰此丹溪大慨之言也。卽諸痛痒瘡皆屬心火之意。假如赤腫痛甚。煩躁脈實而嘔。爲有餘法。當下。不腫硬不痛不潰。脈弱而嘔。爲不足法。當補之。亦有痛傷胃氣或感寒邪穢氣而作嘔者。雖腫瘍尤當助胃壯氣。彼執不用。信用攻伐之藥。

病愈甚復請診其脈微細而發熱謂熱而脈靜脫血脈實。汗後煩躁者皆難治後果然夫腫瘍毒氣內侵作嘔十有二二潰瘍濕氣內侵作嘔十有八九豈可混爲一途。

朱文鼎母因忿鬱腋下結一核二十餘年因怒加腫痛完穀不化飲食少思東垣云瀉利不止飲食不入此腸胃虛也遂以六君子湯加砂仁肉桂乾薑肉豆蔻瀉雖止而膿清瘡口不合氣血虛也以十全大補湯月餘而愈。

一男子年逾五十腋下患毒瘡口不合右關脈數而渴此胃火所致用竹葉黃耆湯遂止再用補氣藥而愈嘗治午後發渴或發熱用地骨皮散亦效

# 胃腕癰

張隱菴曰順治辛卯歲予年四十有二八月中生一胃腕癰在鳩尾斜下右寸許微腫不紅按之不痛隱隱然如一雞卵在內姚繼元視之曰此胃腕癰也一名捧心癰速宜解散否則有性命之憂與一大膏藥上加末藥二三錢中間烘貼至暮手足蘇軟漸至身不能轉側仰卧于書齋心煩意亂屏去家人至初更時癰上起一毒氣從左乳下至肋下脇入于左腎入時如燒錐刺入眼中一陣火光大如車輪神氣昏暈痛楚難言火光漸搖漾而散神昏始蘇過半

時許其氣復起。其行如舊痛楚如前。如此者三四次。予思此戊與癸合也。腑邪入臟。自分必死。忘想此毒氣不從腸下入腎。得從中而入於腸胃。則生矣。如此靜而行之。初次不從二次。卽隨想而仍從左乳下入于腸中。腹中大鳴。無復前痛楚矣。隨起隨想。因悟修養之道。氣隨想而運用者也。至天明大泄數次。胸膈寬舒。繼元先生視之曰。毒已散解無妨事矣。予問曰。膏藥乃毒藥耶。曰。上撒之末藥。名端午藥。純用砒霜巴豆干端午日配制。無此毒藥焉能透入皮肉之內。予曰。何不早言。昨晚以爲必死於毒。今早始悟。膏藥中必有毒藥而得生於毒矣。毒藥攻疾。有如此之妙。

也至次年中秋復發仍用膏藥末藥毫無前番之狀腫亦不消予因想運氣之妙經行坐臥以手按摩意想此毒仍歸腸胃而出如此十餘日而散至次年中秋又發予謂繼元先生曰去歲膏藥不應今須令法治之姚曰部院劉公之夫人生此疾曾另置末藥比前更毒貼之要起大泡此藥用之無有不驗貼之數日並不起泡腫亦不消予想此症已頑不受毒藥之制卽揭去膏藥用大艾圓迎頭灸九壯其毒隨火氣四散嗣後永不發矣予想陽明之毒准在中秋金旺之時而發初從毒攻而解次隨氣運而散後因勝制而消因悟氣運制化之道有如此之妙用五行合化

之理人與天地相參卽以此理推治百病。奇妙異常王紹  
隆先生曰業醫人須病病經過始得之矣。

王洪緒曰井泉疽生於心口又名漫心銳毒初起若心口內  
有塊漸大心口發高毒陷卽死此醫家縮手之症諸書亦  
無治法惟余家秘集載以本人兩手十指以線量以長短  
共積其線在喉管正中處雙環至背脊之中看兩線頭盡  
處爲中穴又以本人之中指中一節用柴心量准作一寸  
寸穴之左右各遠一寸各以墨記分立三穴如品字狀每  
穴用艾灸三大壯齊火灸灸則全愈。

續名醫類案卷三十一終

Call

續名醫類案卷三十二

錢塘魏之琇編集

海昌王士雄孟英  
定州楊照藜素園 同校

發背

精要論背疽其源有五：天行二、瘦弱二

怒氣、四腎氣虛、五飲冷酒食炙煙脂丹藥

元末嘉興桐鄉縣後朱村徐通判素慕洞賓朝夕供禮一日

疽發於背勢垂危猶扶起禮之如昔偶見淨水盂下白紙  
視之有詩云紛紛墓土黃金屑片片花飛白玉芝君主一

斤臣四兩調和服下卽平夷意其仙方然不知何物爲黃

金白玉乃召仙以大黃白芷爲問仙曰然服之果驗後以

之醫人無不效徐無子方竟傳婿沈氏至今沈以此治生數百里來貨藥者無虛日族大而分數十家惟嫡枝居大椿樹下者藥乃驗沈子嘗從吾友俞院判學嘗聞其藥今加川山甲當歸鬚金銀花矣然大黃既多以下爲主不問陰陽之毒而投之恐亦有害者然源源往醫又獨於椿樹下者驗豈非天固與之乎七修類編

京師萬勝門生員王超忽覺背上如有瘡隱倩人看之已如蓋大其頭無數或教往梁門裏外科金龜兒張家買藥張視頤眉曰此瘡甚惡非藥所能治只有灼艾一法庶可冀望萬分然恐費力乃撮艾與之曰且歸試炙瘡上只怕不

疼直待炙瘳方可療耳。灼火十餘殊不知痛。妻守之而哭至第十三壯始大痛。四旁惡肉捲爛。隨手墮地。卽以稍愈。再詣張謝。張付藥數貼。日安則知癰疽發於背脇。其捷法莫如炙也。

類編

王敏診一人發背不起。醫言起則治矣。敏曰是擊指脈。卽起亦不治。眾劫以艾。疽起如粟。眾曰無傷矣。竟三日死。姑蘇志

治發背腦疽。一切惡瘡初覺時。採獨科蒼耳一根。連葉蒂子細剉。不犯鐵器。用砂鍋熬水二大碗。熬及一半。瘡在上徐徐飯後服之。吐出候。吐定再服。以盡爲度。瘡在下。空心服。瘡自破出。膿更不潰爛。瘡上別以膏藥傅之。此方京兆張

伯玉家勝示傳人後昆仲皆登第人謂善報

元遺山續夷堅志

大凡石類多主癰疽世傳麥飯石膏治發背瘡甚效乃中岳

山人呂子華秘方裴員外啖之以名第河南尹薦之以重

刑呂寧絕榮望守死不傳其方取此石碎如碁子炭火燒

赤投米醋中浸之如此十次研末篩細入乳鉢內用數人

更碾五七日要細膩如麵四兩鹿角一具要生取連腦骨

者其自脫者不堪用每二三寸截之炭火燒令煙盡卽止

爲末研細二兩白斂生研末二兩用三年米醋入銀石器

內煎令魚目沸旋旋入藥在內竹杖子不住攪熬一二時

久稀稠得所傾在盆內待冷以紙蓋收勿令塵入用時以

鷺翎拂膏於腫上四圍赤處盡塗之中留錢大洩氣如未  
有膿卽內消。已作頭卽撮小。已潰卽排膿如湍水如病久  
肌肉爛落見出筋骨者卽塗細布上貼之乾卽易逐曰瘡  
口收斂但中隔不穴者卽無不瘥。已潰者用藥時先以猪  
蹄湯洗去膿血。用帛挹乾乃用藥。其瘡切忌手觸動嫩肉  
仍不可以口氣吹風及腋氣月經有孕人見之合藥亦忌  
此等。初時一日一洗一換。十日後二日一換此藥極細方  
有效。若不細塗之卽極痛也。此方千金月令已有之。但不  
及此詳細耳。本草

馮楚瞻治蔣司農向來脈氣寸強尺弱故服八味丸已有年

矣此等脈多陰虛火上炎之候。凡久服八味丸者，多胎後患。然過勞藥力不能勝其妄。

動之火，鼻衄大作。調理雖愈，而口渴殊甚。飲湯水如甘露，然卽數十杯不足滿其欲也。此卽消渴，久成癰疽。勸服大劑壯水佐

以引火歸原之餌，則水升火降，消渴自除。變症可弭，乃忽

之。雖服數劑，渴畧減，藥卽停至初夏，背上忽隱隱痛癢，漸

甚而肉硬。半月餘痛極重，及診之，當脊少偏半寸外，不腫

肉分堅實如椀大矣。日久渴不治，陰水日虧，陰火日熾，書

所以有膿疽背疽之兆也。亟爲托出陽分，使毒氣勿致逗

遛，內陷爲要。乃外用大黃二兩，芙蓉葉赤芍各一兩，白欵

白芨各五錢爲末。雞子清調敷毒四圍，內則重滋陰水，加

熟地山藥土貝角刺天蟲甲片生甘草連翹金銀花之類。  
及腫既成乃早吞八味丸五六錢以培先天之水火食遠  
服參耆歸芍朮草銀花甲片天蟲角刺白芷之類以助後  
天之氣血外以太乙膏加男髮草麻子乳香沒藥煎膏貼  
之以呼毒氣外出不旬日紅腫消痛重減瘡已歟高已有  
膿勢乃一外科改絃易轍幾至內潰再亟治仍用前法煎  
藥加肉桂錢許仍高腫紅活竟如些小之毒潰膿而愈。  
高鼓峰治一鄉人患發背上距風府下連腎俞通塊腫起肌  
肉青冷堅硬如鐵飲食俱廢不省人事醫猶用解毒藥脈  
之六部細數氣血大虧毒將內陷矣急用養榮湯加附子

炮薑三大帖而胃氣開。十劑而堅硬者散去十之八九。只左邊如茶鍾大焮紅作腫。戒之曰。切莫籜藥及刀針。氣血溫和毒當自出。籜則反遲。非時而刺收口難矣。彼以不任痛竟受刺出血。曰當倍前藥急服。以收口爲度。仍戒以節嗜慾慎飲食。兼服還少丹八味丸而愈。

朱丹溪曰。予見吳兄厚味氣鬱而形實性重。年近六十。患背疽。醫與他藥皆不行。惟香附末飲之甚快。始終只此一味。腫潰恃此以安。此等體實千百而一見者也。名獨勝散。惟氣滯血凝實

症宜之。

樓氏婦早寡。善飲啖。形肥偉。性沈毒。年六十六七月間生背

疽近正脊。醫遂橫直裂開取血，雜以五香十宣散，與酒飲之。月餘未嘗議其寡居之鬱，酒肉之毒，執著之滯。時令之熱，迨至於平陷，淹延兩三月而不救。

江陵府紫極觀，掘得石碑載此。凡人發背，欲結未結，赤紅腫痛。先以濕紙覆其上，立視候其紙先乾處，則是結癰頭也。取大蒜切成片，如當三錢厚，安頭上，用大艾炷炙之三壯。卽換一蒜片，痛者炙至不痛時住，不痛者炙至痛時方住。早覺早炙爲上。如有頭似麻豆大者，不須用濕紙覆法。若有十數頭，聚而在一處生者，卽用大蒜頭搗膏，作薄餅鋪頭上，聚艾於餅上燒之。一二日十灸，十活三四日。六七活五六日三四活。

王遠發背方序云元祐三年夏四月官京師疽發於背召國  
醫治之逾日勢益甚得徐州蕭縣人張生以艾火加瘡上  
自旦及暮凡一百五十壯知痛方已明日鑷去黑痴膿盡  
潰肉裏皆紅亦不復痛始別以膏藥貼之日一易焉易時  
旋翦去黑爛肉許瘡乃平是歲秋夏間京師士大夫病疽  
者七人余獨生此雖司命自然固有定數不知其方遂至  
不幸者以人意論之可爲慨然于是撰次前後所得方模  
板以施庶幾古人濟衆之意此卽當頭灸法但不用蒜耳

史源母氏背胛間微痒視之有赤半寸許方有白粒如粟黍  
乃急著艾灸其赤隨消一七壯而止信宿復覺微痛視之

有赤下流長二寸。潤如葢葉。舉家皆以前灸爲悔。或云等慈寺尼智全者。前病瘡甚大。得灸而愈。奔問之。全曰。劇時昏不知。但小師輩言。范八奉議守定灸八百餘壯。方甦。約艾一篩耳。亟歸白之。見從始以艾作炷。如銀否。大灸其上十數。殊不知痛。乃截四旁。赤引其炷減四之三。皆覺痛。七十壯後。覺痒。每一壯。燼則赤隨縮入。灸至二十餘壯。赤暈收退。病者不憚。遂以艾作團。大灸其上。漸加至雞黃大。約四十團。方覺痛。視火焦處已寸餘。蓋灸之遲。而初發處肉已壞。壞肉成隔。直至好肉方痛。四旁知痛。肉未壞也。病者六夜不寐。至是食粥安寢。至晚視之。瘡如覆一餉。突高三四

寸上有百數小竅。色正黑。突然高者。毒氣出外而聚也。百數小竅。毒未聚而浮攻肌膚也。色正黑者。皮與肉俱壞也。非灸火出其毒于壞肉之裏。則五臟逼矣。

薛立齋治王通府患背發十餘日。勢危脈大。先與槐花酒二服。殺退其熱。更以敗毒散二劑。再以托裏藥數劑漸漬。又用桑柴燃炙患處。每日炙良久。仍以膏藥貼之。炙至數次。膿潰腐脫。以托裏藥加白朮陳皮月餘而愈。

劉大尹發背六七日。滿背腫痛。勢甚危。與隔蒜炙百壯。飲槐花酒二碗。卽睡覺。與托裏消毒藥。十去五六令。以桑枝炙患處。而潰數日愈。凡灸及飲槐花酒。則托裏之效甚速。

一園丁患發背甚危。令取金銀藤五六兩搗爛入熱酒一鍾。  
綵取酒汁溫服。渣罨患處四五服而平。彼用此藥治瘡足  
以養家棄園業。諸書云。金銀花治瘡瘍未成者卽散已成  
者卽潰有回生之功。

大監劉關患發背。腫痛色紫。診其脈息沈數。陳良甫云。脈數  
發熱而痛者。發于陽也。且瘡瘍赤甚。則紫卽火極似水也。  
詢之嘗服丹藥半載。乃積溫成熱所致耳。遂以內疏黃連  
湯。再服消平。更用排膿消毒藥及猪蹄湯。太乙膏而愈。經  
曰。色與脈當相參應。治之者在明亢害承制之理。陰陽變  
化之機焉耳。

一男子年逾五十患發背色紫腫痛外皮將潰寢食不安神思甚疲用桑柴炙思處出黑血卽鼾睡覺而諸症如決服仙方活命飲二帖又炙一次膿血皆出更進二劑腫痛大退又服托裏消毒散數帖而歟夫瘡毒熾甚未宜峻劑攻之但年老血氣衰弱况又發在肌表若專于攻毒則胃氣先損必反誤事

吳江申僉憲患背疽堅硬脈沈實乃毒在內用宣毒散大黃五錢煨白芷五錢水煎食前服一劑大小便下汚物再服而消此方乃宣通攻毒之劑脈沈實便秘者其功甚大

琇按卽首條黃金白玉方薛用之而不詳其出處

大尹陳國信素陰虛患背疽用參芪大補而不斂內熱發熱舌燥唇裂小便少頻數口乾飲湯嘔吐瀉利耳閉目盲仰首眩暈脈浮大而數薛曰瘡口不斂脾土敗也舌燥唇裂腎水枯也小便頻數肺氣衰也內熱發熱虛火上炎也口乾飲湯真寒之象也嘔吐瀉利真火衰敗也耳閉目盲肝木枯散也仰首眩暈腎氣絕也辭不治後果歿

琇按不拘內外病凡陰虛者服參耆諸氣分藥非惟無益而反害之據此症純屬三陰虧竭若初時解用二地二冬杞子歸芍之輩猶可挽也

吳庠史邦直之丙仲夏患背疽死肉不潰發熱痛甚作嘔少

食口乾飲湯脈洪大按之如無此內真寒而外假熱當捨時從症先用六君加炮薑肉桂四劑飲食頓進復用十全大補湯仍加薑桂之類五十餘帖而死肉潰又五十餘劑而新肉生斯人血氣充盛而瘡易起易斂使醫者逆知預爲托裏必無此患

雄按十全大補必毒火盡除而後可用

南儀部賀朝卿陞山西少參別時見其唇鼻青黑且時搔背問其故曰有小瘡耳與視之果疽也此脾胃敗壞爲不治之症薛素與善悲其途次不便殯殮遂托其僚友張東沙輩強留之勉與大補但出紫血虛極也或謂毒熾不能爲膿乃服攻毒藥一鍾以致嘔逆脈脫果卒於南都

京兆柴繡菴仲夏背發色黯微腫發熱煩躁痰涎自出小腹  
陰實手足逆冷右關浮澁兩尺微細曰此虛寒之症也王  
太僕云大熱而不熱是無火也決不能起懇求治之用大  
溫補藥一帖流涎雖止患處不起終不能效

憲副屠九峰孟春患此色黯漫腫作渴便數尺脈洪數此腎  
水乾涸當歿於火旺之際不信更用苦寒之藥復傷元氣。  
以促其歿。

一男子不慎房勞背脾腫高三寸許濶經尺餘自汗盜汗內  
熱發熱口乾飲湯脈浮大按之弱澁此陰虛氣節爲患用  
十全大補加五味麥冬山萸山藥四劑諸症悉退後乃別

用流氣飲一帖。虛症悉具。腫硬如石。仍以前藥六劑。始得愈。

一儒者背腫一塊。按之則軟。肉色如故。飲食如常。勞則吐痰。體倦。此脾氣虛而痰滯。用補中益氣加茯苓半夏少加羌活。外用陰陽散。以薑汁調搽而消。後因勞頭暈作嘔。仍以前藥去羌活。加生薑蔓荆子而愈。

節推王器之背患疽。瘡頭如黍。焮痛。背重脹沈而實。此毒在內。服黃連內疏湯二劑少退。更與仙方活命飲而愈。

舉人劉華甫。焮腫作痛。脈浮而數。此毒蓄於經絡。用內托復煎散二劑。而焮腫作痛。用仙方活命飲四劑。而腫痛止。更

用托裏藥而愈。

一儒者患背疽腫爛痛甚。此熱毒蘊結而熾盛。用隔蒜灸而痛止。服仙方活命飲而腫消。更與托裏藥而潰愈。

一男子患背疽腐肉雖潰。而新肉不生。此毒氣解而脾胃之氣虛也。用六君子加芎歸五味黃芪漸愈。用十全大補湯全愈。

一男子背患疽腫痛。赤暈尺餘。背如負石。其勢當峻攻其脈。又不宜遂用針砭。赤處出紫血碗許。腫痛頓退。更用神功散。及仙方活命飲二劑。瘡口及砭處出血水而消。

一男子背患疽。肉腐膿清。肌肉不生。此邪去而氣血俱虛也。

用十全大補湯。月餘而歛。

通府張廷儀背患疽。作嘔。燉痛大便秘結。口乾作渴。此內蘊熱毒。用竹葉石膏湯二劑。諸症頓退。用托裏消毒散。四畔腫消。用仙方活命飲。瘡亦尋愈。

一男子背瘡潰而瘀血不散。此陽氣虛弱也。用參耆歸朮峻補。更以桑枝炙。又用托裏散加肉桂。瘡口自歛。補接陽氣之法也。

一男子背瘡漫腫。微痛。食少體倦。此症屬形病俱虛法。當補元氣爲主。彼不信。乃用攻毒之劑。中央肉黯五寸許。惡症悉具。復求治。曰此胃氣虛寒而變症作矣。當急溫補脾胃。

則惡症自退。黯肉自生。仍不信。乃割死肉祛惡症。遂至不起。

水部曹文兆背胛患之半月餘。瘡頭如粟。且多內痛如刺。其脈歇止。此元氣虛而疽蓄於內。非炙不可。遂灼二三十壯。飲以六君加藿香服。數劑瘡勢漸退。內痛頓去。胃脈漸至。但瘡色紫。瘀肉不潰。此陽氣虛也。燃桑枝灸患處。以解散其毒。補接陽氣。仍以前藥加參耆歸桂。色赤膿稠。瘀肉漸腐。兩月而愈。夫邪氣沈伏。真氣怯弱。不能起發。須炙而兼大補。若投以常藥。待其自潰。鮮有不誤者。

黃汝耘患發背。用生肌散太早。益潰。大便泄瀉。其脈微緩。此

脾胃虛也。用二神丸以止其瀉。次用大補藥以固其本。更用猪蹄湯洗患處。用黃芪末以塗其外。喜其初起曾用艾灸毒不內攻。兩月而愈。

許鴻臚發背十餘日。腫硬木悶。肉色不變。脈沈而實。此毒在內先以黃連內疏湯。更以消毒托裏藥。其毒始發。奈欲速愈。急用生肌藥。患處如負石。身如火燄。遂致不起。

李氏云。龍游有患背疽者。大潰五臟。僅隔膜耳。自謂必死。用鯽魚去腸實。以羯羊糞烘焦爲末。乾糝之。瘡口自收。此出洪氏方。屢用有效。故附于此。復候膿少。欲生肌肉。時用之。

耳。陳自明外科精要

江陰舉人陳鳴岐寓京患背疽用大補之劑而愈翌日欲回  
先期設席作謝對談如常是晚得家信大拂其意惱怒發  
熱作渴食梨子少許至夜半連瀉數次早促薛視脈已脫  
矣竟至不起夫梨者利也疏利下行之物凡脾胃虛寒產  
婦金瘡者皆當忌之所云大補之劑必參耆也大瘡之後  
陰氣大傷不聞有善後之圖以致卒然致變乃歸咎於食  
梨何其善於誣罪耶

琇按其人瘍初愈元氣未復因怒而動厥陽之火致發  
熱作渴其肝木之蹶張不待言矣木盛尅土非嘔即瀉。  
少許梨子何遽云爾。

陳自明治一男子患發背瘡頭如粟重如負石以神仙太乙

丹內服外塗後去三四次每去肛門如炙不日而瘳。

一婦人患此症腫痛發熱睡語脈大用清心湯一劑而安以

金銀花甘草天花粉當歸瓜蔞黃芪數劑漸潰更以托裏

藥而愈方最平穩

一男子患此症已愈惟一眼翻出努肉如血卽名翻花瘡三月不

愈乃傷風寒也以生豬脂調藜蘆末塗之卽愈亦有努出

五寸許者尤宜用此藥也烏梅塗之亦效但緩硫黃亦可

一男子背患毒癰痛飲冷發熱多汗便秘譖語以破棺丹二

丸而瘳以金銀花散四劑膿成開之更用托裏藥而愈

一婦人患此症膿成脹痛不安針之投托裏消毒藥卽愈大

抵發背之症。雖發熱療痛形勢高大。煩渴不寧。脈若有力。  
飲食頗進可保無虞。其膿一潰。諸症悉退。多有因膿不得  
外泄。以致疼痛。若用敗毒寒涼攻之。反致誤事。若有膿即  
針之。膿一出。苦楚即止。膿未成而熱毒作痛者。用解毒之  
藥。亦有腐潰尺餘者。若無惡症。投以大補之劑。肉最易生。  
亦無所妨。惟忌腫不高。色不赤。不焮痛。脈無力。不飲食。腫  
不潰。腐不爛。膿水清。或多而不止。肌肉不生。屬元氣虛也。  
皆難治。宜峻補之。其或膿血既泄。腫痛尤甚。膿水腥臭。煩  
躁時噉。腹痛渴甚。瀉利無度。小便如淋。乃惡症也。皆不治。

徐靈胎曰：峻補必兼

托毒亦不全在參附

一弱婦患此症。外皮雖腐。內膿不潰。脹痛煩熱不安。謂宜急開之。膿一出。毒即解。痛即止。諸症自退。待其自潰。不惟疼痛。潰爛愈深。彼不從。待將旬日。膿尙未出。人已痛疲矣。雖針之。終不能收歟。竟至不起。

一男子患此症。潰而瘀肉不腐。欲取之。更以峻補。一婦皆弱。未成膿。大痛發熱。謂須隔蒜炙。以拔其毒。令自消。皆不從。俱致不救。常治不問日期。陰陽腫痛。或不痛。或痛甚。但不潰者。卽與炙之。隨手取消。勢未定者。先用繩藥圍之。若臣烏金膏。或援生膏貼患處。數點尤好。若頭痛拘急。乃表痛。先服人參敗毒散一二帖。如焮痛發熱。服數者。用金銀花。

散或槐花酒。神效托裏散。如疼痛腫硬脈實者。以清涼飲。  
仙方活命飲。苦參九腫硬木悶。疼痛發熱。煩躁飲冷便秘。  
脈沈實者。內疏黃連湯。或清涼飲。大便以利。欲其作曠。用  
仙方活命飲。托裏散蠟燭丸。外用神異膏。如飲食少思。或  
不甘美。用六君子湯加藿香。連進三五劑。更用雄黃解毒  
散。洗患處。每日用烏金膏塗瘡口處。俟有瘡口。卽用紙作  
燃。薰烏金膏。紉入瘡內。若有膿爲脂膜。間隔不出。或作脹  
痛者。宜用針引之。腐肉堵塞者去之。若瘀肉腐動。用猪蹄  
湯洗。如膿稠或痛。飲食如常。瘀肉自腐。用消毒與托裏藥  
相兼服之。仍用前二膏塗貼。若腐肉已離。好肉宜速去之。

如膿不稠不稀。微有疼痛。飲食不甘。瘀肉腐遲。更用桑柴  
炙之。亦用托裏藥。若瘀肉不腐。或膿清稀。不歟痛者。卽服  
大補之劑。亦用桑木炙之。以補接陽氣。解散鬱毒。常觀患  
瘡稍重。未成膿者。不用蒜炙之法。及毒熟不開。或待腐肉  
自去。多致不救。大抵氣血壯實。或毒少輕者。可假藥力。或  
自腐潰。怯弱之人。熱毒中隔。內外不通。不行針灸。藥無全  
功矣。然此症若膿已成。宜急開之。否則重者潰通臟腑。腐  
爛筋骨。輕者延潰良久。難于收功。因而不歟者多矣。

一男子年逾五十。患此症。已五日焮腫大痛。赤暈尺餘。重如  
負石。勢熾甚。當峻攻。察其脈又不宜。遂先砭赤處。出黑血。

碗許。腫痛頓退。背重頓去。更敷神功散。及服仙方活命飲。  
二劑瘡口及砭處出血水而消。大抵瘡毒勢甚。若用攻劑。  
怯弱之人。必損元氣。因而變症者衆矣。

一婦人患此症。半月餘尚不起發。不作膿。痛甚。脈弱隔蒜灸。  
二十餘壯而止。更服托裏藥。漸潰膿清。而瘀肉不腐。以大  
補藥及桑柴炙之。漸腐。取之尋愈。常治一日至四五日未  
成膿而痛者。炙之不痛。不痛者。炙之至痛。若炙而不痛。或  
麻木者。明炙之毒氣自然隨火而散。腫硬不作膿。焮痛。或  
不痛。或微痛。瘡頭如黍者。炙之尤效。亦有數日色尙未赤。  
腫尙不起。痛不甚。膿不作者。尤宜多炙。勿拘日期。更服甘

溫托裏藥。切忌寒涼之劑。或瘀肉不腐。亦用桑木炙之。若脈數發熱而痛者。發于陽也。可治。脈不數不發痛者。發于陰也。難治。不痛最惡。不可視為常疾。此症不可不痛。不可大痛。煩悶者不治。大抵發背。腦疽。大疔。懸癰。脫疽。腳發之類。皆由膏梁厚味。盡力房勞。七情六慾。或丹石補藥精虛氣鬱所致。非獨因榮衛凝滯而生也。必灸之以拔其毒。更辨其因。及察邪在臟腑之異。虛實之殊。而治庶無誤也。

一男子患此症。初生如粟。悶痛煩渴。便秘。脈數實。此毒在臟也。謂宜急疏去之。以絕其源。使毒不致外侵。彼以爲小恙。乃服尋常之藥。後大潰而歿。

一老婦患此症。初生三日。頭皆如粟。腫硬木悶。煩躁。至六日。  
其頭甚多。脈大。按之沈細。爲隔蒜炙。及托裏漸起。發尙不  
潰。又數劑內外雖腐。惟筋所隔。膿不得出。致脹痛不安。謂  
須開之。彼不從。後雖自穿。毒已攻深矣。亦歿。大抵發背之  
患。其名雖多。惟陰陽二症爲要。若發一頭。或二頭。焮赤腫  
高頭起。疼痛發熱。爲癰。屬陽易治。若初起一頭。如黍。不腫  
不赤。悶痛煩躁。大渴便秘。睡語咬牙。四五日間。其頭不計  
數。其瘡口各含一粟。形似蓮蓬。故名蓮蓬發。積日不潰。按  
之流血。至八九日。或數日。其頭成片。所含之物俱出。通結  
一衣揭去。又結。其口共爛。爲一瘡。其膿內攻色紫黯。爲疽。

屬陰難治。脈洪滑者尚可。沈細尤難如此惡症。惟隔蒜灸及塗烏金膏有效。凡人背近脊并脾皮裏有筋一層。患此處者外皮雖破其筋難潰以致內膿不出令人脹痛苦楚。氣血轉虛變症百出若待自潰多致不救必須開之兼以托裏常治此症以利刀翦之尚不能去似此堅物待其自潰不亦反傷非血氣壯實者未見其能自潰也。

一男子年逾五十患此色紫腫痛外皮將潰寢食不安神思甚疲用桑柴炙患處出黑血卽剗睡覺而諸症如失服仙方活命飲二劑又炙一次膿血皆出更二劑腫痛大退又服托裏消毒散數劑而愈夫瘡勢熾甚宜用峻劑攻之但

年老血氣衰弱。況又發在肌表。若專於攻毒。則胃氣先損。  
反致誤事。

一婦人患此症。發熱作痛。專服降火敗毒藥。潰後尤甚。煩躁時。噦小便如淋。皆惡症辭不治。果死大抵瘡瘍之症。五善之中見一二善症可治。七惡之內。見一二惡症者難治。若虛中見惡症者不救。實中無惡症者自愈。此症雖云屬火。未有不由陰虛而致者。故經云督脈經虛。從腦而出膀胱經。虛從背而出。豈可耑泥于火。

趙太守患此腫堅不澤。瘡頭如粟。脈洪大。按之則溼。經云骨髓不枯。臟腑不敗者可治。然腫硬色天。堅如牛領之皮。脈

更澁此精氣已絕矣。不治亦死。

圖經云薛荔治背瘻。頃年寓宜興。懸張鎮有一老舉人。敎村學。年七十餘忽一日患發背。村中無醫藥。急取薛荔研爛。絞汁和蜜飲數升。以其渣傅瘻上。後以他藥傅貼遂愈。醫者云其本蓋得薛荔之力。乃知圖經所載不妄。本草

郭戶爲予言。鄉里有善治發背瘻者。于瘻上炙之。多至三百壯。無有不愈。但作艾炷小。則人人不畏炙。炙多則效矣。蓋得此法也。然亦不必泥此。近有一醫以治外科得名。有人發背。瘡大如碗。有數孔。醫亦無藥可治。只此艾遍敷在瘡上。炙之久而方痛。以瘡上皆死肉。故不覺疼也。旋以

藥調治之愈。蓋出於意表也。

百乙方

治發背初作。取水蛭置腫上飲血腹脹自落。別換新者。脹蛭以新水養之。卽活矣。吳內翰備急方云。其姪祖仁。一日忽覺背瘡赤腫如椀大。急用此治之。至晚遂安。

百乙方

昔嚴州一通判忘其名。母病發背。祈禱備至。夜夢呂真人服青衣告之曰。公極孝。故來相告。以方更遲一日。不可療矣。通判公急市藥治之。卽愈。用瓜蔞五個。取子細研。乳香五塊。如棗子大。亦細研。加白沙蜜一觔。同煎成膏。每服二三錢。溫酒化下。大治發背諸惡瘡。日進二服。無不立效。楊王得此方。家人凡百瘡毒。依此治之。立效。遂合以施人。無不

驗者漏瘡惡核並皆治之此卽鄭府朱保義所說神妙方  
是也。醫說續編

立齋治張錦衣年逾四十患發背心脈洪數勢危劇經云心脈洪數乃心火熾甚諸症痒瘡瘍皆屬心火心主血心氣滯則血不行故生癰也騎竹馬灸穴是心脈所由之地急灸之以瀉心火隔蒜灸以拔其毒再以托裏消毒果愈

鄭大理伯興牌骨患疽背左右各一竟背重如負石兩臂如墜瘡頭皆大如荳許其隱於皮膚如粟者不計其數瘡色黯而不起已七十口乾作渴診之脾胃脈甚虛彼云昨日所進粥食今尙不消作酸意此難治之症因與素善者籌

其治法以隔蒜灸二十餘壯。其背與臂動覺少便。隨用六君子湯加薑汁炒山梔及吳茱萸連服數劑。吞酸遂止。飲食少進。但口乾瘡仍不起。色亦不赤。亦無膿。復如法灸二十餘壯。背臂頓便。瘡遂發。其時適秋。又投大補之劑。及生脈散以代茶飲。

留都鄭中翰仲夏患發背。已半月。瘡頭十餘枚。皆如粟許。漫腫堅硬。根如大盤。背重如負石。卽隔蒜灸五十餘壯。其背頓輕。彼因輕愈。不守禁忌。三日後大作。瘡不起。發喜得痛。用活命散四劑。勢少退。用香砂六君子湯四劑。飲食少進。彼恃知醫。自用敗毒藥數劑。飲食益少。口流涎沫。若不自

知此脾虛之甚也。每用托裏藥內參芪各三錢。彼密自掠去大半。後雖用大補藥加薑桂。亦不應遂。令其子以參耆各一觔歸。並各半觔乾薑桂附各一兩。煎膏一罐。三日飲盡。涎頓止。腐頓潰。食頓進。再用托裏健脾藥。腐肉自脫而愈。徐靈胎曰。大症潰後。精血大虧。自宜溫補。但瘡口未全愈。必有兼外科之症。或膿清不厚。或寒熱未止。或火毒未清。或胃口未和。或新肉未生。或毒痰內積。種種病症。若一味峻補。與外症不相照顧。則餘毒未清。反能增病。必須審度其虛實。或全屬虛寒。然後擇取對症之藥。幾味成方。如不問外症之有無。而一概以內科溫補之全方治之。則其必有不對症之藥。反能有害。不但不知內科并外科之理。亦不知也。薛立齋之用內科方。盡如此。不值一笑也。

張侍御背患瘡三枚。皆如粟。彼以爲小毒。服清熱化痰之藥。外用涼藥敷貼。數日尚不起。色黯不焮。腹中氣不得出入。

其勢甚可畏。連用活命飲二劑，氣雖利，膿清稀，瘡不起。欲用補劑，彼泥于素有痰火，不受參朮之補，因其固執陽以敗毒之劑與視之，而陰以參芪歸朮各五錢，薑桂各二錢，服二劑，背覺熱腫起腐肉，得貴方信余言，始明用大補藥乃愈。

南都聘士葉公玉表兄聶姓者，患發背，時六月，腐肉已去，瘡口尺餘，色赤而焮，發熱不食欲，嘔不嘔，服十宣散等藥，自謂不起，請決之。其脈輕診則浮而數，重診則弱而澁。此潰後之正脈，然瘡口開張，血氣虛也。欲嘔而不嘔，脾胃虛也。色赤焮腫，虛火之象也。尙可治。遂與十全大補湯加酒炒

知柏五味麥冬及飲童便。飲食頓進。肌肉頓生。服至八劑。  
瘡口收如粟許。又惑於人言。又服消毒藥二劑。以爲消餘  
毒。反發熱昏憒。急進前藥。又二十餘劑乃愈。後兩月因作  
善事。一晝夜不睡。至勞發熱似睡不睡。與前藥二劑。愈加  
發熱。飲食不進。惟飲熱湯。後以前藥加附子一錢二劑愈。  
五味能收斂毒  
氣不可輕用

石武選廉伯患發背。內服防風通聖散。外敷涼藥。汗出不止。  
飲食不進。且不寐。瘡盈尺。色黯而堅硬。按之不痛。氣息奄  
奄。此陽氣已脫。脈息如無。急隔蒜炙時。許背頓輕。四圍高。  
不知痛。中央肉六寸許一塊已死。服香砂六君子湯一劑。

翌日復炙一次。痛處死肉得解。令砭去。薛歸後。又爲他醫所惑。未砭其血。復凝。又敷辛溫活血藥。翌日依言砭之。出黑血二盞許。背強頓去。以前藥加薑桂服一鍾。卽鼾睡覺來。肢體少健。但飲食仍不思。吞酸仍有瘡。仍不痛。彼以爲陰毒。乃如此。赤曰此血氣虛極。寒邪淫于內。無陽營于患處。故肌肉死也。非陰毒。若陽氣一回。胃氣卽省。死肉卽潰可保無虞矣。以前藥二劑。各加薑桂附子二錢。服之略進米飲。精神復舊。患處覺熱。脈略有力。此陽氣略回矣。是日他醫謂瘡瘍屬火症。况今暑令。乃敷芙蓉根等涼藥。卽進粥二碗。服消毒藥。死肉卽潰。意芙蓉乃寒涼之藥。與脾胃

何蓋飲食卽時而進。消毒乃卒散之劑。與陽氣何補。死肉卽時而潰。此蓋前桂附之功。至而脾胃之氣省。故飲食陽氣旺。死肉腐也。苟虛寒之人。若內無辛熱回陽之藥。輒用寒涼攻毒之劑。豈可得而生耶。若以爲火令屬陽之症。內有熱而用辛溫大補之劑。豈不致死。而反生耶。殊不知此乃捨時從症之治法也。吞酸乃伏邪  
未出之故

一男子患發背。膿始潰。腫未消。已十七日。脈微而靜。曰膿毒未盡。脈先弱。此元氣虛。宜補之。否則後必生變。彼惑于人言。乃服敗毒藥。腐肉雖潰。瘡口不完。忽腹中似病。後去白垢。肛門裏急。復求治。曰此裏虛。然非痢。非毒。當溫補脾胃。

爲善。因諸瘍醫皆以爲毒未盡。仍服敗毒藥而死。

賀少參朝儀背胛患疽大如豆粒根畔木悶不腫肉色如常曰氣虛毒甚之症。雖用大補劑亦不能收斂。先用活命飲二劑。背強少和又二劑疽少赤用大補劑瘡出黑血杯許繼有鮮血。微有清膿。曰可見氣血虛極矣。他醫以爲屬氣血有餘之症。密用攻毒一鍾卽嘔逆腹內陰冷而死。

少司寇周玉岩背患疽在胛已四日瘡頭如粟重如負石堅硬不起。自以爲小恙。外敷涼藥。內服連翹消毒散。去後四次形體倦怠。自汗盜汗。口乾無寐。曰瘡不宜硬。色不宜黯。周曰。初起時赤而軟。自前二藥以致如此。曰凡瘡外如麻。

三內如瓜。毒結於內。非小患也。脈輕診如數。按之則微。未潰脈失弱。王後難歛。因與卿雅不能辭。遂隔蒜灸二十餘壯。乃知痛又十餘壯。背覺少和。服六君子湯加黃芪藿香當歸麻黃根浮麥二劑。渴止汗少歛。瘡色仍黯堅硬。又服辛溫活血之藥。瘡起至渴止汗歛所結死血得散。良久汗復出口復乾。又復數劑。外皮雖潰。清膿尙未潰。通于內膿。欲走別處。彼用藥圍之。曰。裏虛而膿不能潰于外。圍藥逼毒入內。至十二日。脈浮。按之無如。再用前藥一劑。加薑桂。服之即安寐。又二日。脈忽脫。再于前藥加附子七分。服二劑。乃曰。背今日始屬吾也。形體亦健。頗有生意。因先曰有言。

難以收斂。屢更醫雜用清熱解毒及敷涼藥。遂至裏虛元氣下陷去後如痢。用治痢消毒藥而死。

初起不宜用涼藥以遏抑邪氣令不得出。犯此禁則其病益加。

過如此爲醫安。有長進之日。

明是陰血大虧津液耗竭乃不救其陰。專補其陽以致生變尚不悟而巧爲却

無成功。此症隔蒜艾灸用六君子湯以外敷內服者多矣。苦寒之失至過熱之品圍藥之法均宜詳參。

姜舉人患發背十日正腐潰作渴喜熱湯飲此中氣虛不能

充津液而口乾宜預補之。否則不能收斂後瘡口故不收。

猶以毒爲未盡。用敗毒藥兩月瘡口不完。清利腹痛又服

清涼之藥而死。

王序班患發背元氣虛弱用托裏藥而始起。用大補藥而始

潰。彼惑他議。敷涼藥。致腹內不和。裏急後重。去後如痢。大孔作痛。曰。此裏虛非痢。仍用敗毒治痢藥而死。

一男子四十餘歲。患發背未潰。卽作渴脈。數腫高色紫面赤。小便如膏。以加減八味丸料。加酒炒加柏爲丸。每日空心並食前。以童便送下百丸。用八珍湯加五味麥冬黃芪酒炒知母赤小豆食遠煎服。逐日又以童便代茶飲之。渴止瘡潰而愈。吾治得生者。此人耳。五味不可妄用

汪夫人患發背。用敷藥令肩內欲嘔。急令洗去。用托裏藥尋愈。又劉太宰紫岩太夫人患發背。元氣不足。用托裏藥而起。王安人發背正潰時。欲速敷。俱敷草藥。卽日而死。

劉大尹年將五十，陸歸赴京，兼喪其妻，發背盈尺，中六寸許，不痛，發熱，口乾惡寒。自汗少食，大便不禁，且氣促，脈浮大。按之空虛，用補中益氣湯加半夏、茯苓四劑。又隔蒜炙之。彼云：背重已去，形氣少健，但吞酸。前日所進飲食，覺仍在腹，又以前藥加薑桂服二帖。飲食少進，吞酸已止，始得睡。瘡且不痛，不潰，疑爲陰症。曰：此陽氣虛，不能營於患處，故所患肉死而不痛，不潰也。若胃氣回，飲食進，死肉卽潰矣。仍服前藥六劑。飲食漸進，患處漸潰，脈有力。曰：此陽氣回矣。後惑于他醫云：必服飛龍奪命丹。出汗爲善，遂進一服。汗大出三日，不止，復請治。曰：汗多亡陽，無能爲也。強曰：諸

書云。汗之則瘡已。豈遂爲患後果死。東垣曰。瘡瘍因風熱  
鬱於下。其人多怒其瘡色赤。腫窩結硬而痛。左關脈洪緩  
而強。是邪客于血脉之上皮膚之間。故發其汗。而通其榮  
衛。則邪氣去矣。謙甫治瘡瘍。冬月脈浮緊。按之洪緩。乃寒  
覆皮毛。鬱遏經絡。熱不得升。聚而赤腫。蓋冬月乃曰寒氣。  
收斂皮膚緻密腠理。汗不得出。而設也。况發汗乃陰盛陽  
虛邪不能自出。必得陽氣泄。汗乃出。是助陽退陰之意也。  
且前症未潰。其氣血既虛。潰後氣血愈虛。凡瘡雖宜汗。然  
元氣虛者不宜。況所見之症俱屬不足。豈可汗耶。口乾者  
身之漸

也。何以用  
半夏茯苓

晉都機房紀姓者背瘡冒氣虛用溫補藥而飲食進大補藥而瘡腐愈後患腿痛用養血化痰之劑少止彼嫌功緩他醫以爲溼熱服麻黃左經湯一劑汗出不止曰必發瘻而死已而果然

王德之患發背脈浮數按之則澁大便五六日不行腹不加脹曰邪在表不在裏但因氣血虛飲食少故大便不行非熱結也宜生氣血爲主彼泥積毒在內用大黃之藥下之遂連瀉三四次更加發熱來日又服一劑瀉遂不止飲食不化吃逆不絕手足皆冷診之脈已脫辭不治其子曰瀉之能爲害平曰服利藥而利不止者死不當瀉而瀉令人

開腸洞泄不禁者死。下多亡陰者死。曰瘡瘍乃積毒在臟。若不驅逐其毒何以得解。曰瘡瘍雖積毒在臟腑。治法當先助胃氣使根本堅固。參以行經活血時宜之藥。非專用大黃也。今病在表而反以峻利之劑重奪其陰可乎哉。故曰表病裏和而反下之。則中氣虛。表邪乘虛而入。由是變症百出。雖云脈浮數邪在表屬外。因當用內托復煎散其中黃芩蒼朮亦不敢用脈沈實邪在內屬內因當用內疏黃連湯。其中大黃檳榔亦不敢用。况浮數澁三脈皆主氣血俱虛邪既在表而反用峻利之劑重寫其裏。誅役無故不死何俟。

一縣尹背瘡竟背腐潰色黯重若負石危甚飲食頗進用紅  
桃散色漸赤負漸輕再用而肌生更服托裏藥而愈蓋此  
大毒症非峻藥莫能治內用砒故用攻毒有效。

平氏室患發背以托裏消毒藥二十餘劑而潰因怒頓吐血  
五六椀許氣弱脈細此氣血虛極也遂令服獨參膏劖許  
稍緩更以參耆歸朮陳皮炙草三十餘劑瘡口漸合設投  
以犀角地黃湯沈寒之藥鮮有不誤。

徐符卿年逾四十患發背五日不起肉色不變脈弱少食大  
便不實但以疽未潰脈先弱難于收斂用托裏消毒二劑  
方起發彼惑一嫗言貼膏藥服攻毒劑反甚背如負石復

請治。遂以隔蒜灸三十餘壯。云背不覺重。但痒痛未知。更以托裏藥。知痒痛。膿清。仍以前藥倍加參耆。佐以薑桂。膿稍稠。又爲人惑。外用豬腰子貼。抽膿血。內服硝黃劑。遂流血五六碗許。連瀉十行。腹內如冰。飲食不進。不得已連診之。脈還脫。已不可爲矣。蓋其症屬大虛不足之甚。雖一干溫補。猶恐不救。况用攻伐之劑。不死何俟。

顧浩室年逾四十。患發背。治以托裏藥。而潰忽。嘔而瘡痛。胃脈弦緊。彼以爲餘毒。內攻東垣。云嘔吐無時。手足厥冷。臟腑之虛也。丹溪云。潰後發嘔不食者。溼氣侵於內也。又云。膿出而反痛者虛也。今胃脈弦緊。木乘土位。是虛明矣。欲

以六君子湯加酒芍砂仁藿香治之。彼自服護心散，嘔愈甚。仍用前藥，更以補氣血藥。兩月而愈。大抵溼氣內侵或感穢氣而作嘔，必喜溫而脈弱。熱毒內攻而作嘔者，必喜涼而脈數。必須辨認明白。

鄭揮使年逾五十，患發背形症，俱虛用托裏藥而潰，但有腐肉當去。彼懼不肯延至旬日，則好肉皆敗矣。雖投大劑毒甚，竟不救。古人謂壞肉惡千狼虎，毒千蜂蟻，緩去之則戕賊性命，信哉。

張宣人年逾六十，患發背，三日肉色不變，頭如粟許，肩背加重，寒熱飲冷，脈洪數。陳良甫云：外如麻，裏如瓜。齊氏云：憎

寒壯熱所患必深。又曰肉色不變發于內也。以人參敗毒散二劑乃隔蒜炙五十餘壯毒始發。背始輕。再用托裏藥漸潰。氣血虛甚而作渴。參芪歸地等藥渴亦止。彼欲速自用草藥罨患處。毒氣復入。遂不救。嘗見老弱者患此瘡頭不起。或堅如牛領之皮。多不待潰而死。有潰後氣血不能培養者亦死。凡瘡初潰。毒正發越。宜用膏藥吸之。參耆等藥托之。若反以藥遏之。使毒氣內攻者必不救。

王太守宜人患發背。膿熟不開。昏悶不食。此毒入內也。斷不治。強之針膿枕許。稍蘇須臾竟亡。大抵血氣壯實。膿自涌出。老弱之人。血氣枯槁。必須迎而奪之。順而取之。若毒結

四肢砭刺少緩。腐潰深大亦難收斂。痛結於頰項脅腹。緊要之地。不問壯弱急宜針刺。否則難治。

郭職方名璉患背瘡潰陷色紫舌卷謂下陷色紫主陽氣脫舌卷囊縮肝氣絕遂辭之經日舌卷囊縮此筋先死庚日篤辛日死果至立秋日而歿。

姚應鳳治撫軍喻恂駐師溫州拒海賊劉香受降有日毒發背閒劇甚應鳳至割腐肉二大器洞見五臟隨敷以丹藥越二日癰平開轅門坐受降撫喻喜深德之。仁和縣志

王洪緒治木瀆譚姓婦患背瘡如碗初起色白近已轉紅痛甚時值三伏與陽和湯或曰暑天何用麻桂熱劑曰此陰

症也。又云患色轉紅陰已回陽，乃立令煎服。不一時痛止。  
連進四服，症減其七餘分。三分有膿，不痛而潰。五日收功。  
錢國賓治湖州三官廟僧大乘，發背長二尺，濶八寸，深寸許。  
中閒如蜂窩，二百餘頭流膿，痛極欲死。乃半身發也。此僧  
素喜燭炙，多動肝氣。其脈浮洪可救。以新槐子一合，生白  
朳一錢，盛錫壺內，冲滾水二三碗，再以壺炖水內煮十數  
滾，令味盡出。陸續飲之，至五七壺痛止。外用綠膏藥取松  
香一觔，五兩燒酒五觔，微火煮乾爲度。領冷水內，以手捻  
成松子，百次去水酒溼氣。用全蝎二十一個，蜈蚣二十條。  
真蟾酥五錢，乳香沒藥各三錢，銅綠八錢。各另研。方以松

香化開。入香油少許。試老嫩成膏。待松香冷定。方入總藥。攬勻盛磁罐內。隔水炖攤。一日一換。每次下腐肉一層。生肌如石榴子。二十日收口。此膏妙在一長齊平。不比別膏。自周圍長至豆大。難收口也。凡冤業大毒。一切通治。内外治法

俱有  
巧思

治發背膏藥方。滴乳香。箬包燒紅磚壓去油四兩。淨沒藥四兩。製同上。白色兒茶。上好銀硃。鮮紅血竭。杭州定粉。上好黃丹各四兩。上好銅綠三錢。以上俱各碾至無渣。爲度篩。極細末。和勻磁瓶密貯。臨用照患之大小。用夾連四油紙一塊。以鍼多刺小孔。每張以藥末五錢。麻油調攤紙上。再

用油紙一塊蓋上周圍用線將二紙合縫一處貼患上卽止痛化腐生新過三日將膏揭開煎葱湯將患洗淨軟絹拭乾將膏藥翻過用鍼照前刺小孔貼之無火之人內服十全大補湯有火者減去肉桂薑棗兼以飲食滋補無不取效

治發背初起方。遠志肉甘草汁煮去骨五錢。甘草一錢五分。鮮甘菊花葉一兩。貝母三錢。鮮忍冬藤五錢。紫花地丁五錢。連翹一錢。白芨三錢。

又托裏敗毒散。棉黃芪鹽水炒三錢或五錢或八錢一兩。水炙甘草節二錢可加至四五錢。赤芍一錢。金銀花三錢。茜

草江<sub>西出細</sub>如燈心者三錢。何首烏五錢。白殭蠶炙研六分。白芨二

錢五分。皂角刺一錢。貝母二錢。天花粉三錢。穿山甲土炒研一錢。鼠粘子炒研一錢。蟬退去翼足一錢。先用夏枯草五兩。河水五大碗。煎三碗。入前藥同煎至一碗。不拘時服。陰症去後五味。加人參三錢。麥冬五錢。

又潰後服方。人參三錢。麥冬五錢。綿黃芪蜜炒五錢。或一兩。炙甘草一錢。五味子蜜拌蒸一錢。白芍酒炒三錢。金銀花三錢。山藥炒三錢。水煎服。潰瘍忌朮。腫瘍忌當歸。廣筆記

# 肺癰肺痿

薛立齋治一婦人，素血虛發熱咳嗽，服痰火之劑後吐膿血，而赤脈數，其熱甚危。此膿成而氣血虛也。用八珍湯補元氣桔梗湯治之而愈。

一婦人感冒風寒，或用發表之劑，反咳嗽喘急，飲食少，思胸膈不利，大便不通，右寸關浮數，欲用疏通之劑。薛曰：此因脾土虧損，不能生肺金。若更利之，復耗津液，必患肺癰矣。不信，仍利之。虛症悉至。後果吐膿，乃朝用補中益氣湯，夕用桔梗湯，各數劑。吐膿漸止。又朝仍用前湯，夕用十全大補湯，各五十劑。喜其善調理，獲愈。

一婦人咳嗽吐痰，胸膈作痛，右寸關浮滑，項下牽強，此脾胃

積熱之痰非癰也以二陳山梔白朮桔梗治之而安

一婦人素血虛內熱時咳用辰孟冬兩尺浮洪以脾不健請治曰防患肺症丙午孟春果咳嗽左右寸脈洪數肺癰也。膿已成右寸脈仍洪數乃心火尅肺金夏令可憂用壯水健脾之劑稍愈彼遽自忽不自調攝果殞于夏令。

喻嘉言治施眉蒼肺痿喘嗽吐清痰肢體軟痿不能舉動脈來虛數以蛤蚧二十枚酒浸酥炙人參黑參各十兩蜜丸時時噙化不終劑而痊出張氏醫通

張路玉治陸去非肺痿聲嘶吐痰午後發熱自汗左脈弦細右脈虛濡平昔勞心耽色所致先與生脈散合保元湯次

與異功散加黃芪並薑棗。與都氣丸。晨夕間進調補半月。  
熱除痰止。月餘方得聲清。

孫起伯肺脹服耗氣藥過多。脈浮大而重按豁然。飲食不入。  
幸得瀉清便堅。金土未憊。與局方七氣丸。每劑用人參三錢。肉桂半夏。麴炙甘草各一錢。生薑四片。四劑霍然。蓋脹肺實。

症居多。此脈虛大當不以尋常論也。

一尼患肺脹喘鳴肩息。服下氣止嗽藥不應。漸至胸腹脹滿。  
脈得氣口弦細而濶。此必勞力氣上悞飲冷水傷肺。肺氣不能收斂所致也。遂與越婢湯減麻黃加細辛。葶苈大瀉肺氣而安。

一酒客嚴冬醉臥渴飲冷茶肺脹喘咳脈得氣口沈眩搏指  
與小青龍去白芍加葶苈半夏一劑而痊則知肺脹喘滿  
當以葶苈爲向導也非實症未可輕投

孫文垣治初陽姪婦先時咳嗽諸治無功嗽急則吐用碧玉  
散二錢白湯調下立止半年復咳嗽胸背隱隱疼痛常內  
熱吐出桃紅膿甚多且腥穢右脇並乳脹痛診之脈洪數  
大便燥肌骨瘦立此肺癰症也用貝母茜根白芍各一錢  
知母麥冬山梔紫苑各八分桑皮當歸丹皮杏仁各七分  
苡仁一錢五分甘草葶苈各五分服之甚安但稍停卽發  
或云肺竅中痰積瘀血尙多未能卽去宜緩圖之候膿盡

當愈。孫謂丹溪雖有此言，亦不可執。設不以藥消化之，必俟其自己恐歲月深而有他變。且中年之人，何能當此？莫若清熱潤肺，消痰化瘀，久服或早愈也。或又謂久嗽傷肺，宜補，每補必增熱加痛，加咳，而膿轉多，仍依法治之二年，良愈。

喻嘉言治陸令儀母，平日持齋，腸胃素槁，天癸已絕，復淋漓不止，治之久痊。值秋月燥金太過，溼蟲不生，人多病咳，而血虛津槁之軀，受傷獨猛，胸脇緊脹，上氣喘急，臥寐不寧，咳嗽則大痛痰中帶血，而腥食不易入，聲不易出，寒熱交作，申酉二時燥金用事，諸苦倍增，脈時大時小，時牢伏時

弦緊服清肺藥無進退。告以肺癰將成高年難任。以草薢  
大棗瀉肺湯先通肺氣之壅。卽覺氣稍平。食少入痰稍易  
出身。稍可側。大有生機。喻曰未也。因見來勢太急。不得已  
取快一時。暫開者易至復閉。迨復閉則前法不可再用矣。  
今乘其暫開多方以圖。必在六十日後。交立冬節方是愈  
期。蓋身中之燥與時令之燥。膠結不解。必俟燥金退氣。肺  
金乃寧。後六十日閒。屢危屢安。大率皆用活法斡旋。緣病  
不可補。而脾虛又不能生肺。肺燥喜潤。而脾滯又難于運  
食。今日脾虛不思飲食。則于清肺中少加參朮以補脾。明  
日肺燥熱盛。咳嗽則于清肺中少加阿膠以潤燥。日復一

日扶至立冬之午刻病者忽自云內中光景大覺清爽可得生矣奇哉天時之燥去而肺金之燥遂下傳大腸五六日不一大便略一潤腸旋卽解散正以客邪易去耳至小雪節康健加餐倍于曩昔蓋胃中空虛已久勢必復其容受之常方爲全愈也

薛立齋治一男子神勞冬月患咳嗽服解毒之藥自以爲便曰此因肺氣虛弱腠理不密而外邪所感也當急補其母是治本也始服六君子湯內去參尤反加紫蘇枳壳之類以致元氣亦虛生肺癰而歿

一武職因飲食起居失宜咳嗽吐痰用化痰止嗽之藥時仲

夏左尺洪數而無力。胸滿面赤。吐痰腥臭。自汗。曰。腎虛水泛爲痰。而反重亡津液。得非肺癰乎。不信。仍服前藥。翌日吐膿脈數。右寸爲甚。用桔梗湯一劑。脈數與膿頓減。又二劑將愈。佐以六味而痊。

一男子咳嗽喘急。發熱煩燥。面赤咽痛。脈洪大。用黃連解毒湯二劑少退。更以梔子湯四劑而安。此肺癰將成未成之候

薛立齋治一男子患肺癰。咳嗽喘急。吐痰腥臭。胸滿咽乾。脈洪數。用人參平肺散六劑及飲童便。諸症悉退。更以紫苑茸湯而愈。童便雖云治虛火。常治瘡瘍。焮腫。疼痛。發熱作渴。及肺癰肺癰。發熱口渴者尤效。

一僕年逾三十。嗽久不愈。病久故可用瀉氣壅不利。睡臥不安。略吐膿血甚覺可畏。其主已棄之矣。與寧肺散一服少愈。又服而止大半。乃以寧肺散湯數劑而痊。所以有是病必用是藥。若以前散性滯而不用。何以得愈。

上舍毛體仁素陰虛。春初咳嗽。胸中隱痛。腎脈洪數。肺脈數而時不見。曰內當結癰。先用六味地黃丸料一劑。服之翌日來謂曰。昨得良劑。嗽愈六七。務求一方到監調理。曰陰虛火炎。患癰之症。第因元氣虛弱。未能發出。因其易忽薛不能治。乃別用降火化瘀等劑。愈甚月餘。復請診之。脈洪滑而數。曰膿已成矣。當請常治之者。同論針之。且免內潰。

之患。仍不決。又月餘請視。他醫已先開瘡孔。偏上。塊膿不出。仍內潰。脈愈洪大。曰脈洪滑而數。其舌青黯。內臟已壞。無能爲矣。後果然。

一男子咳嗽。兩脇脹滿。咽乾日燥。咳唾腥臭。以桔梗湯四劑而唾膿。以排膿散數服而止。乃以補陰排膿之劑而瘳。

一男子咳而膿不止。脈不退。諸藥不應。甚危。用枯黃丸一服少愈。再服即退數服而痊。枯黃一兩爲末。百齒霜即梳垢二錢。用糊爲丸如梧桐子大。每服三五丸。米飲下。枯黃乃枯

樹所生者。其色黃。狀似靈芝。江南最多。北方鮮有。

一婦人吐膿。五心煩熱。口渴胸悶。以四順散二劑少止。以排

膿散數服而安。排膿散。黃芪白芷五味人參四順散。貝母  
紫苑桔梗各一錢。半夏甘草各七分。作一劑水煎食。遠服。  
一男子因勞咳嗽不止。項強而痛。脈微緊而數。此肺癰也。尙  
未成膿。欲用托裏益氣藥。彼不信。仍服發散藥。致血氣愈。  
虛吐膿不止。竟不救。經曰。肺內主氣。外司皮毛。若肺氣虛。  
則腠理不密。皮毛不澤。肺受傷。則皮毛錯縱。故患癰瘍。腸  
癰者。必致皮毛如此。以其氣不榮養而然也。亦有服表藥  
見邪不解而仍用發表。殊不知邪不解者。非邪不能解。多  
因腠理不密。而邪復入也。專用發表。則腠理愈虛。邪愈易  
入。反爲敗症矣。宜診其脈。邪在表者。止當和解。而實腠理。

乘虛復人者亦當和解兼實腠理故用托裏益氣之藥。若小便赤色爲肺熱所傳短少爲肺氣虛蓋肺爲母腎爲子母虛不能生子故也。亦有小便頻者亦爲肺虛不能約制耳。

一男子面白神勞咳嗽胸臆隱痛其脈滑數以爲肺癰欲用桔梗湯不信服敗毒散致咳嗽愈甚吐痰腥臭始悟仍服前湯四劑咳嗽少定又以四順散四劑而脈靜更以托裏藥數劑而愈大抵勞傷血氣則腠理不密風邪乘肺風熱相搏蘊結不散必致喘咳又因汗下過度則津液重亡遂成斯症若寸脈數而虛者爲肺癰數而實者爲肺疽脈微

緊而數者未有膿也。緊甚而數者已有膿也。唾膿而止脈短而面白者易治。膿不止脈洪大而面赤色者不治。使其治早可救。膿成則無及矣。金匱方論熱在上焦者因咳爲肺癰。得之或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。或從便難。人被下藥快利。重亡津液。故寸口脈數。其人燥咳。胸中隱隱時痛。脈反滑數。此爲肺癰。咳吐膿血脈數虛者爲肺癰數實者爲肺癰。

一童子氣稟不足。患肺癰。吐膿腥臭。皮毛枯槁。脈浮按之濇更無力。用鍾乳粉湯治之。

一男子患之形症皆同。唯咽喉時或作痒。痰多。脇痛。難于睡。

臥用紫苑茸湯治之而病愈。

一弱人咳膿日晡發熱夜間盜汗脈浮數而緊用人參五味子湯數劑而愈以苑茸湯月餘而痊

一男子患肺痿咳嗽喘急吐痰腥臭胸滿咽乾脈洪數用人參平肺散六劑及飲童便諸症悉退更以紫苑茸湯而愈童便雖云專治虛火常治瘡瘍腫焮疼痛發熱作渴及肺痿肺癰發熱口渴者尤效

一婦人患肺痿咳嗽吐痰腥臭日晡發熱脈數無力用地骨皮治之熟止更用人參養肺湯月餘而安

一男子前病肺癰後又患咳嗽頭眩吐沫飲食少思小便頻

數服解毒散化痰藥不應診之脾肺二脈虛甚謂暈眩唾涎屬脾氣不能上升小便無度乃肺氣不得下降尙未成膿耳投以加味理中湯四劑諸症已退大半更用鍾乳粉湯而安河間曰金匱云肺痿屬熱如咳嗽肺癟聲啞聲嘶咯血此屬陰虛熱甚然也本論治肺痿吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小便數以上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩多涎唾用甘草乾薑此屬寒也脈痿涎唾多心中溫溫液液者用炙甘草湯此補虛勞也亦與補陰虛火熱不同是皆宜分治故肺痿又有寒熱之異也

趙以德治一婦人年二十餘患肺癰胸膺間患一竅口中所

咳膿血與竅相應而出以人參黃芪當歸補氣血劑加退  
熱排膿等藥服之不一月而安

藥要或問

治肺癰目擊神效其法用百年芥菜鹵久窖地中者數匙立  
起此鹵嘉興府城中大家多藏之

廣筆記魚腥草不住口食之治肺癰吐膿血神方也正名蕺  
草兼治魚口

雄按此方可治鵝片烟癰

薛立齋治陸司廳子仁春間咳嗽吐痰腥穢胸滿氣促皮膚  
項強脈數此肺疽也蓋肺系在項肺傷則系傷故牽引不  
能轉側肺者氣之本其華在毛其充在皮肺傷不能攝氣  
故脹脹氣促而皮膚縱東垣云肺瘡之脈微緊而數者未

有膿也。緊甚而數者已有膿也。其脈來緊數則膿已成。遂以人參黃芪當歸川芎白芷貝母知母麥冬。棗仁桔梗防風甘草兼以蠟燭丸及太乙膏治之。膿盡脈濬而愈。至冬脈復數經云飲食勞倦則傷脾。脾傷不能生肺金。形寒飲冷則傷肺。肺傷不能生腎水。腎水不足則心火熾盛故脈來洪數經云冬見心脈而不治果死于火旺之月。凡肺疽愈而復作多不治余常治三人一間三年兩間一年皆復作而死

周國用年逾三十患咳嗽項強氣促右寸脈數此肺疽也。東垣云風中於胃呼氣不入。熱攻于榮吸氣不出。風傷皮毛熱傷血脉風熱相博血氣稽留于肺變成瘡疽。診其脈數

而虛者。肺痿也。數而實者。肺疽也。今診脈滑。此疽膿已成。  
以排膿托裏之藥及蠟燭丸治之。脈漸濇而愈。錦衣李大  
器亦患此。吐膿面赤脈大。謂肺病脈宜濇。面宜白。今脈大  
面赤。火魁金也。不可治。果歿。

一男子年逾四十。喘咳。脇痛。胸滿。氣促。右寸脈大。此風熱蘊  
於肺也。尙未成瘡。屬有餘之症。意欲以瀉白散治之。彼謂  
肺氣素怯。不然之。乃服補藥。喘咳愈甚。兩月後復請視之。  
二語贊汗出如油。喘而不休。此肺氣已絕。不治果歿。夫肺氣充實。  
邪何從襲。邪氣既入。則宜去之。故用瀉白散。所以瀉肺氣  
之邪也。邪氣既去。則真自實矣。

姚應鳳治某叟患脹滿。諸醫多云隔症。應鳳曰此肺癰耳。令病者閉目。取一大盤水。向病者項上傾之。病者陡大驚吸。舉刀直刺心坎。瀉膿血數椀而愈。人問之。應鳳曰心尖下垂。水潑而驚驚則心系提。吾刀可入也。

仁和縣志

沈夫人患嗽血晝夜不休。應鳳曰肺虛痿不虛潰。今潰至第三葉。尚可生也。先投洗肺湯已。令食猪肺數十斤。遂愈。

王洪緒曰諸患易識。獨肺中患毒難覺。凡兩脚骨疼痛者。或脚骨不痛。而舌下生如細豆一粒者。再必口直上內作微疼。及咳嗽口乾咽燥。皆肺中生毒之候也。卽用甘草桔梗各三錢煎服。服後如覺少安。肺之患毒無疑矣。以犀黃丸。

十服服完全愈此是預識先治百無一死者余每見此症  
吐膿膿色皆白故稱肺疽用犀黃丸治無不效或用陳年  
鹽菜滷每早取半杯滾豆漿沖服服後胸中一塊塞上塞  
下數次方能吐出連吐惡膿日服至愈患此症者終身戒  
食鴨蛋白煮紅蘿蔔著甲魚石首魚食則復發不救  
千金葦莖湯葦莖二斤薏苡仁半斤桃仁五十枚瓜瓣半斤  
以水五斗先煮葦莖得五升去渣內諸藥煮取二升服一  
升再服當吐如膿王晉三曰是方也推作者之意病在膈  
上越之使吐也蓋肺癰由于氣血混一營衛不分以二味  
涼其氣二味行其血分清營衛之氣因勢湧越誠爲先著

其瓜瓣當用絲瓜者良。時珍曰。絲瓜經絡貫串。房隔聯屬。能通人脈絡臟腑。消腫化痰。治諸血病。與桃仁有相須之理。茲仁下氣。葷莖上升。一升一降。激而行其氣血。則肉之未敗者。不致成膿癰之已潰者。能令吐出矣。今時用嫩葷根性寒滌熱。冬瓜瓣性急趨下。合之二仁。變成潤下之方。借以治肺癰。其義頗善。徐靈胎曰。此治肺癰之主方也。

徐靈胎曰。古之醫者。無分內外。又學有根柢。故能無病不識。後世內外科既分。則顯然爲內症者。內科治之。顯然爲外症者。外科治之。其有病在腹中。內外未顯然者。則各執一說。各擬一方。曆試諸藥。皆無效驗。輕者變重。重者卽殞矣。

此等症不特外科當知之。卽內科亦不可不辨分真確。知  
非已責。卽勿施治。毋致臨危束手而後委他人也。腹內之  
癰有數症。有肺癰。有肝癰。有胃肫癰。有小腸癰。有大腸癰。  
有膀胱癰。惟肺癰咳吐腥痰。人猶易辨。餘者或以爲痞結。  
或以爲瘀血。或以爲寒痰。或以爲食積。醫藥雜投。及至成  
膿治已無及。並有不及成膿而死者。病者醫者始終不知  
何以致死。比比然也。今先辨明痞結瘀血寒痰食積之狀。  
凡痞結瘀血必有所因。且由漸而成。寒痰則痛止無定。又  
必另現痰症。食積則必有受傷之日。且三五日後大便通  
即散。惟外症則痛有常所。而遷延益甚。金匱云。諸脈浮數。

應當發熱而反漸漸惡寒。若有痛處。當發其癰。以手按腫上。熟者有膿。不熟者無膿。此數句乃內癰真諦也。又云腸癰之爲病。身甲錯。腹皮急。按之濡如腫狀。腹無積聚。身無熱是也。若肝癰則脇內隱隱痛。日久亦吐膿血。小腸癰與大腸癰相似。而位略高。膀胱癰則痛在少腹之下。近毛際著皮卽痛。小便亦艱而痛。胃腕癰則有虛實二種。其實者易消。若成膿必大吐膿血而愈。惟虛症則多不治。先胃中痛。脹久而心下漸高。其堅如石。或有寒熱飲食不進。按之尤痛形體枯瘦。此乃思慮傷脾之症。不待癰成卽死。故凡腹中有一定痛處。惡寒倦臥不能食者。皆當審察。防成內

癰慎毋因循求治于不明之人以致久而膿潰自傷其生也。

# 腹癰

薛立齋治上舍周一元腹患癰三月不愈。膿水清稀。朝寒暮熱。服四物知柏之類。食少作瀉。涎上湧。服二陳枳實之類。痰涎愈甚。胸膈痞悶。問故曰。朝寒暮熱。血氣虛也。食少作瀉。脾腎虛也。悉因真氣虛而邪氣實也。當先壯其胃氣。使諸臟有所稟而邪自退矣。乃遂用六君子。黃芪當歸數劑。諸症漸退。又用十全大補湯。肌肉漸斂。更用補中益氣。

調理而愈。

從姪孫年十四而畢姻乙巳春年二十四腹中作痛用大黃等藥二劑下血甚多胸腹脹滿痰喘發熱又服破氣降火藥一劑汗出如水手足如冰薛歸診之左關洪數右關尤甚乃腹癰也雖能收斂至夏必變而成瘵症用參芪各一兩歸朮各五錢陳皮茯苓各三錢炙草炮薑各一錢二劑諸症稍退腹始微赤按之覺痛又二劑作痛又二劑腫痛脈滑數針出膿瘀更用大補湯精神飲食如故因遺精患處色黯用前藥加五味山萸山藥骨脂吳萸等劑瘡口漸斂。療症悉具其脈非洪大而數卽微細如無惟專服獨參

湯人乳汁少復良久仍脫曰當備後事以俟火旺乃禱鬼  
神巫者曆言往事如見更示以方藥皆峻利之劑且言保  
其必生敬信服之後果歿經曰拘于鬼神者不可與言至  
德而況又輕信方藥于邪妄之人耶書此以警後患

薛立齋治一男子腹患癰腫硬不潰乃陽氣虛弱嘔吐少食  
乃胃氣虛寒法當溫補脾胃假如腫赤痛甚煩燥脈實而  
嘔爲有餘當下之腫硬不潰脈弱而嘔爲不足當補之若  
痛傷胃氣或感寒邪穢氣而嘔者雖肺癆猶當助胃壯氣  
彼信不眞仍服攻伐藥而嘔甚復請治脈微弱而發熱曰  
熱而脈反靜脫血脈反實汗後脈反躁者皆爲逆也辭不

治果歟。

秋官錢可容腹患癰。焮腫煩渴作痛。飲冷大便不通。脈沈數實。此熱毒蘊于內。清熱用消毒散。加大黃二錢。一劑諸症悉退。但形氣頓虛。用托裏消毒散。去銀花白芷。倍加參芪歸朮而安。

毛礪安側室。肚患癰月餘矣。色黯不腫。內痛作嘔。飲食不入。四肢逆冷。其脈或脫絕或浮大。雜用定痛敗毒之藥。曰。此氣血俱虛而作痛。內決無膿。不治之症也。強用大溫補之藥。二劑痛止。色赤。飲食少進。謂但可延日而已。人皆以爲有膿。復強針之。又用大補之劑。始生清膿。少許。衆仍以爲

毒結于內。用攻膿保其必生。殊不知乃速其死耳。惜哉。

一男腹患癰腫硬木悶煩熱便秘。脈數而實。以黃連內疎湯一劑少愈。以黃連解毒散二劑頓退。更以金銀花散四劑。

### 瘡頭出水而消

一男年逾三十。患腹癰腫脈數喜冷。齊氏云。瘡瘍腫起堅硬。瘡疽之實也。河間云。腫硬木悶喜飲冷。邪氣在內也。遂用清涼飲倍用大黃三劑稍緩。次以四物湯加芩連山梔木通四劑而遂潰。更以十宣散去參芪肉桂。加金銀花天花粉漸愈。彼欲速效自服溫補之劑。致腹俱腫。小便不利。仍以清涼飲治之。膿潰數碗。再以托裏藥治之愈。東垣云。瘡

疽之發其受有內外之別。治之有寒溫之異。受之外者。法當托裏以溫劑。反用寒藥。則是皮毛始受之邪。引入骨髓受之內者。法當疎利以寒劑。反用溫補托裏。則是骨髓之病。上徹毛皮。表裏通潰。共爲一瘡。助邪爲毒。苦楚百倍。輕則幾殆。重則死矣。

一男子素好酒色。小腹患毒。脈弱微痛。欲求內消。謂當助胃壯氣。兼行經活血藥。佐之可消。不宜用敗毒等藥。彼欲速效。乃自用之。病熱果盛。瘡亦不潰。飲食少思。迨兩月餘。復請治。診其脈愈弱。盜汗不止。聚腫不潰。肌寒肉冷。自汗色脫。此氣血俱虛也。故不能發腫成膿。以十全大補湯三十

餘服。遂成膿刺之反加煩躁脈此亡陽也。以聖愈湯服二劑。仍用前藥百貼愈。

劉貴患腹癰。焮痛煩躁作嘔。脈實河閒云瘡瘍者。火之屬須分內外以治其本。若脈沈實者。先當疎其內。以絕其源。又曰嘔噦以煩。脈沈而實。腫硬木悶。或皮肉不變。邪氣在內。宜內疎黃連湯治之。今作嘔脈實。毒在內也。遂用前湯通利二三行諸症悉退。更以連翹消毒散而愈。

一人患腹癰。膿熟開遲。脈微細。膿出後。瘡口微膿如蟹吐沫。此內潰透膜也。凡瘡瘍透膜十無一生。雖以大補藥治之。亦不能較。此可爲待膿自出之戒也。

黃師文云。男子服建中湯。婦人服四物湯。往往十七八得但時爲之損益耳。有男病小腹一大癰。其諸弟侮之曰。今日用建中湯否。師文曰。服建中湯俄而癰潰。蓋小腹癰本虛其熱毒乘虛而入。建中湯既補虛。而黃芪且潰膿也。北窗灸輶

# 腰疽

薛立齋治府庠彭碧溪。患腰疽。服寒涼敗毒之藥。色黯不痛。瘡頭如鋪黍。背重不能安寢。耳聵目白。面赤無神。小便頻瀆。作渴迷悶。氣粗短促。脈浮數重。按如無。先用磁水之藥一劑。少傾便利渴止。背卽輕爽。乃砭出瘀血。以艾半斤許。

明炎患處外敷烏金膏內服參芪歸朮肉桂等藥至數劑元氣稍復。自疑肉桂辛熱一日不用手足並冷大便不禁仍用肉桂及補骨脂二錢肉豆蔻一錢大便復常其肉漸潰更用當歸膏以生肌肉八珍湯以補氣血而愈。

錦衣傅允承母年逾七十腰生一癟作痒異常脈浮數反惡寒曰此瘡瘍症也未潰而先弱何以收斂况大便不通則真氣已竭治之無功因懇請不得已用六君加藿香神麩數劑飲食漸進大便始通更用峻補之劑潰而膿清作渴再用參芪歸地麥冬五味渴止彼喜曰可無虞矣曰尙難收斂先日之言也彼疑遂速他醫卒致不起。

舉人顧東溪久作渴。六月初腰患疽。不慎起居瘡潰尺許色黯敗臭。小便如淋。唇裂口刺。七月終請治。左尺洪數。左關浮濶。謂先渴而患疽者。乃腎水乾涸。虛火上炎。多致不起。今膾水敗臭。色黯不痛。瘡口張大。乃脾氣敗而肌肉死也。小便如淋。痰壅喘促。口乾舌裂。乃脾肺敗。而腎水絕也。左尺洪數。腎無所生也。左關浮濶。肺尅肝也。況當金旺之際。危殆速矣。二日後果歿。蓋此症發于兩月方歿者。乃元氣虛不能收斂也。若預爲調補。使氣血無虧。亦有得生者。

一男子腰患毒。膾熟不潰。針之膾大泄。反加煩躁。以聖愈散湯四劑而寧。更以人參養榮湯加麥冬五味。兩月而愈。此

人後患溼氣。遂爲痼疾。凡瘡膿血去多。瘡口難合。尤當補益。務使氣血平復。否則更患他症。必難治療。慎之。

一男子腰中患疽。發而不潰。其氣血止能發起。不能培養。爲膿也。投大補藥數劑。而潰又數劑。膿出尙清。乃服參芪。歸朮膏。斤餘膿少。稠數斤。膿漸稠。肌肉頓生。大凡癰疽。藉血氣爲主。若患而不起。或潰而不腐。或不收斂。及膿少。或清皆氣血之虛也。宜大補之。最忌攻伐之劑。亦有膿反多者。乃氣血不能禁止故也。若潰後發熱。作渴。脈大。而膿愈多。屬真氣虛。而邪氣實也。但不治。常見血氣充實之人。患瘡。皆腫高色赤。易腐潰而膿且稠。又易干收歟。怯弱之人。多

不起發不腐潰，又難于收斂。若不審察而妄投攻劑，虛虛之禍不免矣。若患後當調養，若瘰癧流注之症，尤當補益也。否則更患他症，必難于措治。慎之。

有人腰間生一毒癰，紅腫未破皮痛不可忍，俯躬而行，一人取新殺牡猪肝切片如瘡貼上，外以布纏定。一對畫其病良已。肝色變黑，臭不可近，棄之地，犬不食。下有小指大一點，尚硬，乃肝少未貼滿所致。竟亦無他。

薛立齋治昆山張舉人元忠，孟秋患腰疽，瘡頭如大豆粒，根大三寸許，微腫畧赤，虛症悉具。用桑枝炙患處服活命飲一劑，腫起色赤，飲食仍少。用香砂六君子湯四劑，食漸進。

後用大補藥。膿雖成而不潰。乃每劑加附子一片。二劑後。膿自湧出。旬日而愈。

陸氏女初嫁患腰痛不腫脈沈滑神思倦怠此爲內發七情之火飲食之毒所致以托裏藥一劑下瘀膿升許陳良甫曰瘡未潰內陷面青唇黑者不治果歿

王洪緒治一人患腰疽根盤圍濶二尺餘前連腹後接背不紅不腫不痛不軟按之如木王舉方用炮薑肉桂他醫以爲暑月安可用此熱劑改服攻托清涼閱五日病者神昏無主復延診患仍不痛色如隔宿猪肝言語不清飲食不進王曰過今晚商治是夜卽斃

又一人患此服以陽和湯次日覺鬆又一帖疽消小半。趕合犀黃丸與陽和湯輪轉間服。五日而愈。陽和湯方。熟地一兩。麻黃五分。鹿角膠三錢。白芥子二錢。肉桂一錢。甘草二錢。炮薑炭五分。此方麻黃得熟地不發表。熟地有麻黃不凝膈。神用在斯。主治骨槽風流注。陰疽脫骨疽。鶴膝風。乳岩結核石疽附骨疽。及漫腫無頭平塌白陷。一切陰凝等證。犀黃丸方。乳香一兩。沒藥一兩。麝香一錢。五分。牛黃三分。共爲末。用飯擣丸。每服三錢。陳酒送。上部臨臥服。下部空心服。主治一切陰疽大毒。

續名醫類案卷三十三

錢塘魏之琇編集

海昌王士雄孟英

定州楊照藜素園

同校

腸癰

華陀傳軍吏李成苦咳嗽晝夜不寐時吐膿血以問陀言君病腸癰。咳之所吐非從肺來也。與君散兩錢。當吐二升餘膿血。吐訖自養一月可小起。好自將愛一年便健。十八歲當一小發。服此散亦行復差。若不得此藥。故當死。復與兩錢散。成得藥去五六歲。親中人有疾如成者。謂成曰卿今

強健我欲死。何忍無急葬藥。松之按古語以藏爲弄以待不詳。先持

貸我。我差爲卿從華陀更索成與之已故致謹。適陀見收。

忽忽不忍從求。後閱十八年成病竟發。無藥可服。以至于

死。三國志

薛立齋治金臺院僉憲年逾五十腹內隱痛小便如淋皮膚錯縱而脈滑數此腸癰也。脈滑數則膿已成。遂以廣東牛皮膠溶化送太乙膏下膿升許更以排膿托裏藥及蠟簪丸而愈。

孫文垣治染匠婦腹痛兩年或以爲寒爲熱爲氣爲血爲蟲爲積治不效或與膏藥大如斗貼之痛益劇欲去揭之牢

粘不可揭。卧舟中數人扶之不起。往診見其面色蒼黑。兩手枯燥如柴。六脈皆洪數。腹痛脉洪數內癰可知其得生亦賴此。問其痛之所在。解衣指示。痛有定處始知膏藥牢粘。叩其不能起步之由

乃左脚不可動。動則痛應于心。察其色脈皆非死候。此必腸癰。左脚不能舉動。是其徵也。

俗名縮脚腸癰

與營衛反魂湯加

金銀花爲君。四帖。酒水各半煎服。一帖痛稍減。二貼下臭

膿半桶。病全減。膏藥亦不揭。自落四貼完。其婦與匠來謝。

并求善後之方。

龔子才治一婦人。腹痛如錐。每痛欲死。不可著手。六脈洪數。此腸癰也。用穿山甲炒白芷貝母殭蠶大黃。合一大劑。水

續醫卷三  
煎服膿血從小便處出而愈

李士材治吳光祿夫人患腹滿而痛喘急異常飲食不進或用理氣利水之劑二十日不效診之脈大而數右尺爲甚令人按腹手不可近曰此大腸癰也脈數爲膿已成用黃芪角刺白芷之類加葵根一兩煎一碗頓服之未申痛甚至夜半膿血大下昏暈不支卽與獨參湯稍安更與十全大補兩月而愈。

周漢卿治義烏陳氏子腹有塊捫之如罌漢卿曰此腸癰也用大針灼而刺之入三寸許膿隨針迸出有聲愈。明史

薛立齋診秀水卜封君善飲腹痛便瀉服分利化瘀等劑不

應其脉滑數膚皮甲錯。謂此酒毒致腸癰而潰敗也。辭不治。仍服煎劑。果便膿而歿。

孫某治一女子腹痛百方不效。脈滑數時作熱腹微急。孫曰。痛病脈當沉細。今滑數腸癰也。以雲母膏一兩爲丸如梧子大。以牛皮膠溶入酒中。并水吞之。餉時服盡下膿血愈。

外科  
心法

薛立齋治通府張廷用患腸癰。兩月餘矣。時出自白膿。體倦惡寒。此邪氣去而中氣虛也。用托裏散兼益氣湯。徐徐呷之。又令以猪肚肺煮爛。取其湯調米粉煮。時呷半盞。後漸調理而痊。

理而痊。

一男子小腹痛而堅硬小便數汗時出脉遲緊以大黃湯一劑下瘀合許以薏苡仁湯四劑而安。苡仁瓜蔞各二錢丹皮桃仁各二錢

一男子患腸癰曠已成用雲母膏一服下曠升許更以排曠托裏藥而愈後因不守禁忌以致不救。

一人患腸癰僵痛不能伸有道人教以飲純黃犬血二碗和白酒服其人遂飲至四碗次日下曠血盡而瘳。廣筆記

# 腸風臓毒

孫文垣治潘大司馬常有腸風之症八月丁祭學博餽鹿血食之血暴下用槐角子五錢黃連枳壳地榆貫眾各三錢。

一服而止。潘善其方。書之粘壁間。遇有便血者。依方服之。無不立效。

陳鹿塘原有腸風臘毒之症。大便燥結。數日不能一行。痛苦殊甚。此胃寒腸熱也。其脈兩寸皆數。兩關弦而無力。兩尺洪滑而左尤甚。久治不效。因憶東垣有云。大腸喜清而惡熱。脾胃喜溫而惡寒。以胃屬土。腸屬金也。乃制一方。專以腸風臘。毒藥爲主。外以養血之藥裹之。使不傷胃氣。蓋藥先入胃。後入大腸。入胃時。裏藥未化。及入大腸。則裏藥化而君藥始見。庶幾兩不相妨。因以九製大黃二兩。槐花三兩。木耳二兩。郁李仁。皂角子。象牙屑。條芩各一兩。血餘升。

麻荊芥穗各五錢。共爲末。煉蜜爲丸。赤豆大。外以四物加蒲黃各一兩爲衣。米飲送下。空心及下午各二錢。血果止。大便不燥。飲食日加而愈。

王祖泉大便裏急後重。腹痛。日夜下紫稠粘三四十度。作痢治。三月不效。肌瘦。嬾食。眼合嬾開。悉以爲不治。脉之六部濡弱所下之色甚晦。狀如芋苗汁。曰此非痢。乃臟毒下血也。醫說中人參樗皮散。正與此對。卽製與之。其夜果減半。終劑全愈。方以人參樗根白皮各二兩爲末。空心米飲調

二錢。忌肉汁。生菜魚腥。

湯封君簡庵血分熱甚。以善飲致腸風。且心腎不交。以四物

湯加棗仁側柏葉槐花連翹蜜爲丸服之卽愈。

吳孚先治張東銘素患痔疾，兼後重之症，似痢非痢，登園窖迫行步如跨馬狀，坐亦作楚，六脈偏盛，稍覺無神，知爲氣血虛而挾濕熱，用芎歸芩連生地槐角查肉升麻加入參二兩爲丸，彼去參服之不效，復入參服半料已全愈。

張子和曰：一男子臟毒下血，當六月熱不可堪，自分必死，忽思蜜水猛含性命飲一大盞，痛止血住。

汝南節度副使完顏君寶病臟毒下血，發渴寒熱，往來延及六載，日漸瘦弱，無力面黃如染，張診其兩手脉沉而身涼，內經寒以爲營氣在故生。可治，先以七宣丸下五七行。

次以黃連解毒湯加當歸赤芍地榆散同煎服之一月而愈。

方勺泊宅編云外兄劉掾病臟毒下血凡半月自分必死得一方只以乾柿燒灰飯服一錢遂愈又王璆百一方云曾通判子病下血十年亦用此方一服而愈爲丸爲散皆可。

本草  
綱目

薛立齋治一男子臟毒下血服涼血敗毒藥不惟血不能止且飲食少思肢體愈倦脈數按之則濇先以補中益氣湯數劑少止更以六君子湯加升麻炮羌四劑而止乃去炮薑加芎歸月餘脾胃亦愈常治積熱或風熱下血者先以

敗毒散。散之胃寒氣弱者用四君子湯或參芩白朮散補之并効。

一男子臘毒下血。脾氣素弱。用六君子湯加芎歸枳壳地榆槐花治之而愈。後因謀事。血復下。諸藥不應。意思慮傷脾所致。投歸脾湯四劑而痊。大抵此症所致之由不一。當究其因而治之。丹溪云。芎歸湯一劑。又調血之上品。熱加茯苓。槐花。冷加茯苓木香。此則自根自本之論也。雖然精氣血出于穀氣。惟大腸下血。以胃藥收功。以四君子湯參芪白朮散。以枳壳散。小烏沉湯和之。胃氣一回。血自循經絡矣。腸風者。邪氣外入。隨感隨見。臘毒者。蘊積毒久而始見矣。

又云人惟坐卧風溫醉飽房勞。生冷停寒酒麵積熱以致  
榮血失道。滲入大腸。此腸風臟毒之所作也。挾熱下血。清  
而色鮮。腹中有痛。挾冷下血。濁而色黯。腹內畧痛。清則爲  
腸風。濁則爲臟毒。有先便而後血者。其來也遠。有先血而  
後便者。其來也近。世俗屎前屎後之說非也。治法大要先  
當解散腸胃風邪。熱則敗毒散。冷則換金正氣散。加芎歸。  
後隨其冷熱治之。劉河間云。起居不節。用力過度。則絡脈  
傷。陽絡傷則血外溢。血外溢則衄血。陰絡傷則血內溢。血  
內溢則便血。腸胃之絡傷則溢血。腸外有寒汁沫。與血相  
搏。則併合凝聚。不得散。而成積矣。又內經云。腸癖下膿血。

脉弦絕者死。滑大者生。血溢身熱者死。身涼者生。諸方皆謂風熱侵于大腸而然。若飲食有節。起居有時。腸胃不虛。邪氣從何而入。

王執中云。何教授湯簿有腸風疾。積年不愈。取脊端窮骨名龜尾。當中一灸除根。湯簿因傳此方。後觀灸經。此穴療小兒脫肛瀉血。蓋岐伯灸小兒法也。後人因之以灸大人腸風瀉血耳。蓋大人小兒之病。初不異故也。五痔便血失屎廻氣。炙百壯。在脊窮骨上赤下白處。

# 痔

附脫

孫文垣治周文川。肛上生一腫毒。月餘膿潰矣。但少動則出鮮血不止。大便結燥。胸膈飽悶。飲食不思。脈之兩寸短弱。關弦尺洪滑。此氣虛血熱。陷于下部。宜補而升提。不然痔癟將作。可慮也。黃芪二錢。歸身地榆槐花枳壳各一錢。升麻秦艽各七分。荆芥穗五分。甘草三分。服後胸膈寬。惟口苦甚。前方加酒連翹各五分而愈。

高仰山內人。痔血裏急。後重飲食入腹。大便卽行。晝夜五六十度。五更咳嗽痰齁。肌肉脫口作渴。由服涼血之劑過多。致脾氣虛不能統血也。脈之六部皆軟弱無力。以六君子湯加荆芥穗秦艽陳皮炮薑。四帖而飲食進。血全止。嗽亦定。

減炮羌倍加何首烏又四帖。遂數年不發。

徐檢老發寒熱，臀近肛硬處生一毒紅腫而痛，坐卧爲難。外科以鑱針點開，插藥線于內，塗以爛藥，使膿血急潰，又與敷生肌藥，使易收口。受謝而去。未半月硬處之旁，又紅腫痛，寒熱交作。名前醫治法如前，受謝以去。遞醫遞患，幾半年矣。診之面色青慘，脈皆濡弱，手足如冰，飲食減半。究所服，則槐角生地黃柏之屬。曰：此痔癰非痔漏也。痔漏當用挂線，以五灰膏點之可愈。今腫硬無定處，離肛門且遠，其初只可大補氣血，卽有毒亦宜託出。一膿而愈，此王道之治。不勝于針刀萬萬哉。乃內用寒涼，外用收口，動輒挂線。

致凝滯流注。愈而屢發。非稟厚氣強。六旬餘人。安能當此。  
與十全大補四帖。飲食加。手足煖。大便艱滯。向潤之而不  
行者。今亦通利。再以首烏四兩。人參。枸杞。當歸。黃芪。熟地。  
各二兩。槐角。秦艽。各一兩。蜜九服之。腫處出少膿。全瘳。徐  
喜而謔曰。予非孫君。諸外科視此。譬爲金穴矣。呵呵。

醫學博士齊德之云。予讀養生必效方。見乾義傳僧覺海。少  
年患痔疾。其行業比冰霜。此緣飽食久坐。知痔疾者不必  
酒色過度矣。故素問云。因而飽食。筋脈橫解。腸癖爲痔。治  
之。故不同也。三神丸。枳壳。皂角。五倍。蜜丸。每服二三十丸。

黃履素曰。予中年患痔點洗都不效。惟白蘿蔔煎湯頻洗。差佳。近讀環中集載冬瓜皮同朴硝煎洗。翻花痔立愈。又曰。以蘿蔔代冬瓜亦效。冬瓜未之試。蘿蔔已驗矣。

薛立齋治儒者楊舉元素陰虛勞則體肢倦怠兩足發熱。服清熱等藥。熱至腰膝。大便滯滯。飲食過多。則瀉至年餘。作渴吐痰。患痔出膿。仍不節勞。則忽惡寒發熱。後患癰膿水。不止氣血虛甚。乃用六味九補中益氣湯滋養化源。喜其慎疾。年餘而痊。

陳自明治一男子患痔未成膿。若痛大便難。與神仙太乙丹一錠去後二次痛即止。不日而消。見蟲門

薛立齋治一男子患痔大便燥結，廝痛作渴，脈數按之則熱，以秦艽蒼朮湯二帖少愈。更以四物湯加芩連槐花枳壳四劑而愈。

一男子素不慎酒色，患痔廝腫肛門墜痛，兼下血，大便乾燥，脈洪大，按之則濶。以當歸郁李仁湯加桃仁四劑少愈。更以四物湯加紅花桃仁條芩槐花數帖而愈。大抵醉飽入房，則筋脉橫解，或精氣脫帶，脉絡一虛，酒食之毒乘虛流注，或淫極強固，精氣遂傳大腸，以致木乘火熱而毀金，或食厚味過多，必成斯疾。夫受病者，燥氣也。爲病者，濕熱也。宜以瀉火和血潤燥，疎風之劑治之。若破而不愈，卽成漏

矣。有串脣者。有串陰者。有穿腸者。有穢從瘡口而出者。形雖不同。治法頗似。其腸頭腫成塊者。濕熱也。作痛者。風也。大便燥結者。火也。潰而爲膿者。熱勝血也。當各推其所因而治之。

一男子患痔成漏。每登廁則痛。以秦艽防風湯加條芩菖歸一帖。卽痊。如肛門下脫作痛。良久。加以大黃、枳壳四劑。而愈。以四物加升麻芩連荆防不復作。

一男子患痔漏。每登廁則肛門下脫作痛。良久方止。以秦艽防風湯數劑少愈。乃去大黃。加黃芪川芎。白芍。而痛止。更以補中益氣湯二十餘帖。再不脫。

一婦入患痔瘡，痛甚。以四物湯加芩連桃仁紅花丹皮。四帖少止。又數帖而愈。

一婦入素患痔漏，每因熱則下血數滴。以四物湯加黃連治之卽愈。後爲大勞瘡，腫痛，經水不止，脉洪大。按之無力。此勞傷血氣，血動而然也。用八珍湯加芩連蒲黃二劑而止。後去蒲黃芩連，加地骨皮數劑而安。丹溪云：婦人崩中者。

由臟腑傷損衝任二脈。血氣俱虛故也。二脈爲脉經之海。血氣之行，外循經絡，內經臟腑。若血氣調適，經下依時。若勞動過極，臟腑俱傷。衝任之氣虛，不能約制其經血。故忽然而下。謂之崩中暴下。治宜大補氣血之藥。舉養脾胃微

加鎖墻心火之藥。治其心。補陰瀉陽。經自正矣。

一男子有痔漏。每發如廁。肛脫。良久方上。診其脈細而微。用補中益氣湯三十餘劑。遂不再作。丹溪曰。脫肛屬氣熱。氣虛血虛。血熱者涼血。四物湯加黃柏。肺與大腸爲表裏。故肺臟蘊熱。則肛門閉結。肺臟虛寒。則肛門脫出。故婦人產育用力。小兒久痢。均致此病。治之必須溫補肺臟。腸胃久則自然收矣。雄按此症必見此脉始可用此藥

臨安曹五方黃院薦引爲高宗取痔得效。後封曹官至察使。用好信石色黃明者三錢。打如豆大。明礬一兩爲末。好黃

丹水飛炒紫色五錢。蝎稍七個。淨水瓦上焙乾研末。草烏  
緊實光滑者去皮生研末一錢。右用紫泥罐。先將炭火煅  
放冷拭淨。先下明礬燒令沸。次下信人礬內拌勻文武火  
煅候沸再攬勻看罐通紅。烟起爲度。將罐掇下待冷取研  
末。方入草烏黃丹蝎稍三味。再同研極細末。磁罐內收貯。  
如欲敷藥。先以甘草煎湯。或葱椒煎湯。洗淨患處。然後用  
生麻油調前藥。以鷺毛掃藥痔上。每日敷藥三次。必去黃  
水如膠汁然。痔頭漸消。看痔病年深淺。年遠者不出十日。  
可取盡。日近者俱化黃水。連根去盡。更搽生好肉藥名如  
神子。

季防禦方。五痔者。貧富男女皆有之。富者酒色財氣。貧者擔  
輕負重。飢露早行。皆在心肝二經。喜則傷心。怒則傷肝。喜  
怒無常。風血浸于大腸。到穀道無出路。結積成塊。出出血生  
乳。各有形相。婦人因經後傷冷。月事傷風。餘血在心經。血  
流于大腸。小兒因利後。或母腹中受熱也。先用水澄膏護  
其內。鬱金白芨各一兩。或加黃連。右二味爲末。如內痔候  
登廁翻出在外。用溫湯洗淨。不須坐。側卧于牀。卽出用蜜  
水調令得中。箋挑塗穀道四邊。好肉上留痔在外。以紙蓋  
藥上。良久方用枯藥搽痔上。用筆蘸溫水于紙上。不令藥  
乾。及四散枯藥。用好白礬四兩。生信石二錢半。硃砂一錢。

生研極細。右各研爲細末。先用砒入紫泥罐。次用白礬末。蓋之。用火煅令烟斷。其砒盡隨烟去。止借砒氣于礬中耳。用礬爲細末。看痔頭大小。取礬末在掌中。更入硃砂少許。以唾調稀。用篦頭塗痔上。周遍一日三上。候看痔頭顏色焦黑爲度。至夜有黃水出。切勿他疑。水盡爲妙。至中夜上藥一遍。來日依然藥三次。有小痛不妨換藥。時以碗盛新水或溫湯。在邊用筆輕洗痔上舊藥。更上新藥。仍用護肉藥。次用荆芥湯洗之。三兩日後黃水出將盡。却于藥中增硃砂。減白礬。則藥力卽緩。三兩日方可增減漸漸。取之庶不驚人。全在用藥人。看痔頭轉色。增減厚薄。傳藥方是活。

法此藥只是借碗信耳。又有硃砂解之。一方士將此二方在京治人多效致富。一富商因驗以百金求得之。錄于予。予雖未用。傳人無不言效。但枯藥趙宜真。煉師以刊于書。囊襍纂。如神千金方。未見刊傳。大抵今人言能取痔者。皆此方也。恐氣血虛。或內邪者。還當兼治其內。庶不有失。

二條

皆外科  
發揮

薛立齋治一男子痔瘡腫痛。便血尤甚。脈洪且濇。經云。因而飽食筋脈橫解。腸澼爲痔。蓋風氣通于肝。肝生風。風生熱。風客則淫氣傷精。而成斯疾。遂與黃連當歸黃芪生地防風枳壳白芷柴胡槐花地榆甘草。治之漸愈。次以黃連丸。

而瘡

一男子患痔，脈浮鼓。午後發熱，作痛。以八珍湯加黃芪、柴胡、地骨皮治之，稍可。彼欲速效，用刲藥蝕之，痛甚，絕食而歿。  
凡用桔藥者宜先治其內，而愈而後可治其外也。夫瘡之潰斂，氣血使然也。脈浮鼓，日晡痛。此氣血虛也。丹溪云：瘡口不合，大劑參芪尤歸芎補之外，以附子餅炙之。更以補藥作膏貼之。

一男子年踰四十，有痔漏，大便不實。服五苓散，愈加泄瀉。飲食少思，此非濕毒。乃腸脾胃虛也。當以理中湯治之。不信，乃服五苓散，愈甚。乃以理中湯及二神丸，月餘而平。

李遠因痔瘡怯弱，以補中益氣湯少加芩連枳壳治之，稍愈。

後因怒加甚時仲冬脈得洪大謂脈不應病此乃腎水不足火來乘之藥不能治果歿于火旺之月常見患痔者腎脈不足俱難治

劉商有痔肛門脫出此濕熱下注真氣不能升舉診其脈果虛遂以四君子湯加黃芩芎歸蒼朮黃柏升麻柴胡服之更以五倍子煎湯熏洗彼以爲緩乃用砒霜等毒藥蝕之而歿刲藥特治其末且能伐真元鮮不害人慎之

徐生因痔氣血愈虛飲食不甘小便不禁夜或遺精此氣虛兼濕熱而然非瘡故也以補中益氣湯加茱萸山藥五味兼還少丹治之而愈

一男子患痔漏，膿出大便。諸藥不應。診其脈頗實。令用豬腰一個切開，入黑牽牛末五分線扎以荷葉包煨熟，空心細嚼溫鹽酒送下數服頓退。更以托裏藥而愈。卽煨腎散

朱丹溪治一人肛門生癧，後不收口。鍼窮三孔穴邊血膿。用黃芪條芩連翹秦艽右末之神曲丸服。治法

予庚子除夕痔作時官舍合肥難得醫者。取官局釣腸丸一百二十粒分爲二服熱酒併服之中夜腹間微痛下少結屎。旦起已安。治証具載本方所以作効速者以服多故耳。

百乙 方

葱青內刮取涎對停入蜜調勻先以木鱉子煎湯熏洗然後

傳藥其冷如冰。唐仲舉云：常有一吏人苦此。渠族弟親合與之。早飯前敷。午後以榜紙來謝。拜于庭下。疾已安矣。

鄭器先用之。親曾得效。其法鳩尾骨尖少偃處。即是穴。麥粒大艾炷炙七壯。或十四壯。甚者二十一壯。上瘡發即安。可

除根本

並百乙方

薛立齋治一人。痔漏口乾。胃脈弱。此中氣不足。津液短少。不能上潤而然。以黃芪六一湯。七味白朮散治之。或曰：諸痛痒瘡。皆屬心火。遂服苦寒之藥。大便不禁而歿。夫諸痛痒。皆屬心火。言其常也。始熱終寒。則反常矣。可泥此而不察乎。

許叔微治一人腸風脫肛不收有血下用皂角三莖槌碎水一椀揉令皂角消盡用絹二重瀝去清汁數分將脫肛腸浸在藥中其腸自收不用手托如大腸收了更用湯盪其脫肛上令皂角氣行則不再作三次盪愈

龔之才治小兒脫肛因久患瀉利所致宜用葱湯熏洗令軟送上或以五倍子末敷而托入又以五倍子煎湯洗亦可又以鰲頭燒存性香油調敷一云此物烟熏之久自收又以東壁土泡湯先熏後洗亦效

蘇東坡與程正甫書云凡痔疾宜斷酒肉與鹽酪醬菜厚味及粳米飯唯宜食淡麵一味及以九蒸胡麻卽黑芝麻同

煎去皮茯苓少入白蜜爲麵食之日久氣力不衰百病自去而痔漸退此乃長生要訣但易知而難行耳

江夏鐵佛寺蔡和尚病肛門痔痛不可忍有人教用木鱉仁帶潤者雌雄各五個乳細作七丸盃覆溫處勿令乾每以一丸唾化開貼痔上其痛卽止一夜一丸自消也後用治數人皆效瀕湖集酒方

張子和治趙君玉常病痔鳳眼草刺鷀皮槐根狸首之類皆用之或以乾薑作末塗豬肉炙食之大便燥結不利且瘤疑瘻後數日因病黃大涌瀉數次不言痔作矣

徐靈胎曰脫肛多由濁氣下降溼痰毒火合併爲害故腫痛

異常此實症也。必清其大腸之火而用外治之藥以收之。  
無不立愈。其有虛人病後清氣下陷。則用補中益氣以提  
之。乃十不得一者也。若不論何因。俱用升提收斂之法。肛  
門之痰火濁氣。將升提而置之何地耶。且脫肛之疾屬實  
者多。又用溫燥更非所宜。

# 漏瘡

薛立齋治一男子臂患漏口。乾發熱喜膿不清稀。脈來遲緩。  
以豆豉餅炙。及服八珍湯加麥冬五味子軟柴胡地骨皮。  
三月餘而愈。後因不慎房勞復潰。膿清脈大。鮮不治。果歿。

一男子臂癰作膿而痛。以仙方活命飲二劑痛止。更以托裏消毒散。膿潰而瘥。

一男子臂癰不作膿。飲食少思。先用六君子湯加玄歸黃芪。飲食漸進。更以托裏消毒散。膿潰而愈。

一男子臂癰潰而膿清不歛。以豆豉餅炙之。更飲十全大補湯。兩月餘而痊。凡瘡不作膿。或不潰。或潰而不歛。皆氣血之虛也。若膿清稀。尤其虛甚也。

一男子臂癰。膿水不止。肌肉漸瘦。飲食少思。胃脉見弦。以六君子湯加霍香。當歸。數劑飲食漸進。以十全大補湯及豆豉餅炙之。兩月餘而歟。

薛立齋治一弱人。臂漫腫。色不變。脈滑數而無力。此臂癰也。  
膿將成。尚在內。欲治以托裏藥。待發出而用針。彼欲內消。  
服攻伐藥愈虛。復求治。仍投前藥。托山針之。以大補藥而  
愈。凡瘡毒氣已結不起者。但可補其血氣。使膿速成而針  
去。不可論內消之法。膿成又當辨其生熟淺深而針之。若  
大按之乃痛者。膿深也。小按之便痛者。膿淺也。按之不甚  
痛者。未成膿也。按之卽復起者。有膿也。按之不復起者。無  
膿也。若腫高而軟者。發于血脉。腫下而堅者。發于筋骨。色  
相不變。發于骨髓也。此條舊案已收因無後段發明故錄之

一男子臂癰腐潰。肌肉不生。用藥敷之。四沿反硬。診之脉濶。

而弱。此氣血不能營于患處。故敷涼藥反硬。乃氣血受寒凝結而非毒也。用大補藥愈矣。

一人患臀癰。用五爪龍連枝搗汁酒澆服。日進四五次。膿從大便出。未成膿者內消。如有頭以渣敷上立散。治魚口極

效。廣筆記

曹文部文兆年逾四十。肺腫患毒已半月餘。頭甚多狀如粟。許內痛如癩。飲食不思。性甚脈歇。上此元氣虛。疽畜于內也。非灸不可。遂灸二十五壯。以六君子湯加藿香當歸數劑。瘡勢漸起。內痛頓去。胃脈漸至。但色尚紫。瘀肉不潰。此陽氣尙虛也。燃桑柴灸之。以補接陽氣。解散其毒。仍以前

藥加參芪歸桂。色赤膿稠，瘀肉漸腐取去。兩月餘而愈。夫邪氣沉伏，真氣性弱，不能起發。須火炙而兼大補，投以常藥，待其自潰，鮮有不誤者。

沈侍御患腎腫痛，小便不利。彼謂關格症，以艾蒸腎，大便赤不利。以降火分利之藥治之，不應。診其脉，數膿成此癰。患也。遂針之，出膿數椀許。大便即利。五日陰囊腫脹，小便不行。仍針之。參連歸朮之藥猶緩。俾服獨參湯至二觔，氣稍復。又服獨參湯，兼以托裏藥。兩月餘而平。大抵瘡瘍膿血之泄，先補氣血爲主。雖他病當從未治。

滕千兵年踰五十，腎患癰，膿熟不開。攻通大肛，膿從大便而

出辭不能治果斃。丹溪云：腎居小腹之後，陰中之陰也。道遠位僻，血亦罕周。中年後尤慮患此。況膿成不刺，欲不亡得乎。

# 囊癰

薛立齋治一男子，囊癰未作膿而腫痛以加味龍胆瀉肝湯。二劑少愈，更以四物湯加木通知母黃柏而愈。

一男子囊癰爛腫痛甚，小便濶發熱，脈數，以龍胆瀉肝湯倍用車前子木通茯苓。四劑勢去其半，仍以前湯止加黃柏金銀花。四劑又減一二三，便利如常。惟一處不消，此欲成膿。

也。再用前湯加金銀花白芷角刺六帖。微腫痛。脉滑數。乃膿已成。令針之。腫痛悉退。投滋陰托裏藥。及紫蘇末敷之愈。

一膏梁之客。陰囊腫脹。小便不利。此中焦積熱。乘虛下注。先用龍胆瀉肝湯加黃柏牛膝。四劑漸愈。後用補陰八珍湯。加柴胡山梔而愈。後不守禁忌。前症復作。仍用補陰八珍湯。補中益氣湯。六味丸而痊。又因勞倦發熱。自用四物湯。知柏之類。虛症悉具。瘡口大開。五臟氣血俱虛也。朝用補中益氣。夕用六君加當歸各五十餘帖。瘡口始斂。又用六味丸調理而愈。

知州黃汝道先晡熱發熱肢體倦怠入房則腿足痠軟足心  
熱至腿膝六脈洪數兩尺爲甚此足三陰虛欲滋補化源。  
彼反服苦寒降火之劑後陰囊腫脹以疝治之腫脹益甚。  
形氣愈虛服溫補之劑腫痛上攻小便不利兩尺脉洪按  
之虛甚曰此囊癰也因氣血虛而不能潰先用補中益氣  
湯加山藥山萸車前柴胡山梔一劑腫脹頓消隨用六味  
丸料加車前牛膝柴胡山梔一帖小便漸通乃用活命飲  
與前二藥消息間用至二十餘劑囊裂出穢膿甚多乃用  
托裏消毒散六劑膿穢清又用托裏散數劑膿水漸少更  
用補陰托裏散及十全大補五十餘劑而痊。

府庠李達卿素腎虛發熱久服知柏之類形體漸瘦遺精白濁、晡熱吐痰此腎水虧損虛火內熾用補中益氣之類加五味麥冬前症將愈又別用清熱涼血之劑飲食少思唾痰不止此脾虛復損不能攝涎歸源仍用前湯加茯苓半夏而愈後入房頭暉吐痰腰骨作痛大小便道牽痛此精已耗而復竭所致危殆之症也遂朝用前湯加麥冬五味夕用六昧丸料加五味草薢五十餘帖諸症頓退后又入房陰囊陰莖作痛別用淡滲之劑陰囊內潰乃用補陰托裏之劑出膿甚多喜腫消痛止竟不善調養致大便不通小便如淋痰涎上涌此腎虛之症復作矣誠爲可慮有保

其可生者用礞石滾痰丸。牛黃清心丸之類。吐痰愈加。曰  
非惟無益。保其生而反促其危矣。辭不治果歿。

一男子患囊癰。腫痛發熱。以小柴胡湯加黃連青皮四劑少  
愈。更以加減龍胆瀉肝湯而愈。

一男子囊癰。膿熱作脹。致小便不利。令急針之。以小柴胡湯  
加黃柏白芷銀花。四劑少愈。更以托裏消毒散數劑而痊。  
一男子囊腫。狀如水晶。時痛時痒。出水。小腹按之作水聲。小  
便頻數。脉遲緩。此醉後飲水入房。汎出遇風寒。溼毒氣聚  
于囊爲患。名水疝也。先以導水丸二服。腹水已去。小便如  
常。再飲胃苓散。倍苓朮。更用針引去聚水而痊。

一男子患囊癰久而不歟。以十全大補湯加五味子麥冬。炙以豆豉餅月餘而平。

一弱人囊癰腫痛未成膿。小便赤濇。以炙甘草青皮木通黃柏當歸麥冬四劑少愈。以清心蓮子飲而消。

一男子患囊癰病勢已甚。脉洪大可畏。用前湯二劑腫少退。以仙方活命飲二劑痛少止。脉之滑數乃膿已成須針之。否則囊皆潰。不信遂更他醫果大潰。墨丸懸掛復求治。診之脉將靜。以八珍湯加黃芪知柏山梔。更敷紫蘇末。數日而痊。此症勢雖可畏。多得保全。患者勿懼。

一弱人患囊癰。膿熟脹痛大小便秘結。針之膿出三碗許。卽

軒睡覺而神思少健。但針後雖敷解毒藥亦潰盡矣。故用  
托裏藥三十餘劑始痊。大抵此症屬陰道虧濕熱不利所  
致。故滋陰除溼爲要。常治腫痛小便秘滯者。用除溼爲主。  
滋陰佐之。腫痛退便利和者。除溼滋陰相兼治之。欲其成  
膿。用托裏爲主。滋陰佐之。膿成卽針之。仍用托裏滋陰。溼  
毒已盡。專用托裏。如膿清。或多或少或歛遲者。用大補之劑。及  
豆豉餅或附子餅炙之。如盧武選封君。年逾五十。患此瘡。  
口年餘不歛。診之微有溼熱。以龍胆瀉肝湯治之。溼熱悉  
退。乃以托裏藥及豆豉餅炙之而愈。次年復患。溼熱頗盛。  
仍用前湯四劑而退。又以滋陰藥而消。若潰後虛而不補。

少壯者成漏。老弱者不治。膿清作渴。肺大者亦不治。

朱丹溪曰。癰疽入囊者。予嘗治數人。悉以溼熱入肝經施治而用補陰佐之。雖膿潰皮脫。犀丸懸掛皆不死。外  
科  
心法

薛立齋治胡同知年踰五十。陰囊腫痛。得熱愈甚。服蟠葱散等藥不應。肝脉數。此囊癰也。乃肝經溼熱所致。膿已成。急針之。以龍胆瀉肝湯。脈症悉退。更以托裏滋陰藥。外搽杉木灰紫蘇末。月餘而愈。此症雖潰盡無害。患者審之。

柏道官六十餘。陰囊已潰。痛不可忍。腎丸露出。與以龍胆瀉肝湯服之。及敷前未不應。竟此溼氣熾甚。先以槐花酒一椀。仍投前藥少愈。更以托裏加滋陰藥。月餘而平。設以前

藥不應加之峻利。未有不損中氣以致敗者也。聘士陳時用沈汝和患此。悉用前藥而愈。

竇材治一人。忽遍身拘急。來日陰囊連莖大腫如斗。六脉沉緊。此陰疽也。幸未服解毒涼藥。若服之。則莖與睾丸必皆爛去而死。急令服救生湯五錢。又一服全安。

## 懸瘤

薛立齋治一弱人。穀道前結核如大豆許。勞則腫痛。先以十全大補湯去桂枝加車前麥冬、酒炒黃柏知母少愈。更服製甘草漸愈。卽國老膏仍以四物車前之類而消。

二男子患懸癰。焮腫發熱。以龍胆瀉肝湯二劑。及製甘草四  
劑而潰。再用滋陰之劑而愈。若膿未成。以葱炒熟敷上。冷  
則易之。隔蒜灸之亦可。數日不消。或不潰。或潰而不斂。以  
十全大補湯加柴胡稍爲主。間服製甘草並效。若不保守。  
必成漏矣。

一男子患懸癰。服坎離丸。及四物知柏之類。不應。脉浮洪。按  
之微細。以爲足三陰之虛。用托裏散。及補陰八珍湯。愈。又  
用六味丸。補中益氣湯。調補化源。半年而痊。大凡瘡瘍等  
症。若腎經火氣亢盛。致陰水不能生化。而患陰虛發熱者。  
宜用坎離丸。取其苦寒。能化水中之火。令火氣衰而水自

生若陽氣衰弱致陰水不能生化而患陰虛發熱者宜用六味丸取其酸溫能生火中之水使陽氣旺而陰自生況此症屬腎經精氣虧損者十有八九屬腎經陽氣亢盛者十無一二然江南之人患此者多屬脾經陰血虧損元氣下陷須用補中益氣湯升補陽氣使陽生而陰長若嗜慾過多虧損真陰者宜用六味丸補腎經元氣以生精血仍用補中益氣湯以培脾肺之生氣而滋腎水經云陰虛者脾虛也但多認爲腎經火症用黃柏知母之類復傷脾肺絕其化源反致不起惜哉

通府張敬之患懸癰久不愈日晡熱甚作煩渴而喘或用四

物湯知柏之類，病益甚，肢體倦少，食大便不實，小便頻數。  
問何故，曰此肺虛之症。前藥復傷而然，遂用補中益氣加  
茯苓半夏數劑，飲食漸進，症漸減，更加麥冬五味，調理乃  
痊。經曰：脾屬太陰，爲陰土而主生血。故東垣云：脾虛元氣  
下陷，發熱煩渴，肢體倦怠等症。用補中益氣湯，以升補氣  
而生陰血。若誤認爲腎虛火盛，而用四物知柏之類，反傷  
脾胃生氣，是虛其虛矣。況知柏乃瀉陽損陰之劑，若非膀  
胱陽火盛而不能生陰水，以致發熱者，不可用也。

魏玉橫治江云溪兄，初春患痔，卽令服一丸湯加減，不信致  
臥月餘後，遂成管冬月復患懸糰，初時如大豆，半月來大

如雞卵按之甚痛，行動有妨。幸未服藥，脈之惟左關尺畧大而微，此膿尙未成也。仍與一炁湯加減，大生地、麥冬、北沙參、甘杞子、生米仁、冀仁丹皮、地丁等令服八劑。二劑知四劑消其半，八劑完而全愈。

薛立齋治尚寶鮑希傳足發熱，服四物知母黃柏之類年餘，患懸癰，唾痰作渴，飲湯其熱至膝，更加芩連二陳，熱痰益甚。問故曰：此足三陰虧損，水泛爲痰，寒涼之劑傷胃而甚耳，遂先用補中益氣，夕用六味丸，間佐以當歸補血湯半載乃愈。

上舍劉克新，懸癰潰後作痛，發熱口乾，小便赤色，自用清熱

消毒之藥不應。左尺洪數。此陽氣盛而陰氣虛也。先用四物湯加知母等諸劑。瀉其陽氣。使陰自生。數劑諸症漸愈。後用益氣湯地黃丸。補脾胃。肺滋腎水而愈。

一儒者患懸癰。小便赤濇。勞則足軟腫痛。發熱口乾舌燥。體倦。日晡益盛。此氣血虛而未能潰也。遂用八珍加麥冬。山藥。倍用製甘草。數劑諸症悉退。但患處腫痛。此膿內熾也。又五劑膿自涌出。又五十餘劑而瘡口將完。又因勞役且停藥。寒熱作渴。膿多腫痛。用補中益氣湯加炒梔。二劑少愈。又以八珍湯加麥冬。五味。百餘劑腫痛悉去。喜其慎起居。節飲食。常服補劑而安。但勞則膿出一二滴。後惑於他

言內用降火。外用追蝕。必其收斂。致患處大潰。幾至不起。  
仍補而愈。

一男子懸癰腫痛。小便赤濁。以加減龍胆瀉肝湯。加製甘草。  
二劑少愈。以參芪歸朮知柏製甘草四劑而潰。更以四物  
湯加知柏參芪製甘草而愈。

一男子患懸癰。膿清不斂。內有一核。以十全大補湯。加青皮  
柴胡製甘草。更以豆豉餅炙之。核消而斂。

一男子患懸癰。久而不斂。脉大而無力。以十全大補湯。加五  
味麥冬。炙以豆豉餅。月餘而愈。

一老人患懸癰年餘不斂。診其脉尚有溼熱。以龍胆瀉肝湯。

二劑濕退乃以托裏藥及豆豉餅炙之而愈。

一男子患此症腫痛發熱以小柴胡湯加黃連青皮四劑少愈更以加減龍胆瀉肝湯而消。

一男子患懸癰膿不潰脹痛小便不利急針之尿膿皆利更以小柴胡湯加黃柏白芷金銀花四劑痛止以托裏消毒四劑而愈常見患者多不肯用針待其自破殊不知緊要之地若一有膿宜炙針之使毒外發不致內潰故前人云凡瘡若不針烙毒結無從而解膿瘀無從而泄又云宜開戶以逐之今之患者反謂地部緊要而不用針何其悖哉

一男子懸癰膿熟不潰脉數無力此氣血俱虛也欲治以滋

陰益血之劑。更針之使膿外泄。彼不從。仍用降火散毒藥。  
致元氣愈虛。瘡勢益甚。後潰不歛。竟至不救。夫懸癰之症。  
原係肝腎二經。陰虛雖一于補。尤多不治。況膿成而又尅。  
伐。不死何俟。常治初起腫痛或小便赤濇。先以製甘草一  
二劑。及隔蒜灸。更飲龍膽瀉肝湯。若發熱腫痛者。以小柴  
胡湯。加車前黃柏菖歸濃已成卽針之。已潰者。用八珍湯。  
加製甘草。柴胡稍酒炒知柏。小便濇而脈有力者。仍用龍  
膽瀉肝湯。加製甘草。小便濇而無力者。用清心蓮子飲。加  
製甘草。膿清不歛者。用大補之劑。間以豆豉餅灸之。久而  
不歛者。用附子餅灸之。並効。

薛立齋治一男子患懸癰，焮痛發寒熱以小柴胡湯加製甘草二劑少退。又用製甘草四劑而消。大抵此症屬陰虛，故不足之人多患之。寒涼之藥不可過用，恐傷胃氣。惟製甘草一藥，不損氣血，不動臟腑，其功甚捷。最宜用之，不可忽也。

馬銘鞠治談公武患跨馬癰，外勢不腫，毒內攻，膿多瘡口甚小，突出如指大一塊，觸之痛不可忍。多飲寒劑，敷涼藥，毒內攻，胃氣俱損，令盡去圍藥，洗淨瘡口，但用一膏藥以護其風。用大劑黃芪、山藥、生地、白芷、牛膝、米仁、銀花、棗以健脾藥十餘劑，膿盡。再數劑，肉長。突者平矣。後服六味丸斤。

許精神始復。廣筆記

薛立齋治黃吏部穀道前患毒焮痛寒熱。此肝經血虛溼熱所致。名曰懸癰。屬陰虛症。先以製甘草二服頓退。用以四物加車前子青皮甘草節酒製知柏數服而消。

一男子歲逾五十。患懸癰。膿清肝腎脉弱。此不慎酒色溼熱壅滯也。然膿清脉弱老年值此甚難收斂。況穀道前爲任脈發源之地。肝經宗筋之所。辭不治後果死。嘗治此癰。惟潤水製甘草有效。已破者兼十全大補湯爲要法。

柴嶼青以省覲舟行。舟人患騎馬癰。哀號痛楚憐而治之。先用大歸湯十餘劑。外貼回生膏。日令其以藥水勤洗。繼惟

十全大補湯。因貧人苦無力。購參。攜有扁黨參。給以半斤。

始備藥。又用玉蟾生肌散。人參末。敷患處。調理月餘而愈。

# 痃癖

一名便癰。一名便毒。一名痞子。一名血疝。又俗名石米瘡。左爲魚口。右爲便毒。生於兩膀合縫之間。結腫名曰橫痃。又名外疝。

薛立齋治一婦人拘中。赤腫脹痛。此膿內作。用托裏消毒散加柴胡數劑。潰而膿清寒熱。乃氣血復虛。用托裏散而寒熱止。用十全大補百餘劑而痊。

一婦人腹拘腫痛。小水不利。或時胸乳作痛。脇腹作脹。此肝火氣滯。四物加柴胡青皮。元胡索木香而愈。

一婦人拘中作痛。小腹痞悶。小便不利。內熱體倦。飲食少思。

此肝火內動脾胃受傷也。用加味歸脾湯。柴胡清肝散而安。

一婦人拘中腫脹。小腹作痛。服下血之劑。其痛益甚。更吐瀉少食。此肝脾復傷。用六君子湯。加升麻柴胡而愈。

薛立齋治一婦人。兩拘腫痛。腹內一塊不時上攻。月經不調。大便不利。此肝脾氣滯而血傷。以四君加芎歸柴胡山梔而愈。後因鬱怒。前症復作。兼胸滿腹脹盜汗。此肝木甚而傷脾土也。用加味歸脾湯。下蘆薈丸而痊。

一婦人小腹內作痛。或痞悶。兩拘腫痛。內熱寒熱。胸膈不利。飲食不甘。形體日瘦。此肝氣滯而氣傷也。朝用補中益氣

湯。夕用蘆薈丸漸愈。更用六味丸全愈。

一婦人兩拘腫痛。小腹痞脹。白帶時下。寒熱往來。小水淋瀝。此肝氣滯而血病。用龍胆瀉肝湯漸愈。又用加味逍遙散。

六味地黃丸全愈。

一婦人患前症。胸脇脹悶。或小水不利。或時腹痛。此肝火氣病。先用龍胆瀉肝湯。以清肝熱。又用加味逍遙散。以生肝血。六味地黃丸。以滋腎水而愈。

一婦人患前症。內熱作渴。飲食不甘。肢體倦怠。陰中作梗。小便赤澑。此脾經鬱結。肝經溼熱。用加味歸脾湯而愈。後因怒氣復作。小腹脹痛。用小柴胡加山梔子歸痛止。又用加

味道遙散而愈。

一婦人小腹痞悶，溺濇內熱，體倦懶食。此肝火動而脾血傷也。用八珍加柴胡山梔胆草而安。

一婦人陰中如梗，兩拘腫痛，寒熱不食，小便頻數，小腹重墜。此肝脾鬱怒所致。先以補中益氣，加茯苓山梔車前子青皮，以清肝火升脾氣，更以加味歸脾湯調理脾鬱而愈。

一婦人小腹內如有所結，兩拘並玉門俱腫，小便淋漓，經候不調，內熱作渴，飲食少思，腹內如鷄卵而漸大，脈洪數而不虛，左關尤甚，屬肝膽鬱結之症也。用加味歸脾湯，肝火退而脾土健，間以逍遙散，下蘆薈丸而愈。

一男子患便毒。焮腫作痛。大小便秘。脉有力。以玉燭散二劑頓退。更以龍胆瀉肝湯四劑而愈。

一男子便毒已潰。而痛不止。小便秘濁。此肝火未解也。以小柴胡加黃柏知母芎歸。痛止便利。更以托裏當歸湯。而瘡歛。若毒未解而痛不止者。須用活命飲。

春元凌待之虛。而服尅伐藥。幾致危殆。用托裏健脾藥而愈。秀才王文遠。因勞苦之後。患此。服小柴胡湯。及表症散後。用托裏藥。膿成針之。而旬日愈。又胡判官。膿清脈弱。以大補藥已愈。因新婚而復發。自用連翹清毒散。致渴利不止。竟至不救。可見此症屬不足者多矣。非補不可。大凡便毒。

屬肝經。初起堅硬。肝主筋故也。五七日後赤軟膿成故也。  
若尙堅硬。乃元氣不能腐化。往往人見堅硬。只欲內消。反  
服攻散藥。多致虛虛之禍。前此治者。卽其驗也。

魏玉橫治宋復華兄。因勞頓患左拘腫硬。漸如鵝卵。或與發  
散轉甚。已半月足冷過膝。面赤手亦冷。惡寒夜熱。口苦食  
解。脉之弦數。曰此肝虛火甚也。與生地。杞子。炒參。麥冬。丹  
皮。蔓仁。歸身。紅花。間入川棟。川連。羚羊。牛蒡。數劑。寒熱退。  
又十劑。其腫硬及諸症漸愈。惟餘小塊如豆大未消。彼以  
要務奔走勞碌。復腫數日大如李。其色赤而軟。已成膿。再  
與前藥。卽自潰而愈。此症俗名一石米瘡。言百日後可愈。

也。卽遇先輩如立齋。其治法或未能如是。余非能有過古  
人。第知爲肝腎病。則不雜入他藥耳。

薛立齋治一婦人素清苦。因鬱怒患前症。或用散毒寒涼之  
藥。反晡熱。內熱。首汗盜汗。月經不行。口乾咽燥。此鬱氣傷  
脾。因藥復損。先以當歸湯數劑。後兼逍遙散五十餘劑而

愈。

陳自明治一男子患便毒堅硬。與神仙太乙丹一粒。卽服之。  
去後二次。痛止。不日而消。方見  
蠱門

薛立齋治一男子患此。未作膿。小便秘滯。以八珍三劑少愈。  
以小柴胡湯加澤瀉。山梔木通二劑而消。

一男子患此症腫痛發寒熱以荆防敗毒散二劑而止以雙解散二劑而愈

一男子患此症膿未成覺大痛服消毒托裏內疎藥不應診之脈洪大毒尙在以仙方活命飲一劑痛止又一劑而消一男子患此症腫痛日晡發熱以小柴胡湯加青皮花粉四劑痛止熱退以神効瓜蔞散四劑而消。

一男子患此症腫而不潰以參芪歸朮白芷皂角刺柴胡甘草節數服而潰以八珍湯加柴胡數劑而愈。

一男子患此症潰而腫不消且不斂診之脉浮而濇以豆豉餅炙之更以十全大補湯月餘而愈。

一男子患此症。潰而痛不止。諸藥不應。診之。脈大。按之則數。乃毒未解也。以仙方活命飲而止。又二劑而歟。

一男子患此症。服尅伐之藥。以求內消。致瀉利不食。以二神丸。先止其瀉。以十全大補倍加白朮茯苓數劑而消。大抵此症多患於勞役之人。亦有內蘊熱毒而生者。須辨虛實。及成膿否。不可妄投藥餌。常見治此症者。槩用大黃之類。下之以求內消。或膿成令膿從大便出。鮮有見其痊也。人多欲內消者。蓋恐收口之難也。若補養血氣。不旬日而收矣。何難之有。若膿既成。豈有可消之理。如再用尅伐之劑。反爲難治。

一男子不慎房勞，患此腫痛，以雙解散一服通之。其痛卽止。  
更以補中益氣湯數劑，而膿針之。以八珍湯加五味子、麥  
冬、柴胡三十餘劑而愈。大抵便癰者血疝也。俗呼爲便毒。  
言于不便處腫毒，故爲便癰也。乃足厥陰肝之經絡，及衝  
任督脈，亦屬肝之旁絡。且氣血流通之道，今壅而腫痛。此  
則熱毒所致。宜先疎導其滯，更以托裏之劑。此臨症制宜  
之法也。

一老婦患此症，腫痛膿尚未成，小便濁，肝脈數，以加減龍胆  
瀉肝湯加山梔黃柏四劑而愈。

張德俊灸便毒，親曾取効云，屢以灸他人皆驗，以細草或軟

箇一莖隨所患左右手量中指。自手掌盡處橫紋量起。通

三節至指盡處爲則。不量指甲集斷。卻將此草于手腕橫紋量起。引草向臂當中草盡處。即是穴。麥粒大炙三壯。腫

散痛止卽時安。

百乙方

繆仲淳親試治便毒甚驗。棉地榆四兩。白酒三椀。煎一椀空

心服。雖腫者亦愈。加穿山甲同患處者三片。土炒引經更

妙。廣筆記又方。棉地榆四兩。粉甘草一兩。金銀花一兩。白芷

三錢。皂角刺二錢。五分水煎服。

黃履素曰。余家有女流患便癰。兩拘腫痛。不能起。瘍醫用敗  
毒藥十餘帖。以圍藥逼之出膿。腫痛愈甚。予查薛氏外科

樞要此症皆因鬱怒傷肝得之治用加味歸脾湯加味道  
遙散間服。遂依用之不三劑腫痛減半六劑而起。

孫文垣治吳翁年七十有三偶墜馬左脇作痛隨治而愈後  
半年忽左脇腫痛憎寒作熱諸治罔效或作癰氣投荔枝核  
大小茴香川棟橘核之類痛不可忍至欲引繩自絕診之  
六脉浮而洪數左尺尤甚驗痛處紅腫如匏按之烙手此  
便毒也非因近色而得蓋脇屬厥陰肝經肝爲血海乃昔  
時墜馬惡血消之未盡畜於經絡化而爲膿年高氣虛又  
爲香燥尅伐故痛且劇今其色青中隱黑膿成久矣乃令  
外科針之出青黑膿五六碗此俗名一石米瘡也乃用托

裏十宣散。又加參芪三錢。後加至五錢。一日兩進。兩月而愈。

## 腿 瘰

薛立齋治一男子。年逾二十。稟弱。左腿外側患毒。三月方潰。膿水清稀。肌肉不生。以十全大補湯加牛膝。二十餘劑漸愈。更以豆豉餅炙之。月餘而痊。

滁州于侍御髀甲患毒痛甚。服消毒藥其勢未減。卽以槐花酒一服。其症大去。再以托裏消毒而愈。

丁蘭年二十餘。股內患毒。日久欲求內消。診其脈滑數。知膿

已成且氣血虛不潰。遂刺之膿出作痛。以八珍湯治之少可。但膿水清稀。更以十全大補湯加炮薑附子五分數劑漸愈。仍服十全大補湯三十餘劑而痊。

一僧患股內腫。一塊不痛不潰。治以托藥二十餘劑。膿成刺之作痛。謂腫而不潰。潰而反痛。此氣血虛甚也。宜峻補之。彼云痛無補法。曰正氣不足不可不補。補之則氣化而痛邪自除。遂以參耆歸地白朮治之。兩月而平。

一男子腿內患癰。漫腫作痛。四肢厥逆。咽喉閉塞。發寒熱。諸治不効。乃邪鬱筋絡而然也。用五香連翹湯一劑。諸症少退。又服之大便行二次。諸症悉退而愈。

薛立齋治一男子先腿痛後四肢皆痛遊走不定至夜益甚  
服除敗毒之劑不應其脉滑甚兼溼痰濁血爲患以二陳  
湯加蒼朮羌活桃仁紅花牛膝草鳥治之而愈凡溼痰溼  
熱及死血流注關節非辛溫之劑開發腠理流通隧道使  
氣行血和焉能得愈

上舍李道甫腿患瘡作痛少食作嘔惡寒此痛傷胃氣用六  
君子湯加當歸四劑疼痛少止飲食加進又以十宣散加  
白术茯苓陳皮數劑膿成針而出之又以前散去防風白  
芷數劑而痊

一老人腿患癰自潰忽發昏瞀脉細而微此氣血虛極也以

大補之劑而甦

一男子患腿痛而不焮腫大小便利調和用托裏榮衛湯數劑而消。

一男子內股患毒腫硬痛甚不作膿隔蒜灸五十餘壯勢退七八以仙方活命飲四劑而膿成用十宣散六劑膿潰而愈凡瘡或大痛或不痛麻木炙最良。

一男子腿內側患癰未作膿而腫痛以內托黃芪柴胡二劑少愈又二劑而消。

一男子腿外側患癰漫腫大痛以托裏黃芪酒煎湯二劑少可更以托裏散數劑潰之而愈。

一婦人腿癰久而不愈。瘡口紫陷。膿水清稀。以爲虛。彼不信。乃服攻毒之劑。虛症蜂起。復求治。令炙以附子餅。服十全大補湯百餘劑而愈。凡瘡腫膿清不歛者。再或陷下。皆氣血虛極也。最宜大補。否則成敗症。若更患他症。尤難治療。男子腿癰內潰。針之膿出四五碗。惡寒畏食。診脉如絲。此陽氣微也。以四君子湯加炮附子一錢。服之寒少止。又四劑而止。以六君子湯加桂。數劑飲食頓進。乃以十全大補湯。及附子餅。兩月而愈。

一男子患腿癰。兼筋攣痛。脈弦緊。用五積散加黃柏柴胡蒼朮。治之而痊。

一男子腿痛兼筋攣骨痛脈弦緊。以大防風湯二劑。攣少愈。  
又二劑而腫消。但內一處尙作痛。脈不緊。此寒邪已去。乃  
所滯瘀濁之物。欲作膿故痛不止。用托裏藥數劑。腫發起  
脉滑數。乃膿已成矣。針之。用十全大補湯月餘而安。

一男子右腿赤腫焮痛。脈沈數。用當歸拈痛湯。四肢反痛。乃  
溼毒壅遏。又況下部藥難達。非藥不對症也。遂砭患處去  
毒血。仍用前药一劑頓減。又四劑而消。

丹溪診東陽李兄子。年逾三十。形瘦膚厚。連得憂患。又因作  
勞過於色。忽足腿外側廉上。紅腫其大如栗。一醫問其大  
府堅實。與承氣湯兩帖不効。又一醫教以大黃硃砂生粉

草麒麟竭，又二三帖，半月後召視之曰：脈實大事去矣。後果歿。

馬銘鞠治江都尹子九歲患腿癰，治彌月勢漸盛，按之堅如石，幸兒氣厚，可內消，用牛膝米仁地榆生地牛蒡銀花連翹甘草。初劑加利藥微利之，卽稍寬。後兩劑加汗藥微汗之，勢益寬。至數劑取穿山甲末五錢半入煎，半調藥送下。兒善飲，令一醉。自此頓消。半月地下行矣。初一醫欲開刀，遇馬中止。凡外科宜以開刀爲戒。廣筆記

薛立齋治一男子患腿癰，膿已成，針之出二椀許，飲以托裏藥一劑，大發熱，更以聖愈湯二劑而止。翌日惡寒不食，脣

細如絲以人參一兩熟附子三片薑東煎再服而愈但少食不寐更與大補黃芪湯而平。

一男子腿腫發熱畏寒以補中益氣湯治之彼以爲緩乃服芩連等藥熱愈甚復請治與人參養榮湯二十餘劑而潰更以參芪歸朮炙草肉桂又月餘而歛夫火之爲病當分虛實芩連苦寒能瀉心肺有餘之火若老弱或飲食勞倦而發者此爲不足當以甘溫之劑治之未嘗有實熱而畏寒虛熱而喜寒者琇按二語却不然此其驗也。

陸封公養質患腿癰醫用忍冬花角刺連翹白芷貝母花粉陳皮乳香沒藥治之不效仲淳卽前方加棉地榆炙甘草

紫花地丁服三四劑愈。

# 膿瘡

附爛

腿

薛立齋治一婦人患膿瘡，因步履勞動，復惡寒發熱，倦怠懶食，而瘡出血，此元氣虛而不能攝血歸經也。用補中益氣湯而愈。

陶九成曰：辛酉夏余足瘍發於外臍，初甚微，其後浸淫涉秋徂冬，不良于行，凡敷膏澑之劑嘗試略盡，痛痒雜作，大妨應酬。一日友人俞和父過見怪其蹣跚，舉以告之，和父笑曰：吾能三日已此疾。法當先以淡鹽水滌瘡口，浥乾次用

局方駐車丸研極細加乳香少許乾糝之無不立效如其

說用之數日良愈蓋駐車丸本治血痢滯下而此瘡亦由

氣血凝滯所成也。

齊東野語

張子和治小渠袁三因被盜受驚仆傷其兩脇外廉作瘡數年不已膿水常涓涓然但飲冷則瘡間冷水浸淫而出延爲濕瘡張曰爾中焦當有綠水二三升涎數掬袁曰何也曰當被盜時感驚氣入腹驚則胆傷足少陽經也兼兩外廉皆少陽之部此胆之甲木受邪甲木色青當有綠水少陽在中焦如漚既伏驚涎在中焦飲冷水咽爲驚涎所阻水隨經而旁入瘡中故飲水則瘡中水出乃上涌寒痰汙

如流水。次下綠水果二三升。一夕而癥乾矣。

薛立齋治一室女。年十七。腿外廉忽腫起一紅點作痒。搔破日日鮮血如注。及飛出小蟲甚多。審其由。每先寒熱。雨耳下或結核。蓋外廉耳下俱屬胆經。胆爲肝之腑。肝主風熱。生蟲。血得風而妄行。肝火旺而血出。其肝膽陰陽俱虛矣。凡病虛則補其母。用六味丸滋腎水以生肝木。四物加柴胡山梔鈎簾。生肝血以抑風熱而痊。

陳湖陸懋誠。素因陰虛過飲入房。發熱腿痛似廉瘡。用發表之劑。兩腿腫黯。熱氣如霧。欲發痙。脉皆洪數。兩尺尤大。此屬足三陰虛。酒濕所乘。元氣損而邪益甚耳。用十全大補

加山藥山萸附子一劑脈症頓退去附子又二劑全愈。

李絳記武元衡相國在西川且苦脛瘡焮痛不可堪百醫無效及到京城呼供奉石碌等數人療治無益有廳吏上此方用之便瘥其方云療多年惡瘡百方不差或痛焮走注不已者並爛搗馬齒莧傅上不過三兩度愈

李絳兵部手集

章宇泰傳治瞼瘡方六郎乳母試之神效松香一兩輕粉三錢乳香五錢細茶五錢四味共打成膏先將葱頭花椒煎湯熏洗淨用布攤膏厚貼患處以絹縛定黃水流盡爛肉

生肌

廣筆記

陳儀部年逾五十兩瞼生瘡日久不愈飲食失節或勞苦或

服滲利消毒之劑愈甚。脾脈大而無力。此脾虛而無溼熱也。以補中益氣湯數劑少愈。更以六君子湯加蒼朮升麻。神曲治之而愈。嘗治下部生瘡痏痛。或發寒熱。或腳氣腫痛。以人參敗毒散加檳榔蘇木蒼朮黃柏並劫。久不愈者。以四生散治之。愈後以補腎丸補之。庶不再發矣。

王洪緒治馬悠也。右足背連小腿轉彎處。初因湯毒而成爛腿。三十餘年。其腫如斗。孔可容拳。有時出血。以布圍填塞。否則空痛。時年七十有四。令以老蟾破腹。身刺數孔。以肚襍填患孔。蟾身覆之。早晚煎葱椒湯溫洗一次。以蟾易貼。用醒消丸早晚二服。三日後取地丁大力鮮草搗爛填孔。

外貼烏金膏。日服醒消丸。其四圍硬塊出水處。以嫩膏加五味散敷。其發痒者。以白花膏貼。內有硬塊如石者。以生商陸搗爛塗孔內。出血時先以參三七末。繖之。然後填藥。如此二十餘日。腫退痒止。塊平黑肉漸紅活。孔亦收淺。止以草填。日以五寶散繖。仍貼烏金膏。因老人精神不衰。飲食不減。始終不用補而收功。

蔣仲芳治胡明甫。年五十餘。患臙瘡三載。治皮癬。痒微腫。色紫黑。用膏藥蓋之。則流水鞋襪盡濕。去膏藥卽又燥烈。痒痛難忍。此溼熱下流也。人但知燥濕清熱解毒。而不知濕熱之原。從脾家下陷耳。遂用補中益氣湯。升舉其氣。更加

黃柏清熱、蒼朮燥濕、茯苓澤濕利水。蓋治濕不利小便，非其治也。外用陳石灰調側柏汁以燥溼散瘀清熱，稍加火酒爲從治，敷之明日瘡乾數日而愈。外治法妙

## 脫疽

謂疔生于足指或足消而自脫，故名。亦有發

子手指者，名炷節疔，重者腐指節，輕者筋彎。一男子足指患脫疽，焮痛色赤，發熱，隔蒜灸之，更以人參敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃痛止。又十宣散去桔梗官桂，加花粉數劑而痊。

一男子足指患脫疽，色紫不痛，隔蒜灸五十餘壯，尚不知痛。又明灸百壯始痛，更投仙方活命飲四劑，乃以托裏藥潰

而愈。

心法中韓判官症同灸同乃以敗毒散加銀花白芷而愈矣

一男子足指不大痛。色赤而腫。令隔蒜灸至痛止。以人參敗毒散去桔梗。加金銀花。白芷。大黃而潰。更加以仙方活命飲而痊。症形勢雖小。其惡甚大。須隔蒜灸之。不痛者宜用灸之。庶得少殺其毒。蓋因膏梁厚味。酒麵炙煢。積毒所致。或不慎房勞。腎水枯竭。或服丹石補藥。致有先渴而後患者。有先患而後渴者。皆腎水涸不能制火故也。初發而色黑者不治。赤者水未涸尚可。若失解其毒。以致肉死色黑者。急斬去之。緩則黑延上足必死。此患不同腫潰。惟隔蒜灸有效。亦有色作痛而自潰者。元氣未脫易治。夫至陰

之。下血氣難到。毒不易腐。藥力又不易達。況所用皆攻痛之藥。未免先於腸胃。又不能攻擊其毒。故隔蒜炙。并割去。最爲良法。故孫真人云。在指則截。在肉則割。卽此意也。

一男子腳背患此症。赤腫作痛。令隔蒜炙三十餘壯。痛止。以仙方活命飲四劑。而潰以托裏消毒藥。而愈。

一男子足指患此症。色赤焮痛。作渴。隔蒜炙數壯。服仙方活命飲三劑。而潰。更服托裏藥。及加減八味丸。潰脫而愈。

一男子足指患此症。色黑不痛。令明炙三十餘壯。而痛。喜飲食。如常。謂急割去。速服補劑。彼不信。延上。遂致不救。

一男子腳背患此症。色黯而不腫。痛。煩躁。大渴。尺脉大而澁。

此精氣已絕不治。後果然。

楊太僕年逾四十。左足大指赤腫焮痛。此脾經積毒下注。而然乃脫疽也。喜色赤而痛。以人參敗毒散去人參桔梗。加銀花白芷大黃。一劑更以瓜蔞銀花甘草節四劑頓退。再以十宣散去桔梗。加銀花防已數劑而愈。

一膏粱人年逾五十。患此症。色紫黑。腳焮痛。孫真人云。脫疽之症。急斬去之。毒延腹必不治。色黑不痛者亦不治。喜其飲食如故。動息自甯。爲瘡瘍善症也。尙可治。遂以連翹消毒散六劑。更以銀花甘草節瓜蔞二十餘劑。患指潰脫。再以芎歸地連翹銀花白芷二十餘劑而愈。

一芻蕘左足指患一泡。麻木色赤。次日指黑。五日足黑。冷不知疼痛。脉沈細。此脾胃受毒所致。以飛龍奪命丹一服。翌日令割去足上死黑肉。割後骨始痛可救。遂以十全大補湯治之而愈。蓋黑肉乃毒氣之盛。而拒截營氣所致。況至陰之下。氣血難達。經云風淫木疾。卽此是也。向若攻伐之。則邪氣愈盛。乘虛上侵必不救。

海山騎淫益無度。强并民居田宅婦女。竟占山東之半陸。宣子者。山東名醫也。有富室妾。足小指生瘡。狀類細米瘡頭。早白根如熟棗。臟腑挈挈欲墜。聞平湖名廷之視曰。此粟米瘡也。與人面瘡等。七日毒上升。遍體腐爛成黑水死矣。

君欲生之。當急斷其指。斷之愈。海山亦生是瘡。屬宣子視。宣子仍前言。海山大怒。欲殺之。楚人丁維章以外科有名。出入禁內。海山邀之至。告以宣子語。且曰。公視我瘡無恙。吾必殺之。維章熟視曰。殺我可也。何尤宣子。今已過三日。毒上升矣。公欲活耶。斷膝尚可。海山瞋目曰。其然。三問應聲如響。海山喟然曰。我命在公矣。顧左右取截刀。伸足曰。斬。左右戰慄。海怒罵使斬。遂斷一腿。維章手提海山髮。倚柱坐。海山面黃氣絕。維章曰。可速召前醫者。宣子至。視其地一腿尚自起跳躍。黑血淋漓。命取人參一斤。濃煎灌其口。少頃海山甦。顧其足曰。嗟乎。刖足刑已重矣。何辜而刖。

膝。幸公治我。我自今後庶幾可以無後患。閱四十九日而右膝毒發。復生人面瘡。醫曰。不可再活矣。海山不數日死。凡所奪民家產皆散去。其兄乃乞食如初。

# 多骨疽

薛立齋治舉人于廷器。腿患流注。年餘出腐骨少許。午前畏寒。午後發熱。口乾唾痰。小便頻數。以爲足三陰虧損。朝用補中益氣湯。夕用六味地黃丸料。加歸耆五味。各三十餘劑。外炙豆豉餅。諸症漸愈。又以十全大補之類。喜其慎疾而愈。

薛立齋治一儒者患附骨疽失于調補瘡口不歛日出清膿少許已而常出三腐骨其脈但數而無邪此氣血虛瘡結膿管而不能愈絏以烏金膏日服十全大補湯而愈

上舍王廷璋患前症三年未愈肢體消瘦飲食難化手足並冷大便不通手足陰冷此陽氣虛寒用補中益氣湯八味丸及炙其患處而愈

一男子臂患流注出腐骨三塊尙不歛發熱作渴脈浮大而濁乃氣血俱損須多服生氣血之劑庶可保全彼惑於火尙未盡仍用涼藥內服外敷幾危始求治其形甚瘁其脉愈虛先以六君子湯加芎歸月餘飲食漸進以八珍湯加

肉桂三十餘劑。瘡色乃赤。更以十全大補湯外。以附子餅  
炙之。僅年而痊。醫林集要云。骨疽乃流注之敗症也。如用  
涼藥。則內傷其脾。外冰其血。脾主肌肉。脾氣受傷。飲食必  
減。肌肉不生。血爲脈絡。血受冰。則氣血不旺。而愈滯。宜用  
理脾健脾。則肉自生。而氣自運行矣。又有白虎飛留連周  
期。或展轉數歲。冷毒朽骨。出盡自愈。若附骨腐者。可痊。正  
骨腐。則爲終身廢疾矣。有毒。自手足。或頭面腫起。或兼疼  
痛。上至頸項。骨節去處。如癟癰貫珠。此風溼流注之症也。  
宜以加減小續命湯。及獨活寄生湯治之。有兩膝腫痛起。  
或至遍身骨節疼痛者。此亂至。名厯節風。宜用附子。

八物湯治之又有結核在項腋或兩乳傍或兩胯軟肉處  
名曰癰癧癰屬冷症也。又有小兒宿痰失道致結核于頸  
項臂膊胸背之處亦冷症也。俱用熟藥敷貼已上諸症皆  
緣于腎腎主骨腎虛則骨冷而爲患也所謂骨疽皆起于  
腎亦以其根于此也故用大附子以補腎氣腎熱則骨有  
生氣而疽不附骨矣。聖書云患腫潰久不時出細骨用桐油調蜜陀僧如膏絹攤貼妙

# 附骨疽

王肯堂治一人患附骨疽膿熟不能洩潰而入腹精神昏憊  
粥藥不入醫無所措診之脉細如蛛絲氣息奄奄曰無傷

也用針刺其腹。膿大洩。然皆清稀若蟹吐沫。在法爲透膜。  
不治用參芪附子加厥陰行經之藥。大劑飲之。又服八味  
丸。食大進。米升餘。肉數匕。旬日而平。所可治者。潰瘍之脉。  
決實者死。細微者生。病脉相合。故可治也。刺腹者。膿不洩。  
必內攻。按之知其瘡深。卽刺無害。所以不透膜。八味補腎。  
腎氣旺而上升。胃口開而納食。凡洩膿既多。刀圭之藥。其  
何能濟。遷延遲久。且有他患。故進開胃之藥。多食肉以補  
之。肌乃速生。此治潰瘍之大法。

一男子腿根環跳穴患痛徹骨外皮如故。脉數而滯滑。此附  
骨疽。膿將成也。用托裏藥六劑。腫起作痛。脈滑數。其膿已

成針之出椀許。更加補劑。月餘而瘳。

一男子患附骨疽。腫硬發熱。骨痛筋攣。脈數而沉。用當歸拈痛湯而愈。

張景岳治一人。年三十餘。素多勞忽。患環跳酸痛。數月後。大股漸腫。曰。此附骨也。當速治。與活命飲二帖。未效。而腫益甚。因混投清火解毒。遂致嘔惡發熱。飲食不進。勢甚危。復求治。與參芪內托散。大加炮薑。敷劑而嘔止。食進。其腫軟熟。知其膿成。針之膿不多。復與九味異功煎。遂大潰且瓣。瓣出膿。潰者五六處。腿肉盡去。止存皮骨矣。潰後復嘔。發熱不食。以十全大補湯。丸味異功散。相間與之。熱漸退。食

漸進。然足筋短縮。但可豎膝仰卧。左右挨緊。毫不能動。動則痛極。自分已成廢人。凡用十全大補三十餘劑。人參三斤。乃肉生筋舒如故。

一人年近三旬。素不節慾。忽環跳穴酸痛月餘。張曰。此最可畏。恐生癰毒。不信。或謂筋骨痛常事耳。不過風熱使然。與散風清火藥。至半年後。果微腫復求治。曰。速用托補。以救根本。尚不遲也。又不信。謀之瘍醫曰。豈有腫瘍未潰。遽可溫補耶。復用清火消毒之劑。及大潰而危。再延視。則脈症俱敗。悔無及矣。

一膏梁子年三旬。素耽酒色。亦患前症。令早服藥。執拗不從。

及腫而膿成。令速針之。不肯偏信庸流敷以苦寒解毒之藥。不知膿已成。猶何毒之可解。但有愈久愈深。直待自潰。元氣盡去。不可收拾耳。

立齋治地官孟鄉環跳穴患疽。內服外敷皆敗毒寒劑。因痛極刺之。膿瘀大瀉。瘡口開張。其色紫黯。右關脉浮大。此胃氣復傷。不能榮于患處也。以豆豉餅六君子加藿香砂仁炮羌。數劑由是胃氣醒。而飲食進。患處暖。而肌肉漸生。再以十全大補湯而愈。

大君都承慶患附骨疽。內痛如錐。外色不變。勢不可消。喜其未用寒創。止因痛傷胃氣。而不思飲食用六君子湯治之。

續名醫類案卷三  
飲食少進。更以十全大補二十餘劑而膿成。針去。仍以大補湯倍用參芪歸朮。加麥冬。五味。遠志。貝母。數服。膿漸止。而瘡亦愈。

一儒者左腿微腫。肉色如故。飲食少。思此真氣虛而溫邪內襲也。蓋諸氣皆秉于胃。法當助胃壯氣。遂用六君子加藿香木香。當歸。數劑飲食漸進。更以十全大補。元氣復而愈。一儒者兩腿腫痛。肉色不變。惡寒發熱。飲食少。思肢體倦怠。脾氣不足。濕痰下注也。以補中益氣加半夏茯苓白芍。二劑。寒熱退而腫痛消。又十餘劑。脾胃壯而形體健。一男子因負重。飲食失節。胸間作痛。誤認爲瘡毒。服大黃等。

藥右腿股腫肉色如故頭痛惡寒喘渴發熱脈洪大而無力此勞傷元氣藥損胃氣而然耳用補中益氣湯四劑又用十全大補湯數劑喜其年少而愈

薛立齋治一婦人患附骨疽久而不歛致腿細軟脉來遲緩卽以十全大補湯加牛膝杜仲及附子餅炙之兩月餘而愈凡膿潰之後脉滯遲緩者易愈以其有胃氣故也脉來細而沉時直者裏虛欲變症也若煩痛尙未痊也洪實粗散者難療以其正氣虛而邪氣實也

一婦人環跳穴作痛肉色不變脉緊數此附骨疽也膿未成用內托黃芪酒煎湯加青皮龍胆草山梔數劑而消。

一婦人患附骨疽，久不愈，膿水不絕，皮膚癩痒，四肢痠軟，以爲虛欲補之，彼惑爲風疾，遂服祛風藥竟致不起。陳無擇云：人身有皮毛血脉筋膜肌肉骨骼，以成其形。內則有心肝脾肺腎以主之。若隨情妄用，喜怒勞逸，致內藏精血虛耗，使皮血筋骨肉瘦弱無力以運動，故致瘻躉，狀與柔風脚氣相類。柔風脚氣皆外所因，瘦則內藏不足所致也。

山西曹主簿，年逾四十，夏間患附骨疽，服托裏藥而愈。至秋飲食少，思痰氣壅盛，口舌生瘡，用八味丸治之而愈。

一老人腿患附骨疽，腫硬，大按方痛，口乾脈弱，腫聚不潰，飲食少，思謂腫下而堅者，發于筋骨，皮色不變者，發于骨骼。

遂以參芪等藥托之三十餘劑。膿雖熟不穿，謂藥力雖達。  
必須針刺不聽。至旬日方刺之，涌出清膿五六椀許。然衰  
老之人氣血不足，養毒又久，竟不治。大抵瘡疽旬日不退。  
宜托之。有膿刺之。有腐肉取之。虛則補之。此十全之功也。  
王上舍患附骨疽，畏針不開，臂膝通潰，脉數發渴，煩躁時嗽。  
飲食少。思齊氏曰：瘡癆煩躁時嗽，腹痛渴甚，或瀉利無度。  
此惡症也。膿出之後，若脈洪數難治，微濶遲緩易治。遂刺  
之，膿出四五椀許，卽服大劑參芪歸朮。翌日脉稍歛，更以  
八珍湯加五味麥冬、肉桂、白歛三十餘劑，脈緩膿稠。三月  
而愈。

王洪緒治附骨疽方。用白芥子搗粉酒釀調塗。或以大戟甘遂二末。白蜜調敷。內服陽和湯。每日一劑。四五日可消。消後或服子龍丸。或服小金丹。以杜後患。大忌開刀。開則成縮腳損疾。