

小儿病

國醫萬病自療叢書

小兒病

上海大眾書局印行

國醫萬病自療叢書 小兒病

例言

- 一 本書文字淺顯。撰句簡潔。極便一般人士之閱讀。或醫士之參攷。
- 一 本書不侈高深。不論空理。在在以實能應用爲歸宿。一切詭異奇僻。人情者。俱不錄入。
- 一 本書自初生兒始。至成年止。劃分爲三期。各以其所常病者選入。並非某一時期。必患某一病症云也。
- 一 本書每一病先述其病狀。使人人皆得見其病狀而追求其病因。更考其病因而施以治療。則方無不効。病無不除矣。
- 一 本書各病附有單方。蓋濟急於一時者也。根本治療。尙以參閱處方爲要。

編者識 四、二、二十二

國醫

萬病自
療叢書

小兒病目次

一 初生期——初生通論

A 預防胎毒法

拭口法

斷臍法

浴兒法

去瘀法

剃頭法

B 胎病治療法

不啼

眼不開

不乳

一
二
三
三
四
五
六
七

吐不止

.....八

不小便

.....一一

不大便

.....一二

大小便不通

.....一四

懸癰

.....一五

重舌

.....一六

重齦重腭

.....一七

噤風

.....一八

鵝口

.....二一

撮口

.....二二

臍風

.....二四

臍濕

.....二八

臍瘡

.....二九

臍突	三〇
胎驚	三一
胎癩	三二
胎風	三四
胎熱	三五
胎寒	三七
胎黃	三九
胎赤	四〇
內釣	四二
覘乳	四二
夜啼	四四
赤游風	四五
初生無皮	四七

變蒸

四九

二 哺乳期——哺乳通論

A 驚癇病治療法

急驚風

五〇

慢驚風

五三

驚啼

五五

癇

五六

偏風噤口

五八

中風

五九

B 痘疹病治療法

天痘

六二

水痘

六五

看痘法

六六

種痘法 七〇

麻疹 七六

看麻疹法 七七

C 積滯吐瀉病治療法

食積 七九

痰涎 八一

吐乳 八二

瀉 八三

D 感冒喘咳治療法

感冒 八七

諸汗 九〇

喘息 九二

咳嗽 九三

三 孩童期——孩童通論

A 疳癖病治療法

肝疳 九五

心疳 九七

脾疳 九八

肺疳 九九

腎疳 一〇〇

無辜疳 一〇二

癖病 一〇三

B 霍亂痢瘧病治療法

霍亂 一〇四

赤白痢 一〇五

瘧 一〇七

C 黃疸腫脹病治療法

黃疸.....一〇八

腹脹.....一一〇

水腫.....一一一

D 瘟疫暑熱病治療法

瘟疫.....一一三

暑證.....一一四

諸熱.....一一六

E 雜病治療法

疝證.....一一七

淋.....一一八

遺尿.....一一九

尿白便濁.....一二〇

陰腫

..... 一一一

脫肛

..... 一一二

肛癢

..... 一二四

語遲

..... 一二五

鶴膝

..... 一二六

咽喉腫痛

..... 一二七

目赤腫病

..... 一二八

滯頤

..... 一三〇

龜胸

..... 一三一

龜背

..... 一三二

解顛

..... 一三二

顛陷

..... 一三三

五遲

..... 一三四

五軟	一三六
五鞭	一三七
齒痛	一三八
耳病	一三八
鼻塞	一三九
鼻癭	一四〇
客忤	一四一
吐	一四二
中惡	一四三
卒死	一四四
瘡瘍	一四五
丹毒	一四六
疔瘡	一四七

時毒	一四八
天泡瘡	一四九
楊梅瘡	一五〇
惡核瘰癧	一五二
疥瘡	一五三
口瘡	一五四
便毒	一五四
腳凍瘡	一五五
湯火瘡	一五六

附錄一

保嬰要訣

哺乳	一五七
乳母之選擇	一五七
護乳	一五八
乳時	一五八
沐浴	一五八
服被	一五九
換屎尿片	一五九
睡臥	一五九
保抱	一五九
扇與火	一六〇
居室	一六〇
雜食	一六〇
護眼	一六一

口齒…………… [六一]

勿輕服藥…………… [六一]

衛生要言…………… [六二]

附錄二

小兒病自己診斷法

三關主病…………… [六四]

又訣…………… [六五]

虎口脈紋歌…………… [六五]

診寒熱病法…………… [六六]

聽聲法…………… [六六]

觀色法…………… [六六]

看小兒傷寒傷熱傷風傷食法…………… [六六]

小兒危症·····	一六七
決死症·····	一六七
決死症日數歌·····	一六八
看初生小兒病法·····	一六八
審察小兒病源法·····	一六九
看小兒壽夭法·····	一七一
小兒服藥法·····	一七二

國醫

萬病自療叢書

小兒病

茹十眉醫士編

門人鄧庭楫恭校

一 初生期

初生通論

小兒初出母腹。如蠶初孵。如草初芽。偶一不慎。即致夭折。推其病源不外三端。一則母胎受毒。從內而發。一因風寒水濕。從外而受。一因乳母粗疏。調護失宜。苟能於此三端。無病時爲之預防周密。有病時爲之治療得宜。則普天下自無不長大之小兒矣。

A 預防胎毒法

拭口法——斷臍法——浴兒法——去瘀法——剃頭法

□ 拭口法

小兒初生。口中不潔。春夏秋三季內。宜以甘草一錢泡水。用脫脂棉（即藥水棉花西藥房有售）裹指。蘸汁滿拭其口。使口中穢物流出。然後用核桃肉去淨薄

皮搗汁和赤砂糖少許。盛於杯中。放在開水內燙溫。徐徐喂之。俟二十四小時後。再行哺乳。冬季則可用生薑湯拭口。蓋薑有去胃寒。通神明之功。可免吐瀉之患。如初生小兒甚肥厚。面色紅赤。唇色紅紫者。爲胎火過重。於上法拭口後。卽用川連一錢。甘草五分。泡水徐徐喂之。再續進核桃汁少許。任兒口流出白沫。則疾病自少。古人謂小兒落地。口含血塊。卽當用手挖出。如嚙下卽有劇毒。此語以余之經驗。則以爲未必盡然。蓋小兒無非血氣所生。獨此一塊而有毒乎。卽使嚙下。亦必從大便而出也。

斷臍法

嬰兒出胎。洗後方斷臍帶。則不傷水濕以致病。斷臍時。一手握臍帶。一手將臍帶推擠三四次。使胞血貫通臍穴。離臍四五寸處。以綿緊札。用帛包裹。以口咬斷。蓋緊札則兒血不貫於胞衣。自然痿縮易下。卽或胞衣未下。延緩數日亦無大害。口咬則斷臍不犯剪刀。但將剪刀在火上烘暖亦無妨。自無冷氣內傾。可免腹中弔痛之虞。所留臍帶不可太長。太長則難乾而傷肌。然又不可太短。太短則逼

內而傷臟。或致腸痛而夜啼。臍帶斷後。宜用下列之摻臍散敷之。再以軟絹新棉封裹之。每日換尿布時。仍摻此散。摻完一料。則永無臍風等症。如藥不備。卽以細熟艾一塊。照依前法封裹亦可。

摻臍散

枯礬二錢半 硼砂二錢半 硃砂二分

冰片五厘 麝香五厘 共爲極細末

浴兒法

兒生三日。以桑槐榆桃柳各取嫩枝三寸長者。二三十節。煎湯看冷熱。入豬胆汁二三枝浴之。臨浴時。須擇無風處。適可而止。不可久在水中。冬月恐其受寒。夏月恐其傷熱。浴畢。以乾軟布或棉花拭極燥。再撲以六一散。（中藥店有售。）則可令兒胎瘡不生。（市上之爽身粉亦可用。）

去瘀法

兒在母胎。純是吮血。故下地後。宜用去瘀法。瘀血去淨。臟腑清潔。自少疾病。

去瘀方

歸尾五分 紅花五分 桃仁五分

甘草五分 錦紋大黃五分

將此藥濃煎。儘生下六個時辰內服完。卽解出黑糞。熱重者。再服一二劑。小便不通。加車前子五分。

□ 剃頭法

俗尙剃頭。向於滿月後行之。剃時須就無風暖處。剃後用下方擦頭上。可避風邪。又可免生瘡癬。

剃頭方

薄荷葉三分 杏仁去皮尖三粒 搗爛入生麻油三四滴 和勻用以擦頭

(按)世俗小兒剃頭。最好在三四個月後行之。蓋小兒生僅一月。腦筋未固。有髮尙可護腦。若竟剃去。風寒水濕。從髮孔入。灌輸腦筋。周遍全體。易致變生諸症。若嫌頭垢。可潤以麻油。用軟刷輕輕刷之。髮生久太長。可用快剪浮剪之。

B 胎病治療法

不啼——眼不開——不乳——吐不止——不小便——不大便——小便不通——懸癰
——重舌——重齕重腭——噤風——鵝口——撮口——臍風——臍濕——臍瘡——
臍突——胎驚——胎疝——胎風——胎熱——胎寒——胎黃——胎赤——內釣——
喂乳——夜啼——赤游風——初生無皮——變蒸

□ 不啼

【病狀】小兒生下不啼。俗語名之爲草迷。西醫謂之初生兒假死。輕者面色紅紫。筋肉緊張。重者氣絕無聲。面青甲黑。是形雖存而命已不立矣。

【病因】一因臨產時生育艱難。以致兒生氣閉不通。所以不啼。一因時值天寒之際。兒氣爲寒所逼。亦不能啼。

【治療】臨產時生育艱難者。急用鞭背法。兒氣爲寒所逼者。宜用薰臍帶法。重者可行人工呼吸法。

一 鞭背法

小兒初生氣不通。奄奄呼吸。少啼聲。急以葱白細鞭其背。

二 薰臍帶法

小兒初生。方離母腹。又值天寒。氣爲寒閉。致兒聲不出者。須急用棉絮包裹。抱於懷中。且勿斷臍。用紙燃薰油點火。於臍帶下往來薰之。令火氣由臍入腹。寒得溫散。氣得煖通。啼聲自出矣。

三 人工呼吸法

先持定嬰兒肩胛部。拇指抵胸前。食指由背後伸入腋下。餘三指當胸背間。嬰兒儼然懸於醫者手指間也。既則漸漸舉起兒體。將兒下身向上。上身向下。彎腰擠胸。使喉中之穢血。得以盡出。遂得呼氣。終則速將兒身放下。仍如前式。遂得呼氣。依此提起放下。大約在一分鐘內。以行十四次至十六次爲度。兩分鐘後。則以溫水浴兒。此卽人工呼吸法也。此法須斷續施行。必俟呼吸已起。方可中止。

【調理】上行諸法。兒雖蘇生啼哭。然亦輒嗜眠。故每閱兩點鐘。須使醒覺一次爲愈。

□ 眼不開

【病狀】小兒初生。兩眼不開。

【病因】孕婦飲食不節。恣情厚味。熱毒薰蒸。以致熱蘊於內。故兒眼不能開也。
【治療】初以熊膽湯洗之。一日七次。如三日不開。則服生地黃湯。

一 熊膽湯

熊膽 黃連各小許煎湯薰洗。

二 生地黃湯

乾地黃 赤芍藥 川芎 當歸(去蘆)

瓜蒌根 甘草

右等分爲細末少許。用燈心煎湯。調抹入口中。速服。

□ 不乳

【病狀】兒生能乳。本屬天然。今不吮乳者。則爲病矣。

【病因】一因惡穢在腹。則令腹滿氣短。不能吮乳。一因取冷過度。胎中受寒。

【治療】惡穢在腹者。用一捻金治之。受寒而面色青白。多啼者。用茯苓丸及勻氣散主之。若受寒過甚。四肢厥逆者。則用理中湯治之。

一 一捻金方

生大黃 黑丑 白丑 人參 檳榔各等分。
右爲細末。每取少許。蜜水調服。

二 茯苓丸

赤茯苓 川黃連(去鬚) 枳殼(炒)
右等分爲末。煉蜜丸桐子大。每服一丸。乳汁調下。

三 勻氣散

陳皮一錢 桔梗一錢 炮薑五分 砂仁五分 炙甘草五分 木香三分
右共爲細末。每服五分。紅棗煎湯調服。

四 理中湯

人參五分 白朮(土炒)一錢 乾薑三分 炙甘草三分
右用紅棗肉爲引。水煎服。

□ 吐不止

【病狀】小兒初生。嘔吐不止。

【病因】因腹中穢惡不淨而吐者。則覺腹滿便秘。因生育時觸冒寒邪。入裏犯胃而吐者。則曲腰而啼。吐沫不止。因胎前受熱而吐者。面黃赤。手足溫。口吐黃涎。因胎前受寒而吐者。面青白。四肢冷。口吐清稀白沫。

【治療】腹中穢氣不淨者。宜用木瓜丸治之。寒邪犯胃者。宜用香蘇飲治之。胎前受熱者。宜用黃連二陳湯主之。胎前受寒者。宜用理中湯治之。

一 木瓜丸

木瓜 麝香 膩粉 木香 檳榔各等分

右藥研細末。麵糊丸如小黃米大。每服一二丸。甘草水下。時時用之。

二 香蘇飲

藿香 蘇葉 厚朴(薑炒) 陳皮 枳殼(麩炒) 茯苓 木香(煨) 炙甘草

右等分以生薑爲引。水煎服。

三 黃連二陳湯

半夏(薑製)六分 陳皮一錢 茯苓一錢 生甘草三分 黃連(薑製)五分
右以生薑爲引。水煎服。

四 理中湯

人參五分 白朮(土炒)一錢 乾薑三分 炙甘草三分
右用紅棗肉爲引。水煎服。

五 單方

小兒初生吐不止者。用籩籬少許。用人乳二合。鹽二粟許。煎沸。入生黃粟許。與服。(外台祕要)
小兒嘔乳不止。服此立效。用膩粉一錢。鹽豉七粒。去皮研勻。丸麻子大。每服三丸。藿香湯下。(活幼口
議)

襍襍吐乳。石燕子末。以蜜調少許。塗唇上。日三五次。(衛生寶鑑)

以乳汁一杯。葱白兩個。於飯鍋上燉熟。卽與小兒服之。自愈。(鄭氏小兒方)

米七粒。燒黑。水半酒杯。煎至五分服。極有效驗。(活幼全書)

取田中蚯蚓一兩。研末。空心以米湯服半錢。不過二三服。效。(聖惠方)

□ 不小便

【病狀】小兒初生不尿。臍腹腫脹。倘覺臍之四旁有青黑氣色。及口撮。卽成險症矣。

【病因】此病多因在胎時。母恣食噉。熱毒之氣。流入胎中。兒飲其血。卽內熱而不便矣。

【治療】如未見青黑色。不飲乳者。宜服葱乳湯。或導赤散。熱甚者。八正散主之。外用豆豉膏貼臍上。則小便自通矣。

一 葱乳湯

葱白三四寸。破之。以乳汁半盞煎灌。或取葱生用搗爛。入乳。拌入兒口內。再與乳吮。嚙下卽通。

二 導赤散

生地黃 木通 生甘草各等分

右以燈心竹葉爲引。水煎服。加黃連。滑石。赤苓。更妙。

三 八正散

扁蓄 瞿麥 滑石(飛) 木通 赤苓 車前子 生大黃 生梔子
右等分。以燈心爲引。水煎服。

四 外用豆豉膏

淡豆豉一勺 田螺十九個 葱一大束
右搗爛。用芭蕉汁調貼臍上。卽通。

五 單方

鹽安臍中熨之。效。(千金方)

小兒初生小便不通。葱白搗爛。麝香三厘。摻傅臍上。(衛生總微)
用孩兒茶。研極細末。分許。煎扁蓄湯調下。立通。

□ 不大便

【病狀】小兒初生之日或次日卽大便秘者。俗云下臍屎。此腸胃通和。幽門潤澤也。
若至二三日不大便者。名曰鎖肚。其兒面赤腹脹。不乳多啼。

【病因】胎中受辛熱之毒。氣滯。故大便秘不通。

【治療】用一捻金量兒與之。繼令婦人以溫水漱口。唾兒前後心。手足心。並臍下共七處。以皮見紅赤色爲度。仍以輕粉半錢。蜜少許。溫水化開。時時少許服之。以通爲止。如更不通。卽是肛門內合。當以物透而通之。金簪爲上。玉簪次之。須刺入二寸許。以蘇合香丸納入孔中。糞出爲快。若肚腹膨脹。不能乳食。作呻吟聲。至於一七。則難望其生矣。

一 一捻金方

生大黃 黑丑 白丑 人參 檳榔各等分

右爲細末。每取少許。蜜水調服。

二 蘇合香丸

蘇合香油五錢（入安息香內） 安息香一兩（另爲末 用無灰酒半斤熬膏） 丁香 青木香 沉香 藁朮 香附子 訶子（煨取肉） 烏犀（鎊） 硃砂（水飛）各一兩 薰陸香 片腦（研）各五錢 麝香七錢半

右爲細末。入安息香膏。煉蜜和劑。圓如芡實大。

三 單方

小兒初生便閉。甘草。枳殼煨各一錢。水半盞煎服。(全幼心鑑)

□ 大小便不通

【病狀】小兒初生。大小便不通。腹脹欲絕。最爲急候。宜速治之。

【病因】兒在胎中受辛熱之毒甚。氣滯。故大小便不通。

【治療】亦須如前法。用口啞五心及臍下。以紅赤色爲度。須臾自通。不通。再以木通散行其熱。紫霜丸開其結。庶可望生。若至六七日。謂之一臘。肚腹硬脹。常作呻吟。則難治矣。

一 木通散

車前子 扁蓄 瞿麥 木通 赤茯苓 山梔 滑石(飛) 黃芩 生甘草 大黃
右各等分。以燈心爲引。水煎服。

二 紫霜丸

代赭石一兩(火煨醋浸三五次研末) 赤石脂一兩 杏仁六十粒(炒去皮尖) 巴豆三十粒

(去油膜)

右爲末。飯糊爲丸。如麻子大。日服三丸。白水下。

三 單方

用皂角燒存性。研爲細末。煉蜜作丸。如棗核樣。納穀道中。卽通。(育嬰家祕)
用真香油一兩。皮硝少許。同煎滾。冷定。徐徐灌入口中。服下。卽通。(蘭氏方)

口 懸癰

【病狀】懸癰一名垂癰。凡喉裏上腭腫起如蘆籜盛水狀者卽是。(注)蘆籜卽蘆筍也。

【病因】此乃胎毒上攻所致。

【治療】可以綿纏長針。留刃處如粟米許大。以刺破之。令氣泄。去青黃赤等色之血汁。若一日未消。來日又刺之。不過三刺。自消盡。餘小小未消。三刺亦止。刺後再用鹽湯洗拭。急用如聖散或一字散搽刷。

一 如聖散

鉛霜 眞牛黃 元精石 砂硃(水飛曝乾)

右四味各研極細。秤準。各二錢五分。并勻入白龍腦五分。再研勻。每用少許。搽兒口中。時時用。

一一 一字散

硃砂 硼砂各半錢 龍腦 朴硝各少許

右爲極細末。用蜜調少許。鵝翎蘸刷口內。嚥下無妨。

□ 重舌

【病狀】重舌者。近舌根處有物形如舌而短。故名此。

【病因】因胎兒受熱太盛。致發於上焦。

【治療】急以雞內金爲末。乾摻口內。並內服天竺黃散。或清熱飲。外更吹涼心散。

一 天竺黃散

川鬱金(剉) 皂莢水煮乾 細者如膽狀佳 天竺黃 炙甘草 馬牙硝各半兩 硃砂一分

(研) 蟬殼十四個(水洗去土) 麝香少許

右爲末。每服半錢至一錢。蜜湯調下。

二 清熱飲

黃連(生) 生地 木通 甘草(生) 連翹(去心) 蓮子
右等分。以淡竹葉爲引。水煎服。時時灌入口中。

三 涼心散

青黛 硼砂 黃蘗 黃連(入乳拌曬) 人中白各二錢(煨過) 風化硝一錢 冰片二分
右爲細末吹之。甚效。

四 單方

取釜下土。和苦酒塗舌上。(錢乙小兒直訣)

□ 重齟重腭

【病狀】牙根上腭。腫如水泡。

【病因】皆因小兒在胎有熱。蓄於胃中所發。

【治療】先用針將水泡刺破。以鹽湯拭淨。外敷牛黃散或一字散。內服清胃散。其腫自消。

一 牛黃散

牛黃 白龍腦 硃砂各一分 鉛霜半兩 元精石一兩
右研細爲散。時時敷上。

二 一字散

硃砂 硼砂各半錢 龍腦 朴硝各少許
右爲極細末。用蜜調少許。鵝毛蘸刷。嚙下無妨。

三 清胃散

生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 石膏(煨)
右以燈心爲引。水煎服。

口 噤風

【病狀】此病又名噤口。如果失治。多至不救。其病狀因胎熱者。則舌上生瘡。如黍米大吮乳不得。啼聲漸小。兼爲風邪外襲者。則口吐白沫。牙關緊急。

【病因】或因胎熱所致。或因胎熱內結而復爲風邪外襲。

【治療】因胎熱所致者。當清疏利。以龍胆湯主之。更覺肚腹脹硬。二便不通者。紫霜丸主之。因胎熱復爲風邪外襲者。當以祕方擦牙散。先擦其牙關。次服辰砂全蝎散。中病卽止。不可過服。症退。當調和脾胃。以勻氣散主之。

一 龍胆湯

柴胡五錢(去蘆) 黃芩五錢(炒) 甘草五錢(炙) 鉤藤鈎五錢 赤芍五錢(炒) 大黃一分
(紙裏煨) 龍胆草五錢 蟋蟀二枚(去翅足) 桔梗五錢(去蘆炒) 赤茯苓五錢(去皮)
右以棗肉爲引。水煎服。

二 紫霜丸

代赭石一兩(火煨醋浸三五次研) 赤石脂一兩 杏仁六十粒(炒去皮尖) 巴豆三十粒(去油膜)

右爲末。飯糊丸。如麻子大。日服三丸。白水下。

三 勻氣散

陳皮 桔梗各一錢 炮薑 砂仁 炙甘草各五分 木香三分

右共爲細末。每服五分。紅棗煎湯調服。

四 擦牙散

生南星 二錢（去皮臍） 龍腦少許

右研爲極細末。用指蘸生薑汁。放牙根上擦之。

五 辰沙全蝎散

辰砂半錢（水飛） 全蝎二十枚（頭尾全 去毒） 礪砂少許 龍腦少許

右爲極細末。用乳汁調塗口唇裏及牙齒上。

六 單方

小兒口噤。面青赤者。用雞矢白如棗大。綿裹。以水一合。煮分二服。一方。酒研服之。（千金方）

小兒百日內風噤。口中有物如蝸牛。或如黃頭白虫者。薄豬肪擦之。卽消。（聖惠方）

白棟燒末。水服一錢。（聖惠方）

小兒口噤體熱。以青竹茹三兩。醋一碗。煎取三分之一。溫分數服。（衛生總微）

天南星去皮臍。研爲細末。龍腦少許。和勻。在牙根上搽之。卽好。（衛生總微）

蟬蛻十四個。去頭足。全蠍十四個。去頭足。同爲細末。入輕粉少許。和勻。用乳汁調服。
以鹿角粉。大豆。等分研細。乳和塗乳上。與兒吮之。(衛生總徵)

□ 鵝口

【病狀】白屑生滿口舌。如鵝之口。故名。

【病因】由兒在胎中。受母飲食熱毒之氣。蘊於心脾二經。生後遂發於口舌之間。
【治療】治法以清熱瀉脾散爲主。外用棉花蘸水拭口。搽保命散。日敷二三次。白
退自安。倘治之稍遲。必口舌糜爛。吮乳不得。則難痊矣。

一 清熱瀉脾散

山梔(炒) 石膏(煨) 黃連(薑炒) 生地 黃芩 赤苓
右以燈心爲引。水煎服。

二 保命散

白礬(燒灰) 硃砂各二錢半(水飛) 馬牙硝半兩
右各研極細。再同研。每用小許。取白鵝糞。以水攪取汁。調塗舌上頤頰內。未用藥時。先以手指纏新棉

花。揩拭舌上垢。然後用藥敷上。

三 單方

患此者不能吮乳。可用蜜陀僧末。醋調塗足心。瘡愈。洗去。（黎居士簡易方）

枯礬一錢。硃砂二分爲末。每以少許敷之。日三次。神驗。（普濟方）

朴硝。兒茶各二分。礬砂一分。研細。蠟搗自然汁調搽。（小品方）

撮口

【病狀】嬰兒啼聲不出。哺乳艱難。七日之內尤甚。舌強唇青。面色黃赤。其症爲危候。急當隨症治之。

【病因】嬰兒胎氣挾熱。亦因母有邪熱傳染。或生下洗浴當風。襁褓失度。

【治療】如氣高痰盛者。辰砂殭蠶散主之。二便秘結者。紫霜丸主之。身熱多驚者。龍胆湯主之。手足抽搐者。撮風散或急風散主之。若更口吐白沫。四肢厥冷。雖有神丹。終屬難濟。

一 辰砂殭蠶散

辰砂五分(水飛) 疆蠶一錢(選直身者去絲嘴炒) 蛇蛻皮一錢(炒) 麝香五分
右爲極細末。取小許。用蜜調敷唇口。

一 紫霜丸

代赭石一兩(火煨醋浸三五次研) 赤石脂一兩 杏仁六十粒(炒去皮尖) 巴豆三十粒(去油膜)

右爲末。飯糊爲丸。如麻子大。日服三丸。白水下。

三 龍胆湯

龍胆草 鉤藤 柴胡(去蘆) 黃芩(炒) 桔梗(去蘆炒) 赤芍藥(炒) 茯苓(去皮) 甘草
(炙)各五錢 蟻螂二枚(去翅足炙) 大黃一分(紙裏煨)

右研合爲極細末。用棗去核煎。食前調服一錢。

四 撮風散

赤足蜈蚣半條(炙) 鉤藤二錢半 硃砂 眞疆蠶(焙) 全蠍梢各一錢 麝香少許
右爲末。每服小許。取竹瀝調下。竹瀝解熱極妙。

五 急風散

蛇蛻皮(微炒) 鈎藤 乾蠟梢各一分搗末 硃砂一分(細研水飛) 上麝香 真牛黃各半錢
并研極細

右合拌勻。再研至無聲爲度。每服少許。取竹瀝一兩點同乳汁調下。

六 單方

初生豆芽研爛絞汁。和乳灌少許。(普濟方)

生甘草一分細剉。水一盞。煎至六分。去渣。放溫。分數次灌兒口中。令吐出痰涎穢物。後取豬乳汁點兒口中。(普濟方)

真牛黃少許。研細。淡竹瀝調一字。灌之。次以豬乳滴口中。(普濟方)

食鹽搗細。貼臍上炙之。(子母祕錄)

蛇蛻燒灰。拭淨傅之。(千金方)

□ 臍風

【病狀】將作時則腹脹臍腫。日夜啼叫。已成者當視其兼症。風兼實則肚腹脹硬。

大便不通。風兼虛則面青肢冷。二便不實。風兼痰則痰涎壅盛。氣高喘急。風兼熱則身體壯熱。面赤口乾。風兼寒則曲腰多啼。面青嘔吐。風兼驚則撮口唇青。抽搐不止。若臍邊青黑。口噤不開者。是爲內抽。治亦無益矣。

【病因】臍者小兒之根帶也。名曰神闕。穴近三陰。喜溫惡涼。喜乾惡濕。如斷臍悉依前法。臍風何自而起。惟不知慎重。以致水濕風冷之氣入於臍中。則咎由自取矣。

【治療】將作時急以驅風散治之。風兼實則用黑白散治之。風兼虛則用理中湯治之。風兼痰則用辰砂殭蠶散治之。風兼熱則用龍膽湯治之。風兼寒則用益脾散主之。風兼驚則用撮風散主之。

一 驅風散

蘇葉 防風 陳皮 厚朴(姜炒) 枳殼(麸炒) 木香(煨) 殭蠶(炒) 鈎藤鈎 生甘草
右各等分。生薑爲引。水煎服。

二 黑白散

黑牽牛(米生半炒) 白牽牛(米生半炒) 大黃(生用) 陳皮(去白) 檳榔各半兩 甘草三

錢(炙) 元明粉二錢

右除檳榔不過火外。餘五味。或曬或焙。仍合檳榔爲末。同元明粉。入乳鉢中。再杵勻。每服半錢至一錢。溫蜜湯調化。空心投服。

三 理中湯

人參五分 白朮一錢(土炒) 乾薑三分 炙甘草三分

右用紅棗肉爲引。水煎服。

四 辰砂殭蠶散

辰砂五分(水飛) 殭蠶一錢(選直身者去絲嘴炒) 蛇蛻皮一錢(炒) 麝香五分

右爲極細末。每服半錢至一錢。

五 龍胆湯

龍胆草 鉤藤 柴胡(去蘆) 黃芩(炒) 桔梗(去蘆炒) 赤芍藥(炒) 茯苓(去皮) 炙甘

草各五錢 蜈蚣二枚(去足翅炙) 大黃一分(紙裹煨)

右研合爲極細末。用棗去核煎。食前調服一錢。

六 益脾散

白茯苓 人參 草果(煨) 木香(濕紙裏煨) 甘草 陳皮 厚朴(姜製) 紫蘇子(炒)

右各分爲末。每服一錢。薑棗水煎。

七 撮風散

赤足蜈蚣半條(炙) 鈎藤二錢半 硃砂 真殭蠶(焙) 全蠍梢各一錢 麝香少許

右爲末。每服少許。竹瀝調下。

八 單方

艾葉燒灰填臍中。以帛縛定。效甚。(保嬰金鏡錄)

小兒臍風 腫久不瘥者。蜂房燒末傅之。(保幼大全)

小兒臍爛成風。杏仁去皮研敷。(育嬰家祕)

臍風將死。以蒜安臍。以熟艾炙蒜上。至口中有蒜氣方止。仍以蒜汁滴鼻中。(全幼心鑑)

艾燒灰厚敷臍上。綢絹裹之。(保嬰金鏡錄)

□ 臍濕

【病狀】嬰兒臍中腫濕。經久不癒。若至百日卽危。

【病因】兒生洗浴。不可久在水中。任意洗滌。既包裹畢。宜時常留意。勿令尿濕浸臍。如不知慎。遂得此病。

【治療】宜用滲臍散或胡粉散治之。

一 滲臍散

枯礬 龍骨各二錢(煨) 麝香少許

右研細末。乾撒臍中。

二 胡粉散

胡粉 乾薑(燒灰) 白石脂(燒存性)

右各等分。研極細。再同研勻。用藥小許。敷臍中。時時用。

三 單方

車前子炒焦。爲細末敷。(至寶方)

臍間出水。附子二錢。甘遂錢半。蛇床子一錢。麝香五厘。各研細末。和勻填臍中。外加膏藥封之。（聖惠方）

□ 臍瘡

【病狀】臍中焮赤成瘡。腫爛。

【病因】此因浴兒水入臍中。或尿濕襁袍致臍中受濕。腫爛成瘡。一旦解脫爲風邪所襲。入於經絡。則成風痲。若久不愈。則兒發搐矣。

【治療】焮赤成瘡者。用金黃散或異功散敷之。

一 金黃散

川黃連二錢半 胡粉 龍骨（煨）各一錢

右各另研。復合研爲細末。各用少許傅臍中。時時用。

二 異功散

龍骨（煨） 輕粉各半錢 黃連一錢半（去鬚）

右爲極細末。每用少許。乾摻臍。時時用。

臍突

【病狀】小兒初生旬日外。臍忽光浮如吹。捻動微響。間或驚悸作啼。

【病因】一因初生洗浴。繫臍不緊。穢水浸入於內。一因初生之兒。熱在胸腹。頻頻呻吟。睡臥不寧。努張其氣。衝入臍間。

【治療】內服犀角消毒飲。外敷外消散。

一 犀角消毒飲

牛蒡子(炒研) 生甘草 荊芥 防風 金銀花

右等分水煎。臨服入犀角細末少許。調勻服。

二 外消散

大黃 牡蠣各半兩 朴梢二錢

右前二味。剉焙爲末。仍入朴梢。乳鉢內同杵勻。抄一錢或二錢。取田螺洗淨。再以水半碗。浸過一宿。去螺。用水調塗腫處。卽消。

三 單方

小兒臍突囊腫。大黃。牡蠣各五錢。朴硝二錢。研末。每一二錢。以田螺一枚。洗淨。浸一宿。取水調塗。（蘭氏經驗方）

兒臍突出。原斷臍帶。并艾葉同燒灰。油胭脂調搽。（證治準繩）

胎驚

【病狀】小兒生下卽病。其狀月內壯熱。翻眼握拳。噤口咬牙。身腰強直。涎潮嘔吐。搐掣驚啼。腮縮顙開。或兩頰絳赤。或面青眼合。此乃胎驚風證也。

【病因】妊婦調攝乖常。飲酒嗜慾。忿怒驚撲。母有所觸。胎必感之。或外挾風邪。有傷於胎。故兒生下卽病。

【治療】視其眉間氣色。赤而鮮碧者可治。若黯青黑者不救。治法先宜解散風邪。利驚化痰調氣。當服青金丸。甚者以硃銀丸利之。若面青拳搐。用鈎藤飲。大抵小兒腑臟脆弱。不可輒用銀粉鎮墜之劑。如遇此症。急取豬乳。細研牛黃麝香各少許。調抹入口中。仍服導赤散（方見不小便條）卽愈。

一 青金丸

人參(去蘆) 天麻(煨) 茯神(去皮木) 白附子(炮) 牛膽南星(炒)各二錢 炙甘草一錢
 半 青黛一錢

右爲極細末。煉白蜜丸如梧桐子大。用鈎藤。皂莢子化湯研化。不拘時服。

二 硃銀丸

水銀一錢(蒸棗研如泥) 白附子一錢半 全蠟 南星 硃砂各一錢 天漿子 蘆香 牛黃
 各半兩鉛霜半錢(和水錄煨研) 龍腦少許 麝香少許 眞殭蠶七個(炒)

右爲末。煉蜜丸桐子大。薄荷湯化下。

三 鈎藤飲

人參 全蠟(去毒) 羚羊角 天麻 炙甘草 鈎藤鈎
 右等分。水煎服。

胎癇

【病狀】此病一名天釣。發時驚悸壯熱。眼目上翻。手足痠痲。爪甲色青。症似驚風。

但目多仰視。較驚風稍異耳。

【病因】胎中受驚。兼以邪熱痰涎。壅塞胸中。不能宣通而成。

【治療】痰盛兼搐者。九龍控涎散主之。驚盛兼風者。牛黃散主之。搐盛多熱者。鈎藤飲主之。爪甲皆青者。蘇合香丸主之。

一 九龍控涎散

赤脚蜈蚣一條(酒塗炙乾) 滴乳香 天竺黃各二錢(同研勻) 臘茶 雄黃 炙甘草各二錢
荆芥穗(炒) 白礬(枯)各一錢 菴豆百粒(半生半熟)
右爲末。每服五分。人參薄荷湯調下。

二 牛黃散

牛黃一錢(細研) 硃砂一錢(水飛細研) 麝香五分 天竺黃二錢 蠟梢一錢 鈎藤鈎二錢
右研勻。每服少許。新汲水調下。

三 鈎藤飲

人參 全蠟(去毒) 羚羊角 天麻 炙甘草 鈎藤鈎
右等分。水煎服。

四 蘇合香丸

蘇合香油五錢（入安息香內） 安息香一兩另爲末用無灰酒半斤熬膏 丁香 青木香 白檀

香 沉香 藁茛 香附子 訶子（煨取肉） 烏犀（鎊） 硃砂（水飛）各一兩 薰陸香 片腦

（研）各五錢 麝香七錢半

右爲細末。入安息香膏。煉蜜和劑。圓如芡實大。空心用沸湯化下。酒下亦可。

胎風

【病狀】此病極其複雜。患者之身有如湯火潑傷者。有身無皮膚而不嫩赤者。有身無皮膚而嫩赤發熱者。有更以腦額生瘡者。脚上生瘡者。未滿月而撮口握拳。腰軟如隨者。眉紅者。多不治。

【病因】如湯火潑傷者。則因乳母過食膏粱。無皮而不熱赤者。由產母脾氣不足。嫩赤發熱者。由產母胃中火盛。

【治療】如湯火潑傷者。其母宜服清胃散及逍遙散以清其血。兒亦飲數滴可也。無皮而不嫩赤者。用粳米粉傅之。嫩赤者。用石膏粉傅之。

一 清胃散

生地黃 當歸 川黃連 升麻 牡丹皮
水服煎。

二 逍遙散

芍藥(酒炒) 當歸 白朮(炒) 茯苓 甘草(炙) 柴胡各二錢
右方用水煎服。

胎熱

【病狀】小兒降生之後。旬日之間。即多虛痰。氣急喘滿。眼閉目赤。目胞浮腫。神困呵欠。呢呢作聲。遍體壯熱。小便赤色。大便不通。時復驚煩。

【病因】此因胎中受熱。或誤服溫劑。致令熱蓄於內。薰蒸胎氣。故有此證。若經久不治。則鵝口。重舌。丹瘤。自此而生矣。

【治療】宜先用木通散。煎與母服。使入於乳。令兒飲之。通心氣。解煩熱。然後以四聖散。溫洗兩日。日開。進地黃膏。乳母忌辛辣酒麵。

一 木通散

木通 地篇蓄各半兩 大黃 甘草 赤茯苓各三錢 瞿麥 滑石 山梔子 車前子 黃芩 各二錢半

右水一鍾。燈心三莖。或入薄荷同煎。

二 四聖散

燈心 黃連 秦皮 木賊 棗子各半兩
右水一鍾煎。澄清去渣。隨時起。洗兩目自開。

三 地黃膏

山梔仁 菘豆粉各一兩半

右爲末。用生地黃爛杵一兩半。和好蜜一兩半。以薄瓦器盛在銅銚中。煮成膏。如稀糊相似。候冷。停分。入前藥末。同在乳鉢內。再研勻。芡實大。每以半丸。麥門冬湯化服。

四 單方

初生小兒五七日有熱證。黑豆二錢。甘草一錢。入燈心七寸。淡竹葉一片。小煎。(全幼心鑑)

胎寒

【病狀】嬰兒初生百日內。覺口冷腹痛。身起寒粟。時發時慄。曲足握拳。晝夜啼哭不已。或口噤不開。或覘乳瀉白。若不早治。必成慢驚。

【病因】此證在胎時。母因腹痛而致產。亦有孕婦喜啖甘肥生冷時果。或胎前外感風寒暑濕。治以涼藥。內傷胎氣。

【治療】患此者先宜服當歸飲。合和水煨薑煎服。使之微泄。泄行。進勻氣散調補。泄止氣勻。神安痛定。手足舒伸。次用參苓白朮散以養胃氣。芍藥湯去其寒濕。乳母宜節生冷飲食。庶易瘥也。又有手足稍冷。唇面微青。額上汗出。不顧乳食。至夜多啼。頗似前證。但無口冷寒戰。名曰藏寒。其病夜重日輕。腹痛腸鳴。泄瀉清水。間有不泄者。此證在百日內有之。皆因臨產坐地稍久。冷氣侵逼。或以涼水洗兒。或斷臍帶短。而又結縛不緊。爲寒風所傷如此。宜以芍藥湯加鹽炒茴香。茱萸。水薑煎服。並乳母同服。

一 當歸飲

何首烏(製) 白蘚皮 白蒺藜 甘草 當歸 生地黃 白芍藥 人參 黃耆 川芎
右方用水煎服。

二 勻氣散

陳皮 桔梗各一錢 炮薑 砂仁 炙甘草各五分 木香三分
右共爲細末。每服五分。紅棗煎湯同服。

三 參苓白朮散

人參五分 苡米二錢 白朮 茯苓 扁豆各一錢 桔梗八分 砂仁 甘草各三分 蓮心五粒
大棗三枚

右方用水煎服。

四 芍藥湯

芍藥二兩 當歸 黃連各五錢 檳榔 木香 甘草各三錢 肉桂一錢半 黃芩五錢
每服半兩。水煎服。

五 單方

腹痛汗出。用衣巾白魚二七枚。絹包。於兒腹上回轉摩之。以愈爲度。（聖惠方）
當歸爲末。每用一小豆許。乳汁調下。日二夜一。兒大添之。（衛生隱微）

柏子仁爲末。每服一錢半。溫水調下。

棗梨葉濃汁七合。可三四度飲之。（千金方）

白礬煨半日。研末。棗肉丸黍米大。每乳下一丸。愈乃止。

胎黃

【病狀】小兒生下。遍體面目皆黃。狀如金色。身上壯熱。大便不通。小便黃如梔汁。乳食不思。啼哭不止。

【病因】多因乳母受熱濕而傳於胎。有生下百日。及半週。不因病後身微黃者。胃熱也。若自生而身黃者。胎疸也。若淡黃兼白者。胃怯也。

【治療】乳母受熱濕而傳於胎者。母子皆宜服地黃湯。及地黃飲子。胃熱及胎疸。宜服犀角散。胃怯者。宜服白朮散。

一 地黃湯

生地黃 赤芍藥 天花粉 赤茯苓(去皮) 川芎 當歸(去蘆) 猪苓 澤瀉 甘草 茵陳
 各等分

右剉散。用水煎。食前服。

二 地黃飲子

生地黃 赤芍藥各二錢 羌活(去蘆) 當歸(去蘆) 甘草各一錢
 右爲極細末。用燈心煎湯。食前服。

三 犀角散

犀角 茵陳 括蕒根 升麻(煨) 甘草 龍膽草 生地黃 寒水石(煨)等分
 右咬咀。用水煎。不拘時候服。

四 白朮散

人參 白朮 茯苓 甘草各二錢 藿香半兩 葛根一兩 木香二錢半
 右爲末。每服二錢。白湯調下。

胎赤

【病狀】小兒生下。頭面肢體。赤若丹塗。故名胎赤。

【病因】此因孕婦過食辛熱之物。以致毒熱凝結。蘊於胎中。小兒受之。

【治療】宜服清熱解毒湯。熱盛便秘者。化毒湯治之。乳母則服清涼飲子三大劑。乳兒可外用二金散。

一 清熱解毒湯

生地 黃連 金銀花 薄荷葉 連翹(去心) 赤芍 木通 甘草(生)
右以燈心爲引。水煎服。

二 化毒湯

犀角 黃連 桔梗 元參 薄荷葉 生甘草 生大黃各一兩 青黛五錢
右爲細末。煉白蜜爲丸。重六分。每服一丸。燈心湯化服。

三 二金散

黃連(去鬚) 黃柏各一錢

右搗爲粗末。以乳汁浸一宿。焙乾。每用少許。以新綿裹。用荊芥湯。浸放溫熱。時時洗之。

□ 內鈞

【病狀】糞青潮搐。偃僵而啼。口吐涎沫。症雖與驚癇相類。但目有紅絲血點。

【病因】此因肝臟素弱。外受寒冷所致。

【治療】瘈瘲甚者。鈞藤飲主之。急啼腹痛者。木香丸主之。若肢冷甲青。唇口黑者。養臟散主之。然內鈞至此。乃中寒陰盛不治之症。用此救治。容或保全耳。

一 木香丸

沒藥 煨木香 茴香(炒) 鈞藤鈎 全蠟 乳香

右各等分。先將乳香沒藥研勻。後入諸藥末。和畢。取大蒜少許。研細。和丸如桐子大。曬乾。每次二丸。鈞藤湯下。

二 養臟散

當歸 沉香 煨木香 肉桂 川芎各半兩 丁香二錢

右爲末。每服一錢。薑湯調服。

□ 覘乳

【病狀】熱嘔則面色多赤。二便微祕。手足指熱。寒嘔則面色青白。糞清多沫。手足指冷。因傷乳而嘔則口熱唇乾。夜臥不寧。手足心熱。因停痰而嘔則胸膈膨脹。嘔吐痰涎。若喫乳過多。滿而自溢者。不須服藥。惟節乳則嘔自止矣。

【病因】小兒嘔乳。證非一端。有宿乳停痰。胃寒胃熱之分。

【治療】熱嘔則用和中清熱飲治之。寒嘔則用溫中止吐湯治之。傷乳則用平胃散治之。停痰則用枳桔二陳湯治之。

一 和中清熱飲

黃連(薑炒) 半夏(薑製) 陳皮 茯苓 藿香 砂仁
右用生薑爲引。水煎服。

二 溫中止吐湯

白豆蔻(研) 茯苓 半夏(薑製)
右水煎。沖磨沉香汁服。

三 平胃散

蒼朮(炒) 陳皮 厚朴(薑炒)各一錢 甘草(炙)三分

右用生薑爲引。水煎服。

四 枳桔二陳湯

枳殼(麩炒) 桔梗 陳皮 半夏(薑製) 茯苓 甘草(炙)

右用生薑爲引。水服煎。

□ 夜啼

【病狀】因脾寒而啼者。面色青白。手腹俱冷。不欲吮乳。曲腰不伸。因心熱者。面赤

唇紅。身腹俱熱。小便不利。

【病因】小兒初生夜啼。其因有二。一曰脾寒。一曰心熱。

【治療】因脾寒者。鈎藤飲治之。因心熱者。導赤散治之。若非以上形證。但夜啼者。

用蟬花散最當。

一 鈎藤飲

川芎 白當歸 茯神 白芍(炒) 茯苓 甘草 木香(煨) 鈎藤鈎

右用紅棗爲引。水煎服。

二 導赤散

生地黃 木通 生甘草

右各等分。以燈心竹葉爲引。水煎服。

三 蟬花散

蟬蛻不拘多少 用下半截

右研細末。每服少許。薄荷煎湯調下。

赤游風

【病狀】小兒皮膚赤熱而腫。色若塗丹。游走不定。行於遍身。故曰赤遊風。多發於頭面四肢之間。若內歸心腹則死。不可不慎也。

【病因】多由胎中熱毒而成。或生後過於溫熱。煖毒蒸發於外而生此病。

【治療】當服犀角解毒飲。如不愈。繼以藍葉散。外用砭法。刺出毒血。毒甚者。敷以神功散。小兒在百日內者。忌砭血。以其肌肉難任也。須用豬肉切片貼赤

腫處。或以赤小豆末。雞子清調塗之。甚效。

一 犀角解毒飲

牛蒡子(炒) 犀角 荊芥穗 防風 連翹(去心) 金銀花 赤芍藥 生甘草 川黃連 生地黃

右用燈心爲引。水煎服。

二 藍葉散

藍葉五錢 黃芩 犀角屑 川黃連(剉微炒) 柴胡 梔子(生)各二錢 川升麻一錢 石膏一錢 生甘草一錢

右爲細末。每服一錢。水三小杯。煎五分。去渣。兌竹瀝一酒杯。煎兩三沸。放溫。量兒大小用之。氣怯弱者。可去大黃。

三 神功散

黃蘗(炒) 草烏(生)

右各爲末。等分。用水調敷。頻頻以水潤之。

四 砭法血

用口吮毒血。各聚一處。用細磁器擊碎。取鋒銳者。將筋頭劈開夾住。用線縛定。兩指輕撮筋梢。令磁銳對聚血處。再用筋一根。頻擊。刺出毒血。砭後。毒甚者。以神功散敷之。毒輕者。砭後不宜用。恐皮膚既破。草烏能作痛也。如患在頭者。不可砭。祇宜臥鍼。倒挑患處。出毒血即愈。

□ 初生無皮

【病狀】生下無皮。或上半身赤爛。或下半身赤爛。甚至色帶紫黑者。此梅毒有以致之也。遍體浸漬。紅嫩而光者。因月分未足也。

【病因】一因父母素有楊梅結毒。傳染胞中。一因月分未足。生育太早。

【治療】二證俱屬惡症。遺毒者。內服換肌消毒散。外用清涼膏。或鵝黃散敷之。胎元不足者。內服當歸飲。外用稻米粉撲之。

一 換肌消毒散

當歸 生地黃 赤芍藥 川芎 皂刺 土茯苓 金銀花 連翹(去心) 甘草(生) 白芷
苦參 白蘚皮 防風

右等分。用燈心爲引。水煎服。

二 清涼膏

石灰四兩（未經水濕成塊者）

右用水泡之。沒指半許露一宿。面上有浮起如雲片者。輕輕取之。微帶清水。視其多少。兌小磨香油。亦如之。以順攪成膏爲度。用雞翎搽之。自愈。

三 當歸飲

何首烏（製） 白蘚皮 白蒺藜 甘草 當歸 生地黃 白芍藥 人參 黃耆 川芎
右方用水煎服。

四 鵝黃散

黃蘗（生） 石膏（煨）各等分
右共研細末。撲之。濕則乾撲。乾則用猪胆調搽。

五 稻米粉撲法

早稻白米作粉。時時撲之。其皮漸生。神效。

六 單方

初生無皮。色赤。但有紅筋。乃受胎未足也。掘土坑臥之。卽長皮。（聖濟總錄）

伏龍肝。雞子清調塗。（二因方）

□ 變蒸

【病狀】其變蒸時。亦有發熱等症。與病無異。

【病因】小兒生後。有變蒸之一症。大約三十二日爲一期。

【治療】只須治以發熱諸藥。切勿妄投礮石猛烈。冰麝香竄。牛黃苦寒諸丸藥。以暗耗其生長之氣。

二 哺乳期

哺乳通論

嬰兒之在哺乳期中。不特要調攝得宜。更須謹慎驚風。疹痘等險症。至六十日。則瞳子成。能笑認人。切忌生人懷抱。勿使見非常異物。恐防驚嚇。百日則任脉成。自能反覆。一百八十日則尻骨成。母可令兒學坐。二百四十日則掌骨成。母當扶教。

其匍匐。三百日則髓骨成。母當扶兒立。三百六十日則膝骨成。母當扶教兒行。此皆養育嬰孩一定之法也。若日捧懷抱。重襲棉裘。致令筋骨緩弱。稍有失護。病疾卽生。此乃保嬰大過之處也。更凡戲謔之物。不可恣樂。刀劍凶具。無使摸捉。莫近猿猴。近則傷意。莫抱鵬雀。抱恐傷目。扶坐勿久。久令腰折。行莫令早。筋骨軟弱。甘肥生冷。勿令過食。睡莫當風。坐莫近水。笑極與和。哭極與喜。哭後切勿與乳。心經有病。忌食鹽鹵。肺經有病。忌食焦苦。肝經有病。忌食辛辣。脾經有病。忌食酸味。腎經有病。忌食甘甜。五味飢飽。勿令太過。過甜成疳。過飽傷氣。過酸傷志。過冷成積。過苦耗神。過鹹閉氣。過辛傷肺。過肥益痰。淡薄滋味。反能脾強胃充。百脉得潤。臟腑氣清。血實色華。則病魔亦無從而進擾矣。

A 驚癇病治療法

急驚風——慢驚風——驚啼——痾——偏風口噤——中風

□ 急驚風

【病狀】急驚之候。亦曰真搐。牙關緊急。壯熱涎潮。竄視反張。搐搦顛動。唇口眉睫。

眨引頻併。口中氣熱。面赤唇紅。大小便黃赤。則脉浮數洪緊。蓋由血亂氣併。痰涎壅盛。百脉凝滯。關竅不通。風氣蕃盛。無所發泄。故暴烈也。又有搐搦反將斜視。而牙關不緊。口無痰涎而氣熱。未可直指爲驚風。恐是傷風傷寒。夾食。夾驚。疹痘將發等症。

【病因】此因臟腑虛兼痰而得之。蓋虛能發熱。熱則生風。肝風痰火。互相交爭。遂成急驚。

【治療】急驚病勢迅急。如關竅不通。宜卽用通關散。後用參蘇散。或防風散。

一 通關散

南星(炮) 礞石(炮)各一錢 麝香少許 猪芽皂二定 赤脚蜈蚣各一條
右爲末。以手點薑汁。麝藥少許。擦牙關。

二 參蘇散

人參(去蘆) 紫蘇(加梗) 前胡(去蘆) 乾葛 半夏 赤茯苓(去皮)各七錢半 枳殼 陳皮(去白) 桔梗(剉炒) 甘草各五分

右剉。每服二錢。水一鍾。薑二片。煎七分。隨時溫服。

三 防風湯

防風 羌活 枳實各半兩 川芎 甘草(炙) 大黃(煨)各二錢半

右剉末。每服二錢。薑棗煎。此爲急驚輕下法。

四 單方

遠年白田螺殼燒灰。入麝香少許。水調灌之。

石綠四兩。輕粉一錢爲末。薄荷湯入酒調一字服。取吐。(全嬰方)

鐵粉一錢。硃砂一錢爲末。每服一字。薄荷湯調下。(本草綱目)

【經驗】急驚宜先用治標之法。但痰火稍退。卽當調補氣血。如四物湯等皆可投服。若過用寒涼。防成慢驚。慎之。此症余以其病勢迅急。故曾製急驚散廣送。茲將其方列後。

一 四物湯

當歸 熟地各三錢 川芎一錢五分 白芍(酒炒)二錢

右四味水煎服。

二 小兒急驚七釐散

全蠍二錢 殭蠶二錢 硃砂三錢 牛黃一分 梅片五釐 川連(酒炒)二分 胆星二分 甘草二分 天麻四分

右共爲細末。每服七釐。用薄荷湯沖服。立愈。

慢驚風

【病狀】慢驚之候。或吐或瀉。涎鳴微喘。眼開神緩。睡則露睛。驚跳搐搦。乍發乍靜。或身熱。或身冷。或四肢熱。或口鼻冷。面色淡白淡青。眉唇間或青黯。其脉沉遲散緩。若現身冷黏汗。直臥如尸。喘嗽頭軟。背直口噤。搖頭唇縮。氣粗痰湧。則爲不治。

【病因】此症多由大病後。或吐瀉。或祇吐不瀉。變成脾胃虛損而然。

【治療】治宜溫補脾胃。尤當注重中州。如理中湯。聚寶丹。湯氏方皆可服。

一 理中湯

人參五分 白朮一錢 甘草 乾薑各三分

右方用水煎服。

一 聚寶丹

人參 茯苓 琥珀 天麻 蠶蠶 全蠍(炙) 防風 牛胆南星 白附子(生用) 烏蛇肉

(酒浸焙)各一錢 硃砂半錢 麝香少許

右爲末。煉蜜丸桐子大。每服二丸。菖蒲湯下。

三 湯氏方

真川烏一枚(去皮生用) 全蠍等分

右剉末。分二服。水二盞。薑十片。煎半盞。徐徐滴入口中。

四 單方

烏藥磨水灌之。(濟急方)

蚤休末一錢。括蕪根末一錢。同於慢火上炒焦黃研勻。每服一字。煎麝香薄荷調下。(小兒直訣)

【經驗】慢驚一症泄瀉者。余常用做胃關煎治之多愈。

仿胃關煎

熟地五錢 淮藥(炒)二錢 白扁豆(炒)一錢半 乾薑一錢 炙草一錢 雲苓一錢 炙閩黨二錢 烏梅一個
右方水煎服。

□ 驚啼

【病狀】小兒驚啼。其症狀多在寐時慌惕。或振物不安。或忽啼叫。

【病因】小兒驚啼一證。與急慢二驚不同。與大嚇卒恐更異。蓋驚啼者。小兒肝氣未足。胆氣最怯。凡耳聞驟聲。目視驟色。皆能怖其神魂。醒時受怖。寐時則有驚啼之症矣。

【治療】此症總宜安神養氣。茯神湯主之。若有煩熱者。保赤散主之。

一 茯神湯

生黨二錢 炙耆錢半 熟地五錢 棗仁(炒)八分 白芍八分 茯神三錢 桂心三分 柏子仁(炒)七分 甘草五分 五味五枚

右方用金銀同煎。分數次灌服。

二 保赤散

真牛黃三釐 川連五釐 硃砂三釐 青黛五釐 上冰片三釐 珍珠三釐 生軍三分 赤金五分 人中白三釐 百草霜五分 蟬退七只（用銀挖插入 香油燈上燒焦）
右共研細末。同鈎藤薄荷各五分。煎湯調服。

【經驗】啼而多淚。時哭時止。始係驚啼。若無淚聲長。不安。憂憂戚戚者。則恐是腹痛。宜細辨之。

疳

【病狀】疳有風疳。驚疳。食疳之分。風疳則目青面紅。發搐。驚疳則忽然叫聲發搐。食疳則嘔吐酸氣。卽發搐。或大便酸臭。

【病因】風疳則因將養失度。血氣不和。或厚衣汗出。腠理開舒。風邪因而入之而成。驚疳則因血氣盛實。臟腑生熱。或驚悸大啼。精神傷動。外邪所入爲之。食疳則其先不哺乳。吐而變熱後發。

【治療】風癇宜用獨活湯或牛黃丸。驚癇宜用蛇黃丸或鎮驚丸。食癇則宜用妙聖丹治之。

一 獨活湯

獨活 麻黃(去節) 川芎各一錢 大黃 甘草(炒)各半錢
右剉碎。每服二錢。用水一鍾。生薑二片。煎至四分。不拘時。溫服。

二 牛黃丸

牛胆南星 全蠟(焙去毒) 蟬殼各二錢半 防風 牛黃 白附子(生) 僵蠶(炒去絲嘴)
天麻各一錢半 麝香半錢
右爲末。煮棗去皮核。取肉。和水銀半錢。研極細。次入藥末。和丸如菉豆大。每服三五丸。用荊芥生薑煎湯送下。不拘時服。

三 蛇黃丸

真蛇黃三個(火煨醋淬) 鬱金七分(一處爲末) 麝香(另入一匙)
右爲末。飯丸桐子大。每服一二丸。煎金銀磨刀水化下。

四 鎮驚丸

茯神(去木) 鐵粉 遠志(去心薑製焙) 紫石英(燒醋淬研) 人參(去蘆) 琥珀 滑石
蛇黃(煨醋淬) 南星(炮各二錢半) 龍齒 熊胆各半分 輕粉三分

右爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。硃砂爲衣。每服三五丸。煎金銀湯磨化下。不拘時服。

五 妙聖丹

赭石錢半(醋淬) 巴豆霜三分 硃砂 雄黃 全蝎梢各一錢
右爲末。棗肉爲丸。如桐子大。每服一二丸。用木賊一錢煎湯送下。

口 偏風口噤

【病狀】筋脉偏急。口不能言。目緊上視。寒熱往來。小便淋漓。面色青白。兩脇脹痛。或則唇口歪斜。半身不遂。腹痛少食。目胞肥腫。面色青黃。肢體倦怠。

【病因】小兒偏風者。屬少陽厥陰肝膽二經。噤者。筋急。由風木太甚而乘於脾。以勝水濕。則筋太燥。然燥筋金主於收斂勁切故也。

【治療】口眼喎斜。言語不正。手足偏廢不舉者。用全蠍散治之。水穀不化。泄瀉注

下。及腸胃濕毒。下如豆汁。或瘀血日夜無度者。用胃風湯治之。風痰壅滿。風傷於氣不能言語者。用寬氣散主之。

一 全蠍散

全蠍(去毒炒) 蠶蠶(直者炒) 川芎 黃芩(去心) 甘草 桂枝 赤芍藥 麻黃(去節)各一兩 天麻六錢 天南星五錢(湯泡七次去皮臍切焙乾)
右爲粗末。每服三錢。水一鍾半。薑七片。煎七分。溫服無時。量大小與之。一日三四服。忌羊肉。

二 胃風湯

人參 白茯苓 芎藭 肉桂 當歸 白芍藥 白朮
右爲散。每服二錢。入粟米數粒同煎。食前服。

三 寬氣散

枳殼一兩(去瓢) 人參五錢(去蘆) 天麻 蠶蠶(炒去絲嘴) 羌活 甘草(炙)各三錢
右剉碎。每服二錢。用水一盞。生薑三片。煎五分。不拘時服。

□ 中風

【病狀】昏不知人。壯熱狂燥。搐掣氣粗。口噤涎潮。

【病因】小兒中風者。以其血氣未定。寒溫失調。內則盛熱蘊蓄。外則腠理開虛。故風邪乘其外虛而暴中之。

【治療】小兒之驟病。莫有急於中風者。倉卒之際。若未知精審。且與下氣豁痰。蓋中風多因痰鬱氣滯而作。先用通關散以疏之。急以南星。生薑。木香煎湯。調蘇合香丸灌下。牙緊者。南星。細辛末。入麝香。烏梅肉點擦。牙自開。進藥之後。痰消氣下。病勢稍蘇。乃用省風湯或羌活散治之。勢甚者。防風通聖散。化風丹。可選而用之。

一 通關散

南星(炮) 殭蠶(炮)各一錢 麝香少許 豬牙皂角二定 赤脚蜈蚣(炙)一條
右爲末。以手點薑汁。蘸藥少許。擦牙。

二 蘇合香丸

丁香 青木香 白檀香 沉香 藁朮 香附 訶子(煨取肉) 烏犀(屑鎊) 硃砂(研水飛)

各一兩 薰陸香 片腦(俱另研)各五錢 麝香七錢半 蘇合香油五錢(入安息香膏內) 安息香一兩(另爲末 用無灰酒半斤煎膏)

右爲細末。用安息香膏。入煉蜜和劑。圓如芡實大。空心用沸湯化下。小兒一丸。酒下。

三 省風湯

生南星 防風各四兩 甘草 半夏(湯浸一宿) 黃芩(去粗皮)各二兩

右剉散。每服二錢。生薑一片。去滓溫服。不拘時。

四 羌活散

羌活 川獨活 前胡 柴胡 川芎 白茯苓 桔梗 枳殼 人參 地骨皮 天麻各等分

甘草減半

右剉散。生薑薄荷煎。不拘時服。

五 防風通聖散

防風 川芎 大黃 當歸 薄荷葉 芍藥 麻黃(去根節) 芒硝各半兩 石膏 黃芩 桔梗各一兩 滑石六兩 生甘草二兩 白朮 荊芥 山梔子各二錢半

右剉末。每二錢。薑二片。水一盞。煎七分。不拘時服。

六 化風丹

羌活 獨活 防風 天麻 胆星 人參 川芎 荆芥 粉草 全蠟各等分

右爲末。煉蜜丸如芡實大。薄荷湯調下一二丸。

B 痘疹治療法

天痘——水痘——看痘法——種痘法——麻疹——看麻疹法

□ 天痘

【病狀】痘瘡證候。有順有逆。然不外發熱。出痘。灌漿。回漿。結靨五者。而終之還原。若欲分析言之。則人一見。家一說。殊難臚舉並述也。

【病因】小兒受胎之時。乃母五臟之液所養成形也。其母不知禁戒。縱情厚味。好啖辛酸。或食毒物。其氣傳於胞胎之中。遂發爲瘡疹。然亦屬天行時氣。市廛村落。互相傳染。輕則俱輕。重則俱重。雖有異於衆。亦僅十之一二而已。又豈可概謂爲胎氣哉。

【治療】治法亦種種不一。且言人人各殊。但護咽喉。護眼目諸法。殊爲重要。餘如一切禁忌亦不可不遵守之。茲將各治方列後。

一 安裏解毒防風散

防風一兩 地骨皮 黃芪 芍藥 荊芥 枳殼 鼠粘子各等分
右爲末。水煎四五錢服。若能食而大便實。宜當歸丸微利之。

二 保嬰百補湯

專治痘瘡八九日。漿足之後。別無他證。可以此方調理血氣。滋養脾胃。不拘實熱痘。皆可服之。
當歸 芍藥 地黃 白朮 人參 茯苓 山藥 甘草各等分
右水一鍾。棗二枚。煎六分。溫服。如氣虛。加黃芪二錢。官桂少許。

三 田氏調肝散

生犀二錢半 龍胆草 麻黃(去節) 鉤藤鈎 黃芪 桑白皮(炒黃) 石膏各半錢 大黃
瓜蒌仁(去皮) 甘草(炒)各二錢
右爲粗末。每服三錢。水煎。食後溫服。微利效。

四 透肌湯 (治痘不透)

紫草 白芍藥 升麻 藕粉(炒)各半兩

五 四聖散 治瘡痘出不快 或倒靨

紫草茸 木通 甘草(炙) 枳殼(麩皮炒)

右等分。爲粗末。每服一錢。水一鍾。煎至八分。溫服。

六 加味犀角散 (痘已出不均 心煩壯熱 口舌生瘡)

犀角 牛蒡子 荊芥 甘草 防風 升麻 桔梗 麥門冬

右水煎服。

七 回漿散 (治痘不漿結痂)

何首烏 白芍藥 黃芪 人參 甘草 白朮 白茯苓

右薑水煎服。

八 人參清神湯 (治痘痂不落 昏迷沉睡)

人參 黃芪 當歸 白朮(土炒) 麥門冬 陳皮 酸棗仁 黃連(酒炒) 茯苓各等分

右加棗子糯米水煎服。

□ 水痘

【病狀】此證輕於痘疹。發熱二三日而出。其痘皮薄如水泡。破即易乾。漸紅色白。或淡紅。冷冷有水漿。無何即消。易出易斃。亦有心悶。煩燥發熱。口舌生瘡。大小便澀。外證。夾流黑水。或手足冷。

【病因】水痘與正痘不同。爲發於腑之表證。

【治療】此證不宜燥溫。但用輕劑解之。麥湯散。消毒飲。麥煎散。皆可選用。

一 麥湯散

地骨皮 滑石 甘草各半錢 甜葶藶 麻黃 大黃 知母 羌活 人參各一錢

右剉爲散。水一盞。每服二三錢。小麥七粒。煎六分。不拘時溫服。

一 消毒飲

牛蒡 荆芥 甘草各等分

右方用水煎服。

三 麥煎散

滑石 地骨皮 赤芍藥 石膏 白茯苓 杏仁 知母 甘草 葶藶子(炒) 人參 麻黃一兩半

右爲末。每服一錢。麥子湯煎下。

【經驗】水痘一痘。今小兒患之者。大率無害。如無內證。不必服藥。免致無事生事。前三處方。不爲輕劑。非熱甚不解。二便秘澀。煩悶不寧者。不宜輕服。

□ 看痘法

凡五臟之屬。皆見於面。察其部位。可知吉凶。蓋人之面部。左頰屬肝。右頰屬肺。額上屬心。頰下屬腎。鼻爲脾土。目爲肝竅。鼻孔肺之竅。口爲脾之竅。耳爲腎之竅。舌爲心之苗。若痘未出以前。得面中諸部位處明潤者吉。燥暗者凶。又山根爲命宮。年壽爲疾厄宮。此二宮紅黃光潤者吉。青黑昏暗者凶。又面之正額。爲手足太陽。小腸膀胱二經所合之處。兩耳前後。爲手足少陽。三焦與膽經所過之處。如痘在此部位先現者凶。惟在口角兩旁。人中上下者吉。四肢雖多不致害。心窩手足心

謂之五心痘。如多者必重。至於形乃氣之充。色乃血之華。凡看痘者。形色爲最要。是故形貴尖圓起發。若皮膚硬厚而平塌者。凶也。色貴光明潤澤。根窠不紅活而慘暗昏黑者。凶也。

一 看痘吉症

- 一看口唇舌尖紅活無燥白之色者吉。
- 一看根窠紅活圓潤。地白分明者吉。
- 一看心窩額上稀少者最吉。
- 一看痘頂出來不焦不紫者吉。
- 一看顏色無黑陷。痘頂內暗而黃如蒼臘色。外潤如油色而黃者吉。

一一 看痘凶症

- 一痘未出而聲啞。喉啞者不治。已出五日內如此者不治。
- 一痘未出而先抓破泄氣者不治。
- 一痘無論已出未出。而痰涎壅甚氣急者不治。

一痘無論已出未出。而神昏氣促。踴亂不甯者不治。

一痘無論已出未出。腹痛瀉瀉濃血者不治。

一痘未出而肌肉紫黑。如被杖者不治。

一痘無論已出未出。而水漿米粒不入口。或飲食噎喉者不治。

一眼內黑珠起浮油瑣睛者不治。

一眼中神光不明。色轉綠轉赤者不治。

一閉目昏睡。舌捲囊縮者不治。

一頭溫足冷。悶亂飲水者不治。

一泄瀉不止。藥食不停不化。直下及肛門如竹筒者不治。

一胃熱發黃。身如橘色。不利者不治。

一痘初出青晦焦黑者不治。

一痘密如蠶種。全不起發者不治。

一痘瘡癢塌。寒戰不止者不治。

三 痘之宜忌

- 一 宜家中內外潔淨。
- 一 宜房中清油亮燭。
- 一 宜房內燒紅棗和荊芥燒烟。並能止癢。
- 一 出痘宜着柔軟衣。
- 一 忌痘兒飲冷湯水。
- 一 忌雞犬入房。
- 一 忌葱蒜薤韭氣。
- 一 忌吹滅燈燭氣。
- 一 忌過飽過飢。
- 一 忌溝糞臭氣。
- 一 忌冒罵呼怒。
- 一 忌暈油煙氣。

一畏薰抹瘡藥氣。

一畏柴烟諸毛氣。

一畏牛羊蜡燭氣。

一畏醉酒薰胆氣。

一畏廚內辣椒氣。

一畏吃煙煤烟氣。

種痘法

天花亦名痘瘡。此爲急性之傳染疾患。自古以來。卽有此症。流行最廣。傳延最速。不限區域。不分人類。殆人人具有此病性之素因。故無一人能獲免者。然罹發一次之後。卽具有免疫質。可免再發之虞。此症觸發之後。始現惡寒頭疼。旋見體溫上昇。且達四十度以上之高熱。嘔噁譫語。三四日後。先發紅斑。繼成丘疹。漸爲膿泡。於第九日中體溫再昇。此次之熱。爲完全化膿之期。顏面腫脹甚盛。咽喉嘶啞。嚥下困難。病者在此期中。死者頗多。多至十二日或十三日之後。體溫始降。膿泡

乾燥。結痂而愈。愈後留有疤結之痕。且爲終身之憾矣。自牛痘術發明之後。預防有策。從此無辜之嬰孩。沾惠良不淺鮮焉。

□ 施術

種痘施術之時。醫生坐於室中明亮處。使受痘之小兒。露出上膊。以酒精棉花。細洗拭上膊外側。至無垢爲止。再用無菌棉布抹乾。迺取已消毒之牛痘刀。並痘苗。置於盤中。移放右側。嗣以左手執小兒之上膊。使緊張其皮膚。以右手拇指中指。指三指。執定痘刀。如執鉛筆狀。以小指環抵於上膊面。刀與皮膚作四十五度角。輕輕淺切。切線不可過長。約有一分許。深達皮膚粘膜層。以紅潤爲度。不可使甚出血。如血流過多。則痘漿必被沖去。失其效力。切宜戒之。連切五處。或一手單種。或二手並種。均無不可。每處相離。須在一寸以上。其開切之式。有單線者。十字紋者。星狀式者之別。而對於將來之發痘力。則單線爲弱。十字紋次之。星狀最強。單線痘開狀。宜於人種苗。用牛痘苗。則宜十字形。或星狀形也。

□ 器械

器械中之最強者。爲痘刀與痘盤。痘刀之式甚多。迄今之最通用者。爲柳葉刀。狀如柳葉。而小探漿種痘均可用之。消毒亦便。又有鉞形刀。頭似鉞而薄小。柄用鐵製。長而重。用之切種。不必甚加力。以其重而切開皮膚時。不必加力。皮膚卽開。亦不至過深。運用便利。消毒亦易。此外尙有束針刀。束針刀者。以數針聚作一束。藏之管中。一端有彈機壓。壓之則針鋒出露。不見針形。小兒可免危懼之心。惟以消毒不便。易傳染病毒。致有痘疱潰爛之虞。且痘刀每易生誘。故每用後。宜以酒精棉拭淨血痕。塗油而藏之。痘盤。則以厚玻璃片爲之。一面有凹窩。用以承痘漿用也。

痘苗

有人化痘苗。天然牛痘苗二種。人化痘苗者。係以患痘兒之漿製成者。用此種痘漿。最易爲梅毒丹毒結核等之傳染病。故其爲用。不若天然牛痘之爲優。惟天然牛痘。須用新鮮者。倘存貯已久。則將失其效力。我國官家。無製造痘苗發賣專所。今所用者。惟仰他國之製造品。且遠僻內地。不能遍及。故不得不兼用人化痘苗。

以輔不及。惟採苗時。尤宜十分注意。慎重選擇。以免遺患。故小兒必擇六月以上。體質健全。營養佳良者。及無梅毒。無腺病。無結核。無皮膚病。及未染天痘等之小兒。父母健全。初次種痘。發痘在二顆以上者爲度。其痘疱成熟之後。帶有眞珠色澤。不過大。不破潰。無血液穢暗赤色者爲佳。若色澤不潤。發痘一顆者。不可採用。純牛痘苗。係採之於牛身。其牛痘苗係永遠傳種於犢身。並不移植於人體。故其効力偉大。其採製之時。又最慎重。嚴密消毒。一無遺患。荷蘭國自古卽有製而出售者。近日本梅野氏所製之痘苗。其効力。亦能永種不滅云。

□ 消毒

種痘時小兒之膊。醫師之手。接種之器械。均須清潔以消毒之。否則種後。傳染病卽由此引入。故消毒法。實爲預防後患之要務。消毒水。用五千倍之昇汞。或二十倍至五十倍之石炭酸水。洗滌手掌。再用酒精棉花。抹拭手指。種痘之刀。一人用過之後。至第二人。亦必加以消毒。至要至要。

□ 時令

種痘之時。四季俱可。惟酷暑嚴寒時。宜避之。此時痘漿易於發育。痘漿易於分解。或不發育。繼起險症。最適宜者。爲春秋二季。惟天花流行之時。不論冬夏。不問年齡。凡生後未經種者。或種痘已過三四年者。悉宜種之。

□ 年 齡

小兒初種痘。以生後六月至十月爲最佳。因此時體質最健。抗力最強。知識淺薄。不感苦楚故也。六月以下之兒。種亦無妨。惟切線宜短。顆數應少耳。初種之後。至七歲時。再爲種之。有定十三歲。二十歲。三十歲。各種一次者。迄今尙無定論。

□ 感 應

凡種痘善感應者。種後第一二日。施術部微現外傷之反應。針痕周圍見淡紅小斑。稍腫起。未幾消滅。有時無之。至第三日。針痕部發輕炎。生小紅斑。稍隆起。但經過慢者。至第四五日始見之。至第四日。起赤色小結節。稍硬固。且隆起。卽謂蕾疹。至第五日。結節尖端生小水泡。周圍漸腫起。圍似紅暈。至第六日。水泡增大。變膿泡狀。中央凹陷。周圍隆起。泡中漿液稀薄。透明。稍帶藍色。紅暈亦增大。至第七日。

痘疱已成熟。諸症亦加烈。此成痘疱之形狀。隨種法而異。刺種。則大圓形。單線切種。則花瓣形。既成熟之痘疱。以顯微鏡檢之。則見痘疱內表皮之粘液層。作多數小疱。內含漿液。宛如蜂窠。互相分隔。故採痘漿。須將各小疱個個切開。此時痘漿透明弱黃。放蛋白石光。檢以顯微鏡。則見赤血球纖維素之凝固物外。更含各種有機小體。至第八日。痘疱發育至極。疱液充實。變成真正膿疱。大如豌豆。因皮層緊張。帶眞珠光。中心現褐色。周圍益腫脹。稍感疼痛。紅暈著大。色紅如火。或發高熱。或發輕熱。或全無熱。或倦怠厭食。或見顏面蒼白。或覺腋下疼痛。腋窩線腫起。知覺過敏。小兒頗不安。有時漏少量之蛋白尿。至第九日。紅暈益大。色澤較著。膿疱亦增其容積。有時破開。至第十日。痘疱醱膿。作白濁色。黃色濃液。痘疱發育達極點。中央稍凸起。其形扁圓。有熱者。漸退熱。至第十一日。痘疱形狀。不復變化。自此始收靨。自中心向周圍漸乾燥。變褐色。紅暈亦退。至第十二日。炎症稍散。結痂。黑色堅實痂皮。因皮膚緊張。不能剝落。至第二十一日。始剝痂。遺癍痕。卽痘疱是圓形或橢圓形。其初赤色平滑。久之則白色凹陷。底面網狀不整。終身鮮明。不生。

毛髮。有時略能消失。如再三種痘。其經過輕而速。六七日遂化膿。而只生結節。或形成水泡。不甚化膿。五六日即成熟。至七日已結痂者尤多。

□ 麻疹

【病狀】麻疹北人謂之糠瘡。南人謂之麩瘡。吳人謂之瘡。越人謂之痧。古人所謂麻。出輕而日數少者名奶疹子。出稍重而日數稍多者名正疹子。又出於痘前者名奶疹子。出於痘後者名正疹子。初出時感覺傷風。發熱咳嗽。鼻塞面腫涕唾稠粘。頻發噴嚏。目赤流淚。手足微冷。惡寒無汗。面色青慘。或赤而光。後乃漸熱。間有發熱至十餘日始見者。所發疹子。浮小而頭粒。有如粟米頭抗。隨出即收。不積膿泡。又如發風疹症。疙癢。擁起如雲。赤色成斑。隨見隨沒。

【病因】小兒出痘疹者。必感而出此。雖曰胎毒。未有不由天行者。故一時傳染。大小相似。

【治療】此症大忌觸冒風寒。不可不慎。瀉白消毒散。加味地骨皮散皆可治之。

一 瀉白消毒散

桑白皮 地骨皮二味自採鮮者各三錢 牛蒡子(炒研) 荆芥穗各一錢半 桔梗 甘草各一錢 浮萍(曬乾)二錢
右爲粗末。每服三五錢。水一盞。煎六分。濾清服。

二 加味地骨皮散

地骨皮(鮮者)三錢 桑白皮(鮮者)三錢 麥門冬三錢 銀柴胡 赤芍藥 乾葛各一錢 甘草 生犀角各五分
右水煎服五六分。

□ 看麻疹法

凡麻疹初熱與傷寒相似。預先切莫立定是麻是痘之見實。若係出麻其喉發熱發赤。咳嗽流涕。聲啞。目中流淚。呵欠喜睡。或吐泄。或面皮微有腫樣。或咯出鼻血。均吉兆也。宜謹避風寒。節飲食。避厭惡。戒葷腥。忌辛熱。使飢膚通達。腠理開張。或身有微汗。則邪從汗解。而毒卽易出耳。倘無各候。有因寒者。微用散寒。散寒則麻

自見有因食者。微用消食。消食則麻自出。萬不可驟用升提。俟看耳後兩腮隱隱有微點者。再行升提發散。此治麻之要訣也。

一 看麻症輕重凶吉

或退五六日而出者輕。

或透發三日而漸收者輕。

淡紅滋潤。面勻淨而多者輕。

頭面不出者重。

紅紫黯燥者重。

冒風早收者重。

移熱大腸變痢者重。

黑黯乾枯一出即收者不治。

鼻煽口張。目無神光者不治。

鼻清糞黑者不治。

胸高氣喘。心前煽動者不治。
腹痛不瀉。用藥疏通不應者不治。

一 麻證四忌

一忌葷腥生冷風寒。

二忌驟用寒涼。

三忌誤用辛熱。

四忌誤投補澀。

C 積滯吐瀉病治療法

食積——痰涎——吐乳——瀉

食積

【病狀】乳積者。則小兒睡臥不寧。不時啼叫。口中氣熱。頻吐乳片。腹脹而熱。大便酸臭。肥甘生冷積者。頭溫腹熱。大便酸臭。噯氣惡食。煩不安眠。口乾作渴。

【病因】乳母不知調節。哺食不時。或飲食取冷。冷氣積於脾胃。則不消而致病矣。

【治療】乳兒臟腑嬌嫩。不可過攻。惟宜調和脾胃為上。以消乳丸消導之。其稍成長之小兒。恣意肥甘生冷。不能運化。則腸胃停積而生食滯者。宜木香大安丸。滯重便秘者。宜下積丸攻下之。

一 消乳丸

砂仁 陳皮(炒) 神麩(炒) 麥芽(炒)各半兩 香附(炒)一兩

右末麩糊丸。如麻子大。食後白湯送下。大小加減。

二 木香大安丸

木香 黃連 陳皮 白朮各三錢 枳實 山杏一錢 萊菔子(炒) 連翹 神麩(炒) 麥蘖

(炒) 砂仁各一錢半

右為末。神麩糊為丸。陳麩米湯下。

三 下積丸

丁香二十粒 縮砂仁二十粒 使君子肉五枚 烏梅三枚 巴豆肉(不去油)三枚

右為末。爛飯為丸。麻子大。每服三丸。陳皮湯下。

痰涎

【病狀】小兒多痰。最足爲患。初覺其喉中有聲。時有痰咳出。或涎中帶痰。卽宜治之。

【病因】兒多涎者。風熱壅脾。積聚成痰。或乳食不下。涎沫結實而生壯熱。大抵脾氣不足。不能四布津液。則生痰涎。

【治療】平常痰涎多者。可服消乳痰丸。以防其未然。已積結者。治用半夏丸或膽星天竺丸。

一 消乳痰丸

大半夏半兩（切作骰子大） 用蘿蔔一個 亦切作骰子大 用水一碗 煮水盡爲度 不用蘿蔔（人參二錢半（取末二錢））

右二味焙乾。同爲細末。生薑自然汁煮糊。爲丸如綠豆大。每服二十九。或三十九。生薑湯下。食後服。看兒大小加減。

一一 半夏丸

半夏二兩(生用) 赤茯苓(去皮) 枳殼(製)各一兩 風化朴硝二錢半

右前三味。剉焙爲末。入乳鉢同朴硝杵均。用生羌自然汁。煮糯米粉。爲丸棗豆大。每服三十九。仍以淡薑湯。食後。臨睡。送下。兒小。煮丸如粟穀大。

三 膽星天竺丸

牛胆南星一兩 半夏(湯泡去皮臍 薑汁製) 白附子(湯泡去皮臍)各五兩 天竺黃三錢

天麻 防風各二錢 辰砂(另研水飛)一錢

右爲末。甘草膏爲丸。如芡實大。每服一丸。空心薄荷淡薑湯化下。

吐乳

【病狀】小兒乳後嘔吐。不一而足。長此不已。恐成慢驚。故急宜治之。又乳直出而不停留者。謂之覘乳。亦宜止之。

【病因】乳下嬰兒。乳哺過甚。或兒睡著而更吮乳。豈有厭足。以致脾不能運。胃不能受。滿而溢。故令嘔吐。

【治療】吐乳宜服消乳丸。覘乳宜服麥香湯。

一 消乳丸

香附子二兩(炒) 甘草半兩(炙) 陳皮半兩(去白) 縮砂仁 神麩(炒) 麥蘖(炒)各一兩
右爲末。泡雪糕圓如黍米大。每服二十九。食後淡薑湯下。

二 麥香湯

麥芽三錢 橘紅一錢 丁香三分

右方水煎服之。立止。

□ 瀉

【病狀】因冷瀉者。純係白水。瀉密而少。腹痛雷鳴。眉皺目慢。面帶白色。額上有汗。因熱瀉者。大便色黃。如筒弔水。瀉過卽止。半日復然。心煩口渴。小便黃少。食乳必粗。因傷食瀉者。面唇俱白。瀉稀而少。或如壞鷄子。腥臭異常。身形黃瘦。水瀉則水穀不分。但瀉黃水。小便秘少。積瀉則留連不止。風瀉則糞稀。色作黃褐。臟寒瀉則糞如青竹色。不稀不稠。未瀉時時腹痛而鳴。啼哭始瀉。疳積釀瀉則面色痿黃。肚脹脚弱。頭大項小。髮稀且堅。肌肉消瘦。不

思飲食。晝涼夜熱。或腹內有癥瘕氣塊。瀉則顏色不等。其臭異常。其瀉有時或一月半月。旬日一番。自瀉自止。

【病因】瀉之病狀不同。原因亦因之而異。勢難詳盡。故略而不述。

【治療】冷瀉服守中湯治之。熱瀉則用白朮散治之。食瀉則先服紫霜丸然後服調中散。水瀉用五苓散加薏苡仁。車前子。半夏各一錢。水薑煎服。積瀉宜先用三稜丸去積。再用白朮散治之。風瀉宜用胃風散。臟寒瀉宜用開胃丸。疳積釀瀉宜投以沒石子丸。無不立愈。

一 守中湯

桔梗(去蘆剉炒) 蒼朮(米泔水浸一宿 去粗皮 濾乾剉片 炒微黃)各二兩 白薑(炮)四錢 甘草(炙)六錢

二 白朮散

白朮 人參 半夏麩各二錢 茯苓 乾薑 甘草各一錢
右爲末。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。去渣溫服。

三 紫霜丸

代赭石(煨用醋淬七次) 赤石脂(煨)各一兩 杏仁(去皮尖)五十枚 巴豆三十粒(去皮膜油炒研)

右先將杏仁巴豆入乳鉢內細研如膏。卽入代赭石脂研和勻。以湯浸蒸餅丸如粟米大。一歲兒五丸米飲下。一二百日兒三丸。餘酌量。

四 調中散

人參(去蘆) 白茯苓 白朮 木香 乾薑(炮) 藿香葉 香附子(砂去毛) 縮砂仁 甘草
(炙) 丁香各等分

右爲末。每服一錢。薑棗湯調下。肚痛。白湯下。量大小加減。

五 五苓散

澤瀉五錢 豬苓 官桂 赤茯苓 白朮各三錢

右爲末。每服一二錢。白湯調下。

六 三稜丸

三稜(煨) 木香 神麩(炒) 陳皮 半夏(薑製)各一兩 丁香 肉桂各半兩
右爲末。麵糊丸如黃米大。每服二十九。乳食後。生薑湯送下。

七 胃風散

人參(去蘆頭) 白茯苓(去皮) 芎藭 桂皮(去粗皮) 當歸(去苗) 白芍藥 白朮各等分
右爲粗散。每服一錢。以水一大盞。入粟米百粒。同煎七分。去滓。空心服。

八 清胃丸

木香 蓬莪朮 白朮 人參(去蘆頭) 當歸(剉微炒)各半兩 麝香(細研) 白芍藥各一分
右搗羅爲末。研合均。湯浸炊餅。和丸如黍米大。每服十五丸。溫米飲下。

九 當歸散

當歸 黃芩 芍藥 芎藭各一兩 白朮半兩
右五味。杵爲散。薑湯調服一錢至二錢。

十 沒石子丸

沒石子二枚 南木香(濕紙包略煨) 淨黃連(剉碎) 姜汁炒各二錢半 肉豆蔻二枚(炮)

訶子四枚(炮去核)

右剉成末。加烏犀丸內。製飯糊爲丸。粟米大。每服十丸。溫白湯空心下。

十一 單方

紅棗二十個。去核。將官粉入內。以陰陽瓦焙乾。去棗研粉。每服三分。米湯下。(千金方)

小兒熱瀉。黃蘗削皮。焙爲末。米湯和。丸粟米大。每服一二十九。米湯下。(十全博救方)

小兒四季患泄瀉。製白朮。陳皮。川厚朴。薑汁炒各三分。甘草二分。煎服效。(窮鄉便方)

小兒泄瀉。用木鼈子一個。煨熟。去殼。小丁香三粒。共爲末。米飲丸。入小兒臍。以膏藥封之。(身經通考)

D 感冒喘咳治療法

感冒——諸汗——喘息——咳嗽

【病狀】感冒輕者爲傷風。易痊。重者爲傷寒。難治。傷風則令兒身體發熱。憎寒。頭痛。有汗。嚏涕。鼻塞聲重。不時咳嗽。脈浮緩。傷寒則身體發熱。惡寒。無汗。頭痛。身疼。而脈浮緊。夾食者。則發熱。憎寒。頭痛。惡食。噯臭。吐酸。便秘。尿瀝。腹熱。膨脹。夾熱者。則面赤舌焦。口臭。乾燥。憎寒。壯熱。口渴。飲冷。心神煩躁。譫

語狂妄。二便秘澀。夾驚者。則心驚胆怯。睡臥不安。身熱煩躁。面色青赤。

【病因】小兒氣血未充。肌膚柔脆。偶爲風寒所觸。邪氣入於腠理。榮衛受病。輕者爲傷風。易痊。重者爲傷寒。難治。若小兒平日飲食無節。內傷停滯。外復爲風寒所感。則成感冒夾食。若小兒臟腑素稟多熱。今復爲風寒所傷。風熱相搏。故火邪愈盛。則成感冒夾熱。感冒夾驚者。乃小兒感冒。邪氣未解。復爲驚異所觸也。

【治療】傷風宜服杏蘇飲解散外邪。又用金沸草散開通氣逆。則愈。傷寒宜服九味羌活湯。如熱盛者。以雙解通聖湯治之。夾食熱盛者。亦宜雙解通聖湯。內無熱者。用藿香正氣湯解之。然後調理其脾。平胃散可用。夾熱者。當服清解散。夾驚者。先以疏解散解之。再用涼驚丸清鎮之。

一 杏蘇飲

杏仁(炒去皮尖) 紫蘇 前胡 桔梗 枳實(麸炒) 桑皮(炒) 黃芩 甘草(生) 麥冬

(去心) 浙貝母(去心) 橘紅

右隨兒之大小病之輕重爲量。生薑水煎服。

二 金沸草散

細辛 荊芥 半夏(薑製) 旋覆花 前胡 甘草 赤苓

右隨兒之大小病之輕重爲量。薑棗水煎服。

三 九味羌活湯

蒼朮 白芷 川芎 細辛 羌活 防風 生地 黃芩 生甘草

右隨兒之大小病之輕重爲量。用生薑葱白水煎服。大便秘者加大黃。

四 雙解通聖湯

麻黃 朴硝 大黃 當歸 赤芍 川芎 白朮(土炒) 石膏 桔梗 梔子 連翹(去心)

黃芩 薄荷 甘草(生) 荊芥 防風

右隨兒之大小病之輕重爲量。生薑水葱白煎服。

五 藿香正氣湯

蘇葉 白芷 藿香 陳皮 半夏(薑製) 茯苓 大腹皮 生甘草 厚朴(薑炒) 桔梗

右隨兒之大小。病之輕重爲量。生薑紅棗水煎服。

六 平胃散

蒼朮五斤(米泔浸七日) 陳皮(去白) 厚朴(薑汁炒)各三斤 炙甘草三十兩

右爲末。每服二錢薑湯下。日三服。或水煎。每服五錢。

七 清解散

北參 防風 天麻 北前胡 茯苓 桔梗 枳殼(剉) 甘草各二錢 細辛 柴胡各一錢半

川芎三錢

右爲末。每一錢。水一盞。薄荷葉略煎。溫服。

八 疏解散

羌活 蘇葉 防風 枳殼(麩炒) 桔梗 前胡 赤芍藥 杏仁(炒去皮尖) 僵蠶(炒) 甘

草 黃連(酒炒)

右用生薑水煎服。用量隨病之輕重。乳兒之大小。

諸汗

【病狀】兒睡而汗自出者曰盜汗。晝夜出不止曰自汗。

【病因】盜汗因小兒肌肉虛也。自汗小兒血氣具熱而榮衛虛也。

【治療】盜汗宜內服當歸六黃湯及止汗散。自汗者。外用撲汗散內服亦宜用當歸六黃湯。蓋此方爲治諸汗之神方也。

一 當歸六黃湯

當歸 熟地黃 黃芪(炒黑) 黃藥(炒黑) 黃芩 黃連 生地黃各等分
右每服二錢。水煎。

二 止汗散

敗蒲扇燒灰存性

右研細。每服三錢。溫酒調下。無時。

三 撲汗散

黃連 牡蠣粉 貝母各半兩 米粉一升

右末。敷於身上。

喘息

【病狀】有胸滿短氣。氣急。咳嗽。喉聲如鋸。小便漸短諸症狀。

【病因】此證有因暴驚觸心者。有因寒邪壅盛者。有因風邪外客者。有因食鹹酸痰滯者。有因膏梁積熱。薰蒸清道者。種種不一。

【治療】虛冷者投枳實湯。水薑煎。喘急者不拘冷虛宜定喘飲。涎壅失音可服二聖散。

一 枳實湯

枳實(去瓢片)麩炒微黃 赤茯苓(去皮)各半兩 甘草六錢 桔梗(剉炒)七錢半 半夏(湯煮透濾仍剉焙乾)七錢

右咬咀。每服二錢。水一盞。薑三片。煎七分。無時服。

二 定喘飲

人參(去蘆) 麻黃(不去根節) 防己(去黑皮) 訶子(去核) 半夏湯洗(去滑) 甘草各六錢

右剉。每服二錢。水一盞。薑二片。煎七分。無時。溫服。

三 二聖散

訶子十枚（大者半生半炙 去核） 大腹皮五錢（淨洗焙乾）

右剉。每服二錢。水一盞。煎七分。無時。溫服。

□ 咳嗽

【病狀】初得時。面赤昏紅。氣粗發熱。嗽來痰鳴。眼胞微浮。額上汗多。久咳則臥而氣促。坐乃稍寬。咳嗽連聲不斷。喉中作響。氣息欲絕。嗽罷則吐白沫。或則乾嘔。面唇慘白。額上多汗。飲食減少。是爲虛嗽。

【病因】多由感冒傷肺而起。

【治療】無痰者宜服三拗湯或順肺湯。兼痰者宜服百部丸。

一 三拗湯

麻黃（不去節） 杏仁（不去皮尖） 甘草（生用）各等分

右剉散。每服三錢。水一盞。生薑三片。煎至六分。去滓。溫服。取汗爲度。

二 順肺湯

紫蘇葉 半夏(湯洗七次遍體)各一兩 五味子 欵冬花 陳橘皮(湯浸去白) 桂心 木香 各半兩

右搗爲細末。每服一錢。水八分。入生薑人參各少許。煎四分。去滓。溫服。

三 百部丸

百部(炒) 麻黃(去節)各一兩 杏仁(去皮尖 微炒研入)四十枚
右爲末。煮熟棗子。丸如皂子大。溫水二三丸。日服三四次。

四 單方

蜂房二兩。洗淨。燒研。每服一字。米飲下。(勝金方)

生薑四兩。煎湯浴之。(千金方)

聲不出者。紫苑末。杏仁等分。入蜜同研。丸芡子大。每服一丸。五味湯化下。(全幼心鑑)

皂莢燒灰。細研末。每服半錢。或一錢。豉湯調下。無時服。(衛生總微)

三 孩童期

孩童通論

嬰兒自斷乳後。母宜謹慎其飲食起居。及長而成童子。則應施以性教育。免其沾犯手淫。倘係女子。則對於發育之次序。母宜詳細指示。蓋月水初屆。極易引起處女之驚異。甚有恐懼過劇。而陷入於精神病者。且於經期之衛生。亦須留心指導。免至一旦抱病而終。則爲山九仞。功虧一簣矣。

A 疔癬病治療法

肝疔——心疔——脾疔——肺疔——腎疔——無辜疔

肝疔

【病狀】面目爪甲皆青。眼生眵淚。隱澀難睜。搖頭揉目。耳瘡流膿。腹大筋青。身體瘦弱。燥渴煩急。糞青如苔。

【病因】肝疔者由乳食不調。肝臟受熱所致也。

【治療】治宜先清其熱。用柴胡清肝散。蘆薈肥兒丸主之。若病勢稍退。當以逍遙散調理之。

一 柴胡清肝散

銀柴胡 梔子(微炒) 連翹(去心) 生地黄 胡黃連 赤芍 龍胆草 青皮(炒) 甘草

(生)

右用燈心竹葉爲引。水煎服。

二 蘆薈肥兒丸

五穀虫(炒)二兩 蘆薈(生) 胡黃連(炒) 川黃連(薑炒)各一兩 銀柴胡(炒)一兩二錢

扁豆(炒) 山藥(炒)各二兩 南山香一二兩半 蝦蟆(煨)四只 肉苳蔻(煨)七錢 檳榔五

錢 使君子(炒)二錢半 神麩(炒)二兩 麥芽(炒)一兩六錢 鶴蝮(炒)八錢 蕪荑(炒)一

兩 砂硃(飛)二兩 麝香二錢

右共研細末。醋糊爲丸。如黍米大。每服一錢。米飲下。

三 逍遙散

茯苓 白朮(炒) 當歸 白芍(炒) 柴胡 薄荷 炙甘草 丹皮 梔子(炒)

右等分。用薑棗爲引。水煎服。

心疳

【病狀】面紅目赤。壯熱有汗。時時煩渴。咬牙弄舌。口舌煩躁。渴飲。生瘡。小便黃赤。胸膈飽滿。喜睡伏臥。懶食乾瘦。或吐或利。

【病因】乳食不調。心臟受熱所致。

【治療】熱感者。參黃丹治之。兼驚者。珍珠散主之。病久心虛者。茯神湯調理之。

一 參黃丹

乾蠟(微炒)二十一斤 天漿子(乾者微炒) 一十四個 人參 胡黃連各一兩 天竺黃半兩

(研以上爲細末 次入) 青黛 朱砂各一分 龍腦一錢并研細

右一處拌勻。煉蜜和如黍米大。每服十粒。人參湯下。量兒大小加減。

二 珍珠散

眞珠(末) 麥門冬(去心)各半兩 天竺黃 金銀箔各研五十片臨和加入諸藥末內 牛黃麝香各研細 胡黃連 甘草(炙) 羚羊角(屑) 川大黃(炒) 當歸(微炒) 硃砂 雄黃 茯神 犀角(屑)各一分

右搗爲散。每服以茵陳湯調半錢。量兒大小服之。

三 茯神湯

茯神(去皮木根)一兩 人參(去蘆) 當歸(去蘆尾酒洗)各半兩 甘草(炙)二錢

右咬咀。每服二錢。水二盞。煎七分。無時溫服。有微熱煩躁。入天門冬同煎。

脾疔

【病狀】面色發黃。肌肉消瘦。身體發熱。困倦喜睡。心下痞硬。乳食懶進。睡臥喜冷。肚腹堅硬疼痛。有時吐瀉。口乾煩渴。大便腥黏。

【病因】乳食不節。脾胃受傷所致。

【治療】宜先服消肝理脾湯。肥兒丸。積退後。方用參苓白朮散調理。

一 消肝理脾湯

蕪荑 三稜 莪朮 青皮(炒) 陳皮 蘆薈 檳榔 使君子肉 甘草(生) 川黃連 胡黃

運 麥芽(炒) 神麩(炒)

右以燈心爲引。水煎服。

二 肥兒丸

人參二錢半 白朮(土炒)五錢 茯苓三錢 黃連二錢 胡黃連五錢 使君子肉四錢 神麩(炒) 麥芽(炒) 山渣肉各三錢半 甘草(炙)錢半 蘆薈(煨)二錢半
右爲末。黃米糊丸。如黍米大。每服二三十九。米湯送下。

三 參苓白朮散

人參二錢 茯苓 白朮(土炒) 扁豆(炒) 薏米(炒) 山藥(炒)各五錢 陳皮三錢 縮砂 桔梗各二錢 甘草(炙)一錢 建蓮子(去心)五錢
右共爲細末。每服一錢。老米湯調服。

四 單方

使君子 蘆薈 等分爲末。米飲湯下。每服一錢。(儒門事親)

□ 肺疳

【病狀】肺疳面白。氣逆咳嗽。毛髮焦枯。皮上生粟。肌膚乾燥。憎寒發熱。常流清涕。鼻頰生瘡。

【病因】乳食不調。壅熱傷肺所致。

【治療】宜服地黃清肺飲。日久肺虛者。以補肺散投之。

一 地黃清肺飲

桑白皮(炒)半兩 紫蘇 北前胡 防風 赤茯苓 黃芩 當歸 天門冬(去心) 連翹 桔
 梗 生地黃 甘草(炙)各二錢半
 右到散。每服二錢。水煎。食後服。

二 補肺散

阿膠(剉炒)一兩半 白茯苓 馬兜鈴(去老梗) 糯米各半兩 杏仁(湯炮去皮尖) 三十一
 粒 甘草(炙)四錢
 右到。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

腎疳

【病狀】面色黧黑。齒齦出血。口中氣臭。足冷如冰。腹痛泄瀉。啼哭不已。

【病因】患此疳者。初必有解顛。鶴膝。齒遲。行遲。腎氣不足等證。更因肥甘失節。久

則漸成腎疝。

【治療】先用金蟾丸繼以九味地黃丸調補。若稟賦不足調元散主之。

一 金蟾丸

乾蝦蟆(燒灰)五個 雷丸 蘆薈 蕪荑 雄黃(飛過)各一分

右爲末。麵糊爲丸。綠豆大。雄黃爲衣。每服十五丸。飯湯下。

二 九味地黃丸

熟地黃四錢五分 赤茯苓 山茱萸肉 川棟子 當歸 川芎 牡丹皮 山藥 使君子肉各二錢

右爲末。蜜丸。桐子大。每服三十九至八十九。空心溫酒下。

三 調元散

乾山藥(去黑皮)五錢 人參(去蘆) 白茯苓(去皮) 茯神(去皮根) 白朮 白芍藥 熟地黃(酒洗) 當歸(酒洗) 黃耆(蜜水炙)各二錢半 川芎 甘草(炙)各三錢 石膏

右碎。每服二錢。水一盞。薑一枚。煎七分。無時溫服。

無辜疔

【病狀】此症小兒頸項生瘡。或項內有核如彈。按之轉動。軟而不疼。其中有蟲如米粉。不速破之。使蟲蝕臟腑。便利膿血。身體瘦弱。面黃發熱。

【病因】因乳母有病。傳染小兒。以致此病。

【治療】先宜清其熱。柴胡飲主之。再消其疔。蘆薈肥兒丸主之。

一 柴胡飲

北柴胡(去蘆洗淨) 人參(去蘆) 當歸(酒洗) 黃芩 赤芍藥 甘草(炙) 各一兩 大黃(生用) 桔梗(去蘆剉炒) 北五味子(去梗) 半夏(湯煮透去滑) 各半兩
右剉。每服二錢。水一盞。烏梅一個。薑二片。煎七分。溫服。

二 蘆薈肥兒丸

五穀蟲(炒)二兩 蘆薈(生) 胡黃連(炒) 川黃連(薑炒)各一兩 銀柴胡(炒)一兩二錢
扁豆(炒) 山藥(炒)各二兩 南山渣二兩半 蝦蟆(煨)四個 肉豆蔻(煨)七錢 檳榔五錢
使君子(炒)二錢半 神麩(炒)二兩 麥芽(炒)一兩六錢 鶴蝨(炒)八錢 蕪荑(炒)一兩

硃砂(飛)二兩 麝香二錢

右共研細末。醋糊爲丸。如黍米大。每服一錢。米飲下。

癰病

【病狀】每生於左脅之下。初作之時。午後潮熱。口渴飲冷。腹大筋青。漸如雞卵。堅硬成塊。不時作痛。久則如覆盆之形。若越臍則難治矣。

【病因】皆因飲食失節。腸胃填滿。濁汁外溢。復感寒氣。凝結而成此症。

【治療】內服千金消癰丸。外貼紅花膏。內外兼治。其癰自消。

一 千金消癰丸

蘆薈 阿魏(另爲糊) 青黛 木香 厚朴(薑炒) 檳榔 陳皮 甘草(生)各一錢 使君子
(去殼) 胡黃連 山渣肉 香附(醋炒) 三稜(醋炒) 莖朮(醋炒)各二錢 水紅花子 神
麵(炒) 麥芽(炒)各四錢 人參 白朮(土炒) 茯苓各三錢

右爲細末。將阿魏一錢。白水和麵打糊。爲丸綠豆大。米飲下。

二 紅花膏

沒藥五錢 血竭 麝香 阿魏各三錢 當歸 赤芍各一錢 水紅花料一捆煎汁去渣熬膏一

碗

右爲細末。入膏內攪勻。青布攤貼患處。

B 霍亂痢瘡病治療法

霍亂——赤白痢——瘡

□ 霍亂

【病狀】有先瀉而後吐者。其候。先瀉白水。吐亦不多。口氣緩而神色慢。額前有汗。六脈沈濡。有先吐而後瀉者。其候。氣促唇紅。吐時面赤。脈洪而數。渴飲水漿。其昏睡露睛。手足冰冷。

【病因】此證皆由六氣未完。六淫易侵。兼以調護失宜。乳食不節。遂使脾胃虛弱。清濁相干。蘊作而然。

【治療】暑月霍亂。吐瀉煩悶。引飲不止。小便利者宜服車前子散。心脾不和。氣不升降。吐瀉不止者。宜服六和湯。

一 車前子散

白茯苓 猪苓 香薷 車前子(炒) 人參各等分
右爲末。燈心湯調下。

二 六和丸

人參(去蘆) 縮砂仁 甘草(炙) 杏仁(炮水皮尖) 半夏(湯煮透剉焙乾)各一兩 白扁豆
一斤(炒熟去殼) 碎切杵爛 拌勻釀一宿焙乾) 藿香 赤茯苓(去皮) 木瓜各二兩 香薷
厚朴 (去粗皮 薑製 慢火焙乾)各四兩
右每服二錢。水一盞。薑二斤。棗一枚。煎七分。無時溫服。

□ 赤白痢

【病狀】或下純白痢。或白上有粉紅色。或似猪肝瘀血。或下純鮮血。或下五色痢。
若赤白同下。久而不禁。小便少澀。唇裂眼赤。氣促心煩。坐臥不安。狂渴飲
水。穀道傾陷。時復面容如妝。飲食不進者。難治。

【病因】此由飲食無節。或餐果食肉。不知厭足而起。

【治療】普通治療以丹溪方爲主。熱痢下血者宜用黃柏丸。血痢日久不癒者宜用地榆散。

一 丹溪方

黃連 黃芩 大黃 甘草各等分

右水煎服。赤痢加紅花桃仁。白痢加滑石末。

二 黃柏丸

黃柏(去皮)半兩 赤芍藥四錢

右爲末。飯和丸如麻子大。每服一二十九。食前米飲下。量兒加減。

三 地榆散

地榆(炒)一分 訶子五個(炮去皮) 陳穗 黃連(炒)各一錢

右爲細末。每服半錢或一錢。陳米飲下。

四 單方

不拘赤白。用麻油一合。搗和蜜湯服之。(外臺秘要)

痢下類似魚凍者。白鴨殺取血。滾酒沖服。(摘元方)

枳實磨汁服一二錢。(廣利方)

雲母粉半兩。煮白粥調食之。(食醫心鏡)

瘡

【病狀】伸欠寒慄。腰背俱痛。骨節煩疼。不嗜食。善嘔。小便利。寒去則內外皆熱。頭痛而渴。詳細分之。尚有寒瘡。溫瘡。濕瘡。牝瘡種種。

【病因】此由腠理開而汗出。遇風。或得於澡浴。水氣客於皮膚。衛氣不守。邪氣並居。其病始作。

【治療】治瘡之法。必須先表。用百解散。水薑葱煎投。次以小柴胡湯加桂水薑棗煎服。以和解表裏之邪。自然見効。

一 百解散

乾薑二兩半 升麻 赤芍藥各二兩 黃芩一兩 麻黃(製)七錢半 薄荷(去粗皮)二錢半
甘草一兩半

右碎。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。無時溫服。有風熱感。加薄荷同煎。

二 小柴胡湯

人參二錢 甘草(微炙)二錢 麥門冬(去心)二錢 龍胆草(酒炒煎) 防風各一錢 柴胡五分

右每服一錢。水煎。

C 黃疸腫脹病治療法

黃疸——腹脹——水腫

□ 黃疸

【病狀】面目遍身皆黃。甚則深黃。面如煙薰之狀。

【病因】皆因脾氣有虧。運化失職。濕熱留於肌膚。

【治療】此證有陰陽之別。如面紅口渴。尿色赤。身熱者。乃脾家濕熱。此陽黃也。口

不渴而色暗黃。身冷如冰者。乃脾腎寒濕。此陰黃也。宜分別施治。陽黃因

濕熱而成。如表裏無汗。宜外發其汗。茵陳麻黃湯主之。使黃從表解。表實。

二便秘齏腹滿者宜用茵陳蒿湯下之使黃從裏解。若表有汗裏不便祕腹滿。是表裏無汗。不可汗下。惟利小便。宜用茵陳五苓散。使黃從水道利之即愈。陰黃者。乃脾濕腎寒兩虛而成。此乃最危之候。宜以茵陳四逆湯主之。

一 茵陳麻黃湯

茵陳蒿 麻黃

右各等分。水煎。加黃酒少許服之。

二 茵陳蒿湯

茵陳蒿(嫩者)一兩 大黃三錢半 梔子(大者)三枚

右剉散。以水一大碗。先煎茵陳減半。次入二味。煎八分。去滓。溫服。日三服。

三 茵陳五苓散

茵陳蒿 赤茯苓 豬苓 澤瀉 白朮(土炒) 肉桂

右燈心水煎服。

四 茵陳四逆湯

附子(製) 乾薑 茵陳蒿 甘草(生)

右水煎服。

腹脹

【病狀】腹脹有虛實之分。小兒久病脾虛。或吐瀉暴傷脾氣。健運失常。故飲食不化。食少腹即脹滿。精神倦怠。面黃肌瘦。此虛脹也。小兒飲食過度。停滯胃中。以致腹脹。大便不利。身體潮熱。心煩口渴。形氣壯實。此實脹也。

【病因】虛者因久病。內傷其脾。實者因飲食停滯於胃。

【治療】虛脹宜服香朴四君子湯。實脹輕者宜用平胃散。重者宜用小承氣湯。

一 重朴四君子湯

人參 白朮(土炒) 茯苓 甘草(炙) 丁香 厚朴

右用煨薑爲引。水煎服。

二 平胃散

蒼朮五斤（米泔浸七日） 陳皮（去白） 厚朴（薑汁炒）各三斤 甘草（炙）三十兩
右爲末。每服二錢。薑湯下。日三服。或水煎。每服五錢。

三 小承氣湯

大黃四兩 厚朴（去皮尖）二兩 枳實（炙）三枚

右以水四升煮。取六合。去滓。分溫二服。初服湯當更衣。不爾者多飲之。若更衣則止。

□ 水腫

【病狀】上身腫者。謂之風水腫。乃自頭面肩臂至腰間皆腫也。下身腫者。謂之濕水腫。自腰臍至兩足皆腫也。通身腫者。謂之風濕腫。自頭面至手足皆腫也。

【病因】上身腫者。病因外感風邪。下身腫者。因脾經濕熱。通身腫者。因內停濕飲。外感風邪風濕。水道不利。外攻肌表。因而作腫也。

【治療】上身腫者。服越婢湯加蒼朮。下身腫者。內服沉香琥珀丸。外用貼臍法。全身腫者。輕則用茯苓導水湯和解之。重則用疏鑿飲峻攻之。

一 越婢湯

麻黃 石膏(煨) 甘草(生) 蒼朮(米泔水浸)
右等分。水煎服。

二 沈香琥珀丸

苦葶蘆一兩五錢 郁李仁(去皮)一兩五錢 防風七錢五分 沈香一兩五錢 陳皮(去白)七錢五分 琥珀五錢 杏仁五錢(去皮尖炒) 蘇子五錢 赤苓五錢 澤瀉五錢
右共爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐大。以麝香爲衣。每服一錢。量兒大小與之。用白開水下。

三 貼臍法

巴豆(去油)四錢 水銀粉二錢 硫黃一錢

右研勻成餅。先用新棉一片。包藥布臍上。外用棉縛時許。自然瀉下惡水。待下三五次。去藥。以粥補住。

四 茯苓導水湯

紫蘇 陳皮 白朮(土炒) 木香 桑白皮(炒) 麥冬(去心) 赤茯苓 澤瀉 木瓜 大腹皮 縮砂仁 檳榔

右燈心水煎服。

五 疏鑿散

商陸 秦艽 羌活 椒目 木通 赤小豆 茯苓 大腹皮 澤瀉 檳榔
右各等分。薑水煎服。

D 瘟疫暑熱病治療法

瘟疫——暑證——諸熱

□ 瘟疫

【病狀】此為天地之厲氣流行。沿門閤戶。無論老少弱強。觸之者即病。

【病因】天地之厲氣流行。自人口鼻而入。故傳染之速。迅如風火。

【治療】發以荊防敗毒散。清以普濟消毒飲。攻以二聖救苦丹。

一 荊防敗毒散

防風 荊芥 羌活 獨活 柴胡 前胡 生甘草 川芎 枳殼(麩炒) 桔梗 茯苓
右用生薑水煎服。隨兒之大小。病之輕重用。

二 普濟消毒散

黃芩(酒炒) 黃連(酒炒) 陳皮 桔梗 板藍根 升麻 柴胡 薄荷 連翹(去心) 牛蒡子(炒研) 僵蠶(炒) 馬勃 甘草(生) 元參

右燈心水煎服。隨兒之大小。病之輕重用量。

三 二聖救苦丹

大黃四兩 皂角二兩

右爲末。每服一錢。量兒大小與之。水下。

暑證

【病狀】中暑者身熱有汗。頭痛口渴。煩燥不寧。甚則氣乏神倦。足冷惡寒。傷暑則發熱無汗。口渴飲水。面色紅赤。乾嘔惡心。或腹中絞痛嗜臥懶食。傷暑夾食則大吐瀉。暑風則手足搐搦。狀似驚風。暑厥則昏昧不省人事。

【病因】中暑爲陽邪。單中暑熱也。陽邪身熱有汗。傷暑爲陰邪。中暑復感寒也。陰邪身熱無汗。中暑則因熱極攻肝。故抽搐。恐則厥冒不省人事。

【治療】中暑宜服人參白虎湯。傷暑宜服二香飲。暑風宜服加味香薷飲。暑厥宜

服清暑益氣湯。

一 人參白虎湯

人參 石膏 知母(生) 粳米 甘草 蒼朮
右等分。水煎服。

二 二香飲

蘇葉 藿香 白茯苓 扁豆(炒) 厚朴(薑製) 陳皮 生夏(薑製) 甘草(生) 大腹皮
白芷 桔梗 川黃連 香薷
右生薑燈心水煎服。

三 加味香薷飲

香薷 厚朴(薑炒) 陳皮 扁豆(炒) 山渣肉 豬苓 甘草(生) 枳實(麩炒)
右水煎服。

四 清暑益氣湯

人參 黃芪(炙) 當歸(酒炒) 白朮(土炒) 甘草(炙) 陳皮 麥冬(去心) 五味子 青皮(炒) 蒼朮(炒) 黃蘗(酒炒) 升麻 葛根 澤瀉 神麩(炒)

諸熱

【病狀】熱有虛實。實則面赤濃黃。氣粗口熱。燥渴唇腫。大小便難。掀揭露衣。煩啼暴叫。虛則面色青白。恍惚神緩。口中清冷。噓瀉多尿。夜出虛汗。

【病因】小兒發熱。原因複雜。有因外感者。有因內傷者。

【治療】實熱宜用七寶散。虛熱宜用敗毒散加木香。當歸。此大法也。

一 七寶散

川大黃(蒸) 赤芍藥 甘草(炙) 川當歸各二錢半 麻黃 白朮 荊芥穗各二錢
右爲末。一歲一錢。水半盞。葱白一寸。薄荷一葉。煎至三分不拘時。溫服。

二 敗毒散

柴胡 前胡 川芎 枳殼 羌活 獨活 茯苓 桔梗 人參各一兩 甘草半兩
右爲末。每服二錢。生薑薄荷水煎。

E 雜病治療法

疝證——淋——遺尿——尿白便濁——陰腫——脫肛——肛癢——語遲——鶴膝
 咽喉腫痛——目赤腫痛——滯頤——龜胸——龜背——解顛——顛陷——五遲
 五軟——五鞭——齒痛——耳病——鼻塞——鼻疽——客忤——吐——中惡
 卒死——瘡瘍——丹毒——疔瘡——時毒——天泡瘡——楊梅瘡——惡核瘰癧
 疥瘡——口瘡——便毒——脚凍瘡——湯火瘡

疝證

【病狀】臍腹絞刺。激搏而痛。無有定處。倉卒之際。不堪忍者。

【病因】陰氣積於內。復爲寒氣所傷。榮衛不調。二氣虛弱。風冷入腹而成。

【治療】先宜用五苓散和解之。輕則但以白芍藥湯爲治。重則用散氣丸。未有不愈也。

一 五苓散

澤瀉二兩半 豬苓 白朮(炒) 白茯苓各一兩半 肉桂一兩

右爲細末。每服二錢。白湯調下。

二 白芍藥湯

白芍藥一兩半 澤瀉(去粗皮)七錢半 甘草(炙)二錢 薄桂(去粗皮)一錢半
右咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。空心溫服。

三 散氣丸

海藻(湯浸洗七次焙乾) 澤瀉(去粗皮) 茴香(炒) 車前子 蘿蔔子(瓦上慢火焙乾) 川
棘肉(用斑蝥九枚去翅足 同炒少時去之) 大腹皮(淨洗焙乾)各一兩
右剉焙爲末。酒煮麵糊丸如菉豆大。每服三十九。南木香煎酒空心下。

淋

【病狀】小便淋瀝。或少腹引臍而痛。

【病因】小兒諸淋者。腎與膀胱熱也。

【治療】初起時。卽服五淋散。遲則恐其變矣。

一 五淋散

赤茯苓六錢 當歸 甘草各五錢 赤芍藥 山梔子各二錢
右咬咀。每服三錢。水一小盞。入燈心煎服。

二 單方

血淋雞矢尖白如粉者。炒研。爲丸菉豆大。每服三五丸。酒下四五服。愈。（醫林集要）
沙淋黑豆一百二十粒。生甘草一寸。新水煮熟。入滑石末。乘熱飲之。良佳。（全幼心鑑）
淋痛水芹菜白根者。去葉搗汁。井水調服。（聖惠方）

遺尿

【病狀】睡中尿自出。不能收禁。

【病因】腎主水。膀胱爲津液之腑。腎與膀胱俱虛。而冷氣乘之。故不能拘制其水。
【治療】宜用鷄腸散或用參苓白朮散治之。

一 鷄腸散

雞腸（一具 男用雌 女用雄 燒存性） 牡蠣 茯苓 桑螵蛸（炒）各五錢 桂皮（去粗皮）
龍骨各二錢半

右爲極細末。仍以雞胗一具。雞腸一具。燒存性。研細末。同前藥末一錢。用溫酒調化。食前服。

二 參苓白朮散

人參(去蘆) 白茯苓(去皮) 粉草 白朮 白扁豆(炒去殼) 山藥(去黑皮) 縮砂仁 薏苡仁 桔梗(剉炒) 九味各一兩 蓮子肉(去心)
右剉焙爲末。每服半錢至一錢。用棗湯空心調下。

三 單方

用瞿麥。石韋。龍胆。皂莢。桂心各半兩。雞腸草。人參各一兩。車前子一兩六錢。八味爲末。蜜丸。每食後服如小豆大五九。日三。加至六七九。(幼幼近編)
破故紙末爲末。每夜熱湯服五分。(嬰童百問)
大甘草頭煎湯。夜夜服之。(得效方)

□ 尿白便濁

【病狀】小兒尿白如米泔狀。

【病因】皆由乳哺失節。有傷於脾。致令清濁不分而色白也。

【治療】可用君朴丸治之。

一 君朴丸

使君子(煨去殼) 厚朴(製) 黃連各一兩 木香三錢

右爲末。蒸餅糊丸。桐子大。每服一二十九。米湯下。

□ 陰腫

【病狀】小兒陰莖腫脹。或則全縮不見。陰囊光腫不痛。女兒則陰戶腫脹。冷汗自出。

【病因】此由小兒啼哭。氣逆不順。乘虛而入。致令陰核偏大。又因肥甘不節。生冷過度。致生疝氣。氣結不行。流入陰中。或傷暑毒。或觸風邪。血氣與邪氣相搏。停結不散。遂成陰腫。

【治療】用青木香湯或立消散主之。

一 青木香湯

青木香(去蘆) 枳殼(炒)各半兩 甘草二錢半

右服二錢。水一盞。煎七分。不拘時溫服。

二 立消散

赤小豆 赤芍藥 生枳殼 商陸 風化朴硝（另研後入）各半兩

右不過火。剉晒爲末。柏枝煎湯候冷。調二錢。塗腫處。仍服吹咀五苓散。加車前子。薏苡仁。水煎服。

□ 脫肛

【病狀】有實脫及虛脫之分。虛脫者腸頭露出。面色青黃。指梢冰冷。唇色淡白。實脫則腸頭脫出。大便祕結。

【病因】虛脫者多因瀉痢日久。中氣下陷。腸胃薄弱。遂令肛門滑脫不收。熱脫者則因小兒積熱太盛。以致肛門作腫。大便艱難。努力翻出。則肛脫而不還矣。

【治療】虛脫者宜用蕪荑散。外以澀腸散摻之。實脫者。外用蟠龍散消其腫。苦參湯去其熱。內服薄荷散。自効。

白蕪荑(微炒) 龍甲(塗酥炙黃去裙襖) 蝮牛皮(炙令焦黃) 磁石(煆醋煎七遍研水飛)

各一兩 蝮蛇胆 黃連(去鬚微炒)各半兩

右搗羅爲末。用軟飯和。丸如黍米大。每服十粒。粥飯下。量兒大小加減。乳前食。

二 澀腸散

訶子 赤石脂 龍骨(煆)各等分

右爲細末。用蠟茶調敷。和藥摻腸頭上。棉帛揉入。

三 蟠龍散

乾地蟠龍一兩(略去土焙) 風化朴硝二錢

右剉爲細末。仍和勻朴硝。每以二錢至三錢。肛門溼潤者乾塗。乾燥者。用清油調塗。先用荆芥生葱煎

水。候溫洗浴。輕與拭乾。然後敷藥。

四 苦參湯

枳殼 黃連 大黃 甘草 荆芥 苦參 赤芍藥 黃芩各等分

右剉散。每用五錢。以車前子茅草同煎。薰洗。

五 薄荷散

薄荷(和梗) 骨碎補(去毛) 金櫻刺根七錢半 甘草二錢半
右剉碎。每服二錢。水一盞。入酒一大匙。煎七分。空心溫服。

六 單方

以魚腥草搗如泥。先以朴硝水洗過。用芭蕉葉托上。並坐之。自入也。(永類方)

黃括蕪一個。入白礬五錢在內。固封煨存性爲末。糊丸桐子大。每米飲下二十九。(摘元方)

用五倍子爲末。量多少摻患處。以物襯手揉入。(醫學綱目)

蒲黃一兩。豬脂二兩。煉成膏。塗腸頭上。卽縮入。(同上)

荊芥。皂角等分。煎湯洗之。(經經方)

香附子。荊芥穗等分爲末。每服一匙。水一大碗。煎十數沸。淋洗。(三因方)

□ 肛癢

【病狀】因蟲而癢者。其齒齦必無色。舌上盡白。四肢倦怠。上唇內有腫。唾血如粟。

【病因】此因大腸濕熱。滯滯。或溫毒生蟲。而蝕肛門而發。或因不潔而發。

【治療】生蟲者以雄黃散摻之。不潔者以金銀花煎水薰洗。

一 雄黃散

雄黃 銅綠各等分

右爲末。摻患處。

□ 語遲

【病狀】兒稍長應語而語遲。

【病因】由在胎時。母猝驚怖。內動兒臟。邪乘於心。心氣不和。舌本無力。故語遲也。

【治療】數歲不語者。服菖蒲丹。病後不語者。用鷄頭丸。

一 菖蒲丹

菖蒲一寸 遠志(去心) 桂心各一兩 人參(去蘆) 黃連(去鬚) 酸棗仁各半兩

右爲細末。煉蜜和丸如芡實大。每服一粒至二粒。煎生薑湯化下。不拘時服。

二 鷄頭丸

雄雞頭(炙)一個 鳴蟬(炙)三個 大黃(取實處炙紙裏煨熟) 黃芪(切焙) 川芎 遠志

(去心) 麥門冬(去心) 當歸(去蘆焙)各七錢半 人參(去蘆) 木通各半兩
 右同爲細末。煉蜜丸如小豆大。平旦用米飲下五丸。空心服。

鶴膝

【病狀】鶴膝風者。其腿漸細。其膝愈粗。狀如鶴膝。是以名之。

【病因】此內稟腎經不足。外邪所乘而患之。初則膝內作痛。外色不變。伸屈艱難。若一二月間。焮腫色赤。而作膿者。可治。腫硬色白。而不作膿者。難治。

【治療】初起用大防風湯爲主。成者宜用地黃丸。加鹿茸。牛膝。

一 大防風湯

附子(炮) 牛膝(酒炒)各一錢 白朮 羌活 人參 防風各二錢 杜仲(去皮薑製) 川芎
 肉桂(去皮) 黃芪(炒) 熟地黃(製)
 右每服三五錢。水煎。仍量兒大小用之。

二 地黃丸

熟地黃(洗焙)八錢 澤瀉(洗)二錢 牡丹皮(去心) 白茯苓各三錢 山萸肉 牛膝 鹿茸

(酥炙) 山藥各四錢

右爲末。蜜丸桐子大。三歲以下。二三丸。溫水空心化下。

□ 咽喉腫痛

【病狀】咽喉爲一身之總要。與胃氣相接。呼吸之所從出。若胸膈之間。蘊積熱毒。致生風痰。壅滯不散。發而爲咽喉之痛。喉內生瘡。或狀如肉腐。爲唾爲痛。窒塞不通。吐嚔不下。

【病因】咽喉之痰。本傷熱毒上攻也。四時受熱。藏心肺之間。一旦所觸。上攻咽喉。則腫痛矣。

【治療】宜外用吹喉散。內服牛蒡湯。內外夾施。見效甚速。

一 吹喉散

甘草(生)二錢半 朴硝一兩

右爲極細末。用小竹管吹入喉內。

二 牛蒡湯

牛蒡湯三兩(略炒細研) 大黃一兩半 防風(去蘆) 薄荷(去老梗)各一兩 荊芥(去根梗) 四兩 甘草一兩一錢半
右咬咀。每服二錢。水一盞。煎七分。無時溫服。

三 單方

牛蒡根搗汁。細細嚥之。(普濟方)

杏仁炒黑。研爛。含嚥。(同上)

目赤腫痛

【病狀】小兒目赤腫痛。

【病因】心主赤。赤甚。心實熱也。赤微。心虛熱也。其兩目羞明。眼胞腫痛。微有紫色者。肝受邪熱也。

【治療】實熱目赤。宜服導赤散。虛熱目赤。宜服九仙散。肝熱腫赤者。先以百解散發表。次投明目飲。自然平復矣。

一 導赤散

赤芍藥 羌活 防風各半兩 大黃 甘草各一錢
右爲末。燈心黑豆同煎。食後服。

二 九仙散

柴胡(去蘆) 蒼朮(米泔浸刮去皮炒燥)各二兩 赤芍藥 荆芥 甘草各六錢半 麻黃(劉
去節湯泡濾焙乾) 川芎 薄荷(連梗)各半兩 旋覆花(去老梗)三錢
右碎。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。不拘時溫服。

三 百解散

乾葛二兩半 升麻 赤芍藥各二兩 黃芩一兩 麻黃(製)七錢半 薄桂(去粗皮)二錢半
甘草一兩半

右碎。每服二錢。水一盞。薑二片。葱一根。煎七分。無時溫服。

四 明目飲

山梔子 淨香附各一錢 夏枯草(去梗)半兩
右剉。每服二錢。水一盞。蜜一匙。煎七分。無時拘服。

五 單方

生黃星。生大黃等分爲末。用醋調塗兩足心。(衛生總微)

羊肝切薄片。井水浸貼。(普濟方)

淡竹瀝點之。或入人乳亦可。(古今錄驗方)

□ 滯頤

【病狀】滯頤之病。乃小兒多涎唾流出。滯於頤下。

【病因】此由脾冷液多故也。脾之液爲涎。脾氣冷。不能收制其津液。故冷涎流出。滯於頤也。

【治療】溫胃散或溫脾丹皆可服。

一 溫胃散

丁香一兩 肉豆蔻 半夏(白礬水浸炒黃) 白朮 乾薑 甘草 人參(去蘆)各半兩
右搗羅爲細末。每服一錢。水八分。入生薑二片。煎五分。食前服。

二 溫脾丹

丁香 木香各一兩 半夏(用生薑六兩同搗細炒令黃)一兩 青橘皮 白朮 乾薑(微炒)各半兩

右搗羅爲細末。煉蜜和丸。如黍米大。每服十粒。米飲下。

□ 龜胸

【病狀】小兒胸前高脹滿。形如龜胸故名。

【病因】肺熱脹滿。攻於胸膈。又因乳母多食五辛而成。

【治療】因乳母多食五辛者。當以清胃散治其母。子亦服少許。因小兒肺熱脹滿。

則宜服寬氣散。

一 清胃散

生地黃 當歸 川黃連 升麻 牡丹皮

右方煎服。

二 寬氣散

杏仁(去皮尖炒) 桑白皮(炒) 橘紅 蘇子(炒) 枳實(麩炒) 枇杷葉(蜜炙) 麥門冬

(去心) 生甘草 苦苧藤

右各等分。水煎服。

□ 龜背

【病狀】小兒背高如龜。

【病因】小兒生後一百八十日。始髓骨成。方能獨坐。若強令兒坐之太早。即客風寒。吹著兒背及脊至骨。傳入於髓。使背隆如龜之狀。多成痼疾。

【治療】宜服松藥丹。

松藥丹

松花(洗焙乾) 枳殼(去瓢麸炒) 獨活 防風(去蘆)各一兩 川大黃(炮) 前胡 麻黃
(去節根) 桂心各半兩

右爲細末。煉蜜和。爲丸如黍米大。每服十粒。粥飲下。

□ 解顛

【病狀】小兒顛門開大。頭縫不合。宛如解開。

【病因】此由腎氣不足之故。其所以不足。乃因母氣血虛與熱故矣。
【治療】氣色精明。能飲食者。多服調元散。旬日有效。

一 調元散

乾山藥(去黑皮)五錢 人參(去蘆) 白茯苓(去皮) 白朮 白芍藥 熟地黃(酒洗) 當歸
(酒洗) 黃芪(蜜水炙)各二錢半 川芎 甘草(炙)各三錢 石菖蒲二錢
右碎。每服二錢。水一盞。薑二片。棗一枚。煎七分。無時溫服。

二 單方

生蟹足。白飲。各半兩。搗末。乳汁和敷。(保幼大全)

天南星炮去皮爲末。淡醋調緋帛上。貼顛門。熱物熨之。(聖惠方)

防風。柏子仁。白芨。各一兩爲末。乳和敷二十餘日。(墨娥小錄)

□ 顛陷

【病狀】小兒顛陷如坑。不能平滿。

【病因】小兒臟腑有熱。渴引水漿。致成泄利。久則血氣虛弱。不能上充腦髓。故顛

陷也。

【治療】內服防風升麻湯。外貼烏附膏有效。

一 防風升麻湯

麥冬(去心) 木通 甘草節 山梔 升麻 防風
右用淡竹葉水煎服。

二 烏附膏

雄黃二錢 川烏 附子(生)各五錢
右爲細末。用生葱和根葉細切杵爛。入煎藥末同煎。作成膏。每早空心貼顙處。

三 單方

水調半夏末。塗足心妙。(救急方)

烏頭附子並生用。去皮臍各二錢。雄黃八分爲末。葱白搗汁。和貼陷處。(勝方金)

□ 五遲

【病狀】五遲者。小兒坐行。生齒。言語。生髮。皆不能如其期也。

【病因】小兒行步艱難。齒不速長。坐不能穩。皆腎氣不足之故也。又足少陰爲腎之經。其華在髮。若少陰之血氣不足。即不能上榮於髮。故髮遲。又有驚邪乘人心氣。至四五歲。尙不能言者。

【治療】行遲。坐遲。齒遲者。先用加味地黃丸滋養其血。髮遲者。苜勝丹治之。語遲者。可參閱語遲條。

一 加味地黃丸

熟地黃一兩 山萸肉一兩 淮山藥(炒) 茯苓各一錢 澤瀉 牡丹皮各五錢 鹿茸(炙)三錢 五加皮五錢 麝香五分
右搗蜜丸如棗豆大。食前服。溫酒下十九丸。

二 苜勝丸

當歸(洗焙乾) 生乾地黃 芍藥各一兩
以上搗羅爲末。次用。

苜勝子二兩(研) 胡粉三錢(研細)

右用研勻。煉蜜和。製丸如黍米大。每服十粒。煎黑豆湯下。

三 單方

髮遲陳香薷二兩。水一盞。煎汁三分。入豬脂半兩。和勻。日日塗之。(永類鈴方)

齒遲取稻粒於齒路點三七下。其齒自生。(聖惠方)

五 軟

【病狀】五軟者。頭項軟。手軟。足軟。口軟。肌肉軟是也。頭軟者。項軟無力也。手足軟者。四肢無力也。肉軟者。皮寬不長肌肉也。口軟者。唇薄無力也。

【病因】五者皆因稟受不足。氣血不充。故骨脉不強。筋肉痿弱。

【治療】治宜補氣爲主。先以補腎地黃丸補先天精氣。再以扶元丸補其後天羸弱。漸次調理。五軟自強。

一 補腎地黃丸

熟地黃一兩五錢 山萸肉一兩 淮山藥(炒) 茯苓各八錢 牡丹皮 澤瀉各五錢 牛膝八

錢 鹿茸(酥炙)五錢

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服二錢鹽湯送下

二 扶元丸

人參 白朮(土炒) 茯苓 熟地黃 茯神 黃芪(蜜炙) 山藥(炒) 炙甘草 當歸 白芍

藥 川芎 石菖蒲

右各等分薑棗水煎服。

五鞭

【病狀】五鞭者。仰頭取氣。難以動搖。氣壅作痛。連於胸膈。脚手心而硬。故又名五

硬也。

【病因】此陽氣不營於四末也。

【治療】烏藥順氣散及加味六君子湯主之。

一 烏藥順氣散

麻黃 白芷 川芎 桔梗 枳殼(炒) 殭蠶(炒) 烏藥 炮薑 甘草(生) 橘紅

右各等分葱白水煎服。

二 加味六君子湯

人參 白朮 炮薑 陳皮 半夏(製) 茯苓 炙甘草 升麻(蜜炙) 柴胡(醋炒) 肉桂
 右水煎服。

齒痛

【病狀】牙痛連頭目。啼哭不休。

【病因】小兒牙痛。多因胃火妄動。

【治療】齒痛清胃散治之。

齒痛清胃散

升麻五分 生地黃 牡丹皮 黃連(炒) 當歸各三分
 右水煎服。

耳病

【病狀】常出黃膿者。為聾耳。出紅膿者。為膿耳。出白膿者。為纏耳疳。臭者為伍耳。

耳內虛鳴。出青膿者。為震耳。

【病因】證雖五般。病源一也。皆由風水入耳。而因有積熱上壅。若不早治。久則成聾。

一 龍骨散

枯礬 龍骨 胭脂胚各一錢 麝香少許

右爲細末。以綿裹杖子。拭去耳中膿。再將末吹入。加海螵蛸一錢尤妙。

二 單方

硫黃以粉吹耳中。日一夜一。(千金方)

硫黃和蠟作挺插之。日二易。(千金方)

桃仁炒研綿裹。日日塞之。(千金方)

以白礬麝香研勻。少少摻入耳。(衛生總微)

□ 鼻塞

【病狀】小兒鼻塞不通。呼吸困難。並非一日。

【病因】多爲風邪所致。

【治療】此證宜服消風散。若驚悸發熱者。則服薄荷散。

一 消風散

茯苓 川芎 羌活 荊芥穗 防風(去蘆) 藿香 僵蠶 蟬蛻(去嘴爪) 甘草(炙) 厚朴
(製) 陳皮(去白)各等分
古爲末。每服五分。茶清調下。

二 薄荷湯

薄荷葉五錢 羌活 麻黃(去節) 甘草 僵蠶(炒)各一錢 天竺黃 白附子(半煨)各二錢
右爲末。薄荷湯下。

三 單方

以槐葉爲末。人乳調。厚塗額門上。(莊氏家傳)

大天南星一個。微炮爲末。以淡醋調塗紅帛上。以貼額上。熱手頻熨之。(張雞峯方)

□ 鼻瘻

【病狀】小兒鼻中生瘻肉。

【病因】多因肺熱所致。

【治療】用千金方治之多効。

千金方

通草 細辛各一兩

右二味搗末。取藥如豆。著綿纏頭。塞鼻中。日二次。

客忤

【病狀】吐黃白色。水穀解離。其面變易五色。腹痛反倒。厥狀似癇。

【病因】此由小兒神氣軟弱。忽有非常之物觸之。與兒神氣相忤而發者。

【治療】急用安神丸治之。或先用通關散擦牙齦。

安神丸

生犀末半錢 雄黃(研) 人參 茯苓 車前子各一分

右爲末。取桃白皮一兩。桃符一兩。二味以水三升。同煎至一升。去滓。更煎如膏。和前藥爲丸。如麻仁大。每服三丸。芍藥湯下。

吐

【病狀】面赤唇紅。吐次少而出多。乳片消而色黃。遍體熱甚。或食熱物精神不振。而多煩躁。此熱吐也。眼泡浮腫。面色微黃。足冷腰熱。晝輕夜重。吐黃酸水。或有清痰。或宿食併出。此積吐也。面目微脹。額上有汗。吐涎夾乳。小便清利。此寒吐也。

【病因】論吐之原。難以枚舉。其吐雖同。其因不一。茲姑略之。

【治療】寒吐服白朮散。熱吐服麥門冬散。積吐用烏犀丸。倉卒未辨其因。可用朱沈丹。

一 白朮散

白朮 人參 半夏麩各二錢 茯苓 乾薑 甘草各一錢

右爲末。每服二錢。水一盞。薑三片。棗一枚。煎七分溫服。

二 麥門冬散

麥門冬 半夏 人參 茯苓各二錢 甘草一錢

右爲末。每服二錢。水一盞。薑三片。煎至五分。溫服。日二三。

三 烏犀丸

皂莢(煨)七錢 硫黃 白薑各三錢半 陳皮(去白) 川烏(炮去皮臍)各五錢 巴豆(去殼心存油)七十七粒製丸服

四 朱沈丹

朱砂二錢半 沈香二錢 藿香三錢 滑石半兩 丁香十四粒
右爲細末。每服半錢。空心用水送下。

五 單方

鹿角粉。大豆末等分。和乳調塗乳上飲之。(古今醫驗方)
五倍子兩個。一生一熟。甘草一握。濕紙煨過。同研爲末。每服半錢。米泔調下。立瘥。(經驗方)
白附。藿香。等分爲末。每米飲下半錢。(保幼大全)

□ 中惡

【病狀】其狀先無他病。卒然心腹刺痛。悶亂欲死。腹大如滿。脉緊而浮者死。緊細

而微者生。

【病因】小兒中惡者。是鬼邪之氣。卒中於人。

【治療】先下蘇合香丸。未醒。以皂角末搐鼻。次服沉香降氣散。加人參茯苓。

一 蘇合香丸

蘇合香油五錢（入安息香膏內） 安息香一兩（另為末用酒熬膏） 丁香 青木香 白檀香

沉香 藁攬 香附末 訶子（煨取肉） 烏犀（鎊屑） 硃砂（研水飛）各一兩 薰陸香 片腦

（研）各五錢 麝香七錢半

右為細末。用安息香膏。入煉蜜和劑。圓如芡實大。空心用沸湯下。小兒一丸。

二 沉香降氣散

降真香 沉香 白膠香 虎脛骨（酥炙） 人參 鬼箭 草龍胆各五錢

右為末。次入雄黃五錢。麝香一錢。煉蜜丸。乳香湯化下。

□ 卒死

【病狀】小兒暴絕而死。

【病因】是三虛而遇賊風。故無病倉卒而死也。

【治療】救卒死而壯熱者。用礬石半斤。水一升半。煮消以漬脚令沒踝。或用女青末半錢。用牛乳汁調服之。

一 單方

以苦參醋煮汁少許。納口中。即蘇。水煮亦得。（聖惠方）

煎鹽湯令極鹹。以物拗開口灌之。令入腹。即活。（同上）

□ 瘡瘍

【病狀】小兒滿身瘡瘍。始生微癢而熱輕。甚則腫痛潰爛。寒熱大作。

【病因】多因臟腑不調。經絡壅滯而得。或由胎毒。

【治療】內服當歸散加黃連。升麻。乾葛。水薑葱燈心煎服。外敷一抹金。良效。

一 當歸散

當歸（焙） 麻黃（去根節）各半兩 羌活 酸棗仁（微炒） 人參 杜仲（微炙） 桂心各二錢
半

右爲細末。每服一錢。

二 一抹金

藜蘆(淨洗焙) 蛇牀子(去埃土) 紅丹(水飛)各五錢 硫黃 赤石脂 明白礬(水飛) 五

倍子(去蟲屑) 黃柏(去粗皮)各二錢半 輕粉五貼

右爲末。仍用輕粉。入乳鉢內再杵勻。用生肥豬膏。碎切。以瓦鉢和藥末爛杵。塗抹患處。或清油調搽亦可。

丹毒

【病狀】小兒身上及面上片片如胭脂塗染。皆腫而憎寒壯熱。鼻塞腦悶。或上氣痰喘。如毒入腹。則腹脹硬氣。必致殺兒。

【病因】此證雖有多種。病源則一。皆由血有風毒乘之。

【治療】宜速敷以鬱金散。

一 鬱金散

川鬱金半兩 赤小豆一合 甜葶藶半兩 伏龍肝二兩 川芒硝半兩 生川大黃半兩

右爲末。以生雞子白並蜜少許。令稀稠得所塗之。乾再塗。

二 單方

伏龍肝爲末。以雞子白和傅。乾易之。(千金方)

用蜜和乾薑末傅之。(肘後方)

綠豆五錢。大黃二錢爲末。用生薄荷汁。入蜜調塗。(全幼心鑑)

柳葉一斤。水一斗。煮取汁三升。溫洗赤處。日七八度。(廣利方)

寒水石末一兩。塗之。(集元方)

醋和蕎麥麵塗之。(證治準繩)

□ 疔瘡

【病狀】其瘡多生頭面四肢。形色不一。或如小瘡。或如水泡。或痛或癢。或麻木不仁。外證寒熱。熱嘔惡心。肢體拘急。

【病因】諸瘡惟疔毒爲甚。殺人甚速。此症多因乳母多食有毒之物。或兒卒中飲食之毒。或感四時不正之氣。皆能致之。

【治療】若人事不省。牙關緊閉。急以奪命丹爲末。熱酒調灌。

奪命丹

眞蟾酥(乾者酒化) 輕粉 枯白礬 寒水石 銅綠 乳香 沒藥 麝香 硃砂各六錢 蝸牛四十個(另研)無亦無礙

右各爲末。入蟾酥蝸牛或加酒少許。糊丸綠荳大。每服一二丸。溫酒或葱湯下。

時毒

【病狀】患兒鼻面耳項或咽喉。一併赤腫。寒熱頭痛。甚者恍惚不寧。咽喉閉塞。

【病因】此由感四時不正之氣而發。故名時毒。

【治療】時毒口唇連牙腫痛者。用犀角升麻湯。大便祕結者用梔子仁湯。

一 犀角升麻湯

犀角二錢 升麻 防風 羌活 川芎 白芷各五分 黃芩 甘草各一錢 白附四分
右每服三五錢。水煎服。

二 梔子仁湯

鬱金 枳殼(麩炒) 升麻 山梔仁 牛蒡(研炒) 大黃(炒)
右各等分。爲細末。每服三錢。蜜水煎服。

□ 天泡瘡

【病狀】天泡瘡生於滿身。狀如水泡。發熱。癢痛。邪在表也。發熱咳嗽。邪在肺也。熱渴便秘。邪在內也。

【病因】此症屬肺胃二經之風熱。

【治療】邪在表者。宜服人參敗毒散。邪在肺者。宜服加味瀉白散。邪在裏者。宜服加味清涼飲。外敷金黃散。見效。

一 人參敗毒散

人參 茯苓 川芎 羌活 獨活 前胡 柴胡 枳殼(麩皮炒) 桔梗 甘草(炒等分)
右每服二三錢。水煎。

二 加味瀉白散

桑皮(蜜炙) 地骨皮 甘草(生) 川貝母(去心) 麥冬(去心) 知母(生) 桔梗 黃芩

薄荷

右水煎服。

三 加味清涼散

當歸 赤芍藥 甘草(炙) 大黃(炒)各三分 山梔(炒)三分 牛蒡子(炒杵)四分

右水煎服。

四 金黃散

滑石 甘草

右各另爲末。和勻。傅患處。如泡挑去水傅之。加黃柏尤好。

□ 楊梅瘡

【病狀】其症多起於下部。治失其宜。多致蝕傷眼目。腐敗腎莖。拳攣肢節。故初起時。小兒皮膚發生無數之紅疹。而手掌足蹠起梅毒性天泡瘡時。卽宜早

爲診治。

【病因】多由淫夫御不潔之婦。傳染而致。

【治療】初起時先用荊防敗毒散。下體多者。先用龍胆瀉肝湯。大便秘者。用大連翹飲。後用換肌消毒散。

一 荊防敗毒散

防風 荊芥 羌活 獨活 柴胡 前胡 生甘草 川芎 枳殼(麩炒) 桔梗 茯苓
右用薑水煎服。

二 龍胆瀉肝湯

龍胆草(酒拌炒黃) 澤瀉 車前子(炒) 木通 當歸(酒拌) 生地黄(酒拌) 山梔 黃芩
(炒) 甘草各三分
右水煎。食前服。

三 大連翹飲

柴胡 荊芥 連翹(去心) 木通 滑石(水飛) 梔子 蟬退(去足翅) 瞿麥 當歸(酒洗)
赤芍藥 黃芩 甘草(生) 防風
右水煎服。

四 換肌消毒散

土茯苓 當歸 白芷 甘草 皂角刺 薏苡仁 白鮮皮 木瓜不犯鐵器各等分
右水煎。食前並空心服。

五 單方

起於口內。延及遍身。以土革解末。乳汁調服。自愈。（外科發揮）

惡核瘰癧

【病狀】瘰癧一證。又名九漏。形狀非一。不過隨象命名。大概初發於頸項肌肉之間。

【病因】小兒遇風熱毒氣。與血氣相搏。結成頑核。生於頸項。遇風寒所折不消。遂成瘰癧。久則潰膿成瘡。

【治療】宜服升麻湯或龍胆湯。

一 升麻湯

升麻 射干 連翹 犀角屑 大黃（微炮） 朴硝各半兩

右咬咀。水煎。大小加減。忌酒麵炙博物。

二 龍胆湯

龍胆湯 鈎藤 柴胡 黃芩 桔梗 芍藥 茯苓 甘草各六銖 螻螂二枚(去翅俱炙) 大黃(煨)一兩

□ 疥瘡

【病狀】小兒頭目及遍體生瘡。或腫或癢。或膿水浸淫。

【病因】一因小兒經絡蘊熱。一因娠母飲食之毒。

【治療】內服當歸飲子。外敷立效散。輕者旬日可愈。

一 當歸飲子

當歸(去蘆) 赤芍藥 川芎 生地黃 蒺藜(炒去刺) 荆芥穗 防風(去蘆)各一兩 何首烏 黃芪(去蘆) 甘草(炙)各半兩

右剉碎。每服四錢。水一盞。薑三片。煎六分服。

二 立效散

定粉(末) 松香(末) 黃柏(末) 黃連(末)各一兩

右各另爲末。用清油調搽。

□ 口瘡

【病狀】口舌齒齦。生如瘡狀。

【病因】因乳哺失節。或母食膏粱積熱。或乳母七情鬱火所致。

【治療】先服清胃散。外搽牡蠣散效。

一 清胃散

升麻五分 生地黃四分 黃連 牡丹皮各三分 當歸梢四分

右水煎服。嬰兒母亦服。

二 牡蠣散

牡蠣(煨通紅取出候冷研細紙裹入土中七日出毒)三錢 甘草(炙爲末)一錢
右和勻。時時挑少許。搽口中。或吐亦無害。

□ 便毒

【病狀】小兒陰莖腫硬作痛紅赤。漸成膿。

【病因】便毒多因肝火肝疔。或稟肝經熱毒。

【治療】初起先服龍胆瀉肝湯一二劑。腫痛再不減。則服仙方活命飲二劑即愈。

一 龍胆瀉肝湯

龍胆草(酒拌炒黃) 澤瀉 車前子(炒) 木通當歸(酒拌) 生地黃(酒拌) 山梔 黃芩

(炒) 甘草各三分

右水煎。食前服。

二 仙方活命飲

金銀花 橘皮各三分 皂角刺(炒) 穿山甲(蛤粉同炒) 防風 沒藥 白芷 乳香 當歸

各一錢 貝母 天花粉 甘草節各八分

右每服五錢。酒煎服。爲末。酒調服亦可。

□ 脚凍瘡

【病狀】脚因受寒。以致氣血凝滯。久而不愈。則潰爛成瘡。

【病因】因受稟虛怯。故寒邪易乘。氣血凝滯而成瘡。

【治療】外用敷寒藥。內勿服消毒之劑。否則元氣受傷。必成敗證。宜搽白蘇散或
用火酒磨擦之。

白蘇散

白蘇一兩 黃柏(炒黑)五錢

右爲末。乾摻患處。

湯火瘡

【病狀】小兒爲湯火所傷。始爲水泡。繼則爲爛。

【治療】宜即搽乳香定痛散。

乳香定痛散

乳香 沒藥(各五錢) 滑石(一兩) 冰片(一錢)

右爲細末。搽患處。痛即止。

附錄一

保嬰要訣

□ 哺乳

凡母有憂怒新浴酒醉淫慾等事。切勿與乳。恐致吐瀉等。母睡勿與乳。恐食乳過多而傷脾胃。並有阻止小兒呼吸之患。兒睡若啼哭。亦勿與乳。因氣息不調。停滯胸膈。不能消化。致生痰熱等。凡小兒平時。與有病時。因啼哭母卽與乳慰之。豈知小兒因病而哭。非欲食乳。卽下肚則乳汁化爲堅韌細片。堆積腸中。難於消化。變爲頑痰。豈有不生病之理。平時乳後不得與食。哺後不得與乳。蓋乳食相併。難以化。大則成癖。小則成積。疝氣卽自此始。慎之。

□ 乳母之選擇

選擇乳母。年須三十五歲以下者。體格健全。不過肥過瘦者。面色紅潤。無有傳染遺傳神經梅毒萎黃各種暗疾者。乳房宜充實高起。乳汁白色甘濃。其子女無疾病健全者。方可僱用。否則切不可僱。

□ 護乳

乳爲小兒食料。如菜飯焉。最宜新鮮清潔。時要加意保護。不可感受寒暑。如受暑。須將乳頭去些乳。然後揉勻。始與兒吮。如感寒。其法亦同。且乳母食宜清淡。若食重油。恐兒吮生痰。此最是不治已病而治未病之道。

□ 乳時

小兒吮乳。須有一定時間。每日約六七次。饑飽以時。臟腑安和。疾病自少。乳如不足。牛乳等物。嫌其滯脾。且易陳腐。傷人致疾。不如用米粉稀糊。每日與乳相間。飼一二三次不等。平淡鮮潔。似較有益。若恐有滯。每一星期。可用炒查肉。炒穀芽各少許煎服。蓋查肉能消乳積。穀芽能消糊積也。

□ 沐浴

五六週後。小兒宜每日沐浴一次。冬日可數日一次。浴法宜擇無風之處。水取溫暖。放入礪砂少許。以細軟浴布。用上等香皂畧擦之。浴後以法蘭絨拭之使乾。再以爽身粉撲之。浴時不可過久。恐受外感也。

□ 被服

小兒衣服。暑天勿用薄綢薄布。恐其太涼受寒。冬天勿用新棉厚棉。恐其太暖生熱。被不宜厚。恐鬱熱易發風火等症。且亦夜啼不能安神。語云。若要兒身安。常帶三分飢與寒。此之謂也。

□ 換屎尿片

換屎尿片。最忌當風。如要用水揩拭。須用溫水。其屎尿片。日晒須要攤涼。火烘須要退熱。如此庶可免風寒暑濕燥火等症。

□ 睡臥

小兒睡眠。每日至少要十四小時。日間不可當風。亦不可遮緊。夜間俟吮乳飽後。須與母離開。若抱緊睡。誠恐過煖生熱。又恐母氣呼吸。吹乳顛門。變生諸症。此亦慎疾之道也。

□ 保抱

小兒除吮乳外。勿常保抱。宜安置有輪床筐內。動搖嬉戲。使之肢體舒適。氣血宣

暢。心神和樂。自然無病。且暑天多抱。鬱熱易成瘡癤。尤非所宜。

□ 扇與火

婦人暑天畏熱。最喜揮扇。日間對兒醒揮。尙易致疾。况夜間兒睡。毛孔大開。而亦在床對之手不停揮。致兒感受風寒。深入臟腑。或咳嗽。或發熱。或腹痛。或吐瀉。變生諸症。所以小兒之病。入夏更多者。職是故也。而婦人冬天畏冷。又喜薰火。恐兒亦冷。將火放於桶下。將兒立於桶上。甚致火熾熱炙。啼哭不已。而亦不顧。以致鬱熱成症。而不自覺也。

□ 居室

居室清潔爽。空氣流通。使兒居之。自然少病。若污穢湫隘。窗戶閉塞。夏或暑盛。冬或寒多。則小兒未有不疾病叢生者。故余每至病家診疾。衣食之外。必教其注意居室爲第一要義。

□ 雜食

小兒能食。最喜糕餅水果等類。而父母愛子。又往往市而與之。不知所市諸物。糕

餅多未熟透。水果多係生冷。且日晒蠅嘍。或是陳腐。小兒食之。極傷脾胃。疝積等症。多從此起。萬一要食糕餅。只好用米麥粉自製。水果只好擇花生。荸薺。蔗橘等類與之。不然。還以粥飯爲最養人。

□ 護眼

小兒早起。宜用硼酸水（即硼砂水）一分。和入百分之熱水。待冷以細紗布洗之。可免各種目疾。又小兒平常亦不宜穿着紅色衣服。因刺激力太強。易傷小兒目力故也。

□ 口齒

宜常以藥水棉花纏指。蘸硼酸水洗兒口內。牙床。上顎等處。可勉防馬牙。口瘡等症。最注意者。小兒之口。切不可使乳母及他人吻之。恐有細菌侵入。爲害無窮。此種惡習。急宜改除。

□ 勿輕服藥

小兒無病。切不可輕服丸藥與針灸。市售保赤抱龍各種套藥。萬不可輕服。此內

皆辛竄之藥。無風能引風。其害甚大。藥不可輕用。攻下之味。致令下焦虛而上焦熱。轉成重病。殊足可懼。有子女者。勿輕爾服藥。以傷兒身爲要。

□ 衛生要言

兒始生肌膚成。不可煖衣。煖衣則令筋骨緩弱。宜時風日。若不見風日。則令肌膚脆軟。便易損傷。

嬰兒皆當以故絮著衣。莫用新棉。天氣和煖無風之時。令母將抱日中嬉戲。數見風日。則令血凝氣剛。肌肉硬密。堪耐風寒。不致病作。至要。至要。

嬰兒又當習薄衣之法。當從秋習之。不可以春夏卒減其衣。則令兒中風寒。嬰兒又當消息。無令汗出。汗出多則致虛損。便受風寒。晝夜寤寐。皆當戒之。

初生兒。出月必須人襁褓。襁褓之道。必須得宜。如春夏之月。乃萬物生長之時。宜教令地臥。使之不逆生長之氣。如秋冬之月。乃萬物收藏之時。宜就溫煖之處。使之不逆收藏之氣。然後血凝氣和。則百病無自入矣。

人生十六歲以前。血氣俱盛。如日方升。如月將圓。惟陰常不足。養之道。不可不

謹。童子不衣裘帛。前哲格言。具在人耳。

小兒乳哺。須要得法。乳後不得便與食。哺後不得便與乳。小兒脾胃怯弱。乳食相併。難以尅化。周歲以上。必成乳癖食癖。於腹中作痛作熱。疴病卽從此起。血氣俱盛。食物易消。故食無時。然腸胃尙脆而窄。若稠黏乾硬。酸鹹甜辣。一切魚肉水果。濕麵燒炙煨炒。俱是發熱難化之物。皆宜禁絕。只與熟菜白粥。非惟無病。且不縱口。可以養德。此外生栗味甜。乾柿性涼。可爲長陰之助。然栗太補。柿太澀。俱爲難化。亦宜少與。婦人無知。惟務姑息。畏其啼哭。無所不與。積成痼疾。雖悔何及。所以富貴驕養。有子多病。迨至成人。筋骨柔弱。有食則不能忌口。以自養。居喪則不能食素。以盡禮。小節不謹。大義亦虧。可不慎歟。至於乳母。尤宜謹節。飲食下咽。乳汁便通。情欲中動。乳脈便應。病氣到乳。汁必凝滯。兒得此乳。疾病立至。不吐則瀉。不瘡則熱。或爲口糜。或爲驚搐。或爲夜啼。或爲腹痛。病之初來。其溺必少。便須詢問。隨證治母。母安亦安。可消患於未形也。乳母血氣。爲乳汁也。五情善惡。悉血氣所生。宜戒喜怒。一切禁忌。

盛啼不可食乳。恐氣逆不順聚而爲逆。亦能成驚風也。

凡乳兒不可過飽。飽則溢而成嘔吐。若乳來多猛取出。按後再乳。

小兒啼未定。氣息不調。母不可以乳飲。蓋恐乳不能下。停滯胸膈。則爲嘔吐。

怒乳令兒疝氣腹脹。寒乳令兒爛片不化。熱乳令兒面黃不食。壅乳令兒吐逆生

痰。醉乳令兒恍惚多驚。淫乳令兒必發驚癇。

小兒過煖生熱。熱極生風。提抱生癰。餵飼生癖。最宜慎之。

附錄一

小兒病自己診斷法

□ 三關主病

小兒食指有三關可辨。男左女右。從下數上。旁有脈紋隱現。宜細看之。

第一關名曰寅關（卽風關）。如脈紋青紫。心肝有病。主驚搐。口舌生瘡。發熱。四肢厥逆。不食。黃白紋。主食停胃口。腹脹痛。色黑者不救。

第二關名曰卯關（卽氣關）。如脈紋青紫。心肝受病。日久成疔。發熱頭暈。驚怖。

面赤口乾。黃白紋疔病在脾肺。吐瀉發熱。咳嗽吐痰。黑紋疔病在腎。繞耳生瘡。作痛作脹。

第三關名曰辰關（卽命關）如脈紋青赤。通過三關。直上爪甲。胃絕多死。

又訣

小兒食指辨三關。男左女右一般看。一風二氣三命關。說與醫家仔細詳。左手紅色是綫色。須知發熱又兼驚。右手脈紋如左樣。脾傷驚積一時生。紋頭有似三叉樣。肺氣生痰喘作聲。色青應有傷寒症。若是宣紅瀉定生。指脈深青不暫停。微青腹痛糞多青。若兼黑色盤腸疔。眼搐牽抽不得寧。小兒指脈深紅色。發搐驚時目強直。微紅下痢腹中痛。吐瀉脾虛多不食。指上紋生紫色深。驚時啼叫又呻吟。微微紫色腸中痛。若是紋彎主惡心。

虎口脈紋歌

大指與食指之間曰虎口

虎口脈紋多。須知氣不和。色青驚積聚。下痢瀉如何。青黑慢驚發。入掌內鈞多。三關急通過（言食指之三關）此症必成疔。

□ 診寒熱病法

用三指曲按小兒額上。食指居上。中指居中。名指居下。若三指俱熱。風熱也。三指俱冷。吐瀉也。食指熱。胸膈氣滿也。名指熱。乳食不消也。

□ 聽聲法

聲輕者。氣弱也。重濁者。風也。痛也。高喊者。熱將狂也。聲急者。神驚也。聲塞者。痰也。聲戰者。寒也。聲強者。熱也。氣喧者。氣不順也。喘者。氣促也。逆者。噴嚏也。氣與風也。呵欠者。倦而陰陽雜也。又風也。聽其聲而審之。凶吉可知矣。所謂聞而知之也。

□ 觀色法

色青病在肝。色紅病在心。色白病在肺。色黑病在腎。色黃病在脾。若青而兼紅。心與肝二經之病。面青者。風也。紅者。熱也。白者。寒也。黑者。腎氣敗也。黃者。脾氣虛也。哭者。病在肝也。多痰啼者。肺有風也。唾者。腎有虧也。所謂見而知之也。

□ 看小兒傷寒傷熱傷風傷食法

指冷面青。躁而惡寒。左額有青紋。此傷寒也。掌心有汗。面色青紅。人中青紋。獨處

不寧。時發驚悸。似驚非驚。此傷熱也。面赤鼻塞。清涕交流。手足煩躁。此傷風也。眼
眶或腫。右額紋青。頭肚俱熱。胸膈不寬。腹脹而吐。此傷食也。

□ 小兒危症歌

鼻乾黑燥。面黯黃焦。冷汗如油。鴉聲魚口。吐瀉不定。精神不爽。唇若塗硃。太衝無
脈。爪甲青黯。耳如煤染。服藥不化。便溺無知。氣急口張。舌捲囊縮。目直視而無光。
腳龍抱而屈曲。縱有丹丸。將安施治。又如藥不下咽。通關不噎。臍突胸腫。眼陷唇
青。或手足冷如凝冰。或喉中響如截鋸。眉黑入耳。目赤貫瞳。與夫瀉痢如筒。丹毒
遍身似火。唇不蓋齒。汗臭沾身。四肢不收。兩眼白膜。驚癇後而喘發。吐瀉後而嗽
加。瀉止復瀉。眠而又眠。鼻孔張開。手足心腫。吐瀉思酒。下痢如肝。或實胸而陷胸。
或舒舌而弄舌。或人中滿而齒黑。或頭髮直而飢枯。將手抱頭。脈青過命。皆死症
也。

□ 决死症歌

吐瀉膨脹。爪甲青。氣喘搖頭。手抓人。筋過三關。漁刺樣。忽然大叫。必歸陰。齒如解

鋸目生絲。角弓反張。目吊之。十指無血。兼聲啞。項軟如綿。死可知。白如枯骨。黑如煤。赤似塗硃。凝不開。目青面黃。人不救。四時黃潤。不須哀。十銓穴內布針。施此術。人問識者稀。紅紫血流。人即醒。若然化水。不能醫。要知兒病生與死。先觀顏色聽聲音。唇青耳黑。人難救。哭聲不響。赴幽冥。鵝聲魚口。頂門高。直視目。莖舌黑焦。騰蛇鎖口。筋盤肚。吐痰不住。併頭搖。

□ 決死症日數歌

面色紫兮心氣絕。五日之中亡可知。面青目陷絕肝經。三日云亡也可驚。面黃肢腫脾氣衰。九日以來實可哀。面目鼻張絕肺經。三日之中定見陰。齒黃熟豈胃家敗。一日闔君來索債。面如紫黑腎家強。四日之間命必亡。口張唇青舌黑枯。脈絕五朝人必殂。凡兒足腫併身重。便不禁兮睛不動。藥餌針刺不須加。免使亡兒空受痛。至於病後面目黃。將愈之兆喜非常。朝夕生意漸漸回。不久可以慶安康。病前病後宜安察。術者還須仔細詳。

□ 看初生小兒病法

凡看初生小兒之病。以手捻其頭。摸其頤。頤不作聲者。爲無病。縱有病。以手指探其口。雖發聲而從容。咂指者。其病輕。若卽發聲不咂指。而色或青紅兼紫者。此落地受風寒之甚也。其病重。若牙關緊閉。不能納乳。牙根硬勁。其病極重。此驚邪入於膀胱胃經也。須急治之。且初生小兒。若見肥胖。而面目覺好看。此根本不堅。甚非佳兆。必易感邪。凡父母肥者。不可生肥兒。父母瘦者。亦不可生肥兒。生而肥胖。其氣必虛。一切薑葱湯不可多服。如面轉微黃。則吉兆。生兒怯弱。其血必虛。一切寒涼之劑。不可妄投。若七日之內。肌肉頓肥。則必病矣。過此以往。漸肥者。又爲吉兆。

□ 審察小兒病源法

凡病有諸內。必形諸外。小兒之病。旣不能語言。先憑一望法。次以脉應之。斯爲醫理。夫望之之法。審其苗竅。察其形色。而虛實寒熱。已得其大半矣。舌乃心之苗。紅紫心熱也。腫黑心火極也。淡白虛也。鼻準與牙牀。乃脾之竅。鼻紅燥脾熱也。慘黃脾敗也。牙牀紅腫熱也。破爛脾胃火也。唇爲脾胃之竅。紅紫熱也。淡白虛也。如漆

黑者。胃將絕也。口右扯肝風也。左扯脾之痰也。鼻孔肺之竅。乾燥熱也。流清涕。寒也。耳與齒乃腎之竅。耳鳴氣不和也。齒如黃豆。腎將絕也。目乃肝之竅。勇視而轉睛者。風也。直視而不轉睛者。肝氣絕也。以目分言之。又屬五臟之竅。黑珠屬肝。純是黃色。凶症也。白珠屬肺。色青。肝風侮肺也。淡黃色。脾有積滯也。老黃色。脾有濕熱。痘證也。目發黃。溺黃赤。安臥者。黃疸也。已食如飢者。胃疸也。瞳人屬腎。無光彩。又兼發黃。腎氣虛也。大角屬大腸。破爛肺有風也。小角屬小腸。破爛心有熱也。上皮膚屬脾。腫脾傷也。下皮屬胃。青色。胃有寒也。上下皮睡合不緊。露一線縫者。脾胃虛極也。面有五位。五臟各有所屬。額屬心。左顙屬肝。右顙屬肺。唇之上下屬腎。五臟異也。六腑表也。小腸心之表。小便短黃澀痛。心熱也。清利而長。虛也。胃乃脾之表。唇紅而吐。胃熱也。唇淡白而吐。胃虛也。唇色平常而吐。作傷胃論。大腸肺之表。閉結。肺有火也。肺無熱而便閉。必血枯。不可通下。脫肛。肺虛也。胆乃肝之表。口苦。肝熱也。聞聲着嚇。肝虛也。膀胱腎之表。居臍下氣海之右。有名無形。筋腫筋痛。腎水之寒氣入膀胱也。面有五色。一曰紅。紅病在心。面紅者熱。一曰青。青病在肝。面

青者痛。一曰黃。黃病在脾。面黃者脾傷。一曰白。白病在肺。面白者寒。一曰黑。黑病在腎。面黑而無潤澤者。腎氣敗也。望其色若異於平日。而苗竅之色與色相符。則臟腑之虛實。無有不驗矣。

□ 看小兒壽夭法

凡看小兒。以聽聲爲先。察色爲次。其聲音清亮者壽。澀者病。散而無出聲者夭。忽然大聲而無病者。須細看其身。恐有瘡毒。又或衣沾針刺之類。

臍帶中無血者壽。臍帶銀白色者壽。短帶紫脹者。於斷帶之後。捻去紫血。可保無害。

額皮寬者壽。

初生二三日內。面轉黃色吉。

生下粉白花色者。必主臍風而夭。

生下皮肉不光者。必夭。

泣而無淚者夭。

無糞門者天。

臀肉不生者天。

臍帶短大紫者天。

生下渾身銀白色有天。

□ 小兒服藥法

用水一二杯煎藥。性溫熱者。食乳前服。性寒涼者。食乳後服。性和平者。隨時服之。不必拘定可也。