

0
1cm
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館



丹溪心法附餘卷之二

外感門

中暑

丹溪心法

○暑證用黃連香薷飲

扶掖加半夏南星

如虛加參

菖 暑病內傷石用清暑益氣湯

暑氣一作風

是痰用吐

注夏屬陰虛元氣不足夏初春末頭疼脚軟食少體熱

休寧東山古庵方廣約之類

下書

五圖 附暑風 注夏

注



者是宜補中益氣湯去參胡升麻加炒栝白芍藥茯苓者
加南星半夏陳皮煎服又或用生脈湯 暑風挾痰挾火
實者可用吐法

暑乃夏月炎暑也盛熱之氣着人也有冒有傷有中暑
者有輕重之分虛實之辨或腹瀉水瀉者胃與大腸受
之惡心者胃口有痰飲也此一者冒暑也可用黃連香
薷飲清暑益氣湯益黃連退暑熱香薷消暑水或身熱
頭疼燥亂不寧者或身如針刺者此為熱傷在肉分也
當以解毒湯白虎湯加柴胡如氣虛者加人參此為傷
暑或咳嗽發寒熱盜汗出不止脈數者熱在肺經用清

肺湯柴胡湯天水散之類急治則可遲則不救盛火乘
金也此為中暑凡治病須要明白辯別慎勿滾同施治
春秋間亦或有之切莫執一隨病處方為妙

戴云暑風者夏月卒倒不省人事者是也有因火者有
因痰者火君相二火也暑天地一火也內外合而炎藥
所以卒倒也痰者人身之痰飲也因暑氣入而鼓激痰
飲塞碍心之竅道手足不知動躡而卒倒也此二者
皆可吐內經曰少陽則發之吐即發散也量其虛實而
吐之吐醒後可用和調治之

入方 治暑渴

生芩一錢

麥門冬一錢

牛膝一錢

炒柏一錢半

知母八分

生薑一分

官甘草三分

右剉作一服水一鐘煎七分溫服

附脈理

書

脈訣舉要曰暑傷於氣所以脈虛弦細扎遲體狀無餘

附諸方

黃龍丸

治伏暑發熱煩渴嘔吐惡心

黃連二斤

右以好酒五升煮乾為末新麵糊丸梧子大熱湯下二十

丸

玉露散 張子和方治暑渴

寒水石

滑石

館石膏

括樓根各二

甘草一兩

右為細末每服五錢新水調服

枇杷葉散 和劑方治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目

昏眩

枇杷葉

去毛炙

汪

香薷七錢半

白茅根

麥門冬

去心

甘草炙

乾木瓜

各一

丁香

陳皮

去白

厚朴

法斂

右為末每服二錢水一鐘姜三片煎服

如止渴燥去

丁香加知母冷水調下

○已上諸方主渴之劑

生脈湯 生津止渴

人參一錢 麥門冬二錢 五味子八分

右剉水一鍾煎七分服

人參白虎湯 徐同知方 治伏暑發渴嘔吐身熱脈虛自汗

人參一錢 知母二錢 石膏半兩 甘草炙一錢

右咬咀入粳米一合水二鍾煎至一鍾不拘時熱服如

伏暑作寒熱未解宜和五苓散同煎服伏熱後或冷水

沐浴或喫冷物清氣在脾不覺散今日晡作寒慄壯熱

渾身洒淅宜加桂煎服出汗便解

竹葉石膏湯 治伏暑內外發熱煩燥大渴見溫病

○已上諸方補虛止渴之劑

香薷飲 和劑方治伏暑引飲口深咽乾或吐或瀉並皆治

之一方加黃連四兩用姜汁同炒念老黃色名薑

香薷飲 如有搐搦加羌活煎服

厚朴去皮姜汁炙 白扁豆微炒 香薷四錢土

右咬咀每服三錢水一鍾入酒少許煎七分沉冷不拘

時服熱則作瀉香薷須陳者佳

五物香薷飲 直指方驅暑和中通用

香薷

去土二兩

白扁豆

炒

厚朴

去皮姜製炒

白茯苓

去土

甘草 五分

官

右咬咀每服五錢水二鍾煎至一鍾去滓溫服

二香散

治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

見霍亂類

香薷縮脾飲

直指方

驅暑和中除煩止渴

縮砂仁

草果仁

烏梅肉

香薷

甘草

炒各兩半

白乾葛

白扁豆

酪

右剉每服三錢生姜五片水煎去滓微溫服

縮脾飲

和劑方消暑氣除煩渴止吐瀉霍亂

縮砂仁

四兩

乾葛

二兩

白扁豆

二兩

烏梅肉

草果炒去

甘草各

一方無乾葛有乾姜

右吹咀每服四錢水一大碗煎七分以水沉冷服

卻暑散 治冒暑伏熱頭目眩暈嘔吐泄痢煩渴背寒面

垢

赤茯苓

生甘草

各四兩寒食麩

生姜各一斤

右為末每服二錢白湯調下

大順散 和劑方治冒暑伏熱汗飲過多脾胃受濕水穀不

分霍亂嘔吐臟腑不調

甘草一斤

乾姜

浙

杏仁去皮尖

肉桂去皮各六兩四錢

右先將甘草用白砂蜜炒及八分黃熟次入乾姜同炒

却入杏仁候杏仁不作聲為度用篩篩淨後入肉桂一處搗羅為末每服三錢水一鍾煎五七分溫服如煩燥并花水調下不拘時候以沸湯點服亦可

○廣按寒則傷形熱則傷氣何以言之人與天地同一橐籥夏月天之氣浮於地表則人之氣浮於肌表況被盛暑所傷膚腠踈豁氣液為汗發泄於外是表裏之氣俱虛失不善攝生者暑熱傷於外生冷戕於中若之何而能運化也是以水穀停積而為濕熱發為嘔吐為泄瀉甚則吐瀉俱作而揮霍闕亂也若不即病濕熱怫鬱於內他日為癰為痢之所由矣今大順

散非治暑熱之藥乃治暑月飲涼過多為病之劑也
歟

○已上諸方消導之劑

香朴飲子 聖惠方 治大人小兒伏熱吐瀉虛煩作亂

人參 去蘆 八分

茯苓 去皮 錢

甘草 炙 二分

紫蘇葉 七分

木瓜 七分

澤瀉 六分

香薷 去上 錢

半夏 湯泡 七分

白扁豆 炒 七分

陳皮 七分

烏梅肉 七分

厚朴 切 七分

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片棗一箇煎至一鍾

食前熱服

六和湯 和齋

治心脾不調氣不升降霍亂轉筋嘔吐泄

瀉寒熱交作痰喘咳嗽胃膈痞滿頭目昏痛肢體浮腫
嗜卧倦怠小便赤澁并傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶
或成痢疾中酒煩渴畏食婦人胎產中亦可服

縮砂仁

半夏湯泡七次

杏仁去皮尖

人參

甘草炙各一兩

赤茯苓去皮

藿香葉去土

白扁豆姜汁

木瓜各一兩

香薷

厚朴姜汁製

各四兩

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片棗子一枚煎至一

鍾溫服

十未香薷飲百一選消暑氣和脾胃

香薷一兩

人參去蘆

陳皮云白

白朮

黃芪 去蘆

白扁豆

炒去殼

甘草炙

各

厚朴

皮炙

乾木瓜

白茯苓

去皮各

右為末每服二錢熱湯冷水任調下

清暑益氣湯東垣方治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦

精神減少懶於動作胃滿氣促支節疼痛或氣高而喘

身熱而煩心下膨悶小便黃而數大便溏而頻或痢或

渴不思飲食自汗體虛

汪

黃芪

蒼朮

米泔

浙

升麻

各一

人參

白朮

神麩

炒

浙

陳皮

各五分

澤瀉

各五分

甘草炙

酒栝

各

麥門冬

各五分

當歸

各五分

葛根二分 五味子九粒 青皮二分半

右咬咀作一服水一大鐘煎至一鐘去滓大温服愈速

○已上諸方補虛消道之劑

消暑丸 和劑方 治伏暑引飲脾胃不和

半夏一斤 甘草生用 茯苓去皮各半斤

右為末姜汁煮糊為丸如梧桐子每服五十九丸熱湯下

解暑三白飲 和劑方 治冒暑伏執霍亂嘔吐小便不利頭

目昏眩

澤瀉 白朮 浙白茯苓各等分

右咬咀每服四錢 水一鐘姜五片燈心十莖煎八分下

拘時服

五苓散和劑方治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤

少如心神恍惚加辰砂如桂分兩又名辰砂五苓散

見温
熱

加味五苓散濟生方治伏暑熱二氣及胃濕泄瀉注下或

煩或渴或小便不利

赤茯苓去皮澤瀉

江猪苓去皮

白木礪

官桂不見火車前子礪

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片燈心十莖煎火分不

拘時温服

益元散 御藥院方 治中暑身熱小便不利此藥性涼除胃

脘積熱又淡能滲濕故利小便而散濕熱也 見溫熱

桂苓甘露飲 御藥院方 治伏暑引飲過度肚腹膨脹霍亂

瀉利

白茯苓 去皮 白朮 一 猪苓 去皮 滑石 研各二

寒水石 研 甘草 炙 澤瀉 各一 肉桂 去皮半

右為末 拌勻 每服二錢 熱湯冷水任下 入蜜少許 尤好

桂苓甘露散 張子和方

官桂 半兩 人參 去芦 漸 藿香 半兩 茯苓 去皮

白朮 甘草 炙 葛根 澤瀉

石膏

寒水石各一兩 滑石二兩

木香二錢半

右為細末每服二錢白湯下新以水或生姜湯亦好

桂苓白朮散宣明方治冒暑濕熱吐瀉轉筋腹痛小兒亦

可服

官桂去皮

白朮

猪苓各五錢

茯苓去皮

澤瀉各一兩

甘草炙

石膏

寒水石各二兩

滑石四兩

右為末每服二錢熱湯新汲水或生姜湯調下劉廷瑞

方不用猪苓

○已上諸方利濕清熱之劑

龍鬚散

一名甘草散 聖惠方 治中暑迷悶不省人事及

泄瀉霍亂渴一服即愈亦能解暑毒

白礬生一兩

五倍子姓一作五

烏梅槌去仁

各二兩

甘草

一兩半炙一方生用

飛羅麵

日麵一方用清

明

右為末入飛羅麵拌勻每服二錢新水調下

一方加

柯子肉滴水為丸如彈子大細嚼水下名龍涎丸

二氣丹 治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或泄或嘔

硝石

硫黃各等分

右為末於銀石器內火炒令黃色再研用糯米糊為丸

如梧桐子大每服四十九新汲井花水下

來復丹和劑方治三盛下虛伏暑泄瀉如水

硝石一兩同硫黃為末入銀內以微火炒用柝條攪

船上硫黃通明者二兩 太陰玄精石研飛一兩

五靈脂水澄過晒乾 陳皮祛白二 青皮祛白二

右先用五靈脂陳皮青皮為末次入玄精石末及二氣

末拌勻好醋打糊為丸如豌豆大每服三十九空心米

飲送下

大黃龍丸百一選方 治中暑身熱頭疼壯如瘧疾或煩瀉

嘔吐昏悶不食

船上硫黃 硝石各一兩 白礬 滑石各半兩

易美 志信

雄黃半兩

白麵四兩

石五味研末入麵和勻滴水煮如梧子大每服二十九
新水下

○廣按已上三方皆劫劑也夫暑熱流金燦石人到其
時膚腠開豁氣液耗散而煩渴縱飲寒涼而不顧况
氣液為汗發泄于外其中虛矣所以不能尅化水穀
而停積膠固于內發為嘔吐泄瀉腹痛頭疼身熱諸
証非石藥其性慄悍而詎開散之乎

○已上諸方攻散者毒之劑

暑病治例

出明醫雜著

王節齋曰夏至日後病熱為暑暑者相火行令也夏月
人感之自口齒而入傷心包絡之經其脈虛或浮大而
散或弦細孔達蓋熱傷氣則氣消而脈虛弱其為症汗
煩則喘渴靜則多言身熱而煩心痛大渴引飲頭疼自
汗倦怠少氣或下血發黃生斑甚者火熱制金不能平
木搖搨不省人事治暑之法清心利小便最好暑傷氣
宜補真氣為要又有惡寒或四肢逆冷甚者迷悶不省
而為霍亂吐利痰滯嘔逆腹痛瀉痢此則非暑傷人乃
因暑而自致之病也以其因暑而得故亦謂之暑病然
治法不同也

中氣
心法
卷之三
十一
若行人或農夫於日中勞役得之者是動而得之陽証也其病必苦頭痛發熱惡熱捫之肌膚火熱必大渴引飲汗大泄無氣以參黃芪五味知母石膏之類氣用香薷黃連扁豆參黃芪五味知母石膏之類暑熱發渴脈虛用人參白虎湯見前或用竹葉石膏湯亦好 見溫熱

東垣清暑益氣湯治長夏濕熱蒸人人感之四肢困倦精神少胃滿氣促支節痛或氣高而喘身熱而煩心下痞悶小便黃而數大便溏而頻或痢或渴不思飲食自汗躄虛此湯最好 見前

若暑熱之時無病之人或避暑熱納涼於深堂大厦涼
臺冷館大扇風車得之者是靜而得之陰証也其病
必頭痛惡寒身形拘急肢節痠痛而煩心肌膚大熱
無汗此為陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜用辛
溫之劑以解表散寒用厚朴紫蘇乾葛藿香羌活蒼
朮之類若外既受寒內復傷水生冷瓜果之類
藥再加乾姜瀉心神曲之類此非治暑也治因暑而
致之病也

若外不受寒止是時傷於暑物腹痛泄瀉或霍亂吐
逆宜縮脾飲或中寒類加神曲來牙

縮砂蒼朮此專治心胃中消食也

若吐瀉脈沉微者不可用寒藥可用大順散見前如

熟附子等分或附子三錢或炒芍藥

夏月多食冷物及過飲酒致傷脾胃吐瀉霍亂故治

暑藥多用溫脾消食治利小便之藥醫者要識此
意

若既傷暑熱復傷生冷外熱內寒宜先治其內溫中消
食次治其外清暑補氣而以理脾為主於前陰陽二
條內相兼取用東垣清暑者益氣湯之兼此意其用黃
芪升麻人參白朮甘草冬當歸五味黃柏葛根

是清暑補氣也蒼朮神曲
陳皮澤瀉青皮是治內補

脾也

官

治暑風卒倒法

凡人中暑先着於心一時昏迷切不可

與冷水飲并卧濕地其法先以熱湯灌或童便灌及用

布蘸熱湯熨臍并氣海續續令暖氣透徹臍腹俟其甦

省然後進藥若旅途中卒然暈倒急扶在陰涼處掬路

中熱灰土作窩於臍中令人尿其內即甦却灌以人尿

或攪地漿飲之半碗或車輪土五錢冷水調澄清服皆

可一方用大蒜三兩細嚼溫湯送下禁冷水即愈

補中益氣湯

見內傷類

清肺湯

見咳家類

中濕

六

陰濕熱館

丹溪心法

書

本草云蒼朮治濕上下部皆可用 二陳湯中加酒芍

活蒼朮散風行濕 脾胃受濕沉困無力怠惰好卧去濕

痰瀆用白朮 上部濕蒼朮功烈 下部濕宜升麻提之

外濕宜表散 內濕宜淡滲 若燥濕以羌活勝濕湯

平胃散之類 若風濕相搏一身盡痛以黃芪防已湯

若濕勝氣實者以神佑丸舟車丸服之氣虛者桑皮茯苓

人參 葶藶 木香 之類 凡肥人 沉困 怠惰 是濕熱 宜蒼朮
茯苓 滑石 凡肥白之人 沉困 怠惰 是氣虛 宜二朮 人參
半夏 草菓 厚朴 芍藥 凡黑瘦而沉困 怠惰者 是熱 宜白
朮 黃芩 凡飲食不節 脾胃受傷 不能運送 宜枳朮丸
去上焦濕及熱 須用黃芩瀉肺火 故也 又如肺有濕 亦宜
黃芩 如肺有虛熱 宜天門冬 麥門冬 知母 用黃芩多則損
脾 去中焦濕與痛熱 用黃連瀉心火 故也 如中焦有實
熱 亦用黃連 若脾胃虛弱 不能運轉 而鬱滯 宜黃芩 白朮
乾葛 若中焦濕熱 積久而痛 乃熱勢甚盛 宜黃連 用姜汁
炒 去下焦濕腫及痛 併膀胱有火邪者 必須酒洗 防已

黃栢知母草龍膽又云凡下焦有濕草龍膽防己為君甘
草黃栢為佐如下焦腫及痛者是濕熱宜酒防己草龍膽
黃栢蒼朮 若肥白魚虛之人腫痛宜二朮南星滑石茯
苓 黑瘦之人下焦腫痛宜當歸桃仁紅花牛膝枳榔黃
栢

戴云濕有自外入者有自內出者必審其方土之致病
源東南地下多陰雨地濕居受必從外入多自下起以
重腿脚氣者多治當汗散久者宜踈通滲泄西北地高
人多食生冷濕麵乳酪或飲酒後寒氣拂鬱濕不能越
作致腹皮脹痛甚則水鼓脹滿或通身浮腫按之如泥

不起此皆自內而出也辨其元氣多少而通利其二便
責其根在內也此方主內外亦立相有之但多少不同
須對證施治不可執一

附脈理

脈訣舉要曰或瀆或細或濡或緩是皆中濕可得而斷

附諸方

麻黃白朮散 治感風濕身體煩疼無汗發熱者

麻黃去節三兩 白朮四兩 甘草炙二兩 桂心一兩

杏仁二十六箇
去皮尖

右咬咀每服四錢水一鍾煎七分空心服

羌活勝濕湯 按粹方 治脊痛項強腰似折項似拔上衝頭

痛及足太陽經不行

官

羌活 去芦

獨活 去芦

各一錢

防風

去芦各五分

蔓荊子 二分 川芎 二分 甘草 五分 炙

如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也加黃柏一錢附子

半錢蒼朮二錢水二鍾煎至一鍾去渣溫服食後

平胃散 和劑方 治脾胃不和 不進飲食 常服暖胃消痰

蒼朮

米泔浸厚朴

姜製炒

陳皮

各三斤

甘草

炒三十兩

右為末 每服五錢 姜三片 棗一枚 煎服 入鹽一捻 沸湯

點服亦得

一方加草果名平胃草果散

一方 治風濕

官

用蒼木一斤米泔浸竹刀刮去皮晒乾為片以半斤用
童便浸一宿半斤用酒浸一宿焙乾為末每服一錢空
心益湯或酒調下常服除濕壯筋骨明目

防已黃芪湯 治風濕相搏客在皮膚四肢無力關節煩

痲脈浮身重汗出惡風

江

防已一兩

甘草炙半兩白朮七錢半

黃芪

一兩二錢五分

石咬咀每服一兩入姜棗煎喘者加麻黃 胃氣不

和加芍藥 氣上衝加桂枝 下有寒加細辛

木附湯和劑方治風濕相搏腰膝疼痛四肢重者不嘔不

渴大便堅硬小便自利

官

白朮四兩

附子炮

兩半去皮臍

右咬咀每服三錢水一鍾姜棗煎熱服

生附湯直指方治受濕腰痛腿疼

附子

生二錢蒼朮炒

杜仲姜炒半兩

牛膝酒浸焙

厚朴

姜製

乾姜生

白朮

茯苓去皮

甘草

錢各三

右咬咀每服五錢姜三片棗一枚水一鍾半食前煎服

羌附湯濟生方治風濕相搏手足掣痛不可屈伸或身微

浮腫

羌活去芦

附子炮去皮白朮

甘草炙各等分

右咬咀每服五錢姜五片水一鍾煎七分溫服

除濕湯百一選方治寒濕所傷身體重著脚腰酸疼大便秘

澹泄小便或澁或利

半夏麩炒

厚朴姜製

蒼朮米泔洗藿香葉

陳皮去白

白茯苓去皮各

甘草炙七錢

白朮生用一兩

右咬咀每服五錢水一鍾姜七片棗一枚煎七分食前

溫服

已上治外濕未散之劑

神仙飛步丹

治諸風濕痺痿等証

見中風類

仙傳黑虎丹

治感風濕傳於經絡手足麻木骨節遍身

疼痛腰腿疼痛

見中風類

乳香黑虎丹

治諸風寒濕發於經終渾身骨節疼痛

蒼朮三兩

草烏五兩

白芷

五靈脂

羌活

川芎

江

自然銅煅碎當歸各二兩

乳香一兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大百草霜為衣每服五
七十九臨卧温酒下忌熱物

○已上治外濕客于經絡既久疏通之劑

五苓散

治內傷飲食有濕小便赤少大便溏瀉方見中暑類

赤茯苓丸

聖惠方

治內濕大過四肢腫滿腹脹喘急氣不

宣通小便赤澀

葶藶四兩

防已二兩

赤茯苓二兩 木香半兩

右為末棗肉丸如梧桐子大每服五十九丸桑白皮湯下

茯苓湯秘方治脾氣不實手足浮腫小便赤澀氣急喘滿

赤茯苓

澤瀉

香附子

陳皮

桑白皮

大腹皮

浙

乾姜各等分

右吹咀每服一兩水二鐘煎至一鐘去滓溫服不拘時

消腫丸三烟方治水腫喘滿小便不利

白朮

黑牽牛炒滑石

陳皮各二兩

木通

茯神去木

半夏湯泡七

通脫木

木香各一分

茯苓

書瞿麥穗

丁香各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸芍草麥門冬

湯下

○已上治內濕淡滲之劑

三花神佑丸

宣明方治一切水濕腫病大腹實脹喘滿

輕粉一錢

大黃一兩

牽牛二兩

芫花醋拌炒

甘遂

大戟各半兩

右為末滴小丸小豆大初服五丸每服加五丸溫水下
無時日三服

○廣按世傳銀粉為治水腫鼓脹之藥以其善開濕熱
拂鬱故也俱可少用為引經而已多則耗氣戒之戒
之

舟車丸



大黃二兩

甘遂

王大戟

芫花

青皮

陳皮各一兩

牽牛頭末四

木香半兩

右為細末水丸如梧桐子大每服六七十片白湯下隨
証加減

○已上治濕勝氣實者之劑

枳朮丸

治飲食不節脾胃傷不能運送

見瘧類

升陽除濕湯

治脾胃虛不能運化濕勝泄瀉

見泄瀉類

大安丸

治脾胃有濕飲食不消

見傷食

白朮和胃丸

治脾胃虛有濕不能飲食

見調胃

○已上健脾胃燥濕之劑

濕熱新增

附論

○廣按濕熱之原蓋因寒溫飢飽失常喜怒勞役過度以傷脾胃夫脾胃乃水穀之海也今脾胃受傷而動

火火則薰蒸水穀而為濕熱者也又按胃司納受脾
司運化今脾不能運化飲食飲食停積而生濕熱亦
良多矣為治之法人壯實則專可攻其濕熱人弱虛則
攻補並施而補脾消穀道守水二者不可闕一也

附脉理

脉理提綱曰濕熱脉緩大



附諸方

神芎導水丸 宣明方 治一切熱証常服保益除痰飲消酒

食清頭目利咽膈能令偏身結滯宣通氣和而愈神強
體健耐傷者病并婦人產後血滯腰脚重痛亦

兒積熱驚風瀉指名曰藏劑也亦曰顯仁丸加黃連瀉
苛川芎各半兩名曰神效丸

大黃錦紋者

黃芩中結者

牽牛

滑石各四兩

右為細末滴水為丸如小豆大溫水下十丸至十五丸
每服加十丸日三服冷水亦得煉蜜丸愈佳或久病
熱鬱無門瘦悴老弱并一切証可下者始自十丸每服
加十丸以利為度如常服此藥但除腸垢積滯不傷和
氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾亦不困倦虛損
頗遂病人心意或熱甚必須急下者便服四五丸未
利再服以意消息三五歲孩兒丸六麻子丸此一法

此藥至善常服二三十丸不利臟腑但有益無損或婦
人血下惡物加桂枝半兩病微者常服病重者亦取利
因而結滯開通惡物自下也此方除臟腑滑泄者或裏
寒脉遲者或婦人經病產後血下不止者但孕婦等則
不宜服除此以外一切風熱雜病煩悶壅塞神氣不和
或平人保養常服自顯其功若以効驗觀其藥味則非
明本草造化之理者不可得而知其然也猶孔子讚易
道明顯應化萬仁之善而不見其大道之用功故曰顯
諸仁藏諸用曰以云藏用也亦其義也兼以世說之久
矣而反不善此等妙方不肯知之每有久獲大効而誠

懇求其方不得已而授之既見其方及生疑懼不復用
焉亦有効而志信求其方務以廣傳救疾因衆議百端
擬疑妄生謗說致使俗醫皆畏之致道不能神但有妨
病者後之君子但行其藥明顯諸人勿示其方而密藏
諸用耳或以一法加黃連川芎薄荷等各半兩治一切
頭目昏眩者愈加

○廣按此方瀉濕熱通利大小二便之藥也然濕熱內
甚不從二便而踈導之何能使之去乎蓋諸病皆生
於熱臟腑為本經絡為標臟腑之熱既去經絡之熱
豈能留乎此河間劉先生議此方誠千載治熱病之

莖蹄也果能依此方所云丸如小豆大每服十九至
十五丸以次而加以通利為度何患之有哉但有益
而無損也又嘗論之地土有南北下濕高燥之殊人
之賦質有肥白黑瘦之異所養有膏梁淡食之別所
病有寒濕熱燥之差不可不詳審而明辨也若夫高
燥之地黑瘦之人膏梁之家熱燥之病此藥切當若
夫下濕之地肥白之人淡食之家寒濕之病此藥猶
未當也古人所立之方君臣佐用主治引經籠圍已
定不可分毫移易但後人不善於用所施不當反生
疑議良可嘆息

玄青丹 宣明方 治下痢勢急志頻併客痛或久不愈諸藥不

能須此下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣血宣通而

愈兼宣利積熱酒食積滯東瘦中滿水腫腹脹兼療小兒

驚疳積熱乳癖諸証惟泄瀉者勿服

見痢類

除濕丹 按粹方 治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊

急津液凝澁便弱不利目赤癰疹疽癰發背疥癬走注

脚氣無首尾瘡癬不可盡述

檳榔

甘遂

葳靈仙

赤芍藥

葶藶

各二兩

乳香

浙

沒藥

各一兩牽牛

大戟

炒三兩

陳皮

白四兩

為赤麵糊丸如梧桐子八每服五十九加至七八十九
溫水下食前得便衣止如服藥前後忌酒二日藥後亦
忌濕麵兩三日食溫淡以補胃丸佳經驗良方有澤瀉
青皮無苧蔴

瘟疫

七附大頭病 冬溫病 嶺南諸病
運氣証治

丹溪心法

瘟疫眾人一般病者是又謂之天行時疫治有三法宜補
宜散宜降 熱甚者如音便法中入方宜

大黃中

黃連上

黃芩上

人參中

瘰癧

心法附錄卷之三

二十三

七

桔梗 中

防風 中

蒼朮 中

滑石 中

香附 中

人中黃 下 官

右為末神麩糊丸每服六七十丸分氣血與痰作湯使

氣虛者四君子湯 血虛者四物湯 痰多者二陳湯

送下 熱甚者童便下

又方溫病亦治食積痰熱降陰火

人中黃

飯為丸菉豆大下十五丸

又時病

半夏 中

川芎 上

茯苓 上

陳皮 中

浙 江 圖

山查中

白朮上

益果上

甘草下

如頭痛加酒芥

口渴加乾薑

身痛加羌活薄桂防

風芍藥

○大頭天行病此為濕氣在顛首以上切勿用降藥東垣

有方

羌活中

酒黃芥上

酒蒸大黃中

○冬溫為病非其時而有其氣也冬時嚴寒當君子閉藏而反發泄於外專用補藥而帶表藥如補中益氣之類

作人中黃法

以竹筒兩頭留一節作一竅納甘草於中仍以竹木釘

閉竅於大糞缸中浸一月取出晒乾大治疫毒

左手脉大於右手浮緩而盛按之無力

大病虛脫本是陰虛用艾灸丹田者所以補陽陽生陰長故也不可用附子止可多服人參

附諸方

十神湯 治時令不正瘟疫妄行

升麻葛根湯 治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱

柴胡升麻湯 治時行瘟疫吐熱惡風頭痛體疼鼻塞咽

乾咳嗽涕唾稠粘

清熱解肌湯

治傷寒瘟疫病天行頭痛壯熱

俱見溫熱類

黃連橘皮湯 瘟毒發斑

黃連四兩去 陳橘皮 杏仁去皮尖 枳實

麻黃去節湯 葛根各二兩 厚朴姜汁炙 甘草

每服五錢水一鍾煎溫服

小柴胡湯 治瘟疫內虛發熱 骨節疼痛

渴加瓜蒌仁

竹葉石膏湯 傷寒時氣表虛 骨節疼痛 身發熱心胃煩悶

得汗已解內無津液虛羸心氣欲吐 俱見溫熱類

化癍湯 治斑毒 見溫熱類

黃連解毒湯 治時疫三日已汗解或因飲酒復劇若煩

瀉痢

見溫熱

悶乾嘔口燥呻吟錯語不睡

瀉蘆湯 治臟腑積熱發為瀉

毒時疫疔瘡頭面洪腫咽

噤填塞水藥不下一切危惡

瘦癘

瀉蘆上

升麻下

書

大黃中

黃芩中

藍葉中

玄參下

圖

右吹咀每服二錢水煎服

腫熱甚如芒銷二錢

消毒丸 治時毒疔瘡惡証

大黃上

牡礪中

疆蚕中炒

右為末煉蜜丸如彈子大

水化一丸

內加桔梗大

刀子湯尤妙

勃赤古雄黃丸 辟特疾可與病人同床傳著衣服亦不相

染

雄黃一兩研赤小豆炒 丹參 鬼箭羽 酪二

右為細末蜜丸每服五丸空心溫水下

治大頭病兼治喉痺歌

圖

人間治疫有仙方 一兩殭蚕二大黃

姜汁為丸如彈子 江井花調蜜便清涼

四君子湯

四物湯 俱見補損類

浙

二陳湯 見痰類

補中益氣湯 見內傷類

○嶺南諸病 新增 出明醫錄著

附諸方

春秋時月人感山嵐瘴霧毒氣發寒熱脇膈飽悶不思飲食此毒氣從鼻口入內也治當清上焦解內毒行氣降痰不宜發汗

黃連水洗 錢姜 黃芩一分 酒升 麻一錢半 生甘草七分

木香一錢 蒼朮一分 厚朴一錢 姜一分

枳實一錢 枳殼半 白朮一分 枳殼湯 桔梗一錢 柴胡一錢

木通一錢

右生薑五片水一鍾半煎七分食前熱服渣煎四分繼服

寒温不節汗身脫衣巾感冒風寒之氣氣閉發熱頭疼此傷寒類也但嶺南氣温易出汗故多類瘧重則寒熱不退輕則為瘧南方氣升故嶺南人得此病者卒皆骨滿痰涎壅塞飲食不進與北方傷寒只傷表而裏自和者不同治當解表清熱降氣行痰此方用於寒涼時月及雖在温暖時而感冒風寒者

羌活半錢 蒼朮一錢 柴胡一錢 黃芩一錢
橘紅一錢 半夏一錢 枳實一錢 甘草一錢

上五文
小
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十

川芎一錢

右生姜五片水一鍾半煎二分食前溫服渣煎四分隨再服取汗出止服

瘡癰時瘡寒熱往來

書

柴胡一錢半 知母一錢半 蒼朮一錢 黃芩一錢

乾葛一錢 陳皮一錢 半夏一錢 川芎一錢

甘草七分

右生姜三六片烏梅肉二箇水一鍾半煎七分食前清

晨服渣煎四分午前服

瘡久者加人參一錢半 當歸一錢 汗多者去蒼朮換

白朮加酒炒白芍藥各一錢半

後變成痢疾瘡後之痢從虛治用補脾胃藥

黃連一錢 木香一錢 縮砂一錢 黃芩一錢炒

橘皮一錢 白朮一錢半 白芍藥二錢 甘草五分

當歸一錢酒洗

右生姜三片水二鐘煎八分食前熱服

溫暑之月民病天行瘟疫熱病治宜清熱解毒兼治內外

枯黃芩一錢酒炒 知母一錢酒炒 石膏半錢 升麻一錢

黃連五分酒炒 生甘草七分 羌活三分 白芍藥一錢酒炒

炒 生地黄五分酒洗 人參半錢 乾葛一錢

右生姜三片水一鍾半煎七分食前熱服渣煎四分繼服
 若胸膈痞悶痰涎壅塞者加枳實半夏各一錢
 生姜汁四五匙 若脾胃不實加白朮一錢半

時氣發熱變為黃病所謂瘟癘也宜治內瀉濕熱

茵陳一錢 黃連水一錢 山梔仁一錢 白朮一錢

白茯苓一錢 去皮 厚朴一錢 水炒 木通一錢 去心 木香七分

白芍藥一錢 酒炒 乾葛半錢 人參一錢

用生姜三大片水二鍾煎七分食前溫服渣煎四分繼服

運氣證治新增 出乾身生意

附諸賢論

運氣証治者所以參天地陰陽之理明五行衰旺之機考
氣候之寒溫察民病之凶吉推加臨補瀉之法施寒熱溫
涼之劑古人云治時病不知運氣如涉海問津誠哉言也
今遵先賢圖訣撮其要領使人一覽而知其悉也矣

五運配十干之年

甲巳得合為土運 乙庚得合為金運 丁壬得合為
木運 丙辛得合為水運 戊癸得合為火運
六氣為司天之歲

子午少陰君火 丑未太陰濕土 寅申少陽相火
卯酉陽明燥金 辰戌太陽寒水 巳亥厥陰風木

南政北政

甲巳土運為南政蓋土居中央君尊南面而行餘四運以臣事之面北而受令所以有別也

十二支年分運氣書

子午年少陰君大司天歲氣熱化之候

司天者天之氣候也

君火者年少陰心經也心者君主之官神明出焉君火乃主宰陽氣之本餘象生土乃發生萬物之源

陽明燥金在泉

在泉者地之氣候也

初之氣厥陰風木用事于上父下益辛瀉苦

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 寒風切冽霜雪水冰蟄虫伏藏

民病 關節禁固腰腿疼中外瘡瘍

二之氣少陰君火用事火盛金衰補肺瀉心

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 風雨時寒雨生羽蟲

民病 淋氣鬱於上而熱令人目赤

三之氣少陽相火用事君相二火瀉苦益辛

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 大火行熱氣生羽蟲不鳴燕百舌社字之

類官

民病 厥熱心痛寒更作咳喘目赤

四之氣太陰濕土用事牛母相順瀉肺補腎

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 大雨時行寒熱互作

民病 黃疸劫血咽乾嘔吐痰飲

五之氣陽明燥金用事心盛肺衰火怕水復

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 溫氣乃至初冬尤暖萬物尚榮

民病 寒熱伏邪於春為瘧

六之氣太明陽寒水用事火衰心病瀉賊益苦

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時 暴寒勁切火邪恣毒寒氣暴止

民病 生腫咳喘甚則血溢下連小腹而作寒中

丑未年太陰濕土司天歲氣濕化之候

太陰濕土者足太陰脾經也脾屬中央戊己土每季

寄旺一十八日合為七十二日以應一歲六六三百

六十日之成數也

太陽寒水在泉

初之氣厥陰風木用事主旺客衰瀉酸補甘

自年前十二月大寒節起至閏二月驚蟄終止

天時 大風發涼雨生毛虫

民病 血溢經絡拘強關節不利身重筋痛

二之氣少陰君火用事以生上瀉甘補酸

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 太火至疫瀉君令宜行濕蒸相搏暴雨時

降

民病 瘟疫盛行遠近咸若

三之氣少陽相火用事土旺木補賢瀉脾

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 雷雨電雹地氣騰濕氣降

民病 身重跗腫胸腹滿感冒濕氣

四之氣太陰濕土用事甘旺醜衰補腎益膀胱

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 炎熱沸騰地氣升濕化不流

民病 腠理熱血暴溢寒瘡心腹脹浮腫

五之氣陽明燥金用事土能生金益肝瀉肺

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 大涼露降

民病 皮胃寒瘡刺甚行

六之氣太陽寒水用事以館 剋下瀉脾補腎

自十月小雪節起至十一月小寒終止

天時 大寒凝冽 書

民病 關節禁固腰腿拘痛

寅申年少陽相火司天歲氣火化之候

少陽相火者三焦浮流之火火邪炎上上剋肺金

受剋腎水失母則上盛下虛虛陽上攻變生諸疾致

傷元氣

厥陰風木在泉

初之厥陰風木用事子父相逢瀉苦益辛

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 熱風傷人時氣流行

民病 寒熱交作咳逆頭痛血氣不調心腹不快

二之氣少陰君火用事肺衰心盛制苦益辛

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 暴風疾雨溫濕相蒸

民病 上熱咳逆胸膈不利頭痛寒熱

三之氣少陽相火用事夏旺火熾補肺益大腸

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 炎暑亢旱草萎河輪

民病 煩熱目赤夜閉失血熱渴風邪人多暴死

四之氣太陰濕土用事火能生土瀉甘補酸

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 風雨時降炎暑未去

民病 瘡痢交作寒熱頭疼

五之氣陽明燥金用事肺金受邪瀉苦補辛

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 寒熱風雨草木黃落

民病 寒邪風熱君子周密

六之氣六陽寒水用事心火受尅瀉鹹補苦

自十月小寒節起至十一月小寒終止

天時 寒溫無時地氣三寒霜露乃降

民病 感冒寒邪關節不利心腹痛

卯酉年陽明燥金司天歲氣燥化之候

陽明燥金者肺與大腸之氣象庚辛金也

少陰君火在泉

初之氣厥陰風木用事木不相尅補酸瀉辛

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 陰始凝地始肅水乃冰寒雨多花開遲

民病 寒熱淫腫失血嘔吐小便赤淋

二之氣少陰君之用事之金衰瀉苦益辛

自二月春分節起至三四月立夏終止

天時 臣居君位 熱日行

民病 疫癘流行人多卒暴

三之氣少陽相火用事之盛客衰瀉心補肺

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 燥熱交合 風雨暴至

民病 寒熱頭疼心煩作渴

四之氣太陰濕土用事以下生上瀉辛益酸

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 早秋寒雨有傷苗稼

民病 卒暴寒熱風邪傷人心疼浮腫瘡瘍失血

五之氣陽明燥金用事金成木衰瀉肺補肝

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 冬行春令草木生青風雨生虫

民病 寒熱作痢氣血不和

六之氣太陽寒水用事寒來助主益音瀉醜

自十月小雪節起至十一月小寒終止

天時 氣候反溫蟄虫出現反行春令

民病 疫癘温毒寒熱伏邪

辰戌年太陽寒水司天歲氣燥化之候

太陽寒水者足膀胱經也與足少陰腎經合為表裏

屬北方壬癸水

太陰濕土在泉

初之氣厥陰風水用事脾胃受邪瀉醎助甘

自年前十二月大寒節起至二月驚蟄終止

天時 氣早暖草早榮温風至

民病 瘟疫寒熱頭眩嘔吐瘡瘍

二之氣少陰君火用事心火受邪瀉醎補甘

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 春寒多雨寒濕無時

民病 氣鬱中病浮腫寒熱

三之氣少陽相火用事以上尅下瀉賊助苦

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 暴熱乍涼疾風暴雨

民病 寒熱吐利心煩悶亂癰疽瘡瘍

四之氣太陰濕土用事木旺土衰瀉甘補酸

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 風溼交爭雨生羽蟲暴風疾雨

民病 大熱短氣赤白痢瀉

五之氣陽明燥金用事金生水旺制鹹益苦

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 濕熱而行客主令

民病 氣虛客熱血熱妄行肺氣壅盛

六之氣太陽寒水用事水盛火衰瀉鹹助苦

自十月小雪節起至十二月小寒終止

天時 凝寒雨雪地氣正濕令行

民病 病乃凍瘃孕婦多災脾受濕肺旺肝衰

巳亥年厥陰風木司天厥氣風化之候

厥陰風木者足厥陰肝經也肝屬東方甲乙木春旺七十二日也

少陽相火在泉

初之氣厥陰風木用事脾胃受邪瀉酸補甘

自年前十二月太寒節起至二月驚蟄終止

天時 寒始肅客行主令殺氣方至

民病 寒居右脇氣滯脾胃虛墜

二之氣少陰君火用事火旺金衰瀉心補肺

自二月春分節起至四月立夏終止

天時 寒不去霜雪冰殺氣施木草焦寒兩至

民病 熱中氣血不升降

三之氣少陽相火用事肺經受邪瀉苦益辛

自四月小滿節起至六月小暑終止

天時 風熱大作兩生羽虫

畏病 淚出耳鳴掉眩

四之氣大陰濕土用事木土相刑瀉酸益甘

自六月大暑節起至八月白露終止

天時 熱氣返用山澤浮雲暴雨溽濕

畏病 心受邪黃疸面為浮腫

五之氣陽明燥金用事以金刑木瀉肺益肝

自八月秋分節起至十月立冬終止

天時 燥濕更勝沉陰乃布風雨乃行

民病 寒氣及體肺受風脾受濕發為瘧

六之氣大陽寒水用事主助客勝瀉酸補甘

自十月小雪節起至十一月小寒終止

天時 畏火司令陽乃火化蟄虫出現流水不冰

逆氣大發草木乃生

民病 瘟疫疔疔相制

○廣按運氣之說內經言之詳矣夫人在氣交之中與

天地相為流運也必先立其平以明其氣臨病施治

之際烏乎以用補瀉之藥哉以運氣證治不可不知也又嘗按而驗之多有不應何則陰陽之消長寒暑之更易或失其常在智者通其活變豈可膠柱鼓瑟按圖索驥也耶○又按時氣流行或有病者不病者蓋邪之所轉其氣必虛故虛者感邪而實者邪難入也又有一家傳染者蓋家有病人則憂患而飲食少飲食少則氣餒矣時與病人相近感其氣從鼻口入也

浙

丹溪心法附餘卷之三

伏寧東山古庵方廣約之類集

內傷門

內傷八

丹溪心法

○內傷東垣內外傷辨甚詳世之病此者為多但有挾痰者有挾外邪者有熱鬱於內而發者皆以補元氣為主若所挾而兼用藥如挾痰者則以補中益氣湯加半夏竹瀝

江圖書

仍少入姜汁傳送 凡內傷發症因胃氣虛寒是火遊行於外亦痰熱所致火則補而降之痰熱則微汗以散之切不可下恐生危證 內傷病退後燥渴不解者有餘熱在肺家可用參苓甘草少許姜汁冷服或茶匙挑姜汁與之虛者可用人參



○廣按外感內傷病之關鍵於此昧焉何足云醫夫外感張長沙已言之矣內傷李東垣已言之矣至於內傷按外感未有言之者也况外感風寒則身熱鼻塞聲音左手脉洪盛乃有餘之症當發不當補內傷喜怒勞傷則身熱口苦聲微右手脉洪盛乃不足

之證當補不當發至於內傷挾外感之症又當補發
兼施辨之不可不詳施之不可不當也予懷是論久
矣及觀丹溪心法內傷條云東垣內外傷辨甚詳世
之病此者爲多有挾外邪者有挾熱鬱於內而發者
有挾痰者皆以補元氣爲主看所挾而兼用藥此得
吾心之同然者也但先生之言引而未發予補之
如內傷挾外感者則於補中益氣湯內春加川芎防
風柴胡荆芥紫蘇薄荷之類夏加葛根石膏甘草薄
荷升麻柴胡之類秋加羌活防風蒼朮荆芥之類冬
加麻黃桂枝乾姜附子之類兩手脉俱洪盛而身熱

鼻塞口苦蒸見也如內傷挾熱鬱於內而發者則於
 補中益氣湯內加火鬱湯之類其人平素心胃昏悶
 手足心發熱小便赤脉沉數今脉洪數身熱是也如
 內傷挾痰者則於補中益氣湯內加半夏竹瀝姜汁
 之類其人肥白平素喘滿吐痰脉沉滑今脉洪滑身
 熱是也噫嘻外感內傷不同發表補中有異如冰炭
 之相反天壤之懸隔學者苟無定見于中臨症投劑
 鮮不眩惑也矣

火鬱湯 見發熱類

浙

附諸賢論

東垣曰甚哉陰陽之證不可不詳也徧觀內經中所說變化百病其源皆由喜怒過度飲食失節寒溫不適勞役所傷而然夫元氣穀氣營氣清氣衛氣生發諸陽上升之氣此六者皆飲食入胃穀氣上行胃氣之異名其實一也既脾胃有傷則中氣不足中氣不足則六腑陽氣皆絕於外故經言五藏之氣已絕於外者是六腑之元氣病也氣傷臟乃病臟病則形乃應是五臟六腑真氣皆不足也惟陰火獨旺上乘陽分故榮衛失守諸病生焉其中變化皆由中氣不足乃生發耳後有脾胃已受勞役之疾飲食又復失節病日久事息心安飽食太

甚病乃大作槩其外傷風寒六淫客邪皆有餘之病當
瀉不當補飲食失節中氣不足之病當補不當瀉舉世
醫者習以飲食失節勞役所傷中氣不足當補之證認
作外感風寒有餘客邪之病重瀉其表使榮衛之氣外
絕其死只在旬日之間所謂差之毫釐謬以千里可不
詳辨乎夫外感有餘之症寒熱甚而齊作鼻塞聲重頭
常痛手背熱內傷不足之症寒熱微而間作口渴聲輕
頭間痛手心熱於此可以稽驗矣始受飲食勞倦所
傷之病必氣高而喘身熱而煩及短氣上逆鼻息不調
怠惰嗜臥四肢困倦不收無氣以動亦無氣以言皆為

熱傷元氣以甘溫之劑以補元氣卽是瀉火之藥凡所
受病_門摸之肌膚間必大熱必燥熱悶亂心煩不安或
渴久病必不渴或表虛惡風寒慎不可以寒涼藥與之
經言勞者溫之損者溫之惟以補中益氣湯溫藥以補
元氣而瀉火邪內經云溫能除大熱正謂此也

王節齋曰東垣論飲食勞倦爲內傷不足之證治用補中
益氣湯迺酒集中又論不足之中又當分別飲食傷爲
有餘勞倦傷爲不足予謂傷飲食而留積不化以致宿
食鬱熱發於外此爲有餘之證法當消道東垣自有
枳朮丸等方治法具於飲食門矣其補中益氣方論却

謂人因傷飢失飽致損脾胃非有積滯者也故只用補藥蓋脾胃全賴飲食之養今因飽飢不時失其所養則脾胃虛矣又脾主四肢若勞力辛苦傷其四肢則根本竭矣或專因飲食不調或專因勞力過度或飲食不調之後加之勞力或勞力過度之後繼以不調故皆謂之內傷元氣不足之證而宜用補藥也但須於此四者之間審察明白畧為加減則無不效矣

附脈理

東垣曰占人以脈上辨內外傷於人迎氣口人迎脈大於氣口為外傷氣口脈大於人迎為內傷此辨固是但其

說有所未盡耳外感風寒皆有餘之證是從前客邪來也其病必見於左手主表乃行陽二十五度內傷飲食及飲食不節勞役所傷皆不足之病也必見於右手右手主裏乃行陰二十五度故外感寒邪則獨左寸人迎脈浮緊按之洪大緊者急甚於弦是足太陽寒水之脈按之洪大而有力中見手少陰心火之脈寸與壬合內顯洪大乃傷寒脈也若外感風邪則人迎脈緩而大或大於氣口一倍或兩倍三倍內傷飲食則右寸氣口脈大於人迎一倍傷之重者過在少陰則兩倍太陰則三倍此內傷飲食之脈若飲食不節勞

役過甚則心脈變見於氣口是心火刑肺其肝木挾心
 火之勢亦來薄肺經云侮所不勝寡於畏者是也故氣
 口脈急大而數時一代而澁也澁者肺之本脈代者元
 氣不相接脾胃不及之脈洪大而數者心脈刑肺也急
 者肝木挾心火而反剋肺金也 若不甚勞役惟右關
 脾脈大而數謂獨大於五脈數中顯緩時一代也 如
 飲食不節寒暑失所則先右關胃脈損弱甚則隱而不
 見惟內關脾脈之大數微緩時一代也宿食不消則獨
 右關脈沉而滑經云脈滑者有宿食也

附諸方

補中益氣湯 治形神勞役或飲食失節勞倦虛損身熱而煩脈洪大而虛頭痛或惡寒而渴自汗無力氣高而喘

黃芪一錢半

人參

書甘草

各一錢

白朮

當歸身

柴胡

升麻

陳皮

各半錢

渴加葛根五分

圖

嗽加麥門冬一錢

五味子十五粒

一方有白芍藥半錢秋冬不用黃柏三分以滋腎水瀉

伏火紅花三分入心養血瀉

若作一服水煎午前稍熱服

按立方本指云夫脾胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其土位其次肺氣受邪須用黃芪最多人參甘草次之脾胃一虛肺氣先絕故用黃芪以益皮毛而閉腠理不令自汗上喘氣短損其元氣人參以補之心火乘脾炙甘草之甘溫以瀉火熱而補脾胃中元氣若脾胃急痛腹中急縮者宜多用之經云急者緩之白朮苦甘溫除胃中熱利腰膈間血胃中清氣在下升麻柴胡以引之引黃芪甘草甘溫之氣味上升壯補衛氣之散解而實其表也又緩帶脈之縮急二味皆平味之薄者陰中之陽引清氣上升也氣亂於胃中而清濁相干用陳皮

以理之又能助陽氣之升以散滯氣助諸其辛為用也
脾胃氣虛不能升浮為陰火傷其生發之氣滯血大虧
營氣不榮陰火熾盛是血中伏火日漸煎熬血氣日減
心主血血減則心無所養致使心亂而煩病名曰恍惚
者心惑而煩悶不安也故加辛其微溫之劑生陽氣陽
旺則能生陰血更以當歸和之少加黃柏以救腎水能
瀉陰中之伏火如煩不止少加生地黃補腎水水旺而
心火自降如氣浮心亂以朱砂安神丸鎮固之則愈
若病日久者以權宜加減法 若頭痛加蔓荊子二分
痛甚加川芎五分百病腦痛者加梔本五分細辛二分

諸頭痛併用此藥四味頭痛有痰沉重顛倦者乃大陰

厥陰頭疼加半夏半錢或一錢生姜三片 若耳鳴目

黃頰頰腫頸肩臑肘臂外後廉痛面赤脈洪者加羌活

一錢防風七分甘草三分藁本五分通其經血加黃芩

黃連各三分消其腫 噤口頰腫脈洪大面赤加黃芩

三分桔梗七分甘草三分 口乾噤乾或渴者加葛根

五分升胃氣上行以潤之 心下痞膈者加芍藥黃

連各一錢如痞腹脹加枳實三分厚朴七分木香砂仁

各三分如天寒加乾姜 腹中痛者加白芍藥炒半錢

炙甘草三分如惡寒覺冷痛加桂心半錢夏月腹中痛

不惡寒又惡熱者加黃芩五分芍藥一錢甘草五分以
治時熱 臍下痛者加真熟地黃半錢 如胃中滯氣
加四花青皮一分或二分壅滯可用氣促少氣者去之
如身體重疼乃風濕相搏加羌活半錢防風半錢升
麻一錢柴胡半錢梔子根半錢蒼朮一錢如病去勿再
服 若大便秘澀加歸稍一錢 若久病痰嗽者去人
參冬月加不去節麻黃秋涼亦加不去根節麻黃春月
天溫加佛耳草三分欬花一分勿加麻黃 若初病之
人雖痰嗽不去人參必不增添若久病肺中伏火者去
人參以防痰嗽增益耳 長夏濕土客邪大旺加蒼朮

白木澤瀉上下分消其濕熱之氣濕熱大勝主食不消
 故食減不知穀味則加麩以消之加五味子麥門冬助
 人參瀉火益肺氣助秋損也在三伏中為聖藥 脇下
 急或痛俱加柴胡甘草人參 多唾或唾白沫胃口上
 停寒也加益智仁 若胃脘當心痛加草薺薏仁三分
 疲甚之人參芪白朮有用至一兩二兩者
 未砂安神丸 治心神煩亂怔忡兀兀欲吐氣亂而熱似
 懊懷狀

黃連一錢

生地黃

當歸身

甘草各半

朱砂一錢
研為衣

浙

右為末蒸餅丸黍米大每服十九或十五二十丸嚙津

下

升陽順氣湯

治因飲食不節勞役所傷腹脇滿悶短氣

遇春則口無味遇夏雖熱猶寒飢常如飽不喜食冷

升麻

柴胡各一錢

黃芪一兩

半夏三錢

甘草

炙半錢

陳皮一錢

人參一錢

神麩一錢炒

歸身一錢

黃栢半錢

五草豆蔻仁一錢

右咬咀每服三錢或半兩水煎入生姜三片

按論云脾胃不足之證須用升麻柴胡苦平味之薄者

陰中之陽引脾胃中清氣行於陽道及諸經生發陰陽

之氣以滋春氣之和也又引黃芪人參并草并温之氣
味上行充實腠理使陽氣得衛外而為固也凡治脾胃
之藥多以升陽補氣名之者也

參朮調中湯 瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食

黃芪 四分

桑白皮 五分

人參

甘草 多

白茯苓

各三分

五味子

二十箇

白朮

三分

地骨皮

麥門冬

陳皮 各二分

青皮 一分

右以咀作一服水煎大温服早飯後忌多言語勞役

按論云內經曰火位之主其瀉以甘以黃芪并温瀉熱
補氣桑白皮苦微寒瀉肺火定喘故以為君肺欲收急

食酸以收之以五味子之酸收耗散之氣止咳嗽脾胃
不足以其補之白朮人參炙甘草苦甘溫補脾緩中為
臣地骨皮苦微寒善解肌熱茯苓甘平降肺火麥門冬
甘微寒保肺氣為佐青陳皮苦辛溫散胃中滯氣為使
也

升陽益胃湯 治脾胃虛則怠惰嗜卧四肢不收時值秋

燥令行濕熱少退體重節痛口乾舌乾飲食無味大便
不調小便頻數食不消蒸見肺病洒淅惡寒擦擦不樂
面色惡而不和乃陽氣不伸故也當以升陽益胃名之

柴胡

白朮

茯苓

炙甘草

苦甘溫者勿
澤瀉各三錢

羌活

獨活

防風 各二兩

人參

半夏

甘草 各二兩

陳皮 四錢

白芍 五錢

何故秋旺用參朮芍藥之類及補益脾胃虛則脾俱

受邪故因時而補易為力也



右每服三錢水煎入姜棗早飯後溫服或加至半兩服

藥後如小便罷而病加劇是不宜利小便當少去茯苓

澤瀉若喜食初二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚

少胃氣不得轉運升發也須薄味之食或美食助其藥

力益外浮之氣而滋其胃氣慎不可淡食以損力而助

邪氣之降沉也。可以少役形體，使胃與藥得轉運升發。慎勿大勞役，使氣復之。若脾胃得安靜為佳。若胃氣稍強，少食果以助穀藥之力。經云：五穀為養，五果為助者也。

○此類諸方俱是補益之劑

傷食

九

丹溪心法

○傷食惡食者，胃中有物宜導。痰補脾用二陳湯加白朮。山查川芎蒼朮服之。

傷食 八 卷之三 十一

○憂抑傷脾不思飲食炒黃連酒芍藥香附同清六丸末
用姜汁浸蒸餅丸服

入方

治氣抑痰倦不思飲食

白蒼二朮 半夏製

黃栢各二兩 香附

圖 陳皮

白芍各二兩 扁栢七錢

黃連

右為末姜汁麵糊丸每服五十九丸滾白水下姜湯下更効

治心腹膨脹 內多食積所致

南星一兩半 半夏製

黃連三兩 姜礞石硝煨

瓜蒌仁

蘿蔔子

香附一兩童

連翹半兩

麝香少許
又方加陳皮半兩

右為末麪糊丸

一人因喫麵內傷吐熱頭痛

白木半錢

白芍

書陳皮

蒼木各二錢

茯苓

黃連

人參

甘草各半錢

右作一服姜二片煎服如口渴加乾葛三錢再調理

補脾丸

白木半斤

蒼朮

茯苓

陳皮各三兩

粥為丸如梧子大每服五十丸白滾水下

二陳湯

見痰類

傷食

公法付余卷之三

三

7

清六九

見泄瀉類

附脈理

官

脈訣舉要曰氣口緊盛為傷於食食不消化浮滑而疾

心法附錄曰傷食之証右手氣口必緊盛胃膈痞塞噫氣

如敗卵臭亦有頭痛發熱但身不痛為異耳

附諸方

荳蔻橘紅散楊氏家藏方溫經養胃升降陰陽和三焦化

宿食

丁香

木香各一兩

浙

白豆蔻仁

人參

厚朴姜製

神麴炒

乾姜炮

半夏麴

橘紅去白

甘草炙

藿香葉

去土

白朮各半兩

右咬咀每服三錢水一盞生姜三片棗二枚煎七分去

渣溫服

紅丸子和劑方壯脾胃消宿食并治冷瘧

京三稜水浸莪朮

陳皮去白

青皮去白各

乾姜炮

胡椒各二箇

右為末醋煮糊丸如梧子大以礬紅為衣每服二十九

食後姜湯下

丁香爛飯丸拔粹方治食傷又治卒心痛

丁香炭

甘草炙各二錢

砂仁三錢

益智仁二錢

香附子半兩 甘松三錢 丁香 京三稜炮

木香 廣木炮各館

右為細末湯浸蒸餅為丸如葶藶大每二十九白湯下

或細嚼亦可不拘時候

木香當歸散 實脾順氣消食

川芎 當歸 人參 官桂

三稜炮 莪朮炮 江 青皮炮 厚朴

麥蘖 乾姜炮 小茴香炒 木香

陳皮 甘草 浙 神麩炒 枳殼各等分

右次咀每服八錢水二盞生姜三片棗子一枚葱白三

草煎至一盞溫服大便閉倍加枳殼加枳實二兩炒去
乾姜食前服

○已上辛溫消導宿食之劑

麩藥枳木丸 治為人所勉強食之故心腹滿悶不快

白朮二兩

枳實

神麩炒

麥藥麩炒略

右為細末荷葉燒飯丸如桐子大每服五十九溫水下

消食化氣香鼓散

醒脾去積順氣化痰

青皮炒

陳皮炒各四兩

蘿蔔子炒

木香

三稜炒

蓬朮炒

浙神麩炒

麥藥炒各一兩

枳殼炒二兩

半夏二兩半

枳實炒一兩

香附子一兩

棋榔

山查

草果 各一兩

陳倉米 一升用巴豆二十粒炒黃色去巴豆不用

右為末醋糊丸如桐子大每服四五丸漸加至七八

十丸食後米湯或白湯下

一方 治食過飽滿悶

圖

青橘皮 二兩湯浸去穢炒黃

葛根 一兩

縮砂 半兩

右為細末濃煎茶調一二錢服乾舔喫亦可常服消食

化氣醒酒

寬中丸 丹溪秘方 治胸膈痞滿停滯飲食

山查 不以多少蒸熟晒乾

右爲末作丸服

大安丸丹溪秘方 脾經消導之藥

山查 二兩

神麴炒

半夏

茯苓各一兩

陳皮

蘿蔔子

連翹各半兩

白木 二兩

右爲細末粥糊丸服滾白水或米湯送下

○已上辛平消道宿食之劑

除濕益氣丸 治傷濕麵心腹滿悶肢體沉重

枳實 麩炒

白朮

黃芩 略一

蘿蔔子 炒熟去殼半兩

神麴 炒一兩

紅花 三錢

折

右爲細末荷葉燒飯爲丸如菘豆大每五六十九白湯

傷食
八法附食者之三
十五
丙
毛

下或姜湯下

二黃丸 治傷熱食痞悶元元欲吐煩亂不安

黃芩 二兩

黃連 酒浸一兩

升麻

柴胡 各三錢

甘草 二錢

枳實 半兩炒

右為極細末湯浸蒸餅丸如菉豆大每五七十九白湯

下或姜湯下

白朮丸 治傷豆粉濕麵油膩之物

白朮

半夏 湯洗

神麴 炒

枳實 炒各一兩

橘皮 七錢

黃芩 半兩

白礬 枯一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大一倍每五十九白

湯下量所傷加減服

○已上辛涼消導宿食之劑

水香見現丸 治傷生冷硬物心腹滿悶痰痛

巴豆霜半錢 荊三稜一兩 神麩一兩 水香二錢

香附半兩 炒石三稜半兩 升麻三錢 藜胡二錢

草豆蔻半兩 麩一兩



右為末湯浸餅丸如菉豆大一倍每三十丸白湯平量所傷服之

三稜消積丸 治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

丁香皮 益智各三錢 陳皮 青皮各五錢

茴香

炒半兩

炒麩

廣木炮

涼三稜炮

巴豆

和米炒去

館

右為細末醋糊丸如梧桐子大每十九至二十九溫姜

湯下食前看虛實加減如更衣止後服

如意丸 濟生方 治氣虛積冷 碎食不消 心下堅痞 噫宿腐

氣及霍亂吐瀉水穀不消一切食積之疾並皆治之

半夏

湯洗七次

三稜

江

枳殼去穰

檳榔

陳皮

乾姜

黃連

蓬木各二兩

巴豆

用三七粒連殼

浙

右除巴豆外餘藥剉如豆大用好酒煮乾用巴豆同藥

焙為末薄糊丸如菉豆大每服十九加至二十九用茶清姜湯任下食後溫服孕婦不宜服之

阿魏丸 濟生方 治脾胃怯弱過食肉麵生果之物停滯中

焦不能消化以致腹脹刺痛嘔惡不食或利或秘並皆治之

百草霜 三錢 巴豆 去皮心腹 阿魏 酒浸 官桂 不見火

蓬朮 炒 麥蘖 炒 神麴 炒 青皮 去白

蘿蔔子 炒 白朮 江 乾姜 炮 各半

右為末和勻用薄糊丸如菉豆大每服二十九不拘時麵傷用麵湯下生果傷用射香湯下

湯食 卷之三 王棟三百七

混元鄧山房神効感應丸 常服消食除積滯不動藏府

丁香

木香

官桂香

陳皮

甬沉香

不見

青皮

黃連

砂仁

香附去毛

三棱罈

書

半夏湯炮七衣

義木十分大者用面裹煨

以上藥各一兩淨研為細末外用肥烏梅有肉者一百

枚去核巴豆三百粒肥白者去皮膜心石用磁器一隻

盛巴豆以烏梅肉蓋之却用陳米醋浸與烏梅肉平於

甕上蒸以巴豆紅色為度却搗二件令極爛次用糯米

糝和前件諸藥搜勻搗千百下以黑為度衆手丸如羅

蔔子大每服十九飲食不消陳皮湯下氣滯茴香湯下

酒後嘔吐痰涎生薑湯下

秘方化滯丸 理一切氣化一切積奪造化有通塞之功

調陰陽有補瀉之妙又堅沉痼磨之自消暴積乍留導

之立去

南木香 堅實者不見火 丁香 去苞下 青皮 四花者去穢

紅橘皮 水濕去 黃連 二者各半 京三棱 慢火煨

莪朮 慢火煨各四分 半夏 煉白淨半夏研末搗生薑自然汁和為餅晒乾二錢五分

前八味晒乾和研為細末

巴豆 去殼滾湯泡逐一研開去心膜以瓦器盛用好醋浸過一指慢火熬至醋乾秤大錢重碾細將

前藥末和再碾令勻入後烏梅肉膏巴豆若乾

湯食

心法附錄卷之三

大

一

烏梅用肉厚者打碎去核細切大焙乾為細末秤五錢重用米醋調勻清慢火熬成膏和入煎藥

右通和勻了用白麵八錢重水調得所慢火調糊為丸

如粟米大每服五七丸人盛者十九五更空心用橘皮

湯下 常服磨滯不欲通泄津液嘔下 停食飽悶枳

殼湯下 但有所積物取本汗冷下 因食吐不止津

液嘔下即止 食瀉不休及霍亂嘔吐俱用冷水下

赤痢冷甘草湯下 白痢冷乾姜湯下 心痛石菖蒲

湯下 赤白痢冷甘草乾姜湯下 諸氣痛生姜橘皮

湯下 小腸氣痛茴香酒下 婦人血氣當歸湯下

若欲宣積滾姜湯下 仍加丸數未利再服利多飲冷

水 口補住

小兒量歲數加減丸服疳積常服米飲

下不拘時服

孕婦勿服此藥得執則行得冷則止

海藏神應丸

治因一切冷物冷水及瀉乳酪水腹痛腸

鳴水穀不化

巴豆

杏仁

乾姜

百草霜各半

丁香

木香各二

錢黃蠟一兩

兩

右先將黃蠟用好醋煮去粗將巴豆杏仁同炒黑烟盡
研如泥將蠟再上火入小油半兩溶開入在杏仁等泥
子內同攪旋下丁香等藥末研勻搓作挺子油紙裹子
旋丸每用三五丸溫米飲下食前服

○已上辛溫推逐宿食之劑

大柴胡湯

治內傷飲食鬱結在裏身熱煩燥日晡發熱

如瘡脈實而滑數者用此微利

方見胃寒類

三黃枳朮丸

治傷肉食濕麵辛辣味厚之物填塞悶亂

不安

圖

黃芩二兩

黃連

大黃煨

神麴炒

白朮

橘皮各一兩

枳實炒半兩

右藥末湯浸蒸餅丸如棗豆大一倍每五十丸白湯下

量所傷服之

枳實導滯丸

治傷濕熱之物不得施化而作痞悶不安

茯苓

黃芩

白朮

黃連 各三錢

澤瀉 二錢

大黃 一兩

枳實 炒

神麴 各五錢

右為細末如上法丸服至七十丸

大枳殼丸 御藥院方治一切酒食傷胸膈閉悶痰痛飲食

不消兩脇刺痛嘔逆惡心並皆治之

蓬莪朮

煨香

厚朴

去粗皮 姜汁製

青皮

黑牽牛 炒

枳殼

麩炒去穢

木香

陳皮 去白

白朮

各一兩

大黃 錦紋者 各二兩

半夏

湯炮七次

麥蘖 微炒

三稜 各一兩

一方有乾生姜 五錢

右為末姜汁糊丸如梧桐子大每服三四十丸姜湯下
常服美食

木香檳榔丸 治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大小便
結滯不利者並亦服之

木香

檳榔

青皮 去白

陳皮 去白

枳殼 麩炒

廣茂 煨切

黃連 各一兩

黃柏 去粗皮

香附

大黃 炒各三

黑牽牛 各三兩

右為末滴水丸如豌豆大每服三五丸食後生薑湯

送下加至以利為度

木香和中丸 和脾胃消宿食利胸膈化痰涎除膈熱進

飲食

木香

黃芩

青礞石

枳殼

檳榔

青皮

橘紅各半兩

滑石二兩

沉香二錢

大黃一兩

黑牽牛

頭末二兩三錢

右為末水丸如梧桐子大每服五十丸姜湯或茶清下

○已上辛涼推逐宿食之劑

○廣按已上方中用巴豆大黃者蓋取其推逐積滯積滯去而正氣自復矣如用石灰於田中殺稂莠稂莠死而禾苗自茂也夫巴豆性大熱號為斬關奪門之將若傷生冷硬物不能消化用之推逐可也若施之

於傷濕熱之物則是以火濟火而反助病邪矣大黃
性大寒號爲將軍若傷濕熱之物不能轉運用之推
逐可也若施之於傷生冷之物則是以寒治寒而打
格不入矣又常論之人有虛實病有新久若夫少壯
新病者固當用藥推逐急去爲美若夫衰老久病者
又當用藥消導漸去爲佳東垣所謂輕則損其穀重
則遂其滯是也雖然病之新久要分而用藥寒濕不
可不察丹溪所謂明知身受寒氣口噴寒物而得病
者於初得之時當與溫散溫利之藥若曰病得之稍
久則成蠶又驚即蒸熱熱久心牛火若欲行溫散溫

利之藥寧無助火添病耶惟當用辛涼以發表辛寒以理中則邪易伏病易退正易復而病安矣

葛花解醒湯 按粹方治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足戰搖飲食減少小便不利

白豆蔻 砂仁 葛花各半兩 木香 半錢

青皮 三錢 陳皮 白茯苓 猪苓

人參 各一錢 白朮 神麴炒 澤瀉

乾生姜 各二錢

右為細末和勻每三錢白湯調下但得微汗酒病去矣論云此蓋不得已用之豈可恃賴日日飲酒耶是方氣

味辛温偶因酒病服之則不損元氣何者敵酒病故也
若頻服之損人天年也 **館**

○廣按藥乃氣之偏可用於暫而不可用於久有病則
病當之無病則正氣當之所以不可久也

除濕散 治傷馬乳并牛駱水一切冷病

車前子炒 澤瀉各半兩 神麩炒一兩 半夏湯炮七

乾生姜 錢各三 紅花 江甘草錢各三 茯苓七錢

右爲細末每三錢七白湯調合前服

五苓散 見中暑類

○廣按酒作濕熱治之之法或發汗或利小便使上下

分清其濕是也。已上三方並滲利之劑也。

益脾丸 治飲酒不醉又益脾胃

葛花 二兩

小豆花 二兩

菘豆花 五錢 木香 二錢半

一方加草豆蔻

一兩 去皮

書

右件為末蜜丸如梧子大葛花湯下十丸或夜飲津液下五丸最妙

圖

葛花散 御藥院方 治飲酒令人不醉

葛花

小豆花 略一兩

右件為末每服三錢調仍進葛汁及枇杷葉飲倍能飲

酒 又九月九日其菊花末飲酒時先服方寸匕

小豆花葉陰乾百日為末服之能消酒

烏梅丸 消酒食

神麩炒 烏梅

麥蘖

龍腦葉

右以其草膏子為丸

硼砂丸 消酒清膈

圖

硼砂三錢

片腦五分

射香半錢

薄荷葉一錢

右以其草膏子為丸硃砂為衣每服一丸嚙化

不醉方

菡豆

亦豆

葛根等分

右為末當未飲酒之前用冷水調一匙或二匙服之

人不醉

入方雞胚脰乾葛等分為末
糊丸如梧桐子大每服五
十九酒送下

神妙列仙散 治飲酒所傷以致遍身疼痛腰脚強跛手足頑麻胃脘疼痛胃膈滿悶肚腹膨脹嘔吐瀉利及酒食停久成一應積聚黃疸熱鼓並皆治之

木香

沉香

茴香

檳榔

篇蓄

大黃

麥蘖

瞿麥

右為末每服三錢或五錢五更熱酒調下能飲者多飲
二三盃不妨仰面臥手叉胸前至天明取下大便如魚

馬... 三... 五...

腦小便如血為効忌生冷硬物及葷腥止啖米粥

○已上消導宿酒之劑

備急大黃丸 療心腹諸痛卒暴百病

大黃

乾姜

巴豆

去皮各兩

右精擇藥品為末蜜和更搗一千杵丸如小豆大每服

三丸大小量之若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺

痛氣急口噤尸厥卒死者以熱水或酒服之或口噤用

木棒撐起牙關令下咽須臾差未差更與三丸以腹中

鳴轉即吐下便愈若口噤漬折齒灌之令入為妙已盧

筍猪肉冷水肥膩之物易冰張先生又名獨行丸乃急

劑也

瓜蒂散 治上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死何謂也下部無脈此所謂木鬱也飲食過飽填塞胃中者太陰之分內經云氣口反大於人迎三倍食傷太陰故曰木鬱即達之吐者是也

瓜蒂

赤小豆

右二味為極細末每服一錢七溫漿水調下取吐為度若不兩手尺脈絕無者不宜便用此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胃中空塞悶亂不通以指探去之如不得吐者以物探去之得吐則已如是食不得去者方用

此藥去之○已上二方劫奪壅滯之劑

調補脾胃 十館新增

附論

唐按內經曰胃者五藏六府之海也水穀皆入於胃
 五藏六府皆稟氣於胃胃者五藏之本六府之大源
 也又曰胃為水穀之海飲食入胃遊溢精氣上輸於
 脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四
 布五經並行合於四時五藏陰陽候度以為常也以
 此論之若夫飲食有節寒溫適宜則脾胃壯實而氣

書

納受水穀運化精微充溢五藏六府榮衛四肢百骸
以供給日用動作云爲若夫飲食失節寒溫不適則
脾胃虛弱不能納受水穀運化氣液則五藏六府失
其所稟受四肢百骸失其所榮衛而日用動作云爲
失其所供給也况土爲五行之本萬物籍土而生古
人以扶持脾胃爲王道之藥厥有旨哉今於調補脾
胃條下謹述內經之旨及予僻見欲人知節飲食適
寒溫爲養脾胃之本倘脾胃虛弱又當以後開諸方
擇而用之苟得脾胃壯實則外邪不能侵內邪不能
起固本澄源之事也

附諸方

調中益氣湯 夫脈弦洪緩而沉按之中指下得一濇其

證四肢滿閉肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安

忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味大小便清利而數或上

欽下便或大便澁滯不行一二日一見夏月飧泄米穀

不化或便後見血見白膿胃滿短氣咽膈不通安臥嗜

嚙無力不思飲食

升麻二分 黃芪一錢 甘草半錢 蒼朮四分

木香一分 人參五分 柴胡二分 橘皮二分

右以咀作一處水煎食前熱服

如特顯熱躁是下元蒸蒸發也加生地黃黃柏

如大便虛坐不得或大便了而不了腹常逼迫血虛血

澁也加歸身

白朮和胃丸 治久病不能食而臟腑或結或澁此胃氣

虛弱也常服則和中理氣消痰去濕和脾胃進飲食

厚朴製

半夏各一兩

圖曰木一兩二錢

陳皮八錢

枳榔

枳實各二錢

木香一錢

人參七錢

甘草炙三錢

右為末生姜汁浸蒸餅丸如梧桐子大每三十九溫水

食遠服

補脾丸 心法秘方 有脾虛而惡湯藥者製此丸用湯吞省

口苦而易於從也

白朮 半斤

蒼朮

茯苓

陳皮 各三兩

芍藥 半兩

右為末粥糊丸加潤下丸可作催生用上熱甚者加清

金丸尤妙與此藥必無產患

潤下丸

見痰類

青金丸

見咳嗽

白朮丸 心法秘方 同前

白朮 一兩

白芍藥 半兩

言... 八... 卷之三... 二十七... 丙... 三

冬月不用芍藥加肉豆蔻泄者炒丸服

右為末粥丸

一方枯礬半夏各一錢半治脾水

養脾丸 和劑方治脾胃虛冷心腹脹悶嘔逆惡心泄瀉

大麥蘖炒 白茯苓去皮 人參去芦各一斤 白朮半斤

乾姜炮 縮砂去皮各一斤 甘草炙一斤

右為末煉蜜為丸每兩作八丸每服一九細嚼姜湯下

思食調中丸 御藥院方治脾胃久弱三焦不調氣滯膈

痞悶不食嘔逆惡心或吐痰水

神麴炒 麥蘖炒 陳皮去白 半夏麴炒

詩經
心法所查卷之三
三十八

烏藥 各一兩
檳榔
人參 各七錢
白木 二兩半

木香
沉香 各半兩

右為末蜜調白麵打糊丸如梧桐子大每服二十九米
飲吞下

治中湯和劑方治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或泄瀉

人參 去芦
甘草 炙
乾姜 炮
白朮

青皮 去白
陳皮 去白 各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去渣空心溫服嘔吐
不已加半夏等分丁香減半名丁香溫中湯

補脾湯 三因方治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不

消

人參 去芦

茯苓 去皮

草果 去皮

乾姜 炮各

麥蘖 炒

甘草 各二兩半

厚朴 去皮姜製

陳皮 去白

白朮 各七錢半

書

右咬咀每服四錢水一盞煎七分去渣空心溫服

溫脾散 本事方 開胃進食利氣散寒濕中

青皮 去白

陳皮 去白

江縮砂仁

舶上茴香 炒

良姜

桔梗

白芷

厚朴 各一兩

木香

麥蘖

浙香附

白朮 各半兩

甘草 一兩半

紅豆

乾葛 各三錢

右咬咀每服三錢水一盞藥一枚煎七分去渣空心服

生胃丹 生胃消痰沫開胃膈進飲食

粟米四兩溫水浸透作飯焙乾乘熟用生姜自然

天南星二兩姜汁浸一宿次日用生姜自然汁和紙

取出南星用



人參 白木 茯苓 各二兩 陳皮

白豆蔻 縮砂 麥蘖炒 半夏麴

青皮 葶澄茄 石蓮肉 各一兩 南木香 三錢

右為米粉糊丸如菉豆大每服五十九丸姜湯送下

○廣按脾胃氣虛則不能運化水穀水穀停積則為濕

痰曰補氣曰消食曰燥濕痰三者不可偏廢也此方
中人參白朮以補氣麥蘖砂仁以消食南星半夏以
燥濕痰其餘茯苓滲濕陳皮青皮利氣白豆蔻薑渣
茄開膈南木香調氣石蓮肉清心可謂周而且備矣
肥白人氣虛有濕尤宜服之

道寧純陽丹 治真元虛損心腎不安精神耗散脾土濕
敗不能化食所食五味之物不成精液及成痰涎聚於
中脘不能傳導以致大腸燥澁小便及多而赤或時嘔
吐酸水久成翻胃結腸之證

蒼朮

堅實者米泔水浸三日再換淨水
浸先切晒乾以清鹽水浸一宿

開胃

心法寸余卷之三

三

行

蓮肉

好者去心皮淨酒浸一宿各四兩

右大公猪肚一箇壁上揉洗浸納入前二味以綿縫密

用無灰酒煮爛取起入石臼中搗爛捏成小餅烘乾研

為細末入後藥

南星

四兩淨切細以姜汁一宿以竈心土同炒去土不用

大半夏

四兩湯炮去涎晒乾為末以好醋浸七日蒸熟不麻為度入藥中

橘紅

四兩到以竈心土炒去土不用

厚朴

白木

麥芽炒

甘草

人參

茯苓

白豆蔻

三稜

義木

縮砂

萼澄茄

木香

丁香

沉香各半兩 粟米四兩浸炒

右為細末稀麵糊為丸如梧桐子大每服六七十丸空

心米飲下

八味理中丸百一選方治脾胃虛寒飲食不化胃膈痞悶

或嘔吐痰水或腸鳴泄瀉

縮砂仁

川姜

圖麥麩各二兩

白茯苓

神麩炒

人參各一兩

白朮四兩

甘草炙二兩

右為末煉蜜丸每兩分作十九空心用一丸姜湯嚼下

或加半夏麩一兩為末入棗煎服亦可

大藿香散 治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮痛泄瀉

同胃

心法

三一

一

言胃
不已最宜服之

方見泄瀉類

養胃湯

三因方

治脾胃虛寒逆惡心腹脇脹痛腸鳴泄

瀉或有外感寒熱如瘧骨節煩疼並皆治之

藿香

去梗

厚朴

姜炒

書

半夏

湯洗

茯苓

草果

附子炮

甘草炙

陳皮

去白

人參各一錢
白朮

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚烏梅半箇

煎溫服

天下受拜平胃散

澹寮方

治脾胃不和嘔吐痰水胃膈痞

滯不美飲食並治

厚朴去皮 陳皮湯洗存白 生姜

甘草炙

茅山蒼朮

米泔水浸一宿 去皮晒乾五兩剉

南京小棗

二百枚 去核

右用水五升煮乾搗作餅子晒乾再研為末每服二錢

益湯點服泄瀉姜五片烏梅二箇水盞半煎服

平胃散 御藥院方 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹痛

刺痛口苦無味胃滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色萎

黃肌體瘦弱怠惰嗜臥體重節痛常多自利或發霍亂

及五噎八痞膈氣反胃宜服

厚朴製

橘皮各五兩

蒼朮

泔浸八

甘草

茯苓

各二兩

人參

二兩

右咬咀水二盞生姜三片棗一枚煎至一盞去渣溫服
 不拘時一方棗肉丸小豆大服五十丸姜湯下空心常
 服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非節之
 氣

加減平胃散按梓方治脾胃不和進飲食常服暖胃消
 痰

蒼木米泔浸厚朴姜制炒陳皮各五兩甘草炒三兩

右為末每服五錢姜三片棗一枚煎服入鹽一捻沸

湯點服亦可若瀉脾濕加茯苓丁香白朮為調胃散

一法加藿香半夏若加乾姜為厚朴湯若瘟疫時

氣二毒傷寒頭痛壯熱加連根葱白五寸豆豉三十粒
 煎二三沸微出汗愈 若五勞七傷手脚心熱煩燥不
 安百節酸疼加柴胡 若痰嗽瘧疾加姜製半夏 若
 本臟氣痛加茴香 若水氣腫滿加桑白皮 若婦人
 赤白帶下加黃芪 若酒傷加丁香 若飲冷傷食加
 高良姜 若滑脫泄瀉加肉豆蔻 若風痰四肢沉困
 加荆芥 若腿膝冷痛加牛膝 若渾身虛羸拘急加
 地骨皮 若腿膝溫痺加皂絲子 若白痢加吳茱萸
 若赤痢加黃連 若頭風加藁本 若轉筋霍亂加橘
 木皮 若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重膝腿酸

法加霍香半夏 若加乾姜厚朴湯

若石瘟疫時

疼及婦人宮藏久冷月脉不調者加桂 若胃寒嘔吐

多加生姜一法加茯苓丁香各三兩共成六味 若氣

不舒快中脘痞塞加宿砂仁香附子各三兩生姜煎服

若五苓散相伴為對金飲子 若與六一散相合為

黃白散 若與錢氏異功散相合為調胃散 若欲遠

飲食加神麩麥蘗吳茱萸更蜀椒乾姜桂為吳茱萸湯

若加藁本桔梗為和餅散治傷寒吐痢 若加藿香半

夏為不換金正氣散 若瘧疾寒熱加柴胡 若小腸

氣加苦練茴香 五苓散六一散方見異功散方見本

調胃散 御藥院方 療陰陽氣不和三焦痞膈五勞七傷山

嵐瘴氣八般癘疾四時傷寒頭目肢節疼痛腹脹滿嘔吐惡心痰嗽手足虛腫五種膈氣噎塞寒熱水瀉諸病脾胃不和飲食減少並皆治之

藿香

甘草炙

書 陳皮

去白

厚朴

去皮每兩用姜一兩製

半夏

每兩用生姜三兩半製

右五味各二兩同為細末每服四錢水一盞生姜三片煎至半盞食前溫服

功效散 按粹方 治脾胃虛冷腸鳴腹痛自利不思飲食

人參

茯苓

浙白朮

甘草炙

橘皮 各等分

胃

去

九

百

右咬咀每服五錢生姜三片棗一枚水二盞煎八分温服

六君子湯聖惠方治脾臟不和進飲食上燥下寒服熟藥不得者

人參 白朮 各一兩 橘紅 半夏 湯炮七

枳殼 去穢 麩 甘草 炙 各半兩

右咬咀每服一兩生姜七片棗一枚水二盞煎至一盞去渣温服

枳朮丸 按粹方治痞消食強胃 見痞類

橘皮枳朮丸 衛生寶鑑治老幼元氣虛弱飲食不消或臍

腑不調心下痞悶 見痞類

半夏枳朮丸 按粹方 治因冷食瀉傷

白朮

枳實 煨炒

館

半夏

湯炮七次 各等分

右為末用荷葉燒飯為丸 如梧桐子大每服五十九白

湯下

木香乾姜枳朮丸

蘭室秘藏

破除寒滯氣消寒飲食

木香 三錢

乾姜 半兩炮

枳實 一兩炮

白朮 一兩半

右件為末用荷葉燒飯為丸 如梧桐子大每服二十九

溫水送下食前服

木香人參生薑枳朮丸 按粹方 開胃進食

言胃
八法四會卷之三
三五
五
五

木香 三錢
人參 三錢半
乾生薑 一錢
枳實 一兩炒

白木 一兩半
橘皮 四錢
館

右件為末用荷葉燒飯為丸如梧桐子大每服三五

丸溫水送下食前服

藿香安胃散衛生寶鑑治脾胃虛弱不能飲食嘔吐不待腐熟

藿香 丁香 人參 各二錢 橘紅 半兩

右以咀水二盞生薑三片煎至一盞溫服不拘時

和中丸按粹方治病久虛弱厭厭不能食而臟腑或秘或

澹此胃氣虛也常服則和中理氣消痰去濕厚腸進飲

食

厚朴製一兩 白朮一兩二錢 半夏製一兩 陳皮去白八錢

檳榔四錢 半木香二錢半 甘草多二錢半 枳實炒三錢半

右為末 姜汁浸餅為丸 如梧桐子大 每服三五十九溫

水下

枳縮二陳湯 理脾胃 順氣寬膈 消痰飲

砂仁

枳實

圖茯苓

半夏

陳皮

甘草多等分

右剉每服六錢 水一盞 半生薑五片 煎八分 溫服

寬中進食丸 滋形氣 美飲食

神麴炒四錢 甘草多一錢 木香五分

草豆蔻仁五錢

枳實炒四錢 半夏七錢 人參一錢 乾薑一錢

青皮一錢 陳皮 館白朮 白茯苓

澤瀉各二錢 猪苓一錢 砂仁一錢半 太麥芽一兩

右為細末湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服三四十九溫

米飲下食遠服之



參香散 三因方治心氣不足諸虛百損常服調榮衛寧心

志去脾胃寒濕進飲食

蓮肉去心一兩 甘草炙七錢 人參 白朮

白茯苓 丁香 乾姜炮各半 山藥

烏藥 砂仁 沉香各二錢 檳榔

黃芪

帶木香

檀香絡二錢

右每服四錢米一匙生薑三片棗一枚煎食前服一方
加附子一枚

○廣按脾惡濕而好燥古方中多用燥藥為脾濕故也

然胃火亢甚口燥咽乾軀歲不食又當以潤劑治之

已上諸方治脾濕之劑也下諸方治胃火之劑也

參苓白朮散和劑方治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄

瀉及大病後調助脾胃此藥最好

白朮

人參

折耳草

山藥

白茯苓法度者白朮

一斤半去

蓮子肉

薏苡仁

砂仁

桔梗炒一斤

右為末每服二錢棗湯調下

芩珍散本專方開胃養氣溫脾進食

人參

白朮

黃芪蜜炙

山芋

茯苓

粟米

圖北草各一兩

一方加白扁豆一兩蒸用名芩珍散

右為末每服三錢水一盞薑棗煎服

橘皮竹茹湯濟生方治胃熱多渴嘔噦不食

赤茯苓

去皮

橘皮

去白

此

麥門冬去心

青竹茹

半夏湯洗

各半

各半

人參各半兩

右吹咀每服四錢水一盞薑五片煎至七分不拘時服

八珍湯御藥院方和血氣理脾胃

當歸

赤芍藥 館川芎

熟地黃

人參

白茯苓

甘草

砂仁各等分

右吹咀每服三錢水一盞薑七片棗三枚煎至七分空

心溫服

圖

和中散直指方和胃氣止吐瀉

石蓮肉

茯苓各二錢

藿香

人參

甘草炙

白扁豆

浙天麻

木香

白朮各半兩

調胃

本草綱目卷之八

卷之八

本草綱目

右吹咀每服四錢水一盞姜三片煎七分去渣溫服

增損白朮散御藥院方生津止渴順氣下痰

白朮

葛根

茯苓

藿香葉

人參

木香上各

陳皮二兩

乾生姜一錢

右吹咀每服一兩用水二盞煎至一盞溫服不拘時

生姜和中湯按粹方治食不下口乾虛渴四肢困倦

柴胡二分

升麻三分

藁本半錢

羌活七分

蒼朮一錢

黃芩一錢生酒黃芩一分

葛根半錢

甘草一分生

甘草炙一分

橘皮二分

白朮五分

右吹咀作一服水二盞生姜五片棗二枚煎至一盞

渣温服

凝神散 病後收斂胃氣清涼肌表

人參

白朮

館茯苓

山藥各一兩

粳米

扁豆炒

知母

生芩

茸草

錢各五

淡竹葉

地骨皮

麥門冬

錢各二

右咬咀每服五錢水盞半姜三片棗一枚煎至一盞去

渣温服

加減枳朮丸

明醫雜著

論曰人之

一身脾胃為主胃陽主

氣脾陰主血胃司納受脾同運化一納一運化生精氣

津液上升糟粕下降斯無病矣人惟飲食不節起居不

時損傷脾胃損則不能納脾損則不能化脾胃俱損
納化皆難元氣斯弱百邪易侵而飽悶痞積悶格吐逆
腹痛泄痢等證作矣况人於飲食豈能一一節調一或
有傷脾胃便損飲食減常元氣漸憊矣故潔古製枳朮
之丸東垣發脾胃之論使人常以調理脾胃爲主後人
稱爲醫中王道厥有旨哉近世論治脾胃者不分陰陽
氣血而率皆理胃所用之藥又皆辛温燥熱助火消陰
之劑遂致胃火益壯脾陰愈傷清純中和之氣變爲燥
熱胃脘乾枯大腸燥結脾臟漸絕而死期迫矣殊不知
脾胃屬土屬濕位居長夏故濕熱之病十居七八况土

居四季寒熱溫涼各依其時豈可備用辛熱之劑哉今
舉枳朮丸方之加減法於後

白朮二兩
去梗

枳實一兩
麩炒

右為細末荷葉包飯燒取出杵爛和藥杵勻丸如薤子
大每服五六十九清米湯下此法一補一消取飲食
化不令有傷東垣加陳皮二兩橘皮枳朮丸治老幼
元氣衰弱飲食少進久服令人多食而不傷

若元氣素弱飲食難化食多即腹中不和疼痛泄瀉此
虛寒也加人參白芍藥酒神麩炒大麥芽炒并去皮

宿砂木香各五錢

若素有痰火胃膈鬱塞酸噎氣及素有吞酸吐酸之

證或有酒積瀉結痛此皆濕熱也加黃連煨汁白芍

藥酒陳皮各二石膏生甘草各五縮砂木香各二川

芎四錢

若傷食飽悶痞塞不消加神麴大麥芽山查子各一有

食積痞塊在腹者再加黃連厚朴瓜蒌製各積堅者

再加蓬朮醋昆布各三錢

若傷冷食不消腹痛瀉泄加半夏製縮砂乾姜各神

麴大麥芽各五錢

若人性多氣惱夾氣傷食氣滯不通加川芎香附米各

兩木香黃連姜製各五錢

若胃膈不利人過服辛香燥熱之藥以致上焦受傷胃

腕乾燥嘔吐膈噎及胃加黃連姜炒山梔子炒各五錢白芍

藥當歸各一兩桔梗生甘草石膏各五錢胃膈頑痰膠結

及大便秘再加芒硝五錢

若素有痰者加半夏姜炒橘紅白茯苓各一兩黃芩炒黃連

姜炒各五錢

若人能食好食但食後及飽難化此胃火旺脾陰虛也

加白芍藥酒炒一兩半人參七錢石膏火煨生甘草五錢黃連

炒香附米炒木香各四錢

同胃
小法付余卷之三
百三十五

若年高人脾虛血燥易飢易飽大便燥難加白芍藥當

歸各一人參乾升麻甘草炙絡山查子大麥芽桃仁

去皮尖各五錢此老人常服藥也

加減保和丸 消痰利氣扶脾胃進飲食 古菴方

山查 神麴炒 半夏湯炮七次 茯苓去皮各

陳皮洗 連翹 蘿蔔子各二兩 白朮五兩

蒼朮米泔浸去粗皮枳實去皮各一兩香附酒浸厚朴姜製各

黃芩去腐酒浸炒黃連去須酒浸炒各一兩

右為細末姜汁麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸漸

加至七八十丸食後茶湯任下

橘連枳朮丸 古菴方 健脾消痞清熱見痞類

○廣按脾胃虛弱不能運化水穀初時則為寒濕宜用
辛香燥熱之劑以散之丹溪曰苟方用燥藥為劫濕
病也濕得燥則訟然而收正猶又雨山川溟濛地土
駸汩不能生物必須杲日普照然後山川清明地土
和爽方能生物也苟飲食停積日久濕能生熱熱化
為火火能傷氣耗血則為執燥宜用辛甘苦寒之劑
以潤之正猶又旱山川蒸滲地土乾焦不能成物必
須甘霖遍及然後山川清涼地土滋潤方能成物也
故調補脾胃之劑知新久之異燥潤之宜可也

○此類諸方一補一消之劑

○廣按內傷用藥曰補益之劑調補脾胃用藥曰一補

一消之劑傷食用藥曰消導之劑曰推逐之劑其實

一源流也

圖

江

浙

里

丹溪心法附餘卷之四

休寧東山 醫方廣約之類集

風門

破傷風

十一書

圖

丹溪心法

○破傷風多死 防風全蝎之類 非全蝎不開于箇為

末酒調日二次 破傷風血凝心 鴉翎燒灰存性研細酒

調一錢

皮傷

丹溪心法附餘卷之四

一百一十四

入方 破傷風發熱

瓜蒌子九錢 滑石一錢 獨活

蒼朮

赤芍

陳皮一錢 黃連

炒栝

黃芩

白芷半錢 甘草些小

右姜一斤煎服

圖

附諸方

防風湯 後粹方 治破傷風 內傷寒 表証未傳入裏 宜急服

此藥

防風

羌活

浙獨活

川芎各等分

右以咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣通口服不

拘時候服後宜調蜈蚣散大効

蜈蚣散 按粹方

蜈蚣 一隻

江鰮 五錢

左盤龍

鹽炒

右為末每服二錢用防風湯調下如前藥鮮不已覺轉入裏當服左龍丸服之漸漸看臟腑硬軟加巴豆霜左龍丸 按粹方治直視在裏者

左盤龍 炒

僵蚕 炒

江鰮 炒

雄黃 一錢

右為末燒飯丸桐子大服十丸酒下如裏証不已當於左龍丸內一半末入巴豆霜半錢燒飯丸桐子大同左龍丸一處每服加一丸漸加服至利為度若利後更服

按

...

...

...

後藥若搐痊不已亦宜服後藥羌活湯

羌活湯 按粹方

羌活

獨活

地榆

防風各二兩

右以咀每服五七錢水一盞煎至一盞去渣通口服有

熱加黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃

全氣養血為度

養血當歸地黃湯 按粹方

江

當歸

地黃

芍藥

川芎

藁本

防風

浙

白芷

各二兩

細辛

五錢

右為籠末每服一兩水二盞煎至一盞通口服食前

○已上五方治破傷風自表入裏之劑

羌活防風湯 按粹方 治破傷風邪初傷在表

羌活

防風

川芎

藁本

當歸

芍藥

甘草

各四兩

地榆

細辛 各二兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時
量緊慢加減用之熱加黃芩二兩大便秘加大黃一兩
緩緩令過

白朮防風湯 按粹方 若服前藥過多有自汗者

白朮

黃耆

各一兩

防風

二兩

右次咀每服五六錢水二盞煎至一盞去渣溫服不拘
時候破傷風臟腑秘小便赤用熱藥自汗不休故知無
寒也宜速下之先用芎黃湯三二服後用大芎黃湯下
之

芎黃湯 按粹方

川芎 兩

黃芩 六錢

甘草 一錢

右次咀每服五七錢水二盞煎至一盞去渣溫服不拘
時候

大芎黃湯 按粹方下藥

川芎 半兩

羌活

黃芩

大黃 各一兩

浙

圖

書

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時

羌活湯按粹方治半在表半在裏

羌活去芦

菊花去梗

麻黃去根節

白茯苓去皮

川芎

防風去芦

石膏研

前胡去芦

黃芩

蔓荊子

細辛去葉

枳殼各一兩

甘草炙一錢

薄荷

圖香白芷各半兩

右咬咀每服一兩水二盞生姜五片煎至一盞去渣通

口服食後渣再煎服

白木湯按粹方治破傷風大汗不止筋掣搐搦

白木

葛根

芍藥

升麻

按

心法村餘卷之四

四

百三十七

黃芩

各五錢

甘草

三錢半

右吹咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣溫服不拘時

鯨鱗丸

按持方

治破傷風驚而發搐臆暗秘澁知病在裏

可用下藥

江鱗

剉炒

野鴿糞

剉炒

白姜

各五錢

雄黃

兩

蜈蚣

一對

天麻

一兩

右為末作三分二分用燒飯丸桐子大硃砂為衣一分

巴豆霜二錢半亦燒飯丸桐子大每服硃衣丸二十九

加巴豆霜丸一丸第二服加二丸加至利為度再服硃

砂丸病愈止

砂丸病愈止

○已上七方亦治破傷風邪表裏之劑

玉真散 瑞竹堂方 治破傷風及金刃傷打撲傷損

天南星

官防風 等分

右為未破傷風以藥敷貼瘡口然後以温酒調一錢如
牙關緊急角弓反張用藥三錢童子小便調下或因歐
打內有損傷以藥一錢温酒調下打傷欲死但心頭微
温以童便灌下三錢併進二服天南星為防風所製服
之不蘇衛生寶鑑名定風散治類狗咬破先口罅內藥水
洗淨用綿乾貼藥更不再發無膿大有効

如聖散 聖惠方 治破傷風止血定疼

散

心法

五

百三

石仿

八江所錄卷之四

三

蒼朮 六兩

川烏頭炮 防風

草烏頭炮 去

細辛 各二兩

兩頭尖炮 天麻

川芎

白芷 各兩半

蝎稍 炒

雄黃 各半兩

損骨加乳香 半兩

書

右為細末每服一錢酒調下不拘時服

一方 治破傷風手足顫掉不已者

人手足指甲

炒絕烟

江 硃砂另研

天南星姜製

獨活 各二錢

右為末分作三服酒調下不拘時候

保命丹 治破傷風

辰砂

射香

川烏去皮尖

大牛黃

辰砂

射香

川烏去皮尖

大半夏生各錢

藜蘆

去土三錢

雄黃半兩

右為末棗肉丸如雞頭實大每一丸嚼細溫酒下若牙

關急幹開灌下吐涎為効如吐不止生葱湯止之不吐

更用半丸大効

一字散 如前

圖

金頭蜈蚣

一條半

天麻半兩

草烏頭去尾半兩

全蝎十箇

香白芷少許

右為末每服一字發熱茶清下發寒溫酒或半夏茯苓

湯下親溫熱

破傷

去付余卷之四

六

二百七十一

天麻丸 治破傷風神效

天麻

川烏生去皮各三錢

雄黃各一錢

右為末酒糊丸桐子大每服十九溫酒下無時

元戎方治破傷風欲死者

川烏

南星

半夏並生

天麻去芦等

右為細末每服一錢豆淋酒調下稍溫服次以酒三盞投之

奪命散 治破傷風角弓反張牙關緊急

天麻

白芷

川烏去皮各草烏二錢

雄黃各一錢

右為末酒糊丸梧子大每服十九溫酒下無時

右為末酒糊丸梧子六每服十九溫酒送下不拘時

蜈蚣散 治破傷風搐搦角弓反張

蜈蚣去毒炒

全蝎去毒炒

右為細末如發時用一字或二字擦牙縫內或吹鼻中

烏稍散 治破傷風及洗頭風

烏稍蛇酒浸一宿去骨六錢

麻黃一兩

草烏

乾姜 附子炮

川芎

白附子

天麻各半兩蝎稍二錢半

右為末每服一錢熱酒調下日三服重者三五日見效

治破傷風方 極有神效

初覺有風時急取熟糞堆內蟻蟪虫一二箇用手捏住
待虫口中吐沫小水就抹在破傷處身穿稍厚衣裳待
片時瘡口覺麻兩脇微汗風出立効 如風緊急速取
此虫三五箇剪去尾將肚內黃水塗瘡口再滴些小水
熱酒內飲之汗出立効

○已上諸方攻散風毒之劑

胃風

十二

丹溪心法

○此因初飲食訖乘風涼而致其証脹滿食飲不下形瘦

○此因初飲食訖無風涼而致其証脹滿而飲食不下形瘦

腹大惡風頭汗隔塞不通胃風湯正始此然亦看按
加減脈右關弦而緩帶浮

附諸方

胃風湯 按粹方 治虛風證能食麻木牙關急搐目內蠕動

胃風面腫

白芷 一錢 升麻 二錢 獨活 一錢 蒼朮 一錢

甘草 一錢 柴胡 一錢 藁本 一錢 羌活 一錢

黃栢 一錢 草豆蔻 各三錢 麻黃 半錢 蔓荊子 二錢

當歸身 一錢

右咬咀水二盞薑三片棗一枚煎至一盞去渣溫服

胃風

卷之六

胃風

胃風湯 治風冷入於腸胃泄下鮮血或腸胃濕毒下如
豆汁或瘀血

人參

茯苓

川芎

當歸

桂

白朮

書

白芍 等分

右剉水煎入粟米百餘粒同煎腹痛加木香

痛風

十三

附肢節痛

肩背痛

再溪心法

四肢百節走痛是也他方謂之白虎歷節風証大率有痰

風熱風濕

血虛

因於風者小續命湯

因於濕者蒼

木白朮之類佐以竹瀝 因於痰者二陳湯加酒炒黃芩

羌活蒼朮 因於血虛者用芎藭之類佐以紅花桃仁

大法之方蒼朮川芎白芷南星當歸酒黃芩在上者如羌

活威靈仙桂枝 在下者加牛膝防己木通黃柏 血虛

格致餘論詳言多用川芎當歸佐以桃仁紅花薄荷威靈

仙 治痛風取薄荷味薄者圖此能橫行手臂領南星蒼

朮等藥至痛處

入方

治上中下疼痛

南星 姜製

蒼朮 淋浸

黃柏 酒炒

各川芎 一兩

公法討論

乙

丙

癩風

心法附錄卷之四

白芷 半兩

神效炒一兩

桃仁 半兩

威靈仙

酒洗三錢

羌活 三錢走骨節

防己 酒洗

桂枝 三錢

紅花 酒洗

三錢

草龍膽 半錢下行

右為末 麩糊丸 梧子大 每服一百丸 空心白湯下

張子元血氣虛有痰白濁陰國痛風

人參 一兩

白朮

熟芋

川黃柏

炒黑各二兩

山藥

海石

江

南星

各一兩

敗龜板

酒炙二兩

瑣陽 半兩

乾姜

燒灰半兩取其灰

右為末 粥丸 一云酒糊丸

腎痛方

蒼朮 一錢 半夏

南星

...

蒼朮一錢 半夏 南星

酒苓炒 香附各一錢 陳皮 蒼朮各半錢

威靈仙三錢 甘草少許 別本加羌活一錢

右以咀作一服入生姜二三片水煎服

二妙散 治筋骨疼痛因濕熱者有氣加氣藥血虛者加

補血藥痛甚者加生姜汁熱辣服之

黃柏炒 蒼朮米其浸炒

右二味為末沸湯入姜汁調服二物皆有雄壯之氣衰
實氣實者加酒少許佐之折若痰帶熱者先以舟車丸
或道水充神芎充下伐後以趣痛散服之

逐痛散

乳香七分

沒藥七分

縮桃仁五分去皮尖

紅花五分

當歸八分

地龍酒炒六分

牛膝酒浸五分

羌活六分

甘草四分

五靈脂酒海六分

香附薑便浸錢

或加酒淬炒酒柏各七分

右為末酒調二錢服

八珍丸 治痛風走注脚疾

乳香

沒藥

代赭石

穿山甲

生用各三錢

羌活

草烏生用各五錢

全蝎二十一分

川烏

生用一兩

右為末醋糊丸如梧子大每服二十一丸温酒送下

四妙散

痛風走注

右為末醋糊丸如梧子大每服二十丸溫酒送下

四炒散 痛風走注

威靈仙酒炒 羊角灰二錢 白芥子一錢 蒼耳一錢半
云蒼耳

右為末每服一錢生姜一大片搗汁入湯調服 又二

妙散同調服

書

又方 治酒濕痰痛風

黃柏酒炒 威靈仙酒炒 蒼朮 羌活

甘草三錢 陳皮一錢 芍藥一錢

右為末每服一錢或二錢煎湯入姜汁調下

治氣實表實骨節痛方

浙

滑石六錢 甘草一錢 香附 片苓各三錢

痛風

心法付余卷之三

上

一兩 三錢九

右為末姜汁糊丸如梧子大每服五七十九丸白湯吞下

又方

糯米一盞

黃躑躅根

握

黑豆半合

右用酒水各一椀煎徐徐服大吐大瀉一服便能行動

治食積肩腿痛

龜板

酒浸炙一兩

酒栢葉

香附半兩

辣芥子二錢

凌霄花一錢半

右為末酒糊丸如梧子大煎四物湯加陳皮其草湯下

附諸方

控涎丹 治一身及兩脇走痛痰挾死血者

控涎丹 治一身及兩脇走痛癢厥死血者

并逐 面暴眼 大戟 真白芥菜子炒香等分

右為末加挑仁泥糊丸如梧子大每服五七丸漸加至

十九臨卧姜湯下

龍虎丹 治走注疼痛或麻木不遂或半身痛

草烏

蒼朮

白芷

各一兩 張粗末拌 發熱盒過入後藥

乳香

沒藥

當歸

牛膝 各五錢

右為末酒糊丸如彈子大每服一丸温酒化下

乳香丸

白附子炮

南星

浙白芷

沒藥

赤小豆

荆芥

藿香去土

骨碎楠去毛

痛風

去付余式之曰

上

丙 三三六

乳香各一兩 五靈脂 川烏炮去皮 糯米炒各二兩

草烏炮去皮 京墨各宜 松脂半兩

右為末酒糊丸梧子大每服十九至十五丸冷酒吞下

茶亦得不拘時忌熱物

一粒金丹 治一切風疾走注疼痛手足癱瘓麻木不仁

及白虎歷節等風

射香二錢半 好真黑土燒烟盡 乳香

當歸酒洗晒乾 沒藥又七錢半 白膠香另研 草烏去皮臍

地龍去土 木鱉子去油 五靈脂各一兩半

右為細末與前藥和勻用糯米糊為丸如雞頭實大每

服一丸温酒化下遠年近日寒濕脚氣臨發時空心服
一丸脚面黑汗出爲効初中風不醒人事牙關不開研
二丸酒調灌下豆醒

天麻丹 治諸風癱瘓及白虎歷節風

烏頭八兩 蒼朮四兩 全蝎一兩

荆芥

防風 天麻各二兩

右爲細末用豆腐和勻作餅入銅銚以水滿煮藥至半
沉半浮存性爲度取出待半乾爲丸如梧桐子大以硃
砂爲衣臨卧時先嚼木瓜片以好酒吞下二三丸
服後覺昏沉吐涎痰一二時爲効

通風

去時余之

一三

四

金囊丹 治一切風疾等証

川烏去皮 生用 防風生用 獨活 荆芥 蔓荊子各四 白木 香白芷

獨活 荆芥 蔓荊子各四 白木

羌活 細辛去土 各半兩 全蝎 威靈仙

天麻 僵蚕各二 木香 雄黃各一兩

蒼木八兩 漫 川芎五兩 乳香一兩 何首烏一兩 八錢

沒藥 草烏各一兩 五錢 藁本二兩 五錢 當歸三兩

右為細末以糯米糊丸如棗樣大金箔為衣每服一錠

傷風流涕好酒調服 諸般頭風細茶調服薄荷湯亦

可 中風不語生姜湯調下 左癱右疾好酒調下

白虎歷節風遍身走痛生姜湯或好酒調服 破傷風

昏倒在地牙關緊急用好酒調服仍將敷患處 雷頭

風并乾癬麻痺温酒調服 洗頭風温酒調服 偏正

頭疼及夾腦風研爲末吹鼻孔中吐涎再用生姜汁調

藥塗兩太陽穴仍用茶清調服 風狗咬傷噲水洗淨

敷之 蜈蚣傷口噲水洗過敷之 蛇傷人白礬少許

敷患處以津唾調搽亦可 蝎傷唾調搽 痔漏口漱

漿水洗過敷之 多年惡瘡口不合者口漱益水洗過

敷徐合 嗽喘桑白皮湯調服 紅絲魚眼禱脚腦疽

發背疔瘡裏外臙瘡用白已小便洗過并水調敷薄紙

四頁二十一

貼上再用裏外搽之 丹瘡并花水調藥毛翎掃三二

次 不發灸瘡口噙水洗過貼三二次知大可方止

乳香黑虎膏 治諸風寒濕骨節渾身痠痛 見中濕類

虎骨散 和劑方 治風毒邪氣乘虛攻注經絡之間痛無常

處晝靜夜甚筋脈拘攣不得屈伸

蒼耳子微炒 五加皮一兩 骨碎補三兩 虎脛骨酥炙

沒藥三兩 當歸去苗 天麻一兩 自然銅醋淬

防風去苗 肉桂去粗 破敗龜板炙 騏驎竭細研

白芷 赤芍藥 白附子炮 酪換柳一兩

羌活去芦 牛膝去

右為末入研藥令勻每服一錢溫酒調下不拘時

赴痛丸 澹寮方 治走注歷節諸風軟痛卒中倒地跌撲傷

損

草烏頭 三兩不去皮

熟地黄 或胡南星

半夏麩

白殭蚕

烏藥 各半兩焙乾

右為末酒糊丸如梧桐子大晒乾每服五七丸空心溫

酒下如跌撲傷損姜汁和酒研十數丸塗傷處如卒中

倒地姜汁茶清研五七丸灌下立醒

虎骨丸 御藥院方 治經絡凝滯骨節疼痛筋脈攣急遇陰

寒愈痛

...

乳香另研

沒藥另研

赤芍藥

當歸

熟地黃

虎骨

破傷

血竭二錢半

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香一錢末在內麻

纏定毋令透氣好酒二升煮酒盡取木瓜去皮研入蜜

杵和丸如梧桐子大每服三五丸酒下

麒麟竭散

治寒濕搏於經絡以致氣血凝泣疼痛不可

忍著接粹方

血竭

乳香

浙沒藥

白芍藥

當歸

水蛭炒令

射香各二錢

虎脛骨

斷多黃半兩

右為末每三錢溫酒調下食前

透骨丹 治風濕腰腿筋骨疼痛

天麻散 秘方 治風濕疼痛黃腫

天麻

全蝎 各四兩
地黃

木瓜 各二兩

沒藥

乳香

川山甲 絡
川芎

烏頭 各二錢

牛膝

二錢酒浸一宿

當歸 三錢

右為末每服三錢空心溫酒調服

○廣按風寒濕入於經絡以致氣血凝泣津液稽留久

則佛鬱堅牢阻礙榮衛難行正邪交戰故作痛也須

氣味辛烈暴悍之藥開鬱行氣破血豁痰則佛鬱開

榮衛行而病方已也又嘗論之成佛鬱凡有形之物

不過痰與血也巳上方中有偏於豁痰者有偏於破血者有均治痰血者在人對証施治不差可也

小續命湯 見中風類

二陳湯 見痰類

舟車丸 見中濕類

神芎導水丸 見濕熱類

○肢節痛

丹溪心法

肢節痛須用羌活去風濕亦宜用之 如肥人肢節痛多是風濕與痰飲流注經絡而痛宜南星半夏 如瘦

江圖書

多是風濕與痰飲流注經絡而痛宜南星半夏如瘦

人肢節痛是血虛宜四物湯加防風羌活 如瘦人性

急燥而肢節痛發熱是血熱宜四物湯加黃芩酒炒黃

栝 如肢節腫痛脈滑者當用燥濕宜蒼朮南星蕪行

氣藥木香枳殼檳榔在下者加漢防已 若肢節腫痛

脈澁數者此是瘀血宜桃仁紅花當歸川芎及大黃微

利之 如倦怠無力而肢節痛此是氣虛兼有痰飲疏

注宜參朮星半

丹溪無肢節痛餘此文又說丹溪語甚詳以

○肩背痛 新考

浙

附諸方

通氣
心通
手卷

通氣防風湯按粹方有背脊不可通者此太陽氣鬱而
不行以風藥散之脊脊痛強腰似折項似拔者此足太
陽經不通也

羌活

獨活各一

防風

甘草各半錢

川芎 圖 荆子各三分

當歸拈痛湯按粹方治濕熱為病肢節煩痛肩背沉重胸

膈不利及遍身疼痛下疰於足脛痛腫不可忍

蒼朮復煎散按粹方治寒濕相合腦痛惡寒煩悶脊骨脚

眼痛膝膕痛脈沉洪

蒼朮

四兩水二碗煎至一碗去渣
入下項藥末再煎一沸溫服

羌活

升麻此方無澤瀉

柴胡

藁本

白朮各半錢黃栢三錢

紅花少許

右為末先煎蒼朮三分之一後下衆藥同煎切忌酒麵

加減當歸飲子聖惠方治肩忽痛

防風

當歸

柴胡各五兩

芍藥一兩

生地黄半兩黃芩

圖人參各一兩黃連半兩

甘草錢一兩滑石六兩

大黃一兩半

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去渣食後通口服

人參益肺散按粹方治肩背痛汗出小便數而少者風熱

乘脾胃氣鬱脹也當瀉風熱則愈

柴胡

升麻

黃耆 各一錢
羌活

防風

人參

官甘草

陳皮 各半兩

藁本 三分

青皮

黃芩

白豆蔻 各二分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去渣通口服如面

色白脫色氣短者不可服

舒經湯 澹寮方 治臂痛不能舉有人常善左臂痛或以為

飲或以為風為濕諸藥悉投繼以針艾俱不効得此方

而愈蓋是氣血凝滯經絡不行所致非風非飲非濕腰

以下食前服腰以上食後服一名通氣飲子

片子姜黃

四兩無則用嫩義米代之

甘草炙

羌活 各一兩

海桐皮皮去外當歸

赤芍藥

白木各二兩

右咬咀每服二錢水一盞半生薑二片磨沉香木少許

煎至一盞去渣通口服

治骨痛

姜黃四兩

甘草多

羌活一兩

白木一兩

右咬咀水一盞煎隨意至一盞去滓溫服食後

痺

十四 新增注

附諸賢論

袖珍方曰凡痺病自有五種皮痺脈痺肌痺骨痺筋痺是

...

也。多由體虛之人，腠理空疎，為風寒濕三氣侵入於皮。脈肌筋骨不能隨時驅散，留滯於內，久而為痺。其為病也，寒多則掣痛，風多則引注，濕多則重著。爾

附脈理

脈訣要言曰：風寒濕氣合而為痺，浮瀉而緊三脈乃備。

附諸方

防風湯 宣明方 風寒濕三氣合為痺，風氣勝者行痺上下。

左右無留隨所至，作防風湯主之。治行痺行走無定。

防風

甘草

當歸

赤茯苓 去皮

杏仁 去皮炒

桂 各二兩

黃芩

秦艽

杏仁法皮炒桂各二兩 共煎
秦艽

葛根 各二錢 麻黃附去

右為末每服五錢酒水各一盞薑二枚姜五片煎至一

盞溫服

官

茯苓湯 宣明方寒氣勝者為痛痺大宜宣通陰寒為痛宜

通氣溫經而愈茯苓湯加減主之 治痛痺四肢疼痛

拘倦浮腫

圖

赤茯苓 去皮 桑白皮 附各 防風 官桂

川芎 芍藥 麻黃去節各 兩半

右為末每服五錢水一盞薑二枚煎至八分溫服以薑

粥投之汗泄為度效矣

五

法

二

百

茯苓川芎湯宣明方濕氣勝者為著痺濕地水氣甚重著

而不去多汗而濡者茯苓川芎湯主之治著痺留注

不去四肢麻木拘攣浮腫

赤茯苓 桑白皮 書 防風 官桂

川芎 麻黃 圖 芍藥 當歸

甘草五分

右為末每服四錢半水二盞薑棗三枚同煎至一盞去滓

空心溫服如欲出汗以粥投之

升麻湯宣明方陽氣多陰氣少陽熱其法寒故痺藏府熱

燭然而悶也升麻湯主之治熱痺肌肉熱極體上加

鼠走唇口及縱皮色變兼諸風皆治

升麻 三兩

茯神 去皮

人參

防風

犀角 鎊

羚羊角 鎊

羌活 各一兩

官桂 半兩

右為末每服四錢水二盞生姜一塊碎竹歷少許同煎

至一盞溫服

五痺湯 和劑方 治風寒濕之氣客留肌體手足緩弱麻頑

不仁

片子姜黃

一兩洗去灰土

羌活

白朮

防己

各二兩

甘草

微炙

石咬咀每服四錢水一盞半姜七片煎八分去粗病在

上食後服病在下食前服

蠲痺湯濟生方治手足冷痺腰腿沉重及身體煩疼背項

拘急

當歸去芦酒洗

赤芍藥

書

黃芪去芦

防風去芦

片子姜黃

羌活各一兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎八分去

粗濕服

防風湯齊生方治血痺皮膚不仁

川當歸去芦洗

赤茯苓去皮

川獨活各一兩

甘草炙半兩

防風二兩

赤芍藥

黃芩各一兩

杏仁去皮尖

秦光去芦一桂心不見火

右以咀每服四錢水一盞姜五片煎七分去粗温服不

拘疔

茯苓湯濟生方治得蓄支飲手足麻痺多睡眩冒

半夏湯洗七次赤茯苓去皮陳皮各一兩枳實去穢

桔梗去芦甘草各半

右以咀每服四錢水一盞半姜七片煎七分温服

羌活湯濟生方治白虎歷節風毒攻注骨節痠痛發作不

定

羌活去芦二附子炮皮臍秦光去芦桂心

五

法

二

法

木香 不見火 州芎

當歸 去芦

牛膝 川者去

甘草 兩各半 桃仁 去皮尖 骨碎補

防風 去

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎七分温服

虎骨散 濟生方 治白虎風肢節疼痛發則不可忍

虎骨 兩各二 甘草 炙

全蝎 去毒各半兩 射香 一分

天麻 防風 去芦

川牛膝 去芦 白姜蚕 去系

川當歸 酒去 乳香 去研

桂心 不見火 白花蛇 酒浸取

右為末每服三錢口麻酒調服

○廣按已上二方治白虎歷節風骨節疼痛即宣明所

謂痛痺也蓋風寒濕三氣客於經絡為病不一或為

痛或為痺或為麻痺不仁或為手足緩弱所以然者
有新久輕重之分有濕痰死血之異濟生防風湯祇
苓湯所治已露訛倪也學者宜細心求之丹溪不言
痺病蓋已該於痛風腎著痿厥條內矣但丹溪所言
病之見証占人所言病之原因即中庸藹藹之義也
續斷丸 本事方治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

當歸 炒

川續斷

草薢

各一兩

川芎 七錢半

乳香

半兩

天麻

防風

附子 各一兩

沒藥

半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十丸溫酒米飲任

下

○廣按用附子大黃之劑多有所嫌者殊不知寒濕克滿經絡四肢浮腫非附子性浮而不沉而能散之乎熱燥銷燬腸胃二便秘結非大黃性走而不守而能潤之乎故善用藥者三公無棄物善用兵者天下無棄人况大黃附子乃藥中之元首用其所當用何嫌之有哉

增損續斷丸

本事方治寒濕之氣痺滯關節麻木疼痛

人參

防風

鹿角膠

白朮

炮各七兩

麥門冬

乾地黄

黃芪

續斷

薏苡仁 山羊 牡丹皮 桂心

山茱萸 白茯苓 石斛 各二兩

右為末蜜丸如梧桐子大每服五十丸溫酒空心下

三痺湯危氏方治血氣滯滯手足拘攣風痺等疾皆療

川續斷 杜仲 去皮 姜 防風 桂心

人參 白茯苓 當歸 白芍藥

甘草 各一兩 秦艽 生地黄 川芎

川獨活 各半兩 黃芪 川牛膝 細辛 各二兩

右咬咀每服五錢水二盞薑三片棗一枚煎一盞去

滓熟服

五痺 治風痺 治風痺 治風痺

黃耆酒 濟生方 治風濕痒痛筋脈攣急或身體頑麻

當歸

雲母粉

館茵芋葉

白朮

虎骨

草薺

木香 不見火

仙靈皮

川續斷

甘草炙

書 白芍藥

黃芪 去芦

防風 去芦

官桂 不見

圖 天麻

石斛 去根各一兩

右咬咀用絹袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七冬一日每服一盞溫暖服之常令酒氣相續為佳

防風天麻散

宣明方

治風麻痺走注肢節疼痛

見中風類

癘風

十五

附血風瘡

身上虛痒

癩疹

丹溪心法

○大風病是受得天地間殺物之風古人謂之厲風者以其酷烈暴悍可畏耳人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳虫於穀道中出雖有上下道路之殊然皆不外乎陽明一經治此病者須知此意看其疙瘩與瘡若上先見者上體多者在上也若下先見者下體多者在下也上下同得者在上復在下也陽明經胃與大腸也無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受者甚重自非醫者神手病者鐵心罕有免此

夫從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見病勢之
緩多忽之雖按此法施治病能全然脫體若不能絕味絕
色皆不免再發再發則終不救矣某曾治五人矣中間惟
一婦人得免以其貧甚且寡無物可喫也餘四人三兩年
後皆再發孫真人云吾嘗治四五百人終無一人氣於死
非孫真人不能治也蓋無一人能守禁忌耳此婦人本病
外又是百餘貼加減四物湯半年之上方得月經行十分
安愈

醉仙散

浙

胡麻仁

牛蒡子

蔓荊子

枸杞子

各半兩同炒

胡麻仁

牛蒡子

蔓荊子

枸杞子

防風

瓜萎根

白茯苓

苦參各半兩

右為末每一兩半入輕粉二錢拌勻大人每用一錢空
 心日午臨卧各服茶湯調下嗽後五七日間先於牙縫
 內出臭涎水渾身覺疼昏悶如醉利下臭屎為度量天
 小虛實加減與之証候重而急者須先以再造散下之
 候補養得還復與此藥喫瀆斷塩醬醋諸般肉魚腥椒
 料水果煨燒炙燻及茄子等物只宜淡粥煮熟時菜并
 烏稍菜花蛇用淡酒煮熟食之以助藥力也

再造散

浙

錦紋大黃

兩 皂角刺

兩 羊獨生

壽金 半兩生

高麗

法付余心之四

二六

刊三十一

白牽牛 頭末六錢 生半炒

一本無鬱金牽牛二味

右為細末每服二錢 一云五錢 臨臥冷酒調服 一云日未出而服

以尋搗向候泄出虫如虫黑色乃是多年赤色是為方近三四日又進一服直候無虫則絕根矣後用通聖散調理可用三稜針刺委中出血終身不得食牛馬驢驘等肉大忌房事犯者必不救

黃精丸

蒼耳葉 紫背浮萍 大力子 各等 烏蛇肉 虫半酒浸 去皮骨

黃精 倍前三味生搗汁 和四味研細焙乾

右為末神麩糊丸如梧子大每服五七十丸温酒下

一方加炒栝生葉廿草節

又方

蒼耳葉

浮遊

鼠粘子

烏蛇肉

右用豆淋酒炒等分爲末每服一二錢豆淋酒調下

治麻風脈大而虛者

苦參七錢半

蒼耳

牛蒡子

酒蒸柏

黃精

浮游各一兩

右爲末用烏蛇肉酒煮如無蛇以烏蠶魚亦可糊丸服之候脈實再用通天再造散取虫

治麻風

馬風

卷之五

五

百

右爲末神麩糊丸如梧子大每服五七十丸溫酒下

四物湯加羌活防風陳皮甘草

又方

大黃

黃芩

雄黃 三兩

右為末用樟樹葉濃煎湯入藥煮流

附論

圖

廣按大風証者所因不一或因色慾當風或因醉即濕地或乘熱脫衣或汗出入水或空心飢餓山行感山嵐瘴氣或勞役奔走途中冒寒雨陰露皆由內傷形體不知避忌外感風濕毒氣入於皮毛血脈肌肉筋骨之間當時罔覺夫於驅散停積既久以致榮衛

不行內外薰蒸內則生虫外則生瘡而臟腑經絡皆
受患矣古人謂大風疾三因五死三因者一曰風毒
二曰濕毒三曰傳染五死者一曰皮死麻木不仁二
曰脈死血潰成膿三曰肉死割切不痛四曰筋死手
足緩縱五曰骨死鼻梁崩塌與夫目落眼昏唇翻聲
噎甚可畏也所以然者蓋由邪正交攻氣血沸騰而
濕痰死血充滿於經絡之中故生虫生瘡痛痒麻木
也治療大法內通臟腑外發經絡而虫瘡痛痒麻木
自出矣亦須首尾斷酒戒色忌食發風動氣重腥蓋
醬炙烤生冷之物清心寡慾方保無虞也今將所用

藥方次序開具于後

附諸方

滑風散 第一日服

香白芷

全蝎

書人參各一兩

右為細末每服二錢先一日午間宜喫粥忌生薑胡椒

葱蒜一切熱性之物晚間不可飲食次日空心溫酒調

下覺身漸清燥為妙

追風散 第二日服瀉血追虫

大黃

鱗紋者

鬱金

小者

皂角

刺

一兩

右為末初服六錢或七錢大楓油一錢半淨朴硝少許

入內好酒一碗調化五更空心溫服直待辰時又如前
調藥一碗入熟蜜少許勿令患人知先以水與患人盥
漱淨然後服藥必以蜜辭口忌人與患者同坐臥良久
腹中疼爲妙候瀉十數次以薄粥補之凡老弱者難治
五十歲以下者可治精壯者十日三服謂初一日服消
風散初二日服追風散初三日服磨風丸損弱者十日
內一服稍痊如壯健八十日內三服每月後二十日一
服須要記其日數

磨風丸 第三日服日進一次

川當歸

羌活

獨活

川芎

天麻

細辛

防風

荆芥

葳靈仙

麻黃

何首烏

石京子

牛旁子

車前子

皺面草

即地

蒼耳草

各一

右皆不見火晒乾為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大
每服三十丸食前温酒下服後煎藥薰洗

洗藥

地骨皮

荆芥

江苦參

細辛各等分

右剉片每用二兩以水煎薰洗遍身血出為効如洗務
要湯寬浸洗良久方佳

敷藥

第四日治瘡大爛遍身塗之

黑狗脊

二兩如無以杜仲代之

蛇床子

一兩

寒水石

硫黃

白礬各二兩

木硝少許

右三細末用臘猪油或香油調敷不爛不必敷

一方

蜜陀僧

白附子

蒼耳子

細辛

香白芷

各等分

圖

右為細末用生姜汁調搽患處

一方

蛇床子根燒灰存性

浙雄黃

硫黃

白礬

草烏各等分

毒風

去付余卷之四

三

百

右為細末用香油或蜜水調敷患處

○已二諸方治大風次第之劑

加減大造苦參丸 治大風瘡及諸風赤白癩風

苦參一斤 防風 書 荆芥 蒼耳子

胡麻子半生 皂角刺各半 蔓荊子 牛旁子

黃荊子 枸杞子 何首烏 禹餘糧

蛇床子各三兩 香白芷半兩

右為細末用皂角搗爛熬膏入前藥勻為丸如梧桐子大每服五十九丸茶酒任下

方 治大風肌頑麻木皮膚瘙癢遍身疥癩癢疹面上

遊風或如虫行紫白癩風或賊風攻注腿脚生瘡者

川烏

白芷

苦參

胡麻炒

荆芥

防風 各三兩

當歸

川芎

獨活

羌活

白蒺藜

赤芍藥

白附子

山梔子

各一兩

蔓荊子

一兩

何首烏

大楓子

去殼

葳靈仙

各一兩

地龍

二兩

右為細末先取烏蛇一條用好酒浸煮熟去骨取肉晒

乾或焙同為末酒糊丸如梧桐子大每服四十九茶湯

下

一方

風

去付徐志之四

三

二百

歲靈仙 何首烏 地松即破皮 防風

蔓荊子 荊芥 官車前子 細辛

牛旁子酒浸 猪牙皂角 當歸 蒼耳草

天麻 甘草 書 羌活 獨活

麻黃 澤蘭 川芎 苦參各等分

右為米酒糊丸如梧桐子大每服四十九丸茶酒任下

一方

用蒼耳草於五月五日或六月六日五更時帶露採搗
絞取汁熬成膏作錠子取一斤半重鯉魚一箇剖開不
去肚腸入藥一錠在內以線縫之用酒二碗慢火煮乾

去肚腸入藥一錠在內以線緝之用酒二碗以火煮
爲度令患人喫盡毋過四五箇即愈也蓋百日

一方

用白花蛇一條生蒸糯米二斗缸底先用酒麴次將蛇
以絹袋盛之頓於麴上然後以糯米飯和勻頓於蛇上
用紙封缸口候二七日開取酒將蛇去皮骨焙乾爲末
每服溫酒一盞調蛇末少許服之仍以酒脚并糟做餅
食之

一方

用蒼耳爲末以大楓子油丸如梧桐子大每三四十九
荆芥湯送下茶湯亦可

一方 治大風眼昏不辨人物眉髮自落鼻梁崩塌肌膚
生瘡如癬

用皂角刺一二斤蒸晒為末食後煎大黃湯調服一錢
服一旬後眉髮再生肌膚光潤眼目復明

一方 治大風瘡令眉髮再生

用栢葉九蒸九曝為末煉蜜為丸如梧桐子大日三服
夜一服白湯下每服五六丸百日後生眉髮

一方 治大風後生眉毛

皂角筴 焙乾

浙

鹿角 燒存性 各等分

右為細末生姜汁調塗眉上一日二次則生

右爲細末生薑汁調塗眉上一日二次則生

一方 治大風眉毛脫落肌膚崩裂

用防風通聖散加苦參天麻蟬蛻早晚各一服至百貼必愈忌房事鹽醬葷腥生冷油膩之物

一方 治大風後斷根

書

於脚大拇指筋骨縫間約半寸冬三壯以出毒氣

四物湯 見補損類

圖

通聖散 見斑疹類

防風通聖散 見中風類

江

○血風瘡 新增

浙

附諸方

高風

治法

三十三

方

二百五十二

馬齒莧膏 治兩足血風瘡并兩肩背風濕瘡疼痒至骨

馬齒莧

五切碎焙乾

官黃丹飛

黃栢

枯白礬

孩兒茶

文口三錢

輕粉

一錢

右為細末和勻後入輕粉用生桐油調攤於厚桐油紙

上用葱椒湯洗淨患處貼之

一方 治血風瘡

川椒

貝母

江白芷

蛇床子炒

黃丹飛

枯白礬

黃連

各三錢

輕粉五錢

右為細末生桐油調攤厚油紙上貼瘡紫定七日方開

忌胡椒生姜葱蒜一切熱毒物

當歸拈痛湯

治帶足血風瘡痛痒等証

見脚氣類

○癰癧新增

附諸方

館

胡麻散

和濟方治脾肺風毒攻衝遍身皮膚癢痒或生瘡

疥或生癰癧用小手搔時浸淫成瘡久而不差愈而復作

面上遊風或如虫行紫白癩頑麻或腎臟風攻注脚膝

生瘡宜服

胡麻錢一兩二錢

荆芥穗

苦參各八錢

何首烏炮焙

甘草錢

威靈仙各錢

右為末每服二錢薄荷茶或酒或蜜湯調服服藥後類

右為末每服二錢薄荷茶或酒或蜜湯調服服藥後類

風

六付余卷之四

二四

三

頭浴自得汗出立効

蒼耳丸 治諸風及諸風瘡癩疹白紫癩風

五月五日割取蒼耳草葉洗淨晒乾爲末煉蜜丸如梧
桐子大每服十九日三服若身體有風處或如麻豆粒
此爲風毒出也可以針刺黃汁出盡乃愈

靈草舟 治一切風疾及癩疹紫白癩風痛痒頑麻

採紫背浮萍草攤於竹篩內下着水晒乾爲細末煉蜜
丸如彈子大每服一丸用黑豆淋酒化下及治腳氣打
撲傷損渾身麻痺

一方

用乾浮萍四兩漢枝心五錢濃煎熱湯洗白癩風一切

一斑疹疥癬神效

丹溪心法

○身上虛痒血不榮以腠理所以痒也

右用四物湯加葛根煎調浮萍末服之

見補遺錄

又方

凌霄花一錢酒調下

汪

附諸方

漂洗藥

御藥院方治一切風疾燥痒淋洗

威靈仙去土零陵香

麝香各一斤乾荷葉

藁本

去土

藜蘆香葉

香白芷

其松

各半斤

右咬咀每用四兩生絹袋盛用水三桶熬數沸故稍熟於無風房內沐浴避風勿令風吹光膩皮膚去瘡痒

浙江圖書

餘卷之四

丹溪心法附餘卷之五

休寧東山古庵方廣約之類集

寒門

咳嗽

十六 附肺痿 肺癰

圖

丹溪心法

○咳嗽有風寒 痰飲 火鬱 勞嗽 肺脹 春作是

春升之氣用清涼藥二陳加薄荷之類 夏是火氣炎上

最重用芩連 秋是濕熱傷肺 冬是風寒外來以藥發

咳次

丹溪心法附餘卷之五

一

丹溪心法附餘卷之五

散之後用半夏逐痰必不再來 風寒行痰開腠理用二

陳湯加麻黃桔梗杏仁 逐痰飲降痰隨証加藥

火主清金化痰降火 勞嗽四物湯加竹瀝姜汁補陰為

主 乾咳嗽難治此係火鬱之証乃痰鬱其火邪在中用

苦搜開之下用補陰降火之劑四物加炒栝竹瀝之類不

已則成勞此不得志者有之 倒倉法好 肺虛嗽甚此好

色腎虛者有之用參膏以陳皮生姜佐之大槩有痰加痰

藥 上半日多嗽者此屬胃中有火用貝母石膏降胃火

午後嗽多者屬陰虛必用四物湯加炒栝知母降火

黃昏嗽者是火氣浮於肺不用涼藥宜五味子五倍子

斂而降之 五更嗽多者此屬胃中有食積至此時火氣
流入肺以知母地骨皮降肺火 肺脹而嗽或左或右不
得眠此痰挾痰血礙氣而病宜養血以流動乎氣降火疎
肝以清痰四物湯加桃仁訶子青皮竹瀝姜汁之類 嗽
而腸下痛宜疎肝氣以青皮挾痰藥實者白芥子之類在
後以二陳湯加南星香附子青黛青皮姜汁 血碍氣作
嗽者桃仁去皮尖大黃酒炒姜汁丸服 治嗽多用生姜
以其辛散故也 痰因火動逆上作嗽者先治火次治痰
以知母止嗽清肺滋陰降火夜嗽用降陰分火 治嗽多
用粟殼不必疑但要先去病根此乃收後藥也治刺亦同

勞嗽即火鬱嗽用訶子能治肺氣因火傷極遂成鬱渴脹
滿不得眠一邊取其味酸苦者收斂降火之功佐以海石
童便浸附瓜蒌青黛杏仁半文曲之類姜蜜調嚙化必以
補陰為主 治嗽灸天突穴肺腧穴大瀉肺氣肺腧穴在
三椎骨下兩膀各一寸五分

○師云陰分嗽者多屬陰虛治之 有嗽而肺脹壅遏不

得眠者難治 肺痿專主養肺氣養血清金 嗽而肺氣

有餘者宜瀉之桑白皮為主半夏茯苓佐之瀉其有餘補

其不足 肺燥者當潤之屬熱者桔梗大力知母雞清

犀啞者屬寒宜細辛半夏生姜辛以散之肺虛者人參膏

阿膠為主陰不足者六味地黃丸為要藥或知母茯苓湯

為妙 陰虛氣喘四物湯加陳皮甘草些小以降其氣補

其陰白芍藥須用酒浸晒乾 濕痰帶風喘嗽者不可一

藥苦寒折之如千緡湯墜痰丸又以皂角蘿蔔子杏仁百

藥煎姜汁充噙化 濕痰帶風以千緡湯墜痰丸固捷

痰積嗽非青黛瓜萸不除有食積人面青白黃色不常面

上有如蟹瓜略一黃一白者是 欬逆嗽非蛤粉青黛瓜

萸貝母不除 口燥咽乾有痰者不用半夏南星用瓜萸

貝母飲水者不用瓜萸杏仁潤肺不欬快 知母止欬清肺

滋陰降火 杏仁潤肺氣喘者一二服即止 治

咳水 治法 三

酒敷青黛瓜蒌蜜丸噉收肺 食積痰作嗽發熱者半夏

南星為君瓜蒌羅蔔子為臣青黛石減為使

戴云風寒者鼻塞聲重惡寒者是也火者有聲痰少面赤者是也勞者盜汗出蒸痰者多作寒熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲痰出嗽止五者大藥耳亦當明其是否也

入方

杏仁 去皮尖

羅蔔子 各半兩

石為末粥丸服

清化丸 治肺鬱痰喘嗽睡不安寧

江 浙

貝母一兩

杏仁五錢

青黛三錢

右為末沙糖入姜汁泡蒸餅丸如彈子大噙化

治久嗽風入肺

鵝管石

一錢

雄黃

一錢

香薷

一錢

款花三錢

右為末和艾中以生姜一片安舌上灸之以烟入喉中

為度

圖

治飲酒傷肺痰嗽以竹瀝煎紫蘇入藥酒就吞瓜萎杏連

丸

治欬嗽劫藥

浙

五味子五錢甘草二錢半五倍子

風化硝石

咳

治法

只

五

右為末蜜丸噙化 又云乾

治欬嗽聲嘶者此血虛

青黛中

右為末蜜調噙化

書

蛤粉上

治嗽喘去濕痰

白朮

半夏

蒼朮

香附各二兩

貝母

杏仁

炒皮尖黃芩各半兩

右為末姜汁打糊

治婦人形瘦有特夜痰嗽所經不調

青黛下

瓜蒌仁中

香附童便浸

圖

右為末姜蜜調喻化豆大一丸

治一人風熱痰欬

南星

海粉各二兩

半夏一兩

青黛

黃連

瓜蒌子

石減

蘿蔔子各半

防風

皂角灰錢三

右為末神麩糊丸服姜湯下

治勞嗽吐紅

人參中

白朮上

江

茯苓上

百合上

紅花下

細辛下

浙五味子中

官桂下

阿膠上

黃芪中

半夏製中

杏仁去皮尖

亥女

去付除卷之五

五

丙言平滿

甘草下

白芍中

天門冬上

右剉水煎 若熱去桂氏用桑白皮麻黃不去蒜杏仁
不去皮同煎

又方 治嗽血

書

紅花中

杏仁去皮尖

枇杷葉去毛紫苑茸上

鹿茸炙中

木通中

桑白皮上

又云加大黃

右為末煉蜜丸嚙化一錢作一丸

嗽烟筒 治痰嗽久遠者

佛耳草

欵花二錢

鵝管石

雄黃半錢

右為末鋪艾上捲起燒烟吸入口內細茶湯送下

定嗽劫藥

訶子中

百藥煎上

荊芥穗中

右為末姜蜜丸噙化一錢作一丸

又方 治心煩欬嗽等証

書

六一散加辰砂服溫水調下

青金丸 治食積火鬱嗽劫藥

貝母

知母各半兩

巴豆去油膜

右為末姜泥丸辰砂為衣食後服每五丸白湯下一云

青黛為衣

青金丸一名與點丸與清化丸同用瀉肺火降膈上執痰

片于黃芩炒

右為末糊丸或蒸餅丸梧桐子大服五十丸滾白水下

青化丸 與青金丸同用專治熱嗽及咽喉痛故苦能燥熱

濕輕能治上

燈籠草炒

右為末蒸餅丸 又細末醋調敷咽喉間痛處

又方 治痰嗽

礞石半兩煨 風化硝半錢 半夏二兩製 白朮一兩

茯苓 陳皮各半兩 黃芩半兩炒

右為末粥丸

又方 治欬嗽氣實無虛熱者可服汗多者亦用之

粟穀四兩蜜炒
去蒂膜

烏梅一兩

人參半兩

欬花半兩

桔梗半兩

堯鈴一兩

南星姜製
一兩

右為末蜜丸彈子大含化

蒼沙丸 調中散鬱

蒼木

香附子各四兩

黃芩二兩

右為末蒸餅丸梧桐子大每服五十九食後姜湯下

人參清肺散 治痰嗽咽乾聲不出

人參半錢

陳皮半錢

蘇州半錢

錢

桔梗一錢

麥門冬半錢

五味子十箇

茯苓一錢

甘草半錢

桑白皮一錢 知母一錢 地骨皮半錢 枳殼一錢

貝母一錢半 杏仁一錢 欵花七分 黃連一錢

右水煎生姜三片如法煎服

四物湯 見補損

六味地黃丸 見補損

知母茯苓湯 見肺痿

千緡湯

墜痰丸

二陳湯 俱見痰類

肝脈理

浙 江 圖 書

脉訣與要曰欬嗽所因浮風緊寒數熱細濕房勞滑難右
關濡者飲食傷脾左關弦短疲極肝衰浮短肺傷法當
欬嗽五臟之嗽各視本部浮緊虛寒沉數實熱洪滑多
痰弦湍少血形盛脉細不足以息沉少伏匿皆是死脈
惟有浮大而嗽者生外證內脉參考稱停

附諸方

葦蓋散和劑方治肺感寒邪咳嗽聲重胸膈煩悶頭目昏

玄

紫蘇子炒

赤茯苓去皮陳皮去白

桑白皮

杏仁云皮尖炒

麻黃去根節各一兩甘草炙半兩

咳散

五法寸余卷之二

五言

右為末每服二錢水一盞煎七分食後溫服

敗毒散 治傷寒發熱咳嗽頭疼

參蘇飲 治上膈有熱咳嗽聲重

金沸草散 治感冒寒邪鼻塞聲重咳嗽不已 並見傷寒

小青龙湯和劑方 治感寒咳嗽喘息不得睡卧及治傷寒

表證不解心下有水氣乾嘔發熱咳嗽氣喘 見溫病

五拗湯 治風寒咳嗽肺氣喘急

麻黃 不去節 杏仁 不去皮 甘草 生用 荆芥穗

桔梗 各一分 錢

右以咀生姜三片同煎溫服咽痛甚者煎熟後加朴消

少許 一方去桔梗荆芥用半夏枳實等分

加味理中湯仁齋直指 治肺胃俱寒咳嗽不已

甘草多 半夏湯泡 茯苓去皮 乾姜不炒

白朮 橘紅 書細辛 北五味

人參 各等分

右吹咀每服三錢姜棗煎食前服

易簡杏子湯 按料方 治咳嗽不問外感風寒內傷生冷痰

飲停積悉治

人參大茸 半夏湯泡 浙茯苓去皮 甘草多

芍藥 五味子略 細辛 乾姜

宮桂 各五錢

右吹咽每服四錢水一盞半用杏仁去皮尖五枚姜五

片烏梅一箇煎至七分去滓服 若新感冒加麻黃分

橘蘇散 齊生之 治傷寒咳嗽身熱有汗惡風脉浮數有熱

服杏子湯不得者

紫蘇葉

杏仁

去皮各一兩

甘草

炙半兩

白朮

橘紅

半夏洗七次

桑白皮炒

貝母

去心

五味子

各一兩

右吹咽每服四錢水一盞姜五片煎七分温服不拘時

紫蘇飲子 按粹方 治脾肺虛寒痰涎咳嗽

紫蘇葉

桑白皮

青皮去白

五味子

杏仁

麻黃

甘草

陳皮各五錢

人參

半夏湯泡各二錢

右咬咀每服一兩生姜三片水二盞煎八分食後溫服

人參荆芥散 濟生方 治肺感風邪上壅咳嗽頭目不清言

語不出咽乾項強鼻流清涕

陳皮

去白

荆芥穗

江桔梗

半夏

湯泡七次

細辛

洗去土

甘草

人參

杏仁

去皮

通草

麻黃去根節

右咬咀每服四錢水一盞半姜五片煎八分食後溫服

咳散

去白

十

丙二箇全大

人參潤肺湯聖惠方治肺氣不足喘咳不巳并傷寒壯

熱頭疼身痛

人參

乾葛

桔梗

白芷

麻黃

去節各五錢

乾姜

五錢

薑白水

甘草

炙各一兩

右咬咀每服八錢水一盞

半生姜三片葱白二莖煎至

八分温服

橘皮湯聖惠方療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽痰中有聲上

氣頭痛

陳皮

紫苑

浙麻黃

杏仁

當歸

官桂

甘草

黃芩

各等分

右咳阻每服一兩水二盞煎八分去滓溫服食後

蠟煎散 御藥院方 順肺氣利咽膈止咳嗽化痰涎

款冬花 茶花 甘草 錢各七 五味子 半兩

桑白皮 炒 桔梗 書杏仁 紫蘇葉 略一

右咳阻每服四錢水二盞入黃蠟少許同煎臨卧服

柯子散 咳嗽聲音不出

柯子 三錢去核 江甘草 二錢半生 桔梗 五錢半

木通 三錢

右每服水一盞半煎至八分入生地黄汁一小盞攪勻

臨卧徐徐嚥

咳次 公未付徐卷之五 三頁六

四聖散聖惠方治咳嗽有失聲音

晉益

葛根

官槐花子

山梔子等分

右吹咀水二盞加烏梅甘草少許煎一盞入蜜少許食

後通口服

書

八味欵冬花散御藥院方治肺經寒熱不調涎嗽不已

欵冬花洗焙紫苑茸

五味子

甘草各七錢半

桑白皮炒

麻黃去節

江杏仁湯泡去皮炒

紫蘇葉各一兩

右為粗末每服五錢水盞半入黃蠟早角子大煎至一

盞熱服

○已上數方治感冒風寒新咳嗽之劑

三拗湯

治感冒風邪鼻塞聲重語言不出咳嗽喘急

方見喘類

杏參散

治胸脇脹滿上氣喘急咳嗽不得睡卧

杏仁去皮炒人參

桑白皮蜜炙

杏仁各等分

右以咀每服四錢水一盞姜棗煎不拘時服

蘇沉九寶湯簡易方治老幼素有喘急遇寒暄不常發則

連綿不已咳嗽哮喘夜不得睡

桑白皮

甘草

浙大腹皮

官桂

麻黃

薄荷

陳皮

紫蘇

杏仁 各六分

右吹咀每服二錢水盪半姜三片烏梅半箇煎六分服

平肺散 簡易方 治肺氣上壅喘嗽痰實寒熱往來咽乾口

燥

陳皮 一兩

半夏 洗七次 苦梗 炒

薄荷 各七錢

紫蘇

烏梅 去核

紫苑

知母

桑白皮 蜜炒 杏仁 炒

江 五味子 各錢 甘草 半兩

罌粟殼 蜜炒 七

右吹咀每服五錢水一盞姜三片煎六分食後溫服

瀉白散 濟生方 治肺臟氣實心胸壅悶咳嗽煩喘大便不

利

桔梗去芦炒地骨皮去赤甘草炙

瓜蒌子

升麻

半夏湯泡七次

杏仁去皮尖

桑白皮炙各等分

右咬咀每服四錢水盪半姜五片煎八分食後溫服

加減瀉白散按粹方治陰氣在下陽氣在上咳嗽吐喘

促

桑白皮一兩地骨皮七錢甘草

陳皮去白

青皮

五味子

人參各五錢

白茯苓三錢

右咬咀每服一兩水二盞加粳米煎至一盞食後溫服

青龍散御藥院方治咳嗽上氣不得卧

咳

治法

三

行

人參去芦

陳皮去白

五味子

紫蘇各一兩

右以咀每服一兩水二盞生姜三片煎至八分去滓食

後溫服

加減三奇湯按粹方治咳嗽上氣痰涎喘促胸膈不利

桔梗五錢去芦

半夏洗七錢

陳皮去白

甘草

青皮去白各半兩

杏仁三錢

五味子四錢

人參

桑白皮

蘇葉各五錢

右以咀每服八錢姜三片水二盞煎至八分去滓通口

服食後

人參潤肺散

直指方治軟喘急痞壅鼻塞

麻黃

去根節 二兩

杏仁

去尖炒 一兩半

桔梗

半兩

人參

去芦 二兩

阿膠

炒半兩

甘草

炙一兩

橘紅

二錢半

貝母

去心炒 一兩半

右吹咀每服八錢水二錢紫蘇二葉煎至八分去渣溫

服食後

書

杏仁煎丸 瑞竹堂方治老人久患肺喘咳嗽不已睡卧不

安服之立効

杏仁

去尖

胡桃肉

湯泡去皮衣

右各等分研為膏入煉蜜少許和搜得宜丸如彈子大

每服一二丸食後臨卧細嚼姜湯送下

蘇半夏湯 按粹方治喘嗽痰涎寒熱往來

桑白皮二兩 陳皮去白 五味子各五錢 紫苑各五錢

杏仁去皮 半夏湯泡 紫蘇各五錢

右為粗末每服五錢生姜三片煎日進三服

清金湯 聖惠方 治男婦遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎

聲胸膈滿氣逆坐卧不安飲食不下

粟殼炒半 甘草炙五錢 陳皮去白 茯苓去皮

杏仁去皮尖 阿膠炒 五味子 桑白皮炒

薏苡仁 紫蘇 貝母去心 半夏麩

加百合 欬炙花各兩 人參五錢

右吹咀每服八錢水一盞半生姜三片烏梅一箇煎至

八分食後服

潤肺膏 治咳嗽痰喘

官

紫苑

杏仁 去皮尖

款冬花 各一兩

麻黃

桔梗

細辛

書柯子 各五錢

枯礬 一錢

生姜 二兩

取清油 半斤

蜜 一斤

核桃肉 一兩

石先將油煉香熟次入蜜又煉去沫却下末藥攪勻每服二三匙臨卧白湯調服

奪命丹

上氣喘急經歲咳嗽約給久不愈者

信石 一錢

白礬 二錢

浙白附子 三錢

南星 四錢

半丁夏 五錢

先

咳散

法附錄卷之五

十五

丙三三七

右先用信石與白礬一處於石器內火煨紅出火黃色
爲度切不可犯鐵器却和書夏南星白附子爲細末生
姜汁麵糊爲丸如黍米大硃砂爲末每服七丸小兒三
丸井花水吞下忌食諸惡毒熱物

○廣按此方治咳嗽痰喘劫劑也蓋肺受火邪氣從火
化有升無降加以脾濕生痰則上壅而爲喘嗽滿悶
不得安卧矣病作之時固宜用此藥以劫痰然病安
之後即當用知母茯苓湯或人參五味子散寧肺湯
以補虛可也

一方 治咳嗽痰喘

南星炮

半夏湯泡各

甘草

三錢

陳皮

兩半

白

杏仁

五錢去

欵冬花

二錢

五味子

三錢

人參

二錢

每服水一鍾

半生薑五片煎臨卧温服忌生冷油膩

○庶按此方治咳嗽痰喘

攻補兼施也

烟筒喘嗽方

欵冬花

佛耳草

圖

凝水石

人參

白芷

金精石

玉

銀精石

等分

甘草

少用

右為末不以多少用香爐燒烟

蘆筒吸入肺管

用米飲

下

○巴上數方治咳嗽喘急肺脹之劑

下

浙

○巴上數方治咳嗽喘急肺脹之劑

痰咳

去付余之五

十一

方

半夏丸 濟生方 治肺臟鬱熱痰嗽胸膈塞滿

瓜蒌子 法 穢半夏 湯酒各一兩

右二件和勻姜汁打麴糊丸梧桐子大每服五十丸食

後姜湯下

書

玉液丸 和濟方 治風壅化痰延利咽扁清頭目除咳嗽止

煩熱

寒水石 燒令赤出火毒 玉半夏 洗焙為粉 白礬 研細

右合研麴糊丸如梧子大每服三十丸食後淡姜湯下

玉芝丸 和濟方 治風壅痰實頭目昏眩咳嗽聲重咽喉不

利

人參去芦

乾薄荷

白茯苓去皮

白礬枯

天南星

米泔浸焙
各三兩

官半夏

湯洗七次
姜汁和
作麩六十兩

右為末生薑汁煮麵糊丸如梧桐子每服三十丸食後

姜湯下如痰盛燥熱薄荷湯下

祛痰丸

瑞竹堂方
治風痰喘嗽

人參去芦

木香

天麻各一兩

槐角子七錢

陳皮去白

茯苓去皮

五青皮去穢

白朮各一兩

半夏七錢半

牙皂角

去皮弦酥
各九錢

右為細末生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大每服五

七十丸食後臨卧温酒送下姜湯亦可

利膈丸按粹方治風痰實喘滿咳嗽風氣上攻

牽牛四兩生用

半夏湯洗 木香半兩

青皮去白

槐角炒一兩

皂角去皮

加檳榔

大黃各五

書

右為細末生薑麵糊為丸如梧桐子大每服五十九生

姜湯下

星香丸 治諸氣嗽生痰

江

南星

半夏各三

用白礬一兩研同

陳皮五兩 薑浸一兩

浙香附子三兩 皂角水

右四味不見火為末姜汁糊為梧桐子大每服五十九

臨卧姜湯下

此方家傳秘方累驗

星辛丸 治諸般咳嗽

館

南星

姜制

半夏麩

書凝水石

枯礬

姜蚕炒

乾生姜各一兩

右為末生姜汁糊丸如梧子每服五十九姜湯下食後

瓜蒌半夏丸

治咳嗽喘滿

瓜蒌

杏仁去皮尖

枯礬各一兩

半夏湯泡

欵冬花半兩

麻黃去根節

右為末用瓜蒌汁生姜自然汁用水糊為丸如梧桐子

咳散

去付余卷之五

十八

丙

大每服三十丸食後臨卧淡茶湯下忌生冷鹹酸

至壺丸 治風痰吐逆咳嗽官

南星 生用 半夏 生用各 天麻 生用各 白麵 三兩

右為細末同白麵和均滴水丸如梧桐子大晒乾每服

三十丸以水一大鍾先煎冷沸下之煮五七沸候藥浮

起即瀝出眼乾用姜湯下

透羅丹 治痰實咳嗽胸膈不利

皂角 去皮弦 黑牽牛 炒 半夏 各一兩 大黃 蒸絛白煨

巴豆 錢去 杏仁 去皮尖 麩

右為細末生姜自然汁丸如梧桐子大每服三十丸姜

湯下咳嗽甚者三四服立效

一方取痰

藜蘆

人參用片各二錢

牙皂角去皮各炮一錢

防風去皮

細辛去各錢半

右用酸漿水一碗食後溫服候吐痰覺胸中痰盡用參

葱湯時呷飲止為度

人參散直指方治咳嗽痰壅通用

人參去差

桔梗

半夏麩心

五味子

細辛去葉

枳殼製

浙赤茯苓去皮杏仁各一分

甘草炙半分

後按

心去付除卷之五

十九

与孔三言

右吹咀每服一兩生姜五片烏梅半箇水二盞煎至八分服食後一方無杏仁烏梅不用痰嗽加紫苑添甘草人參飲 治痰嗽

半夏 湯泡七次

南星

書寒水石

柴胡 去芦

五味子

猪牙皂角

甘草

款冬花

熱加黃芩 各等分



右吹咀每服八錢生姜五片水一盞半煎至八分臨卧通口服

人參飲子 百一選方 治痰嗽寒熱壅盛

人參 去芦

桔梗

半夏

五味子

赤茯苓

白朮各兩

枳殼

甘草各半

右咬咀每服三錢水一盞薑五片煎七分空心服治寒
壅者加杏仁不去皮紫蘇各半兩

辰砂半夏丸

治一切痰飲咳嗽

用大半夏一斤湯泡七次晒乾為末用生絹袋盛貯於
磁盆內用淨水洗出去麤渣將洗出半夏末乾於盆內
日晒夜露每日換新水七日七夜澄去水將半夏粉晒
乾每半夏粉一兩入飛過細硃砂末一錢用生姜汁糊
為丸如梧桐子大每七十丸用淡生姜湯下食後服

黃芩半夏丸

治上焦有熱咳嗽生痰

核散

心法傳卷之五

二

百三十三

黃芩末一錢 製過半夏粉一兩

右二味和勻用生姜汁為丸如梧桐子大每服七十丸

用淡生姜湯送下食後服

天竺黃餅子 治一切痰嗽上焦有熱心神不寧其效甚

驗

牛膽南星三錢 薄荷葉二錢 天竺黃二錢 硃砂二錢

片腦三分 茯苓一錢 甘草一錢 天花粉一錢

右為末煉蜜入生地黄汁和藥作餅子每用一餅噙化

下食後服

司本湯濟生方 治五臟受濕咳嗽痰多氣喘身體重著

來濡細

白朮二兩

五味子

半夏湯洗

七

白茯苓去皮

橘紅各二兩

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎八分溫服不拘時

○已上數方治痰飲咳嗽之劑

欬文花散 和劑方 治肺感寒邪咳嗽喘滿胸脇煩悶痰涎

壅盛喉中哮喘鼻塞流涕咽候腫痛

杏仁

阿膠炒

麻黃去根節

半夏湯洗

欬文花各一兩

桑葉

浙知母

甘草炙

貝母各二兩

右吹咀每服二錢水一盞姜三片煎食別溫服

洗肺散 治咳嗽痰盛肺氣不利

黃芩二錢 半夏三錢 天門冬去心 麥門冬去心

五味子各一兩半 甘草半錢 杏仁去皮尖

右吹咀作一服水二鍾生姜五片煎至七分食後服滓再煎服

百花膏 濟生方治喘咳嗽不已或痰中有血

款冬花 百合 蒸焙各等分

右為細末煉蜜為丸龍眼大每服一九食後細嚼吞

下嚙化尤佳

貝母散 御藥院方 治喘嗽多日不愈

貝母 錢法心五

桑白皮 五錢

五味子 五錢

甘草 半兩炙

知母 一錢五分

款冬花 二兩

杏仁 三兩去皮尖麩炒

右咬咀每服一兩水一盞半生姜三片煎至八分去滓

溫服食後

人參散 聖惠方 治諸咳嗽喘急不出言語年久五服日近

三服効

人參

知母

貝母

半夏

杏仁

馬兜鈴 去皮

麻黃 不去節

天仙藤 二兩各半兩

右咬咀每服八錢水二盞烏梅一箇蜜一匙煎至八分

咳散

心法附錄卷之五

二五

百三

去滓溫服食後臨卧服已忌酒醋雞麵鹹酸生冷

○廣按古方治火鬱乾咳嗽者甚少治風寒濕咳嗽者甚多蓋由不分內外所因新久之異故也夫形寒飲冷新咳嗽有痰固當以溫寒散濕為主如人參半夏之類可也若夫氣動火炎久咳嗽無痰又當以清熱潤燥為先然人參半夏之類又在所禁如天門麥門知母貝母石膏瓜蒌之類可也世人徒知肺主皮毛外感風寒為寒殊不知傳裏鬱久變為熱也况肺為華蓋而五臟六腑火自內起薰蒸熒灼作咳嗽者亦良多矣已上諸方類合亦須加減可也

○已上數方治火鬱咳嗽之劑

鍾乳補肺湯 和濟方 治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦

枯唾血腥臭喘乏不已

鍾乳碎如米 桑白皮各三兩 肉桂去皮 白石英如米

五味子揀 欬冬花去梗 紫苑洗去土 人參去芦二兩

麥門冬去心三兩

右除鍾乳白石莫外同為粗末後入鍾乳等同拌勻每

服四錢水一盞半姜五片棗一枚粳米三十粒煎七分

用綿濾去滓食後服

人參潤肺丸 和劑方 治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈新

成虛勞及療風壅痰實頭目昏眩口舌乾燥涕唾稠粘

人參

款冬花去梗細辛 去葉

甘草各四

官桂去皮

桔梗各五

杏仁去皮炒

知母六兩

右為末煉蜜丸如雞頭子大每服一丸食後細嚼淡姜

湯下

人參養肺丸和劑方治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰肺咳

嗽喘急胸中煩悸涕唾稠粘或有勞傷肺胃吐血嘔血

並皆治之

人參

黃芪去芦蜜炙各

瓜蒌根

白茯苓去皮各

杏仁去皮炒

皂角子

三百箇

半夏

湯泡七次為末生

右為末煉蜜丸如彈子大每服一九食後細嚼用紫蘇

湯下如喘急用桑白皮湯下

團參飲子

濟生方

治憂思喜怒飢飽失宜致傷脾肺咳嗽

膿血增寒壯熱漸成勞瘵者

人參

紫苑茸洗

阿膠蛤粉炒百合蒸

細辛

洗去葉

款冬花

江杏仁

炒去皮

天門冬

湯泡

半夏

湯泡七次

經霜桑葉

五味子

各一兩

甘草炙半兩

右吹咀每服四錢水盪半姜五片煎七分食後溫服

氣嗽加木香唾血而熱加生地黃 唾血而寒加鍾乳

咳散

去府余卷之五

三百

三兩不消

粉 疲極咳嗽加黃芪 損肺唾血加沒藥藕節 嘔

吐肢滿不食加白朮 咳而小便多者加益智仁 咳

而面浮氣逆加沉香橘皮煎 大便澹者去杏仁加鍾

乳粉

紫苑茸湯濟生方治飲食過度或食煎燻邪熱傷肺咳嗽

咽痒痰多唾血喘急脇痛用不得安卧

紫苑茸洗

經霜桑葉去款冬花

百合蒸焙

杏仁去皮尖

阿膠蛤粉炒貝母去心

蒲黃炒

半夏湯洗各

犀角錢

浙甘草炙

人參各半兩

右咬咀每服四錢水送 辛姜五片煎八分食後温服

人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸潮

熱見發熱類

館

補肺湯 按粹方 治勞嗽

桑白皮

熟地黄 各一兩 人參

紫苑

黃芪

五味子 各一兩

右咬咀每服一兩水二盞煎至八分入蜜少許食後溫

服

經肺湯 楊氏家藏方 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳

嗽痰嚔

人參 去苳

當歸 去苳

白朮

熟地黄

亥夜

去付余卷之五

二十五

丙 三百五十六

川芎

白芍藥

甘草炙

五味子

麥門冬

桑白皮

白茯苓去皮各半兩

阿膠蛤粉炒

右咬咀每服一兩生姜五片水二盞煎至一盞去滓通

口服食後

五味黃芪散按粹方治嗽咯血成勞眼睛疼四肢困倦

脚膝無力

麥門冬去心

熟地黃

黃芪

桔梗各半兩

人參三錢

甘草

浙芍藥

五味子絡二錢

右咬咀每服八錢水二盞煎至八分去滓溫服食後

溫金散 大全良方治勞嗽

甘草

黃芩

官桑白皮

防風各二兩

杏仁

一十七粒製

人參去芦

茯苓各五錢

麥門冬去心二錢

一半

書

右以前五味用米泔水浸一宿曬乾次入人參茯苓麥門冬三味同為末每服二錢水一盞蠟一豆大煎至八分食後溫服

人參潤肺丸

人參

山藥

浙蓮肉

款冬花

蛤粉

杏仁

去皮尖

龜板

五兩

紅棗

去核

亥散

去付徐卷之五

二十六

可

大蘿蔔一箇 煑熟

右為末棗肉丸梧子大每服五十丸白湯下食後

人參五味子散聖惠方治男女老稚諸虛百損氣血勞傷

涎喘欬膿或嗽哈血寒熱往來夜有盜汗羸瘦困乏一

切虛損

人參

五味子

圖

桔梗

白朮

白茯苓

甘草炙

五熟地黄

當歸各半兩

地骨皮

前胡去苗

桑白皮炒

枳殼去穢炒

黃耆炙

陳皮去白

浙柴胡各三錢

右咬咀每服八錢水一盞半生姜三片煎至八分去滓

温服食後日三煩渴加烏梅青蒿煎咳膿血加知母阿

膠煎尤妙

大寧嗽湯直指方治勞嗽諸嗽通用如神効

此五味

茯苓去皮桑白皮炒紫蘇

細辛

橘皮

枳殼麸炒

杏仁麸炒去

甘草炙

阿膠炒

粟殼去穰蜜炒

半夏

湯洗五錢

勞嗽加川芎

右吹咀每服一兩水二錢薑棗一枚姜三片烏梅半箇煎

至一盞温服

加味人參紫苑散直指方治虛勞咳嗽

五味子

人參

紫苑茸

陳皮

貝母

紫蘇葉

官桑白皮炒

白茯苓

杏仁炒去皮

甘草各七錢

加川芎

半夏各一兩

阿膠蛤粉炒

書

右咬咀每服一兩水二盞姜七片棗二枚烏梅一箇煎

至一盞溫服

人參蛤蚧散 治三年肺氣上喘咳嗽咯唾膿血滿面生

瘡遍身黃腫

蛤蚧一對全者河水浸五宿日換水洗去腥臊炙黃

杏仁去皮尖

人參

甘草各五兩

知母

桑白皮

茯苓 去皮

貝母 各三兩

右為細末，淨磁盒兒內盛，每日用茶點服一錢匕，神効。
○廣按治嗽方中多用人參，以其肺虛故也。然肺受火邪，久嗽喘滿吐血，與夫陰虛火動，午後發熱，兼嗽者，切宜忌之。然肺受寒邪，喘嗽與夫陽虛火動，晝夜發熱，兼嗽者，宜用亦須知。貝母、天門冬、麥門冬、瓜蒌之類，擇其一、二味，監制可也。丹溪云：子每治病，以某藥為主，治以某藥為引，經以某藥為監制，是也。

○已上數方治勞嗽之劑

三母散 治嗽久不愈者，常服除根累効。

知母

貝母等分

右為細末老生姜切片蘸藥細嚼白湯下

人參紫苑湯言一選方治肺氣不調咳嗽喘急久不愈者

五味子一錢

杏仁半兩

書人參

紫苑

甘草各二錢

縮砂一兩

桂枝二錢半

欵冬花半兩

罌粟殼去穢

製一兩



右咬咀每服四錢水一盞薑五片烏梅二枚煎服

人參理肺散按粹方治喘嗽不止

麻黃去毒

炒一兩

米殼炒

人參二兩

去當歸

木香各一兩

杏仁三兩

炒一兩

右為粗末每服四錢水煎服

人參欵花膏和劑方治肺受虛寒久嗽不已嘔膈滿悶咳

嗽痰涎嘔逆惡心腹脇脹滿腰背倦痛或勞虛冷嗽及

遠年近日一切嗽病服諸藥不効者皆治

欵冬花去梗人參去芦北五味去梗紫苑洗去芦

桑白皮各一兩

右為末煉蜜丸雞頭實大每服一九細嚼姜湯下臨卧

食後服

人參欵冬花散按粹方治喘嗽久不已者

人參去芦欵冬花各五錢知母貝母

半夏 各三錢 栗殼 一兩炒

右咳咀每服八錢水一盞半烏梅一箇煎至六分食後

臨卧温服加生姜五片同煎

補肺湯直指方治肺虛氣乏久嗽

阿膠炒

蘇子

桔梗

半夏制

茸草

各半兩

款冬花

圖

砂仁

紫苑

細辛

杏仁

去皮炒

陳皮去白

桑白皮炒

青皮

去白

五味子

石菖蒲

草果

各二錢

右咳咀每服一兩水二盞生薑四片紫蘇三葉煎至八

分温服

治多年喘嗽

人參

麻黃

館甘草各二兩

右為末每服二錢杏子五箇搗碎無根木同煎和滓食

後服

書

治遠年近日一切咳嗽

圖

人參

五倍子

杏仁去皮尖半夏七錢

右用蘿蔔去頂取空以草麻子去殼四十九粒明凡五

錢為末二味入蘿蔔內以頂蓋紙暴煨研丸每服十丸

臨臥烏梅湯下

人參湯經驗方治遠年嗽

亥飲

公法付徐氏五五

三

百二八五

麻黃去節

杏仁去皮尖炒

甘草炙四兩

桑白皮

五味子

粟殼製

陳皮各五錢

麥門冬三錢

紫苑二兩

人參去芦四錢

阿膠七錢炒

右咬咀每服一兩水二盞煎至八分去滓溫服食後

治多年嗽百選方

杏仁去皮尖

半夏湯洗七次

南星生用

甘草生用各等分

右咬咀每服八錢生姜七片棗一枚水一盞半煎至八

分食後溫服

諸般嗽不已

浙

粟殼製上

烏梅去核

陳皮去白

人參去芦

木香下

五味子中

桔梗炒上

杏仁去皮尖

石膏中

甘草下

官

右吹咀每服八錢薑水二盞煎至八分去滓温服食後

九仙散 治一切咳嗽

書

人參

款冬花

桔梗

五味子

阿膠

烏梅各一兩

貝母

罌粟殼各半

桑白皮一兩

右為細末每服三錢白沸湯點服

大參清肺湯和劑方治肺胃虛熱咳嗽喘急坐臥不安并

治久年勞嗽唾血腥臭

亥散

心齋神卷之五

三二

丙二百九十五

阿膠炒

杏仁去皮炒

桑白皮

地骨皮

人參

知母

烏梅去核

甘草炙

罌粟殼

去蒂蓋蜜
各等分

館

右吹咀每服三錢水盞半生姜棗子各一枚煎至一盞

食後溫服

○已上數方治咳嗽喘急久不愈之劑

○廣按肺主皮毛人之無病之時榮衛同流內氣自皮

膚腠理普達於外一或風寒外束則內氣不得於外

達便從中起所以氣升痰上故咳嗽宜用辛溫辛涼

之劑以發散風寒則邪退正復而嗽止也又按肺為

華蓋凡飢飽勞役喜怒憂恐與夫飲醇醪食厚味則
火升痰上而傷於肺亦作咳嗽宜用降火豁痰之劑
則火降痰消而咳止也又按肺主氣運行血液周流
一身今也肺受火邪氣從火化有升無降為嗽為喘
久而不治虛極至損則不能運行氣液發為煩熱驚
悸咳唾粘涎膿血宜用補虛潤燥開鬱散火之劑則
肺得清正而嗽止也故治咳嗽要知新久之異虛實
之殊補瀉之宜也矣

欬嗽治例

出明醫雜著

浙

王節齋曰欬謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動

而生痰欬嗽者因傷肺氣而動脾濕也病本雖分六氣
五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲出也須分
新久虛實新病風寒則散之火熱則清之濕熱則瀉之
久病便屬虛屬鬱氣虛則補氣血虛則補血無鬱則開
鬱滋之潤之斂之降之則治虛之法也

主方

杏仁

去皮尖

白茯苓

各錢五

橘紅

七分

五味子

栝樓

其草各五分

春作多上升之氣宜潤肺抑肝加川芎芍藥半夏

各一錢

麥門冬

炒黃

知母

各五分

春若傷風致欬鼻流清涕宜辛涼解散加防風薄荷紫

蘇炒黃芩麥門冬各一錢

夏多火熱炎上最重宜清金降火加桑白皮知母炒黃

芩麥門冬石膏各一錢

秋多濕熱傷肺宜清熱瀉濕加蒼朮桑白皮各一錢防

風黃芩山梔炒各五錢

冬多風寒外感宜解表行痰加麻黃桂枝半夏生乾姜

防風各一錢肺經素有熱者再加酒炒黃芩知母各五

分若發熱頭疼鼻塞聲重再加梔木川芎前胡柴胡

各一錢

亥夜
心去付余夫之五
三三
五 三三三三

若有痰加半夏枳殼風痰再加商星 姜汁炒 濕痰脾困

少食加白朮蒼朮 有痰而口燥咽乾勿用半夏商

星宜加知母 蜜水并炒 貝母瓜蒌仁黃芩炒

若夏月熱痰或素熱有痰加黃芩黃連知母石膏

上半日欬者胃中有火加貝母石膏黃連 五更嗽者

同治



黃昏欬者火浮於肺不宜正用寒涼藥宜加五味子訶

子皮斂而降之

若欬嗽久肺虛滋氣補血加人參黃耆阿膠當歸生薑

天門冬欬冬花馬薺鈴酒芍藥之類肺熱咳喘去人

參用沙參此兼補氣血也

若午後欬者屬陰虛即勞嗽也宜補陰降火加川芎當歸芍藥熟地黃黃柏知母竹瀝姜汁天門冬瓜蒔仁貝母此專補陰血也

若火鬱嗽謂痰鬱火邪在中宜開鬱消痰用訶子皮香附米瓜蒔仁半夏麩海石青黛黃芩為末蜜調為丸噙化仍服前補陰降火湯熱失治則成勞

若痰積食積作咳嗽者用香附瓜蒔仁貝母海石青黛半夏麩軟石膏山楂子枳實姜炒黃連為末蜜調噙化

若勞嗽見血加阿膠當歸芍藥天門冬知母貝母桑白
皮亦於前肺虛陰虛二條擇用大抵咳嗽見血多是
肺受熱邪氣得熱而變為火火盛而陰虛不得安寧
從火上升故治宜瀉火滋陰忌用人參等甘溫補氣
之藥然亦有氣虛而咳血者則宜用人參黃耆款冬
花之類但此等證不多耳

因欬而有痰者欬為重主治在肺因痰而致欬者痰為
重主治在脾但是食積成痰痰氣上升以致欬嗽只
治其痰消其積而欬自止不必用肺藥以治嗽也

○肺痿

丹溪心法

肺痿治法在乎養血養肺養氣法金 曾治一婦人二十
餘歲胸膈間一竅口中所咳膿血與竅相應而出以人參
黃芪當歸補氣血之劑加退熱排膿等藥而愈

附脉理

脉訣舉要曰寸數虛瀦肺痿之形

附諸方

人參養肺湯 治肺痿證咳救有痰午後熱并聲颯者

人參 去芦

甘草

阿膠珠 各一錢半

茯苓 一錢半

柴胡 四錢

五味子

貝母

杏仁 炒

桔梗炒各一錢半 桑白皮二錢 枳實一錢五分

右咳咀每服八錢 生姜三片 棗一枚 水一盞半 煎至八

分 食後溫服

知母茯苓湯宣明方 治肺痿喘嗽不已 往來寒熱自汗

茯苓 甘草炙各一兩 知母 五味子

人參去芦 薄荷 半夏洗十次 柴胡去苗

白朮 欵冬花 玉桔梗 麥門冬去心

黃芩各半兩 川芎 阿膠炒各三錢

右咳咀每服一兩水二盞 生姜十片 煎至一盞 去渣通

口服 食後

人參平肺散 按粹方 治心火剋肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰

涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利

桑白皮炒 知母七錢 甘草炙 地骨皮各半

五味子三百 茯苓 青皮 人參各四錢

陳皮去白 天門冬去心 如熟加黃芩四錢 紫蘇葉

半夏各半兩

右咬咀每服五錢水二盞生姜三片煎至八分去滓溫

服或為末姜汁丸彈子大噙化亦得食後

紫苑散 按粹方 治咳嗽喘中有膿血虛勞證肺痿變癰

人參一錢 紫苑半錢 知母一錢半 貝母一錢半

卷之五 三十一 丙

桔梗一錢 甘草半錢 五味十粒 茯苓一錢

阿膠炒五分

右呖咀水煎服一二盞每分水二盞生姜三片煎至一

盞食前服

書

劫勞散按粹方治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱
熱過即冷時有盜汗四肢倦怠體力黃瘦飲食減少夜
卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽唾中有紅
絲名曰肺痿若不治便成羸劣之疾

白芍藥六兩 黃耆 浙甘草 人參

半夏洗 白茯苓 熟地黃 當歸

五味子

阿膠各二

右咬咀每服一兩水二盞生薑三片棗三枚煎至一盞服不拘時

○肺癰

丹溪心法

書

肺癰已破入風者不治 用醫壘元戎搜風湯吐之 或用太乙膏成丸食後服 收斂瘡口止有合歡樹皮白欬煎飲之合歡即槿柯皮也又名夜合

附論

○廣按書云咳嗽有濁唾涎沫或咳嗽唾中有紅線膿

亥按

三行余卷之五

三行

百平九浦

血名曰肺痿熟在上焦故也如口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛名曰肺癰欬傷肺葉成也

附脉理

脉訣舉要曰寸數而實肺癰已成寸數虛瀦肺痿之形肺癰色白脉宜短瀦死者浮大不白而赤

附諸方

桔梗湯濟生方治肺癰咳噉膿血咽喉多渴大小便赤澀

桔梗去芦 貝母去心膜 當歸去芦 酒瓜麥子

枳殼去穰 蘇葉炒 杏仁炒 浙桑白皮蜜水 防己各二兩

黃芪去芦 甘草節 生用杏仁去穰 煨尖 百合蒸 各半



右咬咀每服五錢水盞半生姜五片煎入分不拘時服
如大便秘加大黃小便赤少加水通

消膿飲直指方治肺癰膿腥氣上衝而嘔咳軟

南星生一兩 知母 貝母 白芷

生地黄 阿膠炒 圖川芎 桑白皮炒

白芨 各半兩 甘草炙 防風 射干

桔梗 紫蘇葉 江天門冬去心 薄荷

杏仁不去皮 半夏姜製各七錢

右咬咀每服一兩水二盞生姜七片烏梅一箇煎至八

分食後溫服

黃芪散 治肺癰

用白紫蜜炙為細末每服一大匙食遠黃芪湯調服

一方 治肺癰吐膿

桔梗炒一兩 甘草炙半兩

右每服一兩水一鍾半煎八分空心服吐盡膿為効

霍亂

十七

江

丹溪心法

○內有所積外有所感致成吐瀉仍用二陳湯加減作吐以提其氣此非鬼神皆屬飲食前人確論乃陽不升陰不

降平隔而成切莫與穀食雖米飲一呷入口即死必待吐
瀉過二三時直至飢甚方可與稀粥食之脉多伏欬絕
見成吐瀉不徹遠用吐提其氣起或用樟木煎湯吐之亦
可 大法生姜理中湯最好不渴者可用如渴者用五苓
散有吐者以二陳湯探吐亦有可下者 轉筋不住男子
以手挽其陰女子以手牽乳近兩邊此千金妙法也 轉
筋皆屬乎血熱四物湯加酒芍紅花蒼朮南星煎服 乾
霍亂者最難治死在頃更升降不適當以吐提其氣極是
良法世多用益湯此係內有物所傷外有邪氣所逼有用
吐者則蕪發散之義有用溫藥解散者不可用涼藥宜二

陳湯加解散藥

二陳湯加

芫花

館秦

防風

白芷叔云白

石剉姜五片煎服

書

治霍亂方

蒼朮

厚朴

圖

陳皮

葛根各一錢

滑石三錢

白朮二錢

木通一錢

甘草炙五分

石剉入姜煎湯下保和丸四五十九

戴云霍亂者吐也有聲有物先有聲無物而躁亂者謂之乾霍亂也

二陳湯

見痰類

理中湯

見中寒

五苓散

見溫熱

四物湯

見補損

附論

○廣按人於夏月多食生冷因脾虛不能運化加以外感風寒則揮霍亂上吐下瀉也人見倉卒躁擾痛悶似有鬼神然實非鬼神乃飲食痞隔上下不通將欲吐瀉故如是也

附脈理

脉訣舉要曰滑數為嘔代者心亂微滑者生瀉數凶斷又
曰滑而不勻必是吐瀉霍亂之候脉代勿訝

附諸方

姜附湯 治中寒霍亂轉筋手足厥冷

理中湯 治中寒霍亂吐瀉 亞見中寒

通脉四逆湯 濟生方治霍亂多入內冷脉絕

吳茱萸 炒 附子 炮 一兩 桂心 去皮不 木通

細辛 白芍藥 甘草 炙 當歸 去芦

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞姜七片棗一枚煎七

分温服

七氣湯 三因方治七氣鬱結五臟之間互相刑剋陰陽不

和揮霍變亂吐利交作

半夏湯洗五兩 厚朴姜製 桂心各二兩 白芍藥

茯苓去皮各四兩 紫蘇葉 橘皮各二兩 人參去芦兩

每服四錢水一盞酒半盞生姜七片棗一枚煎七分温

服

五苓散 治霍亂吐瀉煩渴引飲 見温熱

香朴飲子 治伏熱吐瀉虛煩作亂 見中暑

藿香正氣散 治中濕霍亂吐瀉

不換金正氣散 治霍亂轉筋嘔吐泄瀉頭疼 並見冒寒

二香散 治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香二兩 半夏 陳皮 桔梗

白朮 大腹皮 茯苓 厚朴

紫蘇 白芷各一兩 書甘草二兩 黃連二兩

香薷一斤 扁豆半斤

每服用水一鍾半生姜三片葱白二根煎食後熱服此

即藿香正氣散黃連香薷飲相合也

既濟湯醫方集成 治霍亂後虛煩不得眠

人參去芦 甘草炙 浙淡竹葉各一兩 麥門冬去心

附子炮半 半夏湯洗

右咬咀每服四錢水二盞姜五片粳米百餘粒煎空心
温服

麥門冬湯濟生方治霍亂已愈煩熱多渴小便不利

麥門冬去心 橘皮去白 半夏湯泡七次 白茯苓去皮

白朮各一兩 人參去芦 甘草炙各半兩 小麥半石

右咬咀每服四錢水二盞姜五片烏梅少許煎入分温服

木瓜湯直指方治霍亂吐瀉轉筋攪悶

酸木瓜二兩 茴香微炒二錢半 甘草炙二錢 吳茱萸洗炒

二兩

右呶咀每服四錢姜五片紫蘇十葉煎服空心

桂苓甘露散 治中暑霍亂吐瀉發渴引飲 見中暑

加減理中湯

人參

白朮

書乾姜

甘草各

若為寒氣濕氣所干者加附子一兩名附子理中湯

若霍亂吐瀉加陳皮青皮各一兩名治中湯 若乾霍

亂心腹作痛先以塩湯少許頻服候吐出令透即進此

藥 若嘔吐者於治中湯內加丁香半夏一兩每服生

姜十片同煎 若泄瀉者加橘紅茯苓各一兩名補中

湯 若瀉泄不止者於補中湯內加附子一兩 不喜

飲米穀不化者再加縮砂仁二兩共成八味。若霍亂吐下，心腹作痛，手足逆冷，於本方內去白朮，加熟附名四順湯。若傷寒結胸，先以桔梗枳殼等分煎服不愈者，及諸吐利後，胃痞欲絕，心膈高起，急痛，手不可近者，加枳實茯苓各一兩，名枳實理中湯。若渴者，再於枳實理中湯內加括麥根一兩。若霍亂後轉筋者，理中湯內加火煨石膏一兩。若臍上築者，腎氣動也，去朮加官桂一兩半，腎惡燥，故去朮，恐作奔豚，故加官桂。若悸多加茯苓一兩。若渴欲飲水者，添加朮半兩。若腹滿者，去白朮加附子一兩。若飲酒過多及啖炙

燔熟食發為鼻衄加川芎一兩 若傷胃吐血以此藥
能理中皖分利陰陽安定血脈只用本方

三因白朮散 治中暑嘔吐暈眩及大病後調理失宜勞
復如初及脾胃虛損面色萎黃飲食不美口吐酸水滑
泄腹鳴飲食所傷霍亂吐瀉並宜服之

白芷

甘草炙

圖

青皮去白

白茯苓

桔梗

山藥

五

香附子

略

乾姜辛兩

白朮

陳皮各一兩

每服水一鍾生姜三片棗一枚木瓜一片紫蘇葉三二
片煎食前服 若吐瀉加白梅煎 喘加桑白皮杏仁

傷寒勞復加薄荷 膈氣加木通入麝香少許 中
暑嘔逆加香薷霍亂加藿香 產後泄瀉加荆芥 氣
厥入鹽煎服

調中白朮散 治大病後吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱及酒

毒嘔噦

白朮

茯苓去皮

人參略半

甘草一兩五分

木香一錢

藿香半兩

葛根一兩

右為末白湯調服二錢煩渴加滑石二兩甚者加姜汁

人參散經驗方 止吐逆及治瀉後煩渴常服調中和氣

茯苓去皮

人參略半

葛根一兩

藿香去土

木香

甘草

右咬咀每用水二升煎至一盞通口服瀉後渴甚者加

滑石一錢

止渴湯 經驗方 治霍亂煩渴

甘草炙

人參 去芦

麥門冬 去心 茯苓 去皮

桔梗

瓜蒌根

圖澤瀉

葛根 各半

右為末蜜湯調二錢服

回生散 百一選方 治霍亂吐瀉但一點胃氣存也服之回

生

陳皮 去白

藿香 去土 二分

浙

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服不拘時
候

姜鹽飲直指方治霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉

鹽一兩

生姜辨兩

右同炒令色變以水一椀煎熟溫服甚者加童子小便
一盞

治絞腸痧證經方治手足厥冷腹痛不可忍者以手蘸

溫水於病者膝腕內拍打有紫黑點處以針刺去惡血

即愈又一法用麻弦小竹弓蘸香油或熱水括手足背

背額項即愈

便急大黃丸 療心腹諸痛卒暴百病用此藥吐下即愈

方見傷食

○廣按乾霍亂者乃寒濕太甚脾被絆而不能動氣被鬱而不能行所以卒痛而手足厥冷惡心嘔噦也俗名攪腸沙者蓋言痛之甚也除用藥不言外此方刺青筋以出氣血南方括骨背手足以行氣血俱能散病然出氣血不如行氣血之爲愈也蓋霍亂乃氣病非血病也今刺青筋固能散氣而血因之以傷况人之一身氣常有餘血常不足今不足者又從而傷之是不足之中又不足也少壯之人庸或得免而衰老

之人則不免於死也何以言之氣為血之先道守血為
氣之依附今陰血既乏則氣失其依附必然發越
不死何待書曰陽虛必惡寒陰虛必發熱蓋氣有餘
便生火火動則發熱熱久而陰血愈消經曰陰虛則
病陰竭則死此之謂也

圖

浙江

丹溪心法附餘卷之五終

序
八
附錄卷之三

四
六



浙江圖書館

善本
339
月 日



浙江圖書館

浙江圖書館善本

甲登記號：010939

一九 年 月 日



浙江圖書館



浙江圖書館



浙江圖書館

colorchecker CLASSIC














浙江圖書館

xrite



colorchecker CLASSIC



x-rite

100mm