

卷四



書名 重刊補註洗冤錄集證五卷
撰者 清 王又槐 撰，清 阮其新 補注
卷 卷四
內容分類 史-政書 法令-檢驗
索書號 大木-法類-獄訟-檢驗-8
編號 B3885700

[彩色首頁1](#)

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: B3885700

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 大木-法類-獄訟-檢驗-8

漢籍善本文影像資料庫文本 [重刊補註洗冤錄集證五卷](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

[使用上的注意事項](#)

事莫重於人命罪莫大於死刑殺人者抵法固無恕施刑失當心則難安故成招定獄全憑屍傷檢驗爲眞傷眞招服一死一抵俾知法者畏法民鮮過犯保全生命必多倘檢驗不眞死者之冤未雪生者之冤又成因一命而殺兩命數

檢驗總論

重刊補註洗冤錄集證卷一

武林王又槐蔭庭氏增輯

山陰李觀瀾虛舟氏補輯

殳山孫光烈臨川氏參閱

會稽阮其新春翁氏補註

武林王又梧鳳偕氏校訂

元和張錫蕃鶴生氏重訂加丹



洗冤錄表云救得一人不死便全得兩人性命此急救之方所由錄也

重刊補註洗冤錄集證卷四

武林王又梧鳳偕氏校訂 元和張錫蕃鶴生氏重訂加丹
殳山孫光烈臨川氏參閱 會稽阮其新春畲氏補註

急救方

救縊死

踏肩提髮擦胸按腹潤喉吹耳

救法

眼開甦醒後宋本作
眼開勿苦勞動

凡縊從早至夜雖冷亦可救從夜至早稍難若心下溫一日以上猶可救不得截繩但緩緩抱解放臥令一人踏其兩肩以手提其髮常令緊不可使頭垂下一人微微撓整喉嚨以手擦胸上散動之一人磨擦臂足屈伸之若已僵但漸強屈之又按其腹如此一飯久卽氣從口出得呼吸眼開甦醒後又以官桂湯及粥飲與之令潤咽喉更令二人以筆管吹其耳內若依此救無不活者。

官桂湯

廣陳皮八分 厚朴一錢 肉桂五分
製半夏一錢 乾薑三分 甘草三分

又法緊用手罨其口勿令通氣兩時許氣急卽活。

緊用手罨救法

皂角細辛救法

又方取活鵝嘴入口內鳴應聲卽活見洗冤錄表

又法用皂角細辛等分爲末。如大豆許吹兩鼻孔。

山羊血救法
原本二三分作二三釐下有不
可過多四字僵定救法

原本手拉直
作首扯直

救溺死

皂角納下部活人背擔各救法

水溺一宿者尙可救。搗皂角以縣裏納下部內。須臾出水卽活。或屈死人兩足著人肩上。以死人背貼生人背擔走吐出水卽活。

壁泥覆救之法

熟字疑即熱
字之訛

又法先打壁泥一堵置地上却以死者仰臥其上更以壁土覆之止露口眼自然水氣喩入泥間其人遂甦。雖身僵氣絕用此法亦可救。

又法炒熟砂覆死人面上下著砂只畱出口鼻

砂冷濕又換數易卽甦。

宋本日字
下有耳字

又醋半盞灌鼻中。

重刊補註洗冤錄集證

卷四

三
四之二

又縣裏石灰納下部中水出卽活。

又倒懸以好酒灌鼻中及下部。

又倒懸解去衣去臍中垢令兩人以筆管吹其耳。

又急解死人衣服於臍上灸百壯。

又榜起時急急將口撬轎音橫啞筋一隻使可

出水以竹管吹其兩耳碾生半夏末吹其鼻孔皂角末置管中吹其穀道如係夏月將溺人肚皮橫覆牛背之上兩邊使人扶住牽牛緩緩行走腹中之水自然從口中并大小便流出再用

熱砂覆救之法
以醋灌鼻之法

蘇裏石灰救法
倒懸灌鼻救法

灸臍救法

分別冬夏救法

冬月溺水救
法又見救凍
死條當參看

生薑湯化蘇合丸灌之。或生薑汁灌之。若無牛
以活人。覆臥躬腰令溺人如前。將肚腹橫覆於
活人身上。令活人微微動搖。水亦可出。若一時
無牛。兼活人不肯拯救。或鍋一口。將溺人覆於
鍋上。亦可。如係冬月急。將濕衣解去。爲之更換。
一面炒鹽。用布包熨臍。一面厚鋪被褥。取竈內
不著草灰。多多鋪於被褥之上。令溺人覆臥於
上。臍下墊以絲枕一個。仍以草灰將渾身厚蓋
之。灰上再加被褥。不可使灰迷於眼內。其撬口
唧筋灌蘇合丸。生薑湯吹耳鼻穀道等事。俱照
重刊補註洗冤錄卷四
夏天法。冬天甦醒後。宜少飲溫酒。夏天宜少飲
粥湯。按灰色煖而能拔水。凡蠅溺水死者。以灰
埋之。少頃即活。此明驗也。

又以酒罇一個紙片一把。燒放罇內。急以罇口
覆臍上。冷卽再燒紙片放罇內。覆臍去水卽活。
又初救起之時。尙有微氣。或胸前尙煖。速令生
人脫貼身裏衣。爲之更換。抱擔身上。將屍微微
倒側之。令其腹內水流出。若水往外流。卽有生
機。一面用粗紙燎灼。取烟薰其鼻竅。稍薰片時。
卽用皂角研細。吹入鼻竅。但得微有一噦噴。卽

可得生。

重刊補註洗冤錄集證

卷四

急救方

五



傷不透膜治法

半溫服宋本作通溫服

凡殺傷不透膜者。乳香沒藥各一皂角子大研爛。以小便半盞。好酒半盞。同煎半溫服。然後用花藥石散或烏賊魚骨或龍骨爲末。敷瘡口上。卽止。昔推官宋豫定驗兩處殺傷氣偶未絕亟令保甲取蔥白。熟鍋炒熟。遍敷傷處。繼而呻吟。再易蔥白。傷者無痛矣。

花藥石散

乳香

沒藥

羌活

紫蘇

草烏

蛇含石

童便煅三次

厚朴

白芷

細辛

降香

當歸

南星

輕粉

蘇木

檀香

龍骨

各二錢

麝香

三分

花藥石

五錢童便煅七次

右共研極細。確收聽用。蔥湯洗淨。用此繆之。軟紙蓋紮。一日一換。神效。

又被刀傷血出不止。用紫藤香卽降香。瓦罐

刮下。石碾碾細。敷之。血即止。又無瘢痕。

又刀刃傷痛不可止。用好雞骨炭。擲地上鏗然

有聲者。與松香明透者。等分捶成一塊。再多用

血出不止治法

洗籠錄表云
必用瓦罐刮
下必用石灰研
首忌銅鐵也

痛不可止治法

血流不止用
千年石灰或



生半夏研末
敷上或用乾
薑和白糖撒
傷處皆效

金瘡腸出治法

老荳菜搗汁拌入陰乾如此拌捶三四遍後爲細末收貯上已端午七夕等日製之敷患處痛立止完好如常

箭鏃傷治法

攤成餅子將火硝細末鋪上再用大螺旋搗成末鋪火硝上包傷一日夜卽出處

治箭鏃木竹器傷用艾絨

金瘡腸出者用小麥五升水九升煮四升縣瀘淨汁待極冷令病人臥席上一人含汁噀其背則腸漸入喫時勿令病人知之及多人在旁言語如未入擡席四角輕搖則自入旣入者須用蘇油潤綫縫緊仍以潤帛紮束慎勿驚動使瘡口復逆

被箭鏃傷者用陳醃肉去皮取紅活美好者用

其肥細切剉濃將象牙末及人所退爪甲爲末共研極細拌入所剉醃肉內再爲勻剉令其合一厚敷箭鏃週圍一飯頃其鏃卽自爲逆脫

重刊補註纂錄集證

卷四

急救方

七

馬前子鱠枳壳鱠於屋下雨水不及常有人溺之溺鉢將前二物放入浸至四十九日取起長流水淘淨將馬前子用黃瓢各晒乾切片用黃土拌炒微焦黑去磁鋒刮去面上薄皮將枳壳破開挖去手足木石金刃各傷均立效傷愈勿去其痂令自落並無疤痕凡傷痕已破損見血或已潰爛者將乾藥敷若傷痕已破用黃酒調敷泡已破仍乾敷傷重者一面急

續輯

用一錢半、沖熱黃酒一碗服之。不能飲者，作二三次服。



重刊補註洗冤錄集證

卷四 急救方

八

救湯火傷

如一時藥不便先飲童便一碗再將生大黃細末用香油或桐油調敷爛至肌內者用山野人家百草霜三錢輕粉錢半研未調香油敷之當門麝卽獐子腎內小如菜豆大

原本已退下有由白轉紅由紅漸淡塗上不卽乾則防其腐處潰害三十字

禁用冷水救法

又方用大麥以淨砂鍋炒之漆黑爲度取出隔紙攤土上出火氣研末燭首乾擦未破者以香油或生桐油調擦

湯潑受傷急覓水中大蚌置磁盤中。將其口向上置無人處候其口自開時豫將冰片二三分。傾入蚌口內其口卽合而蚌內之肉卽化爲漿。然真當門麝二三分同研細末以匙挑一二分傾入蚌口內其口卽合而蚌內之肉卽化爲漿。然後再入冰麝少許用雞翎粘掃傷處先從四面邊沿層層掃入痛楚自減如無大蚌小者亦可此急救最驗之第一方也。及其火氣已退將用下蚌殼燒灰存性碾細末入冰麝少許從邊圍掃如無蚌處用冰片從四面摩起漸及於中亦可。漸瘥。用冰片句原本作如其地有藏冰卽取冰一小塊從圓圈摩起。

重刊補闕冤鑑集證

卷四

急救方

九
四四九

可漸瘥。用冰片句原本作如其地有藏冰卽取冰一小塊從圓圈摩起。凡被湯火切勿以冷水冷物及井下泥尿泥激之其熱氣遇冷則入之愈深輕者攣縮重則直逼火毒攻心而速之死矣。

一法用好杭粉爲細末同婦女所用好頭油調塗之如無或柏子油亦可。

又法用多年陳醬寬寬塗之但愈後有黑瘢塗之如無或柏子油亦可。又用劉寄奴爲末先以糯米漿雞翎掃傷著處後繆藥末竝不痛亦竝無痕大約湯火著急以鹽末繆之護內不壞然後用藥敷之至妙。

陳醬寬塗救法

劉寄奴救法

油粉調塗救法



蚌漿救法

大黃救法

又用生大黃以米醋調敷。二日即愈。

原本湯潑受傷條從邊圍掃下尚有斑
未乾時用油絹袋勺篩傷處或竟將蚌漿
久雞翎敷上外以舊絹護之更加採攘粗
數層紮束令緊沁去傷中毒水如覺稍痛仍
用蚌漿蔭入內服甯心敗毒之
劑以除煩無不立愈七十六宗

暬音謁傷暑也中熱也漢書武
帝紀云夏大旱民多渴死

旱年暑天人
多渴死

救中暬

暬死于行路上。旋以刀器掘開一穴入水擣之。

取爛漿以灌死者卽活。

中暬不省人事者與冷水吃卽死。但且急取竈間微熱灰壅之復以稍熱湯蘸手巾熨腹脇間良久甦醒不宜便與冷物喫。

暑月熱倒急扶在陰涼處切不可與冷水飲當以布巾衣服等蘸熱湯覆臍下及氣海間續以湯淋布帛上令徹臍腹但緩則漸甦也。如倉卒無湯處掬道上熟土於臍端以多爲佳。冷則頻換後與解暑毒藥或道塗無湯處卽掬熟土於臍上仍撥開作窩子令眾人旋溺於其中以代熱湯亦可取效。

凡中暑如已迷悶嚼大蒜一大瓣冷水送下。如不能嚼卽用水研灌之立醒。路中倉卒無水渴甚急嚼生蔥二寸許和津同嚥可抵飲水三升。中暑暴死以胡麻一升炒黑攤冷爲末。新汲水

調下。

救凍死

凍死四肢直口噤有微氣者用大鍋炒灰令煖。

袋盛熨心上冷卽換之候目開以溫酒及清粥
稍稍與之若不先溫其心便以火炙則冷氣與
火爭必死

又用氈或藁薦捲之以索繫定放在平穩處令

二人相對踏令滾轉往來如扞氈法候四肢溫

卽活

扞宋本作扞下注
古早切摩展衣也

冬月溺水之人及被凍極之人雖纖毫人事不知但胸前有微溫皆可救倘或微笑必爲急掩其口鼻如不掩則笑而不止不可救矣切不可驟令近火但一見火則必大笑不可救藥

重刊補註洗冤鑑證

卷四

急救方

主

凡凍死已經救活者宜用生薑帶皮搗碎陳皮搗碎用
水三碗煎一碗溫服

原本生薑陳皮各一
碗半

救斃

斃不得用燈火照并不得近前急喚但痛咬其足跟及足大拇指頻頻呼其名及唾其面再灌以薑湯必活

斃不醒者移動些小臥處徐徐喚之卽醒夜間斃者原有燈卽存燈無燈者不可用燈照又用筆管吹兩耳及取病人頭髮二七莖撲繩刺入鼻中○又鹽湯灌之

救卒死者亦用皂角法

又灸兩足大拇指趾聚毛中三七壯聚毛乃脚趾向上生毛處

如豆許宋本作如大豆許

又方。皂角末如豆許吹兩鼻內得嚏則氣通三

四日者尚可救。

如豆許宋本作如大豆許

又方。皂角末如豆許吹兩鼻內得嚏則氣通三

救中惡

此與麁死均不可用火照但痛咬脚跟卽甦

此與中藥毒及河鰐毒均須急取鴨熱血灌救下喉

凡中惡客忤猝死者或先病及睡臥間忽然而絕皆是中惡也。用韭黃心於男左女右鼻內刺入六七寸。令目開血出。卽活。

視上脣內沿有如粟米粒以針挑破。

重刊補註冤蠶證

卷四 急救方

四之三

又用皂角或生半夏末如大豆許吹入兩鼻。又用羊屎燒烟薰鼻中。又縣浸好醋半盞手按令汁入鼻中及捉其兩手勿令驚。須臾卽活。

又灸臍中百壯。鼻中吹皂角末或研韭汁灌耳中。

又用生菖蒲研取汁一盞灌之。

救驚斃

驚怖死者以溫酒一兩盞灌之。卽活。

救撲打猝死





撲打量倒在
地者用血管

鵝毛煅存性
一錢乳杏沒

藥百草霜各
一錢共爲末

老酒調服卽
醒

凡救五絕之
法急於人中

穴及兩足大
指甲離一韭

菜葉各灸三
五壯卽活

凡跌打損傷
者用男女尿

桶人中白煉
紅投好醋七

次研末已死
者勿移動將

藥末二錢好
酒送下吐出

惡血卽可救
矣但移動者

不治又方用活蟹
搗爛熱酒沖

服極醉一夜
卽安

原書急令親人
下有或密友三
字先拳其兩

手兩足作先拳
其兩足東其兩
手少頃二字

氣下有扶坐少
頃然後緩呼之
九字

原書益上有茶字無下得喉去
便好之句

五絕及撲打猝死等。但須心頭溫煖雖經日亦可救。先將死人盤屈在地下。如僧打坐狀。令人將死人頭髮控放低。用生半夏末以竹筒或紙筒筆管吹在鼻內。如活卽以生薑自然汁灌之。可解半夏毒。五絕者謂產魅縊屬治法單用半夏一味○生薑自然汁用不用水者是。

生薑搗爛取汁

卒暴墮擗築倒及鬼魘死。若肉未冷急以酒調蘇合香丸灌入口。若下喉去可活。

救跌壓傷

凡跌壓重之人。口耳出血。一時昏暈。但視面

糞利補註冤錄集證

卷四

急救方

十四

色尙有生氣。身體尙爲鬆軟。則皆可救。但不可多人環繞嘈雜驚慌。致令驚魂不復。急令親人呼而扶之。坐於地上。先拳其兩手兩足緊爲抱定。少頃再輕移於相呼之人懷中。以膝抵其穀道。不令洩氣。若稍有知覺。卽移於素所寢處。將室內窗櫺遮閉令暗。仍拳手足緊抱不可令臥。急取童便乘熱灌之。馬溺更妙。如一時不可得。卽人溺亦可要去其頭尾。但須未食蔥蒜而清利者。強灌一二盃。下得喉去便好。一面用四物湯照原方加三四倍。再入桃仁去皮尖及好紅

原書洩氣下有惟預備淨桶伺之八字

原書令睡下作如前劑飲之卽服至三四劑亦不妨至所下盡爲糞卽停止

花各一兩全當歸及南山楂搗碎各二兩生大黃二兩童便一大鍾如係夏月加黃連四五分多用急流水卽在旁用急火煎半熱傾入碗內承於傷者鼻下使藥氣透入腹內則不致入口惡逆乘熱用小鍾強令頓服如其不受則姑緩少刻又進只要陸續灌盡不可使臥服藥之後其穀道尤須用力抵緊不可令其洩氣如藥已行動非至緊不可卽解恐其氣從下洩以致不能救也必候腹中動而有聲上下往來數遍急不能待方可翼之以解所下盡屬淤紫毒已解半

重刊補註洗冤錄集證

卷四

急救方

五

方可令睡至所下盡爲糞卽停止前藥否則再用一二劑亦不碍然後次第調理不可輕用補藥。

藥

四物湯

當歸

一錢

川芎

七分

熟地黃

三錢

炒白芍

一錢

治蛇蟲傷

毒蛇能斃人惟急以利刀割去所嚙之死肉可以漸解。蛇傷蟲咬倉卒無藥以大藍汁一碗雄黃末二

錢調勻點在所傷處。併令細細服其汁。如無藍以靛花青黛代之。

原本作急則
以水代之

虺蝮傷人。其毒內攻卽死。立將傷處用繩絹紮定。勿使毒入心腹。令人口含米醋。或燒酒。吮傷以吸拔其毒。隨吮隨吐。隨換酒醋再吮。俟紅淡腫消爲度。吮者不可誤嚥中毒。又急飲麻油一二盞。護心解毒。以薑末敷之。

被蝮嚼死。用香白芷一味。以麥冬湯調服。急以水代之。飲之卽活。

又方。用五靈脂一兩。雄黃五錢。以酒調灌。每服

毒補洗冤鑑證

卷四

急救方

二錢。再以滓塗咬處。

續輯

蛇咬。白芷末一兩煎服。外用白芷末加膽礬少許。日日摻之。蓋白芷末加所畏也。○又蛇遺水。悞飲腹中必生制土。虺蛇咬急拔去頭心。紅髮一根。用何首烏搗汁冲酒服。其渣敷咬處。疼立止。○解毒蛋方。雞蛋三個敲破頭合在蛇咬之處。驟蛋內咯咯有聲。變黑色。再換一個合之。俟變黃白色。不甚黑。再換一個合之。自愈。凡蛇蠍蜈蚣傷。俱治極妙。仙方。○蝎咬。用銀硃雞蛋清調敷。又方。蝎牛搗能食蝎也。

治癲狗傷

用防風獨莖
七星者一兩天南
次一兩共泡
爲末每服一錢
白湯下半服
日再進一服
汗即愈

乘毒未發。用斑貓七個。去頭足翅淨。用雞蛋二枚同蒸。去斑貓淡食雞蛋於小便內取下血塊。痛脹不解。則血塊未淨。仍再食血塊盡乃止。又方。用斑貓同米炒。俟米老黃。去斑貓將米研末。蒸雞蛋。食如前法。血塊下盡爲度。

又法。受咬後。立至溪河。將傷處洗擠血淨盡。多飲生薑汁。則毒可解。仍封紮瘡口。勿使受風。

救服毒中毒方

解砒毒

中砒毒心癢痛欲吐面青肢用陽風四解煎湯飲之
方桐樹葉燒沖生白飲之卽解
方楊梅樹煎湯二三飲之卽愈
方用紫蝴蝶灌下立解
中砒霜毒急取熟鴨血灌之立解又糞青灌之亦解
重一塊用井水於石上磨出黑汁旋磨旋灌盡則愈卽先吐出之後亦宜再用鉛水服之以盡餘毒方無後患

砒霜服下未久者。取雞蛋一二十箇。打入碗內攬勻。入明礬末三錢灌之。吐則再灌。吐盡便愈。但服久。砒已入腹。則不能吐出。急用黑鉛四兩重一塊。用井水於石上磨出黑汁。旋磨旋灌。盡則愈。卽先吐出之後。亦宜再用鉛水服之。以盡餘毒。方無後患。

中砒霜毒。急取熟鴨血灌之。立解。又糞青灌之。亦解。

又方。以豆豉濃煎湯飲之。可解。

又用甘草汁。同藍汁飲之。卽愈。

又用熟豆腐漿灌之。亦愈。

又方。以豆豉濃煎湯飲之。可解。
又用甘草汁。同藍汁飲之。卽愈。
又用熟豆腐漿灌之。亦愈。
解巴豆毒
中巴豆毒痢不止。以大豆一升。煮汁飲之。
又巴豆畏大黃。黃連。蘆筍。蒜筍。藜蘆。各煎冷服。
皆能止泄。

解巴豆毒。中巴豆毒，痢不止，以大豆一升，煮汁飲之。又巴豆畏大黃、黃連、蘆筍、蒜筍、藜蘆，各煎冷服，皆能止泄。又用芭蕉葉搗自然汁服之，卽止。

黑豆汁可解。○又方。用枯蓮房殼。帶蒂梗陰乾。莽草以黑豆汁澆其根卽

原書飲之下有
豆亦可四字

又方用防風四
兩涼水泡濕搗
汁一大碗灌下
卽解應效如神

咬咀煎水二三碗灌之。如無用荷葉中心蒂或用藕節煎湯一碗溫冷灌之。毒即散。

解貳茗毒

用甘草汁或藍青汁飲之卽愈。若服藥卽劇。

解苦杏仁毒

用杏樹皮煎湯飲之雖迷亂將死者亦可救。

解斑貓羌青毒

荒音官

用豬膏大豆汁。戎鹽藍汁。服之。或用鹽湯煮豬膏巴豆飲之。又或用大小黑豆汁服之。並瘥。用肥皂水灌下。再以鵝翎絞喉數次。令吐卽活。

重刊補註洗冤錄證

卷四

救服毒中

十九
四之十九

又方。用生雞鴨卵。開孔灌入口中。連灌五六枚。得吐卽活。倘閉。以箸抉開灌入。

治菌毒

四明溫台間山谷多產菌。然種類不一。食之間有中毒。往往至殺人。蓋蛇虺毒氣所薰蒸也。有僧教掘地以冷水攬之。令濁少頃取飲皆得全活。其方自見本草。楓樹菌食之笑不止。俗言笑菌居山間。不可不知此法也。

解胡蔓草毒

中胡蔓草毒。將糞汁灌之可解。或飲浸草毒水。

凡菌蕈如夜中有光者欲爛無蟲者煮不熟者煮汁照人無影者上有毛下無紋者仰卷赤色者俱毒殺人飲以地漿及糞汁可解冬瓜蔓汁解之或苦菜白之解鈎吻毒亦備咽



宋本可救下有少遲無可救者
六字

用此法

百竅潰血急取抱卵不出之雞蛋研細和麻油開口灌之吐出可救宋本將字下有大字或飲句作或以嫩葉心浸水涓滴入口

治菌毒亦用此法

誤食蕈至吐卽採生金銀花嚼之可解。

解毒蕈

用飴糖黑豆冷水解之。

解射罔毒

用甘草汁或小豆葉浮萍薺荳汁冷水解之。又名甜桔梗河南人呼爲杏葉沙參能解百藥毒

解輕粉毒

重刊補註冤蠻譜

卷四

救服毒中藥方

三
四之三十

用黑鉛五觔打壺一把盛燒酒十五觔納土茯苓半觔乳香三錢封固重湯煮一日夜埋土中出火毒每日早晚任飲數盃溺時以瓦盆接之當有粉出服至筋骨不痛乃已○冰片毒飲以新汲冷水可解。

救服滷

服鹽滷將常用擦桌布洗水灌之使吐卽解。

治吞金

中黃金毒者食鵝鴨肉中白銀毒者以黃連甘草解之又洗金以鹽駱駝驢馬脂餘甘子皆能

服滷垂危用白洋糖四兩湯調灌下卽解

黃豆入水搗汁灌之或生羊血灌之立愈或用生豆腐漿灌之或用生大黃一兩搗碎再用碗同搗數十一用



下服後瀉數遍俱效

又食金銀器者用陳大麥去芒刺
炒研作粉黃糖少許日食三次每
服一盞四日卽解下

柔金羊脂穫子皆能柔銀吞金銀入腹中當服
食前品柔則易出。

又服金者用真輕粉細研水調下能令金從大
便出。

解藥蠶金石毒

治一切藥。毒。蠶。金。石。毒。用石蟹以熱水磨服。

解水銀入耳

以黃金枕耳邊自出若水銀入肉令人筋攣以
金物熨之水銀乃出蝕金其病卽瘥。

解煤薰毒

重刊補註洗冤錄集證

卷四

救服毒中毒方

主

飲冷水可解或蘿蔔搗汁灌口鼻移向風吹便
能醒。

解飲餌毒

凡中飲餌毒不知何物卽煎甘草薺莧湯飲之。
便治。

附解斷腸草方

先用鴨蛋三個將服毒人扶正擺開牙
關剝開蛋殼成個灌下三個待蛋入胃
裏住毒草次用豬膏溶化溫和灌下
飯碗後又用黃豆一小升等雞一隻不
論雌雄連毛帶腸同豆搗爛用清水
其毒卽吐如不吐卽用芋苗探喉或用
女人頭髮髮子探喉鵝翎亦可毒吐卽
灌之卽解

薺莧又名甜桔梗河南人呼爲胡蔓草亦
參飲酒中毒經日不醒者用黑豆一升煮
取汁溫服一小杯不過三次卽愈

斷腸草卽野葛一名鈎吻江西謂之黃藤廣人呼爲茶葉中其毒者用蕹菜汁亦
灌之卽解

愈其毒在胃者可治入腸者難治

增救吞鴉片煙法

○凡服鴉片煙者輕則心

微煩或鴿血或糞汁或醬油或涼水灌之吐出鴉片煙卽愈或用白礬雄黃研末清水調灌亦效又廣東有草名雄黃解崩碗草者取鉗搗自然汁灌之尤妙若肢體柔軟則臟腑筋絡之氣尙在流竚若服多毒重則身冷氣絕似乎已死又將通其實未死也乃鴉片烈性醉迷之故耳其人放在潮濕陰地用筷撬開牙齒頻灌之更妙外用以竹筷一枝橫放口內令口常開以水在一盆將頭髮散放水盆內漂之又可見太陽一被日照卽活但身不僵三之四切用以

者不活

嘗聞老年乍作說檢服鴉片屍骨少者居多側者亦嘗嘗有之平仰則真死矣故其骨殖不伏卽側實服鴉片可救之確証也○道光七年間粵東省有吳姓者寄居客店八人往殮知此人有親屬至而此人在三水地方不敢收窮已計死三日四夜



治蠱毒用芫
升根搗汁半
立下和酒飲之

原本皮根作根皮 飲之
不下卽吐蟲

泉州一僧能治金蠍蠍毒如中毒者先以白礬卽濃煎石榴皮根飲之下卽吐出蟲皆活無不愈者李晦之云凡中毒以白礬芽茶搗爲末冷水飲之卽愈

保靈丹

治蠱毒諸毒

大山豆根

半兩

雄黃

硃砂

淨細研一兩

黃藥子

黃丹

麝香

原本雄黃
藥子黃丹麝香各二錢半

毒利補號冤鑑證

卷四

治蠱毒及金蠍蠍

川巴豆

肥者取肉不去油

糯米

半生半炒

續隨子

生杵末二錢半

赤蜈蚣

生一條一炙

原本須臾下有病人自覺心頭
如拽斷皮條聲將次十四字
毒物下句有或自口出或大便
出嫩出血老則成齧或蟻蟲諸
雜帶命之物二十四字

治諸蠍毒用鰻鱺魚乾未空心服之魚或燒炙令香食之其魚有五色文者佳

誌云嶺南俚人解蠍毒畏人知其方乃詭言三百頭牛藥或云三百兩銀藥久與親朋始得其實所云三百頭牛藥者土常山也三百兩銀藥者馬兜鈴也俱用水煎服



即福蹤清縣有訟遭金蠶毒者。縣令治之不得
身有刺如粟房蓋即山中之刺鼠也。金蠶類遍
畏蠶入其家金蠶不敢動。雖匿榻下牆
蠶盡爲兩刺擒出之。

附解蠶毒方

蠶毒在上則服升麻吐之。在腹則服下
金下之或合升麻鬱金服之。不止則
見廣東通志九十八卷。

辟穀方

三神湯

蒼朮

二兩米泔浸
兩宿焙乾

白朮半兩

甘草

半兩
炙

右爲細末。每服二錢。入鹽少許。點白湯服。

辟穀丹能辟穀氣。

麝香

少許

細辛

半兩

甘松

一兩

川芎

二兩

右爲細末。蜜圓如彈子大。久簪爲妙。每用一圓燒之。

蘇合丸每一丸含化。尤能辟惡。

犀角尖

丁香

香附

重刊補註洗冤錄集證

卷四

辟穀方

安息香

明天麻

沉香

白术

檀香

木香

畢撥

硃砂

荳子肉

白豆蔻肉

麝香

蘇合油

台烏

各二兩

大片腦

乳香

各二兩
或一兩

黃蠟

三十斤

蜜

六斤或

金箔

一百片

右藥一十八味。各取淨末。煉蜜搗和爲丸。金箔爲衣。用蠟作丸裹之。或不用蜜丸。別以糯米糊搗和印成香佩亦妙。

重刊補註洗冤錄集證卷四終



