

醫宗金鑑

卷八

新北京廣益書店刊行

刷印日十月五年十德康……………

刷印

行發日十三月七年十德康……………

行發

<p>書名…………… 醫宗金鑑</p>	<p>定價…………… (全八冊)國幣二十二圓</p>	<p>主編者…………… 新京西三馬路六六ノ一 政 修</p>	<p>發行者…………… 新京西三馬路六六ノ一 車 鵬 程</p>	<p>印刷所…………… 新京東三馬路二三ノ三 廣 益 書 店 工 場</p>	<p>發行所…………… 新京西三馬路六六ノ一 廣 益 書 店</p>	<p>總發行所…………… 新京東三馬路一七〇ノ一 滿洲書籍配給株式會社 長春營業所</p>
--------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	---

<p>監修人</p>	<p>宋 毅</p>	<p>校正人</p>	<p>程 石</p>
------------	------------	------------	------------

御纂醫宗金鑑卷七

編輯外科心法要訣



腹部

幽癰

幽癰臍上七寸生。初小漸大腫硬疼。憂思厚味火毒發。咬牙寒戰毒名攻。
 (註)此證生臍上七寸。初起如粟。漸增漫腫空痛。形如鵝卵。甚則堅硬。痛索胸肋。由胃食膏粱厚味。憂思鬱結。腸胃不通。火鬱成毒。自內而外發也。初起時痛。皮色未紅。時若心煩嘔。脈沉實者。當速火毒。以絕其源。宜內疎黃連湯服之。焮腫痛甚。宜服託裏散。外用艾其臍上灸之。脈沉沉遲。其膿未成。用補中益氣湯託之。脈

見洪數。其膿已成。用託裏透膿湯膿熟脹痛不潰。係氣血虛也。急用十全大補湯溫補之外兼用臥鍼開。臥鍼者斜入斜出。防傷內膜也。或誤行汗下。或誤敷寒涼。以致腫而不潰。潰而不斂者。急用十全大補湯。加乾薑附子以救之。已潰潮寒暮熱者。氣血虛也。食少作瀉脾胃虛也。胸痞痿滯脾肺虛也。俱服六君子湯。服後諸證悉退。換十全大補湯調理即愈。外治之法。按癰疽腫瘍潰瘍門。無論已潰未潰。忽咬牙寒戰。係氣虛不能勝毒。毒陷攻裏之兆。或潰後膿水忽多忽少。瘡口如解吐沫者。係內膜已透。俱為逆證。

托裏散 皂刺 金銀花 黃芩 牡蠣煨 當歸 赤芍 朴硝 大黃

花粉 連翹 各等分 去心

共研粗末。每用五錢。酒水各一鍾。煎八分。去渣服。

〔方歌〕託裏散醫諸瘡毒。腫甚焮疼煎服消。皂刺銀花芩牡蠣。歸芍硝黃花粉飄。

內疎黃連湯 見腫瘍門 隔蒜灸法 見首部灸法 托裏透膿 見頭部侵腦疽

補中益氣湯 十全大補湯 六君子湯 即香砂六君子湯減去藿香砂仁俱見潰瘍門

中脘疽圖



中脘疽

中脘疽由胃火生。臍上四寸隱隱疼。堅硬漫腫無紅熱。不食嘔噦毒內攻。(註)此證一名胃疽。發於心胸之下。臍上四寸。任脈經中脘穴。隱痛日久。向外生疽。堅硬漫腫。皮色無紅無熱。由過食炙搏。以致胃腑火毒而成。人迎脈盛。是毒氣攻裏。作嘔不食。欬嗽膿痰者逆。初宜服仙方活命飲。色紫堅硬。宜服山甲內消散。膿勢將成。內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。若起長膿遲。或瘡不嫩痛者。急用艾莊隔獨頭蒜片。置患上灸之回陽。

山甲內消散

穿山甲三大片炒

當歸尾

大黃

甘草節各三錢

土木鼈三個 黑牽牛

僵蠶各一錢炒

錢炒

酒水各一鍾。煎八分。空心服。渣再煎服。大便行三四次。方食稀粥淡味調理。
（方歌）山甲內消火毒積。色紫堅疹中腕疽。歸尾大黃殭草節。木鼈牽牛力酒宜。

仙方活命飲見腫瘍門



麻癰

麻癰七情鬱火成。臍上三寸粟微紅。暴腫焮痛二七潰。頂陷色黑潰遲凶。（註）此證由七情鬱火。凝結而成。生臍上三寸。屬件脈經建里穴。初如粟米。癢痛相兼其腫迅速。寒熱往來。甚則嘔噦。牽引臍痛初腫微紅。頂尖浪東。漸透赤色。時痛時止。十四日潰膿者順。若頂陷紫黑。銀脚漫腫。面赤大渴。脈見浮數而數大者逆。內治與外治參考。外治法按癰疽腫瘍潰瘍門。

衝疽圖



衝疽

衝疽臍上三寸生。心火毒熾入腎經。高腫焮痛連潰言。若見七惡定然凶。(註)此證生於任脈。臍上二寸下
 皖穴。一名中發疽。又名紫腎瘡。由心火熾盛流入腎經而成。色赤高腫。應在二十一日潰破。膿稠受補者
 順。初宜瘡科流氣飲。或仙方活命飲消之。膿將成時。內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。其證若平塌紫黑。
 膿水清稀。七惡證見者逆。

瘡科流氣散

見背部
 痰注發

仙方活命飲

見腫瘍門

臍癰圖



臍癰三任肝經

臍癰附臍中出水

臍癰毒發在臍中。腫大如瓜。突若鈴。無紅無熱。宜蒜灸。稠膿爲吉。污水凶。(註)此證由心經火毒。流入大腸。小腸所致。生於臍中。屬任脈經神闕穴。此穴禁鍼。腫大如瓜。高突若鈴。無紅無熱。最宜隔蒜灸之。初宜服仙方活命飲。加升麻消之。便結實者。內疎黃蘗湯通利之。將欲成膿。內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。潰後得稠膿者。順時出污水。臭穢者。亦宜臍中不痛。不腫。其瘻。時津黃水。此屬腸胃濕熱積久。宜服黃連平胃散。外用三妙散。乾撒。溼即愈。當忌酒麵。生冷。辛辣。不致再發。若水出不止者。亦屬逆。

黃連平胃散

黃連五錢

陳皮

厚朴各三錢

薑炒

甘草二錢

生

蒼朮一兩

炒

共研細末。每服三錢。

(方歌) 黃連下胃散陳甘。厚朴蒼朮共細研。專除濕熱兼消積。能令暗火立時乾。

三妙散

檳榔

蒼朮生

黃蘗各等分生

共研細末。乾撒肚臍。出水津淫成片。止瘡滲濕。又治濕癬。以蘇合油調搽甚效。

(方歌) 三妙散用檳榔蒼。黃蘗同研滲濕瘡。蘇合油調治濕癬。收乾止瘡效稱強。

隔蒜灸法

見首卷灸法

仙方活命飲

內疎黃連湯

俱見腫瘍門

少腹疽圖



少腹疽

少腹疽

御纂醫宗金鑑 卷七

少腹疽生臍下邊。證由七情火鬱。高腫紅疼牽背易。漫硬陷腐水膿難。(註)此證由七情火鬱而生。每發於氣海丹田關元三穴。氣海在臍下一寸五分。丹田在臍下二寸。關元在臍下三寸。皆屬任脈經。此三穴或穴發腫。即為少腹疽。高腫紅活。疼痛牽背。易潰稠膿者易治。若漫腫堅硬。綿爛腐爛。膿稀如水者難治。凡遇此證初起。急用艾灸腫頂。七壯至三七壯。以痛癢通徹為度。宜服仙方活命飲。氣實之人。大湯便效者。宜服內疎黃連湯通利之。老弱之人。宜服內補十宣散。令其速潰。若潰遲恐透內膜。外治法。同癰疽疔瘍潰瘍門。

仙方活命飲

內疎黃連湯俱見腫瘍門

內補十宣散

見胸部疽癰

腹皮癰圖



腹皮癰

腹皮癰生腹皮內。皮裏膜外腫隱疼。腹痛不止膿成候。證由營滯鬱火生。(註)此證生於腹皮裏膜外。無命

左右。隱疼日久。後發癰腫於皮外。右關脈見沉數而腹痛甚者。是其候也。由膏粱火鬱而成。初起壯實者。用雙解貴金丸下之。虛弱者減半。用之不應。再服半劑。凡下之後。腹痛不止。膿將成也。急用託裏透膿湯。潰後與癰疽潰瘍門治法相同。不可適用尅伐之劑。若香圓清散。過傷胃氣。則腫不能潰。潰不能斂。立見危亡矣。

雙解貴金丸

見腫瘍門

託裏透膿湯

見頭部侵腦疽

緩疽圖



緩疽在少腹之旁

緩疽

緩疽脾經氣積滯。少腹旁生堅又疼。數月不潰生寒熱。食少削瘦效難成。(註)此證由太陰脾經。氣滯寒積而成。生於少腹之旁。堅硬如石。不紅不熱。痛引腰腿。數月不潰。若兼食少削瘦者終屬敗證。但不可棄而不治。初宜服山甲內消散。不應不可強消。徒損胃氣。以十全大補湯加烏藥附子胡盧巴溫補之。外用木香餅

敷之。兼用獨頭蒜搗爛。鋪於患上艾壯灸之。以知熱爲止。次日再灸。以或消或潰爲效。若潰後即按癰疽疔毒
癰門治法。

山甲內消散見中
腕疽

十全大補湯見潰
癰門

木香餅見乳部乳
中結核

腋癰圖



腋癰在腋窩中左右皆同

腋部

腋癰

腋癰暴腫生腋間。腫硬焮赤痛熱寒。肝脾血熱兼忿怒。初宜清解潰補瘡。(註) 此證一名夾肢癰。發於腋際。即俗名腋窩窩也。屬肝脾血熱。兼忿怒而成。初起暴腫焮硬。色赤疼痛。身發寒熱。難消必欲作膿。初宜服柴胡清肝湯。外敷沖和膏。疼痛日增。宜服透膿散。加金銀花甘草節桔梗。膿脹痛者鍼之。已潰內外治法。俱按癰疽潰瘍門。此證首尾忌用寒涼。中年易愈。老弱之人難瘳。

柴胡清肝湯見頭部 冲和膏

髮疽

透膈膿俱見腫瘍門

腋疽圖



腋疽生在腋肢窩居中堅破潰厚存石疔

腋疽

腋疽初起若核形。肝志脾憂氣血凝。漫腫堅硬宜蒜灸。日久紅熱潰先疼（註）此證一名米疽。又名灸疽。發於肘腋窩正中。初起之時。其形如核。由肝脾二經憂思悲怒。氣結血滯而成。漫腫堅硬。皮色如常。日久將潰。色紅微熱疼痛也。切宜艾壯隔蒜片灸法。內服柴胡清肝湯。加烏藥消之。虛弱之人。宜服香貝養榮湯。外用烏龍膏敷之。早治或有全消者。遲則膿成。宜服託裏透膿湯。膿脹痛者。鍼之膿出。痛減。隨患者虛實補之。其餘內外治法。俱按癰疽潰瘍門。此證初終內外治法。禁用寒涼。中年易愈。衰老難痊。

隔蒜灸法見首卷

灸法

柴胡清肝湯見頭部

髮疽

香貝養榮湯見頭部

上石疽

烏龍膏見腫瘍門

肋部

肋疽

肋疽圖



肋疽初起時覺骨節酸疼白如蠟大如豆

肋疽始發屬肝經。火毒鬱結腫形。紫痛梅李甚如蠶。急宜鍼灸免內攻。(註)此證一名夾焚疽。生於肋條骨間。由肝經火毒。鬱結聚而成。初如梅李。漸大如蠶。色紫焮痛。連及肩肘。患在左痛牽右肋。患在右痛牽左肋。二十一日之內。膿潰稠黏者順。屆期不潰。既潰出清水者逆。初腫急宜磁鍼。出紫血。庶免毒氣攻裏。後赤腫痛甚。煩躁脈實作嘔。為有餘之證。宜服雙解貴金丹下之。腫硬不潰。宜服透膿散。脈弱作嘔。此胃虛也。宜服香砂六君子湯補之。亦有痛傷胃氣而作嘔者。即同胃虛治之。若感受寒邪。及偶觸穢氣而作嘔者。雖腫時宜壯胃助氣為主。蓋腫時作嘔。因毒氣內侵者十有一二。停飲內傷者十有八九。惟醫人臨證詳辨之。膿熱用臥鍼圍之。餘按癰疽潰瘍門治法。

雙解貴金丸

透膿散

俱見腫瘍門

香砂六君子湯

見潰瘍門

淵疽圖



淵疽

淵疽肝膽憂恚成。生於肋下硬腫疼。潰破有聲內膜透。(註)此證因憂恚太過。以致肝膽兩傷而成。生於肋下。初起堅硬。腫而不紅。日久方潰。得稠白膿者順。如豆漿水者險。瘡口有聲。似乎兒啼。此屬內膜透也。即於陽陵泉穴灸二七壯。其聲即止。穴在膝臑骨外廉下一寸陷中。蹲坐取之即得。內外治法。皆同肋疽。凡肋胸脅腰腹空軀之處發癰疽者。當在將潰未潰之際。多服護膜散。可免透膜之患。

護膜散

白蠟

白及各等分

共研細末。輕劑一錢。中劑二錢。大劑三錢。黃酒調服米湯亦可。

(方歌) 護膜散內二味藥。白蠟白及爲細末。或酒或以米湯調。將膜預服不透膜。

內發丹毒圖



內發丹毒發於肋骨及腰膝白赤如霞疔走如雲

內發丹毒

丹毒肝脾熱極生。肋上腰膝赤霞形。急宜促出紫黑血。嘔噦昏脹毒內攻。(註)此證由肝脾二經。熱極生風所致。生於肋骨。延及腰膝。色赤如霞。遊走如雲。痛如火燎。急向赤腫週圍。促出紫黑血。以瘦牛肉片貼之。羊肉片亦可。其毒即可減半。初服雙解貴金丸汗之。次服化斑解毒湯。投方應病者順。若嘔噦昏潰。胸腹脹。遍身青紫者。則爲毒氣內攻屬逆。

化斑解毒湯 升麻 石膏 連翹去心 牛蒡子炒研 人中黃

黃連 知母 黑參各一錢

竹葉二十片。水二鍾。煎八分服。

(方歌) 化斑解毒熱生風。致發丹毒雲片紅。升膏翅夢中黃寧。黃連知母黑參同。

雙解貴金丸見腫瘍門

脇癰圖



癰腫在肋骨下軟肉裏

脇癰 (附疽)

脇癰焮紅高腫疼。疽堅塌漫冷不紅。皆屬肝膽怒火結。遲潰敗漿冷虛凶。(註) 此證生於軟肋。有硬骨者為

肋。肋下軟肉處為季脇。癰疽二證。皆由肝膽怒火。凝結而成。多生於體虛之人。初如梅李。漸長如盃如

盆。色紅焮痛高腫。二七潰破膿稠為癰。若堅硬平塌。漫腫不痛。不紅不熱。月餘潰破稀腫為疽。若失治。

屆期不潰。攻擊成膿。腫如鼓脹。發出敗漿。腥臭膿者逆。癰疽二證。初腫時俱宜急服柴胡清肝湯解鬱瀉

火。如已成者。服託裏透膿湯。膿熱脹痛。俱用臥鍼開之。已潰以排餘膿補氣血為要。餘按癰疽費梅門治

柴胡清肝湯
見頭部
鬚疽

託裏透膿湯
見頭部
鬚疽

五臟六腑



內癰部

肺癰

肺癰肺熱復傷風。肺臟生癰隱胸痛。非若傷寒聲欬甚。稠濁痰涎腥臭膿。未潰射干麻黃汁。壅不得臥葶藶攻。潰後膿稠能食吉。膿清兼血不食凶。(註)此證係肺藏蓄熱。復傷風邪。鬱久成癰。以致胸內中府穴隱隱疼痛。振寒脈數。狀類傷寒。咽燥不渴。欬而喘滿。唾稠黏黃痰。兼臭穢膿血也。治之者於未潰時。乘膿未成。風鬱於表者。法宜疎散。用射干麻黃湯以汗之。如氣壅喘滿。身不得臥者。急服葶藶大棗湯以瀉之。如欬有微熱。煩滿。胸中甲錯。膿欲成者。宜千金葦莖湯以吐之。若吐膿腥臭。形如米粥者。宜桔梗湯以排餘膿。若吐膿腥臭。欬而胸滿者。宜外臺桔梗白散。以開瘀塞。若咯吐膿血。兼午後身熱煩躁。宜金鯉湯以排之。兼飲童便。若潰後胸膈脇肋。隱痛不止。口燥咽乾。煩悶多渴。自汗盜汗。眠臥不得。欬吐稠痰腥臭。此係癰膿不盡。而兼裏虛。宜寧肺桔梗湯主之。若癰膿已潰。喘滿腥臭。濁痰俱退。惟欬軟咽乾。咯吐痰



血。胸肋微痛。不能久臥者。此屬肺經虛處未斂。宜紫苑茸湯清補之。渴甚去半夏加石膏服之。若癰膿潰後。欬嗽無休。膿痰不盡。形氣虛羸者。宜清金寧肺丸主之。凡治此證。惟以身溫脈細。膿血交粘。痰色鮮明。飲食甘美。膿血漸止。便潤者爲言。若手掌皮粗。潰後六脈洪數。氣急額紅。污膿白血。懶食及大便結燥者爲凶。中府穴又名肺募。在乳上第三根肋骨間。

射干麻黃湯

射干十三枚 麻黃

或三兩

生薑各四兩 細辛

紫苑

款冬花各三兩

兩

大棗七枚 五味子

半夏各半升洗

水煎溫服

〔方歌〕射干麻黃欬上氣。肺癰喉中水雞聲。射麻生薑辛苑夏。五味大棗並款冬。

葶藶大棗湯

苦葶藶輕者五錢重者一兩

大棗輕者五枚重者十枚去核

以水三鍾。煎至一鍾服之。

〔方歌〕葶藶大棗治肺癰。欬不得臥有癰膿。葶藶苦寒瀉實熱。佐棗之甘和胃經。

千金葶藶湯

葶藶二升 薏苡仁炒

瓜瓣各半升即冬瓜仁

桃仁五十粒去皮尖炒研

水煎服。

〔方歌〕千金葦葉肺癰效。微熱煩滿吐敗濁。皮膚甲錯宜葦葉。慈黃桃仁瓜瓣合。

桔梗湯

苦桔梗一兩

甘草二兩

生

水煎服。

〔方歌〕桔梗湯用排除膿。肺癰吐膿米粥形。清熱解毒須甘草。開提肺氣桔梗功。

外臺桔梗白散

苦桔梗

貝母各三

巴豆一分

去皮
熬研如脂

右三味爲散。強人飲服半錢匕。羸者減之。病在膈上者吐膿。在膈下者瀉出。若下多不止。飲冷水一盃而定。

〔方歌〕外臺桔梗白散方。肺癰便秘服之良。桔梗貝母與巴豆。藥微力大功速強。

金鯉湯

金色活鯉魚

一尾約
四兩重

貝母二錢

先將鯉魚連鱗。剖去肚腸。勿經水氣。用貝母細末。摻在魚肚內。綿紮之。用上白童子便半大盞。將魚置童便內。重湯炖煮。魚眼突出爲度。少頃取出。去鱗骨。取淨肉浸入童便內。炖熟。肉與童便作一二次。一日食盡一枚。其功效甚捷。

〔方歌〕金鯉湯中效罕稀。法同貝母活鯉魚。童便浸魚重湯炖。肺癰煩熱善能醫。

寧肺桔梗湯

苦桔梗

貝母去心

當歸

栝蒌仁研

生黃耆

枳殼炒

甘草節

桑白皮炒

防己

百合去心

薏苡各八分炒

五味子

地骨皮

知母生

杏仁炒研

苦苧藤各五分

水二鍾。薑三斤。煎八分。不拘時服。欬甚倍加百合。

身熱加柴胡黃芩。

大便不利。

加蜜炙大黃一

錢。小水澀滯。加燈心木通。

煩躁痰血加白茅根。

胸痛加人參白芷。

〔方歌〕寧肺桔梗肺癰者。歸萎貝殼甘桑皮。防己百合葶五味。杏仁薏仁地骨宜。

紫苑茸湯

紫苑茸

犀角末

甘草炙

人參各五分

桑葉用經霜者

款冬花

百合去心

杏仁炒研

阿膠便潤炒用便燥生用

貝母去心

半夏製

蒲黃各七分生

引薑三片。水二鍾。煎八分。將犀角末調入。食後服。

〔方歌〕紫苑茸湯參犀角。款冬桑葉杏百合。阿膠甘夏貝蒲黃。專醫肺癰不久臥。

清金寧肺丸

陳皮

白茯苓

苦桔梗

貝母去心

人參

黃芩各五分

麥冬去心

地骨皮

銀柴胡

川芎

白芍炒

胡黃連各六錢 五味子

天冬去心

生地酒浸

熟地搗膏

歸身

白朮各一兩炒

甘草三錢

右爲細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服七十九丸。食遠白滾湯送下。

〔方歌〕清金寧肺丸。陳芥桔貝參二冬。柴苓歸芍黃連草。朮味生熟地骨芍。

大小腸癰

大小腸癰因濕熱。氣滯瘀血注腸中。初服大黃行瘀滯。膿成薏苡牡丹平。〔註〕此二證俱由濕熱氣滯。凝結而成。或努力瘀血。或產後敗瘀。蓄積。流注於大腸小腸之中。初起發營惡風自汗。身皮甲錯。關元天樞穴隱痛。微腫。按之腹內急痛。大腸癰多大便墜腫。小腸癰多小水澀滯。脈俱遲緊。此時癰膿未成。宜大黃湯下之。瘀血利盡。若小水閉澀。仍宜大黃湯加琥珀末木通利之自效。若癰成日久不潰。身皮甲錯。內無結聚。腹急腹痛。身無熱而脈數者。係腸內陰冷。不能爲膿。宜薏苡附子散主之。若脈見洪數。肚臍高突。腹痛脹滿不食。動轉側身。則有水聲。便淋刺痛者。癰膿已成。宜薏苡湯主之。腹濡而痛。少腹急脹。時時下膿者。毒未解也宜丹皮湯治之。如膿從臍出。腹脹不除。飲食減少。面白神勞。此屬氣血俱虛。宜八珍湯加牡丹皮肉桂黃耆五味子斂而補之。患者轉身動作。宜徐緩而勿驚。慎之。如就延日久。因循失治。以致毒攻內藏。腹痛牽陰。腸胃受濕。或致陰器紫黑腐爛。色敗無膿。每流污水。衾幃多臭。煩躁不止。身熱益乾。俱屬逆證。關元穴又名小腸募。在臍下三寸。天樞穴又名大腸募。在臍旁開二寸。

大黃湯 大黃剉炒 牡丹皮 硝石研 芥子 桃仁炒先以湯浸去

右各等分。共剉碎。每用五錢。水二鍾。煎至一鍾。去渣空心溫服。以利下膿血為度。未利再服。

〔方歌〕大黃湯善治腸癰。少腹堅滿膿未成。牡丹皮與大黃炒。芥子逃仁硝石燬。

薏苡附子散 附子二分 敗醬五分 薏苡仁一錢

炮 炒

右為末。每服方寸匕。以水二合煎。頓服。小水當下。三因云。薏苡附子同前敗醬。用一兩一分。每四

錢。水盞半。煎七分。去渣空心服。

〔方歌〕薏苡附子散甲錯。腸癰腹脹痛脈數。附子敗醬薏苡仁。為末水煎空心服。

薏苡湯 薏苡仁 栝萸仁各三 牡丹皮 桃仁各二

錢 錢泥

水二鍾。煎至一鍾。不拘時服。

〔方歌〕薏苡湯治腹水聲。腸癰便淋刺痛疼。牡丹皮共栝萸子。還有桃仁薏苡仁。

丹皮湯 丹皮 栝萸仁各一 桃仁泥 朴硝各二 大黃五錢

錢 錢

水二鍾。煎一鍾。去渣入硝在煎數滾。不拘時服。

〔方歌〕丹皮湯療腸癰證。腹濡而痛時下膿。硝黃丹萸桃仁共。水煎服之有奇功。

八珍湯見潰瘍門

胃癰

胃癰中脘穴腫疼。不效不嘔吐血膿。飲食之毒七情火。候治腸癰大生同。(註)此證初起。中脘穴必隱痛。腫熱如瘡。身皮甲錯。並無欬嗽。咯吐膿血。山飲食之毒。七情之火。熱聚胃口成癰。脈來沉數者。初起清胃射干湯下之。若脈濇滯者瘀血也。宜服丹皮湯下之。脈洪數者。膿成也。赤豆薏苡仁湯排之。體倦氣弱作渴。小水頻數者。肺氣虛也。補中益氣湯。加麥冬五味子補之。其候證生死治法。與大小腸癰同。中脘穴又名胃募。在臍上四寸。

清胃射干湯 射干 升麻 犀角 麥冬去心 元參

大黃 黃芩各一錢 芒硝 梔子 竹葉各五錢

水煎服。

(方歌) 清胃射干湯射干。升麻犀角麥冬全。參芩大黃芒硝等。竹葉山梔胃癰痊。

赤豆薏苡仁湯 赤小豆 薏苡仁 防己 甘草各五分

水二鍾。煎八分。食遠服。

〔方歌〕赤豆薏苡湯最神。甘已赤豆薏苡仁。胃癰膿成脈洪數。二鍾水煎服八分。

丹皮湯見大小腸癰

補中益氣湯見黃腸癰

脾癰

脾癰濕熱瘀血凝。章門穴腫兼隱疼。腹脹喘乾小水短。利下濕瘀補收功。〔註〕此證始發章門穴。必隱疼微腫。由過食生冷。兼濕熱或瘀。血滯滯經而成。令人腹脹。咽乾乾燥。小水短澀。初宜大黃湯。赤豆薏苡仁湯。二方合而用之。以攻滯鬱。二便通利。腹脹全消。宜六君子湯扶脾調理。順逆看法。與胃癰同。章門穴又名脾募。在臍旁開六寸。高上二寸。

大黃湯見大小腸癰

赤豆薏苡仁湯見胃癰

六君子湯即香砂六君子湯去藿香砂仁見潰瘍門

肝癰

肝癰憤鬱氣逆成。期門穴腫更兼疼。臥驚脹滿溺不利。清肝滋腎即成功。〔註〕此證始發期門穴。必隱痛微腫。令人兩肢脹滿。脇痛。側臥則驚。便溺艱難。由憤鬱氣逆而成。初服復元通氣散。次服柴胡清肝湯。痛脹已止。宜服六味地黃丸。脾虛食少。則佐以八珍湯。滋腎補脾。治之取效。禁用溫補鍼灸。期門穴又名肝募。在乳旁一寸半。再直上一寸半。

復元通氣散見腫瘍門

柴胡清肝湯見頭部鬚疔

六味地黃丸見面部雀斑

八珍湯見潰瘍門

心癰

心癰巨闕腫隱疼。酷飲嗜熱火毒成。面赤口渴身作痛。治法陽熱總宜清。(註)此證始發巨闕穴。必隱痛微腫。令人寒熱。身痛頭面色赤。口渴隨飲隨乾。由心火熾盛。更兼酷飲嗜熱而成。宜服涼血飲。酒毒為病者。宜服升麻葛根湯治之。此證甚屬罕有。但治法不可不備。巨闕穴。又名心募。在臍上六寸五分。

涼血飲

木通

瞿麥

荊芥

薄荷

白芷

花粉

甘草

赤芍

麥冬去心

生地

山梔子

車前子

連翹

各等分去心

引用燈心。若潮熱加淡竹葉。水煎溫服。

(方歌)涼血飲善治心癰。要煎荷芷草翹通。赤芍山梔乾生地。車前花粉麥門冬。

升麻葛根湯

山梔

升麻

葛根

白芍

柴胡

黃芩

各一錢

黃連

木通

甘草各五分

水二鍾。煎八分。不拘時服。

(方歌)升麻葛根湯山梔。酒毒心癰黃連宜。柴芍通芩升葛草。水煎溫服不拘時。

腎癰

腫。令人寒熱往來。面白不渴。少腹及肋下瞋脹寒滿。由腎虛不足之人。房勞太過。身形受寒。邪氣自外乘之。初服五積散。加細辛。寒盡痛止。宜用桂附地黃丸調理。京門穴又名腎募。在身側腰中監骨下肋間。

五積散 蒼朮二錢 陳皮 桔梗 川芎 當歸 白芍各一錢

麻黃 枳殼麩炒 桂心 乾薑 厚朴各八分 白芷 半夏製

甘草生 茯苓各四分

引薑一片。水二鍾。煎八分。不拘時服。頭痛惡寒者。加連鬚葱頭三個。蓋臥此汗出甚效。

〔方歌〕五積散蒼殼陳苓。麻黃半桔歸芍芎。芷朴桂心乾薑草。腎癰寒邪服成功。

桂附地黃湯見潰瘍門

三焦癰

三焦癰由濕熱凝。石門穴上腫隱痛。寒結治同腸癰法。內癰俱信膜內生。〔註〕此證始發石門穴。必隱痛微腫。令人寒熱往來。二便秘濕。由濕熱遇寒。凝結而成。治法與大小腸癰同。凡內癰俱係膜內成患。外皮不腐。石門穴又各三焦募。在臍下二寸。

內癰總論

凡人胸腹。有十一募。募者各藏府陰會之所也。靈樞云。發內癰內疽者。其本經募上。肉必浮腫。募中必時隱痛。浮腫爲癰。隱痛爲疽。此即內癰內疽之驗也。茲內癰有治法。內疽無治法何也。蓋內癰內疽。其原無殊。惟在根淺根深之別耳。根淺爲癰。根深爲疽。若臨證用藥。攻補得宜。無不收效。至募有十一。內癰僅九證者何也。蓋膽府形如膜皮。無出無納。汁清氣潔。不生內癰內疽。若夫膀胱如亦如膜皮。中惟水。故古今書籍。並無講及內癰內疽者。是以未敢詳載。雖然中極穴即膀胱募也。今人間有中極穴或浮腫。或隱痛者。所見證候。竟同小腸癰。治法亦當按小腸癰治之可也。俟後之學者留意焉。

驗內癰法

凡遇生內癰之人。與生黃豆五粒。嚼之口中無豆味者。是其候也。

編輯外科心法要訣

肩中疽圖



肩中疽生肩正中左右皆同

乾疽圖



乾疽生在肩前兼左右同

過肩疽圖



肩中疽 乾疽 過肩疽

肩疽癰發正肩中。疽硬黑陷癰腫紅。乾疽肩前過肩後。風濕積熱血瘀凝。(註)此疽生於肩中廉。屬三焦膽二經。紅活高腫。一名疔癰。堅硬平塌。為肩中疽。肩之前廉屬大腸經。名乾疽。一名疔疽。肩之後廉屬小腸經。名過肩疽。瘡勢無論大小。惟在發源之處命名。總由濕熱風邪鬱成。亦有負重瘀血凝結而成。高腫紅活焮熱速潰者順。若平塌堅硬。無紅無熱。潰遲者險。甚則腫痛連及腎脾。口噤寒戰。大痛不食。或兼綿潰便瀉者逆。治法初起有表證者。俱宜荊防敗毒散汗之。有裏證者。內疎黃連湯下之。汗下之後。腫痛不退。膿勢將成。宜用托裏透膿湯。濃熱開之。至於引經之藥。惟在臨證時因經加之。潰後內外治法。俱按癰疽潰

荆防敗毒散
見項部
腦疽

內疎黃連湯
見腫
瘍門

托裏透膿湯
見頭部
侵腦疽

圖疽膠



膠疽在肩之肩下腋之肩外層岐骨縫間左右同

圖毒風肩



肩風毒在肩格骨縫中左右皆同

膠疽 肩風毒

御纂醫宗金鑑 卷八

露疽肩後腋外生。小腸肩貞風火癩。肩風毒生臙端上。大腸肩髃風濕成。(註)露疽生於肩之後。下腋之後外微上。岐骨縫之間。經屬小腸肩貞穴。由風火凝結而成。初起如粟。堅硬腫痛。肩髃拘急不能舉揚。初服荊防敗毒散。便燥實者。服雙解貴金丸雙解之。肩風毒生於肩稍臙上骨尖處。經屬大腸肩髃穴。由邪風深襲骨縫與濕稽留。化熱而成。初起宣腫色赤。大者如桃。小者如杏。痛連肩髃。更兼拘急。初服蠲痛無憂散汗之即消。若腫痛日深。不能盡消者。膿勢將成也。宜服托裏透膿湯。一證潰後內外治法。俱按蠲疽潰瘍門。

蠲痛無憂散

番木鱉香油

當歸酒洗

甘草各二兩生

麻黃三兩

穿山甲陳土炒

川烏黑豆酒煮

草烏薑汁煮

蒼朮米泔水浸炒

半夏各二兩製

威靈仙一兩

各製爲末。共和。勻每服五七分至一錢。無灰酒調服。再飲酒以醉爲度。蓋臥出汗避風。此方加鬧羊花四兩。亦治頭風痛。

(方歌) 蠲痛無憂肩風毒。風襲骨縫與濕癩。番鱉歸草麻黃甲。川芎烏蒼半威靈。

荊防敗毒散

見項部腦疽

雙解貴金丸

見傷門

托裏透膿湯

見頭部侵腦疽

癰疽



癰疽

癰疽肩前腋上生。骨縫開合凹陷中。堅如鵝卵痛入骨。包落血熱氣鬱成。(註)此證生於肩前腋之上。骨縫開合空凹陷。中初起如椒子。漸腫堅硬。大如鵝卵。按之疼痛入骨。膿包絡經血熱氣鬱而成。其證腐爛潰破。出稠膿腫消者順。月餘不潰。既潰出清水腫硬不退者逆。初宜服神授衛生湯。若惡風太過。倍加葱白汗。大服托裏透膿湯。潰遲者十全大補湯。潰後內外治法。俱按癰疽潰瘍門。

神授衛生湯

見腫瘍裏

托裏透膿湯

見腫瘍裏

十全大補湯

見潰瘍門

圖 癰 疔

癰疔在肩三下肘之上週匝漫腫色赤裏小兼俱在左右屬同



圖 疔 疔

疔疔在左右屬不同廣外兼俱可以生



臍部自肩至肘曰臍

臍癰附藕包毒

臍癰肩肘週匝腫。色赤焮疼粟癩癩。藕包毒狀鴨鵝卵。臍內三陰外三陽。
 (註) 此證由風瘟或風火凝滯而成。生於肩下肘上。週匝漫腫。色赤焮癢。初起狀如粟米。一攪。亦有起一粒癰疔者。漸次焮腫紅熱。覺腫脹痛甚。紅腫之外無常者順。有二暈者險。三四暈者逆。腫發臍內。或臍外結腫一核。如桃如鴨鵝卵者。名藕包毒。毒者癰之輕證也。臍癰藕包。內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。此癰毒發苗之處。若在臍內者。以手三陰經。在臍外者。屬手三陽經。隨證用引經之藥。必然獲效。

臍癰發毒圖



臍癰發毒在臍部自肩至肘赤色

魚肚發

魚肚發如魚肚形。青靈穴生心火凝。暴腫紅活焮熱痛。癰疽治法即成功。(註)此證生於臍之後垂肉。患處心經青靈穴。由火毒凝結而成。暴腫色赤。焮熱疼痛。形如魚肚。腫潰治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。其引經之藥。准在臨證加之。



石榴疽

石榴疽起肘尖上。粟炮根開堅腫疼。破翻如榴寒熱甚。三焦相火與濕凝。(註)此證生於肘尖上寸餘。屬三焦經天井穴。初起黃粟小炮。根脚便覺開大。色紅焮腫。堅硬疼痛。腫如覆碗。破翻如榴。寒熱如癩。由三焦相火。與外濕相搏而成。初起宜糖酥丸汗之。外以艾灸九壯。貼糖餅。用萬應膏蓋之。焮腫處衝神和膏。服菊花清燥湯。煩躁熱甚者。服寧心散。九日後作開膿。痛者。表裏證俱退者順。反此者逆。破後用菊花蕊煎湯洗之。次以菊花燒灰存性。加輕粉少許。兌勻敷之。神效。至透膿脫腐生肌時。內外治

法。俱按癰疽疔瘡門。

菊花清燥湯

甘菊花 錢 當歸

生地

白芍酒炒

川芎

知母

貝母去心研

地骨皮

麥冬各一錢去心

柴胡

黃芩

升麻

犀角

甘草各五分生

竹葉二十片。燈心二十寸。水二鍾。煎八分。食後溫服。

(方歌) 菊花清燥石榴疽。腫硬焮紅痛可醫。四物柴芩知貝草。升麻地骨麥冬犀。

蟾酥丸

蟾酥餅即蟾酥丸料捏成餅見疔瘡門

沖和膏

護心散併見腫瘍門

肘癰

肘癰發於肘圍邊。高腫焮熱赤紅疼。心肺稽留風邪火。勢小為癰大為癰。(註)此證生於肘之圍邊。暴風一腫。焮熱色紅疼痛。由心肺風火之邪。稽留凝滯而成。形勢小者為癰。毒形勢大者為瘻。初服荊防敗毒散之。次服白芷升麻湯清托之。外敷二味拔毒散。將黃治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

白芷升麻湯

白苓二錢半生
半酒炒

連翹二錢
去心

黃耆三錢

白芷八分

升麻

桔梗各五分

紅花酒洗

甘草各三分炙

酒水各一鍾。煎八分。食遠熱服。

(方歌) 白芷升麻醫腫痛。解熱除煩托肘癰。苓翹桔梗紅花草。黃耆酒水各一鍾。

肘癰



肘癰在肘之圍邊赤腫左右肘

荆防敗毒散見頭部
 二味拔毒散見腫瘍
 腦疽

臂癰圖



臂癰亦腫臂疽堅硬不拍臂外腫必有生左右臂指同

臂部自肘及腕曰臂

臂癰附疽

臂癰臂疽癰臂生。平紫硬疽紅腫癰。榮衛風邪逆肉理。甚則拳縮徹骨疼。(註)此證生臂外側。屬三陽經。臂裏側。屬三陰經。高腫紅活。焮痛潰速者為癰。平陷紫暗。堅硬木痛潰遲者為疽。俱由榮衛不週。感受風邪。逆於肉理而成。初起形如粟粒。憎寒壯熱。宜服荊防敗毒散汗之。焮痛煩熱。宜服白芷升麻湯消之。膿勢將成。宜服托裏透膿湯。膿熟鍼之。若疽證木痛。無紅無熱。此屬氣血兩虛。無論已潰未潰。宜服十全大

補湯托之。潰後內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。若拳縮筋不能舒疼。痛徹骨者。係潰深傷脈也屬逆。

荆防敗毒散

見項部
腦疽

白芷升麻湯

見頭部
肘癰

托裏透膿湯

見頭部
癰疽

十全大補湯

見潰瘍門

腕癰圖



腕癰在手腕背面高腫色紅左右相向

腕癰

腕癰三陽風火發。手腕背面結癰形。高腫速潰順易治。腐爛露骨逆難功。(註)此證生於手腕背面。尋手三陽。經由風火凝結而成。高腫紅活。在十四日潰破膿出痛減者。順而易治。手腕乃皮肉淺薄之處。苦遲延日久不潰。或漫腫平塌。既潰腐爛露骨者逆。難於收功。初服荊防敗毒散汗之。外用太乙紫金錠敷之。腫成將

潰。即按癰疽腫瘍潰瘍門治法。

荆防敗毒散見項部
腦疽
太乙紫金錠見胸部
脾發疽

免疽圖



免疽在手腕裏面橫紋前稍動脈之間左右同

免疽

免疽生腕動脈間。堅硬漫腫免骨邊。痛徹手膊爲險證。本屬肺經穴太淵。(註)此免疽在於手腕裏面。橫紋前稍動脈之間。免骨裏側。屬肺經太淵穴。由憂思氣滯。風火結成。堅硬漫腫。疼痛徹骨。手膊不能轉動。此動脈處。乃肺經門戶。若發此疽。或潰深大洩肺氣。最爲險候。內外治法。俱按癰疽腫瘍潰爛門。

穿骨疽



穿骨疽

穿骨疽生間使穴。掌後三寸包絡經。堅硬漫腫因蘊熱。毒盛潰深穿骨疼。(註)此證生於間使穴。處在掌紋橫紋上三寸兩筋陷中。屬包絡經。蘊熱凝結而成。初起如粟。漸增堅硬。漫腫微紅。舉熱疼痛。應期速潰。順。若潰破遲緩。膿毒潰穿骨縫。從臂外側出膿者險。內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

骨蠱疽

骨蠱疽生臂外廉。經屬陽明憂怒纏。瘰癧根束多善順。紫暈腐串七惡難。(註)此證生於臂外側前廉。大骨之後。屬手陽明大腸。由憂鬱暴怒。凝結而成。初如粟豆。旬日大如桃李。腫硬疼痛。瘡根收束。多見五善之證者順。若紫暈開大。腐爛斑點。串通肌肉。抽搐拘急。多見七惡之證者逆。始終內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。



蠱蝨申



蠱蝨申

蠱蝨申生臂內中。思傷脾氣包絡聚。筋骨如中流矢痛。內潰申孔似漏形。(註)此證生於臂內中廉。屬包絡經。由思慮傷脾。脾傷則運化遲。故生濁液。流於肌肉。脾氣滯鬱不舒。凝結而成。此患初起筋骨如中流矢。疼痛漸增。漫腫堅硬。不紅不熱。連腫數塊。臂膊不能轉動。日久其腫塊漸次潰破。孔孔時流白漿。內潰申通。諸孔。外勢腫硬如消。膿水淋漓如漏。虛證悉添。如面黃食少。削瘦甚。則午後寒熱交作。而成敗證也。初起宜服逍遙散。外敷太乙紫金錠。次服人參養榮湯。調和氣血。扶助脾胃。十中可保二三。潰按癰疽潰瘍治法。若投藥不效者屬逆。

逍遙散

見背部上搭手

太乙紫金錠

見胸部脾發疔

人參養榮湯

見潰瘍門

手部

手部

手發背

手發背初芒刺形。三陽風火與濕擾。堅硬潰傷筋骨險。高腫速潰易收功。(註)此證生於手背。屬手三陽經。由風火與濕滯滯而成。初起形如芒刺。漸覺疼痛。高腫紅活焮熱潰速為癰。若漫腫堅硬。無紅無熱。潰遲為疽。其證無論形勢大小。但潰深露筋骨者難痊。初俱宜服羌活散汗之。次服內疎黃連湯清之。其餘內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

手發背圖



羌活散

活羌

當歸各二錢

獨活

烏藥

威靈仙各一錢五分

升麻

前胡

荆芥

桔梗各一錢

甘草五分生

肉桂三分

酒水各一鍾。煎一鍾食送服。

(方歌) 羌活散醫手發背。除濕發汗把風追。升麻前獨兩歸草。烏藥威靈桔桂隨。

內疎黃連湯見腫瘍門



掌心毒

掌心毒生赤腫疼。經屬包絡積熱成。偏於掌邊名穿掌。初宜發汗攻宜清。(註) 此證生於手掌心。赤腫疼痛。包絡經勞宮穴。積熱而成。若偏於掌邊。名穿掌毒。一名穿更毒。又名穿掌。初起治同手發背。其除治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

虎口疽附合谷疔



虎口疽生合谷穴。經屬大腸熱濕凝。根深爲疔大爲疽。堅硬木痛汗鍼明。(註)此證生於合谷穴。在手大指次指岐骨間。屬大腸經濕熱凝結而成。一名丫又毒。一名蟻蟹毒。初起如豆。漫大色青。木痛堅硬。名虎口疽。若初起黃粟小胞。瘡熱焮痛。根深有紅線上攻腋內。即名合谷疔。無論疔疽。初俱宜羌活散汗之。內疎黃連湯清之。疽證膿法鍼之。餘治法按癰疽腫瘍潰瘍門。疔證於初起。將疔根挑去。有紅絲者。當紅絲盡處。用鍼斫斷。其餘治法俱按疔門。

羌活散

見手發背

內疎黃連湯

見腫瘍門

病鰕圖



病鰕生於背赤腫高突形勢如鰕兩手皆同

病鰕

病鰕每在手背生。形勢如鰕赤腫疼。內宜消毒外湯洗。手三陽經熱毒成。(註)此證生於手背。屬手三陽經熱。毒盛而成。形勢如鰕。高埂赤腫疼痛。初宜服黃連消毒飲。外用食鹽酒糟香油同炒令香。淬以滾湯淋洗患處即消。如高埂不消。再用蟾酥餅貼之。外用巴膏蓋之。以腐盡更了。次敷生肌散。仍用膏蓋收斂。

黃連消毒飲

見頭部百會疽

蟾酥餅

即蟾酥丸作餅見疔瘡門

巴膏

生肌散

俱見潰瘍門

手了發



手了發

手了發生手指岐。濕火凝結本於脾。初粟漸豆揪熱痛。內外治法按疔醫。(註)此證生於手了岐骨縫間除大指合谷穴。其餘指了生患。即名手了發。本於脾經濕火。凝結而成。初起如粟色紅。漸大如豆。焮熱痛。潰後疼痛不止者。候膿穿脫出。其痛方止。內外治法。俱按疔查門。

調疽圖



調疽在手大指形如李子其色青紫兩子指同

調疽

調疽大指肺熱生。如粟如李青紫疼。六日刺出膿血吉。黑腐延蔓斷指凶。(註)此證生於手大指。由肺積熱而成。初如粟豆。漸腫如李。青紫麻木。癢痛徹心。六日刺破。出稠膿鮮血者吉。出黑血者險。初服靈丹汗之。次服仙方活命飲。外敷白錠子。其餘內外治法。俱同癰疽腫瘍潰瘍門。若黑腐延蔓不痛者。名指屬逆。治法與足部脫疽同。

麥靈丹

仙方活命飲

白錠子俱見腫瘍門

天蛇毒圖



蛇頭疔圖



蛇頭疔 天蛇毒

蛇頭疔腫紫硬疼。天蛇毒疹悶腫紅。二證俱發脾經火。看生何指辨專經。(註)此二證俱生於手指頂尖。上手指雖各有專經。然俱發脾經火毒而成。蛇頭疔自筋骨發出。根深毒重。初起小粒。色紫疼痛。堅硬如釘。初宜服蟾酥丸汗之。外敷雄黃散。天蛇毒自肌肉發出。其毒稍輕。初起悶腫無頭。色紅痛如火燎。初宜服蟾酥丸汗之。外敷雄黃牡蠣散。二證膿勢將成。俱服仙方活命飲。膿熟開之。外貼琥珀膏煨膿生肌治之。虛不能斂者補之。但手指係皮肉澆薄之處。不宜灸法。亦不宜開早。若誤灸開早。以致皮裂肉翻出。疼痛倍增者。不能速愈。慎之。手指經絡圖歌。俱見首卷。

雄黃散

明雄黃二錢

輕粉五分

蟾酥二分

冰片一分

共研細末。新汲水調濃。重湯炖溫。敷於患指。用薄紙蓋之。日換三四次。

(方歌) 雄黃散治蛇頭疔。紫痛根堅火毒攻。冰片蟾酥輕粉末。汲水調塗用紙封。

雄黃牡蠣散

牡蠣四錢

明雄黃二錢

另研細。共和一處。再研。加蜜水調濃。重湯炖溫。塗於患指。能止疼痛。日用五六次。

(方歌) 雄黃牡蠣散。指頭嫩紅腫腫疼。二味細研加蜜水。調敷止痛効又靈。

蟾酥丸

仙方活命飲

琥珀膏

瘡門

楊梅

髮際瘡

蛇背方圖



蛇眼方圖



蛇節疔



蛇節疔在耳指骨節間

蛇腹疔



蛇腹疔在耳指鼻面形如魚肚

泥鰍疽



泥鰍疽生於指一指通腫十指同

蛇眼疔 蛇背疔 蛙節疔 蛇腹疔 泥鰍疽

蛇眼疔在甲旁生。甲後名爲蛇背疔。蛙節疔生中節骨。蛇腹指內魚肚形。泥鰍疽生徧指腫。牽引肘臂熱焮疼
看生。何指分經絡。總由臟腑火毒成。(註)此證有五。如蛇眼疔生於指甲兩旁。形於豆粒。色紫。半含半
露。硬似鐵釘。蛇背疔生於指甲根後。形如半棗。色赤。胖腫。蛙節疔又名蛇節疔。生於中節。透指俱腫。
其色或黃或紫。蛇腹疔又名魚肚疔。生於指中節前面。腫如魚肚。色赤疼痛。泥鰍疽一指通腫。色紫。形如
泥鰍。焮熱痛速肘臂。初起俱宜服蟾酥丸汗之。外敷雄黃散。次服仙方活命飲。膿熟開之。貼琥珀膏煨膿生
肌。虛不能斂者補之。但此五證。總不外乎火毒凝結而成。至於屬何經臟。臨證看生何指以辨之。手指經
絡。各詳註首卷。

蟾酥丸見疔

瘡門

雄黃散見蛇

頭疔

仙方活命飲見腫

瘍門

琥珀膏見頭部

髮際瘡

代指圖



代指

代指每生指甲身。先腫焮熱痛應心。輕潰微膿重脫甲。經脈血熱是其因。(註)此證生於手指甲身內。由經脈血熱凝結而成。初起先腫焮熱疼痛。應心宜用甘草朴硝各五錢。熬水浸洗即瘥。痛仍不止。三四日後。指甲背面上。微透一點黃白色。此係內膿已成。但無門潰出。急用線鍼在指甲身。就膿近處然一小孔。膿方得出。隨手捏盡餘膿。用黃連膏貼之。易愈或失治。或過敷涼藥。以致肌肉塞護。膿毒浸淫好肉。爪甲潰空。必然脫落。用琥珀膏貼之。一兩月即愈。

黃連膏

見鼻部
鼻瘡

琥珀膏

見頭部
髮際瘡

螭螂蛙

螭螂蛙



螭螂蛙在手骨中如大硬塊

螭螂蛙由寒氣凝。指節緊腫臃壯形。初起不疼久方痛。滯久膿清毒病成。(註)此證多生於體虛人。手指骨節。由濕痰寒氣。凝滯而成。初起不紅不熱不痛。漸次腫堅。形如蠅肚。屈伸艱難。日久方知木痛。初腫時。宜先服六君子湯。益氣除濕化痰。外以離宮錠薑汁磨敷。或兼陽燧錠於堅痛處灸之自消。若失於調治。腫處漸漸腐爛。膿如清水。淋瀝不已。腫仍不消。然在骨節之處。潰久大泄氣血。每成瘡癩之證。宜速服人參養榮湯補之。外貼蟾酥餅子。陀僧膏蓋之。遇壯年人。如法治之可愈。若年老及虛羸之人。不能收功。

六君子湯

即香砂六君子湯減去
積香砂仁見腫瘍門

離宮錠

見腫
瘍門

陽燧錠

見首卷
烙法

人參養榮湯

陀僧膏

俱見潰
瘍門

蟾酥餅

見疔
瘡門

癩瘡圖



癩瘡

癩瘡每發指掌中。兩手對生菜莢形。風濕癢痛津汁水。時好時發久生蟲。(註)此證生於指掌之中。形如菜莢。兩手相對而生。亦有成攢者。起黃白膿。癢痛無時。破津黃汁水。時好時發。極其疲頑。由風濕客於膚腠而成。以潤肌膏擦之。若日久不愈。其癢倍增。內必生蟲。治以殺蟲為主。用藜蘆膏擦之甚效。忌動風。雞鵝魚腥等物。

藜蘆膏

藜蘆

苦參各一

兩

豬脂油八兩。將二味燻枯。瀝去渣。入松香一兩。溶化開。離火。再加枯礬末。雌黃末各一兩。攪勻候溫。塗之。以痊為度。

(方歌) 藜蘆膏用苦參良。脂油燻瀝入松香。再加枯礬雌黃攪。殺蟲止癢抹癩瘡。

狐尿刺圖



狐尿刺

狐尿刺生手足間。悶腫焮痛紅紫斑。螻蛄精尿流積毒。誤觸肌膚痛不眠。(註)此證大成書名狐狸刺。外臺
 總錄二書。名狐尿刺。由螻蛄盛暑交媾。精汁染於諸物。乾久有毒。人手足誤觸之。則成此患。初起紅紫斑
 點。肌膚乾燥。悶腫焮痛不眠。十日後腐閉。瘡口日寬。內宜服黃連解毒湯。外以蒲公英連根濃煎。溫洗。
 若得鮮蒲公英。搗汁塗患處更佳。蓋螻蛄又名野狐鼻涕。此證取名。蓋本於此。將潰治法。按癰疽腫瘍門。

黃連解毒湯見耳部黑疔

鶴掌風



鶴掌風

鶴掌風生掌心間。皮膚燥裂紫白斑。楊梅餘毒血燥熱。復受風毒滲滯澀。(註)此證生於掌心。由生風毒未盡。又兼血燥。復受風毒。凝滯而成。初起紫白斑點。疊起白皮。堅硬甚厚。乾枯燥裂。延及偏手。用二難散而洗之。三油膏擦之。內用祛風地黃丸料。加土茯苓白鮮皮當歸為佐。作丸服之甚效。若年久成癬。難愈。又有不因楊梅後。無故掌心燥癢起皮。甚則枯裂微痛者。名掌心風。由脾胃有熱。血燥生風。血不能榮養皮膚而成。宜服祛風地黃丸。外用潤肌膏。久久搽之即愈。

祛風地黃丸

生地

熟地名四兩

白茯苓

川牛膝各三兩

知母

黃蘗

枸杞子各二兩

菟絲子酒洗

獨活各一兩

兩

兩

酒洗

(方歌) 祛風地黃除血熱。鵝掌風生服即癒。知藥疾。 蔓牛膝魚。 獨把同研就生和。

二礬散

白礬

皂礬各四兩

兒茶五錢

側柏葉八兩

水十盞。煎數滾。聽用。先以桐油搽患處。再用紙撚桐油。浸透。火點向患處熏片時。次用煎湯。乘熱貯淨木桶內。手架桶上。以布將手連桶口蓋嚴。湯氣薰手勿令泄氣。待微熱。將湯傾入盆內。薰洗良久。一次即愈。七日切不可見水。

(方歌) 二礬掌起紫白斑。礬與兒茶柏葉煎。先以桐油搽患處。油撚燃薰後洗痊。

三油膏

牛油

柏油

香油

銀朱各一兩

官粉

麝香各二錢

研細

將三油。共合火化。入黃蠟一兩。溶化盡。離火。再入朱麝官粉等末。攪勻成膏。搽患處。火烘之。以油乾滋潤爲度。

(方歌) 三油膏潤鵝掌風。初斑漸裂燥癢攻。牛柏香油朱粉麝。蠟熬擦患火上烘。

潤肌膏見頭都白屑風

御纂醫宗金鑑卷九

編輯外科心法要訣

下部

懸癰

懸癰。毒生會陰穴。初如蓮子。漸如桃。三陰虧損。濕熱鬱。潰久成漏。為瘡勞。(註)此證一名騎馬癰。生於纂間。係前陰之後。後陰之前。屏翳穴。即會陰穴。係任脈經首穴也。初生如蓮子。微癢多痛。日久焮腫。形如桃李。由三陰虧損。兼憂思氣結。濕熱壅滯而成。其色紅。作膿欲潰。若破後潰深。久則成漏。以致溼盡氣血。變為瘡勞。初起氣壯實。尙未成膿。小水澀滯者。宜用九龍丹瀉去病根。稍虛者。仙方活命飲。利去濕熱。如法治之。遇十證可消三四。如十餘日後。腫勢已成。不能內消。宜服託裏消毒散。或託裏透膿湯。自破。如不破。腫高光亮。脹痛者。用臥鍼開之。穢膿一出。其腫全消者順。朝服六味地黃丸。午服十全大補湯。溫補滋陰。又有過食膏粱厚味。氣實者。初服龍膽瀉肝湯。潰服滋陰八物湯。又有房勞過度。羸弱者。初服八珍湯。潰服十全大補湯。脾虛不食。六君子湯。日久成漏者。國老膏化湯。送服琥珀蠟藥丸。外治法按瘻疽潰瘍門。當戒房勞怒氣。魚腥發物。慎重調理。

九龍丹

木香

乳香

沒藥

兒茶

血竭

巴豆不去油

等分爲末。生蜜調成一塊。磁盒收貯。臨用時旋丸豌豆大。每服九丸。空心熱酒一杯送下。行四五次。食稀粥。腫甚者。間日再用一服自消。

〔方歌〕九龍丹醫懸壺毒。初起氣實膿未成。木香乳沒兒茶竭。巴豆蜜丸酒服靈。

滋陰八物湯 當歸 生地黃 白芍藥酒炒 川芎 丹皮

花粉各一錢 澤瀉五分 甘草節一錢

水二鍾燈心五十寸。煎八分。食前服。大便祕者。加蜜炒大黃一錢。

〔方歌〕滋陰八物過膏梁。懸壺已潰服此方。四物丹皮花粉瀉。草節便祕加大黃。

仙方活命飲 琥珀蠟礬丸 託裏消毒散俱見腫瘍門

託裏透膿湯見頭部 侵腦疽 六味地黃丸見面部 雀斑 十全大補湯 八珍湯

六君子湯即香砂六君子湯減去 蜜香砂仁俱見潰瘍門 龍膽瀉肝湯見腰部纏腰火丹 國老膏見背部丹毒發

穿棉發

穿棉發發會陰前。憂思勞傷濕鬱源。嫩紅順場臨。病深漏瀉收敵難。〔註〕此證生於龜陰穴之前。醫囊

後。由憂思勞傷。濕鬱凝滯而成。初起如粟。漸生紅亮。焮爛。潰出稠膿者順。若起如椰子。黑焦陷於皮肉之內。漫腫紫暗。並無焮熱。痛痺等九及腰背肛門者逆。此係皮囊空虛。凡生此患。宜速潰根淺。但遇根深遲潰。腐傷尿管。漏溺不能收斂者至險。內治按癰。外治按癰。疽腫瘍潰湯門。

跨馬癰

跨馬癰生腎囊旁。重墜肝腎火濕傷。紅腫焮痛宜速潰。初清託裏勿寒涼。(註)此證一名騙馬墜。生於腎囊之旁。大腿根裏側股縫夾空中。由肝腎濕火結滯而成。初如豆粒。漸漸腫如鵝卵。墜墜舉重。色紅焮痛暴起高腫。速潰稠膿者順。若漫腫平塌。微熱微紅。潰出稀膿者險。多成串皮漏證。此處乃至陰之下。醫治不可過用寒涼。初宜服仙方活命飲消之。次服託裏透膿湯。既潰之後。內外治法。俱按癰疽潰瘍門。

仙方活命飲

癰疽門

託裏透膿湯

兒頭部
侵腦疽

便毒

便毒生於腿縫間。忍精瘀血怒傷肝。堅硬木痛寒熱作。初汗次下灸之痊。(註)此證又名血疔。又名便毒。無論男女。皆可以生。發於少腹之下。腿根之上摺紋縫中。經屬肝腎。由強力房勞。忍精不洩或慾念不遂。以致精搏血留。聚於中途。壅遏而成或為暴怒傷肝。氣滯血凝而發。初如杏核。漸如鵝卵。堅硬木痛。微熱不紅。令人寒熱往來。宜煎防敗毒散汗之。若煩躁作渴。氣鬱者宜山甲內消散以消解之。若過於堅硬大痛者。宜紅花散瘀湯舒通之。前藥用之不應者。宜九龍丹攻之。若無痛無熱。則下可攻下。宜陽燧鏡日灸五七壯。以或輒或消或潰為止。腿勢將成。不可強消。宜黃耆內託散託之。甚虛者託裏透膿湯。既潰宜八珍湯。

十全大補湯。補中益氣湯。因證用之。外用五色靈藥撒之化腐煨膿。兼琥珀膏萬應膏貼之。生肌斂口。斯潰後。即名魚口。因生於摺紋縫中。其瘡口潰大。身立則口必合。身屈則口必張。形如魚口開合之狀。故魚口之名。但此毒係忍精不洩。及怒氣傷肝而成。至於生楊梅而兼有便毒者。另詳註於楊梅門。

紅花散瘀湯

紅花

當歸尾

皂刺各一錢

生軍三錢

連翹去心

蘇木

穿山甲炙研

石決明

殭蠶炒

乳香

貝母各一錢

去心研

黑牽牛二錢

酒水各一鍾。煎八分空心服。行五六次。方食稀粥補之。

〔方歌〕紅花散瘀消堅硬。便毒初起腫痛添。歸刺軍翹蘇木甲。石決殭蠶乳貝牽。

黃耆內託散

黃耆二錢

白朮一錢

當歸

川芎各二錢

金銀花

皂刺

天花粉各一錢

澤瀉

甘草各五分

水二鍾。煎八分。食前服。

〔方歌〕黃耆內託醫便毒。腫盛消託潰良。白朮歸芎銀皂刺。天花瀉草力均功。

荆防敗毒散

見項部
腦疽

山口中消散

見腹部
中皖疽

九龍丹

見前
懸癰

陽燄錠

見首卷
烙法

託裏透膿湯

見頭部
侵腦疽

八珍湯

十全大補湯

補中益氣湯

五色靈藥

萬應膏

俱見潰瘍門

琥珀膏

見頭部
髮際瘡

疔瘡

疔瘡統名有三原。慾火未遂洩淋難。房術塗藥痛癢紫。光亮赤腫梅瘡惡。(註)此毒名疔瘡。又名妬精瘡。生於前陰。經云。前陰者。宗筋之所主。督脈經絡。循陰器合篡間。又云腎開竅於二陰。是瘡生於此。屬肝腎三經也。其名異而形殊。生於馬口之下者。名下疔。生莖之上者。名蚌疔。莖上生瘡。外皮腫脹包裹者。名袖口疔。疔久而徧潰者。名蠟燭疔。痛引翠丸。陰囊腫墜者。名雞癩疔。痛而多癢。潰而不深。形如剝皮爛杏者。名搔疔。生馬口旁。有孔如棕眼。眼內作毒。捻之有微膿出者。名錢根疔。生楊梅時。或誤用蕪搽等藥。以致腐爛如白者。名楊梅疔。又有生楊梅時。服輕粉水銀。打成切藥。以致便溺尿管內刺痛者。名楊梅內疔。諸疔原由有三。一由男子慾念萌動。淫火猖狂。未經發泄。以致敗精濁血。留滯中途結而為腫。初起必先淋漓洩瀉澀痛。次流黃濁敗精。陽物漸損。甚則腫痛腐爛。治當疎利肝腎邪火。以八正散清肝導滯湯主之。一由房術熱藥。塗抹玉莖。洗擦陰器。微停不衰。久頓不洩。以致火鬱結腫。初起陽物癢痛堅硬。漸生疙癢。色紫腐爛。血水淋漓。不時興舉。治當洩火解毒。以黃連解毒湯盧菴丸主之。一由娼家結

人陰器。癢精濁氣未淨。輒與交媾。以致淫精傳染梅毒。初起皮腫紅亮。甚如水晶。破流膿水。麻癢時發。腫痛日增。治當解毒。以龍膽瀉肝湯主之。次服二子消毒散。外用大豆甘草湯洗之。紅腫熱痛。以鯽魚膽汁敷之。損破腐爛。以鳳衣散、旱螺散、珍珠散、銀粉散、回春脫疔散。因證敷之。惟楊梅毒與楊梅內疔二證。多服五寶散甚效。

八正散

扁蓄

生軍各一錢

滑石二錢

瞿麥

甘草生

車前子

梔子

木通各一錢

水二鍾。煎八分。食前服。

(方歌) 八正散清積火盛。小水作淋結腫疼。扁蓄軍滑瞿麥草。車前梔子木通靈。

清肝導滯湯

扁蓄四錢

滑石二錢

甘草一錢

大黃二錢便祕者用

瞿麥三錢

水二鍾。燈心五十寸。煎八分。空心服。

(方歌) 清肝導滯清肝熱。玉菴腫疼小水澀。扁蓄滑石草大黃。燈心瞿麥服通徹。

二子消毒散

土茯苓八兩

豬脂二兩切碎

杏仁炒去皮尖

僵蠶炒

蟬蛻各七個

牛膝

荆芥

防風各一錢

皂角子七個

金銀花三錢

肥皂子七個

豬牙皂角一條

水八盞。煎三盞。作三次服。如結毒服三七日自愈。袖口疔。加黃藥一錢。肥皂子倍之。楊梅疔。加

薏苡仁皂刺各一錢。調柏葉綠豆糯米各三錢。楊梅內疔。加海金沙五加皮白丑各一錢五分。

(方歌) 二子消毒梅毒疔。土芥豬脂香殭蠶。蟬膝荊防皂角子。銀花肥皂豬牙煎。

大豆甘草湯

黑豆二合 甘草一兩 赤皮葱三莖 槐條六寸

水煎濃。澄湯候溫。日洗二次。

(方歌) 大豆甘草湯神方。諸般疔證洗之良。止癢消疹能解毒。赤葱槐條共熬湯。

鳳衣散

鳳凰衣一錢雞抱卵殼 輕粉四分 冰片二分 黃丹一錢

共研細末。鴨蛋清調敷。或乾撒亦可。

(方歌) 鳳衣散能敷潰疔。輕粉冰片共黃丹。化腐生肌兼止癢。鴨蛋清調痛即安。

旱螺散

白田螺殼三錢 輕粉一錢 冰片 麝香各三分

共研細末。香油調敷。

(方歌) 旱螺散用易生肌。潰疔瘰癧俱可醫。煨螺殼與輕冰麝。香油調敷去腐宜。

珍珠散 珍珠 黃連末 黃蘗末 定粉 輕粉 象牙末

五倍子炒 兒茶 沒藥 乳香各等分

共研極細末。先以米泔水洗患處。再撒此藥甚效。

方歌）珍珠散治下疳瘡。清熱除癢脫腐強。連藥兒茶輕定粉。五倍象牙沒乳香。

銀粉散

上好錫六錢。火化開。入硃砂末二錢。攪炒砂枯。去砂留錫。再化開。投水銀一兩。和勻傾出聽用。定粉一兩。研極細。鋪綿紙上。捲成一條。一頭點火。煨至紙盡為度。吹去紙灰。用粉同前錫末。再加輕粉一兩。共合一處。研成極細末。先以甘草湯淋洗患處。拭乾隨撒。此藥能生肌止痛。收斂甚效。

（方歌）銀粉散醫疔腐蝕。葦損梅毒爛皆施。錫炒硃砂水銀入。定輕二粉對研之。

回春脫疔散

黑鉛五錢火化開。投水銀二錢五分。研不見星為度。再加寒水石三錢五分。輕粉二錢五分。硼砂二錢。共研細末。先以葱艾花椒。煎湯洗患處。再撒此藥。

（方歌）回春散先化黑鉛。次下水銀要細研。寒水硼砂輕粉入。下疔蝕爛撒之痊。

五寶散

石鍾乳

四錢如乳石下條煉成
易碎似蜻蜓翅者方真

硃砂一錢

珍珠

二錢豆腐內煮
半炷香時取出

冰片一錢 琥珀二錢

各研極細。和一處再研。數百轉。磁罐密收。用藥二錢。加飛羅麵八錢。再研和勻。每用土茯苓一觔。水八盞。煎至五盞。濾去渣。作五次。每次加五寶散一分。和勻。量病上下服。日用十次。如鼻子腐爛。每日土茯苓內加辛夷三錢煎服。引藥上行。忌食海腥。牛羊鷄肉。火酒煎炒。房事第件。
(方歌) 五寶散硃鍾乳珍。冰珀飛羅麵細勻。楊梅疔瘡結毒證。土苓湯調服最神。

黃連解毒湯

見耳部
黑疔

蘆薈丸

見齒部
牙齦

龍膽瀉肝湯

見腰部
腰火丹

陰風瘡

陰風瘡。毛際內。肝腎濁熱不潔生。瘙癢抓紅含紫點。若還梅毒蠟皮形。(註) 此瘡一名八脚蟲。生於前陰毛際內。由肝腎氣濁生熱。兼淫慾失洗不潔。搏滯而成。瘙癢難忍。抓破色紅。中含紫點。內宜服蘆薈地黃丸。外用錢挑破去風。隨擦銀杏無憂散易愈。若毛際內如豆如餅。發癢結如蠟皮者。楊梅毒也。即按楊梅毒治之。

銀杏無憂散

水銀鉛製

輕粉

杏仁

去皮尖
搗膏

蘆薈

雄黃

狼毒各一 麝香一分

錢

除水銀杏仁膏。共研篩細。再入銀杏同研勻。先以石膏煎湯洗之。用鐵挑破去風。隨用津唾調擦。使藥氣入內。愈不復發。切忌牛犬繁罔。

〔方歌〕 銀杏無憂散止癢。熱滯毛際陰風癢。鉛製水銀輕粉杏。蘆薈雄黃狼麝香。

蘆薈地黃丸

即六味地黃丸加蘆薈五錢
蜜炒黃藥一兩見面部雀斑

腎囊瘡

腎囊紅腫發爲瘡。寒熱口乾焮痛疼。肝腎濕熱流注此。失治潰深露辜凶。〔註〕此證生於腎囊。紅腫焮熱疼。身發寒熱。口乾飲冷。由肝腎濕熱。下注腎囊而成。初起宜服荊防敗毒散汗之。外用葱鹽熬湯燙之。寒熱已退。宜服清肝滲濕湯消解之。不應者。膿勢將成也。急服滋陰內託散。若氣怯食少者。宜服託裏透膿湯。外用二味拔毒散。圍敷腫根。膿脹痛者。用臥鍼鍼之。出稠膿者順。出腥水者險。宜服託裏排膿湯。外用琥珀膏貼之。俟腫消膿少痛減時。用生肌散、生肌玉紅膏以生肌斂口。此癰本於肝腎發出。以滋陰培補氣血爲要。生肌斂口時。朝服六味地黃湯。暮服人參養榮湯滋補之甚效。此證若失治。潰深露辜丸者險。然不可棄而不治。宜杉木灰託之。蘇子葉包之。患者仰臥。靜以養之。或可取效。

清肝滲濕湯

黃芩

梔子生研

當歸

生地

白芍藥酒炒

川芎 柴胡 花粉 龍膽草各一錢 甘草生 澤瀉 木通各五分

水二鍾。燈心五十寸。煎八分。食前服。

〔方歌〕清肝滲濕消癥瘕。小水淋漓腫痛攻。苓梔四物柴花粉。膽草燈甘瀉木通。

滋陰內託散 當歸 熟地 白芍藥酒炒 川芎各一錢五分

穿山甲炙研 澤瀉 皂刺各五分 黃耆一錢五分

水二鍾。煎八分。食前服。

〔方歌〕滋陰內託將潰劑。癰癤欲膿託最宜。四物穿山瀉皂刺。食前煎服入黃耆。

荆防敗毒散見項部 腦疽 託裏透膿湯見頭部 侵腦疽 二味拔毒散見腫瘍門 託裏排膿湯見項部 魚尾毒

琥珀膏見頭部 髮際瘡 生肌散 生肌玉紅膏 人參養榮湯俱見潰瘍門

六味地黃湯即六味地黃丸改作 煎劑見面部雀斑

腎囊風

腎囊風發屬肝經。證由風濕外襲成。麻癢搔破流脂水。甚起疙瘩火燎疼。(註)此證一名繡毬風。係腎囊作癢。由肝經濕熱。風邪外襲皮裏而成。初起乾燥癢極。喜飲熱湯。甚起疙瘩。形如赤粟麻癢。搔破流脂水。皮熱痛如火燎者。此屬裏熱。俱宜龍膽瀉肝湯服之。外用蛇牀子湯薰洗之。洗後擦狼毒膏甚效。

蛇牀子湯

威靈仙

蛇牀子

當歸尾各五錢

縮砂殼三錢

土大黃

苦參各五錢

老葱頭七個

水五碗。煎數滾。傾入盆內。先薰候溫浸洗。

(方歌) 蛇牀子湯洗囊風。止癢消風除濕靈。威靈歸尾縮砂殼。土大黃與苦參葱。

狼毒膏

狼毒

川椒

硫黃

檳榔

文蛤

蛇牀子

大風子

枯白礬各三錢

共研細末。用香油一茶鍾煎滾。下公豬膽汁一枚。和勻調煎藥。擦患處。

(方歌) 狼毒膏擦繡毬風。濕癢浸淫火燎疼。椒硫檳榔蛇牀子。枯礬礬膽油調成。

龍膽瀉肝湯

見腰部繡
腰火丹

婦人陰瘡

婦人陰瘡係總名。各有形證各屬經。陰挺如蛇脾虛弱。陰腫勞傷血分虛。陰蝕胃虛積鬱致。陰脫憂思太過。陰瀉氣血雙虛損。隨證施治諸說。 (註) 此證俱生於陰器。如陰中挺出一條如蛇形者。名爲陰挺。由脾經虛弱。或產後遇怒受風所致。初宜服逍遙散加荊芥防風。次宜朝服補中益氣湯。倍用升麻。晚服龍膽瀉肝湯。外以蛇牀子煎湯薰洗之。如陰戶忽然腫而作痛者。名爲陰腫。又名蚌疔。由勞傷血分所致。宜四物湯加丹皮、澤瀉花粉、柴胡服之。或服秦朮湯。外用艾葉一兩。防風六錢。大戟五錢。煎湯薰洗。如陰器外生疔瘡。內生小蟲作癢者。名爲陰蝕。又名蟲瘡。由胃虛積鬱所致。宜四物湯加石菖蒲、龍膽草、黃連、木通服之。若寒熱與虛勞相似者。蟲入臟腑也。宜逍遙散吞送麝香丸。早晚各一服。外以海養湯薰洗。次以銀杏散塞入陰中。殺蟲止癢。如陰戶閉而不閉。瘻痛出水者。名爲陰脫。由憂思太過所致。宜逍遙散或歸脾湯。俱加柴胡、梔子、白芍。丹皮服之。由產後得者。補中益氣湯加五味子。醋炒白芍服之。外俱用荊芥、枳殼、訶子、文蛤、大劑煎湯薰洗。如子宮脫出。名爲陰癰。俗名癰葫蘆。由氣血俱虛所致。宜補中益氣湯。去柴胡。倍用升麻加益母草服之。外以葶藶子肉搗爛。貼頂心。再用枳殼半觔。煎湯薰洗。由思慾不遂。肝氣鬱結而成者。必先於小便似有堵塞之意。因而努力。久之隨努而下。令穩婆扶正葫蘆。令患婦仰臥。以枕墊腰。吹噓藥收之。收入卽緊閉陰氣。隨以布帛。將腰縛定。內仍服補中益氣湯自愈。

秦朮湯

秦朮六錢

石菖蒲

當歸各三錢

葱白五個。水二鍾。煎一鍾。食前服。

〔方歌〕秦黃湯治蚌疔生。腫痛能除效可徵。石菖蒲與當歸片。食前葱白水煎成。

漏養湯

苦參

狼毒

蛇牀子

當歸尾

威靈仙各五錢

鶴虱草一兩

用河水十盞。煎數滾。瀝去渣。貯盆內。乘熱先薰。待溫投公豬膽汁二三枚。和勻洗之甚效。

〔方歌〕濕癢殺蟲療陰蝕。熬湯薰洗不宜遲。苦參狼毒牀歸尾。豬膽威靈鶴虱施。

銀杏散

輕粉

雄黃

水銀鉛製

杏仁各一錢
生用

右各研。共和一處再勻。每用五分。棗肉一枚和丸。用絲綿包裹。線紮緊。將藥入陰內。留線頭在外。如

小解時。將藥取出。解完復入內。一日一換。四五個自愈。

〔方歌〕銀杏散醫熱下侵。輕粉雄黃製水銀。杏仁棗肉綿包裹。陰瘡生瘡用有神。

逍遙散

見背部
上搭手

歸脾湯見乳部
乳中結核

補中益氣湯

見潰瘍門

龍膽

瀉肝湯

見腰部
腰火丹

四物湯

見耳部
耳疳

蘆薈丸

見齒部
牙齦

腎部

鵝口疽

鵝口疽生尻尾尖。經屬督脈濕痰源。腫如魚脰潰鵝嘴。少壯易愈老難痊。(註)此證一名銳疽。生於尻尾骨尖處。初腫形如魚脰。色赤堅痛。潰破口若鵝嘴。屬督脈經。由濕痰流結所致。朝寒暮熱。夜重日輕。潰出稀膿爲不足。或流稠膿鮮血爲有餘。少壯可愈。老弱難斂。易於成漏。初起宜滋陰除濕湯以和之。已成不得內消者。用和氣養榮湯以託之。氣血虛弱。斂而斂遲者。滋腎保元湯以補之。若失治久而不斂者。宜服先天大造丸。兼服琥珀蠟礬丸。久久收斂。外治法。按癰疽腫瘍潰瘍門。

滋陰除濕湯

當歸

熟地

川芎

白芍

各一錢

陳皮

柴胡

知母

貝母

去心

黃芩

各八分

澤瀉

地骨皮

甘草

各五分



水二鍾。薑三片。煎八分。食前服。

(方歌) 滋陰除濕鷓口疽。退熱消癰初起宜。四物鍊柴知母草。澤瀉黃芩地骨皮。

和氣養榮湯

人參

白朮土炒

白茯苓

丹皮

陳皮

熟地

當歸

黃耆各一錢

沉香

甘草各五分炙

水二鍾。煎八分。食前服。

(方歌) 和氣養榮託銳疽。將臙煎服貴更宜。四君丹皮陳熟地。當歸沉香共黃耆。

滋腎保元湯

人參

白朮土炒

白茯苓

當歸身

熟地

黃耆

山萸肉

丹皮

杜仲各一錢

肉桂

附子製

甘草各五分炙

水二鍾。薑三片。紅棗肉二枚。建蓮子七個。去必煎八分。食前服。

(方歌) 滋腎保元潰後虛。斂遲膿清水淋漓。十全大補除芎芍。山萸附子牡丹皮。

先天大造丸

人參

白朮土炒

當歸身

白茯苓

菟絲子

枸杞

黃精

牛膝各兩

補骨脂炒

骨碎補去毛微炒

巴戟肉

遠志各一兩
去心

廣木香

青鹽各五錢

丁香三錢以上
共研末

熟地四兩酒
黃搗膏

仙茅浸去赤汁蒸
熟去皮搗膏

何首烏去皮黑豆同
黃去豆搗膏

膠棗肉搗膏

肉苁蓉各二兩去鹽并
內膜酒浸搗膏

紫河車一具白酒煮爛搗膏以
上六膏共入前藥末內

右爲細末。搗膏共合一處。再加煉過白蜂蜜爲丸。如梧桐子大。每服七十丸。空心溫酒送下。

(方歌) 先天大造補氣血。專治癱疽潰後虛。膿水清稀難收斂。參朮歸苓地首烏。補骨青鹽骨碎補。枸杞黃
稍遠菟絲。巴戟仙茅丁木棗。河車牛膝菴蓉俱。

琥珀蠟攀丸見腫瘍門



坐馬癰在尻尾高骨大裏上坐

坐馬癰

坐馬癰屬督脈經。尻尾略上濕熱凝。高腫潰爛稠膿。漫腫潰遲紫水凶。(註)此證生於尻尾骨略上。脈經。由濕熱凝結而成。高腫潰爛稠者順。若漫腫潰遲出紫水者險。虛人患此。易於成漏。初宜艾壯。蒜片灸之。以宣通結滯。令其易潰易斂。內服之藥。與鷓口疔同。潰後內外俱按癰疽潰瘍門。

隔蒜灸法見首卷

灸法



腎經證屬膀胱經。取腰間腫濕熱。肉厚之處遲清飲。最宜紅膏高腫疼。(註)此證屬膀胱經濕熱。屢結而成。生於髀肉厚處。腫潰微俱遲清。初宜隔蒜片艾灸。服仙方活命飲消之。不應者即服透膿散。膿熟鍼之。潰後內外治法。俱按癰疽潰瘍門。

隔蒜灸法

凡首卷灸法

仙方活命飲

透膿散

俱見腫瘍門

上馬癰下馬癰圖



上馬癰 下馬癰

上馬癰與下馬癰。上左下右膀胱生。膀胱濕熱變膿。黑隔為重高腫疼。(註)此證生於髀肉之下摺紋中。

感於此經濕熱。又兼七情不和。受漬滲滯而成。初起如粟。黃膿小胞。漸生焮腫。寒熱往來。高腫紅亮為

輕。平陷黑硬為重。初服荆防敗毒散。以退寒熱。

勢將成。服託裏透膿湯。其餘內

法。俱按癰疽潰瘍門。

內託羌活湯

羌活

黃蘗各二錢

酒炒

黃耆一錢

五分

當歸尾

陳皮

藥本

連翹

蒼朮炒

甘草炙

防風各一錢

錢

肉桂三分

水一鐘。酒半鐘。煎八分。食前服。

(方歌) 內託羌活宜堅硬。燥濕能託臂下癰。歸黃蘗藥同甘草。藥本連翹蒼朮風。

荆防敗毒散

見項部
腦疽

託裏透膿湯

見頭部
癰疽

涌泉疽



涌泉疽生在尻骨之前肝門之後

涌泉疽

涌泉疽生尻骨前。形如伏鼠臃腫痛堅。督脈濕熱潰破險。少壯易愈老弱難。(註)此證生尻骨之前長強穴。督脈經首穴。由濕熱凝結而成。初腫堅硬疼痛。狀如伏鼠。十日可刺。得白膿者。順潰遲青膿者險。紫黑者水者危。內治法同鸚口疽。外治潰後。按癰疽潰瘍門。少壯者得此易愈。老年氣衰弱者。多成冷漏難痊。

臃腫圖



意要在尻門兩旁

臃腫

臃腫毒注在肛門。內外虛實各有因。醇酒厚味兼辛苦外屬陽分內屬陰。(註)此證有內外陰陽之別。發於外者。由醇酒厚味。勸勞辛苦。蘊注於肛門。兩旁腫突。形如桃李。大便祕結。小水短赤。甚者肛門重墜緊閉。下氣不通。刺痛如錐。脈數有力。多實多熱。屬陽易治。宜服一前散。通利一便。其提掣之腫痛仍前。不全退者。膿將成也。宜服託裏透膿湯。膿脹痛斂之。膿出之後。治同潰瘍門發於內者。兼陰虛濕熱。

下注肛門。內結瘰癧。刺痛如錐。大便虛閉。小水淋漓。寒熱往來。過夜尤甚。服散瘰癧。為法得時。屬陰難治。宜服五灰散。膿毒自然潰出。膿生遲者。服十全大補湯托之。潰後按法收口。

一煎散 當歸尾 穿山甲炙研 甘草 桃仁泥

皂角刺各一錢 川黃連一錢 枳殼麩炒 檳榔 天花粉 烏藥

赤芍 生地 白芷各一錢 元明粉 大黃各三錢 紅花五分

水二鍾。浸一宿。次早煎一滾。空心服。俟行三四次。以稀粥補之。

(方歌) 一煎散消臟毒方。歸甲甘連桃枳檳。天花皂刺紅烏藥。芍地元明芷大黃。

菩提露 熊膽三分 冰片一分

涼水十茶匙。調化開。搽於患處甚效。

(方歌) 菩提露消積熱痛。臟毒堅空嫩腫增。水調熊膽加冰片。搽於患處毒漸輕。

五灰散 血管繻毛 血餘 蜈蚣 穿山甲 生鹿角各錢 存性

各等分研細。共合勻。每服五錢。空心溫黃酒調下。

(方歌) 五灰散用繻管毛。血餘蜈蚣鹿角燒。臟毒腫痛肛門內。每服五錢黃酒調。

託裏透膿湯 十全大補湯

瘰癧疽

痔門


痔氣



痔母子



痔雄雌



痔疔癰



痔瘰癧



痔花魚



痔攻血




痔腸塊



痔肉



痔桃櫻



痔珊瑚



痔角莖




痔子蓮




痔肝腕




痔腸治




痔心鷄



痔奶牛



痔風鼠



痔花翻



痔肉蜆



痔珠懸



痔腸盤



痔子粟



痔桃核



痔瘡

痔瘡形名亦多般。不外風濕燥熱源。肛門內外俱可發。潰久成漏最難痊。（註）此證係肛門生瘡。有生於肛門內者。有生於肛門外者。初起成癰。不破者爲痔。易治。破潰而出膿血。黃水浸淫。淋瀝久不止者爲漏。難痊。斯證名因形起。其名雖有二十四種。總不外乎醉飽入房。筋脈橫解。精氣脫泄。熱毒乘虛下注。或憂思太過。蘊積熱毒。憤鬱之氣。致生風濕燥熱。四氣相合而成。如結腫脹悶成塊者。濕盛也。結腫痛如火燎。二便閉者。大腸小腸熱盛也。結腫多瘻者。風盛也。肛門圍遶。摺紋破裂。便結者火燥也。初俱服止瀉如神湯。消解之外俱用菩提露。或田螺水點之。若堅硬者。以五倍子散唾津調塗之。兼用朴硝蔥頭煎湯洗之。頂大蒂小者。用藥線勒於痔根。每日緊線。其痔枯落。隨以月白珍珠散撒之收口。又有頂小蒂大者。用枯痔散枯之。內痔不出者。用喚痔散填入肛門。其痔卽出。隨以朴硝蔥頭煎湯洗之。又有因勤苦勞役。負重遠行。以致氣血交錯而生痔者。俱用止痛如神湯加減服之。又有血箭痔生肛門。或裏或外。堵塞墜腫。每逢大用力。則鮮血急流如箭。不論糞前糞後。由腸胃風熱。而兼暴怒成之。初服生熟二黃丸。若唇白面色萎黃。四肢無力。屬氣血兩虛。宜十全大補湯。倍川芎參耆服之。外用自己小便洗之。童便熱洗亦可。其血自止。亦有腸風下血。點滴而出。糞前者宜防風秦朮湯。糞後出血者爲酒毒。宜服苦參地黃丸。效後必多服臟連丸二三料除根。又有產後用力太過而生痔者。宜補中益氣湯。加桃仁紅花蘇木服之。又有久瀉久痢而生痔者。宜補中益氣湯。加槐花皂莢子煨末服之。如痔已通腸。污從漏孔出者。用胡連追毒丸酒服之。服後膿水反多者。藥力到也。勿以爲懼。如漏有管者。用黃連閉管丸服之。可代鍼刀藥線之力。凡痔未被已破。及成漏者。俱用却毒湯澆洗。或用喇叭花煎湯日洗二次。喇叭花卽上地黃苗。產成房勞河豚。海腥辛辣椒酒。

物。有久患痔而後腫者。取效甚難。久病咳嗽而後生痔者。多致不效。

止痛如神湯

秦艽去苗

桃仁去皮尖研

皂角子各一錢燒存性研

蒼朮米泔水浸炒

防風各七

黃蘗五分酒炒

當歸尾酒洗

澤瀉各三

檳榔一分

熟大黃一錢二分

右除桃仁皂角子檳榔。用水二鍾。將藥煎至一鍾。再入桃仁皂角子檳榔。再煎至八分。空心熱服。待少

時以美醃壓之。不犯胃也。忌生冷五辛。火酒硬物。大料濕麵之類。加腫有膿。加自朶花。(五朶去漉

心) 膏皮(五分) 木香(三分) 則膿從大便出也。如大便秘甚。倍大黃加麻仁枳實。如腫甚。倍黃蘗

澤瀉。加防己蒼朮條芩。如痛甚加羌活郁李仁。如癢甚。倍防風。加黃耆羌活麻黃藥本甘草。如腫

下。倍黃蘗。多加地榆槐花荆芥穗白芷。如小便澀數不通者。加赤茯苓車前子燈心扁蓄。

(方歌) 止痛如神諸痔瘡。風濕燥熱總能防。歸藥桃椰皂角子。蒼朮朶風澤大黃。

田螺水

大田螺一枚。用尖刀挑起螺壓。入冰片末五釐。平放磁盤內。待片時。螺殼內滲出漿水。用雞翎蘸點患

處。勤點之。其腫自然消散。

(方歌) 田螺水點痔瘡效。冰片裝入田螺殼。少時化水取點瘡。止痛消腫有奇效。

五倍子散

用川文蛤大者一枚。敲一小孔。用陰乾荔枝草。揉碎塞入文蛤內令滿。用紙塞孔。濕紙包煨片時許。取出

去紙。研爲細末。每一錢加醋三分。冰片五分。共研爲細末。唾津調塗患處。

〔方歌〕五倍子散痔瘡。堅硬腫疼立刻搽。輕粉冰片各研細。荔枝草入蛤中煨。

藥線 芫花五錢 壓錢二錢

用白色細衣線三錢。同芫花鹽錢。用水一盞。盛貯小磁罐內。慢火煮至湯乾爲度。取線陰乾。凡遇痔瘡腫。頂大蒂小之證。用線一根。患大者二根。雙扣繫紮患處。兩頭留線。日漸緊之。其患。自然紫黑。冰冷不熱爲度。輕者七日。重者十五日後必枯落。以月白珍珠散收口甚效。

〔方歌〕藥線芫花共懸錢。再加白扣線同煎。諸痔癰癢繫根處。生似葷形用此捐。

枯痔散

天靈蓋

用意子者佳。又用青線水將天靈蓋浸片時撈出。以火煨紅。再入青線水內淬之。如此七次。淨用四錢。

砒霜一兩

白礬二兩

輕粉四錢

蟾酥二錢

共爲細細末。入小新燒鍋內。上用粗磁器密蓋。鹽泥封固。炭火煨至二炷香。待冷揭開盤。將藥研末。搽痔上。每日辰午申三時。用泔水洗淨患處。上藥三次。上至七八日。其痔枯黑堅硬。生藥裂離。待其自落。〔方歌〕枯痔天靈蓋煨淨。砒難輕粉共研碎。入鍋煨蓋泥固煨。痔瘡生之藥折除。

喚痔散

枯白礬五分

食鹽三分

草烏生

刺楸皮

各錢

麝香五分

妙

煨存性

冰片一分

共研細末。先用溫水洗淨肛門。隨用唾津調藥三錢。填入肛門。片時即出。

(方歌) 瘰癧散把內痔呼。刺蝟皮磨麝草烏。冰片枯礬同研細。津調填入片時出。

生熟三黃湯

生地

熟地

各一錢五分

黃連

黃蘗

黃芩

人參

蒼朮

米泔水浸炒

白朮土炒

厚朴薑炙

當歸身

陳皮各一錢

地榆

防風

澤瀉

甘草

各六分生

烏梅二個

水二鐘。煎八分。食前服。

(方歌) 生熟三黃連麝參。蒼朮厚朮共歸陳。極風澤瀉烏梅草。而醫血箭痔如神。

防風秦朮湯

防風

秦朮

當歸

生地

白芍酒炒

川芎

赤茯苓

連翹各一錢

去心

梔子生研

蒼朮

米泔水浸炒

槐角

白芷

地榆

枳殼

炒

檳榔

甘草各六分生

水二鍾。煎至八分。食前溫服。如便秘者加大黃。

〔方歌〕防風秦朮治腸風。墜腫津血最止疼。四物梔蒼槐角芷。地榆枳草麴檳苓。

苦參地黃丸

苦參

切片酒浸濕蒸曬九次
為度炒黃為末淨一觔

生地黃

四兩酒浸一宿蒸熟
搗爛和入苦參末內

加煉過蜂蜜為丸。如梧桐子大。每服三錢。白滾水送下。或酒下亦可。日服二次。

〔方歌〕苦參地黃養後紅。皆因酒毒熱來攻。二味酒蒸蜂蜜煉。為丸水送最有功。

臍連丸

黃連八兩研
淨末

公豬大腸

肥者一段長一
尺二寸水洗淨

右二味將黃連末裝入大腸內。兩頭以線紮緊。放砂鍋內。重煮一斤半。慢火熬之。以酒乾為引。將藥腸

取起。共搗如泥。如藥濃再曬一時許。復搗為丸。如梧桐子大。每服七十丸。空心溫酒送下。久服除根。

〔方歌〕臍連丸用黃連。研入豬腸煮酒煎。搗爛為丸溫酒服。便血肛門墜腫痊。

胡連追毒丸

胡黃連切片薑汁
拌炒研末

刺蝟皮

各一兩炙切片
再炒黃研末

麝香二分
研細

共和一處研勻。輾成為丸。如麻子大。每服一錢。食前溫酒送下。

〔方歌〕胡連追毒丸醫痔。成漏通腸服最宜。連麝蝟皮飯丸服。排膿瘻瘻好肌。

黃連閉管丸

胡黃連

兩
穿山甲香油內
炸黃

石決明

槐花各五錢
微炒

共研細末。煉蜜爲丸。如麻子大。每服一錢。空心清米湯送下。早晚服二次至重者不過四十日而愈。如漏四邊有硬肉突起者。加殭蠶二十條。炒研末入藥內。及徧身諸般漏證。服此方皆可有效。

〔方歌〕黃連閉管丸穿山。石決槐花共細研。能除漏管米湯送。蜜丸麻子大一般。

却毒湯

瓦松

馬齒莧

甘草各五錢

錢生

川文蛤

川椒

蒼朮

防風

葱白

枳殼

側柏葉各三錢

焰硝一兩

水五盞。煎三盞。先煎後洗。日用三次。

〔方歌〕却毒湯洗痔漏效。瓦松甘草蛤川椒。蔥白若風葱枳殼。柏葉同熬加焰硝。

菩提露見臍毒

月白珍珠散

十全大補湯

補中益氣湯俱見潰瘍門



坐板瘡

坐板瘡在臀腿生。形如黍豆發癢疼。暑濕熱毒凝肌肉。初宜燙洗油搽烘。(註)此證一名風疔。生於臀腿之間。形如黍豆。色紅作癢。甚則癢痛。延及谷道。勢如火燎。由暑令坐日曬几凳。或久坐陰濕之地。以致暑濕熱毒。凝滯肌肉而成。初宜羌花川椒黃蘗煎湯燙洗即消。或毒盛癢痛仍不止者。宜用油缸青布三指寬一條。香油調雄黃末一錢。攤於布上。攤之燃著。吹滅焰頭。向瘡烘之。其癢痛即止甚效。

御纂醫宗金鑑卷十

扁鵲外科心法要訣

天骨直圖



此骨直在大腿骨外側漫腫大如繩

天骨直圖



此骨直在大腿骨外側漫腫大如繩

股部

附骨疽 咬骨疽

附骨大腿外側生。在腿裏側咬骨名。體虛寒濕乘虛入。寒熱往來不微紅。痛甚徹骨難屈伸。寒濕化熱腫形。蒸灸起肉無常。潰後最忌收緊。 (註) 此二證生於大腿裏外。外間屬足三陽經。裏側屬足三陰經。附骨疽生於大腿外側。咬骨疽生於大腿裏側。由體虛之人。露臥風冷。浴後乘涼。寒濕侵襲。或房慾之後。蓋覆單薄。寒邪乘虛入裏。漸成斯病。初覺寒熱往來。如同感冒風邪。隨後筋骨疼痛。不熱不紅。甚則痛難刺。筋骨不能屈伸動轉。經久陰極生陽。寒變爲熱。熱甚腐肉爲膿。外形腫胖無頭。皮色如常。漸透紅一點。肉膿已成。凡治此證。初起寒熱往來。覺痛時輕者即服萬靈丹。重者服五積散。加半膝紅花。痛處雷火鍼灸之。發汗散寒。通行經絡。膿成開之。潰後餘治。俱按潰瘍門。又有漫腫疼痛。發於尻髀部位者宜服內托羌活湯。又有發於腿之裏側近膝者。屬足太陰脾。足厥陰肝二經部位。宜服內托黃耆湯。又有發於腿外側者。屬足少陽膽經部位。宜服內托酒煎湯。又有發於腿之正面者。屬陽明胃經部位。頭目昏眩。嘔不食。胸膈不利。心煩熱悶者。宜服茯苓佐經湯。又有發於腿之裏側。屬太陰脾經部位。骨節酸痛。四肢急。自汗短氣。小水不利。手足浮腫者。宜服附子六物湯。又有發於腿之後面。屬足太陽膀胱經部位。腿膝痺。關節重痛。掣寒發熱無汗惡寒。或兼惡風頭痛者。宜服麻黃佐經湯。又有三陰不足。外邪過盛。大遍腫。皮色不變。疼痛日增。不消不潰者。此屬虛寒骨冷。急服大防風湯。補虛逐寒。日久消之不應者。或作腫外用隔蒜片灸之起膿。艾燻有聲爲吉。灸之無聲。骨中不熱者屬逆。灸後宜服十全大補湯。如虛完活防已。或八珍湯加附子補托之。膿成眠痛。鍼之出膿自膿後順。若出白膿水或黃汁者。俱爲逆。或

論。散置後。內外治法。亦俱按癰疽漢法門。以上之證。皆由沈寒痼冷中來。外敷內服。不可用苦寒損脾胃氣等藥。犯之必至氣血冰凍。內肉腐爛。日久化爲污水不治之證也。按準繩書云。傷寒汗後餘邪。成流注。流注之虞。證成附骨疽。夫汗後流注易愈。惟失治乃爲壞證。不能復生。似不能變或附骨疽。況附骨疽。證調治可愈之證。若果數變之後。爛壞而又噴矣。又豈能復有成功乎。是流注壞證。變成附骨之證。存固不論可也。

雷火神鍼

蕪艾三錢

丁香五分

麝香二分

藥與艾採和。用夾紙一張。將藥平鋪紙上。用力密播如指粗大。收貯。臨用以紙七層。平放患處。將鍼點者一項。對患向紙捺實。待不痛方起鍼。病甚者再鍼一次。七日後。火瘡大發。其功甚效。

(方歌) 雷火神鍼攻寒濕。附骨疽痛鍼之宜。丁香二香共斷艾。藥鍼痛處功效奇。

內托黃耆湯

黃耆鹽水

當歸

木瓜

連翹去心

柴胡各一錢

羌活

肉桂

生地

黃蘗各五分

酒水各一鍾。煎一鍾。空心熱服。

(方歌) 內托黃耆歸木瓜。羌柴翹桂地蘗加。疽生膝股肝脾位。酒水煎之服最佳。

內托酒煎湯

當歸

黃耆各一錢

柴胡一錢五分

大力子

連翹去心

肉桂各一錢

升麻 黃蘗 甘草各五分

酒水各一鐘。煎一鐘。食前服。

〔方歌〕內托酒煎寒濕癩。腿外少陽附骨生。歸耆大力柴胡桂。升藥甘加酒水靈。

茯苓佐經湯

白茯苓

蒼朮米泔水炒

陳皮

白朮土炒

半夏各一錢

厚朴薑炒

木瓜 柴胡

藿香

澤瀉

葛根

甘草各五分

生薑三片。水二鐘。煎八分。食前服。

〔方歌〕茯苓佐經是陽明。經筋麻痺頸熱乘。平胃木瓜柴朮半。蒼瀉加藿葛引經。

附子六物湯

附子

甘草各一錢

防已

白朮土炒

白茯苓各八分

桂枝五分

生薑三片。水二鐘。煎八分。食後服。

〔方歌〕附子六物風寒濕。流注脾經須服之。國枝拘急骨節痛。防已朮苓苓桂枝。

麻黃佐經湯

麻黃

蒼朮米泔水炒

防風

防已

羌活

白茯苓

葛根各一錢
桂心
甘草生
細辛各五分

生薑三片。紅棗肉二枚。水二鍾。煎八分。食前服。

〔方歌〕麻黃佐經足太陽。風寒濕注水經傷。薤朮二防羌活桂。苓甘細葛棗生薑。

大防風湯
人參二錢
防風
白朮土炒
黃耆
牛膝
杜仲

當歸
熟地
白芍酒炒
川芎
羌活
甘草
附子各一錢錢製

生薑三片。水二鍾。煎八分。食前服。

〔方歌〕大防風療寒邪傷。附骨疽腫色如常。參朮黃耆牛膝仰。四物羌甘附子薑。

萬靈丹方見腫瘍門
內托羌活湯方見普部上馬癰
隔蒜灸法方見首灸灸法
十全大補湯

八珍湯俱見潰瘍門
五積散見內癰部醫癰

股陰疽

股陰疽發大股中。陰囊之側堅腫疼。七情不和憂憤致。潰後纏綿功難成。(註)此證一名赤施。發生於股合縫下。近陰囊之側。因偏在厥陰經。故名大股也。堅硬漫腫木痛。由七情不和憂思憤鬱。凝結而成。因陰經起長潰膿。俱屬遲緩。潰後尤見纏綿。收斂成功者甚少。初起與附骨疽治法同。腫潰俱按癰疽腫瘍法。



股陰疽在股內膏肓之側左右局

橫痃瘡圖



橫痃瘡在面頰或眉間其形長如角

陰瘡圖



陰瘡在額或眉間其形如球

橫痃瘡 陰瘡

橫痃瘡左陰瘡右。股內合縫腫硬者。痛牽舉丸長如線。三陰七疔疔疔。此二瘡俱生股內合縫摺紋間。

疔為橫痃。疽右為陰疽。屬三陰經。由七情鬱滯凝結而成。漫腫堅硬時疼。甚則痛牽臑丸。上及少腹。形如蛤。一兩月方能潰破其膿深可知。破後膿稠可愈。敗壞最難斂口。久必成漏。初治同附骨疽。潰按瘡門。癰門若膿水淋漓。日久有生蟲者。形類虻蟲。亦係膿深鬱久之所化也。屬逆。

伏兔疽



伏兔疽在大腿

伏兔疽

伏兔穴處忌生疽。詳硬鍼灸不相宜。寒痛徹心寒熱作。胃火毒滯潰難斂。(註)經云伏兔不宜生瘡。其伏兔乃胃經穴道。在膝蓋之上。六寸正中甲力大如掌。一堆高肉處。禁用鍼灸。始發寒熱交作。疼痛徹心。由胃火毒滯而成潰後最難收斂。初治同附骨疽。潰按瘡門。

股陽疽 環跳疽

環跳疽

環跳疽在環跳穴漫腫膚脹倒解左右同



股陽疽

股陽疽在膕外側胫骨之左右同



股陽疽生於外側。內搏於骨不變色。環跳疽腫脹難伸。俱由風濕寒凝結。(註)股陽疽生於股外側。胫尖之

後。其毒內搏官節。膿深至骨。故漫腫不變色也。環跳疽生胯骨節間之環跳穴。所以腰難屈伸。漫腫隱痛也。此二證皆由風濕寒凝結而成。屬足少陽膽經。初起宜服黃狗下頰方。更刺委中穴出黑血。其腿即能轉動。若漫腫大痛者。俱宜服內托黃耆湯。痛而筋纏者。萬靈丹汗之。痛止換服神應養真丹。偏身走注作痛。兩脚面腫者。亦服萬靈丹汗之。痛止則宜服大防風湯。倍加參朮歸耆等藥宜消之。若時時跳痛。將潰宜托裏透膿湯服之。潰後膿清稀者。宜十全大補湯。加牛膝。外以豆豉餅灸之。瘡口紫陷者。十全大補湯加附子服之。外換附子餅灸之。食少者胃弱也。諸虛皆稟於脾胃。宜香砂六君子湯減去砂仁。加當歸服之。俟胃口強盛。仍服十全大補湯。潰而反痛者。氣血虛也。治宜峻補。始終外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。但環跳疽潰破。多成腫疾。

黃狗下頰方

黃狗下頰

連舌皮毛剪下入罐內鹽泥封固鐵盞蓋口服一炷香覺烟清即止務宜在性取出色黑如炭為度若帶白色其性已過則無用矣用時研極細末用下

須宜於屠家已殺者製用
始生取特殺恐反招不祥

豌豆粉

白斂末

三味各等分。共和勻。每服五錢。溫黃酒空心調服。外以此藥用香油調敷患處。服藥之後。出臭汗及熱氣為適。

(方歌) 黃狗下頰連舌皮。入罐泥封火煨宜。豌豆粉研加白斂。酒調僻腿疽盡醫。

內托黃耆湯

大防風湯

見附骨疽

萬靈丹

見癰

神應養真丹

見頭部遊風

托裏透膿湯見頭部候腦疽

十全大補湯

香砂六君子湯俱見潰瘍門

附子餅見首卷灸法

肚門



肚門在大腿肚左右同

笑門



笑門在大腿肚左右同

壯門癰 箕門癰

壯門癰在股壯生。股內近膝箕門癰。二證皆腫焮熱痛。膀胱脾胃濕熱發。(註)此二證皆屬濕熱凝結而成。壯門癰生於大腿肚。局足太陽膀胱經。箕門癰生於股內近膝。局足太陽脾經。初起紅腫焮痛者。宜服神授衛生湯。若癰腫便秘。煩躁飲冷。脈數者熱淫於內也。宜內疎黃連湯。或雙解貴金丸下之。若腫痛空熱。脈沉而無力。胸腹脹滿。飲食如常者。宜服檳蘇散。如腫痛寒熱已止。即換服逍遙散。若腫痛色不變。寒熱長少體倦者。由肝虛濕痰下注也。宜補中益氣湯。加茯苓半夏芍藥服之。若患此入房。腫硬二便不通者。宜六味地黃丸。加牛膝車前。俟二便通利。仍服補中益氣湯。除治按癰疽腫瘍潰瘍門。

檳蘇散

檳榔 紫蘇

香附

木瓜

陳皮

大腹皮各一

錢

羌活五分

木香三分

生薑三片。葱白三寸。水二鍾。煎一鍾。空心服。

(方歌) 檳蘇腹脹氣不舒。股內箕門癰可除。香附木瓜陳大腹。木香羌活檳榔蘇。

神授衛生湯

內疎黃連湯

雙解貴金丸

俱見腫

逍遙散

見背手

補中益氣湯見

揚門

六味地黃丸

見面部

背手

腿遊風

腿遊風在遊腿生。赤腫如雲焮熱疼。榮衛風熱相搏滯。宜從出血變解清。(註)此證兩腿裏外。忽生赤腫。形如堆雲。焮熱疼。由榮衛風熱相搏。結滯而成。凡遇此證。先施砭石。放出惡血。隨服變解通聖散。次以當歸拈痛湯清解治之。外貼牛肉片。以拔風毒甚效。

當歸拈痛湯

當歸 羌活 茵陳蒿 蒼朮米泔水浸炒 防風各一錢 苦參

白朮土炒

升麻各七分 葛根

澤瀉

人參

知母

黃芩

豬苓

甘草各五分

黃蘗三分

腿遊風



水二鍾。煎八分。食前服。

〔方歌〕當歸拈痛腿遊風。羌活人參二朮升。茵陳葛草芍知藥。苦參風瀉其積苓。

雙解通聖散

治腎部
腎風



青腿牙疳

青腿牙疳何故生。只緣上下不交通。陽火炎熾陰寒閉。凝結為毒此病成。青腿如雲茄黑色。喉頑腫硬履難行。牙疳歸隔出臭血。穿破腮唇腐黑圓。(註)此症自古方書罕載其名。僅傳雍正年間。北路隨營醫官陶起麟。頗得其詳。略云。軍中凡病腿腫色青者。其上必發牙疳。凡病牙疳腐血者。其下必發青腿。二者相因而至。推其原。皆因上為陽火炎熾。下陰寒閉。以至陰陽上下不交。各自為寒為熱。各為凝結而生此也。相近內地。間亦有之。邊外雖亦有。不甚多。惟內地人初居邊外。得此證者。竟十居八九。藏中國

人。本不耐邊外嚴寒。更不免坐臥濕地。故寒濕之痰生於下。至腫舌腫。其病形如蟹片。色似茄黑。肉體硬。所以步履艱難也。又緣邊外缺少五穀。多食牛羊等肉。其熱而濕合。寒痰於胃。毒火上薰。致生牙疳。牙齦腐腫。出血。若穿腮破唇。腐爛色黑。即爲危候。邊外相傳。僅有令服馬乳之法。麟初到軍營診視。青腿牙疳之疔。亦僅知投以馬乳。聞歷既久。因悟馬腦之力。較馬乳爲效倍速。令患者服之。是夜即能發出大汗。而諸病滅矣。蓋腦爲諸陽之首。其性溫煖。且能流通故耳。兼服活絡流氣飲。加味二妙湯。宜其血氣。通其經絡。使毒不得凝結。外用之法。令惡血流出。以殺毒勢。更以牛肉片貼敷。以拔出毒毒。不數日而愈。蓋黑血出則陰氣外泄。陽氣即隨陰氣而下降。兩相交濟。上下自安也。由是習爲成法。其中活者頗多。因不敢自私。著之於書。以公於世。並將所著應驗諸方。備詳於後。

服馬乳法 治青腿牙疳。用青白馬乳。早午晚隨擠隨服。甚效。如無青白馬。雜色馬亦可。

服馬腦法 治青腿牙疳。用馬腦子一個。用竹刀挑去筋膜。放在盥內。先將馬腦攪勻。再用滾黃酒沖服。或一觔。或半觔俱可。倘一次不能服盡。分作二次。沖服亦可。

活絡流氣飲一名和申既濟湯 蒼朮 木瓜 羌活 附子生

山查肉 獨活 懷牛膝 麻黃各二錢 黃蘗 烏藥

乾薑 檳榔 枳殼各一錢五分 甘草八分

分麩炒

黑豆四十九粒。生薑三片。水四鐘。煎一鐘服渣再煎。水三鐘。煎八分。如牙疳盛。減去乾薑附子。加胡黃連二錢。龍膽草二錢。

如牙疳輕而腿疼重。加肉桂二錢。如寒熱已退。減去羌活麻黃。加威靈仙二錢。五加皮二錢。

(方歌) 活絡流氣去風強。青腿牙疳初服良。除濕清胃通經絡。加減臨時莫誤方。蒼朮木瓜羌附子。山查獨活藥麻黃。烏藥乾薑椰枳草。引加黑豆與生薑。

加味二妙湯

黃蘗生

蒼朮夾泔水

牛膝各三

檳榔

澤瀉

木瓜

烏藥各二

當歸尾一錢

錢

五分

黑豆四十九粒。生薑三片。水三鐘。煎一鐘服。再煎渣。水二鐘半。煎八分。

(方歌) 加味二妙行步難。青腿牙疳眼腫宣。藥倉牛膝歸椰枳。木瓜烏藥豆薑煎。

刺出血去

此方用三棱扁鍼。形如錐挺者。向腿之青黑處。勿論穴道。量黑之大小。鍼一分深。或十鍼。二十鍼。俱可。務令黑血流出。外以牛肉切片貼鍼眼。並黑處。次日再看。如黑處復退。仍鍼仍貼。如無牛肉。當頂刺破。用蠟拔法。

搽牙牛黃青黛散

牛黃

青黛各五

硼砂二錢

硃砂

分

人中白 龍骨各一 冰片三分

錢煨

研細末。先以甘草湯。將口漱淨。再上此藥。

(方歌) 牛黃青黛散硼砂。冰片硃砂中白加。龍骨研細爲細末。牙疳疔瘡此藥搽。

一方用黃馬肉湯燙洗。一方用羊肝切片。貼患處。一方用芥菜子搗。麵燒酒調敷患處。

青腿牙疳不治證。

一形氣衰敗。飲食不思者不治。一牙齒俱落。紫黑流血。腐潰穢臭者不治。一腿大腫腐爛。或細乾枯者

不治。

膝 癰 圖



膝癰生於膝窩紅腫石所
孔疽亦在膝下以象腫

膝癰

膝癰 疵疽

膝微腫色紅疼。疝疔如蠶色不紅。宜輒爲順堅硬逆。脾胃肝經邪所乘。(註)膝癰生於膝蓋。色紅微腫疼痛。屬氣血實疝疽亦生在膝蓋。腫大如蠶。其色不變。寒熱往來。屬氣血虛。宜輒爲順。堅硬如石者爲逆。經云。肉之小會爲竅。竅者二肘二膝四腕也。凡脾病在竅。腎有邪。其氣留於兩膝。凡筋病皆屬於節。筋乃肝之餘。故又屬肝。是以竅會有病。皆從脾胃肝三經。邪氣乘之也。始終內外治法。俱按癰疽腫毒潰瘍門。惟兩膝俱生。屬敗證不可治也。

膝眼風圖



膝眼風

膝眼風在鬼眼生。疼痛如錐腫形。下虛風濕寒侵襲。屈伸不遂濕散癢。(註)此證生於膝眼穴。又名鬼眼穴。在膝蓋之下。左右兩骨穴陷中由下焦素虛。外邪易於侵襲。先從膝眼。隱隱作疼。如風勝其痛則走注不定。寒勝則痛如錐刺。濕勝則外見腫。屈不能伸。其病在筋伸不能屈。其病在骨。動移不遂。沉寒痼冷之候也。惟在臨證宜詳辨之。初服萬靈丹溫散之。其痛即止。次服獨活寄生湯溫補之。效遲者兼用火鍼灸膝眼

穴。此種重就輕之法也。單膝生者輕。雙膝生者重。若左膝方愈。復病右膝。右膝方愈。復病左膝者。名過膝風。屬險。治法同前。

獨活寄生湯

獨活

人參

桑寄生

如真者以川續斷代之

茯苓

川芎酒洗

防風

桂心

杜仲薑汁炒去絲

牛膝

秦艽

細辛各一錢五分

當歸酒洗

白芍酒炒

熟地

甘草各一錢

生薑五片。水二鐘。煎七分。食前服。

(方歌) 獨活寄生肝腎虛。寒濕注膝腫痛居。參苓四物防風桂。杜膝秦艽甘細宜。

萬靈丹見腫瘍門

鶴膝風圖



鶴膝風其膝肿大宜厚皮色如膏

鶴膝風

鶴膝風腫生於膝。上下枯細三陰虛。風寒濕邪乘虛入。痛寒攣風筋緩濕。(註)此證一名遊膝風。一名風。痢後得者為痢風。單生者輕。雙生者嚴重。因循日久。膝腫粗大。上下股脛枯細。由是三陰經虛。濕邪乘虛而入為是病也。膝內隱痛寒勝也。筋急而變風勝也。筋緩無力濕勝也。初腫如綿。皮色不變。或熾熱。疼痛日增。無論單雙。俱宜服五積散汗之。次服萬靈丹溫散之。外敷回陽玉散膏。常服換骨丹。或丸。以驅其邪。若日久不消。勢欲潰者。宜服獨活寄生湯。或大防風湯補而溫之。痛甚加乳香。時出白漿。浮皮雖腐。腫痛仍前。不可用油藥。只宜芙蓉葉菊花葉各五錢。研末。大麥米飯拌均貼之。生肌。或用豆腐渣蒸熟搗作餅。貼之亦可。此證係外證中之敗證也。收功甚難。

換骨丹

蒼朮四兩

肉桂二兩

茄根二兩

當歸

牛膝

敗龜板

五錢
此

防風 秦芫 獨活 葶藶 羌活 蠶沙 松節 虎骨各一兩 酥炙

共用酒浸曬乾。研爲細末。酒糊爲丸。如梧桐子大。每服三錢。食前白滾水送下。

(方歌) 換骨丹歸膝拘蒼。龜板風尤獨穉羌。蠶沙松節茄根虎。蒲膝風生服最良。

蚘蚘丸 蚘蚘一兩即全 生者 白芷 桂心 安息香 阿魏以上各用酒炒熟

威靈仙 白附子童便 酒炒 當歸 羌活 桃仁童便 酒炒 牛膝

北漏蘆 地骨皮 白芍各一兩 酒炒 乳骨 沒藥各七錢五分 二味用童便酒炒

共研末。煉密爲丸。桐子大。每服三錢。空心溫酒送下。

(方歌) 蚘蚘丸治鶴膝風。芷桂安息瓊威靈。白附歸羌桃乳沒。膝漏骨皮芍密成。

五積散見內癰 部腎癰 大防風湯見皮部 附骨疽 萬靈丹 回陽玉龍膏見腫 癆門

獨活寄生湯見本部 膝眼風



下石疽

下石疽在膝上生。堅硬如石牽筋疼。皮色如常難潰斂。證由血滯外寒凝。(註)此證生於膝間。無論膝脛左右。俱可以生。堅硬如石。牽筋疼痛。腫如雞卵。皮色不變。並無焮熱。難消難潰。既潰難斂。最難。由身虛寒邪深襲。致令血瘀凝結而成。腫潰內外治法。俱與中石疽同考。但此證腫潰俱涼。宜涼化熱。見諸善證者始吉。仍見惡證者難痊。

雙腿膝兩旁腫硬如餛飩其色紫黯兩膝皆同



緩疽

緩疽血滯外寒凝。腫硬如餛飩上生。紫黯潰遲多焮熱。腫久漸腐爛皮疼。(註)此證由外寒深襲。血瘀而成。生於兩膝上。或生於膝兩旁。腫硬如餛飩。木痛日增。其色紫黯。積日不潰。證之情形。與下石疔似。惟多焮熱。腫久則腐爛肌肉皮膚。初服當歸拈痛湯。以宣通濕熱。次按中石疔治法。內宜溫補。外宜法。虛甚者十全大補湯相兼治之。

當歸拈痛湯

見股部
腿遊風

十全大補湯

見潰
瘍門

委中毒

委中毒圖



委中毒症候因本穴微紅左右皆司

委中毒在膈紋生。屈伸本硬微腫紅。膽熱流入膀胱湯。速宜活血刺委中。(註)此證生委中穴在膝後腘
 尖約紋。動脈陷中即是。約紋者指紋也。又名血疔穴。屬膀胱經。俗名腰間。經曰膈中。由膀胱積熱流
 膀胱。壅遏不行而發。本硬腫痛微紅。屈伸艱難。治宜速用活血散瘀湯。逐下惡血為效。則筋縮而皮膚
 漸書皆云。兼刺委中穴出血自消。然刺穴必兼有腰痛不能轉移者。方可刺之。即出血亦不可過多。多則令
 身搖。兩見脫色。其餘內外治法。俱按癰疽腫痛諸湯門。不可嫩痛色赤潰連者。由濕熱凝結所致。治法亦
 腫瘍潰瘍門。

活血散瘀湯

當歸尾

赤芍

桃仁去皮

大黃各二錢
酒炒

用芍

蘇木各一錢 丹皮 枳殼 麩炒 枳實 仁各一 續榔 六分

二鍾 煎八分。穴心服。渣再煎服。

〔歌〕活血散瘀委中志。皆因積熱腫其處。歸身丹皮桃根柳。枳實大黃芍蘇木。

〔五字〕右腿四指六兩指腫如高變長如魚形色紫左右同



上水魚

水魚生委中旁。摺紋兩稍痛墮昂。長若魚形紫無語。外施散血散二黃。〔註〕此證生委中摺紋兩稍。腫如高埂。長若魚形。色紫作痛。由血熱滲外其絡留。則血瘀凝結而成。外用法。向高埂上。出惡血。兼用二黃散。香油調敷甚效。

二黃散 申顏劉散見鼻

都肺風粉刺

人面瘡



人面瘡

膝肘瘡生如人面。自古傳來係孽因。流氣苦參敷貝母。從善改惡自察心。(註)此證自古傳來。乃奇病也。多生兩膝。或生兩肘。腫類人形。眉目口鼻皆具。本事方云。瘡口能飲食。施治諸藥。絕無所苦。惟敷貝母。其瘡皺眉閉口。自此日用貝母末。和水敷灌。數日瘡消結痂而愈。又諸書皆以為素積冤讎。須自清心懺悔。初宜服流氣飲。日久宜用大苦參丸。今據我用之藥。俱係辛熱疎散之品。其證或因風寒濕三氣。凝合之所化。亦未必盡由冤讎之所致也。依古施治。諒可奏效。

大苦參丸

苦參一錢

蔓荊子

赤茯苓

山藥

白芷

荊芥

防風

白附子

川芎

山梔生

何首烏

白茯苓

皂角

川烏炮

黃耆

赤芍

獨活

羌活各五錢

草烏一錢五分炮

右爲細末。麵糊和丸。如梧桐子大。每服五七十九。空心黃酒送下。不飲酒者。以茶代之。

〔方歌〕大苦參丸人面瘡。蔓苔山藥芷荆防。白附芎梔何蒺皂。川草烏耆芍獨羌。

流氣飲

方見背部
痰注發

御纂醫宗金鑑卷十一

編輯外科心法要訣

三里發



三里發在膝眼下三寸初生如牛眼其色青黑左右皆同

脛部

三里發

三里發腫牛眼形。膝眼之下冷痛凝。勞力傷筋兼胃熱。腫色青黑紫血膿。(註)此發牛膝眼下三寸。外側前廉兩筋間。初腫形如牛眼。拘急冷疼。由勞力傷筋。胃熱凝結而成。漸增腫痛。其色青黑。潰出紫血。次出稀膿。內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

腓腦發

腓腦發圖



腓腦發至腿肚正中左右皆同

腓腦發在小腿肚。憎寒煩躁積熱成。焮腫痛潰膿血吉。漫腫平塌清水凶。(註)此證發於腓腦。即小腸注也。由腎水不足。膀胱積熱。凝結而成。古方云不治。若焮亦高腫疼痛。潰出正膿而兼血者吉。為順。或漫腫平塌。紫暗譽痛。潰出清水者凶。為逆。初服仙方活命飲。潰服八珍湯。氣血虛者服十全大補湯。下虛者以桂附地黃丸補之。外治法同癰疽潰瘍門。

仙方活命飲見腫八珍湯

傷門

十全大補湯

傷門

桂附地黃丸見面部

傷門

黃蠟癰



黃蠟癰生腿肚旁。疼痛硬腫若蠟長。肝脾濕熱微紅色。順出稠膿逆敗葉。(註)此證生在小腿肚裏側。疼痛

黃蠟癰

黃蠟癰生腿肚旁。疼痛硬腫若蠟長。肝脾濕熱微紅色。順出稠膿逆敗葉。(註)此證生在小腿肚裏側。疼痛硬腫長有數寸。形如泥餅。其色微紅。由肝脾二經濕熱凝結而成。應明潰破出稠膿者為順。若出污水敗膿者屬逆。初服五香流氣散。其次內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

五香流氣散

金銀花二兩

小茴香

殭蠶炒

羌活

獨活

連翹去心

煇萸仁各一兩

五錢

藿香五錢

丁香二錢

木香

沉香


甘草各一

錢

分爲十劑。水煎隨病上下服。

(方歌) 五香流氣消黃毒。流注結核也能療。丁木荷沉殭霍草。銀花羌獨翹枯萋。

青蛇毒生腿肚之下長三寸結腫紫塊頭天屬細左右皆同



青蛇毒

青蛇毒生腿肚下。形長三寸紫塊殭。腎與膀胱濕熱結。急鍼刺頭血出良。(註)此毒又名青蛇便。生於小腿肚之下。形長二三寸。結腫紫塊殭硬。憎寒壯熱。大瀉不食。由腎經素虛。膀胱濕熱下注而成。蛇頭向下者毒輕而淺。急刺蛇頭一半寸。出紫黑血。諸鍼孔搽拔疔散。外敷離宮錠。內服仙方活命飲。加黃藥牛膝木瓜。亦有蛇頭向上者。毒深而惡。急刺蛇頭一二寸。出紫黑血。鍼孔用白降。細管插入五六分。外貼巴膏。煎敷太乙紫金錠。內服麥蘘丹。俟毒減退。次服仙方活命飲調和之。若毒入腹。嘔吐。腹痛。神昏。脈躁。俱為逆證。

救疔散見齒部 離宮錠

仙方活命飲

麥蘘丹見腫 白降丹

牙疔

揚門

已音

太乙紫金錠見胸部
脾發疔

接骨發疔圖



接骨疔發於下後腿相接處其初起時腹內如打鐵聲之松而為疔

接骨發

接骨發如核桃形。腿肚之下硬脹疼。色紅漫腫宜速潰。遲損筋脈缺踵行。(註)此發生於腿肚之下。接骨之上。脛骨與足後跟骨相接處。故名接骨發。屬膀胱經濕熱凝滯而成。初如核桃。其硬如物打磕碰之狀。各眼微疼。色紅漫腫。膿宜速潰。遲則膿毒損筋。筋脈受傷。腿缺踵行。踵行者不能全是踐地。惟恃足指著力而行也。始終內不治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

附陰疽圖



附陰疽生肉際之上三寸紅腫如雞卵左右皆同

附陰疽

附陰疽發內踝上。初如紅粟日增疼。堅硬赤腫漸如卵。三陰交會濕熱蒸。(註)此證生於內踝骨之上三寸。初如紅粟。疼痛日增。堅硬赤腫漸如雞卵。係三陰交會濕熱積聚而成。始終內外治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。但三陰交係純陰之穴。收斂遲緩。調養不可不慎。

內踝疽 外踝疽



內踝疽 外踝疽

內外踝疽濕寒成。血滯氣滯阻於經。三陽外側三陰裏。初用宜通蒜灸靈。(註)此二證生兩是踝近腕之處。在內踝者名走緩。又名鞋帶疽。在外踝者名脚拐毒。著內踝骨屬三陰經脈絡也。外踝骨屬三陽經脈絡也。俱由濕寒下注。血滯氣阻而成。其堅硬漫腫皮色不變。時時隱痛。難於行立者。初服瘡科流氣飲。加牛膝木瓜防己以宣通之。外用蒜片灸法以消之。發三陰經者服內託黃耆湯。發三陽經者。服內託羌活湯。若虛弱欲作膿。跳痛無時者。俱服十全大補湯。外敷烏龍膏。其腫潰治法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

瘡科流氣飲

見背部
痰注發

內託黃耆湯

見股部
附骨疽

內託羌活湯

見臀部
上馬癰

十全大補湯見潰瘍門 烏龍膏見腫瘍門

穿踝疽圖



穿踝疽係裏名瘻屬陽虛不紅

穿踝疽

穿踝疽由脾濕寒。裏發串外踝骨間。有頭屬陽陰腫。潰出清水廢疾纏。(註)此證由脾經濕寒下注。血滯氣阻而成。先從裏踝骨發起。串及外踝。致令裏外通腫。以有頭為陽易破。若無頭腫無頭。為陰難潰。其證初起寒熱往來。有紅兼兼有熱也。宜服煎防敗毒散。皮色不變者。服萬靈丹。其餘腫潰治法。俱同內外。踝疽。若潰出清水。或發方不寒。纏綿日久者。必成廢疾難治。

煎防敗毒散

見頭部

萬靈丹

見腫瘍門

濕毒流注附瓜藤纏

濕毒流注



本藥專治濕毒

二證初如牛眼次如魚鱗色黃白乾裂宜速全愈

濕毒流注腿脛生。頂如牛眼漫腫形。紫輕黑重膿水漬。寒濕暑熱在腠凝。(註)此證生於腿脛。流行不定。或發一二處。瘡頂形似牛眼。根脚漫腫。輕則色紫。重則色黑。潰破伏膿水。浸漬好肉。破爛日久不斂。由暴風疾雨。寒濕暑火。侵在腠理而肌肉爲病也。初覺急服防風通聖散。加木瓜、牛膝、防己、蒼朮消之。若腿脛至晚發熱者。宜服當歸拈痛湯。加牛膝。外治初搽三妙散。腫痛全消。換搽輕粉散斂之即效。若邊脛而發。卽名瓜藤纏。結核數枚。日久腫痛。腐爛不已。亦屬濕熱下注而成。治法同前。

輕粉散

輕粉一錢

黃丹

黃蘗

密陀僧

高末茶

乳香各三 麝香五分

錢

共研末。先用葱煎湯洗患處。再搽此藥。

（方歌）輕粉黃丹藥陀僧。末茶乳麝共研成。濕毒流注腫瘡證。化腐除濕又止疼。

防風通聖散見頭部

疔瘡

當歸拈痛湯見股部

腿遊風

三妙散見腹部

臍癰

腎氣遊風圖



腎氣遊風

腎氣遊風腿肚生。紅腫如雲火烘疼。證由腎火蘊於內。膀胱氣滯外受風。（註）此證多生於腎虛之人。腿肚紅腫。形如雲片。遊走不定。痛如火烘。由腎火內蘊。外受風邪。膀胱氣滯而成也。初服紫蘇流氣飲。次服

檳榔丸。外用豆腐研調黃蘗末。貼敷之甚效。

柴蘇流氣飲 紫蘇 黃蘗 木瓜 檳榔 香附 陳皮

川芎 厚朴薑炒 白芷 蒼朮米泔水浸炒 烏藥 荊芥 防風

甘草 獨活 枳殼麩炒

等分薑三片。棗一枚水煎服。

〔方歌〕紫蘇流氣藥瓜榔。香附陳芎厚芷蒼。烏藥荊防甘獨枳。腎氣遊風服最昌。

檳榔丸 檳榔 枳殼各二兩 麩炒 木瓜一兩 五錢 木香一兩 大黃四兩

共研細末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。空心白滾湯送下。黃酒送下亦可。
〔方歌〕檳榔枳殼木瓜痛。木香大黃煉蜜丸。腎氣遊風紅腫痛。空心水送自然痊。

廉瘡

廉瘡當分內外廉。外廉易治內難痊。外屬三陽濕熱毒。內屬三陰虛缺纏。法宜搜風除濕熱。外貼三香夾紙錢。(註)此證生在兩脛內外廉骨。外廉屬足三陽經濕熱結聚。早治易於見效。內廉屬三陰有濕。兼血分虛熱而成。更兼廉骨皮肉澆薄。難得見效。極其綿纏。初發光癢後痛。紅腫成片。破津紫水。新起宜貼三香膏。色紫貼夾紙膏。日久紫色紫黑。貼解毒紫金膏。又年久頑。廉瘡皮黑黑下陷。臭穢不堪者。用蜈蚣錢法。去風毒。化腐。蓋貼黃蠟膏。漸效。初服黃耆丸。日久者服四生丸。下元虛冷者宜虎潛丸。常服甚效。但脛脛在至陰之下。生瘡者當戒勞動發物其證可愈否則難痊。



三香膏

輕粉

乳香

松香各等分

共爲末。香油調稠。用夾紙。一面以鍼密刺細孔。將藥搽紙內。先以葱湯洗淨患處。將藥紙有孔一面。對瘡貼之。三日一換。

(方歌) 三香輕粉乳松香。研末油調紙內藏。葱湯洗患方貼藥。初起腫瘡用此良。

夾紙膏

黃丹炒 輕粉 兒茶 沒藥 雄黃 血竭 五倍子炒

銀朱

枯礬各等分

共爲末。量瘡大小。剪油紙二張。夾藥於內。紙周圍用麵糊粘住。紙上用鍼刺孔。先將瘡口用葱椒煎湯洗淨。拭乾。然後貼上。以帛縛之。三日一洗。再換新藥。

(方歌) 夾紙膏貼腫瘡破。黃丹輕粉兒茶沒。雄黃竭倍銀朱礬。油紙夾貼腐可脫。

解毒紫金膏

明淨松香

皂礬各一兩
椒赤

共研極細末。香油調稠。先用葱艾甘草。煎湯洗淨患處。再搽此藥。紙紙蓋住。以縲布紮緊。三日一換。此藥又治楊梅結毒。腐爛作臭。膿水淋漓。用之甚效。

(方歌) 解毒紫金膏。瘡爛。明淨松香皂礬。二味研末香油調。葱艾草湯先洗患。

蜈蚣錢

蜈蚣

甘草

獨活

白芷各一錢

桐油二兩。將藥煎滾。先以米泔水洗净瘡。水和白麵作圈。圍在瘡之四邊。勿令洩氣。將腿放平。以匙挑油。漸漸乘熱加滿。待油溫取下。已後風毒自散。腐肉漸脫。其功甚速。

〔方歌〕蜈蚣錢治久癩瘡。皮黑下陷臭難當。桐油煎草獨活芷。白麵圍瘡油燙強。

黃蠟膏

血竭

赤石脂煨

龍骨各三錢

錢煨

共爲細末。香油一兩。入血餘藥上大一團。煨枯去滓。再入黃蠟一兩。白膠香三錢。溶化盡。離火下血竭等末。攪勻候冷。磁罐盛之。用時搽作薄片。貼瘡上。絹帛縛定。三日後翻過貼之。

〔方歌〕黃蠟血餘竭白膠。石脂龍骨入油調。蜈蚣錢後此膏蓋。肌肉能生痛自消。

黃耆丸

黃耆

川烏頭炮去皮

赤小豆

蒺藜炒去刺

地龍去土

川楝子鹽水泡去核

茴香炒

防風各一兩

烏藥五錢

石爲細末。酒煮稠糊爲丸。如梧桐子大。每服十五丸。空心溫酒送下。鹽湯亦可。婦人用醋煎滾。候溫送下。

〔方歌〕黃耆丸治癩瘡起。川烏赤豆共蒺藜。地龍川楝茴香炒。防風烏藥酒糊宜。

四生丸

地龍炒

白附子

僵蠶炒

草烏去皮

五靈脂各等分

失炮

右爲細末。米糊爲丸如梧桐子大。每服三四十九丸。食前茶酒任下。

(方歌) 四生。瘡久纏綿。骨節多疼舉動難。地龍白附殭蠶炒。草烏靈脂米糊丸。

虎潛丸

敗龜板四兩
酥炙

知母

黃蘗二味
酒炒

熟地各三
兩

牛膝酒蒸

白芍酒炒

陳皮各二兩
鹽水潤

瑣陽酒潤

當歸各一兩五
錢酒洗

虎骨一兩
酥炙

共研末。羯羊肉酒煮爛搗。膏和入藥末內。爲丸如梧桐子大。每服三錢。空心淡鹽湯送下。冬月加乾薑一兩。

兩。

(方歌) 虎潛丸療筋骨痿。下元虛冷精血虧。龜板瑣陽膝虎脛。知藥芍陳熟地歸。

鱧魚漏圖



鱧魚瘻形如漏瘻破爛中有孔數黍深如鐵眼兩脛皆同

腿漏

腿漏生在腿肚間。孔如鑽眼津水綿。頗似濕疥濕熱發。艾湯煎洗膏瘡痊。(主)此登由濕熱而成。初起類
濕瘡。生於腿肚。癢痛相兼。破津黃水。綿綿不已。其孔深如鑽眼。復受寒風。侵入窟孔。以致時
法宜艾藥老葱熬湯。每日先熏後洗。瘡口發熱覺癢時。即貼黃蠟膏。收斂而愈。

黃臘膏見膿瘡

四風醫圖



四風生於兩腿間。形如風癬風邪襲。搔破成瘡癢難堪。

四風風

四風風生腿脚間。每月一發甚難痊。形如風癬風邪襲。搔破成瘡癢難堪。(註)此證生在兩腿間。每
一發。形如風癬。風風刺刺。癢難堪而成。宜艾藥老葱熬湯。每日先熏後洗。法宜大麥一升。熬湯先熏後洗。

大搖三妙散。滲濕殺蟲。其瘡即止。緩緩取敷。

三妙散 見腹部
諸癰

風疽圖



風疽生兩脛脛骨曲凹之處紅腫皮損

風疽

風疽生脛曲凹中。癢搔皮損津汁膿。風邪留於血脈內。煩熱昏冒肌腫疼。(註)此證生脛骨及曲凹之處。癰
蠶皮損。津黃汁極其黏濃。由風邪留於血脈。相搏而成。因其根深。故有疽名。其則身體煩熱昏冒。而肌肉
透紅。更增腫疼。宜服防風湯。外抹青竹大豆油即效。

防風湯

防風

附子製

麻黃蜜炙

白芷

木通

柴胡

當歸焙

桔梗 甘草炙 羌活各五分

共爲粗末。水一鍾半。煎八分。澄去滓。食後服。臨睡再用一服。如欲出汗。俟空心頭煎落淨。併一服之。後食稀粥生薑。食畢被覆臥取汗避風。

〔方歌〕防風湯療風熱搏。留於血脈津汁破。附子麻黃芷木通。柴胡歸桔甘羌活。

青竹大豆油

青竹筒截三尺長。徑一寸半。筒內裝黑豆一升。以穀糠馬糞二物。燒火當竹筒中炙之。以磁盤兩頭。接取油汁。先以清米泔水。和鹽熱洗患處。拭乾即塗豆油。不過三度極效。

〔方歌〕青竹筒截三尺長。徑要寸半黑豆裝。穀糠馬糞燒炙筒。風疽搔癢油塗良。

足部

足發背

足發背屬膽胃經。七情六淫下注成。詳別善惡分順逆。細辨疽癰定死生。(註)此證一名足跗發。凡足背雖行三陽。而偏在膽胃二經居多。證由七情內鬱。或兼六淫外傷而成。經云三背不宜生瘡。惟足背多筋多骨。肉少皮薄。又在至陰之下。發瘡疽者。升發遲慢。所以謂爲險候也。宜別五善七惡而分順逆。發背者大瘡之通名也。須當細辨或疽或癰。順逆既分。則生死定焉。初宜服仙方活命飲。及隔蒜灸之。令瘡速潰。餘與肺癆潰瘍門治同。

足發背圖



足發背定背左右同

仙方活命飲

見腫瘍門

隔蒜灸法

見首卷灸法



湧泉疽

湧泉疽發在足心。腎虛濕滯多屬陰。速破潰淺癰可治。黑陷為疽命難存。(註)此證生在足心湧泉穴。一足心發。又名穿痛天蛇。俗名刺穿板。屬足少陰。由腎經虛損。兼濕熱下注而成。若十四日內即潰膿。淺癰。猶可調治。初服仙方活命飲。外用神燈照法。虛甚膿生遲者。十全大補湯。潰後兼用桂附地黃丸服之。餘治按癰疽腫瘍潰瘍門。若黑陷不疼。二十一日之內不潰膿者為疽。屬陰敗之證難救。

仙方活命飲

見腫瘍門

神燈照法

見首卷

十全大補湯

見潰瘍門

桂附地黃丸

見面部腫瘍

脫疽

脫疽圖



脫疽是積色黑旁有紅暈十指司

脫疽多生足指間。黃腫如粟黑爛延。腎竭血枯五敗證。割切仍黑定歸泉。(註)此證多生足指之間。手指生者間或有之。蓋手足十指。乃藏府枝幹。未發疽之先。煩躁發熱。顛瀕消渴。日久始發此患。初生如粟。黃腫一點。皮色紫暗。猶如煮熟紅棗。黑氣浸漫。腐爛延開。五指相傳。甚則攻於脚面。痛如湯潑火燃。其臭氣雖異香難解。由膏粱藥酒。及房術丹石熱藥。以致陽精煽惑。添火猖狂。蘊蓄於藏府。消燦陰液而成。斯時血死心敗。皮死肺敗。筋死肝敗。肉死脾敗。骨死腎敗。此五敗證。雖遇靈丹。亦難獲效。初起宜服解毒生肌湯。外用大麥米糞散。拌芙蓉葉菊花葉各五錢。貼之止痛。消之不應者。必施割法。須患者情懇將死生付於度外。遵古法毒在肉則割。毒在骨則切。然割切之法。須宜早施。乘其未及延散時。用頭髮十餘根。繫患指本節盡處。透繫十餘轉。毋令毒氣攻延好肉。端用蠟餅放於初起黃腫頂上。加艾灸之。至肉枯瘡死

爲度。次日病指盡黑。方用利刀。尋至本節縫中。將患指徐順取下。血流不止者。用如聖金刀散止之。餘腫以離宮錠擦之。次日倘有黑氣未盡。單用麝酥餅研末撒之。用陀僧膏蓋貼。黑氣自退。患上生膿。兼貼生肌玉紅膏。及生肌等藥。肌生護骨斂口。此爲吉兆。內宜滋腎水。養氣血。俾脾胃神之劑。如陰陽二氣丹。清神散。金液戊土丹。俱可服之。若內外始終無變證。十中可保三四。若割切之後。復生黑氣。漏節侵漫好肉。疼痛尤甚者。屬逆。此證初起下痛者。宜離離霹靂火灸之。其餘滋補浸沈等法。俱按癰疽腫瘍潰瘍門。按諸書論脫疽。單生於是大指。而別指生者。俱名救疽。此非確論。然脫疽偏生於屬陰經之指者居多。屢經如此。後之學者。宜詳審焉可也。

解毒濟生湯

當歸

遠志去心

川芎

花粉

柴胡

黃芩

犀角鎊

麥冬去心

知母

黃蘗

茯神

金銀花各

錢

紅花

牛膝

甘草各五

分生

水二鍾。煎八分。入童便一椀。食前服。

如生手指間。去牛膝加升麻。

(方歌) 解毒濟生歸遠芎。花粉柴芩犀麥冬。知蘗茯銀紅膝草。脫疽初起煩熱攻。

如聖金刀散

松香七兩

生白礬

枯白礬各一兩

五錢

共研細末。磁罐收貯。臨用時撒於患處。

(方歌) 如聖金刀散刀傷。血流不止撒之良。白礬枯礬松香等。共研爲末罐收藏。

陰陽二氣片

天門冬去心 麥門冬去心

元參

湯泡去粗皮以
三味名場膏

五味子炒

人中白生

黃蘗各兩

甘草生

澤瀉

枯白礬

青黛各三錢

水片一錢

各研細末。同天門冬等膏。加煉蜜少許。再搗千餘下。糝硬得中。丸如梧桐子大。硃爲衣。每服六十九。

童便人乳各一酒鍾。空心送下。安睡一時。

〔方歌〕陰陽二氣月脫疽。腎水枯乾燥熱敷。天麥元參甘瀉味。中白冰礬藥黛宜。

清神散

綠豆粉一兩

牛黃三分

甘草節五錢

冰片五分

硃砂三錢

右共爲極細末。每服一錢。洗竹葉燈心。煎湯調服。

〔方歌〕清神散治脫疽發。悶亂心煩調服佳。豆粉牛黃甘草節。研加冰片共硃砂。

金液戊土丹

茯神

胡黃連

烏梅肉

人中黃

五味子各一

兩

硃砂

雄黃

硝石

遠志去心

石菖蒲各三

錢

牛黃

冰片各一

錢

各研細末。共和一處。再研千轉。於端午七夕。或春秋二分。冬夏二至吉辰。在淨室中。先將烏梅肉搗

膏。和入藥末內。加煉蜜少許。搗千餘下。糝硬得中爲丸。每丸重一錢。金鉞爲衣。每服一丸。人乳童便

各一酒鍾。隨病上下。化服。修和之時。服藥之際。忌婦人僧尼。孝服雞犬等見之。此藥用蠟封固收藏。不洩藥味。愈久愈效。

(方歌) 金液艾土茯苓黃。硃雄硝遠片石菖。胡連梅肉中黃味。耑治脫疽發背瘡。

雌雄霹靂火

雌黃

雄黃

丁香各二

麝香一分

錢

右爲細末。用斫艾茸二錢。將藥末搓入艾內。作豌豆大丸。安患上灸之。毋論瘡癩。以肉焦爲度。如毒已經走散。就紅暈盡處。排炸灸之。痛則至癢。癢則至痛。以瘡紅活爲妙。

(方歌) 霹靂火治陰疽方。脫疽不疼灸更強。雌黃丁麝雄黃末。斫艾茸搓藥末良。

蟾酥餅

卽蟾酥丸作餅見疔瘡門

離宮錠

見腫瘍門

陀僧膏

生肌玉紅膏俱見潰瘍門

敦疽圖



敦疽是指色紅下指

敦疽

敦疽多生足指疼。腫色紅活出血膿。血燥精竭無敗色。膏梁房勞脾腎經。(註)此證多生於足指。而手指亦間有生者。由膏梁太過則損脾。房勞太過則傷腎。脾既損則血生少。腎既傷則精必竭。更兼濕熱癰盛而成。初起黃粟小粒。痛如湯潑火燃。其色紅活。腫無黑暈。潰破有膿。腐無敗色。此屬血脈未死之候。然此證雖無敗色。亦由臟腑發出。未可視為小毒也。法宜急服滋陰救燥。補血理脾之藥。初服解毒濟生湯。六味地黃湯。潰服人參養榮湯。桂附地黃湯。外初宜蟬蛻拔毒散塗之。將潰貼蟾酥餅。兼貼巴膏。潰腐之後。換生肌玉紅膏。生肌斂口初終禁用灸法。患者宜清心寡慾。調理庶免變證。

解毒濟生湯

脫疽

六味地黃湯

見面部雀斑

桂附地黃湯

見面部頰斑

人參養榮湯

巴膏

生肌玉紅膏

其見潰瘍門

蚪蚪拔毒散

見腫瘍門

蟾酥餅

即蟾酥丸作餅見疔瘡門

甲疽圖



甲疽疔指甲旁肉高突白紅十指同

甲疽

甲疽多因剔甲傷。甲長侵肉破成瘡。怒肉高突痛難忍。消痰化努效非常。(註)此證因剔甲傷肉。或剔甲傷肉。或甲長侵肉。穿窄小靴鞋。以致甲旁癰腫破爛。時津黃水。努肉高突。疼痛難忍不能著衣。原係好肉受傷。宜用鹽湯浸洗。外敷華陀累效散。白膏藥蓋貼。努肉消盡即愈。

華陀累效散

乳香

綱砂各

輕粉五分

橄欖核三枚燒存性

黃丹三分

共研細末。香油調敷。

〔方歌〕華陀累效敷嵌甲。黃丹輕粉乳礪砂。橄欖核。碗同碾細。香油調濃患處搽。

白膏藥見潰

足跟疽圖



足跟疽生足掌跟紫腫形如兔咬左右同

足跟疽

足跟疽生脚掌根。狀如兔咬紫紅嫩。陽蹻積熱潰難斂。初宜隔蒜艾灸勤。〔註〕此諸生足跟。俗名脚掌根。由臟腑積熱。汗出涉水。速行傷筋而成。初腫紅紫疼痛。潰破膿水淋漓。狀如兔咬。經云兔嚙狀如赤豆。至骨急治。遲則害人。蓋謂毒之深惡也。屬足太陽膀胱經。穴名申脈。即陽蹻脈發源之所。反係腎經所過之路。瘡口久潰不合。陽蹻脈氣不能沖發。腎氣由此漏洩。以致患者益虛。初起宜隔蒜片灸之。服仙方活命飲加肉桂生肌。潰後宜補中益氣湯。人參養榮湯。桂附地黃丸。隨證滋補治之。餘按癰疽潰瘍門。海藏云。兔齧久

不收斂。用鹽湯洗之。白朮研末撒之。兩日一易。謹戒一切勞碌即效。

隔蒜灸法

見首卷灸法

仙方活命飲

元種場門

補中益氣湯

人參養榮湯

俱見潰場門

桂附地黄丸

元種場門

廣譽告前兩旁小如粟餘三有同



廣譽 四淫

廣譽勢小足旁生。四淫在足上下
源。三陰虧損為疽重。三陽濕熱
發癰輕。(註)癰橫云。發於是
上下名曰四淫。其狀大癰。急治
之。百日死。發於足旁。名曰厲
癰。其狀不大。急治之。去其黑
者。不消輒益不治。百日死。此

以生定治之出上下且八知癰左右同

四淫



二證俱由是三陰經虧損為。疽者重。若兼是三陽經濕熱下注而成癰者輕。若紅腫疼痛。潰破有膿。腐脫無黑
氣浸漫屬濕熱偏盛。順證易治。若微紅微腫。潰出膿無
水。屬陰氣凝結不能化膿。險證難治。若黑暗漫腫。痛
下潰膿。煩熱作渴。小水淋漓為陰敗惡證屬逆。四淫邊
沿。屬癰疽致疽。初俱宜仙方活命飲外。宜隔蒜灸以宣
壅。毒將潰。宜服人參養榮湯。兼六味地黃丸以滋補之。
若色黯不痛。即用桑柴烘法。以行壅滯助陽氣更宜十全
大補湯。金桂附地黃丸。壯脾滋水。治之或可成功。若
妄用苦寒劫伐之藥。多致不救。外治法同致疽。

仙方活命飲見腫瘍門 隔蒜灸法見首卷灸法 人參養榮湯 十全大補湯俱見腫瘍門

六味地黄丸見面部雀斑 桑柴烘法見首卷 桂附地黄丸見面部頰場

臭田螺



臭田螺生於了起有比大如象在左右

臭田螺

臭田螺瘡最纏綿。脚丫搔癢起白斑。搓破皮爛腥水臭。治宜清熱滲濕痊。(註)此證由胃經濕熱下注而生。了破爛。其患甚小。其癢搓之不能解。必搓至皮爛。津潤臭水覺癢時。其癢方止。次日仍癢。經年不愈。其纏綿。法宜甘草薏苡仁煎湯洗之。嚼細茶葉塗之。乾則黃連膏潤之。破爛甚者。宜用鵝掌皮煨存性。研香油調敷甚效。

黃連膏見鼻部

鼻衄

牛程躩



牛程躩生版底似此硬硬白者不能着地左右同

牛程躩

牛程躩因奔走急。脚熱著水寒風襲。氣滯血凝起硬硬。法宜鴿糞滾湯漬（註）此證生於足跟。及足掌皮內。頭硬腫起。高梗色黃。疼痛不能行履。由脚熱著冷水。或遇寒風襲於血脈。令氣滯血凝而成。法宜用盆一箇。內安新磚。磚上安鴿糞。糞上合罩籬以脚踏罩籬上。次以滾水從旁冲入蒸之。浸漬之。冷則易之。或用新磚燒紅。韭菜汁澆之。將病足踏於其上燙之。早治或有消者。久則破裂。膿水津流。每日夾溼水淨洗。或搽牛角散。四圍頑皮浮起。剪之搥搽生肌玉紅膏。月白珍珠散。生肌斂口白愈。

牛角散

松香

輕粉

水龍骨即舊船底

牛角尖燒灰

油石灰

共為末。牛骨髓調搽。

(方歌) 牛角散治牛程躑。久破膿水流不痊。松香輕粉水煎膏。牛角燒灰須用尖。

生肌玉紅膏

月白珍珠散

俱見潰瘍門

土栗圖

土栗生足跟旁。如棗栗色黃腫。如琥珀石石同。



土栗

土栗生在足跟旁。腫若琉璃亮色黃。行路崎嶇傷筋骨。急服仙方合五香。(註) 此證又名琉璃疽。生在足跟之旁。形如棗栗。亮而色黃。腫若琉璃。由行崎嶇之路。勞傷筋骨血脈而成。急服五香湯。及仙方活命飲。宜通變滯。膿熱減之。膿少而多水者。以蛇膽膏貼之。餘按癰疽潰瘍治法。

五香湯

乳香

檀香

丁香

沉香

青木香各三錢半

水二鍾。煎八分服之。

(方歌) 五香湯善治土粟。行路勞傷血脈積。乳蕈丁沉香木香。煎服舒擊功效極。

仙方活命飲見腫瘍門

陀僧膏見腫瘍門

冷疔圖



本疔定跟成疔如瘰癧起或向胞左右向

冷疔

冷疔濕寒足跟生。疼痛徹骨紫疔形。黑爛深孔流血水。氣機神燈照法靈。(註)此證生在足跟。由濕寒凝結而成。形如瘰癧。起紫白。疼痛徹骨。漸生黑氣。腐爛孔深。時流血水。氣機經久不斂者。宜神燈照法照之。鐵粉散敷之。初服內補十宣散。次按潰瘍治同。

鐵粉散

生鐵粉

鐵粉如無用黑鉛四兩鐵杓化開頂水中定取出再化再傾以鎔化盡為度去水取末三錢

黃丹飛

輕粉

松香各一 麝香一分

各研細末。共和一處。再研勻。將患處以新湯洗去。血水腐臭。香油十指搽於患上。油紙蓋之。繫之。
〔方歌〕鐵粉散醫足冷疔。能使黑腐肌肉生。黃丹輕粉松香麝。香油調搽紙蓋靈。

神燈照法見首 內補十宣散見胸部

疔癰癰

脚氣瘡圖



脚氣瘡在膝下足上腿脛腫出黃水結黃痂左右同

脚氣瘡

脚氣瘡在足膝生。濕熱相搏風氣乘。壯熱腫痛津黃水。心神煩躁犀角靈。
〔註〕此瘡生於足膝。由濕熱內搏。滯於膚腠。外為風乘。不得宣通。故令脚膝生瘡。瘡癰作腫。破津黃水。形類黃水瘡。惟身禮壯熱。

心神煩躁。經久難瘥。宜服犀角散。外以漏蘆湯洗之。兼服龍骨散甚效。

犀角散

犀角屑

天麻

黃耆

枳殼麩炒

白鮮皮

黃芩

防風

羌活

白蒺藜各七錢五分

檳榔一兩

烏梢蛇二兩酒浸

甘草五錢

灰

右研細末。每服八錢。水一鍾半。生薑五片。煎一鍾。去滓不拘時溫服。

〔方歌〕犀角散醫脚氣瘡。天麻者根白鮮榔。烏蛇芍草風羌活。蒺藜粗末引加薑。

漏蘆湯

漏蘆

甘草生

槐白皮

五加皮

白斂各一兩五錢

白蒺藜四兩

共為粗末。每用五兩。水八盞。煎五盞。去滓淋洗。

〔方歌〕漏蘆湯甘槐白皮。五加白斂白蒺藜。脚氣瘡疼癢津水。熬湯洗患散濕宜。

龍骨散

白龍骨研

輕粉各二錢五分

檳榔一錢研

豬糞

新瓦上焙乾再入火中燒之存性取出研末五錢

共研勻。先以口含蠶水。或溫盛湯。洗令瘡淨見肉。却用香油調藥。隨瘡大小敷之。未愈再敷。
〔方歌〕龍骨散能去濕腐。脚氣瘡敷自然無。輕椰豬糞香油入。久遠惡瘡用亦除。

田螺脫圖



田螺脫生足掌起如豆表膜左右同

田螺脫

田螺脫在足掌生。裏濕外寒蒸鬱成。豆粒黃腫悶脹硬。破汁臭水腫爛疼。(註)此毒多生足掌。而手掌見。白晝紅濕熱下注。外寒閉塞。或因熱體涉水。濕冷之氣。蒸鬱而成。初生形如豆粒。黃腫悶脹。硬疼能著地。連生數粒。皮厚難於自破。每度三五。成片濕爛。甚則是疔俱腫。寒熱往來。法宜苦參葛蒲野艾湯。熱洗。次用線錢將殼挑破。放出臭水。加味太乙膏貼之。又將脫皮剪去。宜用石膏輕粉等分研末撒之。可以加味太乙膏蓋貼。內明解毒瀉脾湯。更有經年不愈者。係下部濕寒。以金寶腎氣丸常服甚效。

解毒瀉脾湯

石膏

牛蒡子炒研

防風

黃芩

蒼朮炒

甘草生 木通

山梔各一錢
生研

水二鍾。燈心二十根。煎八分。服之。

(方歌) 解毒瀉脾芩麥子。風膏蒼朮草通梔。田螺肉起宜煎服。清熱疎風又去濕。

加味太乙膏見潰瘍門

金匱腎氣丸

即桂附地黄丸加車前子
牛膝各一兩見面部頰瘍

肉刺證由纏脚生。或著窄鞋遠路行。步履艱難疼痛甚。玉簪根搗貼塗靈。(註)此證生在脚指。形如雞眼。故俗名雞眼。根陷肉裏。頂起硬凸。疼痛步履不得。或因纏脚。或著窄鞋遠行。皆可生之。法宜貼加味太乙膏滋潤之。或用紫玉簪花根。搗爛貼塗。以油紙蓋之。又地骨皮紅花等分研細。香油調敷俱效。

加味太乙膏見潰瘍門

御纂醫宗金鑑卷十二

編輯外科心法要訣

丹痧圖



發無定處

疔瘡

五臟皆可發疔瘡。現於形體細考詳。若論陰陽分上下。欲知經藏辨何方。疔名火焰發心經。往往生於臂指中。心作煩時神恍惚。痛癢麻癢黃紅。毒發肝經名紫燕。此患多於筋骨見。破流血水爛串筋。指青舌強神昏亂。黃鼓由於脾發毒。多生口角與顛骨。紅黃光潤紅色纏。麻癢硬癩發嘔吐。毒發肺經名曰刃。白癩頂硬根突峻。易傷易陷多損腮。咳吐痰涎氣急甚。從來黑癩發腎經。黑斑紫癩硬如釘。為毒極甚毒家

骨。驚悸沉昏目露睛。以上五疔應五臟。又有紅絲疔一樣。初如小瘡漸發紅。最忌紅絲攻心疔。凡治疔證貴乎早。三陰三陽更宜曉。在下宜灸上宜鍼。速醫即愈緩難保。(註)此數證俱名曰疔。蓋疔者如釘之狀。其形小。其根深。隨處可生。由恣食厚味。或中蛇蠍之毒。或中疫死牛馬猪羊之毒。或受四時不正疫氣致生是證。天疔瘡者。乃火證也。迅速之病。有朝發夕死。隨發隨死。三五日不死。一月半月亦必死。此係祇府之乖逆。性清之激變。節候之寒溫肅殺。且毒中有淺深也。若一時失治。立判存亡。有名爲火焰疔者。多生於唇口及手掌指節間。初生一點紅黃小點。痛癢麻木。甚則寒熱交作。煩燥舌強。言語疎忽。此屬心經毒火而成也。有名爲紫蟲疔者。多生於手足腰肋筋骨之間。初生便作紫點。次日破流血水三日後串筋爛骨。甚則目紅甲青。邪視神昏。睡語驚惕。此屬肝經毒火而成也。有名爲黃鼓疔者。初生黃點。光亮明潤。四畔紅色纏繞。多生口角腮頰眼胞上下。及太陽正面之處。發時便作麻癢。重則惡心嘔吐。肢體木痛。寒熱交作。煩渴乾。此屬脾經毒火而成也。有名爲白刃疔者。多生白。頭硬根突。破流脂水。癢痛兼作。多生鼻孔。兩手易腐易陷。重則腮損咽焦。欬吐痰涎。鼻掀氣急。此屬肺經毒火而成也。有名爲黑醫疔者。多生耳竅牙縫。胸腹腰腎偏僻之處。初生黑斑紫點。毒串皮膚。漸攻肌肉。頑硬如丁。痛徹骨髓。重則手足青紫驚悸沉困。輒陷孔深。目睛透紫。此屬腎經毒火而成也。以上五疔。本於五臟而生。又有紅絲疔。發於手掌及骨節間。初起似小瘡。漸發紅絲。上攻手。令人寒熱往來。甚則惡心嘔吐。治遲者紅絲攻心。常能壞人。又有疔疔未發而腋下先呿腫無頭。次腫陰囊。突兀如筋頭。令人寒熱拘急。燃熱疼痛。又有內疔。先發寒熱腹痛數日間忽然腫起一塊如積者是也。又有羊毛疔。身發寒熱。狀類傷寒但前心後心有紅點。又如疹形。視其斑點。色紫黑者爲。色淡紅者爲。以上諸證。初起俱宜服蟾酥丸汗之。青勢。增寒壯熱

仍作者。宜服五味消毒飲汗之。如發熱口渴便閉。胡沉實者。邪在裏也。宜服黃連解毒湯。加生大黃一錢五分。蔥頭五個搗之。凡證輕者。宜服化疔內消散。若疔毒將欲走黃。急服疔毒復生湯。已走黃者。令人心煩昏憤。急用七星劍湯以救之。若手足冷。六脈暴絕者。係毒氣閉塞。元氣不能宣通。先宜蟬酥丸。毒服木香流氣飲行氣。其脈自見。若疔毒誤灸。煩躁謔語者。乃逼毒內攻也。宜服解毒大青湯。若潰後餘毒未盡。五心煩熱者。宜服人參清神湯。鍼後出膿之時。氣虛驚悸者。宜服內託安神散。若攻利太過。以致發渴。六脈虛大者。宜服補中益氣湯。若發汗之後。汗不止。熱不退。瘡不疼。便不利者。此屬裏虛。宜服八珍湯加黃香麥冬治之。凡疔潰後。不宜補早。雖見真虛。只可平補。忌用溫補之藥。外治用蟬鍼灸。亦當循其次第。書云。疔瘡先刺血。內毒宜汗瀉。禁灸不禁鍼。怕膿不怕鐵。初覺貴手早治。十證十全。稍遲者十全五六。夫治者十壞八九。初發項以上者。三陽受毒。必用鉞鍼刺入瘡心四五分。挑斷疔根。令出想血。隨用立馬回疔丹。或蟬酥條。插入孔內。外以巴膏蓋之。如項以下生者。三陰受毒。即當艾灸以殺其勢。灸之不痛。亦須鉞刺出血。插蟬酥條。旁睡以錐宮鉞塗之。如旁腫頑硬。推之不動。用鉞亂刺。頑硬之處。令多出惡血。否則必致走黃。挑法先用鉞幹。將毒頂焦皮刮開。鉞入疔根。堅硬如鉞者爲順。若鉞刺入。絲縷如瓜瓞而不知痛者爲逆。百無一生。凡挑疔根先用刀割黑血。再挑刺至鮮血出。以如痛爲止。隨填拔疔散令滿。以萬應膏蓋之。過三四時。撥去舊藥。易以新藥。若藥乾無水不痛者。此挑法未斷疔根也。再深挑之。必以上藥知痛。藥入水流爲準。三四日後瘡頂乾燥。以琥珀膏貼之。令疔根託出。換九一丹撒之。黃連膏抹之。外蓋白膏藥生肌斂口。若初起失治。或房勞夢遺損氣以致毒氣內攻。走黃不住者。其瘡必塌陷。急當隨走黃處。按經找尋。有一芒刺直豎。即其疔苗。急當用鐵鉞刺出惡血。即在刺處。用艾壯灸三壯。以宣餘毒。若身而漫

腫。神昏悶亂。乾嘔心煩作渴。遍身起紅抽痞者。俱爲逆證。惟紅絲疔於初起時。急用磁鍼於紅絲盡處。較斷出血。尋至初起瘡上挑破。即用蟾酥條插入。萬應膏蓋之。隨服黃連解毒湯。再疔內二疔。不用挑法。先以蟾酥丸含化令盡。以冷水漱去毒涎。再用三九喇葱白三寸。裹藥黃酒塗下。蓋臥出汗。少時無汗。再飲熱酒催下之。仍無汗。係毒氣滯結。急用霹靂火法。令汗出。毒熱隨之而解。次用雙解貴金丸下之自效。若疔內二疔。初起牙關緊急者。用蟾酥丸三五粒。葱頭煎湯。研化灌之。俟稍甦。治法如前。至羊毛疔。先將紫黑斑點。用衣鍼挑出。如羊毛狀。前後心共挑數處。用黑豆蕎麥。研粉擦之。即時汗出而愈。一法用明雄黃末二錢。青布包紮。蘸熱酒於前心擦之。自外圈入內。其毛即奔至後心。再於後心擦之。其羊毛俱拔出於布上。埋之。忌茶水一日。再諸疔部位形色。亦有急緩。生於頭項胸背者最急。生於手足骨節之間者稍緩。一疔之外。別生一小瘡。名曰應候。四圍赤腫而不散漫者名曰護場。四旁多生小瘡者名曰滿天星。有此者。無此者急。疔證初起。至四五日間。由白色而至青紫色。疔頭潰膿。形似蜂窩。內無七惡等證者爲順。若初起似疔非疔。灰色頂陷如魚臍。如蠶斑。青紫黑陷。軟陷無膿。內見七惡等證者爲逆。凡疔毒俱由火毒而生。忌服辛熱之藥。恐反助其邪也。忌敷寒涼之藥。恐逼毒攻裏也。再膏藥不宜早貼。惟在將潰已潰時貼之。呼膿長肉。以避風寒。初潰時忌用生肌藥。恐毒未除。反增潰爛。生項以上者。屬三陽經。不宜灸。若火日生疔。亦禁灸。犯之或爲倒陷。或至走黃。俱忌椒酒、雞魚、海味、鵝肉、猪首、辛辣、生冷等物。氣怒房勞諸香。並孝服經婦僧道雞犬等項。犯之必致反覆慎之。

蟾酥丸

蟾酥二錢酒化

輕粉

銅錄

枯礬

寒水石煨

蟾螬

丁香

沒藥

麝香各一錢

硃砂三錢

雄黃二錢

蝸牛二十一個

以上各爲末。稱準於端午日午時、在淨室中先將蝸牛研爛。同蟾酥和何鞠粉。方入各藥。共搗極勻。丸如菜豆大每服三丸。用葱白五寸。令患者嚼爛吐於手心內男用左手女用右手將藥丸裹入葱泥內。用無灰熱酒一茶鍾送下。被蓋約人行五六里路。病者出汗爲度。甚者再用一服。如外用之法。搽條作餅。隨證用之。修合時忌婦人雞犬等見之。

(方歌) 蟾酥丸治諸疔毒。初起惡瘡皆可逐。外用化腐又消堅。內服驅毒發汗速。硃砂彈粉麝雄黃。銅絲粘蟾寒水入。膽礬乳沒共蝸牛。丸如綠豆葱酒服。

五味消毒飲

金銀花三錢

野菊花

蒲公英

紫花地丁

紫背天葵子各一錢二分

水二鍾。煎八分。加無灰酒半鍾。再滾二三沸時熱服。渣如法再煎服。被蓋出汗爲度。

(方歌) 五味消毒瘰癧疔。紫花野菊蒲公英。紫花地丁天葵子。煎加酒服發汗靈。

化疔內消散

知母

貝母去心研

穿山甲炙研

蚤休

白及

乳香 天花粉 皂刺 金銀花 當歸 赤芍

甘草各一錢生

酒水各一鍾。煎一鍾。去渣。量病上下服之。

(方歌) 化疗內消知貝甲。蚤休及乳草天花。皂刺銀花歸芍酒。疔證毒輕服更嘉。

疔毒復生湯 金銀花 梔子生研 地骨皮 牛蒡子炒研 連翹去心

木通 牡蠣炒 生軍 皂刺 天花粉 沒藥

乳香各八分

酒水各一鍾。煎一鍾。食遠服。不能飲者。只用水煎。臨服入酒一。和服亦效。脈實便秘者。盡付礮。
(方歌) 疔毒復生欲走黃。頭面腫浮毒內傷。銀梔骨芍翹通翹。軍刺天花沒乳香。

七星劍 蒼耳頭 野菊花 豨薟草 地丁香 半枝連各三錢 蚤休二錢

麻黃一錢

用好酒，酌量至一盞。滷去渣熱服。被蓋出汗爲度。

〔方歌〕七星劍嘔熱寒。疔毒走黃昏憤添。麻黃蒼耳菊穉菴。地丁香蚤半枝連。

木香流氣飲 當歸 白芍酒炒 川芎 紫蘇 桔梗 枳實麩炒 烏藥 陳皮

半夏製 白茯苓 黃耆 防風 青皮各一錢 大腹皮 檳榔 枳殼麩炒 澤瀉

甘草節 木香各五分

生薑三片。紅棗肉二枚。水煎服。下部加牛膝。

〔方歌〕木香流氣宣氣滯。歸芍芍蘇桔枳實。烏藥二陳耆大腹。風榔青枳瀉煎之。

解毒大青湯 大青葉 木通 麥門冬去心 人中黃 梔子生研

桔梗 元參 知母 升麻 淡竹葉 石膏各一錢

水二鍾。燈心二十根。煎八分。食遠服。大便秘加大黃。悶亂加燒入糞。

〔方歌〕解毒大青過麥門。中黃梔子桔元參。知升竹葉石膏根。疔瘡誤灸毒內侵。

人參清神湯 人參 陳皮 白茯苓 地骨皮 麥門冬去心 當歸 白朮土炒

黃耆 遠志各一錢去心 柴胡 黃連 甘草各五分炙

水二鍾。梗米一撮。煎八分。食遠服。

〔方歌〕人參清神疔毒潰。陳峇地骨麥冬歸。朮耆柴遠黃連草。益氣除煩熱可推。

內託安神散 人參 麥門冬去心 茯神 黃耆 白朮土炒 元參 陳皮各一錢

石菖蒲 甘草炙 酸棗仁炒研 遠志去心 五味子各五分研

水二鍾。煎八分。臨服入硃砂末三分和勻。食遠服。

〔方歌〕內託安神多驚悸。疔瘡鍼後元氣虛。參麥茯菖耆朮草。元參棗遠味陳皮。

立馬回疔丹 輕粉 蟾酥酒化 白丁香 硃砂各一分 乳香六分 雄黃 硃砂

麝香各三分 蜈蚣一條 金頂砒五分註末卷

共為細末。麵糊搓如麥子大。凡遇疔瘡。以鍼挑破。用一粒插入孔內。外以膏蓋。追出膿血疔根為效。

〔方歌〕立馬回疔輕蟾酥。白丁香乳麝雄珠。蝮蜈金頂砒研末。疔瘡用此根自除。

九一丹 石膏九錢 黃靈藥一錢

煨

共研極細。撒於患處。

〔方歌〕九一丹醫疔破後。根除用此把膿搜。煨石膏對黃蘗藥。清熱生肌患自瘳。

靈巖火

鵝卵石燒紅安鐵杓內。杓安桶內。以醋一盞。令患者將患處覆桶上。厚衣密蓋。勿令沖氣。藥氣微再添紅石。加醋淬之。瘡頭及腫處。使熱氣盡行汗出。其毒滅半。

黃連解毒湯見耳部黑疔

補中益氣湯

八珍湯

巴膏

萬應膏

白膏藥

萬靈藥俱見潰瘡門

離宮錠

雙解貴金丸俱見腫瘍門

拔疔散

見牙齒牙疔

珀琥膏見頭部髮際瘡

黃連膏見鼻部鼻瘡

流注圖



流注

流注原有證數般。濕痰瘀風汗後寒。發無定處連腫漫。潰近骨節治難痊。此證本由脾胃弱。留結肌肉骨間。〔註〕此證名雖無殊。其原各異。蓋人之血氣。每日週身流行。自無停息。或因濕痰。或因瘀血。或因風濕。或因傷寒。汗後餘毒。或因熱後受寒。稽留於肌肉之中。至令氣血不行。故名流注。諸家書云。流注流行。注者住也。發無定處。隨在可生。初發漫腫無頭。皮色不變。凝結日久。微熱漸痛。透紅一點。方且膿熟。即宜用鍼開破。若濕痰化者。膿色黏白。瘀血化者。膿色金黃。黏水風濕化者。膿色稀白如豆汁。汗後餘邪化者。膿色或黃或黑。稀膿穢臭。以上四證。發在肉厚處可愈。發在骨節及骨空處難痊。蓋寒受寒化者。膿色稀白而腥。其水中有豬脂水油之狀。此為敗漿膿也。諸書雖有治法。終成敗證。初起濕痰所中者。木香流氣飲瀉之。產後瘀血所中者。通經導滯湯通活之。跌撲傷損瘀血所中者。宜散瘀高根湯

之。風濕所中者。萬靈丹五積散加附子溫散之汗後餘邪發腫者。人參敗毒散散之。房慾後外寒侵襲者。初宜服五積散加附子。次服附子八物湯溫之。又有室女嬌嬌。鬱怒傷肝。思慮傷脾而成者。宜服歸脾湯加香附青皮散之。此皆流注初起。將成之法。一服至三四服皆可。外俱用烏龍膏或沖和膏敷貼。皮肉不熱者。雷火神鍼鍼之。經者即消。重者其勢必潰。將潰時俱宜服託裏透膿湯。已潰俱服人參養榮湯。久潰膿水清稀。飲食減少。不能生肌收斂者。俱宜服調中大成湯。久潰膿水清稀。精神怯少。漸成漏證者。俱宜服先天大造丸。潰後其餘治法。俱按癰疽潰瘍門參考。

通經導滯湯 當歸 熟地 赤芍 川芎 枳殼 麩炒 紫蘇 香附 陳皮

丹皮 紅花 牛膝各一 獨活 甘草各五分節

水二鐘。煎八分。入酒一杯食前服。

(方歌) 通經導滯產後疾。收血流瘀腫痛積。四物枳蘇香附陳。丹皮獨草紅花註。

散瘀葛根湯 葛根 川芎 半夏製 桔梗 防風 羌活 升麻各八分 細辛

甘草生 香附 紅花 蘇葉 白芷各六分

水二鐘。葱三根薑三片。煎八分。不拘時服。

〔方歌〕 散瘀葛根瘀血凝。皆因跌撲流注成。芍半桔風羌細草。香附紅花蘇芷升。

附子八物湯 附子製 人參 白朮土炒 當歸 白茯苓 熟地 川芎

白芍各一錢 木香 肉桂 甘草各五分
酒炒 分炙

水二鍾。薑三片。紅棗肉一枚。煎八分。食遠服。

〔方歌〕 附子八物醫流注。房驚傷陰外寒入。木香肉桂八珍湯。薑棗水煎食遠服。

調中大成湯 人參 白朮土炒 白茯苓 黃耆 山藥炒 丹皮 當歸身

白芍酒炒 陳皮各一錢 肉桂 附子各八分分製 遠志去心 藿香 縮砂仁 甘草各五分分炙

水二鍾煨薑三片。紅棗肉二枚。煎八分。食遠服。

〔方歌〕 調中大成四君香。山藥丹皮歸芍宜。遠志縮砂陳桂附。能醫流注潰膿稀。

木香流氣飲上疔 瘡門 萬靈丹 烏龍膏 沖和膏俱見腫 瘡門 五積散見內癰 瘡門

人參敗毒散即荊防敗毒散減去 荊防見項部腦疽 歸脾湯見乳部乳 中結核 雷火神鍼見股部 附骨疽 託裏透膿湯見額部 侵腦疽

人參養榮湯見潰瘍門

先天大造丸見腎部
鶴口疽



瘰癧

五癭屬陽六癭陰。癭別血氣肉石脂。瘰氣血肉脂肪。惟脂開潰不傷身。癭蒂細小紅不緊。瘰根漫大高肉新。證由內外風水氣。療治須當戒怒嗔。(註) 癭壅三證。發於皮膚血肉筋骨之處。癭者如纒絡之狀。瘰者隨氣留注。故有是名也。多外因六邪。葉衝氣血凝滯。內因七情。憂悲怒氣濕痰瘀滯。山嵐水氣而成。皆不痛癢。癭證屬陽。色紅而高突。皮寬不急。蒂小而下垂。瘰證屬陰。色白而漫腫。皮嫩而光亮。頂小而根大。癭有五種。肉色不變者。名肉癭。其筋脈現露者。名筋癭。若赤脈交絡者。名血癭。隨喜怒消長者。名氣癭。堅硬推之不移者。名石癭。五癭皆不可破。破則膿血崩潰。多致傷坐。瘰有六種。堆硬紫色。名紫青筋。盤曲若蛇

剝狀者。名筋瘤。又名石瘤。微紫微紅。軟硬間雜。皮膚中隱隱若紅絲糾纏。時時牽痛。誤有觸破。而血流不止者。名血瘤。或軟如綿。或硬如鐵。皮色如常。不緊不寬。始終只似覆肝。名肉瘤。軟而不堅。皮色如常。隨喜怒消長。無寒無熱者。名氣瘤。日久化膿流出。又名膿瘤也。形色紫黑。堅硬如石。或按之推之不移。昂昂緊貼於骨者。名骨瘤。軟而不硬。皮色淡紅者。名脂瘤。即粉瘤也。六瘤之形色如此。凡癭多生於肩項兩頤。癭則隨處有之。夫肝統筋。怒氣動肝。則火盛血燥。致生筋癭。筋瘤宜清肝解鬱。養血舒筋。清肝蘆薈丸主之。心主血。暴戾太甚。則火旺逼血沸騰。復被外邪所搏。致生血癭。血瘤宜養血涼血。抑火滋陰。安效心神。調和血脈。芎藭二母丸主之。脾主肌肉。鬱結傷脾。肌肉澆薄。土氣不行。逆於肉裏。致生肉癭。肉瘤宜理脾胃。疏通戊土。開鬱行痰。調理飲食。加味歸脾丸主之。肺主氣。勞傷元氣。醜裏不密。外寒搏之。致生氣癭。氣瘤宜清肺氣。調經脈。理旁傷。和榮衛。通氣散堅丸主之。腎主骨。恚怒傷腎。暴火鬱遏。骨無榮養。致生石癭。骨癭。石榴海藻玉壺湯主之。骨癭尤宜補腎散堅。行瘀利竅。調元腎氣丸主之。癭瘤諸證。用藥緩緩消磨。自熱縮小。若久而膿血崩潰。滲漏不已者。皆爲逆證。不可輕用刀鍼洪破。以致出血不止。立見危殆。惟粉瘤可破。其色粉紅。多生耳項前後。亦有生於下體者。全係痰凝氣結而成。治宜研錢破去脂粉。以白降丹搽子插入數次。將內膜化淨。用生肌玉紅膏貼之自愈。又有一種黑砂癭。多生臀腿。腫突大小不一。以手攝起。內有黑色即是。亦用鍼刺出黑砂有聲。軟硬不一。又有髮癭。多生耳後髮下寸許。軟小高突按之不痛。亦用鍼刺之。粉髮齊出。又有虱癭。發後其癢徹骨。聞破出虱無數。內有極大一虱出。其虱方盡。黑砂髮虱三癭。外治皆同粉瘤之法。其口方收。又有蟲癭。每生脇下。治法當按癭疔腫瘍潰瘍門。但本憂思化成。甚難獲效。諸證形狀各異。皆五臟濕熱邪火濁瘀。各有所感而成。癭非正象。

清肝蘆薈丸 當歸 生地酒浸搗膏 白芍酒炒 川芎各一兩 黃連 青皮 海粉

牙皂 甘草節 昆布酒洗 蘆薈各五錢

寫爲糊末。神麵糊丸。如梧桐子大。每服八十丸。白滾水量病上下。食前後服之。

(方歌) 清肝蘆薈怒傷肝。筋結癭瘤血燥原。四物黃連青海粉牙皂甘昆麵糊丸。

芩連二母丸 黃芩 黃連 知母 貝母去心 當歸 白芍酒炒 羚羊角銹

生地 熟地 蒲黃 地骨皮 川芎各一兩 甘草五錢生

右爲末。側柏葉煎湯。打寒食麵糊爲丸。如梧桐子大。每服七十丸。燈心煎湯送下。

(方歌) 芩連二母血癭癭。血沸寒凝微紫紅。歸芍羚羊生熟地。蒲黃地骨草川芎。

加味歸脾丸 香附 人參 酸棗仁炒 遠志去心 當歸 黃耆 烏藥 陳皮

茯神 白朮土炒 貝母各一兩 木香 甘草各三錢去心

右爲細末。合蘇胡根皮四兩。煨黃芩末糊爲丸。如桐子大。每服六十九。食後白滾水送下。
〔方歌〕 加味歸脾香附參。紫遠歸香烏藥。陳茯神虎薑木香貝。消腫除癰脾腎伸。

通氣散堅丸 人參 桔梗 川芎 當歸 花粉 黃芩 枳實炒 陳皮

半夏製 白茯苓 膽星 貝母去心 海藻洗 香附 石菖蒲 甘草各一兩生

右爲細末。荷葉煎湯爲丸如豌豆大每服一錢。食遠燈心生薑煎湯送下。

〔方歌〕 通氣散癰堅氣癰。參桔芍歸花粉。枳芩枳二陳星貝藻。香附石菖患漸瘳。

海藻玉壺湯 海藻洗 陳皮 貝母去心 連翹去心 昆布 半夏製 青皮

獨活 川芎 當歸 甘草各一錢節 海帶五分洗

水二鍾。煎八分。量病上下。食前後服之。

〔方歌〕 海藻玉壺湯石癰。陳貝連翹昆布青。獨活芍歸甘海帶。化硬消堅最有靈。

調元腎氣丸 生地四兩酒 山萸肉 山藥炒 丹皮 白茯苓各二兩 澤瀉

煨搗膏

麥冬去心 人參 當歸身 龍骨煨 地骨皮各兩 知母童便炒 黃蘗各五錢鹽水炒

搗膏

縮砂仁

木香各三錢

共研細末。鹿角膠四兩。老酒化開。加蜂蜜四兩同煎。滴水成膏。和丸。每服八十丸。空心溫酒送下。忌蘿蔔火酒房事。

(方歌) 調元腎氣縮砂石。六味地黃知麥參。歸厚木香龍地骨。骨痛服此又滋陰。

白降丹

生肌玉龍膏

世見潰瘍門



參骨疽

骨疽由腎虛源。瘡久腫潰復受寒。落草患此胎元結。名爲骨膿治一般。(註)此證一名爛骨。一名朽骨。

無論老少。皆有生者。多在腮膠牙床。眼胞頰下。手足腿膊等處。有因腎虛之人。生瘡久潰。腫硬不退。口不收斂。外被寒邪襲入。與膿毒凝結。借人之氣血。化成多骨者。又有初生萍草。身肉之中。按之有如脆骨。由胎元受之。精血交錯而致。迨其人長大後。必於脆骨所生之處。突然發腫生疽。及潰破後。多骨脫出。其口方收。有多骨出之不休者。名曰骨脹。難愈。以上二因。治法皆同。俱宜隔附子餅支灸。以宣寒瘴。令骨速脫。蓋骨屬腎。遇寒則瘴。故從熱治也。若朽骨內含。或出臭膿。或出涎泡。宜撒黃靈藥。陀僧膏蓋貼。令朽骨出盡。其口始易斂也。腎虛微寒者。服六味地黃丸。虛而寒甚者。桂附地黃丸。常服可愈。由胎元結成者。稟賦身虛。不可強取骨。候自破則取之。

降子餅灸治見首卷

灸法

黃靈藥

陀僧膏俱見潰瘍門

六味地黃丸見面部

雀斑

桂附地黃丸見面部

雀斑

結核圖



結核

結核即同栗核形。皮裏膜外結凝成。或由風火氣鬱致或因怒火濕痰生。(註)此證生於皮裏膜外。結如果核。堅而不痛。由風火氣鬱。結聚而生。初發令人寒熱往來。有表證者。荊防敗毒散解之。表既解。即服運翹消毒飲。若濕氣凝結者。宜行氣化痰以五香流氣飲。千金指迷丸。辛涼之藥治之。其核自消。若誤投苦寒之劑。必致潰破。或服之而反甚者。其勢將潰。不可強消。以耗其氣。宜用透膿散。潰而不愈者。屬氣虛。宜用補中益氣湯平補之。外治按癰疽腫瘍潰瘍門。

千金指迷丸

半夏四兩

白茯苓

枳殼子三兩

風化硝三錢

共研氣末。河水煮糊為丸。如梧桐子大。每服二錢。白滾水送下。

〔方歌〕千金指迷丸半夏。茯苓枳殼硝同研。河水煮糊作成丸。消堅去核結痰化。

荆防敗毒散 見頭部

腦疽

連翹消毒飲 見背部

酒發

五香流氣飲 見腰部

黃腫

透膿散 見腫

瘰癧

補中益氣湯 見痰

瘰癧

消腫聖藥伸縮動寒濕腫淡紅



瘰癧

瘰癧皆由外感生。伸縮動處每成形。漫腫無頭寒熱作。四肢沉重渴煩增。〔註〕此證體虛之人。感受天地不

正之厲氣而生。非由內作也。多生於手足掌心。或腕肘臂下。伸縮動處。疼如痛風。而兼漫腫無頭。其色淡

紅。增寒發熱。四肢沉重煩渴。初起宜服萬應丹與汁解表。腫仍不消。必欲作膿者。宜託毒消毒散。兼

琥珀蠟礬丸開服。已潰者。按癰疽潰瘍門治法。

萬靈丹

託裏消毒散

琥珀蠟礬丸



癰疽

癰疽本由烟瘴起。小如粟豆。大如梅李。初發紅點。次變黑。腐爛筋骨。疼無已。(註)此證一名蛇瘡。用廣烟瘴地面有之。初起紅點。次變黑色。其命小者如粟豆。大者如梅李。隨處可生。疼痛厥心不止。腐爛筋骨。潰破膿如豆汁。今日拭淨。次日膿汁復滿。愈而復發。初起宜貼紫羅餅。或真交作。宜服黍米寸金丹。或奪命丹亦可。紅腫遊走不定者。宜用鏡塗之。兼神燈照。重照之。破後脾虛。食少作嘔者。補中益氣湯。加黃連。麥冬。補而不膩。或出稀水。膿汁者。並。

蟾酥餅見疔瘡

黍米寸金丹

離宮錠見腫毒

奪命丹見背部陰陽二氣痛

補中益氣湯見潰瘍門

神燈法照見首卷

烏白癩圖



白癩發在偏身皮毛變黑上起若癰疹

烏癩發在偏身皮毛變白上起若癰疹

烏白癩

烏白癩由中惡風。犯觸忌害亦能成。麻痺微有刺不痛。除風養血即收功。(註)此二證。俱由惡風侵襲皮膚血分之間。火鬱耗血。及犯觸忌害而成。有烏白二種。烏者初覺皮毛變黑。發若癰疹。瘡若蟲行。手足頭麻。鍼刺下痛。目視物若垂絲。心常驚而妄語。凡飲良言語之時。開口出氣而鳴。宜服蠟皮丸。外擦大黑神膏。白癩皮色漸變。白斑語聲嘶夏。目視不明四肢項疼。身重火熱。心常懊惱。手則不縱。背脊拘急。肉如錢

剉。鼻生息肉。腫生白沫。宜服白花蛇散。外擦螫膏。一證俱常飲苦參酒。白癩便秘者。先宜服醉仙散。次服通天再造散。利下惡物即效。

蝟皮丸

蝟皮燒存 蝟蛇頭燒存 魁蛤各一枚 紅娘子去頂足翅 螻蛄焙乾

蝨蟲去頭

水蛭糯米炒熟 蜘蛛焙 螻蛄各三個去頭足翅 桂心 大黃 黃連

龍骨煨研

麝香研 汞即水銀 川椒各五錢炒 芒硝 石膏各一兩煨 穿山甲三片炙

枯白礬

滑石研水飛 甘遂各錢五分與胡麻同炒以胡麻熟爲度去麻用甘遂 蜈蚣一條半炙 附子二枚泡去皮

巴豆去皮膜

雷丸名五十粒

右爲細末。煉密爲丸。如小豆大。每服一丸。滾白水送下。空心臨臥。各一服。如未覺。每服加一丸。如室中痛。卽有蟲下。細觀形狀皆死矣。痛多減一丸。痛少服二丸以瘳爲度。此藥乃攻毒取蟲之峻劑。非灼灼藏府有蟲毒。及精神可勝攻下者。不可輕服。

(方歌) 蝟皮膚黑成烏癩。心驚視物若垂臺。瘡似蟲行手足掉。紅娘魁於木翠嚼。蝟蝟黃蝟蝟甲。黃連龍骨礬蝟膏。川椒滑附蜈蚣巴豆。雷丸甘遂共整整。

大黑神膏

頭髮雞子大一團

川芎

黃連

黃蘗

防己去皮

川烏

升麻

藜蘆各五錢

巴豆

杏仁十粒

用豬脂油二觔。將藥煤至頭髮化盡為度。撈去渣。再用礬黃、雄黃、白礬、鉛粉各五錢。松脂一塊。如雞

子大。同研末。入油內攪勻。先以熱鹽湯洗淨患處。次搽藥。日三次。勿令入口。

〔方歌〕大黑神膏烏廩塗。髮中神藥巴川烏。雌雄巴豆繫松脂。鉛粉升麻香藜蘆。

白花蛇散

白花蛇酒浸

槐子

天麻

枳殼麩炒

蔓荊子

防風

羌活

威靈仙

白鮮皮

晚蠶蛾

各一兩去頭足翅

甘草五錢

共研細末。每服二錢。溫酒調下。不拘時。日用二服。

〔方歌〕白花蛇散體多熟。刺痛聲嘶白腐疔。槐子天麻鮮枳蔓。風光威草晚蠶蛾。

盤蛇膏

盤蛇十四枚

大蝮蛇

一條頭尾全者晒乾

黃酒七銀。置某人瓶內。用糠火煨酒至一銀。濾去渣。收貯。每用薄薄塗於患上。

〔方歌〕盤蛇白蝮風。蝮蛇黃酒入磁瓶。糠火煨酒取塗患。以毒攻惡癩自平。

苦參酒

苦參五觔

露蜂房五兩

刺蝟皮一具

酥炙

共研粗末。用水三斗。煎湯至一斗。去渣。侵細麴五觔。炊黍米三斗。拌如常醱法。酒熟壓去糟。每於
前酒飲一小盞。

〔方歌〕古參酒治烏白癩。露蜂房與刺蝟皮。煎湯浸麴炊黍米。醱酒飲之惡疾離。

醉仙散

通天再造散俱見大麻風

大風病發在偏身麻不交生白屑以手起紅蚊髮眉脫落

大風麻圖



大風風

麻風總感毒癘成。其因有三五損風。五疔毒見真惡癘。初病能守或可生。(註)此證古名爲風。癘風者有毒之風也。經云脈風成爲癘。又云癘者有榮實熱腐。其氣不清。故使其鼻柱壞而色敗。皮膚癢潰。毒風客於眼而不去。名曰癘風。今人呼爲大風。一因風土所生。中國少有。此證惟烟瘴地面多有之。一因傳染或遇生麻風之人。或父母夫妻。家人遞相傳染。或在外不潔。或葦坑房屋。床鋪衣被不潔。一因自不調攝。洗浴乘涼。希圖快意。或露臥當風。睡眠濕地。毒風入血脈。其因名雖有三。總屬天地瘴氣。感受不覺。未經

泄。積久而發。遍身麻木。次起白屑紅斑。蔓延如絮。形若蛇皮。脫落成片。始發之時。自上而下者順。下而上者逆。漸來可治。頓發難醫。風毒入裏。花生爲蟲。蟲蝕五臟。則形有五損。肺受病。先落眉毛。肝病而起紫爛。腎受病。腳底先穿。脾受病。遍身如癩。心受病。先相其目。此爲險證。又有五死證。木如麻。仁者爲皮死。割切不痛者爲肉死。潰爛無膿者爲血死。手足脫落者爲筋死。鼻梁崩塌。膜弦斷裂。唇翻聲啞。爲骨死。若五死見一。即爲敗惡不治之候也。此證初覺。即服萬靈丹汗之。次宜神應消風散。追風散。磨丸。次第服之。牙齦出血。用黃連貫衆等分。煎湯漱之。外搽頑癩祛風散。兼用地骨皮、荊芥、苦參、各二兩。河水煎湯。浸浴熏洗。若遇損敗之證。在上部則服醉仙散。在下部則服通天再造散。若鼻梁塌壞。換肌散服之。患者稍露虛象。即以補氣滋榮湯服之。兼用何首烏酒飲之。若能清心寧慾。戒口早治。或宜生。若口味不能清淡。色慾不能斷絕。即愈後仍不免再發。終於不救。

神應消風散

全蝎

白芷

人參各一兩

兩

右爲細末。每用二錢。勿食鹽飯。次日空心溫酒調服。覺身微躁爲效。

(方歌) 神應消風散。身麻白屑起斑紅。鐵正人參各一兩。空心酒服麻木消。

追風散

錦紋大黃

川鬱金

皂角刺

各一兩

兩

共研細末。每用五錢。加大風子油一錢五分。酒調一錢。五更空心。溫酒調服。直待辰時。又如前調藥。熱煎服之。以蜜解口。切不可臥。良久痛止。若不效。以稀粥調之。如第一日服消風散。第二日服

此藥。第三日服磨風丸。周而復始。又如此服之。瘦弱者十日內追風散只用一服。老弱者勿服。
(方歌) 追風散用川鬱金。皂刺大黃研末勻。初服消風次用此。風油消酒調服神。

磨風丸

豨薟草

牛蒡子

麻黃

蒼耳草

細辛

川芎

當歸

荆芥

蔓荊子

防風

車前子

威靈仙

天麻

何首烏

羌活

獨活各一兩

(共爲細末。酒打麵糊爲丸。如梧桐子大。每服六七十丸。溫酒送下。日服一服。
(方歌) 磨風丸豨薟麻黃。蒼細芎歸荊蔓防。車威天麻何羌獨。追風散後用此方。

類聚祛風散

硫黃

寒水石

枯白礬

貫衆各二兩

蛇床子一兩

朴硝五錢

共研細末。臘月豬脂搗爛調敷。

(方歌) 類聚祛風散硫黃。寒水枯礬蛇床。貫衆細辛豬脂搗。搽。風。

醉仙散

牛蒡子

炒胡麻

枸杞子

蔓荊子

苦參

白蒺藜 防風 花粉各五錢

共研細末。每服一錢。加輕粉一分二厘。研勻。茶清調服。晨午晚各一服。五七日後。先於牙縫內出臭涎。渾身癢悶如醉。然後利下膿血惡物臭氣。病根乃去矣。

〔方歌〕 醉仙上部癩風重。牛蒡胡麻枸蔓荊。苦參蒺藜防花粉。服加輕粉用茶清。

通天再造散

大黃一兩煨 皂角刺一兩五錢 鬱金五錢 白牽牛六錢頭末半生半炒

共研細末。每服二錢或三錢。早晨面東。醇酒調下。常日利下惡物。或膿或蟲為效。

〔方歌〕 通天再造治癩風。敗證先從下部攻。鬱金大黃牽牛刺。晨服酒調面尚東。

換肌散

烏梢蛇 白花蛇 蚯蚓各一兩去土 細辛 木鱉子

白芷

天麻連莖者 赤芍 蔓荊子 當歸 威靈仙 荆芥穗

甘菊花

不灰木 紫參 苦參 參沙 何首烏 石菖蒲

木賊

天門冬去心 川芎 白蒺藜 甘草炙 胡麻仁 蒼朮水漬火炒

草烏各三錢五分
湯泡去皮

共研細末。每服五錢。溫酒調下。酒多更妙。紫參不灰木。雖無亦可。

(方歌) 換肌散治大風瘡。毒攻肩脫壞鼻梁。烏稍白花並蜈蚣。紫花天麻芍藥當。威靈桐菊不灰木。紫苦沙參何首莖。木賊天冬芍藥草。胡麻蒼朮草烏強。

補氣瀉榮湯

連翹去心 升麻各六分 桔梗五分 黃芩 生地各四分

黃連

蚯蚓酒炒 去土

當歸

黃耆

蘇木

全蠍各三分 人參

白豆蔻各二分 甘草一分 生

水二鐘。酒一鐘。煎至一鐘。去渣。又用胡桐淚一分。水蛭、蝮蟲各三個炒。麝香五厘。桃仁三個研泥。共為細末。入藥湯內。煎至七分。飯後服之。

(方歌) 補氣瀉榮虛宜。芎連參桔蚯蚓耆。蘇地升蠍翹蔻草。桐淚蛭蝮麝桃泥。

何首烏酒

何首烏四兩 當歸身

當歸尾

穿山甲炙

生地黃

熟地黃

蝦蟆各兩

側柏葉

松鍼

五加皮


川烏湯泡
去皮
草烏各四錢湯
泡去皮

將藥入夏布袋內。繫口。用黃酒二十觔。同藥袋入罈內封固。重湯煮三炷香。埋罈七日。開罈口取酒。時飲之令醺醺然。作汗避風。

(方歌) 何首烏酒大風疾。歸甲松鍼生熟地。獨莖五加川草烏。酒煮滋榮毒自息。

萬靈丹見腫瘍門

楊梅瘡圖



梅毒瘡

楊梅瘡生有二般。精化氣化是其源。精化淫慾氣傳染。氣化發汗積下疳。(注)此證一名廣瘡。因其毒出自廣。

南。一名時癩。以時氣乖變。邪氣滲入之故。一名棉花瘡。以其纏綿不已也。一名翻花楊梅。因穿肌破爛。肉反突於外。如黃蠟色。一名天泡瘡。因其火蒸而生白泡也。有形如赤豆。嵌於肉內。堅硬如錢。名楊梅瘡。有形如風疹作瘡。名楊梅疹。先起紅暈。後發斑點者。名楊梅斑。色紅作瘡。其圈大小不一。二三相套。因其穢毒之物。入大腸而發名楊梅圈。其名形雖異。總不出氣化精化二因。但氣化傳染者輕精。化感染者重氣。化者。或遇生此病之人。鼻聞其氣。或誤食不潔之物。或登閣受梅毒不潔之氣。脾肺受毒。故先發上部見之。皮膚作瘡。筋骨微疼。其形小而且乾也。精化者。由交媾不潔。精泄時毒氣乘肝腎之虛。而入於裏。此爲慾染。先從下部見之。筋骨多痛或小水澀淋。瘡形大而且堅。氣化者毒在表。未經入裏。稍有動盪。宜急服透骨搜風散。元氣實者。楊梅一劑散汗之。精化者。毒在裏。深伏骨髓。未透肌膚。宜服九龍丹。通利大小二便。以瀉骨中之毒。甚者二服。降下毒物。以土深壓之。行瀉之後。體實者升麻解毒湯。體虛者歸藏內託散。服至筋骨不疼。瘡色淡白。內毒已解。再用金蟾脫殼酒一料。掃餘毒以絕其源。如梅毒初發服表藥時。恐上攻頭面。宜豫服護面散。或瘡勢已發於面。兼後斑痕不退。宜翠雲散噴之。以滅痕跡。若梅毒潰爛時。膿穢浸淫。成片而痛者。以越黃散撒之。又翻花楊梅。亦以本方加雄黃末。香油調敷之。外有護從丸。於發瘡時令侍從人服之。可免傳染楊瘡。初起頭不痛。筋骨不疼。小水通利。瘡形小色鮮。頭面稀少。口角生瘡。胸背稠密。穀道清楚者爲順。若先發下疳。次生便毒魚口。便覺筋骨疼痛。而梅毒隨發。色紫堅頂。足多生。形共湯發起者爲險。總之始終調治得法。輕者半年。重者一載。始得全愈。若患者不遵正法醫治。欲求速效。服輕粉水銀白粉霜劫藥等類。妄用熏擦冷吸等法。以致餘毒含藏骨髓。復爲倒發結毒。輕則累及妻子。甚則腐爛損形。不可不慎。

透骨搜風散

透骨草花者

生脂麻陰乾

羌活

獨活

小黑豆

紫葡萄

槐子

白糖

六安茶

核桃肉各一錢五分

生薑三片。紅棗肉三枚。水三鍾。煎一鍾。露一宿。空心熱服。蓋被出汗避風。

(方歌) 透骨搜風散梅毒。筋骨微疼癢皮膚。脂麻羌獨豆葡萄。槐子糖茶核桃肉。

楊梅 劑散

麻黃一兩

威靈仙八錢

大黃七錢

羌活

白芷

皂刺

金銀花

穿山甲炙研

蟬蛻各五錢

防風三錢

出羊肉一觔。河水煮熟。取清湯一盞。用黃酒一盞。將藥煎至一盞。令患者空心將羊肉淡食令飽。隨後服

藥。蓋被出汗避風。

(方歌) 楊梅一劑元氣壯。上部生毒氣化瘡。麻黃羌芷威靈刺。銀花風甲蟬大黃。

升麻解毒湯

升麻

皂刺各四錢

土茯苓一觔

水八盞。煎四盞。作四次。一日服盡。每次燒熱。加香油三茶匙。和勻。量病上下。晨前後服之。如瘡生

頂上加白芷。咽內加桔梗。胸腹加白芍。肩背共羌活。下部加牛膝。

(方歌) 升麻解毒筋骨疼。梅毒纏綿壯服靈。土苓皂刺香油服。按部須加藥引經。

歸靈內託散 人參 木瓜 白朮土炒 金銀花 防己

天花粉 白鮮皮 薏苡仁各一錢 當歸 熟地 白芍酒炒

川芎各一錢 土茯苓二兩 威靈仙六分 甘草五分

水三鍾。煎二鍾。作二次。隨病上下服之。渣再煎服。下部加牛膝五分。元氣虛者倍加參歸，極其虛

者倍金銀花。加蒲公英。外以麥冬五錢去心。薏苡仁五錢。土茯苓一兩。煎湯常服以代茶。

(方歌) 歸靈內託參木瓜。朮銀四物已天花。土苓鮮薏威靈草。梅瘡體弱服堪誇。

金蟬脫殼酒

醇酒五觔大蝦蟆一個。土茯苓五兩。浸酒內。瓶口封嚴。重湯煮二炷香時取出。待次日飲之。以醉為度。無論冬夏。蓋煖出汗為效。餘存之酒。次日隨量飲之。酒盡瘡愈。又治結毒筋骨疼痛。諸藥不效者更妙。服酒七日後。禁見風為效。忌口及房慾。

護面散 女人頭髮眼存 明雄黃各三分

共研細。香油半酒鍾調勻。滾黃酒沖服。一日三服。

(方歌) 護面散醫梅毒現。豫服毒不攻頭面。香油調藥黃酒沖。只用雄黃頭髮煨。

翠雲散

輕粉一兩

石膏一兩

蟾礬

銅綠各五錢

共研極細末。濕瘡乾撒。乾瘡以公豬膽汁。調濃點之。每日三次。斑瘡自退。

(方歌) 翠雲散去瘡後斑。輕粉石膏共膽礬。銅綠共研濕乾撒。豬膽汁調能潤乾。

黃散

輕粉

石膏煨

黃蘗各等分炒

共為末。乾撒患處。即可生痂。再瀾再撒。毒盡即愈。

(方歌) 鵝黃散治梅毒瘡。膿穢多疼浸成片。輕粉石膏黃蘗研。乾散止疼解毒驗。

護從丸

雄黃

川椒各五錢

杏仁一百粒炒去皮尖

共研末。燒酒打飛羅麵。糊為丸。如梧桐子大。每服十五丸。白滾水送下。

(方歌) 護從丸避梅毒患。雄黃川椒各五錢。杏仁百粒酒糊入。從人服之毒不傳。

九龍丹見下部歷驗

楊梅結毒圖

楊梅結毒形狀破頭爛眼蝕鼻或肩肘腿胫有瘡



楊梅結毒

結毒楊梅毒結生。原於誤服劫藥成。日久逢虛始倒發。腦鼻喉目任蝕攻。(註)此證因生楊梅方熾。誤服水銀升煉悍燥劫藥。希圖速效。瘡痂盡落。一時僥倖而愈。不知遺害。久遠引生毒藏骨髓關節之中。其毒積久。因經虛外攻。故名結毒倒發。其始先從筋骨疼痛。隨處結腫。皮色如常。將爛時色方紫紅。腐臭不堪。以致腦頂塌陷。腮唇鼻梁損壞。穿喉蝕目。手足拘攣等患。終成痼疾。初起結腫。筋骨疼痛時。宜服搜風解毒湯。若偏身破爛臭穢。而兼筋骨疼痛。氣實毒盛者。宜服化毒散。氣衰者務請于湯主之。若結毒腫塊。經年難愈。諸法罔效者。宜西聖復煎丸主之。若結毒攻於口鼻者宜五寶散主之。年久鼻爛。鼻破損壞者。宜服結毒紫金丹。若入顛頂。頭痛如破者。內服天麻餅子。鼻吸碧雲散。若鼻塞不通。宜吹通鼻散甚效。毒攻咽喉。腐爛鼻前者。宜服硫黃不二散。兼吸結毒靈藥。兌人中白。若結毒筋骨疼痛。朝經夜重。喜熱手按摩

者。係犯寒涼。宜鉛回散主之。結毒臭爛不斂。宜貼解毒紫金膏。兼撒結毒靈藥。壯實者以解毒為主。虛弱者以兼補為法。以上之證。各隨次第。如法調治。重者一年輕者半年。自然可痊。永無後患。慎勿妄求速效。以自貽誤也。

搜風解毒湯

上茯苓一兩

白鮮皮

金銀花

慧苡仁

防風

木通

木瓜各五分

皂角子四分

水二鍾煎一鍾。服之。一日三服。

氣虛加人參七分。

血虛加當歸七分。

忌清茶、牛、羊、鷄、鴨、

魚肉、燒酒、房慾等件。

(方歌) 搜風解毒湯倒發。初腫拘急骨痛加。土苓白鮮銀花蕒。皂角防風通木瓜。

化毒散

生大黃一兩

穿山甲炙

當歸尾各五分

白殭蠶三錢

蜈蚣一條

共研細末。每服二錢。溫酒調下。一日二服。

(方歌) 化毒散醫結毒盛。破機氣實筋骨疼。大黃山甲殭歸尾。蜈蚣研末酒調成。

豬膽子湯

豬膽子一兩

黃耆鹽水炒

金銀花各三錢

當歸

白芍各一錢五分

切碎

錢

分酒炒

天花粉

貝母去心

穿山甲炙研

白鮮皮

青風藤

白芷

木瓜

刺皂

甘草節各一錢

黃栝萋一個連仁研爛

防己七分

鼈胡虱麻二錢炒研

白色土茯苓四兩。河水四大盃。煎湯三盃。去滓。將羣藥入湯內。煎一大盃。通口服。胃弱者分爲二服。日三服。

(方歌) 豬脬湯治結毒虛。歸芍天花藁貝耆。胡麻銀甲鮮藤菖。木瓜已刺草苓宜。

西聖復煎丸

香乳

沒藥

茶孩兒

丁香各一兩

竭血

阿魏

白花蛇各四錢

飛羅麵一觔炒焦黃色

共研細。煉蜜六兩。煎滾香油四兩。大棗肉二十枚。搗膏共和爲丸。如彈子大。每服一丸。土茯苓二兩。水二鍾。煎至一鍾。將藥丸入內再煎至半鍾澄去渣溫服。

(方歌) 西聖復煎丸結毒。腫塊經年服自無。乳沒兒茶了血竭。阿魏白蛇麵炒和。

結毒紫金丹

龜板放炭火上炙焦用白酒漿塗之

硃砂六錢

石決明六錢用九孔大者

各研極細末。共和勻。爛米飯爲丸麻子大。每服一錢。量病上下。食前後服之。筋骨疼痛。酒下。腐爛者。土茯苓湯下。

(方歌) 結毒紫金丹龜板。石決硃砂米飯丸。年久毒攻鼻損破。土苓湯服鼻爛痊。

天麻餅子 天麻 薄荷 甘松 白附子去皮 白芷 蒼朮米泔水浸炒

川芎 川烏湯泡去皮 草烏湯泡去皮 防風 細辛 甘草各一錢生 雄黃

全蠍各三錢

右為細末。寒食麵打糊為丸。如豌豆大。捻作餅子。每服二三十餅。葱白煎湯送下。

〔方歌〕天麻餅子薄甘松。雄黃白附芷蒼芎。川草烏蠍防細草。結毒攻癩頭痛平。

通鼻散 壺盧殼灰 石鍾乳 膽礬 冰片各等分

共為末。吸入鼻內。出黃水。日吹二三次。三二日即通。

〔方歌〕通鼻散吹結毒證。毒塞鼻中息不通。石鍾乳與壺盧殼。膽礬冰片等分同。

硫黃不二散 硫黃一錢 靛花一分

共研細。用涼水一酒鍾調服。

〔方歌〕硫黃不二毒攻喉。腐臭爛蝕痛不休。涼水調服疼立止。靛花少兌不須憂。

結毒靈藥 水銀一兩 硃砂 硫黃 雄黃各三錢

共研細。入陽城罐內。泥固鐵蓋。梁兜固緊封口。其火候俱按紅升丹之煉法。火畢。次日取出。盡底藥約有一兩五六錢。治尋常腐爛之證。藥五錢。輕粉五錢。同研細。小罐盛收。以紗封之。臨用時。甘草湯洗淨患處。將罐倒懸。紗眼內飾藥患上。油紙蓋之。男婦咽喉爛者。藥一錢。加入中白二分。研細吹之。日用三次。

(方歌) 諸毒靈藥化腐方。水銀研砂硫黃雄。共研入罐用泥固。兜緊火昇三炷香。

鉛回散

黑鉛

半動銅的化開傾入水中取起再化再傾以鉛化盡爲度澄去水將鉛灰倒在三重紙上下用灰收乾水氣鉛灰日中曬乾

硫黃

各等分。共研細。每服一錢。溫酒調服。至重者不過三次即效。

(方歌) 鉛回散療筋骨痛。寒觸結毒夜間重。鉛化成灰兌硫黃。每服一錢酒調送。

五寶散

方見下部疔瘡

碧雲散

方見頭部頭風傷目

結毒紫金膏

方見脛部癰瘡

赤白遊風圖



赤白遊風

赤白遊風如粟形。浮腫焮熱癢兼疼。表虛風襲佛鬱久。血赤氣白熱化成。(註) 此證發於肌膚。遊走無定。起如雲片。浮腫焮熱。痛癢相兼。高紫如粟。由脾肺燥熱。而兼表虛腠理不密。風邪襲入。佛鬱日久與熱相搏則化熱益盛而成。滯於血分者。則發赤色。滯在氣分者。則發白色。故名赤白遊風也。初俱宜荊防毒散疎解之。赤者次服四物消風飲。白者次服補中益氣湯。加防風蠅蛻蠶蠶生何首烏治之。初俱用牛肉片之。豬羊俱可。遊走太速者。定停者以真君妙貼散雞子清調敷。其看順逆之法。與丹毒門參考。忌食雞鵝動風燥血之物。犯則難愈。

四物消風飲

生地三錢

當歸兩

荊芥

防風各一錢

赤芍

五分

川芎

白鮮皮

蟬蛻

薄荷各一錢

獨活

柴胡各七分

紅棗肉二枚。水二鍾。煎八分。去渣服。

(方歌) 四物消風飲調榮。血液風滅赤色平。荆防鮮蟬兼獨活。柴薄紅棗水煎濃。

荆防敗毒散

見項部
腦疽

補中益氣湯

見潰瘍門

真君妙貼散

見腫瘍門

紫台瘡風圖



白濁其益補氣為症中有白膿

紫白癩風

紫白癩風無癢痛。白因氣滯紫血凝。熱體風侵熱相搏。毛竅閉塞發斑形。(註)此證俗名汗斑。有紫白二種。紫因血滯。白因氣滯。總由熱體風邪濕氣。侵入毛孔。與氣血凝滯。毛竅閉塞而成。多生面項。斑點遊

走。延蔓成片初無痛癢。久之微癢。初起宜萬靈丹汗之。次以胡麻丸常服。外用蜜陀僧散擦患處。冷汗出即自解。古今治法雖多。取效甚少。得此證者。當急魚腥煎炒少酒煎風發物。

胡麻丸 大胡麻四兩 苦參 防風 石菖蒲 威靈仙各二兩

白附子 獨活各一兩 甘草五錢

共為細末。白酒漿和丸如菉豆大。每服二錢。形瘦者。一錢五分。食後臨臥。白滾水送下。

(方歌) 胡麻丸治紫白癩。除去風濕不致延。若參白附防風草。菖蒲獨活威靈仙。

蜜陀僧散 雄黃 硫黃 蛇床子各二錢 蜜陀僧 石黃各一錢

輕粉五分

共研末。醋調搽患上。

(方歌) 蜜陀僧散風濕患。入臙成癩紫白斑。雄硫輕粉蛇床子。石黃共末醋搽痊。

萬靈丹 見腫瘍門

白駁風圖



白駁風初生面頰比白癩點其則延及徧身

白駁風

白駁風生面頸間。風邪相搏白點斑。甚延徧身無痛癢。治宜消風塗脂瘞。(註)此證自面及頸項。肉色忽然變白。狀類癩點。並不癢痛。由風邪相搏於皮膚。致令氣血失和。施治宜早。若因循日久。甚者延及徧身。初服浮萍丸。次服蒼耳膏。外以穿山甲片先刮患處。至燥痛取鱧魚脂。日三塗之。一方收樹孔中水濕洗之。洗後搗桂心牡蠣等分爲末。面油調塗。日三夜一俱效。

浮萍丸

紫背浮萍取大者洗淨曬乾

研細末。煉蜜爲丸。如彈子大。每服一丸。豆淋酒送下。

豆淋酒法

黑豆半升。炒烟起。沖入醇酒三觔。浸一日夜。去豆用酒送藥。

〔方歌〕 淫萍丸治白駁應。曬乾紫背大浮萍。蜜丸彈狀豆酒服。專能發表散邪風。

蒼耳膏

蒼耳

鮮者連根帶葉取
五七十觔洗淨

切碎。入大鍋內煮爛。取汁絹濾過。再熬成膏。磁罐盛之。用時以桑木匙挑一匙。噙口內。用黃酒送下。服後有風處。必出小瘡如豆粒大。此風毒出也。刺破出汁。即愈。忌豬肉。

〔方歌〕 蒼耳風邪侵皮膚。氣血失和白生。連根帶葉鮮蒼耳。洗淨熬膏酒服靈。

癩瘍風



癩瘍風在項胸腋起疹子白絲髮變和變

癩瘍風

癩瘍風從皮膚生。頸項胸腋無癢疹。紫白點點不開大。皮膚風邪熱結成。〔註〕此證發於皮膚。多生頸項

腋。其色紫白。點點相連。亦無癢疼。較白形圓。不延蔓開大由風邪鬱熱皮膚。居久不散。而成斯疾。宜服烏蛇散。外用羊蹄草根。共硫黃薰醋於綉鐵片上。研濃汁日塗二三次效。

烏蛇散

烏蛇三兩
酒浸

羌活 防風 黃芩 苦參各二兩 人參 沙參 丹參 元參

梔子仁生 桂心 秦艽 木通 犀角屑 白蒺藜 升麻 枳殼麩炒

白鮮皮 川芎各一兩

共研細末。每服二錢。食遠溫酒調服。忌雞豬魚蒜麵食熱物之類。

(方歌) 烏蛇麻傷風熱淫。羌活防風芎五參。梔桂秦芎通犀角。蒺藜升麻白鮮芩。

丹毒



丹毒發在偏身形如雲片色如朱砂

丹毒

丹毒名多雲片形。風火濕寒肉分滯。胸腹四肢分順逆。消火消風疔敷靈。(證)孫真人云。丹毒一名天火。肉中忽有赤色如丹塗之狀。其大如掌。甚者偏身。有癢有痛。而無定處。丹名雖多。其理則一也。形如雞冠名雞冠丹。若皮澀起如麻豆粒者名菜莢丹。亦有水丹。偏身起胞。遇水濕搏之。透露黃色。恍如有水在皮中。此雖小疾。能令人死。須當速治。不可忽也。色赤者諸書謂之赤遊丹。色白者爲水丹。小兒多生之。俱有乾濕癢痛之殊。有夾濕夾風夾寒之別。諸丹總屬心火三焦風邪而成。如色赤而乾。發熱作癢。形如雲片者。卽名赤遊丹。屬血分有火而受風也。毒盛者服藍葉散。毒輕者宜導赤湯。加薄荷葉獨活服之。如初起白癩。漸透黃色。光亮脹隆。破流黃水。濕爛多痛者。名水丹。又名風丹。多生腿膝。屬脾肺有熱而夾濕也。官防已散主之。亦有起白癩。無熱無痛。遊走不定者。由火毒未發。肌膚外受寒鬱。名爲冷癩。宜服烏藥順氣散。外用

蓮擦。凡丹形初見。卽用牛羊精肉片貼之。甚則用此法令出紫血。色重不散者。以柏葉散敷之。又方去毒葉。研末。旋青調敷甚效。諸丹本於火邪。其勢暴速。自胸腹走於四肢者順。從四肢攻於胸腹者逆。

藍葉散 藍葉曬乾 川芎 赤芍 知母 生地 白芷 川升麻

柴胡 葛根 杏仁炒去皮尖 甘草各一錢生 石膏煨 梔子仁各五分

共搗粗末。每用八錢。新汲水二鍾。煎八分去渣服。熱甚加黃芩元參。

(方歌) 藍葉散却赤遊丹。皆因血熱馬邪纏。芍芍知膏生地芎。升麻柴葛杏梔甘。

防己散 防己三兩 朴硝二兩 犀角鎊 川芎 黃芩 黃耆

川升麻各一錢

共搗粗末。每用五錢。加竹葉三十片。新汲水二鍾。煎八分服。

(方歌) 防己丹毒始白癩。漸黃赤痛濕熱原。朴硝犀角芎芩共。耆與升麻竹葉煎。

烏藥順氣散 烏藥 橘紅各二錢 枳殼炒 白芷 桔梗 防風

蠶蠶炒 獨活 川芎各一錢生 甘草五分

水二鍾。生薑三片。煎八分服。

〔方歌〕烏藥順氣枳橘紅。芷桔風殭獨草芎。冷痲遊行無熱痛。因毒未發受寒風。

導赤湯見口部

口糜

柏葉散見腰部

腰火丹

粟瘡圖



粟瘡作癢

粟瘡癢證屬火生。風邪乘皮起粟形。風爲火化能作癢。通聖苦參及消風。〔註〕凡諸瘡作癢。皆屬心火。

火邪內鬱。表虛之人。感受風邪。襲入皮膚。風過火化作癢。致起瘡形如粟粒。其色紅。搔之愈癢。久而不癒。亦能消耗血液。膚如蛇皮。初服防風通聖散。加枳殼蟬蛻。血燥遇晚癢甚。夜不寐者。宜服消風散。外敷一味拔毒散。若年深日久。膚如蛇皮者。宜常服皂角苦參丸。外用豬脂油二兩苦杏仁一兩搗泥抹之自效。

皂角苦參丸 苦參一兩 荆芥十二兩 白芷 大風子肉 防風各六兩

大皂角 川芎 當歸 何首烏 大胡麻 枸杞子 牛蒡子炒 威靈仙

全蠍 白附子 蒺藜炒去刺 獨活 川牛膝炒五兩 草烏湯泡去皮 蒼朮米泔水浸炒

連翹去心 天麻 蔓荊子 羌活 青風藤 甘草 杜仲各三兩 酥炙

白花蛇切片酥油炙黃 縮砂仁各二兩炒 人參一兩

共研細末。醋打老米糊爲丸。如梧桐子大每服三四十九丸。溫酒食前前後任下。避風忌口爲要。

(方歌) 皂角苦參衆瘡癢。久似蛇皮膚難當。芎歸何首胡麻芷。大風枸杞草烏蒼。制蒡威靈蠍白附。蒺藜天麻獨蔓羌。白蛇風藤甘杜仲。人參牛膝縮砂仁。

防風通聖散 見頭部 禿瘡 消風散 見頭部 鉗扣風 二味拔毒散 見腫毒門

枯筋筋圖



枯筋筋

枯筋筋由肝失榮。筋氣外發赤豆形。破突筋頭如花蕊。或繫或灸便成功。(註) 此證一名腕子。由肝失血養。以致筋氣外發。初起如赤豆。枯則微槁。日久破裂。鑽出筋頭。聚繫枯槁。如花之蕊。多生於手足。胸乳之間。根蒂細小者宜用藥線齊根繫緊七日後其患自落。以月白珍珠散搽之。其槩收斂。根大頂小者。用銅錢一文。套腕子上。以草紙覆化艾。連灸三壯。其患枯落。肘形若大。用草紙蘸濕。套在肘上灸之。

藥線見腎部
持痔
月白珍珠散見潰瘍門

疥瘡圖



疥瘡

疥瘡乾濕蟲砂膿。各種蘊毒風化成。治論上下分肥瘦。清風利濕兼殺蟲（註）此證有乾濕蟲砂膿之分。其形雖有五種。總由各種蘊毒。日久生火。兼受風濕。化生斯疾。或傳染而生。凡疥先從手了生起。遞徧週身。癢癢無度。如肺經燥盛則生乾疥。癢癢皮枯。而起白屑。如脾經濕盛。則生濕疥。癢腫作痛。破津黃水甚流黑汁。如肝經風盛。則生蟲疥。癢癢徹骨。撓不知疼。如心血癱滯。則生砂疥。形如細砂。狀赤癢涌。抓之有水。如腎經濕熱。則生膿瘻。疥形如豆粒。便利作瘡。膿清淡白。或脾經濕盛。亦生膿瘻疥。但頭含稠膿。

疹相兼為異疥。雖有餘之證。而體虛之人亦生。以便祕為實。便利為虛。亦有虛而便燥者。如風祕則便燥。血分枯燥則便澀。又在疔形色重色淡。及脈息之有力無力辨之。何處有餘之人。俱宜防風通聖散服之。虛者服消防敗毒散透發之。及形勢已定。則無論虛實。乾疥服消風散。濕疥服苦朮膏。疥蟲服苦蘆丸。砂疥服犀角飲子。癩窠疥服秦朮丸。經久不愈。血燥者服當歸飲子。外治乾疥者擦繡毳丸。濕者擦臭靈丹。潤燥殺蟲俱效。疥生上體多者偏風熱盛。下體多者偏風濕盛。肥人多風濕。瘦人多血熱。詳辨治之。

蒼朮膏

蒼朮十兩切片入砂鍋內水煮減半取汁再加水煮如前以朮無味為度併汁一處用小砂鍋再煎如乾一寸加汁一寸煎成膏加蜂蜜四兩和勻

每服二錢匙。空心白滾水調服。

〔方歌〕蒼朮膏醫濕疥瘡。切片入鍋煮成湯。熬膏加蜜空心服。濕除熱散勝羣方。

犀角飲子

犀角鎊 赤芍 甘花 菊苦參 木通 赤小豆炒

石菖蒲各一錢 甘草一錢

五分 生

空薑三片 水二鍾。煎八分服。

〔方歌〕犀角飲子砂疥生。癢疼色赤出心經。芍菊花參通赤豆。菖蒲薑草水煎成。

秦朮丸

秦朮 苦參 大黃酒蒸 黃耆各二兩 防風 漏蘆

黃連各一兩 烏蛇肉五錢酒浸焙乾

共爲細末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服三十丸。食後溫酒送下。

(方歌) 秦芫丸服膿疥愈。清熱實除瘡自去。苦參大黃風濕癩。烏蛇黃連音蜜聚。

當歸飲子 當歸 生地 白芍酒炒 川芎 何首烏 荆芥 防風

白蒺藜各一錢 黃耆 甘草各五分生

水二鍾。煎八分。食遠服。

(方歌) 當歸飲子膿疥久。瘡添血燥不能除。四物黃耆何首草。前防蒺入風自疎。

繡球丸 川椒 輕粉 樟腦 雄黃 枯白礬 水銀各一分

大風子肉一百枚 另研

共研細末。同大風子肉。再碾勻。加柏油一兩。化開和藥。攪勻作丸。以二掌合搓如圓眼大。先以鼻間。次擦患處。

(方歌) 繡球丸用椒輕粉。樟腦雄黃礬水銀。大風子研柏油兌。乳疥癩瘡效如神。

臭靈丹 硫黃末 油核桃 生豬脂油各一兩 水銀一錢

搗膏用擦患處

(方歌) 臭靈丹擦膿濕疥。硫黃末共油核桃。生豬脂油各一兩。水銀一錢同搗膏。

防風通聖散

見頭部

荆防敗毒散

見頭部

消風散

見頭部

蘆薈丸

見牙齒部

癬瘡圖



癬瘡

癬證情形有六。風熱濕蟲是根原。乾濕風牛松刀癬。春生桃花面上旋。(註)此證總由風熱濕邪。侵
膚。經久風。則。是以搔癢之無休也。其名有六。一曰乾癬。二曰

癬。搔癢則出黏汁。浸淫如蟲行。三日風癬。卽年久不愈之頑癬也。搔則破頭。不知痛癢。四曰牛皮癬。卽如牛頭之皮。厚而且堅。五日松皮癬。狀如蒼松之皮。紅白斑點相連。時時作癢。六曰刀癬。輪郭全無。錯橫不定。總以殺蟲滌熱。消毒之藥敷之。輕者羊蹄根散。久頑者必效散搽之。亦有脾肺風濕過盛而腫痛者。宜服散風苦參丸。解散風濕。其腫痛卽消。又有面上風癬。初如瘡疥。或漸成細瘡。時作痛癢。發於春月。又名吹花癬。卽俗所謂挑花癬也。婦女多有之。此由肺胃風熱。隨陽氣上升而成。宜服疎風清熱飲。外用散風玉容散。每日先之自效。

羊蹄根散

羊蹄根八錢 枯白礬二錢

共研勻。米醋調擦癬處。

〔方歌〕羊蹄根散敷諸癬。羊蹄根共枯白礬。二味研末加米醋。搽患滲濕癢可痊。

必效散

川槿皮四兩 海桐皮 大黃各二兩 百藥煎一兩 巴豆一錢五分

蟄螫一個

全用

雄黃

輕粉各四錢

共研極細末。用陰陽水調藥。將癬抓損。薄敷。藥乾必待自落。

〔方歌〕必效大黃百藥煎。川槿海桐巴豆蟄。雄黃輕粉陰陽水。調搽諸癬久年頑。

散風苦參丸

苦參四兩 大黃炒香 防風 枳殼炒 元參 獨活

黃連各一兩
黃芩
梔子生
菊花各一兩

共研細末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服三十丸。食後白滾水送下。日服三次。茶酒任下。

〔方歌〕散風苦參風濕盛。癰瘡多瘰腫痛囊。大黃芩獨防風枳。元參梔子菊黃連。

疎風清熱飲

苦參二錢酒浸蒸
曬九次炒黃

全蠍土炒

皂刺

豬牙皂角

防風

荆芥穗 金銀花

蟬蛻各一錢炒

酒水各一鍾。加葱白三寸。煎一鍾。去滓熱服。忌發物。

〔方歌〕疎風清熱風癰患。時作痛癢極纏綿。苦參蠍刺豬牙皂。防風荆芥銀花蠟。

消風玉容散

綠豆麵三兩

白菊花

白附子

白芷各一兩

熬白食鹽五錢

共研細末。加水片五分。再研勻收貯。每日洗面。以代肥皂。

〔方歌〕消風玉容綠豆麵。菊花白附芷食鹽。研加水片代肥皂。風除癰去最爲先。

水瘡圖



黃水瘡

黃水瘡如粟米形。起時作癢破時疼。外因風邪內濕熱。黃水浸淫更復生。（註）此證初如粟米。而癢兼痛。破流黃水。浸淫成片。隨處可生。由脾胃濕熱。外受風邪。相搏而成。宜服升麻消毒飲。熱甚外用青蛤散敷之。濕盛碧玉散敷之。即效。痂厚用香油潤之。忌見水洗。

升麻消毒飲

當歸尾

赤芍

金銀花

連翹去心

牛蒡子炒

梔子生

羌活

白芷

紅花

防風

甘草生

升麻

桔梗

每味用二錢爲大劑。一錢五分爲中劑。一錢爲小劑。水三鍾。煎八分。食遠熱服。如瘡生頭面。減去歸

尾紅花。

〔方歌〕 升麻清毒却風濕。歸芍銀花翹芍樞。羌芷紅花防草桔。黃水浸淫服漸失。

青蛤散見鼻部 鼻廔瘡 燕窩瘡

碧玉散見面部

暑令癆毒小節圖



暑令癆毒小節

暑令癆癩癩腫疼。頭暈口苦背肌痛。較之癩疽發熱異。不分日夜似火攻。
〔註〕 此證係暑令所生。傷毒。初發背心腎膚紅暈。次生腫痛。發熱無時。日夜不止。廉頭目暈眩。口苦舌乾。心煩背熱。肢體怠倦。初宜預防散散。加茶黃連石膏服之。外治按癩疽腫癩演癩門。

荆防敗毒散見頭部

腦疽

瘰癧疔在初骨生其癭青色如拳打之狀

瘰癧疔圖



瘰癧

瘰癧因受山瘴毒。伏藏久痛附筋骨。初黑次青如拳打。急則惡血後膿熱。(註)此證因受山嵐瘴氣。伏藏筋骨之間。年月久遠。令人痛附筋骨。始發黑色。頑瘰如木石。其毒附著於筋骨。重按方知微痛。五七日後。毒勢湧出浮腫。皮變青色。如拳打之狀。寒戰似瘧。頭顛口偏。手足厥逆。黑睛緊小。始見黑色時。急用此法。令出惡血。隨即下換金正氣散。加羚羊角以洩邪毒。次按瘰癧疔腫癆潰癆治法。膿熟潰黃白膿爲順。出黑汁者險。

不換金正氣散

蒼朮米泔水
浸炒

厚朴薑製

陳皮

藿香

半夏麴各二
錢炒

甘草錢

炙

水二鍾。生薑五片。紅棗肉二枚煎一鍾。去滓。稍熱服。忌生冷油膩。

〔方歌〕正氣散因由瘰癧。伏久生疽身戰寒。平胃散加半夏糊。茯苓薏苡服平安。

產後癰疽



產後癰疽

產後癰疽最屬險。七情之傷六淫感。瘀血稽留成癰疽。勢潰託裏不宜緩。〔註〕此證因產後氣血經絡俱虛或因七情所傷。或因六淫所感。與瘀血相稽而成。最屬險候。法宜大補。扶助根本。兼活瘀生新為要。其病以末治之。初服生化湯。隨證加減。以消毒。有表邪服清魂散。有裏熱服回生丹。勢欲潰膿時。急宜。遲則恐毒內陷藥味宜和平純善。最忌汗下峻劑。其餘腫潰治俱按癰疽腫瘍潰瘍門。

生化湯

當歸八錢

川芎四錢

蕪荑

甘草各三

桃仁十粒去皮
尖研泥

分

水一鍾半。煎六分。加無灰酒一小杯和服。

〔方歌〕 生化湯宜產後煎。通滯和氣又補虛。歸芍靈炭炙甘草。桃仁酒服善消瘀。

清魂散

荆芥一錢 川芎五分 人參 甘草炙 澤蘭葉各三分

烏末黃酒調服

〔方歌〕 清魂產後風邪侵。荆芥川芎與人參。炙甘澤蘭同作劑。能疎表證效通神。

回生丹

黑豆三升煮熟取 紅花三兩炒黃色入醇酒大壺 生大黃一觔
汁三盃去豆 同煮三五滾去紅花用汁 研末

蘇木

二兩切寸可水五
盃煎汁三盃去渣

先將大黃末。以好米醋三四盃。攪勻。文武火熬成膏。如此二遍。次下紅花酒。蘇木湯。黑豆汁。共熬成膏。離火再入後藥。

當歸 熟地 川芎 白茯苓 延胡索 烏藥 香附 蒲黃 牛膝

桃仁另研

蒼朮各二兩米
泔水浸炒

白芍酒炒 甘草炙 羌活 山
肉酒浸 三棱

陳皮 地榆

木香 五靈脂各五錢 人參 白朮土炒 青皮 木瓜各三錢

良薑四錢 乳香 沒藥各一錢

共研細末。用大黃膏爲丸。如彈子大。每服一丸。酒化。通口服。

（方歌）回生產後存惡露。致責癰疽服可逐。除惡清瘀香衛和。紅花大黃豆蘇木。八珍羌莢稜延胡。烏藥青陳榆香附。乳沒蒲黃良膝瓜。木香靈脂桃蒼朮。

翻花瘡無圖

翻花瘡因潰後生。頭大蒂小努菌形。雖無血毒觸流血。血燥肝虛怒氣成。（註）此證因生瘡潰後。努肉自瘡口突出。其狀如菌。頭大蒂小。愈努愈翻。雖不大如大瘡。誤有觸損。流血不佳。久則虧虛。總由肝虛怒氣血燥而成。宜服逍遙散。外用烏梅煨灰。輕粉各等分。研末撒之。或馬齒莧煨灰。豬脂調敷俱效。

逍遙散見背部
上搭手

血風瘡發在遍身如粟米下硬成紅羣



血風瘡

血風瘡證生遍身。粟形搔癢脂水淫。肝脾脾經風濕熱。久鬱燥癢抓血津。(註) 此證由肝脾二經。濕熱外受。風邪襲於皮膚。鬱於肺經。致遍身生瘡。形如粟米。搔癢無度。抓破時津脂水浸淫成片。令人煩躁口渴。搔癢。日輕夜甚。宜服消風散。外敷雄黃解毒散。者日久風邪鬱在肌膚。則耗血生火。搔癢倍增。夜不得寐。流破津血。心煩。大便燥結。咽乾不渴。此屬火燥血短。宜服地黃飲。外擦黃連膏潤肌膏合而用之。悉效。並忌椒酒鷄鵝動風等物。

雄黃解毒散

雄黃

寒水石

各一兩煨

白礬四兩生

共研細末。滾水調敷。

(方歌) 雄黃解毒寒水石。白礬因兩共研之。血風瘡生粟米瘡。滾水調敷滲毒濕。

地黃飲 生地 熟地 何首烏各三錢生 當歸二錢 丹皮 黑參

白蒺藜炒原 僵蠶各一錢 紅花 甘草各五分生

水煎。早晚服。

(方歌) 地黃飲治血風瘡。瘡盛不眠血燥傷。首烏丹皮生熟地。黑參歸蒺草紅蠶。

消風散見頭部 黃連膏見鼻部 潤肌膏見頭部
鈕扣風 鼻瘡風 白屑風

瘡癰形如豆 癰扁瘡 疔 疔紅暈 疔腫



瘡癩汗出中邪風。狀類豆瓣扁瘡形。日瘡秦朮湯宜服。夜重當歸飲服寧。(註)此證俗名鬼飯疔。由汗出受風。或露臥乘涼。風邪多中表虛之人。初起皮膚作癢。次發扁疔。形如豆瓣。堆累成片。日瘡甚者。宜服秦朮牛蒡湯。夜癢重者。宜當歸飲子服之。外用燒酒浸百部。以藍布蘸酒擦之。謹避風涼自效。

秦朮牛蒡湯

秦朮一錢

牛蒡子炒研

枳殼麩炒

麻黃蜜炙

犀角鎊

黃芩

防風

甘草生

黑參

升麻各一錢

水二鍾。煎八分服。

(方歌)秦朮牛蒡風留膚。瘡癩生如麻豆形。枳殼麻黃犀角鎊。黃芩風草黑參升。

當歸飲子見疥瘡

浸淫瘡

浸淫瘡發火濕風。黃水浸淫似疥形。蔓延成片癢不止。治宜清熱並消風。(註)此證初生如疥。搔癢無時。蔓延不止。抓津黃水。浸淫成片。由心火脾濕。受風而成。經云。歲火太過。甚則身熱。肌膚浸淫。仲景云。從口流向四肢者順。四肢流入口者逆。初服升麻消毒飲。加蒼朮川黃連。抓破津血者。宜服消風散。外搽奇蛤散即愈。若脈遲不食。黃水不止。此屬脾敗。不治之證也。



升麻消毒飲

見黃水瘡

消風散

見頭部

青蛤散

見鼻部

鈕扣風

鼻部

火赤瘡

火赤瘡由時氣生。燎漿水腫徧身成。治分上下風濕熱。瀉心清脾自可寧。(註)此證由心火妄動。或感酷暑時臨。火邪入肺。伏結而成。初起小如芡實。大如棋子。燎漿水腫。色赤者爲火赤瘡。若頂白根赤。名天曉瘡。俱延及徧身。焮熱疼痛。未破不堅。自破者俱宜蠟蚘拔毒散敷之。已破者俱宜石珍散撒之。清其濕熱。破爛多生者屬濕熱盛。宜服清脾除濕飲。未破者俱宜蠟蚘拔毒散敷之。已破者俱宜石珍散撒之。清其濕熱。破爛自乾甚效。

解毒瀉心湯

黃芩

黃連

牛蒡子炒研

知母

石膏煨

梔子生

防風

元參

荊芥

滑石各一錢

木通

甘草各五分生

火赤瘡圖



水二鍾。燈心二十根。煎八分。食遠服。

〔方歌〕解毒瀉心湯火赤。苓連牛蒡木通知。石膏梔子防風草。元參荊芥與滑石。

清脾除濕飲

赤茯苓

白朮土炒

蒼朮天泔浸炒

黃芩

生地黃

麥冬去心

梔子生研

澤瀉

甘草生

翹連去心

茵陳蒿

枳殼麩炒

元明粉各一錢

水二鍾。竹葉二十片。燈心二十根。煎八分。食前服。

〔方歌〕清脾除濕天皴疾。赤苓二朮苓生地。麥冬梔子草連翹。茵陳元明同作劑。

石珍散

輕粉

石膏各一錢煨

黃蘗木

青黛各三錢

共研勻。先以甘草湯洗淨瘡處。共用此藥撒之。

〔方歌〕石珍散去火邪害。天皴破撒自康泰。一兩輕粉煨石膏。三錢黃蘗加青黛。

蝌蚪拔毒散見腫

楊門

貓眼瘡圖



貓眼瘡形如貓眼

貓眼瘡

貓眼瘡名取象形。痛癢不常無血膿。光芒閃爍如貓眼。脾經濕熱外寒凝。(註)此證一名寒瘡每生於面。及偏身。甲脾經久鬱濕熱。復被外寒。凝結而成。初起形如貓眼。光彩閃爍。無膿無血。但痛癢不常。久則淫。宜服清肌滲濕湯。外敷真君妙貼散。兼多食鷄魚蒜韭。忌食鮎魚蟹鰕而愈。

清肌滲濕湯

蒼朮米泔水浸炒

厚朴薑汁炒

陳皮

甘草生

柴胡

木通

澤瀉

白芷

升麻

白朮土炒

梔子生

黃連各一錢

水三鍾。生薑三片。燈心二十根。煎至八分溫服。

(方歌) 清肌滲濕瘡貓眼。脾濕熱鬱外寒纏。平胃柴胡通瀉芷。升麻白朮梔黃連。

真君妙貼散見腫

傷門



魚脊瘡

魚脊瘡由虛人成。感受濕熱皮間凝。虛寒緩緩胞津水。氣變稠膿陽氣生。(註)此證形如魚脊。由陽氣虛之人。復感濕熱結滯而成。多生筋骨之間。以陽氣虛寒。故發長緩慢。只在皮膚堅凝癢痛。初起白胞漸長。狀如魚脊。破津黃水。正膿生遲、初治無論已破未破。宜蒜片艾灸。以通陽氣。外用真君妙貼散。香江調敷。宜服內補十宣散。得稠膿色鮮者為順。若灸之不應。色暗腐爛。出臭水者逆。其次內外治法。俱按此道潰瘍門。

眞君妙貼散

見腫
湯門

內補十宣散

見胸
部

骨痿瘡圖



骨痿瘡色紅如梅李

骨痿瘡

骨痿瘡形粟豆紅。漸如梅李火毒成。膿血不出痛不止。治同疔法即成功。(註)此證初生。形如粟豆。色紅漸大。如梅如李。由火毒而成。血不生。膿不出。痛亦不止。久則延及徧身。內外治法。與疔門參考。

風疔無圖

風疔證如風疔形。被流黃水瘡微疼。由於風濕客谷道。如聖膏搽功即成。(註)此證由風濕客於谷道而成油形如風疔作瘡。被流黃水浸淫徧體微疼。宜用如聖膏搽之即愈。

如聖膏

當歸五錢

巴豆三錢

去殼

香油八兩。將二藥燥枯。去滓。入黃蠟三兩。化盡離火。稍溫淨。將燬入輕粉二錢。攪勻揉之。
(方歌) 如聖膏用歸巴豆。二味一同入香油。燥枯加蠟添輕粉。凝捺風疔功即收。

血疔



血疔發在偏身形如紫疥其色紅紫極癢

血疔

血疔形如紫疥瘡。痛癢時作血多傷。證因風熱閉腠理。消風散服功最強。(註) 此證由風熱閉寒腠理而成。形如紫疥。痛癢時作。血燥多熱。宜服消風散。

消風散

見項頭
鍾和風

白朮

白朮之形如疹疥。色白而癢多不快。固由風邪客皮膚。亦由血燥難榮外。(註)此證俗名蛇虱。生於皮膚。形如疹疥。色白而癢。搔起白皮。由風邪客於皮膚。血燥不能榮養所致。初服防風通聖散。次服搜風順氣丸。以豬脂苦杏仁等分。共搗絹包擦之俱效。

白朮丸瘡圖



白朮生於編身色白搔癢起白皮

搜風順氣丸

大黃

五兩酒浸
蒸曬九次

車前子酒炒

山嵐肉

山藥炒

牛膝酒浸

菟絲子酒煮

獨活

火麻仁

微火焙
去殼

檳榔

枳殼麩炒

郁李仁

各二兩
水浸去皮

羌活一兩

右爲末。煉蜜爲丸。如梧桐子大。每服三十丸。茶酒任下。早晚各一服。

(方歌) 搜風順氣車前子。莫藥大黃膝菟絲。羌獨火麻榔枳郁。服去風邪血燥滋。

防風通聖散

見頭部
禿癩

漆瘡圖



漆瘡

漆瘡感受漆毒生。腠理不密腫焮紅。初發覺癢後如疹。皮破流水更癢疼。(註)此證由人之腠理不密。感

辛熱之毒而生。初發面癢而腫。抓之漸似癩疹色紅。循傳肢體焮痛。皮破爛斑。流水甚者。寒熱交作。宜

藥汁。調三白散塗之。內服化斑解毒湯。忌浴熱水。或油膩厚味發物。或用神龜研爲末。生蠶黃調塗患處。

數。

三白散

鉛粉一兩

輕粉五錢

石青三錢

共研勻。菲菜汁調敷。紙蓋。如無菲菜汁。涼水調亦可。

〔方歌〕三白散敷漆瘡消。輕粉鉛粉煨石膏。去熱解毒功效速。研勻須用菲汁調。

化斑解毒湯

見肋部內發丹毒

血箭圖



血箭無定處如從毛孔射出

血箭

血箭毛孔射出血。心火熾迫血亂行。桃花散用涼水敷。再塗金墨即能停。
 〔註〕此證一名肌蝦。由心肺火盛。逼血從毛孔中射出如箭。宜服涼血並黃湯。外用桃花散。以涼水調敷。或用金墨研末。醋調涼塗。其血

即止。

涼血地黃湯

生地三錢

黃連

當歸各一錢
五分

甘草

梔子生研

元參各一
錢

黃芩三錢

水二鐘。煎八分。量病上下服之。

〔方歌〕涼血地黃心火盛。毛孔血溢不歸經。黃連歸草芩梔子。元參煎服效通靈。

桃花散

白石灰半升。用水潑成末。與大黃片一兩五錢同炒。以灰變紅色爲度。去大黃將石灰篩細。

〔方歌〕桃花止血最爲良。一兩五錢生大黃。半升石灰相併炒。去軍研篩水調強。

血痔

血痔初起似痔形。漸大如豆其色紅。揩破外皮流鮮血。肝經怒火鬱血成。(註)此證由肝經怒火鬱血而成。初起如痣。色紅。漸大如豆。觸破時流鮮血。用花蕊石散撒之。血已止。宜冰蠶散。枯去不壞。以月白珍珠散降太乙膏蓋貼。生皮即愈。血出甚者。服涼血地黃湯。兼戒厚味發物。

血痔圖



血痔色紅如豆

花蕊石散

花蕊石

五錢火煨入童便洗之七次

草烏

南星

白芷

厚朴

紫蘇

羌活

沒藥

輕粉

龍骨煨

細辛

檀香

蘇木

乳香

蛇含石

火煨童便洗三次

當歸

降真香各二錢

麝香三分

云爲細末。漚收。臨用時撒於患處。

(方歌) 花蕊石散止血強。草烏星芷厚蓀羌。沒經龍骨細檀腐。蘇木乳歸含降香。

冰蟬散 即冰蟬散研末
見乳部穿脫

月白珍珠散 見潰
瘍門

涼血地黃湯 見血
筋

太乙膏 見潰
瘍門

腹痛無圖

腹痛本於寒氣侵。鬱者肌膚痛連心。衣觸手捺無皮狀。法宜椒酒綿濕溫。(註)此證係寒寒侵襲肌膚之中。寒鬱不行。偶犯衣觸或以手捺。疼痛連心。似乎如無皮之狀。法宜胡椒四錢。燒酒四兩。裝入磁盃內。重湯燉黃。以輭綿蘸酒。溫、熨痛處即效。

瘡口誤入毒水無圖

論潰誤入污水毒。或傷諸刺痛至骨。金蟬散煨敷瘡口。毒水流盡刺亦出。(註)潰誤入皂角驢馬尿糞。一切汚穢毒水入瘡。或木刺傷著於瘡內。焮腫疼至骨者。先以溫水洗瘡。拭乾。再用金蟬散煨凍妥貼。撒於瘡內。以加味太乙膏蓋之。良久毒水流盡。有刺亦自出矣。

金蟬散

大乾蝦蟆一個

胡椒十五粒

皂角子七粒

右用乾鍋入藥在內。瓦蓋鍋口慢火煨至烟盡。取出存性。研為細末取用。

(方歌) 金蟬潰瘡受毒水。腫痛或因木刺傷。蝦蟆胡椒皂角子。火煨烟盡研撒良。

諸瘡生蠅蛆無圖

夏月諸瘡臭腐爛。蠅衆生蛆治勿慢。蟬花散服可除之。蛆化爲水蠅畏散。(註)夏月諸瘡潰爛腐臭或孤單及懶惰之人。失於洗浴。積膿污穢。蒼蠅聞穢叢聚。以致生蛆。宜急服蟬花散。蛆盡化水而出。蠅亦不敢近瘡。嬰兒痘爛生蛆者。亦服前藥。外用寒水石細末繆之。又治瘡膿忽臭。有冬月潰瘡生蛆者。係陰濕之所生也。宜海參爲末撒之。或皂莢飛過爲末撒之。其蛆亦化爲水。

蟬花散

蛇蛻一兩火燒

存性研末

蟬蛻

青黛各五

錢

細辛二錢

五分

右爲末。每服用三錢。黃酒調服。日用二服。

(方歌)蟬花散療諸瘡穢。夏月生蛆蟬近圍。蛇蛻細辛蟬蛻黛。酒調蛆化蠅畏飛。

編輯外科心法要訣

雜證部

跌撲

跌撲之證屬尋常。復元活血湯最良。已破亡血八珍湯。未破血瘀大成湯。(註)此證有已破未破之分。亡血瘀血之別。如尋常跌撲微傷。皮肉疼痛未破者。以復元活血湯。散瘀活血。若損傷筋骨。血流過多不止者。以爲亡血。急用花蕊石散乾撒止血。內服八珍湯。加酒炙骨碎補。續斷、紅花。若從高跌墜。未曾損破皮肉者。必有瘀血流注臟腑。人必昏沉不醒。二便秘結。當以大成湯通利二便。其人自醒。若便利不醒者。灌獨參湯救之。

大成湯

大黃二錢

朴硝

枳殼各二錢
麩炒

厚朴薑炒

當歸

紅花

木通

蘇木

陳皮

甘草

各一錢
生

水二鍾煎八分。不拘時服。服後二時不行。渣再煎加蜜三匙沖服。

〔方歌〕大成活瘀便立通。確黃枳殼厚歸紅。木通蘇木陳皮草。煎服不行加蜜沖。

復元活血湯

當歸尾二錢

柴胡一錢
五分

穿山甲炙研

紅花

栝蔞仁各七分

甘草五分 桃仁十七個 大黃三錢

水二鍾。酒二鍾。煎一鍾。食遠服。以利爲度。

〔方歌〕復元活血跌撲證。惡血流瘀積滯疼。山甲柴紅 萎草。桃仁歸尾大黃行。

花蕊石散

見發其定處血瘰

八珍湯

獨參湯俱見潰瘍門

金瘡

金瘡須宜驗傷痕。輕傷皮肉重傷筋。外撒如聖桃花散。血多八珍湯獨參。〔註〕此證有金刃傷。箭鏃傷。磁鋒傷。須看傷痕深淺。輕者皮肉破損。血流不住。以桃花散撒之。重者筋斷血飛。保大脈已傷。用如聖金刀散撒之。以絹帛紮住。止而復流。再撒。若藥痂過厚拘痛者。以生肌玉紅膏塗傷處。外貼陀僧膏。長筋止痛生肌治之。無論輕重傷破出血。初服三黃寶蠟丸。傷破微出血者。服黎洞丸。若出血過多。其人面黃眼黑。不可專攻瘀血。宜用八珍湯。甚者獨參湯。先固根本。二方俱加蘇木紅花。兼調瘀血。此證雖係好肉暴傷。然驗脈法形證。亦可以定生死。如傷血過多。脈見虛細沉小和緩者生。若脈見浮洪數大實虛促者死。被傷入肺者。二七死左脇下傷內者。腸全斷者。少腹下傷內者。傷處繁多者。老人左股壓碎者。傷破陰子者。肩內耳後傷透於內者死。凡傷天聰穴與眉角。腦後臂裏跳脈。髀內陰股。兩乳上下心下鳩尾。及五臟六腑之輪者皆死。腦後出髓而不能語。目睛直視。喉中沸聲。口急唾出。兩手妄舉者亦死。又有腹皮損破腸出者。看腸若傷傷一半者可治。先以大麥糞粥。取濃汁。溫洗其腐。以桑皮尖茸爲線。蘸花蕊石散。縫傷傷口。並於縫處塗

活難冠血。隨以清油塗腸令潤。將腸輕輕納入腹中。外用生人長髮密縫腹傷口之裏肉。留外皮。撒月百珍散以侍生肌斂口。若傷口大者。不能外縫。以陀僧膏護貼。候自潰膿。即按潰瘍門治法。縫後勿驚笑。以米飲少少飲之。漸增待二十日後。再喫濃粥。調理而愈。

三黃寶蠟丸

藤黃四兩製法見黎洞丸內

天竹黃無真者九轉南星代之

紅芽大戟 劉寄奴

血竭各三兩

孩兒茶

雄黃各三兩

朴硝一兩

當歸尾一兩五錢

鉛粉

汞即水銀

乳香

麝香各三錢

琥珀二錢

各研極細末。稱準和一處。將水銀同鉛粉。在鐵鍋內火上熱研成末。入前藥內。共研勻。用煉淨黃蠟二十四兩。放磁器內坐滾水中化開。將藥入內攪勻。病重者每丸一錢。病輕者每丸五分。熱黃酒調服。倘受傷至重。連服數次。服藥後飲出汗更妙。又治一切惡瘡。以香油化開敷之甚効。

（方歌）三黃寶蠟琥天竹。大戟兒茶硝寄奴。雄竭藤黃鉛粉末。乳歸麝碾去其粗。蠟丸黃酒熱調服。外治惡瘡油化敷。能療金瘡傷損證。續筋癢散痛全無。

黎洞丸

三七

生大黃

阿魏

孩兒茶

天竹黃

血竭

乳香

沒藥各二兩

雄黃一兩

山羊血五錢無真者以小童子鮮心血代之

冰片

麝香

牛黃各二錢五分

以上各研細末

藤黃二兩以秋荷葉露泡之隔湯煮十餘次
去浮沉取中將山羊肉拌入曬乾

取秋露水化藤黃。拌藥搗干陰下。如乾加煉蜜少許為丸。重一錢。黃蠟封固。每用一丸。黃酒化服。外敷亦用黃酒磨塗。此藥如在夏天修和。取天落水拌之為丸。

〔方歌〕 黎洞金瘡跌僕傷。發背癰疽諸惡瘡。瘰癧刑傷瘋犬咬。蜂蛇蠍毒服敷良。三七火黃冰麝陳。兒茶天竹竭藤黃。羊血牛雄黃乳沒。秋露和丸酒化強。

桃花散見發無定處血箭

如聖金刀散見足部脫疽

生肌玉紅膏

陀僧膏

八珍湯

獨參湯

月白珍珠散俱見潰瘍門

花蕊石散見發無定處血瘰

箭頭入肉 附毒箭

箭頭入肉。箭頭不出。解骨丸納羊脂敷。煇銅毒箭金汁解。射酒中人篋汁塗。〔註〕箭頭嵌入肉內。鉗不出者。宜解骨丸。納傷口內。外用羊腎脂細嚼貼之。覺痛忍之極痛。箭頭漸冒。撼動拔出即以人尿洗之。貼陀僧膏。口換傷口自斂。又有毒箭二種。交廣蠻夷。用煇銅作箭鏃甚毒。人若中之。纔傷皮肉。便悶膿沸爛而死。急飲金汁。外亦用金汁抹之。若金汁一時不得。即灌人糞汁。並外敷之。非此不能解毒也。又一種以毒藥喂箭。名爲射麇。人若中之甚毒。急用葛氏方。用藍靛汁一盞灌之。外亦用塗抹傷處。用法用大豆豬羊血內服。外敷解毒亦效。又箭鏃不出者。搗鼠肝塗之。或鼠腦搗塗即出。

解骨丸

蛇螂研

雄黃研

象牙末

各等分

共和勻煉蜜爲丸。如黍米大。納傷口處。

(方歌) 解骨丸能拔毒蠶。蛇螂雄黃功效速。象牙末加蜜煉丸。大如黍米納傷處。

陀僧膏見漢瘍門

鐵錢入肉

一鐵錢入肉隨氣遊。走向心胸險可愁。烏鴉翎灰酒調服。膏貼錢出始免憂。(註) 凡鐵錢誤入肉中。無眼者。有眼者隨氣遊走。若走向心窠胸膈者險。急用烏鴉翎數根。炙焦黃色。研細末。酒調服一錢或二錢。四外用神聖膏貼。三五次其錢自出。前法用在一二日間效。

神聖膏

用車脂香油。不拘多少。研如膏。調慈石末。攤紙上。如錢許貼之。每日二換。

鐵錢誤入咽喉

誤吞鐵錢入咽喉。急飲蝦蟇血數頭。錢不卽吐若難散。或食飴糖出不留。(計) 鐵錢誤入咽喉。無藥可施。用蠶蝦蟇數個將頭剝去。倒垂流血。以盃接之得一盃許。灌入喉中。移時連錢吐出。錢自輕曲一方用藥。驅撥存性。研末。每服三錢。黃酒調服。亦能化錢。或用飴糖一筋。食盡便出。

誤吞銅錢

誤吞銅錢雖無疼。久留腹中病必成。葶薺能化堅爲軟。多食無傷可化銅。(註)誤吞銅錢。多食葶薺。而化堅爲軟。若誤吞鐵骨等物。腸中不能轉送。覺墜者。多食青菜豬脂。自然送入大腸。與糞同出甚效。

骨鯁咽喉

骨鯁咽喉最可憂。吐嚔刺痛礙咽喉。魚骨須用鴨涎灌。獸骨狗涎灌即瘳。(註)此證由嚔物急迫。骨鯁於喉。妨礙飲食。吐嚔刺痛。宜急治之。然有魚骨獸骨之分。誤吞魚骨者。用河中養著活鴨。倒挂垂涎。以盪接下。令患人仰臥。頻灌。其骨盡化。誤吞獸骨者。用狗一隻。倒挂接涎如前法。頻灌其骨盡化俱效。治。咽喉腫痛潰膿。宜用水硼散吹之。不可妄服涼藥。若骨勢大者。與飲食難下。餓倒胃氣者。俱屬難治。

水硼散見口部鵝口瘡

杖瘡

杖瘡須宜看其形。已破未破要分明。清涼拈痛膏破用。敷之消腫並止疼。未破瘀血須當破。湯劑急宜用。成。玉紅膏貼瘀腐痛。搽之新肉自然生。(註)此瘡有已破未破之分。已破者隨杖後用清涼拈痛膏敷之。腫即消。未破瘀血內攻者。急宜破去瘀血。內服大成湯。便通自愈。如傷處瘀腐作疼者。生肌玉紅膏搽之。自然腐化新生。其效甚捷。

清涼拈痛膏

如意金黃散一兩。加樟腦末三錢和勻。又用生白石灰塊三四兩許以水泡開水高石灰二三指。露一宿。將石灰面上浮起油沫掃如雲片者輕輕。帶水起入盆內。有水一盞。對香油一盞。竹筋攪百轉。自成稠膏調。前藥稀稠得所不用湯洗徧敷傷處。紙蓋布紮夏月一日。冬月二日。方用葱湯淋洗乾淨。仍再敷之。以腫消痛止爲度。

〔方歌〕清涼拈痛金黃散。加入樟腦末三錢。杖瘡破後多疼痛。石灰水油調敷痊。

大成湯見跌

生肌玉紅膏見潰

如意金黃散見腫

撲

傷門

傷門

夾傷

夾傷禁用藥貼敷。硃砂燒酒可調塗。瓊液散服隨飲醉。腫勢必消痛目除。復受重刑潰破者。代杖湯藥速宜圖。氣血弱者當大補。六真膏貼痛即無。〔註〕夾傷即擠傷也。禁用敷藥膏藥。及泥塗等法。恐後必作腫成膿。受刑初宜服代杖丹以護心。隨用銀珠或硃砂末。燒酒調敷傷處。再著一人以手十指尖。輕啄患者脚心。先覺瘡。次覺疼爲止。次者一二人以筆管於患者脚面上。輕輕趕之。助通血脈。候傷處凹者突起。四圍腫大爲度。即服瓊液散。隨飲至醉。次日揩去所敷銀珠。只用洗杖傷湯。日燙二三次。次日再服瓊液散。其腫自消痛即止矣。如復受重刑。以致破潰者。外貼瓊液膏。內服代杖湯。纔宜大補氣血。易於收功。生肌時換貼六真膏。其效甚捷。

代杖丹

丁香

蘇木

蚯蚓去土

無名異

丹皮

肉桂

木鱉子

乳香

沒藥

自然銅

各一兩火煨
醋淬七次

右爲末。煉蜜和丸二錢重。用一丸黃酒化下。

(方歌) 代杖護心血不攻。了香蘇木蚓無名丹皮肉桂木鱉子。乳香沒藥自然銅。

瓊液散

鬧羊花

擇去梗蒂莖葉洗去
灰砂曬乾砂鍋微焙

爲末。每服五分。壯者七分。先飲醇酒至午酣。次用調藥服下。再飲至大醉爲度。靜臥勿語。語則發麻。

至次日其麻方解。消腫止疼。其功甚捷。連服三五次。弱者間一日再服。

(方歌) 瓊液散消瘀血滯。豫酌酒至午酣時。鬧羊花末調服下。瓊液復飲醉如癩。

洗杖湯

陳皮

透骨草

南星

天門冬

地骨皮

天靈蓋各五錢

象皮一兩切碎

水煎浸洗。日三二次。

(方歌) 洗杖湯陳透骨星。天冬地骨共天靈。象皮水煎日動洗。夾傷消腫又除疼。

瓊液膏

當歸尾

鬧羊花

紅花

白芷

蒲黃各兩

香油一觔。浸藥七日。煤枯去渣。入白蠟黃蠟各一兩。溶化盡。絹濾淨。稍溫再入冰片六分。復藥乳香末各六錢。攪勻攤貼。

〔方歌〕 復液膏貼夾傷破。歸關紅花芷蒲黃。油燻又下白黃蠟。再加冰片沒乳香。

代杖湯

乳香

沒藥

蘇木各

蒲黃

木通

枳殼製炒

甘草生 當歸尾

丹皮

木耳

穿山甲各一錢

土木鱉五個

酒水煎服。

〔方歌〕 代杖湯醫夾傷驗。乳沒蒲黃通枳甘。歸尾丹皮鱉木耳。酒煎蘇末炙穿山。

六真膏

樟腦三兩

孩兒茶

滴乳香

血竭

沒藥

三七各三錢

共爲末。用豬脂油十二兩。盛火煮化。將藥入油內。和勻攤貼。

〔方歌〕 六真膏貼夾杖傷。樟腦兒茶滴乳香。竭浸三七脂油化。和勻諸膏也相當。

竹木刺入肉

諸刺入肉係外傷。螻蛄搗塗最爲良。如刺已出乃作痛。再塗螻蛄即無妨。〔注〕 諸刺入肉。外傷之傷也。螻蛄

淺者以錢撥出。硬深者搗蜈蚣塗之。少時卽出。如刺已出而仍作痛者。再以蜈蚣塗之卽愈。

破傷風

皮肉損破。氣血傷風。初覺牙關緊不鬆。甚則角弓反張狀。吐涎抽搐不時等。四因動靜驚潰毒。陷縮神昏不語。因。在表者宜裏宣下。半裏半裏以和平。(註)此證由破傷皮肉。風邪襲入經絡。初起先發寒熱。牙關緊急。甚則身如角弓反張之狀。口吐涎沫。四肢抽搐。無有寧時。不省人事。麪目銹澀。然傷風有四。因風受、靜受、驚受、潰潰後受。皆可傷風。動而受者。然則氣上。其人跳躍。皮肉觸破。雖被風傷。風入在表。因氣血虛旺。不致深入屬靜。靜受者。起作和平之時。氣不充鼓。偶被破傷。風邪易於入裏屬重。驚受者。驚則氣陷。偶被傷破。風邪隨氣直陷入陰。多致不救屬逆。若風邪傳入陰雜者。則身涼自汗。傷處反風平塌陷縮。甚則神昏不語。噤口舌短。其證宜垂阜治。當分風邪在表在裏。或半表半裏。以施汗下和法。如邪在表者。寒熱拘急。口噤咬牙。宜服千里奔散。或雄鼠散汗之。次以蜈蚣星風散頻服。追盡臭汗。如邪在裏者。則驚而抽搐。臟腑秘澀。宜江樞丸下之。如邪在半表半裏。無汗者宜羌麻湯主之。若頭汗出。而身無汗者。不可發汗。宜橘丁散和之。若目汗不止。二便秘赤者。宜大芍黃湯主之。又有發表太過。臟腑雖和。自汗不止者。宜防風當歸散服之。發表之後。表熱不止者。宜十芍黃湯服之。攻裏之後。裏熱不止。宜栝石湯服之。若傷時血出過多。不可再汗。宜當歸地黃湯主之。至於生瘡盡後受風者。因生瘡潰而合。失於調護。風邪乘虛侵入瘡口。先從瘡圍起粟作癢。重則牙緊項下視。不宜發汗。誤汗令人成瘰。當以參歸養榮湯。加殭蠶主之。先固根本。風邪自定。若手足戰掉不已者。宜硃砂指甲散主之。若癩盛抽搐身冷者。宜黑花蛇散主之。外治之法。遇初破之時。一二日間。當用灸法。命汗出其風邪方解。若日數已多。卽

禁川灸法。宜羊尾油漬微熟。絹包乘熱熨破處。數換投盡風邪。未盡者次日再熨。兼用漱口水洗之。日數上真散。至破口不銜出膿時。換貼生肌玉紅膏。緩緩收斂。按劉完素只論三陽汗下和三法。而不論三陰者。蓋風邪傳入陰經。其證已危。如腹滿自利。口燥咽乾。舌捲囊縮等類。皆無可生之證。故置而不論也。

千里奔散

用行遠路驟蹄心。陰陽瓦煨存性。研細。每服三錢。熱黃酒沖服。

〔方歌〕千里奔散破傷風。口噤拘急寒熱攻。驟蹄火煨存性研。每服三錢黃酒沖。

雄鼠散

活雄鼠一枚。用鐵線縛繞。陰陽瓦煨存性。研爲細末。作一服熱黃酒調下。

〔方歌〕雄鼠破傷風居表。活鼠一枚鐵線繞。陰陽瓦煨存性研。酒調盡服風邪了。

蜈蚣星風散

蜈蚣二條

江鯨三錢

南星

防風各二錢

五分

共研細末。每用二錢。黃酒調服。一日三服。

〔方歌〕蜈蚣星風邪未散。搜風發汗去風源。南星江鯨防風末。酒服經絡自通宣。

江蠔丸

天麻

雄黃各一錢

蜈蚣二條

江蠔

僵蠶炒

野鴿糞各五分

共研細末。作兩分。一分飯丸如梧桐子。硃砂爲衣。一分加巴豆霜二分五厘。飯丸加梧桐子大。每用硃藥二十丸。加巴豆藥一丸。二服加二丸。白滾水送下。至便利爲度。再服硃砂藥。病愈即止。

(方歌) 江標破傷風入裏。鷓鴣抽搖下之宜。天麻蜈蚣鴉鴿糞。雄黃巴霜丸硃衣。

羌麻湯 羌活 麻黃 川芎 防風 枳殼 麩炒

白茯苓 石膏煨 黃芩 細辛 甘菊花 蔓荊子

前胡 甘草各七分 薄荷各五分

生薑三片。水二鍾。煎八分服。

(方歌) 羌麻湯芍風枳殼。苓芷石膏芩薄荷。細辛菊麩前甘草。發汗破傷風即瘳。

榆丁散 防風 地榆 紫花地丁 馬齒莧各五錢

共研細末。每服三錢。溫米湯調下。

(方歌) 榆丁破傷風爲患。頭汗身無不宜散。此藥米湯服緩和。防榆地丁馬齒莧。

大芎黃湯 黃芩 羌活 大黃各二錢 川芎二錢

水煎服。以微利爲度。

〔方歌〕大芎黃治破傷風。汗多便秘小水紅。水煎黃芩地羌活。大芎切片共川芎。

防風當歸散

防風

當歸

川芎

生地各二錢
五分

水煎服。

〔方歌〕防風當歸表太過。臟腑雖調汗出多。只將四味水煎服。川芎生地共相和。

小芎黃湯

川芎三錢

黃芩二錢

甘草五分
生

水煎溫服。

〔方歌〕小芎黃湯發散後。表熱猶存用此藥。芎芩甘草煎溫服。退熱除根神效奇。

栝石湯

栝蒌仁九錢

滑石一錢
五分

蒼朮米泔水浸炒

南星

赤芍

陳皮各一錢

白芷

黃蘗

黃芩

黃連各五分

甘草一分
生

生薑三片。水三鍾。煎一鍾服之。

〔方歌〕栝石芍芷藥本連。蒼朮南星陳草煎。醫治破傷風下後。熱瀉不解服之痊。

當歸地黃湯

當歸

熟地

川芎

藥本

白芍酒炒

防風 白芷各一錢 細辛五分

（煎服）

（方歌）當歸地黃芩桑本。白芍防風芷細辛。破傷之時血出甚。服此滋榮風不侵。

參歸養榮湯 人參 當歸 川芎 白芍酒炒 熟地

白朮土炒 白茯苓 陳皮各一錢 甘草五分

生薑三片。紅棗肉二枚。水煎服。

（方歌）參歸養榮榮傷虛。潰瘡失護風邪居。生薑三片一枚棗。八珍湯內入陳皮。

硃砂指甲散 人手足指甲燒存性 硃砂 南星 獨活各二錢

共研細末。每用四錢。熱黃酒調下。

（方歌）硃砂指甲散神效。破傷風侵手足搖。每用四錢熱酒服。南星獨活指甲燒。

黑花蛇散 麻黃一兩 黑花蛇六錢即烏蛇酒浸 天麻 白附子 乾薑

川芎 附子一兩 草烏各五錢 蠟梢三錢

炭 炮去皮 五分

共研細末。每服一錢。熱黃酒調下。日二服。

〔方歌〕 黑花蛇散蠍麻黃。天麻白附子乾薑。川芎附子草烏泡。善却風痰醫破傷。

玉真散

白芷

南星

白附子

天麻

羌活

防風各一兩

共研細末。唾津調濃敷傷處。如破傷風初起。角弓反張。牙關緊急。每用三錢。熱童便調服亦妙。

〔方歌〕 玉真散芷共南星。白附天麻羌活風。破傷風襲傳經絡。熱酒調服立奏功。

生肌玉紅膏

見潰瘍門

發瘰

潰瘍發瘰類破傷。有汗爲柔無汗剛。膿血出多成此證。補正驅邪要審詳。〔註〕此證勢類破傷風。牙緊體強。肢搖背反。有汗曰柔瘰。無汗曰剛瘰。由潰瘍亡血過多所致。治宜大補氣血。以十全大補湯。加鈎藤鈎橈子天麻。服之不應者。服獨參湯。手足逆冷。加桂附。誤作風瘰。汗之則危。

十全大補湯

獨參湯俱見潰瘍門

湯火傷

湯浸火燒皮爛疼。即起挑破使毒輕。煩躁作嘔防毒陷。便祕神昏氣喘凶。〔註〕此證係好肉暴傷湯燙火燒。皮膚疼痛。外起燎皴。即將即挑破。放出毒水使毒輕也。其證雖屬外因。然形勢必分輕重。輕者施治。重者

而愈。重者防火毒熱氣攻裏。令人煩躁作嘔便秘。甚則神昏悶絕。初傷用冷燒酒一鍾。於無意中望患者胸前一滾。被喫一驚。其氣必一吸一呵。則內之熱毒隨呵而出矣。仍作煩悶者。以新童便灌之。外初用清涼膏塗之。解毒止痛。不致臭爛。次以蠶粟膏塗之。痛止生膿時。換黃連膏貼之收斂。火毒攻裏者。宜四順清涼飲服之。務令二便通利。則毒熱必解。初終禁用冷水并泥浸濕傷處。恐熱毒伏於內。寒滯束於外。致令皮肉臭爛。神昏便秘。端肩氣喘。多致不救。外花炮火藥烘燎者。治法同前。

眼馬粟膏

眼馬粟花十五朵無花

以殼代之

香油四兩。將蠶粟煤枯。滷淨。入白蠟三錢溶化。盡傾入盃內。待將凝之時。下麝粉二錢。攪勻純水中。令冷取出。臨用時用脚挑膏。手心中捺化。搽於傷處。綿紙蓋之。日換二次。其痛自止。次日用靛帛搥淨。搥皮。再搽之。

(方歌) 蠶粟膏醫湯火燒。香油蠶粟共煎熬。白蠟更兼真麝粉。患上搽塗痛即消。

清涼膏

本澄開石灰末一升。加水四盃。攪渾澄清汁一盃。加香油一盃。以筋腦攪數百轉。其稠黏如糊。用雞羽蘸掃傷處。

黃連膏見鼻部

鼻瘡

四順清涼膏見面部

疥癩

凍瘡

凍瘡觸犯嚴寒傷。氣血肌肉硬腫。涼水揉湯覺熱散。大忌烘火立成瘡（註）此證由觸犯嚴寒之氣。傷及皮膚著凍。以致氣血凝結。肌肉硬腫。凍木不知痛癢。即在著凍之處。墊衣揉搓。令氣血活動。次用涼水頻洗覺熱。凍木處通活如故則已。若日久凍爛。瘡癢不散。用冰一塊。絹包潤之。以凍化盡爲度。此從治之法也。若暴凍即著熱。或進煖屋。或用火烘湯泡。必致肉死損形。輕則潰爛。重則骨脫筋連。急剪去筋。否則浸淫好肉。初治宜人參養榮湯加醇酒服之。潰爛者外按癰疽潰瘍治法。亦有經年不愈者。用獨勝膏敷之其效。

獨勝膏

於六月初六二十六日。用獨頭蒜杵爛。日中曬熱。塗於凍發之處。即於日中曬乾。忌患處著水。

人參養榮湯

見潰瘍門

人齲傷

人齲係受牙毒傷。腫痛臭爛異尋常。始終惟宜童便洗。蟾酥條餅功最良。（註）此傷由人牙齒。食用炙縛之物。漸漬有毒。故一受其傷。則腫痛臭爛。異於尋常。初齲時用熱童便浸傷處。洗去牙黃汚血。貼蟾酥餅。以萬應膏蓋之。出微膿即愈。若失治。則爛痛發腫。仍用童便浸洗。此用油紙捻點火於患處薰之。良久插蟾酥條如傷口大。作餅卷上。萬應膏蓋之。俟腫消時。用葱白二兩。甘草五錢。煎日洗一次。換生肌玉紅

膏。蓋貼萬應膏收口。一法隨於敵後。即用童便洗之。人糞塗之。腫潰時人中黃煎湯時洗。較諸治法。尤神效。

蟾酥餅

蟾酥條

見疔瘡門

萬應膏

生肌玉紅膏

具見潰瘍門

熊虎狼傷人

熊虎狼傷致成瘡。內外服洗葛根湯。青布燃薰鐵湯洗。獨窠粟子嚼塗傷。(註)熊虎狼牙爪傷人皮肉成瘡者。初宜葛根濃煎。內服一二鍾。外洗日十度。或煮生織有味者洗之。又用青布。搗為繩。燃著納竹筒中。注瘡口薰之出毒水。次宜獨窠粟子。生嚼塗傷口效。

馬齧傷

馬齧傷時損肌肉。粟子嚼爛敷患處。若逢毒氣入裏者。馬齒煎湯速宜服。(註)此傷用粟子嚼爛敷之。毒氣入裏。心煩嘔悶者。馬齒煎湯飲之。即效。外用馬鞭子挽子及鞭穗。煨灰存性研末。豬脂搗合貼之俱效。

瘋犬齧傷

瘋犬齧傷毒最深。刺吮糞灸尿洗淋。頂心紅髮當拔去。三年禁忌保終身。(註)犬因五臟受毒而成瘋犬。故經其齧。必致傷人。九死一生之證也。初被齧時。急就齧處刺令出毒血。以口含漿水吮洗傷處。或以拔法掃之。或以人尿淋洗。拭乾。即用核桃殼半邊。以人糞填滿。黏在齧處。上著艾灸之。殼焦糞乾。再易。灸至百壯。以五真散唾津調敷。次日再灸。漸灸至三五百壯為度。於初灸時即服扶危散。逐惡物血片。從小水出。若毒物血片。堵塞草中。致小水澀滯若淋者。即服曉時黃散以通利之。破齧之人。頂心有紅髮一根。

虛氣已出。易丸再搗。至無茸毛方止甚效。始終禁忌。必當慎重。終身忌食狗肉。及蠶蛹赤豆。百日內忌見麻物。忌飲酒。三年內忌食一切毒物。及房事。可常食杏仁。以防其毒。若治遲犬毒入心。煩亂腹脹。口吐白沫者。用虎頭骨。虎牙虎脛骨爲末。酒調二錢服之。若發狂叫喚。人聲似犬聲。眼神露白者逆。終始犯禁。忌者不救。

扶危散

蜚螫

按日敷用之。如犬咬已竟。七日用七個。十日用十個。去翅足加糯米同炒去米。

滑石二兩

水飛

雄黃 錢

麝香二分

共研細末。每服一錢。溫酒調下。不飲酒者。米湯調下。

(方歌) 扶危散治瘋犬咬。蜚螫糯米一同炒。滑石雄黃與麝香。研加酒服毒即掃。

琥珀碧玉散

滑石六兩

甘草一兩

琥珀五錢

青黛八分

共研細末。每服三錢。燈心煎湯調下。

(方歌) 琥珀碧玉用六一。黛珀同加研極細。燈心湯調服三錢。滑盡能醫小水利。

瘋犬咬傷拔法

用砂燒酒壺兩個。盛多半壺燒酒。先以一壺上火令滾無聲。痛去酒。即按在被傷瘡口。拔出汚黑血。水滿則自落。再以次重。仍按瘡口。輪流提拔。以盡爲度。其證立愈。

玉真散見破傷風

馬汗驅涎入瘡

潰瘡誤見馬汗毒。焮痛紫腫瘡四旁。急反腫處出紫血。烏梅嚼爛塗敷良。患者煩熱毒攻腹。強弱量服馬乳湯。更有腫涎入瘡者。冬瓜青皮末敷瘡。(註)此證係潰瘡未合。誤入馬汗之毒。以致瘡口四旁。忽復焮痛紫腫。宜急腫處。令出紫血。烏梅嚼爛。塗於瘍上。若患者煩悶發熱。恐毒入腹。以致不救。急用醴酒漬煎馬齒草飲之。其毒爲效。但馬齒草其性寒滑。凡潰瘡未合。氣血未復。而又受此汗毒。必量人壯弱。用一兩五錢。更有蠟涎入瘡者。形證與馬汗毒同。宜冬瓜片下青皮。响乾研末敷之。煎湯洗之亦可。毒甚者濃用馬齒草酒飲之立效。

蛇敲傷

針敲傷時即飲醋。仍宜用繩繫患處。再服五靈共雄黃。腫消口合自如故。(註)凡被蛇敲傷者。即時飲好醋二三杯。使氣不逆血走以繩繫傷處兩頭。若手困宜用五靈脂五錢。雄黃一分。共爲末。酒調。浸灌之。小時數處出黃水。水盡則腫消。以雄黃之糝之。口合而愈。

蜈蚣咬傷

蜈蚣咬傷用雄雞。倒控涎手蘸之。埃搽傷處痛立止。其飲鷄血最相宜。(註)此傷取雄鷄倒控少時。以手蘸雞口內涎抹。搽傷處。其痛立止。甚者生鷄血乘熱飲之立效。

蠶蟻毒取大蝮牛。搗爛塗之。痛立止。凡蝮蟻。取大蝮牛一個。蟻蠶塗之。其痛立止。一時不得蝮牛。即將蟻處搽去毒水。急用膏藥烤熱貼之。亦能止痛。蠶咬者。用芋根搗汁塗之即愈。

射工傷

射工傷人必癢痛。甚則骨肉爛成瘡。豆豉搗敷白芷洗。已爛海螵蛸末良。(註)射工即楊間雜毛蟲也。又名瓦刺蟲。人觸著則能放毛射人。初發次痛。勢如火燎。久則外癢內痛。骨肉皆爛。名藥罔效。用豆豉清油搗敷痛癢之處。少時則毛出可見。去豆豉用白芷煎湯洗之。如肉已爛。用海螵蛸末搽之即愈。

蚯蚓傷

蚯蚓咬傷受毒氣。眉髻脫落全無跡。法用鹽湯頻頻洗。久則其毒自然去。(註)蚯蚓咬傷。即受蚯蚓毒。令人眉髻皆落。狀如大麻風。但夜則蚓鳴於體中爲異耳。宜用鹽湯頻頻洗之。其毒自去。

天蛇瘡

天蛇瘡發肌膚中。似癩非癩是其形。證因草內蜘蛛毒。復被露水侵始生。(註)此證生於肌膚。似癩非癩。是草中花蜘蛛螫傷。復被露水所侵而致。法宜秦艽一味煎湯。徐徐飲之。外敷一味拔毒散甚效。

二味拔毒散見腫瘍門

蠶蟻傷

蠶蟻傷人。誤著皮膚水炮塗。痛如火烙如豆大。鹽湯二味拔毒侵。(註)此蟲一名多脚蟲。藏於壁

聞。以尿射人。若誤中其毒。令人皮膚起癢漿水泡。痛如火燎。初如飯糰。次如豆大。宜鹽湯綿裹瘡上。換即消。甚則毒延偏身。搔養不休。宜二味拔毒散敷之甚效。

二味拔毒散見腫瘍門

百蟲入耳

蟲偶入耳勿驚慌。燒肉香氣近耳旁。獨坐夜燈引蟲出。麻油滴耳使蟲殃。(註)百蟲偶然誤入耳中。如蟬小蟲。以麻油數點滴入耳竅。蟲即死取出。如蛹等物入者。以肉灸香。置於耳旁。蟲聞香自出。夜間暗者。切勿驚慌響叫。逼蟲內攻。宜端坐點燈光向耳竅。其蟲見光自出。若對面有人。其蟲不出。人皆旁避。救。

御纂醫宗金鑑卷十六

諸病外科心法要訣

嬰兒部

赤遊丹毒

胎毒初患赤遊丹。腹肢先後內外參。內服外貼兼。血。紅輕紫重黑難痊。(註)小兒赤遊丹之證。皆由胎毒所致。欲發之時。先身熱啼叫。鵝指不寧。次生紅暈。由小漸大。其色如丹。遊走無定。起於背腹。流散四肢者順。起於四肢。流入胸腹者逆。或初生之後。外用熱水洗浴。兼以火烘衣物。觸動內毒。遂成此證。治之者宜。出惡血。看血色紅者輕。紫者重。黑者死。次宜牛羊肉片。徧貼紅暈處。候乾再易。俟肉片不乾。換如意金毒散。用鹽澆清汁調敷。內初服大連翹飲。次服消毒犀角飲。大便祕結。加生大黃三五分。若煩躁不安未者。宜服五疳化毒丹。若失治。毒氣入裏。腹脹堅硬。聲音雌啞。吮乳不下。曠者。散宜服紫雪下之。一二日間。身輕腹軟。熱退身涼。皮處肉活。乳哺如常者生。反此者不治。

大連翹飲

連翹去心

當歸

赤芍

防風

木通

滑石水飛

牛蒡子炒研

蟬蛻去足翅

瞿麥

石膏煨

荊芥

甘草生

柴胡

黃芩

梔子生研

車前子各五分

水二鍾。燈心二十根。煎八分。于與乳母同服。

〔方歌〕大連翹飲赤遊丹。歸芍防通滑芎蟬。瞿麥石膏薤芥草。柴苓梔子共車前。

消毒犀角飲

犀角鎊

防風各一

甘草五分

黃連三分

水二鍾。燈心二十根。煎四分。徐徐服之。

〔方歌〕消毒犀角飲黃連。防風甘草共和煎。赤遊丹毒啼驚搐。氣粗身熱服之安。

五福化毒丹

人參

赤茯苓

桔梗各二

牙硝

青黛

黃連

龍膽草各一

甘草五錢

黑參

硃砂各三

冰片五分

共研細末。煉蜜爲丸。如芡實大。金箔爲衣。每服一丸。薄荷燈心煎湯化服。

〔方歌〕五福化毒清熱速。瘡癰丹毒服即除。參苓桔草硝冰黛。黃連龍膽草黑參硃。

如意金黃散

見腫瘍門 紫雪散見舌部重舌

胎癰

嬰兒初產患胎癰。胎熱瘀血是根由。色紫漸大熟透刺。放出膿汁自可瘳。〔註〕此證由胎前孕母積熱。以致胞熱。更兼血瘀滯結而成。多生頭上。及胸乳間。初起如核。漸大如饅。色紫微硬。漫腫不痛。寒痛。嬰兒初

生肌膏者。候滿月。熱透可鍼之。放出赤豆汁。其膿未盡。其腫則消。服初五福化毒丹。黃蘗貼連膏。貼生肌膏。生肌膏。口。若滿月後生者。不得腫破。或。若。詳註於紅絲癰。

五福化毒丹 黃蘗膏 生肌膏 紅膏 見潰瘍門

紅絲癰

嬰兒初生紅絲癰。皮合血絲。大由。精中紅絲。伏火。相傳患此。終難瘳。(註)此一名胎癰。發無定處。由小漸大。嬰兒落草。或一。之。患之。癰皮色紅。中含血絲。亦有自破者。治之。胎癰。但此患由先天腎中伏火。精有血絲。以氣相傳。生子故有此。終變火。潰處亦難收斂。

胎瘡

瘡瘡始於胎前。胎中血熱受風。乾癢白屑。濕淫水。熱極紅。火。 (註)此。胎兒如項。或生瘡。端。又名。起白屑。形如癩疥。由胎中血熱。落草受風。此係。有。皮膚起粟。癢。無度。深。延及。即成濕。消風。赤湯。乾者。潤肌膚。法。與滑石等分。撒之。厚。再以潤肌膚。又有熱極。火熱。紅。成片。遊。如火丹。治法不宜收斂。只宜外發。宜服五福化毒丹。亦以潤肌膚。者俱用烏雲。之。乳母忌。河海魚。雞。辛辣。風。發物。緩。自效。

- 消風導赤湯
- 生地
- 赤茯苓各一錢
- 牛蒡子
- 白鮮皮
- 金銀花

南薄荷葉

木通各八分

黃連酒炒

甘草各三分

燈心五十寸。水煎徐服。

〔方歌〕消風導赤醫胎瘰。疎風清熱勞黃連。白鮮生地赤苓薄。銀花燈草木通甘。

烏雲膏

松香二兩

硫黃末一兩

研勻。香油拌如糊。攤南青布上。少半指厚。捲成條。線紮之。再用香油泡一日。取出刮去餘油。以火煎着。一頭。下用粗碗接之。布灰陸續剪去。取所滴藥油。浸冷水內一宿。出火毒抹之。

〔方歌〕烏雲膏搽胎瘰瘡。油拌松香末硫黃。布攤捲紮香油泡。火煎去灰用油良。

潤肌膏見頭部白屑風

五福化毒丹見赤遊丹毒

痘癰

痘癰毒留經絡中。發無定處腫不紅。留於肌肉爲治易。結於骨節難成功。〔註〕此證因出大痘。漿瀝不足。以致毒氣不得透發。留滯經絡之中。隨處可生。小如李者爲毒。大如桃者爲癰。漫腫不紅。亦無癢痛。身多煩。若生單個者。毒在肌肉屬順。易治。連發數處者。船小載重屬險。若結於骨節之間。或成對發出者。其毒已盛。潰破之後。滲泄氣血。不能斂口屬逆。初發不可強消。俱宜服透膿散。外敷烏龍膏。膿熟鍼之。加味太乙膏貼之。若氣血虛弱者。食服保元湯。潰後潮熱全退。毒氣方淨。否則何處之憂。忌生冷硬雜食。

保元湯

人參

白朮土炒

當歸

黃耆各一錢

甘草三分

生薑一片。紅棗肉二枚。水二鍾。煎八分。食遠服。

〔方歌〕保元湯補真元氣。脾胃虛弱服更宜。人參白朮炙甘草。當歸薑棗共黃耆。

透膿散

烏龍膏俱見腫瘍門

加味太乙膏見潰瘍門

葡萄疫

葡萄疫同葡萄狀。感受穢疫鬱發生。徧身發點青紫色。毒攻牙齒類疳形。〔註〕此證多因嬰兒感受穢疫之氣。鬱於皮膚。凝結而成。大小青紫斑點色。狀如葡萄。發於徧身。惟脛脛居多。甚則邪毒攻胃。以致牙齦腐爛。臭味出血。形類牙疳。而青紫斑點。其色反淡。久則令人虛羸。初起宜服羚羊角散。久虛者宜服胃脾湯。米泔水漱口。以非疳散日擦四五次。即效。近見中年之人不虛者。亦患此證。治法同前。

羚羊角散

羚羊角鎊

麥冬去心

黃芩

知母

牛蒡子炒研

防風

元參各八分

甘草二分

生

水二鍾。淡竹葉十片。煎六分。食遠服。

〔方歌〕 羚羊角散麥冬苓。知葑防風草元參。葡萄疫發初宜服。煎加竹葉效如神。

● 胃脾湯 白朮土炒 遠志去心 麥冬去心 沙參 茯神

陳皮各六分 五味子 甘草各五分

水二鍾。煎六分。食遠服。 虛弱自汗者。去沙參。加人參黃耆各五分。

〔方歌〕 胃脾湯治葡萄疫。日久虛添羸弱宜。朮運麥冬五味子。沙參甘草茯陳皮。

非疳散 冰片四分 人中白殺去臭 五倍子各一兩沙茶

氣存性 褐色存性

共研細末。先用米泔水漱口。後搽此藥。

〔方歌〕 非疳中白煨五倍。二味同研冰片兌。醫治諸疳患處擦。清熱止疼去臭穢。

胎驚丹毒

胎驚丹毒面初生。形如水痘根微紅。時出時隱延頸項。 繼發丹毒赤遊同。〔註〕此證因孕母受驚。寐驚心

胎。嬰兒初生之後。週歲以上。忽兩眼胞紅暈。面色青黯。煩熱夜啼。或面如燕脂。此屬伏熱在內。散發於

面。狀如水痘。根脚微紅。時出時隱。延及頸項。繼發丹毒。初用四聖散洗目。其形色順逆。治法皆同。胎毒

丹。若此患延及胸乳。癢喘抽搐。此屬火毒攻裏。防變驚風。宜服百解散五和湯救之。

四聖散 木賊 秦皮 紅棗子 燈心 黃連名五錢

共研粗末。每用二錢。水一鐘。煎七分。去渣頓洗兩目。

(方歌) 四聖散治熱毒侵。木賊犀皮棗蠶心。再入黃連研粗末。煎湯去渣洗目頻。

百解散

乾葛二兩

升麻

赤芍各二兩

甘草一兩五錢

黃芩二兩

麻黃七錢五分

肉桂

各五分 搗碎

共研粗末。每服二錢。水一鐘。薑二片。葱一根。煎七分。不拘時服。

(方歌) 百解驚丹毒內攻。煎服不致變驚風。乾葛麻黃芩桂草。升麻赤芍共薑葱。

五和湯

大黃

枳殼炒

甘草各七錢

赤茯苓

當歸各五錢

共研粗末。每服二錢。水一鐘。煎七分。不拘時服。

(方歌) 五和甘草並當歸。赤苓枳殼大黃隨。驚丹延乳添抽痛。煎服火毒即剷推。

滯熱丹毒

滯熱丹毒赤遊形。傷乳多食滯熱生。較之赤遊走緩慢。先宜消食次宜清。(註) 此毒初發。形若赤遊丹。較之赤遊丹遊走緩慢。因嬰兒乳食過多。不能運化。蘊熱於內。達於肌表而生。發熱面赤。口酸舌有黃胎。宜服和丸。先消食滯。若昏焦便秘者。宜一捻金服之。丹毒偶作者。宜犀角散服之。其餘治法。俱按赤遊丹。

保和丸 白茯苓 半夏製 山查肉 神麴各一兩妙 陳皮

蘿蔔子炒 連翹各五錢 去心

右研細末。粥丸如梧桐子大。每服三十九丸。白滾水化下。

〔方歌〕保和丸用茯苓夏。陳皮蘿蔔子山查。神麴連翹丸水服。能消乳積効堪嘉。

一捻金 人參 大黃 黑丑 白丑 檳榔各等分

共為細末。每服一字。蜜水調下。

〔方歌〕一捻金醫食火積。唇焦便秘服通利。次用黑白丑人參。檳榔為末須加蜜。

犀角散 犀角屑 升麻 防己 山梔生 朴硝 黃芩

黃耆各一錢 牛黃五分

右為細末。每服五分。竹葉煎湯調下。量兒加減用之。

〔方歌〕犀角散消丹毒赤。升麻防己共山梔。硝耆黃耆牛黃末。竹葉湯調服無時。

嬰兒瘡毒

嬰兒宿積乳火成。因食厚味滯火聚。更發六淫氣感受。腫潰汁法打痕。凡嬰兒生瘡極小。多由乳母七情之火。或過過歲。能飲食者。由疳食致熱厚味而生滯火。更發六淫之氣感受。皆能成之。但發表攻裏。托裏消毒等法。及腫潰外治。俱按瘡疽腫瘍潰瘍門。嬰兒純陽。火證居多。非峻劑不能勝其病。但肌膚癢。應效即止。不可過劑。

垂癰

嬰兒垂癰上脛生。喉前結腫色紅疼。積熱凝結宜刺破。服五福丹抹冰硼。(註)此證生於喉前上脛。下垂如珠。紅腫脹痛。不能吮乳。三四日後。宜用鍼刺一二分。放出膿血。其腫痛即減。由積熱凝結而成。宜服五福化毒丹。兼用冰硼散。抹於瘡處。日三抹之。乳母當忌魚腥辣物。

五福化毒丹 見赤遊丹毒 冰硼散 見口部龜口瘡

胎風

胎風初起皮色紅。狀如湯潑火燒同。證由孕母多積熱。清胃湯服即有功。(註)此證又名胎赤。嬰兒初生。身熱皮紅。狀如湯潑火燒。由孕母過食辛香熱物。以致脾胃積熱。乳母宜服清胃湯。嬰兒亦飲少許。外皮皴赤。用煨石膏研細敷之如無嫩赤。乃孕母脾虛用粳米粉敷之。若兒大能食米麵。身熱皮紅者。係腑熱內蒸。濕氣外乘之故。即名玉爛瘡。宜如意金黃散。蜜水調敷。內服導赤湯即效。

清胃湯 見齒部牙齦 如意金黃散 見腫瘍門 導赤湯 見口部口糜

臍瘻

臍瘻兒臍被水傷。草紙燒灰敷最良。久而不愈風邪襲。恐發風癩緊緊防。(註)此證由水濕傷臍所致。若不愈。則發抽搐。又因風邪外襲也。恐變風癩。宜大草紙燒灰敷之。或加枯礬。或再加龍骨。燒灰等分。臍香少許。撒之即效。

臍突

臍突胎中積熱生。總由孕母失調停。兒臍突出腫赤大。宜清母子即臍平。(註)此證兒臍突出赤腫虛大耳也。由孕母失於調停。兒在腹胎。受母積熱。既生之後。兒臍即腫。宜清母子之熱。兒臍不必敷治。恐反害。如旬口外。兒臍忽腫。如吹不赤。捻動微響。或驚悸作啼者。宜用白芍藥湯加薏苡仁。令兒服之。外以外消散敷之即愈。

白芍藥湯

白芍一兩

澤瀉五錢

甘草一錢二分

肉桂揀薄者刮去粗皮一錢

共研粗末。每用二錢。水一鍾。煎四分。空心頻服。臍下痛加鈎藤一錢。生薑一片。(食鹽五錢。)(方歌)白芍藥湯澤瀉甘。再加肉桂共粗研。專醫臍腫驚啼叫。空心煎服整二錢。

外消散

大黃

牡蠣各五錢

朴硝二錢

共研細末。用活田螺數十枚。洗淨。再以清水半盆養之。過宿取田螺清水。調藥敷於患處。其螺仍放水。勿害方數。

(方歌) 外消散敷臍臑。大黃散牡蠣朴硝。海田螺用清水泡。過宿取水將藥調。

陰腫

陰腫之證小兒生。久坐陰濕寒氣凝。或因怒叫氣結閉。寒熱虛實擇可行。(註)此證古名脫囊。由久坐陰濕之地。為寒氣所凝而成。間或有因怒叫氣閉。結聚於下而成者。俱宜用桃仁丸主之。若寒氣寄於厥陰少陰者。則陰囊腫痛。腹痛冷汗。引縮二子入腹。痛止方出。謂之內疝。宜烏梅散勻氣散主之。有陰囊全縮不見。或下縮而陰囊腫大光亮。不燥不疼者。肝腎氣虛也。宜橘核煎湯調勻氣散服之。囊腫及四肢俱腫。二便不利者。膀胱蘊熱。風熱相乘也。宜白牽牛散主之。若女兒陰戶腫脹者。心熱相傳也。宜導赤湯服之。或五苓散用意黃車前子煎湯調服。外治法但敷立消散甚效。

桃仁丸

桃仁

七錢五分去皮尖炒微黃

白疾藜

微炒去刺

桂心

丹皮

各五錢

黑牽牛

二錢五分頭末

右為細末。煉蜜和丸。如黍粒大。每服十丸。黃酒送下。

(方歌) 桃仁丸逐陰腫疾。絲氣閉結或濕襲。茯苓牽牛桂丹皮。研末蜜丸如黍粒。

烏梅散

烏梅肉

甘草半生

半炙

元胡索各五錢

錢

鈎藤鈎

乳香

沒藥各二錢五分

共搗粗末。每服二錢。水一鍾。煎七分服。

〔方歌〕烏梅散用乳香沒。鈎藤甘草元胡索。陰囊腫發腹中疼。煎服必先研粗末。

勻氣散

桔梗二兩 陳皮一兩 茴香炒 縮砂仁各五錢 甘草四錢 薑炭二錢
去白 錢炒 炙

共研細末。每服五分。或一錢。白滾水調下。

〔方歌〕勻氣散因外寒侵。陰囊腫痛汗淋淋。桔梗陳皮甘草炙。茴香薑炭縮砂仁。

白牽牛散

白牽牛半生 甘草炙 橘紅 白朮土炒 桑白皮 木通各一錢
半熟

水煎服。

〔方歌〕白牽牛散草橘紅。白朮桑白皮木通。陰囊相兼四肢腫。能逐膀胱熱結壅。

五茯苓散

白朮土炒 赤茯苓各一錢 豬苓 澤瀉各一錢 桂心五分
五分

水煎服。

〔方歌〕五苓白朮桂心加。赤茯苓除心火邪。豬苓澤瀉能分利。調和臟腑效堪誇。

立消散

赤小豆

風化消

赤芍

枳殼

商陸

各五分但下宜見
火酒乾共研為末

用側柏葉煎湯候冷。調敷腫處。

〔方歌〕立消陰囊腫痛注。因受風寒濕熱毒。赤小豆與風化消。枳殼商陸加商陸。

導赤湯見口部口糜

脫肛

小兒脫肛肺虛源。補中益氣湯居先。腫硬作痛除積熱。臟毒翻肛臟連丸。(註)此證由小兒氣虛。肛脫於外。用補中益氣湯。加羌活白芍煨薑主之。如腫硬疼痛者。有濕熱在內。常用清熱除濕之劑以清之。若生臟毒。肛門翻出者。以臟連丸為主。外治以五倍子老葱頭朴硝煎湯洗之。腫用坎宮錠子塗之俱效。

補中益氣湯見潰瘍門

臟連丸見腎部痔瘡門

坎宮錠子見腫瘍門

肛門作痒

肛門作痒係蟲傷。下唇必生不白瘡。九味蘆薈丸與服。外撒銅綠共雄黃。(註)此證係小兒肛門作癢。由蟲蝕也。視其下唇。內必生小白瘡。或耳之前後。結小核如串珠者是也。書曰。下唇有瘡。蟲蝕其肛。宜用蘆薈丸服之。外用雄黃銅綠等分爲末。撒之即效。

蘆薈丸見齒部牙疳

遺毒

遺毒稟受結胎先。無皮身赤未易痊。肌膚紅點次班爛。染受尙可稟毒難。(註)此證係先天遺毒於胞胎。有稟受染受之分。稟受者由父母先患楊梅。而後結胎元。嬰兒生後。則周身色赤無皮。毒攻九竅。以致爛班。

患此難愈。百無一生。染受者乃先結胎元。父母後患楊梅。毒氣傳於胎中。嬰兒既生。則頭上坑凹。肌膚先出紅點。次發爛斑。甚者毒攻口角眼耳鼻。及前陰穀道破爛。初宜人中黃細末三五分。土茯苓煎湯調稠。日用二三服。腫用太乙紫金錠水磨塗之。破爛者用苦藥蜜炙爲末撒之。乾用香油調搽。投藥難效者後服二黃散。十中可保三四。若毒延偏身。日夜多啼不喫。乳食者屬毒甚氣微。終難救治。

二黃散

胡黃連

山慈菇各二

甘草一錢五

牛黃七分

錢

分生

石爲細末。每服三分。蜜湯調服。

(方歌) 二黃散治遺毒方。胡連甘草共牛黃。山慈菇研爲細末。每服三分加蜜湯。

太乙紫金錠

見胸部脾發瘋

痘裏夾癩

痘裏夾癩生頸項。形如桃李瓜棗狀。證兼身熱多渴煩。痰氣凝結致此恙。(註)此證結於頸項或生耳後腋

下。形如桃李瓜。身熱煩渴。由痰氣凝結所致。痘初起即發癩者。治宜托裏消痰解毒。如木通桔梗生地甘

草蟬蛻芍藥荊芥等藥。缺一不可。若考連等藥及耗燥之劑。俱不可用。若痘發在三四日而作癩者。則毒隨痘

洩。毒隨痘泄。自可挽全而無害。宜服三消散。倘斯時紅腫。將膿一潰。則元氣洩而痘漿必不能充。未

潰時。急用黃耆衛元湯補之。若痘至七八日潰膿時而發癩者。沖和散下之。若痘瘡蒼蠟色而作癩者。宜消

毒。潰後宜生肌玉紅膏貼之。

三消散 當歸 赤芍 天花粉 甘草 牛蒡子炒研

白茯苓 生地黃 紅花 蟬蛻去足翅 木通 半夏各八分

水二鍾。燈心二十根。煎六分服。

〔方歌〕三消豆豉三四日。痰凝結癭須當治。歸芍天花甘芍苓。生地紅蟬適夏製。

黃耆衛元湯 黃耆 人參 當歸 桔梗 紅花

甘草炙 白芍酒炒 防風各一錢

水煎。不拘時服。

〔方歌〕黃耆衛元癭腫起。已潰未潰急補之。人參歸桔紅花草。防風芍藥服無時。

沖和飲子 麥門冬去心 人參 桔梗 當歸 黃耆

柴胡 白芍酒炒 白茯苓 天花粉 荆芥 防風

連翹去心 白朮七分土炒

水煎服。

〔方歌〕冲和飲子麥門冬。參桔歸耆柴芍苓。花粉荊防翹白朮。痘發七天瘥氣凝。

生肌玉紅膏見潰瘍門

痘疔

痘疔不與豆瘡同。俗呼賊痘是其名。色紫黯黑硬如石。諸證蜂起難灌膿。疔有多般須宜記。再審何處發其形。搗熊疔生舌根底。大小不一最易明。火珠疔生鼻孔內。圍寒噴火面赤紅。眼沿生疔名忘波。腫如封蛤熱增。象虎疔於耳內見。腎毒攻耳致成形。燕窩疔生兩腋下。面赤謔語更腫疼。注命疔生足心裏。紫筋直透足股中。透腸疔在肛內發。痛如錐刺一般同。鬮龍疔生尿孔內。身熱謔語便不通。法按疔名施醫治。自然諸證悉能平。〔註〕此證名多。治不一法。痘生五六日間。或三五枚。或六七枚。雜於諸痘之間。其色紫黯。甚則黑硬如石。有此以致諸證蜂起。不能灌膿。如搗熊疔生於舌根底。小如黑豆。大似葡萄。令兒舌捲喉痛。急用銀鈎鈎破。去淨惡血。隨以苦茶漱口。搽拔疔散。再以冰片硼砂青黛黃連薄荷荊芥妙殭蠶共爲細末。吹之用。火珠疔生於鼻孔內。圍寒噴火。面赤眼紅。亦用銀鈎鈎破。用黃連膏加冰片。滴入鼻孔。內服萬金散。忘波疔生於眼沿。腫如封蛤。煩熱面紫。宜挑破用燕脂嚼汁點之。兼清公英菊在前湯洗之。象虎疔生於耳內。於膿成之時。宜搗破搽拔疔散。燕窩疔生於腋下。腫硬面赤謔語。如疔在左腋瀉注。則右腋之疔沉伏失色。右亦如之。亦挑破去其根。用拔疔散搽之。服消毒飲子。注命疔生兩足心。腫硬如錢。如痘如椒。有紫筋直透足股。挑之去淨惡血。用田螺水點之。次用慎火草菘豆浸脹。搗爛敷之。透腸疔生肛門旁。在六七朝

燒之。銀花防風煎湯令洗之。次用輕粉珍珠冰片白欬末塗之。內服黃連解毒湯。或煎行氣尿孔內。於五六朝身發謔語。眼翻肢厥。腹脹小水閉瀉。急用蟾酥牛黃冰片麝香研末。次用黃連細茶湯煎。候冷取半匙調水。以細軟稻心簾之。送入孔內。服消毒飲子甚效。

瀉金散

犀角鎊

牛蒡子炒研

紅花

生地

桔梗

赤芍

紫蘇

甘草各一

錢生

水煎服。

〔方歌〕瀉金散治火毒疔。面赤眼紅鼻內疼。犀蒡紅花生地桔。赤芍紫蘇甘草生。

消毒飲子

白茯苓

生地

連翹去心

牛蒡子炒研

紅花

甘草生

犀角鎊

木通

赤芍各一錢

燈心二十根。水煎服。

〔方歌〕消毒飲子蒼生地。翹蒡紅花甘草犀。木通芍藥燈心共。善却疔毒火證宜。

拔疔散

見牙齒部牙疔

黃連膏

見鼻部鼻瘡

田螺水

見唇部

黃連解毒湯

見耳部黑疔

痘裏發丹

痘裏發毒因熱極。宜施涼血散毒劑。塗抹內服量寒涼。外用化斑湯洗浴。(註)此證由內熱甚極而成。內宜服生地牛蒡芍藥甘草木通荊穗等藥。其毒自消。腫痛者加柴胡羌活。頭頂盛者。毒溼上焦也。宜用炒黃連柴胡甘草車前子梔子等藥。外用化斑解毒湯洗浴。量服寒涼藥及豬膽京墨冰片塗抹。丹之形色與赤遊丹毒參考。

化斑解毒湯見助部內發丹毒

痘爛

痘爛浸淨無完膚。水淬茶葉帶濕鋪。上隔草紙令兒臥。一夜膿乾爛即除。(註)此證係出痘破爛。身無完膚。膿水浸淫。沾黏衣服。宜用茶葉揀去梗。入滾水一燉。即撈起。再揀去梗。濕鋪牀上。上隔草紙。令兒臥之。一夜膿乾其效。

痘風瘡

痘風瘡生先作癢。次延成片水浸淫。痘後遇風甚成癩。麥錢散搽效可申。(註)此證由痘後遇風所致。先發細瘡作癢。次延成片。脂水漸長浸淫。宜滲濕救苦散搽之。兼避風戒口。甚者搔癢毒水浸淫。肌無完膚。即成癩癩。急用十全大補湯大補氣血。兼散風苦參丸以清熱解毒。二方合而服之。外塗麥錢散甚效。

滲濕救苦散

蜜陀僧

滑石各

白芷五錢

研細末。乾用白密調搽。濕則乾搽。

(方歌) 溼濕救苦散白芷。密陀僧研入滑石。瘡瘡風起瘡成片。白密調搽可去之。

麥餞散

小麥

一合炒
焦存性

硫黃四錢

白砒一錢

共研細。又加烟膠末八錢。枯礬末川椒末三錢。共和勻。先以葱湯洗淨患處。香油調塗。油紙蓋紮。三

換。

(方歌) 麥餞瘡風成癩恙。小麥炒加砒硫黃。次入烟膠枯礬末。川椒香油調上良。

十全大補湯見漢

散風苦參丸

見發無
定處癩

逐日人神所在不宜鍼灸歌

人神走注須當記。足大指兮屬初一。外踝二日股內三。四日在腰五日寄。六手七日內踝存。八腕九尻腰
十。十有一日鼻柱間。十二日兮在髮際。十三注於牙齒中。十四常在胃皖案。偏身十五十六胸。十有七日氣
集。十八股內足十九。二十日在內踝麗。二十一日手小指。念二外踝神所寓。肝及足兮二十三。在手陽明
四日。二十五日足陽明。念六在胸念七膝。二十八日伏於陰。念九即在膝際室。三十日兮在足跗。人神所
刺禁忌。

十二時人神歌

子操丑寢寅在日。卯而辰頭巳子屬。午胸未腹申在心。酉背戌頭亥股續。

十二支日人神所在歌

子不治頭耳。丑日耳實胸膈。卯日鼻脾辰膝腰。巳手午心真捷徑。未頭手足申頭背。酉行膝背肩類。戌日在陰血。亥日遊行頸頭位。十二支神禁灸歌。男除女破應該會。

十干日不宜用鍼犯之病多反覆

甲不治頭乙耳喉。丙肩丁背與心求。戊己腹脾庚腰肺。辛膝壬當腎脛收。癸日不宜鍼手足。十干不犯則

變。

尻神圖



此神農所置一歲起押
二歲震逐年順飛九宮
周而復始行年到夷則
所主敗切忌鍼灸慎勿
犯三否則變生他病也

九宮尻神歌

尻神所在有根由。

坤內外際聖人留。

震宮牙口喘宜記。

巽位還居乳口頭。

中宮骨連尻骨。

背面目從乾上遊。

干膊兌宮難灸。

艮宮腰項也須休。

離膝腓陰鍼離下。

坎肘還連肚脚求。

為醫神魄尻神訣。

萬病無干禁忌變。

升打靈藥固罐法

宜用陽城罐。將罐煑熱。搗大蒸於罐外遍擦之。再燒再擦。如是三四次。次以葷醋入罐內盪之。以乾爲度。次用黃土二分。煤灰二分。以馬毛以鹽水合之。固罐一指厚。陰乾。裂縫再固。必要固盡用。

升打靈藥封罐口法

入藥畢。蓋鐵器。用鐵絲縛。用石膏無名異等分。食鹽減半。俱煑過。爲極細末。將罐口內用此末二三塊。於罐內。燒盡熱。以葷藥周圍塗之。隨乾隨塗。以口平爲率。一用石膏。白封。馬毛。等分爲末。水調塗之如前。

煉金頂砒法

用鉛一觔。小罐內炭火煑化。投白砒二兩於化焯鉛上。煉烟盡爲度。取起冷定。打爛。金頂砒結在鉛上。取下聽用。

製寒食麵法

用白麵一觔。外再以麵半觔。水調稠厚。趕成薄片二塊。將前麵包含於內。周圍捏緊。於清明正日蒸熟。掛透風處陰乾。用麵包藏。勿經女手。愈久愈效。

醫宗金鑑正誤表

第八冊

10	10	9	9	9	9	8	8	8	8	7	7	卷別
21	12	28	17	16	12	33	20	11	2	13	2	頁數
6	10	6	5	2	10	13	4	1	8	6	5	行數
骨	蕭	賜	烏	官	煎	都	脈	別	熱	丹	解	誤
香	薑	賜	烏	宜	前	部	肌	門	熱	丸	鱗	正
乳	生	公	地	初	和	頭	次	見	濃	雙	瘡	改正所在
香	薑	豬	首	起	勻	部	敷	腫	熱	解	11	如鱗
10	10	10	9	9	9	9	8	8	8	7	7	卷別
25	21	12	19	16	15	3	22	16	9	21	4	頁數
2	4	3	3	9	6	15	4	5	8	3	6	行數
穴	兩	局	灸	必	斂	下	數	如	邊	斤	件	誤
空	個	屬	灸	心	潰	不	敷	不	翹	片	任	正
空	個	屬	蒜	去	潰	則	外	腫	脊	薑	屬	改正所在
心	個	足	片	心	而	不	敷	硬	翹	三	任	脈經
服	個	太	艾	煎	斂	可	白	不	桔	片	經	
		陽	灸		遲	攻	鏡	消	梗			
					者	下	子					

13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	10
4	24	22	18	16	14	13	11	9	3	16	10	9	4	25
6	2	7	8	2	15	8	9	3	9	2	7	3	3	5
常	名	夏	降	陳	又	坐	酒	靈	想	瘡	蘊	伏	請	
當	各	夏	附	陳	又	生	酒	霹	惡	瘡	蘊	之	證	上
當	各	聲	附	烏	又	多	入	霹	令	覺	由	潰	此	水
日	十	嘶	子	藥	有	致	酒	靈	出	癢	腎	破	證	上
利	四	腹	餅	陳	風	傷	一	火	惡	痊	火	之	又	魚
下	粒		灸	。	瘤	生	杯		血		內	騰	名	
13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11
4	1	23	20	16	14	14	13	11	6	23	11	10	7	3
10	5	7	1	6	17	11	3	4	8	3	9	6	3	6
參	沿	名	研	投	母	洪	脂	經	畫		痛	蘊	著	括
沙	沿	各	研	投	每	決	筋	輕	加	砂	研	蘊	蓋	括
沙	洗	各	硝	花	每	刀	肉	輕	加	硃	木	蘊	蓋	括
參	浴	五	同	粉	難	斂	石	者	朴	砂	瓜	於	內	萋
	浴	十	研	投	獲	破	筋	即	硝	爲	研	內	踝	仁
		粒		。	效			消		衣			骨	

16	16	16	15	14	14	14	14	13	13	13	13	13
19	12	5	7	21	20	14	5	24	18	13	10	5
15	8	10	14	4	4	3	6	7	2	5	8	5
而	茯	不	其	出	緩	原	先	跽	少	茶孩兒孩兒茶	散	苓
面	苓	下	甚	生	發	去	洗	蛇	火		撒	苓
卯	五	下	其	膿	虛	炒	每	膚	火	孩	乾	黃
面	苓	虛	效	不	寒	去	日	如	酒	兒	撒	
辰	散	者	甚	生	發	刺	洗	蛇	動	茶	止	苓
頭			捷		緩		之	皮	風		疼	
							自		發			
							効		物			
16	16	16	15	14	14	14	14	14	13	13	13	13
18	11	1	3	21	18	10	5	22	13	13	7	
10	8	9	2	4	7	7	1	8	5	1	6	
其	俱	散	待	生	子	治	日	官	竭	刺	瘡	
甚	俱	散	待	出	渴	法	曰	宜	血	兒	瘰	
膿	俱	宜	以	血	麥	其	三	宜	血	皂	皮	
乾	服	服	待	不	冬	餘	日	防	竭	刺	膚	
甚	立	紫	生	出	梔	腫	風	已			作	
效	消	雪	肌	出	湯	潰	癬	散			瘰	
	散	散	斂			治						
			口			法						

