

金匱要略

一

金匱要略

方論

四部叢刊子部

上海涵芬樓景印
明刊本原書板心
高營造尺六寸二
分寬四寸四分

新編金匱要畧方論序

張仲景為傷寒雜病論合十六卷今世但傳傷寒論十卷雜病未見其書或於諸家方中載其一二矣翰林學士王洙在館閣日於蠹簡中得仲景金匱玉函要畧方三卷上則辯傷寒中則論雜病下則載其方并療婦人乃錄而傳之士流纔數家耳嘗以對方證對者施之於人其効若神然而或有證而無方或有方而無證救疾治病其有未備國家詔儒臣校正醫書臣竒先校定傷寒論次校定金匱玉函經今又校成此書仍以逐方次於證候之下使倉卒之際便於檢用也又採散在諸家之方附於逐篇之末以

廣其法以其傷寒支多節畧故取自雜病以下終於飲食
禁忌凡二十五篇除重復合二百六十二方勒成上中下
三卷依舊名曰金匱方論臣竒嘗讀魏志華佗傳云出書
一卷曰此書可以活人每觀華佗凡所療病多尚奇怪不
合聖人之經臣竒謂活人者必仲景之書也大哉炎農聖
法屬我

盛旦恭惟

主上不承大統撫育元元頒行方書拯濟疾苦使和氣盈
溢而萬物莫不盡和矣

太子右贊善大夫臣高保衡

尚書都官員外郎臣孫奇

尚書司封郎中充秘閣校理臣林億等傳上
仲景金匱錄岐黃素難之方近將千卷患其混雜
煩重有求難得故周流華裔九州之內收合竒異
據拾遺逸揀選諸經筋髓以為方論一編其諸救
療暴病使知其次第凡此藥石者是諸仙之所造
服之將來固無天橫或治療不早或被師誤幸具
詳焉

宋學士王洙得是書於蠹簡林億等雖校理重刻
元金以來世寡經見諸家或載金匱方治多於他

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

括樓牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

雄黃燻方

赤小豆當歸散

升麻鱉甲湯

葛根芩連湯

瘧病第四

鱉甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

新編金匱要略方論目錄

卷之上

臟腑經絡先後第一

白虎加封神湯

瘡濕腸第二

桔梗桂枝湯

葛根湯 麻黃杏仁湯

大承氣湯

麻黃加术湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

白虎人參湯

瓜蒂散

防已黃耆湯

百合狐惑陰陽毒第三

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

括樓牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

雄黃燻方

赤小豆當歸散

升麻鱉甲湯

瘡病第四

鱉甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

牡蠣湯

柴胡去半夏加桔梗湯

柴胡桂姜湯

中風歷節第五

侯氏黑散

風引湯

防風地黃湯

頭風摩散

桂枝芍藥知母湯

烏頭湯

礬石湯

附方

續命湯

三黃湯

木附湯

八味圓

越婢加朮湯

血痺虛勞第六

桂枝五物湯

桂枝加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

黃芪建中湯

大黃麴丸

酸棗湯

署預丸

附方

炙甘草湯

獘肝散

肺痿肺癰咳嗽上氣第七

甘草乾姜湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

麥門冬湯

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

附方

生姜甘草湯

生姜湯

桂枝湯

桔梗白散

荳莖湯

奔豚氣第八

奔豚湯

桂枝加桂湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

胸痺心痛短氣第九

括樓薤白酒湯

括樓薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

人參湯

茯苓杏仁甘草湯

橘皮枳實生姜湯

薏苡附子湯

桂枝生姜枳實湯

赤石脂丸

九痛丸

腹滿寒疝宿食第十

厚朴七物湯

附子粳米湯

厚朴三物湯

大柴胡湯

大承氣湯

大建中湯

大黃附子湯

赤丸

烏頭煎

當歸生姜羊肉湯

烏頭桂枝湯

桂枝湯

附方

瓜蒂散

柴胡桂枝湯

走馬湯

卷之中

五臟風寒積聚第十一

麻子仁丸

甘草乾姜菝葜白朮湯

痰飲咳嗽第十二

菝葜桂枝白朮甘草湯

五苓散

甘遂半夏湯

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

厚朴木黃湯

小半夏湯

防己椒目草陳歷大黃丸

小半夏加茯苓湯

附方

茯苓飲

茯苓桂枝五味甘草湯

茯甘五味姜辛湯

桂苓去桂加姜辛夏湯

茯苓姜味辛仁湯 茯甘姜味辛夏仁湯

消渴小便利淋第十三

文蛤散

桔萎瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎益湯

猪苓湯

水氣病第十四

防已黃耆湯

越婢湯

防已茯苓湯

甘草麻黃湯

附子麻黃湯

杏子湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

桂枝加黃耆湯

桂姜草棗黃辛附湯

枳實木湯

黃疸病第十五

茵陳蒿湯

消石礬石散

梔枳大黃湯

猪膏鬚

茵陳五苓散

大黃黃蘖梔硝湯

附方

麻黃醇酒湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

半夏麻黃丸

柏葉湯

黃土湯

瀉心湯

嘔吐藏下利第十七

茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生姜湯 猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤鴻湯

文蛤湯

半夏乾姜散

生姜半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脉四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附方

黃芩湯

瘡癰腸癰浸淫第十八

薏苡附子敗醬散 大黃牡丹湯

王不留行散

排膿散

跌躉手指臂膊轉筋陰狐疝蛇蟲第十九

雞屎白散

蟹蛛散

甘草粉蜜湯

烏梅丸

卷之下

婦人妊娠第二十

桂枝茯苓丸

膠艾湯

當歸芍藥散

乾姜人參半夏丸

當歸貝母苦參丸 葵子茯苓散

當歸散

白朮散

婦人產後病第二十一

枳實芍藥散

下瘀血湯

竹葉湯

白頭翁加甘草阿膠湯

竹皮大丸

附方

三物黃芩湯

內補當歸建中湯

婦人雜病第二十二

半夏厚朴湯

甘草小麥湯

溫經湯

土瓜根湯

旋復花湯

大黃甘遂湯

抵當湯

礬石丸

紅藍花酒

當歸芍藥散

小兒疳蟲餓齒方 蛇床子散

狼牙湯

四時加減柴胡飲 長服訶梨勒丸

雜療第二十三

三物備急丸

紫石寒食散

救卒死方共五方

救卒死而壯熱方

救卒死而目閉者方

救卒死而張口反折者方

救卒死而四肢不收失便方

治尸癰方共二方

救小兒卒死而吐利不知何病方

救卒死客忤方二方救自縊死方

療中膈方
救溺死方

馬墜及一切筋骨損方

禽獸虫魚禁忌第二十四

治自死六畜肉中毒

治食鱈肉漏脯中毒方

治食生肉中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方

治食六畜鳥獸肝中毒方

治馬肝中毒人未死方二

治食馬肉中毒欲死方三

治食噉蛇牛肉欲死方三

治食牛肉中毒方 治食犬肉不消成病方

治食鳥獸中箭肉毒方

治食鱠不化成癥病方

二

治食魚後食毒兩種煩亂方

治食鯷鮋魚中毒方

治食蠅中毒方

二

菓實菜穀禁忌第二十五

治食諸菓中毒方

食諸菌中毒悶亂欲死方

食躁或躁方

治誤食鉤吻殺人解之方

治誤食水莨菪中毒

治食芹菜中龍精毒方

治食苦瓠中毒方

治凡飲食中毒方

貪食食多不消必腹堅滿痛治之方

新編金匱要略方論目錄 終

新編金匱要畧方論卷之上

尚書司封郎中充秘閣校理臣林億等詮次

晉 王叔和集

漢 張仲景述

臟腑經絡先後病脉證第一

論十三首 脉證二條

問曰上工治未病何也○師曰夫治未病者見肝之病知肝傳脾當先實脾四季脾王不受邪即勿補之中工不曉相傳見肝之病不解實脾惟治肝也夫肝之病補用醋助用焦苦益用甘味之藥調之酸入肝焦

苦入心甘入脾脾能傷腎腎氣微弱則水不行水不行則心火氣盛心火氣盛則傷肺肺被傷則金氣不行金氣不行則肝氣盛故實脾則肝自愈此治肝補脾之要妙也肝虛則用此法實則不在用之經曰虛虛實實補不足損有餘是其義也餘藏准此

夫人稟五常因風氣而生長風氣雖能生萬物亦能害萬物如水能浮舟亦能覆舟若五臟元真通暢人即安和客氣邪風中人多死千般灾難不越三條一者經絡受邪入臟腑爲內所因也二者四肢九竅血脉相傳壅塞不通爲外皮膚所中也三者房室金刃

蟲獸所傷以凡詳之病由都盡若人能養慎不令邪
風干忤經絡適中經絡未流傳腑臟即醫治之四肢
才覺重滯即導引吐納鍼灸膏摩勿令九竅閉塞更
能無犯王法禽獸灾傷房室勿令竭之服食節其令
熟苦酸辛甘不遺形體有衰病則無由入其腠理腠
者是三焦通會元真之處爲血氣所注理者是皮膚
臟腑之文理也

問曰病人有氣色見於面部願聞其說師曰鼻頭色青
腹中痛苦冷者死一云腹中冷痛者死鼻頭色微黑者有水
氣色黃者胸上有寒色白者亡血也設微赤非時者

死其目正圓者痊不治又色青爲痛色黑爲勞色赤爲風色黃者便難色鮮明者有留飲

師曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語聲喑二然不徹者心膈間病語聲啾二然細而長者頭中病一作痛

師曰息搖肩者心中堅息引胸中上氣者歟息張口短氣者肺痿唾沫

師曰吸而微數其病在中焦實也當下之即愈虛者不治在上焦者其吸促在下焦者其吸遠此皆難治呼吸動搖振二者不治

師曰寸口脉動者因其王時而動假令肝王色青四時各隨其色肝色青而反色白非其時色脉皆當病問曰有未至而至有至而不至有至而不去有至而太過何謂也○師曰冬至之後甲子夜半少陽起少陽之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此爲未至而至也以得甲子而天未溫和此爲至而不至也以得甲子而天大寒不解此爲至而不去也以得甲子而天溫如盛夏五六月時此爲至而太過也師曰病人脈浮者在前其病在表浮者在後其病在裏腰痛背強不能行必短氣而極也

問曰經云厥陽獨行何謂也○師曰此爲有陽無陰故稱厥陽

問曰寸脉沉大而滑沉則爲實滑則爲氣實氣相傳血氣入臟即死入腑即愈此爲卒厥何謂也○師曰唇

口青身冷爲入臟即死如身和汗自出爲入腑即愈

問曰脉脫入臟即死入腑即愈何謂也○師曰非爲一

病百病皆然譬如浸淫瘡從口起流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治病在外者可治入裏者

即死

問曰陽病十八何謂也○師曰頭痛項腰脊臂脚掣痛

陰病十八何謂也○師曰欬上氣喘嚦咽腸鳴脹滿
心痛拘急五臟病各有十八合爲九十病人又有六
微微有十八病合爲一百八病五勞七傷六極婦人
三十六病不在其中清邪居上濁邪居下大邪中表
小邪中裏藜飪之邪從口入者宿食也五邪中人各
有法度風中於前寒中於暮溫傷於下霧傷於上風
令脉浮寒令脉急霧傷皮腠溫流關節食傷脾胃極
寒傷經極熱傷絡

問曰病有急當救裏救表者何謂也○師曰病醫下之
續得下利清穀不止身體疼痛者急當救裏後身體

疼痛清便自調者急當救表也○夫病痼疾加以卒病當先治其卒病後乃治其痼疾也

師曰五臟病各有得者愈五臟病各有所惡各隨其所不喜者爲病病者素不應食而反暴渴之必發熱也○夫諸病在臟欲攻之當隨其所得而攻之如渴者與猪苓湯餘皆倣此

○瘡濕暍病脉證治第二

論一首 脉證十二條 方十一首

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘡一作痘餘同○太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘡○太陽病發熱脉沉

而細者名曰痓爲難治○太陽病發汗太多因致痓○夫風病下之則痓復發汗必拘急○瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則痓

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張者痓病也若發其汗者寒溫相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脉如蛇一云其脉滄滄○暴腹脹大者爲欲解脉如故反伏弦者痓○夫痓脉按之緊如弦直上下行一作築二而弦脉經云瘡家其脉伏堅直上下○痓病有灸瘡難治○脉經云痓家其脉伏堅直上下

太陽病其證備身體強几几然脉反沉遲此爲痓括樞

桂枝湯主之

括萎桂枝湯方

括萎根二兩

桂枝三兩

芍藥三兩

甘草二兩

生姜三兩

大棗十二枚

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗
汗不出食頃啜熱粥發之

太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作
剛痙葛根湯主之

葛根湯方

葛根四兩

麻黃三兩去節

桂

二兩去皮

芍藥

二兩

甘草

二兩

生姜

三兩

大棗

十二枚

右七味㕮咀以水一升先煮麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服乙升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝湯法將息及禁忌似汗不須啜粥餘如桂枝湯法將息及禁忌

瘡爲病

一本瘡字上有剛字

胸滿口噤卧不着席脚牽急必齦齒

可與大承氣湯

大承氣湯方

大黃

四兩酒洗

厚朴

半斤炙去皮

枳實

五枚炙

芒硝

三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓内大
黃煮取二升去滓内芒硝更上火微一二弗分
温再服得下止服

太陽病關節疼痛而煩脉沉而細緩一作緩

者此名濕痺王

云中濕痺之候小便不利大便反快但當利其小便○

濕家之爲病一身盡疼一云發熱身色如熏黃也○濕

家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦

或胸滿小便不利一云

舌上如胎者以丹曰有熱胸上

有寒渴欲得飲而不能飲則口燥煩也○濕家下之額

上汗出微喘小便利一云不利者死若下利不止者亦死○

風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止
醫云此可發汗之病不愈者何也蓋發其汗大出
者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗
但微似欲出汗者風濕俱去也○濕家病身疼發熱
面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無
病病在頭中寒濕故鼻寒內藥鼻中則愈脉經云病人
喘而無濕家病十三字○濕家身煩疼可與麻黃加术湯發其汗
爲宜慎不可以火攻之

麻黃加术湯方

麻黃三兩

桂枝二兩

去皮

甘草二兩

去核

杏仁七十箇去皮尖

白朮四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內
諸藥者取二升半去滓溫服六合覆取微似汗
病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗
出當風或久傷取冷所致也可與麻黃杏仁薏苡甘草
湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯方

麻黃

去節半兩湯泡

甘草一兩炙

薏苡仁半兩

杏仁

十箇去皮火炒

右剉麻豆大每服四錢七水盡半煮八分去滓

溫服有微汗避風

風濕脉浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之

防已黃耆湯方

防已

一兩

甘草

半兩

白朮

七錢半

黃耆

一兩分去蘆

右剉麻豆大每抄五錢七生姜四片大棗一枚水盞半煎八分去滓溫服良久再服○喘者加麻黃半兩○胃中不和者加芍藥三分○氣上衝者加桂枝三兩○下有陳寒者加細辛三分○服後當如魚行皮中從腰下如冰後坐被上久以一被

統腰以下溫令微汗差

傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濶者桂枝附子湯主之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之

桂枝附子湯方

桂枝

四兩去皮

生姜

三兩切

附子

三枚炮去皮破八片

甘草

二兩炙

大棗

十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

白朮附子湯方

白朮

二兩

附子

一枚半炮去皮

甘草

一兩炙

生姜一
半切
兩
大棗六
枚

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一
服覺身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀
勿怪即是木附竝走皮中逐水氣未得除故耳
風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出
短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子
湯主之

甘草附子湯方

甘草二
兩
炙

附子二
枚炮

桂枝去皮四
兩

白朮二
兩

桂枝去皮四
兩

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日
三服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五
合恐一升多者服六七合爲妙

太陽中暯發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細芤遲小便
已洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口前開板齒
燥若發其汗則其惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則
淋甚

太陽中熱者暯是也汗出惡寒身熱而渴白虎加人參
湯主之

白虎人參湯方

知母

六两

石膏

一斤碎

甘草

二两

梗米

六合

人參

三两

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升

日三服

太陽中暒身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也一物旅蒂湯主之

一物旅蒂湯方

旅蒂

二七

右剉以水一升煮取五合去滓頓服

○百合狐惑陰陽毒病證治第三

論一首 脉證三條 方十一首

論曰百合病者百脉一宗悉致其病也意欲食復不能食常默然欲卧不能卧欲行不能行飲食或有美時或有不用聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則劇吐利如有神靈者身形如和其脉微數每溺時頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛漸然者四十日愈若溺快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨證治之

百合病發汗後者百合知母湯主之

百合知母湯方

百合七枚

知母三兩

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更
以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎
知母取一升去滓後合和煎取一升五合分溫
再服

百合病下之後者滑石代赭湯主之

滑石代赭湯方

百合七枚

滑石三兩

碎代赭石彈大一
枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更

以泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎
滑石代赭取一升去滓後合和重煎取一升五

合分溫服

百合病吐之後者用後方主之

百合雞子湯方

百合七枚 雞子黃一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更
以泉水二升煎取一升去滓內雞子黃攪勻煎

五分溫服

百合病不經吐下發汗病形如初者百合地黃湯主之

百合地黃湯方

百合

七枚

生地黃

一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以
泉水二升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升
五合分溫再服中病勿更服大便常如漆

百合病一月不解變成渴煮百合洗方主之

百合洗方

右以百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗

已食者餅勿以鹽豉也

百合病渴不差者用後方主之

括萎牡蠣散方

括萎根

牡蠣

熬等分

右爲細末飲服方寸匕七日三服

百合病變發熱者

二作發寒熱

百合滑石散主之

百合滑石散方

百合

炙一兩

滑石

三兩

右爲散飲服方寸匕七日三服當微利者止服熱

則除

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此爲逆見陰攻陽乃復下之此亦

爲逆

狐惑之爲病狀如傷寒熱默欲眠目不得閉卧起不安
蝕於喉爲惑蝕於陰爲狐不欲飲食惡聞食臭其面目
乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲喝一作嘔 甘草瀉心湯主

之

甘草瀉心湯方

甘草

四兩

黃芩

人參

乾姜

各三兩

黃連

九兩

大棗

十二枚

半夏

半斤

右七味水一斗煮取六升去滓再煎溫服一升

日三服蝕於下部則咽乾苦參湯洗之

蝕於肛者椎黃熏之

椎黃熏方

右一味爲末筒瓦二枚合之燒向肛熏方

脉經云病入或從呼吸上蝕其咽或從下焦飲其肛陰蝕上爲惑飲下爲狐惑病者猪苓散

主

病者脉數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四眴一本此有黃字黑若能食者膿已成也赤豆當歸散主之

赤小豆當歸散方

赤小豆

三升浸令牙出曝乾

當歸

右二味杵爲散漿水服方寸七日三服
陽毒之爲病面赤班班如錦文咽喉痛壅膿血五日可
治七日不可治升麻鱉甲湯主之

陰毒之爲病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七
日不可治升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒主之

升麻鱉甲湯方

升麻

二兩

當歸

一兩

蜀椒

炒去汁一兩

甘草

二兩

鱉甲

手指大一片炙

雄黃

半兩研

右六味以水四升煮取一升頓服之老小再服

取汗

肘後千金方陽毒用升麻湯無鱉
甲有桂陰毒用甘草湯無椎黃

瘧病脉證并治第四

證二條 方六首

師曰瘧脉自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗針灸也浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之

病瘧以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解如其不差當去何師曰此結爲癰瘕名曰瘧母急治之宜

鱉甲煎丸

鱉甲煎丸方

鱉甲十二分灸

烏扇三分燒

黃芩三分

柴胡六分

鼠婦三分熬

乾姜二分

大黃三分

芍藥五分

桂枝三分

芩歷一分熬

石韋三分去毛

厚朴三分

牡丹五分去心

瞿麥二分

紫盛三分

半夏一分

人參一分

麌虫五分熬

附膠三分炙

蜂巢四分灸

赤消十二分

蟻蠅六分熬

桃仁二分

右二十三味爲末取鍛竈下灰一斗清酒一斛

五斗浸灰候酒盡一半着鱉甲於中煮令泛爛
如膠漆絞取汁內諸藥煎爲丸如梧子大空心
服七丸日三服

千金方用鱉甲十二片又以海藻三分大戟一
分蟻五分無鼠婦赤消二味以鱉甲煎和諸
藥爲丸

師曰陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩寃手足熱而
欲嘔名曰瘧若但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分
肉之間令人消鑠脫肉

溫瘧者其脉如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔白虎加

桂枝湯主之

白虎加桂枝湯方

知母六兩

甘草二兩

石膏一斤

粳米合

桂去皮

三兩

右剉每五錢水一盞半煎至八分去滓溫服汗

出即愈

瘡多寒者名曰牡瘡蜀漆散主之

蜀漆散方

蜀漆燒去腥

雲母燒二日夜

龍骨等分

右三味杵爲散未發前以漿水服半錢○溫瘡
加蜀漆半分臨發時服一錢七一方雲母作雲實

附外臺秘要方

牡蠣湯治牡瘧

牡蠣熬四兩

麻黃去節四兩

甘草二兩

蜀添三兩

右四味以水八升先煮蜀添麻黃去上沫得六升內諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服柴胡去半夏加括蔞湯治瘧病發渴者亦治

勞瘧

柴胡八兩

人參

黃芩

甘草各三兩

括蔞根四兩

生姜二兩

大棗十二枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取
三升溫服一升日二服

柴胡桂裏湯治瘧寒多微有熱或但寒不熱

服一劑如神

柴胡半斤

桂枝三兩

乾姜二兩

括萎根四兩

黃芩三兩

牡蠣三兩

甘草二兩

炙

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取
三升溫服一升日三服初服微煩後服汗出便

愈

○中風歷節病脉證并治第五

論一首 脉證三條 方十二首

夫風之爲病當半身不遂或但臂不遂者此爲痺脉微而數中風使然○寸口脉浮而緊緊則爲寒浮則爲虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛絡脉空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喝僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於腑即不識人邪入於臟舌即難言口吐涎

侯氏黑散治大風四肢煩重心中惡寒不足

者外臺治風癩

菊花四十分

白术十

細辛三

茯苓三分

牡蠣三分

桔梗八

防風十分

人參三分

礬石三分

黃芩五分

當歸三分

乾姜三分

芎藭三分

桂枝三分

礬石三分

右十四味杵爲散酒服方寸一日一服初服二十日溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日止即藥積在腹中不下也熟食即下矣冷食自能助藥力

金匱要略

寸口脈遲而緩遲則爲寒緩則爲虛榮緩則爲亡血衛
緩則爲中風邪氣中經則身痒而癰疹心氣不足邪氣
入中則胸滿而短氣

風引湯除熱癰癩

大黃

乾姜

龍骨

各四兩

桂枝

三兩

甘草

牡蠣

各二兩

寒水石

滑石

赤石脂

白石脂

紫石英

石膏

各六兩

右十二味杵麩篩以韋囊盛之取三指撮井花

水三升煮三沸溫服一升

治大人風引少小驚癲瘍瘍日數十後醫

所不療除熱方巢氏
云脚氣宜風引湯

防已地黃湯治病如狂狀妄行獨語不休無
寒熱其脉浮

防已錢

桂枝錢

防風錢

甘草一錢

右四味以酒一盃漬之一宿絞取汁生地黃二
斤㕮咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞
地黃汁和分再服

頭風摩散方

大附子

一枚炮

鹽等分

右二味爲散沫了以方寸匕摩疾上令藥力行

寸口脉沉而弱沉即主骨弱即主筋沉即爲腎弱即爲肝汗出入水中如水傷心歷節黃汗出故曰歷節
趺陽脉浮而滑滑則穀氣實浮則汗自出

少陰脉浮而弱弱則血不足浮則爲風風血相搏即疼痛如掣盛人脉濇小短氣血汗出歷節疼不可屈伸此皆飲酒汗出當風所致諸肢節疼痛身體尪羸脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲吐桂枝芍藥知母湯主之

桂枝芍藥知母湯方

桂枝

四兩

芍藥

三兩

甘草

二兩

麻黃

二兩

生姜

五兩

白朮

五兩

知母

四兩

防風

四兩

附子

二兩炮

右九味以水七升煮取二升溫服七合日三服
味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄鹹則傷骨骨傷則痿名
曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱
微三焦無所御四寓斷絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出
脛冷假令發熱便爲歷節也

痛歷節不可屈伸疼痛烏頭湯主之

烏頭湯方治脚氣疼痛不可屈伸

麻黃

芍藥

黃氏各三
兩

甘草

川烏

五枚咬咀以蜜二升
煎取一升即出烏豆

右五味咬咀四味以水三升煮取一升去滓內
蜜煎中更煎之服七合不知盡服之

礬石湯治脚氣沖心

礬石

二
兩

右一味以漿水一斗五升煎三五沸浸脚良

附方

古今錄驗續命湯治中風痱身體不能自收
口不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側

云與大續命同兼治婦人
產後去血者及老人小兒

麻黃

桂枝

當歸

人參

石膏

乾姜

甘草

各三兩

芎藭

杏仁

四十枚

右九味以水一斗煮取四升當小汗薄覆脊憲
几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風并治
但伏不得卧欬逆上氣面目浮腫

千金三黃湯治中風手足拘急百節疼痛煩
熱心亂惡寒經日不欲飲食

麻黃

五錢

獨活

四錢

細辛

二錢

黃芩
錢

黃芩
錢

右五味以水六升煮取二升溫三服一服小汗
二服大汗心熱加大黃二錢腹痛加枳實一枚
氣逆加人參三錢悸加牡蠣三錢渴加括囊根
三錢先有寒加附子一枚

近効方

术附湯治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌
補中益精氣

白术
二
兩

附子
一枚半
炮去皮
炙

右三味剉每五錢匕姜五片棗一枚水盞半煎

七分去滓溫服

崔氏八味丸治脚氣上入小腹不仁

乾地黃八两

山茱萸

署蕷各四两

澤鴻

茯苓

牡丹皮各三两

桂枝

附子炮各一两

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸日

再服

千金方越婢加术湯治內極熱則身體津脫
腠理開汗大泄厲風氣下焦脚弱

麻黃六两

石膏半斤

生姜三两

甘草二兩

白朮四兩

大棗十五枚

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮
取三升分溫三服○惡風加附子一枚炮

○血痺虛勞病脉證并治第六

論一首 脉證九條 方九首

問曰血痺病從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重
困疲勞汗出卧不時動搖加被微風遂得之但以脉自
微濇在寸口閑上小緊宜鍼引陽氣令脉和緊去則愈
血痺陰陽俱微寸口閑上微尺中小緊外證身體不仁
如風痺狀黃耆桂枝五物湯主之

黃耆桂枝五物湯方

黃耆

三兩

芍藥

三兩

桂枝

三兩

生姜

六兩

大棗

十二枚

右五味以水六升煮取二升溫服七合日三服

人參一
方有

夫男子平人脉大爲勞極虛亦爲勞○男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸脉浮者裏虛也○男子脉虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時目瞑兼衄小腹滿此爲勞使之然○勞之爲病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬瘥陰寒精自出酸削不能行○男子脉浮弱而

潘烏無子精氣清冷

一作冷

○夫失精家小腹弦急陰頭

寒目眩

一作
眼痛

髮落脈極虛乳遲爲清穀亡血失精脉

得諸乳動微緊男子失精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯

主之

桂枝加龍骨牡蠣湯方

小品云虛弱浮熱汗出者除桂加白薇附

子各三分故曰二加龍骨湯

桂枝

芍藥

生姜各三

甘草

二兩

大棗故十二

龍骨

牡蠣

右七味以水七升煮取三升分溫三服

天雄散方

天雄

三兩炮

白术

八兩

桂枝

六兩

龍骨

三兩

右四味杵爲散酒服半錢七日三服不知稍增之

男子平人脉虛弱經微者善盜汗也○人年五六十其病脉大者痺俠背行若腸鳴馬刀俠瘦者皆爲勞得之○脉沉小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則溏泄食不消化也○脉弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛虛寒相搏此名爲革婦人則半

產漏下男子則亡血失精

虛勞裏急悸効腹中痛夢失精四肢痠痛手足煩熱咽乾口燥小建中湯主之

小建中湯方

桂枝

三兩去皮

甘草

三兩炙

大棗

十二枚

芍藥

八兩

生姜

二兩

膠飴

一升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上

微火消解溫服一升日三服

嘔家不可用建中湯以餅故也

千金療男女因積冷氣滯或大病後不服常苦四肢沉重骨肉痠疼兩兩少氣行動喘乏脣滿氣急腰背強痛心中虛浮咽乾唇燥而體少色或飲食無味脇肋腹脹頭重不舉多卧少起甚

者積年輕者百日漸致瘦弱五藏氣竭則難可復當六脉俱不足虛寒之氣少腹拘急羸瘠百

病名曰黃耆建中

湯又有人參二兩

虛勞裏急諸不足黃耆建中湯主之

於小建中湯內加黃耆一兩半餘依

上法○氣短胸滿者加生姜腰痛者去棗加茯苓一兩半及療肺虛損不足補氣加半夏三兩

虛勞腰痛少腹拘急小便不利者八味腎氣丸主之

方見

腳氣
中

虛勞諸不足風氣百疾薯蕷丸主之

薯蕷丸方

薯蕷

三十

當歸

桂枝

麵

乾地黃

豆黃卷

各十
分

甘草

二十分

人參

七分

芎藶

芍藥

白朮

麥門冬

杏仁

各六分

柴胡

桔梗

茯苓

各五分

阿膠

七分

乾姜

三分

白斂

二分

防風

六分

大棗

百枚爲膏

右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒
服一丸一百丸爲劑

虛勞虛煩不得眠酸棗湯主之

酸棗湯方

酸棗仁

一升

甘草

一兩

知母

二兩

茯苓二两

芎窮二两

○深師有生
姜二两

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮
取三升分溫三服

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷憂傷飲傷房室傷
饑傷旁傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩目黯
黑緩中補虛大黃麌丸主之

大黃麌丸方

大黃十分

蒸

黃芩二两

蒸

甘草三两

蒸

桃仁一升

蒸

杏仁一升

蒸

芍藥四两

蒸

乾地黃十两

蒸

乾漆一两

蒸

蟲一升

蒸

水蛭

百枚

鱗螬

一升

塵蟲

半升

右十二味末之煉蜜爲丸小豆大酒飲服五丸

日三服

附方

千金翼灸甘草湯

一云復脉湯

治虛勞不足汗出

而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十

一日死

甘草

炙四两

桂枝

生姜

各三两

麥門冬

半斤

麻仁

半斤

人參

阿膠

各二两

大棗

三十枚

生地黃

一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去
滓內膠消盡溫服一升日三服

肘後癩肝散治冷勞又主鬼症一門相染

癩肝一具炙乾末之水服方寸匕日三服

○肺痿肺癰欬嗽上氣病脉證治第七

論三首 脉證四條 方十五首

問曰熱在上焦者因欬爲肺痿肺癰之病何從得之師
曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難
又被快藥下利重亡津液故得之曰寸口脉數其人欬
口中反有濁唾涎沫者何師曰爲肺痿之病若口中辟

辟燥欬即胸中隱隱痛脉反滑數此爲肺癰欬唾濃血
脉數虛者爲肺痿數實者爲肺癰○問曰病欬逆脉之
何以知此爲肺癰當有膿血吐之則死其脉何類師曰
寸口脉微而數微則爲風數則爲熱微則汗出數則惡
寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不岀風傷皮毛
熱傷血肺風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴時
唾濁沫時時振寒熱之所過血爲之凝滯畜結癰膿吐
如米粥始萌可挾膿成則死○上氣面浮腫肩息其脉
浮大不治又加利尤甚○上氣喘而躁者屬肺脹欬作
風水發汗則愈

肺癆吐涎沫而不咳者其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此爲肺中冷必眩多涎唾甘草乾姜湯以溫之若服湯已渴者屬消渴

甘草乾姜湯方

甘草

四两
炙

乾姜

二两
炮

右㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再

服

欬而上氣喉中水鶴聲射干麻黃湯主之

射干麻黃湯方

射干

十三枚一
法三两

麻黃

四两

生姜

四两

細辛

紫苑

欬冬花各三
兩

五味子半升

大棗七枚

半夏一

大者洗八枚

法半斤

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫
內諸藥煮取三升分溫三服

欬逆上氣時時唾濁但坐不得服皂莢丸主之

皂莢丸方

皂莢

八兩刮去皮用酥炙

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三丸

日三夜一服

欬而脉浮者厚朴麻黃湯主之

厚朴麻黃湯方

厚朴五
升

麻黃四
升

石膏如鷄
子大

杏仁半
升

半夏半
升

乾姜二
升

細辛二
升

小麥一
升

五味子半
升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥煮取三升溫服一升日三服

脉沉者澤漆湯主之

澤漆湯方

半夏半
升

紫參五
兩

一作紫苑

澤漆三斤以東流水
五斗煮取斗五

生姜五
兩

白前五
兩

甘草

金匱要略方
卷上
黃芩

人參

桂枝各三
兩

右九味㕮咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合
至夜盡

大逆上氣咽喉不利止逆下氣者麥門冬湯主之

麥門冬湯方

麥門冬七升

半夏一升

人參二兩

甘草二兩

粳米三合

大棗十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日

三夜一服

肺癰喘不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之

葶藶大棗瀉肺湯方

葶藶

炙令黃色搗丸如彈丸大

大棗

十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取一升頓服

欬而胸滿振脉寒數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者爲肺癰桔梗湯主之

桔梗湯方

亦治脾血

桔梗

一兩

甘草

二兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服則吐膿

血色

欬而上氣此爲肺脹其人喘目如脫狀脉浮大者越婢
加半夏湯主之

越婢加半夏湯方

麻黃六兩

石膏半斤

生姜三兩

大棗十五枚

甘草二兩

半夏半升

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮
取一升分溫三服

肺脹欬而上氣煩燥而喘脉浮者心下有水小青龍加
石膏湯主之

小青龍加石膏湯方

千金證治同外臺
加膈下痛引缺盆

麻黃

芍藥

桂枝

細辛

甘草

乾姜

各半升

石膏

二兩

右九味以水一斗先煮麻黃去上沫內諸藥煮
取三升強人服一升羸者減之日三服小兒服
四合

附方

外蒙炙甘草湯治肺痿涎唾多心中溫溫液
液者勸覩千金甘草湯

甘草

右一味以水三升煮減半分溫三服

千金生姜甘草湯治肺痿欬唾涎沫不止咽

燥而渴

生姜五

人參二

甘草四

大棗十五

右四味以水七升煮取三升分溫三服

千金桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫

桂枝

生姜各三

甘草二

大棗十

皂莢二

子炙焦去皮

右五味以水七升微微大煮取三升分溫三服

外臺桔梗白散治欬而胸滿振寒脉數咽乾
不渴時出濁唾腥臭又吐膿如米粥者爲

肺癰

桔梗

貝母各三

巴豆

一分去皮熬研如脂

右三味爲散強人飲服半錢七羸者減之病在
膈上者吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲令
水一盃

千金薷薷湯治欬有微熱煩滿胸中甲錯是
爲肺癰

薷薷二升

薏苡仁半升

桃仁五十

卷之三
瓜瓣半升

右四味以水一斗先煮蕎蕎得五升去滓內諸藥煮取二升服一升再服當吐如膿

肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞亭歷大棗鴻肺湯主之方見上三日一劑可至三四劑此先服小青龍湯一劑乃進小青龍方見欬嗽門中

○奔㹠氣病脉證治第八

論二首 方三首

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從驚發得之師曰奔豚病從小腹起上衝咽喉發作欬死

復還止皆從驚恐得之

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

奔豚湯方

甘草

芍藥

當歸各二

半夏

四兩

黃芩

二兩

生葛五兩

芍藥

二兩

生姜

四兩

甘李根白皮

一升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜

一服

發汗後燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發貢豚氣從小腹上至心灸其核上各一壯與桂枝加桂湯主

之

桂枝加桂湯方

桂枝五兩

芍藥三兩

甘草三兩炙

生姜三兩

大棗十二枚

升

右五味以水七升微火煮取三升去滓溫服一

發汗後臍下悸者欲作賁豚茯苓桂枝甘草大棗湯主
之

茯苓桂枝甘草大棗湯方

茯苓半斤

甘草二兩炙

大棗十五枚

桂枝四兩

右四味以甘爛水一斗先煮菝葜減二升內諸

藥煮取三升去滓溫服一升日三服

甘爛水法
取水二斗

置大盆內以杓揚之水上
有珠子五六十顆相逐取用之

○胸痺心痛短氣病脈證治第九

論一首 脉證一條 方十首

師曰夫脉當取太過不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者責其極虛也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦故也○平人無寒熱短氣不足以息者實也○胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脉沉而遲閏

上小緊數用後方主之

金匱要略
卷上
三
括萎薤白白酒湯方

括萎實一升
薤白半升
白酒升

右三味同煮取二升分溫再服

胸痺不得卧心痛徹背者括萎薤白半夏湯主之

括萎薤白半夏湯方

括萎實一枚
薤白兩
半夏半升

白酒一斗

右四味同煮取四升溫服一升日三服

胸痺心中痞留氣結在胸胃滿脇下逆愴心枳實薤白

桂枝湯主之人參湯亦主之

枳實

四枚

厚朴

四兩

薤白

半斤

桂枝

一兩

括萎

一枚搗

右五味以水五升先煮枳實厚朴取一升去滓
內諸藥煮數沸分溫三服

人參湯方

人參

甘草

乾姜

白朮

各三兩

右四味以水八升煮取三升溫服一升日三服

胸痺胸中氣寒短氣疾芩杏仁甘草湯主之橘枳姜湯亦主之

亦主之

金匱要略方
卷五
茯苓杏仁甘草湯方

茯苓

三两

杏仁

五十

甘草

一两

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服
不差更服

橘枳姜湯方

橘皮

一斤

枳實

三两

生姜

半斤

右三味以水五升煮取二升分溫再服

時後十
金云治

胸
脾
中
福
海
如
滿
噎
塞
腎
如
痒
喉
中
澁
睡
燥
沫

胸痺緩急者用後方主之

薏苡附子散方

薏苡仁十五两
大附子十枚炮

右二味杵為散服方寸七日三服

心中痞諸逆心懸痛桂枝生姜枳實湯主之

桂姜枳實湯方

桂枝 生姜各三两 枳實五枚炮

右三味以水六升煮取三升分溫三服

心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之

赤石脂丸方

蜀椒一两一法二分 烏頭一分 附子半两炮一法一分

乾姜一两一分 赤石脂一两一分 法二分

右五味末之蜜丸如梧子大先食服一丸日三服

九痛丸治九種心痛

附子

炮三兩

生狼牙

一兩炙香巴豆

一兩去皮心熬餅如脂

人參

乾姜

吳茱萸

各一兩

右六味末之煉蜜丸如梧子大酒下強人初服
三丸日三服弱者二丸○兼治卒中惡腹脹痛
口不能言又治連年積冷流注心胸痛并冷腫
上氣落馬墜車血疾等皆主之忌口如常法

○腹滿寒疝宿食病脉證治第十

論一首 脉證十六條 方十五首

趺陽脉微弦法當腹滿不滿者必便難兩胠疼痛此虛寒從下上也當以溫藥服之○病者腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之舌黃未下者下之黃自去○腹滿時減復如故此為寒當與溫藥○病者瘦黃躁而不渴胸中寒實而利不止者死○寸口脉弦者即脇下拘急而痛其人嗵嗵惡寒也○夫中寒家喜欠其人清涕出發熱色和者善嘔○中寒其人下利以裏虛也欲嘔不能此人肚中寒一云痛○夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞也

之

厚朴七物湯方

厚朴半斤

甘草

大黃

各三
兩

大棗十枚

枳實五枚

桂枝二
兩

生姜五
兩

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三服
○嘔者加半夏五合○下利去大黃○寒多者

加生姜至半斤

腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐附子粳米湯主之

附子粳米湯方

附子

一枚
炮

粳米

半升
半升

甘草

一兩

大棗

十枚

粳米

半升

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升

日三服

痛而閉者用後湯主之

厚朴三物湯方

厚朴

八兩

大黃

四兩

枳實

五枚

右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大

黃煮取三升溫分一升以利爲度

按之心下滿痛者此爲實也當下之宜大柴胡湯主之

大柴胡湯方

柴胡半斤

黃芩三兩

芍藥二兩

半夏半升

枳實四枚

大棗二兩

大棗十二枚

生姜五兩

右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫
服一升日三服

腹滿不減減不足言當湏下之宜大承氣湯

大承氣湯方

大黃半斤

酒洗四兩

厚朴半斤

皮炙去

枳實五枚

炙五枚

芒硝二合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓内大
黃煮取二升内芒硝更上火微一二沸分温再
服得下餘勿服

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有
頭足上下痛而不可觸近宜用後湯

大建中湯方

蜀椒二合

乾姜

四两

人參

二两

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升
微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥

二升後更服當一日食糜溫覆之

脇下偏痛發熱其脉緊弦此寒也以溫藥下之宜用後

湯

大黃附子湯方

大黃三兩

附子炮三枚

細辛二兩

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強人
煮取二升半分溫三服服後如人行四五里進
一服

寒氣厥逆赤丸主之

赤丸方

茯苓

四兩

半夏

四兩洗

烏頭

二兩炮

細辛

一兩半金作人參

右六味末之內真珠爲色蜜煉丸如麻子大先
食酒飲下三丸日再夜一服不知稍增之以知
爲度

腹痛脉弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪
正相搏即爲寒疝寒疝逆臍痛苦發則白汗出手足厥
冷其脉沉弦者大烏頭煎主之

烏頭煎方

烏頭大者去皮五枚熬

右以水三升煮取一升去滓内蜜二升煎令水氣盡取二升强者服七合弱者服五合不差明日更服不可日再服

寒疝腹中痛及脇痛裏急者宜用後方

當歸生姜羊肉湯方

當歸

三兩

生姜

五兩

羊肉

一斤

右三味以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多者加生姜成一斤痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩加生姜者亦加水五升煮取三

升二合服之

寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸藥不能
治抵當用後方

烏頭桂枝湯方

烏頭

右一味以蜜二斤煎減半去滓以桂枝湯五合
解之得一升後初服二合不知即服三合又不
知復加至五合其知者如醉狀得吐者爲中病

桂枝湯方

桂枝

三兩去皮

芍藥

三兩

甘草

二兩炙

生姜

三兩

大棗

十二枚

右五味剉以水七升微火煮取三升去滓

其脉數而緊乃弦狀如弓弦按之不移脉數弦者當下
其寒脉緊大而遲者必心下堅脉大而緊者陽中有陰
可下之

附方

外臺烏頭湯治寒疝腹中絞痛賊風入攻五
臟拘急不得轉側發作有時瘦人陰縮手足

厥逆

方見上

外臺柴胡桂湯方治心腹卒中痛者

柴胡

四兩

黃芩

人參

芍藥

桂枝

生姜

各一
兩半

甘草

一
兩

半夏

二
合

大棗

六
枚

右九味以水六升煮取三升溫服一升日三服
外臺走馬湯治中惡心痛腹脹大便不通

巴豆

二枚去

皮心熬

杏仁

一枚

右二味以綿纏搘令碎熟湯二合捻取白汁飲
之當下老小量之通治飛尸鬼擊病

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脉浮而大按之
及濇尺中亦微而濇故知有宿食大承氣湯主之○脉
數而滑者實此有宿食下之愈宜大承氣湯○下利不

飲食者有宿食也下之宜大承氣湯

大承氣湯方

見前瘡病中

宿食在上脘當吐之宜瓜蒂散

瓜蒂散方

瓜蒂一分

赤小豆一分

熬黃煮

右三味杵爲散以香豉七合煮取汁和散一錢七

溫服之不吐者少加之以快吐爲度而止

亡血及虛者不可與之

脉緊如轉索無常者有宿食也○脉緊頭痛風寒腹中
有宿食不化也口云脉緊